

Theodore
Besterman


391

IN PRAESALIA

IN PRAESALIA

HISTORIA

LONDON



VNIVERSALIS
Plantarum
HISTORIAE
Tomus II.

ANIVERSALIS

Plantarum

HISTORIAE

Tomus II.

SOL AD ASPECTUM NUNCIAT DE GLORIOSO DEO
INSTRUMENTUM EST ADMIRABILE OPUS ALTISSIMI. Ecce tunc



HISTORIA
PLANTARUM

UNIVERSALIS

Tomus II.

Auctoribus

JOHANNE BAUHINO,

Archiatro.

JOH. HENRICO CHERLERO,

Doctore:

Basilienfis

Quam recensuit et auxit

DOMINICUS CHABRAUS,

D. Genevensis

Jusis verò publicis fecit,

FR. LUD. AGRAFFENRIED,

Dñs in Gentzensee etc.

EBRODUNI.

MDC LI. W. H. pples


Dominus creavit e terra pharmaca, vir prudens non gravabitur
illis. Eccl. xxxix. 4.

NEOCOMUNE.

Contr. Meyer fecit.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

PLANTARUM
SINGULARUM
TOMI II.
JONATHAN BARNES
JOHN BARNES
DOMINICUS CHARRAS
R. L. AGRAVATED
R. L. AGRAVATED
R. L. AGRAVATED



HISTORIA
PLANTARVM
VNIVERSALIS NOVA
ET ABSOLVTISSIMA
CVM CONSENSV ET DISSENSV
CIRCA EAS.

Auctoribus

IOH. BAVHINO ILL. CELS. VVIRT.
ARCHIATRO

ET

IOH. HEN. CHERLERO PHILOS. ET MED. DOCT.
BASILIENSIBVS.

Quam recensuit & auxit

DOMINICVS CHABRÆVS MED. DOCT.
GENEVENSIS.

Iuris verò publici fecit

FRANCISCVS LVD. A GRAFFENRIED.
Dominus in Gertzensee &c.

Continens

DESCRIPTIONES STIRPIVM EXACTAS, FIGVRAS NOVAS, EX IPSO
Prototypo maxima ex parte depictas: earundem Satum, Cultum, Mangonia: item Vires omnige-
nas: Præparationes, Extractiones, ac Distillationes præcipuas: Exoticarum Orien-
tis atque Occidentis, aliarumque ante nostrum seculum incognitarum,
supra mille Historias novas: Synonyma: Equiuoca: Succe-
danæ: & præcipuarum Linguarum appellationes.

In primis verò

PLACITA VETERVM GRAECORVM, ARABVM, LATINORVM.
& posterioris seculi Scriptorum:

INTERPRETATIONES AC CORRECTIONES SENTENTIARVM
obscurarum & deprauatarum.

Notantur ERRORES eorum qui de Plantis scripserunt: Ac continentur
plæraque omnia, quæ

THEOLOGI, IURISCONSULTI, MEDICI, PHILOSOPHI, HISTORICI, POETAE
Grammatici, Geoponici, Architecti, alique de Plantis promulgarunt.

Vt meritò omnium Herbariorum vicem supplere queat.

TOMVS II

EBRODVNI

CIO. IO. CLI.

A MAGNIFIQUE ET PUISSANT SEIGNEUR

FRANCOIS LOVYS DE GRAFFENRIED

SEIGNEUR DE GERTZENZEE DV GRAND ET SOUVERAIN

Senat de la ville de Berne, Baillif d'Yverdon, Sur l'Impression de son Herbiere.

QUATRAINS

SEigneur Agent infiny, ce Puissant Oeconome
Qui a basti d'un rié tout ce grand Vniuers,
Aux herbes a donné des offices diuers,
Et des Proprietez pour la santé de l'homme.
Le sçauant Esculape a esté le premier,
La Princesse Ciré a esté la seconde,
Et Hermes le troisieme qui ont laissé au monde
Les Vertus des herboiges ia au siecle premier.
Dés lors les plus grands Rois ont reputé à gloire
De s'attirer du n. m. de quelq' herbe nouvelle
Gentin de Gentiane, & Prunel de Prunelles
Artemise d'Armoise, Eupator d'Eupatoire.
Alors on appellait les enfans du Soleil
Les Diktés qui auoyent des herbes la norice.
Comment nommera-t-on cil qui d'un artifice
Admirable produit, cet Herbiere numpareil
Si d'une seule plante aduinte au Catalogue
Des autres, ils ont fait tant d'estime & de cas,
Qu'est-ce que nous diront? Ains ne diront nous pas
Que nous devons chanter de GRAFFENRIED l'Eloge?
De GRAFFENRIED qui est un Seigneur Magnifique,
Un Baillif de bonnaire, amateur de Iustice,
Fauteur de l'Innocence, & punisseur du vice
Grand Pilier au Cant. n. de BERNE l'Heroïque.
Qui n. n. pour son esgard, ou profit, ou traisie,
Estale en ce Volume mille plantes incognues,
Au grand Dioscoride, les raisons qui l'ont menés
A ce noble dessein, C'est le bien du public.
Tu me diras que Cherler, que Chabrey, que Baubins,
Y ont contribué de leur peine beaucoup,
Il est vray, mais c'est luy qui a fait ce beau coup
D'auoir heureusement mis cet œuvre a sa fin.
Oœuvre qui prendra fin, seulement quand ce tour
Sera réduit en feu. Mais tandis que la fleur
Verdira au printemps, la memoire & l'honneur
De ce DE GRAFFENRIED ne verra point de bout.
De tous vous Medecins, commencés les premiers
A louer ce Chef d'œuvre, qui vous saurra la source
De pouuoir à l'honneur bien remplir vostre bourse.
Et couronner vos chefs de verdoyans lauriers.
Vous humains qui auez icy un repertoire,
De remedes certains pour soulager vos maux
Exaltez ce Seigneur, benissez ses travaux
Et en rendez à DIEU loüange, honneur, & gloire.

G. BULET Sieur de Grand

DOMINVS A GRAFFENRIED ANAGRAMMA.

DIGNVS ODE FERRI MANA

EVOLVTIO.

SINT Meccenates, non deerunt, Flacce, Marones,
Ritè Poëta canit, quisquis & ille fiet;
Hoc, liber iste docet, cuius monumenta laboris
Magnorum crexit dextera gnara Virum.
Quid sit Amaltheæ cornu qui nôsse laborat
Huius præstabit lectio lecta libri.
Quid Chiron, Pæon, Podalyrius, atque Machaon,
Quid medicus Lucas, præstiteritque Philon.
Clusius, atque Tragus, Gesnerus, quid Lonicerus
Gesseri, hoc præiens continet omne Liber.
Plantigraphorum alii stipata volumina voluant,
Sed tibi præ reliquis hic liber vnus erit.
Acriter heic dum tres desudauêre Marones,
En! nec Meccenas defuit altus ope.
His grauis astes erat mox Grafenriedius Heros,
Gentis qui & mentis nobilitate valet.
Promouet hic operas, argenti & prodigus auri,
Inuitâ perâ nec remoratur opus.
Eius magnifico sumptu bene seruit incus,
Contuleret magnis vt liber iste Viris.
Non fiet hic dignus Meccenas ferri odes?
Staret inoblitis non sibi semper honos?
Vespasiane vale qui spurca lucella matellis
Exigis, hinc putet sordida fama tibi.
Sed Grafenriedi, saluèque, vigèque, virèque,
Lilia dum violam & florea rura dabunt.
Non lucra putida amas, sed commoda totius orbis,
Publica priuatis anteferendo lucris.
DIGNVS es ergo vehi nostra Venerabilis ODE,
MANA fama Viro huic inclyta, yua mane.
Claudam oden voto: Grafenriedi, viue Galeni
Lustra senex, à te cætera namque petes.

Ereostichon per phalacin.

est IesVs MeDICVs IVVans probat Vs
ægriVs Vera panaX, & Vnlsânans.

Obseruantiz E.F.

L. M. Q.

Hen. Ernius H.F. Tigur.
Ecclesiæ Capellanæ D.

CLARISSIMO Dⁿ. DOCTORI CHABRAEO.
MEDICO PERITISSIMO, HISTORIÆ PLANTARVM
instauratori diligentissimo.



R T I S Apollineæ quamvis cernantur in arte,
Censores multi, Medicas qui spernere Musas
Conutiis tentant, illas & dente maligno
Rodere non cessant : Medici non tollere possunt
Nodosos morbos, dicentes, & mala tristes
Dura lepræ, tum vastantis contagia pestis :
Insuper in campis creseit non herbula contra

Vim mortis rigidæ. Tua sed mens dedita Phœbo,
Scommata committit furiosis flatibus ista.
Nam sapiens clarum parcat contemnere Phœbum.
Hinc bene, gentis Apollineæ Propagator & Auctor,
Herbarum virtutes, radiceque potentes,
Et folia, & flores, caules, & semina, fructus
Diuersos, pisces varios, mineralia plura,
Narcissos, ceras flauas imitantia pruna,
Ac pyra cum cerasis, Thisbæi mora cruoris,
Castaneæque, nuces. & mespila, dulcia poma,
Tum dulces Bacchi succos, ratione propomis.
Hic liber iste tuus se nobilitate tuetur :
Nam sensus dubios, pugnancia scripta virorum
Doctrinâ Medicâ clarorum, soluere præstat.
Succurrit sanis, illis bona fercula præbet,
Omnibus inferuire solet mortalibus ægris
Nam morbus cerebrum magnus si corripit ipsum,
Actio si cordis vitalis læsa veneno,
Actio si hecoris turbatur bile funestâ,
Actio si stomachi læsa est, si tussis acerbat
Pulmones molles, renes quando dolor viget,
Si lacerat dentes, oculos, & membra fatigit.
Tum truculenta tabes corpus eum conficit omne,
Si rabie canis, & si læsit aranea valde,
Si nocuit serpens, si vipera dente momordit,
Tunc adfert Medicas herbas, & vincere morbos,
Corporis ac vires direptas reddere, tentat.
Singula quis numeret : restant perplura canendi,
Sed, peto, cognoscas animo mea scripta benigno,
Nestoris ac superes Musis comitantibus annos.

Obseruantia & amicitia E. F. L. M. Q.
Fridericus Striberus Medicus. Dilect.



SERENISSIMO
PRINCIPI AC DOMINO,
DOMINO

HENRICO D'ORLEANS

LONGOVILLÆ NEC NON ESTOVTENVILLÆ DVCI:
GALLIÆ PARI:

Nouicastro & Vallangini SUPREMO PRINCIPI:

COMITI in Dunois, S. Paul, Chaumont, Gournay, & Tancarville:

DYNASTÆ in Colummiers en Brie: . . .

BARONI in Vouuant, Veruant, Montreuilbellay, Humbic, Bricquebec &c.

NORMANNIÆ CONNESTABILI HÆREDITARIO:

Ejusdémque Prouinciæ, Christianissimæ Majestatis nomine ADMINISTRA-
TORI & PROREGI:

Regiorumque Galliæ Ordinum EQVITI.



VEM nuper SERENISSIME
PRINCEPS, obuiis exceptit vlnis
Medicorum turba, denuò prodit
Naturæ Genius. Et qui duodecim
antehac promulgatis Libris Arbo-
rum & Fruticum Historiam absol-
uit: totidem jam ad aliorum, non
minùs cognitu necessariorum, gra-
phicam Enarrationem accingitur.

Hic enim Suffrutices: hic Rosæ: hic scandentes Plantæ: hic
Dionyso sacra: hic Legumina: hic Cereales Fruges: hic Gra-
mina: hic Iunci: hic Arundines: hic Flores hortorum decus: hic
Rapunculi & Campanulæ: hic Nasturtia: hic Culinariæ her-
bæ: hic Mollientes & Oleraceæ: hic Lactuæ & reliquæ Pap-
posæ recensentur, delineantur, pinguntur.

Hic tandem Veterum & Recentiorum circa eas Placita
obscura reteguntur, alia illustrantur, Nodi soluuntur, Dissi-
dia componuntur, notantur Lapsus.

Tom. II.

Nec deerit in quo miretur Mundus se tot cecutiuisse seculis: atque adeò Poëtæ factus sit locus Epiphonemati

*Lucetius
Val. Flaccus.* *O miseras hominum mentes, ô pectora ceca!
Qualibus in tenebris vita, quantisq; periclis
Degitur hoc aui quodcunque est?*

Et ut EN ΟΛΙΓΟΙΣ ΠΟΛΛΑ, hic non Aegypti ΑΒΑΣΕΙΣ, sed bifera Alcinoi Viridaria: Horti Adonidis: Insula Tilos, palmarum, vinearum & margaritarum ferax: atque quicquid in physicarum rerum adytis & penetralibus aperiendis potuerunt celeberrimorum Philosophorum ac Medicorum solertia, sedulitas, & candor.

Prodit igitur alius nostri ΙΟΗ. ΒΑΥΗΝΙ foetus: nec redimere volentibus longiores trahere datum moras. Diphilo in suis producendis sint alii tardiores: Acellæ expectent alii Lunam: Nobis humano generi prodesse animus.

Qui autem Primogenito Præpotentes inuénimus Patronos, à quibus scilicet inter alia & Cunas habuerat: Eandem & huic optamus sortem, sub cuius auspiciis cum nomine & splendore publici fiat juris. Minimè enim nos latet quibus hæc sine ridica vitis & Coeli & animalium exponatur iniuriis: Quàm fastidiosa sit hujus æui peruersitas: Quàm magnus sit labor cani lectum sternere: Quàm crescere aliquid ægre ferat Inuidia: Quàm graues sint Zoilorum morsus: Præsertim verò quam aduersus ejusmodi malè feriatos homines præstet tutelam Principum virorum patrocinium.

Nec diu deliberandum fuit, PRINCEPS SERENISSIME, cujus clientelæ hoc committeretur OPVS. Ad te enim trahebant ejus cum tuis harum regionum amplis Ditio- nibus loci natalitij vicinitas, ac SERENISSIMAE CELSITVDINIS TVAE erga omnes humanitas, in literas & literatos pronus animus: maximè verò innatum GRAFFENRIEDANI GENERIS illi quam facimus parti de SUPREMIS Nouicastrensium DYNASTIS bene merendi studium. Cujus sicut & foelicia & grata ab Auo & à Parente piæ memoriæ edita fuere specimina; sic & NOBIS in eadem humili deuotione pergendi animus, & ejusdem spes gratiæ quæ à CEL-
SIS SI-

SISSIMIS PRINCIPIBUS Majorum nostrorum accessit
rebus.

Ecquem porrò Nostris hisce & incomparabilis illius BAV-
HINI lucubrationibus præcellentiorem fautorem Mæcena-
témve præfecissemus, quàm Principem cuius Stemma vene-
ratur Gallia: cuius in Rempublicam Christianam merita cele-
brat Orbis: Principem pace bellóque, sago togáque, Arte &
Marte, apud omnes Gentes celeberrimum. Principem præpo-
tentem, clementissimum, munificentissimum. Principem cui
labor in negotiis, fortitudo in periculis, industria in agendo, ce-
leritas in conficiendo, & consilium in prouidendo, tanta in vno
sunt, quanta in multis aliis etiam insignibus vix reperiuntur.
Principem quem numerosissimos exercitus cum tummo impe-
rio foelicissimè ducentem vidit Germania, vidit Italia, viderunt
Iberia, Burgundia, & Lotharingia, semper & vbique vincentē.
Principem Monasteriensis PACIS inter CAESAREAM,
CHRISTIANISSIMAM, & SVECICAM MAIEST.
aliásque nonnullas Europæ Orbis primarias POTESTA-
TES, nuper initæ præcipuum ARBITRVM. Atque adeò
Principem quem meritò dixeris omnibus reddidisse omnia,
singula singulis: prostratosque restituisse Magistratus & siccas
effecisse ficas. Principem tandem, vt in his encomiorum suffiti-
bus parci simus, quem vnum rerum Natura videtur edidisse, vt
ostenderet quid in summa Fortuna summa posset Virtus.

Talem nos eligimus Patronum, PRINCEPS SERE-
NISSIME, Vniuersalis Plantarum Historiæ SECUNDAM hanc
PARTEM, quâ par est humili submissione, SERENISSIMAE
CELSITVDINI TVAE offerentes & consecrantes.

Auiculæ, cùm nihil possent opulentiùs, plumas ad magni-
ficentissimum Delphici Apollinis templum vltro feruntur
detulisse: Apes ceras. Sic nos ad tuas aras quod opis est nostræ:
nec dedignaberis Munus quod studio suo dignum plurimi cen-
suere Reges, quodq; Mausoleis prætulit Cariæ regina, quæ post
tot annorum myriades adhuc per Artemisiam viuit. GLORIAM
sic TVAM tradent Posteris, & in huius Vniuersi extremis claratam
conseruabunt, omnia ea quæ in hominis & pecudum escam, in

arua-

aruorum & hortorum decus cedunt, quibus hic, quanta quanta nostra sunt, eminentissimo LONGOVILLAEI NOMINI litamus.

Superest, PRINCEPS SERENISSIME, ut obsequij hoc anathema, humillimæ obseruantiae monumentum, et quaecunque beneficiorum redhostimentum, quod Sacratio tuo appendere annitimur, quo soles omnia, benigno & sereno suscipias vultu. Superest tandem, ut ab illustrissimo & Splendidissimo Nomine Tuo huic abiturienti tuarum laudum Praeconi nitorem & commendationem accedere lubens patiari: nosque tibi in omnem seruitutem deditissimos semper in posterum studio & fauore tuo prosequi digneris.

Sic, ô Nate in exemplum virorum Principum, Nestoreos quàm foelicissimè viue annos. Sic impleat lehoua petitiones tuas. In his desinunt votis

PRINCEPS SERENISSIME,

SERENISSIMÆ TVÆ CELSITVDINIS

Cientes Humillimi,

FRANCISCVS LVDOVICVS à GRAFFENRIED
D. in Gertzenzee, Ebrodunensis Bernensium Ditionis pro tempore Praefectus:

&

DOMINICVS CHABRÆVS M. D.
Illustriss. Celsit. Vvirtemb. à Consiliis Medicis,
Vrbisq; Ebrodunensis Medicus ordinarius.

*Ebroduni Heluetiorum Calendis Iun.
Anno salutis M. DC. LI.*



HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER XIII

(CXX)

FRVTICES ET SVFRVTICES FLORE

ROSEO HISQVE AFFINES.

PROXIMUM nunc locum dabimus iis fruticibus ac suffruticibus, quos r. seo quodam flore, veluti ornamento proprio natura donavit: contentioni fortè sit locus, si separemus, quæ similitudinibus & amicitia illa quasi reſſera ab eadem sunt unita.

DE CISTO VETERVM SENTENTIAE.

C A P. I.

Theophr.


Error mul-
torum.

Cisti duo
genera.

Flor.

Cisti mas-
culina.

Dioſc.
Citharus
& Cisthar-
on.



SUNT, auctore Theophrasto, eorum [quibus aculeus deest] genera complura, summiſque differentiis diſcreta, ut *mas* [Gaza, *mas* Hederæ verit, ut in Theophr. legitur, quem Plinius, Ruellius & olim etiam Cluſius ſequutus eſt, ſed male: legendum enim *mas*, et ſi, ut poſt etiam Cluſ.] cuius duo genera traduntur, mas & fœmina. Quoniam altera majus, durius, pinguiſque folium [vox *mas* in quibusdam Theophr. codicibus male deſideratur] habeat, florẽque ad purpuram inclinatum: ambabus tamen flores Roſis [in Al. dno: c. dice male omittitur vox *mas*] ſylveſtribus proximi, verũ minores & ſine odore.

Plinius non animadvertens diſtinctionem inter *mas* & *mas*, Theophr. in emendam lectionem ſequitur, ita ſcribens: Hederæ [legendum Cisti] duo genera prima, mas & fœmina: major traditur mas, corpore & folio duriore etiam ac pinguiore & flore ad purpuram accedente. Vtriuſque autem ſlos ſimilis Roſæ ſylveſtri, niſi quidd careat odore. Vtuntur [ad coronas] & Hederæ [leg. Cisti] flore purpureo. Eſt & in alio genere, earum ſylveſtribus Roſis ſimilis. Et in iis quoque color tantũ deſectat, odor autem abeſt. Græci vicino vocabulo Cithon appellat fruticem majorem Thymo, foliis Ocimi. Duo ejus genera. Floſ maſculus roſaceus fœmine albus. Plinium autem de Dioſcoridis Cisto dicere, ambiguum non eſt, teſte Cornario, etiamſi ex toto non omnia ita reſpondeant, & hoc ſanè loco Hederæ nomen [Cisti] Cisto vicinum dicit. Theophrasti porro Græcum exemplar multas hinc ſæculis mendosum fuiſſe teſtatur Cluſius & alij. *mas* igitur pro *mas*, locis citatis apud Plinium legendum eſſe conſtat. Cistus [xistos] quem aliqui Citharon aut Citharon [*xistos* in *xistos*] vocant, frutex eſt iuxta Dioſcoridem in petroſis locis naſcens, multis ramis præditus, folioſus, non altus, folia

habens rotunda, acerbâ, hirsuta: flores velut Mali punica [poſas] ſed in fœmina albi.

Aſt quidd Plinius rectius, quàm Dioſcorides, marem deſcripſerit, roſeum florem habere dicens, res ipſa, inquit Marantha, oſtendit: nam ſive hanc floris ſimilitudinem ad colorem referat Dioſcorides, ſive ad figuram (quamvis ad figuram potiùs referre videatur, quod oſtendit ex hoc, quod de fœmina ſubdit, ei florem albefcere) minùs apta comparatio eſt. Etenim Punicorum floribus phœniceus color in eſt, quem vix in alio reperias, ſi Theophrasto credimus, lib. i. c. 21. quanquam hoc de arboribus ſolis intelligere voluiſſe credendum ſit. Eſt & alterum, pergit Dioſcorides, Cisti genus, quod ab aliquibus Ledon appellatur. Ex his itaque conſtat Cisti duo prima genera facere Veteres, Marem & fœminam: Dioſcoridem verò tertium addere, Ledon diſtinctum. Verũ de hoc & alio nos plura trademus, ſed potiſſimum de iis, quorum icones exhibemus.

Frutex *xistos*, *mas* aut *mas* Græcis dictus, Latiniſ ut Scribon. Largo, quoque Cistus appellatur, & lingua. Roſa ſilvatica, ſeu canina. Arab. *Kamer*. *Althai*, ſive *Lhai* *althai*, inquit Marth. Germ. *Ciſſen* *oſſen*. Gall. *Rose canine*. Ital. *Cisto*. Caſt. & Cat. *Eſtepa*. Portug. *Cergatos*. *Cergatos*. Angl. *Liſtus* / *Cisti* buſhe / *odev* / *Cist* ſage / *With ſage*.

Cistus, inquit Dioſcorides, vim habet ad ſtringentem, unde flores triti in vino auſtero, bis in die poti, dyſenterici commodant: ipſi verò per ſe illi, nomas depaſcentes cohibent. Cum cerato verò, ambulta & vetera ulcera ſanant.

Hæc pauld aliter ita Plinius. Cisti genera ambo proſunt dyſentericis & ſolutionibus ventris, in vino auſtero ternis digitis flore capto, & ſimiliter bis die poto. Vlceribus veteribus & ambuſtis cum cera: & per ſe oris ulceribus.

Cisthus aut Cithatus, auctore Galeno frutex eſt guſtu adſtringens, omnibuſque particulatim operibus. Attamen folia & parva germina trita ad de-

siccant, adstringuntque, ut [maritima] ulcera glutinate valeant. At flores magis sunt efficaces, aded, ut cum vino poti dysenterias, ventris imbecillitates, fluxusque achumiditates sanent. Cataplasmatibus ritu illita ulcerum putredinosa iuvant. Est enim facultas eorum non instituenē desiccans, serēque secundi excessūs à temperatis absoluti. Aded verò frutex hic frigidus est, ut tepidi caloris sit particeps.

Imbecillitates.
Humiditates.

Temperamentum.

CISTVS MAS, MAIOR, FOLIO
rotundiore. CAP. II.

Generatitia
summa.

Mare
dictus.

Mare
speciei
quoniam.

Cistus mas
Bononiensis.

Apulensis.

IN Cisti tractatione Dioscoridis vestigiis insistentium, tria summa genera constituenda, deinde singula in eas species, quas tum nos, tum alij observarunt, dividenda initium à mare facturis. Marem verò cum Clusio appellamus, qui flore quidem ut reliqua Cisti genera sylvestrem Rosam æmulatur, sed colorem rubrum, nunc saturatiorem, nunc dilutiorem habet: cujus quinquae species foliorum forma, aut colore inter se differentes numerantur.

Apud clariss. virum igitur, Vlysses Aldroandum Bononiensem primò vidimus Cistum mare, Monspessulano multò maiorem, foliis rugosis, rotundioribus & nigrioribus, non tamen exactè rotundis, ut olim pingebat Matthiolum. Rarum observavi inter plantas, Domini Theodori Zvvingeri, qui delatus dicebatur ex Apuleia, cujus folia erant minis nigra, & pluribus pilis albis, longioribusque abundabant.

Descriptio.
Ramuli.
Folia.
Flos.

Capitula.
Semen.

An Anguil.
Flosa mari-
na.

Matth. no-
tatur.

Turn. la-
pser.

Synon.

Clusius hoc describit: Humanà altitudine plerumque attollitur, ut reliqui Cisti, fruticosus: ramulis aliquantulum incanis: folia reliquis majora & quasi orbiculata, hirsuta nonnihil & rugosa: flos reliquis forma similis paulò major & colore saturatiùs rubente: capitula hirsuta, dura, pentagona, dicendis majora, in quibus semen rufum, majus, quam aliorum continetur.

An Anguil. Cistus mas, Rosa marina & Rosole in Lanzana quam ait Hypocistidem & Ladanum ferre? An Cordo in sylv. Obs. Cistus frutex ex folio oblongo & tamen subrotundo Salviæ aliquo modo simili, majori, hirsuto cavoque, semine in pericarpis mirato, Papaveri simili?

Matthiolum olim Cistum marem pinxit folio admodum rotundo, & floribus integris, Campanulam exprimentibus (quum tamen Rosarum instar folia separata habeat) qualem plantam nunquam vidimus, eam igitur iconem in post. commen. meritis, ut falsam rejecit, in com. Lat. & Ital. cum mag. fig. & in hist. Germ. aliam reponens meliorem.

Turnerus malam Matthioli figuram habet nomine Cisti maris, quem dicit se vidisse in Italia.

Dodonæi Cistum existimasse lib. de flor. cap. 29. nisi aliò videretur reduci similis figura à Clusio: unicum enim Cisti figuram ponit, relicta priore, quæ Cisti foemina erat, ut arbitror.

Lacuna dicitur Cistus Mas Matthioli. Cistus masculus Lonic. Clus. Hist. & Hist. Cistus quartus

mas sine figura. Lob. Obs. Cistus mas quartus Clusij.

Hist. Lugd. prater meliorem figuram Cisti maris Matthioli, habet etiam duas priores falsas sub his titulis: Cistus mas folio rotundiore Matthioli, & Cistus cum Hypocistide Matthioli. Ponit præterea descriptionem ex Clusio Cisti quarti.

Camer. in Matth. Hist. germ. ponit figuram cui inscriptio, Cistus foemina cum Hypocistide. Eandem etiam ponit in ejusdem Epit. sub hoc titulo Hypocistidis. Videtur autem mihi facta eius icon ad ramum quendam à me Bononiæ collectum anno 1563. & Gesnero missum. Erat tamen sine Hypocistide, & sine floribus. Gesnerus autem ad meam plantam quam adhuc habeo, annotarat, esse Ladanum foliis rotundis, Hypocistidem Matthioli.

C. Bauh. apud Matth. exhibet pro Cisto mare, si C. Bauh. figuram malam. Est enim eadem cum priore falsa Hist. Lugdunensis. Falsam autem eam esse ipsemet fateatur, ita enim scribit: Matthiolum in suis editionibus diversas proponit icones inter magnas enim figuras habet Cistum, cuius folia ex rotunditate oblonga sunt inter minores verò eam proponit foliis rotundis, proculdubio imitari volens Dioscoridis descriptionem, qui talia in Cisto requirit folia. Cum verò talibus foliis marem hactenus non viderimus, sed oblongis, adposuimus figuram talem sub Hypocistide. Ait præterea C. Bauh. in animadv. in Hist. Lugd. Historiæ Cistum marem Matthioli, & Cistum marem primum Clusij: esse duas figuras unius Cisti. Sed & hoc imaginarium. Sunt enim diversarum plantarum figurae, ut notum est utramque noscentibus. Est Cistus mas 1. Clusij, Cistus mas Monspeliensis, folio oblongo albedo. Sed cur hoc loco tam siccò pede transit impudentissimum illud Matthioli figmentum, Cistum marem folio rotundiore cum Campanæ effigie floribus, ex mera descriptione excogitatis (nihil enim tale unquam visum in natura) quem bis depingit, non sine fœda, ambitionisque plena impostura. C. Bauh. pin. Cistus mas 1. sive folio rotundo hirsutissimo.

Clusij Cistus quartus mas invenitur in regno Valentino & Aragonum in Italia etiam frequens est.

CISTVS MAS IL FOLIO
longiore.



Eadem altitudine, ne, qua primus Clusij [Cistus mas Monsp. folio oblongo, albedo] assurgit, interdum etiam majore, non minis fruticoso stipite, neque minore ramorum frequentia: minis tamen candidat. Folia præterea eodem ordine disposita, molliora, longiora, angustiora, & magis acuminata sunt: Flos superioris similis, incarnatus: capitulis etiam & semine parum differt. Dubium non est, quin

Hypocistis sub hoc genere crescat, nullam tamen observavit Clusius, qui Cistum marem secundum nominat.

Lob. Obs. & Ic. & Ger. Cistus mas angustifolius. Tab. Icon. & Hist. Cistus mas angustifolius Cistis n. ling. cōplem

röſlein. Lugd. Cistus mas 2. Cluſij. C. Bauh. pin. Cistus mas 3, five anguſtiſolius. Belg. *Ciſtus manneſcen* ſet ſmale blaſers. Angl. *The male hoſly Roſe*.

Nāſcitur in Hiſpania, & diutius reliquis maris generibus ſoretilius item ramuli tenaciores ſub Autumno, roſulentum quiddam pingue & odorum contrahunt.

CISTVS MAS III. FOLIIS dilutis virentibus.

Priori breuior eſt, non minùs tamen fruticoſus, ſed tenuioribus ramis: ſolia ejuſ jam dicto breuiora & dilutior virore prædita, magis rugoſa, pinguiſſa, & odorata: ſloſ aliis ſimilis, dilutè rubens & aliquantulum odoratus, quā notam in reliquis Ciſti maris generibus non deprehendit Cluſius: huius capitula ſuperioribus paulò mirora ſunt, & ſuis involucriſ, quæ ſlorum calycis ſunt, diutius occultantur, ſemen in capitulis æquale.

Hunc Ciſtum marem tertium (cujus autor nullam ponit figuram) in Luſitania ſolùm ſpontè naſcentem ſuprà Vlyſſiponem itinere Conimbricenſi, atque etiam in maritimis obſervabat. Nos Patavij vidimus Ciſtum, quam ſeminam vocabant, diverſam nonnihil à Monſpeſſulana, folio multò majore, rugoſiore, denſiore, hirsuto, formæ ſerè ejuſdem: ramis nigris, & minimè tomentoſis, quales etiam ſunt Monſpeſſulanae, fortaiſſi id fecit cultura. Si ſlore fuerit rubente, conſiderandum, an ſit eadem cum Ciſto Cluſij mare tertio. Lob. Obſer. Ciſtus mas tertius Cluſij. C. Bauh. pin. Ciſtus mas 4, five folio breuiore.

CISTVS MAS IV. MONSP. FOLIO oblongo, albid.

Frutex eſt, quàm ſemina robuſtior, albidior, bicubitalis, hirsutus, Cluſio autore, humana altitudine, plerumq; fruticans, ligno ſatis fragili, & candicante cortice tecto, frequentibus ramis alternatim ſemper ex adverſo reſpondentibus. Folia ſibi invicem oppoſita, & teſte Cluſio, molliora & longiora in novellis plantis, in adultis verò, contraſtiora, duriora & aſpera, adſtringentis guſtus: utrinque incana, hirsuta, longiora, quàm latiora, infernè rugoſa, anguſtiora, ſpiſſiora què, quàm ſemina: non rotunda, ut in Ciſto à Matthiolo olim exhibitò. Floſ coloris roſæ incarnatæ apices luteos in medio contentos ambit, magnus, in ſolia quinque diviſus, ſed, ut in Cythiro & Campanula, integer, ut pingebat Matthiolum, deciduus, nec ſingularis, hinc inde per ramos ſparſus, ut ipſius icon habebat, ſed confertus, agminatim ſtipatus, rumerofior in ramulorum extremis, ex brevibus, robuſtis pediculis, non debilibus oblongis & ſingularibus, ut in Ciſto ſemina, quibus decidentibus, ſuccedunt capitula longè etiam majora & duriora, hirsuta, triſariam ſcæta, perennia, foliolis tribus mucronatis, hirsutis obſepta; pentagona, ut reſert Tom. II.



Matthiolum vocatur. Floſ.

Capitula.

Cluſius, in quibus exiguum ſemen, ex ruſo nigricans, ſeminis Hyoſcia miæ aut Papaveris magnitudi-
ne. Ad huius radices, quæ ſummis ceſpitibus diſ-
funduntur & coherent, Hypociftidem illè obſervavit copioſè naſcentem, elegantiffimam omnium, quæ unquam viderit, primo vere, cū Ciſtus jam ad ſlorendum ſe parat: Etenim quando primùm ex terra emergit, purpureum ſive kermefinum ſericum eſſe dices, deinde paulatim aſurgens, & ſeſe explicans, multum de priſtini coloris elegantia re-
mittit, cū Cythinos ſuos proſert, qui candicantes ſunt, turgidique, & lento ſucco pleni: qui à pericis pharmacopœis in Hypociftidis lucca denſatur.

Cluſ. Hiſp. & Hiſt. poſt. Ciſtus mas primus, ab Hiſpanis, ceu & 2. & 3. & quattuſ Eltepa vocatus.

Lob. Adv. Ciſtus mas. Obſ. & Ic. Ciſtus mas cum ſynonyma. Hypociftide, Luſitanis Cergacos, Italici Ciſto.

An Rauvvolf. Ciſtus flore purpureo? An Cæſalp. hunc intelligit his verbis: Alterum genus Ciſti, in arenofis maritimis naſcitur, folio majusculo & candidiore, floſes puniceos fert, latiores: fructum ſimilem, [Ciſto ſemina] ſed conceptaculis quatuor diſtinctum: ſub hoc nunquam Hypociftidem repetam ſcio: Dioſc. hunc marem vocat, ut & Plinius flore roſaceo, foliis Ocimi.

Caſtori, Tabern. Eicon. & Hiſt. Ciſtus mas latifolius. Cam. apud Mart. Germ. reſ. 2. Matthioli figura, aliam poſuit ſub titulo Ciſti maris. Figura autem ea facta eſt ad plantam Monſpeſſulanam, quā Gell-
nero miſeram, quamque adhuc habeo. Eandem figuram ponit etiam in eiſdem Epit. nomine Ciſti. An præterea eidem in horto, dicitur Ciſtus mas?

Hiſt. Lugdun. Ciſtus mas primus Cluſij. Animadvertit & hic C. Bauh. Hiſt. Lugdun. ſem duas figuras ponere, quod eſt falſum, ut abſolutioribus Botaniciſ notum eſt. Eſt enim Ciſtus cum Hypociftide Matthioli à Ciſto mare primo Cluſij diverſiſſimus, & non alius, quàm Ciſtus mas folio rotundior Matthioli cum falſis floribus Campanulan exprimentibus. Sed poſterior figura Cluſij ſufficiebat, inquit. Vnde miror quomodo vir integer ſubdicere potuerit figuram Matthioli eſſe falſam, fictam & imaginariam.

Ger. Ang. The male hoſly Roſe with his. C. Bauh. apud Mart. Ciſtus 3, cui Hypociftidis id dicitur, quod ex ipſius Ciſti & Ledi radices medio pullulat: Limodori genus vocat Dodoneus. Reperitur rubra ſlava, pallida. Eidem pin. Ciſtus mas 2, five folio oblongo incano. Provenit in itinere verſus Frontignanum inter faxa, ſeſquimiliari Gallico à Monſpelio, item in monte Setho, ſlorens menſe Aprilis & Maio. Cluſio frequens eſt hic Ciſtus cū in Hiſpania, præſertim Bætica, tum Luſitania & Gallia Narbonenſi.

CISTVS MAS V. FOLIIS CRISPIS & quodammodo ſinuofis.

Humilis eſt, & ſupinus ut plurimum, pedali-
bus ramis, aut paulò amplioribus, multis ex eadem radice prodeantibus: folia criſpa ſunt & quodammodo ſinuofa, candicantia & hirsuta, guſtus acerbi & adſtringentis: floſes ramulorum ſummitatibus æquali altitudine & quaſi umbellatim naſcentibus, ſuperioribus paulò minores, ſed elegantius ex rubro purpurafcentis coloris intenſioris, quàm in quarto, capitula reliquis minoribus ſuis involucriſ plerūq; cō-
tecta, ſemè cōtinet reliquias ſimile, ſed magis at. um.

C. Bauh. pin. Ciſtus mas 3, five, foliis Chamædrys Ciſtus mas 3. Cluſij. Lob. Ic. & Lug. Ciſtus mas ſupinus ſimbriatis & ſinuatis foliis Lob. Ciſtus mas 3. Tabern.

Ciſtum marem quintum Cluſius, in Luſitania tantùm naſcentem videbat, ſolo admodum arenoso, nec uſquam ſequentiorem, quàm apud Mona-



stimento Aprilis, aliquando etiam maturis, nonnunquam lenis, pro regionum & locorum natura & temperamento: semen Augusto, Septembri, & Octobri maturefcit: Cisti hoc genus peculiariter Lusitanis Rosella vocatur.

Nomina.

Ger. Cistus mas dentatus: Belg. Cistus mannes Fen planten aerden ligghende. Angl. Tedi hedor sinept male Cistus.

sterum Petalorum diu, quarto supra V. Hispanem mian, semine maturo ortum, in nonnullis plantis, flore etiam Novembri conspecto. Semen in Belgium reuersus, aliquot annis communica- bat: sed nemini natus est hic frutex, preterquam uni Petro Coudebourgo pharmacopaeo doctissimo, quem tamen diu conservare non potuit: nam subsequens hiems suas rigida abstulit. Florent predicti Ci-

tibus: capitula minora sunt, maris capitulis, nigriora, non mucronata, sed nonnihil compressa superiore parte, semen paulo nigrius & satis magnum continentia.

Math. in Diosc. Cistum semina proponit sine descriptione, floribus & fructu, quæ accedit ad hanc nostram: in post. com. Ital. & hist. Germ. addidit flores, qui an bene appicti sint, aliorum esto iudiciorum: eam ait vocari à rusticis patavinis Salviam salvaticam. Anguill. Cisto semina, rusticis Salvia salbegia vocata, subnalsci refert Hypocistidem & Ladanum. Turn. Cistum semina à Matthiolo depictam habet, quam ait se vidisse in Angliam horto à Sion denominato.

An Bellon. Obs. lib. 1. c. 7. de hac ait: Ladanum non fit in Creta ex Ledo, sed ex Cisto, cuius Cisti species provenit similis in ea parte Gallia, quæ dicitur Lau-de d'Oise in Ducatu Mainio, præcipue verò ad Castrum Fouletourte, juxta Souletere.

Cord. Hist. Lob. Camer. hort. & Cast. dicitur Cistus semina. Dodon. in fol. Cistum semina videtur appellare, eadem repetens, quæ in flor. hist. dixerat in hist. Gall. pingit pro Cisto non Ladanifera, ubi matrem & semina colore florum tantum distinguit. Clus. Hispan. & post. Hist. ait Cistum semina Hispanis Xara-clepa: & à Narbonensibus Gallie incolis, qui circa Monspeliu vicinisque locis habitant, Mouges vernacula lingua dici. Rau-

volf. est Cistus flore albo: Cæsalp. Cistus flore candido, alicubi Hypocistidem gignens, & Cistus semina Dioscoridis.

Camer. apud Matth. Germ. & Epit. mutavit figuram, aliamque reposuit, quam Gesnerus curarat pingendam ad ramum Monspelij collectum, quem ei miseram, quemque adhuc habeo: in qua figura pili non placent. Lugd. cum Tabern. & hunc imitatus Gerardo, pro Cisto semina, præter bonam Clusij figuram, si ultra ponunt Matthioli malam. Et hanc quoque C. Bauh. apud Matth. exhibet pro Cisto semina. Ipse tamen non verius fuit Lugdunensem idem carpere. Cistus semina Matthioli (inquit in suis animadv. in Lugd.) & Cistus semina Clusij: posterior figura servanda erat. Ergo altera rejicienda. Sed quare? cur silentio involuit? quia patrocinium ejus assumpsit. Eid. pin. Cistus semina, sive folio Salvia: Cistus semina, Gesn. hort. Lac. Est elatior & rectis virgis: est & supinus humi sparsus: in utroque flos candidus, quandoque tamen luteus.

Florentem vidimus Aprilis & Maio in sylva Agremont propè Monspeliu & in monte Sethi, in Italia juxta Florentiam: in Sabaudia penes Rodanum. P. tavij observatur in montibus Euganeis inter Balneum Aponense & Arqua, ibi aiunt nasci Hypocistim. Bononia spontè à Florentia al jugo florebat Aprilis. Ejus qui albo est flore, cum rectis, tum supini magna est copia in Hispaniis, Lusitania, Gallia, Narbonensi & Aquitanica: qui verò luteum profert, nonnullis duntaxat Hispanie locis, & extrema Aquitania Car tabris finitima circa Bayonam se vidisse meminit Clusius.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

CISTUS FOEMINA MONSPELIANA flore albo, & Hispanica luteo.

C A P. III.

Cisti semina
varie.
lat.



Del.

Lat.

Flores.

Refer. Clus.

fer.

Flas.

vix cedunt ejus foliis, quem Bononia supra observasse nos retulimus, magis viridia, molliora & latiora, quam in mare Monspeliensi: flores in longis pediculis, ut Rosæ, sed albi, luteos apices in medio coëccent, non minores, quam maris, multo majores, quam Ledi, in odori, gustu grato ut Ledi, qui exsiccati lutei sunt non minus quam maris.

Clusius sic describit: Est Cistus semina, frutex ramosus, cubitum interdum altus, nonnunquam humi stratus, gracilibus, nigricantibusque ramis, folio non minore, quam in maris quarto genere, circinata ferè rotunditatis, rudi & aspero, undi tamen: saporis adstringentis & acerbi: Florem habet paulo minorem, quam mas, quinti generis flori penè similem, album, nonnunquam etiam flauum, luteis fipsis, ut in Rosæ sylvestri, medium florem occupan-

Cistus semina etiam in suas species distribuenda. Nam aut elatior est, & rectis virgis fruticosa, sicut mas: aut supinus & humi sparsus, ut Leda vulgaris. Deinde utrumque genus, teste Clusio, in colore variat, qui maxima ex parte candidus est, & quandoque luteus. Cistus igitur semina Monspeliensis flore albo, & Hispanica luteo, frutex est, cui folia circinata ferè rotunditatis

Gerardo, pro Cisto semina, præter bonam Clusij figuram, si ultra ponunt Matthioli malam. Et hanc quoque C. Bauh. apud Matth. exhibet pro Cisto semina. Ipse tamen non verius fuit Lugdunensem idem carpere. Cistus semina Matthioli (inquit in suis animadv. in Lugd.) & Cistus semina Clusij: posterior figura servanda erat. Ergo altera rejicienda. Sed quare? cur silentio involuit? quia patrocinium ejus assumpsit. Eid. pin. Cistus semina, sive folio Salvia: Cistus semina, Gesn. hort. Lac. Est elatior & rectis virgis: est & supinus humi sparsus: in utroque flos candidus, quandoque tamen luteus.

Florentem vidimus Aprilis & Maio in sylva Agremont propè Monspeliu & in monte Sethi, in Italia juxta Florentiam: in Sabaudia penes Rodanum. P. tavij observatur in montibus Euganeis inter Balneum Aponense & Arqua, ibi aiunt nasci Hypocistim. Bononia spontè à Florentia al jugo florebat Aprilis. Ejus qui albo est flore, cum rectis, tum supini magna est copia in Hispaniis, Lusitania, Gallia, Narbonensi & Aquitanica: qui verò luteum profert, nonnullis duntaxat Hispanie locis, & extrema Aquitania Car tabris finitima circa Bayonam se vidisse meminit Clusius.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Locus et tempus.

Folia.



Flores.

mucronati, lanugine alba, densa que hirsuti ambiebant totos. An à quoquam sit descripta hæc planta, non potuimus animadvertere.

CISTVS FOLIO HALIMI
flore luteo.

Des.



Rami.

Folia.

Flori.

Capitula.


Hypocistis.

Locus.

Synon.

conjicere licebat, parvum, foliolis multis stipatum, non parùm minoribus, quàm in Cisto fœmina Monspeliensium, oblongis, hirsutis, minus rugosis, gustu adstringentibus. Flores non singuli ex ramulis, sed plures simul, ut in Ledo Monspeliensi, pediculis satis longis, hirsutis, incanis indebant, albidis, Ledi Monspeliensis floribus penè similes, quos nondum explicatos alabastriculi

CISTVS FOLIO HALIMI LONGIORE INCANO.



Cistus folio Halimi alter Clusij. ^{Deserv.} Hisp. & post. hisp. proterior est præcedente, ramis firmioribus, incanis ut præcedens: Folia ^{Folia.} etiam habet Halimi, paulò tamen longiora, angustiora, magis mucronata, & dorso elatiora, incana tamen tota & sicca, subacidi etiam & adstringentis saporis. Istius neque florem, neque semen visum. Provenit ubi præcedens. ^{Locus.}

Lobel. Obser. & Synon.

Icon. pl. ut & Lugd.

Cistus folio Halimi secundus Clusij: Tabern. Icon. & Hist. Cistus folio Halimi secundus. Gerard. Cistus folio Lavendulæ, Angl. Lavender leaved Cistus. Belg. Cistus mer bladers van Lavender.

CISTVS FOLIO LAVENDULÆ

Clusio, fortè idem cum Helianthemum recto.



Cistus folio Lavendulæ (eundem vel similem fruticem denominavimus Helianthemum sive Helianthemum rectum, repertum à socio nostro) plerumque cubitali est altitudine, admodum ramosus, sed brevibus ramis & foliis confertim nascens: foliis ^{Folia.} scintibus, angustis, incanis, sapore adstringente: flores ^{Flores.} parvi, non multum à superiore differentes, albo colore: semen non observavit Clusius. Est

hic frutex adè Lavendulæ similis, ut nisi odor & sapor prohiberent, pro Lavendula sumi posset: & certè quas plantas sine flore primùm conspexit, pro Lavendula habuit, ideoque negligebat, donec floribus, quos in plantis aliis conspicebat, admonitus, diligentius observaret.

Solummodò Valentino regno invenit aridis & petrosis locis, quarto à Valentia miliari, mensis Aprilis initio. Repertus à socio fidelissimo Domino Leonhardo Rauvolfii in provincia montibus, qui uniculis erat, rectus, cubitalis: flores in cacumine similes forma Helianthemum lutei & vulgaris coloris: folia autem per caulem multa, longa, similia foliis Lavendulæ. Florebat autem mense Maio.

Lobel. Obs. & Icon. plan. Cistus folio Lavendulæ Clusij & Valerandi. Tabern. Icon. & Hist. Cistus

HISTORIAE PLANTARVM

Spec. R. m.
Belg. Cistus *Röflein* / cactus titulus hic simplex non placet.
 Lugd. Cistus Lavendulae folio Clusij. Gerard.
 Cistus mas tenuifolius. Ang. Thin loafed Cistus.
 Belg. Cistomer diaders van Lavender.

CISTVS FOLIO SAMPSVCI CLVS.

cui macula in flore.



Capitula.
 constat, quorum medullium macula ex purpura nigricans inficit, villis & staminibus luteis, medium florem occupantibus. Capitula deinde Lini ferè equa, trigona in quibus semen minutum Hysosami, ex nigro candicans, sive cinereum continetur: totus verò oblongus ille ramulus, qui florem & capitula sustinet, semine maturo arte scit, ut in singulis Cisti generibus.

Diad.
 Primum hic inventus in Castellae veteri, supra S. Martin del Castañal: deinde copiosius in castellae nova, circa Caragejo, & toto Batice agro inter Tagum & Anam flumina.

Hyss.
 Hispani Quiruela aut Quirivela appellant, communi semine cum Ericae minoris vulgarioris vocabulo, quia fortassis inter Ericas numerant.

Tabern. n.
 Lobelio, qui inscribit in Obs. & Ico. pl. Cistum folio Sampsuci Clusij, videtur eadem, quae Helianthes Allobrogum & Gallorum Delphinatis flore albo. Clusij autem figuram habet, verum Cistus Clusij maculas habet ex purpura nigricantes, ergo diversa. Hist. Lugd. Cistus folio Sampsuci Clusij.

Tabern. n.
 Tabern. Icon. & Hist. Sonnenblum / Helianthemum Sabaudicum vocat, & tamen sibi alicui cognatum. Quare non placet nonnihil mutata figura & titulus in planta incognita. Gerard. Helianthemum Sabaudicum: Ang. the dmarfe Cistus of Sanoie. Belg. Cistus merbladens van Marioleyn / ende schont te wesen Helianthon van Sanoie / ende deifine, met witte bloemen.

CISTVS FOLIO THYMI CLVSII,

cum maculis in flore.

Deser. R. m.
 Cistus folio Thymi, ut annotat Clusius saepe dicto loco, pedali fruticat altitudine, ramulis ex purpura nigricantibus, duris, lignosis, qui magna ex parte sine foliis conspiciuntur, praterquam circa eorum summitates, in quibus confertim nascuntur, exilia admodum, viridia, Thymi amula, gustu adstringente. Florem fert summis ramis, Cisto folio Sampsuci similem, annorem, neque maculis insignitum. Semen non observant.



Solid.
 Solidum autem est conspectus in extrema Bræce parte, qua Castellam & Lusitaniam spestat.

Icon.
 Lobel. Obfer. & Icon. Lugd. Cistus folio Thymi Clusij. Tabern. Icon. & Hist. sicut & Gerardo Cistus folio Thymi. Angl. Cistus with the leaves of Thyme. Belg. Cistomer de bladers van Thymme. Hispan. Perdiguetta.

DE LEDO ET LADANO.

CAP. IV.

Leden. Dia.
 Est alterum Cisti genus, inquit Dioscorides, quod ab aliquibus Ledon appellatur, frutex simili modo, ut Cistus, nascens, sed longiora & nigriora folia habet, quæ in vere pinguedines quadam contrahunt. Huius foliorum vis adstringens est, faciens ad quæ etiam Cistus. Fit autem ex ipso id, quod Ladanium appellatur. Nam capræ & hirci, folia ipsius depascentes, pinguedinem palam barbis excipiunt, quæ etiam se nonibus adhæret, eoque quod sit viscosa: hanc oblatam excolant, & in massas effornatam reponunt. Quidam etiam funiculos per frutices trahunt & adhærentem ipsi pinguedinem ite derafal, efformant. Optimum est Ladanium, quodd odoratum est, subvinde, facile mollescens, pingue, non particeps arene, nec friabile, sed resinolum. Tale autem est id quod in Cypro nascitur. Nam & Arabicum & Libicum vilius est.

Dele. n.
 Arabia etiam Ladano gloriatur, ut habetur apud Plinium: forte casuque hoc, & in iuria fieri odoris, plures tradidere. Capras maleficum aliis frondibus animal, odoratorum vero fructum appetentius, tanquam intelligant præcia, carpere germinum caules prædulci liquore turgentibus, distillantemque ab his casu mixturæ succum improbo barbarum villo abstergere. Hunc glomerari pulvere, incoqui sole. Et idem in Ladano caprarum pilos esse. Sed hoc non alibi fieri, quam in Nabathæis, qui sunt ex Arabia contermini Syriæ. Recentiores ex Antonibus Strobor hoc vocant, traduntque silvas Arabum pastui caprarum infingi, atque ita succum villis inhærescere: verum autem Ladanium Cypri insula esse: ut obiter quoque genera odorum dicantur, quamvis non terrarum ordine. Similiter hoc & ibi se tradunt, & esse Oesopum hircorum barbis genitum, ut villosis inhærens, sed Edera [Cisti debet scribere] flore derofo, pastibus matutinis, cum est rotulenta Cypros. Deinde nebula Sole discussa, pulverem madentibus villis adhærescere, atque ita Ladanium deponi. Sunt qui hec bami in Cypro, ex quod fiat, Ledam appellant: etenim illi Ladanium vocant. Huius pingue infidere: itaque attritis funiculis herbam eam convolvit, atque ita offas fieri. Ergo in utraque gente bina genera, terrenum & fascitium. Id, quod terrenum, est friabile: fascitium, lenum. Ne non & huiusmodi esse dicunt in Carmania, & super Egyptum per Ptolomæos translati sunt, & super plantis aut ut alij generante [ver. generari & id in id, per dig. ut Tū.].

Collegendi vasis. Adulera vium.
 in Thuria arborem. Del. generatū & ibidem cum Thuria
 arb. vibus) Scid Thuria arbore colligitur; ut gummi, in-
 ciso cortice, & caprinis pellibus excipi. Precia sunt
 laudatissimo in libra asses xl. *xxx. alius.* Adulteratur
 Myrtu baccis, & aliis animalium fordibus. Synceri
 odor debet esse ferus, & quodammodo soliditatem
 redolens: ipsum visum aridum, tactu statim mollesce-
 re, accensum fulgere, odore jucundo gratum. Myr-
 tati d.prehenduntur, crepitantque in igne. Præter-
 ea à syncero calculi potius è rupibus inhaerent,
 quam pulvis. Et Ladano (inquit alibi Plin.) sistitur
 alvus, utroque, quod in segetibus nascitur, contuso
 & cribrato: bibitur ex aqua multa: item nobili è vi-
 no. Lada appellatur herba, ex qua Ladano fit in
 Cypro, barbis caprarum adhaerens, nobilior in
 Arabia. Fit jam & in Syria, atque Africa, quod To-
 xicon vocant. Nervos enim in arcu circumdatos
 lanis trahunt, adhærescente roscida lanugine. Hoc
 gravissimum odore est, durissimumque tactu. Pluri-
 mum enim terre colligit, cum probetur maximè pu-
 rum, odoratum, molle, viride, resinofum.

Ladanum recentiorum & officinarum.
 Ladano Officinarum laudabile, viscidum est
 succus, in magnas offas coactus, easque graves, ex
 purpura fuscas, odore valido, sed suavi, præsertim si
 calorem senserit, cuius etiam beneficio mollescit,
 veluti & mansum, saporem imprimens adstangen-
 tem: hoc Ladano existimamus esse idem, cum ve-
 terum Ladano. Hujus autem colligendi rationem
 miram quandam Bellonius describit, quam ipse in
 Creta observavit: Græci, inquit, colligendo Lada-
 no peculiare instrumentum parant, vernaculo ser-
 mone illis Ergastiri dictum. Est verò id instrumen-
 tum rastro dentium experti simile: huic affixæ sunt
 multe ligulæ sive Zonzæ corio rudi, nec præparato
 confectæ. Eas leniter adfricant Ladani feris frutici-
 bus, ut inhaereat liquidus ille humor circa folia, con-
 cretus, qui deinde à ligulis per summos ardores So-
 lis cultris est abradendus. Itaque Ladano collig-
 endi summus, imò intolerabilis est labor, cum to-
 tos dies ardentissimo caniculæ estu in montibus he-
 rere necesse sit: neque facile quisquam alius ad id
 colligendum operam sumit præter Calohieros, hoc
 est, Monachos Græcos. Nulquam autem majore co-
 pia per totam insulam cogitur, quam ad montis Ida
 radices, pago Cigalunus nuncupato, & apud Milo-
 potamo. Haætenus Bellonius. Siquis tamen in Hi-
 spaniis huic colligendo operam navare vellet, mul-
 to minore (ut Clusio videtur) negotio, magnam e-
 jus longè purissimam, resinofam, & odoratam copiam col-
 ligere posset, cum integræ aliquando silvæ inveni-
 untur omnium pinguiissimi illius Ledi, quod Ci-
 stus Ledon flore macula nigricante notato inscribitur:
 neque illo ex Africa in vecto, magna ex parte
 impuro, opus esset.

Tempus. Locus.
 Ladano, autore Dioscoride, vim habet adstringen-
 gentem, calefacientem, mollientem, aperientem.
 Sistit de fluos capillos, ammixtum vino, Myrrha, &
 oleo myrteo. Cicatrices decentiores efficit cum vi-
 no illatum. Aurium doloribus, cum aqua multa, aut
 rosacco insulum medetur. Suffitu etiam secundas
 ejicit. Et durities in utero pessis ammixtum curat:
 compositionibus item, quæ dolorem & tussim, exi-
 munt, & malagmatis utiliter ammiscetur. Alvum
 quoque sistit cum vino veteri potum, ciet etiam
 urinam.

Vires & usus. Capilli. Cicatrices. Aurei. Secunda. Vires. Tussis. Ani fluor. Vrinam.
 Cistus, aut Ladano in calidioribus regionibus
 proveniens, tamen si haud alius fit generis, quam qui
 apud nos nascitur, inquit Galenus, eximiam tamen
 à regione, ac peculiarem digerentemque calidita-
 tem nactus est, utque utroque à nostratè differturum
 quia frigiditytatem deposuit, cum quia calorem assump-
 sit. Itaque cætera quidem hujus Cisthi illis quæ in
 agrostate videntur, similia sunt. E vero Ladano, quod

Cistus Galenus. Temperamentum.
 vocant, provenit medicamentum, primo, excessu
 jam quodammodo completè calidum, ut vi & se-
 cundum attingat, habens etiam adstrictionis pau-
 lulum. Ad hæc substantia tenui ac proinde emol-
 liens, sive malacicum moderatè pariterque dige-
 rens, ac videlicet etiam *συσπνικτός*, hoc est, conco-
 quens. Itaque mirandum non est, si peculiariter ad
 uteri vitia conveniat, quandoquidem ad dicta pau-
 lum quidem adstrictionis obinet. Quocirca de-
 fluentes capillos retinet. Nam quicquid, ad radi-
 ces eorum, pravi humoris fedit, id omne absumit:
 tum meatus quibus infixi sunt contrahit, & con-
 stringit adstrictione. Ceterum, alopecias & ophthal-
 mias sive lippitudines sanare non potest, utpote
 magis discolorias vires, quam quæ Ladano insunt,
 poscentes.

Substantia. Vires. Capillorum fluxus. Ophthalmias nobilior.
 Plin. de facultate Ladani sparsim ita scribit. Na-
 tura ei, molliendi, siccandi, concoquendi, somnum
 alliciendi. Capillum fluentem cohibet, nigritiamque
 custodit: auribus cum hydromelite, aut rosaceo in-
 funditur. Furfures cutis & manantia ulcera sale ad-
 dito sanat. Tussim veterem cum Sytraco sumptum.
 Efficacissimum ad rûsus. Cicatrices cum elegantia
 ad colorem reducit: suffitu corrigit vulvas; dolori
 earum exulceratque imponitur. Denique, si fistu-
 læ in quacunque parte serpant, Medicorum vitio
 malè factis corporibus, auxilio est Ladano cum
 castorio. Lad. Cyprum potum interitæ eorum vitii
 occurrit. Ladano verò segetum contusum febres
 tertianas leviores facit. Hæcille, qui confusè satis
 & ignoranter, ut de aliis, indistinctè hic recitata
 collegit.

DE HYPOCISTIDE. CAP. V.

Hypocistis. Robethrum. Orobethrum. Cytinus.
 CISTIS radicibus adnascitur quoddam Mali po-
 tina: Cythno simile, quod Hypocistis [*συσπνικτός*]
 dicitur: nonnullis verò Robethrum [*ρὸβῆθρον*, Sarr.
ρὸβῆθρον, Ald. Orobethron, Orobethrum Pal.] aut Cyti-
 nus [*κύθινος*] appellatur. Est ex ipso quoddam ful-
 vum, quoddam viride, quoddam album: ex quo
 succus exprimitur, velut ex Acacia. Quidam verò
 ressecatum ipsum & contusum madescentem ac co-
 quant, & reliqua velut in Lycio faciunt, teste Dio-
 scoride. Sub his [*Cistis*] maximè nascitur Hypo-
 cistis, quam inter Hederas diximus, inquit Plinius:
 Cysso erythranos ab eisdem appellatur, similis He-
 dera. Manifestus hæc sit Plinij lapsus confundentis
 Cistum cum Cisso Hedera, de quo errore plura an-
 te. Quia verò (Cornario) Mali punici flori simi-
 lis est, ided etiam ipsa Hypocistis appellatur Cyti-
 nus: Plinius Orobathion habet, sed in manuscripto
 exemplari Oboothron legitur, omnibus ex æquo
 obscuris appellationibus: idem Malo granato im-
 maturo similem dicit, & sub Cisso nasci, unde ha-
 beat nomen, nostris officinis ut Cistus, ita etiam
 Hypocistis ignota est: Hypocistidis tamen succum
 aliunde importatum habent, & re, & usu omnibus
 notum: an verò genuinus sit, & ex vera Hypocisti-
 de, non temerè ambigi putat Cornarius.

Vires.
 Hipp. de nat. mul. Hypocistin ex vino bibitam,
 secundas & menses detrudere posse ait, cui non as-
 sentior hoc medicamento purgati uterum; sed su-
 spicor multa confusè scripta per transcriptores.
 Vim enim ut Diosc. prodidit, habet eandem quam
 Acacia, sed magis adstringentem & siccantem, quæ
 facit ad cælicos, dysentericos, sanguinem per spu-
 tum rejicientes, fluxum muliebrem, sive bibatur, si-
 ve per clysterem infundatur.

Plinio autore. Cysso erythranos contandicibus
 uulis est è vino potus; item lumbis, tantumque vim

singula folia circa unguem ex purpura nigricante macula, rhomboide nunc majore, modò minore, & anguliotiore, ut plurimum infecta sunt, floris umbilico multis croceis fibris pleno, ut in aliis Cisti generibus: Capitula in longis pediculis, foliisque suis denudatis, omnium maxima, rotunda ferè & plana, non mucronata, & sapenumero decagona, dura, interius flavescentia, quibus desiccantibus, semen decedit copiosum, subrufulum, omnium minutissimum.

Capitula.

Semen.

Duratio.

Locus.

Synon.

Lecum & Ladum.

Tota planta dum resiccata est, quandam candorem contrahit, pinguem attamen illum suum lentorem & suavem odorem non amittit, sed cum retinet ad multos etiam annos.

Crescit multis Hispaniæ & Lusitaniæ locis frequentissimè, nusquam tamen magis copiosè, quam in collibus declivis inter Tagum & Anam flumina & toto ferè monte Sierra morena nuncupato. Hispani Xara, Lusitani Estepa vocant.

Lobel. Obs. & Gerard. dicitur Cistus Ledon primus. Dodonæus in fol. figuram habet Clusij, & describit sub Cisto Ledo, & Aldrov. & Ad. d. ipsam fruticem dicit & Cisti spurium affirmat. Tabern. vocat Ledum Clusij primum. Lugd. Ledi speciem Bauhini, in Gallia Narbonensi. Sed non est Gallia Narbonensis. Figura etiam mala: meliorem habet nomen Cisti ledi 1. Clusij. C. Bauh. pin. Cistus ledon 2. sive Cistus ladanifera Hispanica incana. Belg. & Estepa Cistus ledon van Clusius. Angl. Theophrasti Cistus brimzing.

CISTVS LEDON, POPVLI NIGRÆ foliis Clusij, major & minor.

Mains.

Stolonæ, Ramæ, Folia.

Flor.

Capitula.

Semen.

L. Edi alterum genus, sive Ledum 2. Latifolium majus, ubi spontè nascitur, brevius est, sed bicubitalibus duntaxat assurgit stolonibus, ramosis: rami sunt fragiles: folia omnium inter Cisti genera, quæ observabat Clusius, maxima, supernè viridia, infernè nonnihil candicantia, Hederae foliorum formam interdum, & Populi nigrae plerumque amulantia, suis rudia & carnosia, Hyeme rubedinem aliquam contrahentia, subacidi & adstringentis saporis: Flos candidus, Cisti femine magnitudine par: capitula pentagona, acuminata, semine exili & nigricante referta. Tenella plantæ neque pingues, neque odoratæ sunt, sed anrotine duntaxat, & vestustiores Autumno præferti, quo tempore omnes Cisti, qui pingues sunt, abundantiore succo, crassio-

re sibi & magis tenaci prægnantes esse visæ sunt.

Hujus generis alia species invenitur, per omnia ferè similis, sed humilior, neque cubitum excedens; cujus folia etiam minora sunt: aliis neque facie, neque flore, neque semine, neque sapore dissimilis.

Minor.

Vtrumque nasci in Mariano monte (vulgò Sierra morena) qui superius dicitur, qui Vlyssipone Hospitium faciunt iter. Invenitur etiam collibus quibusdam Granatæ vicinis. Primam speciem incolæ Xara-xarguna & Xaron vocabant. Glanatenfes Xara-estepa eodem quo Cutellani Cistum feminean, nomine. Altera species incolis Xaguateo dicitur.

Locus.

Nomina.

Lobel. Observ. & Ic. cum Lugd. Tabern. (qui non benè capitibus separat.) & Gerard. dicitur Ledon secundus, & Cistus Ledon populæ fronde alter, cultu fortè duntaxat, differens. C. Bauh. pin. Cistus ledon 4. sive folijs Populi nigrae major: Ledon 2. Clus. hisp. Lugd. Tab. Ledon latifolium 2. majus, Clus. hist. Cistus ledon Clusij, Lob. Ger. Eid. Cistus ledon 5. sive Populi nigrae minor: Cisti ledi 2. altera species, Clus. hisp. & Lugd. Ledon 2. latifolium minus, Clus. hist. Cistus ledon populæ fronde alter, Lob. Cistus ledon 3. populæ fronde Lugd. Tab. & Ger.

CISTVS LEDON LATIFOLIUM craticum.



L. Edi genus vis- Descrip. Do
lucidum, folio
lum.

major, quam Cisti feminae Monspessulanae, minus rotundo, mucronato, infernè candicante, tribus secundum longitudinem decurrentibus nervis plantagineis, supernè nigriore, minus rugoso, quam Cisti maris majoris: folia verò juniora & extremorum ramorum longa, angusta, latiora tamen multo quam Monspessulani Ledi. In

Flora

extremis ramorum veluti ex longo pediculo, aliquot flores sunt (tres observavi) ex pediculis unciam circiter longis: calyces hirsuti cum brevibus pilis.

Hujus fructus Ledi Ladaniferi nomine missus sic se habet: Capitula vel vascula sunt Cicetis circiter magnitudine, Oliva ferè, sive oblonga figuræ, hirsuta cum quinque angulis, membranis distincta, plena seminibus minutis, papaverinis, fuscis, argulosis.

Capitula.

Clusius sic describit: Ledon tertium, semine ex Italia missio, Cyprij Ledi nomine, nobis & plerisque natum est, cubitali interdum majori altitudine, fruticosum, nigricantibus ramis, carnosis foliis, & præfigurata viriditate nigricantibus, mediæ inter primi & secundi generis [Ledi angustifolij & latifolij] folia magnitudinis, brevioribus tamen, & rhomboidis quodammodo figuræ, quæ cum novellis ramis lentis & roseo humore oblecta sunt, non adeò tamen abundanti & densa, neque etiam adeò odorato, ut in primo genere: Flos albus est, secundo generi similis, semen etiam exile, nigricans in rotundis capitulis. Lugd. etiam eundem, vel valde similem sic delineat: A floribus specie dicitur Cistus frutex hic, in maritimis proveniens, cubitalis, nonnunquam altior, densis, numerosisque radicibus, caulibus multis, sarculosis, cortice ex rubo rubente, foliis longis,

Semen.

Ledi Cyprij

Clusij de-

scripta.

Flor.

Descrip.

Cistus cyprij

Radix.

Cort. ex Fo-

lia.

longis, in ambitu laciniatis, acuminaus, supernè ob-
scuris virentibus, infernè candicantibus, & parùm
lanuginosis, flore Cisti, Rosæ silvestris, albo, vel
ex albo purpurascente.

Ladanum. An Anguill. Cistus mas, producus liquorem di-
ctum Ladanum in Cypro & Italia &c. profertensq;
Hypocistis. etiam Hypocistidem? An Bel. Obs. Cistus, ex quo La-
danum fit in Creta, de quo sub Cisto femina ante.

Lob. error. Lobel. & Penz. Adv. est Cistus Ledon latifolium:
rarior species quædam Ladanifera, foliis multò cras-
sioribus, longioribus, Sumachij Plinij, aut Rusci
modo fruticans, &c. apud quos tamen figura pessima
& inepta: proque Rusci legendum Rhœis. Icon.
plan. Cistus Ledon Rusci aut Myrti folio. Sed & hic
figura Adversariorum mala: Titulus falsus & deterio-
rior factus ad figuram malam. Melior icon ex Clusio
in obs. Lobelij ante, hac inscriptione: Cistus Ledon
tertius, Ledon Cyprium in Italia. Tab. Icon. &
hist. Cistus Ledon myrtifolium. Mala figuram as-
sumpsit Taber. cum falso titulo, & falsam proponit
descriptionem.

Error in icon plant. An Casalp. Cisti Ledi sive Ladani species quæ-
dam latiore folio?

Ledon Cy- prium. Tab nota- tur. Camer. ad hist. Germ. Matth. ejusdémque Epit.
ponit ramum sub Ladano, quem ex meis plantis de-
pinxitat Gesnerus notatum litera O.

Ladanum. An Alpin. de hac ait. plantam, ex qua Lada-
num Cretenses colligunt, planè differentem ab ea,
quam hæcenus ferè omnes prodidère, inspexi: hæc
siquidem Cisto feminae persimilis est, foliis tamen
Cisti longioribus prædita, Salviaeque proximis: flo-
ræque fert silvestribus Rosis omnino similes, qui
rosæ etiam colore, quippe communis in Rosarum,
suffusi spectantur: quæ planta à Cisto femina flo-
rum tantùm magnitudine differre videtur: dece-
ptusque fuit Matthioli, Diosc. dicente, Ladanum
esse Cisti genus longioribus foliis nigrioribusq;
refertur: quæ nota in Cisto, ex quo Cretenses Lada-
num colligunt, omnes observantur, quando hæc
planta omnino Cisto feminae sit similis, cum nullo-
modum foliis, floribusque, et si majoribus.

Matth. error. Lugd. Cistus Ledon aliud latifolium Penz. Item,
Cistus marinus. Hunc suspicamus pictum ad plan-
tam siccam, ac etiam descriptum. Non additur præ-
terea locus particularis ubi proveniat: eo loci per-
quiri posset, si annotatus fuisset. Florum etiam di-
spositio alia est, quam soleat esse in Cistis Ledis,
non ex extremitate ramulorum, sed ex alis. In siccis
præterea plantis folia quædam apparent laciniata,
ubi ambitus eorum se contrahit. Nos portionem e-
jus figuræ proponimus ex planta nostra sicca.

Gerard nota- tur. Gerardus, cui Cistus Ledon myrtifolium, imita-
tur Compilatore, Taber. figuram non bonam pro-
ponens, cum falso titulo, & falsa descriptione.
C. Bauh. pin. Cistus Ledum 4. sive Cretense. An Ci-
stus mas Matth. in mag. fig. & Lugd. Ledon 3. Clus.
Hist. Lob. Lugd. Ledon 3. Cyprium, Clus. hist.

CISTVS LEDON IV. CLVS. flore candido.

Deser. Ra- m. Icon. Multis ramis fruticat, cubito longioribus, lentis
& flexilibus, hirsutis, albicantibus: folia reli-
quis Ledi generibus molliora, ad Cisti feminae fo-
lia accedunt, verùm paulò longiora, angustiora, hir-
suta, nigriora & lentà pinguedine conspersa, non
modò verno tempore, sed etiam per totam ætatem
conspiciuntur: flos albus est, Cisti feminae flore non
minor, nec ei ab similibus: capitula exigua membra-
nceis quibusdam & laxis involucribus tecta: semen
contineat omnium inter Cisti genera maximum, ni-
grum. In sola Castellà veteri hoc genus observabat

*Flo-
Cistula.
Sicca.*

Li. no



autor, vicinis pago
S. Martini del Ca-
stannal locis, ubi
ab incolis Ardivicia
runcupatur, ad
frequentem, ut
vulgare sit illic p-
verbium.

*Ardivicia
Hisp.*

Quien al mon-
te va, y mas non
puede, Alomenos
ardiveieja coge:
hoc est, quicunque
montem accedit,
potius quàm ina-
nis redeat, vel Ar-
divicia (plantam
vilissimam) colli-
gat. Apud nostros
Belgas latum felici-
ter provenit.

Adagium.

An Dod. de flor.
hunc pinxit pro Cisto, dubito: sive tamen exhibeat
suâ figurâ pro mare aut femina, olim aliam habuit.

Lob. Obs. & Icon. eandem cum Clusio figuram
habet, Ledi quarti nomine. Taber. Ic. & Hist. est Le-
dum Clusij: Gerard. & Lugd. Cistus Ledon quartum
Clusij. C. Bauh. pin. Cistus Ledum 8. sive hirsutum.

Synon.

CISTVS LADANIFERA, SIVE LE- dum Monsp. angusto folio, nigricans.



Ledum hoc Mō. Deser.
L. speculanti, cu-
jus figuram dedit
Matthioli, & ex
eo Lonicerus, fru-
tex est bicubitalis,
odoratus, in ramos,
plures brachiatus,
cortice nigro ob-
ductus, foliis sel-
quinciam longis,
angustis, nigris, ru-
gosis, ex brevibus
intervallis mutuo
oppositis, angustio-
ribus, quàm præfe-
rat Matthioli figu-
ra, quam fortè ex
fativa depinxit: flo-
res albi, parvis Ro-
sis sylvestribus assi-
miles, majores,

Rami.

Folia.

Flores.

quàm exprimat Matthioli figura, in quorum medio
apices lutei succedunt pericarpia hispida, & semina Pericarpia
minora, quàm in Cisto mare Monspess.

Ad hæc observavi Hypocistis seu rectius Hypo-
ledon, copiosè proveniens Maio. Nascitur autem
ad Ledi radicem cui adhæret ut Fungi, & Agaricus
arboribus, neque verò est de substantia ipsius fruti-
cis propriè. Itaque non videtur nisi reprehensione
dignus Fuchius, qui tãquam Fungum esse dixerit.
Sed ut redeam, ad unius plantæ radicem multa sub-
nascuntur Hypoleda, palmari longitudine, ex squa-
mis multis imbricatis compacta, quibus sui sunt in
summo Cityni, luteoli, sub quibus capitula rotun-
da, mediocriter magna, succo viscido & lento plena.
Doucez annotat se Monspelij verno tempore, ex
aqua calida, in qua Ledum hoc elucrat, ad spissitu-
dinem decoctæ, optimum Ladanum confecisse.

*Hypocistis
sive Hypo-
ledon.*

*Fuch. re-
preh.*

Nos existimamus idem esse Ledon quintum à
Clusio his verbis traditum; eadem, quâ quartum a-
l-

*Ledum 5
Clusij.*

surget

CISTVS LEDON VI. MINORIBVS
angustioribûsque foliis Clusij.Valentino quoque regno observatum à Clusio *Locus.*
circa Xativa, ubi ab incolis Xaguarco dicitur.CISTVS LEDON FOLII
colore cinereo.

Cvitalis est, *Desce.*
multis & frequētibz ramis fruticans, colore cinereo præditis, frequentissimis foliis eos septentibus, Rosimarini coronaria, sed omnino canescentibus & hispidis: non tamen minus pinguis, lento succo perfusus, cum suis tenellis ramulis, quā quintū genus *Moss.*
Flos summis ramis *Flos.*
copiosus, candidus, præcedenti similis, semen etiam non dissimile.

Valentino regno, *Locus, enim Synon.*

Cisti Ledi genus septimum Clusio Hispan. & Hist. duntaxat observatum, circa Xativa, ubi ab incolis quoque Xaguarco dicitur. Lob. Obs. & Icon. Ledi genus septimum. Tab. Lugd. ac Ger. Ledon Clusij septimum. C. Bauh. pin. Cistus Ledon n. sive foliis Rosimarini hispidis.

CISTVS LEDON FOLII ROSMARINI coronaria Clusij, flore luteo.

Eadem, quā superius magnitudine crescit, rami tamen magis expansi sunt, folia tenuiora, superna parte ex fulco viridia, inferna vero candicantia, ut Rosimarini coronariae folia videantur, gustu tamen adstringentia, licet lento quodam & pingui humore sint, cum tenellis ramis obsita: flores numerosi secundum ramorum longitudinem, quique foliis constantes, exigui, lutei, semen in exiguis capitellis ex cinereo nigricans.

Inve-

Ram. Folia. surgit altitudine, verum ramis duris, lignosis, nigricantibus, oblongis, Oleæ foliis angustioribus, fuscis, pinguis, lento humore conspersis, quemadmodum & novelli ramuli; flos albus, omnium ferè minimus: longa & angulosa capitula, in quibus semen ex ruffo nigricans, exiguum. Ad hujus radices genus illud *duodiceps*, sive Cynomorij, Hypocistis nuncupatum, adnatum inveniebat Clusius, multis veluti squamis, ut quod in aliorum Cisti generum radicibus crescit compactum, pallefcantis coloris, quibusdam tamen lineis purpurascens & nonnihil virefcens distincti, Cytinos suos in summo proferens, lentosque & glutinoso succo totum prægnans.

Plinij error. Matthiolus in Diosc. notat Plinium, aitque vocabulorum vicinitate eum deceptum, ex Cisto [Hedera] Ladanum colligi dicerent, non autem ex Cisto, arbutula: Græc. *Ἀνδύς*, Lat. *Ledum*, Arab. *Chafus* vocari. In post. comm. Ital. ait Rob. Constantinum conivere in annot. ad enarrat. Amati, excusantem Plinium. Habet autem Ledi figuram cum foliis latioribus, quàm sint in nostro, fortè ad cultas plantas factam: vidi sanè Ledum valde simile nostro, si non sit idem, folio longiore & triplo latiore: in cæteris nescimus an sit discrimen, nec etiam ullius discriminis ejus video mentionem factam à Clusio.

Tur. icon mala. Turn. pro Cysto ladanifera, figuram habet quæ non placet. Lob. in Adv. Cistus Ledon, cui frequenter Hypocistis adnascitur: Eid. Obs. Ledon 5, Icon. Ledum Narbonense cum Hypocisto, Ledum 5, Clusij.

Limodorum Icon Clusij. Clus. Ledum quintum, sub quo ait se invenisse Limodori, sive Orobanches speciem, quod Hypocista appellant. Notandum apud Clusium figuram angustissimis foliis esse positam in Hispaniis sub titulo quinti: pertinere autem ad sextum: folia enim tenuiora, in postrema hist. meritò mutatum esse titulum, & positam pro sexto: quinti autem loco, novam iconem introductam quæ respondet Monspelienfi.

Ledon unde dictum. Cæsalp. & Camer. ad Matth. germ. Ladanum vulgò appellatum frutem, odoramentum ferens eodem nomine. Eid. in Epit. Ledum.

Lugd. Cisti Ladaniferi genus, *Ἀνδύς*, sic fortè dictum, quia folia ejus neque levia, neque nitida sunt, sed scabra & pannosa: *Ἀνδύς* enim est vestis ex panno raro & detricto: Ledum Matthioli, item Ledum 5, Clusij.

Tabern. ignorantia. Tabern. Icon. & hist. Cistus Ledon Narbonense cum Hypocistide: item Ledum Clusij nonum. Mira Tabern. circa rem herbariam ignorantia manifestatur, ut à quo passim in suis eiconibus ultra centum & quinquaginta superflue proponantur, quemadmodum videre est hoc in loco, ubi eandem Ledi plantam, duobus diversis & titulis & figuris exprimendam curavit.

Ger. notatur. Ger. Cistus Ledon quintus Clusij, Cistus octavus Ledon, cum Hypocistide Lobelij: Cistus decimus tertius, Ledum Matthioli. Gerardus separat jurgendas figuras. Anguill. dic. tur Ladanum ferens Hypocistidem. C. Bauh. pin. Cistus Ledon sive foliis Oleæ, sed angustioribus: Cistus Ledon Lobelij, Ger. Cistus flore albo. Eyst. Hunc similem sub Cisto adulterino pingunt, Tab. & Ger.

Locus & Tempus. Ledum abundat Monspelij in silva Ægremont, ubi quis diceret datà operâ factum, flores Aprilis & Maio: ferens Hypocistida, sed parum liquoris sive Ladanii continens conspicitur in monte S. Iuliani in Abbruzzo in Apuleia & Provincia: nihil isto Ledi genere vulgatius toto regno Valentino, & Gallia Narbonensi, ubi aliud Leon. non observatum à Clusio, sed in plerisque aliis Hispaniæ & Lusitanie locis etiam invenitur.

Sylva.

Locus.

Rosmarinus.

Tuber ex
Cist. lappin.

Cistus Ledon 12. five foliis Rosmarini subtus incanis.

Invenitur Cisti Ledi genus octavum Clusij sequens in nonnullis locis intra Tagum supra Vlyssiponem & nonnullis Batica, ubi ab incolis Romero appellatur, id est Rosmarinus. Rauv. Ladanum Clusij folio Rosmarini, flore luteo. Lob. Obf. & Ic. ut & Lugd. Ledi 8. genus. Tab. Ledum Clusij quintum p octavo. Ger. Cistus Ledon sextus Clusij. Cur sextum facit, cum sit octavus. C. Bauh. pin.



C. Bauh. pin. Cistus Ledon 14. five foliis Thymi.

vel potius, ut existimabat autor, Hypocistis, quæ illis tuberculis fortasse loco observata est, narrantur: Tuber enim Hispani Turmas vocant.

Lob. Obf. & Ic. Synon.

Ledi decimum genus. Tab. Ledum Clusij octavum pro decimo. Lugd. Ledum decimum Clusij. In icone nostra observata proportione ad figuram Clusij, oportebat minora esse folia. Ger. Cistus Ledon decimus Clusij.

CISTVS LEDON IX. CLVSIO.

Deser.
Folia.

Ramuli.

Capitula.

Synon.

Locus.



guaco nuncupatum.

Tab. aberr.
rat.

Lob. Obf. & Ic. ut & Lugd. Ledi nonum genus. Tab. Ledum Clusij sextum pro nono. C. Bauh. pin. Cistus Ledon 13. five foliis Rosmarini, sed non incanis.

Minus est superiore, folia paulo majora, neque subtilis incana, ut in octavo, sed rariora & magis glutinosa sunt: ramulos, quibus flos inhaeret, tenues, & exsuccos planeque retortidos: aliquot capitula inania, omnino hiantia, jam excusso semine, sustinere deprehendebat Clusius.

Nascitur Ledi nonum genus Clusij in extrema Batica parte, qua Castellam novam spectat, ab incolis Xar-

CISTVS LEDON THYMI
foliis Clusij.Deser.
Ramuli.

Folia.


Capitula.

Locus.

Tumeruella.

Pedali duntaxat est altitudine, ramulis exilibus, lignosis, satis tamen fragilibus, nigricantibus, pinguioribus, & lento quodam humore madentibus: folia longè minora, quam in nono, non multum à Thymi foliis dissidentia: flores non observavit Clusius, quemadmodum nec in superiore, sed in oblongis ramulis quasi umbellatim procedentia capitula, exigua, & superiore parte aperta, jam inania & cum suis ramulis arida.

Nascitur Cisti Ledi decimum genus Clusij in extrema Batica parte, qua Castellam novam spectat, ab incolis Xaguarco nuncupatum: quidam etiam Tumeruela appellant, quod sub eo fortè tubera,

TVBERARIA NOSTRAS.
CAP. VII.

Aulis pede altior, teres, alioqui glaber imò duntaxat parte candicante tomento obfusus, interlucente leviculâ quâdam rubedine, folia citra infimum caulis crebra, plantaginea, ex rotundo oblonga, latitudine femunciali, longitudine ferè unciali, supra, subtusque incana lanugine, pubescentia, nervis tribus, Plantaginis in morem dispositis, distincta. Per reliquum caulem ex longis intervallis

Deser.

Folia.

bina folia adverso situ veluti ex geniculo nascuntur, (aut alterum altero paulò inferius) angustiora, longiora, acutioraque, quam infima, glabra, nervosa, supremum caulis fastigium in binos longiusculos pediculos dividitur, quorum unus in tres alios breviores facessit. Singulis autem inhaeret capitulum turbinatum, plurium foliolorum voluminibus contextum, cujus basin fulciunt foliola perpusilla acuminata: flores interdum longè plures. Duodecim siquidem gerebat ea, quam siccam apud D. Rentzium vidi. Ego eandem cum Tuberaria majore Myconi suspicor, de qua mox.

Capitulum.

Flores.

Raram hanc nec uspiam nobis visam alibi plantam communicavit D. Rentzium collectam in monte Divi Iohannis propè Pisas, inter plantas Stachadis arabicæ.

Tuberaria maior Myconi.

TVBERARIA MAIOR MYCONI.

Tuberaria maior Myconi, à Mycono dicta, ut Eryman refert. Lugd. quod foliorum & florum figurâ, hirsutie & facultate minor jam dicendæ sit similis, magnitudine tantum distans, foliis multis, Plantaginea.

Deser.

tagini

Caulis.

Flores.

Radix.

Sapor.

Locus.



lum pilosa est, ejusque sapor adstringens, majoris, quam minor efficacia. Nascitur in locis siccis.

Hanc cum sequenti C. Bauh. refert ad Cistum foeminam vocatque secundum, sive folio Plantagini.

TUBERARIA MINOR MYCONI.

Deser.

Folia.

Caulis.

Flores.

Semen.

Radix.

Sapor.

Locus.

Turmeria.

Hydnophyl.

Lam.

Locus.



Tuberaria minor Myconi, formâ & facultate cum superiore, affinis est Pilosellæ, folia habet Plantagini similia, sed multo minora, humi repentia, villosa: caules dodrantales, rotundos, inanes, hirsutos, in quibus per intervalla folia sunt bina, exigua, caulē ambientia, minuta, quæ circa radices humi jacēt: in caulium vertice flores luteos, in quorū medio purpureum quiddam est, in nigrum vergens, semen in exiguo folliculo, (dilatato flore) statim conspicitur: radix admodum parva est, tenuis, nonnihil fibrata. Tota herba hirsuta est: totius etiam sapor adstringens est cum vocitate.

Castellani eam *Turmeria* vocant, id est, Herbam Tuberariam: quoniam ubi illa crescit, tubera frequentissimè reperiuntur. Hanc, si veteres cognoverunt, eam esse suspicatur Myconus, quam apud Athenæum Pamphilus Hydnophillum vocat, quia sapissimè tubera demonstrat: unde nomen Tuberariæ ei, à Castellani inditum.

Passim in pratis reperitur, locis pinguius, terrenis. Ambas has plantas Myconus ex Hispania misit.

CISTVS ANNVVS I. CLVSIO, folio rotundiore. C. A. VIII.

Deser.

Radix.

Cauliculi.

In horto meo Genevensi ad cubiti altitudinem ac etiam majorem excrevit: ab una radice lignosâ & canaliculâ, nigrâ, modò ciliatâ uno, modò pluribus, quinque Tom. II.



ac etiam sex, medio erectiori, omnibus hirsutis, teretibus: folius veluti pergenicula binis, Majoranæ similibus, longioribus, potissimum circa medios caules: inferiora enim rotundiora sunt, superiora angustiora verò, pilosa ad latera singulorum, geniculorum, ad unum quodque folium, duo parva foliola: in extremis ramis duo, tres, quatuorve flores, unusquisque in suo geniculo ex brevi pediculo, hirsuto u-

no folio longo & duobus parvis constans. Floribus succedunt vascula, triquetra, brevia, magna, Ciceri ferè equalia, quæ matura in tres dehiscunt veluti cotylas latas, corticofas, rufas, quas cingunt foliolaria, hirsuta, costas habentia: intus membranulæ tenuis, lucida, cui adherent multa semina, minus ruffa, papaverinis minorâ, inæqualia, matura Augusto. Icon nostra ex Clusio potuisset forè melius ex-

primi, quod folia attinet superiora, & capsulas, nisi abfuisse, cum pingeretur. Clus. suam sic describit: longiusculis, hirsutis, rectis & ratis est virgulis, foliis autem amplioribus, quam in Chamæcisto primo, magisque viridibus, adstringentis gustus: flos Chamæcisti primi flori similis, pallidus aut albicans est, semen minutum rubescens in trigonis capitulis, duplo quam Chamæcisti primi majoribus continetur.

Castellani, Cistum annuum hunc Clusij primum *Turmeria* vocant, quia forsitan, ubi hæc nascitur, turmes *serva del quadrillo*. An Hydnophillum herba est, ait Clusius, quam Pamphilus in glossis, teste Apollonius, tradit supernascentem tuberibus, cujus judicio subesse tubera cognoscunt. Meo judicio quidem Chamæcisto est congener.

Ejus alia species invenitur longioribus aliquantulum virgis, non tamen minus hirsutis, angustioribus etiam foliis, cujus flos minor, pallidus, valde altera, caducus: capitula & semen similia.

Lob. Obi. Cistus humilis annuus, folio Salicis humilis: item (ut & Lugd.) Cistus annuus primus Clusij. Ic. Cistus annuus folio Salicis. Cam. hort. Cistus annuus flore luteo Clusij in Hisp. Tab. & Ger. Cistus annuus. C. Bauh. pin. Cistus foemina ro. sive Cistus folio Salicis.

Bely. *Zaerliefche cleyne leese Cistus met bla ders van cleyne wlehe.*

Genevæ habui semine maturo, Augusto. Argentinæ vidi cum vasculis, sive capsulis triquetris Julio tempore, in horto D. Obrecht. In vinetorum apud Salamanticensis marginibus, & Granatensi regno a Clusio observatus.

Cisti annui semen, annotante eodem, maximè commendatur ad nephriticos dolores, præter alios usus, à doctissimo viro Simone de Tovar, Hispanen-

CISTVS ANNVVS II. CLVSIO, FLO-

re pallido, maculâ punicante insignito. Cistum annuum secundum Clusium inveniebat in sylva Madritiana, secundo ab urbe Lutetiâ

Cauliculi.

Folia.

Flos.

Capitula.

Semen.

Tempus.

miliari, ad Cisti genus referendum, pedali altitudine, exilibus cauliculis, rectis, tenellis, non admodum ramosis, foliis oblongis, angustis, hirsutis, virentibus, quæ cum ramulis per Caniculæ ætus humore quodam pingui, & lento sunt obstita: flos pusillus, quinque foliis constans, ut Helianthemum, pallido colore, & maculâ punicea insignitis: capitula tenella admodum, triquetra, semen pusillum & cinereum continentia. Maio mense floret.

C. Bauh. pin. hunc Cistum cum frequenti eundem facit, statuens varietatem esse in flore maculoso, & non maculoso. Vocat autem Cistum feminam n. Cistum flore pallido punicea maculâ insignito: Cistum annuum 2. Clus. hisp. & hist. Lugd. Cistum annuum guttato flore, Pona: Helianthemum flore maculoso, Colum.

Variati est enim flore maculoso, maculâ ex nigro rufescente, sive puniceo: vel non maculoso. Cæterum, mirari subit C. Bauhinum, quomodo in phyt. Cistum silentio præterierit, nec ejus mentionem aliquam fecerit.

CISTVS ANNVVS FLORE guttato.

Descriptio.

Surculus.

Folium.

Flos.



Radix.

Locum, et tempus.

titus, ad instar Pyropi, auro summa arte exceptus, tum summitati, tum pediculo longiusculo & capillari calycibus affixi hærent, horum tamen aliqui sine foliis unicum florem in suprema parte obtinentes plantam finiunt, quæ radice unicâ, exili, lignosâ, ac parum fibratâ alitur. Floret initio Julij: apor & semina, ut in aliis Chamæcistis. Provenit in plano Agro altero, sed frequenter in oppido Ciari.

Si quis consideret, quæ scribuntur de Tuberaria Myconi, de Cisto Clusij annuo secundo, & de Cisto hoc annuo Pona: judicabit fortè de una eademque planta scribi. Verum quum quotidie experientia nos doceat, multas plantas ex descriptionibus videri easdem, quæ tamen non parum differant, malimus nos hic omnes tres proponere, quàm temere asserere, eandem plantam cum reliquis duabus unam esse. Hoc autem idè potissimum, quoddam latius descriptionibus & iconibus non raro notæ quædam observentur, quæ differentias manifestò facere videntur. Qui igitur fuerunt in locis aut ibunt, ubi illæ proveniunt, statuant quid sentiendum, & nos moneant, libenter sententiam mutabimus, utpote qui veritatis sumus studiosi.

CISTVS ANNVVS FOLIO LEDI, flore luteo.



Narbonensis Locus. Ledi annua ra species, viâ, quæ ducit Monspelio ad Rondeleij prædium vulgè Terralinter Sierro-cavallo & Cristas galinaceas herbulas fruticæ, foliis Ledi angustifoliis, hirsutis, juxta sum nam pedalem & sesquipedalem caulem: semen exile angulosum, rubrum, pulchellum in pericarpio nitido triquetro Selaginis Pliniana dictæ, lenore glandis ilicis & magnitudine ferè

pari: flos luteus. Lob. in icone, quàm hic posui. Flomus, caules sunt crassiores, quàm proportionaliter esse oporteat.

Lob. Obs. & Ic. Cistus annuus folio Ledi. Tab. Cistus annuus Ledi folio Lobelij. Lugd. Cistus annuus alter Lobelij, quæ eundem facit cum Clusij annuo secundo, contra sententiam Lobelij separantis. Considerandum an ejusdem plantæ figura & descriptio à Lugd. non ponatur pro Alyssum gonon Dalechampi: perpendendum etiam an Tuberaria Myconialiquid commune habeat cum hoc Cisto.

Ger. Cistus annuus longifolius Lobelij. Belg. Cistus merbladera van Ledum: Ang. Lang leaved yeerly Cistus. C. Bauh. pin. Cistus femina n. sive Cistus Ledi folio: Cistus annuus alter Lobelij, & Alyssum trigonum, Lugd.

Pona annotat in monte Baldo provenire Cistum Locus, annum alterum Lobelij.

CISTVS MINIMVS FOLIO subrotundo.



Exhibuit Heidelbergæ anno 1595. Sprengerus Cisti tenui folio Candia nomine plantam semipalmatam, radice tenui, lignosâ, reliqua plantâ longiore: foliis parvis, subrotundis, latiusculis, binis ex adverso respondentibus, cinereis, in coliculis singulâ, tenui, retenti, cujus summum occupant capellæ Helianthemum canâ lanugine pubescentes. Colebatur in fidei lunio mense: perennans.

nem discutabat, de quo tamen dubitamus.

CISTI

CISTII SPECIES ANNUA,
angustifolia.Locus &
tempus.

Deser.

Radix.

Caulis.

Folia.

Rami.

Capitula.

Flos.

Sapor.



Cisti nomine attulit frater C. Bauh. plantam à se Monspeli inventā, florentem mense Maio, in via Perou versus, annuā meo iudicio. Est dodrantalis, vel etiam major ac cubitalis: radix unīca leviter fibrosa, satis tenuis, recta: caulis unicus, teres, hirsutus, gracilis, quatuor aut quinque gemiculis distinctus, ad quorum urummodq; folia bina duabus uncis longiora, angusta, hirsuta, ad Ledi Monspessulani

ni accedentia, ad radicem breviora. subdidit ut in aliquot ramulos inaequaliter non ex adverso fitos, quod observaverimus, quatuor aut quinque uncias longos, capitulis multis (ad quindecim enim numeravimus) parvis, triquetris, Ledi Monspessulani similibus, minoribus tamen, ex pediculis fere uncialibus, in unam partem, instar jubae, vergentibus, quaterna foliola hirsuta circumplectuntur. Florem quidem non vidimus, verum Gener Cherlerus attulit Monspelio; adscriptis his verbis: circulum in medio nigrum habet, cuius interiora alba, punctulis nigris aspersa, aliquando etiam striis intercurrentibus nigris, folia flava. In planta sicca nullum animadvertimus saporem manifestum, praeter adstrictionem aliquam. Considerandum an aliquid commune habeat, cum Cisti annui prioris, alia specie Clusij. Quod ad vasculā & folia sibi mutuō opposita, affine quid habet, cum Ledo nono ejusdem.

HELIANTHEMUM VULGARE,
flore luteo. CAP. IX.

Deser.

Radix.

Rami.

Folia.

Sapor.

Flores.

Pericarpia.

Semen.



Lignosa, albā, lenitque radice nititur: ramulos emittens rubentes, lignosos, hirsutos: in quibus folia opposita, Hyssopi latiora multo, unciā longa, modicē in acumē desinentia, hirsuta, sapore praeter siccitatem nullo excellēte, glutinosi: flores longo thyrsi dispositi, qui cum apicibus lutei, quinque foliis constant, Cisti positi, hirsuti, tripartitis folliculis circumscripti, quibus pericarpia succedunt lini,

longiora, trifida, in quibus semen. Figura ex Plantino nobis, absentibus desumpta & pro vulgari posita, non multum placet, licet eandem attulisset Clusius.

Tom. II.

Tragus, Hyssopum sylvestre in sen campestre nominat: Cord. in hist. Helianthemum. Ibidem ait: Gesnerus: est hac, ni fallor, in merid. Hyssopus sylvestris dicta à Trago: & additur post: Consolidam auream quibusdam dici Chirurgis. Anguill. aurore, Panaces Chironium, folio Sampuchi appellant quidam plantam, quam Plinius dixit Helianthemum, id est, & a des. l.

Non desunt qui pro Chironio Panace ostendunt plantam, quae folium habet oblongum, Hyssopi fere modo, sed non video, inquit Matth. quomodo ingenue possint eorum sententiae subscribere. Idem in post. com. Ital. dicit, Panaces Chironium nondum potui invenire, quamvis non desint Neoterici, qui pro Panace Chironio demonstrent, quam quidam Florem Solis vocant, ego tamen Panaces esse credere non possum: mihi potius Symphiti species videtur. Ita n. hist. Germ. Sonnenblum, Pleudo-Panax Chironium, sive Flos Solis latioribus foliis. Apud Gesner. hort. dicitur Gratia Dei Coldenbergio, quae si libeat, Vulneraria Hyssopoides vocari possit.

Videtur Dodonaeo gall. Selago Plinij. At de flore & hist. Lat. in fol. Florem Solis appellat, Cisto ad Leon. similem, sed minorem stirpem, de qua ait: Plerique latine Gratiam Dei vocant: est tamen & alia herba. Gratiola à recentioribus dicta: Plinius Helianthen tradit Helicalliden nominari: Quae ex Helicallide cum nullo Solis flore sit, an diversa, nemo facile in tanta Plinij brevitate explicaverit: Matth. Helianthemum sive Solis florem à quibusdam Panaces Chironium existimare refert: verum cum eo si militudinis habet nihil.

Lob. Adv. Helianthos sive Flos Solis, an Panax Chironium & Helenium 2. Dioscoridis. Monspelienses Cisti parvi speciem faciebant: sed crescit hic in Anglia & aliis locis passim, ubi nulla Cistus: Adstringendi siccandique vi pollet: acrimoniam rutilam prode: eoque minus Chironij opinionem facit: sed facit fortasse magis Certaeureum luteum [perfoliata lutea, de qua sub loco] effigie cum sit & viribus haud procul recedentibus. Idem Obs. Helianthes, sive Flos Solis. Cisti species Monspeliensis, an Helianthe Plinij: Helianthes Fuchsij. In l. sub titulo Helianthemum Panacis Chironij posuit Lob. Clusij figuram, quamvis Clusius separet à vulgari, quā ait, quod inter Ericas nascatur, & foliis Hyssopum emulatur, Beyden Bissop, & ob flores aureos Cor. solidam auream Herbariorum Germaniae vulgus nuncupare: Est, qui Plinij Helianthen esse velint alios, qui Panacem Chironium Dioscoridis, cui folium Amaraco simile, florem aureum, radicem parvam, nec altē demissam, tribuat. Is interea ad Cisti feminæ tertiam classem reducendam esse cerfet.

Loric. Hyssopus montanus, sive sylv. Beyden oder Berg Bissop / odoris peregrini: pingit Helianthemum in quo odorem non animadvertimus.

Lugd. Helianthemum, sive Flos Solis: Hyssopus nemorensis Dodonaei. Cam. hort. Flos Solis, aliis Panax Chironium, quamvis radix sit expers odoris & saporis. Thal. Helianthemum Cordi. Tab. Helianthemum germanicum Sonnenburgel. Ger. Helianthemum Anglieum album; cur mutari titulum Tabernomontani, nescio. Vocat enim Helianthemum Germanicum Tabernom. quamvis non sine insigni lapsu, meo quidem iudicio. C.B. pin. Chamæcistus 1. sive vulgaris flore luteo: Flos Solis Dod. (cui & Cisti & Ledi quadam species) Cast. Cam. Helianthemum vulgo dictum, Clus. hisp. Helianthemum Plinij, Eid. pan. In hist. verò (ubi ad Cisti feminæ tertiam classem reducit) Chamæcistus 1. Chironia, Cast.

Subnectam hic, quae aliquando de Helianthemo flore luteo scripti ad Gesnerum: Vir quidam doctus existimat esse Helianthen, de qua Plin. li. 24. c. 17. ait. Pliny.

B 2

Helicallis. Helianthen vocant in Themiscyra regione & Cilicid montibus maritimis. Folio Myrthæ cum adperleoneino decocto, addito croco & palmæ vino, perungit Magos & Perlarum Reges, ut fiat corpus asperctum jucundum, ideo Helicallidem eandem nominari &c. Hæc sanè conveniunt prædictæ herbe, tum nominis ætymologia, tum figura descriptio, quamvis brevis, tum effectus: cum enim viscosa sit planta, non absurdè in fucos recipi potest, tum etiam natales, qui sunt in montibus. Quamvis in

Helicoma
Aegypt.

Chryso-

Locus &
Tempus.

Herbe d'or

24/25.
Sanguinis

Algi pro-

Sanguinea
sister.

Tumores.

Paralysis.

Vulnera.
V'Gula.

—

Viribus.

Idem &
Ternus.

Folia.



liantherum Plinij, flore albo: Chamæcisti species, Chamæcisti
folio latiore, quàm vulgè nascentis ex Italia missa, & frus.

CISTVS, HUMILIS CLVSIO, SIVE

Helianthemum omnino candicans, flore
nunc albo, nunc pallido.



Exigua est plan- *Descri.*
ta, tenuibus vir- *Virgula.*
gulis, lignosis, & *Folia.*
humii sparsis prædi-
ta, foliis Helianthe-
mo vulgo dicto simi-
libus, minoribus
tamē, omnino can-
dicantibus, gustu *Gustum.*
adstringentibus: flo- *Flora.*
res extremis ramis
insident, quinque
foliis constantes,
coloris interdum al-
bi, ut plurimum pal-
lidi, staminibus me-
dium florem occu-
pantibus. Semen in *Semen.*
capitulis triangulis
lino paribus inesse
exiguū, rufum. Radix *Radix.*
lignosa & fibrosa.

Frequens est hic Chamæcistus, sive Cistus humi-
 lis Clusi primus, hisp. al. quartus in hist. quoad de-
 scriptionem: quintus vero quoad iconem. Salma-
 ticensi agro, ubi *Perdiguera* ab incolis appellatur, *Perdiguera*
 quia perdes circa eam frequenter se volutant &
 pulverant.

Lob. Obs. p. 1. figuram Clusij sub titulo Helianthemi Cordi & Tragi: vocando Cistum humilem primum Clusij: item Helianthon five florem Solis descriptum in Adv. p. 1. Clusius tamen Helianthon ab hac separat. Quare melius vocat in Icon. Cistum parvum Clusij.

Tab.

HELIANTHEMUM FOLIIS
majoribus flore albo.

A Pud Fridericum Meier Argentinae Octobri
mense Helianthen vidi florentem albo flore
in hypogæo, cui folia uncis duabus longiora, satis
lata: similem postea observavi Spiræ in horto D.
Tengnagl, florentem Iunio: huic respondet figura

Lernaeus
Tempus.
Descr.
Folia.

1

Tab. Helianthemum 1. latvum, sam Sonnenblumlein. Compiler in hist. male ponit figuram, quæ iterum ponitur pro Helianthemo peregrino angustifolio. Ger. Helianthemum Anglicum luteum, English yellow diwai sse Cistus. C.B. pin. Chamæcistus 4. five foliis minoribus & incanis: Flos foliis, Lob. Dod. utrique quoad iconem. Chironia aliud genus, Czef.

Monspelij spontaneam vidi, & quidem florentem in monte propè Castellneuf, & montibus propè Gigan, quæ itur Narbonam, mense Martio & April; Lugduni prope ædes, quæ erant Darutiorum ad ripam Rhodani, inter Lugdunum & Montuel, florentem Maio.

HELIANTHEMVM FLORE ALBO, folio angusto, hirsuto.



Plantula sesqui-palmatis, dod. artali-
busve ramis donata, interdum paulò minoribus, Monspelij verbè & Lugduni nūquam ferè cubitalibus, partim erectis, partim repandis: folia mediocriter magna, semüciam longa, angusta, pilosa, incana, ut Lavendula, insipida, nonnihil viscosa: flores ex longa serie plures, quales Helianthes vulgaris, nisi quòd albi, fibris luteis me-

dium occupantibus, calyces hirsuti, vascula quoque consimilia, in quibus semen. Quæ Monspelij provenit, radicem habet crassiusculam, lignosam, & in frequentes abit propagines.

Hanc fortè Clusius in Hisp. pro Cisto humili secundo: & Hist. pro Chamæcisto quinto sic describit. Non differt magnitudine & ramulorum tenuitate: flores item similes, semina similia: sed folia angusta omnino & tenuia, Cisto foliis Thymi respondentia, incana etiam, & ejusdem temperamenti. Radix perinde dura, & fibrosa, atque præcedens, flores aperit Maio, frequens plantula Salmanticensi agro, ubi Perdiguera appellatur. Apud Clusium verò in hist. icon hujus posita est sub titulo quarti Chamæcisti, incuria Typographi.

Lob. Obl. dicitur Cistus humilis angustifolius, Cortis Monspeliensis foliis, Selago Monpel. Cistus 5. Aslatij & Erica Chrysanthemis minima Adv. Ego contra Ericam Chrysanthemem diversam puto à Cisto humili secundo Clusij, (ut in Icon. inscribitur) quam ob causam, quæ Lobel. dixit de Erica Chrysanthemem ad asiam plantam refero.

Tab. Helianthemum peregrinum, angustifolium, Klein fremdd. Sonnengunzel: item Helianthemum germanicum tertium, Sonnengunzel. Quæ qua in re à peregrino differat nondum animadverto: Compiler nulla utitur diligetia in distinguendis Cistis. Ger. Helianthemum album germanicum: item Helianthemum angustifolium. Diximus qua in re differant hæc duæ figure, nos nondum videre, unam plantam tantum exprimere videntur.

C.B. pin. Chamæcistus 5. five foliis Thymi incanis: Panax chironium minus, Cam. ep.

Tom. II.

CHAMÆCISTVS SERPILLI FOLIO, nigricante & hirsuto, flore aureo odorato.



Mltos præmit Desf. ex eadem ramulis, dice ramulos, tenues, oblongos, summâ tellure sparsos, subrubentes, in quibus exigua folia, ordine quodam & duplici serie, quæ admodum in reliquis Cisti generibus disposita, Serpillo ferè similia, nigricantia, & hirsuta crassaque: sub florum autem parum, in novellis ramis longiora & candidiora: flores in extremis ramulis iisdem novellis terni, aut quaterni, ob-

longis & hirsutis pedicellis inherentes, quinis foliis, ut superiores flores constantes, illisque magnitudine pares, sed aurei planè coloris, & odorati, seu men observare non licuit: Radix multifida, aliquot fibris latè sparsis capillata:

Nusquam nisi in summis Austria & Stiria alpinis invenit Clusius Chamæcistum hunc 3. pann.

2. Hist. semel mense Augusto florentem. In hortum verò translatus, Maio ipsi floruit: sed flores cum suis pedicellis nimium caduci, omnem observandi seminis occasionem planè ademerunt.

Tab. & Ger. Cistus humilis, Serpilli folio.

C.B. pin. Chamæcistus n. five repens Serpillifolia lutea. Ger. Klein Cistenröschlein: Ang. Low Cistus with leanes like wilde Thyme.

CISTVS HELIANTHEMOS, flore parvo, luteo.

Almo longiores fundit virgulas, molli lanugine incanas, foliis per genicula binis mollicellis, sem. muncialibus, pilosis, ex quorum alis ramuli propagantur. Flores virgularum extremis multi, saturatè crocei, triplo minores, quàm nostratis Helianthemis. Calyces eorum hirsuti. Gener Cherlerus collegit Nemausi, & Cistum Helianthemum flore parvo, luteo denominavit. Considerandum an conveniat cum Chamæcisto Clusij Serpilli folio.

CHAMÆCISTVS ANGUSTIFOLIUS, flore luteo Clusij.

Ramulos habet humi fufos, dodrantes, aut majores, multis, oblongis, angustisque foliis, nullo ut plurimum certo, sed confuso ordine dispositis septos, præter vulgarem in omnibus Cisti generibus foliorum situm, saporis primum velut gummosi, deinde amaricantis: extremos ramulos binii aut terni occupant flores, quinque foliolis constantes, lutei cum suis in medio staminibus coloris: quibus succedunt trigona capitula, satis magna, majusculum & inæquale semen continentia: Radix lignosa, dura, vivax, foris nigro cortice obducta, & in aliquot ramos sparsa.

*Locus
et
tempus.*



*Cistus hujus
modi.*

Ang. Low Cistus with narrow leaves.

Rarior est Chamæcistus 1. angustifolius Clusij in pan. 6. in hist. nec nisi in monte Badensibus Thermis imminenti, quarto à Vienna Austriæ miliari; atq; in Hamburgensi duobus à Posonio Vngaræ urbe miliaribus, pauculas plantas, inveniebat autor, florentes Junio, quo tempore, aut paulò post semen etiam perficitur.

Tab. & Ger. Cistus humilis angustifolius. C. Bauh. pin. Chamæcistus 8. five angustifolia.

CHAMÆCISTUS FOLII MYRTI

Tarentinæ, canis vel cinereis.

*Deser.
Rarior.*

Folia.

Capitula.

Flora.

Locus.

Capitula.

Semen.

Rarior.

Locus.

Tempus.

Spec. alter.

West. Sicut.

Icon Tab.



Dodrantalibus est ramulis, humi diffusis, quos bina, semper contrario inter se situ sunt foliola, Myrti Tarentinæ foliis æqualia, aut angustiora, supernè cinerea quadam lanugine obducta, infernè verd omnino incana, gustu adstringente, & nonnihil deinde amaro prædita: pedicillos postea exerit duas aut tres uncias longos: quibus insident quini, aut seni flores, Chamæcisto Serpilli-folio similes, quos pistor malè expressit, & sculptor corrumpit, lutei coloris: his succedunt trigona parva capitula, semine in æquali, minuto, rufo, plena: radix lignosa, dura, vivax. Ramuli, flores sustinentes, maturo & deceduo semine exsiccati & confringi plerumque solent.

Maxima abundantia nascitur Chamæcistus 2. Clusij pann. 3. hist. in omnibus illis montibus, qui à Calenberg Danubio imminenti, ad Alpes Austriacas continuà quadam serie procurrunt, tum etiam in Hamburgensi, Pannoniæ monte aliisque ejusdem provincie locis, sublimioribus præsertim, sicisque, gramine tamen tedis agris. Floret Maio, semen maturum est Junio. Austriaci Seylaster welsch vocatur à præsentem videlicet juvenum vulerum facultate. Tabern. qui mutavit flores, qui non respondent descriptioni Clusij, quia, ut ait, à sculptore corrupti, & Gerard. Cistus humilis latifolius. C. Bauh. pin. Chamæcistus 7. five foliis Myrti minoris canis.

Germ. Klein Eichen Rößlein: Ang. Low Cistus with broad leaves.

HELIANTHEMVM TENUI-folium glabrum luteo flore.



EX radice crassa, Deser. lignosa, cortice Radix. nigricante conteâ, ramuli plures surgunt, lignosi, dodrantales, nonnunquam erecti, interdum per humum sparsi, foliis Folia donati valde tenuibus & angustis, ut in Cori Monspeliulana, vel Erica arborecente, viridantibus & subrubentibus, glabris, nec sibi oppositis, ut in vulgari, sed alternatim ramos confedentibus, & singularibus: Ramolius videtur,

quàm Thymi-folium sequens. Flores multò minores, quàm in vulgari, aurei, caduci, quibus succedunt vascula, majuscula, lucida, quæ semine maturo, in tres vel uti scutellas triquetras dehiscunt, ea autem vascula ambiunt tres tunica. Semen copiosum, ferrugineum, triquetrum.

Lugd. Erica quinta Chrysanthemos. Lob. Adv. Cistus quintus opinatus Aslatio: item, Chrysanthemis Erica minima foliis Tamarisci, floscellis luteis. Dalechampi vocat Ericam Chrysanthemin: Reb. Const. Chrysocomen faciebat: Frater C. Bauh. attulit ex Italia nomine Coris Dioscoridis, Guilan.

Per Ericam minimam Chrysanthemin Lobelius intellexisse eandem, quàm Dalechampium, non dubitamus, id indicante ipso nomine: is enim Dalechampi & nostras opiniones pleraque habuit, licet raro meminerit, id què operà Valerandi Dourez affinis nostri, qui ei omnia nostra communicabat, cum Lugduni Lugdunensem in cepissem Historiam conscribere generalem, in qua multum laborabat Dalechampi. Quæ tandem ob tumultus bellicos interrupta, confascinata est per stirpium ignarum, qui confudit ac miscuit nostras & Dalechampi doctas observationes cum aliis. Vidit etiam Lobelius nostras stirpes cum suis nominibus, descriptiones etiam plantarum habuit. C. B. pin. Chamæcistus 12. five Erica folio luteus: Cori similimus frutex in maritimis, Czf. Hujus duæ species, altera brevioribus foliis & humilior, altera quadruplo longioribus & elatior. Genevæ observavi locis siccis circa Champe & Monspelij. Cherlerus attulit collectum Ne-mausi. Vidi Basileæ in hortis, semine maturo Septembri. Degustata nobis nullum manifestum saporem præbuit. Chrysanthemis, Erica minima, inquit Lobelius, nacta est natales fabuleta maritima Veneta: eandem studiosiores videbant Monspelij secus patibulum Castri novi. Erica Chrysanthemon in fabulosis æditorum collium locis apricis & perflatis gigni, florere Iulio observavit Dalechampi.

HELIANTHEMVM ALPINVM FOLIO Pilosellæ minoris Fuchij.

HERBA hæc collecta in montium locis siccis circa Genevam, ut Saleve, & in hortum translata floruit Junio. Eam sic descripsi ante triginta annos: Fruicosa

Helianthemum alpinum Genevæ.

Zohia.

Rat.



abus, ad Polium montanum vulgare accedentibus, cinereis & ferè albis: radice crassa, lignosa, cum capitulis multis onusta.

CISTVS HELIANTHEMOS folio Polij montani.

Cist. Heli-
anthermos.Varietas
fortis.

Adem, aut planè similis, nobis data est Argentina ex plantis D. Agerij, cui nomen feceram, Cistum Heliætheum folio Polij montani vulgaris. Albicantes in ea erant cauliculi, unciarum quatuor, vel quinque, ramosi, qui desinebant in tenues pediculos, parvos flores profertentes, luteos, tres vel quatuor: Folia albicantia Polij vulgaris montani.

Nec dissimilem ab hac Cherlerus attulit stirpem, collectam in rupetis pro-

pe Agdes Gallia Narbonensis, quæ folio est candidiore, quantum judicare possum ex reliquiis quibusdam allata sæpè fuerant plures plantæ integræ, sed redditæ sunt nobis invisibiles, remanente tantum portiuncula.

CISTVS PVSILLVS FOLIO candido, flore luteo.

Descri.

Ramuli.

Cistus pusillus folio candido, flore luteo, pal- mum longiorem, duram, lignosam, foris rubentem, intus albam, gracilem demittit radicem, quæ terram versus crassescit, in quæ numerosa capita dividitur: è quorum singulis ramuli prodeunt, alij unciales, alij duplo longiores, hirsuti, foliis numerosis, infernâ parte candicante densâ lanugine ob- sitis, supernè viridantibus, pilorum non expertibus, acuminatis, semücialibus, culmis latis onustis: extre- mis ramulis bini suis singuli pedicellis insident flo-



sculi perpusilli, lu- *flosculi*.
tei, luteoque capil-
lameto donati, quo-
rum exteriori parte
foliola extima, pilis
obrita canescunt, in-
teriori parte lutea.

Ceterum, fieri po-
test, ut vel natura
ob Solitantium na-
talis varietatem in
tribus præcedentibus
plantis ludat: Vel, si
non, ut eadem, aut
earum aliquæ à Clu-
sio in hist. c. de Cha-
macisto, & potissi-
mum sub Cisto hu-
mili altero tradan-
tur. Hæc diligentius
posterius examinent.

An hac em
dubius pra
cedentibus
eadem?

An Cista
macistis u.
Clusii?

HELIANTHEMVM FOLIO Thymicano.



Virgula plu- *Descri.*
res, tenues, *Virgula.*

incanæ, quæ in al-
ios repandos ramos
dividuntur ramu-
los: foliola Thymi *Folia.*
durioris, minuta,
brevia, hirsuta, ci-
nerca, terna, qua-
terna, interdum
plura ex eodem
geniculo enata.
Flos & Capellæ in *Flos.*
tres carinas dehi-
scentes, cum invo-
lucris hirsutis, ut
in Helianthemo
vulgari. Radix cras-
sifolia, contorta,
lignosa, multifida,
multorum capitum.

Fortè hanc mi-
scet & intelligit Lobel. cum Helianthemo tenuiflo- *Heliantho.*
lio glabro: similes sunt plantæ, differentes tamen, *mi tenuiflo-*
diligentius consideranti. *lium.*

Montpelij observavi florens adhuc mense Se- *Locus et*
ptembri & in montibus propè Castelnæuf & juxta *tempus.*
patibulum Maio. Mense quoque Aprili, in monte
Sæti: Cherlerus attulit collectum in vinetis & colli-
bus Nemauso vicinis.

CISTVS PVMILVS MONTIS Baldi, fortè Austriacus myrtifolius.

Compluscus, sescuncialibus & quadrantalibus, *Descri.*
lignosis adolescit virgulis, tenuibus & hirsutis:
folia virentia, crebra satis, similia Myrto Tarentina, *Folia*
vel Lentis foliis paria, nec ita dissimili circumscri-
ptione, ortu & positu diversissimo, quippe bina, in-
condita tamen, fortuitis pilis, supra subtusque dona-
ta, per margines copiosioribus, ut in Nerio alpino:
flores extremis ramulis unici, satis magni, cum mul-
tis staminibus. Siccam hanc accepimus à Jacobo
Zvvingero, & fratre C. Bauhino, delatam è Monte
Baldo. Eadem fortè est, cum Chamæcisto 8. in hist.
seu 4. in pann. Clusij, proveniente in Austria, quam

Deser. Cist. sic descriptis. Palmaris aut paulò amplior est, super
Ramuli. minoribus Chamæcistis tamen firmior, multique ram-



Folia.

Gustus.

Flor.

Color.

Capitula.

Semen.

Locus.

mulis, lignosis, re-
 ctis & nigricanti-
 bus præditus, quos
 numerosa & aded
 conferta ambiunt
 folia, ut quaternis
 versibus digesta vi-
 deantur, Myrti mi-
 noris foliis nõ dis-
 similia, minora qui-
 dem & hirsuta, li-
 cet atra viriditate
 supernè splēdeant,
 quorum gustus ad-
 strictionis partici-
 peps est: flos uni-
 cus, interdum & al-
 ter extremis ramu-
 lis exit, satis crasso
 pediculo subnixus,
 unico constans foli-
 o, quinque pro-

fundis crenis, iisdemque veluti circinatis, diviso, ita
 ut quinque folia habere videatur, ejusdem cum pri-
 mo genere penè magnitudinis, coloris ex albo pur-
 purascentis, & quasi carnei dilutionis, decem stami-
 nibus extrema parte nigris, & stylo oblongo pur-
 purascente, medium florem occupantibus. Floribus
 excussis apparent pentagona capitula, qualia in nõ-
 nullis Cisti generibus videre est, obtusè mucrona-
 ta, quæ maturitate aperta, semen continere depre-
 henduntur exile admodum, flavi coloris.

Rarissimum suum fructum duntaxat in Sene-
 ben iugi scopulis nascentem observabat Clusius,
 unde florentem sub mensis Junij finem eruit; semi-
 ne verò prægnantem Augusto: in Veyßalben sum-
 mo supercilio, duobus supra Neuburg miliaribus.
 Eam cicurare voluit in horto suo semel atque ite-
 rum ex his iugis cum suo cespite desumptum, sed mi-
 tescere noluit.

Si Clusij Chamæcistus hic eadem est, cuncti no-
 stra, sanè in Ico hæc, quam proponimus, caules nimis
 crasse picti, & folia sunt, ejusdem magnitudinis cum
 figura: Idem mihi evenire videtur ipsi Clusij figure,
 quod animaduertere poterit Lector conferens de-
 scriptionem cum iconè.

Tab. & Ger. Cistus humilis Austriaca Blein C.
 fennòblein. C. Bau. pin. Chamæcistus sive hirsuta.

HELIANTHEMVM, SIVE CISTVS humilis, folio Sampfuchi, capitulis valdè hirsutis.

Deser.

Radix.

Caules.

Folia.

Flores.



Dodrâtales cir-
 citer, eosque
 creberrimos, ali-
 quando à radice li-
 gnosa, crassiusculâ,
 longiusculâ, fundit
 caules, eosque rigi-
 dos, perquam hirsu-
 tos, per quos veluti
 ad nodos folia ad-
 verla, Maioranæ foli-
 is paria, alia ob-
 longa & latiuscula,
 alia angustiora: flo-
 res in ramulorum
 extremis multi, se-
 muncialibus circi-
 ter pediculis hirsu-
 tissimis nixi, lutei,
 foliolo calyce, stria-

to, villosò obvallati. Hanc Cherlerus attulit Mon-
 spelio ac nominavit Cistum folio Sampfuchi.

HELIANTHEMVM AD NYMV. lariam accedens.



Pleracet nobis
 planta à D. Ri-
 chnero Basileæ an-
 no 1568. data, no-
 mine Cisti, foliis
 Sampfuchi, dolo-
 mus non integram
 fuisse, sed tantum
 ramos cubitales,
 quos putamus su-
 pra terram exclu-
 sos fuisse. Rami ma-
 gnis pilis hirsuti,
 folia bina in ordine
 disposita, ad Nu-
 mulariam acceden-
 tia, minora tamen
 & cum pediculis
 longiusculis, qua-
 les Alfine vulgari,
 tales pediculos im-
 consimilibus He-

Rami.

Folia.

lianthemis, vel Cistis minoribus non observavi: fo-
 lia breves habent pilos, minus conspicuos: ad alas
 foliorum sunt tenuia foliola.

HELIANTHES SPECIES RARA, coma inflexa, ut in Heliotropio.



Radix digitali,
 longitudine scilicet
 palmari, lignosa, fi-
 bris paucis, sed va-
 lidis donata, foris
 buxæ, intus albæ,
 ramos sex, octo, aut
 plures per terram
 spargit palmares &
 spithameos, tere-
 tes, tenues, quibus
 folia nullo insigni
 sapore prædita, cre-
 bra, alterno situ ut-
 trinque adnascun-
 tur Majoranæ, gla-
 bra, & ex viridilu-
 teola, unico nervo
 per longitudinem
 decurrente, at prio-
 ra folia, & quæ proximè terram, non parum ab iis,
 quæ per ramos videntur, differunt, utpote longius-
 cula: flores in extremis ramulis perquam conferti &
 Scorpioidis re flexi, quinque foliis albis constant, api-
 cibus luteolis, quinque viridantibus extrinsecus
 obvallati: capitula sequuntur triquetra, fusca, semi-
 ne exiguo, papaveri ino pari, atro, cavitatem impre-
 sam altera parte habenti, altera gibbo referta amaro.

Deser.

Radix.

Rami.

Folia.

Flores.

Capitula.

Semen.

Lob. not. in.

Helianthes.

Lob. Adv. tribuit huic flores aureos, cum sint al-
 bi: verum eam describit ex sicca planta, non ex vi-
 rente, in quibus non rarò mutantur colores. Vocat
 autem Helianthes speciem rarâ, figurâ leguminosâ,
 floribus aureis: In Ic. Cistum folio Majoranæ, deflexis
 floribus: ejus autem con non placet, idè aliam
 curavimus pingendam. Aliquando misit nobis
 Hortu.

Hortulanus Ducis Florentiæ cum hac inscriptione,
Telephium. an *Telephium Candia*. Cherlerus attulit cu n se-
Helenium quentibus nominibus; *Telephium* quorundam &
Cratæva. *Helenium* Cratævæ, dictum à Pona. Imper. *Tele-*
phium Dioscoridis quibusdam, *Helenium* Cratævæ.

Telephium. Cam. hort. At calorem, quæm in *Telephio* Impe-
 rati requirant veteres, à radicem potissimum gu-
 stantibus deprehendi.

C. Bauh. C. Bau. phyt. meminit hujus *Telephij*: sed præ-
 mentem Camerarij, ut suo capite dictum, idem fa-
 ciens cum Aizoo peregrino ejusdem Camerarij: E-
Aizoon pe- go *Telephium* Dioscoridis non existimam, descri-
regrinum ptio siquidem non convenit, ut apparet conferenti.
Telephium Eid. pin. Cistus femina 8. sive folio Majoranæ: *Hel-*
Diosc non est contra *Camera-* lianthes species Pena. Lugd.

Ex Gallo-provincia bis misit Jacobus Reynaudet,
 primum nomine plantæ repentis, ut *Numularia* se-
 cundò stirpis *Veronica* modo repentis. Ex semine
 mihi misso provenit floruitque lupio & Julio: etiam
 non repocita duravit aliquot annis: Basileæ obser-
 vavi in hortis, & Lutetiæ Augusto cum suis capitulis.
 Cameratio perit hyeme postquam plurimos
 annos duravit, semine tamen spontè exidente, plu-
 rimum rursus propagavit. Lob. misit Raymundo
 è jugis arduis montis D. Bonaventuræ non procul
 Aquilexensis erutum.



succum, quali Ledi
 genera madent) ef-
 fundere videtur.
 Clusio hac planta
 revocat in memo-
 riam fruticem Ga-
 gel, qui etiam fru-
 tex odoratus, de
 quo nos suo loco.
 Clus. Pan. & hist.
 Myrto - Cistus Ba-
 learica, & (ut Ger-
 & C. Bau. pin. cui e-
 tiam Cistus ledum
 17.) Myrto - Cistus
 Pennæi. Tab. Myr-
 to - Cistus Clusij.
 Londini in An-
 glia siccam ostendit
 Clusio, Pennæus
 Londinensis Medi-
 cus, quam ille ex Balearium insularum majore,
 vulgò Majoricæ nuncupata erutam Myrtociste ap-
 pellavit.

NERIVM ALPINVM QVIBVS DAM, aliis Ledum glabrum, & hirsutum.

C A P. X.

CISTI FOLIO ARBOR EXOTICA, capitulis lanosis Platani.

Defr.
 Virgulta.

Folia.

Flor.

Synon.



Cisti folio arbo-
 ris extrema vir-
 gula lignosa sunt.
 Cisto concoloria &
 similia: folia item
 rugosa, oblonga,
 Salviæ aut Menthe,
 sed in summis ramu-
 lis villosos, exat-
 tæ sphericos flo-
 cos ostentant, sive
 lanosa capitula Pla-
 tani.

Lob. Adv. & Ic.
 Arbor exotica Cisti
 folio. Tab. Cisti fo-
 lio exotica arbor.

Lugd. Cisti, vel
 Ledi Arbor pere-
 grina Pena. Ger. Ci-
 stus exotica Lobe-
 lij. C. B. pin. Cistus.

femina 17. sive Cisti folio arbor exotica. Belg. We-
 lanfden boom met bladers van Cistus: Ang. firanz
 ge Cistus.

MYRTO CISTVS PENNÆI, FLO- ribus luteis oblongis.

Defr.
 Cortex.

Folia.

Flor.

Capitulum

Myrto-Cistus tricubitalis interdum frutex est,
 scabro admodum cortice, & velut quibusdam
 tuberculis obdito, qui in verutis ramulis facilè ab-
 scedit & sponte decedit: foliis Myrti ferè, dorso non
 minus scabro, quàm ramuli, superne autem læui-
 bus, conjugatim ut reliquis Cisti generibus circa ra-
 mulos nascentibus: flores summis virgis insident,
 luteis quinque oblongis foliis confartos, & multis
 intus longiusculis staminibus præditi: his succedit
 oblongiusculum & pentagonum capitulum, semi-
 ne plenum. Tota stirps odorata est, & gummi sive
 resinam (lentorem potius & pinguem quandam



Vtrumq; Ne-
 rium Alpinu,
 tum facies, tum na-
 tales conjungere.
 Frutex esaprius cu-
 bitalis, ramis con-
 tortis ac lignosis,
 digitali crassitie,
 cortice vestitis, ex-
 timo quidem ci-
 neraceo, interiore
 autem nigricante,
 at minimi ramuli
 subinde etiam ru-
 bente cortice te-
 guntur, per quos
 folia circa fastigium
 conferta, glabra,
 brevibus hærent
 pediculis Lævisi fo-
 liis paria, nec forma
 diffimili, nisi quòd
 crassiora, nervosio-
 ra, Clusio autore,
 minimè in ambitu
 hirsuta: superiore
 patte virent, infe-
 riore ferruginei sùt
 coloris, saporis ad-
 stringentis, & quo-
 dammodo resinosi:
 Inter quæ in extre-
 mis ramulorù flo-
 res multi coac-
 vantur coccinei,
 Clusio, dilatores,
 quàm sequetis, ob-
 longi, superius quin-
 que partiti, atque
 argenteis punctulis
 conspersi, in qui-
 bus plura sunt mi-
 nula, capitulis toti-
 dem,

Glabri de-
 scriptio.

Folia.

Sapor.

Flor.

Capitula. dem, medium pistillum stipant, quibus deecidentibus relinquuntur capitula rubentia, in quinque cartulas dehiscentia, in quibus pulvisculas, veluti semen ferrugineum. **Radix.** Radix oblonga, lignosa, dura, subnigro cortice tecta. Hujus porro surculorum summitatibus capitula quaedam increfcunt, squamis foliaceis congesta, oblonga, & gemmae majores speciem exhibentia. Colore subrufo foris, intus flavescente. Folii verò (Clusio referente) ramisque adnata aliquando reperiuntur Tubercula, nunc Nucis ponticae, modò Pisti magnitudine, inaequalia, foris rutilantia aut pallescente nonnunquam colore, intus fungosa, alba, gustique adtingente, pulpâ plena, quae gallarum vicem praestare possint.

Nerium II. Alterum Nerij Alpini genus, multis etiam stolonibus, duris, ac lignosis, cubitalibus, aut paulò longioribus, vix unquam surrectis fructuat. Folia potissimum per ramorum extrema conspiciuntur, & illic quidem conferta, breviora, quàm praecedentis, & obtusiora, utrinque virentia, sed virore saturato, per ambitum pilis seu per ciliorum tarsus, longis & conspicuis obliquis, saporis non ingrati, aromatici, & non nihil resinosi, cum astringente quadam. Flores praecedenti consimiliter acervatim in ramorum extremitatibus nascuntur, sed pediculis hirsutis inherentes, nec adeò diluti, & in capitula, quinque cellulis constantia, desinentia. Clusio capitula vitidia, suo odore capitis grauedinem quodam nodo inducunt. Radix dura, lignosa, oblonga sed & rami per terram sparsi, interdum fibras agunt.

Gesner in epistola ad Aetium, scribit se Berg-Rosen in multis montibus invenisse, & Sabaudica, Italicae quae nomina diversa audivisse, quorum nullum Latinam, Graecamve originem præ se ferat. Idem de Lunariis agens (intellige de Arthritica) ait eam vocari *Stübblumle* & fructum esse odoratum, cujus ligno pro *Xylobalsamo*, & semine pro *Carpobalsamo* Bergomenis quidam perperam utatur. Ad hæc eodem libro ipse desit. Montis fracti, inquit, Rosam alpinam, pastores nominare; Aldroandum verò Nerion Alpinum: sed potius, Ledon Alpinum esse denominandum. Item in sine hist. Cordi. refert, virum quendam Italum seu Chamænerium quoddam, Nerium Alpinum vocare, naturâ tamen totâ discrepare: Demum in epist. ad me I. Bauhinum: in monte Gotthardo Laurum Alpinum virentem (ut scribis) invenisti ascendendo, quo nomine Balsamum ab aliis dictum [*aliis* Alp-Rosen/ Berg-Rosen] accipere te conjecto.

Lob. Adv. Montana Allobrogum *Leniscifolia*, *Chamaelea* folia, vel *Oleastrifolia*, minis odora, *Chamaerhododendrum*, *Chamaedaphnes*, sive pusilla *Laurus*, an Germanicum *Mezereum*, an num potius nostrum *Chamaerhododendrum*? Et paulò ante: *Alpigena Chamaerhododendros*, odora; *Alpinis* Italo-Germanis, *Alp-Rosen*, bacculas *Alparagi*, vel *Taxi* pares & concolores, Septembri edens. Hæcille. Ego faciliè equidem crederem, eam duarum istarum specierum, quæ latiora & rotundiora habet folia, esse Nerij nostri Alpini speciem, si baccas non ferre, nostrum enim Nerium his destituitur. Videndum itaque an inter scribendum illa verba bacularum, non sint transposita apud Lobelium in Adv. & fortè pertineant, ad alteram plantam, quam paulò post describit. In Obs. habet figuram sub titulo *Balsami alpini*, de quo ait, *Alpigenæ Chamaerhododendri* odoræ varietas. *Balsamum Alpinum* Gesneri & *Rosa alpina*, vel *Evonymos* Theophrasti, *Dalechampi* & *Herbariorum*. Idem ponit aliam figuram cum *Baccis*, cui hæc adscribit: *Alpigenæ Chamaerhododendros* odora Adv. 154. *Balsamum Italicum* vulgare, sive *Rhododaphne* parva rustica, *Ternionarcha* Plinii putata ex Guilandino. Eidem alibi, *Genuina uva* *Vrâ*

Galerii apud Clusium, eadem videtur etiam *Alpigena Chamaerhododendro* exhibita Obs. p. 199. & Adv. 145. Videtur autem Lob. in Obs. etiam in Adv. minus bene agnovisse Nerium Alpinum, sed misere cum eo Vicin Idem secundum miscuisse. Atiquando fortè habuit ramulum *Ledi*, sive Nerij Alpini sine floribus & fructu, cum nominibus prædictis, qualia inveni inter chartas Valerandi adscripta: inde putavit baccas ferre.

Clus. in Pann. & hist. Cisto ledo non ineptè subjungit *Ledum Alpinum*, de quo ait, Nerion alpinum Aldroandus appellat: Alpini pastores *Alparosen* & *Bergrosen*, quidam etiam *Bärenbloß* [*Vrâ* *florem dixerit*] nonnullos *Hünnerlaub*, [*Fl. lrum gallicanum*] vocant. Primum genus intelligi existimarem à Lobelio in Adv. lib. Alpigenæ *Chamaerhododendri* odora nomine, nisi bacculas *Alparagi* vel *Taxi* pares illi fructus, quæ in nostro non reperias; sed pentagona tantum capitula, ut ex ejus descriptione liquet. Alterum plurimum convenit, cum ejus Montana *Chamaelea* folia, sive *Leniscifolia*, *Chamaerhododendro* minis odorata: in Obs. prioris iconem exhibet Lobelius. *Balsami alpini* nomine: pictor tamen flores non fideliter expressit, quos in quinque crenas, non in quatuor divisos esse compesisset, si ramos suis floribus onustos à me anno 1574. amicis *Machliniam* missos (de quibus illam iconem expressit) diligentiùs considerasset: licet non negem interdum fieri posse, ut quatuor tantum crenis dividantur, sic nonnunquam ludente in floribus naturâ: at omnes in eodem ramo tales natos esse, credibile non est. Et hæc est frutex qui à nonnullis *Evonymos* dicitur, nescio qua ratione ductis: Nam in hoc ubi fructus *Sesamo* proximus, in quo acinus in quaternos versus digestus, qualem Theophrasti; sive granum quadrangula figurâ, quod Plinius, illi tribuunt. Sed ex ipsa sanè historia satis liquet ne minimè quidem notâ ad *Evonymum* Theophrasti & Plinii referri posse. Itaque cum Gesnero *Ledi* potius esse genus, quam Nerion aut *Evonymum* arbitror, multum me impellente, ut ita censam, hujus stirpis odore & temperamento. Rustici & pastores eorum montium, in quibus observavi, utrumque genus *Rausch* appellant.

Myrtus Alpina dicitur Rob. Constant. In Rhetia *Porcellana* Dourez annotat ad ramum plantæ nostræ esse *Evonymum* Theophr. veram *Dalechampio*, *Laurum* tamen Plinii, *Rhododaphnen* rusticam Gesnero & *Chamaepeven* Bellonio. Gesnerus autem sub junxerat nihil habere commune cum *Lauro*.

Tab. (ubi decimum facit) *Ledum Alpinum*: Item *Balsamum Apinum* *Alp-Rosam*: Ad hæc, *Chamaerhododendros alpina latifolia*, *Balsamum Italicum*, *Alp-Rosen*. Demum, *Chamaerhododendros alpina angustifolia*, *Alp-Rosen*/montana *Allobrogum*, *Leniscifolia*; *Chamaelea* folia, aut *Oleastrifolia*. Cæterum, quam Tabern. ponit sub titulo *Alp-Rosen*/ *Chamaerhododendros alpina latifolia*, cui baccas tribuit, videtur mihi *Vitis Idæa* species, quam confundit cum *Ledo Alpino*. Cui verò titulus est, *Alp-Rosen*/ *Chamaerhododendros Alpina angustifolia*, est *Ledum* sive *Nerium Alpinum* glabrum, sed figura non placet. Illa autem quæ inscripta est, *Alp-Rosam*/ *Balsamum Alpinum*, est *Ledum Alpinum* hirsutum. Tandem qui nomen *Ledi* decimi Alpini est in hist. eadem est cum *Balsamo Alpino* Tabern. vel *Ledo Alpino*, hirsuto.

Lugd. *Evonymus* Theophr. l. c. 18. qui, eo autore, tum alibi, tum in Ordynno, *Lesbi* monte nascitur (sic enim ex Plinio legendum, non *egervio* sed *uio* *Plinius* con-
xat *videt*, ut Theophrasti exemplaria habent) magnitudine loci; *Punicæ*, pariter molli, majore, quàm *Chama-*

Figura Lob. falsâ

Evonymus non est. Nerium non est.


Rhododaphne Chamaepeven.

Vitis Idæa species.

Evonymus Theophr.

ROSMARINVS SYLVESTRIS
quorundam. CAP. XI.

Cvitalibus interdum est virgis, firmis, lignosis, Deser.
Cortice cinereo obductis, quarum extrema in Virg.
plures alias tenuiores & quodammodo purpura-
scentes, easque etiam nudas dividantur; illa vicif-
sim in alios dodrantales ramulos, virentes quidem,
sed tomento quodam rubiginis coloris obfutos,



quos nulla serie di-
gesta, sed confu-
sa ambiunt folia,
Libanotidis coro-
narix foliis, fe-
re similia; sed lon-
giora, supinâ parte
viridia, adeoque in
prona partem re-
flexa & convoluta,
ut ejus nihil conspi-
ci possit, præter ner-
vum, secundum foli-
li longitudinem,
excurrentem simili
tomento cum pedi-
culo, cui inhaeret,
pubescentem, grati
& suavis odoris, a
crisiculi tamen sa-
poris: summis istis

ramis insident capita, ex multis, brevibus quasi
squamis ferrugineis compacta, è quibus deinde sese
explicat, corymbacea quædam multorum florum
coma, oblongis, tenellis atque virentibus, non nihil
tamen larugiosis pedicellis inhaerentium, grato
odore nates ferientium, quinis foliolis albis con-
stantium, nõ subluteorum (ut temere quidam [Lob.]
qui siccum cum flore ramum duntaxat conspexit,
asserere non est veritus) decem candidis staminibus
cum stylo medium florem occupantibus: his de-
mum succedunt, oblongiuscula capitula, pentago-
na, officulis fructibus Corni, aliquando magnitudine
non cedentia, quæ, dum adhuc viridia sunt, argen-
teis punctis distincta esse videntur, sed maturita-
tem adæpta, rubiginis sunt coloris, semenque con-
tinent oblongum, flavescens, adeoque exile, ut sco-
bis, è ligno à vermibus eroso sponte decidentis, in-
stat sit. Verim peculiare est in istis capitulis, ut ma-
tura deorsum in hæstantur, terramque mucrone spe-
ctent, magnâ Naturæ providentiâ, ne semen teme-
re effluat; nam præter reliquorum consuetudinem,
à pediculo, non ab extrema cuspidè, aperiri & dehi-
scere solent: maturo semine, terni aut quaterpi, alij
ramuli, rubigineo tomento obducti cum suis foliis,
in eorum lateribus nascuntur, spem florum in se-
quentem annum pollicentes: radix lignosa est, & Rarior
brevibus fibris donata. Tota planta odorata, præ-
ferum cum floribus onusta est, & aromaticum quid-
dam spirat.

Monuit Clusium Achilles Cromerus, ad mon-
tium radices, se aliquas plantas invenisse, quæ flores
sex foliis constantes, duodenisque staminibus præ-
ditos præstarent: insuper addidit, qui illi dux viæ
fuisse, Venatorem adfirmare similem plantam, in
summis montium jugis conspexisse, jam suis flori-
bus ornatam, quæ digitalem longitudinem non ex-
cederet; nominatam autem ab eo Heydnisy bin-
frant; hoc est peregrinam Apariam, quod apes ejus
videlicet floribus delectentur.

CORD. in Diosc. Chamæpeuce, à Germanis Zeit-
heyde appellata, quam ait quosdam pharmacopolas
Chamæpyda vocare, sed errare: quædam ex opia-
ria pro

Tempus. Chamædaphnies. Circa Septembrem germinare in-
cipit, floret vere, floris color, qualis Leucoio, odore
gravi, & qualis sentitur cruciatò cadavere in totum
putrescente, ut quasi casum animal referat, sic enim
Plinij error. verenda videntur, & si quid dicitur ab eo, Plinius tran-
sultit, statim pestem denuntians, sed non rectè) fru-
ctu cum suo putamine loculo ve Selami siliquis non
absumili, intus solido, sed in quatuor versus distin-

Esfu lethalis. Esfu lethalis est arbor, tam fructu, quam foliis
pecorì, & ovium gregibus, sed præcipuè capris, nisi
purgentur. Purgantur autem inedia & cibi abstinen-
tia. Quæ postrema sic fidelis opinio, traducta sunt,

Gaza & le-
thale depre-
cat. quàm à Theodoro. Nusquam legi, quid sit ab eo.
Quare ab eo legi potest. Alij ab eo interpretantur
vomitionem, ut Dodonæus. Matth. in Diosc. Theo-
ron vocat: Hanc & capras & oves refugere opilio-
nes asserunt. Dalechampsius quidem, cum attentius
contempleretur caprarum greges, vicina frutera de-
pascentes, nullam vidit, quæ hanc attingeret, atque
adde cum decerpam objiceret, averfari deprehen-
dit. Allobroges vocantur uirles Quo loco Theoph.
Chamædaphnes legitur, mendum subesse Asteriscus
indicat, & Gaza Clematidem legisse videtur, qui Vin-
cam per vinicam vertent non adest, si nile non lego,
sed adest, præsertim puniceo. Floris tam grave n-
& detestandum odorem non potest significare oi-

Hist. Lugd. Hæc Lugd. quæ jungit & describit glabram
plantam, quæ non esset, ut vult, Cneorum Matthioli.
An sit Evonymus Theophr. hæremus. Non enim
audivimus quenquam vidisse hanc in arborem ex-
crevisse, folia non sunt mollia, fructus non est soli-
dus; loculus, quæ res non sunt in quatuor versus
distincta, sed in quinque. Odor, nec sapor nobis in-
gratus & foetidus, sed aromaticus & resinofus.

C.B. pin. Ledum alpinum, sive hirsutum: Alpi-
genæ Chamærhododendri varietas, Lob. Balsa-
mum alpinum in Gelsæri, Lob. Tab. & Cam. Le-
dum alpinum, Clus. pan. & hist. Tab. Cistus Ledon
alpinum, Ger. Eid. pin. Ledum alpinum, sive foli-
is ferreâ rubigine nigricantibus: Ledum alpinum genus
alterum, Clus. pan. & hist. Rhododendros alpina
quibudam, Cæl. Chamærhododendros alpigena,
Ger. Hoc floris colore variat, communiter dilu-
tè rubentis; at in Pyrenæis, flore tantum albo repe-
ritur.

Loca. In Allobrogum faxosis & asperis montibus nasci,
propè Muram oppidum, decem à Gratianopoli mi-
liariis distans, Punica non altiore, sæpius bre-
viorem, legitur apud Lugdunensem. Ledum alpinum
genus in montibus à Clusio in summis Eneberg/
Entalpen/Wechseln/Südenschein, aliarumque vi-
cinarum Alpium jugis inter faxa, ad dexera ple-
rumque eorum latera, & suprà Gaminam, Chartu-
stanorum Cernobium, in montis ascensu lapidibus
strato, qui subeundus est, qui ad Seßel & vici-
nas Alpes proficiscuntur. Alud ejus genus inveni-
tur in Enealpen supra Eneberg. Floret utrumque
Junio & Julio: semen sub Augusti finem, aut paulò
serius maturæcit. Ledum alpinum, hirsutum, in
priori tabella litera A. denotatum provenit in mon-
tibus Genevensibus, ut Thuit. Vtrumque vidit in
montibus Rhaticis, ubi Burnio florens mense Junio
Patavij virens Mario, est enim perpetui folio: In
monte Gotthardo Maio cum angustioribus foliis &
quadrupartito fructu, unde etiam attulit Cherle-
rus. Vtrumque Ledum generis observavit Gargillus in
monte Pilati Lucernatum mense Junio, glabrum
quidem adhuc florens, hirsutum verò jam deflo-
rerat.

Tempus. Vtroque Ledo Alpino tinctorum, qui montium
Eneberg & aliorum vicina inhabitant, ubi prove-
nit, utuntur ad lineas penulas nigro colore infi-
ciendas, autore Clusio.

1/2us.

ria pro *zauar dnm*, *zauar dnm*, habere, sed malè.
Chamzpeucen Dioſcoridi & Plinio, Germanis
Seetannien / Gichttannen & Zethyde appella-
ri. Hæc illæ, qui in hiſt. eam copioſè deſcribit.

Erica. Falli cos ait Matth. qui velint esse Ericam Dio-
Rosmarinus Icondis: invocat Wilden Rosmarin, Rosmarinum
mus sylvestrem. Bohem. Royowrus. Lob. Obf. & Ic.
 Ledum foliis Rosmarini alterum.

Videtur Clusio pann. & hist. Cisti Ledi generibus adnumerari posse hunc fruticem, Rosmarinum sylvestre, vocatum à Matthiolo & Castore, idèoque Ledum Silesiacum nuncupavit.

Cam. hort. Chamæpeuce Cordi : Eid. ad Germ.
Matth. ejusdémque Epit. Rosmarinum sylvestre.

Taber. Ledum Rosmarini folio: Item Ledum Sileiacum. Si compilator intellexisset, vel diligenter considerasset, quæ scriberet, non se parafar à capite Rosmarini silvestris Matthioli Cistum adulterinam: nec ejus imitator Gerardus, cui dicitur Cistus Ledum Sileiacum, the Polomian Cistus: item, Cistus Ledon Rosmarini folio.

H. Lugd. p. 967. *Rofmarinum* fylvestre five Bohe-
micum Martioli. Schvvenckf. *Ledum Silefiacum*
majus: *Melissa foliudinum*: *Schabenfraut* / *Heys-*
den *Bienfraut* / *Har* *Reyde* / *W. anze* / *Seyngra-*
nze *Monticolis*, quali dicitur suum grando, per ine-
thascin literarum. C.B. pin. *Cittus ledon* is. five
foliis *Rorimarini* ferrugineis: *Rof. narinus* fylvest.
Dod. belg.

Locus et Tempus. Floret sub finem Iunii, & Iulio plurimis udis & desertis montium locis: senen Augusto & Septembri est maturum in haerente interdum in frequentem uide annum capitula, sic ut recenti flore, & fructu superioris anni vacuo, nonnunquam & tertij anni fructus pedicellus, onusti rami conspici possint.

Pires ^{du} *us.* Excalefacit, attenuat, aperit, roborat, concoquit, resolvit, incidit, & digerit. Quin ad ea omnia efficax est, ad quæ Coronarius Rosinarius, præterquam ad ciborum condimenta. Non dubium est ta-

men, quin h quis periculum faceret, ad pleraq; magni usus futurus sit hic frutex. Sileb; j, telte Cromero, adversus articularum contractiones felicissi-


©1977.

Scorica

Trerimorbi
capitis
scabiei
Cerebifla
inroquunt.
Tincac.
Ecorm.
scabiei.
Apib. gra.

ROSMARINVS SYLVESTRIS,
ἀρωματ. Clusio. CAP. XII.

Defer.
Virga. **F**Rutex quidam, inquit Clusus, pedalis altitudinis raro amplior, tenuibus, subrubentibus, virgis præditus, quæ deinde in tenuiores candicantesque ramulos, dividuntur, angustis, oblongisque fo-



ROSMARINVS SYLVESTRIS
minor Camerarij.

Mltò minor, & tenerior est priore, lignosis at- *Descri*
que tenuibus viris; ultra palmi altitudinem
paullum affurgens: vel ad plinum dodrantem
æquans: folia acuminata sunt, & inferiore parte *Felis*.
cæsa. In firculorum summitatibus flosculi *pro-floresc.*
dent rubelli, & quibus semen, prioris planta [*Ru-*
smarini filiv. quorundam] semini simile. Oloriphus *Odr.*
vis percipi potest.

Nascitur Rosmarinum sylv. minus, Camin. Epit. Locm.
sive (utin hist. Germ.) Rosmarinus sylvest. minor,
Wilder flemer Rossmarin/in Borussia, in silvis um-
brosis, uliginoso solo propè priorem, quæ ibi huma-
nitas saturampæne superat.

Rosmarinum hoc Camerarij mihi persuadeo *Synon.*
idem cum Clusiano inodorato, antè tradito, quam-
vis icones multum differre videntur : fortè à Clusio
cultu



culta depicta.
Schvvenckf. Ledī
Siletiacum minus:
Rosmarinum silve-
stre minus Mat-
thioli: Rosmar. silv.
Lugd. Clusij: Klein
Grange.

Raritas occurrit
iisdem natalitibus,
flore Maio & Iunio
conspicuum, conca-
vo, quo ab altero
diversus, suaviter
rubente.

Folia Rosmarini
laticora, pulchrè vi-
rentia, inodora, ex-
siccantur, & adtrin-
gentis facultatis.
Neglecti usus.

LIBANOTIDIS SPECIES RON- deletij. CAP. XIII.



Lignosus est frut-
tex, bipalmatis
(à Cherlero bicubi-
talis observatus) ra-
dice subtrufa, robu-
sta: stolonibus rigi-
dis: Rosif. marini
textura, alioqui gla-
bris, sed minoribus
ramis, hirsutis, per
quos folia, Hyslopi
Arabum foliis pa-
ria, alia Thymi Cre-
tici capituli folio-
rum modo, laticora,
hirsuta, aspera, du-
ra, ex eodem pun-
cto saepe numero
plura, quorum u-
num reliquis lon-
gius multo, uncia-
lem tamen longitu-
dinem non assequitur, nervo unico, per singula se-
cundum longitudinem decurrente: nullo seu odo-
re, seu sapore: flores extremis haerent ramulis, ex
oblongo tubulo in calathiscum quinquepartitum,
ad Primule veris imitationem, explicati, colore pur-
pureo, femina cum Echij feminibus non nihil ha-
bent commune, aut potius Buglossi, satis magna,
colore cinereo.

Lugd. figuram & descriptionem habet sub titulo,
Tragoriganum nothi Dalechampi. C.B. phyt. Trago-
riganum angustifolium 3. sive, Tragoriganum no-
thum Dalech. Eid. in Animadv. in Hist. Lugd.
Tragoriganum nothum Dalechampi: Anchusa li-
gnosior Peræ. Vtrobique describitur. Non possum
ego cum fratre Tragoriganum Dalech. & Anchusa
Lobelij eandem facere plantam, quamvis adhuc
in pin. ejusdem sit opinio. Vna enim frutex
est: altera non item. Vni flores spinosi, purpurei:
alteri pusilli, cerulei.

Menibus Martio, Aprili & Maio floret Monspe-
lij in monte Castelnœuf.

ROSMARINVS CORONARIVS fruticosus. CAP. XIV.

Rosmarinus frutex jucundissimi odoris Thus
redolentis (unde & nomen ipsi ῥοσμάρινον dandi.
Tom. II.

tum) vel imprimis utilitatis commendatione notifi-
simus, & quia corollis petiis, Coronarij nomen
adeptus, bicubitalis est, & altior, v. g. latus & rubus, v. g. latus.



cinereo colore pa-
ditis, in quibus so-
lia aliquot simul,
ex intervallis o-
riuntur, rigidula,
Lacini dulci angu-
stioribus, brevior-
ibus, pronâ parte
candidis, supinâ
semper virentibus:
flores ex foliorum
alis, ex caruleo al-
bicantes, Salviae
florum effigie, mi-
nores, labello co-
tyla instar conca-
vo, guttato: fibræ
incurvæ, longæ, ex
ristu sub supremo
folio promicant.

Duplicem agno-
scimus Rosmari-
num vulgare, seu Coronarium Libanotis, cujus

modi etiam meminit Cordus & ex eo Ges. de hortis.
Vnam nobiliorem angustiore folio, quam Cordus
in Hist. Rosmarinum nunciorum seu tenuiorem ap-
pellat, quique apud nos in hortis colitur, quem qui-
dam putant veram Libanotidem Diosc. & veterum
Medicorum, sed apud nos degenerare verum in to-
talo aberrant: diversissima sunt plantæ. Alteram
ignobiliorem à Cordo silvestrem seu majorem vo-
catam, cui Plinium falsò seriem negare tradit, quam
que nasci in Narborensi Gallia scribit.

Munsterus. Cosm. lib. 2. de Narbona, Rosmarini
ineptam figuram proponit. Quin & Crescentius
pro Rosmarino aliquid Myrti simile pingit.

Mizald. ait rura & officinas Rosem majorem ap-
pellare quod aliis Libanotis dici solet. Sed Mizal-
dus non distinguens inter Libanotidem, quæ
Cachry fert herbam: & Libanotidem coronariam fru-
ticem, huic tribuit, quæ ei conveniunt, ut infra lice-
bit videre de viribus ex eo recitatis. Eundem pla-
næ errorem ac plures alios Car. Steph. in hort. com-
mittit, talia dicens: Rosmarinum, sive, ut quibusdam
placet Rosmarinus, adhuc hodie vulgus appellat du-
plex. Eum autem fruticem Plinius Libanotida
vocat l. 9. c. 12. &c. Sunt autem, ne quis fallatur, mul-
tæ Libanotidis species, quarum una tantum mihi
est cognita. Est enim Libanotis ferax, quæ duplex,
mas & femina: folia habet Rosmarino similia, sed
umbellam gerit, quemadmodum Anethum, in qua
est Cachry, cujusmodi in canina Rosa apparere so-
let, atque in ipso Cachry semen complexum est. Ca-
terum hæc duæ Libanotidis species mihi sunt igno-
tissimæ. Est & alia Libanotis, quæ sterilis appellatur,
eaque simplex est, ramos scissiles habens, ac folia no-
stros Rosmarino similia, sed neque florem, neque
femina gerit, passimque audio reperiri apud Mon-
spessulanum: item etiam in quibusdam Hispaniæ a-
gris, quos eâ herbâ spontè nascenti plenos ac refer-
tos audivi. Est in super alia Libanotis species nobis
cognitissima, atque hæc à Call. r. simpl. Coronaria Libanotis
vocalur. Quæ hæcenus scribit Steph. de Libanotis.

de coronariis, scilicet erroribus. In primis malè Ros-
marinum coronarium, eandem facit cum Libano-
tide Plinij. Quis dixit Stephano Libanotidem ferax
habere folia Rosmarini: Diosc. dixit Marathri.
Quid sibi vult cum Cachry in rosâ canina: Quare in-
est Monspessulana & Hispanica: Cur non dicit Ga-
leni eandem cum Rosmarino, primo loco ab eo tra-
C

- ditam? Cur non statim eam subjunxit? Verba quæ de viribus adducit radicis, nullo modo competunt nostro Rosmarino. Sed & Francis. Venetus in sua Harmon. mundi confundit cum Libanotide, si-
Fr. Venetus notat ve Rosmarino coronaria, umbelliferæ sive ferulaceæ.
- Zea. Dendrolibanus.* Trago Libanotis dicitur etiam Zea, ite Dendrolibanus & Campfanema, ab Italis Corona montana. In Serapione hæc leguntur nomina Xaieralmerien. Arbor Mariæ, Alpinalphach, Cachola. Avic. facit Buchornariem, quod negat Serapio. Orpheus vocat Solis Thymiaa teste Agrippa oculi. philosoph. Anguillare est Rosmarinus coronaria Cneorum nigrum Theophr. Casia Hygini & Virgilij. Sed errat Anguillara, ceu & alij recentiores quidam, existimantes Rosmarinum coronarium esse Cneorum Theophrasti.
- Ang. error.*
- Synon. C.B.* C.B. pin. Rosmarinus. sive hortensis angustiore folio. Rosmarinus, Brunfels. Trag. Fuch. Turn, & Lon. Rosmarinum coronarium, Matth. Ang. (cui & Cneorum Theophr. & Casia Latinorum) Dod. gall. Lac. Lob. Lugd. Cam. & Eyst. Libanotis coronaria, Cord. in Diosc. & Gefn. hor. cui & Rosmarinus minor sive tenuifolius. Casia nigra Theophrasti, Dal. in Plin. Hyssopus Hebræorum quibusdam. Floribus est communiter subcæuleis, rariis albis.
- Coronar. eur. ds. Fr.*
- Nomina linguar.* Διανός. Diosc. Λιβανotis στεφανομακίη recentioribus, Rosmarinus aut Libanotis coronaria, Arab. El-kaalgeber: Germ. Rosmarin: Belg. Rosemaryn: Gall. Rosmarin: It. Rosmarino, Rosmarino coronario: Hisp. Romaner: Ang. Rosemari: & Garden Rosmarinen: Boh. Rosmaryn.
- Locus cum tempore.* Qui seminatur, & latiora & rugosiora habet folia, non facile fert hyemem. Alter folio angustiori, vulgarior, furculis facile propagatur: Ex semine an hic proveniat ignoro. Rosmarinum sponte provenientem observavi in Gallia Narbonensi, ubi tantus ejus proventus, ut haud temerè aliud incolæ lignum urant, eoque Monspelij & locis vicinis pro ignis vomite utantur. Floret mense Martio, Aprilis, Autumno ac toto ferè anno. Vvatville in Alsatia me docuit Sacerdos, Rosmarino ut citius proveniat decerpens esse summos ramulos, idque sapius, ut lignum durius evadat ac frigori magis resistat: adhæc si in transplantatione, simus addatur, corrumpi. Seritur, inquit Plinius, quoniam illi semen non est [falsò illi negat semen] propagine & avulsione. Tradunt facie vini, aut è parietibus latere tuso, mirè ali. Rosmarinus certò tempore in novella Junipero insita, ut Cam. observavit, eò facilius hiemem non reconditus perfert.
- Cultura.*
- Vires ejus lèger.* Diosc. Rosmarino vim tribuit calefacientem: sanare morbum regium, si quis ipsam in aqua coctam ante exercitationem exhibeat bibendam: deinde exercitatum lavet, & vinum ipsi bibendum det: misseri etiam acopis & unguentis de glaucino. Vfus ejus si Plinio credimus, stomacho post annum saluberrimus. Datur contra serpentes ex vino, vel acet. Pulces etiam contrita, & cum aqua sparsa necat. Rosmarinus coronaria, ut Serapio testatur, calefacit, exsiccatque: & ex autoritate Abin Mesue, confert, aut idem, Coriæ frigida cerebri. Mizaldus varias ei adscribit vires, de quibus ager dum. Rosmarinus inquit, frutex est topiatus, nec non coronarius,
- cujus odor, resmatur aut Thus, utique præ se fert: tam luavi ac jueundo spiraculo, ut quos animus defecent, ilicò recreare possit. Sufficit distillationes ac cullum continet, regiumque morbum suo curat decocto. Et quod illi de multis nobile est ac insigne, solo nidore in pestilentia tutam reddit domum, diluendo & expurgando improbam ætis perniciem sufficit ac vapore salutari. Flores caput ac cerebrum maximè roborant; ex quo illorum usus admodum efficax esse solet contra capitis affectiones. Sunt qui Saccharo eos condiant, & sibi ac amicis eam in rem diligenter custodiant. Touts frutex utilis est, omnibus frigidis aggritudinibus, membra ac nervos egregiè roborans & calefaciens. Sed paulò particularitè hic nobis est medicè philosophandum in expertus & probatis Rosimarinii auxiliis. Itaque succus radicis & foliorum ejus defæcatus, & cum melle defpumato in modum collyrii concinnatus, plurimum valet ad defluxiones pituitæ in oculos. Quæ si calidè fuerint, licet addere ovi albumen, cum succo Porri generosi, & aqua rosacea confusum ac diu agitatam. Semen cum Pipere & vino haustum singulare adfert prædium contra icterum, hepatis obstructiones & inflammationes. Radix siccata, pulverata, & cum vino bibita, ventris dolores, etiam si colici fuerint, perbellè castigat & demulcet. Quis non exhiberet Mizaldum? Quis unquam observata Rosimarinii radice præscribit ex ea succum defæcatum, vel credet lignosam & insipidam radicem efficere posse perbelles, quæ ille pollicetur? si medicè philosophatus fuisset, & expertus, quod jactat, animadvertisset se confundere ineptè admodum Libanotim umbelliferam, Cachryn ferentem, quæ herba est, cum Libanotide coronaria, quæ frutex arboreus est. Credant lectores istis Medicis non Botanicis, fabulas scribentibus pro veris. Dodonæo calidum & siccatum Coronarium Rosimarinum secundo est ordine, & simul adstringentis facultatis particeps; utpote ex terrestri quadam essentia copiosius admixta, compositum. Proinde & omnes uteri diuturnos fluxus sistit & sanguinis profusiva supprimit. Convenit etiam, & præsertim flores, omnibus capitis ac cerebri ex frigida humiditate, causa malis; cerebrum etenim desiccant, sensus & memoriam acuiunt, nervos partes confortant. Matth. Rosmarinus non tantum ad corollas expectitur, sed & culinas & pharmacopæorum officinas: oblonis enim quibullibet & potibus gratiam conciliat, & ad multos morbos vim saluarem habet. Ejus decoctum superfluos humores cõsumit, veneno resistit, hepatis & lienis obstructiones aperit roboratque. Rosmarinus cerebri robur addit & sensibus omnibus, frigidis defluxionibus quibuscunque utilis, epilepsie, lethargi, paralyti, caro, contractionibus, tremori, stuporibus, alio fluore mulierum potu & infestis curat. Siccat pulvis cum tosto pane, aut ex vino Cretico assumptus ventriculo cibum non retinenti confert. Rosimarinii cum Ruta in vino decoctum addito Piperis momento bibitum, auxilio est epilepticis. Conserva florum Rosimarinii idem præstat. Quibus anima fœtet, aut visus imbecillior, pdest comedisse omni matutino tenella folia & flores cum pane & pauxillo sale. Sufficit naribus & ore hiant exceptus valet ad tussim & catarrhū. Collutio oris ex Rosemarino in aceto & vino acido decocto dentibus & gingivis salutaris. Ex aqua decoctus vulnera putrida & ulcera extergit insperso simul pulvere. In lixivio capituli utiliter maceratur. Stillati liquor efficax est ad epilepsiam manè bibitus: cõfert ventriculo & cordi: prodest capiti vertiginoso & anhelitu fœdido. Oleū ad prædicta efficacius. artus atrophici laborantes reficit. cervix & tēpora eo inuncta applexiam pœvat.



HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XIV.

(669)

QVI EST ROSARVM. ET HIS AFFINIVM SPINOSARVM NONNVLLARVM, VT RVBORVM, CAPPARVM.

NUNC amenam illam Rosam celebremus, florum reginam, sed quae undique rigidis spinarum telis armata sit: unde Rosa Plinio nascitur spinâ verius, quam frutice. Quamquam & nos absque spinis nascentes observaverimus, uti constabit in progressu. Sed quid vel spinarum minas metuemus, tam r. seo colore, tam pulchra floribus facit, tam suave spirante odore illeceit? Adeamus & florum vniuersissimam decerpentes contemplemur.

DE ROSA. CAP. I.

Duo summa
ma susti-
gia.

Descr. uni-
versalis.

Virga.

Folia.

Flores.

Alabastr.

Stamina.

Semen.

Rosa partes

Calix.

Cortex.



OTISSIMA Rosarum stirps tam hortensis, quam silvestris, tamen si frumcosa & spinosa sit, consentaneum tamen & decens magis est, eam seorsim hic tradere, quam aliis spinosis fruticibus jungere. Est igitur in genere frutex infirmus, Cael.

& citò senescens, nisi recidatur, ut cum suffruticibus ambigere videatur: ramis aut potius virgis ductis, lignosis, & ut plurimum, hispidis, mordacibus, quae aculeis horrentibus, non rectis, sed modicè recurvis, frequentibus; foliis subrotundis, asperis, per ambitum serratis, quinque & septem ex uno nervo, sive pediculo coherentibus, sibi invicem oppositis, supremo singulari: floribus (quibus Rosae nomen sui fruticis, quique proprie *ῥόδον* Graecis, ob odoris suavitatem dicti) primum herbaceo inclusis calyce, qui tumefcentes in virides alabastris fastigiantur, quibus dehiscuntibus flores panduntur, vel simplices, vel multiplices, in calycis sui medio stamina quaedam capillacea, luteis apicibus donata, complerunt: semine in oblongis capitulis, quae calycibus & floribus subsunt, Dod. per maturitatem rubentibus, duro, lanugine involuto: radicibus duris, lignosis, in diversa tendentibus.

Porro, Rosae partes Medici numerant octo, quas ob medicam materiam novisse proderit, viribus siquidem differunt. Pediculus igitur, qui florem sustinet, terminatur in caput solidum, lanugine quadam repletum, foliis & floribus substratum, seu basis totam rosam sustinens, calyx [quo nomine tamen globuluni totius folii nondum apertum cognominant] vocatus. Hunc ambit cortex apertè rosà in quinque pinnulas seu lacinias divisus. Tertia pars est, floris medium illud croceum, quod capillamentis infidet,

à recentioribus & Officinis Anthera vocata, deductum ab eo, quod est *ἀνθή*, id est, flos rosae. Quarta, ipsum capillamentum subtile, veluti filum floris, seu crocei illius fulcrum & sustentaculum. Quinta solum, cuius ima pars candida, unguis appellatus, sextam constituit. His addunt septimam, quae est lana in capite contenta. Semen, quod est octava pars Rosae, ne putes inquit Palladius, medios flosculos esse, aurei coloris, sed baccas Pyri brevissimi similitudine, seminibus plenas, post vinediam maturas, quarum quidem maturitas tum ex colore rufio, tum ex mollitie estimatur. Et haec ferè sunt, quae omnibus Rosis sunt communia: de his pluribus agetur infra.

Theophrastus Rosam modò inter frutices, modò inter suffrutices numerat, ejusque differentias his verbis assignat. Rosarum differentiae multae, foliorum multitudine, paucitate, asperitate, laevitate, colore, odore. Quippe plurimis quina [in flore] folia sunt, quibusdam duodena, vicièque, aliis longè plura: sunt enim quas Centifolias vocant, quae circa Philippis plurimè proveniunt, quas incolae ex Pangeo transferentes ferunt: illic enim multae ejusmodi sunt. Sed folia interna [in harum flore] parva admodum sunt, ita enim oriuntur, ut alia intus, alia extra emicent, non tamen jucundi odoris, nec amplae magnitudinis sunt. Odoratiores inter amplas, quibus pars ima scabra. Ad summam (ut dictum est) & odoris & coloris praestantia, loci ratione continet: & quae eadem in diversa tellure proveniunt, à se differunt, quod jucundum vel nullum spirent odorem. Ex hunc locum Gaza sic est malè interpretatus: nam Gaza & quae in eadem tellure proveniunt, diversitatem bonae exilisve odentia, nullam offendunt. Odoratissima quae apud Cyrenam gignuntur. Sylvestris asperioribus Cyrenica, tum virgis, tum foliis constat, & florem minus odoratum, minusque coloratum, nec tam magnam fert.

Genera Plin. Paulò curiosius de his Plinius prodidit. Genera ejus nostri fecere celeberrima, Parnesinam & Campanam: addidit alij Miletiam, cujus sit ardentissimus color, non excedentis [excedens] duodena folia. Proximam & Trachiniam minis rubentem: mox Alabandicam, vilioiorem, albicantibus foliis. Vtilissimam [alij vilissimam] verò plurimis, sed minutissimis Spinicolam. Differunt enim multitudine foliorum, asperitate, sapore, colore, odore. Paucissima quina folia ac deinde numerosiora, cum sit genus ejus quam Centifoliam vocant, quæ est in Campania Italia, Græciæ verò circa Philippos, sed ibi non sua terra provenit. Pangæus mons in vicinio fert, numerosis foliis ac parvis, unde accolæ transferentes conferunt, ipsaque plantatione proferunt. Non autem talis odoratissima est, nec cui latissimum maximumque folium. Breviterque indicium est odoris, scabritia corticis. Cepio Tiberij Cæsaris principatu, negavit Centifoliam in coronas addi, præterquam extremos velut ad cardines utpote nec odore, nec specie probabilem. Est & quæ Græca appellatur à nostris, à Græcis Lychnis, non nisi in humidis locis proveniens, nec unquam excedens quinque folia, Violæ magnitudine, odore nullo. Est & alia Græcula appellata, convolutis foliorum panniculis, nec dehiscentis nisi manu coacta, semperque nascenti similis, latissimis foliis. Alia funditur è caule malva-
Indicium odori. ceo, folia Oleæ habente, Molceutem vocant. Atque inter has media magnitudine Autumnalis, quam Coroneolam vocant. Omnes sine odore præter Coroneolam, & in Rubo natam: tot modis adulterantur. Hactenus Plinius, qui & Pallidæ & Quinquæfoliæ meminit, de quibus infra, ubi de loco & tempore sermo habetur, agetur.
Rosa coloris. In Rosis communiter color quadruplex invenitur: est enim alius rubens, candidus alius, alius candor inest rubore aspersus, qui color propriè roseus & carneus dicitur, & hoc genus vulgò incarnatum vocant: alius pallidus.
Fabula de Rosa colore. Rosam verò non nisi candidam per initia fuisse, Rosa colore comminiscuntur, & Turce & Poëtæ. Illi non ut Poëtæ Rosam ex sanguine Deæ alicuius tinctam esse credunt, sed (id referente Generoso D. Augerio Bufbekio) ex sudore Mahumetis rubedinem illam ortam esse sibi persuadent: ac propterea hujus folia humi jacerent non patiuntur. Græci contra sanguine Cupidinis, ut Ausonius, admirandam illam colorum pulchritudinem odorisque suavitatem à Venere contributam fingunt. Alij vulnerato Venenis pede eam adrubuisse fabulantur hoc modo. Deam Venerem Adonidis amore captam Mars Zelotypus deperire laborans, Adonidis morte in vitam consuetudinem solum in sperat, Adoniam interficit. Venerus resciscens gestum facinus, omni studio diligentiaque properè subsidium ferre volens, in Rosa frutices irruit, pedem nullo munitum Sandalio ejus spinis transigit: unde Rosa pristinum candorem, in profusi cruoris memoriam, in ruborem convertit. Quare Claudianus:
— Sic fata cruoris Carpit signa sui.
Alij aliter: Ferunt enim Cupidinem cum in Deorum convivio lascivis saltationibus indulgeret patenam nectaris plenam, alæ concursu subvertisse, nectar inde fufum Rosem Rosæ rubicundum reddidisse. Philostratus Rosa fruticem Cupidini dicat, quem tota facie videtur æmulari. Semper illa recens juvenisque, nec non mollis ut Cupido. Aureis comatur capillis, spinas pro jaculis gestans, pro facibus fulgorem. Folia pro alis Rosæ data sunt: neque Cupido, neque Rosa tempus norunt. Idem lumine terræ, veris comas, amoris igniculos, terræ fulgur appellat. Quod vero Philostratus Rosis hæc assignat attributa, nemini mirum videbitur, si Ana-

creontem Tejum Poëtam græcum vetustissimum quem Henricus Stephanus perquam elegantè carmine latino reddidit, canentem audivit:

Rosa bonas decusque florum,

Rosa curæ amorque Verus,

Rosa cælitus est voluptas,

Rosæ puer Cytheres

Caput implicat coronis,

Charum choros frequentans.

Apud Achillem Tatium l. 2. de Leucippe & Clitophonthe, invenitur sequens encomium Rosæ. Si floribus vellet Iupiter imponere Regem, Rosa inter flores regnum obtineret. Terra est ornamentum, plantarum decus, oculis florum, prati rubor, pulchritudo coruscans. Amorem spirat, Veneris est conciliatrix, formosis foliis comata est, nobilibus frondibus luxuriat: Calix Zephitho ridet.

Rosa etiam Veneri sacra est. Virgilius in Rosa: *Veneri dicata.*

Sideris & floris est divina una Venus.

Hac autem ratione Veneri Rosam dicantur antiqui, ut quemadmodum brevi hac tempore duret, & porè durat. *Brevi tempore durat.* ocyssimè marcescat, sic forma & voluptas venera cedere pereant. Quod Hieronymus Angerimus apud Curtium festivo hoc disticho notavit:

Pulchra brevi duras Rosa tempore, forma brevique

Tempore sic forma par Rosa tempus habes.

Rosam porò brevi temporis spatio durare, insinuat elegantissimus hic Theocriti versus:

Καὶ τὸ ῥόδον καὶ ῥόδον, & ἡ ῥοῦ ἀνὰ νύκτα.

Et Rosa formosa est, sed tempore marcescit & arecet.

In quam sententiam elegantè distichon extat Ioan. Majoris Poëtæ celebris.

Ve Rosa manè viget, tamen & mox vespere languet,

Sic modò quis fuimus, etas levis umbræ sumus.

Et alterum ejusdem:

Vidi ego manè Rosam solū cum lumine nasci,

Et vidi rursum Sole cadente mori.

Huc facit & illud:

Ῥόδον ἡγεῖται, ὡς καὶ ἡ ῥοῦ ἀνὰ νύκτα.

Ne te maceres desiderio rerum, quæ revocari restitueque non queunt, velut exatæ juventæ, formæ, viriū, fortunæ. Nam ut nihil est Rosa gravior, ita nihil minus diuturnum. In eundem sensum dixit in Odis Horatius,

Mitte scèdari Rosam, quo locorum Seramoretur.

Habent enim Rosæ suum tempus, sed perbreve. at exquisitius delicatæ etiam alieno tempore Rosam querunt. Vnde quadrabit & in eos qui jam ægri voluptates scèdantur: veluti si Nucibus ludat vir, aut amet, potitè tene fenex. Rubet præterea, pungitque. Nam & libido ipsa verecundia opprobrio erubescit, pererratique aculeo stimulat. Græcorum tamen nonnulli Palladi Rosam attribunt, propter scripta.

Myrsinæ Atheniensis puellam. Huc etiam refertur distichon hoc Virgilij:

Collige virgo Rosas, dum floris novus, & nova pubes:

Et memor esto avum sic properare tuum.

Ovidij illud de arte amandi:

Forma bonum fragile est, quantumque accedit ad annos,

Fit minor & spacio carpitur ipsa suo.

Nec semper Viola, nec semper Lilia florent:

Et riget amissa spina relicta Rosa.

Olympij Nemeasiani in Bucolico ludico:

Non hac semper eris, perdunt & gramina flores:

Perdit spina Rosas, nec semper Lilia cadent.

Nec Longum tenet Vra comas, nec Populus umbras.

Donum forma breve est, nec se tibi committat annis.

Priscis, sicut & recentioribus, Rosam in honore maximo fuisse, satis superque comperit est, eorum etiam monumentis. Quod vel imprimis hoc adagium

dagio Græco comprobatur: ῥόδον ὡς καὶ ἡ ῥοῦ ἀνὰ νύκτα.

id est,

Cupidini sanguis.

Veneris sanguis.

Capitulum sanguis.

Ne tar Deor.

Cupidini sacra.

Encenia Rosa.

Ne tar Deor.

Cupidini sacra.

Encenia Rosa.

Ne tar Deor.

Cupidini sacra.

Encenia Rosa.

Ne tar Deor.

Cupidini sacra.

Encenia Rosa.

Ne tar Deor.

Cupidini sacra.

Encenia Rosa.

Ne tar Deor.

Cupidini sacra.

Encenia Rosa.

Ne tar Deor.

Cupidini sacra.

Encenia Rosa.

Ne tar Deor.

Cupidini sacra.

Encenia Rosa.

Ne tar Deor.

Cupidini sacra.

Encenia Rosa.

Ne tar Deor.

Cupidini sacra.

Encenia Rosa.

Ne tar Deor.

Cupidini sacra.

Encenia Rosa.

Ne tar Deor.

Cupidini sacra.

Encenia Rosa.

Ne tar Deor.

Cupidini sacra.

Encenia Rosa.

Rosam cum Anemone confert. Vbi quis imparia inter se componit. Est autem Anemone, Pappaveris genus, cuius flos, specie Rosam imitatur, exterius nulla odoris gratia. Est & aliud, *Rosae logus*, id est, verba gratissima, & Rosarum instar amabilia. Et Persius ait:

3. Quicquid calcaveris hic, Rosas fat.

Quod adhuc vulgus in homines gloriosos profert.

4. Adde & hoc quod Cræti philosopho adscribitur, *Sus per Rosas* [id est, p. 58.] Est autem Rosæ odor huic animali naturæ contrarius. Consule hac de re Camerarii cent. 2. p. 58.

Inter Philologica, quæ de Rosâ sese offerunt, imprimis placet illud quod apud Claudianum legitur: *Armat spina Rosas*: id est, nihil absque labore iucundum. Lege Camerarii cent. 1. p. 58. Rosæ itaque indicant allegoricè animum heroica virtute præditum, consilia & facta singularia, non à quovis præstita.

Sed relictis Poëtis, missis Græcorum fabulis, recitatis Adagiis, investigemus quænam sint illa Plinii Rosarum genera, & utrum eorum quædam ad nos usque pervenerint. Cæsalp. sua veteribus accom-

modare studet, sic: Quæ roseo colore est, nascitur in frutice valdè hispida, quaterna cubita excedente, primò floret inter cæteras: Campanam videtur appellare Plinius, quæ præcox est, & Trachiniam minus rubentem. Apud nos *in Italia* præter Car-

neam Rosam, quædam rubens est multifolia, odore jucundo, sed exili: hanc Plinius Mulsiam vocat, colore ardentissimo, non excedentem duodecim folia.

Alia apud nos huic similis inter peregrinas videtur, colore magis diluto, accedente ad carnem, latissimis foliis, pluribusque in se convolutis, ut explicari nequeat, odoratior rubente: Eius frutex parvus est, & solus spinis caret: hanc Græculam videtur Plinius appellasse. Quarta candida, maxime omnium numero-

fo folio constat, sed parva, odore valdè exili. Plinius hanc Alabandicam vocat, viliorem albanicantibus foliis: & Spermoniam plurimis foliis, sed minutissimis, utilissimam, non multò odoratam. Quæ ex translatione in Campania, & circa Philippos adeo profecit, ut latissima, & maxima folia proven-

iant, non tamen odoratissima quam Centifoliam vocant, Muscatula apud nos appellatur, ob odoris excellentiam, sed quæ opere Topiario colitur: caudice cæteris crassiore: ramis longissimis: aculeis rariore. Rosa parva ex quibus foliis constans candidis, multis intus floccis, pulvisculum luteum fundentibus, amarior hæc & maiorem vim purgandi habet: tardissime floret, & perdurat usque in autumnum: In hoc genere quædam reperitur multifolia, fortè Prænestina apud Plinium, quæ celebra-

tissima, novissime desinit. Sylvestris in sepius spontè nascitur, virgis prælongis, Rubo similibus; in quibus sæpè spongiolæ villosæ visuntur: fert parvam Rosam, non excedentem quinque folia, colore albo, aut subrubente, exili odore: aliores virgæ, & spinosiores sunt, quibus subrubentes Rosæ, humiliores quibus albæ: Dioscorides eandem Cynosbaton appellat, quasi Rubum caninum: Theophrastus inter Rubos tertium genus describit: Theodorus aliquando Caninam sentem vertit: Plinius modo Cynonodon, modo Cynosbaton vocat, videturque diversas intelligere: nam Cynorodon, radicem sylvestris Rosæ facit; Cynosbaton verò Rubi genus, Rosæ similitudine. Quin & Capparis quoque Cynosbaton vocari traditur ab eodem. Sunt & Rosæ luteæ quinquæ foliis constantes, ut sylvestres, latiores tamen: odore ingrato: frutex, & folia similia sylvestri. Plinius alteram Græculam vocat, Pallidam, spinosam, longissimis virgis quinque foliam. Addit autem Plinius alia genera, ut Græcam, quæ Lychnis vocatur à Græcis & Moscuton, sed ex

Tom. II.

æquivocè potius Rosæ appellata sunt; alio loco explicanda.

Athenæus Rosarum differentias ex Theophr. ponit, nec plures. Ex recentioribus Hermolaus præterea, quæ ex Plinio transcrita ipso innominato, de suo nihil adiecit, quam quod apud Plinium maxillæ legi Spermoniam, quam Spinolam aut Spinofamita enim, si quod minutissimo folio, si quod vilissimam sit oranium, rectissime ipsi videtur appellata, ait tamen esse quosdam qui Syconiam legendum putent. Nec probat quod nonnulli Musketon legant, quandoquidem Aceton & Moscuton melius redatur à propagine, viviradicæ, quam Græci Moscheuma dicant. Cæterum, ambigit Coronæola sitne Cynofati, an Cynorhodios: quanquam Cynofati magis putet. Cynorhoda porro silvestris esse Rosas dicit, licet Aristoteles eam videatur appellasse Cynacanthem, hoc est, Canina n senticem.

Curtius particulatim ex sua observatione Pæstæ celebrat, à Pæsto Calabriæ oppido, passim in autoribus commendabilem, quotannis his germinantem. An autem ea sit, quæ nunc Damascena dicitur, ignorat. Parva enim hæc, inquit, candidi & rubei coloris, egregii odoris. Plures autem ab uno geniculo exeunt. Ultima autem hæc germinat est, verum continuè & hieme etiam tepidioribus locis floret. Est & Provincialis in Gallia ab oppido sic cognominata, colore inter album & rubrum medio, quem incarnatum vulgus vocat. Ethuria has Anconitanas vocat. Odoratissimæ non sunt quibus folium maximum & latissimum. Odoratiores, quo rubicundiores. Inducunt autem odoris corticis scabritia. Quærit in probl. Arist. Cur suavis Rosæ oleant, quibus asper, quam lævis umbilicus sit: Quod magis secundum suam naturam constituta sint. Naturæ enim suæ, Rosa spinosa est.

Differentiæ Rosarum quas Ruellius in longum recenset, alia non sunt, quam Theophrasti & Plinii, quamvis pro suis venditet.

Tragus Rosæ hortensis hanc ponit differentiam, ut alia candida sit, alia ex purpura albicans, quædam rubra. Et rursus in hoc genere ura simplici: altera multiplici foliorum ordine. Rosæ verò sylvestris quatuor fastigia constituit. Cujus primum genus, ejus quidem judicio, Cynorhodon Barbari fuerit, nobis Rosâ silv. folio glabro: secundum, Spina Maritima nominatum, est nobis Rosâ Eglentina, siue foliis odoratis: tertium, Rosam cinnamominam flore subrubente conjectamur; ceu ultimum, cum priori Rosâ campestri dicta, Rosam sylvest. folio glabro, flore planè albo. Et ita Tragus distinguit, satis ostentanter.

Matthioli de Rosis Italicis, pauca hæc habet. Multa quidem sunt Rosarum genera, quæ in usum medicum veniunt. At vulgissimæ in Italia sunt, albicantes, puniceæ, & quæ ex albo rufescunt, quas vulgò appellant incarnatas. Quædam etiam aureo colore fulgent, odore admodum ingrato acinsuavi.

Rosæ hortensis albæ (inquit Gesn.) multiplici folio, passim apud Tigureses in hortis abundat, frutice proceriore, quam rubrarum, quæ tum simplici, tum multiplici folio constat. Vidi & Rosam dimidiâ parte candidissimam, alterâ purpuream. Rosæ Alexandrinæ, vel Persicæ, vel Damascenæ, vulgò incarnatæ dictæ nunc nobis satis frequentes. Damascenas autem vocant, quoniam ex Damasco Syria urbe advectæ creduntur. Rosæ citrinæ, seu luteæ. Rosæ moschum fragrantés luteæ. Rosa inodora, vulpina cognominata. Rosa muscata alia à præcedenti simplex & multiplex. Rosæ muscatæ vel Damascenæ parvæ, simplices, albæ, flores in Italia toto ferè anno. Aliæ nobiles, densi folio, flore parvo, purpurei coloris diluti. Adhæc purpureæ.

Albo-citrina.
na.

Rosæ alix albx ad citrinum tendentes, parvæ, tria, quatuorve folia habentes (quales hæ Rosæ sunt, nos late) per totum annum in arbore ferè videndæ, Muscata ab odore, vel Alexandrinæ vulgò appellatæ, ab aliquibus Damascenæ. Hæ verò odore caput tentant: & potentissimè alvum subducunt, non minus auctore Manardo, ac Scammonium: ita ut si sex, vel octo folia acetario miscueris, totum purgatorium teddas, quæ de causa ab illis tanquam pernicioso medicamento, naturæ vim inferenti, abstinendum censeo. In Hispania rarè videntur & ab aliquibus cum incarnatis confunduntur. Audio easdem Marinæ nas à non nullis vocari.

Incarnata.
Marina.

Sylvestris.

Cynorhodon.

Campestris.

Tragi.

Clusii diff.

Centifolia.

Batavica.

Major Pro.

Vinialis.

Prænestina.

alba.

Versicolor.

Flava plena.

na.

Centifolia.

alba.

Rosa 2. sine

spinis.

Humilis.

Campestris.

Foliorum 60.

Tab diff.

A. hesia.

P. hesia.

Sine spinis.

Muscata.

A. yppia.

Egenteria.

Sylvestris.

Lacuna diff.

Domestica

triplex.

Hermol. ex

Plin. notat.

Lch diff.

Rubra.

Candida.

Monachi Rosam Damascenam *Moschette* vulgò dictam, è silvestrium genere esse putant, sicut & incarnatam, vel trentaphyllam, à foliis triginta, & albam Centifoliam dictam. Rosæ sylv. Cynobati, vel Cynorhodi veteribus dictæ, passim sepes vivas replent. Rosæ sylv. alia humilior in collibus siccis & apricis toto frutice suavisimè odorato. Rosæ sylv. à Maio mense denominata *Weyenrösle*, spontanea in Albio monte, fuerit Rosæ campestris Tragi, rosà colore magis rubro tincta. Hujus altera species, rosà prorsus candida.

Insignis Botanicus Clusius prodidit nobis Rosas Batavicas, Autinnacque, ita scribens: an, quæ apud Batavos Centifoliæ nomine dicitur Rosæ, nonnuncquam etiam centenis vicinis foliis, ea sit, cujus Theophr. & Plin. mentionem faciunt, hæreo. Illius scilicet altera, albo flore, mediæ inter illam & proximè sequentem magnitudinis, alba major Provincialis appellata, ut superior major Prænestina. Sed & rarius Centifoliæ genus, priore aliquanto minus, colore alioqui, odore & formâ conveniens. Non defunt, qui Prænestinam albi coloris inveniri asserant, quæ nihî nondum videre contigit, nisi ea sit, quam V Vilh. Osterra. Francofurt. unicam in horto suo alit, flore multò dilutior Prænestinâ, & fetè albicante. Illi congener esse videtur Rosæ versicolor, Joannis Rosteau Colonienfis. Accipio etiam Rosas flavas multiplici foliorum serie præditas existare.

Cæterum, ad eas, quæ præter vulgares à me observatæ sunt, redeam. Illarum autem varietates sunt species. Prior Prænestinæ, Provincialis vocatæ, valdè similis, flore saturatius nonnihil rubente, & eadem albo, Centifolia alba vocata Batavis. Rosæ 2. sine spinis, ejusque varietas flore albo. Rosæ sine spinis altera. Rosæ cinnamomea pleno fore. Rosæ humilis flore albo, Græcula Plinij fortè. Rosæ campestris odora. Rosæ pumila five Chamærhodon. Herodotus in Vrania, five lib. 8. Rosas in Mida Gordio geniti hortis sua spontè nasci refert sexagenum foliorum, fragrantiore odore, quàm cæteras.

Tabern. has agnoscit differentias. 1. Rosam albam. 2. Rosam rubram, quam vocari ait Milefiam, purpuream & puniceam. 3. Rosam provincialem majorem, Persicam, incarnatam & purpuream dictam, ut 4. Provincialem minorem. 5. Rosam sine spinis. 6. Rosam muscatam albam. 7. Muscatam albam multiplicem. 8. Rosam luteam Ægyptiam & Vulpinam dictam. 9. Rosam Egenterianam, Dumenfem & Pampinulam cognominatam. 10. Rosam silvestrem. 11. Rosam arvinam.

Lacuna Rosam domesticam triplicem facit, albam, rubram, & incarnatam, additque quartam vulgariter Mosquetam, vel Damascenam dictam. Rosam silvestrem ait Cynorhodon Græcis vocari, Plinijumque ac Hermolaum eam cum Cynobato confundere, quàm verè judicent alij.

Leban Adv. Rosas Angliæ, Belgij, & Northmanniæ tradit: Triplex est vulgarioris è colore differentia: nam aut purpurea sanguinea saturatè punicea: vel aspectu nivo micant: aut candore & rubore

confusis, flammeo rutilant, virgineis genis concalores, quas plebecula pallidas vocat. Silvestris nativæ varietates notatu dignæ: Cinnamomeæ præteritum florum foliis minimis. Moschatæ silvestrem exuerunt animum & hortenses duplè factæ. Pares & illis luteæ Galliæ inquilinæ factæ. Est & jamdiu caruleas videre. Est species vulgò *Eglenrine*, ou *Ef. glénier* dicta foliis odoratis. Est alia pomifera, morifera, aut baccifera *Quen* Rosen dicta.

In tradendis Rosarum differentis diligentior paululum Lobelio Dodonæus est. In sativatum Dodon. diff. Rosarum numero prima, inquit is, Rosæ alba, Plinij Spineola esse potest, si modo Campana non sit. Altera, quam Incarnatam Italia nuncupant, Alabandica similis est. Tertia, Provincialis Gallis dicitur: hæc Milefiam esse, non temerè suspicari licet. Quartam Rosas Franchas Galliæ, Plinius Trachiniam fortè, aut Prænestinam dixerit. Quinta Moschata ab odore dicitur: Damascenam autem & hanc nonnulli appellant. Sexta Rosæ sylv. propriissimè, hirsutis sylv. pilulis, spongiosis dictis. Septima Cinnamomina appellatur. Octava à colore nomen accepit, Lutea dicta. Nonam, Dumenfem nominant, ab ipsi in marino litore arenosis tumulis, quos vulgò *Quynen* nominant: Sunt qui Pampinulam nuncupant.

Decima Cynorhodon, five canina Rosæ odorata, Gallis Engletterium, teste Ruellio, nominata, quæ & hanc Cynobatos, five Canirubum esse suspicatur. Lugd. vult Campanas Plinij, esse Rosas nostras albas: Damascenas foliis densissimis, Alabandicas, Spineolas & Centifolias: Rosas verò Prænestinas, rubras, & in iis Milefias, quas Galli *Roses de provins* appellant. Trachinias minis rubentes, quas *Roses incarnates*. Græca rubra etiam est, ut ille equidem sentit, quamvis Plinius colorem non expellerit, eaque multorum n sententiâ, quæ Damascena rubra nominatur, *Rosè de Damas rouge*. Græcula etiam multorum judicio, Rosæ Damascenæ genus est, flore ex albo ad puniceum nonnihil vergente, *Rosè de incarnate*.

Damas incarnate: Moscheutos Rosæ Plinio quæ sit ambigitur. Sunt qui inter Damascenas numerent, alij inter Rosas sylvestres passim nascentes in dumis. Damascenarum cortex malleaci corticis modo lævis quidè vires, quàm cæterarum, sed quæ foliis sit Oleæ nullam adhuc comperit Dalechampius, quanquam in quibusdam exemplaribus folia lævia legantur, non Oleæ. Cæterum, Moscheuton Rosam dictam putat, non quòd Moschum oleat (ut vult Dodon.) antiquis incognitum, sed quòd *uobis*, id est, stolonibus multis fruticet, vel quòd *uobis*, id est, malleolis felicitè pangatur Vitis modo, non solum vivi radice. Coronæolam à coronis nominatam, si ve seram, five Autumnalem, Damascenam esse ferè omnes autumant, tum quod Autumno proveniat, tum quod odore suavi prædita sit, Galli *Rosè Musquee* & *Muscadelle* vocant. Ea duplex est, Quinque folia le una, & altera densa. His addenda Lutea veteribus indita. Cynorhodon universè quidem Rosam omnem silvestrem Plinius appellat. Hujus autem generata duo observantur Herbarij filij, Rosam vulgarem, & Cynorhodon Polyacanthon, forma Rosæ sativæ.

Camer. in horto memorat primò albam simplicem & plenam, quam Campanam præcocem Plinij dicit. 2. Laetæolam, Centifoliam eandem putat. 3. Rubricundam non omnino debilem, ut Plinij Rubicundam. 4. Incarnatam, Norimbergæ Vlmens sem à loco vocatam, veterum Prænestinam existimat. 5. Intensè rubentem simplicem, vel plenam à pharmacopœis Finam appellatam, Plinij Milefiam facit. 6. Rosæ purpureæ, à priore parum discrepans, videtur ipsi Trachinia Plinij. 7. Damascenam five Muschatam nominat, eamque simplicem facit & plenam,

Pallida.

Cinnamomea

Moschata.

Lutea.

Carulea.

Eglenrine.

Pomifera.

Incarnata.

Provincia.

Is.

Rosæ Francha.

Moschata.

Cinnam.

Lutea.

Dumenf.

Cynorhodon odorata.

Lugd. diff.

Rosæ alba.

Damascen.

Rosæ de provins.

Rosæ incarnates.

Rosè de Damas rouge.

Rosè de incarnate.

Moscheuton unde.

Do. m. no. tatur.

Coronæola.

Damascen.

Rosè musquee.

Muscadelle.

Lutea.

Cynorhodon vulg.

Polyacanthon.

Cam. diff.

Intensè rubent.

Finæ.

Purpurea.

Damascen.

Moscheuton.

plena.

lanugine quadam opertum cortice continetur: in Officinis tamen, ut dicit Dodonæus, & ab Arabibus Medicis, Anthera nominatur. Manardus contra flores, Anthere nomine recentiores significasse contendit. Quod & nomen ipsum manifestat, cum ab eo, quod est *ἀνθή*, id est, flos Rosæ deductum videatur, voce tamen (ut fieri vulgò solet) paulisper decurtatâ. Est & Anthera compositionum nomen, quarum Plinius 24. Cels. 6. Diosc. 1. Gal. 5. de compos. med. secundum genera, Paulus & plerique in suis libris meminere. Ceterum, Dodon. & Manardus non distinguunt *ἀνθή* à *capillamentis*, id quod facit Tragus: qui Anthos vocat puncta lutea in Rosis. Capillamenta autem vocat fila illa quibus insident puncta. Nunc *Κεφάλαιον* id est, *κεφάλαιον ἑστὸν*, Diosc. dicta, id est, Capita Rosarum Plinio, in quibus semen gignitur, dicit Manardus esse solidum illud, quod foliis & floribus, seu basis subternitur: cujus superior pars, ex qua flos & folia prodeunt propriè caput, reliquum calyx nominetur. Tragus calicem ait esse superiorem partem Rosæ nondum expansæ. Dodonæo Calix vocatur, qui stamina & floris foliola complectitur & continet. Alabastri etiam sunt calycis partes laciniosæ, conum floris priusquam panditur, completentes: quæ quinque sunt, duæ barbutulæ, duæ imberbes, & quinta partim barbata; partim minime, quæ cortices Rosarum à plerisque appellantur. Per nodum Rosarum non intelligit author apud Monachos (sicut Mesues) pomellum, sive pyrum in quo femina Rosarum concreviscit & servantur ad maturitatem, quodque de fluxu foliis restat in planta & tempore maturationis fit rubrum: sed Calycem, folia florum Rosarum continentem, qui vulgariter Bolto dicitur. Fructum autem, ut inquit Tragus, Rosæ maturum & rubrum, Germani *Büttel*, *Büuten*, *Äßßugeln* nominant. Semina denique sunt lapilli illi duri, qui in capite Rosæ includuntur, ex quo novæ plantulæ proveniunt, sed tardè. Qui itaque Rosarum semen Antheram vocant, decipiuntur. Lanæ tandem sunt capilli, in quibus lapidea semina continentur.

Nascitur, autore Theophr. Rosa etiam ex semine, quod sub flore in malo inclusum habet, lanugine Cnici modo, aut Echini Carduorum obdutum, omnia semina proximè ambiente: *καὶ τὰ ῥοσὰ ὑπὸ τῷ ἑστῷ ἵπῳ ἔχουσιν ἡ δὲ ῥοσὴν ἔχουσαν ἵπῳ ἔχουσιν*. Sic enim emendari debet falsa hæc Gazar lectio, *ἡ δὲ ῥοσὴν ἔχουσαν ἵπῳ ἔχουσιν*, in *ἡ δὲ ῥοσὴν ἔχουσαν ἵπῳ ἔχουσιν*: quod flori subditum suo in malo contentum cneceum, vel acanaceum, lanugine quadam obdutum gerit, ut primis seminibus proximum sit. Ceterum, quoniam tardè perficitur semine lata, caule conciso vel toto purgato feritur: ultra rescisæ florem melius profert: relicta namque excrefcit, silvescitque: sæpius transferre eam satius est: sic enim pulchriorem effundi Rosam affirmant. Tempus hoc generationis notatur. Rosa ferior hinc [*Hyacintho, Gladiolo, Viola nigra, &c.*] est, & novissima quidem crumpit: prima autem inter vernos definit flores, parum enim temporis durat ejus proventus. Vita Rosæ quinquenniū ad vigorem scilicet, non adultæ, nec rescisæ. Sed ejus quoque flores senescentis deteriores redduntur. Ad jucundam autem olentiam, Solum, cælumque accommodatum plurimum confert: montibus autem Rosæ longè deteriores emergunt.

Nascitur, inquit Plinius, Rosa spina veriùs, quam frutice. Germinat omnis primò inclusa granoso cortice. Quo mox intumescente, & in virides alabastro [*papillatos corymbis Hier.*] fastigiato, paulatim rubescens dehiscit, ac sese pandit, in calicis medio sui stantis complexa luteos apices. Et aliàs verò quoque plunum solo prævalet. Cyrenis odoratissima

est, idèoque ibi unguentum pulcherrimum. Carthagine Hispaniæ hyeme tota præcox. Refert & cæli temperies. Quibuldam enim annis minis odorata provenit. Præterea locis omnis siccis, quàm humidis odoratur. Seri nec pinguibus vult, nec argillosis locis, nec riguis, contenta raris: proprièque ruderatam agrum amat. Præcox Campana, sèra Mælia. Novissimè tamen definit Prænestina. Fodiuntur altiùs, quàm fruges, leviùs, quàm Vites. Tardissimè proveniunt semine, quod in ipso cortice est sub ipso flore opertum lanugine, ob id potiùs caule conciso inferuntur. Et oculis radices, ut Harundo, unum genus inferitur pallidæ spinosæ, longissimæ virgis Quinquæfoliæ, quæ & Græcis altera est. Omnis autem tem rescione atque ustione proficit: translatione quoque ut Viis optimè ocyllimèque provenit, sarculis quaternum digitorum longitudine, aut ampliore, post Vergiliarum occasum lata: dein per Favonium translata pedibus intervallis, crebriùsque circumfossa. Qui præcozem faciunt pedali circa radicem scrobe aquam calidam infundunt, germinare incipiunt calyce. Rosæ & quinquennium profert, nec rescia, nec adultæ. Illo enim modo juvenescit. Diximus & terram referre plurimum. Nam & in Ægypto sine odore hæc omnia: tantùmque Myrtis odor præcipuus. Alicubi etiam binis mensibus antecedit germinatio omnium. Rosaria à Favonio fossa oportet esse, iterumque solstitio. Et id agendum, ut intra id tempus purgata ac pura sint. Rosa recens à longinquo olet, sicca propius. Omnis autem verno tempore actior, & matutinis: quicquid ad meridianas horas diei vergit, hebetatur. Novella quoque vetustis minis odorata. Acerimus tamen odor omnium ætate media. Rosæ & Crocum odoratoria, cum serenis diebus leguntur: & omnia in calidis, quàm in frigidis.

Februario mense Rosaria conferenda, inquit Palladius, sulco brevissimo, aut scrobibus ponenda sunt vel virgulis, vel etiam semine. Si qua etiam sunt antiqua rosaria, hoc tempore circumfodiuntur sarculis, vel dolabris, & ariditas universa reciditur. Nunc & quæ rara sunt, possunt ducta virgarum propagine reparari. Si Rosam temperiùs habere volueris, duobus palmis ab eam gyrum fodies, & aqua calidà bis rigabis in die. Rosas nondam patèfactas Maio mense fervabis, si incanna viridi stante illa, recudas ita, ut stillicium coire patiaris, & eo tempore cannas recidas, quo Rosas virides habere volueris. Aliqui olla rudi conditas, ac benè munitas sub dio obruunt, ac reserant. Odoratiore fieri Ro. si odoras Didymus affirmat, quibus Allia propè fuerint constita. Si velis sine temporis intercapidine rosas frui, singulis mensibus loco stercorato pangis, semper Rosas habiturus. Serendi ratio variat. Aliqui integras plantas cum suis radicibus transferunt: alij in palmares taleolas cum suis radicibus in fobolis modum cubitali intervallo deponunt, & crebris irrigationibus & stercore juvant. Nonnulli ut majorem odoris fragrantiam adfiscant, intertextas iis coronas simul adobruunt. Majorem odoris gratiam habent quæ siccanis enascuntur. Vita, vigorque manet Rosis, quæ in amurca, si mergantur ut humo extet. Alij ut diu servantur, hordeum dum in herba murca vivum est, cum radicibus evulsam, in fidele non picatum demitti, Rosamque priùs quàm dehiscens se pandat, operiri præcipiunt. Alij virentem hordei segetem pavito loco sterunt, & rosas ipsas recondunt. Democritus frutem bis die rigatum, Januario mense Rosas ædere promittit. Florentinus est author, florem Rosæ inoculationis modo cortici mali insitam, eodem quo malum tempore partus suos excludere. Sunt qui recentes hac ratione custodiant: Alabastro turgentique calyces in ventè adole-

Locum.

Tempus.

Inferitio.

Præcox ut facienda.

Duratio.

Rosaria.

quo tempore colenda.

Rosa ubique quando a duratur.

Rosarum cultus.

Vt præcox fiat.

Vt in canna sereantur.

Vt odoras fiat.

Serendi ratio.

Rosa in murca viva.

Rosa in murca viva.

Rosa in murca viva.

Rosa in murca viva.

Rosa in murca viva.

Rosa in murca viva.

Rosa in murca viva.

Rosa in murca viva.

Rosa in murca viva.

Recentium assertio.

in circuitu strata, glabra, supernè virentia, infernè canescentia.

ROSA ACANTHOS, FLORE pleno, coloris rubelli.



IN plurimis hæc variat à reliquis Rosarum speciebus. Est quidem ea ramis & frondibus Rosæ intensè rubescentis vulgaris altitudine, figurâ & effigie, lævibus & sine spinis, viridantibus magis atq; flexuosis: quarum tamen summi propter floris calycem & folia fusculi horridiusculi sunt, ex densissima apicularum nigrarum & asperulularum congerie: foliola, quæ summa occupant ramorū, communiter quina sunt, rariùs terna, interdum sena, lata, opposita, impari ferieb claudente: supernè quidem atro virentia, infernè sub cinerea, tria nonnunquam unciarum longa: rosa speciosa, nec minore foliorum stipatu, quàm pallidæ sive incarnatæ, suavis odoris, coloris rubelli saturatiore tinctura, quam ornat varia vagaque venularum purpurascenscentium delineatio: subtus verò folia ex incarnato candicant omnia. Huic succedit fructus orbicularis, majoris Avellanæ, colore obscurè rubente, densissimo lapillorum villosorum agmine facto. Radix repens, lignosa, duræque.

Clus. sic describit: Multis statim à radice assurgit virgis, humanam altitudinem interdum æquantibus, si fertili solo & umbroso loco pangatur, ut plurimum verò longè infra eam magnitudinem, & cubitalibus duntaxat, vel sesquicubitalibus, lævibus & sine spinis, viridibus, in varios ramos deductis: folia habet alata, hoc est ternis aut quinis uni costæ (quæ subsæpera est) in hærentibus, binis semper inter se oppositis, extremo impari satis amplo, constantia, fuscâ viriditate supernè nitentia, infernè canescentia: extremis ramis insident flores, oblongis hirsutisque pediculis in hærentes, multiplici foliorum numero constantes, Prænestinis majores, mediocres inter illas & rubras coloris, jucundi odoris: fructus brevis, crassus, penè orbicularis, maturitate rubens, inæquale sèmen, & ut rectè Theophrastus notat, immutabile, ut omnia Rosarum genera, lanugine involutum continet: radix dura, lignosa plerumque, aliarum instar, sub terra propagines in lateribus spargit.

Clus. pann. Rosa Austriæ 1. sive sine spinis. Eid. hist. Rosa non vulgaris 2. sive sine spinis. Cam. h. Rosa abique spinis purpurascens, plenius majoribus floribus. Cæf. Rosa rubens multifolia colore magis diluto, Græcula Plinij. Tab. Rosa sine spinis. Ger. Rosa s. sive sine spinis. Ang. The Rose without Prickles. C.B. pin. Rosa fativa 14. sive sine spinis carens, flore majore.

Frederici Meier munere provenit mihi in horto Ill. E. C. Montbelgardii Florens Junio: Octobri cum fructu in prædicti horto Argentina: observata, cui ex Clusij horto Vienna primò delata. Clusius au-

tem hujus cognitionem acceptam fert C. V. D. Ioanni Schrötero seniori, Ienensis Academiæ in Thuringia Medico. Non desunt qui flore albo se conspexisse affirmant.

ROSA SINE SPINIS, COLORE penè tecum vini rubri.

Aliud genus Rosæ sine spinis invenitur, non valdè dissimilibus virgis, Viennæ Austriæ etiam ante Clusij in eam urbem adventum, in quibusdam hortis cultum, quod minores & rariore foliorum textura constantes flores profert, colore penè tecum vini rubri.

Clus. pann. & hist. Rosa sine spinis altera. C.B. pin. Rosa fativa 15. sive sine spinis flore minore.

ROSA PVMILA PANNONICA, flore rubello.

Pedales, inquit Clusius, atque aliquando cubitales etiam ex eadem radice profert virgas, virides, lentas, infernè paucis, supernè multis spinis rigentes: foliorum alas rubræ simillimas, quæque aut septem foliis supernè viridibus, infernè candicantibus constantes. summis virgis & ramulis innascuntur satis, magni calyces sive alabastri, hirti, barbatiq; quales in Rosis rubris simplici foliorum ordine constantibus, ex quibus deinde sese explant magnæ, non omnino odoris expertes Rosæ, quinque foliis præditæ, initio rubræ, deinde paulatim remittente & quasi evanescente rubedine, car. Rosæ. nei ferè coloris, multis luteis staminibus, floris umbilicum, quemadmodum in aliis Rosis, occupantibus: fructus ruber, rotundus, omnium maximus & Pyralin modum turbinatus, fulvescente pulpa, inæqualia alba semina continet.

Non ineptè meo quidem judicio præcipuè dicitur hoc 4. Rosa genus, Latinis Rosa pumila: Austriaci Erdrosen vnd Heydrosen / Vngari verò Parragi Rosa appellant. C.B. pin. Rosa sylv. 14. sive pumila rubens: Rosa 4. Clus. pann. at in hist. 6. & pumila.

Nascitur passim in cædis sylvis, aliarum silvarum marginibus, sublimioribus & desertis agris per Austriam inferiorem & universam Pannoniam. Floret Junio: fructus maturefcit Augusto, & plerumque tota Hieme ipsi stirpi inhæret.

ROSA SYLVESTRIS RVBELLA, parvo, frutice.

Rosa rubella sylvestris frutex parvus est, cubitalis ut plurimum, formâ similis Rosæ intensè rubræ, curvis nonnunquam spinis, sed raris: foliis ut in illa quinquepartitis, rariùs in septem foliola distributis, serratis, glabris, supernâ parte obscurius virentibus, denique ejusdem ferè & coloris & formæ, sed rotundioribus & minoribus: flore non parvo, coloris rubelli, sive incarnati, ut vocant, quinquefolio, jucundissimi odoris, cui succedit capitulum cum pediculo hispido.

An Trago tertium sylvestris Rosæ genus, magnitudine foliorum, eam, quæ odorato folio antecedit, tamen spinas gerens, non perinde minaces, & frondem proflus in odorem: Rosâ quoque aliquanto majore, colore magis rubro, & elegantiore tinctâ, odoris, ejus quidem judicio, ante omnia suavissimi, tactu pinguiore & magis lentâ, luxurians plerumque in humidis, ac minimè fertilibus avenaceis agris, aliisque nonnullis dumetis, rarè supra altitudinem trium cubitorum, sese attollens, & intra humum hinc inde serpentibus radicibus subinde juvenescens. Hæc Rosa campestris facile & nullo negotio plantari potest.

Rosa pumila
la Pann.Locus
Tempus.

Primum observavi Genesiacica Castellum l'Abbatie florentem Junio, postea inter Genevam & Trenei: deinde in Ducatu VVirttembergico non longè à Stutgardia secus viam cum contenderem Pfingen, florentem Junio, & in sylva non longè ab urbe Marbach.

ROSA RVBELLO FLÒRE MAIORE multiplicato sive pleno, incarnata vulgo.

Deser.

Rami.
Spina.

Folia.

Flores.

Alabandica
Plinio.Alexandrina
Persica.
Damascena.

fatia: & perus in Belgio Proxinsch Rosen: Germ. Leibfarb Rosen: quæ fortè Plinio Alabandica. Eidem de flor. & hist. Rosa altera fativa dilutè & pallidè rubens, Incarnata ab Italis vocata; Alabandica similis. Videtur Dod. hujus figuram in hist. exhibere sub titulo Rosæ fativæ.

Gesf. h. Rosæ ex purpureo albicantes, folio multiplici. Rosæ Alexandrinæ, vel Persicæ, vel Damascenæ, vulgò Incarnatæ dictæ. Harum Rosarum (inquit Monard.) nostris majora & viridiora sunt, foliis amplioribus: aculeis plurimis & acutioribus: florum numerosam copiam fundunt, quæ foliis quinis, aut senis constant, medio inter album & rubrum colore. Rudera tum amant locum. Seruntur, inciduntur, cremantur, transferuntur, sicuti nostra. Harum Rosarum apud Italos, Gallos, Germanos, diversasque gentes nunc frequens est usus, quas Damascenas vocant, quoniam ex Damasco Sy-

An Tragus hanc suam Rosam novit nondum nobis certò constat. Multa communia habere videtur cum Rosa pumila Pannonica Clusij, eandem tamen asserere non audemus, de qua ante.

Ad Rosæ sylv. & genus Tragi refert C.B. in pin. Rosam sylv. Gesf. h. dubitatque an sit Cythosatos 4. Cordi in Diosc. Vocat autem Rosam sylv. 5. sive odoratissimam rubro flore.

riæ Vrbe creduntur advehere. Apud nos verò triginta sunt anni, ex quo earum notitiam attigimus ex his Rosis medicamentum (syrupum ex multiplici Symplicis infusione) vel mel Rosaceum foliatum parare solent: hæc ille. Sed videt Gesnerus Damascenas, vel Alexandrinæ Rosas diversas esse, ut differentiarum causa has Persicas tantum nominare censuerit. Proxima laus à Punicis, iis quæ in rubrum candicant, Incarnatæ vulgò dictæ: Monachis in Mesuim incarnata vel trentaphilla. Item de coll. Rosæ purpureæ vel incarnatæ. Ego Rosas has nunquam vidi solitas cum quinis aut senis foliis, ut apud Gesf. hoc loco Monardo placet sed semper multò pluribus.

Ryff. Rosæ flore incarnato Gallorum; Et, Roseo colore insignes Incarnatæ dictæ. Matth. Rosæ ex albo rufescentes, vulgò incarnatæ vocatæ. Lob. Adv. Rosæ pallide plebeculæ. Obs. & ic. Rosæ Damascenæ. Et Rosam Damascenam sive Provinciale vulgi odoratissimæ omnino floribus, vel tantillo candore & rubore confusis, maximo proveniunt albat Gardani D. Adnatus van der O. acp. Quantum judicare possum ex hujus Lobelij, cui foliones sunt spinosi, Rosam rubellam flore intelligit: Rosas alioquin minus diligenter tradidit videtur.

H. Lugd. Rosæ Plinio Trachinæ minus rubentes, Rosæ incarnatæ vocatæ. Tab. groß Drouinsch Rosen/Rosæ Provinciales majores: Item, Rosarum genus, Rosæ majores, & genus minorum dictæ Rosæ provinciales, Rosæ Persicæ, incarnatæ, purpureæ. Pingit Tao. fructum sine spinis, cum soleare esse valde spinosus: errat fortè Copilator, vel Typographus, qui transposuit. Gerard. Rosæ 3. Provinciales sive Damascenæ, Angl. The Drouins fage & Damascenæ. Miror sequuntur in Tabern. posuisse hujusmodi rosæ, non spinosus, cum maxime sit spinosus.

Cam. h. Rosam incarnatam, vel leviter purpureascentem Norimbergæ Vlmensem nominatam, videri in illa præsentia existimat: hanc incarnatam tamen Lugd. Trachiniam esse putat. Nos suspicamus Theophrasto esse Rosas, quas recenset inter amplas, quibus pars interior scabra. Cæf. Rosæ roseo colore, nascens in frutice valde hispida, quaterna cubita excedente, primo florens inter ceteras: Campana fortè Plinij, & Trachinia minus rubens.

C.B. pin. Rosæ fativa 4. sive purpurea; Trachynia Plinij. Rosæ hortensis ex purpurea albicans, Tragi. Gesf. h. Rosæ domestica caris colorem refert, Matth. Rosæ incarnata, Ang. Cam. Rosæ rubra, sive carnei coloris, Bellon. Rosæ pallida, Adv. Rosæ fativa purpurea, Calv. Rosæ minus rubens, Lugd. Rosæ provincialis incarnata pleno, Eysl. Rosæ Zebedenæ Pharmacopæorum, Ioannij in tract. de pilulis.

De Rosæ hac, Clusio Prænestina dicta, alias vulgò Provincialis, puto loquuntur Thomam Morum in Epigr. ubi, quomodo utraque in una coaluerit, ostendit his verbis:

Purpureæ vicina fuit Rosæ candida, utramque
Vtraque a nunc certam, sit prior utra premit.
Vtraque sed sit rem Rosarum calcevit in unum,
Quæque potest unum la cadit illa modo.
Num. Rosæ nascitur ne pili. lat una Sed omnis
Vna habet hæc flores, quas habuere duæ.
Scilicet hinc unius species decor, atque venustas,
Et color & virtus est utriusque Rosæ.
Alter utram ergo Rosam vel sciam quisquis amavit.
Hanc in qua nunc est, quicquid amavit amavit.
At qui tunc emersi, est, tunc nunc amet, ille tunc mebit.
Nempe etiam spinas suas habet iste suas.
Tenetior hæc ad frigus quam alba & rubra: Bassi. Locum
lex hinc tenet vici Maior & Iunio; Monachij Marti
tis, Aprilis & Iunio; Genevæ copiosè Octobri &
Novembri ac etiam Decembri: quæ tamen florent
juventutem

frundissimi sunt odoris, nec ita cito flaccescunt. Et licet nimio frigore impatiens satis, nisi ab eo muniat, quandoque pereat, tamen altero anno à radice rursus repullulat.

ROSA FOLIO CRISPO, FLORE rubello sive incarnato.

Portzhemian-
no 1595. idibus
Iulij observavi in
horto D. Griennin-
geri Rosæ fruticem
folio subrotundo &
crispo, flore rubello
sive incarnato, à
præcedenti in cate-
ris nõ differentem.
Plantata in horto
Montbelg. feliciter
provenit.

C.B. pin. Rosa fa-
tiva 17. sive Rosa fo-
lio subrotundo &
crispo.

Iconi nostræ ap-
pinximus separatim
Rosâ domesticam,
sed minori propor-
tione.



ROSÆ RVBELLÆ SIVE INCARNATÆ SIMILIS.

Prænestinæ, quam vulgus Provinciale vocat,
valde similis est Rosæ prior vel prima Clusii præ-
vulgares, nec illâ minis altè assurgit in solo flore di-
scrimen est, qui circiter quadragenis aut pluribus fo-
liis, paulò amplioribus, & saturatius nonnihil ru-
bentibus constat, multis staminibus flavis umbili-
cum occupantibus, alabastroque multo crassiore &
breviore, quam ob causam Tuppel Roosæ vulgò ap-
pellatur: odor minis suavis, & albæ ferè proximus.
Hujus genus album florem ferens, apud Batavos
invenitur, Centifoliaq; alba illis dicitur, de qua mox.

C.B. pin. Rosa fativa 8. sive Rosa major Prænesti-
na Clusii hist. Rosa Prænestina variegata, Eyf.

Valde frequens Viennensis est hortis, & tota
Austria, nullius tamen apud illos usus, quam ad eli-
ciendam stillatitiam aquam. Francofurti ad Menum
quædam ejus stirpes Prænestinis mixtæ aluntur. Flo-
ret cum cæteris Junio, inter dum etiam Maio.

ROSA PRÆNESTINA ALBA & versicolor.

Non desunt, inquit Clusius, qui Prænestinam
albi coloris invenier assentant: mihi certè non-
dum videre contigit, nisi fortè ea sit quam
honestus vir VVilhelmus Osterreich Francofurten-
sis civis unicum in culto suo horto alit. Illius flos
multò dilutior Prænestinâ, & ferè albicans, per-
inde tamen magnus & plenus, in quo nonnulla et-
iam folia observavi, media ex parte candicantia, al-
terâ purpurascantia, vel similis coloris venis aspersa.
Anno etiam 1593. florem mihi protulit ea, quam ad me
Hoghelandus miserat planta.

Illi congener esse videtur elegans illa Rosa, de
qua honestus vir Ioannes Restæu, civis Colonien-
Tom. II.

sis, superioribus Autumnalibus quodam apud me
verba fecit: se videlicet Coloniæ in suo horto alere
Rosam Prænestinâ similem formâ & magnitudi-
ne, quæ ut plurimum d. andia ex parte folia candida ha-
beret, reliquâ rubra, aut tertia duntaxat ex parte al-
ba, vel nunc integra alba, modò integra rubra inter
se commixta conspiciantur. Ejus prolem sequente
Octobri ad me mittebat, quæ prævaluit quidem, sed
nondum florem ullum dederat, quum Francofurti
excessi.

C.B. pin. Rosa fativa 5. sive versicolor: Rosâ præ-
nestina versicolor, Clusij hist.

ROSA HOLLANDICA RVBELLÆ plena, quibusdam Centifolia spinosa frutice.



Gerardo est Ro-
sa 6. sive Hol-
landica, aut Batava,
Angl. The great
Holland Rose, vul-
gò The great Pro-
vince Rose / dicta,
quæ Pfortzhemian
anno 1593. Iulij 5.
mihi adhuc flores
demonstrata est, in
horto D. Griennin-
geri, quam D. Höch-
letter denomi-
nat Rosam Hollan-
dicam, quàmque di-
cebat ex urbe Del-
phis allatam & ma-
gno pretio emptâ.
Cæterum, folia ejus
videntur majora
quàm in rubellâ si-
ve incarnatâ, cui similis frutex spinosus: flos etiam
similis, major, plenior, florum folia minora paulò.

De hac Clus. Rosa centifolia Batavica prima an-
ea sit, cujus Theophr. Plinius & Athenæus mentio-
nem faciunt, hæreo. Nam illi Centifoliam, inodo-
ram esse, & pusilla habere folia, scribunt. Quæ au-
tem apud Batavos alitur, non modò referente N.V.
Ioab Hoghelande (qui bñas ejus plantas sub anni
1598. initium mihi misit, quas cum prævaluisse puta-
rem, corruptas esse deprehendi, præter unius radi-
culæ fragmentum) prænestinis majorem, & perinde
ferè odoratam intellexi: sed etiam Francofurti ad
Menum apud Baltharem & Carolum Hoyckæ
Belgæ fratresque germanos illo ipso anno conspe-
xi: sequente vtrò, ex neglecto illo, & veluti abjecto
fragmento nata est mihi stirps, quæ altero anno
nempe 9. circiter quadragenos flores tulit, non om-
nes tamen ejusdem amplitudinis, sed in nonnul-
lis numeravi centena vicena folia, extrinsecus ma-
jora, intrinsecus pusilla, staminum locum expletia,
& in ipsum calycem re flexa, odorem autem depre-
hendi prænestinæ, ad albam nonnihil accedentem,
colorem Prænestinæ non dissimilem.

Istius etiam stirpem unam quæ album florem fe-
rat, habere se ait idem Hoghelandus, medietate inter il-
lam & proximè sequentem magnitudinis, quam al-
bam majorem Provinciale appellari ait, ut supe-
riorem, majorem Prænestinam.

C.B. pin. Rosa fativa 6. sive maxima multiplex:
Centifolia Batavica rubra, Clus. hist. Eyf. Habent
& alba, quæ; Rosa alba major provincialis, & Cen-
tifolia Batavica alba, Clus. hist. Rosa provincialis
flore albo, Eyf.

ROSA CENTIFOLIA BATAVICA altera.

Centif. Bat.
rasiua 21
Clus.

Sed & rarius Centifoliae genus apud Batavos inveniri ad Clusium scriptum ille ipse Hoghelandus, priore aliquanto minus, hoc est, media inter Centifoliam & Prænestinam vulgarem magnitudinis, alioqui colore, odore, & formâ convenire: quod verum esse ex ejus planta ab illo missa, sequenti anno apprehendit Clusius.

C.B. pin. Rosa fativa 7. sive multiplex media.

ROSA POMO SPINOSO, folio hirsuto.

Locus.
Deser.

Folium.

Caput.

Spina.



Cherlerus attulit Rose genus ex monte Calcani, & horti Dei declivibus, foliis palmâ ferè longis, quinquepartitis, ad rubellam plenam penè accedentibus, minùs rotundis, longioribus, serratis, subtus hirsutis quadam lenibus tactu, & penè cinereis: capibus sive fructibus spinosis, magnitudinis Avellanæ rotundæ, ex pediculis brevibus spinosis: per ramulos sunt spinæ rariores.

Hanc existimamus esse Rosam sylvestrem 15. C. Bauh. in pin. sive Rosam sylv. pomiferam majorem, Rosâ sylv. pomiferâ Lobelij altior, ramulosior, paucissimis aculeis, foliis majoribus, pallidè virentibus, Basileæ locis humidis in Alnetis proveniente.

An Cynorhodos? An Thal. Cynorhodos seu Rosa canina, virgis, fructu ac foliis auleatis, spingiolas proferens, weyß Dorn, el. Niebende Dorn.

ROSA POMIFERA VENETIIS Sprengeri folio hirsuto.

Locus.
Deser.

Folia.

Flor.

Collegi Heidelbergæ 1595. in horto Sprengeri Rosæ genus, ubi non observatum, foliis accedentibus Rosæ nostræ pomo spinoso, subtus lenibus ad tactum, & albicantibus, hirsutisque: differt autem quod tres conjugationes foliorum minorum habeat, & postremo unicum ut cæteræ Rosæ: in extremis ramis raræ spinæ: florem non vidi, ex ramo sicco describo.

Anno 1609. Maio vidi, ni fallor, hocidem genus Rosæ, Basileæ in horto Heitzmanni, foliis similibus, trium conjugationum: spinis ramorum juxta folia aduncis, firmis: flore rubello simplici: capitulo spinoso ut in præcedenti.

ROSA SPINOSISSIMA HIRSVTA.

Locus.
Folia.

Est & mihi Rosæ ramus, abundans spinis aduncis, cujus folia sunt hirsuta, subtus ad tactum lenia, conjugationum trium, postremo solo: ea autè majora sicut ungue parvi digiti: quales ferat flores & ubi ramus, ex quo describo, fuerit collectus, me læret.

ROSA MINOR RVBELLO MVLTIPlicato flore, asperis spinis armata.



Frutex est asperis duris spinis armatus, in altitudinem satis magnam multis virgis rubentibus valdè excrefens: Rosæ huic parvæ ex brevibus pediculis plenæ, admodum odorata.

De hoc frutice Deser. Clus. Clusius: Rosâ Cin. namomeam flore pleno rarè duorum cubitorum altitudinem superantè Viennæ observavi, frequentibus & brevibus ramis donatam, purpurascens, qui raris & brevibus spinis armatus.

sunt: foliorum alia illis similes quæ in Rosâ, vulgo Canellæ nomen adeptæ, sunt, h. e. ex quinis aut septenis foliis æquali inter se spatio distantibus constant, uno hinc, altero inde, geniculatim conjugatimque semper adhærente, unòque in cacumen exeunte, coloris supernâ parte viridis, infernâ candidis: flores vulgari Cinnamomeæ similes, sed majores & multiplici pusillorum foliorum glomeratione constante, quemadmodum alba & prænestina: odor ferè qualis in alba vulgari plena: fructum nondum videre licuit, tamen multis annis aluerim ejus. Radix latè admodum serpit, & vivax est, novas virgas subinde producens.

Cam. h. Rosâ Cinnamomea altera, vulgò Veneta, alijs Provincialis: Spermonia Plinij, Barbari, & non Spineola, aut Spinosa, Syëonia quorundam.

Gesh. Rosæ nobiles densi-folio flore, parvo, purpurei coloris diluti. An Lugd. Gracula, quæ multorum etiam judicio Rosæ Damascenæ genus est, flore ex albo ad puniceum nonnihil vergente, Rose de Damas incarnate? An Eid. Gracula Rosa flore suaviter olente, quem sub ætatis initium paulò seriùs quàm Damascena candida promit & per ætatem ferè totam perseverat, foliis Damascenæ albæ latioribus sese non explicatibus, nisi quis manu deducat, sed veluti conglobatis & convolutis, ut Plin. scribit: Cinnamomum olere hanc vulgus ait. Intinens perquirendum, & ad trutinam verè contemplationis revocandum, an Plin. scribens de Rosâ Gracula, non miscuerit herbas: præcedens enim, quæ Gracis Lychnis, herba videtur, uti & sequens, quæ Moscheuton: & quamvis veræ Rosæ genus traderet, tamen non videtur competere nostræ minori rubellæ, quæ foliis non est latissimis. Proponimus enim a cæteris in nostra non possit esse Theophrasti Rosâ ex Pangeo, de qua etiam Plinius. Sed & hoc observandum quod scribitur à Lugd. suam videlicet Graculam sub ætatis initium florere, quandoquidem nostra Rosâ, de qua hic agimus, primo Verè floret.

Tab. Rosâ Provincialis minor: Item, Rosarum 3. generum, Provincialis magnæ & parvæ, coloris aurei, jucundi odoris: Rosæ persicæ, incarnate, purpureæ. Figura Tabern. posita pro Rosâ provinciali minore, commodè satis exprimit Rosam, de qua hic agimus.

Ger.

Ger. Rosa 4. five Provincialis minor, Angl. The lesser Damask Rose; item, Rosa Cinnamomea pleno flore, The double Cinnamon Rose. Peccat in excessu Ger. duas proponendo figuras, quæ videntur eandem plantam denotare, prior est Tab. altera verò Clusij in Pan non.

C.B. pin. Rosa silv. 8. five Rosa odore Cinnamomi flore pleno: Rosa cinamomea pleno flore, Clus. pan. & hist. Eyflett.

Locus et Tempus.

In horto E. C. tempestivè primo vere floret, ex Burgundia delata. Vnde primum Viennam allata sit plerique dubitant, nonnulli tamen ex Tyrolehsis Comitatu originem ducere existimant, alijs è Gallia Moschatæ pleno rubro flore, nomine missam. Tunc in omnibus Cæsareis hortis, & aliorum quæ herbaria rei studio oblectantur, alebatur: sed omnium frequentissimam Castellis in cultissimo Ill. Principis VVilhelmi Landtgravij Hassiæ horto, supra humanam altitudinem sese attolentem, interdum etiam Autumno rursus florentem, quæ tamen florem minus plenè superiore, quæ Viennæ est, habere Clusio visa est, & stolones atque ramos minùs rubentes.

ROSA CINNAMOMEA FLORIBVS subrubentibus, spinosa.

Synon. cum descr.



DOd. gall. Rosa faciva 5. genus, flore simplici, fortè Rosa Prænestina Plinij, folijs minoribus, quam albarum, rubrarum & rubellarum, ramis tenuibus, spinosis, subrubentibus: floribus parvis, simplicibus, odoratis, rubellis. Eid. de flor. & hist. Rosa 7. five sylvestris 2. à quibusdam Cinnamomina dicta, id est, Cannel Roepien, Rosa canina vulgo dictæ similis, veruntamen aliquan-

tulum minor, cujus virgæ subrubente cortice vestiuntur; flores pallidè rubent, non in totum absque odore: plerique in hortis habent, præcox est. Notandum Dodon. olim scripsisse spinosam, quod nunc non repetit: In postremis etiam spinarum nullam facit mentionem, quanquam ante dixerit omnes has Rosas mordacibus aculeis horrente.

Lob. Adv. Rosa silv. quam Boreales Cannel roose/ five Cinnamomeam appellant: Hæ foliolis sunt omnium florum minimæ: Franciæ, Belgio, Angliæ, ruri spontè crebræ, ipso odore notissimæ. Eid. de Cannelle. Miror autem Lobelium (& ex eo Lugdunensem, qui eadem recitat) Rosam hanc non describere, nec in Obs. se explicare: coloris florum non meminit, nec etiam tradit an spinosa, vel non spinosa: is quidem titulo *Rose de Cannelle* ponit figuram Rosæ simplici flore cum spinosis virgis: sed considerandum an intelligat rubellam flore pleno.

Clus. in pan. & hist. Cannelæ rosæ vulgaris nec colorem tradit, nec eam describit, neque docet an sit spinosa aut non spinosa. Thal. Cynorrhodon five Rosa sylv. suaviter fragrantibus foliolis, videtur esse Cinnamomina Dodonæi, quam etiam flore candido, non ita frequentem tamen inventi ait. Sed an hæc eadem sit cum Cinnamomina, vel cum aliqua Tom. II.

earum, quas tradimus, non est quod adhuc affirmemus. C.B. pin. Rosa silv. 7. five Rosa odore Cinnamomi simplex: Cinnamomea simplex, Cam. Pro Lychlide Plinij Gesnerus habet: & in Albio monte, majorem & nitidiora nasci tradit: illam fœminam, hæc matrem faciens.

ROSA RUBELLO FLORE, PARVO, simplici, non spinosa.



Mitior hæc, nullis horret spinis, pediculo duntaxat floribus nonnullis aspero: foliorum autem glabrorum conjugationes præter extremum impar, tres sunt, vel quatuor, serratorum: superius virentium, inferius albicantium, glabrum: rosæ sunt paræ quinqueseclæ, odoratæ, coloris rubellæ: hucusque ramosus, parvo Mespilo paullo minor, per maturitatem rubescens, grana tomento involuta continet: in

hortis sæpè altitudinem hominis excedit. Ges. h. Rosa silv. vulgè Tigurinæ & Meyenroffii, ubi à quibusdam colitur in hortis; creseit verò spontè ad radicem Albij montis, & est minor, odoratior & pretiosior Cynorrhodo, inque hortis facillimè durat. Hæc eadem fuerit Rosa campestris Tragici quam Germ. vocat *Banrosen*, *Feldrosen*, *Saber*, *Tragrosen*: Item coll. Rosa à Maio denominata *Meyenroß*, Rosa Maij sine spina, montis Albij prope Tigurum. An Rosa Maij Gesneri eadem sit cum Tragici Rosa campestris, vel 4. nobis dubium est, quia ei prior spinas gerit, secunda autem flore prolius est candido.

Lugd. Rosa Græca [Plinio] à Græcis λεχνη dicta, Græci nascens spontè in sepibus, valdè humilis, spinis carens, (quod huic tantum generi Rosarum proprium est) flore languidius rubro, Vere & Autumno prodeunte: quod etiam huic Rosæ cum Coronella & Græcula commune est: quæ in hortis nostris colitur, & in quibusdam montibus luxuriat, odoris est expers: At humi jaceret & valdè humilem foliis tam exiguis, ut vix Rosa esse videretur, flore suavissimi odoris in Cemenaeorum montium jugo altissimo Lugduno propinquo, quod montem Pilati vocant, Dalechampius collegit: Contra in Carthusianorum Cœnobio primario, Gratiano poli vicino prorsus inodora est, ut verissimum esse comperiat quod scripsit Theophr. de his ipsis Rosis tractans odoris præstantiam loci ratione contingere, & quæ eadem in tellure proveniunt à sese differre, quod jucundum, vel nullum odorem spirant. Eum locum Gaza (ut id obiter etiam hic dicatur) non rectè est interpretatus: Hanc si quis Rosam Græcam esse Plinij negaverit, Rosæ genus, Cynorrhodon leve esse Dalech. jurè concesserit: Sunt Cinnamomeæ foliolis omnium florum minimæ. Inter silvestres etiam non postremæ venustatis, inquit Pena, sed in odore pomodoro atque. Hæc Lugd. separans Cinnamomeam à pomifera Lobelii imitatus, nec indicat an ambe diverſæ sint ab ea, quæ Lychnidè vocat: figura sanè ex Lobelio quæ ponitur, ubi Rosa dicitur Pomifera.

convenit cum ejus *Lychnide* descripta & flores hæc perpendant.

Cinnamomum h. Rosi Cinnamomea simplex, pro *Lychnide* habita à Gesnero, & in Albio monte major & minor nasci tradita. Quaternas in costis singulis foliorum syzygias habet plerumque major, præter summum singulare, quod domesticæ nallæ, nisi rarit. silvestres quædam, sed non omnes solent: Minor, quam pro mare habet, ut priorem pro scemina, minores gerens spinas; floris pericarpium gerit spinolum modicè, superioris leve. Distinctionem hanc *Cam. error.* à Camer. assignatam nondum inveni in libris impressis Gesneri: fortè Camer. inter manuscriptorum annotationes repetit, & non separat Rosam non spinosam à Cinnamomea, de qua ante, quæ Dodon. & Lob. spinosa est rem ulterius considerasse debebat.

Syn. C. B.

C. B. lapsus

Locus & Tempus.

C. B. pin. Rosa sylv. 10. five minor rubello flore, vulgò à mense Maio, Majalis dicta: Cinnamomea altera, Cam. Provincialis minor, Tab. Ger. Malè quoque frater Rosam hanc Majalem, quæ sine spinis est, eandem facit cum spinosa & Provinciali minore Taber. & Gerard quam eam Cinnamomeam 2. Camer. referimus. In hortis nonnullis florentem observavi mense Julio: Geneva ubi vocant *per its Damis rouge*, Maji principio. Reperi spontaneam in monte Thuri copiosè, ceu etiam in pago Colonge: in monte Balon Lotharingiam attingente: item, in montibus Burgundia propè Mâcon cum flore Maji principio.

ROSA SYLVESTRIS POMIFERA

Lobelio, flore rubello, sine spinis, pumila, eadem fortè cum præcedenti.

Locus & Tempus.

Folium.

Fructus.



Inter silvestres Rosas (inquit Lob. in Adv. *Sennen Rosen* pomifera, montera, bacifera, non postrema venustatis, Angliæ perquam familiaris, & Englentique cognatio, fructuat pumila, bicubito non altior, sed inodora: folio minore, & pereleganti: Mespilo Atonia non dispari pomo donata, minore multo, colore viridiore, rubello, subpunico, per Augustum maturum: Ros Rosæ sylvestris est. Eid. Obf. & Ic. Rosa silvestris pomifera. Miror Lobelium non tradere qua in re hæc differat à Cinnamomea, nec coloris meminisse, nec indicasse an sit spinosa: figura spinis destituta non malè convenit nostræ Rosæ parvo flore rubello, quæ spontè provenit, quam an intellexerit Lobelius dubito. Camerarius aliam intelligit nempe Rosam campeltrem odoratam Clusij, quamvis illa sit spinosissima ut ipsemet Camer. fateatur, & flos albus qui Lobel. rubellus: nos igitur Camer. non assentiuntur, eandem Lobel. & Clusij esse hac in parte plantam. Lugd. Rosam sylvestrem pomiferam Penz separat à nostra præcedenti Rosa, non spinosa: nos tamen suspicamur hanc eandem esse cum nostra, sed spontaneam, id quod furpiam periti investigent.

Lob. repet.

Cam. nota.

Q. B. pin. Rosa sylv. 16. five pomifera minor: Rosa silv. pomifera, Lob. & Lugdun. Cynorhodi species, Thal. Rosa arvena, Tab. Rosa pimpinella, Ger. Hanc Lob. spinis carentem, at Tab. spinosam pingit. Ego contra fateor. Cynorhodi brevier Thalij, non puto referendam ad hanc silvestrem pomiferam Lobelij, sed ad pumilam spinosissimam folio Pimpinellæ. Præterea Rosam arvenam Taber. aliam existimo, ob rationes paulò post dicendas.

ROSA PUMILA SPINOSISSIMA, foliis Pimpinellæ glabris, flore albo.



Haud impune Describenda sua parte contrectari se patitur pumila hæc scilicet quicubitalis Rosa, tam denso horret minacium spinarum undiq; agmine, tam per caudicem quam ramulos, quos in conditos multos habet, per quos folia conjugationum quatuor, alata, glabra, vix quadrantem equant unguis digiti minimi, circumcirca crenata, subrotunda: flosculi simplici constant foliorum texturâ,

candidi, crebri, luteis capillamentis medium obsidentibus, alabastriculis parvis: radix repit & plurimas virgas emittit.

Considerandum an eadem sit, quam Clusius in pann. pro Rosa 3. in Hist. pro 5. sic describit: Rosa campeltis odorata, cubitalibus aliquot, aut ad summum, sed rarissimè, bicubitalibus alligat virgis, firmata Clusij: nas, datus, lignosis, tub. & c. rubus, deumilimo spinarum vallo munitis, ex quibus frequentes confuso ordine oriuntur spinosi ramuli, virides, singuli sumum florem sustinentes, album odoratum, quinque foliis constantem, Luteæ, aut Canellæ Rosæ vulgaris (qualis hæc sit Clus. non ostendit) æqualem, capillaceis quibusdam staminibus cum suis apicibus luteis medio floris umbilicum occupantibus: fructus rotundus, brevis, initio viridis, deinde plenam maturitatem adeptus niger, crassa, angulosa, candida, dura semina continet: folia sunt inter eam quæ luteos simplices fert flores, & illam quæ ab aggeribus, in quibus spontè provenit, quæque à Pimpinellæ foliorum similitudine nomen apud Belgas accepit (*Sennen Roosen* & *Pimpernelle Roosen* enim appellant) ferè media, per ambitum serrata, & nullius splendoris: radix dura, lignosa, in diversa tendit. Invenitur multis circa Viennam locis, præsertim editionibus & montosis. Floret Maio, quo tempore rusticæ mulieres plurimos ejus fasciculos, ob odoris gratiam, vepales in forum deferunt. Fructus vagantes na ardet.

Dodon. gall. Rosærum silvestrium genus, cujus Rosa silv. virgæ spinis acutis abundant: flores parvi, simplices, albi, suavissimi odoris: humilis Rosa, inter Rosas domesticas & silvestres minor: Videtur Crætanæ Rosæ, Lat. *roze*, Canad. *Cynorhoda*, & Plinio Rosa spineola. Eidem. de fl. spineola & in hist. Rosa 9. parva humilis, spinosa.

spinosissimis, foliis minimis, rosis perquam exiguis, candidis, & suaviter odoratis: fructus hujus niger, aliorum ruber. Rosa minima à nostris *Suynerosifens*. Th. c. Dunenensis Rosa dicta in marino litore, arenosis tumulis, quos vulgo *Suyneri* nominant: sunt tamen qui *Pimpinella Rosfens* nuncupant. Rosam *Pimpinulam* dixeris à similitudine nempe hujus fructus foliorum, cum foliis minoris *Pimpinulae* quae alio nomine *Sanguisorba* & *Pimpinella* vocatur. Minima spinosissima & asperissima, locis gignitur maritimis, frequens in Morinorum finibus, juxta Icium portum, in arenosis juxta mare tumulis. Observandum hoc in loco Dodonaeum in hystor. Dunenensis Rosa fructum nigrum dicere, Clusium autem id tribuere sive *Campestris*, quam videtur separare à Duneis sive ea, quae *Pimpinella* folio.

Thal. Cynorrhodi species in Broccenbergro nascentes, rarior inventu, fructu nigro, non oblongo, sed rotundo. Cerasi magnitudine, continente semina pauciora quam reliquae species, duplo tamen grandiora, ac formae quodammodo granorum Vitis. Camer. apud Thaliū & in horto ait Rosam pomiferam Lobelij, vel campestem odoratam in pann. Clusij, Belgis à foliorum figura *Pimpinellin Roselin* vocari: quamvis ille sine spinis depingat, cum revera sit spinosissima. Ego non ad stipulor Camerario: Rosa siquidem Clusij, albo flore est; Lobelij autem Rubella: Hoc praeterea observandum, videri Clusium Rosam *Campestem* distinguere ab ea, quae folio *Pimpinellae*, ut jam dictum.

Tab. error: Tabernam. Rosarum 9. genus, Rosa *Eglentaria* dicta, frutice humili, virgulis spinosis, foliis parvis, floribus sive rosis pusillis, albis odoratis: fructu nigro: Rosa Dunenensis, aut *Pimpinula*. Sed apud Tabern. confunduntur Rosarum genera duo: Icon repraesentat quidem *Eglentariam*, sed non descriptio, ut apparet ex ea & nomenclaturis.

Syn. C. B. C. B. pin. Rosa sylv. sive Rosa campestris spinosissima fl. albo odore: Rosa campestris odora & s. Clus. pan. & hist. & Cam. Cynorrhodon polyacanthos, Lugd. Rosa Dunenensis, Dod. Rosa praecox spinosa fl. albo, Eyf. Hæc opinio non placet: pater verò nostra ex dictis, & mox subdendis.

Locus. In hortis non parum se multiplicat serpendo, idèoque haud multum in altum sese attollit. In castello Bermont, unde mihi missa, copiose provenit in rupibus.

ROSA SPINOSISSIMA PVMILA flore rubro.


Cynorrh. Polyacanth. Icon Dal. L Vgd. Icon est sub titulo Cynorrhodi Polyacanthi, quæ non male exprimit nostram Rosam spinosissimam flore albo: jam dictam. Cynorrhodi autem hoc genus à spinarum densissima multitudine quibus caulibus, furculis, ramulis, folia rigent. Polyacanthon nominavit Dalechampius. Id pedis altitudinem nunquam excedit. Flore est rubro exiguo: Reperitur in Gramuntio nemore prope Monspelium: hæc Lugd. Ego inter Rosas secas plantas invenio ramulum spinosissimum foliis minimis, præcedenti similis, sed minoribus multo, cui titulum fecit Dourez Cynosbati odorati. Gesnerus, qui hunc habuit, ascripserat esse fortè vel Rosæ Damascenæ cognatam, vel Nerij Serapionis.

Cynob. odoratum. An Damascena vel Nerij Serapionis. Hanc nos suspicamur esse collectam Monspelij: fecissemus eandem cum præcedenti, nisi invenissemus Dalechampium tradere Cynorrhodon Polyacanthon flore esse rubro, circa Monspelium. Cherlerus reijcit ramis spinosiss. cum minimis foliis, modo dictis similibus, passim provenire in rupibus & fruticibus collium Narbonensis Galliae, ac ibi florere Maio: verum quo colore non indicabat.

Tom. II.

C. Bauh. hanc spinosissimam eandem statuit cum *pumila spinosissima*, foliis *Pimpinellae*. Sed hic flos albus, ali ruber. Hæc pedis altitudinem nunquam excedit, illa verò sesquicubitalis est.

ROSA ARVINA TABERN. SPINOSA



Pud Tabern. in Tab. re. Ic. & hist. hujus Rosæ sive Arvinæ, seldi Rosæ nihil præter iconem & nomen extat, quod ut ait, adèd vulgaris sit omnibus locis, ut non egeat descriptione. Sed Compilator satis demonstrat se parum veratum in Rosarum discriminibus: Icon quam proponit, accedit ad Iconem Rosæ pomiferæ Lobelij. Quare ejusdem plantæ existimarem nisi spinosa pingetur, rarioribus tamen spinis & non crebris, quales sunt in Rosa nostra spinosissima: Considerandum an sit Rosa Maij minor Gesneri Camerario, cujus descriptionem posuimus antea, sub Rosa rubello flore non spinosa.

A me aliquando reperta est Rosa sylv. in monte S. Lucæ. Hippeliti, urbi Burgundiæ vicino, frutice parvo spinis robustis, rarioribus, ut in icone Tabern. foliolis novem ac etiam undecim, glabris, qualia in Rosa spinosissima alba. Ger. qui figuram Tab. exhibet, Rosam *pimpinella*, Angl. *The pampernel Rose*, & Rosa pomifera.

C. Bauh. eandem facit Rosam arvinam Tab. cum C. Bauh. sive pomifera Lob. & Cynorrhodi specie Thalij: sed ei adhuc assentiri non possum.

ROSA MINIMA.



demonstrare quatum pro nostro capto fieri poterit.

ROSA FOLIIS ODORATIS

Eglentina dicta.

R. Ofis silvestrib. ante dictis similis, aculeatis virgibus, Trago magis exigua Rosa silvestri vulgari, D 3

Virgo

Folia.

Flores.

Alba & rubens.

Spongia.

Cynobatos.

Cynorhodon.

do.

Englandi.

do.

Syl. humilior.

Cynobati.

genus.

Rubus caninus.

Cynorhodon.

do.

Græca.

Canine.

species.

Cynobatos.

Oxyacanthus.

ruba.

Cynobatos.

ruba Plinij.

sign. est.

Bedeguar.

Lob. notat.

Rubus Rosa.

Plinio.

Cynobatos.



sed spinis & foliis asperioribus: Dod. proceritate sylvestris omnes sepe superans, virgas habet duras, crassas, & lignosas: nos plerumque observavimus minorem & virgis minus crassis: foliis subrotundis, quibusdam panem rotundis, plerumque septenis, Dod. splendens: pulchre virentibus, Trago cineraceis, nobis potius viridibus odore gratissimo ac suavissimo,

maximè ventò flante, teste eodem Trago: flores exigui, quinquefolij, albi, & valde odorati, (vidimus & rubentes.) Trago ex purpurea saturate candicantes & odore jucundiore ac vehementiore præditi; Dodongo verò, frequentissime albicantes, raro purpurascētes, exigui aut nullius odoris: fructus oblongus, coloris subrubentis. Repertiuntur etiam circa hujus tenues virgas spongiolæ hirsutæ, quales circa Caninæ Rosæ spinas nascuntur.

Cord. in Diosc. *κυνόβατον* sive Cynorhodos altera, hirsutioribus foliis, cuius frutex totus suavissimam odorem spirat, Englandira vulgo appellata. Trago, Rosæ silv. genus 2. German. nonnullorum Weinrosen/ Frauen Dorn/ Marien Dorn. Gesl. h. Rosæ silv. humilior, Tiguren sibus Weinrößlein denominata à vino. Eid. cat. Cynobati genus odoratum, Weindorn/ Weinrag.

Turn. Rubus canis, *κυνόβατον* Gr., Angl. *Eglettine*. In hac communiter spongia nascitur, ut scribit Plinius. Ego hanc nihil aliud quam suaveolentem Cynobati speciem existimo. Idem habet de Cynobato. Dod. Gall. Rosæ 9. genus, Plinio Græcè *κύνος*, Lat. Rosæ Græca, Gal. & Bel. *Eglettier*. Idem de flo. & hist. Rosæ 10. sive silv. quadam, foliis odoratoribus: Cynorhodi sive Caninæ Rosæ odorata species, quam Galli *Eglettierum* Ruellio teste nominant, qui & hanc sylvestrem Rosam Cynobatum sive Caninum Rubum suspicatur, de quo Diosc. *κυνόβατον* sive *κύνος*: Extat & Cynobati apud Theophr. descriptio, quam habet correctiorem Athenæus: Cum harum descriptionum utraque non malè canina Rosa odorata convenire videtur: Est verò & alius Cynobatus, quem Plin. 14. describit: sed hinc Cynobato, sylvestris odorata (si modo legitima & non corrupta est descriptio) nec quicquam similis est, veluti neque Cappari, neq; Smilaci asperæ, quarum utraque etiam Cynobatos à nonnullis appellatur.

Lob. Adv. Rosæ species altera, vulgò *Eglettine* aut *Eglettier*: in hujus potissimum ramis Bedegar vocatum provenit. Idem Obs. & Ic. Sylv. Rosæ & Canina Rosa odorata, Angl. *Brerbusche* or *Heptree* sive *Brere* etc. Germ. *Wildrosen* & *Heckrosen*. Bel. *Wilde Rose*. Gall. *Eglettine*. Hisp. *Rosa salvage*. It. *Rosa canina*, *Rosa salvatica* & *canine*. An Lob. benè distinguerit Rosas sylvestres examinent lectores.

Lugd. Rubi genus aliud in quo Rosa nascitur, inquit Plinius, Dioleoridis *κυνόβατον*, qui in sepibus cum aliis Rubis gignitur. Latine Rubus caninus appellatur, aut Canirubus, Arabicè *Sent*. Fruticem eum esse putant nonnulli, quem Galli *Eglettier* & *Eglettier* vocant, id quod notæ à Diosc. posita te-

stantur. Et licet in Dioscoridis historia nihil sit quod non sententia Herbariorum de hac planta adstipuletur, dubitant tamen adhuc de ea re quidam, alij asperè refragantur, in primis verò Matthioli: cui respondent alij sententia auctores. Hoc primum, quod Matthiolus vehementer probat, & adversus Marcellum contendit; Cynobaton à Cynorhodo sive Rosæ sylvestris differre caulium robore, proceritate, crassitudine, aculeorum multitudinè & rigiditate, folio jucundi odoris, ut inquit Plinius, sed angustius, ne late diffundentis (quod in Rosæ sylvestris profusè odoris est expers) in acutum desinentem, cum Rosæ sylvestris folium summâ parte latiusculum sit & majoribus incisuris divisum, quæ cum tantopere inter se dissideant, Cynobaton neque cum Rosæ sylvestris, neque cum sativâ à Dioscoride confert oportuit. Nullo verò pacto adversatur Plinij autoritas, Rosam sylvestrem Cynorhodon non Cynobaton appellantis: qui præterea non scribit, veteribus Cynorhodon nihil aliud fuisse, quam spongiolam illam, quæ mediis sylvestrium Rosarum ramis obortitur, ut citra illius mentem ait Matthiolus. Pet.

speciere verò ex hac historia licet Cynobati folium præter præsertim sylvestri simillimum esse, verum latius in ambitu serratum, paullo minus acuminatum. Ejusdem fructum nucleo Olivæ, *κύνος* ut scribit Diosc. id est, similem, non *κύνος* id est, magnitudine parem: quanquam nec ejus magnitudo ea sit ut Olivæ superet Hispanicæ aut Narbonensæ. Quod in Theophr. legitur de Cynobato *κύνος* *κύνος* *κύνος* mendosum est, scribendum *κύνος* *κύνος*. Et postea pro *κύνος* scribendum *κύνος* *κύνος* & pro *κύνος* *κύνος*, legendum *κύνος*: nam & Plinius folium hominis vestigio simile est interpretatus. Hominis vestigium si consideres, principio non nihil latum, medio latius, in angustum & acutum, summo cacumine desinit, quale à calcatis arenæ, lutove imprimitur, tali præsertim calceo, quem veteribus in usu fuisse ex antiquis statuis apparet. Ea figura imaginem foliorum Cynobati repræsentat. At quod scribit Plinius Cynobaton uvam nigram ferre, Cynobaton sanè cum Chamæpato confundit. Tam in Cynobato quam in Cynorhodo excrementum quoddam gignitur, globosum, hirsutum, tactu asperum, quod in Cynobato pilulam Castaneæ similem Plinius appellat, in Cynorhodo spongiolam. Et hæc Lugd. quæ cap. sequenti Rosam silv. alteram appellat vulgò *Eglettine*. Nos quidem non negamus Rosam *Eglettinam* esse Cynobaton, non invenimus tamen quod Lugd. scribit Pligium dicere folium jucundi odoris esse Cynobato: nec discrimina quæ ponit multum facimus, nec demonstrat quatinus re tanto perè dissideant, ut Diosc. Cynobaton, neque cum Rosæ sylvestris, neque cum sativâ oportuerit conficere: An non Eglantina Rosa verè Rosæ genus est? Turn. Eglantinam diversam existimat à Cynobato, censuitque esse veterum Cynorhodon seu Rosam caninam.

Compiler Tabern. confundit in hist. cum nona Rosæ, quæ est Eglanteria, Rosam Dunensem sive Pampinulam. Cur Ger. pro Rosæ silv. odora, Angl. *Gerard's the Eglantine* or *Schere* *Erier* dicta, figuram *infus.* Tabern. Rosæ sylvestris posuerit, rationem non video: An Cam. h. Rosæ canina *κύνος* *κύνος* *κύνος* visis sepibus idonea?

C.B. pin. Rosæ silv. 4. sive foliis odoratis: Englantia, Ruell. Rosæ silv. altera, Trag. Gesl. h. Rubus canis, Eglanterium, Turn. Cynobatos, Lac. Rosæ 10. Cynorhodi, vel caninæ Rosæ odorata species, Dod. Rosæ silv. species altera, Lugd. Rosæ Eglanteria, Lob. Adv. Tab. & Eyf. Rosæ canina, Ger.

Provenit sponte Montebegardi ad collem, quem vocant Condemine & alibi, ut Basileæ, Genevæ & Lugduni,

Matth. re.
fautor.
Cynobatos
differre à
Cynorhodo.

Matth. re.
fautor.

Lugd. nota.
Tur.

Eglettina.
Cynorh.
veterum.

Locus
Campus.

Lugduni, mense Junio, hunc Augusto, nunc Septembri, etiam cum spongia. Dodonæo hortensis est, nec usquam in Gallia aut Belgio sponte vivit. Angliæ & Flandriæ hortis ad odoris gratiam colitur, sponte oritur in Bathonia Angliæ, proximis collibus non procul ab ædibus D. Laurentij Huyde, Lob. Hanc cum aliquando Gesnerus in hortuli sui loco umbrato plantasset, odorem amisit: tamen civis quidam alius partim in ipso muro hortuli sui, partim juxta, loco aprico, valde proceram, & suavissimi odoris, quem nectareum dixeris, annis quamplurimis illic vivam habuit.

ROSA EGLENTINA FLORE pleno.

Locus.

Eglentina.

Syls flore multiplici.

Cynorrh. duplex.



rim: ea siquidem vilior Plinio albicantibus foliis.

C.B. pin. Rosa sylv. sive flore pleno: Rosa canina duplicato flore, Cam.

ROSA SYLVESTRIS, FOLIO Eglantinæ virente, albo flore & rubello.

Alba.

Rubella.

IN Alsatia & circa Montbelgardum, in sepibus cum reliquis Rosis sylvestribus, genus quoddam provenit magnum, foliis quinis plerumque, ex virore nigricantibus, similibus Eglentinis rugis & colore, non tamen utillarum odoratis, præterea majoribus: rosæ sunt albæ: spinæ hinc inde per ramos aduncæ. Hujus aliam observavimus florentem Maio in Ducatu Virtembergico inter Stutgardiam & Esslingam, flore rubello.

ROSA SYLVESTRIS ALBA CVM rubore, folio glabro.

Deser. Folia. Flores.

Capita.

Rosa canina vulgo Dod.

ROSA nostra sylvestris, folio glabro, in magnos excrevit fructus, magnis armatis spinis: folia sunt satis magna, utrinque glabra: flores simplices, quinquefolij, albi, cum aliquo rubore, in medio stamina lutea: succedunt capita longa, primum viridia, deinde Coralli modo rubra, quæ ubi planè matura, mollia redduntur, lapidi gustûs, cum aliqua aciditate: à pilis, quibus semina involuta sunt, inter edendum, cavendum.

Dodon. sic describit: Ea quæ canina Rosa vulgo dicitur, Belgio familiaris, aculeatis virgis, & asperis



foliis, sativis similis est; singulis tamen minoribus: flos simplex, quinque folia non excedens, albicans, aut ex albedo colore purpureasces. Adnascitur hujus virgis aliquando pilula quædam hirsuta, echino Castaneæ quasi similis, at mollis, quam spongiolam Rosæ nuncupant.

Spongiola de pile Rosæ sylv.

Lugd. sic, Rosa sylv. quæ in Cynorrhodon Plinius appellat, foliis est asperis, aculeatis: rami furculis, ut in sativa spinis horrent, sed graciliores sunt, foliaque multo minora: rosæ ipsæ simplices, albæ, aut in albo purpureæ, ut in sativa, rubra cum matura sunt, in quibus semen lanæ opertum. In medijs ramis nascitur pilula quædam, hirsuta, à Plinio spongiola nominata. Hanc seplasiarum quidam Bedeguar appellant, non sine errore, cum Bedeguar Cardui genus sit. Sed nec Dodonæus, nec Compiler Lugd. videntur cognovisse discrimina Rosarum sylvestrium. Icon nostra ex

Cynorrh. Plinij.

Bedeguar de pile Rosæ seplasiarum.

Dod. & Lugd. nominantur.

Caner. valde placet. Est hæc illa planta quam Theophr. & Diosc. Canis vocant, & alij apud eundem Oxyacantham, malè meo quidem judicio: Melitis alij apud Plinium Cynosbaton, Cynospaston: alij autem Neurospaston cognominant: existimo tamen eum duas plantas miscere.

Cynobatos.

Oxyacantha malè.

Plin. notas.

Cord. in Diosc. ait *Canis* Canirubum Gazam apud Theophr. reddere, sed eundem fruticem alio nomine Cynorrhodon, Canis rosam, vocari: Esse autem nihil aliud, quam syl. & aculeatam hamatis spinis Rubum: esseque tres, aut quatuor ejus differentias, & ex omnibus hanc esse prociorem: Plinium Cynosbatum cum vulgari Rubo confundere, quosdam etiam hunc fruticem Arbutum esse credere, sed malè.

Canis rubus.

Cynorrhodon.

Rubus sylv.

Plin. error.

Arbutus malè.

Tragi judicio Rosa syl. prior ex purpura dilute albicans, sive vulgare sylvestris Rosa: i. genus, quod Germani *Wildhectrosen*, *Banbüttel*, & *Büttelrosen*, & spongiolas quæ huic adnascuntur, *Schleßfuntz* appellant, Cynorrhodon Barbari fuerit.

Cynorrhodon Barbari.

Dodon. g. Rosa 7. *Canis*, Rosa canina & Rosa sylv. Eid. hist. & de filor. Rosa 6. sylv. canina vulgo vocata, nonnullis etiam Canina sentis, flore albicante, aut ex albedo colore purpureascente, olim inodoro.

Canina sentis.

Holler. morb. int. Cynobaton: Eid. de compo. medic. Cynobati fructus detracta interiori lanugine Senella vocata. At Senella solet dici de Oxyacantha Matthioli, quæ commendatur ad calculum: quare videndum an ne ab Hollerio dux confundantur planta?

Senella.

Holler. nominatur.

Nescio, inquit Lob. in Adv. quæ sèculà invitum me nihil scire docere vult Matth. qui jam diu non novit, ne quidem postremò monitus agnovit Cynobaton, cujus duo fructus, ut nomenclaturæ sic effigiaturæ ex antiqua descriptione persimiles, certum me faciunt, aut saltem ea non carere nos hodie: Est autem frequentissimus Cynobatos Rubi persimilis, promensorem & fruticem Rosa sylvestris. An autem Rosa sylvestris fuerint ritè perspectæ Lo-

Matth. repreh.

belio, valde ambiguis, videant lectores.

Anguill. vocat Rubum caninum, Rosas albas sylvestres Galeni lib. i. comp. med. sec. loc. Cynomorion, & Oribasii Heliodoron: Plinium ait tradere in hac inventi planta spongiosam, vocatam Cynorhodon. Hanc Lob. spongiam Bedeguaris vocat. Tab. Rosam silv. & Cetrose/ non describit, ita ut nesciam an hanc vel sequentem intelligat. Gels. h. Rosam sylvestris Cynosbati vel Cynorhodi nomine veteribus dicta. Eid. cat. Cynorhodon, Rosa canina. Hanc aliquos à Cynosbato distinguere scribit non flore roseo, quem fert utraque, sed spongiolis quas Cynorhodo attribuit, & Cynosbato negat. Turn. eos errare scribit, qui Rubum canis & Canirubum, Rubum esse putent. Ger. vocat Rosam caninam inodoram, ejusque figuram assumpsit ex Tab. quæ posita fuerat pro Rosa Egletteria, cur muravit nescio. Hæc tandem est cujus turpis figura extat apud Lonice. nomine *Bagenbutten* & *Sandrofen*, & Cynosbati Dioscoridis.

C. B. Synon. C. B. pin. Rosa sylv. i. five flore odorato, incarnata; Cynorhodos Plinij & Barbari: Sentis canis & Cynosbatos, Brunf. Rosa sylv. Matth. Dod. odora, Ger. Cynorhodos [an n. hac Rosa pom. spinosa, folio hirsuto] seu Rosa canina, Thal. Rosa sylv. vulgaris, Lugd. Cam. ep. Rosa canina odorata & sylv. Lob. Rosa sylv. altior & spinosior, Cæf. Rosa canina, Camer. Cynosbatos & Rubi tertium genus, Lugd. Rosa sylv. odorigata incarnato flore, Eyst. Huic, ut & tertia [Rosa Egletteria plena] spongiola adnascitur, quam Plinius in Cynosbato, pilulam Castaneæ similem: in Cynorhodo spongiolam vocat. Passi in circa scrobes, folias & margines agrorum & pratorum locis, humidis provenire tradit Dodonæus. Ego diversis in locis diverso tempore florere observavi, ut Junio, Julio, Augusto, Septembri, Octobri & Novembri, ac etiam Spongiam ferentem.

Latius, cum tempore.

ROSA SYLVESTRIS, FOLIO glabro, flore planè albo.

Difer.



Folia.

Locus.

Tempus.

alba cum rubore, folio glabro, sed multum serpens, ramis quibusdam parum spinosis: Eadem passim in silvis & fruticibus provenit & circa itinera inter Montbelgardum, & Borongne, aliique in locis plerumque cum singularibus floribus, modò cum pluribus ut ante dixi: non floret Junio & Julio, tardius paulò quàm cætera sylvestres. Hæc demum fortè sunt Rosæ alba odoratissimæ quas reperi florescentes mense Septembri inter VVallenburg & Liechthal Basiliensium.

An Cordo in Diofca. Cynosbatos five Cynorhodos, aut Rosa sylv. 3. omnium minima, nec multum à terra elata, ac propterea *Herdrofen*, quasi Chamærhodos appellata. Cum nostra hac Rosa sylvestris non male videtur convenire Rosæ sylvestris Tragi 4. species, Rosæ 4. genus, *Cyanrosen* / *Sabersrosen* / *Feldrosen* five Rosa campestris, de qua ait: Rosas proferit prorsus candidas, odoris non tam jucundi ut tertij generis, silvestrium omnium Rosarum vilissima. In sicaneis agrorum quæ limitibus juxtaque itinera Junio & Julio mensibus in flore suo apparet. An Gels. h. Rosæ campestris Tragi species altera, Rosas prorsus candidas proferens. An Lugd. Cynorhodon, five silv. vulgaris Rosa passim in dumetis reperta ab Herbariis?

C. Bin. pin. Rosæ sylv. 4. speciem Tragi, facit Rosam silv. 17. five arvensem candidam: Cynosbaton verò tertiam Cordi, Rosam silv. 18. five campestris repentem.

ROSA SYLVESTRIS ALBA, CVM aliquo rubore, folio hirsuto.



Rosæ sylvestris *Difer.* genus hoc magnum ramosum, spinis hinc inde adjunctis, robustis, cui foliola quina, vel septena, subrotunda, rugosa, albicania, hirsuta, nonnihil odorata, minus tamen quàm Egletteria: flores quinquefolij, albi, cum aliquo rubore quorum pediculi spinulis asperi, circa Montbelgardum in sepibus & dumetis cum cæteris frequens est.

Hujus alia species *Varieta.* quædam à me reperta est mense Septembri in monte VVirtemberg, ubi sita arx Teck. spinis non curvis, sed rectis: foliola huic quidem etiam hirsuta, sed tenuiora, minus rugosa, angustiora, septena; in pediculi dorso rarè quædam spinæ.

Cord. in Diofca. Rosa canis, Cynosbatos quarta, *Cynosbatos* majora, quàm tertia omnium minima, & lanuginosiora [forte longiora & lanuginosa ut in margine *scripsit* Cordo,] & incana habens folia, & rosas in candido flaviter rubescentes. An Thal. Hæcyn. Cynorhodos alia flore paulò minore ex candido subiter rubescente.

ROSA CANDIDA PLENA ET femiplena.

Rosa alba assurgit virgis longis, lignosis, fungo- *Difer.* sis, in quibus spinæ acutæ, aduncæ, raræ; cortex aliqui politus & levis: foliola quinque vel septena, crenata, glabra, sublonga, quædam panè rotunda, pediculi dorso spinoso interdum: extremis ramis calices plures, ex pediculis spinulis non minacibus inhaerent, quibus apertis apparent rosæ pulchræ, odoriferæ: alba, multorum foliorum (interdum cum negligentur pauca producunt folia, nisi aliud genus sit) quorum interiora minora, exteriora v. majora & ampliora, in medio apices luteos includentia:

Fructus.

Cultura.

Icon.

Damasce-
na.Campana
Plinij.

denia: succē sunt
fructus rotundi,
rubri, ubi maturi,
in quibus grana
dura, lant involu-
ta. Hic frutex quia
procerior, ideo
melius frigus tol-
lerat, quā rubel-
la: ei putandi quo-
tannis ramuli qui
flores tulere. No-
stra Icon ex em-
ptiis non placet.

Dod. g. Rosæ 1.
genus, Rosa Da-
masce-na Italia;
Rosa alba Gallia;
Campana Plinij.
Eid. fl. & hist. Rosa
sativa i. vulgò Ro-
sa alba, Rosa spi-

neola Plinij, si modo ejus Campana non sit.

Lob. Ad. Rosa sativa cādida. Gesl. h. Rosa alba hor-
tenses multiplici folio: Rosa vilissima, albicantes;
Monachorum alba Rosa, que & Centifolia. Eid. coll.
Math. & Apollinari Rosa alba. Trago, Rosa hor-
tensis multiplex alba. Tab. Ger. Anguill. & Lugd.
Rosa alba. Cam. h. Rosa alba, candida simplex &
plena. Ryff. in Diosc. Rosa flore albo. Cæf. Rosa
parva quinque foliis constans candidis: & eadem
multifolia, fortè Prænestina Plinij, quæ celebra-
tissima, novissimè definit.

Rosæ albas Campanas esse existimat Lugd. cæs-
que omnium vilissimas tradit, demptis Damasce-
ris. Addit quādam esse foliis densissimis, ut antiquo-
rum Alabandica: has Spineolas fuisse arbitrat &
Centifolias.

Syn. C. B. C. B. pin. Rosa sativa 9. sive alba vulgaris major,
Campana Plinij: sativa alba, Brunf. Rosa domestica
alba, Matth. Rosa a. candida, Cæf. [hæc nobis est la-
cteola, de qua m. x.] Hujus flores foliorum numero
variant: hinc Rosa flore albo pleno & simplici,
Eyslett.

Long. nomi-
na. Germ. Weisse Rosen/ Weiss garten Rosen. Belg.
Witte Roosen. Gall. Rosées blanches. It. Rosa bianche.
Ang. The white Rose.

Locus &
Tempus. In variis locis vario tempore floret, ut Maio &
Junio, Octobri & Novembri. Cæstardissimè floret,
& perdurat usque in Autumnum. Amarior hæc &
majorem vim purgandi habet.

ROSA LACTEOLA.

Rosa lacteola, elegans, non magna, foliis mul-
tis, dense stipatis: quæ singula, si evelluntur,
candida sunt, cum verò simul calyci inhaerent, in
flore integro videtur quidā dilutus rubor emicare.

Locus. Vratilavia: copiosè in hortis coli dicitur, unde
etiam ad nos proveniunt. Hæc Centifolia Plinij vi-
detur, numerosis foliis & parvis. Nec tamen est talis
odoratissima, quamvis reliquis odoris præstantia
parum cedat. Extremos veluti margines in coro-
nis aptè ornat, quod exigua sit, Cam.

C. B. pin. Rosa sativa 10. sive alba minor.

Ethac, me judice, illa est, quam Cæsalpinus quar-
to loco tradit, maximè omnium numero folio
constantem, sed parvo odore valde exili, quam Plin-
ium Alabandicam vocare scribit, vilio-rem albican-
tibus foliis: & Spermoniam plurimis
foliis sed minutissimis, vilissimam,
non multo odoratani.

Candida
numerosis
folio folio.

Alabandi-
ca.

Spermonia.

ROSA HUMILIS, FLORE
albo Clusij.

Rosa 4. Clusij humilis est & fruticosa, foliis illi Desf.
quæ album florem fert, persimilis: sed ejus flo-
res, licet albi, longè minores, neque unquam planè
se se explicantes, ejusdem cum alba vulgari odoris &
coloris, qui tamen plus carnei ad mistum habet. Pau-
lò serius illa floret. Hanc primùm observabat autor Loc. &
in cultiss. D. Ioan. Aicholtzj horto, unde illam ad- Tempus.
quisivisset, ignorantis: Deinde Francofurti ad Mæ-
num, in quorundam Patriciorum hortis. Plurimum
autem accedere videtur, ad Græculam Plinij.

C. B. pin. Rosa sylv. 6. sive odorata albo flore: Ro-
sa sylv. humilior, Cæf.

Græcula
Plinij.

ROSA MOSCHATA MAIOR.



Rosa Moschata Desf.
floribus maio. Flor.
ribus, albis, frutex
est robustus, rectus,
spinulosus, ut Mo-
schata minor: in ra-
morum summicitibus,
ex pediculo raris
aliquibus spiris
aculeato Rose ena-
scuntur, plerum.
que quinque aut
septem foliis con-
stantes, magnæ, al-
bæ cum aliquo ru-
bore, qui potissi-
mū detegitur cum
exsiccantur. Odore
suavissimo floret
Junio. Genevæ in Loc. &
hortis, non facilè
laditur à frigore.

Hanc florentem Maio observavi, etiam Clarevallæ
in oppido Burgundia, unde transtuli Montbelgar-
dum in hortum, ubi quotannis ferè partes superio-
res gelu absumuntur.

Lob. Ic. Rosa moschata major species. An de hæc
loquitur Cæf. Rosa candida, quæ ex translatione in
Campania & circa Philippos aded profecit, ut latif-
sima & maxima folia provenirent, non tamen odo-
ratissima, quam Centifoliam vocant; Muscatula a-
pud nos appellatur ob odoris excellentiam: sed quæ
opere topiario colitur, caudice cæteris crassiore: ra-
mis longissimis: aculeis rarioribus.

ROSA MOSCHATA MINOR
flore simplici.

Hæc jam olim à me sic descripta: Rosa Moschata Desf.
Hæc magnos habet stolonos, rectos, crassos, statim à radice
prodeuntes, in quibus spinæ rariæ, interdum Spræ-
à trunco rubræ ac robustæ: rami tactu essent læves,
nisi interdum spinæ intervenirent, in quo quiddam
habent commune cum Rosæ albis sativis, ac diffe-
runt ab Incarnatis vulgò dictis, quorum rami undi-
que valde spinosi. Folia satis rara quæ non multum
differunt à Rosæ albis & incarnatis, nisi quoddam min-
us rugosa, & magis acuta, glabra superne cum viridita-
te, inferne albidiora cum pilis vix apparentibus, in
circuitu serrata, quæ ut plurimum habent septem
foliola, interdum novem, majori ex parte sibi invicem
opposita, in foliorum pediculis parte inferna

Spræ

Rami.



Vires.

Apices.

Odor.

Nesfrin A.
virens.Muscata
Nesfrin.Damasc.
na.Spinosa
Linn.Alexandri
na.Damasc.
na.Nesfrin
Bell.Nesfrin AL
h. v. linn.
enst. &
pandit
Nesfrin
Monach.

spinæ valde adun-
ce. Rami extremi
divisi in alios mi-
nores, qui quadam
quali lanugine ob-
ducitur & rubent,
pauci habent folia,
abundantque mul-
tis floribus simul
coherentibus qui
priusquam se ex-
pandant longa ap-
parerit capitula, mol-
lia & hirsuta. Aper-
tae rosæ vix diem
durant, & medio-
cris sunt magnitu-
dinis, albae, habent
nonnunquam un-
gues rubentes, qui
lutei sunt prius-
quam expandun-
tur, constantes singulae quinque foliolis: apices lu-
tei foliolis decidentibus nigrescunt: relicto in me-
dio uno magno, hirsuto, clavum aliquatenus expri-
mente. Odor cum suavitate insignis, moschum ut
benè ait Dodon. proximè referens, sapor amarus,
astrictionis non magnæ paruces, aliquam acrimo-
niam in faucibus relinquens.

Auctores sunt Monachi in Mesclum Avicen-
nam cap. de Nesfrin, vel Nesfrin, sive Neflerin, loqui
de Rosâ hac parva sylvestri alba, vulgò dictâ Dama-
scena, seu Damalchina, & à nonnullis Rosâ musca-
tella. Ang. Nesfrin serapionis, *M. schette* Rosæ sim-
plices. Sylv. & Ryff. Rosâ moschata. Matth. Rosæ
Hetruscorum Damascenæ, *Moschetti* vulgò dictæ,
de quibus ut ipse credit, non est intelligendus Mes-
sue, quod eas illi facile incognitas fuisse existimet.
Has enim veteribus cognitâs fuisse (quod sciat) me-
morat prodit nemo: ni forte esse eas credamus, quæ
Plinio spinicolæ appellantur, quæ cæteras excellunt
odore. Lob. Adv. & Obs. Rosæ Moschata. Eid. Ic.
Rosâ Moschata flore simplici. Dodg. Rosæ sativæ 6.
genus, Plinio Rosâ Coroneola, Neoterici Rosâ se-
ra & Rosâ Autumnalis, Belgis *Wijstet rooskens*.
Eid. de flor. & hist. Rosâ sativâ 5. Hetruscorum Ro-
sæ *Moschetti*, ubi Coroneolam Plinij esse posse tra-
dit, eamque Damascenam nonnullos appellare, flo-
re ut plurimum simplici. Gesl. h. Rosâ moschum
fragrans: Rosâ muscata simplex: Moschata vel Alex-
andrina vulgò, & ab aliquibus Damascena appel-
lata. Is se audivisse scribit eandem marinas à nonnul-
lis vocari, colique jam in hortis circa Verbanum la-
cum, sed fortè genus diversum esse: Monachos in-
terpretes Messue Nesfrin vel Nesfrin Arabicè hunc
fruticem vocare, aliâs Rosam putare. Item in app.
ex Anguill. Rosam Moschatam, vel Damascenam,
Alexandrinamve Nesfrin Serapionis vocat. Idem ta-
men lib. de Quadrup. Rosam Moschatam esse Nes-
frin Avicennæ negat, his verbis. Rosâ Damascena
seu Muscatella vulgò dictâ inter sylvestres annu-
merari potest: quam Avicenna Canone 2. c. 314. Nesfrin
vel Nesfrin, vel Neflerin nominat, ut Bellunen-
sis interpretatur, cujus hæc sunt verba: Nesfrin est Rosâ
odoris acuti, quæ vulgò in Hispania & Barbaria Ro-
sâ Muscata dicitur. Damasci est Rosâ Nesfrin vel Nes-
frin, & est species Rosæ sylvestris. Simon Ianuensis
etiam & Pandeclarus, Neflerin vel Nesfrin, autori-
tate Alhavi dicunt esse Rosam sylvestrem & albam,
quæ in frutice spinoso ut sativâ nascatur. Serapio
Nesfrin vocat, & ab aliquibus Rosam sylvestrem &
Rosâ n. Seni nominari scribit. Monachi in Mesuem
alibi etiam Nesfrin Rosam parvam, sylvestrem al-

bam interpretantur cui Avicenna & Serapio ean-
dem facultatem attribuant, quâ præditum est Zam-
bacum vel Ieseminum, sed infirmiores: ut in pen-
ria Olei Zambacini, oleo de Nesfrin, id est, Rosâ Da-
mascenis uti liceat. Nesfrin, inquit Avicenna, calidus
& siccus est ordine tertio. Omnis species (pars) ejus
vim habet abstergerendi & attenuandi, sed flos præci-
puè. Nervis frigidis prodest. Vermes aurium occi-
dit: & tinnitum earum tollit. Dentium dolorem mi-
tigat. Sylvestris in hoc genere frontis in capitis do-
lore illinuit. Prodest guttibus & confusis abscis-
sibus. Drachmæ quatuor inde potæ, de sylvestri præci-
puè, vomitum & singultum hñunt. Hæc Avicenna
de Nesfrin. Sed cum planta sit calida & sicca in ter-
tio, & eadem ferè quæ Zambacum efficiat, Rosâ
eam adnumerare non possumus: neque enim ulla
nobis Rosarum species sive fativâ, sive sylvestris co-
gnita est, quæ tertio gradu calfaciat, & illa præstet,
quæ plantam Nesfrin præstare ex Avicenna nunc re-
citavi. Quamobrem aliam esse oportet Rosam Da-
mascenam sive muscatam vulgò in Italia dictam: cu-
jus Matthiolus etiam meminit, perquam odorife-
ram esse scribens, colore albo, & ventri movendo
cæteris efficacior. Ego loco Nesfrin Ieseminum
vulgò dictum, aut Leucoia potius quam ullum Ro-
sarum genus usurpare malim. Nesfrin, id est Zamba-
cum sylvestre calidum est & siccum: & calidi tempe-
ramenti, caput lædit (& vel sanguinem è naribus a-
liquando suo odore elicit) Rafis. Idem apud Serapi-
onem, vidi, inquit, in Coracem qui dabant folio-
rum ejus duas aut tres ad summum drachmas unde
venter admodum movebatur. Nesfrin est sicut Nar-
cissus, Avicenna & Aben Mesuai: ego Narcissum
hic falsò legi video, sive authorum, sive interpre-
tum aut librariorum hæc culpa sit: nam neque for-
ma, cum sit frutex Rosæ similis, aut saltem magnitu-
dine par: neque vires cum Narcisso conveniunt.
Fieri quidem potest ut ea vox corrupta sit pro Iese-
mino. Quamquam rursus in Narcisso etiam apud Se-
rapionem scribitur, Narcissum esse efficere quæ Iese-
minum. Sed legendum est Nesfrin, non Narces (sic
enim Narcissum vocant) ea præstare quæ Iesemi-
num, ut Avicenna & Mesarugie docent. Serapio qui-
dem, vel citatus ab eo author vocum affinitate faci-
lè falli potuit. Est autem Zambacum sive Iesemi-
num frutex floribus odoratis, quem Galli & Itali e-
tiamnum Ieseminum appellant, docti quidam Ias-
minum, & Vnguentum ejusdem nominis, Dioscori-
di descriptum, ex floribus ejus confici arbitrantur.
Ego eundem fruticem Vergilij Cassiam esse puto,
apibus gratam, ut pluribus in apium historia doce-
bo. Quod si Nesfrin Ieseminum sylvestre est, ut Ra-
fis scribit, non rectè Avicenna hujus plantæ genus
sylvestre privatum nominaret, sativum etiam genus
ejus alterum esse intelligendum relinquens. Cum
de Sambaco, id est Iasmin (sic enim Bellunen-
sis hæc vocabula scribit) seorsum agat. Scribit autem Sam-
bacum calidum & siccum esse ordine tertio, & ole-
um ejus prodesse nervis frigidis, in senibus præ-
sertim, sed odore suo, caput lædere, quod Dioscori-
des etiam de Iasmino tradidit unguento. Sed sive
Sambacum sylvestre hæc planta est, sive similis ei, sat
fuerit intelligere eandem utriusque facultatem esse:
Sambaci tamen efficacior paulò: & nullum pro
eo Rosarum genus substituendum. Rosæ quidem
nomen (vocant enim Nesfrin aliqui Rosam agre-
stem, & Rosam leni, ut apud Serapionem legimus)
non satis est ad probandum propriè dictæ Rosæ
hanc speciem esse: ut neque Violæ propriè dictæ ge-
nera sunt, quæ vocantur Leucoia Dioscoridis, &
Leucoion Theophrasti. Oleum de Nesfrin utile est
adversus pleuresin ex atra bile, & uteri dolores, A-
ben Mesuai. Hæc Gesl. cujus argumentum mihi
non

non, satisfaciit, quo negat Rosam moschatam esse Nefin Avicennæ, quod desumptum est à viribus. Rosæ enim muschatæ sunt calidæ, & prætare posse videntur quæ Avicenna attribuit Nefin. Sylvio Rosarum calidissimæ sunt, ex odoris gravitate insigni sapore quoque amaro, cum acrimonia & adstrictione non pauca. Sylvestre etiam Nefin si est Rosa nostra sylvestris, optimè respondet viribus et attributis ab Avicenna, quæ contrariæ in quibusdam facultatibus & viribus Rosæ Moschatæ. Ieseminum quod Gesnerus loco Nefin sumere mavult, nobis non videtur calidius Rosa Moschata: vires à Rhafi adscriptæ non repugnant: odor ejus non minor quam Iesemini, cerebrum valenter feriens, & caput tentans, Amato. Quod Serapio scribit de purgandi vi, optimè convenit Rosæ Moschatæ, quæ violentè purgare non notavit enim Amatus purgare non minus quam Scammonium, ac ideo abstinendum ab eis suadet: historiam recitat mulieris, quæ ex gustato condito harum rosarum, faucium & linguæ excoarctationem cum stomachi rosione contraxerit. De Iesemino id non constat. rosā mosch. simplex flore est satis simili Narcissi flori, qui roseus. Odor etiam vehemens, nec vires tantum differre putamus, quantum putat Gesnerus: perpendantur vires Narcissi à Dioscorido traditæ.

Synon. cum
nominib.
linguar.

Cam.h. Rosa Damascenæ quasi de Sceni apud Arabas, sive Muscatæ simplici flore & præcoxi, ex albo flore ad purpureum nonnihil vergentem habentes. A quoniam quæso præterquam à Cam. observatus est talis color in Rosā Moschata. Tab. Rosa muscata alba, Weiß Muskat Rosen/ Damascen Rosen/ Biesem Köstlin. Lugd. Rosam Coronæolam sive seram, sive autumnalem, Damascenam esse cum pluribus autumnat, tūm quod autumno proveniat, tūm quod odore suavi prædita sit: Gallic. Rose Musquée, & Muscadelle. Ital. Rosa Moschata: Tradit præterea ex Damascenis unam quinque tantum foliis esse, eam florere Maio, æriterum Septembri. Et hoc nemini mirum videri debere ait, quod sint etiam septembri Rosæ bifera. Ger. Rosa muscata simplici flore, Angl. The simple muscat Rose. Belg. Ghemeyn en eel muscat Roosc.

Damascena
biflora.

C.B. pin. Rosa fativa u. sive moschata simplici flore, Nefin, vel Nefin Serapionis, Ang. Rosa muscatula, Cæsal. Rosa alba Damascenæ s. simplici, Cast. Rosa Damascenæ (quasi de Sceni apud Arabes) simplici flore, Eyst. Hæc minor est & major. Rosæ muscatæ cum silv. tum domesticæ, rubræ, albæ & viridis, Bellon. lib. de cult. meminit.

Montbelgardi copiosè floruit etiam Autumno, sed tandem gelu confecta est frigoris rigidioris impatiens. Montpelij floruit qualis descripta est, Autumno & mense Maio: Lugdunubi frequens, vidi florentem Augusto, Septembri & Octobri; Genevæ etiam Novembri. Floret in Italia ut audit Gesnerus toto ferè anno: Augusto vix ante Autumnum.

ROSA MOSCHATA MINOR, flore pleno.

Deser.

Rosa Moschata flore pleno similis est simplici, habens in flore foliola exteriora majora, interiora minora: Videtur Lobelio sylvestrem exuisse animum obitorum arte & mangonio, & hortensis dupla facta.

Synon.
Damascena
sive Au-
tumnalis.

Lugd. Rosa Damascenæ, sive Autumnalis altera, densa foliorum congerie, & eximii odoris suavitatem delectans. Gesn. h. & Ger. Rosa muscata multiplex. Dod. Rosæ fativæ species rarior multiplex. Lob. Adv. & Ic. Rosæ moscata. Tab. Rosa muscata alba multiplex. Cam. h. Rosæ Damascenæ flore ple-

Muscatæ
multiplex.



C.B. pin. Rosa fativa u. sive moschata fl. pleno, Synon. C.B. Coroneola Plinij: Rosa muscatula multifolia, Cæsal. Rosa alba Damascenæ fl. pleno, Cast. Eyst. Rosa Coroneola altera, Lugd. Prænestina Plinij, aliorum.

Ger. Deuffe gefalt Muscat Rosen Belg. Debe Ling. nomina. b. l. Muscens Roosc. Ang. The double Muscat Rose.

Rosæ Moschatæ duplæ coniunguntur & eitantur passim in Italia, Venetiis præsertim: alvum jucundius, Lob. sed vehementius cient, & animi deliquia, stomachi cordisque lancinationes accerunt. Sed quam jucundè cient alvum, si tam prava symptomata excitant evacuando, videant lectores.

Lob. taxat.
tur.

ROSA SVCCCHARINA PLENA.

Anno 1603. Maio mense in horto fontis & bal. Deser. Ancei admirabilis, occurrit Rosa hæc alibi non visa, spinis multis, ut Incarnata, horrida, cui & folia ferè similia, utrinque pilosa, quinque vel sex foliolis constantia, ad pediculi originem lata, veluti duæ auriculæ, crispiora, quam Incarnata: capitula hispida, breviter, crassa: flori color ruber. Aiebat hortulanus vix in totum explicari eam Rosam Idibus Iunij.

ROSA LVTEA.



Rosæ lutea & speciosa est Rosæ lutea, spinosis virgis, foliis glabris quinque vel septenis, vix tantulum horridis: floribus luteis simplicibus, cum gravitate odoratis: pomio brevior, ventris flore: repit & multum se propagat. Hanc ita de Rosa aurea lineat Lugd. Rosa Securina lutea veteribus in multis, dicta, aurea dicta, quod luteo aureo, ve colore fulgeat, à cæteris Rosarum generibus foliis, floribusque distincta.

pans: Nam parva ejus folia sunt, retunda, oblonga viridita.

viriditatis, valdè infecta, incisurarum trenis propemodum rigentibus, caulibus valdè spinosis, flore aureo sive luteo, cætera aliis simili, sed simplici & quinque tantum foliis constante, odore gravi atque ingrato: accusanda natura quæ florì egregio suavem odorem, id est, roscum invidit, quo si non caret, haud postremum locum inter flores excellentes obtineret, delapso flore poma succedunt adèb Sorbis similia colore, figurâ, & interdum magnitudine, ut imperitus ac inexercitatus, ea vix a Sorbis discernat.

Synon. Bellon. Rosæ Alexandriæ, & totius Ægypti, flore luteo sine odore. Card. rer. var. Rosa crocea malè olens. Gesn. h. Rosæ citrinæ seu luteæ, quam Augustæ ali inodoram audio (& vulpinas cognominari) fructe tamen odorato : Eid. Rosæ Indica magnæ, coloris aurei, VVeisselæ. Sed quid si fortè VVeisselæ intelligebat florem majorem Affricanum Lob. Adv. & Ic. Angl. Carn. h. Tab. Ger. Cast. & Cæf. Rosa lutea. Dod. fl. & hist. Rosa 8. sive Rosa sylv. lutea dicta. Matth. Rosa quædam Italiæ aureo colore fulgens, sed odore admodum ingrato atque insuavi.

Rosa lutea C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea simplex: Rosa lutea, fl. simplici, Eyf. *Locus.* Luteam Rosam Ægypti & Affricæ plerique in hortis nunc habent, florentem Maio & Junio. Rosas luteas cû aliàs sæpè vidi, inquit Lob. Argieria Affricæ, ex Numidia Galliz inquilinas factas: tam in Angliæ consimiles, solerti manu in Genistæ scapum insertas, unde colorem viridique mutantur novas. Si Lobel. vidit cur non demorstrat discrimen inter naturales & insitione mutatas: certum est Rosas luteas omnes, quas hæcenus conspexi non solum colore, sed etiam formâ florum, foliorum & stolonum, posse distingi vires expertus cur non indicat ubi & quomodo. Scribunt aliqui Rosæ albæ furculum facto foramine per Genistæ scapum tractant, luteos flores producere.

Locus. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea simplex: Rosa lutea, fl. simplici, Eyf. *Locus.* Luteam Rosam Ægypti & Affricæ plerique in hortis nunc habent, florentem Maio & Junio. Rosas luteas cû aliàs sæpè vidi, inquit Lob. Argieria Affricæ, ex Numidia Galliz inquilinas factas: tam in Angliæ consimiles, solerti manu in Genistæ scapum insertas, unde colorem viridique mutantur novas. Si Lobel. vidit cur non demorstrat discrimen inter naturales & insitione mutatas: certum est Rosas luteas omnes, quas hæcenus conspexi non solum colore, sed etiam formâ florum, foliorum & stolonum, posse distingi vires expertus cur non indicat ubi & quomodo. Scribunt aliqui Rosæ albæ furculum facto foramine per Genistæ scapum tractant, luteos flores producere.

Locus. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea simplex: Rosa lutea, fl. simplici, Eyf. *Locus.* Luteam Rosam Ægypti & Affricæ plerique in hortis nunc habent, florentem Maio & Junio. Rosas luteas cû aliàs sæpè vidi, inquit Lob. Argieria Affricæ, ex Numidia Galliz inquilinas factas: tam in Angliæ consimiles, solerti manu in Genistæ scapum insertas, unde colorem viridique mutantur novas. Si Lobel. vidit cur non demorstrat discrimen inter naturales & insitione mutatas: certum est Rosas luteas omnes, quas hæcenus conspexi non solum colore, sed etiam formâ florum, foliorum & stolonum, posse distingi vires expertus cur non indicat ubi & quomodo. Scribunt aliqui Rosæ albæ furculum facto foramine per Genistæ scapum tractant, luteos flores producere.

Locus. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea simplex: Rosa lutea, fl. simplici, Eyf. *Locus.* Luteam Rosam Ægypti & Affricæ plerique in hortis nunc habent, florentem Maio & Junio. Rosas luteas cû aliàs sæpè vidi, inquit Lob. Argieria Affricæ, ex Numidia Galliz inquilinas factas: tam in Angliæ consimiles, solerti manu in Genistæ scapum insertas, unde colorem viridique mutantur novas. Si Lobel. vidit cur non demorstrat discrimen inter naturales & insitione mutatas: certum est Rosas luteas omnes, quas hæcenus conspexi non solum colore, sed etiam formâ florum, foliorum & stolonum, posse distingi vires expertus cur non indicat ubi & quomodo. Scribunt aliqui Rosæ albæ furculum facto foramine per Genistæ scapum tractant, luteos flores producere.

Locus. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea simplex: Rosa lutea, fl. simplici, Eyf. *Locus.* Luteam Rosam Ægypti & Affricæ plerique in hortis nunc habent, florentem Maio & Junio. Rosas luteas cû aliàs sæpè vidi, inquit Lob. Argieria Affricæ, ex Numidia Galliz inquilinas factas: tam in Angliæ consimiles, solerti manu in Genistæ scapum insertas, unde colorem viridique mutantur novas. Si Lobel. vidit cur non demorstrat discrimen inter naturales & insitione mutatas: certum est Rosas luteas omnes, quas hæcenus conspexi non solum colore, sed etiam formâ florum, foliorum & stolonum, posse distingi vires expertus cur non indicat ubi & quomodo. Scribunt aliqui Rosæ albæ furculum facto foramine per Genistæ scapum tractant, luteos flores producere.

Locus. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea simplex: Rosa lutea, fl. simplici, Eyf. *Locus.* Luteam Rosam Ægypti & Affricæ plerique in hortis nunc habent, florentem Maio & Junio. Rosas luteas cû aliàs sæpè vidi, inquit Lob. Argieria Affricæ, ex Numidia Galliz inquilinas factas: tam in Angliæ consimiles, solerti manu in Genistæ scapum insertas, unde colorem viridique mutantur novas. Si Lobel. vidit cur non demorstrat discrimen inter naturales & insitione mutatas: certum est Rosas luteas omnes, quas hæcenus conspexi non solum colore, sed etiam formâ florum, foliorum & stolonum, posse distingi vires expertus cur non indicat ubi & quomodo. Scribunt aliqui Rosæ albæ furculum facto foramine per Genistæ scapum tractant, luteos flores producere.

Locus. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea simplex: Rosa lutea, fl. simplici, Eyf. *Locus.* Luteam Rosam Ægypti & Affricæ plerique in hortis nunc habent, florentem Maio & Junio. Rosas luteas cû aliàs sæpè vidi, inquit Lob. Argieria Affricæ, ex Numidia Galliz inquilinas factas: tam in Angliæ consimiles, solerti manu in Genistæ scapum insertas, unde colorem viridique mutantur novas. Si Lobel. vidit cur non demorstrat discrimen inter naturales & insitione mutatas: certum est Rosas luteas omnes, quas hæcenus conspexi non solum colore, sed etiam formâ florum, foliorum & stolonum, posse distingi vires expertus cur non indicat ubi & quomodo. Scribunt aliqui Rosæ albæ furculum facto foramine per Genistæ scapum tractant, luteos flores producere.

Locus. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea simplex: Rosa lutea, fl. simplici, Eyf. *Locus.* Luteam Rosam Ægypti & Affricæ plerique in hortis nunc habent, florentem Maio & Junio. Rosas luteas cû aliàs sæpè vidi, inquit Lob. Argieria Affricæ, ex Numidia Galliz inquilinas factas: tam in Angliæ consimiles, solerti manu in Genistæ scapum insertas, unde colorem viridique mutantur novas. Si Lobel. vidit cur non demorstrat discrimen inter naturales & insitione mutatas: certum est Rosas luteas omnes, quas hæcenus conspexi non solum colore, sed etiam formâ florum, foliorum & stolonum, posse distingi vires expertus cur non indicat ubi & quomodo. Scribunt aliqui Rosæ albæ furculum facto foramine per Genistæ scapum tractant, luteos flores producere.

ROSA LVTEA FLORE PLENO.

Locus. *Amudud* Clusius flavas Rosas, multiplici foliorum serie præditas, extare accepit: Viëna enim Austriæ ad ipsi scribebat nobilis Matrona, ejus ipsi factam esse spem. Et certè paucis post annis intelligebat non modò Matronam illam similem plâtam adquisivisse, sed etiam Pragæ in Cæsareo horto alitum in quibusdam Germaniæ locis repetiri apud eos qui in colendis peregrinis & elegantibus plantis operam collocant. Inter illos Frid. Majerus Argentinenfis, anno 1601. digitalis longitudinis ramulum binis foliis præditum & florem sustentem flavum multiplici foliorum serie constantem, ad eum mittebat, sed prorsus aridum: sed & anno insequente ab eodem accipiebat similis Rosæ furculum sine radice, spinis armatum, perinde ac hi qui florem flavum simplici quinque foliorum texturâ constantem ferunt, atque foliis illius prorsus similibus.

Syn. C. B. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea multiplex: Rosa flava plena, Clus. hist. & ap. 2. & cur. post. Rosa lutea maxima flore pleno, Eyf. Hæc duplex, altera florem totum expandit: altera verò semiclauso flore permanet. Germ. Geel Rosen. Gall. *Rose jaunes.* Angl. The yellow Rose.

Syn. C. B. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea multiplex: Rosa flava plena, Clus. hist. & ap. 2. & cur. post. Rosa lutea maxima flore pleno, Eyf. Hæc duplex, altera florem totum expandit: altera verò semiclauso flore permanet. Germ. Geel Rosen. Gall. *Rose jaunes.* Angl. The yellow Rose.

Syn. C. B. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea multiplex: Rosa flava plena, Clus. hist. & ap. 2. & cur. post. Rosa lutea maxima flore pleno, Eyf. Hæc duplex, altera florem totum expandit: altera verò semiclauso flore permanet. Germ. Geel Rosen. Gall. *Rose jaunes.* Angl. The yellow Rose.

Syn. C. B. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea multiplex: Rosa flava plena, Clus. hist. & ap. 2. & cur. post. Rosa lutea maxima flore pleno, Eyf. Hæc duplex, altera florem totum expandit: altera verò semiclauso flore permanet. Germ. Geel Rosen. Gall. *Rose jaunes.* Angl. The yellow Rose.

Syn. C. B. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea multiplex: Rosa flava plena, Clus. hist. & ap. 2. & cur. post. Rosa lutea maxima flore pleno, Eyf. Hæc duplex, altera florem totum expandit: altera verò semiclauso flore permanet. Germ. Geel Rosen. Gall. *Rose jaunes.* Angl. The yellow Rose.

Syn. C. B. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea multiplex: Rosa flava plena, Clus. hist. & ap. 2. & cur. post. Rosa lutea maxima flore pleno, Eyf. Hæc duplex, altera florem totum expandit: altera verò semiclauso flore permanet. Germ. Geel Rosen. Gall. *Rose jaunes.* Angl. The yellow Rose.

Syn. C. B. C. B. pin. Rosa sylv. n. sive lutea multiplex: Rosa flava plena, Clus. hist. & ap. 2. & cur. post. Rosa lutea maxima flore pleno, Eyf. Hæc duplex, altera florem totum expandit: altera verò semiclauso flore permanet. Germ. Geel Rosen. Gall. *Rose jaunes.* Angl. The yellow Rose.

ROSA SUBVIRIDIS ET carulea.

Syn. C. B. *Si* in teneras Agrifolij arbusculas Rosæ inserantur, virides flores producere scribunt aliqui apud Camerarium. Quamvis interdum anni constitutio-

ne frigidiore & humidior, herbacei coloris rosæ, si ne calyce provenientes, cuius causam Costæus de natur. stirp. explicat.

Hæc est Rosa sativa 16. sive Rosa subviridis, C. Bauh. pin.

Est & jam diu videre, ut refert Lob. & ex hoc Lug. *Rosa Carn.* Caruleas Rosas in hortis Italiciis. Sed optarim ego *les.* scire hortos, si extent, ubi proveniant, & qua in re differant à cæteris Rosis.

ROSA SEMPER VIRENS, Clusio.

*M*ittebat ad me, inquit Clus. Pataviq. Ioachimus *Locus.* *M*ungermannus anno Christi 1592. cuiusdam Rosæ semen, cujus schedæ inscriptum *Rosa semper virens*: ex eo Francofurti terræ commisso nata sunt plantæ, quæ mirificè quidem luxuriarunt, sed nulla florem protulit, præter eam quæ translata in Academico Lugduni Batavorum horto alebatur, cujus *Tempus.* flos denum anno 1605. conspectus est Julio mense, magnâ sanè meâ lætitiâ: valde enim metuebam ne ad eam adulta nullum florem proferens, soli mutatione sterilis evasisset. Multis porro hæc Rosa statim à radice luxuriat fæmentis flexibilibus & caducis, nisi quis palo sustineat, aut ad parietem applicet: nam non valde crassa sunt, sed lenta, viridia, spinis rubescentibus, hami instar aduncis & mucrone versus terram converso obstita, ut pletaq. ferè omnia Rosarum genera, eaque alternatim ambiuntur à foliorum alis, septem interdum, sed quinque ut plurimum, foliis præditis, ex adverso sese spectantibus: horum duo quæ latiori alæ sed, quæ rami amplectitur, proxima, minora sunt, bina alia quæ succedunt illis duplo panè majora, quantum extemam alam occupans, & imparcem numerum faciens, omnium maximum: singula autem à nervo medium folium occupante aliquot venas habent ad folij oras excurrentes, in ambitu sunt serrata, & præ viriditate splendent, nec desuunt ut in aliis Rosis, sed etiam hieme permanent: eam ob causam Rosæ semper virentis nomen illi inditum. Novo verè ex flagellis illis *Nominis* five fæmentis è foliorum alis multi oriuntur *notatio.* velli ramij, initio quidem cum foliis non nihil purpurascens, deinde verò colorem viridem contrahentes: quorum nonnulli summo fastigio ternos aut quaternos gerunt flores uncialibus gracilibus petiolis subnixos, quinque foliis penè uncialibus constantes prorsus nivei candoris, è quorum medio plura staminula prodeunt candida, flavis apicibus insignita, & inter illa capitellum hirsutum albicans. Floris odor suavis est, & ad Rosæ moschatæ simplicem quinque foliorum seriem habentis odorem valde accedit; sed nec ipsius floris forma valde dissimilis.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

C. B. pin. Rosa sativa 13. sive Rosa moschata semper virens si albo, Clus. hist. app. alt. auct.

ba, incarnata, moschata, quamvis recentes odoratissimi sint, tamen siccata sunt in odore: rubra contra recentes parum odoris reddunt, siccata jucundissimum & diuturnissimum jaculantur. Ex agro montoso petroso Pruni urbis, unius diei itinere à Paradisi distat in universam propè Galliam omnium præstantissimæ convehuntur, in territorio tamen Parisiensi non insuaves præsertim vico cui Fons Najadum nomen etiam vulgò est, larga manu luxuriant fabulosis vineis, quæ urbi totis satis esse possint, ut Pestanas & alias præcis celebratas rosas, non desideremus. Rubras admodum foliis paucis & planis præditas præfert Mesues. Rosæ tardius collectæ parum diu servantur, & citò nigrescunt, temperativè lætæ biennio servantur: cum igitur mediocriter sunt apertæ, mox integrè insolentur, sæpè movendæ, deinde folia avulsa, vase terreo claudantur, ne odor aut color pereat. Si quo die sunt lætæ sol non luceat, rare disponuntur, ne se corrumpant densata. Rosæ igitur mediocriter apertæ sereno calidè manè lætæ eodem die ut sunt, siccantur sole, si potes, sæpè vertendo. Nam vix umbra sicca veritèr quamquam id esset optatius, siccatas avelle, & recondere, ut dictum. Meliores montanæ campestribus, & minus minuuntur siccando, cum ex harum libris decem siccatis libr. unica supersit quibuldam, idem de Violis. Hæc Sylvius, qui de rosarum trituratione & siccatione pluribus agit, quæ si cupidus scire desiderat, ipsum leges. Rosæ cum absolute scribuntur, rubra sæpè & verè rubedinis ex Monachis intelliguntur. Vbiunque autem petuntur rosæ recentes, si non habentur, faciendum est potius sine eis quàm cum siccis. Et de contra scilicet in defectu siccarum non sunt apponendæ recentes. Quamvis hoc rarissimè in aliqua urgenti necessitate possit accidere. Quia facilis possumus siccare Rosas tempore suo, quàm extra tempus congruum invenire recentes. Idem autem Monachi (salvo semper meliori iudicio) in defectu Rosarum recentium, ponendum succum ipsarum putant. Et propriè drachmam pro uncia, scilicet quòd pro qualibet uncia rosarum recentium, ponatur drachma vel circa, ex ipsarum succo. Præstantissimæ, quæ punico colore rubent: proxima laus illis, quæ in rusum candiant: vilissimæ albicantes in quarum tamen genere, ex odoratissimæ excipiuntur, quæ Hetruscis Damascenæ, & aliis Moschettæ vulgò dicuntur. Siquidem non modo cæteras excellunt, quòd odore admodum suavi fragrant, sed quòd etiam magis alvum subducant, id quod indicat eorum jucundissimus odor. Hæc Marth. An jucundissimus odor indicet magis alvum subducere judicent alij. Idem, sunt Rosæ rubra minus odorata albis, quæ verò purpureæ, sunt omnibus odoratiores: croceæ autem etiam malè olent. Hujus quidem rei reddit rationem Cardanus: Rubra, inquit, nimis sicca sunt: accidit autem, ut in tenui substantia, citò siccum exhalet, velut & in sylvestribus: alba autem, quoniam nimis humida sunt, non tam benè olent, retinent tamen magis odorem: purpureæ cum temperata sint, optimè olent, & diu retinent odorem. Croceus colos in plantis fit, evanescente calore nativo: sed non croceus qualis croci, sed qualis competit rosis, & qualis palcæ & foliorum arelescentium, unde odorem potius terrum efficit. Si Rosas toto anno habere velis, flores semi-apertos sub vespere proinde serro, manui ne tangas: nocte serena sub divo habeto, manè fictili vitreato recondere, vas obtura, sepelito in arena sicca. Alius modus: siccatas rosas madefacito aqua rosacea, inde per quinque dies in vase sigillatim sepelias. Alii, præcisos botros circumliga filo, in arundine

To.n.ii.

pone, claude os cæra & sepeli. Sed longè melius Palladij experimentum, decerptos enim botros arundini virenti & plantata discisso nodo impones, & nodi partes coire patieris, abscissa arundine, cum opus fuerit botros excipe & aqua tepida fove. Nos accipimus folia Vitis, & modico sale aspergimus, rosarumque boltres interponimus ad modum strati superstrati, ac simul omnia ad vsum cum aceto in vase vitreo foliis Vitis superpositis benè obturato natantia conservamus.

ROSARVM VIRES ET
usus.

Dioscoridem potissimum de rosis rubris scribere, ex sequentibus ejus verbis satis constare arbitror. Rosa, inquit, frigefacit & adstringit. Sed sicca [Znpe, Marcell. nap. recens] magis adstringit. Succum autem exprimere oportet è teneris, fornice defecto eo quod unguem vocant: reliquum autem exprimere, & in mortario terere in umbra, ita ut assidue vertantur, ne situ corrumpantur. Facit id quod aridis rosis in vino coctis exprimitur, ad dolorem capitis, oculorum, aurium, gingivarum, sedis [Saururus, vulg. exempl. Sa. n. vi.] intestini recti, & uteri, penipallitum & assusum. Ipse verò citra expressionem contusa & imposita, ad præcordiorum inflammationes facit, & ad ignes sacros. Sicca verò trita femora [Znpe, unguentis, femina verrit Ruell. & Sarracenus: in quibusdam exemplaribus errore forè Typographi legitar: sic] asperguntur, & compositionibus antheris dictis, & vulnerariis antidotis ammiscentur. Utuntur etiam ad medicamenta ornandis palpebris commoda. At qui in mediis Rosis reperitur flos, is siccus aspersus ad gingivarum fluxiones facit. Capita verò pota, alvum fluentem, & sanguinis rejectionem cohibent. De Rosis ita passim Galenus: In Rosæ natura aliud gustantibus acerbum est, quod terreum ut sit & crassum frigidumque necesse est: aliud verò amarum, quod tenue est & calidum, & tertium in his aqueum, necessario quidem frigidum, sed in tenuitatis crassitudinisque oppositione quadantenus summorum medium, cujus mistura neque ipsum illud acerbum, neque ipsum amarum summè est tale, quale dicitur: qualitates enim omnes exoluit aquri admixtio. Ipsum itaque hoc aqueum elaboratum, extenuatumque, atque exalfactum quodammodo videtur, ac perinde facile in vaporem solvi, & hac ratione rosam tum odoratam esse, tum celerrimè resicari. Atque hæc omnia de eo ex gustu conicias. Rosarum flos magis etiam ipsis rosis adstringit, ac proinde sanè etiam exicatorius est. Quin rosas experiri cuidam suasi, sensistque in nocturnis veneris imaginationibus ex his substratis levamen citra ullam renum noxam. Liceat repetantur Medicorum plerique qui experientia posthabita, an rubra sit rosa, an benè olens, considerant, negligentes ubi caput ipsis exafluat, coronis ex Rosa contextis, capitiq; impositis, aut succo ejus, aut oleo rosaceo, sic vel ipsi experientiâ, id quod res est, discere. Nam si exallicant, magis etiam calida fuerit: sin refrigerentur, frigida: quod perinde est, atque refrigerandæ humanæ naturæ facultate pollere, &c. Et profecto experientiæ quidem ratio tam facilis est, cum in rosis, tam in cæteris medicamentis omnibus. Nam Rosis aut coronari liceat, aut eis contritis hominibus æstantis os ventriculi illinere, aut succum eorum expressum obicere aut oleo aquave mistis aliquam corporis partem consficare. Sed quid

vires.

vires.

Siccarum.

Alvum solu-

Temper. ex

Galeno.

Imagina-

triones Ve-

neres.

HISTORIAE PLANTARVM

40

hæc multis commemorato, cum nonnulli miltum Opobalsamo, rosarum succum sub canis ardoribus refrigerij causa corporibus inungant, usu videlicet ipso docti, cum hoc fecerint abunde refrigerare, &c. Verum rosa illis nequaquam his in rebus propinqua est: tamen quod ad caloris tepiditatem & essentia tenuitatem attinet, perquam sanè & ipsa inflammationibus in hypochondriis consistentibus utilis esse possit, nisi adstrictio (quæ una quocumque illi inest) multatiam læderet, quæ maximè iis obest, in quibus Chamæmelum præcellit, nempe condensata corpora rarefaciens, indurata molliens, tensa relaxans. Nam iis omnibus inimica adstrictio est. Attamen ad ascensum augmentaque inflammationum, ac potissimum earum quæ in exterioribus membris extant, Chamæmelo rosaceum præferitur: quippe cum hæc tepida caliditate cum leni adstrictione indigeant. Eademque ratione, idem caput ab odore rosarum, iuvare consentaneum est, cum à solis exultione laborat. Apud Plinium de rosis sequentia comperimus. Excalcatoria & rosacea [Corn. lincum cum rosina imponitur ex calcatoria. At rosa adstringit &c. primum rosaculum ad superiora refert] uteros attingit, refrigerat. Vfus ejus dividitur in folia & flores. Folium siccatur, aut tribus modis exprimitur. Per se, cum unguis non detrahuntur: ibi enim humoris plurimum. Aut cum detractis unguibus, vacua pars aut oleo, aut vino maceratur, in sole vas vitreis. Quidam & sale admiscet & Anchusam nonnulli, aut Alpalathum, aut Iuncum odoratum, quia talis maximè prodest vulvæ ac dysentericiis. Exprimiuntur eadem folia detractis unguibus, trita, per linteam spillum in æreum vas, lenique igni succus coquitur, donec fiat crassitudo mellis. Ad hoc eligi oportet odoratissima, quæque folia. Vfus succi ad aures, oris ulcera, gingivas, tonsillas, gargarizatus, stomachum, vulvas, sedis vitia, capitis dolores. In febre per se, vel cum aceto ad somnos, nauticas. Folia utuntur ad callibepharam. Et sicis femina [sanctæ a forte melius] asperguntur. Epiphoras quoque arida leniunt. Flos somnum facit. Inhibet fluxiones mulierum, maximè albas, in posca potus, & sanguinis excretionēs. Stomachi quoque dolores, quantum [sanctæ a forte melius] in vini cyathis tribus. Semen his optimum crocivum, nec ancilulo vetustius: & in umbra siccatur. Nigum inutile. Dentium dolori illinitur. Vrinam dicit. Stomacho imponitur. Item igni sacro non veteri. Naribus subductum caput purgat. Capiti pota sanguinem & ventrem solvit. Ungues, rosæ epiphoras salubres sunt. Hæc enim oculorum rosæ sordescunt, præterquam in initio epiphoræ, ita ut arida cum pane imponatur. Folia quidem in initio stomachi roborantibus & vitis ventris, & intestinorum & præcordiis utilissima vel illita. Cibo quoque lapathi modo condiantur. Cavendus in his situs celeriter insidens. Et aridis & expressis aliquis usus. Diapasmata inde fiunt ad sudores coëcendos, ut à balneis inarescant, corpori, dein frigida abluantur. Sylvestris cum adipe urino alopecias mistice emendat. Vfus rosæ in coronis propè minimus est: [per amicus legendum, ut videtur ex ver. legisse Ruellius, nimis] Oleo maceratur, idque jam à Troianis temporibus, Homero teste. Emplastris atque colliriis infertur mordaci subtilitate. Melsarum etiam delictis inungendis minimè noxia. Rosa ut complacet Mesue, est frigida primo gradu, sicca secundo, ex substantiis diversis etiam separabilibus composita: aquea quidem mediocri & terrea adstringente, materiam ei multam præbentem: ætera verò dulci & aromatica: ignea denique tenui à qua est amaritudo, robur, perfectio & forma. Ignem tamen substantiæ vis, quæ ruborem & speciem impressit,

valentior fuit quàm quæ amaritudinem. Ob id hæc sola siccatione perditur, illis adhuc permanentibus: quæ si perierint, non magis rosa fuerit, quàm homo mortuus est homo: recentes tamen sunt amaritudo magis: quàm adstringentes. Ob eamque amaritudinem rosæ recentes, succo præsertim purgant: siccata verò resoluta caliditate amaritudinem excitante, substantiam stypticam & consistentem ostendunt. Succus autem rosarum calidus est, propè ad primum gradum, quia est à substantia terrestris & frigida secretus: purgat, resolvit, aperit, terget. Sicca verò rosa est frigidiore, & magis styptica & ea magis, quæ non fuit perfecta, & alba magis, quàm rubra. rosa præterea resolvit, interperies calidas extinguit: partes cogendo & conspiciendo roborat: id autem semine & pilis in calycis medio inventis maxime. Cuius autem in rosæ tinturæ, & albæ, & albae foliorum mulcorum, vel paucorum: crispiorum, vel plenum: in utroque genere est præstantior, cui color genuinus est perfectior, & folia ad sunt pauca & plana. Albæ nihil aut minimum purgant, potentius tamen adstringunt & roborant quàm rubra. Succus completarum est melior, idemque & aqua, in qua recentes & perfectæ sunt macerata: purgat bile flava sanguinem venarum & arteriarum: Confert utero, quia obstructions ventriculi & hepatis aperit & expurgat. Cor, ventriculum, hepato roborat, cordis tremorem sanat, vacuitatem ejus causa. Febribus biliosis confert. Eadem partem roborat: oleum rosatum & aqua sublimando ex rosis educit. Corrigendo substantiam ipsarum laxam, facultatem retentivam roborant, inflammationem omnem extingunt, & ab ea dolorem sedant, somnum conciliant: coryzam tamen & sternutationem excitant, catarrhis obstruunt, astringunt, & guttur, & roborant ea, crampulam auferunt. Rosæ cum sit medicamentum benignum, sed ad purgandum imbecillum, adminiculis quibusdam eget, ut sero lactis, melle: succi enim rosarum uncia una cum seri lactis uncia duabus, aut tribus, & pauca Spica, commodè vacuat: foliorum quoque in sero lactis infusorum, cum paucis melle expressum sine molestia purgat. Syrupus quoque ex succo rosarum, & rosis ipsis est elementem purgatorius. Oleum verò Rosatum, valentium medicamentorum, ut Scammonij, Euphorbij, acrimoniam potu obtundit, & noxam à liccitate Myrobalanorum corrigit: ut oleum violarum, Amygdalarum dulcium, Sesaminum, Omphacium. Rosa melle condita tergent, purgant, roborant: saccharo autem minus tergent, magis roborant, & adstringunt. Aqua cui infusa sunt rosæ, mundum facit, terget, purgat: per sublimationem, verò facta, multum roborat, non purgat: quia subtili: ejus caliditas igni est dissoluta. Acetum Rosatum inflammationes omnes sedat, incidit, purgat, roborat. Rosa præsertim recentes, coctionem nullam sultinent, facultas enim earum tergens, & purgatoria, mox igni resolvitur, remanet calidior, substantia jam manifestior. Succus autem earum medio-criter coquendo fit tenuior, & potentius terget. Oleum præsertim Omphacium cum rosis, ut periculis infusatum, valentius refrigerat & adstringit. Oleum verò dulce, ex maturis olivis expressum, vel Sesaminum cum rosæ perfectis infusatum, potentius resolvit. Datür Rosarum succus ab uncia una ad uncias duas & syrupus autem cum succo earum ad uncias duas, ab uncis duabus, ad uncias quinque.

Non video (inquit Monardus) à Grecis, neque ab Averrh. inter purgatoria medicamenta reponi rosam, experientia tamen ipsa, colloari inter ea Rosa pot debere ostendit: cui etiam Diosc. consentire videtur. Rosaceum unguentum vires habere dicens, ad solvendam alvum conducentes. Quod dicitur scilicet, Rosam

Inflammationes.

Vires ex Plinio.

Plin. corrigitur.

Succi yssus.

Pulsis.

Semen ver.

Vrinam dicit.

Capiti purgat.

In cibis conditum.

Diapasmata.

Temperamentum Mesue.

Purgant recentes.

Succus calidus.

Qua rosæ sum frigidiore.

Quæ præstantior.

Infusio rosæ cum lacte purgat.

Roborat.

Oleum rosatum.

Inflammationes.

Medicamentum.

Crapula Rosarum.

Mel rosaceum.

Aqua ex rosæ.

sublimationem.

Acetum Rosatum.

Rosæ colliguntur.

non non substantia.

Succus rosarum.

conspiciuntur.

conspiciuntur.

conspiciuntur.

conspiciuntur.

conspiciuntur.

conspiciuntur.

Rosam deperditā rubedine non plus esse Rosam, quam homo mortuus. Hoc dictum valde est ambiguum: neque ex rubore speciem habet rosa: alioquin alba rosa, rosa non esset: colore etiam deperdit, servari odorem adhuc visum est & adstringendum. Sed respondetur Manardus Mesuem non habere rationem coloris quatenus ruber, sed quatenus, ut Sylv. dicit, Rubor signum inseparabile est formæ

Manardus
notatur ex
Mesue de
generum.

Rosarum
succus frigidus, con-
tra Me-
sueum.

Ratio:

Medica-
menta e
rosis facta,
frigida vi-
dentur.

Rosa co-
cus parit
tempera-
mentum
frigidum.

Ex odore
huius tem-
peraturæ
naturæ
non inve-
stiganda.

Tom. II.

tur, ut ex gustu. Quod si cavillator arguat, quod partes tubæ superiores Rosæ, sunt eæ, quæ calorem ministrant ipsi succo, hoc potius esset attribendum infusioni rosarum, in quam permeant partes illæ subtiles rubæ, quæ dant ei amaritudinem & ruborem. Quapropter potius dijudicarem infusionem habere vim solutivam, quam succum. Mesues autem non ad aliud infusionem saccharo confectam comprobatur, quam ad morbos calidos, febrium adustiones, pectorisque calorem. Sed nec ex colore succi rosarum, quoniam rubeus sit, calidam temperiem possidere dixeris. Neque enim calcem (inquit Gal. lib. de Ther. ad Pisonem) quod candida sit, visu duntaxat frigidam judicare, satis esse censemus: neque rosam quod rubea sit, idem illam calfacere, statim pro certo habemus: sed unâ cum visu sensum quoque tactus adhibentes, calidam quidem illam, adeo ut urat, certo invenimus: Hanc verò quod frigiditatem e contrario in ea tactu percipimus, ex refrigerantium numero esse, firmiter habemus persuasum. Patet enim ex eodem Galeno lib. simpl. per colorem temperaturam medicinarum non esse dijudicandam. Aëtius quoque sub primo §. in frigidandi ordine, Oleum rosaceum, ipsamque adeo rosam collocat: & sub secundo ejusdem rosæ succum. Præterea Galenus §. 5. & 10. m. m. succum rosarum esse intensæ frigiditatis nos docet. Quibus clarius sole demonstratur, Mesuem hallucinari in cognoscenda temperatura succi rosarum. Sed & ciplemet sibi repugnat, multis in locis (ut in lib. suo de rectificatione medicinarum acutarum, præsertim ubi de rosæ, & scammonio loquitur) demonstrans, succum rosarum frigidam potius temperaturam quam calidam possidere: quoniam tum ad medicinas valde calidas, tanquam frigidum rectificans adhibet: & tum ad morbos calidos biliososque, ut febres cholericas, & inflammationes extinguendas medicinis commiscet: & ad repellendum, comprimendumque veluti in angina, pro ultima in frigidatione, succo rosarum utitur. Et hæc potissimum sunt rationes, propter quas nullam aliam in succo rosarum, constituto temperaturam, quam frigidam. Neque omnino in hoc est culpandus Mesues, sed interpres, qui hunc locum vitavit, qui pro frigido, calidum esse succum interpretatus est. Hactenus Manardus, qui complures alias rationes de temperatura succi rosarum frigidam in medium adducit, quas brevitate gratia misis facimus, quas si ulterius cognoscere cupis, leges ejusdem tractatum de Rosa, ejusque succi temperamento.

Sylvio rosa omnis amara est atque astringens, præcipue rubra, à qua substantia refrigerat, siccatur: Rosæ autem ejus astringit magis, proinde etiam siccatur valentius: præstantissima est, quæ longè omnino suavissima, & aliis rubicundior. Succus essentia est tenuissima, nam celeriter acescit, & lentore caret, & unguentorum omnium odores exolvit & obscurat. Ex rosæ calidissima videtur Moschata, post hæc Calidissima, rosæ colore insignes, Incarnata dicitur, quæ & cerebrum valenter ferunt, paulò minus albæ. Folia decem recentia, alvum cuidam decies duxerunt, ut a Tagaultum, refert Rasis. Siccata autem folia, quia ab eis recit amarior, laxativa non sunt, sed styptica, & adstringentia. Decoquit Tragacanthæ pulvis foliorum rosæ andorum, in dimidia mensura vini albi & exhibet his, qui fluxionibus alvi laborant, aliquoties per diem bibendum. Quod si morbo producto, calor conjunctus fuerit, cum aqua rosæ confectionem instituit. Semina dura, quæ capitibus Rosarum insunt in pulverem redacta, ac è vino pota, calculum apud eundem pellere traduntur. Easdem facultates nonnulli spongiosis (germ. Schlämungen vocatis) quæ silvestribus, adna-

Temperari
curat rosa
ex colore
non dicit
dicanda.

Mesues sibi
repugnat.

Mesues ex-
misatur.

Folia 10.
purgant.
Sicca, ad
fluorem
alvi.

HISTORIAE PLANTARVM

52

scuntur rosis, si in pulverem redactæ aut in vino decoctæ calidæ fumantur, tribuunt. Succus è fructu rubeo maturo, totaq; sua substantia tuso expressus, posteaque siccatus, demumque in pulverem redactus, gonorrhææ, & tam rubris quàm albis mulierum mensibus singulari experimento medetur. Rubra illa capita, antequam maturitate mollescant, integra conservantur & siccantur, & ad prædictas affectiones vino decoquuntur & potantur.

Gonorrhæa. quod etiam medicamentum & dysenteriz & cruentis excreationibus unice prodesse experientia non semel docuit. Omnia rosarum tam sylvestrium quàm domesticarum genera refrigerantis sunt & adstringentis naturæ, præsertim verò rosæ sylvestres atrox. Sylvestrium rosarum maximè earum quæ *Haberrosen* appellantur aquam distillatam nonnulli majoris faciunt, & efficacioris credunt, quàm domesticarum. Ea namque quibuscumque calidis affectionibus prodest, refrigerat namque & reprimat omnes cholericas & acres exhalationes, & cor in deliquio animi confortat. Ad confectiones quas vocant, Manus Christi, & Zuparium rosatum, primo loco eas quas vocant *Haberrosen*: secundo quas *Frauenrosen*: tertio rubras domesticas eligit Tragus. Aqua ex rosis nunc commemoratis distillata, doloribus capitis in linteolis imposita, neque non fronti pari ritu applicata epiphoris oculorum unice prodest. Virtus, inquit Langius, rosarum laxativa, & odorifera, in supernis ejus partibus consistit: at altioria & roboris alitrix in internis delitescit. Fuchsius ex Simeone Sethi has adscribit rosis facultates. Odorata calidis capitis prodest, humida verò offendit, eaque distillationi obnoxia reddit. Sumpta verò febres ex flava bile procreatas juvat, & roborat stomachum & jecur. Proprietate autem quadam testes lædit, prohibetque acres exhalationes ne in caput ferantur. Spongiolæ ac fructus Cy-norrhodi mitificæ valent contra calculum, & Urinæ difficultates si lævigatæ in pulverem exhibeantur. Nos contra Fuchsiū nihil facimus ad calculum & urinæ difficultatem nec femina, nec spongiolas, ob eorum astrictionem & siccitatem, nisi fortè profint per accidens eo modo quo scribit Dodonæus, cujus verba postea ponemus.

Testes lædi Fuchsi opinio de fructu spongiolæ.

Succus ut placet Matthiolo, medicamentis componendis expetitus, præstantior è puniceis elicitur, item ex subrutilis, verum huic infirmior facultas. Dilutum Græcis ἀραιωμένη, è quo rhodopharmacum alvum innoxie depiciens conficiunt, plerumque ex subrubescensium maceratis aqua foliis paratur: etsi hac in re iis Damascenæ Hetruscis vocatæ longè præstent: quippe ex earum vicinis devoratis foliis faciliè quidem, & citra noxam subducitur alvus. Albicantes deinde rosæ (Damascenas tamen exceptas vult Matth.) non alium sibi in Medicina vendicant usum, quàm ut ex le aquam stillent: siquidem iis dejectoria vis, qua pollent puniceæ, ac subrutilæ, multò infirmior inest. Quamobrem videtur Manardus immeritò id Mesui vicio vertisse. Nam albæ, quas Damascenas appellant, etsi majore deijciendi vi cæteris præstent: credendum tamen est de iis non intellexisse Mesuem, quòd eas illi faciliè incognitas fuisse exilimet: verum de iis alius tantum, quibus passim rosæta florent, cujus rei illud maximo argumento esse potest, quòd Damascenæ Hetruscis vocatæ nuper in Italia florere cœperunt, quòdque eas veteribus cognitas fuisse (quod sciat) memorie prodiderit nemo: ni fortasse eas credamus esse, quæ Plinio spincolæ appellantur. Sylvestres majore adstringendi facultate sunt prædictæ quàm suavæ, sed minori fragrantia redolent, atque deijciendæ alvi ne tantillum quidem facultatis retinent. Idem in hist. Germ. Pucis excalcatis

& extoratis ab urina circa pendenda aspergendus pulvis Rosarum. Ex calicibus distillatur optima aqua adversus omnia profluvia, utilis illachrimantibus oculis. Vernes in spongiolis dicuntur potentiores esse ad calculum, ipsis spongiolis. In apolog. adversus Amathum, nihil, inquit, ad me atinet de illa, quam adducit, muliercula Amathus: Primum sèpius ipsemet id sumpsi medicamentum aliisque frequenter dedi sine ullo proflus incommodo, adeò ut quandoque pueris felicissimè propinaverim. Præterea mansa hæc rosa nullam penitidus gustui relinquit acridinem, etiam tantum se ostendit adstringentem, tum etiam subamaram. Id quod manifestè indicat, ut nulla faucium, aut linguæ erosio, in inflammatione hinc degustantibus accedere possit. Mihi enim hæc rosas sæpè mandanti, ut quandoque adstrictam excitare alvum, nihil erosionis, in inflammationisque accessit. Quòd sit ut quis rectè opinari possit delusum esse Lusitanum, utpote qui hujusce medicamenti facultatis penitidus ignarus, symptomatis illius causam in illud perperam rejecerit. Cùm potius credendum sit id ab acrimia falsorumq; succorum de fluxu provenisse, qui fortè fortuna eo tempore, quo rosaceum illud saccharum mulier illa sumpsit, à capite in eas partes labi cepit. Atque magis sanè demiror, quòd tam acriter damnaverit has Damascenas rosas odore perquam suavi fragrantis, è quibus clementissimum illud paratur medicamentum nullo penitidus incommodo alvum ducens. Præter id, eo ignoranter pervenisse constat, ut cerèd sibi persuaserit Ieneliabin è Persicis rosis paratum, de quo pluries in febrium curatione & ventriculi dolore meminit Avicenna, ex Persici arboris floribus parari debere: sed quæ falsà teneatur opinio, ipsa ostendit medicamenti nomenclatio, quippe Ieneliabin Mauritanis omnium præclarissimorum Medicorū consensu nihil aliud designat quàm Mel rosaceum. Constat enim per rosas Persicas nihil aliud voluisse Avicennam, quàm Puniceas. Siquidem lib. ubi est de medic. compos. omnium egit, de quibus in universo meminit volumine, Ieneliabin ad febres, & ventriculi dolores parari jubet è rubris rosis, non autem ex Persici arboris floribus. Id quod manifestè indicat, nil aliud Persicas rosas Avicennæ designare, quàm Puniceas, Persicas illi fortasse vocatas, quòd à Persis in suas venerint regiones. Nam & nos Damascenas vocamus eas, de quibus diximus, quòd è Damasco Syriæ primò ad nos pervenerint. Et hæcenus Matth. qui videtur causam rubedinis in rosis tribuere calori: statuerq; è rosis rubras subrubetibus esse calidiores: dicit enim, ab aëro verò & subdulcem, & odoratum saporem assumunt: Ex his demum, que ignis naturam sequuntur, amarorem concipiunt, ac etiam coloris rubedinem, que scilicet rubicundæ spectantur. Quo fit, ut plus insit calor puniceis quàm subrubentibus. Sed hoc Matthioli argumentum infirmum esse, constat superius ex Manardo. Quàm porro utiliter lotionibus, & clysteribus, ad inhibendas fluxiones ungues, qui ab autonibus nullam propriam receperunt dorem, inferantur, judicet alij. Plinius dicit ungues epiphoris salubres esse.

Excortatis infantum a urina: Calculi Rosas Dæi menses non infalsas bres contra Amatum.

Persica Rosa non sunt flores Persici ut Gualt. Amatus.

Persica Rosa non sunt Punicea. Ieneliabin è rosis rubris.

Matth. opinio explosa.

Amato ex quibus rosis Zuccharum rosaceum fiat. Sympus.

Amato ex quibus rosis Zuccharum rosaceum fiat. Sympus.

Sylvestres majore adstringentes.

Manardus repreh.

Delectum rosa pro compositionibus.

Testes lædi Fuchsi opinio de fructu spongiolæ.

Dolores capitis. Langius.

Aqua distillata.

Rosa sylvestris.

Temper. Trago.

Dysenteria.

Gonorrhæa.

præcipue si ex illis. mel rosaceum soliatum fiat: nam uncia hujus mellis rosacei, cum strepitu, & alvi turbatione levi, purgare in corpore mediocri, ter & quater facit, ut millies expertus est Amatus, illud pro laxante medicamento ægotantibus propinans. Nec enim dicendum vult, ut multi medicamenti hujus vires ignorantes contendunt, conditum hoc mellis ratione tantum purgare, quum mel coctum parum aut nihil purget, imò mel crudum ciendi vim habeat, quàm in coctione amittit, ut Hippocrates testatur lib. de morbis qui extra, & Galenus lib. 3. de alimentis cap. 33. non minus Paulus Ægineta lib. 1. suæ medicinz cap. 96. hoc ut solet approbat, inquit; mel coctum valentius nutrit quàm subducit alvum, non coctum è contrario. cui ad stipulatur Alex. Aphrodisius lect. 2. problem. 66. dicens, mel incoctum tergit & purgat, coctum alere tantum potest. Ex quibus liquet constare, rosis iis vim laxandi & subducendi insitam & naturalem esse: non verò ex melle acquisitam.

Ex iis igitur rosis, syrupus rosatus solutivus multarum infusionum dictus nobile & securum purgatorium medicamentum parari debet, prout in universa Italia magno ægotantium juvamento paratur, qui Amati sententia efficacior & nobilior evadit si aquæ loco, cum rore è cælo super ipsas cadente pareatur, vel saltem super caulibus ex quibus rosis vel pruinæ magna copia haberi potest. Sunt præterea, inquit, alia rosæ albæ ac citrinum tenentes, parvæ, pauca folia habentes, quæ ferè per totum annum in arbore videntur, quas Moschatas, quia Moschi odorem referunt, vel Alexandrinas vulgus appellat. Hæ verò, odore caput tentant, & potentissimè alvum subducunt, non minus ac Scamonium, ita ut si sex vel octo acetario folia miscueris, totum acetarium purgatorium reddas, & ea de causa ab illis, tanquam pernicioso medicamento, naturæ vim inferente, abstinendum suadeo. Nam non ita pridem Venetiis nobilissima Beatrice a Lina, mulier opulentissima, in morbum quandam incidit pro quo juvando, Medicus quidam Venetus, ex prædictis rosis & saccharo conditum parare fecit, ut eo tanquam præstantissimo, & securo purgatorio medicamento interdum uteretur: at quum primum præclara illa domina, conditum gustare cepit, faucium & linguæ excoriationem cum stomachi rosione contraxit: sed illa dubitans, num symptomata ea ex morbo, aut condito orta essent, nullam in medicamentum culpam rejecit. Ego verò noscens medicamentum potentissimum & ferè venenum esse, eam monui, ut ab illo abstineret, nec eo amplius uteretur, putaverat enim hæc domina conditum illud ex rosis incarnatis à nobis dictis paratum esse, quo alias Antuerpiæ sæpè usa erat. Hæ verò rosæ moschatæ in Hispania rarè videntur: sunt enim albæ, subcitrinæ, limiles, ut paucis dicam, rosis caninis inter spinas nascuntibus, quæ ad summum tria quatuorve folia habent. Non mirum igitur est si Hispani iis Rosis moschatis carentes, dubitent, num incarnatæ à nobis dictæ, quæ ut solutivæ sunt, & apud ipsos reperiantur, Moschatæ vel Alexandrinæ dicantur. Sunt enim longè differentes: rosæ autem hæc moschatæ, Alexandrina sive Damascena dicta, albæ ac citrinum inclinans, est omnino fugienda: Incarnata verò rosæ, quæ inter rubram & albam media est, rubricatæque, longè alia est, quæ ut præstantissima & nobili solvente medicamento uui suaderem: Quia enim in maxima copia habetur per universam Italiam Rosæ hæc, ideo ex ea syrupus rosatus solutivus, sive novem infusionum, mirus paratur, aded ut illius unicæ tres

abique noxa ullâ malos è corpore humores pellant. An verò Ienchabin de rosis Persicis, apud Avicennam multis in locis citatum ex aliqua rosarum dictarum paratur? Respondeo quod non, quia Avicenna ex floribus Persicæ arboris, mel rosatum, sive Ienchabin, confici suadet: vocat enim flores istos interpretes Rosas: proinde ornata nonnullæ officinæ, ex illis syrupum paratum habent, morbis pituitosis admodum convenientem. Sicut enim flores isti, naturæ purgatorii, pituitam & lentes humores, ac crassam bilem depellentes.

Rosarum foliola, inquit Dodon. quia ex diversis partibus constant, dissimiles etiam facultates obtinent; quæ tamen in singulis non similiter se habent. In uno siquidem genere: terrestres & adstringentes: in alio humidæ & aquæ: & in aliis spirituosæ & æthereæ partes excellunt. Prædominantem autem omnes frigidam habent temperiem, proximam tamen temperiei mediæ, ex primo videlicet ordine refrigerantium. Superant quidem humidæ, æthereæ & spirituosæ partes in candidis, dilutè rubentibus, nec non in Damascenis sive Moschatis. Ex tribus his liquor, ea de causa, elicitur gratissimus & suavissimi odoris, qui ferè ex aliis rosis inodorus est. Vtilis autem Rosarum hæc stillatitia aqua, cum ad cordis roborationem & spirituum reparationem, tum etiam ad omnia quæ clementer refrigerari possunt: tragematis, placentis, condimentis & aliis, quæ voluptatis excitandæ gratia conficiuntur multis, eadem admixta, saporis gratiam conciliat: oculorum calidos dolores mitigat: somnum inducit, quem & ipsæ virentes rosæ, odore suo suavi provocant. Succus harum rosarum e-

tiam candidarum, alvum lenit & subducit: efficacissimus earum quas Damascenas vocant: proximus dilutè rubentium, quarum frequentior usus. Idem præstat earundem dilutum, & quod ex eo coquitur Drosolum sive Serapium: Officina syrupum rosatum solutivum nuncupant, quod ex infuso sive diluto apparari debet, in quo pluries rosarum virentium folia multa macerata sunt. Ad leniendam autem sive subducendam alvum utile, quando expurgatione aliâ potentiori, aut opus non est, aut uti non expedit. Nam præter ea quæ in intestinis hærent excrementa, aut in proximis & primis venis cruda, pituitosa & subinde biliosa, alia non educit; si non aliis quibusdam potentioribus medicamentis permisceatur. Humeat potè & refrigerat Serapium istud, idèb. etiam febrium ardentium calores nimios sedat, & viscerum inflammationes mitigat, sitim extinguit: debili autem & humido ventriculo parùm utile, nam cum laxiore debilioreque relinquit. Simile possunt & folia harum rosarum saccharo condita, præsertim si manibus tantummodo contrita, ac diligenter cum saccharo permixta, igni admodum incalcant, & potius quàm decoquantur. In rubentibus, quæ passim sunt vulgares, & aliis saturatæ purpuræ, quas Provinciales appellant, plus est terreæ substantia, & resiccantis adstringentisque facultatis, non tamen absque humido quodam permixto; quod quidem ipsi adhuc virentibus iri est: in resiccatis verò deperditum est. Succus hæc de causa, & dilutè virentium earum, ad alvum subducendam quoque facit, minus tamen quàm aliarum prædictarum. Resiccata autem hæc Rosæ humiditate jam absumptâ, adstringunt & resiccant, refrigerant quoque, sed minus quàm virentes: robur cordi conciliant, ac tremori & palpitationi ejus succurrunt: hepatis, renes, & alia viscera debilia confirmant: ventriculum flaccidum, debilem & humidum siccant & corroborant: fluorem muliebrem & superfluum menstruum purgationem compescunt.

*Ienchabin
Avicenna
ex Persicæ
floribus*

*Candidæ,
dilutè
virentis, &
moschatæ.
Aqua*

Succus.

*Drosolum
Serapium
ex plus ibid.
infus.*

*Rubricæ
Gul.
ex Provin-
ciis.*

*Siccata
virentis*

*Mel coctum
atque
Urgat.*

*Syrupus ro-
satus solu-
tivus.*

*Moscha-
tis abstin-
endum.*

*Sex folia
purgant.*

*Faucium
excoriatio
condito ex
Rosis Mosch.*

*Per se Gene-
num.*

*Rosæ mo-
schatæ in
Hispania.*

*Damascena
fugienda
Incarnata
superanda.*

*Syrupus
novem in-
fusionum.*

HISTORIAE PLANTARVM

54

sanguinis undequaque eruptiones sistant: sudores reprimunt: alvum nimio fluore laxam constriungunt: antidotis omnibus utiliter admiscuntur, & aliis quoque medicamentis, live foris adhibendis, live intra corpus assumendis, quibus ut adstringēs ac corroborans aliquod vtiliter accedit. Quod ex ipsis fit Rhodomeli, vulneribus, ulceribus, eruptionibus, ac in universum omnibus, quæ abstergi & resiccati postulant, longè utilissimum est. Oleum calores omnes sedat, & in inflammationes prohibet, aut jam incipientes mitigat. Flores rosarum, lutea videlicet stamina & apices, resiccant similiter & adstringunt, & potentiùs quidem, quàm ipsarum rosarum foliola. Idem possunt calyces & alabastrī: sed cum his omnibus odor defit, minùs utilia sunt, humanæque naturæ minùs amica. Fuchsius, spongiolas & capitula sylvestris Rosæ contra calculum & urinæ difficultates valere affirmat: si in pulverem trita exhibeantur. Ppodesse autem possunt non ut diuretica, ac calculum atterentia: sed veluti aliæ quædam adstringentia, debiles renes confirmantia: quæ calculosis non rarè utiliora sunt, quàm multa, præsertim potenter diuretica. Nam talium diureticorum frequentiori aut nimio usu, & renes multùm debilitari, & sæpè superealefieri contingit: & calculos non modò non comminui, atteri, aut expelli, sed copiosiores & duriores frequenter generari. Quod etenim in sanguine tenue, aqueum & serosum est, segregant, quod verò crassius, coeunt, ac indurari diuticia fortiora faciunt: & similiter etiam alia minùs potentia, frequentiore usu: ut Gal. & simpl. scribit.

Rhodomel.

Oleum.

Rosapar.
rium usum.

Spongiola
qui conveni-
ant cal-
culis &
urina dif-
ficili.

Contra Do-
den. Symp-
ros. debili
et humido
Ventriculo
utilem.

Saccharum
purgans
Sardani.

Menses
ad dentes
et gingivæ

Ferulæ
Athenæum
& Celsus.

Hæc Dodonæus. Cur autem rosarum syrupus, ut ipse vult, debili & humido ventriculo parum sit utilis, & laxiorem & debiliorem relinquit animadvertere non possum: quandoquidem rosæ præter vim purgandi etiam adstrictionem habent, ut Rhubarb. & Myrobolanī: quæ occaso ut in dysenteria & aliis alvi fluxibus lubenter eo utamur cum Myrobolanis & Rhabarbaro ac Rhapontico vero, si haberi possit. Excipimus tamen syrupum è rosis moschatum, si ubi præparetur.

Saccharum ros. purgans vide (inquit Cam. hort.) apud Card. de tuenda valet. quod non contemnendum. Interior rosæ rubæ flos pulverizatus, cum aqua Cydoniorum destillata datur utiliter in nimio mensium fluxu. Ad dentes à corruptione servandos & gingivas roborandas sumitur acetū Scyll. & aquæ è calycibus rosarum destillatæ æqua portio & eo sæpè os colluitur, annotante Monardo Hispanensi de rebus Indicis. In spongiolæ Cynorrhodi cavitate interiore tinæ interdum occluduntur, quibus pulverizatis ad expellendos vermes intestinorum multi feliciter utuntur. Ferculum ut ipse dicit suavis- simum docet parare Athenæus ex rosis lib. 9.

Ex Rosâ carneâ, autore Celsalpino, colligitur aqua per distillationem odoratissima: Medici quoque oleo infundentes rosaceum componunt: succus ex illâ, & infusus ad purgationes paratur. Rubens, multifolia minimè amara, idè sine vi purgandi: conditur saccharo ad adstringendum, roborandumque. Parva quinque foliis candidis amarij, majoræ vim purgandi habet. E rosīs rubeis succus perfectè rubens extrahitur, ubi paululum ex calefactâ in sartagine rosâ, expresseris succum leviter. Et inquit rosæ substantia alba. Ergo si expresseris ac diligentius, color corrumpetur: atque ita de aliis. Profuit interdum ut in exhibendis medicamentis etiam delicatè locum habeant præsertim apud morosos & delicatos. Ad alvum igitur ducendum parabitur Saccharum roseum tale. Libram unam Sacchari cum libra una roris dissolve: purga, ut solet, cum ovi candido: inde unciam unam rosarum Perficiam immitte, cum jam fervet Saccharum, &

ubi paululum coxeris extrahe, aliâque unciam simili modo. Indico atque ita usque ad duodecimam unciam. Præstat autem rosas cum rore esse collectas. demum coquito ad perfectam rationem: additòque uncias quatuor rosarum rubearum, & in sole exponito. Hoc non differt ab alio Saccharo, & jucundè purgat & pudendum in quibus alia remedia frustra adhibita. Cento. Empiricus pilos spongiolæ rosæ silv. in tenuissimum pulverem reducā, inspergit, & probatum remedium extollit.

Institutio nostri ratio postulare videtur, ut aliquas Rosarum compositiones, quarum hodiè in medicina factitanda magnus est usus, in medium proferamus. Equis enim ignorat vel solas has tum intus sumptas, tum extra ad motas in maximis depellendis contra naturam affectibus: vim obtinere summam? Exordior idcirco Matthiolum, nobisque de distillandi ratione opinionem suam recludit. Ex rosīs, vi ignis fit aqua pluribus ac diversis instrumentis: verugramen ea cæteris præstantior, ac odore fragrantior habetur, quæ per balneum calentis aquæ vitreis organīs elicitur, cuiusmodi & aliæ sunt, quæ eodem modo ad universum medicinarum usum confici solent. Quandoquidem inter has quæ plumbeis instrumentis, lignorum, vel carbonum igne extrahuntur, tanta deprehenditur differentia, quanta inter plumbum & argentum deprehendi potest. Quippe quæ sunt in balneo calentis aquæ vitreis rostratis organīs, ab herbis & floribus, à quibus manant, nec sapore, nec odore dissentiant, adeò ut non solum proprias plantarum qualitates se cum referant, sed ne etiam tantillum quidem tum fecum, tum rei aditus respiciant. Quod quidem in iis non invenias, quæ vulgò plumbeis, & æreis instrumentis eliciuntur: has enim nunquam, vel rarissimè gustaveris, quia tibi humidum virus, idiorèmq, non reddant. Quæ res non modo ægris ingentem molestiam afferunt, & nauseam plerumque movent, sed & plurimum noxæ pectori, ventriculo, jecinori, visceribusque omnibus inferunt: quidd à metallicis organīs, à quibus distillant, malam eorum qualitatem sibi vendicant. Quæ re hac ætate perfectâ, doctissimi, ac peritissimi medici veteres secuti, decoctis, ac dilutis tantum uti ceperunt. Quæ tamen viribus aquas qualescunque sublimatas (ita enim stillatius vocant) præcellant: ea tamen, quæ calentis aquæ fervore (ut supra diximus) sunt, cum propriis tum odoribus tum saporibus herbarum ac florum, à quibus extrahuntur, secum trahant jure quidem decoctis non modò ipsas æquipollere, sed etiam prestare crediderim, non tamen, quod viribus præcellere dixerim, sed quidd gustu: tuaviores, & visu jucundiores habeantur: quod non parum solatij egrotantibus affert. Nos quidem aliis aquis non utimur, quàm his, ad quæ eliciendas nobis organum affabrè parari fecimus, cuius ope hæc distillatias ac præstantissimas aquas suo tempore conficimus. Quarum quæ sapore constant amaro, aliæ verò æcri, aliæ austero, aliæ acido, aliæ denique insipido pro variis simplicium medicamentorum qualitatibus, à quibus eliciuntur. Quapropter Septuagarij, & Medici, quos magis decet humanam charitatem colere, quàm aurum & argentum, dent operam, ut jam plumbea, & ærea organa aboleantur, & balnea, de quibus diximus, in eorum locum succedant, quippe in hoc etiam (quamvis plus laboris, minùs verò emolumenti suscipiant) & Deo, & hominibus simul rem gratam facere poterunt. Ceterum Fuchsius in lib. de compos. medic. unicè cavendum præcipit in succis stillatis eliciendis, nec ejus vasculi fundum, in quo serpentes continentur, aquam in cacabo bullientem attingat, sed solo vapore ab ea elevato incalcescat. Quam re secutus potius videtur fuisse

Aqua Rosarum stillatitia.

Balneum Maria.

Plumbea & ærea reprobanda.

Aqua sublimata.

Admonitio.

Fuchsius cau-
et nimis
religiosus.

eur fuisse Manardum, quàm rei experimentum. Verùm non possum ipse omnino eorum sententiæ subscribere, ut qui iudicem non esse semper eà exquirat ratione procedendum in herbis distillantibus, quod certò sciam nihil referre, quando etià vasculi in herbas recipiens in aquam in maiore vase bullientem immergatur. Nam etsi aqua, quas illi volunt ex herbis vapore tantùm ab aqua bulliente elevato extrahi, ceteris præstantiores habeantur: tamen quæ ex herbis eliciuntur vasculo impositis, quod aqua bulliens circumluat, parum certè, aut ferè nihil illis bonitate cedunt, quod mihi compertum est in iis aquis, quas sapissimè libuit utroque modo elicere & experiri. Attamen aliquis illud discrimen esse dicit, quòd illo modo aquæ ex herbis extrahantur, quæ tenuiores, partes retinent, quod vaporis illius caliditas imbecillior sit, quàm ut possit totam herbæ substantiam conficere: hoc autem modo aquæ eliciantur, quæ omnes herbarum partes secum referant. Hæc sanè differentia quæ facillè concedi potest, non est (meo iudicio) tanti momenti, ut illa regula perpetuò sit observanda, hæc verò evitanda: quin potius, ut hæc mihi videatur probanda, illa verò rejicienda tanquam cautio nimis religiosa. Sed quandoquidem in Aquarum distillarum mentionem incidimus, non gravabimur illarum aliquot modos adscribere, quos quidem in præsentia licuit, multum celebratos invenire. Alij itaque sumunt rosarum quantum volunt, idque triduum, in balneo digestum, vapore aquæ calidæ distillant. Alij absque digestionē præcedente, aquam ex rosis in alembico cum confectis, eliciunt. Alij per cineres distillant: ubi tamen maximà opus est cautio & circumspeditione, ne empyreumate liquor stillaticius inficiatur. Alij lucro magis, quàm valetudini hominum intenti, eas integras, ut decrepæ sunt: cum magna aquæ copia, per vesicam æneam distillant, ac ex triginta rosarum libris centum odoratæ aquæ venalis extrahunt. Alij flores tufos, absque menstruo, aut eo saltè tam paucò, ut ad irrigationem sufficiat, modico balnei calore distillant: & ad vim refrigerantem, tanto expeditius evocandam una distillatione, quam præcedit irrigatio, ex aqua communi, vel rosacea veteri, aut ad virtutem confortantem & fragrantem prolestandam, pluribus in distillata aqua infusionibus utuntur. Io. Beguinus in Tyrocinio chymico, ita eam parandam ducit: distinguendo inter rosas albas & incarnatas. Ex illis enim ut plurimum vis refrigerans petitur, ac propterea paucà aqua pluviali irroratæ in mortario marmoreo contundenæ sunt: inde de torculari succus exprimens & distillandus. Incarnatæ absque irrigatione contusæ, reponuntur in magno vase vitreo, in cellam: post triduum succus exprimitur, qui per balneum distillatur. Hæc aqua est fragrantissima, quæque vel multos annos, odoris sui fragrantiam conservat. Nonnulli recrementis ejus aquam puram superfundunt, & ita per octiduum maceratam, vel balneo, vel vesica distillant, quæ communi venali viribus & efficacia non cedit. Sed & ultra progredi, ac certam facillè quæ, aquas vitæ ex plantis, floribus, seminibusque, cujuscunque generis sint, concinnâ brevitate, veram & legitimam extrahendi methodum tradere est animus, & quidem per digestionem, fermentationisquæ viam, ut quarum ope solâ, ex omnibus rebus, ac iis potissimum, quæ in alimentum veniunt, imò etiam & ex rosis quæ frigide existimantur, aquæ vitæ odoratissima elici potest, quæ de natura celestis æthereæ participet, flammamque, non secus ac ea, quæ ex vino elicitur, concipiat. Rosas igitur sume celo sereno, cum rorido madore destituantur, collectas: eas tere accuratissimè, & in cucurbitam vitream, quæ postea benè clausa, in cel-

lam reponatur, ut ibi fiat earum fermentatio, immittite: Cùm jam acidum quiddam redolere videntur: sume de floribus trius, quantum vis, & per balneum distilla: aquam inde extractam superaffunde parti rosarum restanti, & tursus distilla, similem in modum perpendo, donec omnis rosarum fermentatarum quantitas per alembicum transierit, fecibus, quæ in fundo remanere solent, semper segregatis. Tandem omnem aquam ex rosis elicitam, per balneum distilla, & duodecimam saltè partem aut circiter abstrahæ, eamque si vis, rectificæ. Sic aquam habebis gratissimam, adeoque excellentem, ut unica ejus gutta, ingenti satis aquæ copia odorem suum communicare, eamque utilissimam & jucundissimam reddere possit. Non abs re visum fuit paucula hæc absolutioris doctrinæ ergò proponere, quo modi quidam, distillandi aquas, non infimi sicut & hujus aquæ rosarum, ut & simplicium cæterorum omnium, lectori manifestentur.

Non erit hic recedenda tinctura rosarum, ob summum levamen quod percipiunt acri, in summo febrii vigore, in litui exhaustis, in inquietudinibus, dysentericis passionibus, aliisque affectibus ab humore bilioso, acri & mordaci genitis, pro potu ordinario, ubi püsana palato agrotantium non sapientis igitur esto modus brevissimus. ℞. pro lb. j. aquæ fontanæ, limpidissimæ, gelidissimæ, Rosarum rubrarum, exsiccatarum m. ss. hordei p. j. decoquant ut levis, addendo ℞. j. sacch. filtra vel cola, addendo sp. vitriol. gutt. vi. postquam refrigerata erit, ager hanc sumet cum voluptate, liberalius bibet, sedabiturque sitis. Ne autem iterum transgredi videamur, omitendo eorum aliqua, quæ ad hanc rosarum tractationem spectare videntur, Syrupus quoque enumerandus venit. Est autem simplex, qui ex solo rosarum decocto vel succo fit, & ℞. Rosarum rubrarum recentium, partes sex, quæ infunduntur in vase terreo vitrato, stricti oris benè operculato, horis octo in prædictis quæ recalcascit partibus: tandem additur ad singulas 5. partes infusi colati partes 4. sacchari, per albumen ovorum clarificati, & f. syr. Compositus qui ex infusionibus & aliarum rerum decoctionibus conficitur: ℞. Rosæ vernalis partes sex, fervescant, & indantur rosarum completarum recentium rubrarum partes tres, ac horis octo immorentur: Deinde renovato & reinfusio florum fiat usque septies inclusive absque fraude, & singulis vicibus diligenter exprimantur: post adde sacchari albi partem mediam, & ad syr. formam coquito. Fit quoque syr. de rosis siccis, qui ℞. lefquiunciam rosarum rubrarum siccatarum (nam libra una menfuralis referta rosis siccis, & moderatè coacta ponderat, drachmas 12. plus minus) quæ infunditur horis octo siccis, in aquæ libris tribus: tæque reiteratur rosæ, & infusiones atque expressiones. Aqua quoque eisdem calefiat, at equam rosæ indantur. Postea accipitur liquoris infusi & expressi quantum libuerit, & cum media parte sacchari coquitur ad formam syrupi: Verbi gratia, si liquoris infusi habeas tres libras, tunc illis adde sesquilibram sacchari, & hæc Dispensat. Coloriensis. Paratur tandem syr. vel potius suleptum suavissimum ex aquæ rosarum partibus tri-

Tinctura Rosarum
Syr. rubel.
lo simili.
ma.

Syrupus Rosarum simplex.

Compositus
Syr. Rosarum solut.
ius.

Syr. de rosæ siccis.

Sulept. Rosarum.

Conser. Rosarum.

conseruit) & deinde saccharum fectum, & demum ambo simul. Post contusionem autem & commixtionem sacchari cum floribus rosarum, conserva aliquoties soli exponatur, moveaturque subinde fectum & deorsum. Relinquatur autem spatium vas in aëre propter fermentationem. Triplicem modum parandi mel rosarum docet nos Mesue, quorum primus est, ex foliis rosarum & melle. Secundus vero, sine foliis, ex succo ipsorum foliorum tantum & melle. Et hic secundus modus potest numerari inter syrupos simplices. Tertius autem ex foliis & succo simul & melle, qui tertius modus recipit foliorum partem unam, succi partem upam semis, mellis partes tres. Accipitur mel optimum, feruescit, & inde tepere finitur, spumaque aufertur: deinde adduntur rosæ contusæ cum succo, & ad infolationem ponuntur diebus viginti, vase diligenter operculato. Postmodum supra ignem duplo vase incallescunt, & effervent: mox fit fortissima expressio & colatura. Rursus coquuntur leniter ad consistentiam melleam, id est, mellis fluxilis. Pastillos roseos, Rhodides appellatos hoc modo preparari auctor est Dioscorides. Rosarum viridium non madentium siccatarum 3. xl. Nardi Indicæ 3. x. myrrhæ 3. vj. Trita hæc efformantur in pastillos triobolares, & in umbra siccantur, & reponuntur in vase fictili non pigato probe obturato. Quidam adiciunt etiam Costi 3. ij. Indis Illyricæ tantundem, ammiscentes etiam vinum Chium cum melle. Cæterum, pastilli rosei & rosas quas recipiunt nomen habent. Preparabantur autem graveolentiæ & sudoribus oborientis gratia, & & fœminis collo circumdati morbis vice gestabantur, ut exhalantem de corpore sudoris graveolentiam suo odore retunderent, ex aromatum illorum ammissione. Officinæ præscriptas habent aliquot pastillorum sive trochiscorum ex rosis compositiones, sed nulla ex his ad hunc usum spectat. Alter etiam horum pastillorum usus erat in diapharmatis quæ corpori insperguntur, & in unguentis post balneum, ad coercendos videlicet sudores, & jucundum corpori odorem inducendum. Sed Plinius etiam solas rosas aridas & expressas in hunc usum commendat. Sic enim lib. 21. cap. 30. ait: Et aridis & expressis aliquis usus: diapharmata inde sunt ad sudores coercendos, ita ut & balneo inarescant corpori, deinde frigida abluantur. Ex quo loco ferè cognoscendum datur, de quibus Rosis accipiendum sit, quod Dioscorides præcipit. *ῥοσὰν χρυσῶν διαφάρμακα* utique *ῥοσὰν χρυσῶν* nimirum de his quæ virides quidem & recentes adhuc sunt, non tamen humidæ & madentes, sed siccæ, id quod ipsis una die contingere potest, ut humor omnis ab eis desiccetur, velut Galen. lib. 1. cap. 4. in fine *ῥοσὰν χρυσῶν* docet. Quid autem diapharma sit, idem Plin. 13. cap. 2. exponit. Sicis, inquit, odoribus constant quæ diapharmata vocantur. Nam feces unguenti magmata appellant. Aromaticum rosatum est confectio suavis & saluberrima, in qua miscetur utile dulci, & ob ejus bonitatem & excellentiam cæteris præponenda est, confortat stomachum, cor, cerebrum, & epas, laxos & claros spiritus gignit, excitat appetitivam, munit digestivam, nutritivam, & virtutes omnes naturales corroborat, resolvit aquosam humiditatem stomachi, & emendat malas qualitates, quæ generant malos humores & putredinem, & convalescentibus & debilibus integras vires, & pristinam sanitatem restituit. 2. Ros. 3. j. vij. Liquidatæ rale 3. vij. Cardamomi 3. v. Ligni aloës, santali citrini, 3. ij. Gummi Arabici, Draganti 3. ij. 3. ij. Macis, Garyoph. 3. ij. 3. ij. Spicæ 3. ij. Nucis musc. Cardamomi, Galangæ 3. ij. Anibræ 3. ij. Musci 3. ij. Sacchar. 3. vj. fiat confectio cum aqua Ros.

Conf. 3. 2. arom.

Confectio ex rosis aromatica calefacit & confor-

tat stomachum, jecur & præcordia omnia, frigida-tem repellit, phlegma prohibet & ejus ægritudines, ventositates & inflatiles discutit, nausæam, acidos ructus tollit, & omnem stomachi cruditatem emendat, gustum revocat, renes calefacit, coitum excitat, & facit pulchrum colorem, & odorem anhelitus & sudoris. 2. Rosarum, ligni aloës 3. an. 3. ij. Calami aromatici 3. j. 3. j. Gallie musc. macis, piperis longi, Nucis muscatæ, Mentæ siccæ, Callicæ lignæ, mastichis, Asari, Cinnamomi, Garyophillorum, 3. an. 3. j. Croci, Cardamomi, tritum Santalorum, Rheubarbari, Spicæ, Costi, Cubebæ, Zingiberis, Feniculi, Anisi, Libistici 3. an. 3. ij. Sacchari 3. ij. fiat confectio cum aqua rosata. Electuarium succi rosarum exploratum est contra guttam calidam, & malos tumores calidos & furiosos, fortiter purgat, sanat tertianas simplices & duplas, & reliquas malorum humorum, in convalescentibus exquisitè evacuat, potenter solvit, & est calcar aliarum medicinarum. 2. Succi rosarum, Sacchari 3. an. 3. ij. 3. ij. fiat syrupus, cui adde diagridij 3. j. 3. j. Santalorum omnium 3. vj. Spodij 3. ij. Camphoræ 3. j. fiat electuarium. Equum est ut vini etiam, liquorum omnium post aquas communissimæ, quod humanæ in primis inservit nutritioni, *symphyrum* quæ corporis nostri calorem instaurat roboratque, tractationem aggrediamur brevem. Quinque libras igitur infundito (inquit Pallad. li. 6. quem inscribit Maum c. 13. rosa pridie purgatæ, in vini veteris x. sextarios, & post 10. dies, x. de spumati mellis libras adicies, & uteris. Et Rosatum sine Rosæ facies sic. Folia citri viridia sporta palma missa in musti nondum ferventis vase depones, & claudes, & exemptis quadraginta diebus melle addito, ad modum Rosati, cum placebit, uteris. Meritò vinum subsequitur acetum, quod 2. Rosarum rubrarum mediæ maturitatis, prædictis & abjectis unguibus, in umbra extra solem ad triduum aut quadratum expandarum & ressecarum, 3. j. acetæ sextatiæ octo, hoc est, quartas Colonienfes quatuor. Insolentur diebus quadraginta: Deinde reponantur, vel (quod melius est) abjectis foliis corruptis, acetum coletur ac reponatur. Quidam sæpius mutant folia rosarum, nec ita diu stare in sole sinunt (verbi gratia ad dies triginta vel pauciores) ut elegantius colore aspectuque, & sapore odoreque validius fiat acetum. Singulariter prodest animi deliquis, si ol. Vireg. faciat ut nares obliantur, prodest etiam membris calidis hocce obliuinitis: si duplicatum lineolum in aceto roseo humectetur, stomacho vè applicetur, maximè prodest optimèque calorem attemperat. Oleum rosatum quamvis pluribus fiat modis, melius tamen teste Clem. de materia medica cap. 10. sic fit. Collige Rosas priusquam complicita folia penitus expandantur, & ponantur in umbra sex vel octo dies, quousque fiant modicum passæ, & evellantur folia rosarum a suis tirsis, & contundantur, postea habeas oleum ex Olivis immaturis quod dicitur Omphacinum, quod cum aqua fontium frigida sæpius lavetur & in qualibet ejus libra pone Rosarum 3. vij. in vase vitro obtuso ore, & soli quotidie in hebdomada exponatur, deinde in balneo Mariæ tres horas bulliat ad summum. Prædictas ergo rosas sic coctas exprime, & expressas abijce, & cum oleo alias rosas commisce, & soli septem aliis diebus expone, & postea iterum coque in balneo Mariæ, & permuta iterum Rosas, & adde infusionis Rosarum 3. ij. & quàm benè cooperiatur officium vas, & exponatur soli quadraginta diebus. Deinde oleum extractis rosas quotidie ad solis radios ponatur. Plerique sic faciunt in qualibet libra olei sæpius loti ponunt rosarum recentium contusarum 3. vij. & coquunt in balneo Mariæ ad consumptionem duarum partium & cum torculari ex-

dist. Rosa-
tum conf.
eundi quæ
dus triplex.

pastillorum
rosarum
conficiendi
modus.

Pisus.

Erymon.

Substitu-
tum.

Diapharma

Aromaticum
Rosatum
Vires
Appetitus
Digestivam
Nutritivam.

Conf. 3. 2. arom.

Electuarium
descriptum Ro-
sarum.

Rosatum
vinum.

Sine Rosæ

Acetum Ro-
sarum.

Ol. Vireg.

Ol. An. 1. 2.

Vires.

primitur. Confortat membra debilia, digestivam facultatem & calorem naturalem, & refrigerat calorem accidentalem, febrilem & acuitatem cholerae: stipicat lubrica intestina, & corroborat retentivam, & in principio repellit malos humores, qui concurrunt ad apostemandum, & mitigat dolores capitis, & prohibet phrenesin. Plura de Oleo rosato tradere super vacancum dicimus, quod ea passim apud autores videre liceat.

Diarhodon
descripione
communis.

Restat ut Diarhodon describamus duplex. Commune quod 2. foliorum rosarum rubrarum 3. xx. Trochiscorum diarhodon. & de spodio, liquiritia ana 3. iij. Cinamomi [quodam ex impl. non habet] Garyophyllorum, Gallia mulcata an. 3. iij. Spodij, Croci, Mastichis, Berberis [quidam omittit] ligni aloës an. 3. ij. Trium santalorum, an. 3. iij. Asari, Spica Indæ, Mastichis, Cardamomi, seminis Portulacæ, Laſtuce, Scariolæ, Citrulli, Melonis, Cucumeris, Cucurbitæ, albarum margaritarum, Ocyimi Garyophyllati [Alf. lengemifoli] rasuræ eboris, Tragacanthæ, gummi Arabici, an. 3. j. Camphoræ 3. 8. Musci 3. 8. Conſice cum syrupo de rosis, ex aqua rosarum. Dosis est 3. 8. Ventrículum & hepar roborat, coctionem obid juvat, & dolorem horum à calenti & acri, ac mordente bile mitigat. Diarhodon Abbas 2. Santalorum alborum & rubrorum, an. 3. ij. 8. Tragacanthæ, Gummi Arabici, Spodij an. 3. ij. Asari, Spicæ, Nardi, Mastichis, Cardamomi, Croci, Xylaoes, Garyophyllorum, Gallia Moschata, Anisi, Fœniculi, Cinamomi, Succo liquiritiæ, Rhabarbari, seminum basilicon. Berberorum, i.e. acinorum ejus, sem. Scariolæ, Portulacæ, Papaveris albi, Citrulli, Melonum, Cucumeris, & Cucurbitæ, an. 3. j. Offis ex corde cervi, Margaritarum, an. 3. 8. Sacchari candi, rosarum an. 3. j. 3. iij. Fiat omnium pulvis. Camphoram & Moschum studiosè omittimus, quæ ut & ambra, in aliis etiam compositionibus omitti debent, nisi specialiter exprimat, aut Medicus jubeat. Trochisci à Mesue sic describuntur. 2. Foliorum rosarum rubrarum exungularum modicè siccatur, aureos 4. Spicæ aromaticæ, ligni aloës, an. aureos 2. Glycyrrhizæ aureos 3. Spodij aureum 1. Croci aureum dimidium, Mastichis 3. ij. Cum vino albo fac trochiscos drachmæ unius pondere. Rosata novella, autore Nicolao Alexandrino, recipit rosarum, Glycyrrh. sacchar. ana 3. iij. Cinnam. 3. vj. Garyoph. Nardi, Galangæ, Zingib. Nuc. mosch. Zedoar. Syrac. Cardam. veri, Apij ana 3. j. Mellis desp. q. s. Si in pulvere quis asservare voluerit, Zacharum omittat, donec in formam solidam redigere velit. Vnguentum Rosaceum, Clement. hoc modo describit: 2. Rosarum rub. recentium lib. 1. & tantundem axungia porcina recentis cum aqua calida novies, & toties cum aqua frigida optimè lotæ, & simul cōtundantur, & septem alios dies dimittantur: postea adde succi ros. lib. 8. olei amygd. dulciū 3. ij. 8. coquantur ad succi cōsumptionē, & conſerveur. Plurimum valet in principio apostematū, repercutit enim materiam, sedat dolores eorum, & capitis feblicitatis, & inquietudinem, refrigerat febres ardentes, epar & stomachum calefactum. Si verò addatur Opij cum aqua rosata diloluti 3. 8. Croci 3. ij. sedabit quoscunque acertimos dolores, & provocabit somnum. Vnguentum seminum, 2. seminis rosarum, cupularum glandium an. 3. vj. lūmac. acatæ an. 3. 8. Carabæ, seminis plantaginis, mastichis, balauſtium, corticum Granatorum, Gallarum, nucis Cypressi, ros. rub. gummi arab. Myrrhæ, Myrti, Draganti, tereb. sigillatæ, Coriandrorum præparatorum, boli armeni, santalorum rub. an. 3. 8. sanguinis draconis, thuris, hypocistidos an. 3. 8. bdellij, spodij, coral. rub. an. 3. ij. camphoræ 3. j. olei rosat. lib. j. olei citoniorum, myrtini, mastichini, an. lib. 8. ceræ quod sufficit. Fiat vnguentum. Sed hæc

Dosis.
Vires.Diarhodon
Abbas.

Trochisci.

Rosata
novella.Vnguentum
Rosaceum.

Vires.

Apostema.

Febres
ardentes.

Opium.

Somnum.
Vnguentum
seminum
rosarum.

de Rosis tractatio, hucusque sufficit: Temporis nunc ratio postulat, ut vela contrahamus, ne fortè longiori mora in vertices inexticabiles abrepti, benigno lectori molestiam creare videamur.

RUBVS MAIOR, FRVCTV
nigro. CAP. II.

Nihil vulgatius norunt dumtaxat Rubo, qui ex radice nodosa, impotunè feracitate se propagans, longè lateque fenticosis & mordacibus famentis, angulosis, rubentibus vagatur. Si vicinis fulciatur, in altū crassiores emittit virgas, quæ tamen ipsæ gracilitate & proceritate nimia in terram retractæ, ac curvatæ defixis in eam capitibus radiantur. Virgæ spinis aduncis & pungentibus acutissimæ. Folia terna, serrata, aspera, dorso aculeato, inferiore parte candicantia, superiore nigricantia, sicco adstringentique sapore prædita: hyeme vix decidentia, nisi altera succrescant: flores albi, vel ex candido rosæ, toſulæ instar, apicibus concoloribus: mora rubra per maturitatem nigrescunt, aristis quibuscumque asperiusculis, acinis parvis, gustu quibuscumque, ut nobis, grato, dulci; paululum amaro, Trago.

Theophrasto Rubi genera tria sunt, maximè inter se distantia. Quoddam enim erectum excelsumque, quod dicitur, qui Rubus hic major est, fructu nigro. Quoddam propè à terra protinus deorsum vergens, terreque conjunctum, rursum radicem agens, quem humiliorum, Humi-Rubum quidam appellant; nos Rubum minorem, fructu cæruleo. Nec est quod Humirubum cum Cæsalpino inter plantas humilioris naturæ recenseamus, & Fragariam appellemus. Tertium rubus cælos dicitur, de quo in Rosa loquuti sumus. Cæterum Theophr. in hist. Rubum fruticem spinosum tradit non solum caule & ramis, sed & foliis cunctis, qui in extremo & lateribus sinuata concidunt.

Dioscorides duo generatradit, Rubum hunc vulgaris notitia, qui simpliciter ipsi dicitur, & ab aliis eodem annotante; Cynosbatos, ab aliis Selinorition, ab aliis Alyntrophos, ab aliis Titani sanguis [hæc appellatio à Dioscoride Laſtuce agria attribuitur, & potest fieri ut Rubus propterea communicata fuerit, quod mora illius sanguineum compressa succum reddant.] ab aliis Ibis sanguis, à Romanis Rubus, ab aliis Sentes, à quibusdam Mora baucana, à Dacis Mantia, Ægyptiis Hæmos, aliis Ametros appellatur: Serapionem autè Tragus Buleich sive Haleich nominare tradit, & Hebræos Sene. Alterum, Idem cognominat de quo paullo post. Plinio lib. 16. cap. 17. Rubi mora ferunt: & alio genere similitudinem rosæ, qui vocatur Cynosbatos: tertium genus Idem vocat Græci à loco. Sic 1. 2. c. 13. duorum priorum meminit. & cap. seq. Cynofbati, Rubi Idæi, & Rhamnum inter Rubi genera recentur.

An

An Rubum majorem fructu nigro intelligunt scilicet paginæ Exod. cap. 3. Aparuitque ei Dominus [Angelus Domini, Tigur.] in flamma ignis de medio Rubi, & videbat, quod Rubus arderet, & non combureretur. Dixit ergo Moyses: vadam & video visionem hanc magnam, quare non comburatur Rubus.

Anguill. Morus aut Rubus. Trag. Rubus grandis & secundus. Thal. & Gefn. h. Rubus vulgaris: Eid. coll. Rubus major. Turn. Rubus sentis, baccâ semper nigra ubi maturuerit. Lob. Adv. Rubus, Batis vulgatissimus, cujus mora ad diamorum confectiōnem officinis usitataissima.

Lugd. Rubus, Rubus magnus & sentis. Dod. Rubus & Rubus vulgaris fructu nigro, Vepres dictus apud Ovid. metamorph. 5.

Fepres: Ovid.
Sedy.

Aut Lepori, quæ Vepre latens hostilia cernit
Ora canum.

Cordin. Diosc. & Tabern. (quoad descriptionem) Rubus Arvensis, figura autem quam habet sub dicto titulo cōpetit potius Rubo minor, fructu caruleo, cujus non meminit compilator. C. Bau. apud Matth. & Ger. pro Rubo non bene ponunt figuram Tabern. quæ est Rubi Idæi. Ille tamen pro Rubo Idæo meliorem quoque habet. Schvv. Rubus batus, & Rubus sentis. Corn. Brunf. Fuch. Matth. Ryff. (cujus figura minis placet) Cresc. Cam. apud Matth. germ. & Epit. Lac. Lon. Lob. Obs. & Ic. Cast. & Casl. Rubus. Dorst. quineptam Ryffij figuram habet, Mora bæccæ: Rubi genus grandius fungosum. C. B. pin. Rubus sive vulgaris, Rubus fructu nigro.

Nomina
linguarum.

Idæi. Græci dicitur Rubus & sentis, Lat. Germ. Brombeer. Grauden. Bremen / & ut Cornario placet, Craßbeer / ab ipsius Rubi pungentibus aculeis, Belg. Braemen & Ercmen. Braembesfen haghe: Gall. Ronce, à runcatione, quæ dumorum tantum est. Ital. Rosso: Anguill. More campagnole: Hispan. Carca: Anglic. Bramblebushe / aut Blackberrybushe: Hung. Csepkefa, & fody Szador. Boh. Wofstrugina. Fructum Græci vocant βαρυ, nigella, & βαν, quemadmodum & Mora & Sycamina appellant, Galeno teste. Morum Rubi & Vaticanum Schvv. nominant, ac ut Fuchsius sentit Vacinium vel Vaccinium, quod tamen nec nobis, nec aliis probatur: Offic. Mora Bati, & quæ barbariores sunt, inquit Dodon. Mora Bassi, Germ. Brombeer. Belg. Braembesfen / & Haghebesfen: It. More di Rosso: Hisp. Carca moras: Boh. Wofstrugina.

Docet.

Per dumos repit & in sylvis inter cæteras sentes, neque non ad sepes & agrorum limites reperitur. Plantatur autem plantulis suis, ubi capita in terram demittunt, quia ibi statim radices agunt. Rubi namque (tradente Plinio) curvati gracilitate & simul proceritate nimia, desigunt rursus in terram capita, iterumque nascuntur ex sese, replentur omnia, nisi resistat cultura. Plantatur & seminibus maturè collectis & siccatis, usque ad initium Veris servatis & tunc seminatis: Mayo mense & interdum etiam Julio & Augusto, itemque Octobri flores conspicui sunt: fructus Augusto & circa Autumnum maturitatem assequitur. Rubi folia Vere; flores æstatis initio colliguntur: fructus cum maturuit per menses & extrema æstate decerpitur.

Viret.

Rubus, autore Dioscoride, adstringit & siccatur, capillisque tingit. Summorum autem ipsius ramorum decoctum potu alvum sistit, fluorēque muliebrem cohibet, nec non & contra presteris morbum valet. Firmant & gingivas, orisque ulcera sanant: commanducata folia. Imposita verò herpetas cohibent, ulcensibusque in capite manantibus, oculis proidentibus, condylomatosis, item & hæmorrhoidibus remedium sunt. Eidem cardiaca quoque & stomachica trita convenienter imponuntur. Car-

Fluxus.

Vlcera.

terum confusis caulibus ac foliis expressis succus sole coactus, ad antedicta vitia efficacior est. At fructus perfectam maturitatem assecuti succus, stomachicis, h. e. oris medicamentis accommodatur. Sistit & alvum subcrudus fructus in cibo sumptus, æquè ac flos in vino potus. Galeno Rubi folia, germina, flos, fructus, & radix qualitate adstringente participant, eaque non obscura. Sed hoc inter se differunt, quod folia ac præcipuè mollia & recens nata plurimum in se habeant substantiæ aqueæ, parum verò adstrictionis: eadem ratione & germina, itaque si mandantur, aphthas, & alia oris ulcera sanant. Quin & alia vulnera glutinare valent. Est enim eorum temperies & ex terra frigida essentia, & aquea tepida. At fructus, si quidem maturus fuerit, non parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est. Itaque ob hoc, & ob modicam adstrictionem elui non in suavis est. At immaturus & frigida substantia terrea vincitur, ac proinde acerbus est & valdè exiccatorius. Et sanè uterque siccatus reconditur, validius quàm recens delicatus. Sed & flos eandem vim fructui immaturo possidet: utraque ad dyenterias, & ventris profuvium, & atonias, i. e. imbecillitates [r. bur exolutur m] & sanguinis expuitionem fundit onea remedia. Porro radix præter adstrictionem, non paucam habet substantiam in sese tenuem, per quam & lapides renum comminuit. Idem Aliment. 2. Ruborum fructum Salmis appellant. Sunt autem Cætria, quàm Mora, magis adstringentia: & si quis largius iis vescatur, capitis dolorem sentit: alij stomacho angentur. Proinde fructum hunc abluamus, oportet prius quàm mandere ipsum aggrediamur, quod maxime in Sycaminis quoque est faciendum. Non tamen ventrem subduunt, sed potius cohibent: & si quis immatura ipsa prius siccata reposerit, multò etiam magis cohibebunt: Omnia tamen medicamenta, quæ ex Mororum succo parantur, si facta ex iis quoque fuerint, facultatem habebunt efficaciorē. Idem de comp. med. sec. loc. Innocentium est pharmacum Rubi mororum succus voratus, veluti & ipsorum Mororum: sed succus Rubi Mororum habet quid quod stomachum roborat: quod ipsum Mororum tremor non habet: Rubi mororum succus post nucum succum plurimo melle opus habet.

Eratistratus Rubi cremore ad oris inflammationes usus, se ipsum curavit. Nec Rubos, inquit Plinius, ad maleficia tantum genuit natura: idè quæ ex eis mora vel hominibus cibos dedit. Vim habent siccandi, adstringendi quæ, gingivis, tonsillis, genitalibus accommodatissimam. Adversantur serpentium sceleratissimis hæmorrhoidi & presteri, flos aut mora. Scorpionum vulnera sine collectionum periculo irungunt: urinam cient. Caules eorum tunduntur teretè, exprimiturque succus, qui sole cogitur in crassitudine mellis, singulari remedio contra mala oris, oculorumque, sanguinem excreant. Or. Oculi, tcs, anginas, vulvas, sedes, cæliacos potus aut illi tcs. Angina. [in eligitur succus] Oris quidem vitis etiam folia commanducata prosunt: & ulceribus manantibus, Vlcera. aut quibuscunque in capite illiuntur. Cardiacis vel sic per se imponuntur à mamma sinistra: item stomachi doloribus, oculisque proidentibus. In stillatur succus eorum & auribus. Sanat condylomata cum rosacco cerato. Cauliculorum ex vino decoctum, vel præstante cum remedium est. Idem per se in cibo sumpti cyathis modo, aut decocti in vino austero, labantes dentes firmant. Alvum sistunt & profusiva sanguinis dyentericis prosunt. Siccat ut in umbra, ut cinis crematorum uvam reprimat. Folia quoque arefacta & cortusa, jumer torum ulceribus utilia traduntur. Mora, quæ in his nascuntur, vel cum efficaciorē stomatice præbuerint, quàm favu Morus. Eadèque compositione vel cum hy-

Ex Galeno.

Aphtha.
Vulnera.

Datina.

Nexa
Correctio.

Ex Plinio.

Venenum.

Vrina.

Succus.

Or. Oculi.

Angina.

Vlcera.

Stomachus.

Aures.

Alvus.

proculi-

Cholera. potiusde tantum & melle bibuntur in cholera, & à cardiacis, & contra-aneos. Inter medicamenta, quæ styptica vocant, nihil efficacius Rubi mora ferentis radice decocta in vino ad tertias partes, ut colluantur eo oris ulcera, & sedis foveantur: tantâque vis est, ut spongæ ipsæ lapidescant. Tragus addit à merulis avibusque cæteris expeti fructus, & in cibos quoque venire pauperum: Galenum scribere frequentem fructus Rubi usum dolorem capitis inducere, se autem id necdum expertum esse: Verum se testari posse, quod nora illa vehementer refrigerent, ita quidem ut si quis aquam superbibat, eum horrores febiles continuè obnuere posse. Si verum est quod Tragus scribit, debentur pauperes debent ab eorum usu, qui nil nisi aquam superbibunt. Ego Ruborum mora sapius comedi copiosè, nec nocumentum sensi, quamvis frigidum & humidum ac pituitosum habeam ventriculum.

RUBVS MINOR, FRVCTV caruleo.



Deser. Contractior hic Rubus proximè jam dicto minor parâ n, aut nihil, interdum humo se tollit, reptatu gaudens, sarmentis longè latèque diffusis, Trago, humi serpentibus tenuissimis & aculeatis flagellis nunquam se attollens, sed protinus adorsum vergens: & foliis minutis minusque fenticosis, & Trago authore, Lupulo penè respondentibus, nisi quòd magis nigricant, spinique asperioribus

horrenti flores similes, Trago ex candido rosei, stellati: at fructus, qui minor, prius exorta viridis, paulò post rubro, per maturitatem casio vel caruleo colore tingitur, pilosus ut Rubi præcedentis mora, gustu parè, non in jucunda, qualia arboris Moritradice nodosa.

Est hic Charabæus Theophrasti, Humirubus Gaza, Rubus humilis & c. Tragi. Turn. Rubi species à baccis rubris: is fortè maturum non observavit, sed immaturum duntaxat: mihi enim tantum baccis aut cæsis, vel caruleis, aut nigris notus Charabæus. Quare merito scripsit Marth. in errore versari Monachos, quum Rhæmum existimarent Rubum quendam, qui mora caruleo colore profertur: Gesh. h. alia Rubi species: In cat. Rubi genus humile: de coll. Rubus humilis, Chamæbatus. Lobel. Adv. Rubus alter reptans. Dod. Rubus minor & alius tenerior.

Cluspan. & hist. Rubus humilis proximè ad Chamæbaton accedens, qui plerique Belgicæ locis nascitur, acinis modo nigris, modo caruleis, palato admodum gravis. Occupat etiam ille multos Austriæ & Pannoniæ agros, Hungariæ Szedőry dicitur.

Lugd. Rubi genus alterum, & c. Theophrasti. An Tab. Rubus arvensis, Bronbeeren. Figura enim Tabern. & titulus videntur convenire Rubo nostro caruleo, quavis Compilator non distinguat à majori & pro eo po-

nat: verum ei non novum omnia confundere. Ger. malè ponit pro Rubo Idæo figuram Tab. quæ nobis potius Rubi minoris seu caruleo videtur. Schvv. Rubus arvensis, & Humi-Rubus. Cæs. Rubi differentia altera, Rubus humilior. C.B. pin. Rubus, sive repens fructu casio.

Ripis fluviorum gaudet nec non humectis nonnullis & macris & incultis agris. Flores Maio mensè erumpunt: Mora flore exculto sublequantur.

RUBVS IDÆVS SPINOSVS FRVCTV rubro & albo. CAP. III.



Deser. Rubus Idæus vulgaris illo fenticoso minor & minor, brevibus, & ferè innoxiiis spinulis horridus, interdum omnino carens, potissimum inquit Tragus in virgis primo anno profluentibus, latentis tenuioribus, teretibus & plerumque rectis, triebulibus & alioribus, folia terna aut quina in alia modum disposita, pediculo fenticulosis aut unciis duas longo, levi, annexa, Rubi

vulgaris foliis similia, sed tenera & mollia, superius atro-virentia: inferius incana, ut farina aspersa videantur inquit Tragus, sapore austero: flores albidos excipiunt mora per maturitatem cana, rubentia sunt & alba inter acinos pilis donata, dulci, vinoso que carnei coloris succo ebrata: Tragus ait, odorati ut ferè Violam Martiam spirare. Radix est longa, per terram late se spargens, quotannis furculos produgens, quæ secundo anno flores fructusque proferunt.

Est Dioscor. Idæa, copiosè in Ida proveniens, Bt. G. multò tenerior Rubo, exiguus spinis prædatus. Plinio, Rubi, genus Idæum Græcis vocatum, tenuius, quàm Rubus & Cynosbatus, minoribusque spinis minus adacens. Et rursum Idæus Rubus appellatur, quoniam in Ida non aliàs nascitur. Est autem tenerior ac minor, rarioribus calamis [hamis Dalech.] innocentioribusque, sub arborum umbra nascens.

Galenus, & Paulus, & Aëtius Rubi Idæi non meminerunt, velut sub Rubo comprehensi, cui viribus respondet. Non aliàs Plinius nasci dixit quàm in Ida: Dioscorides tamèn non negat etiam alibi provenire. Et certè communi ferè peritorum consensu, multus etiam passim per Germaniæ sylvas nascitur, & is esse judicatur, cuius fructum Pindbeer, i.e. Vvam cervæ appellant. Et profectò non alius fructus esse mihi videtur (inquit Cœn.) quem lib. 7. cap. 1. & 2. Aesclepiades in pharmaco Archabiani Vvam ursi appellavit. De qua Galerius sic ait. Quæ Vrsi uvæ appellatur & in Ponto nascitur, planta est humilis & fruticosa, folio memæyli, fructum ferens rubrum, & rotundum, gustu austerrum, quæm Vrsi Vvam appellant. Huc accedit, quòd ab uris hunc fructum expeti, hodièque, notum est.

Rubi tertium genus hoc licet recentiores vocent Cynosbâton, vel Tragi tamen iudicio rectè Dioscoridis

Idcoridis *Idz* hoc est, Rubus Idæus nuncupatur, seu Nieandri Rubus Polybata, à copia mororum sic nominata. Hancille describit, ejusque figuram in fallor capite sequenti exhibet pro Chamebato. Porro monet Tragus quoddam Fraga per Rubum Idæum intelligere, sed arroganter nimis. Sunt è recentioribus (inquit Matth.) qui Rubi quoddam genus, quod in montibus Tridentinis, præsertimque Ananienfibus nascitur, quodque rubra mora, Fragis non dissimilia, nullis intus ossiculis, quæ ab incolis vulgò vocantur *Ampomels*, gustui non injucunda profert, pro certo credant Rubum Idæum esse. Sed equidem non video quomodo illorum sententia prorsus rectè probari possit, &c. Nam in Ida provenit. Idem post. com. lat. & ital. Idæus Rubus etsi ab Ida monte denominari cæperit, quod ibi copiosissimus fortasse habeatur, nascitur tamen in aliis etiam montibus. Nam in Boëmia non solum habetur in montibus, ubi spontè copiosissimus, sed & in hortos transfertur.

Meminit ergo Matthiolus, ut ait Turn. Rubi cujusdam bacis rubris suavis, sine acinis, quam Neoteri corum aliqui Rubum Idæum nominant, ait autem se non videre, quæ ratione hæc sententia probari possit. Cum enim dicat Diosc. Rubum Idæum ab Ida nomen adeptum, inde colligi posse putat, non alibi Rubum Idæum, quàm in Ida crescere, &c. Sed hoc argumenti genus, quo frequenter utitur Matthiolus, in veritate evertenda nihil planè concludit, non magis quàm hoc, Stoechas in Stoechadibus insulis nascitur Dioscoridi, Ergo quæ in Arabia, Hispania & Italia nascitur, Stoechas non est. Non enim ait Diosc. Rubum Idæum solummodò in Ida provenire, sed ibi copiosissimam esse: interim non negat quin alibi possit nasci. Et sanè Bellon. in Ida monte Rubum Idæum invenire non potuit.

Tab. Rubus hircinus Boëßbeer / quem Compilator non rectè describit & distinguit à Rubis: titulus etiam non convenit figuræ, quæ est Rubi Idæi. Nec melius Ger. ponit figuram Taber. Rubi Atvensis, quæ mihi potius videtur Rubi minoris fructu ceruleo.

Rubus Idæus Cord. in Diosc. Ryff. Lon. (horum duorum figura non commendanda. Lon. quidem meliorem posuit pro Boëßbeer:.) Cam. Ep. & hist. Lac. (qui Fragariam exhibet) Lob. Adv. Obs. & Ic. Ang. Dod. Geln. h. coll. & cat. Cast. & Schvvenckf. cui etiam Rubus cervinus & Cervirubus. Cat. Rubus 2. montibus proprius, fructu in maturitate solum rubefcente, non nigrescente, sapore acido, gustui grato, quem in Alpibus Ampomelas vocant. Lugdun. Rubus Idæus spinosus. Clus. hist. Rubus Idæus Place, quoad iconem, Rubus Idæus vulgaris, quoad descr. rubro & albo fructu. Vtrorumque meminit Thalius: rubicundo fructu communem passim tradit; candido rariorem.

C. B. apud Matth. ambos conjungit, eos tamen in pin. separat: & hinc Rubus 3. sive Idæus spinosus: & Rubus 4. sive Idæus fructu albo. Hic est Camer. h. Rubus Idæus leucocarpus, i. e. fructu albicante, odoratissimo.

Part. 1. *Idz* Græcis, Lat. Rubus Idæus: Ger. Symbeer / Dorbeer / & Zumberstanden: Tragus ait & Zumberbeer vocari, sed hæc vox magis propriè Cynosbaton denotat. Belg. *Sinnebesien* & *Sinnebramen*. Gall. *Framboisier* [*Framboisiam*] quæ Fragariam ligneam aut ulvofam. Ital. *Rubus* & *Rovus Idæ*, in Baldo *Ampomels*: Hisp. *Carga Idea*: Angl. *Raspus* busby & *Frambois* busby. Fru. Idæus sive mora Idæi Rubi nominatur propriè, Ger. *Zimbeer*: Gal. *Frambois*. Allob. *Impos*. Angl. *F. ambois* & *Zimbery*.

Flores Maio, Junio & Julio mensibus abeunt in mora, quæ diu subsistere nequeunt: intra paucos

enim dies vermiculi in iis nascuntur, & tunc protinus pereunt. Viginosis & umbrosis silvis, locisque minime apricis, neque non torulentis & arenosis faxis gaudet. Porentui, ubi *Ambre* vocant, sicut & Montebelgard, ex eo succum condunt more Citoniatum jucundissimi saporis.

Eadem præstat, autore Diosc. quæ Rubus. Cate. *vires*: rùm flos cum melle oculorum collectionibus commodissime illinitur, & ignem sacrum extinguit: *stomachic*, machicisque ex aqua bibendus datur. Eadem Plin. duobus in locis repetit. Ad quasvis non solum ardentes febres aqua & Rubi Idæi moris distillata utilis est, sed & jucunda & grata ægris cum propter manifestam refrigerandi facultatem, tum propter suavisimum quem exhalat odorem violaceum. Decoctio tenellarum frondium foris, inque in inflammationibus convenienter in linteolis imponetur, nam sedandijillas, & restinguendi vi pollere id medicamentum certa experientia docuit. Qui cibos in ventriculo continere nequeunt, & frequentibus vomitionibus infestantur, iis fructus de voratus, & folia recentia rusa, ac foris stomacho imposita, mirè profunt. Folia Rubi lixivio decocta, si illo caput aliquoties ablus, capillos denigrant. Recentia trita & inflammationibus epatis & stomachi foris imposita, calorem remouent, deliquiumque animi & vires ægrotis addunt, quæ omnia aqua distillata efficacius præstat, potu & illitu, quemadmodum supra quoque Tragus meminit. Idibus serpentium illita folia addito oleo & vino veneno aduersantur. Ex Rubi Idæi fructus succo expresso, Geln. syrupum parare solet, quem vel Sapphicis & Smaragdinis ad corroborandum, anteferre non dubitari. Is enim summo pere oblectat, tum aspectu floridissimi & pellucidi ruboris, tum odore gratissimo tum sapore inter dulcem & acidum suavisimo, idque expertus in seipso & aliis. Ex moris Rubi Idæi exprimi posset vinum in usus multos, ad ventriculorum imbecillum, alvi fluxus, variòsque gingivarum, dentium, uvulæ, palati, aliarumque partium affectus. Calculosis utile est. *Aq. Idæi*, quæ stillaturæ forum Rubi cochlear. 1. mane & vespere assumptum cum quatuor cochlearibus vini,

RUBVS IDÆVS NON SPINOSVS.

Ignitur frequens (inquit Lugdth.) in Allobro- gum monte Gratianopoli vicino, quem vocant la Motte, caulibus multis sequepedalibus, ut Idæus Chamæbatus jure nominari possit, solosis, sine spinis ullis, folio Rubo Idæo simili, a vera parte candido & lanuginoso: fructu rubro, sed non ut in superiore rotundo & dulci, verum ex granis sic tomentato, ut in metæ modum fastigietur, acido sapore etiam cum maturuit, fragi magnitudine. Incollat vocant *des Asnes*, & ab Idæi Rubi fructu probe distinguunt quem vocant *des Ampes*. Tragus Chamæbati speciem esse existimat, nec malè Rubo Idæo conjungi & in hortum translatum in Rubum Idæum mutari, omniaque quæ de Rubo dicta sunt, huic fructui rectè attribui posse scribit. Hæc Lugd. cuius descriptio multum videtur differre à descriptione Tragi, quæ paulò post proponenda ad historiam Rubi alpini humilis. Non placet præterea ex Trago desumpta icon, quæ non alia videtur, quàm Rubi Idæi spinosi: sunt enim ipsa icon spinæ, & fructus minime fastigiatum in metæ modum, sed ternis, aut quaternis acinis solum constans.

C. B. apud Matth. Rubus Idæus non spinosus. Eid. pin. Rubus 4. sive Rubus Idæus levis: Chamæbatus sive Rubus Idæus alter, Trag. Rubus 3. Cord. in Diosc. Rubi alia species, Geln. h. Boëßbeer / i. e. bacca hircinæ, Lon. Rubus hircinus, Tab.

Rubus

Syn. est
Fragaria
Rubus I-
dæus.
Linn.

Non Ru-
bus Idæus.
Matth.

Matth. re-
futatur.

In Ida non
provenit.

Tab. not.

Ger. lapsus.

Synon.

Ampom-
els.

Rub Idæus
duplex.

Nomina
linguar.

Tempus.

Locum.

Vires.

Ignis acer.

Aqua ad

febres.

Inflammationes.

Vomitus.

Syncope.

Syrupus.

Vinum.

Aq. Idæi.

Vespere.

Locus.

Chamæbatus Tragi.

Rubus Idæus non spinosus, Lugd. Rubus Idæus Placæ, Clusii, hist. def. Rubus, Geris. C. Bauhini sententia de hoc Rubo aliena est à nostra opinione. Et præsertim Rubi alia species Gesn. h. est nobis Rubus minor, &c. Rubus, Geris. & Boeckbeer Lon. itemque Rubus hircinus Tab. ic. est Rubus Idæus spinosus. An porro Rubus Placæ, de quo mox agendum, idem sit cum præfenti, iudicent alij. Demum, Chamæbatus Tragi, quoad descriptionem videtur Rubus alpinus humilis; quoad iconem verò Rubus Idæus.

RVBVS SINE SPINIS Valentinus.

Idæi Rubi genus Clusio ostendebat Io. Placain monasterio D. Virginis, cui cognomen de IESU, primo ab urbe Valentia missi, sine spinis, foliis Rubi mollioribus, longis sarmentis per terram sparsis, cujus fructum dicebat Rubo vulgari minorem, alijs illi admodum similem. Cæterum Placæ hanc plantam Rubum Idæum censuit, fortè quoddam Dioscoridis latinus codex cap. de Rubo Idæo, hæc verba, *quamquam & sine spinis invenitur*, addita haberet, præter græci codicis fidem. C.B. pin. cum præfenti Rubo eundem facit.

RVBVS ALPINVS HV- milis.

CAP. IV.



Rubi genus hoc, quod des Chevrotes vocant Burgundi, planta est admodum humilis, palmaris ut plurimum, aut paullo major, mollis, sine spinis: folia terna ut in Rubo Idæo vulgari, mollia, viridia, non ut illa subtus alba: mora punicea ex longo pediculo in ramorum extremitate plura, capitulo ceu Ruborum, sæpe uno acino vel duobus constant, interdum tribus, rariùs quatuor, sapore grato, acido:

granum unum singulis acinis mediocriter durum, sublongum, rugosum, majus, quam semina Rubi Idæi.

Clusius sic fusiùs describit: Pedalem non superat altitudinem, teretibus, subrubentibus, & hisutis viticulis, in quibus bina aut terna folia, Rubo Idæo à plerisque nuncupati penè similia, h. e. terna simul ex eodem pediculo nascentia, rugosa, non hirsuta tamen, nullisque spinis horrentia, valde exsiccantis & adstringentis gustus, deinde amariusculi: in summis viticulis & supremis earum alis flores quidem fert (sed cujus formæ aut coloris, ignoro, verisimile est Rubo Idæo aut humili pares) deinde fructum Rubo vulgari aut Idæo minorem, h. e. minorem acinorum numero constantem: etenim binos tantum, ternos, quaternos, aut ad summum quin-

Tom. II.

nos acinos habet, longè tamen majores quam in ullo alio Rubi genere, omnino rubentes, & adeo succi plenos, ut quodammodo transpareant, acidi & palato gratissimi saporis: continent singuli isti acini singula grana alba rugosa & inæqualia; adstringentis gustu, radix longè, latèque serpit, & longas interdum viticulas humi spargit, quæ subinde radices agunt.

Chamæbatus, seu Rubus Idæus alter, inquit Tragus, non ubique locorum in umbrosis arbusculis provenit, virgis tenuissimis humi sparsis, quæ non aliter atque Fragariæ, aut Rubi vulgaris coliculi, se se ipsæ propagant; folia gerit Rubo adfamilia, sed magis exigua nullis spinis horrentia; fructum edit Augusto mense, sed non copiosum: Atque is nihil aliud est quam Morum rubrum magnitudine fraga non excedens, ternis aut quaternis acinis constans, fructui Rubi exiguo similis, gustu vinum referente, sed pergrato præditus; radix gustum obtinet asperum & ad amaritudinem quandam vergentem. Ea quotannis novos emittit & teneros coliculos. Hæc Mora in VVasgoia nostra & apud Mediomaticas Boeckbeer vocant. Ego existimo Chamæbati speciem esse, aut certè non malè Rubo Idæo conjungi posse. Nam in altissimis montibus gignitur, nec alibi unquam illum me reperisse fructum memini. Cæterum cum in hortulos meos illum transfulissem in Rubum Idæum mutatus est. Quæcunque de Rubo dixi ea puto huic quoque fructui attribui rectè posse. Hactenus ille. Ego jam antea monui me dissentire à Lugdunensi existimante suum Rubum Idæum non spinosum eandem plantam cum hac Tragi, quæ occasio ut hic integram descriptionem ex eo posuerim, licet eandem plantam existimem cum hac quam hic propono, cujusque descriptionem ex Clusio pono: nihil enim invenio quod reclamet præter iconem, quæ est potius Rubi Idæi, ut in qua appareant spinæ & mora multorum acinorum: respondet etiam tota descriptio Tragi. Quare nullus mihi persuadebit eam mutari in Rubum Idæum ut ipse ait se observasse: quanta esset in fructu, foliis & caulibus differentia à Rubo Idæo ab ipsemet descripto? suspicor deceptum Tragum in sua mutatione quam se perhibet observasse: Quandoquidem Rubus Idæus & Chamæbatus in iisdem montibus proveniunt, nempe VVasgoiæ ut ipse testatur: faciliùs fuit Trago unam radicem pro altera absumpsisse, quam tantam metaphoram quasi poeticam evenisse.

Notus Gesnero haud dubiè fuit humilis hic Rubus, eumque de Lunar. Rubum Idæum; de hort. verò Rubum alpinum humilem appellavit.

Cluspann. & hist. Rubus saxatilis, sive petreus alpinus, quia folis saxosis & petrosis locis invenitur. Ad quem modum rustici montari Etceinde [petreus bacca] quoque vocant Chamæbatus Theophrasti non ineptè ejus judicio etiam dici potest, quem Gaza Humi-Rubum interpretatus est. Rubus saxatilis alpinus, Simlero. Cam. h. Rubus parvus saxatilis Clusij.

Lugd. meminit Rubi Idæi non spinosi Allobrogum, quem ait vocari de Asues, putare eundem cum Chamæbato Tragi. Præterea ejusdem iconem assumit, quæ est Rubi Idæi vulgaris, non Chamæbati, ut antea dictum. Conferenti descriptionem Rubi Idæi non spinosi Allobrogum cum Tragi Chamæbato facile apparebit insignis differentia. Tabern. Rubus hircinus; Boeckbeer. Nomina, quæ Compilerator ex Trago mutuatus est, conveniunt Rubo alpino humili, sed non icon, quam hoc titulo exhibet, est enī Rubi Idæi vulgaris. Sed consuetæ excusat

F

Rubus al-
pinus.
Rubus mi-
nimus.

Locum.

etum ignorantia: discrimina Ruborum non movit. Gerard. Rubus Saxatilis, Eteneblac/ Berrye tree. Schv. Rubus alpinus: Item Rubus hircinus. Ecce uni planta duplicem fecit inscriptionem: Thal. Rubus minimus. C.B. pin. Chamærubus spinis carens i. sive saxatilis.

Abundè provenit in Taxofis collibus Neuberger monasterio imminetibus, sub celsissimo ejusdem nominis monte, cujus summum jugum perpetua nive oblitum. Crescit & in aliis scopulis qui circa celsissimum montium radices sunt, non in ipsius montium jugis. Augusto mense colligebat Clusius maturo suo fructu onustum. Ego proveniente observavi in Burgundia montanis prope Marche, ubi comedunt. Vidi aliàs in Sabaudia montibus.

RVBO IDÆO MINORI AF- finis Chamæmorus.

CAP. V.

Def.



Inter mites Rubos etiam censenda est hæc elegans planta cujus iconem & historiam Clusio communicabat Thomas Pénæus, Londinensis Medicus. Dodrantibus autem prædita est viticulis, in quibus alternatim tria, quatuor, rarius quinque folia, scabra, Malus, vel potius Mori [novella videlicet & primum nata, mox tamen Clus. cum Ribes vulgaris foliis conferre] foliis non valdè

dissimilia, in quinque præcipuas partes divisa, & per ambitum ferrata, longis pediculis innixa, qui ex binis alis sive apophysibus cauliculum amplectentibus exeunt. Summum caulem exoriat flos unicuque quinque foliolis ex nigro purpurascens constans. Fructus mori fructui [Rubi vulgaris verius] similis (unde nomen) sed paulò minor, primum albicans, & acerbus, postea ruber, ex acerbò dulcis: radix utcumque nodosa, ex singulis r. odis paucas fibras spargens, mirè se propagans, & quàm longissimè serpens, adè ut brevi tempore maximum spacium occupet.

Angli Bnotherris appellant, h. e. rodosam baccam, à fructu nodis simili. Clus. pan. & hist. itemq; Ger. Chamæmorus dicitur. C.B. pin. Chamærubus spinis carens: sive foliis Ribes Arglica.

Nivosa & aperta loca amat, summòque montes, & magnà eopià inter Ericas provenit monte Engleborov totius Angliæ celsissimo, duodecim miliaribus à Lancastria. Floret Junio & Julij initio: fructus Augusto maturus est.

CHAMÆMORVS NORV- gica.

Chamæ-
morus Nor-
gicus, Clus.

Chamæmoro superiori valdè affinem in Norvvgia & finitimis regionibus nasci ex Henrici

Hoieri epistolâ intelligebam, ait Clusius, qui & ejus fructum conditum sub extremum annum 1597. mittebat, & insequentis anni Junio virgulus, cum foliis & flore inter chartulas repositus. Erant autem hæc Defr. virgæ terpes, digitalis longitudinis, fusi coloris corice obductæ, quibus inhærebant uncilibus petiolis folia, vulgaris Ribes foliis non valdè dissimilia, sed paulò magis orbiculata, in breves aliquot lacinias divisa, tribusque eminentioribus nervis a versa parte prædita, è quibus multæ venæ ad circumferentiam sparguntur, in ambitu dentata: è summis virgis exeunt oblongiores tenuioresque petioli sustinentes singularem caliculum, è quo flos emergit candidus, nunc quaternis, modò quinis foliolis constans, umbilicum occupantibus multis exilibus staminibus albis cum flavis apicibus: flori fructus succedit, fragi magnitudine, rubens aut pallidus, cujus interior pulpa mollis, humida, mucilaginosâ exilium acinulorum plena, gustu non insuavis.

Paludosis & humidis locis gaudet, & maturitate Natali-
tem acquirit fructus, mensibus Junio, Quintili, Sextili: ab incolis verò Noftebeeren appellatur.

C.B. pin. Chamærubus spinis carens 2. sive foliis Ribes.

Ceterum, quæ conservandi hujus fructus ratio, quàm admirabiles ejus facultates, cum ex ipsius Hoieri epistolâ, tum ex his quæ ipse anno 1597. præfens mihi Lugduni confirmabat, sub jicere libuit. Ex ipso fructu, inquit, Electuarium rudi minervâ conficiunt quotannis Norvvgij, atque Finmarchij, in hunc fere modum. Baccas in sicili aut atheno per se ad mediocrem consistentiam coquant, nullo alio addito liquore: eum enim succi plenæ sint & molles alieno humore irrigari non expetunt. Quamquam in delicatioribus sunt nonnulli, qui melicraui Fionensis (quo summè delectantur Septentrionales isti) aliquid affundant. Hanc confessionem idoneis vasibus exceptam, & ne corrumpatur ab ambiente aère, butyro dissoluto obductam usui studiosissimè reservant: nobile sanè, & probatissimum illis adversus scorbutum remedium. Etenim non facillè credas, quæ miracula ista gens, solâ hac medicinâ faciat quotidie: ut omnino fatendum sit, nihil ad hæc esse vel Cochleariam illam tot encomiis hæctenus celebratam, vel Becaburgiam, vel Silymbrium Cardaminem, & id genus alia, quibus Germani sese efferunt. Et merito admiranda singularis Dei benignitas, quod Nordlandia longius ad Septentrionem remota, & fœdissimis morbi ob cæli, solique inclementiam miserabiliter scænti, indigenis remediis prospicere voluerit: enim verò morborum crudorum, putridorum, melancholicorum, mira hic ubique seges. Idcirco necessitas miferos rusticanos varia auxilia edocuit, ut nunc vel in gravissimis casibus pauperculus aliquis accommodatè sibi suisque mederi sciat. Ita nonnulli scorbuticos, quamvis ridiculè, tamen benè atque utiliter hunc in modum curant. In vicinam aliquam insulam moris abundantem exponunt, ibidemque solos reliquos, domum non transferunt, priusquam sanitati sint restituti. Tum enim illi, quasi ab omni humanitate exclusi, vitæ tamen (quod credibile est) cupidi, moris istius vesci coguntur, sive ut extremo remedio promissam sanitatem recuperare tentent, sive ut sitim: quâ ut plurimum torquentur, extinguant. Dumque hoc ad satietatem agunt, sine dubio intra paucos dies oppidò convalescant. Hieme verò quando id non licet, electuario suo non minus feliciter utuntur, sine certâ dosi, aut custodiâ. Aliqui toto curationis tempore, nullo alio alimento utuntur. Ha-

ætenus Hoierus.

CHAMÆ-

CHAMÆMORVS ALTERA
Norvegica.

*chamæmorvs bac-
sera.* IDEM Hoierus, aliam quandam Chamæmorum
Bacciferam, similibus penè præditi & foliis obser-
uavit, cujus historiolum Clusio anno 1576. commu-
nicavit. Fruticosa autem quædam stirps erat, quæ
Ribesium foliis & fructu pro sua proportionem
admodum æmulabatur, ut non dubitavit Clusius ter-
tiam Ribesij speciem appellare. Dodrantalis por-
to erat, cortice petiolorum nigricante, foliis latis,
dilectis, Vitis foliorum modo: baccis in cujusque
pediculi apice quamplurimis conjunctis tanquam
in umbella, non, ut in vulgari Ribesio è multis ob-
longis racemulis pendentibus, rubentibus, acidu-
lis, saporis valde ingrati; Incolis Teticbeeren nun-
cupatur.

C. B. pin. Chamærubus spinis carens 4. five foliis
Vitis: Chamæmorvs altera Norvegica Clusij.

RVBI FACIE SENTICOSA PLAN-
ta Lobelio. CAP. VI.

Defr. **A**lterius illic
(in India) na-
tae arboris truncum
aut bacillum expri-
mendum curavi-
mus, qualem cum
aliis accepimus.
Carpi crassitie est,
longam hastam æ-
quans, & cortice
nigro, denso vesti-
tus: tuberculis cras-
sis, senticosis, cre-
berrimis, in clava
modum muricato,
solido & gravi præ-
duro ligno.



Lob. Adv. & Ic.
Rubi facie sentico-
sa planta.

C. B. pin. Rubus
five exoticus: Ar-
boris truncus spinosus, Lugd. defr. ar. figura sub ti-
tulo Nerij facie secundo loco habetur.

CAPPARIS SPINOSA ET NON
spinosa. CAP. VII.

Defr. **I**mportunius nihil Capparum luxuriantibus lon-
gè, latèque radicibus veteres prodidèrè. Ipse
autem frutex multis etiam stolonibus præditus
est, quos aduncæ spinæ deorsum spectantes Ru-
borum in morem atmant, quanquam & spinarum
experts mitique inveniatur: folia alterno positu
nascuntur, circinata rotunditatis, aliàs modicè
acuminata, uncias duas circiter lata, paulùm va-
riorum longitudine, saporis perquam amari: ex
horum sinu pediculi singulares exeunt longi, qui-
bus capitula insident viridantia, quæ explicata flo-
rem exhibent candidum, Rosæ parvulæ æmulum,
medium obtinentibus infinitis fibrarum cirris: se-
men pericarpio oblongo clauditur, multum, par-
vum.

Cortices autem, quæ in officinis prostant, parietes
habent crassos, duros, solidos, albicantes, nec fricu-
faciles, acerbò sapore, quem obestit alius ru-
gosus & rimosus. Tales reperiuntur interdum qui
Tom. II.

CAPPARIS OFFICINARVM
cortex.

duos pollices cras-
situdine æquent,
quod si è radice de-
tracta sint, simpli-
ces existunt, colo-
remque habet ob-
soletum.

Theoph. non so-
lùm caule & ramis
aculeatis constat
Capparis, sed & fo-
lio hispido, quæ
cultura deterior
redditur, ut natura
sylvestrem dixeris.

Diosc. Capparis
frutex est aculeatus
[Capparis] per cer-
ram in orbem strar-
tus, spinas ut Ru-
bus [Capparis] habens
in hami modum
aduncas: folia Mali
Cotonæ [Capparis] ru-
denda: rotunda: fru-
ctum verò Olivæ
[Capparis] similes: qui
cùm debiles pan-
ditur florem pro-
mit candidum. Hoc
autem delapso nõ
nihil glandis ob-
longæ figura inve-
nitur, quod aper-
tum grana tiquam
Punici mali [Capparis]
exigua
rubentiaque intra
se ostendit. Radice-
ces lignosæ sunt,
grandes ac nume-
rosæ. Cæterum,
Capparis inter e-
jusdem Nothæ
Cynobatus dicitur.

citur, aliis Capria, aliis Malum corvi. Alij Ophio-
scorodon vocant, alij Phyllostaphylon, alij Thal-
lian, alij Petreæam, alij Holophyton, alij Ioni-
tem, alij Oligochloron. Sunt qui Aconiton [A-
conitum Trag.] qui Hippomanes, qui Trichomanes.
Prophetæ Poteram, alij Peuteron [Pentheron Trag.]
alij Cor lupi, alij Haloscorodon [Haloscorod. n. Trag.]
alij Lilium [Crim. n. Trag.] alij Thlaspin: Romani Si-
napi Persicum, alij Inturim, Aphri Herbæzathu, co-
grominant. Differre autè tradit Lybicam quæ apud Genera
Marmaridas nascitur, ab ea quæ in Apulia provenit, Diose.
cecu & ea, quæ de Rubro mari & Lybia affertur. Qua
de re fusius inter Vires Quod autem Capparum Cy-
nosbatum, quidam dixerint, factum esse scilicet Cor-
nariis, quod quædam communia cum Cynosbato ha-
beat. Ast quæ illa sint, non demonstrat. Est Opheo-
staphyles appellatio apud Plinium, i.e. Vix viperi-
na: pro qua in supposititiis Phyllostaphylon ha-
betur. In Ægypto, inquit, & Capparis firmioris ligni
frutex seminis quæ & cibi vulgati, caule quoque unâ
plerumque decerpto. Caverda ejus genera pere-
grina. Siquidem Arabicum pestilens, Africum gin-
gvis inimicum, Marmaricum vulvis & omnium in-
stationibus, Apulum vomitus facit, stomachum
& alvum movet. Quidam eum Cynosbatum
vocant, alij Opheostaphylen. Et postea: Inno-
centius Italicum est. Marmaricum itaque dixit
Plinius, id quod apud Marmaridas nascitur,

ut Dioscorides ait. Palladius Cappar vocat. Serapio Capparus.

Cynobatos. M. Virg. herba Cappar, Cynobatos [*Caninus rubus*] Job hamatos quos habet aculeos dicta. Phyllophylon, quod inter folia fructu quasi uvam habeat: Petrea herba a natalibus. Cur Sinapi Persicum ad Romanis appelletur, incertum.

Phyllophylon. Dod. hist. iconem exhibet priorem Plantini: descriptio verò convenit Cappar retuso folio; ait enim folia habere rotundiora, quàm Malus Cotonæa. Turn. in plurali numero Cappare vocat, & tamen tradit tantum spinosam. Gaza, H. Jun. & Gesn. cat. Inturis. Matth. suæ iconi addit spinas, an ex ipsa planta, vel ex lectione Dioscoridis, ambigo: eo modo dispositas, ut ipse pingit, non vidi. Cam. Epit. & hist. aliam posuit figuram, in qua vix spinæ apparent & folia rotunda ut erant Matthiolo, qui ait se vidisse Cappare fructu non spinoso hortenses, Ferraria. Lopic. figuram habet Cappar non spinosæ, licet in descriptione spinosam tradat, nec faciat mentionem non spinosæ. Ryff. Dioscoridis descriptioni addit Cappar figuram non spinosam, cum tamen Diosc. aculeatam tradat.

Matth. no. tatur. Lob. Adv. Cappare: Obf. & Ic. sicut & Tab. Cappar folio acuto, & Cappar retuso folio: figuræ duæ. Easdem etiam exhibet Lugdun. dicitque folio tantum differre. Et hinc cum Lob. & Compilatore pingit utramque spinosam. Certè si nulla differentia alia est, folium non meretur alteram figuram.

Synon. C.B. C. Bauh. apud Matth. easdem proponit, dicens. Quæ rotundo folio est, Matthiolus expr. sicut I. Cappar, Tragi, Matth. Cordin. Diosc. Dod. Gall. Gesn. h. Lon. Lac. Cast. Lugd. Cappar retuso folio, Lob. Cappar Italica, Cæsalp. Cappar 2. Tabern. II. Cappar Dod. hist. Cappar folio acuto, Lob. Lugd. Ger. Cappar aliud genus, Cæsalp. Cappar prima Tab. Idem pin. Cappar 1. five spinosa fructu minore, folio rotundo Cappar, Tragi, & C. Ang. Lugd. & Rauv. qui & sylvestrium meminit. Cappar spinosa, Bellon. Cappar rotundior folio, Ger. Item, Cappar 2. five folio acuto. Et, Cappar 1. five non spinosa fructu majore: Cappar non spinosa, Bellon. In Arabia arboreus est & hyeme folia retinet, Cappare Alexandriæ majores esse, quàm alibi, quos Cappar appellant, Alpir us author est. Hæcile, cujus multiplex error, studio suum in radio consumere posset. Pingit plantam folio retuso, scribens interim esse rotundo, quasi inter rotundum & retusum nihil intersit. Matthiolus eam non expressit. Spinæ malè pictæ sunt, quod severus censor Lugd. non animadvertit. Sursum enim spectant, & plures simul conjunguntur, cum deorsum inclinent, hamate sint, & simplices. Nec folia retusa sunt, sed ex rotundo acuminata. Nec prima ejus Cappar, Tragi est, sicut nec Dod. gall. Lucanæ, aut H. Lugdunensis, quæ eandem cum Matthiolo exhibent, excepto Trago, cujus figura neque ad plantam viridem, neque ad siccam picta videtur. Cordus etiam in Diosc. & Gesn. h. (cui Cappar & Rurpe dius dicitur) non concludunt, quam intelligant, imò & e folij acuti aut rotundi ibidem meminerunt. Mirum ergo unde colligat, esse ejus primam Cappar. Loniceri quoque figura esse non potest, spinis enim caret. Cæsalpini tandem Cappar Italica esse recit, quæ virgas simplices profert, sine spinis. Quod idem comprobant sequentia ejus verba. Aliud genus spinosis ramis constat peregrinum: Dioscorides describit illud genus, quod aculeis constat. Cam. h. Cappar vera. Schvven. Cappar major & minor.

C. Bauh.

*Nomina
Lugd.*

Nomen apud Græcos idem, quod apud Latinos tum ipsa planta, tum fructus obinet: *capere* siquidem dicitur, nonnullis tamen Lat. Inturis: Arab. Cap-

par & Kappar. Barb. Cappar. Germ. Capperen: Belgis Capper: Gall. Capres: Ital. Cappar: Hisp. Castil. & Portug. Alaparras: Catal. Taperes: Angl. Capper: Boh. Kappary.

Inter interpretes non convenit, quomodo illud Cappar. Eccl. cap. 12. Et dissipabitur Cappar, sit pro *facturum* priè explicandum. Aliis enim appetitus est decia *paginatum* voce. Alij sunt qui exponunt de libidine, & rei venere appetitu, qui expiret ac e notiat in senibus.

Montpelij vidi Cappare florescentes Autumnos, Septembri sine spinis: Patavij fructum siccum cum *Lacm. et Tempus.*

Spinis certo ordine dispositis, ac aliter quàm pingat Matthiolus: nec animadverti spinas alias sursum vergentes, alias sursum tendentes: Lugdun. spinosas Cappare florescentes Nove mbris, unde etiam plantis habui: quas plantavi in orto Montbelgardi: Prostant in officinis venales aceto conditæ parvæ & mediocres, asservatæ cum sale marino grumoso, quæ ante usum in aqua calida macerantur. Sicutur *Satis.* (autore Plinio lib. 19. cap. 8.) Cappar siccis maximè, area in desolus cavata, ripisque undique circumstrutis lapide: alias evagatur per agros, & cogit solum sterile scire: floret Æstate: viret usque ad Ver-

giliarum occasum: sabulosissimissima. Præstantissimas Cappare ex Alexandria Egypti Venetias advehi perhibet Matth. Elle & in Apulia Cappare proveniunt, unde etiam plurimæ deferantur, verum longe deteriores his quæ ex Ægypto importantur: provenire etiam Romæ in collapsis ædificiorum parietibus, ruderibusque præsertim circa Pacis templum: itaque Senis, quæ quidem Apulis saporis præstantia mini nē cedant: In cultis nasci Cappare negare Theophr. lib. 6. cap. 5. de plant. hist.

Seri tamen hæc ætat, colique perinde ac fegetes & legumina, quemadmodum & Plinij tempore, qui ferendi ratione non jam supra explicavit. Cum ergo in cultis locis satæ exerceant Cappare, id Theophrasto repugnare putat Matthiolus, quia gaudere locis arer acis atque tenuibus, cultis haudquaquam exire scripserit: at oppidò quàm ingeniosus sit Matth. quo vultu, quo aspectu talia pronunciare audeat, quàm feliciter auctorum animos affectuatur, hinc aperitissimè dignoscitur, cum Theophrast. rem dubitative proposuerit hoc modo: Inturis peculiare habet, quod & folium & caulem gerit subhispidum, nec Phleum, & Lappaginem amulat, quæ foliis mitibus constant: Vnistris humilis humiculis est: germinat florèque Æstate & folium usque Vergiliarum perdurat: gaudet locis arenaceis atque tenuibus: cultis haudquaquam exire dicitur. Sed cum apud oppida & loca plana proveniat, non Lappaginis modo apud montuosa: hoc minus verè putatur. Cultis ergo exit, sed cultu levissimo contenta est, ut docet Columella his verbis. Cappar plurimis provinciis sua sponte novalibus nascitur: sed quibus locis, ejus iropia est, si serenda fuerit, siccum locum desiderabit. Isque debet ante circumdari fossula, quæ repleatur lapidibus, & calce, vel punico luto, ut sit quasi quædam lorica, ne possint eam perumpere prædicti seminis fructes, qui ferè per totum agrum vagantur, nisi munimento aliquo prohibiti sint. Quod tamen non tantum incommodum est (subinde enim possunt extirpari) quæ tum quod noxium virus habent, succoque suo sterile solum reddunt. Cultu aut nullo, aut levissimo contenta est. Quippe quæ res etiam in desertis agris citra rustici operam convalescit. Sicutur quoque æquinoctio. Fructuat ruri in Æthiopia Tyrrhenici maris, Narbonensis, & Hispanica. Eadem hortis jamdu innecuit.

Cappar, ut videtur est apud Dioscoridem, caulis & fructus ad cibum non sale conditur. Turbat autem alvum, stomachoque incommodus est, & fitum in-

*Plures et
Temperamentum.*

tim inducit. At cocta Capparis in cibo accepta, commoda magis est stomacho quam cruda. Fructus itaque ejus splenem liquat, si duarum drachmarum pondere cum vino bibatur ad dies quadraginta. Ducit etiam urinam & alvi excrementum cruentum. Coxendicium quoque morbo & resolutioni opitulatur fructus si bibatur, ruptis item ac convulsis. Ducit & menses, & pituitam de capite detrahit. Dentium item dolorem sedat fructus cum aceto coctus & collutus. Ceterum radices cortex aridus, tum ad prædicta commodus est, tum omne diuturnum & fœdum ac callosum ulcus repurgat. Imponitur etiam in splenicis, cum cruda hordeacea farina: si verò radix manducetur, dolenti denti auxiliatur. Vitilignes etiam albus exterit cum aceto trita. At verò folia & radix trita, duritias & strumas discutiunt. Succus autem auribus infusus, vermes in ipsis occidit. Porro Lybica Capparis, quæ apud Marmaridas appellatur nascitur, vehementer inflat, quæ in Apulia provenit, vomitus concitat, quæ verò de Rubro mari & Lybia affertur, acerrima est, pustulas in ore excitans, & gingivas ambedens usque ad denudationem. Unde ad efumineptia est. Ferunt eos, inquit Plinius, qui quotidie Capparin Italiam edunt, paralyti non periclitari, nec lienis doloribus. Radix ejus vitilignes albas tollit, si trita in sole fricetur. Splenetici prodest in vino potus radices cortex 3.ij. dempto balnearum usu. Feruntque 35. diebus per urinam & alvum totum lienem emitti. Bibitur in lumborum doloribus, ac paralyti. Dentium dolores sedat tritum semen, ex aceto decoctum, vel manducata radix: infunditur & aurium dolori decoctum semine in oleo. Phagadenas folia & radix recens cum melle sanant. Sic & strumas discutiuntur: parotidas vermiculoseque cocta in aqua. Iocinoris quoque malis medetur. Dant & ad tinea in aceto & melle. Oris exulcerationes in aceto decocta tollit. Stomacho inutile esse inter auctores convenit. Capparis facultas, ut prodit Gal. lib. de alim. est satis tenuium partium, & idem minimum alimentum exhibet corporibus ac vascenibus. Fructu verò ejus magis ut medicameto, quam ut alimento utitur. Idem 7. simpl. Capparis radices cortex vincentem habet qualitatem amaram, proximam acrem, deinde acerbam. Ex quo liquet, quod diversis pugnantiis constet facultatibus: quibus abstergere, purgare, incidere potest amaritudine: ex calfacere, incidere, digerere acrimonia: porro contrahere, densare, costringere acerbitate. Itaque lienes induratos si quid aliud hoc medicamentum juvare valet, tum foris idoneis, illinendis remediis admistum, tum intra corpus assumptum, sive decoctum in aceto aut oxymelite, & id genus sive aridum contusum illisque permistum: quippe cum aptè crassos, lentosque humores hoc pacto sumptum evacuet, nec eos tantum per urinas, sed & per ventrem, sæpè etiam sanguinolentos deferat, unde & lienes adjecti sunt, & coxarum dolores. Quin etiam menses promovet, & ex capite purgat, detrahitque, quod *amara exuritur* vocant, auxiliaturque ruptis atque convulsis. Porro radices ejus cortex ulceribus malignis cataplasmatim modo impositus, non malum est remedium: ut qui illa extergere valeat, nec segniter desiccare. Præterea dentium labores prædicatarum qualitatium ratione adjuvat, interim cum aceto coctus, interim cum vino, sæpè etiam solus dentibus manus ac morsus. Ex dictis ergo clarum est, incindi quandam ei facultatem inesse itaque extergendi, digerendi, contrahendi. Vitilignes liquidum cum aceto detrahit, & cheraidas & duros tumores digerit, idoneis ad ea medicamentis mistis. Radices cortici, fructus proportionem virium respondet, nisi quod ad omnia im-

Tom. II.

becillior. Imò & folia & caules ejus similem vim obtinent, memini quæ me foliis quandoque paucis debentur duritiem choeradis naturam referentem diffusisse. Sed admiscemus scilicet illis quippiam, quod eorum vehementiam obtundit. Nec mirum est, quòd autium vermes amaritate occidunt sua. Porro capparis quæ in admodum calidis ferventibus regionibus provenit, ut quam fert Arabia, multò est nostrate acrior, adeò ut plurimum etiam habeat facultatis adurentis. Serapio Clysteres ad sciaticam (ut loquuntur barbari) & succo Capparorum, Rasimi magna olim experientia factuasse scribit. Capparin affert Simeon Sethi calidam & siccam esse gradu secundo. Contra Fern. m.m. Capparin, cujus florem ac radices corticem usurpant, calidam siccamque esse tertio recessu statuit. Capparis aff. *Sale cordis* fertur ad nos, inquit Corn. sale conspersa, eò quod sola recondita putrescat. Sale itaque condita etiam hodie in muria ad nos affertur. Ex qua exempta & leniter fetvescenda, aceto ac oleo affuso, in cibi usum venit, intinctus ferè loco ad carnes & pitices assatos adhibita. Majores & minores Cappares aiunt Advers. Emponis variis vaneunt, sed minores in primis sunt commendatione, lætisque pluris enuntur quam majores: vulgò namque habentur meliores parvæ. Sic palati studium fallit ingenium, valetudinis dispendio: nam qui sapor illis percipitur, ascitius est à muria, vel ab aceto: alioqui utraque acerrimi ac terribissimi gustus est, seu viridis, seu matura, proindeque minor perpaucæ carnis & succi, facilius & penitus imbuatur conditura, quam major, quæ melioris succi & aprioris alendæ carni est. Culina proinde error est, minores majorebus præferre. Sed hic consuetus inolevit mos, nam, ut scitè dicebat Philosophus, nihil magis adversatur valetudini aut Medico, quam bonus coquus. Itaque voluptati coquus emat minores magno precio: fugi œconomus emet (si nos audiat) majores minoris multò, bonæ tuendæ valetudini. Radices esse adulterinas quidam imperiti Medici ridiculè quiritantur: nam hac radice nihil vulgatiùs aut vilius etiam in Hispania. Vomitiones Cappares haudquaquam ciet, ut inquit Diosc. existimant Matth. Nisi fortasse hac facultate sint prædita, dum recentes ac vides comeduntur, antequam muriam experiantur, & inde elixentur. Sed infirmat Matth. opinionem, quod fortè non eandem Capparin, sc. Apuleam, cum Diosc. intelligat. Capparis *Radices in officin non sunt adultæ* virides ac teneros furculos apud Amatun, nò aliter quam Terebinthi mandunt in aceto simul & muria, *Sarculi in aut solo aceto condientes*. In suis consultationibus tradit Montanus radicem Capparum masticatam multam pituitam trahere. Cappares mense adhibet contra lumbricos Gesnerus. Bayrus, recipit *Crines de* radices Capparorum & illas coquit in lacte asina *migratis*, usque ad tertiam partem & ungit capillos dimittendo per noctem, hos enim peccendo nigrificat.

CAPPARES ARBORESCENTES

Cappares in Arabia invenimus, pumilarum siquæ altitudinem æquantes, ut nobis conciscendæ fuerint, ad earum fructus colligendos; ovi gallinæ magnitudine, & semina intus continentes, piperis instar calida: ipsæ Cappares Juglandibus magnitudine non cedunt. Ut verò album sinapi in vinum vernaciam injiciunt, ne ferveat, sed diutius suam dulcedinem retineat: sic Arabes istarum Capparum semina in suis Vinis commiscere solent, ut dulcia ea conservent, quod etiam Avicenna annotavit. Bellor. Obli. l. c. c. c.

Synon.

C.B. pin. Capparis 4. sive arborefcens fructu Iuglandis magnitudine : Capparis Arabica fructu ovi magnitudine , semine piperis instar acri, Bellon. Capparum arbor, Rauvv. qui fructus magnitudinem non exprefsit. Cappares plurimum ab his quæ in arbores adolefcunt, & quæ in Græcia proveniunt, differentes in Tauri montis saxorum filluris, Bellon. notavit.

CAPPARIS FABAGINEA SIVE
Peplios Lutetianorum.

CAP. VIII.

Defcr.



Longis lentisque caulibus est prædita, glabris, striatis, ramosis, ad quorum genicula nascuntur duo ex adverso siti. pediculi unciales & scunciales, bina folia in summo cacumine gerentes, modicè distantia, positi ferè foliorum Visci, pinguis, ex rotundo oblonga, Portulacæ foliis quodammodo similia, nervo medium percurrente, à quo venulæ obliquæ in margines exporriguntur, a-

mata, ex eorundem sinu pediculi semunciales prodeuntes, florem unum sustinent singuli miniatum, extra quem prominent longa rubentia stamina, apicibus donata concoloribus : florem extrinsecus ambiunt foliola oblonga, viridantia : siliqua auctore Rauvvolfio, Sesamo similis : addit frater C. Bauhinus oblonga, angulosa, quatuor veluti ex thecis composita, in qua semina continentur plura, lata, compressa, ex rotunditate in acumen desinentia. Vniversa planta gustu amaro Salicis aut Capparis.

Synon.
Fabago.
Peplios.

Lob. Obs. & Ic. Capparis leguminosa, sive Fabago Belgarum : Peplios Petri Quiche & Parisiorum.

Rauvvolfij. Halepi Morgesani, Avicennæ Ardifrigi, Morgesani, & Andiria Rhafis.

Dod. hist. annotat à recentioribus Capparin Fabaginem & plerique Capparin leguminosam dici : veteribus notam fuisse, non constare : Cepam Dioscoridis esse, non esse facilè affirmare, brevi ac succincta admodum apud Dioscoridem extante descriptione : describi verò ab Avicenna capite 28. herbam quandam Ardifrigi nomine : cum quare responderet, si tam gravi esset odore, quàm sapore amari-
cante. Si nihil aliud impedit, quàm gravis odor, quominus sit Ardifrigi, nos illud recipimus ex auctoritate Rauvvolfij, qui ait Halepi ingratiissimi esse odoris, ac eam ob occasionem incolæ crebrè uti ad expellendos vermes.

Cam. apud Matth. ejusdemque Epit. Capparis silvestris sive fabaginea, vel leguminosa : Avicennæ Ardifrigi, aut Ardifrigi, Rhafis Andiria. Eid. h. Capparis, Fabago, Tabern. Capparis leguminosa, Geschecht der Capperen.

C.B. in Lugd. Fabago Belgarum. repetitur in append. Morgesani Rauvvolfij nomine : duæ descriptiones ex utraque una faciendæ erat, siquidem in prima fructus reperiantur : aliàs figura posterior magis probatur. Fallitur C. Bauh. nam fructus ali-
quoties pinguius in ipsa planta, & separatim juxta eam. Eid. pin. Capparis s. sive Portulacæ folio : Telephium Dioscoridis & Plinij. Colum.

Observavi florentem Augusto, Lutetiae in hortu regio: Romæ inter rudera spontè nasci perhibetur apud Camer.

CAPPARI FERRE SIMILIS
Alhaut.

CAP. IX.

Thevetus auctor est, in Insula Suachem Æthio-
Locus. pico littori adjacente, nasci herbam quandam Alhaut nomine, in rupibus latè sese diffundentem, foliis ferè Capparis, cujus fructus germina sunt, sive capitula rotunda. Folia, radices, fructus, gustu sua-
vissimi sunt, & cordi salubres, quibus indigenæ ad colicos & stomachi dolores quovis, præterea ad hepatis & pulmonum affectus utuntur, decocto ex tota herba parato, cum Corallij albi pulvere.

C.B. pin. Capparis 6. sive Cappatibus similes bac-
cæ in Virginea. Sacquenummener baccae plantæ, quæ in stagnantibus aquis reperitur, par. i. Ind. occid.

FINIS LIBRI XIII.



HISTO-

Vitis folia non decidere. Tandem de sacu arborum agens, eam inibi his verbis etiam recenset. Vitiū solo differentia maximè numerosa est. Quot enim genera telluris, totidem & vitiū esse quidam affirmant. Verū inter eas, quæ minus fructificant, gemmis crebrioribus constant, solidiorēque sunt. Ex eodem Theophr. hæc habentur. Vitis corticem speciem radicis habere, nervosum, macilentum, tuni-
Vitiū differentia a solo

nis multiplicem, quem auferunt cultores: medulla carnosam: materiem lentam: radices tenues, sobolem sursum versus procreantes, ideo evellendas, quæ in summa tellure sunt: folia ampla, aliquatenus filia, longo pediculo propendens, & tremula ex nervulo, & cortice, & carne constantia: fructificare ex novellis furculis: florem lanugineum amplectentem fructum: nam decidunt perforati: fructum congestum: succum vinosum. Ex semine natam degenerare, ut pro nobili ignobilis, & sæpè silvestris oriatur, aded ut quædam fructum non maret, quædam eundem non compleat, sed ad florem usque perducant.

Varroni differentia. Marcum Varronem quoque Vitem arborem facere colligitur ex sequentibus. Præterea quæ arbores in ordine sacæ sunt, eas æquabiliter ex omnibus Sol & Luna coquunt, quo fit ut uvæ plures nascantur, & ut celerius coquantur, quas res duas sequuntur altera hæc duo, ut plus reddant musti & precij pluri.

Columnella. Columella, ut suo loco constabit, nec arborem, nec fruticem, Vitem propriè dixerit. Eius autem genera hæc tradit. Vitis, inquit, vel ad escam, vel ad effusionem deponitur. Ad escam non expetit institui, nisi cum tam suburbanus est ager, ut ratio postulet in conditum fructum mercantibus velut pomum vendere, quæ cum talis est conditio, maximè præcoques, & duracina, tum denique purpureæ, & bumastæ, dactylicæ & rhodiz, libycæ quoque & cærauniæ, nec solum quæ jucunditate saporis, verū etiam quæ specie commendari possint, conscribere debent, ut stephanitz, ut tripedaneæ, ut uncianæ, ut cydonitz. Item quarum uvæ temporibus hyemis durabiles vasis conduntur, ut venuculæ, ut nuper in hos usus exploratæ, numisianæ. At ubi vino consilium, Vitis eligitur, quæ & in fructu valet, & in materia, quod alterum ad reditus coloni, alterum ad diuturnitatem stirpis plurimum confert. Sed ea tum præcipua est, si nec nimis celeriter sponte, & primo quoque tempore deflorescit, nec nimis tardè miscet, quin etiam pruinis, & caliginem, & carbunculum facit propulsa, eadēque nec imbris putrescit, nec siccitatibus abolescit, talis nobis eligatur vel mediocriter secunda, si modo is locus habetur, in quo gustus nobilis, pretiosusque fuit: nam si sordidus, aut vilis est, feracissimam quamque serere conducit, ut multiplicatione frugum reditus augeatur. Ferè autem omni statu locorum campestris largius vinum, sed jucundius asferunt collina, quæ tamen ipsa modico statu cæli magis exuberant aquiloni prona, sed sunt generosiora sub austro, nec dubium quin sit ea nonnulla vitium natura, ut pro loco suo bonitate vini modo vincat, modo superetur. Solæ traduntur

Vitis ad effusionem. Amineæ excepto cæli statu nimis frigido, ubicunque sint etiam si degenerent, sibi comparatæ, magis aut minus probi gustus vina præbere, & cæteras omnes sapore præcedere. Eæ, cum sint unius nominis, non unam speciem gerunt. Duas germanas cognovimus, quarum minor ocydæ & melius deflorescit habilis arbori, nec non jugo: illa pinguem terram, hæc mediocrem desiderat, longēque præcedit majorem, quia & imbres, & ventos fortius patitur, nam major celeriter in flore corripitur, & magis jugis, quam in arboribus, ideoque non est vineis

Amineæ tres duæ. apta, vix etiam arbutio, nisi præpingui, & uvida terra, nam nec mediocri valet, multo que minus in exili, prolixarum frequentia materiarumque, foliorumque & uvarum, & acinorum magnitudine dignoscitur. Internodius quoque rarior, largis fructibus à minore superatur, gustu non vincitur, & hæc quidem utraq; Amineæ. Verū & alia duæ geminæ, quæ ab eo quod duplices uvæ exigunt, gemellæ vocantur, austerioris vini, sed æquè perennis. Earum minor vulgè notissima, quippe Campaniæ celeberrimos Vesuvii colles, Surrentinōsque vestit. Hilari inter æstivos favonij status, austis affligitur. Cæteris itaque partibus Italiæ non tam vineis, quam arbutio est idonea, cum prædictis regionibus commodissime jugum sustineat, materiam, fructūque, nisi quod duplicem non ab similem minorem germanæ egerit, sicut major gemina minori germanæ, quæ tamen minor hoc melior est, quod fecundior etiam mediocri solo, nam illi nisi præpingui non respondere dictum est. Lanatam quoque amineam quidem maximè probant, quæ hoc vocabulum non ideo usurpat, quod sola ex omnibus Amineis, verū quod præcipue canescit lanugine. Sanè boni vini, sed levioris, quam superioris, crebram quoque materiam fundit, atque ideo propter pampini densitatem sæpè parum rectè deflorescit, eadēque maturo fructu celeriter putrescit, super hunc numerum, quem retulimus, singularis habetur Amineæ, majori geminæ non dissimilis, primum specie pampini, & trunci, sed vini sapore aliquanto inferior, quamvis generosissimus sit, proximè præferenda etiam propriis virtutibus, nam & feracior est, & flore melius exiit, spissaque, & albidæ uvæ, ac tumidioris acini gent, gracili arvo non deficiit. Atque ideo inter uberrimas uvæ numeratur. Nomentanæ vini nobilitate subsequuntur Amineæ, secūdate verò etiam præveniunt, quippe eum se frequenter impleant. Sed earum quoque feracior est minor, cuius & folia parcius scinditur, & materia non ita rubet, ut Amineis, à quo colore Rubellianæ nuncupantur, eadēque fecinie, quod plus quam cætera fecis asserunt. Idem incommodum repensant uvarum multitudine, quas & in jugo, sed & in arbore melius exhibent. Ventos, & imbres valenter suffrunt, & celeriter deflorescunt, & ideo citius miscet, omnis incommodi patientes, præter calor, nam quia minuti acini, & duræ cutis uvæ habent, æstibus contrahuntur. Pingui arvo maximè gaudent, quod ubertatem aliquam natura gracilibus, & exilibus uvis præbere valeat, frigidum, ac rosidum solum & cælum commodissime sustinent Eugenia, dum sunt in Albano colle. nam mutato loco vix nomini respondent suo, nec minus Allobrogicæ, quarum vini jucunditas cum regione mutatur. Magni etiam dotibus tres Apianæ commendantur, omnes feraces, jugoque, & arboribus satis idoneæ, generosior tamen uvæ, quæ nudis foliis est, nam duæ Lanatæ quamvis frondibus, & palmitum pari facie flexere, qualitate sunt disparles, cum tardius altera recipiat cariem vetustatis. Pingui solo feracissima, mediocri quoque fecunda, præcoquis fructus. Ideoque frigidis locis aptissima vini dulcis, sed capiti, nervis, venis que non aptæ, nisi maturè lectæ, pluvius, ventique & apibus asserunt prædam, quantum vocabulo propter hanc expopulationem cognominantur. Atque hæc pretiosi gustus celeberrimæ. Possunt tamen etiam secundæ notæ vites proveniunt, & ubertate commendari, qualis est Biturica, qualis est Basilica, quarum minorem Cocolumen vocant Hispani, longe omnium primis utraq; proximæ. Nam & vetustatem vinum earum patitur, & ad bonitatem æquam per annos venit. Iam verò ipsæ fecunditate præstant omnibus, quas

Gemina, seu de gemella minor & maior.

Aminea lanata.

Aminea singularis.

Aminea Nomentana.

Rub. 1. una & 2. fecinie.

Eugenia.

Allobrogica.

Apiana.

ca. 1. una & 2. lanata.

Biturica, Basilica, Cocolumen.

quas ante retulit, tum etiam patientia, quippe turbines, imbrésque fortissimi sustinent, & commodè fluunt, nec deficient macro solo. frigora melius quam humores sustinent; humores commodius quam siccitates, nec caloribus tamen contrahuntur. Visulæ deinde ab his & minor Argitis terræ mediocritate laetantur. nam in pingui nimis viribus luxuriant, in macra tenues & vacuæ fructu veniunt. A niores jugo quam arboribus, sed Argitis etiam in sublimibus fertilis vastis materiis, & uvis exuberat, humillimis tabulatis aptior. Visula brevem materiam & larum folium exigit, cujus amplitudine fructus suos optimè aduersus grandinem tuetur, qui tamen nisi primo quoque tempore maturi legantur, ad terram decidunt, humoribus etiam priusquam defluat putrescunt. Sunt & Helvolæ, quas nonnulli Varias appellant, neque purpureæ, neque nigrae, ab helvo (nisi fallor) colore vocatae, melior est nigrior abundantia vini, sed hæc sapore pretiosior. color acnorum in neutra conspicitur æqualis, utraque candidi musti alternâ vice annorum plus, aut minus affert, melius arborem, sed & jugum commodè vestiunt, mediocri quoque solo fecundæ, sicut Pretia minor & major, sed ea generalitate vini magis commendantur, & frequentibus materiis frondent, & citò maturescunt. Albuclis utilior, ut ait Celsus, in colle quam in campo, in arbore quam in jugo, in summa arbore quam in ima, ferax & materia frequentis, & uve, nam quæ Greculæ vites sunt, ut Marcoticæ, Thasiæ, Psythiæ, Sophoriciæ, sicut habet probabilem gustum, ita nostris regionibus & raritate uvarû & acnorum exiguitate minus fluunt, Inerticula tamen nigra, quam quidam Græci Amethyson appellant, potest in secunda quasi tibe esse, quod & boni vini est, & innoxia, unde & nomen traxit, quod iners habetur in tentandis nervis, quamvis gustu nō sit hebes. Tertium gradum facit earum Celsus, quæ fecunditate solâ commendantur, ut tres Helvenitiæ, quarum duæ majores nequaquam minori bonitate, & abundantia musti pares habentur, earum altera, quam Galliarum incolæ Emarcum vocant, mediocri vini, & altera quam Longam appellant, eandemque Avaram fordidi, nec tam largi quam ex numero uvarum, quas prima spes promittit. Minima & optima est tribus facillimè folio dignoscitur, nam rotundissimum omnium id gerit, atque est laudabilis, quod siccitates maximè perfert, quod frigora sustinet, dum tamen sine imbris sit, quod nonnullis locis etiam vinum ejus in vetustatem diffunditur, quod scipud sola acerrimum quoque solum fertilitate sua commendat. Ac Spionia dapsilis musto, & amplitudine magis uvarum, quam numero fertilis, ut Oleaginea, ut Murgentina, eadem qua Pompeiana, ut Numisiana, ut Venacula eademque Scirpula, atque Sticula, ut nigra Fregellana, ut Merica, ut Retica, ut omnium, quas cognovimus copiosissima Arcelaea major, à multis Argitis falsò existimata. Nam has nuper mihi cognititas, Pergulanam dico, & Irtiolam, Fercolamque non facile asseverem quo gradu habendæ sint, quod & si satis fecunditas scio, nondum tamen de bonitate vini, quod affertur, judicare scio, ut am etiam præcoquem Vitem ante hoc tempus incognitam græcâ consuetudine Dracontion vocitari compemimus, quæ fecunditate viciuendatæ Arcelate Basilicæque & Bithuricæ comparari possit, generalitate vini Amiricæ. Multa præterea sunt genera Vitium, quarum nec numerum, nec appellationes cum certa fide referre possumus. Neque enim ut ait Poëta, numero comprehendere refert,

Quem qui scire velit Libræ velit aquæ, vis id m

Disce, quàm multæ Zephyro versentur harenæ,

Quippe universæ regionès, regionumque penè sin-

gulæ partes habent propria Vitium genera, quæ consuetudine sua nominant, quedam etiam stirpes cum locis vocabula mutaverunt, quædam propter mutationes locorum etiam à qualitate sua discesserunt, ita ut dignosci non possint. Quare prudentis magistri est, studiosos oculinodi nomenclationis aucupio, quo potiri nequeant, non demorari.

Plinium igitur consulamus naturæ miraculum, Genera et de Vitium natura & quibus modis ferant. Vites ju-
re apud præcos magnitudine quoque inter arbores
numerabantur. Iovis simulacrum in urbe Populo-
nia ex una [Vite] conspiciamus, totæ vis in corruptum, id est
Item Massiliæ pateram; Metaponti templum Iuno-
nis vitiginis columnis stetit. Etiam nunc scalis te-
ctum Ephesiæ Dianæ scanditur [ex] Vite una Cy-
pria, ut ferunt, quoniam ibi ad præcipuum amplitu-
dinem exeunt. Nec est ligno ulli æterior natura
[materia ver.] Verum ista ex silvestribus facta credi-
derim, quando hæc Vites consura annuâ coëcen-
tur, & vis earum omnis evocatur in palmites, aut
deprimitur in propagines, succique tantum gratia
his pluribus modis ad cæli mores, solique ingenia.
In Campano agro populis [fortè legendum Opulis]
rubunt: mantasque complexæ, atque per ramos
earum procacibus brachiis geniculato cursu scan-
dentes, cacumina æquant, in tantum sublimes, ut
vindemiator autotatus rogum ac tumulum excipiat
[dum ad putandum vineam conducitur, paciscitur, si fortè
casu percat, rogum ac sepulchrum sibi fieri impendo auro-
rantur.] Nullo sine crescunt, dividique aut potius a-
velli nequeunt. Villas & domos ambitri singulorum
palmitibus, ac sequacibus lotis quoque, memoria
dignum inter prima Valerianus quoque Cornelius
existimavit. Vna Vitis Romæ in Livæ portibus sub-
diales inambulationes umbrosis pergulis [operculis]
opacat, eadem duodenis musti amphoris fecunda.
Vlmos quidem ubique exsuperant. Miratunque al-
titudinem earum Ariciæ ferunt legatum regis Pyr-
rhi Cineam faceret luisse in austeriorem gustum vi-
ni, meritò matrem ejus pendere in tam alta cruce.
Rumbotinus vocatur, & alio nomine Populus [upu-
lus Dalech.] arbor Italiæ Padum transgressis, cujus
tabulata in orbem patula replent, puroque produ-
cto [semèro palmitis, multo annis durato. Sic vocant à
squam siccoritæ & aspero qualis est Draconim cutis, vel
à longitudine anguineæ, Scel.] Dracone in palmam e-
jus, inde in subrectos ramorum digitos flagella di-
spargunt. Eadem modicè hominis altitudine ad-
miniculatè sudibus horrent [hærent alijs] vineamque
faciunt: & alia improbo reptatu, pampinorūque
superfluitate periticia [superst. a petulantia] domini
amplo discursu actia media complentes [hæ sunt tu-
gate & c. impluviatæ Vites] Tot differentias vel sola plentia
Italia recipit. Stant provinciæ tum aliquarum per se
Vites sine ullo pedamento, artus suos in se colligen-
tes, & brevitate crassitudinem patientes [brevisi-
tem crassitudine pensantes, Dalech.] Vetant hoc aliubi
verti, ut in Africa & in Narbonensis provinciæ par-
tibus. Excrecere ultra suos [senes] pollices prohibi-
tæ, semperque pastinatis [putatis Dal.] similes [nam
cum vinea pastinatur, sicut a suis administris samentis
viniores humi iacere parvuntur, quod putat a suis rur-
sum pedamentis alligenti] herbarum modo vagantur
per arva, ac succum terra passim uvis bibunt, quæ ob
id magnitudinem infantium puerorum in interiore
Africa parte exuperant. Vva non aliubi gratior [ita ma-
[crassiore Turn.] collo, ut inde possit invenisse no-
men [a duris acinis] duracina. Namque genera ma-
gnitudine, colore, saporibus, acinis, innumera, e-
tiamnum multiplicantur vino. Hæc purpureo lucent
colore, illic fulgent, roseo, nitentque viridi. Candi-
caps enim nigerque vulgares. Tument verò mam-
matum modo Bumasti. Prælogis Dactyl: porti-
gunu.

Genera et
de Vitium
natura &
quibus
modis
ferant.

Plinio
Arbor Li-
guri Vitis
auturna.

Vitis
Vitis
Vitis

Populis nu-
buntur.

Sublimi-
tas.

Amplissima
Vitis.

Romanæ
Vitis.

Vitis ex-
perant.

Vitis sine
pedamento.

Vitis sine
pedamento.

Vitis sine
pedamento.

Vitis sine
pedamento.

Vitis sine
pedamento.

Vitis sine
pedamento.

*Leptoragis
Durantis
per hiemem*

Fabrilis.

*Rhetica.
Veronenſis
Paſſe.*

*Allobro-
gica, pie-
cem
reſolens.*

*Numerus
Vitiū in-
finitū cen-
tra Demo-
critum.*

*Aminea
quinq̃.*

*Germana
minor &
maior.*

*Gemella
minor &
maior.*

*Aminea la-
bata.
Nomen ta-
ne.*

*Apiane
duo.*

Gracula.

Eugenia.

guntur acinis. Est & illa naturæ lascivia, ut prægran-
bidus adherent parvi, mites, & leuitate certantes:
Leptoragas has vocat. Durant alie per hiemem,
pensili concauerata nodo [pensiles, congeminate no-
dus, qual. pensili conglomerata nodo, ver.] Alie in sua tan-
tā conduntur anima [horum conditura generum
meminit Caro & Varr.] ollis fistilibus, & in super do-
lis incluse, stipata vineaeis circumludantibus.
Alis gratiam, qui & vinis, fumus affert [Fabriles vo-
cat Aurelianus] fabrilis, iisque gloriam præcipuam
in fornacibus Africæ Tiberij Cælaris autoritas fecit.
Ante cum Rheticis prior mensa erat, & uvis Veronen-
siū in agro. Quin & patientia nomen acinis datur
passis [salsitur Plin. Passus vocamus, quod ad solem ex-
pandantur.] Conduntur & multo uva, ipsæque vino
suo inebriantur. Alie decoctæ in musto dulcescunt:
alie verò sobolem novam in matre ipsa exspectant
translucide vitro, additque acinis eandem, quam in
dolis, amphorivæ duratricem illam firmitatem au-
steritas picis insula pediculo: jam inventa Vitis [Allo-
brogica] per se in vino piecem respiciens, Viennensem
agrum nobilitans, Arverno, Sequanorque & Helvi-
co generibus non pridem illustrata. Atque hæc Vir-
gilij Vitis ætate incognita, à cuius obitu xaguntur
anni. Quid, quod inferta castris summam rerum im-
peritūque continent? Centurionum in manu Vitis,
& opimo præmio tardos ordines ad lentas per-
ducit aquilas atque etiam in delictis pœnam ipsam
honorat. Nec non vineæ oppugnationum dedere
rationem. Nam in medicaminibus adeo magnum
obtinent locum, ut per se vino ipso remedia sint.
Genera Vitiū numero comprehendi posse unus
exultavit Democritus, cuncta sibi Græcia cognita
professus. Ceteri innumera atque infinita esse pro-
diderunt, quod verius apparebit esse ex vinis. Nec
omnia dicentur, sed maxime insignia: quippe quæ
totidem pendē sunt, quot agri. Quamobrem cele-
berrimas Vitiū, aut quibus est aliqua proprietate
miraculum, ostendisse satis erit. Principatus datur
Amineis propter firmitatem, leniōque proficentem
vini ejus ubique vitam. Quinq̃que earum genera: ex
his Germana minor acino melior de floreſcit, imbres,
tempeſtateſque tolerat; non item major, sed in ar-
bore, quam in jugo, minus obnoxia. Gemellarum,
quibus hoc nomen uvæ semper geminæ dedere, a-
perimus fapor, sed vires præcipuæ. Ex his minor
Austro læditur, cæteris ventis alitur, ut in Vesuvio
monte, Surrentinisque collibus. In reliquis Italiæ
partibus non nisi arbori accommodata. Quintum
genus Lanata, ne Seres miremur, aut Indos, adeo lan-
nugo eam vestit. Prima ex Amineis matureſcit,
oculissimæque putrefcit. Proxima dignitas Nomen-
tans rubente materia: quapropter quidam Rubel-
las [Rubellinas Colum.] appellavere vineas. Eæ minis
fertiles vino, acinis & facie nimis, contra pruinas
fortissimæ, siccitate magis, quam imbre, æstu quam
algore vexantur. Quamobrem in frigidis humidif-
que principatum obtinent. Fertilior, quæ minor a-
cino, & folio scissa minis. Apianis apes dedere co-
gnomen, præcipuè earum avidæ. Ex his duo genera
[maior & minor, vel candicans & nigra] lanugine &
ipse pubescunt. Distant, quod altera celeritū matu-
reſcit, quamquam & altera properante. Situs frigi-
dos non reſpuit, & tamen nullæ celeritū imbre
putrefcunt [nulla celeritū matureſcit imbre vina M.]
Vina primo dulciā, austeritatem annis accipiunt, &
rubra sunt. Nulla magis vitæ gaudet. Et hætenus
potissima nobilitas datur peculiaribus atque verna-
culis Italiæ. Ceteræ advenere Chio, Thátovæ. Gra-
cula non inferior Amineis bonitate, præterea
acino: & uva tam parva, ut nisi pinguissimo solo
colere non possit [colere non possit M. caleſcere non
possit, ver. colere, l. hab.] Eugeniā Taurominitani

colles cum generositatis cognomine, misere Alba-
no tantum agro: quoniam intranslata statim mutatur.
Naique est aliquibus tantus locorum amor, ut om-
nem in his gloriam suam relinquunt, nec ulpiam
transcant. Quod & in Rhetica, Allobrogaque,
quàm supra Picatam appellavimus, venit, domi no-
bilibus, nec agnoscendis alibi. Fecundæ tamen, bo-
nitatis vice copiam præstant. Eugenia ferventibus
locis, Rhetica temperatis, Allobroga frigidis, gelu
matureſcens, & colore nigra. Ex his, quas adhuc di-
ximus, sed etiam è nigris vina vetustate in album
colorem tranſeunt. Reliquæ ignobiles. Aliquando
tamen celi aut soli opera non fallunt vetustatem,
sicuti Fecenia [supra Rubellā sic dicta, quod fecit plus af-
ferat, quàm cætera] & cum ea florens Biturica, acino
rarior, nunquam floris obnoxij [tempeſtaribus obno-
xia, quoniam floris antecedunt, Dal.] quoniam antec-
dunt, ventisque & imbribus reſiſtunt, meliores ta-
men argentibus locis, quam calidis; humidis, quam
siccitibus. Vix ulla magis tam denſe uvarum par-
tu, impatiens variantis celi, sed contra tenorem tu-
num algoris æstusque constans. Quæ minor est ex eo
genere, melior. In eligendo solo morosa, pingui pu-
treſcit, gracili omnino non provenit. Mediam tem-
periem delicatè quærit, ob hoc Sabinis collibus fa-
miliaris. Vva ejus indecora viſu, sapore jucunda, ni-
ſi matura protinus rapiatur, etiam non putrefcens
cadit. Contra grandines eam tuetur foliorum am-
plitudo atque duritia. Inſignes jam colore inter
purpureas nigræque medio Helvolæ, sæpius varian-
ti, & ob id Varianz à quibusdam appellatæ. Præfer-
tur in his nigris: utraque alternis annis fertilis: sed
melior vino, cum parior. Et Preciz duo genera ma-
gnitudine acini diſcernuntur, quibus materies plu-
rima, uvæque ollis utilissima, solum Apio simile. Ba-
silicam [Balicam CH.] Dyrrhachini celebrant, Hi-
spani Coccolobin [Coccolubum Colum.] vocant. Rarior
uva, æſtus auſtroſque tolerat: capiti inimica, copia
larga. Hispani duo genera ejus faciunt: unum ob-
longo acino, alterum rotundo: novissimas vinde-
miant. Quo dulcior Coccolibis [Coccolibis CH.] hoc
melior. Sed & auſtera tranſit in dulcem vetustate: &
quæ dulcis fuit, in auſteritatem: tuncque Albano vi-
no æmulatur. Traſunt viciſſe viciſſim utilissimum ex
his potum. Albulis fumis arboribus fertilior est, Albulis
Viſula imis. Quamobrem circa eaſdem ſatæ diverſiſſe
ſitate naturæ locupletant. Intericulam è nigris ap-
pellavere, iuſtiſſi Sobriam [Latiniſic v. cans. quod in-
noxia ſit & iners: tendant nervi Colum.] diſturi in-
verato præcipuè commendabile vino, sed vinbus
innoxiam. Siquidem emulentiā ſola non facit
[ideo Græci Amethyſton vocant, Colum.] Fertilitas com-
mendat cæteras, principemque Helvenacæ. Duo
ejus genera: major, quam quidam Longam: minor duplex, lon-
quam Arcam [Arcum M. Emarcum Colum.] appellant, & Ar-
non tam ſecundam, sed gratiorem hauſtu. Diſcer-
nitur folio circinato. Verum utraque gracilis. Furcas
ſubdere his neceſſarium: alioqui ubertatem ſuam
non tolerant. Maritimo afflatu gaudent, roſcido o-
dore [r. ſida odore, Dal.] Nulla Vitiū minis Ita-
liam amat: uva rara parva putrefcens in ea: vino
quoque, quod geruit, æſtatem non exuperans. Nec
alia macro ſolo familiarior. Græcinus, qui alioqui
Cornelium Ceſſum tranſcripſit, arbitrat non natu-
ram ejus repugnare Italiæ, sed culturam, a vidè
palmites, evocantium. Ob id fertilitatem ſuam ab-
ſumit, ſi non præpinguis ſoli uberitas læſeſcentem ſuſ-
ſineat. Carbunculari negatur, magra dote, ſi verum
eſt, aliqua in Vite celo non eſſe juſ. Aſtum fert
Spionia, quam quidam Spicæmvo art. ætutimæſ-
que & umbroſus pingueſcit. Quærimus ne uvis ura
altur, ob id Ravennat agro peculiaris. Venticulam
[Venticulam Colum.] inter optime deſtoreſcentes, &
ollis

*Rhetica
Allobro-
gica
Picata.*

*Fecenia, ſeu
Rubella
Biturica
florens.*

*Biturica
minor.*

*Helvola.
Variata.*

Preciz duo.

*Folio Ap-
Basilica.
Coccolobis.*

*Albulis.
Viſula.*

*Intericula.
Sobria.*

*Helvenaca
duplex, lon-
ga & Ar-
ca.*

*Græcinus
notatur.*

*Venticula.
ollis*

Situla. collis aptissimam, Campani malunt Circum vocare, alij Staculā, Tarracina Numisianā, nullas vires proprias habentem, sed totam perinde ac solum valeat. Surrentinis tamen efficacissima testis Vesuvio tenus. Ibi enim Murgentina & Sicilia potissima, quam Pompeianam alij vocant, Latio demum feracem: Pompeiana sicut Horconia [*fortasse quam Arelacam maiorem Colum. vocat*] in Campania, tantum vilitatis cibaria, sed ubertate præcipua. Tolerat & annos Mærica, contra omne fidus firmissima, nigro acino, vinis ventustate rubescentibus. Et hæcenus publica sunt genera: cætera regionum, locorumque, aut ex his inter se insitu mista. Siquidem Tulcis peculiaris est Tudernis, atque etiam ejus nominis Florentia. Est optima Aretio Talpana & Etesia & Confeminia Talpana nigra candidū facit multum [*Talpana dicitur a colore Talpa. Etesia fallax [que Etesia variat] quæ quod plus tulit, eò laudabilis fundit: mirumque fecunditate cessat [miraque secunditate non cessat. Dal.]* Confeminia [*Confeminia cognomen hic proprium est. alioquin Confeminia Vitis Colum. diversis Vitis generibus confusa*] nigra, vino minime durate, uva maximè post xv. dies, quam ultra alia metitur, ferulis, sed cibaria. Hujus folia, sicut Labruscæ, prius quam decidant, sanguineo colore mutantur. Evenit hoc etiam quibudam aliis, pessimi generis argumento. Iuola, Vmbria, Mevanatica & Piceno agro peculiaris est, Amiternino pumula. Iisdem Bannanica fallax est: raptant tamen eam. Municipij uvam Pompeij nomine [*Oppidum Neapoli vicinum*] appellant, quamvis Clusini copiosiores. Municipij & Tiburtas appellavere, quamvis Oleaginam nuper inveniunt à similitudine Olivæ. Novissima hæc uvam ad hoc tempus reperiā est. Vinaciolum foli novè Sabini & Laurenti. Nam Gauranas scio à Falerno agro translatas vocari Falernas, celerimè ubique degenerantes. Nec non Tarentinum genus aliquifecere, prædulci uva. Capnias & Bucconiatis, & Tarrupias in Thurinis collibus non ante demetuntur, quam gelaverit. Pharia gaudent Pisæ, Mutina Præstina, nigro acino, intra quadriennium albescente vino. Mirum ubique cum sole circumagi uvam, quæ ob id Streptos vocatur. Et in Italia Gallicam placere, trans Alpes verò Picenam. Dixit Virgilius Thalias & Mæreotidas, & Lageas, compluræque externas, quæ non reperiuntur in Italia. Sed sunt etiamnum insignes uva, non vino, Ambrosiaca, Duracina, sine ulius valis in vite servabilis, tanta est contra frigora, æstus, tempestatesque firmitas. Nec Orthampelos indiget arbore, aut palis, ipsa se sustinens; non item Dactylites digitali gracilitate. Columbinæ acinosissimæ [*racemij sissima Iuvn.*] & magis purpureæ, cognomine Bimammia, quando non racemos, sed uvas alias gerunt. Item Tripedanea, cui nomen à mensura est. Item Sarpula passio acino. Et Rhætica in maritimis Alpibus appellata, dissimilis laudatæ illi. Namque hæc brevis, confecta acino, degener vino, sed cute omnium tenuissima, nucleo, quem Chium [*quod gigartum Turnerus vocat*] vocant, uno ac minimo, acinum prægrandem unum alterumve habens. Est & nigra Amminea, cui Syriacæ nomen imponunt. Item Hispana ignobilium probatissima. In pergulis verò feruntur Escaria appellatæ, Ederæ acinis [*duracina M. & CH.*] albæ nigæque. Et Bumastii totidem coloribus. At nondum dictæ Agria & Rhodia, & Vncialis, velut à pondere acini. Item Pucina [*pucina à pucis colore*] omnium nigerima: & coronario naturæ lulu Stephanitis, acinos foliis intercurantibus: & quæ forenses vocantur, celeres proventus, vendibiles aspectu, portatu faciles. Contra damnantur etiam yllu cinerea & rabuſcula. & asinifca: minùs ta-

men, caudas vulpium imitata, Alopecis. Alexandrina [*Idea Theophr.*] appellatur Vitis circa Phas-lacram brevis, ramis cubitalibus, acino nigro Fabæ magnitudine, nucleo molli & minimo, obliquis racemis prædulcibus, folio parvo & rotundo, sine divifutis. Septem his annis in Narbonensis provinciæ [*arvo*] Alba Elvia inventa est, Vitis uno die deflorescens: ob id tutissima. Narbonicam vocant, quam Narbonica nunc tota Provincia conserit.

Doctiss. Dalechampius apud Plinium vult Rumetinum Columellæ non esse arboris genus, sed arbusculi gallici, vulgò de Hantins appellati, arboribus humilioribus & minime frondosis confiti, eaque re ab arbusculo Italico differentis. Duracinam Vitem, cuius uvæ magnitudinem infantium puerorum in interiore Africa parte exuperant, vulgò, Piquepoullæ, Piquepoullæ Monspeſulanis verò Marraquin, à Marroch Africa civitate denominatam. An hanc intelligit Lugdunum ait. Sunt in regno Menin oppidi Syriæ nobilissimæ magnitudinis cum acini, tum racemi, quos ipsi lingua patriæ privatim vocant Alzibib: nam generi commune est nomen Haneb, nos à succo uvam. Illius vocis imitatione suas grandiores uvas corrupto vocabulo Provinciales dicunt Augibim. Helvicam, Augibim, per se in vino picem respicientem, ab Helvis, Gallie Narbonensis populis, hodie Vivareæ; Ammineam, Narbonensis Gros plant. Quidam, inquit, scribunt cum duplici m, syllaba penultima correpta. Aulonius,

Silius qui Chum misset. Ammineam Alij cum simplicem, penultima producta. Serenus.

Succus Amineæ Vitis cum pane medetur. Virg.

Sunt & Amineæ Vitis fortissima Vitis.

Vitis Amineæ quintum genus, cuius folia lanugine lanuſa vestiantur, ait Marcellum Caniculatam vocare, velut lanugine canescentem & hirtam: Apianam autem tradit esse Muscat, cuius uvæ vineæ longè suaviore sint, quam pergulis, arbusculo, jugo. Nos Moschatelinam observavimus duplicem in Burgundia, rubram & albam, & hanc rursus Stutzgardia; Græculam non inferiorem Amineis bonitate, Raisins de Cornuſe; Rheticam, de la Valteline; Allobrogicam, quam Picatam Plin. quoque nominat, Viennensem, qui sent la violette; Bituricam, le plant d'Orléans; Bituricam minoris, Sabinis collibus familiarem, des Gallez. Lugdunensibus vocatam; Visulam eam dictam fuisse ostendit Columella. Helvolam, sive ut ipse vocat Elveolam, olim fuisse dictam, Oleram & Eleram, & inde cognominari Elvelam, Oleram minutam, & Elveolam Vitis herbaceæ coloris, Titinium appellare, Lenti calido, Elvelam, Rapulam, & Lenticula. Rumicæ Scaligerum: Cocobin esse eam Vitim ex do.

qua vinum Monspeſulanis Piquardant, aliis Muscat Piquardant, de Languedoc, dictum exprimitur. Forenses celerem proventus, uvæ aspectu vendibilem, ac portatu facilem, rusticis Lugdunensibus servato nomine des Foivars: Rabuſculam, eandem facit cum Ravuſculam, Desfoivars colore ad ravum inclinante: Asinifcam ab asini colore denominat: Quæ Plinio Alopecis dicitur, is eam vulgò Raisins barbus nuncupari tradit: ceu Albam Elviam in Narbonensis provinciæ arvo inventam, Aubenas de Vivareis.

Tragus ne nihil fecisse videatur, paucis vulgarissimæ Vitis genera ipsi quidem cognita obiter ita recenset. In tractu Rheni plerumque eæ Vites plantantur, maxime calidioribus locis, quas Muscateller & Traminer [*Muscatellina dixeris & Traminæ*] à loco Traminij dicto, vulgò vocant, licet postestus genus Rhetia superiori & Alsatia familiare quoque sit. Præterea & eas quoque, quas vocant Ger nani Grosj vnd Klein, Frenchisch [*Francicas*] oder Edel vnd lauter Trauben, h. e. Vitem nobilem. Ad Mosellam, Rhenum, & in agro Vormatiensi Vites procreantur Bisling appellatæ. Quæ verò uvas & yllu de

VITIS CORYNTHIACA SIVE
Apyrina.

Strabonem *trauben* vocatas proferunt Vites, eae in omnibus
propè regionibus vulgarissimae habentur. Est & a-
liud Vitis genus quod uvas facit, *Strabonem* *Al-*
bis *trauben* nominatas, & in motanis Ladoice op-
pido imperialis nascitur. Iam & in agro qui & Neapoli
oppido Palatinus celebri adjacet, Vitis genus ha-
betur, quod *Gensfussel* incolae dicunt. Aliud dein-
de Vitis genus *Barthinsch* vocatū propè Turckes-
mum & V Vachheimium provenit. Prope V Veis-
senburgum denique (quis enim reliquarum pro-
vinciarum, Austriae inquam & Franconiae &c. Vi-
tium innumera penè genera persequi queat) Vites
plantantur, quae uvas *Früschwarz*, oder *Kleber* ap-
pellatas, neque non quae *Grünfrantsch* dictas, &
quae *Schwarglein* perstrauben nominatas pro-
creant. Atque haec *Tragus*.

Beillon observavit in Thraciae Callipoli in Augu-
stinianorum monasterio Vitem fructu suo semper
onulata, quam ipsi Monachi affirmabant septies in
anno fructum, eumque maturum præbere.

Tab. not. st. Tab. ut plus quam ceteri sapivisse ducatur, præter
Vitem vulgarem, alias duas nominetenus duntaxat
icone exprimit, eas non describens, nec demonstrans
ubi terrarum observavit. Ipsimet incognitas fuisse
satis indicant quae scribit. Folium & uva, inquit, vul-
gari non multum dissimilia: sapor autem ei constabi-
bit, qui has uvas noverit. Quia igitur sapor ei non cō-
stitit, certè eas non novit. Si sapor constitit, cur non
paucis eum expressit? Si folium & uvam vidit, cur
differentiam non annotavit? quid opus erat inania
pro necessariis & proficuis effundere verba. Inscr-
bitur autem prima, Vitis duracina major: altera, Vi-
tis chenopodia. Addit & tertiam, Vvam barbaram.

c. 8. diff. C. B. pin. Vitem dividit in sativā & sylvestrem. Sa-
tiva alia major est, inquit, cujus plurimae species; alia
minor. Majoris uvae & colore & magnitudine diffe-
runt; alterius namque acini, aut virides albicantē-
ves, aut fulvi, aut saturatorubore nigricant, aut cæru-
lei, aut subrubentis coloris; aliae acinis oblongis
magnitudine & forma prunorum, quae Pergulana
dicta potest; aliae rotundis, jussue vel magnis, vel par-
vis; aliae acinis sunt frequentioribus; aliae rarioribus.
Sunt quae granis aut vinaceis carent, interdum uni-
cum vel alterum granum habent. Rariūs uva barba-
ta reperitur. Minor vero est acinis nigris, raris-
simè albidis, aut fulvis, nucleo nihilo ac molli. Sapore
etiam differunt, ut dulci, acerbō, muscato, quae Vi-
tis Apiana Plinio.

In foliis quoque differentia, alia majora profun-
ditus incisa, ut Italica foliis ad pediculum usque in
lacinias acutas divisis; alia minora sunt: Sic alia te-
nuiora, alia crassiora, alia viridia, alia rubentia, alia
maculata: alia ad tactum duriora, molliora, alia læ-
via, alia denique subhirsuta.

In India insula Baly, Vites bis in anno uvas pro-
munt: Linc. par. 3. Ind. or. cap. 40. & in insulis Azores,
super meras rupes crescunt, quae radices in me-
dios hiatus seu saxorum rimas immittunt, quibus
succum sibi necessarium praeliunt. Et in istis pe-
trans recessibus, Vites multò lætius se proferunt,
quam quae in planitie sunt, quae ad frugem perveni-
re nequeunt. Idem cap. 6. Sed in Hispaniola plan-
tatae exiguas uvas fundunt, nec admodum jucundi
saporis & ferè Februarii & Martii vindemiarum so-
lent, auctore Benzone, sive Americæ lib. 4. cult. & ut
Iosephus Acofta l. 3. c. 22. & l. 4. c. 32. nec in insulis, nec
in firma terra uvae aut vinum nascitur. In nova His-
pania, vineae uvas proferunt, sed nunquam probè
maturescunt, ut vinum confici possit, nisi in Peru &
Chile approbium vinum nascitur: nam jam vites co-
lere didicere, & vineae plerumque in convallibus
Peruanis nascuntur, juxta quas fossas ad aquam col-
ligendam excavant, quā vites subinde irrigant.

Vitium genera pluribus persequi, licet plerique
supervacaneum ducant, contenti Vitem in
cultivam & sylvestrem distinxisse, atamen Dodo-
naeus cultivarum plures esse meritis affirmat. Eas
autem in majores & minorem dividit. Minor, sive
parva, inquit, Idæa modò cognominatur, de qua
Theophr. lib. 4. hæc scribit. Nascitur Vitis in ea parte
Idæ, quam Phalacras vocant. Est autem fruticosa, fru-
tuosa alibi virgulis parvis, & ramulis cubitalibus
penè exporrigitur, quibus acini laterales, nigri ad-
herent, magnitudine Fabæ, dulces, qui vinaceis si-
mile quid [*tragopodes*] continet. Palladio dicitur
vva sine granis. Plinius hæc Alexandrinam facit,
iisdem quibus Theophr. verbis ipsam describens.
Dioscorides silvestris Vitis alteram statuit speciem.

Nos malimus eam inter cultivas retinere. In offi-
cinis hujus exigui passii acini, Passularum de Corin-
tho nomine videntur. Idem Dod. frum. Passulas Co-
rinthiacas vocat. Cap. verò de Vacciniis ait: Nascitur
Vitis quam modo Idæam cognominant, non in al-
tissimis ac nivosis Idæa tractibus (ut Gesn. interpreta-
ri studuit) sed circa Idam provenit: Idam quidem
montem non Cretæ, sed Troadis in Asia minore,
quæ à Ptolomæo Geographiæ libro, Alexandri
Troas appellatur, unde & non temerè à Plinio Vi-
tis Alexandrina dicta est, non secus quam illic enata
Alexandrina Laurus, à Theophr. nominatur. Huic
autem Viti similes apparent, quas Philostratus in
vita Apollonij apud Mæones & Lydos (haud pro-
cul à Troade sitos) nasci refert, cum his Vitis il-
las comparans, quæ apud Indos ultra Caucasum gi-
gnuntur. Vites autem, ait, parvæ admodum, quales
apud Mæones Lydōlque ibi nascuntur: vinum
tamen ex illis expressum gustatu ac ore jucundissi-
mum. Traditur autem hæc Vitis, juxta Idam nata;
fruticis [*tragopodis*] instar esse virgulis [*passis*] par-
vis; ramulis verò ad cubitum extensis, cir-
ca quos acini obliqui [*passis*] nigri, magni-
tudine Fabæ, dulces, intus habentes vinaceum quod-
dam [*tragopodes*] molle: folium autem hujus rotun-
dum, indivisum, ac parvum. Describitur hæc à Pl-
nio lib. 14. cap. 3. iisdem ferè verbis, Alexandrina ap-
pellatur, inquit, Vitis juxta Phalacram brevis, ramis
cubitalibus, acino nigro, Fabæ magnitudine, nucleo
molli & minimo, obliquis racemis prædulcibus, fo-
lio parvo ac rotundo sine divisuris. In quibus ver-
bis, pro eo quod Theophr. habet, [*passis*] obliquis
Plinius non acinos, sed racemos obliquos legit:
quod Viti magis convenit. Cum descriptione autem
hæc fruticulum Germaniæ Officinis Myrtillum di-
ctum, haudquaquam convenire satis manifestum.

De hac etiam Lob. agit Corinthia sive *Apvina* v-
va quæ vocatur, nomen patrium testata, effigie ni-
hil planè differt à communi: Sed algidiore coeli im-
pationis, gracilitate tantum racemorum, & exilitate
acinarum superatur, qui gigartis carent, sunt quæ
ut quædam mala Granata atillibus vacua. Botri
enim, sive racemuli ipsi, consistunt acinulis, piperi-
na aut sambucina grana sequantibus. Ad topiario-
rum pergulas & fornices deducuntur hodie in Itali-
cis & Pedemontanis hortis vites hujus.

Dalechampsio apud Plinium, qui ejusdem Græ-
culam esse autumat, dicitur *Raisins de Corinthe*. Lugd.
Vva *apvina*, Corinthiæ vulgò vocatæ. An eadem u-
væ Maderenses sine granis?

C. B. pin. Vitis 3. sive Vvæ passæ Indiciæ gigartis ca-
rentes: Vva sine vinaceis seu apyrenos, ad Clus-
cur. post. Eidem. Vitis 4. sive Vvæ passæ minores,
vel Passulae Cerynthiæ. Passulae, Trag. Vvæ pas-
sæ mi-

la, sed minores, acinis sine arillis, Montbelgardi etiam habentur in horto E.C. VV. Vite Bizuntio ex horto Dominorum de Granuelle illustantur.

Eidem C. Bauhino Phyt. Vva passa maior *Biquas G.* & Vitis 2. dicitur.

VITIS FOLIO API.



Peculiaris folii forma hanc vitem facile ab aliis dispcit, quippe non tantum plerumque minus vitiginis vulgaribus, sed & profundè dissectum, ex pluribus quodammodo foliis apparatum videri possit, singulis segmentis in Apii foliorum formam subdiuisis, ita tenuiter, vt plurimis etiam vinitoribus, quibus

obtuli, non agnoscerentur pro foliis vitium, rarè sanè diuisura. *Botris* fert albos, donatos *acinis* satis magnis, non multum compactis, sed paulò rarioribus, valde dulcibus & sapidis: similes sunt *vuz* hz *Botris vuz*, quam Burgundi *Raisin flant* aut *fendant*, Germ. *Wurtemb. Gur Edel Reben* vocant, citò maturescunt, & vitæ cibo expectuntur.

Hoc pulchrum vitis genus obseruauit Vesuntii & nusquam alibi, in horto insignis Medici Turnonii, quod delatum dicebant ex Hungaria. Surculi inde delati apud nos feliciter prouenerunt.

Quo referendum hoc genus vitis nondum animaduertit, nisi comprehendatur sub Vitisbus à Plinio dictis *Pretia*, quibus folium Apio simile. Scio Guill. Penam & Lobelium pro ea exhibere *Vuam crispam*, quam *Grossulariam* vocant: verum non mihi sit verisimile Plinium fruticem spinosum, cui nihil simile cum vitibus, cui non est *vua*, nec materies plurima, reposuisse inter vires: fortassis quod Plinius dixit duo genera & ois vtilissima, petuastit illis hunc fruticem Plinium intelligere: verum ille postea dicit. *Veniculam* [Vitim] inter optime deflorescentes & ois apertissimam.

Vua alba dulces, dictæ Monb. & Burg. Raisins fendants, ou de l'hospital.

Longi his sunt Botri, plerumque rariore acini, valde dulces, citò maturi, albi, folia profundè diuisa, utrinque vitidica, & pellucida. Germani in Ducatu Vvrt. has *Gur Edel trauben* vocant, easque ab aliis separant, quia vinum bonum exiis fit, sed non durabile. In Burgundia integras ex eis plantant vineas.

Vua nobiles alba.

Vvæ, quas Germani & Alati vocant *Edel Trauben*, appellant Vvrtemb. vinitores Tom. II.

weiss freuschen. Hæ *vuz* ferunt acinos cute duræ, non magnos, dulces, si bene maturi. Ex his fit *freuschen* vinum illud dulce, in Alatia celebre, *Rangens Rangens* *wein* dictum. In Than aliquando diligenter perquisiui, an ex particulari genere vitis hoc fieret vinum? Verum comperi locum esse particularem, montem glareosum, qui vites illas fert, quæ nulla ratione differunt in figura, sed tantum variant vuarum ratione: ex enim sunt multò dulciores, & ad tactum viscidæ, bene & citò maturescunt, quæ in superiore montis parte proueniunt. Eæ autem quæ in vicinis & potissimum inferiori loco producantur, tardius maturescunt, minus dulces sunt, & ad tactum non glutinosæ. Cæterum, quoniam ex his nobilior vinum parari existimant, nolunt quibusdam in locis alias plantare, quamuis minus vini, quàm multæ aliz reddant: apud nos Montbelgardi parum viles, quia tardius maturantur.

Vesontii vocant *Vites Blanc gentil*, quibus *vuz* acinis rotundis dictis similes: Lignum ferè simile, nisi quodd paulò crassius vbi maturit & rufum. Huius *vuz* esul meliores, ex quibus etiam melius fit vinum album, vt *Arbosiacum*. Vesontii in colle *Ragor* dum putantur, triones relinquuntur palmites. Audio in Ducatu Vvrtemb. abscidare, præsertim circa *Maulbrun*. Prope Ellingam referunt esse montem eà vite consitum, cuius vinum vocant *Scrubwein*. *Vuz* suspensæ diu durant.

Vua germanica dictæ des Alemans, alba.

Nostri vinitores has *Vites* nostro solo comodas dicunt. *Botris* sat magnis, factis, acinis etiam maiusculis, tunicâ duriculâ, mediocriter dulcibus: foliis subrotundis, angulosis, in tres partes diuisis. Vinitores nostri Germ. aiunt in Ducatu frequenter excoli, ac dicit *Elbe* & *Elbe*. *Gur Elbe*: in Alatia autem *Rhein Elbe*, esse duo genera, vnum iam denominatum, alterum *Rauch Elbe*, cui facile decidant folia, quod in nostris vitibus tollitur & extirpatur.

Vua Lausannenses alba.

Vvæ Montbelgardi dictæ *Lausanois* probantur pro nostra regione. Vitis eius profert folia rotunda ferè, parum profundè partita, utrinque viridia, *vuz* dulces, acinos mediocres: Audio vocari in Ducatu Vvrtemb. *Fiderling*. *Fiderz* Solet esse fructifera, vt aiunt, & ex vuis eius fieri vinum laudabile.

Vua alba dictæ Melons.

Viti dictæ folia sunt rotunda, angulosa, subtus tomentosa, non profundè laciniata: vuis Lausannensibus similes *vuz*: acini non magni, dulces, & iis gratiores: sunt enim Lausannensibus paulò acidiores, vt indicant Vinitores, vinumque aiunt minus durabile, nesciunt nomen Germanicum. Ex quo Ill. E. C. Montbelgardi excolendas curauit Vites, multa millia furculorum ex vitibus ad eundem E. C. urbem Grangianam, & arcem suam *Sophenweil* in monte *Liann*, sunt plantata.

Vua alba dictæ Guaches.

Magnæ *vuz*, acini crassi, minus dulces, ex quibus multum vini, sed minus laudabile: folia magna, in acutos angulos definitia, subtus hirsuta. Suspicio dictas à Trago *hinsch trauben* & nonnullis *Scheiss trauben*. Vineæ circa Epag.

Gg

Vitis Pretia Plinio. Guill. & Lobel. notantur.

Vitis Geræ nobilis.

Vitis Blanc gentil.

Lucni.

Duplex geræ.

Lucni.

Binsch trauben. Scheiss trauben.

manduodurum abundant his vuis in montibus dictis Champuermot. In hoc genere, vt afferunt vittores, quadam malæ, ex scil. quibus vna decidunt priusquam maturecant, vnde etiam vinum earum austerum.

Vua alba, Raisins Brulans, dictæ.

Hoc genus vuarum albarum simile est vuis melons, minus dulce, faciliè putrescens, ac vredine corruptibile: quippe faciliè siccatur: multas alioqui hoc Vitium genus fert vvas, & fructiferum est: folium eius quinquepartitum, subtus hirsutum. Hoc Vittores, si viciniore, aliquæ Vites occurrant ex meliore genere, extirpant.

Vua alba acinis minimis.

Præsentis vuz Montbelgardenfibus *chenois* quemadmodum Burgundis quoque dicuntur, vintoribus V Vitemb. Bôse hintschen. Vitis genus hoc minimos platumque acinos profert, ita vt vel degenerasse, vel particularis generis esse videri alicui possit. Vtrum vis, asserere, mihi nondum planè constat. Nostri paulatim id extirpant, & meliores sensim in locum propagant.

Vua alba enfarins nuncupata. Ger. weyßklemmer.

Folia Vitis huius quasi farinâ aspersa conspiciuntur, alba, albi racemi, dulces. Ex Burgundia bonum hoc genus Vitis deferitur, ac in Willassen abundat.

Vua acinis se sudentibus.

Est in vineis Montbel. potissimum Ill. E. C. genus Vitis, delatum, [ni vittores fallant] Sturgardiâ, copiosè ferens vvas, cui nomen *malmer*: vuis vitidis penè coloris, dulcibus, quibus acini magni, faciliè putrescentes. Abundant ad Nicarum circa Canstat & Turques. Frigore faciliè corrumpuntur, acide in Ducatu V Vitemb. gico ante hyemem eas terrâ obruunt. Nos Montbelgardi neque has, neque alias humi sepelimus.

Vua maxima alba.

Hoc Vitis genus Basileâ curari deferendum pro horto Ill. E. C. vuis donatum longissimis, acinis etiam magnis, albis, carne firmâ, difficultè putrescente, suspensis diu conservabilibus. Audio vocari in Ducatu V Vitemb. *groß lampen trauben*, vbi tamen non frequentes.

De his hæc fortè scribuntur: Genus Vitium, quod vulgò vocant *groß lein*: omnium maximis vuis, & acinis maximis, quarum vltus tantum pro culina ad omphacium: vnica siquidem vna interdum reddit Omphacii semi-mensuram, ita vt seps vnicus quandoque reddat Omphacii plusquam 30. mensuras. In pergulis hortorum coli desiderat. An ex his vuis parentur vuz passæ maiores, considerandum.

Vua rubella.

Vites ex Alsatiâ & Richenvilla oriundæ, Germ. *Reckenmer* nuncupata, Montbelg. *des grises*, vvas ferunt esui valde gratas & dulces, quibus color rubellus. Sunt maiores & minores. Non copiosè plantantur.

Vua Rhetica.

Vites Rheticæ, siue Veltolinas [Veltliner] vocant Vittores nostri delatas ex Sturgar-

dia, vvas gignentes satis magnas, ex albo rubentes, cute tenui. Vincam ex eiusmodi Vitibus circa Hohenwall conseri iussit Ill. Comes Wirtembergicus.

Vua rubra, Gamé.

EX Burgundia habetur genus Vitis, quod vocant *Gamé rouge*: vvas mittens, sicut & acinos non paruos, ex quibus excipitur copia vini, quâ de re eas Burgundie quibuldâ in locis colere multum laborant. Verum Vefuntini non excoluntur, nec permittitur vt vinum ex his in vrbem inferatur, quia non durable.

Vua nigra dicta.

Vitis hæc folio ornatur penè rotundo quadrupartito, sed non profundè, inferna parte nonnihil hirsuta. Vittores vocant in Ducatu Vitemb. *Schwartzklemmer* / *Außerklemmer*. Vua huius, quas Montbelgardi vocant *Noirins*, sunt purpureæ, siue rubræ, mediæ cum acinis magnitudinis, dulces. Ex his bona vina parantur, si mustum subito separetur à fratribus. Vefuntini putando ramos, breues relinquuntur, loco potissimum macro & petroso.

Vua atra Traminea cognominata.

Inter vites rubras non vltimum obtinet locum Traminea, Rotfruchben Wittemb. siue Traminer, seu & Alsatis *Schwartzklemmer* dicta, Montbelg. verò *surmentans rouges*. Eius vua valde dulcis est, ex qua in Ducatu V Vit. Ill. E. C. vinum curat parandum, *Schleser* dictum.

Vua dicta Vefuntinis Grappenans.

Extollendæ hæ Vites loco declinæ & petroso quod Solis orientis radiis eo perueniant. Cæterum vuis modò dictis sunt acini minores, quam in *Noirins* dictis, diffusiùs maturescunt, lignum quoque crassius. Vuz esui non commodæ, sed si maturæ sint, optimæ sunt pro vino rubro faciendo, quod diu conservari potest. Satis copiosè Vefuntii. His vuz dictæ *Torpor* similes, sed minores, lignum magis rubet.

Vua Vefuntina.

Harum Vites sunt fertiles, cum coluntur locis calidis & petrosis, vbi tamen non desit terra, nec peruenire possit ventus orientalis. In iurias cæli primo Vere & Æstate melius fert, quam reliquæ Vites. Vvas profert magnas, & acinos magnos, rotundos, nigros. Esui minus commodæ, quam aliæ, nisi suspensæ & reseruatæ vique ad Natalitia Christi. Ex his habetur vinum, crassum, rubrum, quod diu reseruati potest, licet minus bonum, verum copiosum.

Vua Cressans.

Vefuntinis forma & colore Bræginæ similes, *Cressans* nisi quod carne firmiori & duoriore edendo sentiuntur.

Montbelgardi vocant *Gris* vvas rubellas minores, à colore mixto ex rubro & albo, dulces valde, faciliè maturescentes. Germ. vocant *Traminer*. Sūt huius generis & maiores, quæ an

à minoribus differant, præterquam magnitudi-
ne, me latet adhuc.

Vua Arborescens rubra siue nigra.

Spectandæ pulchritudinis sunt vuæ, quas
Montbelgardi *Arbois* vocant, à loco in Bur-
gundia, vbi vocantur à quibusdam *restes d'oiselets*,
Vinitores in Ducatu Vviremb. dicuntur *Kotz-
welsch trauben*. Hæ rubræ vuæ non conueniunt
nostro solo, quia difficulter maturescunt, acini
sunt magni, sublongi, ovales, carne firma, dulces
tamen. Vinitor meus extirpat has Vites, vt aliis
locum det, magis fructiferis & melius matu-
rescentibus. Vescuntur vocant etiam *Arbois* colore
minùs rubro vuas, vel, vt dicere solent, minùs
nigro, parte acinorum pediculo hærente, ligno
crasso. Ex hoc genere vuarum scribunt fieri vi-
num rubellum, quod *Claret* vocant, admixtis
vuis *Blanc gentil*. Sunt etiam, vt tradunt, *Arbois
blanc* eiusdem naturæ & formæ cum nigris.

VVA MONSTROSA BARBATA.



Ivuabit fortè
inter tot natu-
ræ creata le-
gitima, eiusdè
quoque pecca-
ta detegere. Si
modò peccatū
sit, à consuetō
cursu deflecte-
re, & partūs
legitimi vice
monstrū ocu-
lis nostris sub-
icere. Res
senèrara, nec
vulgi modò
rumore spar-
sa, sed principum
curā cognita,
& ad prototy-
pum depicta.
Racemus vua-

rum est geminus, suo quisque pediculo commu-
ni ramo hærens. Hoc naturale. At vterque com-
mū obseptus erat crinita, flauescēte, ad duos ferè
cubitos longa, infernè in vnum iuncta & consu-
fusa : Hoc verò nouum est, atque monstro-
sum.

Picuram cum descriptione ex authentico ad
me misit Cl. D. Rentzius Fontis admirabilis Me-
dicus Bollenfis ordinarius. Dicitur ab Illustriss.
Principe Ernesto Marchione Badensi repertus
prope Fridelsheim in Palatinatu anno 1599. &
Dorlacum missus, vt noui spectaculi eicone ten-
nus ad posteritatem quoque rediret. Huius e-
tiam rei fidem nobis fecit Laurentius Zysar, qui
& vidisse & diligentius consideratos manibus
palpasse ad eundem D. Rentzium scripsit.

Tabernic. & Hist. vocatur Vua barbata, Vuæ
tertium genus, quod ab aliis nonnihil variare
scribit, oblongo filamento, multo ex vua depen-
dente, ac barbam expimente. Figura sanè posi-
ta à Comp. Taber. placet, sed displicet quod ge-
nus tradatur : nec tradatur nec, altribatur locus,
vbi id proveniat.

Nomina. Linguarum
A. *Arbois* dicitur à *Arbois*, Vitis vinifera siue
cultiua appellatur. Vitis quidem dicitur, quòd
inuitatur ad vuas pariendas auctor: Varrone.

Tom. II.

Hebr. *Gephen*, Trago. Arab. *Harin* seu *Karis*, siue
etiam *Karin*, Germ. *Räben* / *weinraben* / *wein fock* /
oder *Räbsfock* / Belg. *Wingacert*. est *Wynfock* /
Gall. *Vigne*, It. *Vite* & *Vigna*, *Vite vinifera*. Vite do-
mestica Hisp. *Cast.* / *Vid.* / *Port.* *Vide*, Angl. *Wynde*
est *Wentree* / or *Grape tree* / Boh. *Wyw wine*.
Hung. *Ten zolo*

Vitis porro arbutina, quæ maritata est arbo-
ribus, vt attestatur Had. lun. dicitur Græcè *ἀμπε-
λοειδὲς* / Ger. *Räben an bäumen* / erzogen,
Belg. *wyngcert an Een boom* / gheschoen / Gall.
vigne mariée aux arbres, ou qui rampe en arbre, It.
vite che rampa sopra li arbori, Hisp. *vid abraçada
con arbol*

Vitis viduæ, non associatæ, nec maritatæ ar-
bori meminit Catul. in *carm. nupt.*

Vitis compluviana Plin. recti in modum longè
lateque formicæ, germ. *Räbsfock weit* / *Vund-
breut* / *zerlegt*. Belg. *wyngacert galerye wyss* / ener-
decht est *gheleyt*. Gall. *vigne liée au long du rayon*,
It. *vite ligata & condotta à guisa d'arco*, di volto, di di-
figna, Hisp. *vid parrada de patio*, en arco de bodega

Vitis pergulana Colum. Germ. *Räbsgländer* /
Belg. *Wingacert lünss* / *oucrleyde* / *wyngacert*,
Gall. *vigne qui est faite en treille*, It. *vite fatta in
guise di pergola*. Hisp. *vid sobre percha*.

Vitis iugata, canterinata Colum. quæ pedamen-
tis canterinisque transuersa iugatur, Germ. *wein-
rüb an cinem* / *ghad mit dwerckhangen aufgez-
richt*. Belg. *Wyn gaert met latten esut* / *reiken
dweers* / *geleyt*. Gall. *vigne eschalassée*, *soûs bienne de
perches traueses* : It. *vite sustentata da perche tra-
uersate* : Hisp. *vid sustentada de perchas intraver-
sadas*.

Vitis pedata, statuminata Plin. palis pertici-
que firmata : Germ. *gustützet* / *Räben*. Belg. *wyn-
gaert aen stoeden* est *staecten* / *gheset* : Gall. *vigne
eschalassée*, ou *mine d'eschalas* : It. *vite s'ienta &
appoggiata sopra pertiche & pali*, Hisp. *vid puesta en
estado, y sustentada de sus rodrgones*.

Vitis ordinaria Colum. in quincuncem ferè
disposita : Germ. *Räben nach ordnung gepflanz-
tzer* : Belg. *wyngacert der rey* / or *Vestilgens*
/ *gheset* / Gall. *vigne plantée par ordre*. It. *vite posta à
plantamra per ordine* : Hisp. *vid puesta y plantada en
orden*.

Vitis luxurians, *ἀμπελοειδὲς* / *ὡς ἐκφυῖς* : Germ. *Über-
flüssig* / *schießend*. Belg. *weerdige* / *wyngacert* / Gall.
vigne croissant trop abondamment, qui sette trop de
branches : It. *vite supradante*, che cresce troppo : Hisp.
vid superflua demasiada, que crece mucho.

Vitis lachrymans, *δακρυόεν* / *ὡς ἡ δάκρυα* / or *Sotio-
nigerm*. Ein *Triefende rüb* : Belg. *Een Druy-
fende wyngacert* : Gall. *vigne qui pleure ou degoute
une sorte d'eau*. It. *vite che lagrima* : Hisp. *vid quel-
lora*.

Vitis siderata Plinio *ἀσπίδων* / *ἀμπελοειδὲς* / *Βασί-
νο*, Ger. *verdorret* / *wein rüb* : Belg. *werbrät doort*
/ *ouwerder*, Gall. *Vigne niellée & gâsée du temps*,
Ital. *Vira prusciata & guasta par la tempesta*, Hisp.
vid pasmada.

Viviradix Plin. Vitis quæ cum radice pangit-
tur *viviradix*, Germ. *Segling* / Belg. *wyngacert
mit den wortel* / *gheset* / Gall. *vigne plantée avec la
racine*, Ital. *vite piantata con la radice*, Hisp. *vid
baruada con rayzes*.

Propago Virg. vetula vitis humi depresso, *ἀμπελοειδὲς*
quo ex vna plures emergant, *ἀμπελοειδὲς* / *κλαμαπὴς*
Anatolio, Germ. *ein alter Räbsfock wider ein-
gelegt* / Belg. *Oude wyngacert* / *Stoek weder in
gheleyt*. Gall. *Prouin de vigne*, Ital. *prouana della
vite*, Hisp. *prouena del sarmiento de la vid*.

Qg 2

Tradux

Tradux Varr. Rumpus eidem propago vitis ab arbore in arborem traducta, Germ. Übersbüßling, Belg. der oüersbüete / die haer in de boeckdent in bree de wt Erect, Gall. l'arant, ou longue branche de vigne, Ital. rampollo, Hisp. Sarmiento para prouena, mugren de la vid.

Vitis partes

Palmes

Generum Vitium appellationibus ita appositis, partium vitis Nomenclatura exponenda. Palmes igitur siue sarmentum Colum. prælonga luxurians vitis virga est, αλφια, αλφιανι, αλφιανι, German. die übrige gerten an den beschnitten weinträben. Belg. wyngaert ranc, welcke blystant nicu hoür te schieten, Gall. le viel bois de la vigne, Ital. palmite, d'alcio, Hisp. el sarmiento de la vid, el pampano.

Palmes fructuarius

Palmes locaneus Colum. qui in bifurco medius proficit, Germ. ein schößlin in achßlin / burling / beygerten. Belg. ein rietßen oft byschietre, Gall. le rietton qui croist entre la fourchure de la vigne, Hisp. sarmiento superon.

Palmes fructuarius

Palmes fructuarius, racemarius, flagellum Vitis fructuarius, Germ. ein fruchtbare schod. Belg. Drückbare schütz / Gall. rietton fruitier.

Palmes orbis

Palmes orbis Colum. qui nihil parit, Germ. Blinde rāben ohne rābaugen / Belg. Blinde schute daer niet aen en combr.

Palmes pampinarius

Palmes pampinarius Colum. Pampinarium Plin. colis, qui primo anno frondem siue fructu fundit, Germ. Rābschoß ohne träuben / Belg. de ranc die niet dan blāderen voortbrengt, Gall. Sarmen qui p. rie feuille seulement sans fruit, Ital. Tralcio del primo anno, f. giufo, Hisp. Sarmiento que no lleua fruta.

Rex.

Rex Colum. alves subsidiarius eidem Sarmentum anr otinum quod putatur ad fructificandum: prædiarius palmes Colum. palmes vinarius & cultos Varro, Germ. Ein gerten an rāb gelassen / ein gesch. mitte gerten. Belg. de rāo die ghecorst / de rāer die gesch. neden wort. Hisp. Sarmient. del cuerpo de la vid.

Malleolus.

Malleolus, nouellus palmes plantationi idoneus, malleolaris virga Colum. Germ. Jünge rābschoß, gurling / knedel, Belg. Zoot, Jönghe ranc, Gall. prouin, Ital. & Hisp. pampano, Flagellum, summa palmitis pars & cyma, Germ. gerten Belg. der böüensie ranc, Gall. si. nou menu bout de la vigne.

Flagellum.

Capreolus.

Capreolus Varr. Clavicula Cic. Colum. Viticula Plin. Crinis eid. Coliculus viteus cincinni in modum contortus, quo locum serpendo capit, Annulus vitis Aureliano l. 12, Germ. Gable an weinträben, Belg. Clauierken, Gall. Fleaux ou vrilles de la vigne, It. l'encierro d' rallo che lega & se la vite alli pali, Hisp. sfereta, d' cargillo de la vid.

Pampinus.

Pampinus Cic. Folium vitis quod vestitur, s'napov. Germ. Rābblat, Belg. wyngaertblat, Gall. pampre, feuille de la vigne, Ital. pampano, Hisp. pampaua, hoja de la vid. Et hinc est pampinare, cacumina destingere Colum. coles enatos è sarmento tollere Catoni, frondium luxuriam tollere.

Gemma.

Gemma quod omisit Hadr. ea dicitur, à qua ineunte Vere oriens vna sefe ostendit, quæ & succo terræ & colore Solis augefcens, primo est peracerba gustatu, deinde matura dulcescit, vestitaque pampinis, nimios Solis defendit ardores.

Caput.

Sagitta.

Quemadmodum autem flagellum illud Vitis vitium & productissimum, caput quidam appellant, ita furculi nouissimam partem Sagittam vocant, siue quia longius à matre recessit, &

quasi emicuerit, atque profuerit: seu quia cacumine attenuata, prædicti teli speciem gerat.

Surculos autem qui nihil attulerint, Spadones apud Ruellium appellare.

Virgas tandem, quæ è radicibus aut caudicis lateribus produnt, quasi nepotum partu geauidis, Sobolem dicunt, rustici tamen malunt Suffraginem appellare.

Nunc, quod superest, palmites appellantur, quod in modum palmarum humanarum, virgulas quasi digitos edunt, Capreolus à capiendo dictus est, à quo & Veteribus Caprea vitis cognominabatur. Malleolus à similitudine rei nomen habet, quod in ea parte, quæ deciditur ex vetere sarmento, prominens utrinque malleoli speciem præbet: vel quod capitulatus utrinque & furculatus solebat feri: differt enim à Sarmento, sicut pars à toto, verum rostratam ostendit imaginem.

Sed iam ad Vitis partum veniamus. Vna constans scapo (scopo Ruell.) & acinis, ab vuido fonte, qui latex est, nomen traxit, vocaturque Græcè σκαπὴ, Germ. trauben, weinträuben, Belg. drüyne / wyndrüyne, Gall. raisin, Ital. & Hisp. vna. Scapæ Varr. Scopus Ruell. Scopium Trago, racemus Virg. propriè ramulus vnde acini dependent, βότρυς, Botrys, Botrus, Botry Mart. Germ. der rapp oder drapp am trauben / der Cham / Belg. ein drüyne, Gall. la grappe, It. racemo, grappolo, Hisp. uencerron de la vna.

Acinus, & Acinum. Acinus vinaceus Cic. Græcè ἀκίνη & ἀκίνη, inquit Democritus, Acinus siue p. granum est vna. G. m. trauber be. Belg. wynebseye, Gall. grain de raisin, Ital. acino, grano d'vna, Hisp. granillo de raziño.

Composita est autem acinorum substantia, ex membrana, siue folliculo, aut cono acini (ὄψλη ὀψλη) carne, humore (πῶς σκαπὸς καὶ ὄψλη) per carnem disperso, & semine, eiusdem acini, quod Vinaceus Varro, Vinaceum Colum. nucleus Trago, πύσθη δὲ πυθῆς Græcis dicitur, Hebr. vt alioi fructuum nuclei garentim, Germ. der kern / Belg. de feceren, oft farle / oft sien tran ein drüyne, Gall. le marc de raisin, Ital. vinaciuolo, Hisp. granillo de la vna, Offic. arilli, quasi ariduli, quod fici, & succum nullum præbeant: sunt tamen & vinacea Colum. quæ ab vuis expressis ac pralo subiectis reliqua sunt. Recrementa tamen hæc propriè σῆμαρα dicuntur, membranosi videlicet acinorum folliculi, & vinacea cum scapis. Sed Attici, inquit Galenus, quæ ex multo expresso superiunt σῆμαρα appellant: σῆμαρα verò, quæ ab Olinis relinquuntur.

Vinearum genera quod ætinet: aliæ sunt humiles, vt quæ appellantur iugata, vt plerique in Italia: quibus stat recta vinca dicuntur pedamenta, quæ transuersa iunguntur, iuga, ab eoq; Vineæ iugata.

Iugorum genera quatuor: pertica, arundo, restes & vites. Pertica, vt in Falerno: Arundo, vt in Arpito: Restes, vt in Brundisio: Vites, vt in Mediolanensi agro, Iugationis species duæ, vna directæ, vt in agro Canusino, altera compluiata in longitudinem & latitudinem, iugata vt in Italia plerique. Hæc vbi domo nascuntur, vineæ non metunt sumptum, vbi multa ex propinqua villa, non valde. Primum genus, quod dixi, maxime quærit Salicæ: secundum Arundinetæ, tertium iunctæ, aut eius generis rem aliquam, quantum Arbuta, vbi traduces possunt

Spado.

Suffrago. Palmis e-
tymon.

Capreolus.

Malleolus.

Vna.
Scapus.

Botrus.

Acinus.

Corium acini.

Arilli.

Vinearum genera.
Pedamenta.Vinea iugata.
Pertica. Arundo.
Restes. Vites.
Iugatio duplex.

Tradux. possint fieri Vitium, vt Mediolanenses faciunt
Opulus. in arboribus, quas Opulos vocant: Canusini
Pedamentum. in harundinatione in Ficis.

Ridici Palus. Pedamentum item, ferè quatuor generum.
 Vnum robustum, quod optimum, solet afferri in
 vineam è Quercu ac Iunipero, & vocatur Ridi-
 ca. Alterum Palus è perisca, meliorque è dura,
 quod diuturnior. Tertium quod in horum ino-
Arundinetum. pia subsidio sit, Arundinetum. Quartum peda-
 mentum est, vbi ex arboribus in arbores tradu-
 ctis vitibus vinea sit, quos traduces, quidam
 Rumpos appellant.

Vinea forma. Vineæ altitudinis modus, longitudo hominis.
 Intervalla pedamentorum, quæ boues iuncti ara-
 re possint.

Locus Vitis aptus. De loco Vitibus apto ita Virg. in Geor. ca-
 nit,

*Salsa autem tellus, & qua perhibetur amara
 Erugibus infelix, ea nec mansuetis arando,
 Nec Baccho genus, aut pomis sua nomina ser-
 uat.*

Aptum, ait Florentinus, Vitibus solum, est omnis
 terra nigra, non valde densa, neque glutinosa,
 humiditatem habens.

Coli. Vitem (inquit Colum.) nos cæteris stipiti-
 bus iure præponimus, non tantum fructus dul-
 cedine, sed etiam facilitate, per quam omni pænè
 regione & omni declinatione Mundi, nisi tamen
 glaciali, vel præferuida, curæ mortalium respon-
 det. Tamque felix campis, quam collibus proue-
 nit, & in densa non minus, quam in resoluta, sæ-
 pe etiam gracili, atque pingui terra, siccaque, &
 viginosa. Tum sola maxime vtramque patitur
 interperiem cæli, vel sub axe frigido, æstiuo,
 procellosoque. Refert tamen cuius generis, aut
 quo habitu vitem pro regionis statu colere cen-
 seas, neque enim omni cælo, solæ cultus idein,
 neque est idem stirpis eius genus, quodque
 præcipuum est ex omnibus non facile dictu est,
 cum suum cuique regioni magis, aut minus ap-
 tum esse doceat vñs. Exploratum tamen habebit
 prudens agricola genus Vitis habile campo,
 quod nebulas pruinaque sine noxa perfert,
 cælique siccitatem, ventoique patitur: pingui, &
 vberi dabit agro gracilem Vitem, nec natura ni-
 mis sæcundam, macro feracem, terræ densæ ve-
 hementem, multaque materia frondentem, reso-
 luto & læto solo rari samentum, humido loco sciet
 non rectè mandari fructus teneri, & amplioris
 acini, sed callosi, & angusti, frequentisque vina-
 cci, sicco rectè contribui diuersæ quoque natu-
 ræ semina. Sed & post hæc non ignorabit do-
 minus loci pluri posse qualitatem cæli frigidam
 vel calidam, siccam vel rosicidam: grandinosam,
 ventosamque, vel placidam: serenam, vel nebu-
 losam. Frigidaque aut nebulosa duorum gene-
 rum Vites aptabit, seu præcoque, quarum matu-
 ritas frugum præcurrit Hiemem, seu firmi, duri-
 que acini, quarum inter caligines vix deflores-
 cunt, & mox gelicidius, ac pruinis, vt alix, calori-
 bus mitescant, ventoso quoque, & tumultuoso
 statu cæli fidentes easdem tenaces, ac duri acini
 emittet: rursus calido vberiores atque tenerio-
 res concredet: sicco destinabit eas, quæ plu-
 uis, aut continuis roribus putrescunt: ros-
 cido, quæ siccitatibus laborant: grandinoso, quæ
 solis duris, laticque sunt, quod melius protegant
 fructum: nam plæida, & serena regio nullam non
 recipit, commodissimè tamen eam, cuius vel
 vix, vel acini celeriter decidunt.

At si voto est eligendus vineis locus, & status
 cæli, sicut censet verissimè Celsus, optimum est
 Tom. II.

Solum, nec densum nimis, nec resolutum, soluto
 tamen propius: nec exile, nec latissimum, pro-
 ximum tamen vberi: nec præceps, simile tamen
 edito campo: nec siccum, nec viginosum, mo-
 dicè tamen rosicidum, quod fontibus non in
 profundo terræ scaturiat, sed vt vicinum radici-
 bus humorem subministrat, eumque nec ama-
 rum, nec salum, ne saporem vini corrumpat, &
 incrementa virentium veluti quadam scabra ru-
 bigine coërceat. Cælum potro neque glaciale
 vinea, nec prorsus æstuosum desiderat, calido ta-
 mē potius, quam frigido lætatur, imbribus magis
 quam serenitatibus ostenditur, & solo sicco,
 quam nimis pluvio est amior, perflatu modico
 lenique gaudet, procellis obnoxia est. Atque
 hæc secundum Colum. maxime probabiles est
 cæli & soli qualitas.

Cælo potro calido, ait Dod. Vitis lætatur: æ-
 stuosissimum tamen non desiderat: frigidum ve-
 rō ac glaciale non sustinet: In calidis idcirco re-
 gionibus vber est potentis vini prouentus, vt in
 Hungaria, Austria, Italia, Hispania, Gallia, & aliis
 locis calidioribus: in frigidioribus tenuius est, &
 oligophorum, ac exiguum aquam admittens, vel
 etiam omnino *impossibile*, quale est quod Louania
 & alibi apud Brabantos, tum quod & apud Bo-
 hemos ac Saxones, ac circa horum fines, nascitur.
 Validiores siquidem & potentiores vvas Sol
 efficit, sed & dulciores, si multum calefeceris: vt
 in Geoponicis Quintilii affirmant, qui & Lunani
 ad maturitatem, ad dulcedinem verò noctes cō-
 ferre aiunt. Monspelii Vites abundant: verum
 longè aliter coluntur, quam nostræ: stipites e-
 nim vix excedunt cubitum: quoannis omnes fer-
 ræ rami abscinduntur, relictis parvis stolonibus,
 nec vtuntur pedamentis. Verum quibusdam lo-
 cis Narbonensis Gallix permittunt vt conscen-
 dant arbores ordine constitas, inter Vites cres-
 cente gramine. In Italia vulgare est, vt agri tria
 ferant, triticum, ligna & vinum: solent enim Ita-
 li ordine in agris conferere Salices, Populos, Iu-
 glandes, quas conscendunt Vites, inter arbores
 serunt triticum. Genus aliquas ita colant & vo-
 cant *des Hutins*.

Iam [ne quid omitatur] cui vineta facere cor-
 di est, præcipue caueat, ne alienæ potius curæ,
 quam suæ credere velit, nèue meretur viciari-
 cem. Sed genus surculi probatissimum domi con-
 ferat, faciatque vitarium; ex quo possit agrum
 vineis vestire: nam quæ peregrina ex diuersa re-
 gione semina transferuntur, minus sunt familia-
 ria nostro solo, quam vernacula, eoque velut
 alienigena reformidant, mutatæ cæli, locique
 positionem. Sed nec certam generositatis fidem
 pollicentur, cum sit incertum an is, qui conserue-
 rit ea, diligenter exploratum, probatumque ge-
 nus surculi deposuerit, quamobrem biennij spa-
 tium longum esse minimè existimandum est, in-
 tra quod vtiq; tempestiuitas seminum respon-
 det, cum semper proximam retulerit, exquisiti
 generis stirpem deposuisse. Post hæc deinde me-
 minerit accuratè locum vineis eligere, de quo
 cum iudicauerit, maximam diligentiam sciat ad-
 hibendam pastinationi, quam cum peregerit,
 non minore curâ Vitem conserat, & cum
 seruerit, summa sedulitate cultura seruiat, id
 enim quasi caput & columen est impensa-
 rum.

Vt autem ea quæ proposita fuere suo quæque
 ordine prosequamur. Vitarium neque ictu-
 na terra, neque viginosa faciendum est, suæ

*Observa-
 tiones de in-
 stituendis
 vitibus.*

*Vitarii
sunt &
compagiti.*

cosâ tamen & mediocri potius, quàm pingui, tamethi ferè omnes Autores huic rei lætissimum solum destinaverunt, quod ego minimè reor esse pro agricola. Nam deponitur stirpes valido solo, quamvis celeriter comprehendant, atque profliant, tamèdum sint viuat radices factæ, priusquam transferantur, retorrescant, nec adulescere queant. Prudentis autem coloni est ex deteriori terra potius in meliorem, quàm ex meliore in deteriore transferre. Propter quod mediocritas in electione loci maximè probatur, quoniam in consilio boni, malique posita est. Siue enim postmodum necessitas postulauerit tempestiva semina ieiuno solo committere, non magnam sentient differentiam, cum ex mediocri terra in exilem translata sunt, siue latior ager conferendus est, longè celerius in vberitate coalescant. Rursus tenuissimo solo vitarium facere minimè ratio nis est, quoniam malleolorum pars maior deperit, & quæ superest tardè fit idonea translationi. Ergo mediocritas & modicè si cuius ager vitario est aptissimus, isque bipalio priùs subigi debet, quæ est altitudo pastinationis, cum in duos pedes & semissem conuertitur humus, ac deinde tripedaneis relictis spatiis, per quæ semina excolitur, in singulis ordinibus, qui ducentos quadragenos pedes obtingent sexcenteni malleoli pangendi sunt: is numerus consumat per totum iugerum, feminum multa quatuor & viginti.

*Delectus
malleoli.*

Verùm hanc curam præuenit inquisitio, & electio malleolorum nam, ut sepe iam retuli, quasi fundamentum est prædictæ rei, probatissimum genus stirpis deponere. Sed electio dupliciter faciendâ est, non enim solum fecundam esse matrem satis est, ex qua semina petuntur, sed adhibenda est ratio subtilior, ut ex his partibus trunci sumantur, quæ & genitales sunt & maximè fertiles. Vitis autem fecunda, non tantum debet ea æstimari, quod vvas complures exigit: potest enim trunci vastitate id accidere, & frequentia palmitum, nec etiam eam feracem dixerim, cuius singulæ vvas in singulis sarmentis conspiciuntur, sed si per vnumquemque palminum maior numerus vvarum dependet, si ex singulis gemmis compluribus materiis cum fructu germinat, si denique etiam è duro virgam cum aliquibus racemis citat, si etiam nepotum fructu grandida est, ea sine dubitatione ferax designari debet legendo malleolo. Malleolus autem nouellus est palme innatus prioris anni flagello, cognominatusque à similitudine rei, quod in ea parte, quæ decidit ex vetere sarmento prominens vtrinque malleoli speciem præbet. Hunc ex fecundissima stirpe legendum censens omni tempore, quo vineæ putantur, ac super terram gemmis tribus vel quatuor exstantibus diligenter obruendum loco modicè humido non vliginolo, dum tamen antiquissimum sit considerare, ne vitis, ex qua is sumitur, ancipitem floris habeat enentum, ne difficulter acinus ingrandescat, ne aut præcoquem, aut sepe maturitatis fructum afferat, nam illa volucritas, hæc etiam tempestatibus hyemis infestatur.

*Piter &
feraces fa
cienda.*

Ceterum fecunditas Vitis adiuvati potest cultoris industria, celeritèque infusionibus ad maximum numerum perducitur. Refert ut in transferendis seminibus similem statum cæli, locique, & ipsius Vitis habitum obseruemus, quoniam plerumque degenerat siccitatis, si aut situs agri, aut æris qualitas repugnet, aut etiam si ex arbore in iugum deferatur. Itaque de frigi-

dis in frigida, de calidis in similia, de vineis in vineas transferemus, magis tamen ex frigido statu stirps potest calidum sustinere, quoniam lætat ut tepore potius quàm frigore. Sed & qualitas soli plurimum iuvat, ut ex macro aut mediocri transducatur in melius, nam quod aliucum est pingui, nullo modo maciem terræ patitur, nisi sæpius stercores.

*Præceptum
de legendo
semina.*

Custodiemus autem, ut à prædictis locis, quos humerosos rustici vocant, semina legamus, tamen quæ attulisse fructum antea animaduertimus: nam si fortè vacua sint, quamvis à laudabili parte, nihil censuimus ad feracitatem conferre malleolo.

Quare magnopere in eligendis feminibus adhibenda cura, uti fructuosâ parte Vitis palmites legantur ei, qui futuram fecunditatem iam toto fructu promittunt. Nec tamen contentissimus singulis vvis, maximeque probandi ii, qui numerosissimis fructibus conspiciuntur. An non opilionem laudabimus ex ea matre sobolem propagantem, quæ geminos enixa sit, & capratium summittentem sætis earum pecudum, quæ trigemino partu commendantur? videlicet quasi semper sit parentum fecunditati proles responsura, & nos sequamur in Vitis hanc ipsam rationem, tantò quidem magis, quod compertum habeamus naturali quadam malignitate desciscere interdum, quamvis diligenter probata semina, idque nobis poeta velut lurdus veritatis indulget dicendo.

Vidi læta diu & multo spectata labore

Degenerare tamen vis humana quot annis

Maxima quæque manu legeret sic omnia satis

In peius ruere, ac retrò sublapsa referri.

Quod non tantum de feminibus leguminum, sed in totam agriculturæ rationis dictum esse intelligendum est.

Sequitur hanc eligendi malleoli curam, pastinationis officium, si tamen antè de qualitate soli constiterit, nam id quoque plurimum & bonitati, & largitati frugum conferre nihil dubium est. Ac priùs quàm ipsum perspicimus, illud antiquissimum censemus, rudem potius eligendum agrum, si sit facultas, quàm vbi fuerit seges, aut arbutum: Si tamen rudis terra non sit, proximum est vacuum arboribus arum. Si nec hoc est, rarissimum arbutum, vel oliuetum quod non fuerit maritatum vineis, destinatur. Vltima est conditio resiliibilis vineæ: nam si necessitas facere cogit, priùs quicquid est residuum vitis extirpari debet, deinde totum solum siccum simo, aut, si id non sit, alterius generis quàm recentissimo, stercore, atque ita conuerti, & diligentissimè resosas omnes radices in summum regeri ac comburi. Tunc rursum vel stercore vultu, quia non pignit herbas, vel de vepribus egesta humo pastinatum largè contegi. Sed hoc in totum ad illud, quod vineis præcipue est idoneum, propriè considerandum, si facilis est humus & modicè resoluta, quam pullam vocitant, nec quia sola ea, sed quia sit habilis maximè vineis. Quis enim vel mediocritas agricola nesciat etiam durissimum tophum vel carbunculum, simul atque sunt confracti, & in summo regesti, tempestatibus, gelivæ, nec minùs æstivæ putrescere caloribus ac resolui, eosque pulcherrimè radices vitium per æstatem refrigerare, succumque retinere: quæ res alendo furculo sunt accommodatissimæ: simili quoque de causa probari solutam glæream, calculosumque agrum & mobilem lapidem, si tamen hæc pingui glebæ

glebæ permixta sunt, nam eadem ieiuna maximè culpantur. Est autem [ut mea fert opinio] vineis amicus etiam Silex, cui superpositum est modicum terrenum, quia frigidus, & tenax humoris per ortum caniculæ non patitur scire radices. Higinus quidem secutus Tremellium, præcipuè montium ima, quæ à uerticibus defluentera humum receperint, vel etiam valles, quæ fluminum alluie, & inundationibus concreuerint, aptas esse vineis asseuerat me non dissentiente. Vitis contra inimica Cretosa humus quam argillam vocant. Nec minùs ieiuna fabulo, & quicquid, ut ait Iulius Atticus, retorridum furculum facit. Id autem solum vel vligiosum est, vel salsum, vel amarum, vel sicciosum, vel peratidum, Nigrum tamen, & rutilum sabulonem, qui sit humidæ terræ permixtus, probauerunt Antiqui. Grauis est rubrica, ut idem Atticus ait, & ad comprehendendum radicibus iniqua. Sed alit eadem vitem, cum tenuit, verum est in opere difficilior, quòd neque humentem fodere possis, quòd sit glutiniosissima, nec nimium sicca, quia ultra modum prædura.

ut Græci-
mus de terra
signali.

Sed ne nunc per infinitas terreni species euegemur, non intemptè commemorabimus Iulii Græcini conscriptam velut formulam ad quam posita est limitatio terræ vinealis. Idem enim Græcinus sic ait. Esse aliquam terram calidam vel frigidam, humidam vel siccam, ratam vel densam, leuem aut grauem; pinguiam aut macram: Sed neque nimium calidum solum posse tolerare vitem, quia inurat, neque prægelidum quoniam velut stupentes, & congelatas radices, nimio frigore moueri non sinat, neque humidum, quoniam cum se promunt vites, modico tempore euocant humorem terræ iusto maiorem qui putrefacit deposita semina. Rursus nimiam siccitatem destituere plantas dicit naturali alimentò, aut in totum necare, aut scabras & retorridas facere. Perdensam humum celestis aquas non sorbere, nec facile perflari, facillimè percurrere, & præbere rimas, quibus sol ad radices stirpium penetrat. Eademque velut conclusa & coarctata semina comprimere atque strangulare. Ratam supra modum velut per insudabilem transmittere imbres, & Sole ac vento penitus siccare, atque exarescere. Trauem terram vix vlla cultura vincibilem, leuem vix vlla sustineri, pinguis-
mam & lætissimam luxuria: macrem, ac tenuem ieiunio laborare. Opus est, inquit, inter has tam diuersas inæqualitates, magno temperamento, quod in corporibus quoque nostris desideratur, quorum bona valetudo calidi & frigidi, humidi & aridi, densi & rari, certo & quasi examinato modo continetur. Nec tamen hoc temperamentum in terra quæ vineis destinatur, pari momentò libratum esse debere ait, sed in alteram partem propensius, ut calidior terra sit quàm frigidior, siccior quàm humidior, rarior quàm densior, & si quæ sunt his similia, ad quæ contemplationem suam dirigat, qui vineas instituit.

Quæ cuncta sicut ego teorimagis profunt, cum suffragatur etiam status cæli: cuius regionem, quam spectare debeant vineæ, vetus est dissentio. Sæternà maximè probante Solis ortum mox deinde meridiem, tum occasum, Tremellio Scropha præcipuam positionem meridianam censente, Virgilio de industria occasum sic repudiante

Néue tibi ad Solem vergant vineæ cadentem.

Democrito, & Magone laudantibus cæli plagam Septentrionalem: quia existiment ei subiectas

Tom. II,

feracissimas fieri vineas; quæ tamen bonitate vini superentur. Nobis in vniuersum præcipere optimum visum est, ut in locis frigidis meridiano vineta subiciantur, tepidis orienti aduertantur, si tamen non infestabuntur Austris, Eurisq; velut oræ maritimæ in Bætica. Sin autem regiones prædictis ventis fuerint obnoxie, melius Aquiloni, vel Faunio committentur, nam feruentibus prouinciis, ut Ægypto & Numidia, vni Septentrioni rectius opponentur, quibus omnibus diligenter exploratis tum demum passionationem suscipiemus.

Et hæc pleraque ex Columella: cætera vero quæ tum ex sua tum ex aliorum sententia de vitis *Passinatione, Positione, Pampinatione, Ablagatione, Putatione, reliquæque eius cultura* prolixè prosequitur, ex ipso fonte haud grauius petet Lector.

Natura vitis, inquit Palladius, cælum omne, solumque sustentat, si generà conuenienter aptentur. Plano igitur loco statues vitem, cuius genus nebulas sustinet, & priuinas: collibus, quod siccitatem durat & ventos. Pingui agro graciles, atque infœcundas, macro feraces & solidas: denso, validas atque frondosas, frigido & nebuloso, quæ hyemem celeri maturitate præueniunt, aut quæ duris acinis inter caligines securitis florent: ventoso, stabiles, & tenaces: calido grano tenerioris, & humidi: sicco, eas, quæ pluuias ferre non possunt: & ne multa dicamus, eligenda sunt genera quæ professione vitorum suorum contraria loca diligant, in quibus durare non poterant. Placida sanè regio, & serena tutò genus omne suscipiet. Vitium genera numerare non attinet, sed notum est maiores Vnas pulchre speciei, grani callosi, & siccioris ad mensiam: feracissimas verò, & citius tenerioris, & sapore nobiles, & maximè quæ citius deflorescunt, vindemiis esse seruandas.

Loca naturam plerisque vitibus mutant. Solæ Amminæ ubique sint, vinum pulcherrimum reddunt. Calidum statum potius quàm frigidum sustinebunt. De macro ad pingue transire non possunt, nisi sterces adiuerint. Harum duo genera sunt, maior & minor. Sed minor melius deflorescit, & citius internodiis minoribus, & grano breuiore. Si arbori applicetur, pinguem terram: si colatur in ordines, mediocrem desiderat. Imbres contemnit, & ventos, nam maior læpe vitatur in flore. Sunt & Apianæ præcipuæ. Satis est genera ista dixisse. Industriosi vir probata deligat, & terris talibus mandet, quæ imitari eas possint vnde sumuntur: sic merita sua quæque seruat. Sed vitem vel arborem, melius erit de exili ad pinguem transferre: nam si à pingui terra ad solum exile transferantur, vitiles esse non poterunt.

Eligenda sunt sarmenta quæ paugimus de Vite media, neque de summa, neque de infima, quinque vel sex gemmarum spatio à veteri procedentia, quia non facillè degenerant, quæ de locis talibus transferuntur. Sumantur autem de Vite fecunda, neque putemus brachia esse fertilia, quæ Vnas singulas, aut binas producunt, sed quæ multà vberitate curuantur: nam potest ferax vitis feracioris in se habere materias. Erit & hoc signum fertilitatis, si de duro aliquo loco fructum citabit, si festu impleuerit ramulos ex ima parte surgentes. Sed hoc signis positus per vindemias est notandum. Ad pangendum, nouellus palmes eligi debet, duri in se nihil habens, & veteris sarmenti, quia hoc putrescente sapè

Natura vitis
est omne cælum
omne solum
sustinet.

Admissæ.

Electio sar-
mentorum.

Fertilitatis
signum.

corruptur. Summa flagella repudiemus, ac furculos, qui licet bono loco nati sint, tamen feracitate caruerunt. Pampinarius, qui de duro nascitur etiam si attulerit fructus, pro frugifero non est ponendus, in suo enim loco fecundatur à matre, translatus vero tenet sterilitatis vitium, quod renascendi conditione suscipit. Caput sarmenti, cum deponitur, torquendum non est, nec aliquo modo vexandum, ne demerita penitis fecundiore parte, quod sterili proximum est supra terram relinquantur: deinde quoniam ipsa tortura vexatio est, & parsea, de qua radix futura præsumitur, iniurite nulli subiicienda est, cum qua contendere cogatur, antequam teneat.

Positio
tempus.

Ponendæ sunt vites placidis diebus ac tepidis. Curandumque ne sarmenta Sole vrantur, aut vento, sed vel statim ponantur, vel obruta referuntur. Martio mense, ac deinceps toto Vere vinea ponenda est regionibus frigidis, pruinosis, pinguibus campis, & humidis prouinciis.

Mensura
sarmenti.

Sit autem mensura sarmenti cubitus vnus. Vbi pinguis est natura terrarum, maiora inter Vites spacia relinquemus, vbi exilis, angustia. Nonnulli itaque in iis vitibus, quas toto solo pastinato disponunt, ternos pedes inter singulas vites quoque uersus dimittunt. Sed hoc genere diuisionis in iugerali tabula panguntur tria millia tricesa vinea sarmenta. Quod si duos & semis pedes inter vites relinqui placuerit, in eadē tabula ponentur vites quatuor mille septingentæ quinquaginta tres.

Positio
vitis.

Sed ad ponendum vitetur hoc ordine. Lineam seruatis iis spatiis, quæ placuerit custodire, candidis signis, vel quibuscunque notabimus: tunc tensa per tabulam lineam, in eis locis furculos, vel calamos figemus, vbi vnaquæque vitis ventura est. Spatium totius tabulæ furculis complebitur ad numerum Vitium ponendarum, atque is qui panditur est, proiecta circa furculos sarmenta sine vilo errore deponet: Præterea nõ est vno genere vitium omne pastinum consequendum, ne annus iniquus generi spem vindemiz totius extinguat. Et idem quatuor, aut quinque eximij generis sarmenta pangemus: sed maxime expedit genera tabulatum disponi, & decimanis diuidi, nisi deterreat operis difficultas, quod si est vetus vinea, singulorum generum furculis tabulatum poterimus inserere, & facile hoc genus colendi, quod est pulchrum, atque utile, consequemur. Ita & maturitatis & floris tempora, quæ in vite diuersa sunt, suis temporibus opportunitis obtinere poterimus. Nec paruo constabit, si legatur maturitas cum acerbitate: dispendium, cum vnus tempestiuam vindemiam sequi, sit permixta cruditate vitiosum, & alterius seras maturitates exspectare, damnicum. Huic commodò adiecit, quoddam pro generum diuersitate per gradus accedente vindemia, minor operarum numerus eam poterit expedire, & generatim condere, ac melius puros sapores, sine luctamine alterius generis, vnaquæque vina seruare. Hoc si difficile videbitur, non alias simul conferas, quam quæ & sapore, & flore, & maturitate conueniunt. Sed hæc in pastinis, vel sulcis ratio erit, in scrobibus vero per angulos 4. sarmenta depones: Sed [vt asserit Columella] vineam stercorei mistam simul sparges, & si exile solum fuerit, pingrem terram scrobi inferes, vel aliunde portatam. Cum vero plantā, vel malleolum disponimus, modicè humido solo, sed potius

Maturitas
et floris
tempora in
vite diuer-
sa.

arido, quam lato solo, duabus gemmis supra terram relictis, sarmenta ponemus obliqua, & sic facilius comprehendunt.

Quod si arbutū te habere, delectat plantā generis. *Arbutū*
grec.
rolæ vitis prius in seminario nutrire debebis, vt inde radicata transferatur ad scrobem, cui arbut iniuncta est. Seminarium vero dimisimus æquē solam tabulam pedum duorum semis altitudine. In hac, quam pro numero ponendarum vitium, vel qualemcunque plantarū protendis, aut contrahis, breuissimo spatio inter se sarmenta depones, si vallis aut humidus est campus, tunc gemmarum, exceptis minutis, quas habebit inferius, & vbi conualuerint, hinc post biennium radicatæ vites, vel arbutulus transferas, quas cum depones in scrobe, ad singulas materias rediges, putas omnibus, quæ scabra sunt, curtas etiam radicibus, si quas poteris inuenire vexatas. In scrobe autem ad arbutum faciendum duas radicatæ vites deponis, hoc seruans, ne se in radice contingant: sed lapides quinque propè librarum medios in vitramque constitues, & ipsas vites ad scrobis latera discreta coniunges. Mago asserit, Mago ad scrobem non primo anno esse complendam: sed post biennium de coarctandam, quæ res vitem facit altius fundare radices: sed hoc aridis prouinciis fortè conueniet, humidis autem sata putrescent recepto humore nisi statim terra cumuletur. Sed arbuta, qui faciet plantas arborum de his generibus ponat, si agro suppetit abundantia, Opulo, Vulnio, Fraxino in montanis & asperis, in quibus, Vlmus minus læta est. Has etiam Columella dicit seminario debere nutrire. Mihi videtur, quod nulla prouincia sit, quæ non ex his quamcunque spontè producat. Sed si ager frumentarius fuerit, vbi arbuta disponis, quæ dragenos pedes inter arbores relinque, vt ser possit, in exili autem vicienos. In scrobe vero vitis ab arbore sua sesquipedis spatio distare debet. Nam vitis multum subiecta arbori, incremento arboris opprimetur. Cauis etiam munienda est aduersum pecoris appetentis iniurias, & arbori suæ protinus alliganda.

Est & aliud de transferenda ex arbutis vite compendium. Fit ex vimine parua corbícula, quæ mensura pedis, vel aliquantū minus circini spatio possit amplecti. Hæc ad arborem, cui vitis inhaeret, fertur. Et in fundi media parte pertunditur, quod sarmenti virgam possit admittere. Inducto itaque sarmento vitis eius, de qua transferre disponis, cornicula ipsa ex aliqua arboris parte suspenditur, & viua terra repletur, vt sarmentum terra possit includi, quod sarmentum prius intorquetur. Ita exacto annui temporis spatio, sarmentum quod clausum est, radices creabit intra prædictam corbiculam. Tunc sub fundo corbis incisum radicum sarmentum cum ipsa corbe portabitur ad locum quem vitibus arbutiuis destinabis implere, ibique obruetur circa arboris maritandæ radices. Hoc genere quantum volueris numerum vitium transferes sine ambiguitateprehendendi.

Compen-
dium de
transferen-
da vite ex
arbutis.

Vineæ in prouinciis multis generibus sunt: sed optimum genus est, vbi Vitis velut arbutula stat breui crure fundata. Hæc primò calamo iuuatur, donec solidetur: sed altior sesquipedale esse non debet, vbi robusta sic erit, sola consistet. Aliud genus est, in quo cannis pluitibus circa dispositis, ipsa vitis per cannas sarmentis ligatis in orbiculos flectitur se sequentes. Vltimū posicio- nis vius est, quæ per terram proiecta discumbit. Hæc omnes & scrobibus ponuntur & sulcis.

Vinea pri-
mæ
unciales.

Putatio vitium Hoc mense (Martio) locis frigidis aliquatenus, & temperatis vitium iusta putatio est. Sed ubi sunt multæ vineæ diuidantur, & pars earum, quæ Septentrionem respiciet, Vere putetur, alia pars aduersa clementioribus plagis recidatur. Autumno: Sed in putatione semper nitamur, ut vitis fiat in crure robustior, neque debili vincula duo duramenta seruemus. Auferenda sunt lata, intorta, debilia, malis locis nata sarmenta. Focaneus etiam, qui inter duo brachia medius nascitur, debet abradi, qui si pinguitudine sua brachium quodcumque proximum debilitauerit, illi decipite succedat. Erat tamen optimi putatoris, inferius sarmentum, quod bono loco natum fuerit, reparandæ vitis causa semper tueri, & ad vnam, vel duas gemmas relinquere.

Loci considerandi In locis clementioribus altius vitem licebit expandere, in exilibus aut æstuosis, aut decliuius, aut procellosis, humilior est habenda. Locis pinguius, singulis brachiis vitium bina flagella dimitte. Sed erit sapientis æstimare vinu uicis. Nam quæ altius tollitur, & fecunda est, plus quam octo palmites habere non debet, ita ut conseruamus semper in inferiore parte custodem. Circa crur quicquid nascitur amputandum est, si non desideret vinea reuocari. Quod si truncus vitis Sole, aut pluuiis, aut noxiis animalibus est cauitus, purgamus quicquid est mortuum, plagæque eas amurcæ linimus, & terrâ aduersum prædicta.

Cortex etiam recisus & pendens à vite tollatur, quæ res minorem faciem reddit in vino. Musculus radatur vbicunque repertus. Sed plagæ, quæ in duro vitis accipiet, oblique & rotundæ esse debebunt. Decisus sicut supra dixi, malè natis omnibus & veteribus nouellis, & fructuarios feruæ. Vngues etiam custodum siccos, & annotinos recide, & omnia quæ vetera, vel scabra reperiens.

Illæ, quæ altius coluntur, ut in iugo, vel pergula, ubi quatuor pedibus supra terram leuata steterint, quaternæ brachia habeant. Si macra Vitis erit, in singulis brachiis singula flagella dimittimus, si pinguis, bina. Sed prouidendum, ne in ima parte sint sarmenta, quæ feruas. Quod cum sit, vitis tanquam si fulgure tangatur, arefcit. Relinquenda sunt sarmenta, neque circa durum, neque in summo, quia hæc velut pampinaria minds afferunt, illa vitem nimietate fœtus onerant, & longius ducunt. Quare in medio loco seruanda sunt, quæ tuemur. Plaga non iuxta gemmam, sed aliquantulum superius fiat, & auertatur à gemma propter lachrymam defluentem.

Putatio arborum Vitis, quæ in arbore collocatur, prima eius materia ad secundam vel tertiam gemmam præcidatur. Deinde omnibus annis aliquid per ramos crescere, subinde patiamur, vnam materiam semper ad cacumen arboris dirigentes. Sed qui fructum volunt maximum, materias plures per ramos submitunt qui vinum melius, sarmenta in cacumem extendunt. Fortioribus ramis arborum plures materiz, debilioribus imponendæ sunt pauciores. Putandi autem ratio talis est, ut & vetera sarmenta, quibus primi anni fructus pendit, omnia recidantur, & non oia circumcisus capreolis, & ramulis inutilibus dimittantur. Sed prouidendum est, omnibus annis vitem resolui, ac religari, quia refrigeratur. Ita formandi sunt rami arborum vitiferarum, ne alter sub alterius linea dirigatur: sed loco pingui vltimus à terra octo pedibus, gracili verò se-

ptem sine ramo relinquenda est. In solo roscido & nebuloso rami arboris vitiferæ in Orientem, & Occidentem putatione dirigantur, vel latera vacua Solis radiis membra totius vitis ostendant. Agendum est autem, ut Vitis spissa non sit in arbore, & deficientibus primis arboribus substituendæ sunt aliz. In loco diuoso humilioris rami arborum seruandi sunt, in plano & vlginoso altius. Palmites ad arborem non duro vinee ligentur, ne eos vinculum recidat, aut atterat. Hoc autem noueris quia palma quod extra ligaturam pendens habuerit, fructum inducet, quod infra ligaturam, materia sequentis anni deputabit.

Vites quas Prouinciali more velut arbutulas stare dixi, si instituere velis, ramos à quatuor partibus his relinques, & in eis brachiis sarmenta pro vitis possibilitate seruabis. Vites autem, quæ cannis in orbem cinguntur sic putentur, quemadmodum eæ, quæ nituntur radicis, aut palis. Illæ verò quæ sine adminiculis iacent, quod pro sola indigentia faciendum est, vel necessitate prouinciæ, primo anno duas gemmas: deinde plures habebunt. Sed huius generis vinea scitius est putanda.

Nouellam vitem dicit Columella à primo anno ad vnam materiam esse formandam, nec recidendam totam, sicut Italiæ consuetudo est. Anno secundo expleto, quia vel intereant vites in totum recisæ, vel infecunda sarmenta producant, quæ amputato capite velut pampinaria de duro coguntur exire: quare iuxta ipsam veteris sarmenti, vnam vel duas gemmas censemus relinquendas, quod est meritò in viticula fortiore seruandum, & sanè excipiendam calamis nouellam, vel exiguis palis, ut tertio anno robustiores possit accipere. Nam quadrina nouella, ubi lætum solum est, tres materias meritò nutrire cogetur. Statim post putationem sarmenta decisa à vineis, & Rubi & impedimentum fossoris omne tollatur.

Hoc etiam mense [Martio] propagandæ sunt vites: sed vetus, & exesa vinea cuius duramenta longè processerunt, ut Columella dicit, mergis melius reparabitur, quam si in fossione totius corporis obruatur, quod agricolis certum est displicere. Mergum dicimus, quoties velut arcus supra terram relinquitur alia parte vitis in fossa. Nam (ut ait Columella) cum totæ stratae sunt, plurimis radicibus totius corporis fatigantur. Mergi verò post biennium reciduntur in ea parte, quæ supra est, & in loco iustas vites relinquunt. Sed [ut agricola afferunt] post biennium si recidas, plerumque infirmas habent radices, & repente simul pereunt.

Hoc Mense calidis & apricis locis optimè celebratur insitio, quæ fit tribus generibus. Sed ex his duo nunc fieri possunt, tertium referuatur æstati. Sunt autem genera inferendi hæc, aut sub cortice, aut in tranco, aut emplastro. Inferemus ergo sic. Arborem vel ramum, in loco qui nitidus est, & sine cicatrice, ferrâ recidemus non læto cortice. Post serraturam plagam ferramentis acutis nitidamus. Inde quasi cuneum tenuem ferreum, vel osseum, maximè leoninum, inter corticem & lignum tribus prope digitis consideranter depouimus, ne corticis fascia dissepatur, & in eum modum subducto cuneo, statim furculum mergimus una parte decimum salua medulla, & cortice partis alterius, qui supra arborem, ex, vel octo digitis omineat, Duo vel tres, vel plures furculos pro trunci qualitate constituimus, qua-

*De Nouella
vitis putatione*

*Propagandis
vitis*

*Insitio ipsa
plena*

ternis digitis, vel amplius inter eos spatium relinquimus, tunc Iunco, aut Vlmo, aut vimine stringimus, & supra lutum musco testum ponemus, ac ligabimus, vt quatuor digitis super lutum possit furculus eminere. Plerosque delectat strictum primo lectæ arboris truncum vinculis arctioribus in medio findere, & ibi furculos ex utraque parte ramos in modum cunei, vt integra sit medulla demergere, præmissis aut cuneolo, quo subducto, depositus furculus redeunte in plagam materia, possit astringi. Sed hoc vtrumque genus verum est, & fit crescente luna, vbi incipit gemma arborum turgescere. Surculi autem, qui inferendi sunt, sint nouelli, fertiles, nodosi, de nouo nati, ab orientali arboris parte de cisi, crassitudine digiti minoris, bifurci, gemmis pluribus vbertati. Si arborem minorem desiderabis inferere, in qua sine dubio meliora incrementa proueniunt, circa terram secato, & quod melius est, furculos inter lignum, corticemque deponere, tunc stringe. Quidam rasum ex utraque parte furculum conuenientem soliditati arboris inferendæ sic in medio deponunt, vt cortex furculi vndique cortici arboris reddatur æqualis. Sed in nouella arbore terra mota vsque ad ipsum insitum colligatur, quæ res eam à vento, & calore defendet. Mihi asseruit diligens agricola, omne insitum sine dubio comprehendere, si depositis furculis viscum non temperatum in ipsa plaga pariter mergamus, quasi glutino quodam succos materiam vtriusque misturum. De emplastratione suo mente dicemus. Quartum genus Columella sic retulit: Gallica terebra vsque ad medullam arborem perforandam, plaga interius leuiter inclinata. Ibi educto omni scobe, vitem vel ramum admodum foraminis impressi delibratum, succidum tamen, & humentem strictè imprimi, vnâ aut duabus gemmis foris relictis, tunc argilla, & musco locum diligenter operiri, ita & vites in Vlmo inferi posse commissas. Hispanus quidam mihi hoc genus nouæ infusionis ostendit, quod ex Persico se asseribat expertum. Salicis ramum brachii crassitudine solidum, longum cubitis duobus aut amplius terebrari iussit in medio & plantam Persici in eodem loco, in quo consistit, spoliata ramis omnibus, Solo capite relicto, per ipsum saligni manubrii foramen induci, tunc eundem salicis ramum terræ capite utroque demerso, in arcus si similitudinem debere curuari, foramen luto, musco, vinculis stringi: anno deinde exempto, vbi infra medullam salicis caput plantæ sic cohæserit, vt vnitas sit ex duobus mista corporibus, plantam subterrocidi, atque transferri, & aggerati terram, quæ arcum salicis cum Persici cacumine possit operire, hinc Persici poma sine ossibus nasci, sed hoc locis humidis conuenire, vel triguis, & salices aquationibus adiuuandas, vt & natura ligni vigeat, quæ delectatur humore, & superfluentem copiam succi germinibus ministrat alienis.

De fodien-
dis palan-
dis, ex li-
gandis Gist-
bus.

Vitis the-
riaca ut fa-
cienda.

Nunc locis maritimis, & calidis fodiendæ sunt vites: vel si hæc prouincæ consuetudo est] exarandæ, & in eisdem locis palandæ, aut ligandæ sunt vineæ prius, quam gemma procedat, cuius concussionem, vel attritu incurritur grande dispendium. Theriacam vitem, cuius iste profectus est, vt vinum eius, vel acetum, vel vna, vel samentorum cinis proficiat, contra morsus omnium bestiarum: sic facies. Samentum, quod pangendum est, trium digitorum spatium in ima parte findatur, & sublata medulla ad

eius vitem Theriacæ medicamen addatur. Tunc terræ mandetur vinculo diligenter astrictum. Aliqui eadem sarmenta iam medicam. ne satuta, intra squillæ bulbum recondunt, & terris prædicta ratione committunt. Aliqui antidoti eius affusione radices vitis infundunt. Sanè samentum, si de hac vite sumatur ad transferendam, potentiam materiam medicaminis non tenet, oportebit autem theriacæ infusione assidua, vim succi senescentis iterare.

Est pulchra species Vitis, quæ granis interioribus caret. Hinc efficitur, vt lumina iucunditate sine impedimento forberi possit, velut vnum omnium corpus Vuarum. Fit autem Græcis Authonibus hac ratione, per artem succedente natura. Samentum, quod obruendum est, quantum latebit in terra tantum findere debemus, & medullâ omni sublata, ac diligenter exscalpta, membra iterum diuisæ partis adunare, & vinculo constituta deponere, Vinculum tamen papyro asserunt esse faciendum, & sic in humida terra esse ponendum. Diligentius quidam samentum reuinctum quantum excisum est, intra squillæ bulbum demergunt, cuius beneficio asserunt facta omnia comprehendere facilius. Alii tempore, quo Vites putant, samentum fructiferum putat Vitis in ipsa vite, quam possint de alto sublata medulla excavari, non diuisum, & calamo affixo alligant, ne possint inuerti. Tunc *oxy-
nebulatæ*, quod Græci sic appellant, in excavata parte suffundunt, ex aqua prius ad saporem pinguedinem resolutum, & hoc transactis octidies semper renouant, donec Vitis germina nouella procedant. Et in granatis malis fieri hoc posse asseritur à Græcis, & in cæteris opus est capienti.

Vites quæ lachrymarum nimietate tabescunt, & deplorando vim roboris sui auertunt à fructu, trunco earum lacerato Græci sinum fieri iubent. Si hoc minus proderit, radicum robur pingue telcindi, vt asserat medicinam vulnus impellens: tum insulsâ amurcâ ad medietatem decoctâ, & refrigeratâ plagæ excisio perlineatur, & sub hac acetum acre fundetur.

Conditum vel absinthiatum, vel rosatum, vel violatum procedere sponte fertur ex vitibus [vt natura suscipiat, quod procurare sinit indu-
stria.] si sarmenta in vas aliquod sem plenum supradictis potionibus mersa seruentur, & vium terram simul resoluas ad lixiuium modum, donec oculi samentorum nitantur exire: tunc eadem sarmenta gemmantia in quo volueris loco, vitium cæterarum more deponas.

Vt Vitis botryones & albos asserere possit, & nigros. Græci sic fieri debere iussunt. Si vicinæ sunt vites nigra & alba, cùm putantur, sarmenta vtriusque inter se diuisa sic iunges, vt medios vtriusque generis oculos æquâdo reddere possint vnitati. Tunc papyro ligabis stricto, & molli, atque humida terra curabis admittre, & interiectis ternis diebus adaquare, donec germen nouæ frondis erumpat. Hinc exempto tempore, si libuerit, genus effices per plura sarmenta.

Martio mense locis frigidis putatio vinearum celebratur, de qua abundè Februario mense locuti sumus, vsque quò incipit gemma esse suspecta. Vbi calor temporis cœperit, ligatur ipsi pinnicillo circa vespertam tenuis debet frequenter humor affundi, vt hoc alimento contrarium cœli torrentis animetur. Cùm ergo germen eruperit, & aliquod cœperit incrementum, calami adiutorio debet annexi, ne motus aliquis fragilem

Vna sine
granis.

Vites la-
chrymosa.

Ve propo-
siata spon-
te nascitur.

Ve botryo-
nes varij
nascantur.

Putationis
tempus.

lem procedentis sarmenti quasset ætatem. Vbi solidius quantumcunque processerit, vincula oportet abscindi, ne adolescentia mollissimi germinis nodo dura constrictionis angatur. Aliqui infra terram semipedali spatio effossa vii sarculos inferunt, & beneficio confectionis accumulanti, ut hoc quoque nouis sarmentis præter nutrimenti alimenta subueniat. Nonnulli circa terras melius asserunt inferendum, quia in altiori difficilius comprehendunt. Vique ad Idus, vel æquinoctium vites locis frigidis pangendæ sunt, seu pastinato, seu sulco, seu scrobibus, more, quo dictum est.

De nouellis puluerandis & fodendis vitibus.

Hoc mense nouella vinea incipit puluerari, quod nunc ac deinceps per omnes Calendas usque ad Octobres faciendum est, non solum propter herbas, sed ne tenera adhuc femina, solidata terra constringat. Graminum radices, quæ plurimum vitibus nocent, extirpandæ sunt. Nunc locis frigidis vinearum fossio celebranda est: & palandæ, atque ligandæ sunt vites: sed nouellam mollihus vinculis alligemus, quia eam teneram vincula duriora præcidunt. Palus maioribus vitibus solidus, minoribus ponatur exilis: propter vimbræ molestiam statuatur ab Aquilone, & plaga frigida, spatio quatuor digitorum, vel semipedis, motus à Vite, ut possit ex omni parte circumfodi.

Vi Getuli vinea reparatur.

Vineas veteres nunc aliqui de terra altius truncant, studentes reparationi, sed vitiosum est. Nam plerunque vastior plaga Sole putrescit, & roribus: quare hoc genere reparatur. Prius ablaguebitur altius, donec eius nodus appareat: deinde infra terram supra nodum recidatur, ut aperta, de frigore & Sole nil timeat. Hoc faciendum est, si optimi generis vitis sit, & altè posita, Omnia supra dicta locis calidis primo mense, frigidis verò, post Idus ipsius exequimur.

Vi agri vinea refodilanda.

Agros vites, vel quibus fructus arescit, circumfodiet, & vinam veterem suffundes. Item cinerem sarmenti, vel querci acetum mixtum subiice, aut incisas circa terram letamine refoueto, & quæ germinant, fortiora dimitte.

Cùm Vitis bidente lædatur aut ferro, plagam si terræ iuncta est, adline stercore ouillo, vel caprino: tunc terra mista circumfossa ligare curato: si in radice læsa est, operiens liquidum latamen admisce.

De nouella vitis sarmentis reuoluenda: & pampinandi.

Maior mense consideremus nouellæ vitis sarmenta, quæ protulit, & ei pauca & solida relinquamus, & adminiculis firmemus, donec brachia prolata durecant. Non enim amplius refectæ, & pullulanti viticula, quàm duæ vel tres materiae relinquantur, & alligentur propter iniuriam venti. Ideò autem tres materias dixi debere dimitti, ne dissipantibus ventis nulla remaneat, si in primordio reliqueris pauciores. Hoc mense pampinari conueniet: sed tunc est opportuna pampinatio, cùm teneri rami digitis stringentibus crepabant sine difficultate carpentis: hæc res Vitis efficit pinguior, & maturitati consulit Solis admissu.

De occidendis vitibus.

Hoc mense Vites quæ ablagueatæ fuerant occidere, hoc est, opereire iam conueniet. Augusto maritimis locis vindemiæ apparatus vrgetur. Locis verò frigidissimis occatio vinearum fit. Hoc etiam tempore, si terra exilis in vinea est, & vinea ipsa inferior, tres, vel quatuor lupini modios in iugero spargis, atque ita occabis.

Quod vbi fruticauerit, enertitur, & optimum stercus præbet in vineis, quia latamen propter vini vitium non conuenit inferre vinetis.

Nunc locis frigidis pampinatur, locis verò feruentibus, ac ficcis obumbratur potius Vitis, ne vi Solis arescat: si aut vinea breuitas aut facultas operarum permittit. Hoc etiam mense extirpare possumus carectas, atque filicetas.

Extirpationis carectorum tempus.

Septembri locis tepidis maritimisque celebranda vindemia est, frigidis apparanda. Sed maturitatem vindemiæ cognoscimus hoc genere. Si expressa vva, vinacea quæ in acinis celantur sint fulca & nonnulla propemodum nigra, quam rem naturalis maturitas facit. Vvas quas seruare volumus, legamus illeceas, neque acerbitate rigidas, neque maturitate defluentes, sed quibus est & granum luce penetrabili, splendidum, & tactus cū molli iucunditate callosus. Si qua sunt corrupta, vel vitiosa resecemus, nec patiamur interesse, quibus inexpugnabilis acerbitas contra blandimenta æstiuæ caloris induruit. Tunc incisos botryonum tenaces calida pice oportet ambiri, atque ita in loco sicco, frigido, & obscuro sine luminis irruptione suspendi. Vitis cuius fructus humore putrescit, per latera pampinanda est, ante trigelimum vindemiæ diem, & sola frons illa seruanda est, quæ in summitate posita Solem nimium defendit à vertice. Octobri vbi calidi, ac sicci aëris qualitas est, vbi exilis, & aridus est campus, vbi collis præruptus, aut macer, vites utilissimè ponuntur, de quibus satis mense Februario disputauit. Nunc locis ficcis, calidis, exilibus, mactis, arenosis, aridis, quæcunque de pastinis, de vitibus ponendis, putandis, propagandis, reparandis, vel arbusto faciendi, antè dicta sunt, rectius fiunt ut contra exilitatem glebæ hybernis imbribus adiuuentur. Sic & humorem sitientibus conferunt, & recisa, vel merfa glacie non adurunt, quia talibus locis pruinarum vis, & natura aëscitur.

Maturitas vva & extirpanda.

Post Idus Octobris ablagueanda est omnis nouella vinea, seu in pastino, seu in scrobibus, aut sulcis, ut amputentur radices superuacuas, quas produxit æstate, quæ si conualuerint, inferiores radices faciunt interire, & ita remanebit vitis in summitate suspensa, quæ res eam frigori obnoxiam faciet & calori. Sed hæc radice non ad siccum debent recidi, ne aut plures inde nascantur, aut noua plaga corpori vitis impressa, vi secuturi algoris vratur. Recidemus autem relicto digiti spatio. Et si placida ibi hyems est, apertas relinquemus vites, si violenta, ante Decembres Idus opereiemus, si perfrigida, aliquantum columbini stercore sub ipsa hyeme circa viticularum vestigia largiemur, quod contra frigus nimium Columella dicit toto faciendum esse quinquennio. Hoc tempore idcirco locis quibus dixi, propagatio melior est, quia firmandis radicibus vitis incumbit, cùm proferendi palmites eam cura non permouet. Græci iubent si Viam nimius imber infuderit, postea quàm mustum eius primo ardore feruebit, ut ad alia vascula transferatur. Ita propter naturæ grauitatem remanens aqua subsidet, & translatum vinum purè seruabitur, relicto quicquid se illi ex umbræ miscuerat.

Ablagueatio vinea nouella.

Novembri toto mense locis calidis, & ficcis, vel apicis, erit vitium celebranda positio. Nunc & propago iure dicitur, & locis frigidis nouellas vites, & arborum plantas circumfodere, atque opereire conueniet, & ante Idus. Nunc mergis;

hoc est propaginis curuatura post triennium, quam pressa fuerat, recidetur à vite.

Nunc ac deinceps vinea vetus, quæ in iugo est vel pergula, si robusto & integro trunco sit, ablata quæta fimo satietur, & angustius putata inter quartum, & tertium pedem à terra viridissima parte corticis, acuto ferramenti mucrone feriatur, ac fossa frequentius incutitur. Nam (sicut asserit Columella ex eo loco germen plerumque producit, & veniente Vere fundit materiam qua vitis reparatur antiqua. Nunc putatio Autumnalis celebratur in vitibus, maximè ubi inuitamur tepore provincia.

Remedium
Sutium sine
fruge luxu-
vianum

Locis calidis, & apricis vites quæ fructu carent, sionde luxuriant & pauperiem sortium compensant vberitate foliorum: nunc putare pressius conueniet: frigidis verò mense Februario. Si permanebit hoc vitium, circum fossas arena fluuiali, vel cinere debebimus aggerare. Quidam lapides inserunt inter flexuosa radicum.

Remedium
sterilis vitis

Iisdem temporibus, & locis vitem quæ sterilis, fuerit Græci ita præcipiunt esse curandam. Trunco eius fisso lapidem asserunt includendum, & ibi vitæ veteris humanæ quatuor cotulas circa truncum debere suffundi, vt ad radices in stillatiam ipsa descendat. Tunc adicienda est terra admixta latamini, & circa radices solum omne vertendū.

Vt sua ef-
fugue in Ger-
in sue re-
feruanda

Græcis asserentibus, vt Vuam ferues in vite vique ad Veris initia, circa ipsam vitem, quæ fructu plena est, loco vmbroso scrobem fodies trium pedum latitudine, altitudine duorum, & mittis fabulonem, & ibi calamos figis, in quibus retorques assidue sarmenta fructibus plena, & illis boryonibus alligabis, vt solum non contingant, & cooperies, vt imber eò penetrare non possit: Item Græcis docentibus Vuas in vite, aut poma in arbore si diu feruare volueris, vasculis clausa fistilibus ab ima parte pertusis diligenter à summo tecta suspende, quamuis poma & gypso cooperta in longam seruentur ætatem. Et hæc sunt Palladii verba formata.

Vindemia
& insti-
tuend.
Pra. ox
Mijella qua
nigra

Vua tandem maturâ vindemiam ita fieri oportet, vt videas à quo genere Vuarum, & à quo loco vineti incipias legere: nam & præcox, & mijella, quam vocant nigram, multo antè cogitur, vnde prior legenda, & quæ pars arbuti, ac vineæ magis aprica prius debet descendere de vite. In vindemiam diligentius Vua non solum legitur ad bibendum, sed eligitur ad edendum.

Reposito
uarum

Itaque lectius deferitur in forum vicarium, vnde in dolum inane veniat, electa in secretam corbulam, vnde in ollulas addatur, & in dolia plena vinaceorum contrudatur: alia, quæ in piscinam seu Amphoram picatam descendat: alia, quæ in aram, vt in carnarium ascendat. Quæ calcæ vix erunt, earum scopi cum folliculis subiciendi sub prælum, vt si quid reliqui habeant multum, exprimat in eundem lacum. Cùm desit sub prælo fluere quidam circumcidunt extrema, & rursus premunt, & rursus, cùm expressum, circumcisum appellant, ac seorsum, quod expressum est, seruant, quod respicit ferrum: expressi acinorum folliculi in dolia coniiciuntur, eoque aqua additur, ea vocatur lora, quod lora acina, ac pro vino operatiis datur Hyeme.

Circumci-
sum.

Aræ

Vuarum conseruandarum & recondendarum meminit Cato de re rustica, & Plinius cuius verba antè recitauimus.

Vires vitis
vinifera.
Capitis do-
lor.

Vitis vinifera folia cum clauiculis, (saxum, capreoli) tuta & imposita, capitis dolores mitigant, itemque stomachi inflammationem & ar-

dorem cum polenta. Idipsum etiam folia per se

imposita præstant: quippe quæ refrigerandi adstringendique vim habeant. Potus eorumdem succus iuuat dyfentericos, sanguinem excreantes, stomachicos, ac mulieres malaciâ laborantes. Eadem efficiunt macerati in aqua capreoli & posui. Lachryma vitium, quæ veluti gummi est, quæque circa illarum caudices conrescit, ex vino pota, calculos pellit: inuncta lichenas, psoras, leprasque nitro affricto præparatas sanat. Eadem cum oleo sapis pilis illitis pylorhi effectum habet, maximèque liquor quem accensa sarmenta vitium viridia exudarunt, quo & peruncta myrmecia tolluntur. Cinis autem sarmentorum & vinaceorum, detrahit circa sedem condylomatis & thymis illius ex aceto medetur. Prodest & luxatis ac viperarum morsibus: quin & contra lienis inflammationes proficit, cum rosaceo, Ruta, & aceto impositus.

Stomachi
ardor.

dyfenteria
malacia

Calculus
Lichen.

Psora
Lepros.

Myrmecia
Pylorhi

Thymis
Lienis

Suppuratio
morsus.

DE OMPHACIO.

Omphacium, succus acerbæ atque nondum maturæ Vuæ, Sole delatus ac refectus, potest ex euuluis vitis cruda ac immatura Vua confici, licet Diofcori ex Thasiz solum aut Amineæ vitis Vua fieri referat, qui modum etiam refecti acerbæ Vuæ, seu Thasiz, seu Amineæ nondum variantis. Oportet autem ante Canis ortum expressum succum in ahenò ex ere rubro, quod linteò sit coopertum insolare, vique dum in densitate coeat, intereaque semper totum id quod visus ipsi valè concretum adhærent liquido reliquo permiscere, atque noctu ipsum à locis subdialibus sub tectum referre: quandoquidem obitant nocturniores, quominus spissescat cogaturve. Eligendum est flauum, friabile, perquam astringens & linguam mordens. Sunt qui coctione succum condensent. Prodest contra tonsillas, Vuam oris, vlcera, gingiuas humore flaccidas, purulentaque aures, cum melle aut passio: item ad fistulas, vetera vlcera, nomasque ex aceto. Dyfentericis & mulieribus fluxione vuluæ laborantibus dyfenteris infunditur Oculorum quoque claritati confert, eorumdemque scabritie angustique artosis conuenit. Bibitur & ad recentem sanguinis excretionem etiam ex ruptis valis obortam. Sed eo admodum diluto & paucotendunt: siquidem potenter exurit.

Omphacium
veteribus.

Diofcori
necatur.

Delectus:

Vires &

Fluxum:

Vires &

Fluxum:

Vires &

Galenus:

Omphacium [vt Galenus prodidit simpl. 4.] calidis morbis omnibus magno iuuamento adhiberi potest, quippe cùm id omninò acidum sit, perfectè etiam refrigerat, vnicèque ardoribus prodest, siue ori ventris impositum, siue totius hypochondriis, siue cuiuslibet alii, quod refrigerare velimus, Omphacium quod in æreo vase inaruit, adstringendi ac insigniter refectandi potentia pollet: princeps est & absterisionis ab æreo vase contractæ.

Recentiores hodie Omphacium appellant, haud anidum Vuæ immaturæ succum, sed liquidum & consistentia vino similem, ex collectis ante maturitatem Vujs, præloque subditis expressum, qui deinde in vasa reconditis insolat, vel tepenti loco reponitur, vique dum effervescent & sordes quasdam à se abiecerit, & faculenta releserint, & tunc quidem sale addito (vii acerbum permaheat) in usum seruat. Nomina Galli & Belgæ du verius passim, Latini agreffam: linguarum Ital.

Omphacium
liquidum

receptum

Nomina

linguarum

Ital.

Ital. *agresto*: Hispani *agraz* appellant. Et hoc Omphacium liquidum, siue agresta, refrigerationem, resiccationem, & egregiè adstringentem facultatem habet, ori ventriculi gratum, nauseam, ac cibi fastidium tollit, appetentiam excitat, alui fluores reprimat: ardores viscerum mitigat, non modò sumptum, sed & foris admotum, sed tamen & icinori lienibusque obstructis parum utile: sunt qui maiorem Omphacio adstrictionem comparent, è siluestrium vitium visis [imò etiam silu. pyris & pomis] illud exprimentes, non ad medicamenta tantum, sed etiam ad ciborum condimenta.

Vinum omphacites. Omphacio liquido non ab simile est Vinum Omphacites, imò reuera specie haudquaquam differens. Hoc Dioscorides refert peculiariter fieri in Lesb. Vuà nondum planè maturà, sed adhuc acerba, ad tres quatuordec dies in cratibus siccatà Sole, donec racemi in rugas contrahantur: ex his postquam expressum sit vinum, cadis insolari [Sole inueterari Plinius.] vim habere adstringendo stomacho amicam, & malacia laborantibus, ileosis, agrè conuocantibus & stomachi dissolutione vexatis, vtilem. Credi & absorptum pestilentibus affectibus auxiliari. Cæterum huiusmodi vina non nisi post annos complures potui apta sunt.

Quilibet Vuà recens alium turbat, & stomachum inflat: quæ verò decerpita aliquandiu pendit, propterea quòd ea ventilatione magna humiditatis portio decessit, innocenter est, ac tum stomacho utilis est, tum & appetentiam ciborum restituit, atque ad eòs ægis languentibus idonea est. In vinaceis & ollis seruatur, ori stomachoque grata sunt: alium sistant [sed vesicam & caput tentant] & sanguinem excreantibus conueniunt. Similes porrò sunt & quæ in mustum coniectæ sũt. Et quæ in sapa aut passio conditæ sunt, stomachum magis infestant. Seruantur & in aqua cælesti quæ prius Solem passæ fuerint: sed ex parum vinosa: sunt siticulosis tamen, ardentibus ac diuturnis febribus viles. Reconditi vihai, inflammatis, præduris lacteque turgentibus mammis cum sale imponuntur. Eorundem decoctum in summe dysentericos iuuat, & cæliacos, itemque sceminas flexione vulvæ laborantes, sed & ad deflectiones ac totus vsurpatur. Cæterum acinorum nuclei adstringent vim obtinent, stomachoque sunt viles: iidem tostii tritique ac polentæ vice inspersi, dysentericis prosunt, itemque cæliacis ac stomachi dissolutione vexatis.

Vuà [vt Galen. lib. 2. de alim. fac. memoria prodidit] quemadmodum inter fructus autumnales principatim obtinent: ita fugacibus omnibus magis nutriunt: minimūque prauis succi habent, præsertim cùm exactam maturitatem fuerint adeptæ: porrò quòd ipsæ nutriant, maximo argumento sunt ii qui vinearum fructum custodiunt, quippe qui tunc temporis Vuarum esu admodum pinguescant. Cæterum non omnes vno quidem modo nutriunt, quoniam quæ dulces existunt, cæteris succum habent calidiorē, ob id sunt siticulosæ, ac ventriculum inflant, & alium subducunt. Contrarium efficiunt austeræ: siquidem & ventrem cohibent, parum nutriunt, agrèque concoquuntur. Acerbæ autem vitari prorsus debent vtpote quæ ventriculo aduersatur. Vuæ ed laudabiliores, quò carnosiores fuerint, præsertim cùm probè maturæ à vite decerpuntur. At pensiles, si prius maturæ sũt, & dulces, cæteris minùs ventriculum inflant.

Tom. II.

& alium conuenienter emolliunt.

Capillos denigrare grana Vuæ assata in testa infusa in oleo, & sepulta in fimo permentem, si eo oleo, vnguntur, testis Bayrus.

Vuarum grana reposta in sacculos qui hieme calefiant in foraminibus fornacum ac pedalibus noctu apponantur magni facio ad eos non solum calefaciendos, sed etiam ad robotandos, vt minis fluxiones arthriticas recepiant.

Grana ad capillos vitæ.

Ad pedum vntu.

VVA PASSA.

Vva passa alba, inquit Diosc. adstringentior est. Prodest esitata earum cato artem, tussis, renibus, ac vesicæ. Estur & cum nucleis per se contra dysenteriam, itemque admista milij ac hordei farina & ouo, in sartagine cum melle fricta sumitur. Sed & eadem ad eliciendam è capite pituitam tum per se, tum etiam cum pipere comanducata proficit. Testium quoque inflammationes sedat imposita cum lomento fabarum & cumini farina. Epinyctidas verò, carbunculos, fauos, putrescentiaque articulorum vlcera, atque gangrænas sine nucleis trita & cum ruta illita sanat. Conuenit & podagræ cum panacis succo adhibita: denique & mobiles vngues illita celerius extrahit.

Vires et Digest.

De Vva passa. Gal. 2. de Alim. hæc prodidit: Vuæ passæ cum aliis visis eandem habent rationem, quam carica cum ficibus. Multæ enim sunt dulces, acerbæ autem omninò pauca: plurimæ verò ex dulci & austera qualitate sunt mixtæ: quanquam dulces nonnihil quoque austere qualitatis habent: & austere dulcedinis. Cæterum vt dulces temperamento sint calidiores, ita austere frigidiores. Ad hoc austere stomachum robotant, & ventrem constipant, & his multò magis acerbæ: mediam autem quodammodò inter ipsas constitutionem dulces obtinent vt quæ nec alium subducant. Dulcibus tamen, vt vis quædam semper inest temperandi, ita & medio-criter detergendi: quibus duabus facultatibus exiguas mordicationes, quæ os ventriculi infestant, obtundunt. Et libro 8. cap. 7. de compos. pharm. sec. locos, idem Galenus sic inquit. Vva passa contempubilis videri possit, ob familiaritatem eius vsum. At verò hoc ipsa eam facit vtiliorem: nam cùm familiaris sit nobis, in tantum adstringens est, quantum opus habet viscus affectum. Habet autem & vim concoctoriam crudorum humorum, & vim coercendi maligna, sitque ipsa haud facile putredini obnoxia: & vltra hæc secundum totam substantiam, vlcera ipsi, hoc est icinori, familiari, & propria est. Item libro de attenuante victus ratione, sic habet. Vuæ passæ si non sint adstringentes, lie ni quidem, & hepatis tumentibus non conducunt, thoracis tamen, & pulmonis affectibus conducunt. De visis autem passis, vt cibis sunt, locutus est ipse Galenus lib. 2. de alim. fac. his verbis. Alimento ex passis visis tali qualitate in corpus distribuitur, qualis ipsarum natura fuerit, dulce ex dulcibus, austere ex austere, mistum ex iis, quæ vtriusque qualitatis sunt participes. Quantitate verò copiosius ex pinguibus, ac dulcibus, parcius ex austere, & macris. Quod si passarum pinguium, ac dulcium, à quibus semina fuerint exempta, parem molem, cum pari Vuarum mole contuleris, passas valentiùs nutrire deprehendes. Huiusmodi sanè, vt mirius quàm carica subducit.

Vires et Galen.

Austera.

Acerbæ.

Dulces.

H

cant, abstergeantque, magis tamen quàm illæ stomachum iuuant.

Sententia
multorum
reprobatur

Ceterum *Vuas passas*, quarum vbiq̃ue vulgaris & frequens est vsus, omnibus notissimas esse arbitror, inquit Matthiolus. Verum tamen non est, meo quidem iudicio, credendum, quod cum de *Vuis passis* mentionem faciunt Galenus, & Veteres alii, paruulas illas tantum intelligant, quæ hoc tempore ex quibusdam Aegæi insulis, ac Peloponneso, Venetas conuehantur, & in quibusdam etiam Italiæ locis insolantur. Siquidem Galenus nulla magnitudinis, vel paruitatis habita ratione, omnes in vniuersum *Vuas Solis* calore siccatas, *passas* appellat. Id quod ipse Galenus libro secundo de alim. fac. suis verbis declarat. Porro quemadmodum *passarum* differentia, quæ à colore sumitur, nihil ad *passarum* facultatem confert, ita nec magnitudo: sola autem qualitas, quæ gustui inest, differentia, potest omnia. Ex his nimirum Galeni verbis satis colligi potest, ipsum omnis generis *Vuas*, quæ Solis feruore flaccescunt, nullo prorsus discrimine *passas* appellasse, nempe Damascenas ceteris grandiores [Zibibum officinæ vocant] ac pariter his congeneres, quæ à Smyrnis (vt aiunt) Cypro, & Creta comportantur. Præterea loco citato idem Galenus ita scribit: Nonnulli autem, & rectè sanè, è dulcibus, grandibusque, quales sunt Scybelitides, priusquam mandant, semina eximunt: quæ & ipsæ inueterata, cutim duram, crassamque habent, easque prius in aqua coguntur macerare: nam & semen ipsum faciliùs sic eximitur. Aliæ quædam sunt his contrariæ, solidæ, & crassæ, quæ nullum prorsus semen habent. Crescunt hæ in Cilicia, colore subflauo. In Pamphylia autem Scybeliticæ, & colore nigre: quæ, vt dixi, sunt maximæ, hæc ille. Ceterum sciendum est, non omnes *Vuas passas* eiusdem esse facultatis: alia namque facultas inest dulcibus, alia austeris, alia vinaceos habentibus, alia non habentibus. Quæ itaque vinaceis carent, vel quod ita naturâ producantur, vel quod ii arte fuerint exempti, si dulces sint, adstringente facultate vsque ad eod priuantur, vt etiam mitificè leniant: quamobrem pectoris angustia, tussis, exasperatis faucibus, & renum, vesicæque vitis maximè conueniunt. Id quod planè confirmat Galenus lib. 7. & 8. de comp. medic. sec. loc. vbi *Vuas passas* sine vinaceis leniendo pectori, ac icinorosis plurimum commendat. Contra verò, facultate omnino adstringente censentur, quæ cum suis vinaceis manduntur. Quod cum non ignoraret Dioscorides, *Vuam passam* cum nucleis in dynteria edendam esse tradidit. Hinc itaque fit, vt maximo in errore versari existimem Medicos aliqui ætatis nostræ celebres, qui alui deiciendæ gratia, *Vuam passam* paruam vulgarem, quæ ex locis suprâ dictis in Italiam defertur, simul cum vinaceis deuorandam exhibent, quippe cum alium fluidam facere in animo sit, eam potius cohibent, quàm leniant: idque potissimum, vbi *Vuæ passæ* temporis tractu succi partem amiserint. Quâ re perspectâ in hanc sententiam deducor, vt ad alium emolliendam aptiores censcam Damascenas, Cyprias, ac Creticas [quibus tamen prius nuclei exempti sint, vel eas sumantur, quæ sine nucleis nascuntur] quàm quæ minus passim in Officinis inueniuntur, quandoquidem hæ succi longè minus, quàm corticis, & vinaceorum continent, nisi sint omnino recentes, & diligenter asseruata. Quapropter si hoc tenui *Vuarum* *passarum* genere vti quandoque cogimur ad emolliendam alium, eas eligi

Medicorum
error.

præstet, quæ sine vinaceis proneniant: vel si hæ defint: suppleant illæ, quæ à nucleis fuerint expurgatæ, tamen si Damascenis, & Creticis longè bonitate cedant: de quibus sanè intellexisse Galenum, easque ad pectoris vitia laudasse, planè suspicamur. In quorum genere hæc etiam tempestate sunt, quæ semine carent, quemadmodum quæ Galeni ætate ex Cilicia conuehebantur. Illud porro animaduertendum est, quod vbi quis alium bonam facere contendit, non debet *passis* vt, quæ gustui acerbicatem, vel austeritatem relinquant: sunt enim tales frigida, ac terrestres, quibus vtique facultatibus cohibent, adstringunt, & roborant, præsertim si cum vinaceis nucleis comedantur.

Vuarum *passarum* faciendarum rationem hanc tradit Columella. *Vuas*, inquit, dulcissimi saporis albas maximis acinis, nec passis, Luna de crescente: sereno, & sicco cælo post horam quintam legi oportet, & in tabulas paulisper porrigi, ne inter se pondere suo pressæ collidantur: deinde de ahenò, vel in olla noua fictili ampla, præparatam lixiuiam cineris samenti calefieri conuenit, quæ cum feruebit exiguum olei quàm optimi adijci, & ita permisceri: deinde *Vuas* pro magnitudine binas vel ternas inter se colligatas in ahenum feruens demitti, & exiguum pati, dum decolorentur, nec rursus committere, vt excoquantur, nam quadam moderatione temperamentoque opus est. Cum deinde exemeris, in crate disposito rariùs quàm vt altera alteram contingat. Post tres deinde horas vnâquamque *Vuam* conuertito, nec in eodem vestigio reponito, ac in humore, qui defluxerit, corrumpantur: noctibus autem contegi debent quemadmodum fici, vt à rore, vel pluuia tutæ sint: cum deinde modicè auerint, in vasa noua sine pice operculata & gypsata, sicco loco reponito. Quidam *Vuam passam* foliis ficulneis inuoluunt, & assicant: alii foliis vitignæis, nonnulli plataniinis semipetas *Vuas* contegunt, & ita in amphoras recondunt. Sunt qui culmos fabæ exurant, & ex eo, quod cremauerint, cinere, lixiuiam faciunt: deinde in lixiuiæ sextarios decem salis tres cyathos, & olei cyathum adiciunt: tum adhibito igne calefaciant, & cætera eodem modo administrant. Quod si videbitur in ahenò parum inesse olei, subinde quantum satis erit adiciatur, quod sit pinguior & nitidior *Vuæ passæ*.

Vuam autem *passam* præceptore Palladio, sic facies. Meliores acini, & dulcis, & lucidi batryonæ in ipsa ymbra suspendis, & *Vuam* constrictam cum ponis in vâculis subternis pampinos sicco algore frigentes, & manu comprimis, & vbi vas impleueris, item pampinos addis nihilominus non calentes, & operculabis, ac statues in loco frigido, quem nullus sumus infestet.

Monspessulani *Vuam* dum parant, racemos binos hinc illinc filo ligatos vitiosis acinis forfice detractis, feruenti lixiuiæ addito olei paululò immergunt, quoad flaccescant tantum & corrugentur: deinde peticis imponunt, vt siccescant, ac post triduum quatruiduumque insolant, vt & Columella docet.

Passas Græci vocant *παμβίας*, quasi conculcatas, non quidem quod conculcentur, sed quod ob refecationem calcatis similes videantur.

Ratio Gra-
rum pas-
sarum facien-
darum Co-
lumbella.

M V S T V M.

Genera mu-
sti. Plin.

Genera musti hæc recenset Plinius l. 14. c. 19. Cifibiles musti genus in Galatia nascens, & Halynium in Sicilia. Medium inter dulcia vinumque est quod Græci Agleuces vocant, hoc est, semper multum. Id euenit cura, quoniam feruere prohibetur. Et l. 23. c. 1. Musta differentias habent naturales has, quod sunt candida, aut nigra, aut inter vtrumque: aliæque ex quibus passum: cura differentias innumerabiles facit. In plenum ergo hæc dixisse conueniat.

Nomina:
Linguarum.

Mustum, liquor videlicet recens ab uvis calcatis, aut torculari subditis effluens. Græci γλυκός, Tarrhæo, γλυκός πύρον Epigram. Al. Mosti, weinmost. Belg. Most. Gall. Moust. It. Musto. Hisp. Mosto.

Mustum li-
quium.

Mustum lixium Colum. protropium Phn. quod in lacum fluxit priusquam prælo pressum sit. vi. c. πύρον Polluci, γλυκός πύρον αμφοδύκτου. Al. Vorßdugwein, trumßwein. Belg. Leccweyn / most ban sels gheleest. Gall. La mere goutte. It. Vino mosto de gioccia. Hisp. Mosto de vino del cintrin.

Mustum
torcium.

Mustum tortium Colum. quod post primam pressuram vinaceorum exprimitur, Al. wein bem nachdruck. B. Most laest wiggepress. Gall. Vin ou moult de pressurage. Ital. Mosto del trimo torchio. Hisp. Vino de mosto torcido, e quod sale del husillo.

Mustum vi-
toro dures
anno.

Mustum si uoles totum annum habere, M. Catione tradente, in amphoram mustum indito, & corticem oppicato, demittito in piscinam, post trigessimam diem eximito, totum annum multum erit.

Vi dulce
permanet.

Mustum ut semper dulce, tanquam recens permaneat sic facito, inquit Columella, antequam prælo vinacea subiiciantur, de lacu quam recentissimum addito mustum in amphoram nouam, eamque oblinito, & impicato diligenter, ne quicquam aquæ introire possit: tunc in piscinam frigida & dulcis aquæ totam amphoram mergito, ita ne qua pars extet: deinde post dies 40. eximito, sicque in annum dulce permanebit.

Musti vires
et sicc.

Mustum recens statu ventriculum & intestina implet: difficile concoquitur: crassi est fucci: & nisi celeriter descendat, nocentius etiam efficitur. Hoc autem vnum illi tantummodò bonum, ut Galenus ait, adest, quod ventrem deiciat. Citissime autem secedit dulcissimum, ac ex maturis uvis expressum. Quod verò ab acidis & austere redditum, ad omnia pessimum est: magis inflat, difficilius concoquitur, crudiores ingenerat humores. Et tamen alio perturbat etiam descendat, colicos tamen sapenumerò simul ingenerat humores, & calculi molestias adfert. Quod si verò alius etiam non commoueat, grauiora ac molestiora omnia sunt: frequenter verò & hienteriam & dysenteriam efficit: tale succo Vuarum respondet, & citò quoque descendit. Posterus vinaceorum, folliculorum, ac scaporum naturæ particeps, deterius est. Mustum omne, auctore Plinio, stomacho inutile, venis iucundum. A balneis raptum & sine interspiratione potum, necat. Cantharidum naturæ aduersatur. Item serpentibus, maximè hæmorrhoidi & salamandris. Capitis dolores facit, & gutturi inutile. Prodest renibus, iocinori, & interaneis vesicæ: colleuat enim ea. Priuatum contra buprestin valet: Contra meconium, lactis coagulationem, cicutam,

Tom. II.

tozica, dorycnium, ex oleo potum, redditumquæ vomitionibus. Ad omnia infirmius album, iucundius passum mustum, & quoddam minorem capitis dolorem afferat: Si quod animal, ait Columella, in mustum ceciderit, & interierit, uti serpens, aut mus, foræque, ne mali odoris vinum faciat, ita ut repertum corpus fuerit, id igne aduratur, cinisque eius in vas, in quod deciderat, frigidus infundatur, atque rutabulo ligneo permisceatur, ea res erit remedio.

SAPA SIVE HEPSEMA.

EX musto ingenii non naturæ operâ conficitur quod Græci ἡψμα καὶ σάπην vocant, Latini Sapam & defrutum: cum videlicet mustum dulcissimi saporis ad tertias decoquitur, ut Columella ait. Plinius Sapam & Defrutum decoctionis modo differte asserit: & sapam quidem fieri musto ad tertiam partem reducto: defrutum ad dimidiam. Siracum, inquit lib. 14. cap. 9. quod alii ἡψμα, nostri Sapam appellant, ingenii non naturæ opus, musto ad tertiam partem mensuræ decocto: quod ubi factum ad dimidiam, defrutum vocamus. Palladius his Caroenum adicit quod ait fieri cum tertia perdita, duæ partes remanent. Leontius in Geoponicis hepsēma ex musti partibus octo, & vini centum, ad tertias decoctis conficiendum refert. Galenus tamen ἡψμα esse mustum plurimum decoctum testatur: Recentiores hepsēma siue sapam, vinum coctum appellant. Mustum quam dulcissimi saporis decoquatur ad tertias, & decoctum, sicut supra dixi, Defrutum vocatur: quod cum defrixit, transferatur in vasa, & reponitur: ut post annum sit in vsu, inquit Columella, qui in huius coquendi ratione multus ac prolixus est.

Vim habet Sapa calfaciendi, non tamen æquè ut vinum, hoc autem crassior est, minus facile distribuitur, tardiusque per vrinās descendit, per ventrem verò subinde citius, nam hunc modicè seducit. Nutrit autem valenter, & corpus citò implet, in ventriculo tamen propter crassitatem aliquantisper hæret, ac iocinori aut lieni minus idonea: concoquit etiam sapa crudos humores, pectori ac pulmōni inhærentes, eorumque citam expurgationem procurat. Tussi idcirco ac respirandi difficultati auxiliatur. Galen. lib. 3. de med. sec. loca, Sapa autem etiam dolores leniri tradit. Refert autem non parum, ex cuiusmodi musto sapa confecta fuerit. Nam ex optimi ac generosi vini musto procul dubio præstator est, atque ad omnia superscripta efficacior: ex tenuis verò ac oligophori vini musto, imbecillior & minus efficax. Carenum Sapam Marcell. appellat, vulgò Vin cuit, at defrutum Resinæ. Plinius Sapam in adulterium mellis excogitatam ait.

DE DEUTERIIS ET SECVNDARIIS,
vini generibus tribus.

Non possunt, inquit Plinius lib. 14. cap. 10. Deuteriis iure dici vina, quæ Græci Deuteria appellat, Cato & nos loram, maceratis aqua vinaceis: sed tamen inter Vina operaria numerantur. Triarum genera. [Leg. Decimæ parti musti quod expressum sit, pari aquæ addita, & ita nocte &c. Dal. ex Colum. & Diosc.] Decima pars aquæ addita, quæ musti expressa sit, & ita nocte ac die madefactis vinaceis, rursusque prælo subiectis.

H 2

Tertium

Alterum; quomodo Græci facitauere, tertia parte eius quod expressum sit, addita aqua, expressioque decocto ad tertias partes. Tertium est, facibus vini expressum, quod fecatum Cato appellat. Nulli ex his plus, quam anno, vsus.

Prioris Loræ compositionem Columella etiam docet, ex tanta nempe aquæ qualitate, quanta est musti expressa decima, vinaceis superfusa, sed adici ait præterea spumam defructi siue sapæ: & facem ex lacu: quorum Plinius non meminit. Quantum, inquit, vini vno die feceris, eius partem decimam, quot metretas efficiat, considerato, & eodem metretas aquæ dulcis, in vinacea, sed quibus vnus diei vinum expressum sit, addito. Eodem & spumas defructi, siue sapæ, & facem ex lacu confundito, & permisceto, eamque tritum macerati vnâ nocte finito, postero die pedibus proculcato, & sic permistam prælo subiecito: quod deinde fluxerit aut dolis aut amphoris condito, & cum defruberit, obturato. Commodius autem seruatur in amphoris. Hanc ipsam loram M. Columella ex aqua vetere faciebat, & nonnunquam plus biennio innoxiam seruabat.

Loram Græci facit Dioscorides

Deuteria, salubre

Tempus. Vires. Vini subtilitatem

Compositio, Lora differentis duplex Gal.

Prior, stemphyliis Gal. de dista. Altera, deuteria Atticorum. Vinum adynamum

Tertia lora compositio

Dioscorides similem aquæ ad mustum, modum ac proportionem retinet, sed à vinaceis loram expressam ad tertias recoquit, additque ad singulas metretas, salis sextarios duos, & huiusmodi Loram non modò *στυφύλιον*, sed & *πύμαρον* nuncupari refert his verbis. Lora, quam Græci Deuteria, alii potimom appellant, paratur hunc in modum. In vinacea, è quibus vini triginta metretæ expressæ fuerint, tres aquæ metretas adadito: ac vbi vinacea ipsa versaueris calcauerisque, exprimito: expressum decoque ad tertias partes, & in singulos residui congios salis binos sextarios addito, ac post hyemem in cados defundito. Eo post annum vutor: celeriter enim exolefcit. Conuenit portò agris, quibus vinum propinare dubitamus, & cogimur tamen ipsorum desideris obtemperare: itémq; à longa valetudine sese recolligentibus.

Galenus verò 2. de alim. facul. multò differentes huiusmodi Loræ compositiones, & quidem duas habet: Vinaceis, inquit, in parua dolia coniectis, tantum aquæ superfunditur, quoad omnia permeadeant, quod vbi satis visum factum fuerit, in doli fundo foramen aperitur, vt dilutum effluat, idque pro vino bibunt. Deinde rursus, ait, aliam aquam, parciorem tamen prioris, vinaceis affundunt: sic vt hoc quoque portioni sit attemperatum: Priorem *στυφύλιον* appellari refert, ab ipsis nempe vinaceis, quæ Græcis *στυφύλα*: Alteram verò Atticæ proprietatis curiosos propriè *δευτερίαν* dici velle.

Secundam Plinii Loram Dioscorides quoque videtur descripsisse, sed tamen non tertiam ad mustum aquæ, vt Plinius, partem accipit, sed musti & aquæ æquales: Fit & vinum, ait is, quod vocant adynamon, viribus iisdem quibus Lora præditum. Pares aquæ & musti mensuræ leniter ac lento igne feruefiunt, dum excoquatur aqua, reliquum vbi refluxerit, in vas picatum transfunditur. Alii aqua marinæ & pluuiæ, mellis atque musti pares miscent porciones, elutriant, & in Sole quadraginta diebus torrent. Huiusmodi potu ad eadem illa omnia post annum vtuntur.

Tertiz verò Loræ compositionem, Dionysius Vitensis in Geoponicis Constantino Imperatori dicatis haud ab similem habet: *στυφύλα*, inquit, hoc est, *στυφύλιον*, post musti de fluxum mox efficienda sunt, & in dolia reponenda ac conculcanda. Etenim *στυφύλα*, id est, sex ex his, quam patri

lingua *στυφύλα* vocant, haud iniucundus sit ruralibus potus. Conficitur autem hac lora, ex vinaceis prælo antè non subiectis, sed à quibus mustum tantummodò, citra pressuram defluxit ac percolatum est: Quid enim ab ipsis exprimi vltius poterit citra liquoris affusionem, vbi semel prælo subdita fuerint.

Vini genera.

Nunc genera vini prosequamur, quorum alia aliis gratiora esse quis dubitet, inquit Plinius lib. 14. c. 6. aut non ex eodem lacu aliud præstantius altero germanitatem præcedere, siue testis [natura] siue sortuito euentus [ars,] Quamobrem de principatu le quisque iudicem statuat. Iulia Augusta, octoginta duos annos vitæ Pucino [Pizzino de Istria] vino retulit acceptos, non alio vlt. Gignitur in sinu Adriatici maris, non procul à Tumano fonte, faxeo colle, mariùmo afflatu paucas coquente amphoras. Nec aliud aptius medicamentis iudicatur. Hoc esse crediderim, quod Græci celebrantes niris laudibus pyctanon appellauerunt, ex Adriatico sinu. Diuus Augustus Setinum [Setia oppidum in colle, à Tartacina paludibus quinque millia distitum: hodie Sezza] prætulit cunctis, & ferè secuti principes, confessa propter experimenta, non temerè crudelitibus noxiis [in ea salebra Dal.] ab ea salua. Nascitur supra forum Apii. Antea Cæcubo erat generositas celeberrima in palustribus populeis, sinu Amyclæano: quod iam intercidit & incuria coloni locique angustia, magis tamen iussa Neronis, quam à Baiano lacu Ostiam vsque nauigabilem inchoauerat. Secunda nobilitas, Falerno agro erat, & ex eo maximè Faustiano. Cura culturaque id collegerat. Exolefcit quoque hoc, copiz potius, quam bonitati, studentium. Falernus ager à ponte Campanæ lazua petentibus vrbem coloniam Syllanam nuper Capuz contributam incipit. Faustianus autem circiter quatuor miliaria à vico propè Cædiaz, qui vicus à Sinuesi & millibus abest. Nec vlli in vino maior autoritas: solo vinorum flamma accenditur. Tria eius genera austerum, dulce: tenue. Quidam ita distinguunt, fummis collibus Gauranum [Cancinum ch.] gigni, medius Faustianum, imis Falernum. Non omittendum autem nulli eorum, quæ celebrantur, iucundum saporem Vux esse. Ad tertiam palmam variè venère Albana vrbis vicina, prædulcia [παυσιγενή] subdulce esse, non prædulce. Athenæus lib. 1. ex Haleno asserit,] ac rara in Austero. Item Surrentina in vineis tantum nascens: conualefcensibus maximè probata, propter tenuitatem salubritatemque. Tiberius Cæsar dicebat consensisse medicos, vt nobilitatem Surrentino darent, alioquin esse generosum acetum. C. Cæsar, qui successit illi, nobilem vappam. Cereant Massica,

[nec veteres pocula Massici.

Horat.] aquæ, ex monte Gaurano [Gaulo c. n. in emend. Gaur] puteolos Baiasque protestantia. Nam Falerno confirmata Statana ad principatus venère non dubiè: palamque fecere sua quibusque teris tempora esse sicut rerum prouentus, occasusque. Iuncta his præponi solebant Calena, & quæ in vineis arbutisq; nascuntur, Fundana, Ex (vt) alia vicina vrbis Veliterna, Priuernatiæque. Nam quod Signiæ nascitur, austeritate ni-

Vini genera Plinio.

Vinum naturale & artificiale.

Pucinum;

Locus

Aprium medicamentis.

Pyctanon

Gauranum;

Setinum Augusti

Cæcubum.

Faustianum tria genera; Gauranum; Faustianum; Falernum.

Albana.

Surrentina

Massica;

Statana;

Calena, Fundana, Veliterna, Priuernatiæ.

mia continenda vitale aluo; inter medicamina
 numeratur. Quartum [auctoritatis & nobilitatis
 gradum. Sumpta metaphorā ab aurigis, qui curra
 in Circo certabant:] curriculum publicis epulis
 obtinere a Diuo Iulio [is enim primus auctori-
 tatem his tribuit, vt in epistolis (epulis) eius ap-
 pareret] Mamertina, circa Messanam in Sicilia ge-
 nita. Ex iis Potulana, ab autore dicta, in loco pro-
 ximo Italiz laudantur præcipue. Est in eadem
 Sicilia & Taurominitanis honos, lagenis pro
 Mamertino plerumque subditis. Ex reliquis au-
 tem à supero mari Prætutia, atque Ancone nas-
 centia, & quæ à palma vna fortè enata, Palmesia,
 appellantur. In mediterraneo verò Cefenatia ac
 Meconatiana [A Meconate, Augusti familiari
 & fido amico, regio sanguine orto, quod Hora-
 tius palam facit.] In Venonensi item Rhætica,
 Falernis tantum posthabita à Virgilio
 2. Georg. — & quo tē carmine dicam
 Rhætica? (Admirantis hoc esse Plinius existimat:
 Seneca verò, incerti laudaturusne, an vituperatu-
 rus sit. Turn. cap. 26. lib. 29. Magis placet Plinii
 expositio: Nam & ipse ca hauriens egregie mi-
 rabar terrenæ & conuallium sanguinis bonita-
 tem.) Mox ab intimo sinu maris, Adriana. Ab in-
 fero autem Latiniensia, Grausicana, Statoniensia.
 Hetruriz palam Luna habet, Liguriz Gê-
 nua: Inter pyrenæum Alpique Massilia gemit
 sapore, quando & condis aliis pinguis,
 [Nigrius & crassius] gignit, quod vocant succo-
 lum. Beterarum (Blutarum Dal.) intra Gallias
 consistit auctoritas. De reliquis in Narbonensi
 genitis asseuerare non est: quoniam officinam
 eius rei fecere tingentes fumo [vinum id Plato
 Comicus apud Athenæum *γερνισαν* vocat: Mar-
 tialis fumos Massilitanos] vti namque non &
 herbis ac medicaminibus noxiis. Quippe etiam
 aloën mercantur, quâ saporem colorēque
 adulterant. Verum & longinquiora Italiz ab Au-
 sonio mari, non carent gloria, Tarentina, & Ser-
 utitiana, & Consentia genita, & Temples ac Ba-
 biz (Balbiz, Hermiol. in Diosc. Balbina vina ead-
 em esse putat, quæ Athenæus Barbarina vocat.)
 Lucanaque antecedentibus Thurinis. Omnium
 verò eorum maximè illustrata Messiaz potu &
 salute Lagarina, non procul Grumento nascen-
 tia. Campania nuper excitauit nouis nominibus
 auctoritatem, siue cura, siue casu, ad quantum à
 Neapoli lapidem Trebelliis, iuxta Capuam
 Caulinis, & in suo agro Trebularis [Italo-
 rum vulgò Trebiano] alioqui semper inter plebeia &
 Trifolinis gloriata. Nam Pompeianis summum
 10. annorum incrementum est, nihil senectâ con-
 ferente. Dolere etiam capitum in sextam horam
 diei sequentis infesta deprehenduntur. Quibus
 exemplis, nisi fallor, manifestum est, patriam ter-
 ramque referre, non Vuam: & superuacuum
 generum consedationem in numerum, cum
 eadem vitis aliud aliis in locis polleat. His-
 paniarum Laletana (Lusitana M. Lasitana CH.)
 copia nobilitantur, elegantia verò, Tarraconen-
 sia, atque Lauronensia, & Balearica ex insulis,
 conferuntur Italiz primis. Nec ignoro, multa
 prætermissa plerisque existimatos, quando
 suum cuique placet, & quocūq; eatur, fabula
 eadem reperitur: Diui Augusti iudiciorum ac
 palati peritissimum è libertis, censuram vini in
 epulas eius facientem, dixisse hospiti de indigena
 vino, nouum quidem sibi gustum esse eum, at-
 que non ex nobilibus, sed Cæsarem non aliud
 poturum. Nec negauerim & alia digna esse fama:
 Tom. II.

sed de quibus consensus xui indicauerint, hæc sunt.

Et eiusdem l. c. 7. Nunc simili modo transma-
 rina diceimus: in summa gloria post Homerica illa,
 quæ diximus, fuisse Thasium Chiumque. Ex Chio
 quod Arusium vocant (ab agro aspero & impor-
 tuoso insula Chii: Strabo 14. Verg. *Vina, nouum
 fundā calat his Arusis nectar*: quamuis aliqui legat
 Arethusia.) His addidit Lesbium Erastri maximi
 Medici auctoritas, circiter de. annum vrbis Ro-
 mæ. Nunc gratia ante omnia est Clazomenio,
 postquam parcius mari conditum. Lesbium spon-
 te naturæ lux mare sapit. Nec Tmoliti per se gra-
 tia, vt vino: sed cuius dulcia admisso, reliquo-
 rum duritia suauitatem accipiat, simul & atatem
 quoniam vetustiora protinus videntur. Ab his
 dignatio Sicyonio, Cyprio, Telsemico, Tripoli-
 tico, Berytio, Tyrio, Sebennytico. In Egipto
 hoc nascitur tibus generibus vuarum ibi nobile,
 Thasia, athalo, peuce [Athalo, quasi fuliginola:
 Peuce quasi preta.] Posthæc auctoritas hippoda-
 mantio, mylico, canthantæ. (A cantharo-
 rum dolis. De cantharea vite Theophr. c. 20. lib.
 2. de Causis) protopro Gnidio, Catacecaumeni-
 ta (quasi retortido, *κατακεκαυμένη* regio 500. stad.
 longitudo 400. latitudo Mycia vicina exu-
 sita similis, vino generoso celebris, de qua Strabo
 lib. 13. & 14.) petra, Myconio, Nam melogiten
 capitis dolores facere compertum est: nec Ephe-
 sium salubre esse, quoniam mari & defruto con-
 diatur. Apameneum nullo præcipue conuenire
 dicitur, sicut prætutium in Italia. Est enim & hæc
 proprietates generum, vt dulcia vitæ inter se
 non congruant. Exoleuit & Protagion, quod Ita-
 licis præcimum seceant Alcibiadis scholæ. Ap-
 polledorus Medicus in volumine, quo fuisse
 Ptolomæo regi quæ vina biberet, Italicis etiam
 tum ignotis, laudauit in Ponto Naipercenten,
 mox Oroeticum, Oeneaten, Leucadium, Ambra-
 cioten & quod cunctis, prætulit Præparethium:
 [Præparethium Turn. & nobis] sed minoris fa-
 mæ esse dixit, quoniam post sex annos non pla-
 ceret.

Et eiusdem lib. c. 14. Vinum omne dulce mi-
 nus odoratum: quod tenuius, ed odoratius. Est
 vini genus quod vocat dulce Narbonensis pro-
 uincia & in ea maxime Vocontii. Aferatur eius
 gratia Vua diutius in Vite, pediculo intorto. Ab
 aliis ipse palmes inciditur in medullam, ab aliis
 vua torretur in tegulis: omnia ex Heluenaca vi-
 te. His adiiciunt aliqui, quod vocant diachyton,
 Vuis in Sole siccatis loco clauso per dies septem,
 in cratribus, totidem pedes à terra altè, noctibus
 à rore defensis, octauo die calcatis. Ita fieri opti-
 mi odoris saporisque.

Sunt & in vino prodigia, id perhibente Theo-
 phraisto, Athenæo & Plinio. Dicitur enim in Ar-
 cadia fieri quod fecunditatem & sterilitatem
 Theophr. *ατρενδους* vitis feminis importet, vitis
 rabiem. At in Achaia maximè circa Caryniam
 [Charmian CH. Cabyniam Theophr. Cery-
 niam Athenæo. Addidit Theophrastus, ca-
 nibus, si Vuas gustauerint, etiam caculos elidi.]
 abigi partum vino, atque etiam si Vuam edant
 grauidæ, cum differentia in gustatu non sit. Tre-
 zenium vinum qui bibunt, negantur generare.
 Thasios duo genera vini diuerla facere proditit:
 vnum quo somnus concilietur, alterum verò
 quo fugetur. Apud eosdem vitis theiæce voca-
 tur, cuius & vinum & Vua contra serpentium ictus
 medetur. Libanios thurijs odore, ex qua Diis

Lesbium

Clazome-

nium.

Tmolitis

Sicyonium.

Cyprium

Telsemico

Tripoliti-

um. Bery-

tium.

Sebenniti-

cum

Mythiæce

Omitium.

Myconium

Nigæticum.

Ephegium.

Apameneum

Protagion

Naiperce-

nium

Oreticum

Oeneaten

Vina dulcia

Drachyon

Vina prodigiosa.

Achaicum

Trezenium

Thasium

duplic.

Theiæce.

Libanum

HISTORIAE PLANTARVM.

Aspendium
Vnde dicitur.

prohibant. E diuerso Aspendios [Quidam sic di-
ctam interpretantur ab Aspendo vrbis Pamphy-
liae. Lego Aspendos, vel Aspendios, à particula
priuationis Graeca & verbo *aspendo* libare, vt Vua
fit, cuius vino Diis libare nefas est.] damna aris.
Ferunt eam nec ab alite villa attingi, Thasiam V-
uam Aegyptus vocat apud se prædulcem, quæ
soluta alium. Est contra in Lycia, quæ solutam
firmat. Aegyptus & Echolada habet, abortus fa-
cientem. Vna in apothecis Canis ortu mutan-
tur quædam, posteaque restituntur sibi. Sic &
mari navigato cuius in status his quæ durauerint
tantum vetustatis adiciere sentitur, quantum ha-
buerint.

Lycia
Aegyptium.
Echoladum.

Setinum
Ad artia.

Vini Setini, quod Plinius D. Augustum cun-
ctis præferre scripsit, recordatur etiam Martia-
lis.

Pendula Pontinos quæ spectat Setia campos
Exigua vetulus misti ab vrbe cados.

Idem
Setinum domineque mives, denique clientes:
Quando egote medico non prohibente bibam.
Iuuenali.

Inuenali.
Cæcubum
Galenus Syn.
de dictum.

— & lato Serinum ardebit in auro
Vicinum & Setia oppidum Signia, vino Signino
clarum.

Galenus porro lib. 7. secund. loc. in Arteria-
corum expositione Cæcubum vinum à loco di-
ctum minime putat, sed ita vocatum fuisse quod
uis vetustissimum, & ob vetustatem solum
supior, quod etiam 12. Meth. rursus confirmat, &
lib. de Antidotis.

Trifolium
Dalech.

Trifolina verò uina quorum supra meminit
Plinius, illa sunt, vt notat Dalechampius, quæ ter-
tio foliorum exortu, nempe tertio anno ad bi-
bendum tempestiua forent: vulgò, *vin de trois*
feuille. Martialis.

Non s. m. de primo facit Trifolina Læo.
Iuxta illud Est, est, est. Propter est, est, est. Domi-
nus meus mortuus est. Transmarina vt vocat
Plinius, Plautus in Penulo hæc memorat.

Vbi Leucadio, Lesbio, Thasio, Coo,
Verustate uia edentulo atatem irriges.

Vini nomi-
na in gene-
re.

Vinum succus defæcatus, iamque purus niti-
dusque apparens absoluta scilicet seruetur fac-
tione, sordibusque residentibus. Græcè *vin* dicitur,
Al. Wein. B. Wyn. Gall. Vin. It. & Hisp. Vno: &
quidem propriè, Nam alii quidam succi ac li-
quores, vt i malorum Punicorum, Cotoæorum,
Pyrorum, Mespilorum, Sorborumue, vel qui ali-
unde veluti ex hordeo ac frugibus confiunt,
hæc quæquam simpliciter, sed addito no-
mine eius ex quo conficiuntur vina dicun-
tur. Ita vinum Rhoites ex Punicorum malorum
scinis expressum: Cydonites ex malis Cotoneis:
Apytes ex pycis: *vin* *vestin* siue vinum hor-
deaceum, quod & Zythum, ex hordeo composi-
tum. Cognomina tamen & alia quædam. & qui-
dem à stirpibus in iis maceratis vina accepere,
quæ ex vite tamen vina sunt: vt Absynthites,
Myrsinites, Hyssopites: factitia autem hæc di-
cuntur.

*Vinum sim-
pliciter.*

Propriè verò ac simpliciter vinum appellatur,
quod ex vitis uitis expressum est, ac nullius alte-
rius misturam admittit. Vinum merum, meracum
Cicer. purum, purum: *vin* *purum*, *vin* *purum*, *vin* *purum*,
Eupir. Al. Lauter purus fuisse / ein ongemende wyn.
Gall. Vin pur, clair, point mixt, *vin* *pur*, Ital. Vno schiet-
topuro. Hisp. Vno puro / sin aqua.

*Vinum di-
lutum.*

Vinum dilutum, lymphatum, *vin* *dilutum*, Al. Ges-
wasserter wein / vermischter wein / mit der

wasserstangen geschlagen / Gheswaterde Wyn
Gall. *vin* *trampé*, Ital. *vin* *con* *aqua*, *vin* *con* *aqua*. Hisp. *vin* *no* *aguard*.
Villum Terent. *vin* *no* *aguard*. Al. Weinle. B. Wynfen/
kleine oft sichte Wyn. Gall. *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*,
It. *vin* *no* *aguard*.

Vinum generosum, nobile Horat. *vin* *no* *aguard*. Al.
Schlicher wein. B. Schacher wyn / Gall. *vin* *no* *aguard*,
It. *vin* *no* *aguard*, Ital. *vin* *no* *aguard* & *vin* *no* *aguard*, H. *vin* *no* *aguard*.

*Vinum ge-
nerosum*

Vinum ignobile, cibarium Varroni *vin* *no* *aguard*. Vinum
Al. ringher wein / tisch wein / B. Schleyre Wyn / ignobile
tisch wein, Gall. *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*,
It. *vin* *no* *aguard*, Ital. *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*,
H. *vin* *no* *aguard*.

Vinum conficiens, ferens atatem, firmum
Plin. & Virg. *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*,
It. *vin* *no* *aguard*, Ital. *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*,
H. *vin* *no* *aguard*.

*Vinum con-
ficiens*

Vinum fugiens Cic. exolecer, dubium, in vi-
tium inclinans, atatem non ferens, *vin* *no* *aguard*,
It. *vin* *no* *aguard*, Ital. *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*,
H. *vin* *no* *aguard*.

*Vinum fu-
giens*

Vinum accensum, vappa Horat. marcium
Scatio, *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*,
It. *vin* *no* *aguard*, Ital. *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*,
H. *vin* *no* *aguard*.

*Vinum a-
ccensum*

Vinum pendulum, quod lentescit. Al. Zager
wein. Belg. Laughe wyn. Gall. *vin* *no* *aguard*, Ital. *vin* *no* *aguard*,
Hisp. *vin* *no* *aguard*.

*Vinum pen-
dulum*

Vinum bimum Horatio, *vin* *no* *aguard*. Gall.
Zweyfarige wein. Bel. Zweyfarige wyn. Gall.
vin de deux feuilles, Ital. *vin* *no* *aguard*, Hisp. *vin* *no* *aguard*.

*Vinum bi-
mum*

Vinum annosum, edentulum Plaut. vetustum:
Al. Alter wein. Belg. Oude wyn. Gall. *vin* *no* *aguard*,
It. *vin* *no* *aguard*, Ital. *vin* *no* *aguard*, H. *vin* *no* *aguard*.

*Vinum an-
nosum*

Vinum atrum Plauto, rubeum. Al. Sicker ro-
ter wein. Belg. Roodde wyn, wyn tinn / wyn van
Alicanten. Gall. *vin* *no* *aguard*, Ital. *vin* *no* *aguard*,
Hisp. *vin* *no* *aguard*.

*Vinum a-
trum*

Vinum heluolum Colum. & Cat. Medium in-
ter album & rufum *vin* *no* *aguard*, Galeno etiam
Eudæ, quod tamen vir doctus annotat esse rubei
coloris, sed erroris non vacuus, hoc est, rufum
pallens. Al. Schiller oder schillerer wein. Belg.
pilsger, vel pils, voce à Gallica detorta, quæ est
pils, wyn claret. Gall. *vin* *no* *aguard*, Ital. *vin* *no* *aguard*.

*Vinum he-
luolum*

Vinum fragrans odoratum, flos Liberi Plauto
Ennio, *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*,
It. *vin* *no* *aguard*, Ital. *vin* *no* *aguard*, H. *vin* *no* *aguard*.

*Vinum fra-
grans*

Vinum aromatizatum Plin. *vin* *no* *aguard*, *vin* *no* *aguard*,
It. *vin* *no* *aguard*, Ital. *vin* *no* *aguard*, H. *vin* *no* *aguard*.

*Vinum aro-
matizatum*

Vinum

taria vīa vtruntur: vaporibus acris non replent caput vt Aureliaca, interna non vtrunt vt Gasconica, Hispanica, & aliarum regionum valde calidarum: non replent corpus stercoreis excrementis, vt vīa cruda & acerbā: non coaceruant humores melancholicos qui pariant obstructions, vt vīa crassa & nigra. Inter omnia Franciæ vīa præstantissima existimantur vīa ex

Vīa Conf.
fi.

Coussi: ideò dicata & referuata Regio potui: plarumque sunt rubra aut rubella generosa, consistentiā mediocri, grati saporis & potui iucunda: optima summè imbecillibus à Venere, & iis qui magnam passī euacuationem. Inter Campaniæ vīa primum obtinent locum bonitatis & perfectionis quæ in Aproueniunt: rubella, subtilia, delicata, palatui admodum grata, ad Rubum Idæum accedentia, expetita Magnatibus: prouocant tamen defluxiones & caput ledunt iis qui raram corporis texturam habent, bibenda ante diēs caniculares, postea enim minuitur eorum bonitas. Inter vīa Burgundica primum locum obtinent *Beauuensis*, consistentiā mediocri, coloris oculorum pēdicum, saporis grati: generosa, minis vaporosa Aurelianensibus, vnde vulgare prouerbum,

Vīa Burgundica
Beauuensis

Vinum Beluense super omnia recenset.

Vīa Aureliana magnifunt in Francia ob generositatem & bonitatem: plarumque rubra sunt, mediocri substantiā, boni saporis, ad Rubi Idæi saporem accedentis, generosa, ventriculo commoda: magis calfaciunt & nutiunt quàm Francica: verum præ cæteris caput grauant & cerebrum lædunt: nocua sunt obnoxii Hemiericæ & defluxionibus, & iis quibuscumque calida & sicca: meliora sunt sec. anno. Diu cōseruantur vīa ex Anjou. Vīa ex Bat-sur-Aube, accedunt proximè colore, sapore, & bonitate ad vīa ex Anjou. Vīa Gasconica licet calidiora & sicciora vinis Aurelianis, nihilominus non sunt ita vaporosa, nec ita citò offendunt caput, vt experientia cognouit, quia crassiora, nec ita subtilia.

Vīa ex
Bat-sur-
Aube.
Vīa Gas-
conica.

De vīno languente, vāpescēte, aspero, turbido, accescente &c. vt & de vinorum adulteris peculiaris insinuetur tractatus. Omne autem vinum vplurimum aciescit, & in vappam tranfit circa Pleiadum occasum, & circa Solstitium hybernū, aut efflorescentiam Vitis, & circa Solstitium æstiuū & sub Caniculæ æstium, & in summa circa omnes accessiones & frigoris & caloris, aut largiorum imbrum. Idem contingit & propter violentos ventos, aut vehemens tonitru, aut etiam iuxta tempus quo Rosæ florent, aut à fulgure violento. Plura qui vult, videat Constaninum Mizaldum, & Colertum.

Adfectat
quando, &
caus.

De vīni naturā & facultate.

Vīni naturam pro ætatis ratione differre nemo sanus dubitat. Vīa vetusta neruos reliquaque sensuum instrumenta, lædunt, attamen gustu suauiore, iucundiorēque sunt: quare vitanda iis qui internè alicuius partis imbecillitatem sentiunt. Nihilominus in secunda valetudine vinum erusmodi paucum & aqua dilutum innoxie sumitur. At nouum in flationes parit, ægrè coquiritur: graua facit in somnia, vīnaque ciet. Quod verò ætate medium est, vtroque illo vitio caret, proindeque ad vsum sanorum, ægrotumque deligendum. Insuper album [variat enim vinum pro ratione coloris] est tenue ac stomacho vtile, faciliēque in membra diuiditur. Nigrum ve-

Actat vīna
varias na-
turas.
Vīna vetu-
sta, sensus
instrumen-
ta aduēt.

Nouum in-
flant.
Vīna,
ægrè me-
diū, opti-
mum.
Color
album,
nigrum.

rd crassum est, & ad concoquendum difficile, temulentiam facit & corpus augeat. Fuluum, vtpote quod medium est, medias etiam inter vtrunque vires obuiet. Album tamen tum in secunda, tum & in aduersa valetudine laudabilius. Sed & vīa a sapore distant.

Sapor enim atque quæ vīno admiscuntur, ea differre faciunt. Siquidem dulce crassius partibus constat & ægrè de corpore expirat, stomachum inflat, aluum & intestina, vti & mustum, turbat: sed minis inebriat, vesicæ ac renibus aptum. Austerum vīnas magis expellit, sed capitis dolorem facit, ac temulentiam gignit. Acerbum ad ciborum per membra digestionem accommodatissimum: aluum cæterisque fluxiones cohibet. Ad vinum molle & sapore languidum neruos minis tentat, minisque vīnas pellit. Passum & heptema nigra quidem si fuerint, crassa sunt & corpora multum alunt: at candida, tenuiora: quæ verò medio inter hæc colore sunt, medias quoque vires sortiuntur. Omnia tamen astringunt, languida pulsus excitant, & faciunt aduersus venena quæcumque exulcerando necant, ex oleo pota & vomitionibus reddita, itemque contra meconium, pharicum, toxicum, cicutam, & lactis in ventriculo coagulationem: necnon & contra renem ac vesicæ rosiones & exulcerationes: nihilominus in flationes pariunt, & stomacho aduersantur. Priuatim confert Melampythium iis qui alui fluxione laborant. Album magis cæteris enollit aluum. Gypso conditum neruos offendit, capitis grauitatem infert, viscera calore accendit, & vesicæ aduersatur: sed contra venena cæteris aptius. Picata aut resinata exalfaciunt, & concoctionem adiuuant, languinem excreantibus inimica. Quæ verò aparachyta, hoc est, mais expertia dicuntur, & lapam tamen ad nistam recipiunt, caput implent, temulentiam gignunt, de corpore difficulter expirant, & stomachum male habent.

Sapor.
Dulce,
crassum.

Austerum
caput tem-
tati

Acerbum
fluxiones
cohibet.

Molle
passi, vires,
heptema.

Venena.

Lactis coa-
gulatio.

Melampy-
thium.

Gypso condi-
tum.

picatum.

Maris ex-
posita.

Vini facul-
tas in genes-
re.

Aceracum,
sincerum,
ac natura
austerum

Alba Sece-
ra, odorata.

Vetusta
dulcia

Austera &
alba

Lactis coa-
gulatio.

Melampy-
thium.

Gypso condi-
tum.

picatum.

Maris ex-
posita.

Vini facul-
tas in genes-
re.

Aceracum,
sincerum,
ac natura
austerum

Alba Sece-
ra, odorata.

Vetusta
dulcia

Austera &
alba

Vini facul-
tas in genes-
re.

Aceracum,
sincerum,
ac natura
austerum

Alba Sece-
ra, odorata.

Vetusta
dulcia

Austera &
alba

Vini facul-
tas in genes-
re.

Aceracum,
sincerum,
ac natura
austerum

ilunt: attamen corpus augent: tenuia autem & austera, stomacho quidem profunt, sed carnes alunt. At quæ sunt valde vetera, tenuia & candida, vehementius vinas ciunt, & dolores capitis inferunt, nervosumque genus largius pota tentant. In media etate, vta à septimo anno, potui saluberrima sunt.

Modus bibendi unde desumendus.

Modus autem pro etate, anni tempestate, consuetudine, & qualitate vini decetatur. Optumè verò præcipitur, vt ne sitis immodica toleretur, & tantum potionis adhibeatur, quantum proluendis cibis sat sit. Siquidem ebrietas omnis, maximèq; iugis, frequentiorè perniciosa. Enim verò largior perpotatio nervos obfessos in dies remittere, morborumque acutorum initia quotidie introducere, consuevit. Attamen moderatè aliquot diebus vino indulgè, maximèque post aquæ potum vile. Ita namque modo quodam, quæ sub sensum deinde cadunt recrementa ex alto euocantur, & per cæca corporis spiracula expurgantur. Sed illi perpotationi aquam superbibere par est: siquidem medicationis alicuius gratiæ factè ex composito temulentia, temelium affert. Et hæc hæcenus de vini natura Dioscorides.

De vino Alexandrino.

Misor, inquit Alexandrinus, fuisse Galeni tempestate inuentos, qui Vinum, ex præstantia quadam potus maximè nomine dignandum, alere quidem dixerint, at alimentum, quod illis *πρωτον* erat, dicendum non esse contenderent, nimia animi perniciacia, & litigandi studio, idque verbo tenuis: quoniam rem concederent, verbum negarent. *πρωτον δὲ τὸν ἀλλ' οὐ δὲ τὸν πρῶτον ἀπὸν ἐννοῦναι.* Alere & nutrire dicis, & nutrimentum non dices? Quis hoc vnquam Sophista eumcet? Illud potius dicerent, quum non deessent copiosissimæ dialecto voces, *πρωτον, σπῆν, ἰσχυρὰ, πρῶτον* vtrumque esse, *διὸν πρῶτον*: alterum verò *σπῆν*, & *ἰσχυρὰ*: alterum *πρωτον*, & *πῶνα*.

Plurima alia, nec illa levis momenti, de nobilibus huius vitis fructus, Vini, inquam, simpliciter sic dicti, Natura, differentiis, qualitatibus variis, duratione, conseruatione, adulteratione, temperamento, vtu, viribus & noxis, hæc, cum ex Veterum tum ex Neotericoſum, nostratque ipsamet obseruatione adicere erat animus: verum ne in immensam excrescat noster Codex molem, reliqua quæ huius Loci esse possent, in peculiarem referuamus tractatum, breui prælis submittendum, in quo, ni nos spes fallit, Lectori beneuolè abundè satisfiet. Ac sic illis dimissis ad factitia vina, & factitios aliquot ex vino liquores propèxanter pergitimus.

Vina factitia.

Vina factitia.

Fictitiorum vinorum, aut si qui malunt, factitorum, tot generum à Dioscoride descriptorum, nec pauciorum à Plinio, traditorum, quædam, tantum in præsentia adscribimus (cætera enim sibi quisque petere legenda de suo simplici potest esse actum agendum toties sit) ea scilicet, quibus aptiore locum adinuenire haud potuimus. Et hæc sunt vinum Melitites, Mulsum, Passum, vina marina siue falsa, & vina quædam dulcia.

Vinum melitites.

Vires & vici.

Vinum igitur Melitites, autore Dioscoride, datur in longis febribus, iis qui Stomacho sunt imbecilli: leuiter enim alium emollit, vinas ciet

ac stomachum expurgat. Prodest & articulario morbo obnoxius, nephriticis & capitis infirmitate laborantibus: vile quoque mulieribus aqua potantibus: siquidem odoratum est: corpora que alit. Distat à mulsò, quoniam sit illud è vino austero ac vetere, & melle exiguo: Melitites autem adiecto ad quinque congios austri mellis congios, & salis cyathò. Porro in magno vase fieri ipsum oportet, quò locus amplior ad vehementer effervesendum pateat, antedicto sale sensim asperso, quandiu efferverit: ac vbi feruere desierit, in cados alios transfunditur.

Mulsum.

Mulsum præfertur, quod ex vetere vino austeroque & bono melle factum est. Tale siquidem minus inflat, & celeriter in vsum venit. Ac vetus quidem corpus alit: quod mediæ est ætatis, alio vile est, vrinamque pellit. Sed à summo cibo sumptum, nocet: inter initia verò potum, stomachum implet, deindeque tamen appetendi auiditatem reuocat. Fit mulsum vt plurimum, duabus vini metretis admixtâ vnâ mellis. Aliqui quò promptius perfici exhiberique possit, mel cum vino coquant, atque ita transfundunt. Alii impensæ parentes ad multi feruentis sextarios sex vnum mellis adiciunt, ac vbi ferbuerit, elutriant: dulce autem permanet.

Vina marina siue falsa.

Marina vina variè factitari, auctor est Dioscorides. Aliqui enim protenus vt decerpit calcataque sunt vux, aquam maris admiscunt: nonnulli prius in cratibus, vvas Sole siccant, iisque deinde calcatis marinam adiciunt. Alii passas prius vvas in dolis aquâ marinâ macerant, moxque calcatas expriment. Et eiusmodi quidem vinum dulce enadit. Quæ tamen austeriore gustu temperantur, etiam in febribus subsidio sunt, siquidem meliora defuerint. Valent & ad alium subducendam, profuntque putulenta excreantibus, iisque qui alio sunt dura, quique facile ex vinorum Aminæorum vtu capite tentantur: attamen & huiusmodi vina stomacho aduersantur, statimque pariunt. Sitim porro facit, nervos infestat, & à valetudine sese recolligentibus haudquaquam idoneum est.

Vini falsi genera septem enumerat Plinius his verbis. Apud Græcos iure clarissimum nomen accepit, quod appellauerunt bion [ab ion Turnet. bizon Vet.] ad plurimos valetudinum vsus excogitatum. Fit autem hoc modo: Vux paulum ante maturitatem decerpit, siccantur acri Sole, ter die versatæ per triduum, quarto exprimentur, deinde cadis Sole inueterantur. Cui marinam aquam largiorem miscunt, à serui furtò origine orta, sic menturam explentis, idque translatum in album mustum leucochrun appellatur. In aliis autem Gentibus simili modo factum thalassomenon vocant. Thalassiten autem vasis musti dieictis in mare, quo genere præcox fit vetustas. Necnon apud nos quoque Coum vinum ex Italico faciendi rationem Cato demonstrauit, super cætera in Sole quadriennio maturandum [coquendam Vuam] præcipiens. Rhodium Coo simile est, Phormeum [Phorineum est, fortè, Phormium, vel Formium] falsius Coo. Omnia transmarina septem aut sex annis ad vetustatem mediam peruenire existimantur. Idem alibi ait. Fictitium non potest videri, quod bion

Febris. Aluus. Vena. Arthritis. Nephritis. Differt à mulsò. Melitites compositio.

Delectatio muls.

Vires.

Muls compositio.

Vina marina. Vires & vici.

Vires & vici. Febris. Aluus. Pus.

Sine.

Vini falsi genera septem Plinius. Bion. Phur.

Compositio.

Leucochrun. Thalassomenon. Thalassiten.

Coom.

Rhodium Phorineum.

Bion.

appellauimus, cum sit in eo sola pro arte festinatio. Prodest stomacho dissoluto, aut cibos non perficienti, prægnantibus, defectis, paralyticis, tremulis, verugini, torminibus, ischiadicis. In pestilentia quoque ac peregrinationibus, vim magnam auxiliandi habere dicitur.

Vnde distillat

Biscay, vt testatur Rhod. lib. 26. cap. 8. dicitur, quod ad vetustatem accelerandam assulo mari cogereetur. Marinam enim Veteres vinis miscabant, tum vt gravior sapor esset, tum vt celerior & præcocior vetustas contingeret. Maris expers vinum Gal. 12. Method. dicitur vocat. Hermol. in Diosc. à festinatione nomen impositum, quasi violenter fiat. Plaut. in Rud.

Aparathyri

Quasi vinis Græcis Neptunus nobis affudit mare. Itaque alium prodipsariis nobis salis poculis. Vini Græci faciendi rationem Cato docet. Vini verò dulcis & Græco similis conficiendi modum Columella tradens sal vino additum id incorruptum seruare.

Stillatitius ex vino liquor, vulgò Aqua vitæ.

*Aqua Vita
sive ardens*

Elicitur ex vino liquor quem *Aquam vitæ*, & *aquam ardentem* vulgò appellant, quod veluti ex herbis aut aliis stillatitij liquores, eodem ac simili modo è generoso vino extrahatur, per organa videlicet ad hoc comparata, quæ Alembica passim appellantur. Est autem eiusmodi liquor colore & consistentia cum ex herbis distillatis aquis, tum & simpliciter puræ aquæ, colore similis, sed facultate longè diuersus. *Vitæ* cognomen accepit, quod ad hominis vitam & conseruandam & prorogandam faciat. *Ardens* verò dicitur, quia facile flammam concipit. Cum enim vix aliud sit, quam generosissima ac tenuissima vini pars, citò ad motû ignis flammâ accenditur ac ardet.

*Aqua Vita
cur distilla.
Aqua ar-
dens.*

*Tempera-
mentum.*

Calidissimus hic liquor est, & subtilissimam ac tenuissimam partium, tertio ordine calidus ac siccus, & quidem intenso, præsertim qui purior, quod enim purior, hoc & calidior, siccior, ac tenuiorum partium: puriorem efficiunt aliquoties repetitæ per organum distillationes.

*Vires &
scur.
Color natu-
ralis.
Sensus*

Prodest verò hæc ex vino stillatitia aqua omnibus vel per longiorem morbum, vel per ætatem grauiorem refrigeratis, vt senibus ac decrepitis. Calorem naturalem & fouet & auget: vires tuetur, reparat ac intendit: vitam producit, sensus omnes vegetat, memoriâ nō modò cōseruat, verum & redintegrat: vitium acuit: utilis cataleptis ac caro, si febris absit, occupatis, aliisque frigidis cerebri ac capitis malis laborantibus: facit ad cordis debilitatem, tremorem, ac palpitationem: ventriculum languidum excitat ac exalfacit: status tum in hoc, tum in hypochondriis, vel etiam in intestinis hærentes discutit: cibi concoctionem promouet, frigidis venenis potenter resistit. Tanta in corroborando corde, ac sensuum organis excitandis huius vis ac potentia est, vt non modò intrò exigui cochlearis, vel etiam mediæ mensuræ sumpta, verum & fortis ad mota efficax reperiatur: nanus videlicet applicata, vel temporibus, brachiorum item carpis illita. Subinde hoc modo vsurpata etiam mortentibus atque animam agentibus vitam ad aliquot horas producit, vel etiam restituit: quæ purissima ac exquisitissima est. Dentium dolores in ore detenta sopit: lenit & nervosarum partium ex frigido contractos, illita. Sunt qui in quartanis ante accessionem, præsertim post morbi statum exhibere audeant. Exhibenda autem hæc aqua

Caros

*Hæmo-
moriens*

Dentes

ex vino, cum magno in morbis est iudicio ac discretu: cum enim impensè calida sit, & partium tenuissimarum, ac nec aliud, quam spiritus ipse vini, citissimè permeat, ac cerebrum facillimè petit ac ferit. Apoplexia idcirco occupatis, Comitiali morbo obnoxius, Hemiplegia, Cephalæa, aut vertigine ex frigida licet causa laborantibus, non tamen tutò semper dari potest: nisi enim materia morbi effectrix omnino sit exigua: & temperamento ipse ægrotus, perquam frigidus, citra periculum exhiberi nequit: fusis siquidem humoribus caput amplius impletur, & morbi vis intenditur. Quod si verò & calidi adsint humores, veluti sanguis, inflammaciones quoque non parum augentur.

*Morbicaps
tiii.*

Nocet verò hæc aqua omnibus naturæ ac temperamento calidis, summè biliosis. Iecur etiam offendit: renibus quoque haud utilis est, sæpius aut copiosius sumpta.

Nona.

Chimistæ quidam vini fortissimi non adulterati lib. xii. ampullæ indunt, & per vas refrigeratorium, vulgari modo destillant, vsque dum vini efficacia imminuat: tunc amoto vale quod excipit vinum distillatum vitro amplo recondunt diligentissimè, ne quid expirat, & in aquam calidam ponunt, sinuntque ebullire per dies octo: postea in vapore balnei spirituum vini subtilissimum extillant. In hoc autem opere tria notari debent: primò ne vas in quo vinum digeritur altius aquæ calidæ imponatur, quam vinum appareat: secundo, vt commixturæ luto optimè circumlinantur: tertio vt spiritus inter destillandum rectè separentur à vino, caloreque moderato euocentur.

*Tria in hoc
perficiendo
notanda.*

Potèrò iidem Vinum Alcalizatum, vt vocant, parant, dum aquosam materiam ex destillatione vini relictam, exhalare sinunt ad succum sæculentum vsque: hunc deinde probè exiccant, conteruntque, & igne vehementi in calcem albam redigunt, quam sal vini appellant. Postea spiritus vini vncias duas, salis eius leuissimam miscant, induntque ampullæ: hanc diligenter oclensam per dies 24. in cineribus sinunt. Mox ex iidem primum lento, deinde fortissimo igne educunt: postea saltem relictum iterum exurunt, conteruntque, & spiritus vini imbuunt, digerunt, euocantque vt prius, atque hunc laborem toties reiterant, donec sal per operculum extillari: sic nobilissimum vini spiritum alcalizatum prouenire aiunt, ad rerum colores extrahendos.

Vel Vini rubri valentissimi, vt Hispanici, aut Alcaici, aut alterius similis, lib. 8. pellicano, aut ampullæ vitæe satis amplè infunduntur, & vase diligenter obturato, macerantur in fimo equino, vel aquâ moderatè calidâ diebus triginta: tunc oleosus liquor phlegmati innatare videbitur: qui igne lento in ampulla frigidiusculè tantum separatur, donec oleosum illud tenue vel spiritus vini vegetabilis à summitate operculi emanare desinit. Hic postea rursus in aqua calida digeritur per dies viginti quatuor: atque sic è libra vini emergit essentia scrupulis, verum ad vitam producendam præsidium. Ex hoc vini liquore subtilissimo essentia siue tinctura rerum, & aquæ vitæ parantur, dum stiperium plantæ & odoramenta, nec non metalla, aliæque terræ fossilia præparata in illo macerantur, liquantur, extrahuntur, destillanturque. Experientia constat scribit Ringelberg, si vino exusto Linum immergatur concipere quidem flammam posse, sed non aduri.

*Vinum Al-
calizatum*

Sal Vini.

Fex vini.

u Vini.

SVperest vt de Face Vini pauca dicamus. Hæc scrulæ instar concreta valorum ac cadorum vinatorum lateribus adhærescens, aded sicca & solida euadit, vt in puluerem atteri possit.

Hanc officinæ Tartarum appellant, Græci *rhô qvja*: Germ. Weinstein. Belg. weinstein. Gall. la grolle: It. Faccia, Hisp. rasura de Vino. Laudatur verò à Diosc. è vino veteri Italico: sin minus ab alio consimili. Nostra ætas eam commendat, quæ è vino albo colligitur, & Tartarum vini albi nuncupat.

Vlus huius facis ad multa. Habet enim vim, iuxta Dioscoridem, supra modum vrendi, detergendi, cicatricem inducendi, astringendi, & vehementer exedendi, siccandi que. Et hinc œdemata perse & cum Myrto cohibet: ventris stomachique rheumatismos in cataplasmate adhibita sistit: muliebri profluuium abdomini & verendis impofita mitigat: panos nondum exulceratos, itemque tubercula discutit. Turgentis mammasi uique lactis impatientes cum aceto peruncta extinguit. Abundè vt Aginetas ait, desiccatur ac discutitur. Adstrictoria ei subinde facultas ex vini specie, vnde colligitur, accedit. Facit ad humiditas corporis affectiones, prodest cachexiæ ac hydropsi, præsertim Leucophlegmonia laborantibus. Vtilis & Argentariis. Argentum enim hac poliunt ac purificant. Sed & tinctores pannorum ad suos eam conuertunt vlus.

Vitru hac facis non rarò, vt Alcyonium, antè diligenter exsiccata. Sunt qui testæ nouæ inditam igni largo crement, vsque dum tota inalbescat, & linguam tactu vrere videatur, quod signum legitimæ ac perfectæ vitronis est. Alii ignitis carbonibus facis glebam obruunt, & similiter faciunt. Sic vitam Græcis *qobvlu* appellari Agineta ait: Officinis Tartarum vitum & calcinatum. Vehementer causticam siue vrentem, abstergentem, ad cicatricem perducentem, adstringentem, exedentem & valdè resiccantem vim, Dioscoride autore, habet: vngues scabros cum resina eiicit: medicamentis, quæ adurunt, Paulus ait, admiscetur. Vitendum cæ, inquit Dioscorides, recenti quoniam celeriter euascit: vitæ siquidem vini fex, citò humida fit, ac in liquorem resoluitur. Idcirco qui ea vti vult, vitreo aut vitreato vase diligenter obstructo, in calido focoque loco; repositam habeat oportet. Colligescit verò hæc & in liquorem resoluitur, si sacculo ex lino alicubi in cella subterranea frigida suspendatur. Lepras, scabies, impetigines, aliaque cutis & faciei fœditates citissime tollit: addita æquali mensurâ ex rosis stillatitia aqua, & tanto quâto ad linimentum consistentiam satis sit, quo vesperti affictæ partes illinendæ sunt. Fit & liquor tartari aliis modis.

Cinere Vitum & facum vini, teste Trago, exustarum, quidam victum suum querant. Nam cum facies destillatæ fuerint, quod reliquum est siccatur, & post in cinerem redigitur, quo ad colorem, & ad saponem conficiendum vtuntur. Vterque cinis Chirurgicis quoque magno vsui esse potest, in sedis condylomatibus & thymis.

Acetum.

Ex liquoribus, quicunque potus vini vices exhibent, penè omnibus fit acetum, natura & arte. Natura, cum vinum aut cereuisia in loco nimis calido detinentur, vel cum eadè nimis diu referuantur. Arte, cum vinum aut cereuisia co-

quitur, refrigeratque fermentum, aut panis calidus hordeaceus [qui vnus omnium præualeat] aut pisa, aut hordeum tostum imponitur. Alii panem tostum in aceto aliquoties reiteratis vitibus macerant & siccant, vinoque aut cereuisiæ imponunt.

In tempore sic acetum parant aliqui. Sal, piper, fermentum, aut (quod citius & minori sumptu fit) lapides, lateres, aut chalybem candentem in vino extinguunt. Vide hac de re Colerum lib. 2. suæ Oeconomiz. Si vasa mellaria (*μελιτρία* Gal. vocat) aut faui lauentur aqua, eaque decoquatur, fieri saluberrimum acetum, apud Plinium præcipitur. Rondeletio probabile non videtur, acetum ex melle fieri, sed potius ex propoli, quæ acidum oleat. Ast contra experientiam: Fit siquidem ex melle cocto cum aqua.

Acetum, quod secum quilibet deportari valeat, sic efficit. Accipe tartarum, macera nouem aut decem diebus in aceto forti, exsicca in Sole, idque repete secunda aut tertia vice, ad vsum. Si necessitas adsit, puluerisa, in vitrum vini parum impone de puluere, & habebis acetum.

Dicitur à Græcis *ἄξος*. German. *Essig*. Belg. *Agyn*. *Edif* & *Acet*: Gall. *vinaigre*: Ital. *Aceto*: Hisp. *vinagro*. Boh. *Ocer*.

Ceterum acetum, auctore Dioscoride, refrigerat & adstringit, stomacho est vtile, & appetentiam cibi excitat: erumpentem vndeunque sanguinem potu infestius sistit: prodest alui fluxionibus, cum cibariis coctum, eruentis vulneribus idoneum est, ac inflammationes arceat, in luccidis lanis aut spongiis impositum. Reprimat & procidentiam sedis vuluæ; item gingiuas abscedentes & sanguine manantes. Est etiam efficax ad nomas, erysipela, herpetas, lepras, lichenas & pterygia, si cum aliquo conuenienti misceatur: phagedænas vlcetum, nomasque totu continuo cohibet: podagricis calido fortu, cum sulphure auxiliatur: fugillata tollit, cum melle inunctum. Contra capitis ardores, cum rosaceo in luccidis velleribus aut spongia imponitur. Ad hydropem, auditum difficilem, auriumque sonitus ac sibilos, feruentis vapor proficit: earundem quoque vermes instillatum necat. Panos coërcet tepidi fortu, aut si inabuta eo spongia admoveatur: & pruritus permulcet. Contra venenatorum morsus, quæ refrigerando nocent, calidi fortu. prodest: vii frigidi, contra eorum idus quæ exurens virus eiuculantur: Calidum potum acque vomitionibus redditum, aduersus omnia venena efficax est, ac præsertim contra haustum meconium cicutamve, sanguinem in ventriculo conglobatum, lac ibidem coagulum, fungos, ixiâ, taxumque, cum sale. Haustu voratas hirudines, si forbeatur, eiicit: tussim vetorem mitigat, & recentem lacescit. In Orthopnæa, calidum commodè forbetur. Sed & guttulis fluxiones gargarizatum inhiibet: anginis & laxata columellæ conuenit: nec non & calidum contra dentium dolorem colluitur. Aceti nequitia inest virtus magnos ad vsus, inquit Plinius, sine quibus vita mitior degi non possit. Summa ei vis in refrigerando. non tamen minor in discutendo: ita fit vt insulum terræ spumet. Dictum est sæpius, diciturque quoties cum aliis proficit. Perle haustum fastidia discutit, singultus cohibet, sternutamenta olfactu, &c. Idem alibi aceto facillè gummi elui, margaritas resolu, murenaeque gustu eius in rabiem agi scripsit. Metallis viridem colorem induci, si humectentur aceto falso, annotat Ringelbergus.

Acetum artificiale

Rondeletius not.

Nominâ linguarum

Aceti Græci: ἄξος. German. Essig. Belg. Agyn. Edif. & Acet. Gall. vinaigre. Ital. Aceto. Hisp. vinagro. Boh. Ocer.

Inflammationes

Erysipela

Podagra, Sugillata

Hydrops

Venena

Hirudines, Orthopnæa

Dentes

Aceti Græci: Plinio

Fastidia, Margaritas resolu

Temper.

Sunt referendi nobis hoc loco, sicuti etiam in aliis fecimus, quicunque tractationem hanc ingrediuntur, præcipui Aceti in Medicina & culina vsus. Frigidum igitur naturâ omnium iudicio Acetum statuitur, longè autem magis siccans: Reuera namque exsiccatissimum. Cæterum in Aceto penetrandi, atque ad profundum se per omnia indendi vis, ambashæc efficaces magis adiciit, ut his particulæ omnes imbutæ nihil putrefactionis causis obnoxium expositumve relinquant, ipsæ primò sicciores factæ, ne peregrinum humorem faciliè excipiant, frigiditytate autem cùm externum calorem arceant, tum internum inuentum prius inelufumque coercent. Iam ex calidis Aceti particulis, quamuis non multis, acrimonia sæpe tamen multa, quod acia omnia faciunt, ipsa quoque partem suam excludendis putrefactionis causis conferret, atque hac conditurâ res nõ minùs quàm ex sale custodiuntur. Condiendi cibaria, & opsonii præparandi ratio, ab incidendi diffecandique facultate, potissimum illi, quâ rerum constitutionis plenæque durities, & humorum crassities tollitur, attenuaturque glutinositas, acrimonia abstergitur, calidæ paulò magis partes frigiditatis potentia ad temperamentum deducuntur, ac si quæ frigidæ infunt, caloricam ex quoque vim sentient temperatiores factæ. Quapropter, quæ multa condire alia non poterunt: Acetum condierit, diuersarum atque etiam contrariarum facultatum vinibus pollens. Quibus nominibus in condimenta opsoniorum penè omnia iure meritoque venire potest. Intinctus autem parantur ex eo cuiuscunque generis, modò sinapi, modò oleo, modò saccharo additis, modò odoratarum herbarum feminibus, & aut aromate aliquo gratiam intinctibus addente, aut rosarum odore conciliato, maceratione earum. Sapidiissimum appositum per se dapibus multis Embamma fecit, quatum præsertim gluinosior crassiorque substantia, humorque extenuari possulent, tam ex quibus timetur bilis, cuius humoris vim reprimere Acetû aptissimû indicatur.

Facultates
Aceti VariæIn condi-
mentis
Obsoniorum
Generis
Intinctus
ex repa-
rantur

Epithymum

Nata

Acrimonia
vini ut re-
impidatur

At idem in temperamento melancholico, affectibusque, peculiariter damnatum, nervis nervosisque partibus inimicum: vetero, intestinis, ventriculo, nisi bilioso, aduersum, mulieribus insuper noxium, & iocinoris virtutes debilitare existimatum: nempe nimio sæpè vsu, & intempestiuo, refrigerato viscere, quemadmodum nervosis quoque partibus qualitatibus eiusdem efficacia, sed & penetrabilitate officere maximè potest, acrimonia non minùs sæpè violentia læsis. Ventriculum quidem, cuiusque præsertim os, quod maior in hoc sensus, ita quandoque vehementer ingruens, afficit, ut manifestò veluti percussione eiusdem læsionem sentiat: os quidem nonnunquam ipsum, linguæque, ac palatum, non satis acrimoniam ferunt: sæpè etiam antequàm admoveatur ori, perhorrescunt. Hoc quidem acerrimum facit, quod faciliè aquâ retundi, aut vino, aut mitioris alterius alicuius succi additione, poterit. Saccharo alii, alii passulis, mitigant: sicuti è diuerso, paulò magis satuo ex aromate acrimoniam, pipere præcipuè, & gingibere quærent.

Acetum portò multum, quod Oxymel vocant hoc modo à Dioscoride temperatur. Aceti heminas quinque, salis marini minam vnam, mellis minas decem, & aquæ sextarios quinque, pariter coquit, dum decies effebuerint: mox ubi refuerint, diffundit. Constat potè sumptum crassos

humores extrahere, atque ischiadicis, arthriticis & comitialibus opitulari. Est & auxilio contra morsum viperæ & lacertæ quam Sepa vocant, itemque contra haustum meconium, ixiâmue, anginis denique veliter gargarizatur. De aceti natura & viribus, plura tract. part. quem de vite eiusque præcipuo fructu breui publici iuris facturi sumus.

Vitis vinifera filv. sue
Labrusca.

Cultivum hæc refert caudicibus, ramis, articulis satmentis, foliis, claviculis, flosculis & fructu, quem tamen non perficit, sed immaturum, durum, ac austerrum relinquit.

In sarmentolam, ait Lobelius, arboreamque penè lobolem luxuriat, prolixitate anfractuam, vnde sterilefcit, aut minores, minulque lapidas & maturas vuas fert, calque raras & perpaucas. Virg. in Bucol.

aspice ut antrum

Sylvestris varis sparsit Labrusca racemis.

Oenanthen à Labrusca separat Dioscorides, Labruscam duum statuens generum. Nos autem Oenanthen non vnius Labruscæ modò florè esse, sed vtriusque asserere non dubitamus cum Matthiolo: cùm non aliud Veteribus significet Oenanthe, quàm Vitis florè, id quod ipse Dioscor. in proprio capite manifestè declarat: quippe qui tradat Oenanthen vocari Vitis filv. fructum, cùm floret, nullius facta generis distinctione. Quin & idem alibi confirmat, ubi vini Oenanthini meminit, è feracis sylv. Vitis floribus fieri scribens. Ex his itaque abundè constat, non tantum infructiferæ, sed etiam fructiferæ Labruscæ florem Oenanthen vocari. His adde auctoritatem Galeni qui lib. 8. de comp. med. cap. 1. Oenanthen appellat Vitium filv. germem vram cum floribus, ex quo succedentibus diebus Vua fiat.

Plinius lib. 12. cap. 28. Oenanthen vnam, non florem esse censet, Eodem, inquit, & Oenanthæ pertinet, Vitis Labruscæ vva: colligitur cum flore cùm optimè olet. Sed in his Plinii verbis rectè suspicatur Matth. mendû subesse, rectiusque legendum esse cum Dioscoride cùm floret, non cum flore. Quomodo enim quis vnam vnam cum flore collegit: Cæterum ad Vitis silvestris genus pertinere scribit Dodon. quas Plinius Triferas & infanas vocari refert lib. 16. cap. 27.

Ab hac Vite silvestri ea est diuersa, quam Glycypticon, seu Amaram dulcem, postea vocabimus. Differt & ab illa Vite filv. Dalechampi, quam Clematin alteram latifoliam hoc loco inscribimus. Nec est Bryonia, quæ eandem appellationem apud nonnullos cum Oenanthæ fortita est.

Nostrâ, quam hîc tradimus, filv. Vitis Græcis *Σύνθεος* dicitur, Latinis Vitis spontanea, Oenanthæ, & Labruscæ dicitur. Germ. Wild râben: Belg. Wilde Weinstock: Gall. *vigne sauvage*. Angl. wild de wine. Fructus eius Græcè *ἐναιδν*, Hebr. *Κοφάρ* & *Reuschim*, Germ. *Bertling trauben* dicitur. Illud silentio haud dissimulandum est quod etiam domesticæ vitis flos Oenanthæ dicitur. Verû quia silvestris Vitis vi multò magis adstrictoriâ pollet per excellentiam Oenanthæ appellatur.

In squalidis agrorum marginibus variis in locis occurrit ac Prouinciæ & Narbonæ maritimis, altas prærumque scandens arbores. Nonnullæ ex hoc genere Junio mensè, ut satia Vitis, florem ostendunt.

Labruscæ folia, caules, & claviculæ, quibus repunt, vim habent cultuæ vitis similem.

Ribe,

Vire s & v
Humores
crassi
Venena.Descriptio
FructusDioscor.
Oenanthe
duplex.Plin. corrup.
guttur.Nomen
linguarum

Locum

Tempus

RIBES VVLGARIS ACIDVS
ruber.

CAP. II.



rent plurimi ex pediculo tenui unciali & fœsquiu-
ciali, aciculi, quinque foliis pallide virentibus, oris
extorsum reflexis constantes, staminibus sex sessilibus
exiguus albis umbilicum medium, qui colore
obsoleto est, stilo virenti minuto bifido lacunam a-
perit, ambientibus.

Veteribus, quantum reor, incognita, & silentio
involuta, quam plures id esse contendunt, teste Be-
ned. Curt. quod à Mauritanis Ribes dicitur, ut non-
nulli etiam recentium Medici, sub hac appellatione
illo in Medicina utantur. Ast ad stipularibus Fuch-
sio, Matthiolo, Lugd. & aliis, Ribes Mauritanorum
à nostro diversum est: nec enim respondet descri-
ptioni Serapionis, is, licet Amat. & Dodon. id afferant,
eiusdemq. Ribes esse credant, vel ob saporem acidi-
um cum quadam permixtum dulcedine. Verba
Atheni hęc sunt: Post Berberorum fruticem proxi-
mum erit citare, Ribes ferentem, quum de illo quo-
que antiqui nullam fecerint mentionem. Antiquos
quum dico, velim intelligatis Hippocratem, Theo-
phrastum, Dioscoridem, Galenum, Oribasium, Pau-
lum, Aëtium, Catonem, Varonem, Plinium, Palladi-
um, & Columellam. Inest huic fructui sapor aci-
dus, cum quadam permixtus dulcedine, unde fir-
miter crederem, hunc ipsum fructum, quem nos Ri-
bes appellamus, eundem apud Serapionem Ribes
esse, quum eundem saporem Serapio suo tribuat,
quem in hoc Officinarum gustamus, nec enim in
ceteris rotis Serapio ab hoc communi quicquam
deviat, proinde nostros Ribes, Serapionis quoque
esse crediderim. Ast Amatum ceterosque, qui pu-
tant hunc fruticem esse Arabum Ribem (de quo pos-
tea) hallucinari abunde constat. Siquidem, ut po-
steritatis memoria prodidit Serapio, Ribes est ar-
bor proferens capreolos colore viridi rubescente,
& folia lata, magna, & rotunda. Quas sanè notas
huic non respicere satis notum est: neque enim
fert hæc capreolos, neque ejusmodi foliis viret: ta-
meti fructu Ribem admodum referat, quod is gu-
stui sit acidus simul & dulcis, qualem esse Ribis bac-
cum auctor est Serapio. Sunt quoque nonnulli, qui
esse existiment Poterium, de quo apud Dioscori-
dum, Plin. & Galenum. Sed errant & hi toto calo. Des-
criptiones conferant & videbunt discrimen. To-
tum Ribis fruticem circumvestit lanugo subtilis ve-

Tom. II.

lut pubescens; spinis Poterium horret. Nec desunt
qui hanc plantam esse arbitrentur, quam Gal. lib. 7.
de comp. med. loc. loc. Vrsi uvam appellat. Quorum
error ab ipsomet Galen. satis refellitur eodem loco:
quandoquidem asserit bujulse Vvæ plantam Me-
næcyli folio virescere.

Matthiolus scribit Lonicærum hallucinatum, Ri-
bem vulgè dictum, Halimum dixisse, id tamen non
comperio apud Lonicærum: meminit quidem alte-
rius plantæ pro Halimo. Idem Matth. in post. comm.
Lat. & Ital. & hist. germ. silvestre genus in collibus
& montibus nasci tradit, hortenfi simile, sapore ta-
men minus grato, acerbiorè, vehementiore. Genus
quidem silvestre dulce mihi notum: nullum autem
hortensii acerbior. Monachi aiunt hujus arbuti
fructu omnes pharmacopœos falsò pro vero Ribes
uti: quid autem sit eos adhuc latere. Talia & Car-
dianus, Ribes loco, inquit, utimur fructu incerto,
fructum in umbella (debebat dicere in racemo) ferente.

Ribes vulgaris acidus ruber vocatur Grossula-
ria rubra, a Lugd. (à qua & Vva transmarina) Tab.
Dod. gall. & lat. cui etiam Grossularia transmarina
dicitur. Cam. ad Matth. Grossularium rubrum &
transmarinum. Vulgo gallico apud Ruell. rubra
Grossula, & transmarina. Gesh. coll. Ribes vulgè
dictum, Acinos divi Ioannis, Itemque h. Ceanothus
levis. Trago Ribes r. & hortensc. Cam. h. Ribes
vulgare baccis rubris. Matth. Ribes officinarum, ja
Ep. & hist. Ribes vulgaris. Clus. Ribes vulg. rubro
fructu dulci. Ribes Fuchf. Lac. Gronemburg. Lon.
Apoll. Tab. Cæli qui & fruticem sine spinis nominat.
Lob. Adv. Ribes rubra: Obs. & Ic. Ribes Arabum,
Ribesium Dodonæi.

C.B. pin. Grossularia s. multiplici acino sive non
spinosa hortensis rubra, sive Ribes officinarum:
Ribes hortensc, Trag. vulgaris fructu rubro; Eyst.
Ribes vulgaris domestica, Matth. Cast. Ribes vul-
go, Ang. Bellon. Cæf. Vva urfi, Dod. gall. Ribesium
fructu rubro, Dod.

Germani nostri appellant Ribem Sant Johans
Tretbel/S. Johans Beerlini quod sc. circa divi Jo-
hannis Baptiste diem ad maturitatem fructus per-
tingant, Belg. Bessefens ouer zee: Gall. Grosfeli,
Grosfelles d'outrè mer: Ital. Vveta rossa: Hispan. Ribes:
Boh. Zahodi So. Jana: Hung. Apro tengori zolo,
hæc minor marina Vva.

Passim in hortis nascitur, eorundem pulvinis & Lacus
areas sepiens, florens Apriliac Maio, sub finem ve-
rè Julij quandoque; sepius verò Julio mense baccas
maturans.

Quæ de fructu Oxyacanthæ dicuntur, ea de aci-
nis Ribis quoque ferè intelligi debent. Exhibendi
sunt illi, Tragi consilio, ægris, qui ardentibus labo-
rant febribus, neque non his qui calidas alvi fluxio-
nes patiuntur. Namque hi acini sicut & Serapia & Sitis
eclegmata, atque Rob (ut vocant) de Ribes, sitim
immensam restinguunt, vomitiones siliunt, cibi
appetentiam invitant. Quidam Saccharo has bac-
cas condiunt sicut & Cerasa, quo pacto pueri vario-
lis, aliisque alvi calidis profluvii laborantibus ap-
primè conducunt. Baccæ Ribis in sole siccata, ad
easdem affectiones asservari poterunt. Reliquas
cum Oxyacanthæ easdem vires obtinet Ribes. Suc-
cus è baccis Ribes expressus, cum aqua Cichorii
aut Acetosæ confert ad febres ardentis & biliosa al-
vi profluvia, auctore Matthiolo, constringendo ro-
borat ventriculum, & iis qui cholera morbo affi-
ciuntur subvenit. Idem facit contra hæmoptysin,
cuma qua Portulacæ aut Plantaginis bibitus. Vvua
læ tumorem gargarisatus cum aqua rosacea cu-
rat. Fronti illitus, lachrymantes oculos adjuvat.
Dentes quoque vacillantes & gingivas corrobora-
rat. Folia vehementer adstringere testis est Fuch-
sio.

I

sus, Ribesij nostratis, ait Dodonæus, rubentes bacca, quarum usus & non aliarum est, frigida & sicca temperamento sunt, ordine secundo satis intenso, & cum partium tenuitate nonnihil quoque additionis obtinent. Ardores febriles restinguunt ac mitigant: bilem reprimunt, sanguinem contemperant; putredinibus adversantur; sitim vehementer sedant; ventriculi subversiones, & cholera morbum solum; dysentericis ex calida causa laborantibus utiles. Syrupus de Ribes conficitur, ut de Granatis, acidus, cui etiam facultate omnino respondet. A vulgo Monspeul, pluris fit, quod ibi rarior sit Ribes, quam Malum Granatum. Ribesium ad seipimenta utile, tum & ad topiarum scenas, quas non difficili opere convescit ac ornatur.

Putredines.

Dysenteria ex calida causa.

Syrupus.

RIBES VULGARIS ACIDUS, albas baccas ferens.

Deser.

Vulgaris similis foret, nisi cortice esset candidiore, floresque facile diffiluerent, ita ut sæpe remaneant paucissimæ bacca, ac etiam singulares. Sed & alia differentia est; bacca enim quamvis acidæ sint, alba tamen manent, pellucidæ, uniones penè referentes, ejusdem tamen cum vulgaribus magnitudinis. Hujus meminit Clus. hist. nomine Ribes vulgaris albo fructu, quem ait Hungaris incognitum. C. Bauh. apud Matth. dicitur Ribes baccis instar unionum candidis. Eid. pin. Grossularia 8. hortensis fructu margaritis simili; Ribes fructu albo, Eysl.

Synon.

Locus.

Montbelgardum Stutgardia ex horto Ill. Ducis Wirtemb. translata, ubi primùm observata est, flores & fructum fert eodem tempore quo vulgaris.

RIBES FLORE RUBENTE.

Deser.

Firmior hujus frutex est vulgaris, ac robustior, cortice rubescens vestitus; foliis hirsutis, ad tactum levibus, angulosis ut vulgaris, sapore tantillum acidis; longis florum racemis, quos Maio in horto Ill. C. Viri. Montbelgardensi profert, ferè palmariibus, figura ferè Vvæ crispæ floribus similibus, obsoleto rubore præditi, quorum simbria quinque partita albescit, sapore subacido.

An Clus. Ribes vulgaris 2. genus.

Synon. C. B.

An Clus. est Ribes vulgaris secundum genus amplioribus foliis & majore fructu, licet acidis saporis ut vulgaris; hujus enim flos variat, quia qui in vulgari herbacei coloris est, in hoc eleganter rubet & puniceus est. An huic similis quam Ioannes Boissot in horto Bruxellis alebat? Hæc Clusius.

C. B. pin. Grossularia 6. hortensis majore fructu rubro: Ribes rubro flore, foliis & fructu majoribus, Clus. pan. & hist. Ribes baccis majoribus, Cam. major fructu rubro, Eysl.

RIBES MONOCARPUS.

Vvæ crispæ rubro fructu.

Fructus singularis.

Intebat anno 1598 aliud Ribes genus ex Anglia acceptum ad Clusium Carolus de Tassis, quod Vvæ crispæ rubro fructu appellatione inscriptum erat. Postea tamen de Jac. Garci epistolâ Londino missâ fructum ferè intelligebat vulgaris similem, paullo majorem, confertim tamen in eodem pediculo non nascentem, sed singularem ut in Vvæ crispâ.

C. B. pin. Grossularia 7. distinctis baccis.

RIBES ALPINUS dulcis.



Ribes alpinus Deser. dulcis fruticat ut præcedens, tenui vimine, cinereo cortice connecto; folia ex albis ternis tuberculis, exeunt simul aliquot, cum floret, plusquam dimidio minora vulgaris Ribis foliis, Vvæ crispæ æqualia, in tres acutos angulos exeuntia, in ambitu serrata, lissimè hirsuta, superne atroviuentia, inferne lato virore splendentia, excurrente in angulos singulos

nervo satis elato, gustu subdulci, ex pediculis femuncialibus, hirsutis; flores ex tuberculis sisdem racematim coherant numerosi ut in vulgari, herbacei, sed floribus Ribis vulgaris magnitudini multum cedentes, foliis tamen quinque perinde & apicibus constantes, odore gratissimo; singularibus flosculis ad pediculum adnascitur foliolum concolor tenue & oblongum. Vvæ breviores quam vulgari; acini minis rubri, subdulces, ferè insipidi.

Gesl. h. est Ceanothi lævis genus sylv. Rusticis Red. becc. Eidem in app. Ribes sylvaticus. Lob. Obs. Ribes candidioribus foliis, acinis dulcibus. Lugd. Grossularia rubra, sive Ceanothi lævis genus circa sylvas Gesneri. Clus. Ribes genus quoddam, quod Austriacæ & Stiriacæ Alpes alunt, nihil vel minus à vulgari differens, fructu tamen non acido, sed dulci. Clusius, quod non silendum, iconem habet, qualem Lobelius pro Ribe Arabum exhibet, cum inscriptione, Ribes vulgaris fructu dulci. C. B. apud Matth. Ribes silvestris fructu dulci, aliàs à vulgari nil differens. Eid. pin. Grossularia 9. vulgaris fructu dulci; Ribes vulgaris fructu dulci, Clus. pan. & hist. Ribes minor fructu rubro, Eysl. Item, Grossularia 10. sive sylv. rubra: Ribes sylv. Matth. Gesl. app. Lon. Call. Cam.

Vidi Genevæ in monte Saleve, deinde in Thuri, ac etiam in montibus circa Basileam.

RIBES NIGRUM VULGO dictum folio olente.

Ruticat Ribes nigrum ceu vulgare, folia vitigena, lata, aversâ parte leviter pilosa, odore sætudo; flores ex eodem tuberculo plures, aut racematim digesti, Vvæ crispæ floribus persimiles, concavi; quinque foliolis rubentibus extrorsum reflexis, totidem surrectis pallidè virentibus, alternante cum quinque fibris concoloribus situ; stilis in medio viridis odor, qui & foliis, gravis; bacca oblonga colore nigro, quæ sive maturæ, sive immaturæ acidæ sunt, cum sapore partim grato, partim ingrato.

Ruellium de hac loqui existimo quamvis descriptio ejus non placeat, quæ sic habet: Non est omitterendum arboreum fruticem apud nos esse, quod

quo velut vivā sepe latiores horum areas, venu-
statis potius causā, quam munimentis, cingunt. Is al-
titudine ternū cubitorum inolefcit, & virgineā
fronde viret, supra modum asperā, utriusque lateri-
bus acuminatā, medio in mucrone desinente,
ambitū leviter fimbriato, satis ad Lupi salictarij, vel
albæ Vitis folium accedente; ramos fundit breves,
in quibus excusso flore primā baccule pendent
virides, ut in Ligustro racematim coactę, quæ ma-
turitatem adipiscētes nigrescunt, gustu & sapore pi-
peris, sed mitiuscu-
lo. Ex prorsus ro-
tundū Piperis faci-
ciem exprimunt:
verū desideratur
in eis retrorrida illa
rugosaque maturi-
tas; abest etiam illa
validior amaritu-
do; gustum Piperis
sapore complent;
& os, quibus anima
foetet, odoris ju-
cunditate commen-
dant. Piper olito-
res nostri nomināt,
quod atrum Piper
colore & sapore
forsitan æmuletur,
Sit ergo nostris Pi-
perastrum, quoad
melius vocabulum



invenimus. Vides itaque quā cæca sit harum re-
rum effigies.


Math. in Diosc. est Arbuscula piper racematim
proferens, Venetiis vīla, faciēque illius plantę
profus exprimens, quā vulgo Ribem appellat.
Et hinc mento appellatur Ribes nigrum. In epist.
ad Corneliū scribit, se audire quosdam Dioscori-
dis Amomum esse recensere. Sed quantas nescit
nugas, qui ut videatur singulare aliquid conspe-
xisse, Piperis plantam Venetiis in horto Maphæi vi-
gere fabulatur. Atqui si frutex ille Piper est, vel e-
tiam Amomum, ut alij sentiunt, parū aberit, quin
vulgare Ribes, vel Piper, vel Amomum (teste Gui-
landino) esse possit.

Cum Amomum (ait Lobel. in Adv.) doctos diu
exercuisset, & eos peregrina planta descisisset, no-
stram Ribes nigram opinati sunt, quæ vera non est.
Esse scribit Apollo quosdam [est Anguill.] qui Piper
silvestre Syrium, Pimento del Rabo Lusitanis vo-
catum, cujus plantę, tum Venetiis, tum Patavij
in hortis quibusdam visuntur, Amomum existi-
ment. Sed considerent docti, an Pimento del Rabo
non falsè existimetur fructus Ribis nigri, vīsi Vene-
tiis & Patavij, non autem plantę Pimento del Ra-
bo, sive Piperis caudati. Lon. Ribes silv. ingrati
odoris. Hadr. Amomum, Piper hortense ab holi-
turo gente dictum. Tigurensum quidam apud Ges-
quadrup. vocat Palmenstauden nimis communi
vocabulo. Is Pseudamomum esse conicit, cujus fo-
lia & ramuli Sabinam herbam aut felis urinam quo-
dammodo redoleant. Vocatur autem à Gesnero de
coll. Ribes silv. aquaticum, Sabinę ferè odore: de
hort. Ceanothus Ribes acinis nigris. Item Amo-
mum Anguillarę, Amomum falsum, Pseudamo-
mum, Piper quorundam. Eid. cat. Amomum, in hor-
us præsertim Gallię Piperis vocabulo olitoribus no-
minatum; Pfeffer mit blesser wie Schmärwurzt:
Piper obteres aliquibus Gallis vocatum. Cam. h. Ri-
bes baccis nigris, minoribus & majoribus, Eid. ad
Math. germ. Ribis silvestris quædam acipis nigris.
Dod. gal. Ribes nigrum, Groiselles n. ira. Bel. Schwa-
Tom. II.

te aelbesien. Lob. Obs. & Ic. ut & Tab. (cujus icon Tab. notat.
non in omnibus placet) Ribes nigra, schwarz, Je-
hans beer. Lugd. Mos live Oeflos niger Theophr. Mos sive O-
Grossularia nigra & alijs Pipirella, Officinis Ribes
niger, Gallis Pourrier & Groslier nigr; siuctus Gros-
selles noires. Clus. Ribes vulgaris nigro fructu, Vnga-
ris ignota. C. B. apud Matth. Ribes fructu nigro.
Eid. pin. Grossularia n. non spinosa, fructu nigro:
Ribes silvestre Trag. Thal. Ribesium fructu ni-
gro, Eyst. Frutex Ribi similis fructu nigro, Cæf.

Copiosè se multiplicat in hortis: Februarij prin-
cipio prorumpere incipit. Frutex Gesneri folijs Gros-
sulariæ hortensis in multis Gallię, Italięque locis in
hortis colitur. Tiguri spontè nascitur, circa rivorum
quorundam ripas, ubi facilè comprehendit transla-
tus in hortos, quem acinos nigros piperi similes in
calidioribus locis proferre aiunt, sed Tiguri, ni falli-
tur Gesnerus, sterilis est. Crescit abundè, si Camer-
hort. rectè meminit, in montanis Misinæ circa An-
nbergam, atque ibi venenati quidam istis baccis inef-
se asserunt, cum alijs in locis esui esse soleant. Sunt
qui folijs cibos condiant.

RIBES VERVM Arabum.



Ribes herba Desf.
Spica Celti-
cæ nascendi modo
aliquo pacto natu-
ram refert: liqui-
dem ea sub nive
ferè perpetuò degi-
git, folio Lapathi
acuti prædita, ni
grandius culget &
rotundius, & ad
Papyrus accedēs.
Baccas fert ex sinu
medio foliorum
rubras, ut in Lau-
ro Alexandrina,
Hippoglossio &
Rusco conspicimus;
septena ut
plurimum à radice
assurgunt folia, in
quorū medio flu-

ctus veluti racematim dependet, ex quo is fœcus
qui exprimitur, turbidus est lactisq; & albedi rem
habet; idèd aliquantisper fini & insulari decet, do-
nece clarescat & depuretur. Hactenus Bellonius, cui
lucem addent quæ ex Rauvvolfio paulò diversa Desf. Rau-
(est eandem videantur plantam ambo intelligere) G. v. l.
subjicimus: nolumus enim in planta non vīsa, alte-
rurum corrigendi provinciam sumere. De Ribe ergo
Arabum sparsim Rauvvolfius; Vera Ribes Ara-
bum, caules habet asperos, longitudine ferè cubita-
li, crassitudine pollicari, colore viridi, infernè (ut e-
tiam meminit Serapio) rubescente vel purpurascen-
te. Autumno in veni Septembri mense, sine flore &
semine, duobus tantum folijs præditum, tanquam
primū prorumpentibus, rugosis, rotundis, Peta-
lidis folijs æqualibus, ex pediculis crassis, brevi-
bus, quæ etiam grato illo acido succo, sicut & cau-
lis, plena sunt.

Sunt apud Serap. qui putarint Ribem esse, quā Synon.
Acetosam nominamus, & Lapatium: alij Gra-
rum acetosum quod asserunt ex Coracem. Illam
Rhazes inter fructus recensuit. Bel'oni is vult
(ait Matth. in post. comm. Ital.) Ribem Serapio-
nis esse plantam repertam in monte Libano. Planta Li-
bani

HISTORIAE PLANTARVM

40

Verum nescio quomodo possit convenire cum Serapionis descriptione cum notas non habeat, quas tribuit ei Serapio, rotunda folia, capreolos, & arborem esse. Hæc ille. In meo quidem Serapione, arboris nulla fit mentio. Fructus est racemosus, ut scribit Bellonius: capreolos verò habere manifestè scribit Rauvolf. ad iconem, qui folia rotunda, & ipse Bellonius, rotundius Lapathò dicit. Card. var. lect. Ribes verum Bellonij in Libano. Rauvolf. Camer. ad Math. Germ. & Lygd. in app. Ribes Arabum. Clus. hist. (qui libenter acquiescit sententia Rauvolfij) Ribes legitimum. C.B. pin. Grossularia 12. Ribes Arabum foliis Petasitidis: Ribes Serapionis, Cam. h. An idem cum hac, Ribes Serapionis foliis Oxylapathi, Bellon. de coniferis, Dod. & Lug. In Libano nascitur, si à Cedris paulò altius usque ad præcipitum montis scanderis. Halepum reversus Rauvolf. agnovit in Offic. Rob de Ribes ex veteri nomine & acido sapore. Non parva ejus ibi quantitas apparatur, aliò etiam mittenda, in primis verò ad Turcicum Imperatorem.

Ribes Liban.

Ribes legitimum.

Lacur.

Vires, & recuperamentum.

Merbilli.

Ribes Serapionis frigida & sicca est ordine 2. Ex capreolis contritis exprimitur succus, qui coctione inspissatur. Ventriculum refrigerat, roboratque, corfer cardiacis; sitim restituit; fluxum ventris biliosum, & vomitum compescit, appetentiam excitat; utilis in morbillis & variolis; adversus hæmorrhoidas & ebrietatem. Sapa de Ribes stomachum calidum confortat, autore Mesue, vomitum colericum sedat, sitim extinguit, cordis ebullitionem mitigat, & ipsum confortat, biliosam vomitionem, seu fluxum colericum sedat, & alterat.

AN RIBES RAVVOLFI, AUT illi congener plantæ?



Ribes plenum ea congener

Icon Rauv.

Inter plantas, quæ in sporulis Doctoris Colij, sive Coolmans repetæ, unam etiam conspicebam (Clusij verba sunt Exot. lib. 4. cap. 21.) quæ licet mutila, nec integra, mihi in memoriam revocabat ea, quæ in Cl. V. Leonard Rauvolfij Itin. Germarico sermone conscripto arte aliquot annos legeram. Is enim lib. 2. cap. 11. mentionem facit ejus plantæ quam Arabes appellant Ribes, ex qua Rob

de Ribes conficiunt, cujus magnam copiam è monte Libano delatam in Iudicis Halepani horto videbat, ad Rob illud conficiendum, quod deinde Constantinopolim esset alegandum. Et cap. sequente ejusdem libri, Ribes plantam numerat inter eas quæ ab ipso in monte Libano fuerunt observatæ. Libro autem quarto, qui seorsim postea fuit editus, & Plantarum figuras additis nominibus dumtaxat continet, ejusdem Ribes primum è terra emergentis iconem exhibet, bis solummodò iclus præditam. Cogitabam itaque apud me, an illa, quæ inter chartas conspicebam folia cum supræ caulis parte, ad Ribes Arabum plantam referri possent (venisimile enim est, pluribus quàm in monte Libano locis nasci, quandoquidem apud Medicos Arabes fre-

quens est ejus mentio) aliquot enim notas habere mihi valebantur non valde diffimiles illis, quas suo Ribes Rauvolfius tribuit, veluti foliorum formam, ta. n. l. Petasitis, quibus Ribes folia comparat, foliis longè inferiorum, nec ad orbiculatorem, ut ille Ribes folia pingit, sed mucronatorum, deinde ultimam caulis abrupti partem quibusdam folliculis præditam, iis ferè similibus capreolis, seu verticillis quas Ribes plantæ adpingit. Quum verò & folia, & caulis illa extrema pars valde sicca essent, nihil mirum, si aciditatem, quam fortè habuerit, in illis deprehendere non potuerim: nihil tamen asserere volo, sed meam opinionem dumtaxat dubius profero.

Quæ porro in regione eam plantam observasset & legisset Colius, nihil in charta quæ folia involuta, erat adscriptum, nec quidem an aliquo in usu apud incolas esse compescisset. Operæ pretium tamen me facturum existimabam, si mutam plantam qualein conspicebam, in tabellâ exprimentam curarem, quæ hic adponeretur. Cæterum, illorum foliorum quorum picturam hic damus, non nulla orbiculans pænè erant formæ, hoc est, quinque uncias longa, totidem lata, præsertim infimâ parte, pediculo cui videlicet inhærebant, proxima, summâ verò & aliquid tantulum mucronata; alia, tamen ejusdem longitudinis & circa pediculum latitudinis, sensum tamen in mucrone aspicebant, nec ad sphaericæ forme erant, sed Hederae folium angulorum expers, aut Còvolvuli majoris quodammodo referebant, ejusdemque formæ unum inter reliqua conspicebam, cujus longitudo sex unciarum erat. Porro non valde densa sive crassa erant ea folia (nescio an siccitate id accidisset) & supinâ parte quandam viridem colorem retinebant, pronâ autem, ex albo nalescebant; & pediculis binas uncias longis nitebantur, à quibus nervus prodiens per medium folium secundam longitudinem protendebatur, & ab illo deinde alij minüs tumentes nervi inæquali situ oriebantur, ex utroque latere quini aut seni, qui ad folij oras usque excurrentes, intermixtis multis obliquis venulis, magnam gratiam folio conciliabant: summi caulis abrupta pars, teretes quosdam & oblongos folliculos inter folia proferebat, sed eos, ut mihi quidem videbatur, pro vellos & recentiores, oblique inanes & siccos, ut facillimè confringeretur.

DE SAMBACH SEV ZAMBACH, & Isaminò quædam in genere. C. A. P. III.

Zambach multis (& verius meâ quidem opinio- Acquisita. re) dicitur de Gelsemino, ut Ang. Dod. gal. Lob. Adv. Math. Cam. h. Clus. & Bellonensis, qui scribit Zambach absolute sumptum, esse Lihum album. Gelsemi tamen in cat. credit Arabes per Zambachum intelligere Violam [Leucoium] quod non placeat. Præterea hist. quadrup. Virgilij Cassiani esse putat, arbutus gratiam. At consideratis iis, quæ de Cassia scripsit Virgilius, non video quomodo conveniat cum ea. Verba autem Virgilij posita sunt capite de Cassia poetica. Idem tandem loco proxime citato pro Nerfin Iseliminum vulgò dictum, aut Leucoia potius, quam ullum Rosarum genus usurpare mavult. Nos tamen dicimus Rosam moschatam melius convenire cum Nerfin quàm Iseliminum.

Sunt qui pro certo sibi persuadent Isaminum unguertum Dioscoridis ex floribus fieri, quos in Italia Gelsemiri vulgò appellamus, inquit Matthiolus. Quorum opinioni non parum suffragantur tum Helmo- Quorum opinio- ra nostratem Gelseminum comprehendisse videtur, cujus sententia nò probanda. Gelseminum differre à Leu-

à Lercoio abunde ostendit Serapio, qui alterum ab altero diversis capitibus distinguit. Nec de Gelseminio agens cap. 176. ulla in Diosc. aut Galeni auctoritatem addit. Credimus ergo Diosc. ceterisque veteribus incognitum. Caterum Arabes Gelsemin appellaverunt, ita nostri vernacula eorum lingua Zambach sive Sambach, vocitur. Additidem in com. Ital. cap. 63. Gualterum Germanum Argent. manifestè errasse qui existimavit Diosc. intellexisse de vulgari Gelseminio. Matth. olim in Diosc. meminit ex Serapione, Gelseminum floribus albis, cum luteis, tum caruleis reperiri, quale etiam se vidisse ait. Modo autem in post. com. dicta de diversis coloribus Gelsemini omittit, quasi ante scripserit non visa.

Iasme porro Dioscoridis non esse Gelseminum comprobat Lob. in Adv. dicens. Concinniore quàm certiore ascrivit sibi Gelseminum vulgatus flore albo appellationem de sententia doctorum, quibus Iasme dictum putatur, quasi Viola odora, quia solitum esset istius floribus oleum apud Persas imbui, quod tamen gravior spirat, eoque arguit, non esse nostrum Gelseminum. Et Viola latior significatio multò est, quàm ut certam quampiam plantam designare valeat, nedum hanc quam Mauritani Zambach & Gelseminum dicunt. Gelseminum vulgare Cæsalpino videtur Diosc. Similax levis esse: qua nvis Diosc. odorem floris subituerit.

Iasminum [douron] quasi violaceum, à Violis quas ita vocant; vel Iosme quasi Violæ odor; aut Iasne quasi medicatus odor. Sambach & Zambach Arab. quibusdam Apiaria, quòd apes ejus floribus plurimè inde tentur. Ger. n. Deyelraben: Gall. Iessmure: Ital. Gelsimino. Amata mænos & calidos tractus habetque in viridariis & hortis.

Avicenna lib. 2. Canon. tract. 2. cap. 619. de Sambacho, Iasmin alba est calidior citrinà, & citrina purpurea; & est universaliter calida sicca in secundo. Est subtilitativa humiditatum, & confert senibus ejus oleum. Delet panum quod ex ea humidum, & quod ficcum, & facit possidere citrinitatem multitudine odoramenti ejus. Ejus oleum confert ægritudinibus frigidis in nervis, & senibus. Ejus odor facit soda: vetur tamen cum hoc resolvit soda factum à phlegmate, quando odoratur: & purum oleum ejus facit fluere sanguinem ex naribus calefacti, cum ipsum odoratur. Serapio de temper. simpl. cap. 176. de Iesemin quod est Zambach tradit ex Isaac eben amram, esse quoddam ex eo album, habens florem, & quoddam citrinum, & citrinum esse minus in operatione sua, & citrinum reperiri in Babylonia. Quàm teratur humidum aut succum, & ponatur super impetiginem aut panum, expelli eos, & resolvere omrem superfuitatem frigidam, & conferre habentibus catharrum, & inducere dolorem capitis illis, qui sint calidæ complexionis, & oleum ejus esse juvativum in hyeme. Sed si calidus aliquis in complexione odoret ipsum nimis, timendum esse ne faciat fluere sanguinem ex naribus ejus. Esse etiam speciem aliam ex ea, cujus flos sit caelestis coloris. Idem ex Aben mesuai ait esse calidum in principio secundi gradus, conferre humiditatem & phlegmati falso, & seribus frigidæ complexionis, & conferre doloribus quæ fiunt à phlegmate viscoso. Ex Mesurugia folia Iesemin humida aut sicca poni docet super impetiginem aut panum, & auferre eos.



coëuntibus viticulis instar caudicis.

Sunt apud Lugd. docti, qui Pothon album à Synon.

Theophr. lib. 6. hist. cap. 7. memoratum, Iasminum album putant; Dendrium veritè Gaza. Plinius sic interpretatus est: Sed maxime spectabilis Pothos, alterum candidius. Avicen. Zambach, Sambach, vel Iasmin alba. Isaac eben amram apud Serap. Iesemin sive Zambach album. Hermol. Ieseminum flore candido, & Viola Persica, Parthica & peregrina. Viola Pers. Ieseminum Marcello. Geln. h. Iasme floribus albis. Lob. Adv. Gelseminum vulgatus flore albo: Obs. & Ic. Gelseminum vulgatus. Cæf. Gelseminum floribus candidis. Cam. h. & epit. Gelseminum sive Iasminum, Zambach Arabum flore albo. Tab. Ger. Zambach Arabum. Lugd. & C. B. Iasminum album; Miror Tabern. & asseclan ejus Gerardum pro Iasmino caruleo ponere eandem figuram, quæ albi, ac etiam pro Iasmino luteo, cum luteum differat formâ. Caruleum nulum vidi, nec invenio, qui intuitus sit, quamvis ejus mentio fiat apud Matthiolum & post. illum apud alios. Iasminum primum Anguill. Iasminum Cord. in Diosc. Dod. Clus. Cam. apud Matth. C. B. pin. Iasminum sive vulgatus flore albo: Apiaria. Dod. Iasminum fl. albo Eyt.

Lobel. ubi vis in hortorum angulis apricis & pro prædiorum cavadiis furculo pangitur, adque ornamenta pergularum, pedamentis erigitur ad fornices. Cæsalp. floret post Rosam diutius è singulis foliorum alis. Fructum apud nos nequaquam perficit. Hyeme amittit folia.

Iasminum album sicut odore flagrat, ita & viri- bus multis pollet. Oleum ex hujus floribus confectum crudos discuit humores; frigidis ac catharrois confert, & hyberno utile tempore. Quibus autem temperatura contigit calidior, his dolorem excitat capitis, & si diutius odoretur, periculum adfert sanguinis & narium profluvij. Præcipua olei è floribus utilitas ad contractos, induratosque artus, articulos, tendones, nervosque calefactos, emollit, aperit. Vteri morbos arcet, non solum hypogastrio & locis muliebribus illitum, sed etiam potu aut enecinate usurpatum. Simili modò prodest & doloribus colicis quos frigidus & viscidus humor concitavit.

IASMINVM HISPANICVM FLORE majore externè rubente.

Consimiles progressus & incrementa habet cum Iasmino vulgato, sed omnibus modis concinnus est; foliorum conjugationes tres quatuorve cum extremo impari alam complent, at singulatia folia ex oblongo rotundantur non in mucronem.

IASMINVM SIVE GELSEMINVM flore albo.

Longissimis & lentis, licet tenuibus viminibus, & nisi sustententur appositis pedamentis, pro- Tom. II.


vulgati more desipunt, usque latiora, propius ple-



Synon.

liniunt extrinsecas uteri partes. Vtuntur quoque eo exteriis irurgentes thoracis regionem, tum per os ipsum cahdum bibentes, ad tussim, anhelitumque diu, culatorum, & ad leuitum lethalem, in quatuor maxima cum difficultate educitur, & ad peripneumoniam, atque ad dolores vehementes stomachi, intestinorum, atque uteri. Parant hoc nostri unguentarii ex dulcibus amygdalis atque c. a. mi feminibus, ex quibus odor florum lesmini imbutis oleum expriment valde odoratum.

IASMINVM SIVE GELSEMINVM luteum, & caruleum.



Iasmini vulgati ti. Descri.

Iu fructicat, virgultis viridatibus, angulosis, striatis, in quibus folia, aliis terna Polemonij Monspelier sium, n. tu, sed acutiora, firmiora quam in albo, interdum duodecuplo maiora, ad Trifolij bituminosii culti folia magnitudine accedentia, aliis vero pinnata ex una duabusve conjugationibus costae annexis, impari semper ur o alam claudente: flores eo ordine & situ quo in Iasmino sive vulgato, sive Hi-

spanico, foliis obtusis, luteis. Fructus mediocriter magnitudinis, niger, oblongus, bina continet semina magna, nigra, oblonga, qua se mutuo spectant planar, altera parte modice gibbosa.

Lob. Adv. Gelseminum luteum. Eid. id. & Tab. Synon. Iasminum luteum, Geel Veyel Râben. Quem quis quæso cum ejus imitator Gerardo excusabit qui Tab. ex C. ratis la. p. 100. pro non viso Iasmino luteo ex sola phantasia ponit albi iconem. Ang. Gelseminum flore luteo. Gels. h. Iasme, Iasminum luteo flore, quo nomine Eyf. & C. Bauh. id apud Matth. nominat, qui seorsim Ieseminum vel Gelseminum luteis floribus inscribit. Eid. pin. Iasminum 2. humilior luteum: Gelseminum humilior alterum fl. luteo, Cæf.


Pfortzheimia in horto Grienningeri, qui hieme tegit, adhuc viret Novembri: Argentina floret Julio & fructum maturat Octobri. Patavina & quidam Gallica vireta habent florens in æstate.

Iasminum caruleum nondum vidimus: An Arabica Ligustrum orientale, quod alijs Syringa caruleum. Iasminum caruleum, Tab. Ger. Iasminum 4. caruleum Serapioni, C. B. pin.

PAVATE ARBOR FOLIS MALI aureæ. CAP. IV.

Frutex est non admodum ramosus octo aut novem pedum altitudinis, cui rara sunt folia, Mali aureæ minoribus foliis similia, excepta appendice qua carent, utrimque eleganti virore prædita: flos exiguus, candidus, quatuor foliis præditus, è cujus medio exit alba fibra cuspidè viridi insignis, odore floris Periclymeni, cui procul aspiciendus persimilis

IASMINVM SIVE SAMBACH Arabum, Alpino.



Descri.

Ealis.

Flores.

Vires et us.

Oleum.

Tumores uteri. Partum in qat.

Vfus florum est magis ad ornatum corporis, quam ad sanitatem: nihilominus parant oleum, quo utuntur mulieres in balneis ad uterum calefaciendum & laxandum, ejus enim scirrholis tumoribus maxime conferre expertæ sunt, ut partum etiam in illo rem reddant, oleum hoc & bibunt caldum, & ipso

milis videtur, rotundum semen, lentissimi magnitudinis, ex vitæ nigricans, & ubi maturerit, nigrum. Caudex & rami cinerei sunt coloris, radix alba & insipida, cum nonnulla tamen amaritudine, odoris propemodum expertus.

Acost. de arom. autor est dici, vulgò in Malabar

Pavate, à Brachmenis & Canarinis *Vasaveli*; Lusitanis *Arbol contra los erisipelas*, h. e. Arbor erysipelas curans. Lugd. Pavate Acost. C.B. pin. Arbor Malabaricum fructu Lentifici.

Tamet si utilis sit hæc planta adversus alvi profluvia, quæadmodum Macer & Coru, cum illis tamen minimè comparari potest, quædoquidem imbecillior est itaque qui jam dictas novit, ea haudquam utetur in alvi profluvio, at in curando omnis generis duntaxat erysipelate, & eo præsertim quod è merâ bile ortum est. etenim insigni virtute adversus hunc morbum pollere deprehensum est. Teritur & maceratur hujus plantæ truncus sive radix orizæ decocto (Canais vocant) aliquot horis quiescere finitur ut acescat hæc aqua, erysipelas deinde ea inungitur bibendaque propinatur sufficiente quantitate bis in die purgato prius ventriculo. Eadem ratione præbetur radix orizæ decocto macerata iis qui jecoris inflammatione laborant & febrium ardoribus, addito autem succi foliorum Tamarindi momento vulnere labia circumquaque inungi solent ad inflammationes prohibendas, & humorum defluxus cohibendos. Quoniam verò iis in provinciis multò majore quantitate Pavate quam Coru crescit, incolæ eo utuntur.



Pavate.
Vasaveli.
Arbor ery-
sipelas cu-
rans.

Pinea.

Erysipelas.

Radix.

Inflamm.
acoris.

CLYMENVM VETERIBVS.

CAP. V.

Clymenon
Diof. **D**E hoc ita Dioscorides differt. Clymenon caulem profert quadrangulum, seu Fabæ, folia Plantagini similia; folliculos verò habet supra caulem ita dispositos, ut alter in alterum propendeat, velut in Iride ac polyporum cirris. Hoc alij inter notha Dioscoridis Calycanthemon vocant, alij Periclymenon, alij Heliophyes, quasi folis plantam. Nonnulli Hepatitum, alij Smilacem, alij Anatolicum, alij Pyticum, alij Merginem, Latini Volucrum, seu Volucrum majus. Egyptij Oxivi, Clymenon, alij Clymenium, & Agonon (quod sterilitatem inducat) quamquam id Periclymeno magis convenit) nuncupant.

Clymenos
Plinio. Plinio Clymenos herba à rege appellata est, Ederæ foliis, ramosa, caule inani, articulis præcincta, odore gravi, & femine Ederæ, sylvestribus & montosis nascens. Græci plantagini similem esse dixerunt, caule quadrato, folliculis cum femine inter se implexis, velut in polyporum cirris. Succus in usu vi summa in refrigerando. Et albi. Pericordis & ilibus utilissimum Clymeni semen potum diebus 30. pondere denarii in vino alio. Hoc in loco Plinius Clymeno peperam illa omnia reddidit, quæ Dioscorid. & Gal. (qui hujus nusquam meminit sicut nec post

Plinij L.
Plat.

ipsum Paulus) Periclymeno assignarunt. Quam re quidem Theophrastum secutus est, scribentem: Im-
Theoph. re-
stantur. potentes facere posse creditur, qui fructum [*το ξυμ-
περον, sem. in Gaza.*] Clymeni [*το ξυμπερον, sem. in Gaza.*] collectum modo sextarii triginta assidue diebus, portionibus æquis biberit ex vino albo. Sic enim penitus sterilecere hominem aiunt, si potionem absolverit. Gaza æquivoco vocabulo usus est; Volucrum interpretans, eo tamen nomine Periclymenum Dioscoridis se intelligere demonstrat. Is Theophrasti *Aoplu* lib. 2. de caul. cap. 25. etiam Volucrum interpretatur.

Clymenon describi aliter à nostris (ait Hermol. coroll. 622.) quam à Græcis Plinius affert. Nam quod is de Clymeno prodidit, Dioscorid. Periclymeno vocatæ tribuit, & descriptio nostrorum de Clymeno, Periclymeno ferè convenit. Cur quælo Hermol. descriptione nostrorum vocat, quam hoc in loco se prætexisse scribit. Plinij ea est, nec ullam aliam prætexit. Si quis præterea consideret, quæ cap. seq. adfert, apparebit eum nullum tradere discrimen, inter Clymenum primum Plinij & Periclymenum Dioscoridis. Ruellius quæ recitat partim ex Plinio, partim ex Hermolao transcribit, licet more suo eos silentio præterire non erubescat.

Ex hæcenus dictis igitur constat Clymenum dici à Plinio d. Periclymeno Dioscoridis, id quod Hermol. & Matth. attestantur. Clymenum Cortusii [*La-nun-
thym sativum*] Lactifolium, seu *Clymenon Matthioli*, Lugd. bellè satis Clymenum Dioscoridis imitari videtur Matthiolo: de hoc hist. nost. lib. 17. de Lathyro *Lathyrus*, majore flore tractabimus. Clymenum Ruellij, *st. mator.* Scrophularia secunda Dod. Ocimastrum Tragi, seu *Scrophularia* Betonica aquatica Septentrionalium, perperam quibusdam Clymenum Dioscoridis creditur. Ad Scrophulariam majorem (de qua lib. 28.) Clymenum Ruellij referendum existimo, vereor tamen ne citatæ tribuat quædam, quæ ad Saponariam pertineant. Clymenum (inquit Matth.) non est Saponaria vulgò dicta, ut voluit Ruellius. Sed fallitur Matthiolo. Ruell. per Clymenum suum non intellexit Saponariam, de qua ipse scribit.

Clematis alteram minorem longifoliam Lobelii, quidam apud Lugd. Clymenum esse arbitrantur. de hac poltea agemus, sub titulo Clematis flore leuco caruleo, surrecto.

Ceterò, probatissimum Clymenon est, autore Dioscoride montanum. E frutice toto cum radice Virer. succus exprimitur, qui ad sanguinis rejectionem in potu efficax est, itèmq; ad cæliacorum profluvia, rubentemque fluorem muliebrem: quippe qui astringat simul atque refrigeret. Sanguinem quoque naribus erumpentem supprimit. Folia trita aut folioli, si vulneribus recentibus imponantur, cauta efficaciter sanant, ut etiam ad cicatricem perducant.

PERICLYMENVM VETERIBVS.

CAP. VI.

Periclymenon
Diof. **P**ERICLYMENON, ex Dioscoridis sententia, frutex est exiguus ac simplex, habens ex intervallis foliola caulem amplectentia, subcandida, hederacea, ac inter ea nascencia germina, in quibus semen Hederæ; florem candidum seu Fabæ [*αυτοειδος in me-*
dio ver.] aliquantulum rotundum [*αυτοειδος, que vox in ald. deest.*] & quasi [*αυτοειδος in orbem addit vet.*] in folium procumbentem; semen durum & quod difficile evellatur: radicem crassam [*αυτοειδος in orbem addit vet.*] ac rotundam. Hæc sic paulò aliter Plinius. Periclymenos fruticat & ipsa, ex intervallo duo folia habens, subcandida, mollia. In cacumine autem semen inter folia du-

Periclymenon
caprifolium

Caprifolium
Matrisfolium
Periclymenon

Legum.

Virg.
Wijn.
Lien.

Seritidis.
Febres.

Ex Galeno
tempera-
mentum.

Ex Plinio.

Ex Plinio.

Marcelli
error.

Diser-
ven-
perfoliatum.

rum, & quod difficile evellatur. Considerans, quæ Hermo. præcedenti cap. de Clymeno scripsit, observabit facile eum Clymenum primum Plinij idem facere cum Periclymeno Dioscoridis. Dicit enim in Clymeno de Periclymeno actum est, quod nunc Caprifolium [perperam esse Corn.] & Matrisfolium vulgò [officin] appellatur. Cæterum id maxime Matthiolum ad credendum impellit, vulgatam Matrifoliam esse Periclymenon, quod non solum omnes hujus ætatis rei herbaria peritissimos in hanc sententiam devenisse compererit, sed quod etiam ex notis, quas illi reddidit Dioscorides, ita esse cognoverit. Periclymenon, inter Diosc. nota, aliqui Ægine nomen latere à capris [satis] alij Clymenon, alij Carpathum, alij Splenium, alij Hepatitin, alij Helxinen majorem, alij Clemantin, alij Myrsinen, alij Calycanthemon, Prophetæ Pileum Venetis, Ægyptij Turcum, Romani Volucrum majus, Aphri Lanath appellant.

Nascitur in arvis ac sepibus autore Diosc. convolvens se propinquis fruticibus, adminiculis quibuscunque, Plin.

Semen postquam ematuruit collectum & in umbra siccatum, si drachma pondere ex vino bibatur quadragenis diebus, lienem absumit, lassitudinem discutit, & orthopnoæ atque singultui prodest: sed urinas cit statim è sexto die cruentas. Idem partum quoque accelerat. Sed & folia iidem sunt prædita viribus, ac tricenis septenis diebus epota sterilitatem in viris facere produntur. Eadem, si ex oleo perungantur, febrium circuitibus redeuntium horrores abigunt.

Periclymeni ex mente Galeni, utile est & semen & folia, siccandi simulque calefaciendi vim habentia, adeo ut etiam urinam cruentam efficiant, si diutius bibantur. In principio tamen solum urinam cient. Si verò foris cum oleo illinantur, calefaciunt. Semen autem etiam siccatur. Et quidam tradunt si amplius bibatur, omnino effici ut bibentes non gignant. Quidam etiam certum diem tempus præhæniunt tali potioni: quemadmodum & Diosc. septem & triginta dies. Hoc etiam urinam cruentam reddicit à sexto die. Semen Periclymeni, ait Plinius, in umbra siccatum tunditur & in passillos digeritur. Hi resoluti dantur in vini albi cyathis tribus, tricenis diebus ad lienem, eumque urinam cruentam, aut peralvum absumit: quod intelligitur à decimo statim die. Urina cient & folia decocta, quæ & orthopnoicis profunt. Partum quoque adjuvant, secundasque pellunt pota simili modo. Dictum artea est, Plinium aperte Clymerum cum Periclymeno confundere. Nam quæ de Clymeno tradit, ad Periclymenum pertinent: quæ verò ex Græcorum sententia scribit, ad Clymerum Dioscoridis spectant. Et in hoc sequutus est Theophrastum, qui & ipse Clymeno adscripsit, quæ Diosc. de Periclymeno prodidit. Illius sententiam sequutus quoque Marcellus à vero aberrat. Etenim magnum est utriusque herbarum discrimen.

PERICLYMENON PLVRIMIS, SIVE Caprifolium duplex, perfoliatum, & non perfoliatum.

Hujus radix lignosa, reptatrix, teruis, cum suis radnatis; flagella plura, altera epis indiga, tenuia, longa, lignosa & in ramulos partita, sursum repentia, cauliculis & geniculis intercepta, leviter pilosa; folia ad genicula ex intervalis bina longiuscula & acuta, mollia, dilute virentia, in fiore tamen parte magis incanescunt: flores in summis ramulis complures panter emicant, oblongi, amarissimi, suavi odore, lubæ bellicæ directæ aut promiscu-

similes ex corniculato argusto principio in latius

PERICLYMENVM NON PER-
foliatum.



PERICLYM. PERFOLIATVM.



nascitur acinorum Sambuci magnitudine colore rubro, dilutiore, ut ait Dodon.

Meminit Periclymeni Pandectaris, qui quidem Periclymenon nullum ejus discrimen tradit, sed in genere delineat his verbis. Matrifolia latine, græcè Splenion, vel Splenaria, vel Lienalis, vel Periclymenos. Herba est, cujus folia ex altero laterum subalbida, & ex altero subviridia; se involvens & adherens lapidis; cujus fructus est magnitudinis Cubebarum in principio viridis, & cum maturuerit citrini coloris tendentis ad rubedinem positi ordinariè, & conclusi in duobus foliis simul conjectis, existentibus in capiibus stipitum juxta eum.

Matris sylvæ nomine (inquit Cron. in comp. Matrifolia) insignivit Periclymenon Græcorum Scrib. Largus, quam luculenter ex veteribus Dioscorides & Plinius aperuerunt, & Gal. 8. simpl. Volucrum majus quoque appellat, Pandectaris quoque Caprifolium nostrum declarat: nam notæ cum Periclymeno veterum satis conveniant: unde doctissimis idem sonant, si Matthiolum & Amatium excipiamus: nam ij Caprifolium Pyxacar tham afferunt. Mesue inter Volubiles tertæ speciei ostendit.

or. ficum fastigiatas, laciniatæ simbrae ligularumque pulchritudine spectabiles & rusca, i. stam. tribus al. quot è medio excurrentibus; color albus ac interdum flavescens. Fructus acinis Sambuci similis conglomeratus, per maturitatem rubens, in quo semen duriusculum; succo abundans acini saporis ingrati.

Alterum genus perfoliatum (perfoliatum) Nardoneense quale in horto habemus à præcedenti vulgari in Germania differt foliis penè glaucis rotundioribus &

pediculis brevissimis, quorum quædam sunt sepe corvinia & à viticulis trajecta pertusave, suprema autem accetabili instar modicè concava, sapore subagri; ex quorum cotyla flores prodeunt præcedentibus similes ananissimi, suavi etiam odore, colore ex purpurea albescente aut in luteum languescens, superioris similes, breviores tamen ac paulo minores Dodon. ex tubulo eminet stammina albidia. Semen glomeratim

Hermol.

Clymenos
Plinij 1.
Periclymenum Romanorum.
Hermol. in Diosc. vocatur Clymenos Plinij prima, Periclymenum Dioscoridis. Ruell. Car. Steph. in coll. & Fuchs. Periclymenum Romanorum, Volucrum majus, Periclymenos Plinij: Sylva mater Scrib. Largi: Caprifolium & Matrifilva vulgi, licet Caprifolium ei, quam Matrifilvam vocant, teste Cornario partim respondeat.

Caprifolium non est Matth.
Sunt (inquit Matth.) qui Periclymenum perperam Caprifolium appellant; Officinæ Matrifilvam vocant: Italici quia in sepibus & frutetis nascitur, adeo ut sæpe tam pertinaciter inhæreat ligetque adimnicula, ut in ea imprimat vestigium, meritis Vinciboscis dicitur. Planè hallucinantur ij, qui Caprifolium, & Matrifilvam seu Periclymenum idem esse existimant, in quorum numero esse deprehenduntur Ruell. & Fuchsius (in post. comm. non Fuchsium, sed Manlium accusat). In hunc autem lapsum hos fortasse deduxit Matthæus Sylvaticus Pandectarum autor. Siquidem is iusdem Caprifolium Matrifilvam nominat, cum tamen, ut subinde legitur, nil aliud Sylvatico Caprifolium fuerit, quam Dioscoridis Pyxanthæ, seu Lycium, non autem Periclymenum, de quo seorsum sub titulo Matrifilvæ Sylvaticus ipse disseruit. Quod fortè non animadvertentes ij, Caprifolium & Periclymenum idem esse putarunt. Ruellium autem, simul ac Fuchsium lapso, falsè concludit Matthiolus, quum vulgò atque recentioribus herbariis Caprifolium vocatam asserant, nec propriâ sententiâ id statuunt: ipse autem affirmat Matrifilvam (repetens verba Dioscoridis sicuti & cetera in sua ejus descriptione) semen prædurum & quod difficilè evellatur habere, caule & radice simplici, quæ an manifesta sint in Matrifilva aliis judicandum relinquitur. Matthiolus sua icone exhibet Periclymenum perfoliatum.

Vinciboscus. Error multorum.
Dod. gall. Periclymenum in hist. duo ejus genera tradit. Vnum Caprifolium germanicum, alterum Caprifolium Italicum; utrumque fruticem amplexicaulem, in vicinis adminiculis sese circumligantem. Porro Sylvaticum reprehendit qui dixerit Lycium vocari Caprifolium & Matrifilvam. Ejus verba hæc sunt: Matthæus Sylvaticus Caprifolium & Sylvarum matrem cap. 137. rectè quidem Periclymenon, sed perperam Lycium & Pyxantham interpretatur, Periclymenum cum Pyxanthâ ineptè cōfundens, pejus uerò etiâ facit Caprifolio vires Pyxanthæ ascribens. Sed cap. 137. Matrifilvam Periclymenon & Caprifolium rectè asserit ac legitimis ei ex Diosc. vires refert.

Lycium.
Matth. re-feratur.
Diosc. bis videtur Vinciboscum plantam describere, ait Cæf. Periclymenum, modo Cyclaminum alteram vocans. Periclymeni descriptio in cæteris quidem congruit exceptâ radice, quam dicit crassam & rotundam. At Plinius radicis non meminit cum in cæteris cum Diosc. consentiat. De altera autem Cyclamino inquit Diosc. folia fert Hederæ minora, &c. Vbi eadem proflus faculatas leguntur, quæ in Periclymeno. Affert quoque Plinius alterius Cyclamini descripti nequaquam diversam à Diosc. enarrationem. Ex quibus patet prædictam plantam magis convenire cum altero Cyclamino ob fructus molliorem & radicem supervacuatam. Si igitur eidem accommodari possit Periclymenum, & fructus durities de semine intelligatur, aufferaturque conditio radicis rotundæ, & crassæ, error erit in repetitione ejusdem diversis nominibus. Probabilius igitur dicendum videtur legitimum Periclymenum adhuc non comperitum esse, non tamen à prædicta planta multum differre. Plinius alibi Clymenum vocat.

Matth. Verba Dioscoridis recte.
Icon Matth.
Clyth. hisp. & hist. Periclymenum vulgare, duplici genere consistit. Illud quod in Septentrionalibus nascitur, extremis ramis multos flores, odoratos admodum & rubrum fructum in unum caput co-

Periclymenum perfoliatum.
atum profert; alterum quod in calidioribus regionibus, veluti Italia, Hispaniâ, & Narbonensi Gallia crescit, est latioribus foliis & binis aut ternis acetabulis extremos ramulos ambientibus, in quorum singulis seni plerumque flores exoriantur præciores & minus odorati quàm in priore, quibus succedunt bacce ferè puniceæ.

Pandect. re-fero.
Cam. ad Matth. Periclymenum perfoliatum: de hort. ait, Periclymeni. Matrifilvæ vulgò, sive Caprifolij radix etiam Dioscoridis descriptioni repugnet, nihilominus tamen ex Crateva & Orisabo affirmatur convenire, qui dicunt radicem esse densam & longam. Hujus generis habui elegantissimam stirpem ex orto Ill. Princ. Landgravij Hassiæ V Vilhel. Periclymenum perfoliatum sive Italicum flore odorato vocatum.

Lycium.
Periclymenum Hermol. Ruell. Carol. Steph. in Coll. Cord. in Diosc. Fuchs. Corn. Matth. Dod. gall. & lat. Trago, Ryffio, Cronemb. Gesn. hort. & de coll. stirp. Had. Junio, Turnero & plerisque. Dorst. sub Dorst. not. titulo Caprifolij ineptè ponit iconem Hepaticæ stellariæ.

Matth. re-feratur.
Lob. Adv. Periclymeni Periplocas hodiernis Græcis vocati, duplicem observari varietatem testatur ex folio. Italicæ sc. & Narbonensi vulgationi folium unum & continuum. Septentrionalis, non perfoliatum. Idem Obs. duas habet figuras, unam hoc titulo, Periclymenon perfoliatum calidarum regionum; alteram hoc, Periclymenon non perfoliatum; In Ic. Periclymenum perfoliatum calidarum regionum officinarum, Periclymenum non perfoliatum; Septentrionalium. Apollinaris nomine Geisblatt figuram ineptam exhibet, alia verò impressione penitus omittit. Tab. Periclymenum: Item, Periclymenum perfoliatum durschnige Speck Lilgen. Com. pilator Tabern. satis demonstrat suam imperitiam stirpium in nomenclatura Germ. tribuens Periclymenon perfoliato quod tribuitur Hyperico. C. Bauh. phyt. Periclymenum, sive perfoliatum, ex purpureo nivo colore nitens: aliquando & luteo asperfo. Item Periclymenum 2. sive Germanicum vulgare.

Periclymenum perfoliatum.
Eid. pin. Periclymenum 1. non perfoliatum germanicum. Caprifolium, Brunf. Gesn. & Lon. Germanicum, Dod. Periclymenum, Trag. Fuchs. Dod. gall. Turn. Cord. in Diosc. Gesn. h. Cam. Thal. Tab. Ger. Germanicum, Eyst. Periclymenum Septentrionalium, Lob. Clus. Item, Periclymenum 2. perfoliatum: Periclymenum, Matth. Ang. Lac. Lob. Adv. & Cast. alterum Dod. gal. Periclymeni species foliis unitis, Gesn. h. Peric. perfoliatum, Lob. Lugd. (& grandius) Tab. Ger. Eyst. Peric. vulgare alterum, Clus. hist. Vinciboscum vulgo, Cæf.

Periclymenum perfoliatum.
Theophrastus Græc. Periclymenum Lat. Officinis & herbariis qui tamen partim Caprifolium, partim Matrifilvam vocant. alij Lilium silvestre, vulgus Lilium inter spinas, Lilium convallium, Narcissum & Volucrum majus appellant, Trag. Germ. Geisblatt / Speck: aut Waldhilgen / Fuchsis Gilgenconsfort / Gesn. quade. Waldwinde / Zeinling: Viennæ, Norimbergæ, Feldkirchij Rhætorum & alibi, Rosen von Zercho: in M. n. Zeinlinger leber, Camerapud Matth. Belg. Gheytenblade & Mammes fens cruy: Gall. cheurefente: It. Matrefilva Vinciboscus & Caprifoglio: Hisp. Madre silva. Angl. Dod. bina de / aut Bonyfuelle: Brabant. Weiven.

Periclymenum perfoliatum.
Nascitur in silvis & in fenteticis, & fruticibus, nonnullisque arbutis. Vere folia exeunt, flores quandoque Aprilis, crebrius Maio ac Junio conspiciuntur; fructus sub Autumni tempus. Vtrumque genus Belgicis & Germanicis hortis valde familiare, pergulas interdum vestit. Neutrum spontè nascitur quod sciat Clusius, in Vngaria, Austria & Bohemia. Frequens tamen est in Harcymia Saxonotheuringia.

Periclymenum perfoliatum.
Lob. Adv. Periclymeni Periplocas hodiernis Græcis vocati, duplicem observari varietatem testatur ex folio. Italicæ sc. & Narbonensi vulgationi folium unum & continuum. Septentrionalis, non perfoliatum. Idem Obs. duas habet figuras, unam hoc titulo, Periclymenon perfoliatum calidarum regionum; alteram hoc, Periclymenon non perfoliatum; In Ic. Periclymenum perfoliatum calidarum regionum officinarum, Periclymenum non perfoliatum; Septentrionalium. Apollinaris nomine Geisblatt figuram ineptam exhibet, alia verò impressione penitus omittit. Tab. Periclymenum: Item, Periclymenum perfoliatum durschnige Speck Lilgen. Com. pilator Tabern. satis demonstrat suam imperitiam stirpium in nomenclatura Germ. tribuens Periclymenon perfoliato quod tribuitur Hyperico. C. Bauh. phyt. Periclymenum, sive perfoliatum, ex purpureo nivo colore nitens: aliquando & luteo asperfo. Item Periclymenum 2. sive Germanicum vulgare.

Periclymenum perfoliatum.
Eid. pin. Periclymenum 1. non perfoliatum germanicum. Caprifolium, Brunf. Gesn. & Lon. Germanicum, Dod. Periclymenum, Trag. Fuchs. Dod. gall. Turn. Cord. in Diosc. Gesn. h. Cam. Thal. Tab. Ger. Germanicum, Eyst. Periclymenum Septentrionalium, Lob. Clus. Item, Periclymenum 2. perfoliatum: Periclymenum, Matth. Ang. Lac. Lob. Adv. & Cast. alterum Dod. gal. Periclymeni species foliis unitis, Gesn. h. Peric. perfoliatum, Lob. Lugd. (& grandius) Tab. Ger. Eyst. Peric. vulgare alterum, Clus. hist. Vinciboscum vulgo, Cæf.

Periclymenum perfoliatum.
Theophrastus Græc. Periclymenum Lat. Officinis & herbariis qui tamen partim Caprifolium, partim Matrifilvam vocant. alij Lilium silvestre, vulgus Lilium inter spinas, Lilium convallium, Narcissum & Volucrum majus appellant, Trag. Germ. Geisblatt / Speck: aut Waldhilgen / Fuchsis Gilgenconsfort / Gesn. quade. Waldwinde / Zeinling: Viennæ, Norimbergæ, Feldkirchij Rhætorum & alibi, Rosen von Zercho: in M. n. Zeinlinger leber, Camerapud Matth. Belg. Gheytenblade & Mammes fens cruy: Gall. cheurefente: It. Matrefilva Vinciboscus & Caprifoglio: Hisp. Madre silva. Angl. Dod. bina de / aut Bonyfuelle: Brabant. Weiven.

Periclymenum perfoliatum.
Nascitur in silvis & in fenteticis, & fruticibus, nonnullisque arbutis. Vere folia exeunt, flores quandoque Aprilis, crebrius Maio ac Junio conspiciuntur; fructus sub Autumni tempus. Vtrumque genus Belgicis & Germanicis hortis valde familiare, pergulas interdum vestit. Neutrum spontè nascitur quod sciat Clusius, in Vngaria, Austria & Bohemia. Frequens tamen est in Harcymia Saxonotheuringia.

Nomina
linguati

Locis
Tempus.

Vitis
Tragi epi-
no expla-
sur. Tragus easdem vires quas Halimio tribuit quod Halimum existimavit. Ast rursus dignum quod postquam in descriptione dixisset baccas gustatas nauseam & vomitus ciere, ex Solini sententia Halimum famem compescere scribat; quod equidem facile crediderit, siquidem ubi baccas illius vel semel degustasset, quamprimum satius fuit, nec ab eo tempore unquam tanta illum invasis fames, ut predictum deinceps appeteret fructum. Ast si cum Trago, quicquid famem compescit & gustu ingratum est Halimum esse dicendum sit, multæ tales plantæ reperirentur. De vitibus hujus fructicis nihil compertum habet Dodonæus.

PERICLYMENO SIMILIS.

Vitis filic.
apud. Vitis silvestris (inquit Cord. in Diosc. l. 4. c. 178.) aliquam cum Vite similitudinem habet. Idemque hoc nomen invenit, improprie tamen. Non enim idem genus cum Vite fativa habet, ut fativa cultura tantum ab hac distinguatur, sed suum genus à Vite diversum habet. Germanis hæc sylvestris Vitis Spectrâben appellatur & flores ejus Spectulien/ Periclymeno valde similis est. Videndum ergo erit ne cum eo confundatur. Hæc ille. Quam verò plantam intelligat Cordus nondum intelligo: Spectulien dicitur de Periclymeno.

PERICLYMENVM RECTVM
folio serrato.

Defr. PERICLYMENO recto vulgari multo humilior est, humanâq; altitudinem rarissime attingit: multo graciliores & rariores habet ramos albicante cortice testos: folia priore teneriora, longiora, in ambitu nonnihil serrata, supernè virentia, infernè minus incana, quam primæ: tenellis gemminibus enascuntur inter folia graciles pediculi: unum interdum, sed binos ut plurimum flores sustinentes, superiore minores & teneriores, non pallescentes ut illi, sed purpureascentes, quibus succedunt gemelli fructus æque magni ac in priore, etiam æquales, nigri tamen, non rubri, succulenti, gustu ingrato. Radix dura est & lignosa.

Synon. Clus. hisp. & hist. Periclymenum rectum 2. (ut & Lugd.) germ. Austriacis & Styriacis Hundsheer. Tabic. Periclymenum rectum 2. Sabaudicum, Duffrech Waldwind: hoc ei quintum in hist. Ger. Periclymenum rectum Sabaudicum, Savoy Boisfucles. C.B. pin. Chamæcerasus spuria 2. sive alpina fructu nigro gemino.

Locus & Tempus. Rarum est inventum, & unicum fruticem in Pyrenæis montibus; binos aut tres apud Allobrogos in Sabaudicis; deinde frequentiores variis montibus Austriæ & Styriæ inveniebatur Clusius; floret cum aliis Periclymeni generibus; semen Julio maturæcit.

CHAMÆCERASVS GESNERI, VEL
Chamæpericlymenon quoddam
Alpinum.PERICLYMENI HVIVS ET
sequens flores.

Defr. Frutex ligni-
dullâ alba, facie tota ad Xylosteum aliquatenus accedit; brevis ille quidem, licet sit usque quatuor cubitos æquet, ramis adpressis, fragilibus, cineraceo cortice obductis, folia Xylostei jam dicti, sed majora multo, acuminate, hirsuta, potissimum subtus, nec usquam serrata, binæ opposita; flores longiusculi, ad florem Periclymeni recti, seu Xylostei, accedentes, rictu patulo hiantes, rubentes, ex adpresso sitis pediculis, longis, ex alis foliorum exortis insidentes; fructus ruber interdum geminus, tanquam ocellis notatus, ex longo pediculo, Ceraso similis, succo insuavi & amaro plenus, in se continet grana sæpe sex septenave aut plura, alba, lata.

Frutex hic si Periclymeno recto cognatus videtur, Chamæpericlymenum appellabimus (inquit Gesn. in hist. Cordii) interea Chamæcerasum nuncupemus: nam & mortuum rostrorum incolæ Bergfriesse appellant, h. e. Cerasa montana. In literis quidem quod sciam, nulla hæcenus ejus memoria extitit; Cerasa rubra sunt veris simillima, paulo minora, succo subamaro, croceo per maturitatem; semina sex septemve aut plura; fructus quidam gemelli videntur, gustu ingrato; singuli tanquam ocellis aut pupillis rotantur; folia Cerasi vel Arbuti, sapore ingrato; medulla ligni alba. Vocat de hort. cum Simlero de alp. Chamæcerasum montanum veteribus indicatum.

Lob. Adv. Chamæcerasus sive alpigena humilis Cerasa Cerasus; floribus albidis, pallentibus aut luteolis, humilis. fructu binis; gigartus quinis aut senis; Obs. Chamæcerasus alpigena, (ita & ic. & hist. Belg.) Xylosteum alterum quorundam Chamæcerasus Cordii. Clus. hisp. Periclymenum rectum 3. Eid. hist. Periclymenum rectum 4. floribus gemellis nunc ex purpureo candicantibus, modo purpureis, fructu plerumque unico, rubro, succulento, transparente, duplici in summo, ubi flores inhærescunt, stigmate notato, sed unicum granum [plura ego semper observavi] continente.

HISTORIAE PLANTARVM

nente. Cui non probatur eorum sententia, qui Plinianam Chamæcerasum esse existimant: cum ejus fructus nulla sapotis gratia commendetur, nullamque habeat tota stirps cum Ceraso asinitatem. Sed magis verisimile judicat (simd verissimum nostro judicio) Plinij Chamæcerasum non esse diversam ab ea, quæ plurimis Pannoniæ & vicinarum quarundam provinciarum locis spontè provenit, cujus historiam lib. 2. h. n. g. titulo Cerasi pumila prosequuti sumus. Nec ipsi satis faciunt qui Ficum Idæam Theophr. lib. 3. hist. c. 17. esse volunt: nam hæc planta nullam notam habet cum ipsius, nec cum Pliniana Ficu Idæa convenientem. Hæc Clusius, cujus iconem exhibemus sculptam sine floribus, quos in secunda tabella 1. loco depingimus: sicuti 2. loco sequentis flores exprinnimus.

Chamæcerasum
Plinij est
nostra Cerasi
pumila
Ficus Idæa
Theophrasti

Iconis.

Xylosteum.

Dod. in fol. figuram habet Plantini, & describit sub titulo Xylostei alterius, dicens, omnino humilem esse fruticem, cui nomen idem, quod Xylosteo posteritas dederit, cujus minor ac humilis species habeatur ac dicatur: falli qui Chamæcerasum appellant, cum non parum differant.

Tab. 102a.

Tab. 10. Periclymenum rectum 3. ut & in hist. ubi sexti titulum ei præponit, ac temerè flores appingit. Hæc planta apud Lugd. Idæa Ficus, vulgò Frangule, pomine exhibetur, ac pro Halimo Tragi & Loniceri depingitur, aliorumque Chamæmespilum esse dicitur. Sed eorum sententiam magis probat Dalechampi, qui Idæam Ficum hunc fruticem esse putant, quod ejus historia à Theophr. descripta lib. 3. hist. cap. 17. huic sententiæ ad stipulat videatur: de qua Plinius lib. 15. cap. 18. ubi Alexandrinam vocat. Eandem rursus Lugd. Chamæcerasi Alpina titulo à Lobelio picta tradit, itémque Chamæcerasi Cordi, Xylostei alterius quorundam, atque, quæ Pena tanquam de rara planta scripserit, Idæam Ficum ostendere videri. Hæc Lugd. qui confundit Periclymenum tertium Dodonæi sive Halimum Tragi & Loniceri cum Ficu Idæa Dalechampi. Nescio quis vocari Chamæmespilum. Miscet etiam cum Alno nigra quæ Frangula Matthioli, duasque habet figuras ejusdem plantæ.

Repetitur
H. Lugd.

Confusio H.
Lugd.

Synon. C. B.

C. B. pin. Chamæcerasus spuria 1. sive alpina fructu aliquando gemino in uno pediculo, rubente, aliquando ex toto coëuntibus seminibus in bipartito conceptaculo, in quolibet duo aut tria sine osse. Periclymenum rectum vel mas Gesn. h. Chamæcerasus, Cast. Xylosteum aliis, quasi lignum osseum, ob ligni duritiem dicitur. An Corno similis frutex in alpinis, Cæf.

Locus et
Tempus.

Repetitur propè Genevam in monte Salevæ & in Thuiri cum fructu Iulio. In Wallenburg ditione Basileensium, & in montibus Wasserschall cum fructu maturo Augusto. Plantata in horto feliciter provenit. Glaronæ circa Fabarias thermas alibi que & Tiguri etiam in Albio monte nascitur, matura in fine Septembris; locis frigidioribus Augusto. Floret una cum Periclymenis, ait Dodon. fructus Augusto perficitur. Ex Germania in Belgium illatus frutex est. Frequens est Clusio in montibus Pyrenæis & Allobrogicis sed omniam abundantissimum in Pannonicis, Austriacis & Striacis, præsertim supra monasterium Neuberg, ubi, & in reliquis vicinis Alpibus plurimum provenit, florens Aprilis & Maio, fructumque Iulio & Augusto plerumque perficiens.

Vires.

Vomitus.
Alvum.

Chamæcerasi montani nullum esse usum putat Gesn. audit quidem quatuor aut quinque cerasa devorata vomitum citare: aliquando etiam alvum.

PERICLYMENVM RECTVM fructu caruleo.

Descri.

Eiusdem cum Periclymeni o serrato folio altitudinis, sed crassiusculo est stipite, multos in ramo-



diviso; nigricante cortice obductos, qui scaber est, & plerumque multis locis hiati interdum statim à radice in multos ramos sese dividit: tenelli ramuli purpurascent, & ineanà lantigine pubescent: folia contrario situ inter se disposita, ut in reliquis Periclymeni generibus, illi quod rubras baccas fert non similia, exsiccantis & amarissimi gustus: flos non fuerat Clusio cōspectus cūm hujus historiam pri-

mūm evulgetet; quandoquidem sub finem Iulij solummodò obfervat frutex suo maturo fructu onustus: at aliquot deinde annis elapsis, semine natæ stirpes, tertio à satū anno, flores è tenellorum ramorum alis pediculo inhaerentes, protulerunt geminos [hos cum præcedentis floribus 2. loco depictos dedimus] rudimento fructus, ut cæterorum, innixos, pusillos, pallescentes, cavos & in quinque lacinias divisos: ut reliquorum Periclymeni furecti generum flores, è quorum umbilico prodeunt quinque staminula flava appendice insignita, fructus singularibus baccis, utrimque inter folia brevi pediculo dependentibus, constat, Chamæmespilo Gesneri magnitudine æqualibus, sed longioribus paulò, coloris carulei, quæ vinolo & acidiusculo succo plenæ, manus rubro colore inficiunt, & multa plana grana continent: radix lignosa latè diffunditur, & multis fibris prædita est.

Videtur nobis habere multa communia cum Synon. Chamæceraso Gesneri. Cluspan. Periclymenum rectum 1. fructu caruleo: Eid. hist. Periclymenum rectum 3. Tab. 10. Periclymenum rectum 4. In hist. Periclymenum 7. Proponit autem descriptionem Clusij, & figuram à Lobelio exhibitam pro Chamæceraso, cui appinxit flores ad descriptionem effictos. Ger. (qui figuram Tab. 10. h. 1. proponit) Periclymenum rectum germanicum Germany Bonifacius. C. B. pin. Chamæcerasus spuria 3. montana, fructu singulari caruleo.

Crescit sponte ad radices cujusdam montis pago Malitz vocato contigui, ad sinistram, via quæ ad Taurum, superioris Stiria Salzbürgensem ditionem pertingentis præcellsum montem, ducit: nunc autem semine natum in quibusdam hortis alitur. In Pannonia fructum diligenter colligunt, atque in tinctorium usum reponunt.

PERICLYMENVM PARVVM PRV- tenicum Clusij.

AD Periclymeni etiam genera procul dubio referenda est elegans hæc planta, quæ cauliculis dodrantalibus est, quibus quatuor, sex, raris osse adherent folia ex adverso per intervalla sita, Phillyceæ Narbonensis, sive mediæ folijs similia, sed paulò majora, magisque nervosa, in mucronem declinentia, quinque costis ab ipso pediculo ad mucronem excurrentibus. E supremorum foliorum cavis duo veluti ramuli exeunt binis folijs eodem modo quo in caule, dispositis præditi, qui cacumine quarta

Tab. 102a.
102.

1/3 usum
clausus.

Deser.



terna alia folia gestant. Existorum ramulorum medio pediculus nudus & sine foliis exit, in cuius summo rubra bacca flores non fuere observati) racematim coherentes nascitur, Prutenis rusticis circa Gedanum vulgo Dactylum appellatum expetita, atque etiam in Norvegia & Suecia, ubi in maritimis copiose nascitur, tenui radice se propagans, & vicina loca occupans, hinc inde fibras spargit.

Thomas Pennus qui huius iconem cum descriptione Clusio communicavit, Champericlymeni nomen, nec immerito, indidit. Considerandum verò proponit Clusius an eadem nō sit (aut certe perisimilis) cuius brevi historiā ipsū participē fecit Hens. Hoier. anno 1596. iniquens herbulā inter bacciferas stirpes in Norvegia à me observata foliis Hyperico humile mentitur: florē unicū profert, Nigellæ florī quodammodo similem, ex quo bacca per maturitatem rubentes, non secus ac vaccinia rubra, ejusdē quoque magnitudinis propendens, intus alba, succulenta, sapore admodum dulci: quæ māducæ scabiē pruritūque generare vulgō creduntur, atque hinc illis nomen inditum Schrubbeeren. Hæc ille.

Plantulam autem, quā Clusio sicā relinquebat, valdē tenella erat, ex quibus si observabat (q. Hoierus brevitatē studens omiserat) singulis furculis live cauliculis sena plerumq; interdum octona in hære folia, ex adverso, sive contrario sitū sēper nascentia, in imis cauliculis minorā, in extimis ampliora, Afyri foliis valdē similia, ē quorum sinu ad latus pediculi florē sustinentis, aliquando unicū, ut plurimum binū, utrinque scilicet unus, exsurgunt ramuli binis aut quaternis foliis simili serie dispositis præditi; florem porro summis cauliculis nitenē, quatuor foliis candicantibus constantē, in cuius medio multarum bacularū suis petiolis in hærentiū rudimenta nigricantia, quæ magnam gratiam florī addere debent.

Clus. pan. Champericlymenum: Prutenicū, Periclymenū 2. hist. Champericlymenū: Et, Periclymenum aliud tenerius. Tab. Periclymenum minus, Waldwinde, Zeinling. Ger. Champericlymenum, Swarffe Bonisuele. C.B. Periclymenum 3. humile: Itē pin. Periclymenum 4. humile Norvegicum.

GLYCYPICROS SIVE AMARA- dulcis. CAP. VII.

Sarmēta lignosa pedes duos aut tres longa & serē nisi sustineantur procubentia emittit, viridantia, & nonnihil purpurascētia, angulosa, gustu primū amaro, postmodum dulcescente, ex quibus alternatim enascuntur folia Solani hortensis atrovirentia, duabus pinnis nonnunquā imā parte aurita, pediculo circiter unciali: flores ferē, sed colore purpurascēte, pulchelli (seruleo purpureo, quādo candidi. Gesn.) in quinque folia extorsum reflexa partiti, in quorum medio apices lutei; hisce succedunt bacca per maturitatem coccineī coloris, sub longæ formæ, molles, lenti & ingrati saporis, parvis granulis plenæ: radix fibrosa.

Multū aberrat Cordus tradēs, Amarum dulcem Tom. II.



refert, ergo Solano somnifico cognata est.

Dorffh. iconem Glycypticidis exprimens, eā inēptē Chamapityn & Ajugā vocat, id quod Tragus etiam monet. Nomen germanicū, Dergis mein nitidū Matthioli ad Germano Pharmacopœo pro Chamapity adductū erroris inculat Brassavolam, immerito facit: & imperitiū multū habetur, cū vocatū Ze lenger je lieber (quo diutius ed amantius aut gratius, quod Amara dulcis sive Circea quadrat) in sitū in Chamapityn transfert. Is autem Hederam Clusiam aut Milacē Theophrasti esse sibi falsō imaginatur, ut & Smilacem le veuf (quod dicitur deus Disce) Imagno errore esse contendit, & Smilacē tertiam non a culeatā antiquorū. Sunt porro qui Vitem silvestrem Dioscoridis esse existimant, inter quos est Matthioli. Sed hanc opinionē non recipiunt Ang. & Dod. quibus & nos ultro subscribimus. Herbarū studiose Lutetia, & Monspelij præsertim, Solani speciem faciunt, Solanū lignosum aut fruticosū appellantes; Solano autē simile nihil habet. Sed, ut & Dodonæo placet, plus fortē similitudinē cū Cyclamino altera habet, quæ Diosc. teste, καριφύλλοι & νιράδιον dicitur.

Gesn. coll. Solanum perpetuum vulgi, dictum Malacocissus. Eid. h. Solanum fruticosum, Solatrum mortale: quorundam, sed mihi minimē noxiū; aliis rectius perpetuum, quoniam caules in eo perennent: nam folia amittit hyeme. Aliqui Amaro-dulcem: quod siquis ramulum aut corticem inadat, primō quidem ingratus videatur gustu, sed quō diutius manditur, ed ingrior ejus dulcedo se prodar, unde nomen ei factū Ze lenger je lieber.

Ex quibus patet Eckardum Chemnicensem in ser. Eckardus, a to nuptiali hanc falsō Chamapityn vocare, dum ait, plus.

Namque Chamapitys Amara dulce vocatur.

Quod magis atq; e magis grata sap. refert.

Chamapitys enim non est grata sapore, ut ipse ait.

Amara dulcis dicitur Corn. Trago (cui & Periglycy) Lon. Hieron. herb. in apodici, Anguil. Gesn. Matth. germ. Lob. ic. Tab. Ger. & plerique. Amarum dulce Euchar. & Dorffh. Dulcamara Dod. & Lugd. Circea, Lob. Adv. Eid. Obs. Circea, Monsp. Cyclaminos altera, Dod. Siliquastrum Plinij, Guil. the. An Melothron Theophrasti: Putat autem Lob. alibi asseri non posse Dulcamaram esse Cyclaminum secundam, cuius sententiæ sumus cum Dodonæo.

Matth. non bene est Vitis silvestris, ut & Lac. Cast. Cam. h. & ep. cui & Amarum dulce & Solanū arborescens quorundam. Nam Diosc. καριφύλλοι & νιράδιον fruticosum florem tribuit. Lugd. Dulcamara, sive Vitis silv. Matthioli, & Melothron Theophrasti. Cels. Silicastrum Plinij videtur, quod Diosc. intellexit cum plinij de Vite sylvestri dixerit: folia habere Solano similia.

K

Solanum scandens.
Solanum rubrum.
Nomin. linguae.
Locum.
Satio.
Tempus.
Vires.
Hydrop.
Ligni us.
Morbis re. gime.
Pecori sus. penditur e collo centra morbum ponsis.
Temperamentum.
Sanguis concretus.
Tem. Sub.
Lac.
Splen.
Inflamma. tio.
Ufus topia. ricus.

C.B. Solanum scandens, seu Dulcamara, à corticis sapore: Schvv. Solanum rubrum, Solanum *γλυκύμηλον* (ut & Thalic) flore sepius violaceo, rarius cado. Dulcis amara flore pleno, & fl. ceruleo vulgatio, Eyst. *Ταχύνμαρον* & *γλυκύμηλον*, sicut & *γλυκύμηλον* denominatur Græcè: Lat. Amara dulcis, Amarum dulce, Amarum dulcis & Amaro-dulcis, & Dulcamara, seu Dulci-amara: Ger. *Je lenger je lieber*, *Bynschfraut*: Belg. *Alfrande*: Gall. *Dulce amere*: Angl. *Sour bitter* & *scalin*: Boih. *Schladfa* *Gorfa*.

Glycyptis aqua plerumq; subesse indicat. Aquosa enim & rigua amat, & hinc circa serobes & fossas frequenter reperitur, sepibus aut fruticibus aliis in-nitens. Ramulus in aquam impositus, brevi radicy-las emittit instar Salicis. In terra etiam putrit Gesl. surculum defixum faciliè crescere. Folia Vere erumpunt: flores Iulio exeunt: Augusto bacca maturæ sunt. Monspelijs Patavij & Geneva floret Aprilis & Maio: Basileæ Iulio & Augusto. Alii in horto flore albo.

Morbum, quæ patrio nomine (inquit VVeierus) Warm vocant VVestphali, scilicet potiunculâ can-rant ex *Je lenger je lieber* radicibus aliquot diebus exhibitâ, ex qua manè sudor gratus sequitur: nec abs-re interna enim obstrucone liberat, & ex ea ortos morbos solvit: urinâ ciet, quare & contra hydropem cum fructu exhibetur. Accipe, præceptore Trago, li-gnū de hac planta libra pondere, ac minutim in fru-cula tali ludici instar concide, dein cū mensura vini albi in novâ ollam eamq; operculo (per quod tamè foramen in medio exiguum transfigito) probè conte-ctâ, ita quidē ut cū farina ex aqua undiq; oblinatur, reponas, sup̄eq; carbonēs lento igne decoquito su-p̄a tertias, demūq; his utare. hæc potio manè hora una priusquā surgas, & vesperi cū lecto te cōmit-tere velis, cyathi vulgaris mensura sumpta, morbum regium, præsertim in veteratū leniter per alvū & uri-nâ exigit. Quidā hoc decoctū adversus putridas vē-triculi febres, ex quibus morbus regius oritur, exhi-bent. Nota est hæc planta pastoribus: nā solent illam pecori de collo suspendere adversus morbū quē vo-cant die *Bynsch*, unde Germanicū herbæ nomē na-tum est, ut *Bynschfraut* vocetur. Facultate, autore Dodonæo, foliis, fructu calida, rescicans, abstergens & digerens est. Fortur ruptis & ex albo præcipitatis, aut casis etiam succum utiliter bibi. Creditur siqui-dem concretū alicubi in visceribus sanguinē dissol-vere, & partiu læsarū sanitatem procurare. Calefacit, siccit (ait Schvv.) tertio ordine, absterge, digerit. Gu-stanti primū non nihil amarois exhibet calore & acrimonia linguā feriens, quæ tamen ilicō abeunt, persistante dulciculo & imbecillo quopiā sapore Gly-cyrrhizæ ingratiore fastidiū pariente, magis magisq; dulcorem ostendendo. Potū moderatē, citra virium dispendiū viscerūve incēdium, egerit per sudores urināq; aquas; atque obstrucone demolitur, quæ sunt ieteri prævit atq; alumnæ. Eadem facultate lac mām suggerere fructus potis est. Bacce ex vino 40. diebus spl̄nem liquant, & per urinā & alvum absumunt. Bibūt ad Orthopnæam, reliquias à partu purgant. Folia foris utiliter cōtra inflammationes & pruriginolos pedum tumores admoventur, plebis vulgato experimento. Attegijs & topiario operi conveniret, nisi gravior esset fruticis odor.

HEDERA VETERIBVS ET IN

genere. CAP. VIII.

Veteres de Hedera consulamus. Ea multas in specie differentias fortitur apud Dioscoridem: summas autem genere tres: candida enim quædam est, nigra altera, tertiaque vocata Helix: Candida quidem fructum fert candidum, nigra, quam vulgus Dionysiam vocat, nigrum, aut Croci æmulum; at Helix fructum non gignit, tenues autem habet

viticulas, folia verò parva, angulosa & rubra.

Theophrasto quoq; Hedera multiplex est. Quæ. Theophr. dam enim humi repit, illa in altum attollitur. Atque Humilia. excellarū genera plura, maximè verò tria patefunt, Excella. candida, nigra, tertiāq; Helix [*ἡ ἡλὶξ*, *Clavicula* *Gaza*, *sed male*.] Harum itē species plures. Alia enim fructu plures. solo, alia etiam foliis candida est. Rursum fructū tan- Candida. tūm cādūm ferentiū, quædam grandiorē, densum, & veluti in orbem circūactū fructū producit, quam nonnulli Corymbian vocant, Athenienses Acharni-cā, quæ in riguis nascitur, quædam minorē, spatio-rem, nigra modo. Habet & nigra differentias, sed non Nigra. ita perspicuas. At Helix [*Clavicula* *Gaza*] maximis Helicis diff. differentiis distinguitur. Etenim foliis plurimū dif- fert, tam quod minoratū quoddā angulosa & concin-niora sint [*sic Plinius & Gaza interpretari sunt jamen-dū & ἀποσπόμενα*. Quare Cornarij n. placet emendatio, Corn delio. qui in hac foliorū Helicis delineatione apud Dioscoridem, *ἡ ἡλὶξ ἡ ἡλὶξ*, *ἡ ἡλὶξ*, *ἡ ἡλὶξ*, i.e. folia habet te-nua, angulosa, & rubra. vocem ἡ ἡλὶξ falso legi cum per-spicere, quod nullus in foliis Helicis rubor conspi-ciatur, æquē falso in vulgato Theophrasti codicibus *ἡ ἡλὶξ*, *ἡ ἡλὶξ*, quæ concinniora Plinius reddidit, *ἡ ἡλὶξ*, *ἡ ἡλὶξ*, id est succulentera legit, in Dioscoride verò *ἡ ἡλὶξ*, *ἡ ἡλὶξ*, eadē significatione. id est, crassa.] Hederis autem reli-quas rotundiora, & simplicia. Differt etiam fla-gellorum [*internodiorum*, *Gaz.*] longitudine, lon-gius enim porriguntur [*hæc Gaz. omisit*.] Præ-terea quoddā sterilis sit. Quidam Helicem autem Hederæ naturam adipisci, mutarique in eam, eūm perfecta jam adoleverit. At si in eo genere omnes in Hederam adolefcent [*hederas fieri Gaza vertit*] ut non nulli volunt, ætate sanè & affectu, non genere constabit hæc differentia, qualis est Piri à Pirastro. Tamen ejus Helicis folium ab Hederæ folio pluri-mū distat. Rarū autē & in paucis evenit, ut vetusta-tes comitentur, velut in Populo alba, & Ricino [*Quæ sic expressisse videtur Plinius. Maxime foliorum unitas in suo cuique genere permanet, præterquam Populo, Hedera, Croton. quæ & Cici vocari diximus*.] Sunt igitur He-licis [*Clavicula*, *Gaz.*] genera multa, maximè verò Helicis 3. nota & summatia. Prima est virens sive herbacea, genera. quæ plurima est, secunda candida, tertia verticolar, quæ Thraciam quidam nominant. Et singularum differentia quædam sunt. Nam virentis alia tenuio-re est & longiore folio [*Plinius habet, in ordinem di-geſt.*] densiorque. Alia minus hæc omnia habet. Et verticolaris alia majus, alia minus folium habet, & Verticolar. colorum varietatem in eo dissimilem. Similiter & magnitudine & colore distant candidæ folia. Facili. Candida. lime augetur herbacea, & altissimè allurgit. Manife-stum esse aiunt Helicem in Hederam transmutari, in Hedera non solum foliis quæ majora latioraque gerit, sed e. transmut. tiam germinibus: protinus enim recta gerit, non lux. inflexa vel inclinata, tum ob tenuitatem, tum ob longitudinem. Nam aliis Hederis [*Gazalegit *ἡ ἡλὶξ*, *ἡ ἡλὶξ*, id est, herbacea pro *ἡ ἡλὶξ**] breviora crassioraque Gerſalu sunt germina. Nam Hedera cum semen parit, subli. Theophr. me & rectum germen edit. Est quidem Hedera om-nis, radice numerosa, densa, intorta, lignosa, cras-sa, nec valde in profundum acta, sed maximè nigra, & inter candidas quæ a petrima, maximè que silve-ſtris. Quare non sine damno arboribus adnascitur: omnes enim necat & arefacit sublato ipsi alimento. Crasseſcit hæc maximè & arboreſcit in tantum, ut per se arbor fiat. Majora autem ex parte super a-liud vivere solet, caulibus suis vicinas arbores velut amplexando, tale quid statim habens sua i. a. tui. Etenim ē germinibus affidue radices per media fo-lia emittit, quibus quasi de industria à natura datus, muros & arbores subit, & iis pertinaciū hæret. At-que ita sublato humore, atque exhausto, ipsas tabe-facit. Quod si inferius succidatur, durat, nec emori-tur.

tur. Est & hujus non parva differentia à fructu sumpta. Nam alius dulcis est, & alius valde amarus, tam candida, quam nigra. Id demonstrant aves, quæ alio vescuntur, alio minime. Duo genera Hedera prima, inquit Plinius, ut reliquarum, mas, & femina. Major traditur mas, corpore & folio duriore etiam ac pinguiore, & flore ad purpuram accedente. Vtriusque autem flos similis est Rosæ sylvestri, nisi quod caret odore. [Turpissimè lapsus hic Plinius, quæ de Cisto audienda sunt, quod nescit, id Hedera, quod nos trinitur. Nec apud Theophrastum nec apud Dioscoridum Hedera differentia statuitur à sexu petita.] Species horum generum tres. Est enim candida & nigra Edera, tertiæ quæ vocatur Helix. Etiamnum hæ species dividuntur in alias: quoniam est aliqua fructu tantum candida, alia & folio fructum quoque candidum ferentium aliis densus acinus, & grandior, racemis in orbem circumactis, qui vocantur corymbi. Item Selenitium cuius est minor acinus, sparsior racemus. [Hæc aliter legisse videtur Plinius quam in græcis exemplaribus exaratum sit, in quibus Selenitium vox deest & Hedera Corymbiam vocari legimus.] Simili modo in nigra. Alicui & semen nigrum, alij crocatum: cuius coronis Poëta utuntur, foliis minus nigris, quam quidam Nyliam, alij Bacchicam vocant, maximis inter nigras corymbis. Quidam apud Græcos etiam. num duo genera hujus faciūt, à colore acinorum Erythranum [erythrocarpon, Dal.] & chrylocarpum. Phymas autem habet differentias Helix, quoniam folio maximè distat. Parva sūt & angulosa concinnioraq; cū reliquorū generū simplicia sint. Distat & longitudine internodiorum, præcipuè tamen sterilitate, quoniam fructū non gignit. Quidam hoc ætatis esse non generis existimant: primòq; Helicem esse; fieri deinde Ederā vetustate. Horū error manifestus intelligitur, quoniam Helicis plura genera reperiuntur, sed tria maximè insignia: herbacea ac virens quæ plurima est: altera cædido folio: tertia versicolor, quæ Thracia vocatur. Etiamnum herbaceæ tenuiora folia, in ordinem digesta, densioraq; in alio genere diversa omnia. Et in versicolori alia tenuioribus foliis, & similiter ordinatis de floribusq; est: alteri generi neglecta hæc omnia. Majora quoque aut minora sunt folia, macularumq; habitus distant: Et in candidis alia sunt candidiora. Adolefcit in longitudinem maximè herbacea. Arbores autem necat candida omnemq; succum auferendo tanta crassitudine augetur, ut ipsa arbor fiat. Signa ejus folia maxima atque latissima, māmās [non mammas quas, sed ramos brachia] erigentes, quæ sunt cæteris in flexa: racemi stantes, ac subrecti. Et quanquā omnium Ederarum generi radicola brachia, huic tamen maximè ramosa ac robu-

sta: ab ea nigra. Sed proprium albæ, quod inter media folia emittit brachia utrinq; semper amplectens; hoc & in muris, quamvis ambire non possit. Itaque etiam pluribus locis intercisa, vivit tamen duratque & totidem initia radicum habet, quot brachia, quibus incolumis & solida arbores fugit ac strangulat. Est & in fructu differentia albæ nigæq; Ederæ: quoniam aliis tanta amaritudo acini, ut aves non attingant. Est & rigens Edera, quæ sine adminiculo stat, sola omnium generum ob id vocata cissos. E diverso nunquam nisi humi repens Chamæcissos.

Cissos & *Kissos* Græcis, Hedera Lat. Hebr. teste *Nomina linguar.* Aruch *Kassus*, Serap. *Cissus* appellatur: Germ. *Ephew*: Belg. *Oeyl* & *Elyf*: Had. Jun. Gall. *Lierre*: It. *Hedera*: Hisp. *Yedra*, & *Edera*: Angl. *Jui*: Brab. oft. *Eerd* suet: Boh. *Bretcom*: Hung. *Folya boroslyan*, quoniam videlicet serpit. *Kissos* autem dictam putat à Cisso, quem pusionem Liberi patris fuisse Græci fabulantur, & in nominis sui fruticem conversum: dum minister cum eo Deo saliens, allisus terra perit. Athenienses Cition Bacchum ipsum vocant, & apud se *Adamas* vico, Hedera primò natam volūt. Quin & Hedera Dionysiam, à Baccho Bacchicam appellavit antiquitas, hoc honore Liberū patrem dignata, qui primus ex India in Græciam Hedera mportavit: itaque in tutela Liberi patris putabatur esse. Nam ut ille juvenis semper, ita hæc perpetuò viret. Nec secus omnia, quæ ille mentes hominum illigat. Mavult *Loabelius* *Kissos* [nec leg.] dictum à textura porosa & spiraculis innumeris ferè pervia, quæ vinū transmittit, quale Catoni & Varroni Cilymbion poculum est quàm à pusionis Citti saltantis in Hedera poëta deformatione à Baccho versū, ut fingunt Græci: & *starnes* pumex porosus lapis ob fistulosas cavitates ita dictus sit. Vel potius *Kissos* Hedera dicta est à *κίσσος*, i.e. à verme seu curculione, in Hordeo & Tritico nascete, qui cuspidula, aut acu, potius quàm ore triticum hordeumq; terebrat. Latini ab edendo Hedera dixerunt: Etenim arborum importuna amasia, & veluti assentatrix, cortice rimoso impacta, macescentes vetustiores demolitur, & radicatis propagationibus arbores amplexa, enecat & exedit: præsertim illa species quæ major & arborea vocatur. Pōpeius verò dictam censet Hedera quod hæreat, vel potius quod edita petat. Hedera poëta cognominant etiam lascivā (propter amplexus arduissimos, & hinc circumfertur illud, Lascivis Hederis ambitiosior) & *proverbis*, comantē, quod olim in Anthisteriorū, i.e. floralium festorū (videntur autem illa fuisse, quæ Latini vocat Bacchanalia) ludis antiqui hæc coronarentur. Hinc natum habetur adagium: Hedera post Anthisteria. Quam ferè quippiam adhibetur.

HEDERA COMMVNIS, major & minor.

Prioricon ex nostris emptitiis major *Icones*, rem Hedera exhibet, & altera minorem. In censu earum quæ adminiculo sustinentur, Hedera etiam communis occurrere referenda, licet tamen & per se non nunquā consistat. Et quidem læmetis te *Deser.* Sarmen. nuius longo & errabundo reptatu proximis arboribus aut maceribus innixa, alta petit his quæ semel apprehendit pro ridicis usū, barbino fibrarum propage to radices in alieno solo agens, cortice *Cortex*, magnā parte rugoso, cinereo, in novellis ramis viridi, materie albā, firmā: *Folia*, folia nullo ordine pediculis semipalmatis & palmaribus appensa, magna, nervosa, rigida, crassa, superne ex atro-virentia & splendētia, inferne ad



Tota. 11.

HISTORIAE PLANTARVM

ra.

luteum tantillum ex virore declinans, sinuosa, triquetra, aliàs rotundata in mucronem exacuuntur, sapore siccante & acri; flores in sarmentorum extremitatibus, sex radiatis foliis herbido colore præditi constant. totidemq; luteis apicibus in orbem circumacti simul multi umbellè initar: corymbi succedunt per maturitatem nigri: acini singuli semuncii longioribus pediculis insident bacis juniperulis æquales, sessiles & quasi vtrinque compressi, circulo umbilicato, cui abestille reliqui acini nitor, inscripti veluti opercula imposito urceolo, cuius centrum designat prominulus niger stilus: intus distinctis sepimento membraneo, nonnihilque pulposo, loculis continentur semina, unum, duo, tria, quatuor, quinque, oblonga, gibba, turgidula, curculioni convoluta similia. cuticula tenui contexta, intus pulposa confictæ orizæ cum gluma sua, aut puliculæ & pane syncomisto non absimilia.

Corymbi.
Acini.

Semina.

Trag. spec.
cica.

Bacchica.

Asplene.

Poetica.

Discrimen
Hederarum
est alia
sua.

Cur autem
rei non se-
parent He-
deras.

Sesap.

Ex cultu
arborescit.

Folia mu-
rat.

Tragas licet proponat unam tantum figuram & unam descriptionem, duas tamen ejus species nasci tradit. Quarum priorem Hederam minimam, *μικράν*, Hederam terrestrem, *ἡγίαν*, Claviculam, Hederulam, germ. *Klein Ephew* nuncupat; Alteram vulgarem, *γέμιν* Ephew, Dioscoridis *ῥίζαν*, *ῥιζοειδὴν* *κρυφὴν καρπὸν*, & (quoniam olim hæc Hederâ Bacchus coronatus fuerit) Hederam Bacchicam, Mysicam & Dionysiam cognominat. Dicitur hæc quibusdam *ἀσπλινος*, quoddam splen faciat, nec non, *ποικιλική* quoddam Poëtæ olim coronarentur:

Pastores Hederâ crescentem ornate Poëtam

Hederam vulgarem porro, acinos ferentem, Theophrasti *κέρυβλαν*, & *ἀχαρινὸν ἀρδανιόφυον*; Exiguam verò, quæ appetente Autumno colorem varium acquirit, helicem & Thraciam cognominat. Recenset autem Tragus quam paucissimis omnem hederæ historiam, quoddam nullum ferè discrimen observari posse credat, nisi ab ætate ipsa. Omnem namque hederam, dum in tenera sua ætate assiduò reptatu per tetram vagatur, triangularis figuræ solius spectandam se præbere; quamprimum verò arbores muròsque invalerit, ilicò foliorum figuram variare ait, quoddam vel Theophrastus dixerit maximam hederarum differentiam in ætate ipsarum positam esse. Nos quoque non separamus hederas nostras, sequuti sententiam Tragi, existimantes unum tantum genus reperiri, ratione loci, ubi crescit, & ætatis, formam mutans.

hederæ, ait Cæsalpinus, frutex est peculiarissimam se ritus naturam: non enim solum radicibus in terram dimissis vivit, sed & germinibus alimentum exsugit & arborum caudicibus, quas scandit; nam præcisè iuxta terram, non emoritur tamen, nisi à totis caudicibus avellatur; frequentissimas enim, easque breves per tota germina radicales, centipedis animalis modo edit, quibus pertinacissimè hæret arbores suffocat, & ædificia (quamvis robusta) tandem demolitur; expetit tamen viridariis; nam sponte nullo adminiculo totos parietes circumvestit, fronde perpetuâ exornans; ex cultu arborescit, caudice satis crasso, & ad magnam altitudinem latitudinemque distenditur, nisi desit quod amplectetur, cum ad eam ætatem accesserit, in qua fructum ferre possit, totâ mutat faciem, naturamq; nam per se erigitur, & quidem in tantum aliquando, ut nullum relinquatur conjunctionis vestigium cum repente Hederæ. Quamdiu enim affixa est, folia fert in plures angulos desinentia, ad summum quinos, quorum duo utrinque prominent, unus in summo folio: quo autem magis adolescit, folia & pauciores edunt angulos obtusiorèque, & ipsa majora fiunt, ac virentiora, & unicolora, cum ab initio eadem pusilla sint, nigra, & maculis albis distincta, aliquando infernè subrubentia; cum autem erigitur,

folia rotundantur oblitteratis ex toto utrinque angulis omnibus, solo eo, qui in summo est, relicto. differentias alias non ætatis, sed generis adhuc non vidi, quamvis Dioscorides tria afferat genera: Theophrastus quoque & Plinius eadem tria in alias plures differentias distribuant, pro fructus magnitudine, sapore, & colore foliorum: sed de Helice, ambigit Theophrastus, utrum generis, an ætatis sit differentia, ut multi putant, primò fieri Helicem, deinde vetustate in Hederam transire: appellant autem hederascere, & in Hederam transire, cum erigitur nullis affixa, quando, & simpliciora sunt folia rotundioraque, cum in Helice sint parva, angulata, & concinnè disposita ac sine fructu: contendit Plinius easdem genere differre maximè ob foliorum varietatem in Helice. Quandam enim herbaceo folio virentique, aliam candido, tertiam versicolori constare, quæ Thracia vocetur. eandem Dioscorides tradit rubro folio, quod nemo alius novavit; sed non cogimur ob hæc Helicem genus diversum ponere cum in ea, quæ manifestè hederascit, variam foliorum & germinum naturam contemplerur, quod in paucis aliis reperitur, ut notavit Theophrastus: fit verò alicubi, ut Helix nunquam hederescat ob imperfectiorem quandam, non speciei, sed individui, ut in arboribus plerisque accidit. Patet ergo quam quidam sine rationibus nos non habere Hederam contendant.

Dod. gal. duas habet figuras dicens ex tribus Dioscoridis Hederæ generibus priorem albam, Hederam feminam Plinij, nobis esse incognitam; secundam speciem Hederam nigram & *δονοναν* Plinij, hederam mare-n esse, Neotericorum Hederam arboream, Hederam muralem, Gallis *Liaire noir*, German. *Schwarzer Eppich* & *Maur Ephew* aut *Baum Ephew*. Belg. *Veyl*. & *Boonen wyl*. Tertiam verò speciem *ἐλάγᾳ*, Claviculam & Hederulam dicit, Gall. *Peut. Liaire*; Germ. *Klein Ephew*; Belg. *Cleyne Veyl*. Dod. lat. autore Theophrasto Hederam in majorem & minorem distinguit: majorem rursus in candidam, nigram, & Helicem, cuius plures species Theophrastus tradat. Cæterum, majorem sese in altitudinem attollentem aut assurgentem, Theophrasti *ῥίζαν ἡγίαν*, Gazam excelsum, Plinium nigentem Hederam, dicere scribit; recentiores verò Hederam arboream, quoddam arbores complectatur: muralem, quoddam secundum parietes nascitur: Esse tamen qui velint omnem assurgentem arborem cognominari, quibuscurque tandem illa conscendens adherat, ad differentiam nempe alterius Hederæ terrestris per humum repentis. Minor denique, ait Dod. nigra similis est, ac *δὴλῆτος* vocatur; germanic. *Klein Ephew*. Dicitur & *χαυδινός*; differens tamen multum ab Hederæ terrestri alibi describenda. Helicem sive Claviculam latinè nuncupatam Helicem, non pauci latini hanc existimant, sed Theophrastus *ἐλάγᾳ* ab *ἐλῆ* *ἡγίαν* differentem ostendit. Tertiam enim inter assurgentem facit.

Nec plures duabus (Hederæ majore seu arboreæ & Helice sive minore) novit nostra ætas, ait Lobelius, differentias genericas: tametsi quamlibet multas dixerit species Dioscorides. Majoris multæ decernuntur varietates, quæ antiquis persuadere poterunt, ut plures differentias, sive species statuerent. Hujus quædam arborescit, suapteque stat stipite, nulli innixa pedamento, qualem in sylvis quibusdam Angliæ meminimus, Orthocissum antiqui dicunt. Interdum etiam quibusdam locis xerampelini colore folia nitent. Pisis nobis ostendebant herbarij corymbos cæsi & albicantis coloris. Melinos subulcos corymbos pleræque plantæ satz in Italicis & Germanicis ex Campania & Apulia, hodie maturat. Humilis planè minor & infrequentiore coccinea voca-

Theophr.
ambigit an
Hederæ be-
lex diversa
sit ab arbori-
rea.

Plinio gen-
ere diversi

Plinij opi-
nio repro-
batur.

Dod. Gall.
icones 25

Hederæ
major Dod.
donesi.

Hederæ ar-
boreæ,
boreæ.

Muralis.

Hederæ
minor.

Hederæ
Helicis.

Differ. Ed.

exerat claviculas, capreolſive viticeos, qui humi panguntur: & propagatione quadam quaſi in ſpicas & anfractus provolvuntur: interdum etiã ſerpendo muſcidis truncis & caudicibus advolvitur gracilioribus ſarmentis. Hæc Lob.

Prior vocatur à Matth. Caſt. Lugd. Brunſ. Geſn. h. (qui hujus ſpeciem tradit luteis baccis) & Tab. Hedera ſcandens, major, & arborea; à Trag. Ang. Cord. in Dioſc. Dod. & Cam. ep. Hedera; à Loſn. (qui quamvis ſolum unius iconem exprimat, attamen tres ejus ſpecies nominat) Fuchſ. Dod. gall. & Lac. Hedera nigra; à Lob. Hedera corymbola communis; à Tab. ic. Hedera corymbola major arborea; à

Schvv. Hedera baccifera. Altera autem Hedera minor five humilis à Matth. Fuchſ. Brunſ. Dod. Lac. Cam. h. ep. & hiſt. Lugd. Lon. Cæſ. Tab. & Ger. Hedera helix; ab Ang. Hedera ſterilis; à Lob. Helix five provoluta ſterilis Hedera; à Geſn. h. Hedera arborea ſilv. genus ſemper repens; à Thal. Hedera ſpecies 3, Helix vocata à Caſt. Hedera minor à Schv. Hedera minor reptans; à C.B. Hedera 3, major ſterilis: Eid. Hedera 4, humi repens; Hedera Tragis Hedera minor, & Hedera Dod.

Hedera paſſim naſcitur ad arbores, in ſilvis, campis, & hortis, & ad ædiſiciorum muros. Sylvarum opaca arida & ſaxoſa perrepat. Plutarch. in Alexandr. memoriæ prodidit Babyloniam regionem non ferre Hedera, rationemque reddit, quòd nimis ſit calida, cùm loca frigida amet. Edera jam dicitur apud Plinium in Aſia naſci. Negaverat Theophrastus, nec in India, niſi in monte Mero. Quin & Harpalum omni modo laboraſſe, ut ſereret eam in Medis, fruſtra. Alexandrum verò ob raritatem ita coronato exercitu, victorem ex India rediſſe, exemplo Liberis patris: cujus Dei & nunc adornat thyrios, galeæque etiam & ſcuta, in Thraciæ populis in ſolennibus ſacris. Inimica arbori ſaſique omnibus, ſepulchræque ac muros rumpens: ſerpentium frigori graſſiſſima, ut mirum ſit ullum honorem habitum ei. Hedera vidi in monte Saleve trunco crus æquante & ſæpè craſſiorem plurimis Helvetiæ locis. In Caſtello l'Abbatie reperi ſerentem reſinam rubram, odoratam, pellucidam, guſtu acrem, chartam imbuentem olei inſtar, igni admodum, flammam concipientem, ut cæteræ reſinæ.

HEREDA DIONYSIAS,

Dalechampi.



EX congeneribus nigris folium habet minus atrum, minime anguloſum, craſſum, carnoſum, venoſum, in acumen ſaſtigiatum, nec admodum denſum: in corymbis acinos luteos aureo nitore fulgentes, ex congeneribus aſpectu maxime pulchros. Hæc radicofis brachiis reliquarum modo vicinas arbores necat, ſucco earum exauſto. Rarè in Gallia provenit.

B. pin. Hedera 2. poëtica: Hedera

Dionysias, & Chryſocarpos Dalechampi, Lugd. Dionysias, aut Bachchia, quòd ex ea Poëtarum com-

Tom. I.

ronæ conſuerentur: Chryſocarpos, à fruſtus colore auco.

HEREDÆ ÆQUIVOCÆ.

Præter Hedera communem & Dionysiam Dalechampi, plures aliæ occurrunt plantæ Hedera nomine donatæ, de quibus ſuo loco agemus, ut de Hedera Cilicia Theophrasti, ſub Smilace aſpera hoc ſmilac libro. Æquivocæ quoque, ob græci nominis ſimilitudinem Hedera nomen tranſiit in Ciſtum marem & ſceminam, quibus ſlos Roſæ ſylveſtris inodorus, ut Plinius ſcribit ex Theophrasto, ubi in verſione Gæzæ, pravâ tamen lectione Ki- & legitur non Ki- & : de Ciſto lib. 13. Sed & Chamæciſſus herba Chamæciſſi Hedera humilis, ſeu terreſtris nomen ſibi vendicat, ut videre eſt lib. 28. Per Hedera arboream ſunt qui intelligant Apocynon Dioſcoridis, minus Apocynon rectè, in remediis ad gangranam Theodorico, de quo paulò poſt, ut & de Smilace lævi, five Convolvulo majore, quem Hedera arboream cognominat Dalechampi. Hedera terreſtrem ſuſpicatur Dodon. Volubilem minorem, five Helxine Volubile Ciſtampelon, ut infra dicemus. Eadem etiam & Conſtantino malaconia, h. e. Hedera mollis dicitur. eſt hæc nobis Helxine Ciſtampelos, ſemine Helx. Ciſt. triangulo. Hedera [malva] ſeu Hedera folium [malva] de Aſclepiade dicitur apud Dioſcorid. Aſclepiadem. Tandem præter dicta genera eſſe & rigentem Hedera, per ſe ſtantem, & ob id ſolam omnium generum vocatam eſſe Hedera, tradit Plinius: hanc Cæſalpinus Agriſolium eſſe cenſet: ſed Agriſolium in Theophrasto non aliam intelligit, quàm ætatis perfectæ Hedera. Tandem quæ Hedera aquatica & paluſtris à Lob. ic. Tab. & Bauh. phyt. vocatur, à nobis Lenticula aquatica triſulca inſcribitur. Quam demum Hedera ſaxatilem C.B. cum Lobelio cognominat, eſt Aſarina ſterilis Sevenæ Narbonenſis agri.

VIREs ET TEMPERAMENTUM.

Omnis Hedera, auctore Dioſcoride, acris eſt, ad Ex Diſſe. ſtringit, nervos lædit. Flores ipſius quantum ipſorum tribus digitis capi poteſt, accepti & in vino poti, faciunt ad dyſentericos, ſed bis per diem bibere Dyſenteria oportet. Faciunt & ad ambuſta cum cerato triti. At tenera folia cum Aceto cocta, aut cruda cum pane trita, ſpleni medentur. Succus foliorum & corymborum cum irino oleo, aut melle, aut nitro, naribus infunditur, & ad veteres capitis dolores commodus eſt. Irrigatur & ex eo caput, cum aceto & roſaceo. Aurium dolores & purulentas aures, cum oleo ſanat. Cæterum nigra hedera ſuccus & corymbi poti, debilitatem corpori inducunt, & amplior uſus mentem turbat. Acini verò corymborum quinque triti, & cum roſaceo in malicorio calſacti, & in oppoſitum tam aurem inſtillati, dentium dolores mitigant. De Dentis. nigrant item capillos corymbi. At verò folia cum vino cocta ad omne ulcus imponuntur. Eadem impoſita velut dictum eſt cocta, ambuſta, ulcera maligna, & maculas ſolares curant. Movent & menſes corymbi triti ſubditi, & poſt purgationem drachmæ pondere poti, conceptionem impediunt. Sed & foliorum pediculus melle tinctus & utero appoſitus, menſes & fœtus educit. Succus autem naribus inſtillatus, graveolentias & putredines expurgat. Lacryma verò hedera illita, pilos abolet, & pediculos occidit. At radicis ſuccus cum aceto potus, comorſis à phalangiis opitulatur. Hedera (inquit Gal. 7. Ex Galeo. ſimpl.) ex cõtrariis compoſita eſt facultatibus habet enim quiddam adſtingentis ſubſtantia, quam terrenam & frigidam eſſe oſtendimus, habetque etiam nonnihil acris, quam calidam eſſe vel guſtus comprobatur: nec de eſt tertia, æqueam rãmq; ſubſtantiam quandam tepidam obtinet, cerè ſi viridis ſit.

HISTORIAE PLANTARVM

Siquidem dū arefcit, hæc prima exhalet necesse est,

Ulcera.

manetq; quæ terrea est & frigida adstringensque, & ea quæ calida est & acris. Viridis autem, foliis ejus in vino decoctis, ulcera grandia conglutinat, quæque maligna sunt sanat, tum igne factas exalcerationes cicatrice includit. Porro cum aceto decocta folia lienosis profunt. Flores autem ejus quodammodo validiores sunt, & ad levorem redacti cum cerato ambustis conveniunt. Præterea succus medicamentum est erethinum, h. e. in nares fufum, capiti purgando idoneum, tum vetustas aurium fluxiones sanat, adhuc vetera ulcera tum in auribus tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosaceo aut dulci oleo miscetur. Lachryma ejus pediculos necat, pilis nudat, usque ad eodē calidæ potestatis, ut obscure adurat, est enim veluti aqueus quidam liquor, sicut omnes aliæ lachrymæ. Hederæ mira natura traditur à Plinio ad experienda vina, si vas fiet

Pediculi.

Ex Plinio.

Vid. lignum ad experienda vina Ignem. Venerem. excusat Hedera sufficiens.

Calculus.

Pulsis Hedera.

Dysenteria.

Succus.

Menfes.

Christus.

Ulcera acriteriorum dæperita retinet.

Epilepsia.

Vrina.

Frigidi articuloz dolores.

Prognosticum de vitibus a flore Hedera.

ex ligno ejus, vina transfluere, ac remanere aquam, si qua mixta fuerit. Theophrastus igniaria ex ea materia fieri testatur, quoniam calida. Plutarchus auctor est, Hederæ suffutim in Venerem trahere, & ebrietatem, ut vinum inducere, furorēque efficere animi. Insignis vis feminis Hederæ nigre, si vera quam Bayrus illi adscribit. Semen ait Hederæ nigre facit cadere pilos & enasci non sinit. Acini Hederæ tusi ac pondere drachmæ in vino sumpti, calculum expellunt, experientiâ Tragi id attestante. Folia Hederæ cum aceto decocta ac leni impolita, dolores ejus sedant. Hederæ florum siccatorum pulvis quantum trium digitorum apicibus comprehendas, ex vino bibitum, fluxum dysentericum sistit, ut legitur apud Matthiolum: Succus est foliis cum vino acidulo tribus continuis diebus lenosus potu juvat: quibus etiam opitulatur pocula de ligno vel radice Hederæ confecta. Acini drachmæ pondere cum vino assumpti, mirifice calculum pellunt, ad menses suppressos minimè fallax traditur remedium, si acini tres Hederæ arboreæ in pulverem triti, cum aqua stillatitia Pulegij & pauxillo Croci bibantur calidè, idq; mane diebus aliquot continuis, quinque aut sex acini ante poculorum certamen comesti, ebrietatem arcent, vaporē decocto foliorum utero lexeptus menses ciet, ad cephalalgiam, sumuntur folia Hederæ septem, totidēque Persicorum delibrati nuclei, simul ambo in aceto & oleo rosaceo bulliunt, atque ita calida fronti & temporibus inducuntur. Ut cauteriorum ulcera aperta maneant, imponitur quotidie Hederæ folium, quod & humiditatem omnem exhaurit, & ne quicquam sinistri accidat prohibet. Mulierculæ de foliis Hederæ pileolos corfectos capitibus imponunt infartum, quos achores infestant, siccant ita & certò curant. Sunt (prohibente Camer.) qui non sine utilitate contra epilepsiam exhibeant Hederæ lignum. Corymborum pulveratorum scrupulus unus ex aqua Menthe aut simili, efficax ad ventriculi dolores, alicubi & peste correptis exhibent, quibus sudores eliciunt potenter. Sunt apud Dodonæum, qui Hederæ corymbos ad ciendam urinam efficaces asserant, & calculosis ac nephriticis eapropter exhibeant. Nonnulli Tabern. teste, corymborum & foliorum Hederæ ex vino decoctum, aut eorundem pulverem cum vino ad febrium rigores exhibent. Valent eodem modo ad urinam ciendam. Ex corymbis extillatur oleum eo modo quo ex bacis Juniperi: alij oleum ita eliciunt ex corymbis, ligno & gummi. Prestans est oleum ad frigidos articuloz morbos. menses ciet, calculos pellit, fordida ulcera exterget. Ad capitis dolorem accipit V. Vir. Empir. Hederam quæ supra terram provenit, macerat in lixivio, quo abluit caput. Sebastianus Feudinger Pincerna illust. C. V. Virtemb. homo curiosus affirmabat

anno 1605. quo hæc scribimus, se observare ex Hederæ flore hoc anno futuram copiam vini, quia circa natalium Domini nostri cum floretet non desinisse flores, ita non defluxuros etiam vitium flores, unde sæpè deficiunt Vvæ & vinum. Lignum Hederæ de radice reserum, ubi crassius esse consuevit, à sutoribus in eum usum parari solet, ut postquam cutellos suos ad corium discendum idoneos ad cotem exaceruerint, asperiores etiam nudi illos æquales levigatosque reddant ad dictum lignum ultra atræque ducendo. quod autem præ aliis idoneum esse judicatur fortè ob molliem substantiæ ipsius, quæ tangentibus se talem offert. Vendibilis vini signum Hederam olim extitisse, probat illud vetus adagium: Vino vendibilis non opus esse Hederæ suspensa. Exponit autem hoc dictum Erasimus, veram virtutem non egere alienis præconiis: aut res præclaras per se placere, neque desiderare exoticam commendationem.

Cor ex ligno Hedera pro sutoribus.

HEDERÆ LACHRYMA.

Glebæ quæ Hederæ gummi nomine in officinis Descri. prostant, ex saturi robore ferè nigrescunt, vitreo nitore, sed non pellucido, durâ satis compactâque consistentia, non tamen uniformi, rubiginosis intercurfantibus micis: haud difficulter in polinem redigitur, saporem imprimens siccum adstringentem, haud in jucundum, cum levi quadam amantidine, salivam croceo colore tingens. Candele admodum claram & pertinacem edit flammam, nidore se-flammam tē Thuris, & ne vel tum quidem liquefcit. admittenda. reperiuntur interdum Hederæ folia. Ipse etiam ex Hederæ lachrymam collegi Geneva circa l'Abatie dictum locum, anno 1570. mensē Aprilis, similem ei, quæ in offic. prostat.

GRANADILLA HEDERÆ similis. C. A. p. IX.

Allatus Monardi ex Continenti herbæ fructus Locus. est, quæ in Peruanis montibus, ubi spontè nascitur, Granadilla appellatur, quod nomen illi imposuerunt Hispani ob similitudinem quam cum Malis granatis habet, nam ejusdem ferè est amplitudo-Erymon. dinis, atque etiam coloris, quando maturus est, nisi quod cororâ careat: in eo resiccato, si agitur, sonitum edit semè intus oclusum, pyri semini simile, alicuius majus, tuberculis quibusdam eleganter, elaboratum & aspectu jucundum: pulpa candida est, & saporis experts. Planta hunc fructum ferens Descri. plant. Hederæ similis est, eodēque modo repit & scan. ea. dit, quæ curque loco ponatur. Elegans est cum fructu orusta conspiciatur, propter ejus amplitudinem: florem habet albæ Rosæ persimilem, in cujus foliis aliq; veluti passionis Christi figuræ delineatæ conspiciuntur, quas magnâ diligentia istic pictas existimes, eam ob causam elegantissimus est flos: fructus ipsi sunt granatula jam dicta, quæ matura acidulo liquore abundant, & semine plena sunt: aperiantur ut ova, & liquor ille cum magna voluptate sorbetur cum ab Indis tum ab Hispanis: nec, etiam si multos sorbeas, ullam ventriculi gravēdinem, sed potius alvum emolliant sentis. Herbararia est, quæ duntaxat uno in loco invenitur. Fructus temperatus esse videtur, & aliquantulum humidus. Granadilla etiam mentum meminit Petrus de Cieza, parte 1. hist. Peruanæ c. 28. fructum. his verbis: Amplamistâ vallem de Lile distâ, in qua oppidum Cali, medium lecat flumē, cujus ripæ abundant fructibus ejus loci, inter quos graui admodum saporis & jucundi odoris est Granadilla niciparus. B. pin.


Temperans mentum.

B.pin. Clematis 17. trifolia flore roseo clayato: Granadilla, Monardi, Petro de Ciega in hist. Peruana, Lugd. Vide in America par. 9. l. 4. c. 27. at cap. 30. Granadilla inter ligna recentetur.

SMILAX ASPERA.

C A P. X.

Smilax aspera longis, rigidis, striatis, contortis, valde implicatis, lentis, famentosis viticulis excre-
scit nunc in hanc, modò in alteram partem, inquit
Clusius, certà quadam serie servata in flexis, ex ge-
niculis capreolos



proferens quorum
ope vicinis arbori-
bus, aliisve advo-
lunt, & ab imis ad
summam repit, hor-
ret autem spinis
duris rigidisq; non
tatum per famenta
furgentibus, sed et
per pediculos,
ut tales plus mi-
nus, quibus folia
& intervallis sin-
gularia appendun-
tur. cæterum folia
Sigilli B. Mariæ di-
cti possidet, sed
longè crassiora, ri-
gida, nervosa, spinis
non tantum per
margines horren-
tia, sed & in dorso secundum nervos, nunc ampla
& viridia, modò angustiora & albis maculis cons-
persa, autore Clusio, flores è singulis extremorum
ramulorum geniculatis tuberculis racematim cohæ-
rentes crebri erumpunt, parvi, albi, odorati, fenis
foliis constantes, in exiguis in medio apiculis: hosce
exciunt fructus, rotundi seu Vvæ, per maturita-
tem rubræ, vel, ut ait Clusius, rutilæ in quorum sin-
gulis semina duo, vel tria, vel unicum, lubrica ma-
gnitudine, colore & figura, seminum Rhamni terrij
seu Paliuri multis dicti, sed duriora, pulpa albicante,
nauseosa cujusdam dulcedinis particeps, Clusius
nucleos vocat duos, osses, veluti Alparagi, foris
nigros, addens radicem longè latèq; serpentes sub
terra fibras habere teneres, candidas & germina
summà tellure spargere minimi interdum digiti
crassitudine, nodosa seu articulata, albicantia.

Theophr. accuratissimè Smilacem hanc descri-
psisse videtur his verbis: Smilax [Edera Cilicia,
Gaza] caulibus suis sese aliis implicat & obvoluit.
Caulis autem ejus spinosus, & veluti rectos acu-
leos gerit: folium ederaceum, oblongum, argu-
losum qua pediculo arnectitur, & latius. Pro-
prium huic quod medium ipsum nervus spina te-
nuis modo lecat, & stamineas propagines non ab
ipsa spina, ut in aliis foliis, sed circa ipsam in orbem
circumactas ducit, ab ipso pediculi annexu. Ad cau-
lem verò imbecillū, qua folia velut interstitio quo-
dam ab ipso se junguntur, ex eodem sinu erascitur
cum foliis cauliculus gracilis & convolutus: flos est
albus, odoratus vernus [Grævis textus habet hunc sed
Cornar. de Smilace, cum Plinio legit hæc eorū i. lilacens]
Fructus similis Solano aut Melothro & maxime Vi-
ti silvestri, racemis, ut Hedera pendens, prop-
rius tamen ad Vvæ figuram accedentibus: quo-
niam ab eodem puncto pediculi acinorum exeunt.
Fructus ruber, sæpius quidem nucleos binos com-
plexus, major ternos, minimus singulos. Foris au-

tem nigri sunt nuclej, & valde duri. Peculiare ha-
bent racemi, quod ex obliquo caulem obfciunt, &
unus omnium maximus est in summo caule, velut
in Rhamno atque Rubo. Vnde liquet Smilacem &
in summo, & in latere fructiferam [Venetus legit
παρὰ πάλαιον ἀρτόν, id est pro παρὰ γόμφον, vel παρὰ
γόμφον. H.] esse.

Smilax aspera folia habet Periclymeni, famenta Diosc. de
multa, tenuia Paliuri aut Rubi modo spinosa, & se-
se arboribus circumvoluit, per eas sursum deorsum-
que repens. Fructum verò profert racematum, seu
exilem Labruscæ racemulum [desunt hæc in Ald. cod. Varie.
in contextu & ad n. r. h. a. transferuntur] qui quidem ubi
maturuerit, colore est rubro, gustumque leniter
quodammodo mordet: radice denique est crassa du-
raque. Smilacis asperæ fructum hic Dioscorides dicit
quodam similem facit, h. e. (ut alia dicitur) & signifi-
cata à Stuida & Aristoph. scholiaste commemorata,
tanquam huic loco non satis convenientia cum
Sarraceno omitamus) exili racemulo: quales is ef-
se solent, qui vel summis palmitibus supra folia ipsa
innascuntur, vel in nativi viridemiæ tempore inter
folia latent. Theophrastus autem uti jam dictum,
scribit esse fructum Solani & Vitis alba fructui simi-
lem, maximeque Vvæ silvestri nuncupatæ. Pessiles
autem esse racemos, cen Hedera, verum ad Vvam
propius accedere: folio autem esse hederaceo, par-
vo non arguloso.

Sed & Plinius de Smilace eadem, quamvis paulò
aliter ita prodidit. Similis est Ederæ, è Cilicia qui-
dem primùm profecta, sed in Græcia frequentior,
quam vocant Smilacem, densis geniculata caulibus,
spinosis fruticosa ramis, folio ederaceo, parvo, non
anguloso, à pediculo, emittente pampinos, flore
candido, olente Lilium. Fert racemos Labruscæ
modo, non Ederæ, colore rubro, complexa acinis
majoribus nucleos ternos, minoribus singulos, ni-
gros durosque: in fausta omnibus sacris & coronis:
quoniam sit lugubris, virgine ejus nominis propter sacris,
amorem juvenis Croci, mutata in hunc fruticem
[Ovid. 4. Met.

Et Crocin in parvos versum cum Smilace flores.]
Id vulgus ignorans, plerumque festa sua polluit,
Ederam existimando: sicut in Poëtis aut Libero pa-
tre, aut Sileno, quis omnino nescit quibus coro-
nentur. E Smilace sunt codicilli. Propriumque ma-
teriam est, ut ad nota auribus levem sonum reddat.
Sed quod hic Plin. dicit de codicillis è Smilace, non
existimo intelligendum de Smilace aspera, quomo-
do enim fierent ex tali frutice? Idem alibi de hac lo-
quitur. Smilax quoque (ait is) qui & Nicophoros
cognominatur, similitudinem Ederæ habet, tenuio-
ribus foliis. Coronam ex eo factam impari foliorum
numero, aium capitis doloribus mederi. Quidam
duo genera Smilacis dixerunt. Alterum immortalitati
proximum, in convallibus opacis, scandens arbo-
res, comantibus acinorum corymbis, contra vene-
rata omnia efficacissimis, in tantum, ut acinorum
succo infantibus sæpè instillato, nulla postea vene-
na nocitura sint. Alterum genus culta amare, & in
his gigni, nullius effectus. Illam esse Smilacem prio-
rem, cujus lignum ad aures sonare diximus.

Fatetur Matth. in com. It. se posse affirmare ali-
quod discrimine esse inter Smilacem asperam & Zar-
zam parillam. Idem tamen dixit esse, qui affirmant Zarzam pa-
rillam nihil aliud esse, quam Smilacem
asperam, quorum opinioni ait se facile assentiri. In
hist. demum germ. addit, quosdam doctos viros exi-
stimare radicem Salsæ & Sarsæ parillas Smilacis a-
spere radicem esse: alios negare, se nihil asserere
posse, quia nihil certi habeat de Salsæ parilla. Vides Salsæ pa-
rillam Matthiolum lectorem incertum suspendat. Si
rilla sit non eadem.

HISTORIAE PLANTARVM

rix, sed tamen eandem esse non concedit. Salsa parilla (inquit Alp.) est Smilax aspera: Smilax tamen Zacythi in sula, ex qua Salsa parilla, à Smilace aspera in Italij locis inventa multum differt. Sed quicquid sit, Smilax aspera radices habet non tantè cum Salsa parilla similitudinis sortitas quantum hæcenus perfluum doctis quibundam fuit, ut dicitur cap. seq.

Synop.

Smilax simpliciter dicitur Theophrasto & Anguillæ; Smilax aspera Diosc. Ruell. Matth. Fuchs. Turn. Cord. in Diosc. (cui & Hedera Ciliiffa) Theod. Golio in onom. Dod. Euchar. Roelslin (cui & Smilax trachæa) Bellon. Obs. Acostæ (qui similem facit Chinæ) Gefn. h. Lac. Lob. Cam. h. & capit. Cast. Cæf. & Lugd. cui & Volubilis acuta, vel pungens; Smilax aspera vera Trago; Smilax aspera fructu rutilo, Clus. hisp. & hist. Smilax aspera 1. fructu rubente, C. Bauh. Hedera Cilicia Plinio (& post eum Gazz.) cui & Smilax, Nicophoro cognominata: Milax, Galeno; Volubilis aspera, Lonicerio.

Trap. & Fuchs. nota.

Icones.

Ceterum, in Tragi figura apparent aliquæ spinæ in foliorum dorso, ut in Fuchsi pictura (qui Smilacem nascentem non vidit, sed ex sicca transmissa pingendam dedit) quæ in nostra iconæ, quæ Guariniana, omisæ. Nomen etiam gallicum apud Fuchsum *Phaeules espinæuses* non placet: mallet vocare *Liseran espinæux*. In Matthioli imagine in foliis nulla spinæ: in post. comm. cum mag. fig. duo tantum spinosæ. In figura per Camerarium facta ad Hist. germ. & Ep. folia in marginibus spinosa. In iconibus Matthioli & Fuchsi, ex qua nostra quæ minus placet, flores appicti tantum cum quinque foliolis. Com. pil. Tab. Smilacis asperæ tres ponit figuras, nec indicat quæ in re differant.

Tab. taxa.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Icones.

Nascitur Dioscoridi in locis palustribus & asperis; Locu. Plinio autem in convallibus opacis. Dioscoridem imitatur Tragus, scribens, in superiori Helvetia uliginosis locis & tenebrosis provenire, quod non placet. Vbi enim legitur apud Diosc. in adunibi malim legere cum doctiss. Dalechampio *Lucubra*, vel *montana*: Corn. malam Dioscoridis lectionem retinuit. Non nisi montosis & collibus fervidiorum tractuum, Romaniz, Hispaniz, Linguagotiz, plurimam provenire Lobelius testatur. Serius flores, imò Autumno etiam ipso, cum suo fructu Octobri & Novembri florentem Clusius reperiebat: at frigidis regionibus culta & scitilibus adservata, Autumno duntaxat flores, nunquam semen perficit. Magna ex parte altero duntaxat à sato anno germinare incipit, nonnunquam & tertio. Perpetuò folia retinet: crescit variis Hispaniz locis, & in Narbonensi Gallia aspero & arido solo: nascitur & aliis calidioribus regionibus: rara in Lusitania conspicitur. Monspelij olim observavi variis in locis, inter fepes locis siccioribus, florentem & baccas ferentem autumno, quamvis toto anno habeat maturas & immaturas; folia in circuitu & in dorso spinis armata interdum iis destituuntur, vel rarissimas habent, ut non mirum si variè pingatur, ut Matthiolas & Alpinus fecit. apud Frid. Meier vidi Smilacem asperam mitiorem in figulinis vasis, quam hyeme reponit.

Folia fructulque contra venena efficacia antidoti vim habent, autore Dioscoride, sive ante, sive post. *Diosc.* stea bibantur. Quin & memoria proditum est, siquid ex his infanti recens nato tritum propinetur, nulla ei postea venena nocitura. Inciditur & ad alexipharmacum, id est, ad ea medicamenta quibus venena arcentur. Plinius autem, ut ex ante dictis patet, alium utendi modum tradit, dum scribit, acinorum corymbos contra venenata omnia efficacissimos esse, in tantum ut acinorum succo infantibus sæpe instillato nulla postea venena nocitura sint. Milacis asperæ folia gustata acrimoniæ aliquam habere, & si illis utamur calefacere legitur apud Galenum: alioqui calidam & siccam haud dubiè Fuchsius credit. Fallopius cum in monte Iuliani Pisis videret Smilacem asperam, eà usus est loco Salsæ panem Salsæ parilla. plurimos à lue venerica liberans. Certè nostratæ Sarsam parillam (quæ Smilax aspera est, inquit Monardes) expertus sum simili facultate præditam, cum illa, quæ ex hispania nova adfertur, ad quam magis accedit, quàm ad eam quæ in Honduras invenitur. Gustu insipido est, & sine acrimonia, neceque aqua, hordeacèa sapidiore est.

SMILAX ASPERA MINVS SPINOSA, fructu nigro

Smilax cum priore sarmentis & claviculis prodest. *Diosc.* Similax quæque amplectentibus nascitur, non est tamen adeò spinis horrida: folia etiam paulò breviora, atriora, molliora, nullis aut certè rarissimis aculeis obsita habet: flos alteri omnino formâ similis, sed colore differens, nam ex albo quasi carneus est, fructulque rudimentum. quod ex medio flore tanquam umbo prominat, rubescit, plenus autem & maturus fructus non est rutilus, ut in priore, sed omnino niger, & succulentior, quantum quidem Clusio videtur, officula conveniunt. Smilax altera Clusij extrema Beticæ incolis, *Vna Nomina de Perry*, i.e. Vva canina, Lusitanis conterminis *Re-Hispanica*, Olyssipponensis *Allegacæon* appellatur. Icon hujus à Clusio hisp. & hist. proponitur cum inscriptione Smilacis asperæ nigro fructu. Eandem etiam exhibet Lob. in Ic. sub hoc titulo: Smilax aspera à fructu Clusio, teta,

Denotat & Smilacem lævem, quæ dicitur Convolvulus major Fuchs. Dod. Matth. Lob. Rob. Constant. & aliis, à quibus dissentient Cæf. & Turnerus: nos de Convolvulo postea agemus.

Smilacis lævis speciem esse Volubilem minorem (quam nos vocamus Helxinen Cissampelon) satis manifestum Dodonæo. Eidem haud aliud est Scammonium, quam species Smilacis lævis radice crassa.

Cassalpino tamen Smilaci lævi magis videtur convenire Gelsemium.

Cum Smilace hortensi phasiolifera, Cordo eadem est lævis, de qua H. n. g. lib. 17.

Quasdam admodum discrepantes, & viribus planè contrariis pollentes, ut Smilacem arborem & genere glandiferarum de qua egimus inger lices lib. 7.

Smilacem quoque de Fraxino dici, ostendimus l. 3.

Nec desunt indocti, qui magno sanè errore Taxum Smilacem appellant, ut videre est lib. 9.

Denotat & Smilacem lævem, quæ dicitur Convolvulus major Fuchs. Dod. Matth. Lob. Rob. Constant. & aliis, à quibus dissentient Cæf. & Turnerus: nos de Convolvulo postea agemus.

Smilacis lævis speciem esse Volubilem minorem (quam nos vocamus Helxinen Cissampelon) satis manifestum Dodonæo. Eidem haud aliud est Scammonium, quam species Smilacis lævis radice crassa.

Cassalpino tamen Smilaci lævi magis videtur convenire Gelsemium.

Cum Smilace hortensi phasiolifera, Cordo eadem est lævis, de qua H. n. g. lib. 17.

Quasdam admodum discrepantes, & viribus planè contrariis pollentes, ut Smilacem arborem & genere glandiferarum de qua egimus inger lices lib. 7.

Smilacem quoque de Fraxino dici, ostendimus l. 3.

Nec desunt indocti, qui magno sanè errore Taxum Smilacem appellant, ut videre est lib. 9.

nilax fo-
non spi-
do.

Baub.

Baub. er-
r. alius.

locus.

Zarza pa-
rilla
Matth.

tera, facie Salsæ parillæ, aut congener. In obl. de-
pingit Smilacem asperæ è spinis verticatem, folio non
spinoso, famentosis viticulis, multò minùs spinis
refertam; cæterò quin cæteris cunctis similibus, aut
iisdem, fructu nigro.

Ex his ita dictis clarum est C. Baubinum in phyt.
multiplicare entia, nec sine errore Clusii Smilacem
asperam fructu nigro (quæ ipsi Smilax aspera 2. est)
à Lobelii Smilace aspera altera, facie Salsæ parillæ,
aut congenerè (Smilace ejus aspera 7. diversam sta-
tuere. Sed hunc errorem apud Matth. silentio invol-
vit, neutriusq; meminit: in pin. verbò correxit, com-
memorans & aliam varietatem foliis angustissimis
in Galloprovincia. Quàm benè porò Clusii Smila-
cem asperam fructu nigro, cum Smilace aspera Lu-
sitana Tab. & Ger. (etiam adhuc in pin.) eandem
faciat, monstrant eorundem diversæ figuræ. Folia
in icone Clusij sicut & Lobelij sunt absque spinis,
in Tabernæmontani verbò sunt spinosa.

Hanc plerisque Lusitanæ provinciæ locis, circa
sepes & collium convexa, & extrema Bæticæ parte,
quæ Lusitanæ contermina est, Clusius cum priori
florentem conspicebat. Nobis visa est Heidelbergæ
in horto D. Sprengerii Smilax aspera sine spinis.
Eadem etiam observata Argentine in horto D. Mei-
eri. Considerandum an eadem cum Clusiana: sper-
pendendum etiam an eadem sit, quam Matth. in
post. comm. cum mag. iconibus exhibet pro Zarza
Parillia, de qua hoc seq. capite.

SMILACI AFFINIS SALSA parilla. CAP. XL.

SALSA PARILLA.

Defev.
famentoso-
rum.

Color.

Sapor.

Smilacis a-
spersa folio.




Hanc ob simili-
tudine quam
cum Smilace aspera
habet, facile post
Smilaces posuerim.
Qualis autem reli-
qua sit plantæ fa-
cies vix certi quic-
quam adferre pos-
sum. Radices verbò
notissimæ sunt ad
deludationes eo-
rum quibus vagus
conubitus luem
affricuit. Sunt au-
tem flagella longis-
sima, plurimarum
ulnarum, lunci ma-
joris crassitie, obse-
quiosa funiculorù
flexibilitate, striis
per longum decur-
rentibus, colore ex-
teriùs fusco, cui substantia farinacea, alba subest,
crassiuscula, mollis & digitorum attritu in pulviscu-
lum solubilis, Agaricum ferè referens, sapore gluti-
noso, amaricante, non ingrato tamen, medullarum
verò lignosum nitidum, lertum, fractuque contu-
max. pendens porò flagella hæc ex pollicaris cras-
situdinis radice transversa, squammata, quæ famen-
ta crebra sursum mittit, vitigineis non absimilia, pa-
riqué crassitudine, veluti geniculis quibusdam in-
tercepta, striata, adunice spinis minaciæ, coloris bu-
xi, substantiâ intus Palmæ instar fibrosâ, albicante,
sapore nullo evidente.

Cùm icon Lob. adv. persimilis sit ipsi plantæ sic-
cæ, quam communicavit Dourez, eam assumpsi-
mus. Folio est (inquit in Obl.) Smilacis asperæ spi-
noso, & famentosis implexis viticulis, spinis adun-

cis, horridis, & radice cæbri implexa, locis. Benzo
tamen in Puna & finibus Guajaquil & Portis vete-
ris Zarzam parilliam herbam racemofam Roboris
folio reperiri scribit.

SMILAX ASPERA ZACYN- thi, Alpino.



Monardes tri-
plicem describit: rilla tri-
plex Mo-
nardes.
Carça-pa-
rilla, in-
quit, Hispaniæ no-
væ est planta mul-
tis radicibus ni-
tens, duos cubitos
aut eo amplius
longis, colore ci-
nereo dilutiore,
quæ interdum tam
altè demittuntur,
ut, qui integras e-
ructe volat, ei
profundâ fossione
opus sit, ramis no-
dosis & lignosis,
qui facillè defic-
eantur: florésne
aut fructum pro-
ferat, ignoro. Ab
hac differens est
quam provincia
Honduras profert,
quodd hæc cinerea,
Carça pa-
rilla ex
Honduras.

nigrior atque crassior, stylis verbò candidior, ad pal-
lorem tendens, & gracilior. Nunc ex provincia
Quito inferri cepit, copiosè nascens vicinis urbi
Guayaquil locis, ad flumen ejusdem nominis maxi-
mum, cujus aqua admodum salubris, & multos
morbos curare dicitur. Indi & Hispaniæ aquâ se
abluendo, & magnam ejus quantitatem sapidi
hauriendo manè, plurimum urinae excernunt, &
valdè sudant, & consequenter morbis liberantur.
Sunt autem qui putent ab hujus fluminis aqua Sar-
sum parillam facultates suas mutuari, quæ colore est
ex cinereo nigricante: majoribûque & crassioribus
radicibus constat, quàm quæ ex Honduras adfertur,
iisque interdum tam longis, ut altitudine humanæ
fodiendum sit, ut erui possint. Hujus tertie ad flu-
vium Guajaquil & in Puna insula nascentis, Petrus
Cieca part. Chronici Peruviani c. 54. meminit, alte-
rique in plerisque Indiæ regionibus nascenti præ-
fert. At Cæsalpinus duas primas differentias ag-
noscit.

De Salsâ-parilla sibi minùs constat Matthioli, *Matth. nio.*
in diversis locis ita scribens. Radix (inquit in com-
lat.) quam nuper aliqui Salsam, aliqui Spartam pa-
rillam nuncupare ceperunt, Ebuli tam ad unguem
æmulatur radices, ut quandoque crediderim Spar-
tam parillam & Ebulum esse idem, tamen id asserere
non ausim, cùm hæc enus ejus folia non viderim.
Idem in comm. It. ait: Radicis Indiæ Hispanis Zar-
zæ parilla vocatæ parvus ramus ex Hispania mihi
missus, foliis est iisdem cum Smilace aspera, ita ut
existimem eos non errare, qui asserunt Zarzam
parillam aliam non esse à Smilace aspera. Cujus o-
pinionis primus autor fuit Ghinus. Non desunt ta-
men qui huic opinioni contradicant, quòd videant
harum radices facie non parùm differre, cùm Smila-
cis asperæ, nodosæ; Zarzæ parillæ verbò rugosæ ha-
beantur. Ego quamvis neutram opinionem certò
assimare possim, cogor tamen potius Ghino assen-
tiri, & Zarzam parillam scilicet esse dicendam Smi-
lacem asperam aut speciem ejus. Libro autem 4.
in post. comm. cap. 140. ponit figuram nonnunc Zar-
zæ parillæ non spinosam: eam scribit sibi à quibus-
dam missam, assermans aliquod discrimen inter Smi-
lax asperam & Zarzam parillam esse, interim ta-
men

Smilax
aspera non
est.

nam perseverat in sua opinione, congeneres esse plantas. Cujus autem plantæ sit Salsæ parillæ figura

Erna Matth.

*2^a arch. op.
m. repræ-
sentatur.*

*Discrimen
radicis Smi-
laci &
Salsæ pa-
rillæ.*

Matthioli, asserere non aulin. considerandum num sit figura aliqua ad Smilacem nindis aspera in expressa. Mira sane fuit ejus opinio de radicibus Ebuli, quæ obsecro similitudo inter Ebuli radicem & Salsæ parilliam vulgò dictam. Neque si similitudine forent, ideò continuò eadem astruendæ. Neque Colutea eadem est cum Sena, licet illa possit nonnulla eadem, quæ hæc præstare. Sed ne tantam Smilacem cum Salsæ parillam in radice sortitur similitudinem, quanta hæcenus persuasa quibusdam fuit. Siquidem Smilacis geniculatæ, articulatis seg. nentis radices, candidæ, foris nitentes, Graminis canini, aut Harundinis valatorii. At Parillæ crebris loris prolixissimis, ab uno trunco radicis magno, præduto, strumoso, rugosisque capitibus, hincinde subtus, ut in Asparago, vel Rusco, oriuntur numerosi concolores lori, æquabiles & sine geniculis vel nodis; recti, flexiles, cortice duriusculo, pullo, rugis striato in longitudine, quam vicenarium pedum interdum mensus est Lobelius. Intus farinacea medulla, non ita ingrata, sed viscida, non nihilemplastica, amaricante, nec tamen calore prodente. Et quanquam Zarzæ parillæ & Smilacis asperæ hispanicæ radices similes Garcias concedat, tamen easdem esse jure negat. Reperiuntur enim sæpe numerò similes, quæ tamen vel mirum aliquo discri. mine differunt. Differentiam etiam cæli solique diversæ constitutio adfert. Quare licet Salsæ parilla, quæ è novi Orbis sive Americæ provinciis infertur, Smilaci asperæ in Europa natæ similis videatur & sit, viribus tamen differt. Neque enim soli calique diversitas, ad formæ modò commutationem aut alterationem facit; sed plurimum etiam ad qualitatem vinu. que remissionem aut intentionem confert. Et si in calidis locis enata potentiora ferè, odoratio. que sunt: frigidis minus. Ita Salsæ parilla Peruviana, quam provincia Honduras, & nunc etiam Quito profert, tamen si Smilaci asperæ in Hispania natæ si. nilis sit, temperati tamen cæli occasione, tum & ipsius foli genio, longè efficacior est, quam vel in Hispaniis, aut etiam in Africa nata.

Synon.

C. Bauh.

Long.

*Smilax as-
pera Za-
cynthi Alp-
mo.*

Smilachia.

Zarzæ parilla Matth. Lac. Monard. Garc. & Lugd. qui cum Dodonæo Zarzæ parillæ etiam in America meminit, ut & C. Bauh. phyt. qui hanc suam Salsæ parillam in 4. malè meo judicio separat ac diversam statuit, ab America, ejus scilicet Salsæ parilla quinta. hunc autem errorem corrigit Bauh. in pin. ubi ambas sub Smilace asperæ 4. Peruviana, sive Salsæ parilla comprehendit. Cæterum apud Lugd. duæ sunt figure, quarum secunda, quæ tantum radicibus constat, inversa est culpa typographica. Zarzæ parilla Peruviana, Dod. Zarzæ seu Salsæ parilla, Cast. Zarzæ parilla, Cæf. Salsæ parilla, Lon. & Frag. Salsæ parilla, Lob. & Tab. cui & Smilax Peruviana, & Ger.

Smilax aspera Zacynthi insulæ Alpino q. agnovit esse veram Salsam parillam quæ medicis utuntur ad sanandam luen veneream: ante dubius erat: quoniam omnes Smilaces asperæ quas viderat exiles admodum brevè. que ac capillares radices habebant: sed in Zacynthio insula longas crassas, aפורתים hispania radicibus Salsæ parillæ omnino similes observavit plantam radicibus ab omni terra deletam impetuosam torrentis aqua, quam transeun. Græcus, loci accola & agricola Smilachiam nuncupavit. Ea rulum præ se ferebant saporem uti radices Salsæ parillæ. Pharmacopola ejus loci multum lucri se fecisse his radicibus ipsi affirmavit aliud missis pro Salsæ parilla: quam mercatura n. clam faciebat Cayri in Salsæ parillæ fascibus ex Hispania aפורתים v. dit. portiones radicum nodosarum vel gericularum asperæ Smilacis, à quibus procedunt radices, qui-

bus utimur cum foliis & ranulis spinosis. Zacynthi verò Smilacem asperam ab Itæica diversam ostendit figure foliorum varietas: sunt enim in breviora: diæces habent etiam nodos quosdam qui non reperiuntur in aliis Smilacibus asperis. Hispani Carzæ parillæ nomen viderunt propter cognationem, quam cum Smilace aspera habet, quam in j. Sarzæ parillam (quasi dicas Rubum viticulam) vocant: Parra enim in Matthioli interprete, Vitis dicitur, & Parilla viticula, sive parva Vitis; Zarzæ autem, Lacuna teste, Rubus significatur.

Semper autem Salsæ parilla deligitur nigrior, recens, non cariola, fractu contumax, quæque assulati in frangitur, & ponderosa: nam quæ carie n. sensiti, & dum frangitur pulverulenta est, inutilis exilitur.

Vitis Carzæ parillæ Hispani ab hinc sexaginta annis circiter innotescere cepit, quoniam ea Indis pro præstanti medicamento erat, ad multos variò. que morbos. Longè alia erat ejus utendæ ratio cum primùm in medicinam recepta est, quàm nunc est: tum enim Indorum consuetudo observabatur, quam in suis morbis curandis usurpare solent, ad quos profligandos maxime reperiebatur efficacia. Verò in nostri sæculi delicia in causa fuerunt, ut eodem quo Guayaci aqua modo nunc propinetur, Carzæ parillæ febrim minutum concisa aqua mace-
Carzæ parilla præparanda a pud Indos à ratio.

rabatur, deinde in mortario duo tundeatur, donec omnino in mucaginē quandam resolveretur, quam inde colabant. Hujus liquoris ita expressi scis capax cyathum calidum manè hauriebant, deinde tragulis sese tegebant, & duarum horarum spatio iudabant. Quid si interdum sitis urgeret, idem mucosillius potus erat. Sub noctem, alium ejus calentis cyathum hauriebant, atque tantum inde temporis, ut manè sudabant. Hic ordo triduo integro observabatur, ut neque aliud ederent, aut lberent præter eum lentorem calidum expressæ carzæ parillæ. Hæc ratio præparatam ego initio plerumque propinavi: multoque melius curavi, quàm nunc sanatur. Subsecuta est alia ejus propinandæ ratio videlicet, duæ uncie carzæ parillæ lotæ, corfractæ, & m. parauda
Carzæ parilla alterata ratio. in concileis novum fictile cum sex aquæ sextantis in unctur & viginti quatuor horarum spatio macerantur: obturato fictili, coquantur lento igne, & prius incenso, ad quatuor sextationum consumptionem, eadem ratione ut in Guayaco diximus: refrigerantur, colantur, & fictili vitrato reconduntur. Eadem deinde carzæ illo ipso fictili aqua pleno maceratur, aliquantulum fervet, frigida colatur, & fictili vitrato asservatur. Purgatus, ut decet, æger, & Viranda
Viranda medicus. calido cubiculo se continens, manè decem uncias prioris carzæ parillæ aquæ hauriet, sudabit duas horas; sudore deterlo, indusium & lintheamina mutabit, ut in Guayaci portione dictum est. Idem sub noctem, octo post prandium horis (nam sub undecima prædebet) faciet: post sudorem uvæ passas, amygdala, & panem biscoctum comedit, & de secunda aqua bibet. Quindecim diebus hunc ordinem observabit, nisi imbecillitas fuerit vires, tunc enim conceditur usus carniū exigui puli assii, serissim quantitatem augendo. Lesto se continet ad minimum novem diebus prioribus, reliquis in cubiculo sedebit, aut deambulabit, frigus & aërem fugiens. Decimo quinto purgabitur keni aliquo medicamento atque etiam trisimo die, omnia ea observando quæ in Guayaci decocto fumer de erant vivimus. Sed etiam post trigefimum diem bona vi. ctus ratio per quadraginta dies utetur, virò. que abstinebit & mulierum congressu. Hæc est vulgaris æque carzæ parillæ fumer de ratio, cuius præparandæ modos secretiores etiam expertus sum: quos hic recensere non pigebit, ne quid eorum prætermis-

tamus,

tamus, quæ ad çarçam panillam pertinent. quando-
quidem medicamentum est, cuius usus & facultates
maximè celebrantur. Iam annus est sextus & vicefi-
mus, quod syrupum confeci, non modò in hac ur-
be, sed tota Hispania laudatissimum, ad morbum
gallicum, atque alios profligandos: nam neque cal-
facit, neque inflammatur, Guayaci videlicet siccitate
temperata, & çarçæ parillæ calore mitigato: hoc
modo. Çarçæ-parillæ unciz duæ, Guayaci quatuor,
ut supra dictum est, præparatur, Zizipha sex & tri-
ginta, pruna passa viginti quatuor, utraque officulis
reputata, florum borraginis semuncia, violarum
randundem, hordei mundi aliquot grana, in sex a-
quæ sextariis lento igne coquantur ad quatuor sex-
tariorum consumptionem: colantur, & decem hu-
jus decocti unciz, una syrupi violati admiscetur. Ca-
lidus mane & vespere forbeandus datur, eodem ser-
vato ordine qui supra dictus est, sudorem etiam (si
provocabitur) detergendo. Conceditur ab initio
eius pulli gallinacei exigui, & reliqui cibi supra enu-
merati, & bibitur simplex aqua çarçæ-parillæ, quæ
fit ex ejus semuncia in octo aquæ sextariis cocta, ad
duorum vel paulò amplius consumptionem. Ea ra-
tione curantur, cum omne genus morbi gallici, tum
reliqui, quos aqua Guayaci, China; aut çarçæ paril-
læ curari diximus. Fuit hoc serapium primò conscri-
ptum in gratiam Pantaleonis de Negro Genuensis,
qui licet jam multoties Medicorum operâ usus fuisset,
atque Guayaci decoctum aliq; medicamenta sum-
pisset, de secessissimis tamen erat viribus, scitòque
in super in crure, & leviss doloribus afflictabatur: at
sumpto serapio, probè curatus est. Fit item alius sy-
rupus huiusmodi: çarçæ-parillæ octo unciz consa-
ctæ & concisæ, in octo aquæ sextariis ad sex consum-
ptionem coquantur; in binis qui supererunt sextar-
iis, sacchari libræ quatuor in jiciuntur, sitque syrupus
ut moris est. Ejus syrupi tres unciz manè, toti-
dem nocte sumuntur, prandium esto de cibis boni
succu, cæna sobria; potus è simplici çarçæ-parillæ a-
qua. Eo utatur donec assumptus sit, quo tempore
ad sua negotia peragenda egredi non verabitur. Cur-
rat hic syrupus plerisque ex morbis supra enume-
ratis, sine molestia. Ex ea etiam fit pulvis in hunc
modum: Nervo illo interiore seu matrice exempto,
çarçæ-parilla exsiccat, contunditur, & citratur.
Hujus pulveris (purgato prius corpore) drachmam
manè jejuni sumit, atque simplicem prædictam
aquam haurit, idem nocte facit dormiturus. Cibus
sit boni succu, potus illa aqua simplex, vino abste-
neat. Vtilis est hic pulvis in lue venerea, alijsq; mor-
bis ab ea oriundis: nec non scabiei purulentæ &
saniosam, in manibus & pedibus misce sanatur, hac
ratione: Purgatus æger, etiam (si necessitas urgeat)
non purgatus, pulverem modo prædicto sumet,
simplicem illam aquam sumet, & rimis quæ in hoc
morbo à salsa pituita, corruptòq; humore nata, pe-
des & manus occupare solent, paululum aquæ sub-
limatæ rosaceæ simpliciore dilutæ plumulâ illinet,
deinde emplastrum Guliemi ferventis vulgò ap-
pellatum, aut palmcum, panno sericeo tenuiter in-
ductum omnibus locis quibus illita fuerit sublimatæ
aquæ simplicior imponet, singulis diebus repetet,
& quindecim dierum spatio perfectissimè curabi-
tur, nec aliis medicamentis opus erit: absterget e-
nim, carnem generat, & ad cicatricem perducit. Ho-
die tam frequens est aquæ çarçæ-parillæ usus modo
prædicto, ut in omni morborum genere fumatur, si-
ve in de fluxionibus, flatibus, uterique morbis frig-
idis, si ve aliis quibuscunque, modò non sint acuti,
aut iis febris accesserit: idèoque non minore copia
multis locis afferatur decoctum simplex çarçæ-pa-
rilla, quàm aqua vulgaris. Certum est tamen, his qui
calidâ, hepatis præserim, intemperie laborant, non

convenire: nimis etenim exalfacit: sed ventricu-
los frigidos fovet, & flatus mitificat discutit. Illud au-
tem animadvertendum est, has tres aquas non nisi
Autumno, aut Vere propinandas esse. Calida est &
sicca in secundo ferè gradu. Duplex verò ejus Sarsæ *Carça Guayaciliana*
parilla, quæ ex provincia Quito caput inferri, exhi-
bendæ ratio apud illos observatur. Prior, quâ Indi & *exhibenda*
nunc utuntur, & ab initio usi sunt, hæc est: çarçæ-
parillæ radices, quot opus erit, sumentes, nervo illo
interiore repurgant; corticem, si sicca sint radices,
macerant, donec mollescat (virides maceratione
non egent) deinde minutim concidunt, & addita a-
qua contundunt, ut succus extrahi possit viscidus &
mucosus, cuius manè eam quantitatem sumunt,
quam uno haustu aut pluribus bibere possunt: le-
ctum deinde ingressi, plurimum sudant; postea, mu-
tatis linteis, pullum edunt, & corticis illius succum
hauriunt, in prandio, in cæna (quæ levis erit) atque
interdiu: deligendus est tamen locus ab aère & fri-
gore liber. Hac ratione, & usu conservarum, neces-
sariorūque aliquot fructuum siccatorum per nif-
so, octo aut novem dierum spatio, omnibus mor-
bis liberantur, quos çarçæ-parilla curare solet: vali-
dum autem & robustis viribus eum esse oportet,
qui hac curatione utetur. Altera convenietis qui *Carça ex*
imbecilliores sunt, nec superiorem, sine manifesto *sub, unde ratio altera.*
vite discrimine, ferre possent, çarçæ-parillæ nervo
suo liberatæ, & ut superius, macerata, si sicca sit,
deinde contuse, quatuor unciz, plurisve aut pau-
ciores (nam hic nullus ponderis aut mer suræ usus)
in octo aquæ sextariis ad dimidias decoquantur, ex
ea aqua quantum possunt semel aut pluries bibunt;
in lectulo deinde se componunt, ad sudorem pro-
vocandum, qui tamen si adeò vehemens non sit, ut
superior, copiosus tamen est: mutatâ veste pullum
edunt, & eadem aqua (nam uno die coctura absumi-
tur) cum in prandio, tum in cæna, illis potus est:
ab aère & frigore sibi cavent: repetitum per quin-
decim aut viginti dies hoc medicamentum, omnes
morbos sanat, non sine magna omnium admiratio-
ne, præter febrem, aut morbos acutos, in quibus *In quibus*
çarçæ decoctum exhiberi non solet. Istic neque in-
itio diæte, neque in mediâ, neque sub finem sese pur-
gant, uti nos facimus (nam & medici & medicamen-
ta composita illis desunt) sed muliercularum dun-
taxat operâ utuntur, quæ illis hujus decoctum pro
arbitrio exhibent. Illud verò observatione dignum
in hac curatione, quod solus radices cortex, nervo ex-
empto, in usu est (efficax enim ille nervus inutilis,
imò operationem, nisi eximatur, impediens). Idè-
que nunc eorum exemplum secutus, solo cortice in
hunc modum uti soleo. Quatuor corticis çarçæ-pa-
rilla lotæ unciz in octo aquæ sextariis viginti qua-
tuor horarum spatio macero, deinde ad dimidias de-
coquo: quod si calorem in egro metuo, hordei mun-
dati dimidiam unciam inter decoquendum adjicio,
& in magno calore, vulgaris aquæ loco, cichorei stil-
latium liquorem cum hordeo substituo. Hæc aqua
temperatissima est, & admirandos ejus effectus in
multis expertus sum. Observandum item est, ut *Quantum po-*
quanta possit quantitate æger hanc aquam, uti retu-
limus, bibat, si ve uno haustu, si ve pluribus, quia ma-
gnam quantitatem bibendo plus sudabit, & citius
certiusque sanabitur. Itaque hanc novam sumendæ
çarçæ-parillæ rationem maximè utilem fore puto,
faciliusque & brevior tempore curandos ægros.
Aliam addit Fragosus ejus præparandæ rationem, *Catapotia*
quæ est: çarçæ-parillæ libra una bis lota, benè con-
tusa, & minutim concisa, in decem & sex aquæ sex-
tariis toto triduo maceratur, deinde lento igne co-
quitur usque ad integram ferè consumptionem, h. e.
ut acetabulum seu scutella ejus decocti solium rema-
neat: çarça statim ex prælo imponitur, succusq;
expi-

HISTORIAE PLANTARVM

exponitur si uncias duas aut eo amplius, etiam si ex eo quod super fuit decocto quantitas augeri debeat. Lento igni imponitur: ubi servere coepit, priusvis aloës optime 3 ij. myrrhae sele 3a, Nucis pōicæ magnitudine; Croci momentū (sunt qui Ligni aloës pusillum addant capitis roborandi causa) injiciuntur & continuè agitantur, donec a nyli crassiciem contrahant: ex ea massa catapotia formantur.

Exhibendi ratio.


Ex his duo singulis decem prioribus diebus devoranda dantur, & singula reliquis viginti, sub horam undecimam noctu. Si verd in veteratus sit morbus, & aeger validus, tria singulis decem prioribus diebus, bina subsequentibus decem, singula reliquis sumi poterunt. Dimidia gallina elixa in aqua (cui salis & croci momentum, & aliquot ciceris grana in jecta sint) meridie datur edenda, reliqua pars in cœna. Potus erit aqua gargæ simplex: surgant hora decima, cubitum eant ante solis occasum. Iis catapotis gravissimos dolores, & brachiorum crurūque paralyfes curari experientia se consecutum scribit. Zarza parilla (attestante Benz.) Veneræ contagioni & aliis morbis medetur. Ea nempe duabus silicibus trita expressus & percolatus succus admisto aquæ calidæ modico egrotis bibendus porrigitur. Si mox hausti ejus potionis, quantum natura patitur, mensurâ, loco calido compositi, quoad tollerate possunt exsudent. Eo medicamento tres aut quatuor dies, ut vulum est, utuntur: bis octo tantū n interea pane & pulli gallinacii assi paululo vescerent. Alij ejus herbæ ramulosos duntaxat aqua incoquentes, jus eliciunt quod interdū bibunt: & eo foribitionis genere nonnulli duos trêve continuos menses utuntur. Radicum decoctum exsiccat, si Lobelio credendum: sudores & urinas cit: cutem evacuat, & quæ cutem subierunt, educit. Pro Salsa pariglia ut & Ligno sancto se feliciter usum esse, Rosmarino, Sabina, Smilace spinosâ, Junipero & similibus, auctor est Bovius.

Salsa succum.

Herbarum majus.

Substantia.

CHINÆ RADIX. CAP. XII.



MAgnæ crassitiei sunt radices, apophy. bus tuberosis inæquales lentis fibratū fragmentis hinc inde apparentibus, latis ponderosæ, modò effictæ ror sint, colore foris ex fusco rubet, intus ex modica rubedine albescens, substantia medioenter compacta, nullis fibrarum pectinūve vel vestigiis apparentibus, quo modo ferè videmus Iuglaridum fungos compactiores, sapore nullo manifestato, urde

Antea nomen apud nuperos meruit.

Figura nostra est ex ipsa radice, cui etiam partem addidimus ex Lobelio, ut & folium spinolo pediculo ex append. Lugd. cuius figura, ut ait, ex recer. ussima China expressa est, quæ demonstrat eam sub terra serpente, ac variis ex locis teretes ac lignosos processus emittere, quibus nova radicum aliarum foveboles adnascitur & incrementum capeffit, multis & tenuibus alicui fibris capillata, quibus nutrimentum attrahit.

Est autem duplex China ab autoribus descripta; alia ex India occidentali, Hispania nimirum nova & Peru, quæ colore intus magis ruffo est; alia ex India orientalis regione Sinarum allata. Orientalem sic describit Garcias: Trunc aut quatuor pal norum in altitudine adurgit cauliculis tenuibus, quos rara folia cingunt, Mali Allyrij junioris similitudine: radix palmi longitudine, interdum in crassa, nonnunquam tenuis, quæ recens eruta ad nodum tenella est, & cruda aut elixa mandi potest: arbores Hederae modo scandit. Linschot. Ind. or. par. 4. c. 37. Chinæ radix fruticis more excrevit, foliis paucis, Aurantium forma. Acoftæ Orientalis China planta est multis tenuibus spinosisque sarmentis prædita, Smilaci asperæ non ab similibus, quorum maxima minimum mandis digitum crassitie non superant, foliis Plantaginifoliz latitudine: radices pugnum nonnunquam æquant, interdum minores sunt; solidæ, graves, candidæ, interdum etiam rubescentes, & multæ sæpè numero simul coherentes. Est occidentalis China Monardi Arundinis majoris radici similis, nodosa, intus alba, interdum rubescens, foris rubra. Saxoniæ radix est Arandinis latifolia, quam virentem se vidisse refert Venetiis in horto Petri Bosselli, ideòque deceptum ait Acoftam, ut qui arbitratus sit plantam esse arboribus adhaerentem, ut Hedera. Amatius quoque inter Arundines recensuit: at Casalpino, China orientalis potius ex genere Iridis, quam Calami videtur. Cæterum cum China suis sarmentis Smilaci asperæ ab similibus non sit & suis cauliculis Hederae modo arbores scandat, merito in scandentium classem refertur.

Considerandum quoniam sint ij apud Auger. Ferr. qui Chinam & Apion, res & delineatione & facultatibus aptè diversitas confuderint. Miror, inquit prædictus auctor, doctos aliquot viros ex sola Chinæ figura turbata Apion judicasse, quasi nihil sit, quod Pyrum referat præter Apion. Ego hac in parte Augerio non subscriperim: meo enim iudicio non propter formam aut quidd Veterum apion existimant, Apion vocarunt; sed ex eo quodd China insipida sit.

Lob. Adv. sub Acoro aquatico, Schinæ (ita enim vocat) obiter meminit, appellatque Schinam Americi orbis. Titulo autem de Apio vera Chinam sive officinarum Apium & Amior (propter nullam terminè gustus perceptibilem qualitatem, sic enim sonat Americi Græcis) & non Amior cognominat, & Occidua Florida Pyrisformam. Eid. hist. belg. videtur species Acori, Arundinis aut Cyperi.

Monardi, Ioub. Lac. Lob. ic. Cast. Matth. (huic & Cina) & Tab. China, cui & Schina, Boeckenhurg. Chinna sive Cinna, Cast. China radix, Frag. Garc. Acoft. & Lugd. qui in app. alteram figuram dat sub titulo, Radicis Chinæ Acoftæ. China radix, Cord. hist. Chinæ. C.B. Dicitur China & Chinæ radix, à China Indiæ regione, in qua copiosè nascitur: Vocatur hoc excellens medicamentum apud Acoftam in Chinaram regione Lampaton, Lampaton vel Lampaton, in Decan Lampas, in Canarin Bonti, ab Arabibus, Persis & Turcis Ch. phchina.

Radix China pumò innotescere coepit post annum 1535. adferentibus Chinenfibus qui sunt Ahiñici Scithæ, Goam Indiæ ubi unicam duntaxat plantam perpussillam vidit Garcias. Iuxta arbores ferendam esse perhibent, quoniam Hederae modo eas scandat & amplectatur: nascitur in Chinaram regione vastissima, quæ Moscoviam usque extendi creditur: invenitur tamen etiam in Malabar, Cochinchina, Cranganor, Tanor & aliis locis. Monardes auctor est etiam ex Occidentali India Chinam deferri, vulgò autem in Sina Orientalis Indiæ provincia, Sychiz atque Sericania huiusmodi, maritimus locis nasci,

leam. naldi, Arundinis, aut Vlvæ modo. Optimam esse recentem, sapore it. lipidum, pinguem, ponderosam, solidam, quæ neque tere dinem, neque cariem lenferit. Mercatores autem foramina à tere dinum erosionem, aut carie facta obturant bolo Armeniâ aquâ dilutâ, velut cemento quodam, obducuntque extrinsecus pari fraude totam radicis molem, quæ fraud & nativum illius colorem ementitur & ei pondus addit. Melior candida quàm rubescens, Garciz. Linfectano tamen quo nigrior radix, eò melior.

Lobel quoniam omnis saporis expertus est China, gratissima est faciendo cõtra lucem veneream decocto, & rad. Ching in orbiculos concisa ʒij. aq. fontanæ lex aut septem libras, macerentur simul diem & noctem in fictili novo; postea lento igne coquantur, fictili benè operculato, aut in balneo mariæ. ut sit decoctum Salte, aut Guayaci, quoad satis videbitur. Hujus decocti bibat quotidie bis, quantum ægroto & Medico satis esse videbitur. Prodest hoc decoctum non tantum in lue venerea, verum etiam omnibus morbis sudores postulâbus. Tamen si porro non desint ex recentioribus, qui Chinæ radicem acriter, sed immeritò damnant, tamen non sine causa magnis effertur à Garcia laudibus, quoniam vel lue venereæ infecti ut curentur, extremâ illâ victûs ratione non egeant, qualis non citra molestiam in Guajaci usû observanda, sed tantum abstinentiam illis sit à bubulis & suillis carnis, pisce & crudis fructibus. In magnis autem doloribus & inveteratis hujus radici uncia in septem aquæ sextariis coquitur, ad dimidij usque humoris consumptionem. Servatur id decoctum usui, vase aliquo vitreo, aut figulino vitrato. Spuma verò inter bulliendum colligitur, & utiliter ulceribus tumoribusq; imponitur. Salutaris est etiam densus ille vapor inter coquendum exhalans ipsi doloribus. Interdum calido decocto tumores fovemus: nonnunquam lineos pannos decocto madidos ulceribus imponimus, eaque numdamus. Solent Sineses majori quâritate in sua regione allumere, quod frigida admodum sit. Quos cum sciatica laboris imitari vellè ait Garcias, radicis duas uncias, addidit interdum semisse in precedenti aquæ quantitate decoquens, & calidè hauriens, provocandi sudoris causâ, ob nimium medicamenti calorem, in tantos hepatis ardores incidi, ut universum corpus erysipelate & phlegmone laborare coepit. Itaque meo periculo facti sapientiores reliqui, calido decocti potu, & tantâ radicis copiâ in posterum uti desierunt. Quare hujus unciam in septem aquæ sextariis decoquimus ad medias, aut ad tertiam partem, pro morbi & ægri natura, subinde ea medicamenta injicientes, quæ hujus radici facultates corrigant. Eg. Si dolor capitis, aut nervorum adsit, rosè marinum, aut rosas injicio: si obstructio-nibus hepar labore, apium: si ardor adsit cû obstructio-ne, intubum: si ulcus vesicæ aut renum infestet, addo glycyrrhizæ succum interdum radicis admisceo æquale pondus bordei. Soleo autem hujus radici decoctum sumptuosius, prius syrupis convenientibus purgare, & nonnunquam syrupos Chinæ decocto diluere. Bene autem purgato corpore, radicis decoctum propriare incipio; post 15. diem, minorativo, si opus sit, exhibito item alio interdum post 30. diem. Toto hoc tẽpore, naturâ, vel arte alvus libera sit. Quod si nimium incalcescat æger, radicem minis decoquo, aut decocto aquam intybi, vel sumitteræ, aut buglossi injicio. Quod si nec hoc sufficit, decoctum subtrahatur, curatio nemque in aliud tempus magis opportunum differo. In singulas verò curas, radicis usus esse solet ad ʒxxx. uncias totidem dierum numero, quibus cura perficitur, respondentibus. Rarò calidum decoctum exhibeo, nisi in vehementibus & inveteratis doloribus, quando sudoribus

Tom. II.

materiam evacuari oportet, bis in die manè sc. & vesperti. Efficacior est hæc radix in inveteratis, ubi videlicet magni tumores, & ulcera maligna edunt, q̃ in recentibus morbis. Quidam in Balagata calido radicis decocto, ejusdem radicis tritz ʒj. s. injiciunt, quotiescunque mane & vesperti sumunt. Sunt qui manè laminam conservæ ex hujus radici pulvere & melle (sive saccharo, si magnus adsit calor) paratæ edant, deinde radicis decoctum bibant. Augetur autem, aut minuitur pulveris quantitas in hac cõserva, & quandoque corrigitur, pro Medici arbitrio. Radice adhuc tenerâ Sineses cum carne elixa vescuntur. Vile demum etiam est hujus radici decoctû præter eos morbos, qui cû contagio luis venereæ committuntur quid habent, ad paralytes, tremores, articulorum dolores, sciaticam, podagram, tumores schirroides & ædematodes, tum etiam strumas extirpat. Succurrit vetriculi imbecillitati, inveterato capitis dolori, calculo & vesicæ ulceribus. Intelligo illos qui hoc decocto utuntur, mulierû conspectu vehementer ad libidinè accendi. Quare consultum videtur, ut per curæ tempus nullâ ad ægros mulieres admittatur. Et hæc Garcias. Hæc radix adeò innoxia apud Acoftam censetur ut eâ fumentibus, tamen si nullam victûs rationem observet, sed liberè carnibus & piscibus vescantur, nihil in eò modi adferre credatur. Vulgaris in Sinarâ & Indiæ provinciis sumedi hujus decocti consuetudo est, ut radicis ʒj. additis radicû apij ʒij. decoquantur lento igne, si hæc fumo, in aquæ th. xvj. ad th. vj. consumptionem reliquas x. in fictili vitreato adservat, sumuntq; ægri singulis diebus recentis decocti (nâ facilè corrumpitur, nec ultra diè adservatur) tepidi manè plenum haustû, duabusque horis in lecto remanent, postea surgunt; duabus autem horis ante cenam totidè hauriunt, interdiu de eadè frigido bibentes. Plerique tamè etiam dum sua negotia exercent & navigant, singulis diebus manè & vesperti duas ejus radici in pulvere redactæ drachmas ex vino, aut ipsius radicis decocto felici successu bibere solent. Ad his magna quantitas radicis absuntur, quâ Garciz plurimû fidunt, non modò in curandis morbis ab eo enumeratis, sed etiâ in hemieria; in herniis humeralibus & ventosis, in colli vesicæ & penis callis, corumq; ulceribus: venerè etiam admodum excitare creditur. Ex hac etiam radice recenti aqua sili-laticia elicitur, delicatioribus admodum familiaris: decoctû ipsâ aquâ præstantius est. Optimè cõservatur radix, si pipere confrecto involvatur. Hactenus Acofta. Solius radici est usus apud Indos, inquit Mo-nardes: propinatur ejus aqua in diuturnis & acutis morbis, febribus præsertim; etenim sudores provocat, cujus rei gratia multi sanantur. Lusitani eam prædicant adversus omnis generis morbos, sed maximè lue veneream. Ejus autem parandæ hæc est ratio. Radicis Chinæ nunctim concisa fictili novo imponitur, huic adfunduntur aquæ sex sextarii, maceratur quatuor & viginti horarum spatio: fictili ob-turato, coquitur lento igne ex prunis incensis ad dimidias, quod eâ rationeprehendetur quam in Guayaco edocui; frigescit, colatur, atque in fictili novo asservatur loco aprico, aut juxta ignem, ut diutius maneat incorrupta. Purgato, ut decet, corpore, collocatus æger loco aprico & conveniente jejunis dictæ aquæ calidæ decem uncias hauriet: duas horas aut paulò diutius sudabit: sudore deinde absterlo, indusum & linteamina mundis & calefactis mutabit; deinde in lectulo duas aut tres horas perdurabit; postea vestitus, calidè se in cubiculo continebit, quod neque aër, neque frigus permeabit, genio indulgens, & lepidus colloquiis se oblectans. Crescit undecimam horam dimidium pullum coctum, aut gallinæ quatuor partem cum paucis sale edet, initio prandij

L

Alia hæc radice utendi ratio. Conserva.

Radix in cibus.

In Indis sumendi consuetudo.

Radix pulvis.

Aq. siliaticæ.

Preparanda China ratio.

Aqua Chinæ sumendi ratio.

cyatho jusculi epoto: pro bellariis carnes cotoneorum adprentur: potus erit similis aqua, quam jejunos sumplit, quia decocti tantummodo unum genus est. A sumpto jusculo, uvas arillis emundatas, aut pruna passa sine ossiculis, & panis bene cocti crusta, biscoctumve initio prandij edere poterit. Si interdiu bibere volet eadem aqua cum conserva aliqua propinetur. Octo post prandium horis lectum denuò ingrediatur, alias decem aquæ uncias quam calidè poterit, bibat, duas horas fudet, sudore deterso, indusium & lintea calefacta mutet, post horam cœnet conservam aliquam, aut uvas passas, aut amygdala, & aliquantulum biscocti; de eadem aqua bibat, postremò cotoneorum carne vescatur, potu deinde abstineat. Hæc victus ratio triginta continuis diebus observanda, nullâ aliâ purgatione adhibita, sed per cubiculum calidum obambulans, & sese oblectans, ab omnibus abstineat quæ illum offendere possunt. Purgatione absolutâ, bona victus ratio servanda est quadraginta continuis diebus, vinnôq; abstinendum & mulieribus: potus erit & Chinæ superioris jam decoctæ, deinde in umbra rescicatæ, uncia una, in sex aquæ sextariis denuò bullita ad dimidias. Illud verò diligenter curandum, ut Chinæ radix per quatuor & viginti horas semper maceatur ante decoctionem, sive illa hatin triginta, sive quadraginta dierum potius usum. Ad varij generis morbos utilis est hæc aqua, luem veneream cuiuscunque generis, vulnèra & ulcera antiqua, tumores schirrosos discutiens, articulorum dolorem solvens, & qualemcunque podagram, sed coxendices præsertim curans. Inveteratos capitis dolores mitigat, & stomachi de fluxiones omnes & rheumatismos sistit, bonum colorem conciliat, icterum solvit, & omnem hepatis intemperiem emendat, ad quam valde celebratur. Paralytin & omnes nervorum morbos sanat, atque vesicæ enterocælis utilis, quia humorem, unde generantur, absumit: frigidis omnibus morbis & melancholicis convenit, ventriculum roborat, & omnes flatus discutit. Febrilibus diuturnis, quotidianis, & erraticis prodest, sudoris insigni provocatione, quæ etiam in pestilentibus febribus utiliter quidam arbitrantur. Siccæ est in secundo gradu cum exiguo calore, idque deprehendere licet ex eo, quòd aqua, cilm Guayaci, tum Sarçæ paritæ calefacit, & sitim excitat, hæc neque sitim ciet, neque caloris alicujus indicium relinquit. Ad pituitam consumendam & ad juncturas, cerebrum & ventriculum roborandum decoctum radices Cynæ sæpè maximo cum ægotantium juvamento à se fuisse comprobatum scribit Franc. Indiæ de Gutta. Sed in Chinæ præparatione & usu quatuor castigatione digna tradit Augerius, quæ quis datâ operâ ex ejus libris repetere poterit, Chinæ radix ut annotat Saxonia, accepit summam auctoritatem à Carolo V. Imp. qui summo cum fructu primus ferè omnium radicem accepit & à morbo venereo antiquisque doloribus est liberatus. Certum est Chinam ritè administratam luem veneream superare, cutem mundare, dolores profligare, macies reparare: test in activis qualitatibus temperatissima. desiccata quidem excrementis humores, alimentales autem vel rescit, vel saltè conservat: Idè humiditatem habet oleosam atque firmiter substantiæ hærentem, ut hæc ratione & diuturnam & multoties repetitam patitur coctionem: si minimè caiola fuerit, neq; admodum gracilis & sicca, sed mediocriter gravis, colore inter album & rufum medio. 2. Rad. Chinæ incisæ in tabellas, unciam: infundatur in aqua lb. vj. deinde bulliant in vase oris angustij bene tecto usque ad consumptionem medietatis: præcipit Vesalius in sua epistola de China ut decoctum hoc calidum conservetur, vel singulis diebus recens fiat, aliquin

China fructuosa.

China temperata.

Pituita in sumptuosa.

China præparata.

Vires.

Temperamentum.

ait acidum fieri: sed experientiâ docetur oppositum, nec servatum 4. dies accessit: ex residuo fit aqua secunda factâ decoctione in lib. 2. usque ad consumptionem tertij partis. Iterum verò quod residuum est coquitur in totidem aquæ libris ad eandem consumptionem. De radicis Chinæ usu Vesalius integrum librum scripsit.

CHINA SPURIA PYRIFORMIS sive turbinata.



Chinæ nomine Defm. nobis ante annos plus minus 28. datum radices cuiusdam fragmentum, quod necdum ad eum usque annum terebinthæ aut cariem sensisset, quod haud scio qua in re à China officinæ differat, consistentia eadem, colore quæ, sapore itidem nullo: fibrosis nervis medijs transcurrentibus, quemadmodum figura ex Lobelio exhibet, alioqui in reliqua substantia nullum

nervulorum fibrarumve apparet vestigium; tamen modo cortex, quo obtegatur, rugosus est, zonisque præinctus, uti exicone apparet. apophyses in hac radice veluti & in China apparent. Quoniam verò proximè accedit ad Chinam spuriam pyriformem Lobelij, utramque conjunximus. Lob. suam in hunc modum describit: Majusculæ sunt radices, & Pyri formâ tuberculis prægrandibus, Apium ab effigie turbinata mentientes; colore verò & concretionem Chinæ, pro qua ex India missæ sed falsæ: adstringunt enim potius substantia fibrosâ & densâ, colore & micis Rhabarbari amulis, sine odore, foris color rufus. Quidam in India versati affirmant, nec Arundinis, nec Acori, nec Cypri radicem esse, qualis esse potest China dicta, sed cuiusdâ magnæ arboris. Notandū autè ad sudores potius sistendos, quâ provocandos facere: id quæ esse cõperit, qui expiri volet.

Nostri Icon est ex ipsa radice cuam habemus, & Icon. China spuria pyriformis sive turbinata Lobelij. In adv. c. de Acoro Aquitanico, h. e. de China spuria Acori effigie, vocat radices prægrandes, turbinatas Americi orbis Schinam emenientes; item c. de Aplo, Occidua floridæ Pyriformem. B. pin. Chinam 2. spuriam pyriformem.

PSEUDO-CHINA RADIX CLVSII.

Facile nobis persuademus jam dictam eandem esse cū Pseudo-Chinæ radice Clusij Exot. quam Londino ad ipsam pro Chinæ specie mittebat anno à Christi nativitate 1591. Iac. Garetus, & VVingandeaov sive Virgineæ relatum.

Valde autem nodosa erat hæc radix, & in aliquot tubera formata, subruilo colore, samentis aliquam partem summo fastigio adhuc retinens, quale in Smilace asperâ conspicitur, duri, lignosi, multis venis, ut Smilacis samenta præditi: ipsius radices substantia etiam subruila, ut in Butomi (vulgo Pseudo-acorus nuncupatur, & nostrâ adhuc ætate à nonnullis magno errore pro legitimo Acoro usurpatur) radice, salvi initio saporis sive gustus, quàm videlicet vultu, deinde desiccantis.

Ulam



B. phyt. China 3.
five pyriformis.

g/cr.

es/cr.



DCMS.

770772.

descr. Chl-

а/р/а/а

CAP. XIII.

Athragene
multorum.

Vespa rami-
nata
plon. dilucio-
larum.

then fert, satis dictam, quæ à Græcis *ἀμπελον* & *ἀμπέλι* nominatur &c. Vt verba hæc, quæ à Græcis *ἀμπελον* & *ἀμπέλι* vocatur, & cætera, ad præcedentiā [Labrusca] quæque Oenanthen fert, satis dictam non referantur, sicuti revera referri non debent, sed ea velut à novo principio legamus, ut de duabus stirpibus Plinium hic loqui accipiamus; priore Labruscā, alterā Vite sylvestris, quæ etiam *ἀμπελον* & *ἀμπέλι* nominatur. Legendum est (inquit Hermol.) non ita ut Labrusca

Labrusca Plinij resistitur.

Oenanthen ferens, Ampelos agria vocetur, sed ita ut duo genera intelligantur, & verba illa, quæ à Græcis *ἀμπελον* & *ἀμπέλι* appellatur, initium sint novæ pædidi. Id & Dioscoridis, & ipsius Plinij testimonio probatur. Plinij dicentis lib. 16. c. 40. Probatur & Vitis sylvestris [Athyragenam significat memoratam Theophrasti. Dal.] alia quam Labrusca, & ipsa Hederæ modo arborescens. Rectè quidem Plinius 1. 23. c. 1. Ampelon agrian appellari dixit, quam ante (inquit Cornar.) apud Dioscoridem, Vitem sylvestrem tradidimus, sed non est Labrusca, quæ Oenanthen fert, ut Plinius ait; Verùm ea Labrusca idem Ampelos agria & Vitis sylvestris nominatur, proinde in his erravit Plinius, sicut neque in Vva taminia sibi constat, quam alibi ad Ampelon agrian retulit cùm paulò ante Vvam taminiam negasset esse Staphidem agrian; cujus tamen contrarium alibi habet.

Plin. error.

Idem 1. 27. c. 7. Vitem sylvestrem aliam esse à Labrusca prodidit his verbis: Ampelos agria vocatur herba, foliis duris, cineracei coloris, qualem in satis diximus, viticulis longis, callosis, rubentibus [rubentibus. Flos qualis eius quem Iovis flammam. ver.] qualiter flos, quem Iovis flammam appellavimus in Violis; fert semen Punici mali simile acinis. Radix ejus decocta in aquæ cyathis ternis, additis vini Coi cyathis duobus, alvum solvit leniter, idèòque hydropicis datur. Vulvæ vitæ & cutis in facie mulierum emendat. Ichthiodicos quoque uti hæc herba prodest tusa cum foliis & illita cum succo suo. Sed vulgata Plinij exemplaria falsissimè habent; vulvæ vitæ & cutis in facie & variis; legendum enim ex veteri codice & re ipsius evidentiā: varos & vitæ cutis in facie. Verba illa (viticulis longis) Dalech. ita reddit: Sarmentis longis, duris, rimoso cortice vestitis; flore capillaceo, fructu exiguis Vitis simili, post maturitatem rubente, granis figurâ rotundis. Diosc. *κόκκους* Plinius ad Punici femina retulit oscitanter, & aliàs totam historiam corruptit. Cæterum, ex omnibus plantis quæ vicina scādunt tres assignat Dalechampi, quarum flos cæruleus, five purpureus, Iovis flori, nempe Aquilegiæ, color similis sit: primam quidem quam granum Nil vocant; alteram, quam Dulcamaram; & tertiam quam pro Clematide secunda pinxit Dodonæus, & quam Pothon cæruleam esse quidam putant. Quæ verò de Vite sylvestri hic tradit Plinius, ea magis convenire putat Dulcamaræ, quam Salicæstrum supra vocavit, & Viti sylvestri similem esse dixit, eisdemque effectus habere. Sed & Hermolao teste, à Plinio lib. 21. in Violis [inter Violas] Iovis flos, non Iovis flamma nominatur. Nam phlox, et si flammam & genus floris apud eum significet, diversus tamen est à Iovis flore.

Vitis sylvestris alia à Labrusca.

Vires.

Plinij lectio corrigitur.

Blum. error.

Dulcamara.

Blum. flor. non flammam.

Vitis sylvestris Dioscoridis videtur.

Orb. lectio manet.

Vires.

Vitis sylvestris [*ἀμπελον* & *ἀμπέλι*] sarmenta Vitis [*ἀμπελον*]. Orb. addit *οἰνοπέγυ*, modo longa quidem emittit, ita deficiente Dioscoride, sed ea lignosa, aspera, & rimoso cortice [*οἰνοπέγυ*]. Orb. non habet folia verò Solani hortensis familia, at latiora, longioraque [*οἰνοπέγυ*]. Serap. legit *οἰνοπέγυ* florem capillaceum, musculosum [*οἰνοπέγυ*]. Orb. *οἰνοπέγυ*, si Marth. credimus quidam *οἰνοπέγυ* fructum exiguis Vitis similem, ac ubi maturitatem consecutus est rubentem; rotunda [*οἰνοπέγυ*]. ver. *οἰνοπέγυ*, quidam [*οἰνοπέγυ*] autem est acinorum figura. Radix decocta in aqua potaque in vini aqua marina diluti cyathis

his duobus, aquosa fiet: atque idèò hydropicis datur. Vvæ ejus tum maculas à Sole contractas, tum Maculas, & alias omnes expurgant. Cibi verò gratia novelli surculi condiuntur.

Vitis sylvestris racemi, inquit 6. simpl. Galen. c. 1. extergendi vim habent, ut epheles & nevros [*maculas solares & alias*] & id genus omne in extrema cute vitium curare possint. Sed & adstrictionem quandam extrema germina [*tum bori ipsi, tum ramuli*] obtinent, quæ & sale [*ac etiam muriâ*] condiuntur.

Vitis five Ampeli sylvestris nomine plures ac diversissimæ plantæ exhibentur. Serapio enim Dioscoridis verba de Vite sylvestri transcribens, & Avicenna, Vitem hanc sylvestrem, cum Labrusca, Vitis sylvestris turpiter confundunt: Actum est à nobis de hac in principio hujus libri cap. de Vite vinifera, titulo de Labrusca. Matthiolus pro Vite sylvestri, five Ampelo agria, plantam exhibuit ab Herbariis Dulcamaram & Solanum lignosum nuncupatum, de qua ante sub titulo, Glycypticos, seu Amara-glycypticos dulcis. Dalechampius Vitem sylvestrem statuit, eam nimirum quæ Vitalba Itolorum multis nominata est. Nos hanc paulò post Clematin latifoliam, five Athragene quorundam inscribemus.

Dod. diversam ab his Vitem sylvestrem depingit & describit Tamumque cognominat, eam scilicet quam Matthiolus pro Vite nigra proposuit, alij pro Cyclamin altera. Est hæc nobis Vitis nigra Matthioli appellata. Dalechampius & quidam periti Vitem sylvestrem, Theophrasti *μύρω* esse conjiciunt: Melathrum sed repugnat florum figura, quòd muscosi non sint, nec capillacei, verùm racematim coherentes.

Ex Galeno Vitis cunctis.

Aequiva.

Clematis latifolia.

Vitis nigra.

Melathrum Theophrasti multis.

CLEMATITIS ACRISS VETERIBUS.

C A P. XIV.

Sequentia, quæ ex Dioscoride, de Clematide sacri adducuntur, in Græco cod. Bas. per Cornarium rejiciuntur: deinde verò ex ejus versione tanquam malè rejecta iterum assumuntur pro legitimis. Est altera Clematidis [*κλεματίς*, quod idem est ac Sarmentaria. *κλεματίς* *ἀμπελον*, à *κλεματίς*, quæ emittit: dicitur aliis *δρυπίς*; Egyptiis *φυλ. ἀμπελον*; Romanis *ἀμπελον*] quæ sarmentum [*κλεματίς*] producit subrubicundum, Viticis modo lentum [*αὐτοῦ*] folium acre admodum in gustu, & exulcerans. Circumvoluit se arboribus velut Smilax. Semen tritum, cum aqua aut aqua multa potum, pituitam & bilem deorsum ducit. Folia imposita lepras removen. Cum Lepidio condita servantur ad usum.

Clematidis folia Galeno acris & adurentis sunt facultatis, adèò ut etiam lepras excoriant. Fuerint itaque ex quarti ordinis calefacientium initio.

Plinius de hac loquitur lib. 24. cap. 10. in hunc modum: Similem huic [*Smilaci videlicet*] aliqui Clematida appellaverant, repentem per arbores, geniculatam & scipam. Folia ejus lepram purgant. Semen alvum solvit acetabuli mensura in aquæ hemina, aut aqua multa. Datur ex eadem causa & decoctum ejus. Idem lib. jam dicto cap. 15. ita scriptum reliquit. Nunc subtexemus herbas mirabiles quidem, sed minus claras, nobilibus in sequentia volumus mirabiles lumina dilatis. Itali Centunculum vocant rostratis foliis, ad similitudinem capitis penularum jacentem [*nascentem ver.*] in arvis; Græci autem Clematidem. Est ejus egregius effectus ad sistendam alvum in vino austero. Idèò sanguinè sibi tritus cū Oxymellitis aut aquæ

Cornar.

Clematidis alia à Diosc.

Vires.

Ex Galeno tempera.

mentum.

Plinius de.

Inter her.

bas mirabiles.

Centuncu-

lum.

Clematis.

aque calidæ cyathis quinque denarij unius pondere: sic & ad secundas mulierum effiçax. Sed Græci Clematidas & alias habent, unam quam aliqui Echiten vocant, alij Laginem, [alteram quam Lygon. alij.] nonnulli repem Scammoniam: & pedales, foliosos, non dissimiles, Scammonæ ramos habet [ea viticulas foliosas non dissimiles Smilacis ramis habet. alij] nisi quòd nigriora minoraq; sunt folia. Invenitur in vineis arvisque. Estur, ut olus, cum oleo ac sale: alvum ciet. Eadem à dyfentericis cum Lini semine in vino austero sorbetur. Folia epiphoris imponuntur cum polenta, supposito udo linteolo. Strumas imposita ad suppurationem perducunt, deinde axungia adjecta percurant. Item hæmorrhoidas cum oleo viridi, phthysicos juvant cum melle. Lactis quoque ubertatem faciunt in cibis sumpta. Et infantibus illita capillum alunt. Ex aceto dentium dolores sedant. Venerem stimulant. Est & alia Clematis, Ægyptia cognomine, quæ ab aliis Daphnoides [myrsinides. Gal.] ab aliis Polygonoides vocatur, folio Lauri, longa tenuisque, adversus serpentes ac privatim aspidem ex aceto pota effiçax. Ægyptus hanc maximè gignit.

Ceterum, qui hoc in loco Centunculus à Plinio nominatur, Aloisio herba est, quam Dod. pingit pro Helxine Cissampelo: sed vires non conveniunt.

Placet magis Dalechampio Dodonæi iudicium, qui Herbe impiæ genus Centunculum vocat.


De Clematide Ægyptia quam Plinius mirè cum aliis confundit & perturbat, agemus postea sub titulo Clematidis Daphnoides.

Dalechampij sententia nobis non probatur referentis Echiten Plinij ad priorem Dioscoridis Clematidem: descriptiones enim multum discrepant. De Clematidebus Plinij sub Convolvulo ex Ruellio multa dicimus.

CLEMATIS LATIFOLIA SIVE

athægens quibuldam.


CLEMATIS LATIFOLIA integra.



radiatis foliis constantes, quorum medullium obfideat mucosus staminum pallidulorum cincinnus, flores excipiunt acini complures cuneatim inde orti pinnatæ lanuginis tomento barbati: radix crassiuscula, fusca, fibris donata.

Ruell. cap. de Ampelo agria, licet multa simul misceat, repetat, nec plantam describat, auctorq; non ciet, sed confuse transcribat: nos tamen per Viornam & Hardeam, plantam à nobis descriptam ab eo intelligi credimus, quamvis non competant ei, quæ

CLEMATIS LATIFOLIA dentata.



durat. Est ei similis quod Salicastrum vocatur: hanc Plinius describit folio duro, cineracei coloris, viticulis callosis, rubentibus, qualiter flos quem Iovis flammam appellat in Violis, ferentem semen punici Mali in acinis ad eisdem effectus. Propterea sunt & recentioribus, qui hæc & Flammulam & Iovis flammam appellarint. Sylvestris vitis ea mihi videtur, quam rura modo Viornam, modò Hardeam vocant, quòd ramorum fæces ea perinde quasi vinculo ligantes distringat. namque viticulis prælongis asperisque cernitur &c. [ex Diosc.] Hanc Plinius credit esse Vvam taminiam.

Sunt qui putent plantam Germanis Waldräben aut Lynen vocatam, Vitem esse albam. Sed errant: est enim, inquit Tragus, Dioscoridis *αἰματόγλυκα*, vitis silv. h. e. Vitis sylvestris, cui Serapio cap. 35. florem canum *Διόσκ. 10* & lanuginosum tribuit, Butaniæque appellat: Vitis silv. plantæ & Plinius mentionem fecit: & meo quidem iudicio hæc planta Salicetrium e jusdè fuerit.

Corn. in Diosc. altera Clematis, Volubilis appellata, *Αἰγελὴ* & Waldräben Germanorum dicitur, *labilis*. non obstantibus aliis qui Waldräben Clematidem Daphnoidem esse volunt. Fuchs. est. Vitis nigra [*αἰματόγλυκα*] ubi quidam annotavit in edit. Lugd. Fuchs. eius Vitem nigram videri esse Viburnum etiam vul. *Viburnum*. go Gallorum cum Virgilio dictum. Sed Fuchs. cum apud illum essem nominabat Vitem sylvestrem. *Vitis silv.* Cord. in Diosc. Pervinca alvum ducens, & Clematis altera, ubi scriptum reliquit, quosdam codices, ut à *αἰματόγλυκα* Gompylo editum, Clematidem alteram nò habere: cens.

Alteram quoque hæc Clematida, ut Galenus referat, Dioscoridè in fine quarti libri descripsisse, aliàs verò in principio libri quarti utræq; describi, sed malè. Priorem enim in principio hujus libri adstringentibus herbis propter virium similitudinem conjunxisse. Hanc verò quoniam alvum semè ejus duceret, in quarti libri fine, ubi de purgantibus agit, descripsisse. Esse autè Clematidè hanc duplicis differentiæ, *Semen purgans*, quarum una grandis frutex sit, proceras arborescens, *Clematis duplex*, & singulis annis incrementum sumens, quoniam caudex & viticula illi aliarum arborum modo durent. Altera verò per omnia huic similis sit, brevior tamen (quamvis & hæc interdum 15. pedum longitudine adoleat) & Autumno caules sive viticulas amittat. Nasci hæc in pratis circa arbuta, quo inundationes pervenire queant. Illam in montibus arbores & vinearum sepes ascendere. Vtramq; Germanis Reibling vocari. Arborescentem tamen majoris, & herbaceam minoris cognomen habere.

Saxones etiam *Wilde ranfen* nominare, quod samentis Vitem emulcentur.

Clematis altera. Matth in Diosc. Clematis altera, quam Vitalbis italicis vulgò vocatis plurimum facie respondere ait, proptereaque sibi omnino persuaserit, Italicam Vitalbam esse Clematidem alteram (quam secundo loco reddiderit Dioscorides) contra eorum opinionem, qui acrem Clematidem eam plantam putant esse, quam quidam rei herbarie imperiti falsò Ligustrum vocant: falsò, inquam, quoniam Dioscoridi Ligustrum arbuscula est, non herba, ut suo diximus loco. Fuchf. Vitalbam Matthioli, Vitem nigram esse existimat, sed errat, ut postea dicitur. Cam. apud Matth. germ. aliam apposuit figuram, dicens, quam Matth. vocat Clematidem tertiam, aliàs dicitur Viorna, & Vitalba, & quibusdam Atragena Theophrasti.

Gesl. coll. Vitis sylv. caustica, Viburnum aliquibus, ac Gallis Viorna, ab usu urendi vulgò vocata. Flore enim, semine, cortice, & radice (inquit idem de hort.) vim urendi habet. Est hæc Clematidi planè cognata: quare à nonnullis recentioribus, si nilliter Flammula nominatur. Eidem cat. Labrusca, Vitis silvestris exulceratoria, *chabris*; Item Vitis sylv. foliis Solani; Viorna, Hardea. Sed Gesnerum de præfenti planta minis distinctè scripsisse, satis demonstrat vocabulum Labruscæ & Oenanthæ, quæ nomina huic non conveniunt.

Ryff. Clematis altera, & Gallorum Viorna. Lon. *Waldrahen/Lynen*; Vitis nigra vulgò, Bryonia nigra Græcorum, Vitis Chironia & Bucranium. Confundit autem nomina duarum plantarum, pingem Atragenam. An eidem in Diosc. l. 4. c. 3. Clematidis altera species, Flammula Officinis. Turn. Vitis nigra, Black Bryonye.

Nihil invenit Anguill. quod melius respondeat *Atragene*. Atragene, quam Vitem albam, quam Fuchf. pro Vite nigra posuit. Si Atragene haberet fructum racemosum, uti vult Diosc. suam habere Vitem silvestrem, eam esse diceret Anguillara. Rob. Const. in lex. *ἀτραγενή* Theoph. quam Plinius Vitē silvestrem transfuisse refert. Qua de re tamen Lob adv. adhuc dubitat, dicens, Viorna vulgi, fortè Vitis sylv. Diosc. & Atragena. Theophr. Non ergo pro Vite sylv. eam planè recipit. Acinis, inquit, est compluribus confectum stipata ab uno pediculo, aptis, rotundis, rubentibus ex fusco, compressis tamen: quare non nulli docti, ubi *ἀτραγενή* legitur, id est, sphaerica figura acinorum vel granorum, *ἀτραγενή* leviuscula immutatione & commodiore sensu legi volunt, id est, rotundam compressam figuram. Ac tamen si conjectura hæc ipsi non satis animum expleat, tamen multò minùs ejus judicio respondent, Amara dulcis vocata, aut Bryonia nigra quas suis locis commodiùs & necessariò aptavimus, notis. Eidem. Obl. dicitur Viorna vulgi, & Vitis alba Italarum; Ic. Viorna.

Amara dulcis. Dod. gall. l. 3. c. 11. Cyclamini species secunda. Cyclaminus altera, *κίρκον*, *κίρκον* & *κίρκον* aliorum, quam postea eodem lib. cap. 48. Vitalbam & Viornam inscribit, speciemque Clematidis alterius haberi refert, sed sibi Cyclaminum alteram potius videri asserit. Idem de purg. & hist. in fol. ait Vitalbam, Bryoniam nigram non esse, ut voluerit Fuchf. sed legitimum Bryoniam nigram aliam esse. Verùm non negandum ad Clematidem alteram accedere atque ejus speciem esse, licet tamen & alia sit.

Thal. Clematis 4. Matthioli. Castori, cujus figura non placet, Clematis 3. Italarum Vitalba. Matthiolum ignorasse, Clematidem alteram liquidò constare arbitratu Guiland. ed. q. dixerit Matthioli, quam gens Italica Vitalbam vocat, à Diosc. sub Vitis sylv. nomine describi. Soleno, Clematis altera Diosc. Plinio

indicta, Vitalba Italarum. Lugd. Vitis sylv. Dalechampi, Clematis; Matthioli. Dalech. in lib. 6. *Æginetæ* c. 77. est Celi & Latinorum Vva taminea, Vitis sylv. Diosc. & Theoph. Atragena. Tab. Vitis nigra 2. Icon ejus nihil valet: Compilator etiam de hac planta confusè scribit. Ger. quoque pro Bryonia nigra sylv. Cordi, malè ponit iconem malam Vitis nigra 2. Tab. Sed ejusdem plantæ aliam exhibet meliorem, cui titulus Viorna, *The trancilore loie*.

Ad Clematidis alterius classem quin sit referenda quam Anguillara Atragena Theophrasti censet, non dubitat Clusius, & insuper Plinio l. 16. c. 14. Vitis sylv. nomine notam fuisse asserit, ut etiam cuilibet utriusque scriptoris verba conferenti facillè apparebit. Sed Plinius lib. 23. aliam adhuc Vitem sylv. profert à Labrusca differentem geniculatam, rimolo cortice, quam si quis conferat cum Vite sylv. Dioscor. unam eandemque stirpem ab eis describi competet. Eam autem Plinius esse credit, quam vulgus Vvam taminiam vocat.

Cafl. Vitalba. Schæp. Clematis seu Vitis sylvestris. *Natura lib. B. phyt. Clematis 1. sive sylv. latifolia ad Clematidem* *Thaeoph. Glus.* Diosc. & Atragena Theophr. referenda. Eid. pin. Clematis 1. sylv. latifolia in foliorum divisuris mirè ludens, & samenta aliquando brachiorum crassitudinis producentis.

Secus margines agrorum inter vepres & sentes crebrò reperiri apud Itales, Germanos, Gallos ac etiam Belgas, jeto secundoque solo, autor est Dodonæus. Vulgaris omnibus quas Clusius addit provinciis, vicinis arboribus & sepibus sese implicans; Julio mense flores; fructus plumis suis incanescens Autumnò, dependent. Passim provenit spontè: Basilæ vidi florentem mense Junio & Augusto extra portam S. Albani ibidem cum seminibus inter portam Stein & Eßchen.

Gustus fervidus & acris calidam arguit vim. Vitis virens & ejus ad circulos pro retinendo libente utero. Ad usum constructi, gendos fascies, veluti Salices & alia vincula, adhibetur.

CLEMATIS BÆTICA CLVSIO.



Deser. Peregrinum est hoc Clematidis Bætice genus, & à nemine quod Clusius sciante, quam ejus historia evulgaretur observatum. Longa autem habet samenta, lenta & ramosa, binos per intervalia capreolos contrarios semper inter se pediculis nascentes proferentia, quibus vicinas arbores & frutices, arbutifolia pyrifera, minora tamen, dura, viridia, in ambitu inserti sive inserti, a

etis & fervidi gustus, singularia in singulis pediculis, sed plurima simul ex clavicularum alis prodeuntia; inter quæ, ex utroque firmamentorum latere pediculi exeunt, caliculum Tithymali caveolis seu labelis similem sustententes, ex quibus medio exilit capitulum ex multis seminibus milio æqualibus conflatum, quibus insident oblongi cinctissimi, & albae quodammodo villosæ plumule.

Clus.

Clus. hisp. & hist. Clematis altera Bœtica. Lugd. & B. phyt. Clematis altera Bœtica Clusij. Lob. Obs. & Ic. Clematis Bœtica Clusij. Tab. & Ger. Clematis Bœtica; Germ. Spanische Waldraben; Angl. The traucilors Joco of Candie. B. pin. Clematidis 3, peregrina foliis Pyri incisiss.

Hanc stirpem primùm inveniebat Clusius anno 1565. inter Asindum (vulgò Medina Sidonia appellatum) & Calpen, secundum fluentia, vicinas arbusculas operientem & suo pondere deprimentem: deinde alijs Bœticæ locis, Ianuario jam suos cōcininos explicantem. Non dubium est quin ad hæc pertinet, cuius Dioscorides lib. 4. meminit, referenda sit, cum & formâ & temperamento sit illi valdè similis.

CLEMATIS SIVE FLAMMULA scandens tenuifolia alba.



Clematis hæc per se infirma, non nisi proximis fulta in altum nititur, neque tamen id ullorum capreolorum ope facit, sed foliorum pediculis sepes amplectitur. Sarmen- ta habet striata, viridantia, geniculata: folia recticaulis Flammulæ foliis similia, à Vitalba sive Athragénè differunt longitudine, angustia & soliditate: tota etiam planta minor: flores albi, odorati, qui uridâ vi labia, si impru-

denter attigerint, inflammant. Semen succrescit plumaceâ cristâ insignè: Huic similis si non eadem, parva admodum, foliis valdè tenuibus à nobis observata est, seminibus cum prædictâ usdem.

Gefn. h. Clematis, Flammula quorundam flore albo, in Gallia Narbonensi. Lob. Adv. (ubi falsò scribit Matthiolum hanc rejectisse, siquidem is eam non novit) Obs. & Ic. Clematis altera, urens, vulgi Flammula. Dod. gall. Clematis altera vera, aliquibus Ambuxii & Epigæti, modernis Flammula nuncupata. Eid. hist. purg. & in fol. Flammula, Flammula adminiculis egeñs, Flammula prior: Flammula pro Clematidis alterius specie habita [ipse in gall. hist. fuit eius opinionis] licet & semine & florum cum figura, tum colore & magnitudine ab ea differat. Lugd. Flammula, Flammula Dodonæi, quâ nulla melius respondet facie & viribus Clemaudi alteri Dioscoridis, teste Lobelio. Cæf. Viticella. Tab. Clematis urens. 1. Leinen/Leinen aut Wald- raben. Cujus icon posset etiam competere Clematidis lausfoliæ quam debebat eo capite Compiler pōnere & non alio relegare, ubi eam vocat Vitum nigram; oportebat annotare discrimen si non cæcus de coloribus scripsisset. Ger. Clematis urens, Ang. Wiggins Flower.

An Cam. h. Clematis altera flore albo, Flammula repens Dodonæi: An Gefn. coll. Salicastrum, quam ait esse Clematis alteram, plantam amplexicaulem & urentem? An Ang. Clematis?

C. Benth. 1. B. phyt. Clematis sive Flammula. 1. repens. Eid. pin. Clematidis 4. Flammula dictâ, quod contulâ ap-

plicata, vesicis flammæ instar excidet: foliis est aliquando Apij modo divisus: est etiam simplex vulgatis, alia multiflora, quæ Clematis urens 2. Tab. Clematis urens multiflora, Ger. Idem per Clematis. 2. idem maritima repentem fortè intelligit nostram Clematidem parvam. Est autem ipsi hæc in pin. Clematidis 5. Clematites, Angl. In prod. sic describit: cauliculos habet sarmientosos, geniculatos & striatos, cubitales, atrovirente cortice vestitos: folia Flammulæ erectæ instar oblonga, acuminata, nervosa, rigida, sed angustiora, quod communiter tria uni pediculo, qui velut in capreolum abit, insident, & quædam per circumferentiam nonnihil crenatâ, quæ verò in summo caule floribus subsunt, angustissima sunt: flores albi sunt, multis staminibus villosis albis, medullium occupantibus, longis pediculis sustentati: quibus semina plana, subrotunda, rufescentia; ut in Flammula erecta, sed minora, bina, ternave jucta, singulis capreolò plumoso, veluti incana cristâ donatis, succedunt: hæc actia sunt quemadmodum & tota planta. In maris Adriatici littoribus, ut in Venetorum Insula Lio & Litzesina, suis sarmētis repentem observavi.

Spontè sua (ut scribit Dod.) in Belgio nusquam exit, sed hortensis est: flores sub Augustum, semens succedit. Vidit ego in Rhætia florentem mense Junio; Monspeji Septembri, ubi sepes & arbores scandit. Eam etiam ramos, ambientem observavi mense Ianuario & Martio; Patavij apud Cortusum. Clematis autem parva à nobis visa est in montibus propè Castelnèuf non longè à Monspejo, mense Octobris.

Acris & valdè calida est, sed tamen Flammula Ranunculo mitior.

CLEMATIS SIVE FLAMMULA surrecta alba.



Fibrosam radicem demittit & albicantem: sarmen- ta nullius op- pis indiga, suâ vi in duorum & plurium cubitorum altitudinem nititur, lævia, teretia, propter terram nonnihil rubentia, fistulosa, & geniculis intercepta: folia cujusmodi ferè in vulgi Flammula, aversâ parte subhirsuta & ferè incana; adversâ verò atrovirentia, flores confimiles, copiosi, quadrifolij, candidi, apici-

bus viridantibus. non minus uridâ vi vesicæ hæc excitat quàm cognata repens. Hæc ab iis, qui dili- gentius observant, teste Clusio, duorum generum esse deprehenditur. Vna enim sarmen- ta rubescentia habet, quemadmodum & foliorum nervos & pediculos, præcociorquè est, & odoratum fert florem. Alterius autem sarmen- ta cum foliorum pediculis vir- rescunt, & florem sæpius proferunt. Humanam verò altitudinem utriusque sarmen- ta ut plurimum superant, & singulis annis nova, eaque frequentiora in- eunte Vere (marcidis & corruptis prioribus) renas- cuntur. Huic prorsus similis sibi natam meminit

Clematis
flore albo,
plano.

Clusus, semine ab amico sibi misso Clematidis flore albo pleno appellatione. An verò talis reperitur, Clusium latet: ipsi certe nunquam videri contigit.

Flammula
Platearij.

Matth. existimat esse Flammulam Platearij: Dodonaeus tamen Platearium de Flammula Ranunculi quadam specie citius; quàm de hac scripsisse crediderit, ac etiam recentiores ab acri & mordaci eius qualitate nominasse.

Matth. re-
daugitur.

Matth. & Lugd. Flammula. Dod. Flammula altera. Lob. obs. & Ic. Flammula altera surrecta. Tab. Flammula, Flammula Iovis, Brenzwurz / Bletterzug. Ger. Flammula Iovis surrecta, Vprigt Würgens Bower. Clus. Flammula Matthioli, & Clematis altera; sic & Turn. Cord. in Diosc. Flammula frut. B. phyt. Flammula 4. Eid. pin. Clematidis 4. five Flammula recta; sic & Cam. & Eyll. Centella herba, quæ trita tumoribus imposita pustulas excitat, in epist. ad Monardem huc referri potest.

Lucus.

Adeo frequens in Austria inferiore & Pannonia ut nulla sint cedux silvæ præsertim circa fluviorum in Danubium delabentium ripas, illis tu necentibus inundari solitas, quæ eâ non abundant. Rarissima aliàs, Dodonæo, Germanis ac Belgis est, & hortensis tantummodo. Vere noua promittit foliola, & cauliculos; æstate flores; Hyeme solæ reliquæ sunt radices. Basilæe florentem mense Junio & Septembri vidi in hortis.

Templu.

Ex Flammula (rectam proposuerat) sepius Matth. aquam elicit, demisso vitreo organo in calentis aquæ balneo, quæ eadem, quæ herba ipsa, pollebat acrimonia. hanc compertum est efficacissimam esse in morbis frigidissimis. Flammula (ut Platearius est auctor) exal facit siccâque ordine tertio. Sed quod imposita carnem non secus exulceret ac ignis, calidam ordine quarto rectius crediderim: Sunt qui Flammulam quartanarum edendam præbeant, magno (ut ferunt) iuvamento. Alij ejus oleum commendant ischiadicis, articulorum, illiùmque doloribus, urinæ angustis, & renum calculis, in quibus morbis aut calidum illud inungunt, aut clysteribus infundunt. Id autem præparant hoc modo. Flammulæ folia tenuissimè concisa in rosaceum imporunt, quodd vitreum vas exceperit, ac inde per æstatem insolant obrurato vase. datur etiam in cibis hisce morbis affectis, trium drachmarum pondere. Ex Flammula (inquit Camer.) scandente elicitur aqua, quæ spiritus vini instar fervida est; folia carpo imposita vésicas excitant, & multis contra odontalgiam prodest, cujus etiam in febribus pestiferis usus est.

Vires.
aqua.

Ex Flammula (rectam proposuerat) sepius Matth. aquam elicit, demisso vitreo organo in calentis aquæ balneo, quæ eadem, quæ herba ipsa, pollebat acrimonia. hanc compertum est efficacissimam esse in morbis frigidissimis. Flammula (ut Platearius est auctor) exal facit siccâque ordine tertio. Sed quod imposita carnem non secus exulceret ac ignis, calidam ordine quarto rectius crediderim: Sunt qui Flammulam quartanarum edendam præbeant, magno (ut ferunt) iuvamento. Alij ejus oleum commendant ischiadicis, articulorum, illiùmque doloribus, urinæ angustis, & renum calculis, in quibus morbis aut calidum illud inungunt, aut clysteribus infundunt. Id autem præparant hoc modo. Flammulæ folia tenuissimè concisa in rosaceum imporunt, quodd vitreum vas exceperit, ac inde per æstatem insolant obrurato vase. datur etiam in cibis hisce morbis affectis, trium drachmarum pondere. Ex Flammula (inquit Camer.) scandente elicitur aqua, quæ spiritus vini instar fervida est; folia carpo imposita vésicas excitant, & multis contra odontalgiam prodest, cujus etiam in febribus pestiferis usus est.

Temper.

Ex Flammula (rectam proposuerat) sepius Matth. aquam elicit, demisso vitreo organo in calentis aquæ balneo, quæ eadem, quæ herba ipsa, pollebat acrimonia. hanc compertum est efficacissimam esse in morbis frigidissimis. Flammula (ut Platearius est auctor) exal facit siccâque ordine tertio. Sed quod imposita carnem non secus exulceret ac ignis, calidam ordine quarto rectius crediderim: Sunt qui Flammulam quartanarum edendam præbeant, magno (ut ferunt) iuvamento. Alij ejus oleum commendant ischiadicis, articulorum, illiùmque doloribus, urinæ angustis, & renum calculis, in quibus morbis aut calidum illud inungunt, aut clysteribus infundunt. Id autem præparant hoc modo. Flammulæ folia tenuissimè concisa in rosaceum imporunt, quodd vitreum vas exceperit, ac inde per æstatem insolant obrurato vase. datur etiam in cibis hisce morbis affectis, trium drachmarum pondere. Ex Flammula (inquit Camer.) scandente elicitur aqua, quæ spiritus vini instar fervida est; folia carpo imposita vésicas excitant, & multis contra odontalgiam prodest, cujus etiam in febribus pestiferis usus est.

Quartana
Oleum.
Articulari
morbo.

Ex Flammula (rectam proposuerat) sepius Matth. aquam elicit, demisso vitreo organo in calentis aquæ balneo, quæ eadem, quæ herba ipsa, pollebat acrimonia. hanc compertum est efficacissimam esse in morbis frigidissimis. Flammula (ut Platearius est auctor) exal facit siccâque ordine tertio. Sed quod imposita carnem non secus exulceret ac ignis, calidam ordine quarto rectius crediderim: Sunt qui Flammulam quartanarum edendam præbeant, magno (ut ferunt) iuvamento. Alij ejus oleum commendant ischiadicis, articulorum, illiùmque doloribus, urinæ angustis, & renum calculis, in quibus morbis aut calidum illud inungunt, aut clysteribus infundunt. Id autem præparant hoc modo. Flammulæ folia tenuissimè concisa in rosaceum imporunt, quodd vitreum vas exceperit, ac inde per æstatem insolant obrurato vase. datur etiam in cibis hisce morbis affectis, trium drachmarum pondere. Ex Flammula (inquit Camer.) scandente elicitur aqua, quæ spiritus vini instar fervida est; folia carpo imposita vésicas excitant, & multis contra odontalgiam prodest, cujus etiam in febribus pestiferis usus est.

Odontalgia

Tumores suppurati difficles cataplasmate ex Flammula (rectam describit) contusa cum oleo, tum maturat, tum aperit Tabernamontanus. Qui ex ea stilliciti liquor elicitur, intra corpus non usurpatur. quodd si quis eo uti velit, in morbis frigidis, cum aliis aquis est miscendus, ne viscera lædat.

Cataplasma.

Tumores suppurati difficles cataplasmate ex Flammula (rectam describit) contusa cum oleo, tum maturat, tum aperit Tabernamontanus. Qui ex ea stilliciti liquor elicitur, intra corpus non usurpatur. quodd si quis eo uti velit, in morbis frigidis, cum aliis aquis est miscendus, ne viscera lædat.

CLEMATIS SIVE FLAMMULA flore cæruleo & purpureo scandens.

Deser.

Concinnior est quàm vulgaris Flammula, foliis ad Athragenem propius accedentibus, ut quæ quàm Flammulæ breviora sint & latiora, & variâ specie Athragenes foliorum modo ludentia, modò integra, aliàs divisa semel aut iterum, minimè tamen forfata, lævia, atrovirentia, sapore acri, ex pediculis renubus, rigidis, subrubentibus, subhirsutis; samentis autè luis innititur depactis pedamentis non secus ac Flammula vulgaris repens. sed præcipua est florum gratia, qui non tantum odore suavi placent, sed & colore purpurante oculos morantur, quatuor



foliis (quorum vel unū integrū Flammulæ vulgaris florem facile superet) crucis modo dispositis constantes: in quorum medio cinnus flaminum ex viridi pallentium, succedunt semina.

An Matth. Iese-
minum five Gelse-
minū cæruleis floribus? Est ei in post.
comm. lat. Clematis

Clematis. *Germ.* tertia floribus purpureis: hist. *Germ.* Reinen od Waldraben / Clematis altera Dioscoridis. *Gefn. h.* Clematis, Flammula Colden-

bergij, flore rubro. An eadem ibidem Gelseminum cæruleis floribus? Dod. gall. Clematidis alterius altera species: Eid. hist. Clematis altera, *reueris tripa*, & nonnullorum *synonymis*, Latinorum Ambuxum, ut *Ambuxum*, quidem Dioscoridis spuria habent: Hispanorum *Gormadera*, quasi Vomitoria. Lob. Adv. (ubi Dodonaeum ait deceptum ab iis, qui sibi persuaserint in Anglia passim luxuriare) Obs. (ubi dubitat an Pothos Theophrasti sit) & Ic. Clematis peregrina cærulea & purpurea. Cam. h. Clematis altera flore purpureo, topiario operi aptissima. Hist. Matth. germ. *usur.* posuit novam figuram, sub titulo Clematidis alterius Dioscoridis. Est & Castori Clematis altera, It. Vitalba purpurea, scandens arbores ut Similax, floribus purpureis magnis, ex quatuor foliis. Cast. pro *Cass. error.* hac planta malè habet figuram Vincæ pervincæ. Apud Clusium hist. Clematidis alterius titulo simpliciter sine descriptione posita icon. Fortè hæc cærenda verior Clematis, quia flores magis accedunt ad Clematidem priorem five Daphnoidem, & ut illa sit topiaria. Cast. Flammula flore cæruleo. Flammula, Theophrasti *adg.* quorundam, Desiderium Gazæ, *Desiderium* flore Hyacinthi. Tab. Clematis cærulea peregrina, *Clematis* frembd blaw Waldrabe. Cur hujus figuram repetit *Tab. mss.* sub diverso titulo, qui est Clematis purpurea, *Purpurea* Waldraben.

B. phyt. Clematis 6. five cærulea repens: qui annotat, & rectè Iconem Matth. germanici esse transpositam & sub Clematide tertia exhibitam; ad Clematidem Diosc. referendam; variare flore simplici ac pleno, ut Cam. in epit. unâ figurâ expresserit; colore etiam purpureo, cujus nomine Tabern. duas figuras proposuerit. Eid. B. pin. Clematidis 9. 3. cærulea vel purpurea repens: Clematis tertia, quæ Flammula, *Cæf.* Clematis peregrina incarnato simpli flore: & Clematis peregrina purpurea simpli flore, *Eyll.* Ger. Clematis peregrina 1. cærulea / Blowe lazdiere Bower. Clematis peregrina 2. rubra, Rod lazdiere Bower.

Gaudet, ait Dodonæus, Soli expositis, sed tamen non omnino aridis locis: læto & haud irriguo solo melius proficit. Apud Belgas hortensis in Hispania verò & quibusdam Italia locis juxta sepes & agrorum margines sponte exit. Augusto mense, & quandoque Julio, floret; semen Septembri perficitur. Flammulam flore purpureo ex semine natam habui Lugduri, florere in orto Maio. In Rhætia peregrinans cum D. Gessnero in monte propè Münsterthal inveni plantam valde similem, fruticosem parvam, flore magno ex longo pediculo, cæruleo, constan-

Lucus et
Templu.

constante quinque foliis: florentem menſe Julio: foliis magis ſerratīs quàm in ea, quàm Lugduni habui.

CLEMATIS PURPUREA FLORE pleno ſcandens.



CLEMATIS hæc ſarmentis & foliis ſcanſiliſque in-
plexu pertactu n
proximè deſcrip-
ſimilis: flos verd,
purpureus mul-
tiplici foliorum ſtipa-
tu luxurat, ſatura-
tur, internâ potiſ-
ſimâ foliorum fac-
cie, extrinſecus ci-
nim lanugine cini-
riceâ pubeſcunt.

Cluſ. exot. appen.
2. ad ejus hiftoriam
lib. 1. c. 36. Clemati-
dis alterius nova
ſpecies, illius qui-
dem generis, quod
florem habet ex ca-
ruleo purpurafcen-

te; ſed alterius formæ multiplici ſc. foliorum textura.

Bauh. phyt. & pin. Clematis cærulea flore pleno:
Eid. pin. Clematis ro. Clematis altera flore pleno,
Cam. ep. & Cluſ. cur. poſt. Clematis peregrina pur-
pur. fl. pleno, & Clematis peregr. incarnata plena,
Eyſt. Flore eſt cæruleo, purpuro cæruleo, incarnato,
ad purpureum colorem, ſed ad nodum dilutum
accedente.

Clematidem flore purpureo pleno vidi Stutgard.
in horto Il. D. VV. ubi Hieme ſub teſto reſervatur:
floruit Junio & Julio.

CLEMATIS CÆRULEA SER- rato folio.



Esquipalmatis
ſhæc eſt, caulicu-
lis pluribus oblon-
gis, quibus ſingulis
folia crebris di-
viſuris infecta inſi-
dent trigemina co-
hærentia, ut in A-
nemone Geraniſo-
lia; flos longiſſimo
ac tenui pediculo
inſidet, ex quatuor
tantum foliis com-
poſitus, coloris ob-
ſcure purpurafcen-
tis; ſemen non vi-
ſum, nec radix, à C.
Bauh. qui eam ex
ſicca deſcripſit.

A ſarmentoſa ra-
dice (ait Pona in
d. ſcript. Baldi) ger-

minant multi caules vitiginei, magis ſubtiles, quàm
in aliis Clematidibus; lignoſi, angulares, lenti, &
tricubitales: è quibus ſurculi multi adhuc magis ſub-
tiles quatuor digitorum altitudinis, qui æqualiter
bipartiti ad latera dividuntur. ſinguliſque obtinent
tria folia juſto intervallo diviſa, & pediculo brevili-

ſimo adnexa, formâ nixteâ; tamen majora, ſatis pro-
fundè per ambitum ſecta, nervoſa, rugoſa, in æqualis
magnitudinis, nigroque virentia: eſt illi flos cru-
cem repræſentans, foliis mucronatis, lanuginofiſ,
cæruleis albicantibus, cujus mediæ nœcervulo quo-
da n extremis foliis (uti in Roſa Alexandrina
apparet) decoratur. Eſt ſarmentosa, inſipida, & per-
ennis radice: tota planta aliàs aliquantulum acri ſa-
pore prædita eſt.

C. B. Clematis 7. ſive alpina Gerani-folia: Clema-
tis cruciata lungermannii. Clematis cruciata alpina, *Clematis*
Pona. *Cruciata*.

Oritur in altioribus Baldi rupibus, quibus Eurus *Locus*
dominatur. Brumâ aſcendunt folia. Hanc eandem ſu-
ſpicor, quàm anno 1561. in mea peregrinatione per
alpes Rhetice obſervavi florentem menſe Julio in
monte propè Münſterthal, de qua ante ſub Clema-
tide cærulea ſive purpurante.

CLEMATIS PANNONICA FLORE cæruleo ſurrecta.



Complures ra- *Deſcrip.*

Edix ſatis craſſa à
lateribus ſpargit ſi-
bras, ſulvas, nervu-
lo ligneo candido
ſarctas: ſarmenta in-
de complura, Clu-
ſio quaternæ aut
quina, ad cubitum
& ſeſquicubitum ex-
ſurgunt, recta, dura,
ſtriata, angulola,
ſubhirtuta, non nih. l
purpuraſcentia, ge-
niculata: ad quorum
ſingula genicula, ſo-
lia ſine pediculis
ſunt bina oppoſita,
Plantaginis majoris
ſerè paria, minora
tamen, ſimiliter per
longitudinem ner-

voſa, acuminata, in ambitu lanuginola, ſupernè ex
atro virentia, infernè dilutiora, lanugine quadam
per nervos reſperſa, Cluſio Aſclepiadis par è foliis
reſpondentia, non valdè dura, ſervidi guſtus, quem-
admodum Flammulæ Matthioli folia; ex ſuperio-
rum foliorum alis, pari incremento ſurgunt gemini
adverſi ſurculi, eodem modo ſe habentes quo ſar-
menta primaria, niſi quòd minora ſint multis nu-
meris folia: atque tam in primariorum ſarmento-
rum, quàm alarum ſurculorumve extremis, flos ru-
tabundus unicus magnus, quatuor foliis mucrona-
tis crucis in formam, inquit Cluſius, decuſſatis con-
ſtans, modicè ſurſum reflexis, ſoris ſaturatè cæruleis,
canaliculatis, minùs cæruleâ lanugine per margines
obſitis, intus verdè glabris, nec tam intenſè, atque
medium extimi folij, cæruleis: medium occupat vil-
loſus glomer ſibrarum ex luteo albeſcentium, qua-
rum complexu continentur ſtamina alia glabra, vi-
ridantia, apicibus ex albo luteis; atque intra hæc ter-
tia fibrarum viſeſcentium intorta phalanx; ſemen
compreſſum magnum Cluſio Pulſatilla ſemini ſerè
ſimile plumatum, ut in Viorna vulgi Gallorum; mul-
lius acrimoniæ particeps autore Cluſio.

Tametſi hæc fructibus ſeſe non implicet, ſed ſatis
firma ſit, nec adminiculis egeat, Clematidis tamen *Clematis*
nomen ei impoſuit Cluſius, quòd ejuſdem ſit tem-
peramenti & florem purpureæ Clematidis ſerè ſimi-
lem habeat. In pann. hujus Clematidis duas figuras *Cluſ. 20*
habet,

habet, primamque & secundam nominat, quae meo iudicio unius plantae sunt, cum etiam in hist. unam tantum describat, & depingat, quam quosdam Clymenum falso vocare refert, cum Clematis carulea pannonica sit.

Clymenum non est.

Tab. notat.

Tab. Clematis carulea pannonica, Ungarisch Blau Waldraube. Item, Clematis carulea 2. Blau Waldraube. Duae haec sunt ejusdem plantae icones ex Clusio à Tabern. mutatae, unam tantum stirpem designantes. Lob. Obs. & c. Clematis altera longifolia minor. Cam. h. Clematis pannonica caruleo flore, folio pene Asclepiadis. Lugd. Clematis altera minor longifolia Lob. Clymenum quorundam. Ges. Clematis pannonica, busch Botter: Item, Clematis major pannonica, great busch Boumer.

B. ph. Clematis 3. carulea erecta. Figura Lobelij (ait) & eam quae simplici, & quae pleno est flore exprimit: à Clusio Clematis carulea pannonica prima, flore simplici, secunda pleno, pingitur: Tabern. duas habet figuras Clematidis caruleae pannonicae, & Clematidis 2. nomine etiam utitur simplicem florem exprimit. Dumerin Lobelij figuram imitandam curavit non advertit apud Lobelium & plenum & simplicem florem. Hæc frater. Ego Clematidem caruleam surrectam nunquam vidi flore pleno, nec Clusius qui figuram exhibet ullius meminit quae pleno sit flore, nec etiam Lobelius: semen quidem dicit Clusius eam ferre planum, in capitula rotunda & veluti pullulas congestum, quale pingitur figura Clusij & Lobelij, non autem flos. Eid. pin. Clematidis 3. magnitudine varians: hinc duae figuræ apud Clusium & Tab. Flore est caruleo, rariis albo.

Tab. notat.

C. Busch.

Specie.

Tempus.

Inventa à Clusio sponte nascens in pratis circa Stampfen duobus ultra Posonium Vngariae miliaribus & aliis ad Danubij ripas sitis supra Posonium, medio fere itinere inter eam urbem & Tabern. Flor. Maior & Junio, semen maturum est Augusto. Caulis sive sarmenta singulis annis ad radicem usque marcescunt, & in eunte Vere novella, frequentioraque ex ipsa repugulant. Sturgardie vidi in horto Ducis, mense Novembri femine maturo: Monchelgardii in horto Ill. C. V. Viri. provenit mihi ex semine & sequenti anno floruit Junio & Julio.

CLEMATIS DAPHNOIDES. SIVE prima Veteribus. CAP. XV.

Clematis [*κλεματίς*] quam aliqui Daphnoidem [*δαφνοειδής*] sive Symplocum [*συμπλοκόν*] vocant apud Dioscoridem, gignitur lato, pinguique solo [*ἐν ῥαβδόσποιο* sic & Orib.] sarmenta autem habet parva [*κατὰ τὴν φύσιν* sic & Orib. & Paulus] luncis [*κλῆμα*] crassitudine: solum parvum, Lauri [*δαφνὸς*] folio & figura & colore simile, sed multo minus. Caulis foliisque in vinea pota alvi profluvia & dysenterias sedant. Cum lacte vero & rosaceo, aut cyprino subdita in pello, cruciatibus vulvae medentur. Dolores dentium commanducata finit: imposita quoque veneratorum moribus juvamentum praestat. Fertur & ex acetate pota, contra aspidum morfus auxiliari. Nasitur in incultis. Marcellus autem in vetustis quibusdam codicibus legit pro lato pinguique solo [*ἐν ῥαβδόσποιο* sic & Orib.] qualem hunc Corra-rio, Jita & Sarraceno placet, quoddam Plinius de hac Clematide agens, lib. 24. cap. 15. eam Aegyptiam cognominet, subdatque Aegyptum eam maxime gignere. Sed non probatur nobis eorum opinio. Nec propterea quoddam Plinius aliquam Clematidem in Aegypto esse scribat, textu Dioscoridis est eorum perditus. Nihil etiam probat incultum solum, quod pro confirmanda eorum opinione facere credunt.

Marcelli.
Clematis
levis
probat.

Non enim obstat, quod minus incultum solum etiam pingui loco quod esse possit. Sarraceno longior, pro parvis agitur, & confertur in Corn. Sarracenus, quoddam & Clematidem longam ac tenuem non solum agnoscit Plinius loco jam citato. Sed & admodum ita legendum ad nonneat. Esse enim longa, imò interdum longissima ejus Clematidis, quam Vincam pervincam vocent, sarmenta, seu vitiginea flagella. Nimis autem temere, meo iudicio, Clematidem Daphnoidem Dioscoridis, & Clematidem Aegyptiam Plinii, eandem cum Vincam pervincam statuit Sarracenus. Nos de Clematide Aegyptia Plinij plura diximus ante sub Clematide veterum. Sunt qui volunt, Plinium hanc tradidisse lib. 21. c. 11. ubi Vincam pervincam de scribit his verbis. Nam Vincam pervincam semper viret, in modum linearum [*lineam vocat praeterea virgam, ut exprimat quod Diosc. ait, Virgulas castrorum, seu virgulas habet lunci crassitie, Dalech.*] foliis geniculatim circumdata, Topiaria herbam inopiam tamen florum aliquando supplet. Hæc à Græcis Chamædaphne vocatur. Arida tusa (inquit cap. 27.) hydropicis datur in aqua cochlearis mensura, celerissimeque reddunt aqua n. Eadem decocta in cinere, sparso vino, tumores siccant. Auribus succo medetur. Alvinis imposita multum prodesse dicitur. Hæc Plinius, qui si per Vincam pervincam eandem intelligit cum Clematide, male hydropicis praescribitur: nec etiam placet quod ait Diosc. apponi moribus venenatarum bestiarum, & dolores uteri sanare. Vincam pervincam quidem apud Dioscoridem etiam Daphnoidem vocatur, sed non Chamædaphne. Hermolaus, ut demonstratur h. n. g. lib. 5. cap. de Chamædaphne per Pervincam Plinij, eandem quam nos intelligit plantam. De Chamædaphne igitur cathartici, cuius adtingens faculus dysenterias & diarrhas cohibet, verum id est, non autem de Clematide, qua in Plinio cum illa ignoranter confundit.

Cæterum Clematis Aegyptia [*κατα τὴν αἰγυπτίαν*] in proverbium abiit, & joco dici solitum fuit in eos, qui corpore prae termodum proceri atque atro colore essent: natum haud dubie (inquit Erasim.) ab ejus herbae specie de qua meminit Dioscor. lib. 4. & Plin. lib. 24. cap. 15. Laertius in vita Zenonis Philosophi, ex autoritate Apollonij scribit, Zenonem gracili fuisse corpore, statu proceri, atræ cute: deinde autorem citat Chrysippum, qui in 2. proverbiorum suorum libro scripserit, ob eam causam à quodam Clematidem [*palmitem reddit interpret Latini Diogeni Laertio*] Aegyptiam fuisse dictum.

Licet potius una solummodo Clematis à Dioscoride notetur, tres tamen ejus differentias magnitudine differentes observari scribit Maranthæ: & quartam etiam, duplicem in flore foliorum exortum habentem.

CLEMATIS DAPHNOIDES MINOR flore caruleo, purpureo, violaceo, ut & albo, simplici ac pleno.

Clematis Daphnoides reptatrix plantae, humose non attollit nisi proximis fulcibus innixa: radix fibrosa: sarmenta multa, teretia, virentia, & gericulata, quaqueversum per terram se spargunt, quam ubi arripuerit, è geniculis propagatis fibris rursus radicarur: folia è geniculis bina opposita, foliis Lauri is similia, mirora tamen multo acuta, rigida, laxa, brevibus pediculis appensa, superne saturato virore intertita, inferne dilutiora, sapore adstrigente, subamaro; flos pediculo è geniculis enato, duas uncias longo, singulari singularis infidei, oblongus Gellেমiri modo, nunc simplex in quinque lacinias altiusculas & latas diffusus.

Diogeni
Laertio.

Sarracenus
probat.

Vincam
pervincam.

Diosc. exprimit
castrorum.

Chamædaphne.
vires.

Plin. reprobat.

Proceri-
bium.

Diogeni Laertio
inter praeterea.

Diff. Clematis
Maranthæ.

Desfer.



cus, nunc aucto
foliorum numero
multiplex, quorum
interiora modò bi-
na, modò terna ad
imū integra, su-
perius ut extrema la-
ciantur dunta-
xat, aliās penitus
separata: color sim-
plici caruleus cum
apicibus concolo-
ribus, sed dilutiori-
bus parum: vel al-
bus cum staminu-
lis luteis, pistillo
albo, fundo candi-
dis versibus striato:
vel pulcherrimo
spectaculo viola-
ceum florem per
singulas lacinias à

summo ad imum linea decurrit lactea, id quod & in
multiplici observatur: verum quæ multiplici est flo-
re, eam non alio quàm purpureo, aut purpureo-vio-
laceo colore observavi & bicolori variegato ut di-
ctum: Anno 1600. observavi in alba partes caruleas,
quod ante nunquam animadverteram quamvis à
plurimis annis in horto coluerim.

Hæc est illa (inquit Marcell.) quam Etruria nunc
Vincam herbam vocat, quæ defunctæ virgines in
gente nostra ad sepulturam coronatæ effervunt: &
quæ familiæ Florentinæ aliquæ gentili jure suo pri-
mū ingrediētem urbem Archiepiscopum coronatæ
ad portam excipiunt stipantque & per urbem
comitantur. Cognitu facilissima est: in hortis passim
nascens, tenuissimis viticulis potius per terram ser-
pens, quàm virgis ut Dioscor. ait de Chamæda-
phne, à terra se extollens: foliisque oleagineis ma-
gis quàm laurinis similibus. Denique à Dioscoridis
Chamædaphnes historia longe differt, & nihilomi-
nustamen Vincæ pervincæ Plinij, l. 23. c. 11. descriptæ
respondet.

A Ruellio l. 3. c. 80. Clematis daphnoides inscribi-
tur, cujus si quis (aitis) imaginem, naturam, effi-
giemque exquisitis exploret, ea censerebit esse,
quæ Lat. Vincæ pervincæ, officinis Pervincæ, vulgò
Pervincæ nominatur. Misceat autem Ruellius in hoc
capite diversissimas plantas, aut reliquas mirè confun-
dit, nec sibi constat. Idem rursus suo nomine lib. jam
citato, c. 112. Hermolai verba de Pervincæ repetit.

Corn. Clematis prior, Vincæ pervincæ officina-
rum, & Chamædaphne Græcorum. Tragus Pervin-
cæ florem assignat ex purpura caruleum, quinis foli-
is distinctum, instar Borriginis, profrus in odo-
rum. Hanc, inquit, quoddam mortui eam coronari con-
sueverint, nonnulli germanicâ voce Todtenkraut
aut reben Violē, h. e. Herbam, sive Violam mor-
tuum vocant. Commune apud Germanos Per-
vincæ nomen est Yngrün, à perpetuo illi virore in-
ditum, Officiæ Pervincæ nominant. Est autem
illa ipsissima Clematis Dioscoridis, quæ Plinio &
Daphnoides cognominatur. Posset & Chamæda-
phne, h. e. Terrestris, seu humilis dici Laurus, aut
ut Romani dicunt Laurago; & Laureola, & Vincæ
pervincæ, quemadmodum alibi meminit Plinius.
Apud Dioscoridem sequentia Pervincæ nomina le-
guntur, δ α γ ο υ ρ ο ν, δ α γ ο υ ρ ο ν, δ α γ ο υ ρ ο ν. Apud Apu-
leium verò cap. 58. multa extant nomenclaciones il-
lius, nimirum Euphros, Daphnoides, Hypoglos-
sion, Eupetalon, Diglossos, Nycephyllon, Pelleon,
Idæa Daphne, Samothracia Daphne, Alexandrina
Daphne, Mision, Danaæ, Stephane Alexandrum,

Chamædaphne, Carpophyllon, Daphnitis. Latine
Pervincæ, Victoriæ folium, Laurus Alexandrina &
Macedonica, Laurago, Mustellago terrestres. In Plin-
io nonnullæ ex his repetuntur, & aliæ etiam adji-
ciuntur, videlicet Hypetale, Pelasgum, & Stephane
Alexandri. Sed quantum mihi quidem videtur, re-
ctius universæ hæc appellationes Lauro Alexandri-
næ quàm Pervincæ tribuentur. Licet verò contro-
versia nominum in hanc quoque plantam irrepre-
sit, nihilominus tamen descriptio, quæ apud Plin.
l. 23. c. 11. extat, Pervincæ huic satis respondet.

Clematidem Daphnoidem, inquit Fuchsius, Pli-
nius l. 24. c. 15. Clematida Ægyptiam nominat: lib. Ægyptia.
aure n. 21. c. 11. Vincam pervincam, aliòque nomine
Chamædaphnen dici tradit, quoddam scilicet humilis vi-
deatur Laurus, ut nomen sonat. Non est autem cur Laureola
eam Chamædaphnen putos, quæ Romanis Laureola
aut Laurago dicta est, hæc enim à Vincæ pervincæ
genere & facultatibus diversa est, & seorsim illam
Chamædaphnen depingit Plinius l. 24. c. 15. ut hinc
manifestissimu n sit Plinio duplicem esse Chamæda-
phnen, Vnam quam sic appellant Dioscorides, Ga-
lenus, & alij Græci. Alteram quam privatum Vincam
pervincam alio nomine vocat Plinius.

Cord. in Diosc. Clematis, Pervincæ species, astrin-
gendi vires habens. Matth. Clematis primo loco à
Diosc. descripta, ac aliquibus Vincæ pervincæ dicta;
vulgò tamen Italis Provenca. In hac nullam reperi-
ri notam scribit, quæ Clematidi primi generis recla-
mare videatur. Quamobrem eorum sententiam ex-
plodendam putaverit, qui Pervincam Chamæda-
phnen esse sibi persuadent, quàm vulgò Laureolam
appellant. Eid. hist. germ. Clematis daphnoides.
Ca. n. apud Matth. Clematidis Daphnoides quatuor
agnoscit differentias: flore purpureo, caruleo, &
albo, & quendam pleno: In hort. Clematis Daphn. si-
ve Pervincæ apud Plinium, flore caruleo, interdum
albo: & purpurea Austriaca, à Clusio missa flore ele-
ganti pleno: In Epit. Clematis: & Clematis flore
multiplici.

Gordonius de cons. vita per Laureolam, quam ad
fluxum ventris infantum (ad lienteriam & diarrhæ-
am Arnold. de Villan.) præscribit, plantam de qua
hic agimus, intelligit. Confundit turpiter Lonic.
in Diosc. l. 4. c. 144. Chamædaphnen Dioscoridis cum
Vincæ pervincæ, quæ Dioscoridi Clematidis species
est. Ejus verba hæc sunt. Chamædaphne i. e. terrestis
Laurus, Alexandrina à similitudine, vel virium pari-
tate; Daphnitis à Lauro; Hydragogus, quoddam aquæ
urinam trahat; Laureola ut & Laurago à Lauro, non
Lactago; Latinis Vincæ pervincæ: Germ. Yngrün.

Anguill. Vincæ pervincæ optimè correspondens
Clematidi primæ Dioscoridis. Gesl. Clematis Æ
gyptia filij. flore caruleo passim: hortensis purpu-
reo: transfudit autem purpureum è Sabaudia circa
Laulannam hortis Tigurum: In cat. Clematis daph-
noides vulgò Vincæ pervincæ. Dod. purg. & hist. phnoid.
Clematis daphnoides, floribus colore ut plurimum
caruleis; quandoque candidis; rariis rubentibus.
Clematis (aitis) quidem dicitur, quia instar καυμάτων
repentes proferat cauliculos, quos καυμάτω [sarmen-
ta] Græci vocant. Daphnoides verò, cum à Lauri fo-
liorum figura, tum ad differentiam alterius [maioris]
vel etiam aliarum. Nam Plinius plures ejus nomi-
nis refert l. 23. c. 15. ubi & hanc Ægyptiam cognomi-
nat. Polygonoides verò vox inter nothas appella-
tiones etiam in Dioscoridis exemplatibus reperitur.
Præter hæc sunt etiam φιλιστολαιο δὲ συρροειδής, aut po-
tius αὐροειδής. Alio autē loco Plinius l. 21. c. 11. Vincam
pervincam & Chamædaphnen appellat, ubi perpe-
ram legitur in modum sit ex pro Lauri. Describitur Plin. corre-
tam ab eodem, & à Dioscoride & alia Chamæda-
phne. De hac nos lib. 5. H. n. g. agimus.

Lob.

HISTORIAE PLANTARVM

H. Lugd.
notatur.

Lob. Clematis daphnoides, Vinca pervinca : an Centunculus Plinij? Item Obl. Daphnoides, polyflora Clematis purpureo rubens. Lug. Vincam pervincam, five Clematidem majorem peramcenâ florum duplicatione variare scribit, quod Lob. non dixit: nec nos majorem observavimus flore pleno. Cæf. Provincia vulgò in officinis vocata, in umbrosis nascens; flore caruleo; fructu oblongo, veluti si liquâ bifurcatâ, in qua semina oblonga, depresso: Vinca pervinca Plinij. Tab. Clematis daphnoides; Vinca pervinca flore caruleo, purpureo & albo, & pleno.

Cluf. Clematis prior, de quodâ cognominata, vulgò Vinca pervinca, quo nomine etiam ab ipso Plinio vocatur, qui lib. 24. c. 15. Egyptiam quoque cognominare videtur. Ejus autem duæ sunt species: Vna vulgatio, caruleo ut plurimum flore, sed qui eum etiam variat, ut nunc albus, nunc subpurpureus conspicitur, interdum & medium florem complectitur.

C.B. Clematis daphnoides i. minor. Vinca pervinca, Brunf. Chamadaphne altera Dioscoridis, Eid. Brunf. Clematis, Lac. Turn. daphnoides, Thal. minor fl. caruleo, albo, & purpureo, Eyst. qui tres figuras. Eid. B. Clematis i. flore pleno: Clematis altera flore pleno, Cluf. hist. ap. alt. Clematis daphnoides fl. purpureo pleno, Eyst.

Nomina
linguar.

Clematis daphnoides vulgò dicitur, & Vinca pervinca, Germ. Singrun / Ingrun / Wintergrun / & Stryten / Geln. Cervin / aut Berwin. Tab. Wilder Singrun / Cord. in Diosc. Belg. Vincorde & Macchde palmen: Gall. Perueneche: Gallobelg. l'anche & Pucelage: Ital. Pervinca: Hispan. Pervinqua: Angl. Perwinck: Fland. Vincorde: Brab. Macchden palm & Ingroen: Boh. Barwinck. Hung. Clematis altera per sepes repens, Feyer venijch. Cæteroqui cur Clematis & Daphnoides appelleretur, jam ante Dod. ostendit. Dicitur autem Vinca pervinca, quod humi serpat, & se in modum funiculi porrigat, vicina quæque vicinis, autore Fuchio. Ingrun à Germanis, quod semper, & particulariter Wintergrun [Hemala viride dixerit] quod hieme vireat, nominatur. Stryten similiter appellatur, quod contra frigus ceteris, & victrix evadat.

Vinca-per-
vinca no-
men vnde.

Viride hy-
male.

Locum &
Tempus.

Clematidem numerosis, umbrosisque tractibus, & sentietis, atque agrotum marginibus gaudere; perpetuò vivere; Martio tamen & Aprilis potissimum florere in confesso est. Clusius subpurpuream apud Allobroges spontè nascentem inter vepres observare meminit, præsertim circa Lausannam, càmque interdum alium florem medium complectentem. Vidi ego in montibus Euganeis florentem sine mensis Februarij; Inter Veronam & Castelfranc, Ferraz, Basileæ & Genevæ, flore albo Aprilis mensis principio; caruleo fl. circa collem l'Abbatie & in hortis adhuc Novembri, aliàs Martio: Montbelgardi frequentem Aprilis extra novam portam in colle in dumetis juxta fossas, & in orto. Videtur degenerare non transplantata.

Ad Sinum
maritimum.

Siquis habuerit vinum turbidum, quodque colorem amisit, accipiat tantum hujus herbe (Pervincæ) quantum pro quantitate & copia vini sufficit, vasdè imponat, ac illud deinde obturet, obturatumque quindenam relinquat, quod cum fecerit, vinum brevi purissimum ac clarissimè reddetur, & genium suum colorem recuperabit: præstabit tamen, si ritè rem perficere voles, ut vinum prius in aliud vas transferatur, tumque herba ut diximus utiliter injiciatur, hæc ita se habere experientiâ certâ comprobavit Tragus. Folia ore retenta sine vinis fluxum è naribus erumpentem compressisse se couenter vidimus, inquit Costæus in libro suo de stirpium differentiis. F. in montibus adalligata viridia folia, mentium

Viret.

Hæmorrhæ-
gia.

abundantiam cohibent & conceptus adjuvant. Capiti adalligata, & collo, gulæ circumducta, sanguinem è naribus manantem sistunt. Adduntur quoque utiliter vulneratis emplastris, & potionibus. Refrigerat enim (authore Matth.) siccat, roborat, cohibet. Apollinaris calidam & siccam facit tertio gradu, quum tamen ejusmodi caloris gradu n. sapor non indicat. Felix Plat. extrinsecus ad venas hæmorrhoidales apertas occludendas præscribit Clematidem. Obscurè admodum. Sunt enim vigintiquatuor plantæ, vel etiam plures, quæ nomen habent Clematidis. Vnde quis obsecro (nisi valdè peritus stirpium) dicet quæ planta sumenda sit: pleræque causticæ sunt & vesicatoriæ. Nos sumendam censemus Clematidem daphnoidem vulgò Vincam pervincam dictam. Vires quæ videntur Pervincæ convenire apud veteres, sunt ante scriptæ sub Clematidis Daphnoidis, five primæ veterum titulo.

Tempera-
mentum.
Apoll. not.
Ecl. Plat.
repreh.

CLEMATIS DAPHNOIDES MA- jor flore caruleo & albo.



P

ER omnia major est hæc Pervinca vulgari: folia quæ opposita ex fœminalibus & longioribus pediculis pendentia è viticulis junco crassioribus oriuntur, tres circiter uncias lata, paulò longiora, nunc acutiora, nunc obtusiora, cum acrimonia amarescunt, saporis ingrati. flores ex foliorum alis pediculis herentes xanthalibus, longo corniculò, divisione & formâ florum Pervincæ vulgarioris, sed, ut par

est, multò majores, coloris carulei, & albi; apud nos interdum frigore absumitur: in hac silicibus five cornicula singularia observavimus.

Dod. purg. & hist. & Tab. Clematis daphnoides major. Lob. Clematis five Pervinca major. Cam. Math. & hort. Clematis daphnoides major caruleo flore. Cæf. Provincia altera major, folio latiore, quasi hederaceo, grandioribus floribus caruleis; Clematis Egyptia Plinij. Cluf. Clematis daphnoides latifolia. C.B. Clematis Daphnoides 2. five major. Clematis Egyptia hortensis flore purpureo, Geln. h. Pervinca major, Eyst. Clematis i. major, Cast. Cur Gesneri purpuream huc referat, non oc. C. Eaub. currit: nunquam vidi purpureo flore, nec scio an talis tradita sit ab aliquo autore: minor sanè dicitur purpurea.

Lugd. Pervincam majorem Lobelij peramcenâ florum duplicatione variare scribit, sed præter L. Hist. Lugd. belij opirionem, qui hanc ab ea separat, nec con-lasus. fur dit ut Lugdunensis. Hæc nec purpureo, nec pleno flore observavimus unquam.

Spontè nascitur, cum multis Hispaniæ locis, tum in Narbonensi Gallia, magnâ præsertim copâ circa Monspelium, toto serè anno florens, ibi spontanea floribus etiam albis quætur Frontignanum.

Lacur.

APOCYNON VETERIBVS.
CAP. XVI.of condis
no Sa-

lia.

.

momer

ny lea
rig.

A Apocynon, inquit Dioscorides, alij Cynan-
chon [κυανόχων, κυανόχων, vet.] nonnulli Parda-
lianchen [παρδαλιανχόν] alij Cynomoron [κυνόμορον,
κυνόμορον, Ald.] alij denique Cynocrambe [κυνό-
κραμβή, h.e. Brassica caninam, vet. hū carer], appel-
lant. Est verò frutex [δένδρον, vulg. exempl. γέν-
germen] longis [μακροῖς, sunt qui παρὰ, vegerime
constans virgultis, virgulum modò obsequiosis
[μακροῖς flexibilibus, Symonis add. Ald. grave olenti-
bus] fractisque fere inuictis: foliis Hederæ, attamen
mollionibus & per extremum acutioribus, gravique
odore, quadantenus viscosis, & luteo succo turgen-
tibus: fructus seu Fabarum siliqua digiti longitudi-
ne protenditur. folliculari specie, minutis intus fe-
minibus, duris [σκληρὰ] parvis [μικρὰ] atque nigris
[νύκτα, pro qua voce Ruell. ex Marcelli textu, & dicitur alba
legit. veteris autem, duris, parvis atque nigris minime ca-
ret.] Huius folia cum farina subacta [scilicet, adipe leg.
non capti. Fab. Colum.] in panes coacta & in cibo data,
canes, lupos, vulpes, & pantheras necant, ac pro-
prie earum quadrupedum coxendices resolvunt.
Alij inter rejectanea Dioscoridis apud Cor. Par-
dialanches, alij Cynochon, alij Phaleon, alij Oligo-
ron, alij Hippomanes, alij Onifitin, alij Ophiosco-
rondon, alij Cynaricen, alij Elaphoscorodon; pro-
phete Paralyfin; Romani Brassicam rusticam aut
caninam vocant. A vi & effectu nomen accepit hæc
planta, inquit Columna: quæ quia interimit, no-
men à canibus habet, à ποῖν & κυνός, ἀποκύνει dicta; cui
vi respondent etiam nomina alia κυανόχων, κυανόχων,
κυνόχων, & κυανόχων. addiderunt etiam à vi necan-
di Pantheras, παρδαλιανχόν. Hanc verò, ut ab homini-
bus caveatur, quia venenosa sit, atque ne pro Ascle-
piade, à similitudine decepti accipiant, Dioscorides
ut alia quadam venenosa diligenter descripsit: at-
que notam illi privatam ab Asclepiade alienam ad-
scripsit, luteum scilicet succum, quo turgere asserit.

Apocynum ex Plinio videtur homini salutare,
quadrupedibus venenum esse. Galenus verò con-
tra ait Apocynum sive Cynocrambe, vocatur à
quibusdam Cynomoron, quoniam canes celerimè
necat. Est autem hominibus venenum, herba
valde graveolens, & omnino calida non ingenero-
sè: non tamen juxta proportionem sicca. Quare e-
tiam imposita, multam discutiendi vim habet. Hæc
Galen. 6. simpl. pharmac. Ex quibus ego, inquit Cor-
nat. moveor, ut non rectam esse putem Plinij le-
ctionem, ubi lib. 24. cap. 11. sic habet. Sic & pleuriticos,
& omnes lateris dolores, Apocyni semen ex
aqua, scilicet sanat. Quum enim Diosc. nullum eius
usum ad humanum corpus præscribat. Et Galenus
venenum esse hominibus dicat, & extra solùm cor-
pori impositam, discutiendi vim habere asserat: me-
ritò suspectum est Apocyni semen, ut ex aqua biba-
tur. Ego itaque verba sic & pleuriticos, & omnes la-
teris dolores ex aqua ad præcedentia pertinere pu-
to, quæ de Radicula traduntur, ita ut sequatur, Apo-
cyni frutex est folio Hederæ, molliore tamen, &
minùs longis viticulis, femine acuto, diviso, lanugi-
noso, gravi odore: canes & omnes quadrupes ne-
cat in cibo datum. Et hæc Diosc. sententia consona
sunt. Aliqui fortè non abs re Plinium interpretan-
tur, ut Apocyni semen ex aqua, intelligatur imposi-
tum, nam digerendi cum habeat facultatem, poterit
lateris dolores sanare: sed certè intrò sumptum Pli-
nius intelligere videtur, cum ad superiorum simili-
tudinem dicat. Sic, &c. Hoc tamen periclitatori-
bus est relinquendum. Cæterum cur Cynocrambe,
quasi canina Brassica, item Brassica rustica nomi-

Tom. II.

netur à quibusdam, non video inquit Gesn. n. si
quod siliquas proferat similes fortè Brassicæ mari-
næ, cui similia habet folia, nempe hederacea: simi-
liter etiam succo turgeat, quamvis Apocynon luteo,
illa candido. Habent insuper ramulos similes, nam
quales Dioscorides Apocyno tribuit, longos &
lentos: tales ipse in Brassica marina, id est, Solda-
nella, vulgò dicta observavit. Apocyno (quod
Matthioli depingit, ex Ægypto autem primum
à Bellonio inventum & demonstratum arbitror)
prorsus congenerem herbam illam existimo, quam
aliqui ridiculo nomine, Noli me tangere vocitant.
Notandum potè aliam esse Cynocrambe Apo-
cynon dictam, prorsus venenosam quam hoc loco
Diosc. describit: aliam Cyniam, quæ item Cynocrambe
bes cognominatur.

Cæterum Apocyni nomine donatæ sunt sequen-
tes plantæ: Apocynon siue Periploca scandens folio
longo, purpurante flore, lacteo succo, cuius &
altera species Clusio, angustioribus foliis, quæ An-
guillæræ Apocynum alterum. Apocynon Dioscor. Secamone.
sunt qui suspicentur esse Secamone Ægyptiorum flo-
re albo. Est & aliud Apocynon folio rotundiore, Apocynum
Apocynon Matthioli non repens. Apocynum
latifolium amplexicaule tertium Clusio, est Lobelia
Apocynos siue Periploca prior. Apocynum 4. la-
tifolium Clusij est Scammonia Monspelienfis. Apo-
cynum Syriacum siue Palestina Beidelzar Alpino.
Apocynum Diosc. Fabius Columnæ, aliis herbariis
Asclepias flore nigro quorundam. Apocynum ar-
bitrantur, inquit Turnerus, quidam Itali eam, quæ Asclepias
Hirundinaria dicitur, sed esse non potest. Inscribi
tur hæc à nobis, Asclepias siue Vincetoxicum mul-
tis. Per Hederam arboream sunt qui intelligent
Apocynon Dioscoridis, minùs rectè.

APOCYNVM SIVE PERIPLOCA
scandens, folio longo, flore purpurante.

T Opiarii operis Desch.

uibus ad per-
gulas obumbradas
expetita est ana-
dendras hæc plan-
ta, non aliter ac Pe-
diclymenon vicina
diminuta solita
scandente, & vicina
pedamentis. se-
convolvens (unde
Periploca, quasi
circumplectens; eò
quod proxima am-
plexetur, dicitur.)
multis longissimis
sarmentis, quibus
teste Clusio, & iam
præstatum arbo-
rum (si vicinas nan-
ciscatur) circumnū-
superat: sunt verò

ea sarmenta dura, lignosa, lenta, fractu inuicta, ruti-
lantis ex fusco coloris, multis nodis siue geniculis
distincta: è quibus bina folia opposita, Asclepiadis
sed ex minùs lato principio sensim dilatata, ex inter-
vallis, lacteo pręnantia succo: in mucronem acu-
tum paulatim facientia, obliquis à medio nervo
venulis cis margines desinentibus ut in Myrtb lau-
rea, quarum extremitates colligit vena totum ambitu
circumcurrentes viridis; flores extremis ramulis late-
ralibus quaterni, quini, aut plures; veluti umbellam
cōficiunt, quorum singuli quinque foliis radiatis cōstāt,

M

quæ infernâ parte glabra ex luteo virescunt, superiore verò hirsuta, obsoletâ purpurâ (cujus mediam aream rhomboides macula viridis obtinet) tincla sunt, oris virentibus: quâ verò foliorum concurrunt ex ortus, corollam efformant vegetioris purpuræ, quinque ejusdem coloris staminibus intrò recurvis emissis, omnium autem medium occupat quinquepartitum villosum albidum capitulum; floribus porro succedunt siliquæ Rhododendri oblongæ, torosæ, geminæ ut plurimum & extrorsum aliquantulum inflexæ sive divaricatæ, deinde mucrone coalescentes, quibus dehiscenibus papposâ lanugine involutum semen apparet; radix latè se spargens & subinde germinans.

Synoni. Matth. Apocynum, Periploca non modò repens, sed & arbores proceras scandens. Cam. ep. & hist. & hort. Apocynum repens, vel potiùs *Andropogon*. Arbores enim scandit, & admodum altè crecit. Gignitur in Græcia, ubi vocant *Andropogon*; lacteum succum emitit & folia ac siliquas profert instar Oleandri. Dod. purg. & hist. Periploca altera repens

Reperitur in. diâ, caulibus perennibus de fluentibus foliis, unde repentis fortassis cognomen: floribus haud magnis, quinque foliolis albicantibus: rara Belgio, & quidem ut Matth. scribit, etiam Italiz ex Syria istuc affertur; ad Diosc. Apocynum referenda. Hanc plantam Dodonæo non fuisse visam florentem satis demonstrat quod annotavit de floribus. Ang. Apocynum non alterum. Lob. Periploca serpens angustiore Periclymeni folio. Column. Apocynum alterum & Apocynum repens vulgare. Clus. hisp. Apocynum 2. amplexicaule. Eid. hist. Apocynum 2. angustifolium. B. phyt. Apocynum 2. sive repens, purpurâcente flore: Eid. pin. Apocynum 2. folio oblongo: Apocynum repens, Matth. Lugd. & Cam. Apocynum foliis Oleandri, Ang. Periploca, Cæz.

Lacus. Semine ex Italia accepto Clusio nata est, cum in Belgio, tum Viennâ Aultriz, perennisque est, deciduis tamen hieme foliis, serius flores producens, quàm ut fructus ad maturitatem (quemadmodum & Rhododendri) pervenire posset. Apocynum vidi Patavij in horto D. Cortusij, mense Januarii ad magnam altitudinem circumvolvens palos, verùm tunc erat sine foliis. Rauvolfij. misit semen Augusta pro Periploca repente ex monte Libano: ea primo anno vix dodrantalis, sequenti duos homines superavit, se, involvens foliis longis ad Nerium accedentibus, quibuldam tamen latioribus in acutum desinentibus: pulchra visu planta, succo lacteo turgens, necdum tertio anno florem proferens: etiam in altissimam evaserit, hiemem facillè fert: interdum tamen gelu corrumpitur remanente radice.

APOCYNO AFFINIS SECAMONE flore albo.

Deser. Planta est repens, altius saliens, seque aliis arboribus convolvens, foliis duris, longis, Sesele Ethiopici proximis, sed majoribus; flores fert albos styracis similes, à quibus produciuntur siliquæ; longæ ac crassæ, quales in Rhododendro cernuntur, plenæ lanugine albâ, ac seminibus parvis. ex hac planta succus emanat flavus, urens, quem siccatum Egyptij valenter tenues humores purgare aiunt.


Scammonij speciem affirmant. quam Secamone appellant, cujus tamen nullum usum in medicina apud eos novit. Hanc plantam Apocynum Diosc. esse suspicatur Guilandinus eamque putat, quam aliqui è Syria venisse, Periplocam vocatam prodiderunt.

Clus. hisp. Apocyni alterius genus 2. Eid. hist. Apo-



cyni secundi sive angustifolij species altera per omnia ferè similis Apocyno angustifolio dicto: sed tenuioribus ramis, multoq; angustioribus foliis, non minùs tamen viridibus & nervosis. B. phyt. Apocynum 1. sive angustifolium albo flore. Eid. pin. Apocynum 1. angustifolium Salicis folio. Sportè hoc Apocyni genus nasci non viliù à Clusio, sed in hortis semine ex Italia missum ab eo cultum.

APOCYNVM FOLIO ROTVNDIO. re, flore ex albo pallefcente.



BREVIS frutex *Deser.* Best stirps hæc neque proximis se advolvens, verùm suis nixa viribus recta stat, in plures ramos divisa, cortice cinereo: folia ad singulos nodos exadverso bina nascuntur, hederaceis similia, non angulosa, modicè acuminata, crassa & mollia, uncialibus & sextantalibus pediculis hærentia, succum remittentia ex albo pallefcente, ex quorum sinu flores ubertim emicant longis innixi pediculis, umbellam quodammodo emittentes, candidi è quinis oblongis foliolis contexti.

Hanc Clusita describit: Hujus stipes pollicari est crassitudine, brevis, cinereo cortice tectus, in plures alas sive ramos divisus, qui licet lenti sint & viminej, rard tamen vicinis fructibus sese advolvunt, aut implicant, sed nullo adminiculo egentes, per se subsistunt: folia perpetuò gemina inter se opposita, ad singulos ramorum nodos adnascuntur hederaceâ formâ, molliora, quâvis satis carnosa, quibus avulsis aut fractis, ex albo pallefcentis succus emanat: flos pusillus, albus, Asclepiadis non dissimilis, ex alarum sinu quasi umbellatim prodit. Fructum (inquit is) non observavi, sed Asclepiadis fructui penè similem intelligebam: semè certè quod hoc nomine aliquando ad me missum fuit, Asclepiadea par erat, planû, in medio aliquantulum intumescens, nigrum, albâ interiore pulpâ, quod terræ commissum, non est natum. Plantam autem ipsam satis crassâ radice, pingui sacco turgidâ & fragili accipiebam à C. V. Alphoq(â) Pancio, Ferrariz Ducis Medico & Academiæ professore.

Apocynon, q & Brassicam caninâ appellant, etiam diu Matthiolo quidem incognita fuisse, adè ut eam inter alias incomptas stirpes in amplissimo naturæ viridario posterorum explorati omni reliquâdam putarit: anno tamen 1554 è Pisis Lucas Chinus duas ad ipsum misit siliquas, Rhododendri siliquis admodum similes: quarum alteri inscriptum erat Periploca

Deser. Styracis Rhododendri siliqua

Scammonij speciem. Apocynum Diosc. Periploca.

Asclepiadis flore fructu & semine

Brassica canina.

plocarepens, alteri verò Periploca non repens, fortasse quod ita Syri eas nominant: inter eas tamen hæc erat differentia, quòd repentis Periplocæ siliqua eà sanè longitudine constabat, quæ & Rhododendri, gracilior tamen erat: alterius verò brevior. E longiori ita plantam provenisse ait, quæ non modò humi reperit; sed & arbores quantà vis proceras scandit: è breviori verò aliam, quæ notis omnibus Apocyn non retulerit. Vtraque porro non minus late abundavit, quàm Thymali omne genus: verum id repenti omnino album fuisse: non repenti verò subcroceum. Hinc itaque factum est ut Ghino planè subscripserit, & hanc cui omnes prorsus notas ad stipulari credidit, Apocyn non esse certò affirmarit. Siliquas autem, quas huic suo Apocyno appinxit, fictitias fuisse, in eomm. It. & lat. cum mag. fig. demonstravit, ut in quibus eas, & meritò, mutarit.

Apocyni prima species, inquit Anguil. multas habens notas respondentes, Apocyn non esset, si occideret canes; Periplocadis nomine intelliguntur omnes plantæ amplexicaules: nec est nomen particularis plantæ, ut quidam existimant.

Clusio ad veterum Apocynum, quod Dioscorides etiam à nonnullis *κινναμωμίδιον* appellari ait (differens tamen à Cynocrambe, de qua peculiari capite agitur) ante descriptæ plantæ & sequentes referendæ videntur, sed hæc, de qua hic agimus, omnium maximè. Est autem ei hisp. Apocynon 1. Eid. hist. Apocynū 1. latifolium. Lob. adv. & ic. Apocynum, Periploca græca foliis latioribus hederaceis: Obs. Apocynum, Periploca græca, Apocynon Guilandini, Matth. & Italorum, Cynocrambe Galeni, & Cynomorus Adversariorum. B. ph. Apocynum 1. subrotundo folio, non repens: Eid. pin. Apocynum 1. folio subrotundo: Apocynum, Matth. Ang. Gef. h. 1. Lac. Lugd. & Cast. Cynocrambe, Lon. Apocyni alterum genus, Cam. Periploca repens, Cast. Dixerat Bauh. in phyt. non repentem, quod in pin. siliquo involvit, & ex Casalpino repentem facit. Quondam ex horto Patavino allatam, nominavit Apocynon Dioscoridis, & Zingiber caninum Avicennæ, Guilandini.

In horto Ill. E. C. (unde delata nunc non recordor) quotannis floret, sed siliquas hæcenus anno 1600. à multis annis non protulit: conservatur in vase & hieme reponitur. Clusius cam Viennæ Austriæ alebat, hieme quidem folia abiciens, illius autem inclementiam facile ferentem.

Mauritius Thaurer, Laurentius Hyperius & Joh. Krug, Doctores & Cancellarii Ill. Princip. Guilhelmi Landgravij testantur apud And. Bertholum de Terra sigill. & Clus. de Apocyno, se Apocyni 3. dedisse cani, qui post semi-horam, licet partem vomuerit, nihilominus post symptomata crudelissima convulsionibus & tremoribus interierit: alterum verò canem, qui cum Apocyno partem Terræ sigillatæ equalem devoravit tribus post sumptionem horis debilem utcumque fuisse, postero tamen die convalescere, & maximo cum appetitu edisse, ut sumpti veneni vix minimum signum apparuerit. Historia hæc revocat nobis in memoriam quod evenit Môtbergardi gubernante Nobili D. Io. Jochemio à Mündelzheim summo præfecto: Quidam se Chymicos dicitantes, quum perquirendo Chrysopæam, aurum suum reddidissent totum potabile & comestibile & fame penè perierint, voluerūt ex Medicina quæstum facere, quod confecti ejusmodi impostoribus Chrysopæis. Terram igitur Silesiacam supra dictam, ac ut suspicamur à prædicto Bertholo nacti, magno pretio dividere conabantur, pollicentes utilem adversus omne venenum. Sed eorum pollicitatio flagris digna erat: hoc enim per experientiam tractare non poterant: imperante enim Præfecto nostro duabus

gallinis data radix Napelli (verum nimis in parva quantitate) nullum illæ nocumentum expertæ eo per se, vel cum Terra silesiaca assumpta: dato autem Sublimato utraq; perit, eaq; citius quæ terram assumpserat, quæ enim non sumptæ vomitu partim rejecto veneno diutius supervixit, altera cum non potuerit vomere, terrâ conspiciante fauces, citius perit. Quare nulli intoxicato consiliumus dandam Silesiacam terram, nec veram Turcicam, ante rejectum venenum per vomitum, nisi parvâ quantitate cum multo liquore ad movendum vomitum. Considerandum an Andreas Bertholus non deceperit medicos: fortè (quod non declarat ipse, nec Clusius) terram sigillatam exhibuit cum multo liquore, unde calida veneni vis infracta & vomitus facilius subsequutus: quod fortè commodius præstitisset (sola aqua tepida, vel cum oleo, aut butyro, aut melle, aut Oxymellite & similibus: lectores videant imposturam quam descripsimus lib. 4. hist. n. g. de Liagno Nephritico cæruleo & flavo tingente.

APOCYNVM LATIFOLIUM amplexicaule.



Longis, tenuibus, & frequentibus sarnetis proxima quæque scandit, multiplici circūvolutione & arcto nexu illa amplectens, viridibus, geniculatis, foliis Hederæ mollibus, sub-
cineracei coloris, lacteo succo, ut etiam sarmata, adò turgidis, ut vellavissimo vulnere, non minus copiose, quæ ex quovis Thymali genere profiliat. Flores ex altum sinu multi umbellæ ferè in morem prodeunt, candidi, parvi, quinque foliis perinde ac Alclepiadis flores constantes: siliquæ præterea similes, multo tomento & lanugine plene, quæ semen occultatum planum, ex cineraceo fuscum, Alclepiadeo semini par. Molestissimæ huius radices, quæ sarmatosæ & brotæ admodum, eadem ferè crassitudine longissimè hac illac serpunt, & latè vicina circumfoca occupant, candidæ alioqui & fragiles, adò tamen vî vaces, ut, si vel minima fibra sub terrâ latens oculos illam eruentis effugerit, proximo Vere germinare, & vicina loca occupare conspiciatur. Itaque, non minus exofa hæc planta rei herbariæ studiosis, quàm Aristolochiæ & Clematidis illud genus, cui vulgus Sarracenicæ cognomen imposuit. Hujus cauliculi & sarmata hieme exarescunt & pereunt, sed novo Vere alia & frequentiora germinant.

Apocyni 3. latifolij siliquas semine plenas paucos annos post meum (inquit Clus.) ex Hispaniis in Belgicam reditum, Pinciâ usque mittebat Ioannes de Ioiny Fabricarum istic Præfectus, hispanicâ inscriptione additâ, quæ trepa por los arb. les, h. e. per arbores repit: postea radicibus adò multiplicata est, ut nemo esset in universo Belgio rei herbariæ studiosus, qui eam ex suo horto penitus erutum non cuperet.

Apocynum
Desf. Dod.

Dod. Periploca prior, potissimum ad Diof. Apocynum referenda, rara Belgio, & quidem ut Matthioli scribit, etiam Italia ex Syria isthuc allata. Nos Matthioli Apocynum ad hanc non referimus, potissimum quoad iconem.

Scammonij
Monsp. Val.
rietas, Lob.

Lob. Obs. Scammonij Monspeliaci varietas: Apocynos live Periploca prior Dod. & Belgarum quorundam. Cognatae figurae & naturae est cum Scammonio Monspeliensi flore, succo, viticulis & longo radice reptatu subtus hinc inde porrecta, quae adeo vivax est, ut semel in hortos ascita, vix truncari deleat, etiamque frustillo tantillo relicto repullulet: sed foliis longioribus, filiquis verò & semine Vincetoxici ejusmodi è litoreis Adriatici finibus & mediterranei maris in hortis Belgicis alitur.

C. B. phyt. Scammonium 3. & Scammoniae affinis. Eid. pin. Scammonia 3. Scammoniae Monspeli. affinis, foliis acutioribus: Apocynum 3. Clus. hisp. 3. latifolium, Eid. hist. Scammonij quoddam genus, Cael. Volubilis marina, Tab.

Scammo-
nea Clusij.

Frater C. Bauh. misit semen (quale fuerit non recordor) nomine Scammoniae Clusij, quod secundo anno non tulit florem; folia erant cinereo colore, crassa, turgentia lacteo succo, acri, acutiora & minora quam in Monspeliensi, nisi immutet aetate formam: protulit hiemem unam in horto Montbelgardii, tandem perit; fortè hæc est Apocynos modò à Clusio tradita: suspicor me hanc etiam collegisse Lutetiae in horto Robini pro Scammonia Monspeliensi.

SCAMMONEA MONSPELIACA flore parvo.

Desf.



Asari folie.

IN longis, teretibus, tenuibus, bicubitalibus farnetis, vicina quæque amplectentibus, ramosis, vel ut ait Lobelius reptantibus & stratis humi viticulis, vel piscatorum atregeis & Tamariscus ad-volutis quinque cubitorum; folia nascentur opposita, Aristolochiae, Clematidis vel Asari, falcata ad pediculum, in mucronem desinentia, lata, densa, glabra, albidula, uncia longioribus pediculis hæ-

Convolvuli
genus.

rentia, succo lacteo prægnantia; flores ex foliorum sinu pediculo orto multifido insident plures confertim congesti, parvi, stellati, albi; semen Lobelio angulosum in utriculo minore quam Aristolochiae. Radix longa, digitali ferè crassitudine, alba: longo inquit Lobelius reptata, multum fibrosa, succulenta veluti reliqua planta.

Lob. Adv. Scammonium, Volubilis marina communis Pharmacopæorum consensu facta, cuius flos à Volubilibus omnium floribus differt: Eid. Obs. & ic. Scammonium Monspeliense. Apud Cord. in hist. lib. 4. c. 109. hujus Scammoniae pictus est ramulus, quamvis Cordus ejus eo loco mentionem non faciat. Gefn. h. Monspeliensis Scammonia quædam floribus exiguis. Rauvvol. Scammonium Monspeliense, incolis Tripolitanis Meudhendij; Razi lib. ad Almanforem Corizyola. Cam. h. & Lugd. Scammonia Monspeliensis maritima. Clus. hisp. Scammonia Valentina & Monspeliaca: Eid. hist. Apocynum 4. latifolium & Convolvuli genus: Valentini & Monspeliensis Scammonia dicta, plurimum tamen à legitima Scammonia distans. B. phyt. Scammonia 2. live Monspeliaca: foliis rotundioribus, Eid. pin. Scammonia Monspeliensis, Eysl. Scammonia Valentina, Tab. Ger.

Lob. copiosissima toto illo litore & sabuleto, ab usque Rhodani ostio ad aquas Marianas & Sinum Agathorfen; flores fert Junio & Julio. In regni Valentini & Narbonensis Galliae maritimis, præsertim litore illo, quod inter Volcarum stagnum & mare Mediterraneum est, herbidis locis Clusius observabat. Ego Monspeli in maritimis copiosam vidi, florentem mense Augusto.

Massilienses cum succo istius herbae & Colophonia, adulterant Scammonium tam exactè, ut vix cognosci queat. Succo lacteo concreto (quo multo tota turget) purgationes moliebantur, sed majore dosi (quam Scammonij) & minore effectu: quippe succo nihil additum erat, sed coctione coactus niger vel fuscus erat.

BEIDELSA ALPINI SIVE APOCYNUM SYRIACUM. CAP. XVII.



Alpini mu-
neris Patavio
Desf. fr.

Alpini mu-neris Patavio retulit D. Cherlerus Beidelsaris fructum, qui oblongus, pugnum crassitudine æquat, pediculo hærens uncialis, crasso, tereti, duro, incurvo; cortex extimus membranaceus, viridis, inferius croceus qui tenuem alutæ eleboratam æmulatur: utrunque committit flammæta villos musci arborei referentia: integrum denique sinum totius fructus implet tomē-

tum, veluti holoferico mollitie neutiquam cedens, colore car didum, semine involuto Cucurbitini forma, dimidio minus, compressiore, fusco, pulpa albicante, sapore amaro.

Est autem planta ipsa, uti scribit Alpinus herbacea, fruticosa, multis stoloribus ab radice rectis, sursum ad duorum ferè cubitorum altitudinem se extollens; foliis latis, oblongis, ut Aloë folia, crassis & candidis, ex quibus dissectis lac album manat, totaq; planta lacte abundat: flores fert croceos Ranunculi floribus proximos, fructus bini invicem alligati pendent satis hominis testibus similes in quibus alba lanugo, semina parva, lata, Lactuca seminis æmula cōnectur. mine.

Quia

Quia autem elegans hæc planta in terra nostra exsul ut plurimum est, non abs re erit, ut aliorum de ea observationes addamus. Affurgit autem, referente Christophoro VVeixio, ad duorum cubitorum, vel etiam ampliore altitudinem, satis crasso stolone, in aliquot ramos diviso, qui multo succo ex candido pallescent abundant. Quantum verò ex resiccatæ plantæ parte (quam ipse VVeixius ex Ægyptiaca, Syriaca, & Constantinopolitana peregrinatione redux, mihi, inquit Clusius, Viennæ Austriæ communicabat cum uno fructu, colligere potui, striato est caule, cui alternatim bina semper, contritiis inter se pediculis innascuntur folia satis magna, crassa, & quodammodo cutacea, ex viridi pallescentia, aliquot nervis, ex mediâ costâ satis crassa se spargentibus, prædita, obtuso mucrone, gravis odoris, tenella folia extremis ramis adnascencia, profus incana sunt: ex foliorum alis alternatim emergunt crassi & longi ramuli bifidi, sustinentes aliquot flores longiusculis petiolis innitentes, unico quidem folio constantes, sed quinque profundis incisuris diviso, instar florum Apocyni, Adlepiadis & multorum aliorum, coloris, quantum conjicere licebat, foris pallescentis, internè obscurè & obsolete purpureiscentis: quibus succedunt singulares, binæ, aut ternæ crassæ, incurvæ, binas uncias longæ filiquæ, quibus hiscentibus, sub summâ filiquæ cute, inclusa apparent membranaceo involucrio, frequentia & quasi imbricatim disposita grana plana, qualia serè Adlepiadis, & Apocyni vulgaris semina, quorum extrema & angustiori parti inhzret candidissima & mollissima quædam villosa materia. Sine perennis an non, nihil affirmare possum. Qualem autem à VVeixio accipiebam plantam, ut comodiùs describere possem, paululum in aqua macerabam; deinde crassâ minervâ delineabam, observatâ in fructu addito eâ proportionem, ut dimidio minorem exprimerem, quàm ille qui à VVeixio mihi donatus. Beidfar ab incolis appellari dicebat. Cùm autem multas notas habeat Apocyno non dispares, non ineptè, meo iudicio Apocynum nuncupare poterimus sive Syriacum, sive Palæstium, & fortè etiam Ægyptiacum; quandoquidem in Ægypto, ut postea dicemus, crescit. Non dubium est quin ea sit, quam Alpinus Medicus c. 25. libri quem de Plantis Ægyptiacis divulgavit, & c. 6. Alexandriam Ægypti observatam descripsit Beidfar nomine.

De hac porro planta consulamus Honor. Bellum, qui multa, diligenti observatione dignissima memorie prodidit; cuius verba hæc sunt. Ossar frutex est stolones multos à radice proferens rectos, rotundos, leves, geniculatos, quibus circa genicula insunt folia longa, rotunda, crassa, per quorum medium nervus excurrit albus, è quo utrinque venæ exeunt diversâ foliorum parte satis conspicuæ, folia autem ex intervallis bina semper inter se opposita sine pediculis stolones undique ambiunt, ex quorum alis multi rami nunc erumpere incipiunt, non quidem ex omnibus, sed alternatim, ita ut si, à primo initio fumens, lineam ab uno ad alium ductas utque ad ultimum, perfectissimè lineam helicen describes. Radice firmatur validâ in multas fibras divisâ, luteos flores proferit, fructûque Mali magnitudine, cordis figurâ, colore virides, binos aut ternos ex uno pediculo pendentes, in quibus semina lata, lanugine quadam mollissimo candidissimoque serico simillimâ involuta: Caulès & folia incana sunt, lanugine quadam tecta, ut crassiore quapiam farinâ tota planta conspersa videatur, quæ imbriculis eluitur, eoque tempore folia & caulis colorem ex viridi ad album tendentem contrahunt: pars*caulis radici proxima albo cortice tecta est,

Tom. II.

fungoso, timis dissecto, ut Sambuci caulis videri possit, & illius instar multa medulla alba reclusus est. Stolonum cortex & foliorum nervus copioso lacte amaro & acri abundat: breviter tota planta aspectu pulchra est, & quas in fistulis setvo semine ex Ægypto accepto natas, ad trium cubitorum altitudinem jam excreverunt, foliisque hieme retinent: nondum autem vel flores, vel fructum tulerunt. Planta hæc in Ægypto vulgariter Ossar appellatur, fructus verò Beid el ossar, hoc est, ovum ex ossar, Beid el aut Italicè Ovo del ossar, Beid enim Arabicè ovum si. Ossar, significat, & el est articulus, qui Italicè dicitur del. Huius fructus lanugine pulvinaria implent, lacte autem V. J. m. tem coria depilant: Sine dubio, hæc planta illa est super quam Avicenna & alij Arabes Saccharum Alhufar (mannæ speciem) inveniri scribunt: & quam Serapio ex Abanifæ sententia, Mutono interprete descripsi his verbis: Haofer, seu Alafer, seu Albulfar, planta est quæ lata habet folia, singulis annis succrescens. Saccharum ex ramis extillans, & à foliorum cavis quod copiosissimè legitur, non parum quidem amarefcens: poma proferit camelorum testibus non dissimilia, à quibus res quædam caustica, adurènsve emanat, cauteriis maximè accommodata, ex qua etiam & culcitæ, & pulvinaria sulciuntur, planta cuius Cherca nuncupatur: folia autem Haofer incisâ humorem destillant in Maio colligi solitum, in quo coria depilantur, adeoque exsudat, ut vas quàm capacissimum ex una, vel altera expressione adimpleatur: lignum verò Haofer leve est, crassum, erectum, pulcherrimum, ut non in iuriâ in suis catminibus tum brachia, tum crura formosarum sanè mulierum, ligno Haofer Poëtæ bellè comparent. Est & alia planta Haofer nominata ex Tithymalo: Haofer autem quidem genere. Hæc Serapio. Sed animadvertendum est, veterem Serapionis interpretationem rectius huic plantæ quadrare, quàm Mutoni, ut utramque cum nostra conferenti faciliè patere poterit. Describitur etiam hic frutex ab Abembitar Medico Arabe Hispano in sua Simplicium hist. & à Malahysah Medico Persâ, qui Abembitaris historiam in Epitomen contraxit: quorum libros manuscriptos apud Hayin Abenzulsem Medicum Hebræum Hispanico sermone vidi, qui mihi Ossaris historiam ex eorum scriptis ad verbum hoc modo humanissimè interpretatus est. Ossar frutex est Tithymalus, longus & parte superiore tenuis, folia habens lata, super quæ decidit manna quæ Zuccar el Ossar vocatur (flore fert Oleandro similem) hoc addit Malahysah: Abembitar enim nullam floris mentionem facit, sed fructus duntaxat: folia ipsius plana & levia sunt, caulem habet viridem, concavum: fert fructum quendam similem sacculo pendenti, qui intus continet particulas albas unas super alias, quibus utuntur Arabes ad accedendum ignem, nihilque (dicunt ipsi) ad hoc munus peragendum præstantius inveniri posse: pulvinaria etiam hac materiam implent. Oritur in montium cavitatibus, Locis, scilicet ubi mons jungitur monti, quandoque etiam in arenis nasci conspiciuntur. Si caulem aut folium incidas, lac magnâ copiam emanat, ita ut quatuor & amplius libræ ex una planta exeant, quod quidem est acre, calidum & siccum, corrodit & incidit, ut sit in principio quarti gradus caliditatis, planta verò ipsa calida est in fine secundi aut principio tertij. Habitatores Mechæ pilos extrahunt à coriis, depilant videlicet coria cum hoc lacte, eam in ipso insundentes: quod quidem est vehementius lac omnium Tithymalorum: drachma enim una & semis per os assumpta interficit evacuando & excoriando: folia verò in pulverem redacta, & inspersa super ulcera maligna at- V. J. m. que corrodentia amplius progredi non sinunt: signa

M 3

Macula
cutis.

Arbor Lan-
gera Theo-
phraſti.

Beid el ſar.
Alpinus.

Syn. C. B.

Locus
Tempus.

Vires.

Dolores ſtri-
gidi.

exſecat ulcera ſordida, humiditatem extremi ſenti-
tiam, carnemque ſuperfluam conſumit; lac co-ſert
maculis cutem inſcientibus. Huiusmodi ſtirpes
nonnullæ Tripoli reperiuntur, nonnullæ etiam
Cayri. Sed cavendum ne propinquius acceda-
aut ſub umbrâ dormias. Bellonius lib. 2. O ſerv.
cap. 60. hanc ſtirpem forte intellexit ſub arb-oris la-
nigeræ nomine, non tamen deſcripſit. Si verò hanc
lanigeram eſſe Theophraſti, aut Plinii putavi, t. valdè
hallucinatus eſt: nam lanigeræ Theophraſti nihil al-
liud ſunt quàm Goſſipium, quod in Arabia & Ægy-
pto arboreſcit, & multos annos durat: ſed in Creta
hieme perit. Alpinus quoque hunc fructicè de ſcribere
videtur libro quem de plantis Ægyptiis edidit ſub
nomine Beid el ſar: ſed ut ingenuè fatear, ipſius de-
ſcriptione nò ſatis aſſequor. Neſcio enim quid com-
mune habeat huius plantæ folia cū Aloës foliis, qui-
bus ipſa cõparat; neque in quibus ſemina huius con-
veniant cum Lactucæ ſeminibus: & icon quam ſpe-
ctandam proponit diligentiorẽ pictorem requi-
rebat: ſemina verò & fructus ſatis rectè expreſſi: at
maiores ſunt his quos ex Ægypto accepi, ut ex ſic-
cis foliis & fructu cum ſua lanugine & ſeminibus,
obſervare memini. De ſaccharo autem quod ſuper
hanc ſtirpem inveniri ſcribunt, aut ab ipſa manare,
nihil adhuc compertum habeo: nam in novellis
plantis illud obſervare non potui. Illud tantum ani-
madverti, quòd lac detracto folio emanans, ſucceſſu
temporis circa vulnus concreſcit inſtar gummi cu-
juſdam albi, Tragacanthæ valdè ſimilis, dulcedinis
tamen expertis. Huc uſque Bellus.

C. Bauh. pin. Lapathum ſilv. laſuſolium & Lapa-
thum Ægyptiacum lacteſcens, ſiliqua Aſclepiadis:
Eſula Indica, quibuſdam.

Anno 1595. Julij 1. Stutgardia in orto D. Hiero-
nymy Gerhart Vicecancellarij obſervavi parvas
plantas Beid el ſar, quæ foliis correſpondebant ſig-
næ ab Alpino propoſitæ; erant autè purpureſcentia:
parvas etiam plantas in olla vidi Argentina in orto
D. Georgij Obrechtii Iuriſconſuldi ex ſeminibus
miſſis nomine Beid el ſar à D. Agerio. Naſcitur, au-
tore Alpino, in humidis locis propè Alexandriam
in ramo Nili Calig vocato & Cayri, propè el Mat-
tharia, loco ſerè perpetuò humido ac ſerè paluſtri
ex aqua Nili ibi diu remanente. Chriſt. VVeixius
Medicus circa Hierico naſcentem ad flumen Iorda-
nem obſervabat & legebat.

Folia contuſa, ut ait Alpinus, tum cruda, tum in
aqua cocta, emplaſtri modo apponuntur in frigidis
tumoribus & doloribus; ex lanugine parant cubi-
lia in ſuum uſum. Utuntur etiam eà ad excipiendum
ignem ex ſilice excuſſum, tanquam eſcà ac pabulo.
Tota planta ſcatet lacteo ſucco calidiſſimo & exu-
rentis facultatis, quem plures in quibuſdam vaſis
excipiunt ad depilanda coria, nam ſi aliquanto tem-
pore in eo macerantur, pilis nudantur. Lac quoque
ſiccatum præſtantiùs corpora ſolvit, atque dyſente-
ricos fluxus etiam lethales facit. Eſt etiam præſtan-
tiſſimum remedium, ad impetiginem curandam, &
ad plures cutis maculas & infecciones tollendas, ſi
eo partes illinantur.

ASCLEPIAS VETERIBVS.

CAP. XVIII.

Aſclepias
Dioſc-
Hederæ ſo-
lio.
Securidacæ
ſemina.
Vires.

Aſclepias, ut ait Dioſcorides, ramos producit
longos, in quibus ſunt folia longa, hederacea;
radices habet multas, & tenues odoratas; florem
graveolentem; ſemen ut Securidacæ. Naſcitur in
montibus. Radices in vino potæ auxiliantur tormi-
nibus, & contra beſtiarum venenatarum morſus.

Folia impoſita, ad mammarum & uteri maligna ul-
cera faciunt.

De Aſclepiade eadem apud Plin. leguntur. Aſcle-
pias folia Hederæ habet: ramos longos; radices nu-
meroſas, tenues, odoratas, ſloris virus grave: ſemen
Securidacæ. Naſcitur in montibus. Radices tormi-
nibus medentur, & contra ſerpentium iectus, non
ſolùm potu, ſed etiam illicit.

Galenus de Aſclepiade herba ſcripſiſſe dicit Dio-
ſcoridem, ſe verò nondum experimentum ejus ha-
bere. Paulus calidam & ſiccam & tenuium partium
eſſe teſtatur, & reliqua ex Dioſcoride addit. Voca-
tur hæc inter northa Dioſcoridis ab aliis Ciſſion,
quaſi Hederula; ab aliis Ciſſophyllon, h. e. Hederæ
foliis prædita.

Falluntur vel Matthiolo nobis adſtipulante, qui
putant Aſclepiada eam eſſe plantam, quam vulgus
herbariorum Vincetoxicum vocat, quæ frequenter
in Saxiſ & alperis locis provenit, lævi admodum
caule; foliis Lauro acutioribus; flore albo, muſcoſo;
corniculis tenuibus, oblongis; radicibus innumeris
albicanibus. Quandoquidem huius radices nullo
odore commendantur: flores virus aliquod non re-
dolent: ſemen non eſt Securidacæ ſimile. Adde
etiam quòd ex Oribaſij lectione Aſclepias non pro-
fert folia longa; cui ſubſcriptis Marcellus interpres,
ſetus fortaſſe, uſcolet, probatiſſimis exemplaribus.
Præterea antiquiſſimus codex manu ſcriptus de ra-
dicibus non legit *multas*, h. e. multas, ſed tantum *la-
tes*, *adde*, i. e. tenues, odoratas.

Veterum ergo Aſclepiadem, eſſe neotericorum
Vincetoxicum, crediderunt, ſed falſò, Trag. Fuchſ.
Corn. Lon. Cord. Lob. Dod. & Tabernamontanus.
Nos herbariorum Vincetoxicum mox inſcribimus
Aſclepiadem ſive Vincetoxicum multis, ſloribus
albicanibus.

Nec minùs etiam hallucinantur ij, qui Aſclepia-
dis vice, quam in montibus naſci Dioſcorides, nec
non etiam Plinius tradiderunt, eam herbam acci-
piunt, quam Hederam terreſtrem cum quibuſdam
alibi nominamus, quæ plerumque ſecus vias naſci-
tur & perpetuò humi ſerpit foliis rotundis. Si qui-
dem præterquam quòd Dioſcorides ſcriptum don-
reliquit Aſclepiada in viis publicis naſci, nuſquam
etiam, quòd legerim, prodidit eandem tam longo
reſpere tractu, & folia rotunda proferre. Anguillara
ait ſe Aſclepiadem non noſſe: Turnerus autem non
facile poſſe affirmari perhibet quanam illa fuerit.

Eſt porro etiam Aſclepias altera flore nigro Lo-
belio, Camer. Tabern. C. Bauh. & Hort. Luſitanico,
quam Columna vult eſſe Apocynon plantam lethale-
m, malè meo quidem iudicio. De hac paulò poſt,
ut & de Aſclepiade Cretica Cluſij.

ASCLEPIAS SIVE VINCETOXI- cum multis, ſloribus albicanibus.

Numeroſas radix demittit fibras, benè habitas, Deſc-
longas, albas, guſtu nauſeoſo [Trago, odorato,
contortas & implicatas, inſtar Hellebori nigri, adeoque in-
terdum ponderoſas ut decem libras æquent, cuius ſmodi à ſe
iam olim in ſilva, quam Germani den Ydar vocant propè
arcem Birkenfeld reportas ait] caules ſurrigens
lentos, cubitum & ſeq̃uicubitum altos, hirsutos, ge-
niculatos: ad quorum genicula bina ſemper folia
adverſa ex brevibus pediculis ſurſum vergentibus,
nonnihil per extremos margines & nervos hirsuta,
formâ hederaceorum, longiora, rugoſiora: ex quo-
rum alis pediculi prodeuntes flores privatiſ inſu-
per pedicellis donatos ſuſtinent albicantes, quin-
que foliis conſtantes [Trago, ex candido paluſcentes]
totidem apicibus concoloribus rotulæ modo, ſeſſi-
lique



lique pistillo viridi, medium occupantibus. hinc succedunt cornicula fescunciam aut amplius longa, semen tomento involutum continentia, rufum. Trago aculeatæ & oblongæ filiquæ, Ciconiæ rostrum imitantes, intus candida lanâ & lato semine Gentianæ simili refertæ, quæ si ad maturitatem suam pervenerint & apertæ haverint, lanuginosum & quasi pinna- tum semen in aurâ evanescit.

An Ruell. l. 3. c. 26. hanc nostram plantam per Asclepiadem, quam alius Ciffion, alius Cissophyllon, quosdam Hederalem nominasse refert, intellexerit, asserere non aumus propter jesuniam ejus descriptionem.

Quo nomine veteribus sit appellata nondum satis constare scribit Tragus, tamen si omnino sit pronuntianda sententia, non ineptè se facturum existimat, si Asclepiadem eorumdem nominet. Asclepiadem autem à Theophr. Pelicinium dici prodidit. Ast meminit quidem Theophr. lib. 8. c. 8. πάλαιος, vel ut vertit Gaza Securine, verum eo loci nihil est quod Vincetoxico conveniat.

Quidam Herbarij Itali, cum Turn. in Italia ageret, Hirundinariam vulgi Apocynon arbitrabantur: verum cum nec succum habeat luteum, nec vina intoxicet, Apocynon esse negat. Porro quod Hirundinariæ radices non sint odoratæ, non faciliè affirmari posse scribit, veram esse Asclepiadem. Neculam hæc enim vidit, quæ cum Asclepiadis descriptione conveniat. Licet Cornarius Asclepiadem Dioscoridis, esse Officinariam Vincetoxicum, & Herbariorum Hirundinariam, descriptione totâ & usu approbati sibi imaginatus fuerit. Sed est & Cordo in Dioscor. & hist. Fuchf. Lon. Turn. Gesf. h. (cui & Herba cognata Apocyno, & Apocynum dicitur) Lob. Obs. & Ic. (cui & Vincetoxicum) Dodon. gall. purg. & hist. Lac. Tab. (cui duplex frustra effigies) Columnæ, Cam. epi. & Cæf. Asclepias, uti & Lugd. qui duas unius plantæ dat icones. Prima inferbitur Vincetoxicum sive Asclepias Fuchfij; altera Vincetoxicum Matthioli. Matth. Fuchf. Montagnanæ (cui & Herba Laurentij dicitur) Dod. gall. purg. & hist. Cam. hist. & ep. Cast. & Thal. Vincetoxicum.

Lob. Adv. Asclepiadem Vincetoxicum, qui invehitur in eos (iniquè) qui Asclepiadem negant. Sic & Dod. Vincetoxici descriptionem, descriptioni Asclepiadis Diosc. conformem esse dicit, & tergiversari Matthiolum scribit. Sed exigui momenti ejus rationes. Radices (inquit) si se opponens Matthiolo odoratas & similes flores, maxime que locis montosis, nemo, cui incorruptum odoratis organum, esse negaverit: folia odore commendari, Dioscorides non asserit: non omnia Bayrovia virus redolent, graveolentia enim omnibus haud æquè magna est: semen tamen non exquisitè quadrangulum, planâ tamen oblongâque figurâ, magnitudine item & colore satis Securidacæ refert. Voces μάρκας & πάλαιος omittæ quid Matthiolo conferre poterunt: folia hederacea sapienter longâ, veluti Periclymeni & aliorum: & tenuis radiculæ frequenter multiplices.

Ger. Asclepias flore albo. Cam. h. Asclepias vulg. Asclepias flore albo: flore candido, Hort. Lus. C. B. A. Asclepias flore albo: Eiel. apud Matth. Asclepias, Apocyno cognata herba. Dod. purg. & hist. Ger. & C. Bauh. Hederalis Ruellij, securi nimis. Hirundinaria, Brunf. Trag. Gesf. h. & Lon. Asclepias vulg., Apocynum Dioscoridis, Col.

Asclepias floribus albicanibus, Vincetoxicum dicitur ab Officinis; Hirundinaria ab Herbariis; Ger. in Schwalbenwurz: Belg. Swaalse wortel: D. myre venin gall. Fuchf. Victrix toxic. It. Asclepiado & Vincetoxico: Ang. Swallow wort & white Swallow wort: aut Swallow wort: Bohem. Laskowic. Hung. Fekete szi. Hirundinis herba. Asclepias autem nominata est ab Asclepio, qui Asclepiadis Græcis dicitur, antiquo Medicinæ autore, juxta illud: Inventum Medicina mæum est, opifexque per orbem Dico. & herbarum subiecta potentia mihi est.

Hirundinariæ nomen haud dubiè sortita est, quod acutæ & apertæ ejus filiquæ cum candida lanugine volanti hirundini seculi similes sint. Licet hæc ipsa Hirundinariæ appellatio, ad Chelidonium & Nummulariam quoque sit referenda, sed diverso respectu. Vincetoxicum, vel redidit, quod illi Vincetoxici insignis adversus venena visus sit.

Nascitur in altis, arenosis que montibus & sylvis, in nonnullis etiam rupibus, in primis verò incultis ac desertis locis, Hircinia Sylva ad Mosellam & in Valsgovia. In sylva ydar ut ante dictum reperitur no. libras ponderans, autore Trago. Copiosissime nasci scribit Fuchf. in monte haud procul à Tübinga sito, in quo olim atr. posita fuisse fertur, Augusto mense florens. Ego Asclepiadem Basileæ vidi florentem mense Ianio & Augusto in monte propè Leurach, cum seminibus in longis filiquis maturis: Montepelji & Lugduni florentem Maio & Junio: radix raro hieme moritur.

Eadem planè ex sententia Tragi facultates Hirundinaria obtinet, quas Aristolochia longa. Radix illius utilissima est evocandis mensibus mulierum.

Potest verò intro sumi & foris quoque: tutò adhiberi. Radices Asclepiadis in vino decoctæ & potæ subveniunt torminibus. Atcet & hæc potio venenum nec cor petat, in iis præcipue qui rabiosi canis, aliorumque venenatorum animalium morfu infestati fuerint. Hæc radix pondere semilibræ per noctem in vino macerata, & deinde usque ad tertias decocta, manè jejuno stomacho calida pota, sudore interim provocato, minuscè expellit aquam inter cutem, ad eam ut illa per pedum plantas erumpat: estque hoc singulare experimentum. Mulieribus ad mensium provocationem magna efficacia in desossionibus semper usurpata: matricis dolores juvat. Herba cum floribus tusa, mammariis tumentibus cataplasmatibus instar imposita, tumorem deprimit. Pulvis ex herba & radice sordidis ac putridis ulceribus medetur non secus atque Aristolochia: potèstque hæc illius loco usurpari & illa vices hujus obire, si alterutra desit. Radix pota ab iis, quorum in corporibus sanguis ex casu coagulatus est, eum educere totum per urinas creditur. Matthiolum Asclepiadem moderatè calidam & siccam dicit. Marantha tormini succurrere volens, ejus radicibus utitur: folia verò adversus vulvæ, mammarumque ulcera, quæ cacothæ vocantur, illinit: floris & seminis nullum esse usum tradit. Apud Fuchsum tamen contrarium scribitur, scilicet flores & folia siccata, innox trita vulneribus utiliter inpergi: sordida etiam ulcera purgare & ad cicatricem perducere, genitaliumque vitiiis, & rupturis egregiè mederi. Peste laborantibus hujus radicem in vino decoctam potamque commendat Tabernomontanus. Idem ex radice & herba recenti aquam distillat, ac cum syrupo de quin-

que radicibus calculosis propinat; cum (yr. verò de Artemisia retentis menstruis laborantibus. Tandem etiam ex radice & herba succum exprimit in eodem usus.

ASCLEPIAS FLORE NIGRO quorundam.

Diser.



Asclepiadis faciunt speciem alteram, eam quæ folio Asclepiadis visitur, nigriore, caulibus non suâ vixis, sed radicæ adminiculo, cui se Periplocæ alicujus instar circumvolvunt, in altum conscendentibus ad duos, aut tres cubitos, in multas alas divisissimis floribus multis ex aduersorum foliorum alis erumpentibus, Asclepiadis formâ, sed colore atris, atrove-rubentibus, umbilico viridante; quos cornicula excipiunt Asclepiadis, cui & radix similis.

Apocynum
Dign.
Querc.
Lob. not.

Dalechampsius atque Lobelius, ut Columna, qui Apocynon Dioscoridis esse contendit, nullo facultatis facto periculo, quia planta hæc similis erat Asclepiadi, nisi quod succum luteum, & flores haberet fuscis, Asclepiadem esse scripserunt. Cur potius, cum similis sit etiam facie Apocyni aliis, & forsitan eadem cum Apocyno non repente, floribus tantum colore diversis, habeatque luteum succum, non Apocynum est denominanda? Infelix quidem est hominum natura, alienis erroribus supposita, quibus vitam cum morte commutari accedit. Hujus quidem forma hæc est. Radice nititur fibrosa Asclepiadi non dissimili, viticulis flexilibus, lævibus, longis, quolibet fulcia, aut alia ipsi propinqua scandit non minus quam alterum Apocynum, quatuor cubita vel magis longitudine æquans extenditur, folia habet hederacea, mollia, viridia, lævia, Asclepiadi similia, nonnihil in summo acuminata: flores Apocyno repenti vulgari similes, sed colore pulchro, parum in purpureum vergente, quamobrem nigrum florem habere dicitur. Siliquas & semina papposa uti aliud vulgare Apocynum, compressa & nigra Augusto mense perficit. Succo turget luteo, ingrato, uti tota planta. Hanc nasci in collibus Montipeliensis agri Frortignanæ vicinis, tradit Lobelius sub nigra Asclepiadis nomine, quod an rectè impostum sit jam demonstravi.

Diser. Co.
Linnæ.

Siliqua
femina.

Asclepias
nigra.

Vincetox.
nigra
Hirund.
nigra.

Tacit.
tempus.
Vires.

Iug. Asclepias nigra Dalechampi. Cam. h. Asclepias flore nigro, subrubescens, puillo; siliquâ tamen satis longâ, & priore Asclepiade grandiore: Herba anadendras. Eid. ep. Vincetoxicum flore nigro: Item ad Matth. germ. Hirundinaria, vel Asclepias nigro flore. Tab. Asclepias 3. flore nigro.

Ger. Clus. hist. & Hor. lus. Asclepias fl. nigro. Asclepias altera nigro flore, C.B. & Lob. Obs. & ic. cui & Periploca minor. Vincetoxici altera species, Dod.

Est mihi radice perpetua in horto ex semine sato: floret Iulio; Augusto siliquas fert.

Inter plantas, quæ à vi, vel effectu nomen accepisse creditur, Columna & hanc connumerat, ideoque Apocynum Diosc. facit, huic illius vires attribuens, non sine errore, me quidem iudice.

ASCLEPIAS CRETICA CLVSIL

Multis ab eadem radice virgis assurgit, lentis, flexilibus, gracilibus & viridibus, quas alterna ambiunt folia, vulgari Asclepiadis folijs non dissimilia, bina ut plurimum, contrariis inter se pediculis nascentia, dilutiùs virentia: inter quæ terni aut quaterni prodeunt flosculi breuibus petiolis nitentes, quinque pallidis foliolis constantes, quibus succedunt interdum singulares, nonnunquam geminæ siliquæ, breviores quàm in vulgari, sed crassiores, statz, bifido mucrone, continentes semen planum suâ lanugine involutum, perinde atque vulgari. Tota planta gravis est odoris buxum referentis.

Asclepiadem Creticam vocat Clus. hist. app. Asclepiadem 3. siliquâ bifido mucrone, C. Bauh. pin.

Eam mulcis perniciosa esse deprehendebat autor, quandoquidem illas floribus insidentes, enecatas reperiebat.

ASCLEPIAS INDICA.



Asclepias hæc Indica, qualem hic depingi curavimus, pro Asclepiade Virginiana sive Vincetoxico Indiano, VV. fauck, à Gerardo Anglo lib. 2. c. 320. p. 752. primum effigie expressa fuit & descripta. Quod autem doleo, ejus historiam ex Gerardo adscribere non licuit, quod præfatus autor, quæ fratri C. Bauhino mutuo communicaui, ad præsentem horam nodum mihi redditus sit, sed

licentiosè nimis suppressus, dissimulatque. Est B. pin. Asclepias 4. ex Virginea.

FRUCTVS APOCYNI, SIVE generis alicujus Asclepiadis.

Fructum tertium, Batavorum mercatorum Amstelredamensium navigatione ex Iava anno 1597. relatum, Apocyni, sive generis alicujus Asclepiadis fructum esse sibi persuadebat Clusius exot. l. 2. c. 15. Nam illorum siliquis per omnia similis erat, atque internè continebat plana, nigra semina, candidâ lanugine involuta, perinde ac illarum siliquarum; membrana tamen quâ semen includebatur, longè densior & durior erat, ut magnâ ex parte, eorum fructum, qui illâ navigatione relati, cornices esse solebant.

C.B. pin. Asclepias 4. sive Fructus Asclepiadis siliquæ similis, seminibus planis nigris: Fructus 3. è navigatione Batav. Clus. exot. l. 2. c. 15.

NERIVM SIVE RHODODEN. dron flore rubro & albo. C. A. P. XIX.

Nerion arborea est planta, caudice recto, rectis, & firmis ramis brachiata, croceis seu ex viridi;



tidi palleſcentibus: in quibus folia multa, acuta, longa, unciam circiter lata, ut plurimum terna ſimul orientia, interdum bina, ubi rami dividuntur, tranſverſū ſerē digittum invicem diſſita, rigida, dura, craſſa, ſuperiore parte atrovirentia ut Lauri folia; infernē magis, propter aſperſas hinc inde maculas, albi- da, exſucca; ſupre- micam in ſurculos al- quot divarican- tur, quibus inſidēt flores multi ſimul

frondis honore, Roſe ſimilitudine, caulibus fruti- coſum: qui locus falſi ſuſpectus eſt. Sunt qui legant Sabinē, hoc eſt lingua Sabinorum, quibus non ac- cedit Hermolaus, huncque ejus loci ſenſum eſſe ait, Rhododendron Sabinam herbam dici, cū tamen in Sabinis primum orta non videatur, ex ipſo no- mine quod Græcū eſt: Sciendum enim aliud fre- ticiſ genus Sabinam vocari, Græcē brathy. Planta verō eſt Lauri facie, non iniucunda ſpectatu, præ- fertim ſuis floribus ornata, quorum ſimilitudine deceptus quondam L. Apuleius in Aſinum muta- tus, dum Roſas quæreret, quarum paſtu in priſti- nam formam reſtitueretur, parum abſuit, quin im- prudens eos devoraret. Verū n. qui in plantarum Hiſtoria, & viribus cognoscendis diligentiſſimus fuerat, recordatus Nerij flores aſinis venenum eſſe præſentaneum, ſtatim labra ſubſtraxit, demiffiſque auribus abiit. Idem Lucianus ſibi in aſinum quoque transformato narrat accidiſſe. Sed Nerium ſilveſtre, id eſt Lauri ſilveſtre n. vocat, pernicioſum aſino & equo cibum, cū aſſerant id comedentes eveſtigio mori.

Matth. (cui in priorib. comm. ſilique malē piſcæ Matth. icon ſunt, tanquam fortē ab eo nondum videri) Ca. n. ep. & h. i. r. inque h. & Lugd. Nerion ſive Rhododaphne, ſive Rhododendron, Oleandrum vulgi, flore rube- ſcente & albo. Matth. It. cum mag. fig. Turn. (qui duas habet figuras fruſtra meo iudicio) Fuch. & Ang. cui & Oleander in Candia, Oleandro & Neandro Italorum quorundam, flore albo & rubro, ſive ro- ſeo. Lon. (qui figuram malam exhibet: ſilique e- nim deorſum nutant) Nerion, Rhododaphne, Lau- rus roſea. Trag. cujus figuræ non benē appiæta ſi- que deorſum pendentes. uti etiam quondam in Fuchſiana) Nerion, qui idem Nerin Nicandro vocari ait. Lob. Adv. Nerion, Oleander, Laurus roſea, & Rhododendrum purpureum & album: Eid. Obſ. Nerion; Item, Nerion albis floribus: Ic. Oleander, Laurus roſea: Et, Nerion floribus albis. Tab. hiſt. Nerion (Rhododendron addit in Icon.) Item Nerion floribus albis. Ego cū nullum diſcri- men noverim præter colorem, fruſtra ab his duas fi- guras poni exiſtimo. Gefn. coll. Rhododaphne vera.

B. pin. Nerion 1. floribus rubeſcentibus: Nerion, Trag. Cord. in Dioſc. Lob. Tab. flore rubro, Eyſt. Nerium, Matth. Fuchſ. Dod. gall. Gefn. h. Lac. Lon. Caſt. Lugd. Rhododendron, Bellon. Gefn. h. Dod. Rhododaphne, Gefn. h. Caſt. Eid. B. Nerion 2. flori- bus albis: Nerion candidis floribus in montis Idæ convallibus Bellon. Nerium ſive Rhododendron flore albo, Eyſt.


Nerion, ſi p. d. d. qm, n. i. d. d. d. es, Græcis dicitur: La- tinis pariter Nerium, Rhododaphne, & Rhodo- dendrum; Offic. & Barbaris Oleader, Ger. Olander, Vnholdenfraut, Roſenblümlein & Lorberroſen: Belg. Oleanderboom: Gall. Oeandre, Roſage, ou R. ſa- gine: It. Roſa Lauro & Oleandro: Hiſp. Adelfa, ſive Eluen- dro: Ang. Olander: poteſt etiam vocari (inquit Tur.) Roſe trec, aut Baye Roſe trec. Aſt Nymphæ fortasſis Nerij cym- Nereides nomen dederunt, apertiūſ alij Rhodo- dendrum, quaſi Arborem Roſam; vel Rhododa- phnen, i. e. Lauream Roſam, vocitarunt. Rhododa- phnem (inquit Fuchſ.) Græci dixerunt à Roſæ flori- bus & Lauri foliis, quæ fruticiſ huius præcipue ſunt notæ. Nec reſert quod Dioſcorides Amygdalæ foliis ejus folia comparaverit: Lauro enim & Amygdalæ non diſſimilis magnoperè ſoliorum figura eſt. Fecit idem Roſæ flos & arbor, ut eadem gens Rhodo- dendrum nominaverit.

Nasci in hortis arborum & mariti- mis locis, & juxta flumina, author eſt Dioſcorides: ſcatere Nerio ſilvas in Ponto, quod propagine & ſemine ſeritur, prodidit Plinius. Vidit primum Mat- thiolus

juncti, odori, pulcherrimē rubentes, quali ſerē co- lore Roſæ incarnatæ: conſpiciuntur, aut albi, divi- ſurā quinquepartitā Clematidis daphnoidis: ſingu- liſque diviſionis partibus internē adnata quædam triſulca appendix, in medio apices quinque ſimul juncti albi, piloſi: floris verō longi veluti calycis imum extrinſecus obvallant foliola intenſe ruben- tia; ſilique marcidis floribus ſuccedunt, quales Apoc- cyni vel Aſclepiadis ſurſum ſpectantes, contrario ſcilicet ſitu ei quem Lon. & Tragi figura demon- ſtrat, pappoſo ſemine plenæ.

Nerion quibusdam apud Dioſc. Rhododaphne, aliis Rhododendron vocatum, frutex eſt notitiæ vulgaris, folia longiora [μακρότερα] craſſioraque [χρυσώτερα] habens, quā Amygdalus. Lacuna lectio non placet cum legitur, folia Amygdalo longiora vidi, ſed non latiora: præſtat igitur legere, μακρότερα, ut habent alia exempl.] florem ad Roſæ ſimilitudinem conformatum: fructum [καρπύον] Miror Dioſc. dicere καρπύον ὅτι κατὰ φύσιν ἀνυπόδηλον, in quo enim conſiſtat, ſimilitu- do nondum mihi conſtat, & non ſilique am, ut Sarrac.] ſi- milem Amygdalæ, velut cornu [ὡς κέρατον] ὅτι κατὰ φύσιν leg- git Corn. ſeu potius ὡς κέρατον] & poſt aperturam ple- num lanosā naturā, ſimili pappi Acanthinis [ἀκανθίνου] ſi- mus juxta vetuſti codicis ſidem legit Corn. Siquidem quod intra Nerij ſiliquam continetur ſemen, lanosū ſi- ſtens albidum eſt implicatum, quales & ſi ſunt pappi, qui in Acan- thio videntur. præſtat ergo hæc lectio, improbat ſicque vul- garis, quæ dicitur Nerion habet] Radicem acuminatam, lon- gam, lignoſam, atque guſtanti ſalſuginoſam. Hæc Dioſcorides in interprete meliori vetere codice. Re- ctē verō fructum intus lanā quādam referum di- xit, ſpinarum ſeu Carduorum pappi ſimili, quæ in quibusdam Dioſcoridis exemplaribus falſo dicitur Si- mons m. m. m. ſimilis eſſe legitur, cum Hyacinthus nul- los proſus pappos habeat. Quare legendum dicitur. Simonis m. m. m. id eſt ſpinarum, ſeu Carduorum pap- pis, ut meliores codices, & ipſa experientia teſtan- tur. Similitudo fructūs Nerij cum Amygdalo intel- ligenda proſus eſt, vel adhuc exiguā ſiliquā, & ado- leſcente, vel ob corticis viriditatem, & craſſitiem, alioquin haud rectē adulta ſiliqua, anguſta, oblon- ga, nullo ſubiecto duro & lignoſo nucleo, lanugi- noſis tantū villis ſarctā cum Amygdalo com- paratur.

Rhododendros, inquit Plin. l. 24. c. 11. quia ne no- men quidem apud nos latum invenit, Rhododa- phnen vocant, aut Nerium. Idem l. 16. cap. 20. ait, Et quamvis herba dicatur Sabinā, Rhododendron, ut nomine appareat, à Græcis venit. Alij Ne- rion vocarunt, alij Rhododaphnen, ſempiterno



dus, illâ navigatione, ut dixi adeductus, baka
 appellari aiebat, atque, dum recens est, edulem esse
 affirmabat. C.B.pin. Nerion 4. sive Fructus Ne-
 riij filiquæ figurâ.

VITIS ALBA SIVE BRYONIA.
CAP. XX.



tibus undulata ut in Cretica quam vocant recentiores; ex foliorum alijs flores simul aliquot juncti, è quinque foliis compoſiti exeunt, colore albido in herbaceum langente, quibus ſuccedunt acini ſambucini pares, per maturitatem rubri, ſucco croceo, naſeoſo, granuliſque turgentes.

Vitis calva
Diof.

Vulgariter porrò Bryonia esse veram Diofcoridis Vitem aliam patet ex multis notis, quas ei Diofcorides assignat, tam aptè coherentibus, ut qui per campos spatiaretur, illam primo occurfu facile cognosceret. immò & Diofcoridi gratiam habere deberet, quippe qui effodiendæ radicis tam vastæ laborem nobis eniperuit. nam qui cognoscere solum hanc plantam affectat, ut cùm opus sit, usui adaptet, satis superque esse possint notæ à foliis, à viticulis, à pampinis, à fructibus, à nascendi, & crescendo modo, alijs; quibdam: qui verò ad medendum eam accipere intendat, poterit radicem (si hac uti volet) effodere. nam multis pollare remedijs hanc, vel ipsæ Diofcorides docet. Quia autem eos qui vulgarem

Bryonia non esse veram *Dioscoridis* Vitem al-
bam arguuntur ex hoc, quod notatu dignam
notam non apposuerit, nempe radicem; quam ob
nimiam magnitudinem non reliquisset, si vera esset;
stultum esse dicit *Marantha*, placet veterum de *Bryo-
nia* huc subscribere historiam, quo veritas magis
elucescat.

Hippocrates passim, præsertim m. in voce *πικρὸν ἐστὶν ἐν ἔργῳ* utitur, quam Galin exegit apud eundem *ἡσπ.*
 Bryonium albam [*πικρὸν ἀλβὸν εὐνοῖον*] exponit, &
 rectè meo iudicio, sed ἐν ἑλκασσὶ quidam vitiosè le-
 gunt. Vitis albæ [*λευκὰ καὶ λευκὴ*] quam aliqui *αἰνῶν*, *ἴρις* alb.,
Diocle
γιν, alij *ὀφιοειδὲς φύλον*, alij *χελιδονίαν*, alij *μήλαθρον*, alij *ψι-
 λλῶν*, alij *ἀσπλάγιν*, *σάροντι*, *αὐτοῦσάντι*, referente
 Diofcoride, nominarunt, (armenta, folia, & tortiles
 papnini [*πικρὰ καὶ ἡσπῶντα, ἐν πικρὰ καὶ ἡσπῶντα* (*forte ài Sarrac.*)
ἐλκιστὶ) fative vii similia sunt, fed omnia hirsutiora.
 Vicinis verò fruticibus implicat sese, illos suis clavi-
 culis amplectens: fructum autem habet racemofum,
 fulvum [*rubente m. cas.*] quo quidem coria depilantur.
 Quod autem Diocle. in hac sua descriptione, ra-
*Diocle. lectio
 dubia.*
 dicis, ut aliàs facere solet, & paulò post in Vite nigra
 facit, non meminerit, fupulcatat Cornarius radicis
 vocem in Diocle. elapsam esse, & quidem ante verba
πικρὸν ἐστὶν ἐν ἔργῳ, ut et radicæ excentes asparagus
 accipiamus. Notandum porò, nomina supra dicta *ἡσπῶν* mul-
torum.
 in Diofcor. lectione retinere quosdam, ut Hermol.
 Corn. Sarrac. & alios: quosdam verò rejicere, ut
 Ruellium, Cefalpinum, & nonnullos alios. Non au-
 tem esse rejicienda patet ex Theophrasto, qui inter
 suffutices Bryonium hanc Melothrum vocat, ei fru-
 ctum Similac similem assignans.

Plinius quoque de Vite alba scribens, ait à Græcis *ἡλία de Pila*
 Ampeleucen, ab aliis *Ῥοφιοφάστυλον*, alio *Μελοῖς alba*,
 θρόλι, alii *Πιλοθρῦλον*, alii *Αρχεζοφῦλον*, alii *Κεδρο-*
στῖν, alii *Μαδον* appellari; hujus farmenta longis &
 exilibus internodiis geniculata scandere; folia pampino-
 sa ad magnitudinem Ederæ, dividi ut Vitis, ut
 radicem albam, grandem, Raphano similem initiò; *Ῥαδίον*
 ex ea caulibus *Ἀπαραγῖ* similitudine exire; semen in
 una raris acinis pendere succo rubente, postea
 Croci *Ῥαδίον legit exemplar Cornary* Novissid, qui
 coria perscrutant, inquit enim ut eos.

Apuleius cap. 64. non contentus recitatis nominibus, plura adscribit: Græci, inquit, Bryonia, Chelidonium, & Melothron, & Archezostin sive Apiastellum, Itali Vvam taminiam, Vitem albam, Agrifolium, Dentariam; Ægyptij Thidona, Dardiadania, Syri Iugadeffi, Dinuplia: Daci Diclea appellavere. Herba virgultus atque foliis & corymbis ut vinifera Vitis, sed omnibus hirtis, quæ se colligat vicinis fruticibus, fructu viri femine botruoso, longo, raro, fulvo, quo etiam tergora depilantur, tyrsos emittens primâ informatione est radice quæ sunt alparagis similes. Humelbergio Bryonia hæc est quæ alio nomine Ampeloleuce, i. e. Viuis alba vocatur. Viuis alba. Teutonice Schmerwitz. Est autem græca appellatio Bryonia, sic dicta, à verbo βρωω quod est extol-
Bryonia unde dicta.
Chelidonium.
Melothron.
lo & exalto, eo quod in propinquos frutices scandens se extollat. Chelidonium dictum videtur à similitudine quadam foliorum quæ similiter quadantenus incurvis dividuntur. Melothron appellari videtur à coriorum concinnatione. Nam Græci μελοθρον vocant ἐχιδναται καὶ κελιδνοσματα i. e. colorum infectiones & concinnationes: quod coriis fortè ex Bryonia alba fructu accedebat. Archezostin dicitur Archæzostin. quasi princeps cingulum: Ζωστής enim græcè, latine cingulum est, ἀρχὴ princeps. Sic appellatum quod inter alia principaliter propinquos frutices cingat, & implorandum comprehendat. Apiastellum inter græcas appellationes ab Apuleio enumeratum, nominis sui (modo non sit corrupta dictio, quod ambigimus, nam latinam potius, quàm græcam for-

Verum duarum drachmarum pondere pota, com-
moris à vipera auxiliatur, & fortis enecat. Ali-
quando vero mentem turbat aliquantulum. Et urina-
nas movet pota. Apposita verò utero, fetus & se-
cundas trahit. Sed & elegia ex ipsa cum melle da-
tur his qui suffocantur, difficulter spirantibus, tus-
sientibus, latus dolentibus, ruptis & vulsis. Splen-
nem liquat trium obolorum pondere, cum aceto ad
dies 30. pota. Imponitur etiam commodè cum fico
ad eadem. Decoquitur ad infessum, ut quæ uterum
purgat, & abortum procurat. Succus è radice collig-
itur Vere. Bibitur hic cum aqua mulsâ ad eadem,
ducens & pituitam. Fructus facit ad scabiem & as-
pram, tum illitus, tum impositus. Attrahit lac suc-
cus ipsius fructus [καυλὸς veteris codex, Lac.] cum triti-
co cocto absorptus. Hæc Dioscorides. Ex quibus il-
lud quod scribit attrahere lac, intelligimus purgan-
do, sive retrahendo à mammillis, non autem abun-
dantiam lactis facere ut Plinius tradit. Qui enim fa-
ceret lac virofa & maligna hæc planta, nisi per acci-
dens repurgando malè affectas morbidasve nutri-
ces? Asparagorum Bryoniæ usum contra Diosc. Pli-
nium & Galenum in cibis non probamus nisi afflu-
mantur loco medicamenti & ad evacuationem alvi,
quæ fortè moderatior si subsequatur, nõ propterea
dixerimus cū Galeno fecidam hanc plantâ edulium
stomacho acceptum: quod etiam non placuit Do-
donzo, ut postea dicitur. Cæterum, Plinij verba
hæc sunt. Caules Asparagi similitudine decocti in
cibo alvi & urinam cient. Folia & caules exulce-
rant corpus, utique ulcerum phagedænis & gangre-
nis, tibiârûmque tædio cum sale illinuntur. Novère
seminis succum qui coria perficiunt, illo enim u-
tuntur. Psoris & lepris illinuntur. Lactis abundan-
tiam facit coctum cum tritico, potumque. Radix nu-
merosis utilitatibus nobilis, contra serpentium ictus
tritâ drachmis duabus bibitur. Vitia cutis in facie
varioque & lentigines, & fugillata emendat & cicat-
rizes. Eadèmq; præstat decocta in oleo. Decocta
datur [præstat in oleo decocta: Datur & Corn.] & comiti-
alibus potus: item mente commotis, & vertigine
laborantibus drachmæ pondere quotidie anno to-
to. Et ipsa autem largior aliquanto sensus purgat
[turbat censet legendum Corn. ut habet Diosc.] Illa vis
præclara, quod olâ infracta extrahit in aqua imposi-
ta. Herba Brionia, inquit Apuleius, in cibo data
lienosis, per urinam lienem digerit & emendat.
Hæc herba tam laudabilis est, ut in thieraces etiam
compositiones mittatur. Item si in capite, vel in cin-
ctu eam tecum portaveris, nulla mala te cõtingent.
Ampeliceus, autore Galeno 6. simpl. prima qui-
dem germina ab omnibus pro more edi Vere so-
lent, utpote edulium stomacho, propter adstrictio-
nem acceptum: sed & subamara sunt & modicè a-
crem adstrictioem possident: quare & urinam mo-
dicè cient. At radix & abstergentem & desiccantem
vim habet, & moderatè [ὀσμὴν ὅτι ubique legitur, sed
necesse sit dicitur] calidam: quamobrem & lienis
induratos liquat tum epota, tum foris cum ficibus
imposita: & psoram & lepram sanat. Porrò fructus
ejus tacemî speciem præ se ferens, iis qui coria de-
plant, est utilis. Scribit Dod. facultate Bryoniam
albam omnibus suis partibus calidam & siccam esse
terium præsertim caloris gradum excedentem, cum
expurgandi vi potentissima, per quam non modo
biliosos ac pituitosos, sed & aquosos humores edu-
cat. Galenum notat in eo quodd ab omnibus pro mo-
re per Ver edi, eduliumq; esse stomacho propter ad-
strictioem gratum dicat: de Vitis silvestris sive Ta-
mi asparagis, sed nequaquam de hujus Bryoniæ ger-
minibus veritatem habere asserit: albæ enim Bryo-
niæ asparagis, sive prima germina nequaquam ad-
stringere, sed alvum vehementius commovere, sto-
Tom. II.

machoque gravem molestiam inferre: Dioscoridè
quoque scribentem cortigit, radici succum Vere ex-
primi. bibique cum aqua mulsâ, pituitâque ducere: du-
cere autem addit, non modo succum, sed & radicis
decoctû, pituitam, bilem flavam, ac serofos aquosol-
que humores, & quidem validissimè, unaque ven-
triculum ita sæpenuero perturbare, ut & eisdem
vomitione reddi procurat, conferte ejusmodi vehe-
mentem purgationem hydropicis posse, & quos
comitialis morbus, aut capitis diuturnæ & pertinac-
es vertigines detinent: sed tamen epilepticis non
quotidie, ut Dioscorides monet, exhibendas: subin-
de etenim dedisse satis fore molestum: validû enim
esse remedium, violenter purgans, & naturæ vim in-
ferens. Plinium denique taxat, qui lactis abundan-
tiam facere scribit: videri enim magis lactis genera-
tioni adversari, quodd acris sit, & eo vellerâ ac coria-
teste Diosc. depilentur. Præter quæ omnia hæc ad-
dit Mesues: Ex succo Bryoniæ, melle & vino ana, fit
potio ad strumas experta, & emplastrum ex ipsius
radice & melle, eadèdem delet. Ex Bryonia medica-
mentum à Democrito compositum apertè efficac
ad epilepsiam, paraly sin, vertiginem, & cæteros affe-
ctus frigidos cerebri, spinalis medullæ, & ortorum
inde utrinque nervorum, accipit radicis Bryoniæ
mundatæ & tritæ lb. s. sapæ uvarum passarum lb. iij.
squillæ assatæ, strobilorum purgatorum añ. j. b.
nucis moschatæ, Cardamomi, Macis, Zingiberis añ.
j. ij. Caryophyllorum, Piperis longi, Stoechados
añ. j. s. Seseleos, Salis gemmæ, Galliæ añ. j. spicæ
j. s. Agarici j. ij. Datur post sex menses à j. ij. ad j. v.
Idem accipit succi Bryoniæ j. v. Aceti scillini lb. j. a-
quæ coctionis Origani, Hyssopi sicci, Lybistici, Sese-
lios, Cardamomi, Stoechados añ. j. j. Sapæ uvarum
passarum lb. s. Mellis lb. ij. facitque syrupum idem
pollentem, quod prior compositio, si detur uncis
duabus. Ex succo ejusdem & sapæ uvarum passarum
eclegma ad tussim & asthma efficac filius Zezar cõ-
ponit. datur autem radix Bryoniæ ab ære uno ad
aureos duos: succus autem à j. ad j. ij. Quendam
epilepsiâ curatum esse tribus septimanis, solummo-
do purgando se succo Bryoniæ depurato, addito
paucis saccharo legitur apud Arnold. de Villanova.
Magni sit à quibusdam radix ad arthridem, quam
sectam macerant in aqua Vitæ deinde distillant, lin-
tea madafacta in aqua calida imponunt parti dolen-
ti. Bayrus, radicè terit, & circa collum ligat, ac sic epi-
lepsiâ tollit, & spasmû sanat. Idem fructu fricato pi-
los removet. Neutram Bryoniam esse in usu ad pur-
gandum asserit Fallopius, sed solum cum leniendâ
alvus sit, inunctionem ex oleo radicis Bryoniæ co-
venire. Sed q̃ vera scribat, patet ex hæcenus dictis.
Ei præterea refragatur Mesues, qui Vitum albâ inter
sua medicamenta dejectoria profuit, & de ea hæc
ad solum scripsit. Vitis silvestris, quodd hausta, quem-
admodum & Dracunculus vetriculo, & jecinori no-
xam inferat, danda non est, nisi aromatum pulvere
permista, aut addito mastiche, Cydoniis malis, aut
aliis adstringentibus, roborantibusq; medicamentis.
Succus è contrita radice expressus pituitâ ejicit, uri-
nâ remorantè trahit, & cerebrû mundat, quin etiam
pectus, & nervos à pituitosis, putridisq; acremetis gar-
liberat, viscerû obstructions aperit, renes à calculis
expedit subvenit itè vertiginosis, comitialibusque.
Præstat opem mitificè tussientibus: & induratos tu-
mores resolvit, præsertim lienis, si cum vino & ficu-
bus tusa radix illinatur. Mēstrua elicit, & universum
purgat uterum, atq; etiam fetum expellit, si in ejus
decocto insideant fœminæ. Succus fabarum, aut ci-
cerum fatinâ exceptus, maculas in facie, & vulne-
rum cicatrices emendat, linimenti modo adhibitus.
Oleum excavatis ejus radicibus immisissum, cineris-
busque incoctum, fugillata delet. Præterea mulieres

Radix pur-
gat.Ventriculo
salde ro-
cna.

Hydropi.

Diosc. mon.

Plin. reproba

Lactis ge-
nerationi
contraria.

Syrupum.

Affectus
cerebri frigi-

dis.

Asthma.

Dosis Bryo-
niæ Mes.

Epilepsia

cura.

Arthrit.

Amuletum

Pils.

Fallopius

refutatur à

Mesue.

Noxa cor-
rectio.Succus ra-
dici pur-
pectus, &

Calculus

venum.

Tussis.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Purgat.

Vteri strangu-
luntus.

vulvæ strangulationibus obnoxias mirum in modum juvat, aded ut eas à strangulatu liberet, & sanet. Equidem novi (inquit Matth.) mulierem quotidie ferè per plures annos hoc morbo vexatam, quæ tandem à quodam vulgari herbario edocta, ut vinum album biberet, in quo Vitis albæ radicis uncia effruiisset dormitum itura semel in hebdomada, cum hac medicinâ per annum usâ fuisset, optimè ex illo morbo convaluit. Cæterum non placet ad dyfenteriam decoctum Bryoniæ, cuiusdam Empirici, cum Thymbra aromatica potum. Mulcò minùs aridet phantasia Portæ phyt. L. 3. c. 17. dicentis, Bryonia ex pallido albescentes flores habens, pituitâ emendat: Item, radix ejusdem lactescens ostendit cauliculos cum tritico coctos, potòsque, lactis abundanter facere. Retulit Io. Stoffelius, radicem Bryoniæ

Succi coll-
gendis ratis.

siquis summâ tellure refecerit, partem verò reliquam terræ inhærentem excavaverit, amputatâque partem superiorem, tanquam operculum rursum imposuerit (cavendo ne quid pulveris sordiumque terrestrii in cavû incidat) postero die detegendo cavû illud succo quodam lacteo plenû, etiam ad tertium usque diem reperiit. Hujus succi cochlear unum propinatum, clementer per inferiora, scilicetque purgate quemlibet hominem. Agrytæ nonnulli mira quædam monstra ex hac radice effingunt, quæ cum aliquot dies sicca arenæ mandaverint, pro Mandragoris postea distrahunt; alij immaniter per illam homines purgant, Tragus.

Mandra-
gora adul-
terium.

BRYONIA ALBA MACVLATA.

Defcr.

E Semine misso à D. Jacobo Zvvingero pro Bryonia Cretica provenit mihi planta Montbelgardi in horto E.C. radice magnâ, albâ; viticulis, foliis (in quibus tamen sunt maculæ albæ) & floribus ac uvis similis vulgari jam descriptæ. De hac frater C. Bauh. Radice est longâ, altè descendente (amplâ, Rapæ modò, dixerat apud Matth.) sed ad vulgaris magnitudinem non accedente, fusco cortice testâ (quæ forinsecus cum vulgari convenit, verum intrinsecus candida, nec circularibus lineis prædita) ex qualonga & tenuia sarmenta prodeunt, quæ ambiunt folia aspera (qualis & tota planta) ad similitudinem Vitium, aut Bryoniæ vulgaris divisa, sed minora, viridia, albis striis per medium discurrentibus, vel maculis albis notata, quibus capreoli ut in Vite adduntur. Flores habet pallidos, quinquefolios, striatos, vulgaris Bryoniæ floribus majores, ex longis pediculis propendentes: cuilibet flori, fructus succedit semicircularis, supernè in partes duas divisus, viridis primùm, at per maturitatem ruber, (qui vulgaris fructui major est, aliquando unicus, aliquando plurimus, ex longo pediculo dependens, aiebat apud Matth.) semina duo continens, quare dicoccos appellari potest. Hæcille, cui dicitur in phyt. & apud Matth. Bryonia 3, sive maculata, à vulgari differens, quòd minor sit, & folia per medium albis striis notentur: In prod. Bryonia 1. In pin. 2 Cretica maculata: Bryonia dicoccos, frequenstissimè in Creta proviens, elegans, & ab aliis alibi natis differens: Bryonia Cretica, Pona Italico.

Sym.

VITIS SIVE BRYONIA NIGRIS baccis. C A P. XXI.

Defcr.

Quamvis videatur Bryonia nigris baccis posse paucis verbis tradi, nihilominus tamen cum liberit Cordo particulatim eam delineare, placet ejus diligentem descriptionem proponere. Bryonia quæ nigras fert baccas, ab una radice viticulas

emittit plures, tennes, longas, & angulosas, foliis asperis, lacris & formâ virgineis similibus vestitis. Secus quæ linguli, longi, intorquæ exeunt capreoli, arbutorum virgas, & sepium sarmenta apprehendentes, quòd facilis ipse viticulus, alioquin infirmæ, sepes scandant, quas ubi ascendunt in omnes partes reptantes se expandunt: flores à Veris exitu, usque post medium Ætatis fert parvos, foliaceos, colore pallidos, pauca intus stamina habentes, quibus singulæ succedunt bacca, seu acini, mediocri Piti quantitate, formâ rotundâ, colore primùm virides, in maturitate verò nigre, & in exiguos racemos congestæ, tactu molles, intusque lubrico & glutinoso succo plenæ, quibus quina senave semina continentur, cannabis colore & quantitate, sed modicè acuminata, in latitudinem compressa, & candidum nucleum intra se claudentia. Radice nititur perenni, secundum ætatem grandi carnosâque, longitudine plerumque cubitum excedente, crassitudine brachijs aut tibis, longo Rapo aut Raphano simili, capite apice multis ceu verrucis tuberoso, in profundo in duas vel tres partes distradâ, colore foris in candido cineracea, intus autem candida, aut Buxi modo pallida, quæ gustu amara & subacris est, cum altitudine non pauca & aliqua nauseosa qualitate abundat. Eadem lubrico & glutinoso succo & gravem odorem spirat, bacca sive acini, radicem qualitatibus emulantur, minùs tamen siccant. Colligitur primo Vere mox prodituris asparagis. Ex radice aqua, præfecto radicis capite, & excavata radice, quæ in cavum (singulis diebus matutino tempore colenda) confluit, ischiadis utilis. Nasctur in sepibus. Plurima in VVitenbergensi Suevia atque Rhena provincia, in Hessa, Saxonia, VVestphalia, Pomerania, Marchia, VVitenbergensi Electoratu & Misnia abundat. Lectores considerent an Cordi Bryonia hæc nigra quæ formâ foliorum non differt ab alba, eadem sit quæ veterum ut Diosc. Plinij & Galeni, quorum verba subijcimus.

Nigra Vitis, inquit Dioscorides, quam aliqui Bryoniam nigram, alij Chironiam Vitem nominant, folia fert Hederæ, ad Smilacis folia propius accedentia, sed majora; caules etiam huic similes; ac ipsa quoque vicinas arbores capreolis suis amplectitur, fructus racematim coheret, qui inter principia virescit, at post maturitatem nigricat; radix foris nigra, intus buxo colore. Hujus etiam cauliculi qui primò germinum partu erumpunt, oleum modo in cibos recipiuntur. Vinas potò cent, menses pellunt, alienem minuunt, nec non & comitialibus, vertiginosis, ac nervorum resolutione tentatis profunt. Radix ipsæ quibus albæ vitibus pollet, eademque præstat, sed inefficaciùs. Folia verò cum vino exulceratis jumentorum cervicibus efficaciter illinuntur; ac luxatis etiam similiter imponuntur. Nigram Vitem inter Dioscoridis notha alij Bucranium, Romanum Vvam taminiam, alij Batanutam, Batcondalij, alij Betifalcam, Daci Priadela, alij Peregrinam, Afri Lavothen vocant.

Bryonia nigra efficacior in eodem usu [cum alba, Bryonia nigra] tradente Plinio: Suppurationes incipientes discutit, veteres maturat & purgat. Ciet menses & uti-usus, nam. Ecligma ex ea fit suspensio, & contra lateris dolores, vulsus, ruptis. Splenem ternis obolis pota triginta diebus consumit. Illinitur eadem cum fico & pterygis digitorum. Ex vino secūdus spermatur apponitur. Trahit & pituitam, drachma pota in aqua mulla. Succus radicis colligi debet ante maturitatem seminis: qui illitus per se & cum eruo, lætore quodâ colore & cutis teneritate magonizat corpora: serpentes fugat. Tūditur radix cum pingui fico, erugat; corp' si statim nium, bina stadia ambulat: alijs unit, nisi frigida ablatur. Lucun.

Iucundius hoc idem præstat nigra Vitis: quoniam alba pruritum affert. Et ergo & nigra, quam propriè Bryoniam vocant, alij Chironiam, alij Cyneanthem, aut Aproniam, similem priori, præterquam colore. Hujus enim nigrum esse diximus. Asparagus ejus Dioles prætulit veris asparagis in cibo urinz ciendæ, lienique minuendo. In fructibus & harundinetis maximè nascitur. Radix foris nigra, intus buxæ colore ossa infracta vel efficacius extrahit, quàm suprà dicta. Cæterum eidem peculiare est, quod jumentorum cervicibus unicè medetur. Aiunt si quis villam eâ cinxerit, fugere accipitres, tutâque fieri villaticas alites. Eadem in jumento hominèque phlegmâ, aut sanguinem, qui se ad talos dejecerit, circumligata sanat.

Vitis nigra, quam Bryoniam propriè vocari scribit Galenus, supra dictæ ad omnia similis est, nisi quod imbecillior. Quod autem non ausimus asserere hanc Cordi Bryoniam nigram [δρυονίαν μέλαναν, quam in Diosc. in quibusdam similem statuit cum Vite alba] eandem esse cum Vite nigra Diosc. Plinii & Galeni, facit potissimum Dioscorides suâ diversâ descriptione in forma foliorum ab alba.

Bryoniam nigram inventu rariorem tradit Marcellus, idèoque cogniti difficiliorum: inventam tamen totam veterum scriptorum historiam confirmare. Sunt illi, inquit, per intervalla cum foliis dispositi racemi: & qui non ultra octo decemve acinos ostendunt: multo minore quàm in punice magnitudine, & colore ante & post maturitatem, quo ab hoc describuntur. Quos tamen Diosc. hic caules vocat: nos potius viticulas dixerimus: earum enim speciem magis, quàm caulium habent. Maturescunt acini ejus extrema æstate: & ubi minus calet: umbrosiusque locis Autumno. Nascitur & hæc, ut in alba diximus, in sepibus & inter fruteta propinquas stirpes ascendens & alligans. Minor hæc quàm alba est: nec tam latè ut illa viticulas suas spargit. Pares utriusque vires antiqui omnes esse tradiderunt idèoque sine discrimine uti ceu alterutram jusserunt. Licetque id in Paulo Aegineta cognoscere, qui contra nigras cicatrices putrique ope his verbis utitur: Nigras cicatrices delet Bryonia: radicis albæ & nigre in oleo decocta &c. De ejus appellationibus non est quod dicamus præter quam Chironiam vitem vocari potuisse: aut quod Chiron Medicinæ & herbarum in Thessalia peritissimus ulceribus jumentorum & hominum ex ea primus remedium inveniret: aut quod Chironis ulceribus eâ veteres mederentur. Quod autem in Dioscoride legitur Vviam taminiam dici à Romanis, falsum est. Alia enim à Bryonia taminia Vva est: quemadmodum Latini antiquiores omnes docuerunt.

Ampelon melaniam, aliquos Aproniam vocare autor est Hermolaus. Hanc etiam Tannum sive Tammum quosdam putare, & vulgò Tamarum. Esse qui Tannum quoque scribant, non Tannum, aut Tannum. Ruellius Vitem nigram vocat, recitans confusè Dioscoridis, Plinii & Hermolai verba, quem non nominat. Cæterum credidit Fuchsius eam stirpem esse legitimam Vitem nigram, quæ Hetrucrienibus vulgò Vitalba dicitur, ac à nobis Clematis latifolia inscribitur. Verùm hæc ejus opinio nobis cum Matthiolo, pace suâ, planè reprobanda videtur. Siquidem nostra Vitalba non habet radicem foris nigram, intus buxæ colore: non fert folia Hederae majora, sed potius minora, & per ambitum lacinia: nec semen edit in racemi modum, sed simul compactum, nullâ cum Vitis similitudine. Adde, quod eadem suâ facultate exulcerat. Vitis verò nigra exulceratis boum cervicibus medetur, & luxatis ob adstringentem vim, quam habet, utilissimè imponitur. Vitem nigram Dioscoridis, temerè nimis Matth. her-

Tom. II.

bariorum & officinarum Sigillum B. Mariæ nuncupat.

An Corn. in Diosc. Bryonia nigra, herbaris nota, fructus & radicis colore ab alba tantum differens? Matth. in Diosc. cum mag. fig. Bryonia fructu nigro, quem ait Dioscoridem non vidisse. Is autem Vitem nigram legitimam non exhibet, ut sequenti historia dicemus. Fallop. Bryoniam nigram ait Psilochron vocatam à Græcis, eò quod usus ipsius attenuet pilos. Cam. h. & Hort. Lusit. Bryonia baccis nigris. Lugd. Vitis nigra quoad descriptionem, non verò quoad iconem, quæ est Vitis nigra quorundam, de qua mox. Hanc eandem iconem eodem titulo retinet Lacuna, Cam. ep. & hist. Matth. germ. & Tab. Vitis nigra quoque dicitur Arnold. Gillen. Hort. Lus. & Rysio absque icone, qui Fuchsiū & alios falli scribit, qui nigram Vitem aliam esse plantam ab alba differentē arbitrentur, cum eadem sit & colore in radice, quæ huic nigra, alteri alba, & fructu tantum differant, quem alba Vitis rubrum, nigra verò nigrum proferat & in Notico agro copiosiss. cum alba proveniat, quamvis simul nascentes nusquam repererit. Dod. gall. Bryoniam nigram à nemine adhuc in Galliis cognitam esse testatur. In hist. eam paucis (ex Cordo nō fallor) describit. Bryonia nigre radix aliquando ad nostras manus venit, ait Calp. pinus, nautis eam pro victu circumferentibus: vocitant Panem Turcharum: est radix brachiali crassitudine amplior, sed brevis, carnosa, colore intus subrubente, ut divisa in taleolas, farciminis speciem gerat. hæc quamvis multò antè eruta, adventante Vere germinare capit. Quamprimum igitur eâ terræ mandavi, ut plantæ speciem addiscerem: protulit autem caulem circumvolvntem se adminiculis ad multam altitudinem, & folia Hederae mucronata, colore subrubente, vixit usque in Autumnum; frigore verò adventante penitus extincta est. ejus neque florem, neque fructum videre licuit.

Gerar. Bryonia nigra silv. qui malè malam habet iconem Tabern. Vitis nigra secundæ, quæ est Clematis latifolia, pro Bryonia nigra. C. B. phyt. mat. Bryonia 2. sive nigra, seu Vitis nigra Diosc. Apud Matth. Bryonia seu Vitis alba altera nigricantibus baccis, fructu nigro Matth. Eid. pin. Bryonia 2. alba baccis nigris: Vitis alba baccis nigris, Cast. Differt à vulgari radicibus, & baccarum colore; hujus radix interius buxæ colore pallet: illius ex albedo subul- tei coloris est: hujus baccæ maturæ nigricant, illius rubent. Siquidem autem hæc colorum differentia icone exprimi non possit, ejus picturam hæc studio omitimus.

Αμπι γ- μέλανη. Græcis, & Ψυχία, ut ab α, & ψυχή- Nomina
vitis δρυονίαν, Latinis Vitis nigra, & Bryonia nigra, & linguar.
Vitis Chironia nominatur; Arabib. Fesire sentanim,
Alfesiressim, sive Feserim: Ger. & Schwarz Eichenwurz;
It. Vite nera: Gall. Couleuree noire.

VITIS NIGRA QVIBVSDAM, sive Tannus Plinij, folio Cyclamini.

CAP. XXII.

Radix magna, crassa, tuberosa, rotunda ferè, so-
lis nigra, intus alba, profundè in terra demer-
sa, ut non nisi alissimè adactò ligone quis facillè
consequi possit, viridis à nobis gultata, saporem a-
crem linguæ imprimebat, non tamen ingratum, aut
amarum: siccata carduiusimâ substantiâ accedit
ad Dracunculi minoris radicem nullis circulis do-
nata quales apparent in Bryonia, quæ facillè in pol-
linem redigi potest, nec rara ut illa, sed compacta, in
eo accedens ad Mechoacan, ab ea etiam diversâ cir-
culus, sapore quoque est non ingrato, cum aliqua

N 2



Folia Cyclaminis fere.

culi, racematim coherentes, ex luteo virides live chlori: quibus racemi succedunt uvarum rubentium, aut ex rubore fuscum.

Cyclamin.
altera.
Sigillum,
vel Tuber
Mariae.
Malacocyl-
fua.

Ruell. Cyclaminos altera Diosc. & Plinij, Herb. & offic. Sigillum Mariae; Mauritanorum Bothormaticum primum (Tuber Maria) nominatum, Malacocylus Democriti. Sic & Corn. Fernel. & Dalecham-
pio. Sed falluntur. Non enim radicem, aut facultates habet Cyclamini alterius.

Matth. Vitis nigra, Hetruscis vulgò Tamaro appellata, corrupto à Tamno vocabulo. Sunt enim (inquit is) qui hanc Tamnum, sive Tamum etiam vocent, unde Latini e jus uva taminia dicta est. Viti nigrae, quae in Italia nascitur, illud obijci posse putavim, quòd in uvarum colore à Dioscoridis dissidere invenitur, quòd ejus Vitis uvae post maturitatem nigrescant, nostrae verò perpetuò rubentes spectentur. Sed hoc nihil me movet, neque facit, ut mutare debeam sententiam, & credere hanc aliam esse à Vite nigra, quod saepe viderim naturam plerumque in florum & fructuum colore ludere. Idcirco nil mirum esse debet, si in Italia Vitis nigra rubentes uvas proferat, alibi verò nigras, ut in Graecia, Asia, aliisque calidioribus, quòd hujusmodi discrimina saepe numero celi, ac soli diversitate contingant. Hac igitur ratione fretus, quae, ni fallor, illam objectionem diluit, non dubitaverim asserere, hanc plantam, esse veram ac genuinam Vitam nigram, quoniam ceterae omnes prorsus notae illi ad-

Matth. si-
gura falsa

supulari deprehenduntur. Hae illae, qui plantae capreolos appingit, qualem observare nunquam potui. Amplectitur quidem proxima, sed non per capreolos: Racemi etiam in prioribus comm. malè exprimuntur: Radix quoque non tenuis, sed crassa, quam non observavit Matthiolus. Plantam praeterea non describit, sed fictam tantum iconem proponit. Quare merito in comm. cum magn. fig. eam mutavit, pingens melius uvam & radicem, licet capreolos reliquerit. Radicem ita longam, qualis est

Icon nostra
ex Lob. &
Dodon. non
placet.
Matth. op-
inio refuta-
tur.

in postrema ejus icon, ac etiam apud Dod. & Lob. ac in nostra, ad imitationem illorum facta, non observavi, sed pæne rotundam & tuberosam. Meliorem Cam. in epit. & hist. sub Vite nigra exhibuit figuram. Quis autem quæso plantam hanc eandem dixerit, cum Vite sive Bryonia nigra Dioscoride: folia huic non sunt angulosa, qualia esse solent albæ: fructus non niger: caret capreolis, quicquid Matth. ex descriptione Dioscoridis pingat: plurimum denique in figura foliorum ut in cæteris differt, cum tamen è contrario Gal. per omnia similem dicat. Tandem radix odore & sapore differt, quæ di-

versam vim ostendunt. Fallitur praeterea Matthiolus hujus racemos uvam taminiam Latinos dixisse. Hæc siquidè Staphisagria est, autore Dalechampio.

Dod. Vitis sylvestris [See! nostre Dame] Bryonia species, non autem Labrusca. Quod admonere voluit, ne quis cum Avicenna, Serapione aliisque Medicis Arabibus, falsò putet eandem esse Labruscam & Vitim sylvestrem. In quo & Plinium (in hist.) particulatim notat, ut cui utriusque quovis occasione præberetur, ut satis de his se explicare non potuerit, & Lx. c. i. utranque inter se confuderit. Hanc praeterea ait Columellam & Latinos Tamum appellare, fructumque ejus uvam tamineam. Vvam autem tamineam, etiam Staphisagriam esse, sed hanc falsò ita nuncupatam Plinium confirmare; qui & Salicistrum vocet. Non esse refellendam eorum sententiam ducit, qui Cyclaminum alteram hæc esse velint, vel solam enim radicis magnitudinem facit hos redarguere. Cyclamini siquidem radix, quòd nullius usûs [αχρηστος] ac exigua sit, hujus autem magna & multi usûs. Cum eo magis ipsi videretur agendum, qui αμαλαν sive βρυονια μετασταν esse pertinacius tueretur: nisi repertâ, & ab eo conspectâ legitimâ Bryoniâ nigrâ, sententiam mutaturum speraret. Sed tamen quid vetat & in hujus errore animadvertere, & Tamum nò esse Bryoniam nigram docere? Caret capreolis Tamus; fructum non nigrum, sed pulchre rubentem gignit. Bryonia verò nigra capreolis habet instar Vitis, & acinos proferit nigros. Ostendunt hæc differentiam satis evidentem. Describit autem is Vitim sylvestrem, quòd longos, lignosos, mediocriter crassitudinis, rimoli corticis, instar sarmentorum Vitis obscurè subrubentes promat coliculos; capreolis sive viticulis cateat: flores candidos, musculos odoratòsque proferat. Sed patet eum Vitim suam silv. ex libris, & non ad plantam, quod ei sæpius evenit, describere: verè quidem dixit adversus Matth. capreolis carere: reliquæ verò notæ non reperiuntur in sua Vite sylv. vel Tamo.

Vitim nigram silv. Ollingeri (si modo est eadem quæ Tanus Plinij, inquit Gesl. h. quæ Matthiolus pingit, quâvis radicè non probè, fructû verò omitit: & capreolos addit descriptione Dioscoridis in hoc, nò naturâ secutus.) ego cû capreolis nunquâ vidi, sed viticulis tantum suis flagellis; se circumvolentem. Aut igitur Dioscorides lapsus fuerit τανα; in hac planta nominando, aut nò propriâ significatione usus: aut Vitis nigra Dioscoridis hæc non erit. Accedit quòd fructû ejus primò viridè, in maturitate nigrum facit: cû Tani acini post viriditatem semper rubeant. Item quòd Dioscorides minis efficacè hujus Vitis radicè facit, quæ albe: cû Tani radix exulceret, quæ meo periculo didici: Vitis albe non itè, aut non adeo. Interim hanc Vitè nigrâ esse non nego, aut proximâ ei speciem: quoniam non invenio aliâ quæ propius ad descriptionem accedat. Eid. Gesl. h. Malacocylus Democriti videtur Vitis nigra, quâ Ruellius Cyclaminum alterâ existimat, aut nò longè dissimile. Eadem habet etiam in cat. pl. ubi præterea (sparsum tamen) Cyclaminum alterum, Tamum & Tannum, ac Vitim nigram appellat. Non placet autem quod aliquando dixerit Tamum habere baccas nigras, maxime cum postea ex autopsia tales negaverit.

Lob. adv. Vitis, vel Bryonia nigra, Sigillum Mariae, an Cyclaminos altera? Obi. Vitis, sive Bryon silv. (ita & ic.) Tamus & Bryonia sylv. Dod. quem ait meritò, vulgatum Sigillum Salomonis [Mariæ] sive Bryoniam nigram, sylvestrem Bryoniam, Tamumve statuisse. Item alibi, Cyclaminos altera, Bryonia nigram quovisdam. Lugd. Vitis nigra Matth. thiol. qui falsam ejusdem figuram retinet, quam etiam Tab. sub Vite nigrâ albâ primâ proponit, quem & Ger. imitatur, Bryoniam nigram appellâs.

Silv.

Schvv. securè nimis pronunciat Sigillum B. Mariae esse Cyclaminum alteram & Bryoniam nigram.

C. B. phyt. Bryonia 4. five sylvestris: Eid. apud Matth. Bryonia sylvestris. Non autem convenit (quod fratri placet) descriptio Dioscoridis. Velim etiam ab ipso annotatum, ubi nigrescentibus bacis, ut ipse prodidit, reperiri? Tandem quæ Theoph. l. 9. hist. c. 14. & 22. de Vite sylvestris, plantæ de qua accipitur, non quadrant. Eid. B. pin. Bryonia 4. lævis, five nigra racemosa: Vitis nigra Matth. Ang. Lac. & Cast. Tamarum vulgo, Czf. Vitis sylv. Diosc. & Theoph. quibusdam. Sed florem capillaceum, muscosumque ei tribuit Diosc. qui in nostra non observatur. Aliis Cyclaminus cyslanthemus Diosc. Aliis Vva taminia Plinii: aliis ejusdem Salicastrum, quod potius Amaræ dulci convenit. Bacca maturæ aliquando rufescent, aliquando nigrescunt.

Provenit à me plantata in horto E.C. collecta ex vicinis locis urbi Montbelgardenfi, ut in colle vestis Arbonam eundo ad planticem in dumetis: item propè la Chau Vitium monte. Genevæ florentem observavi mense Maio in colle l'Abbatie. Frater C. B. in Hünigen collegit. Tiguri in sylvis spontè provenit, ut & Porentrui cum bacis perfectis Augusto. Radicem valdè profundè agit. Vitis nigra Matthioli frequentissima in Hetruria provenit, quin & in Goriitensi comitatu, ubi Martio & Aprili mensibus ejus cauliculi pronascuntur.

Tamari viticulas, quæ Vere primùm erumpunt, quoddam Asparagis similes sint, eorum more decoctas, suam etiam tēpestatē madi Matthiolum prodit, quamvis non eam, quam Asparagi, cum palato ineat gratiam. At comedat Matth. suos Asparagos, ejus ego auctoritati non confido, nec securè sumi posse existimo. Compertum est (inquit Lob. adv.) vel mulierculis, vehementius urinam, renūque fabulum & mensium saburram, impellere potu: verum venis tantopere incentivam esse, non perinde assentiuntur quidam Commentatores: qui potius experti eidem conviciantur; conquesti lumbos enervare, sanguinem, renēsq; inflammare, pluriūque esse sibi unam aut alteram Cynaram, quam incertam & periculosam suam Bryoniam: quam si propter calorem, venerem accendere vult, haberet sibi uni, aut Flammula voceretur, ad sui Satyrii erichonij vires enervēs supplendas. Planta à Matthiolo pro Bryonia nigrā exhibita, legitima Turneri judicio non est; tum quod hæc planta manifestè cum sit frigida, non eas habet facultates, quæ Bryoniæ nigræ tribuunt Dioscorides, Galenus, & Mesuarius; affirmant enim earundem esse virium cum Bryonia alba, at illa Matthioli tam valida non est. Mesuaro Bryonia alba, calida & sicca est in tertio recessu. Nigram manifestè calidam statuit etiam, ubi ait non adeo esse calidam ac albam, additq; utriusq; radicem frigidis conferre morbis &c. Iam verò utrum planta frigida, qualem scio certò Matthioli illam esse, ejusmodi possit morbos persanare, doctis dijudicandum relinquo, & an frigida sit recte, periculo facto circa Solstitium estivum, docebit sapor. Antè diximus ex Gesnero radicem exulcerare, quod tamen nobis non constat, ex gustu sanè acrem compertimus: dubium est etiam an qd dicit Dod. radices sint calidæ & siccæ ordine tertio: addit fructus ad similes facultate, attamen mitione: utramque abstergere & digerere: Quod Galenus scribit de asparagis Bryoniæ ab omnibus pro more per Veredi, de Vite sylv. five Tamo, nequam de Bryonia alba veritatem habere: esse qui asserant in Hispania Batice in cibaria recipi: Dici à porcis hujus radices quæri, erui, ac cum voluptate mandari, neq; minus esse gratas quam Cyclaminum orbicularis, quæ inde Panis porcinus nomen indeptæ sint: Sed temerarium fore idcirco Tamum Cyclaminum.

Tom. II.

mini speciem asserere, quoddam ejus radices porcino generi gratæ sint.

BRYONIA LÆVIS, SIVE NIGRA baccifera, C. Bauhini.

Radice[m] habet magnam, crassam, longam, succo glutinoso plenam; caules verò lamentorum Vitis instar lōgos, lignosos, angulosos, quibus se, (licet capreolis careat) crebris circumvolutionibus vicinis fruticibus circumvoluit; folia hederacea, Smilacis lævis similia, magis tamen sinuata, tenuia, splendens, & nervosa, longissimis pediculis donata: flores albi sunt, muscosi: ad cujuslibet folij exortum, in viticulis maximè superioribus, pedicellus brevis ex caule exurgit, qui baccam unicam ceraso minorem, virentem primùm, at per maturitatem rubet, sustinet: cui semina satis magna, rotunda, nigraque, quaterna, quinave includuntur. Provenit in sylvis circa pagum Hünigen, Junio florens: at bacca Septembris fine maturæ sunt.

Hæc à communi Bryonia sylvestri, quæ Tamus dicitur, potissimùm in his differt, quoddam communis florem minorem habeat, racemosa sit: hæc verò flore sit inajore & baccifera. Hæc C. Bauh.

Est autem in prod. ipsi Bryonia 2. sylvestris baccifera: Eid. pin. Bryonia 5. lævis, five nigra baccifera.

MECHOACAN. C. A. P. XXIII.



T Alex sunt radicis brachialis crassitudinis p transversum sectæ, cortice rugoso testæ, ex fusco cinereæ, cæteroque cinereæ, per quas vix ulla apparet fibra, substantiā molliusculā, sapore subduli cum obscura quadam acrimonia, nauseam movet masticando, circulos habet ut Bryonia, verum ab ea differt, quod compacta sit & non fungosa, nec sapore acri, amaro & viro-

so, qualis illā. Porentrui à Pharmacopœo nobis data Mechoaca, tota fusca nescio unde, sapore nonnihil acri in qua circuli valdè manifesti: altera radix secundum longitudinem secta externè rugosa cinerea, internè albicans.

Mechoacan Monardes duplex tradit, & tertium genus sylvestrius. De primæ verò Mechoacan an. num 1560. primùm in provincia Mechoacan dicta, radices reperta planta hæc scribit. Video stirpem in magno vase terrā pleno repositam Hispani in monasterio Franciscanorum, multis ramis supra terram expansis luxuriantem, colore fusco ad cinereum tendente, qui vicinas perticas aut pergulas (si adponantur) scandere, & multiplici nexu amplecti possint: foliis circinatæ ferè rotundatis in mucronem tamē deo nētibz, nonnunquā admodū amplis, atro-virentibus, fibrosis, perēnibus, adeo verò delicatis, ut humiditate carere videantur: fructu, ut perhibent, coriandris fisci magnitudine, racematim coherentē, riantri.

N 3

mentum hori somnus conceditur, iis præsertim qui vomitibus obnoxij sunt, sed breviter, nam purgati incipienti, nec somnus; nec cibis, nec potus convenit. Si vero qui hunc pulverem, vel aliud quodvis laxans medicamentum sumperit, sibi à vomitu metuit, utatur eo quod sæpius expertus sum remedio, videlicet, illico à sumpto medicamento, albumen ovi assum & adhuc calidum digitiq; attritu in lineo panno raro involvat, & in nodum colliget, quem guttatis orificio imponet, & istic retinebit, donec medicamentum laxare incipiat; etenim non modò vomitum prohibebit, sed etiam fumos & vapores à medicamento sublevatos reprimet. Factà purgatione datur jusculum, & paulò post cibis, qualis his dari solet qui sese purgant. Peractò prandio neque somno indulgeat, neque bibat ante cœnam, quæ levis erit, & rerum boni succi. Postridie eluat corpus medicamento aliquo, & conservà quapiam utatur, deinceps in victu & reliquis rebus necessariis sese gerat, ut decet. Fiunt nonnunquam ex eodem pulvere

excepto electuario rosato Mesic Catapotia Coriandri sicci magnitudine ut faciliù dissolvantur & citius opus suum peragant. In manu autem est Medicij, aut ejus qui sumperit, eam humoris quantitatem purgare quam volet, quoniam sumpto pauxillo jusculo aut alia re, ejus operatio illico cessat. Negat Io. Fragosus Regis Catholici Medicus, jusculo aut alio cibo injecto Mechoacan vim purgativam sibi aut infringi, & quotidianà experientià id se observasse ait, eandemque nostri auctoris in Pimpinichi opinionem reprobatur. Mittit Monardi promontorium D. Helene, quod in eodem quo Nicaragua tractatu est, aliud Mechoacan genus silvestrius, quod gravia symptomata excitat, ut vomitus immodicos, tormina, & alvi profluvia, quom ob causam Scammonæa nuncupatur: sed nemo (periculo semel facto) utitur. Mechoacan agrestis gustu acridinem præfert, & domesticâ nigrior est vehementiusque & cum molestia purgat: quare magis noxia; autore Everardo.

BRYONIA MECHOACANA nigricans.

Radice est Mechoacæ similis, sed cortice nigricante vestita, interioribus rufescente, quæ tessulatim incisâ rotunda, magnitudine & figura calculo aleatorio respondens, ex India Chelapæ sive Celapæ nomine ante annos undecim allata fuit. Ab Alexandrinis & Massiliensibus, Isalapium vel Celapo vocatur: & à Massiliensibus, Mechoaca nigra, vel mas existimatur.

Gustu est non ingrato, & gummoso, & ob copiosam gummositatem, si carbonibus, vel igni admoveatur, flammam concipit. Facultate, vulgarem sive albam Mechoacam superat: nam ob gummi copiosum, fortius humores serosos purgat, cum imi vêtis levi dolore, & præcipuè viscera, hepar & ventriculū roborat. Quare drachmæ unius ponderè exhibetur tutò, & sine fastidio opus suum exequitur. Sunt qui ea in dosi, cum aqua Cichorææ, aut simili stillatitia; seu jure actu frigidis, tribus horis ante prandium, agros propinent.

Ex Bauhino prodromo, ubi eam sub Bryonia 3. Mechoacana nigricante exhibet. In pin. facti Bryoniam 7. Mechoacanā nigricantem.

RADIX QVIMBAYA. CAP. XXIV.

Emittit apud Clus. Petrus Cieq; part. 1. Peruanæ hist. in Provincia Quimbaya, cujus metropolis Cathago, nasci tenues quassam radices digiti

crassitudine inter arbores, quarum si fragmentum brachiali longitudine duobus aquæ sextariis per noctem maceretur in vase aliquo, majorem aquæ partem eà nocte absumi. Ex ea quæ superest aqua, Vires. qui tres uncias sumperit, adeò benignè purgatur, & sine molestia, ut si Rhabbaro purgatus esset. Cujus rei aliquoties periculum fecit magno illorum, qui sumperunt, commodo.

Lugd. Petri Cieq; radix Quimbaya. C.B. Radix Synon. Quimbaya: meminit etiā Fragosus, sed succinctiùs.

BEXVGO' DEL PERU. CAP. XXV.

Plantis illis quæ ex utriusque Mechoacan generis semine Scammonij aut Convulvuli modo prodibant forsitan similes erant, quæ ad Clusium Diepā mittebat doctissimus vir Godofredus le Brû, Medicus Regius, Bexugo, del Peru appellatione, quarum drachmam sumptam, purgandi vim habere scribebat, præsertimque Mechoacan & naciuis Indicijs purgativis. Erant verò illæ, sarmenta veriùs, quàm radices, longæ, æqualis ferè ubique crassitudinis, digitalis videlicet, nonnulla etiam minoræ, lentæ, & funiculorum, sive Athragenæ sarmentorum instar nonnihil contorta, cortice cinereo obducta, valde nervosa internè, lenti gustus initio, dein de nonnihil acris & salivam cientis, denique guttur & fauces urentis, breviter ad Athragenæ sarmenta proximè accedentia, ut quodammodo mihi persuasam Athragenes fuisse sarmenta illis in locis nascentis.

B.pin. Clematis 2. Peruviana.

RADIX PURGATIVA INDICA Mutalista. CAP. XXVI.

Illustr. Principi Frid. Duci VVirtembergico missa fuit hæc radix, nomine radicis purgativæ Indicæ Mutalita, quæ fibre siccata, repræsentabatque quodammodo segmenta Helenij, fusca, rugosa, internè nonnihil hævescens & albicans, nullo sapore manifesto, nisi quòd diu masticata, acrimoniam quandam super habebat. Hæc autem erant adscripta: Assumpta pondere 3.ij. pulverisatam in aqua cordiali stomacho Vires. jejuno manè, refrigerat, valet in febribus cholericis & ardentibus. Syrupus ex hac radice paratus ex Cholera. unc. iij. in lib. i. aquæ decoctis cum Sacchari pondere 3.ij. refrigerat, mundificat sanguinem. Sed quis non intelligit sacchari dosin nimis parvam esse. Syrupi dosi etiam erat adscribenda.

LVPVLVS MAS ET FOEMINA. CAP. XXVII.

LUPULUS MAS.



Nadédra Lu. Deser. Apulus, per se infirmus, facillè riddicas, aut proxima adminicula, quæ arripuit, descendit, non ille quidem capreolorum, quos nullos habet, ope, sed corallibus, asperis, argulosis purpurascens & concavis sarmentis tenaci pedamctorum complexu in altum subniter, cætero qui humo se tollere vix potis; folia è geniculis bina, adversa, pediculis palmaribus, asperis, ru-

nem bile flavà modicè purgat, eumque clarum reddit, & sedato ejus calore temperat, præsertim ferro lactis infusa: iterum syrupus ex eo sanat, febribusque biliosis & sanguineis prodest. Ipsa quoque & succus ejus cum hordei polenta cephalalgiam calidam sanat, & ventriculi, ac hepatis intemperiem calidam. Cumque sit tam efficaciæ medicamentum, mirari subit, cur à nostræ tempestatis medicis in usu tam rarò habeatur.

Qui cervisiam coquant, loco condimenti Lupulum habent, sine illo enim rarò bona conficitur cervisia. Flores tamen cervisiæ largius incocti caput tentant. Pistores etiam nonnulli Lupulo carere nolunt. Est enim ad multa quam utilissimus. Proinde tam flores quam radices ejus temperatura sunt calidæ, & siccæ. Recentes vero ac verni Lupulutiones medicam obtinent naturam, ad humidam & refrigerantem qualitatem vergentes. Apicij recentes Lupuli tutiones non aliter atque Asparagum, acetariis in Vere expetunt, nec sanè ineptè illi facere videri debent. Siquidem Lupulus in tenera sua ætate in cibo devoratus, sanguinem purgat, ventrem solvit laxatque, & obstructionibus epas & lien liberat. Vnde colligi potest non solum tutiones hos in cibo usurpatus, sed flores Lupuli vinodecoctos ac potos, adversus venenum, & si quid aliud malum in interaneis fuerit, unicè facere. Flores Lupuli in deflectionibus duritiem & tumorem matricis juvant, nec non difficulter urinam reddentes & eos qui inter meendum, calculum vesicæ sentiunt. Tutiones primo Vere aquâ ferventi macerati & frigidâ abluti, cum aceto & oleo communi, addito sale in aceteria veniunt. Cichorij sapore non ingrato, calore temperato ad alvum emolliendam, Lupulus flore & semine calefacit, exicat, extenuat, aperit, abstergit, sanguinem purgat. Bibitur contra venas, scabiem, luem gallicam, & ceteros affectus, qui cutim extimam inhiunt. Datur etiam contra febres ab infarctu provenientes. Semen lumbrius ventris necat, urinas provocat & mentis educit. Vulgus & vetula Salmanticenses, sæpenumero medicinam empiricam fæditare solitæ, ad curandam alopeciam à venerea lue natam, hac ratione Lupulo utantur. Ejus radices pondere libræ unius probè lotas & à lordibus repurgatas, per noctem in aquæ libris octo macerabant, postmodum in illa ipsa aqua, lento igne & fumi experte, ad tertiam partem consumptionem coquebant, vel etiam ad mediam partem, si vehemens esset alopecia. Decoctionem servabant in usum: ejus uncias octo manè agris jejunis propinabant, deinde stragulis in jectis sudorem provocabant. Addebant interdum Apij sive Selini hortensis, duas aut tres, & graminis aliquot radices, nonnunquam etiam passas Vvas à gigartibus mundatas.

RADIX CAROLI SANCTI,
foliis Lupuli.
CAP. XXVIII.



Lupulo similis est, & perticis se convolvit illius more; quibus si careat, humi spargitur & diffunditur. folia etiam Lupulo similia, colore viridi, sed obscuriore, odore gravi: neque florem, neque fructum fert. Radix crasso capite est, ex

quo alie radices oriuntur digiti crassitie line majoris, colore candente: cortex qui facile separatur, cumque usus, est odore aromatico, gustu amaro, cum ulnis, quadam acrimonia; nervus radices corticis spoliatur, multis quasi filuris seu tabellis tenuissimis constare conspicitur, quæ sigillatim separari possunt.

Monard. Carlo Santo. Geof. lin. de pl. B. de Car. Synon. lo Santo. Cast. Carolus Sanctus. Lugd. Radix contra venena Carlo Sancto. B. phyt. Lupulo similis Mechoacana. Eid. pin. Lupulus 3. Mechicoanus: Indica radix, Monardi, par. alt.

Nascitur temperatissimis provinciæ Mechoacan Locum. locis solo neque nimium sicco, neque humido.

Calida & sicca initio secundi gradus. Radicis Caroli Sancti cortex manè aliquanto tēpore commenducatus, multam pituitam, aliisque humores ex capite elicet, eamque ob causam rheumatismos, capitis dolores & defluxiones curat: in nonnullis etiam vomitu multam bilem & pituitam è stomacho expellens, sed illius decoctum maxime cuius gratia ventriculorum noxiis humoribus liberat, eumque roborat: purgationem tamen præcedere necesse est. Idem commenducatus, gingivis abscedentibus auxilio est, dentes stabilis eoque à scabritia & corruptione liberat, orisque halitum commendat: sed postea vino os eluendum, ad amaritudinem tollendam. Pulveris ejus exigua quantitas ex vino albo, aut Adianti Canellæque decocto sumptus, vulvam obstructionibus liberat, mensesque provocat, & status difficultatis, purgato videlicet prius corpore, & alvo (dum ejus remedio utetur) ex æquis partibus Liquidambar & unguenti Dialthææ inuncta. Cordis affectibus, iis præsertim qui ex uteri sympathia oriuntur, auxilio est ejus pulvis, utante, sumptus, aut illius decoctum hoc modo præparatum: Radicis minutim concisa drachmæ duæ in tribus aquæ sextariis coquantur: ad dimidias, corticis Curi in pulverem redacti drachmæ quatuor, pulveris Canellæ drachmæ duæ statim injiciuntur, ac denudè fervent, deinde colantur. Illius decocti sex uncie singulis diebus manè addito lacharo propinantur, purgato tamen prius, ut decet, corpore. Hunc pulverem, & decoctum nonnulli in morbi gallici affectibus, atque etiam epilepsia commendant. Alterum experiri non admodum necesse est, quod multis aliis ad eum morbum remediis abundemus. Alterius periculū faciendum in iis qui vigesimo quintum ætatis annum nondum excessere: nam epilepsiam in adultis tolli, non est verisimile. Descriptis his Carlo Sancti facultatibus, qui proximâ classe è Nova Hispania advenere, istam radicem Indicem cognominabant, eamque valdè estimabant: tantas enim illius facultates experientiâ comprobatas se habere dicebant præter modò enumeratas, ut plures de Rore-marino celebrari non soleant. Ejus corticem in pulverem tritum puerperis obstetricum negligentia animi deliquium patientibus, propinans, plurimum enim sudorem provocando liberantur. Idem pulvis ex vino aut florum malorum Aurantiorum stillatio liquore datus, mulieribus partus difficultate laborantibus magnam utilitatem adfert. Monachus quidam ventriculi debilitate affligebatur, ortâ tam ex frigidorum humorum abundantia, quam ex imbecillo colore naturali, sic, ut nec cibum concoquere posset, sed disconsumeretur, & in magnos flatus converteretur: has radices cum pro sua opinione in aqua decoxisset, & garce panilla modo, decoctum per multos continuos dies in prandio & cena hauserit, id illi adeò feliciter cessit, ut & ventriculus roboraretur, & cor caleficeret, eademque operâ cibos postea probè concoqueret, acidis nidoribus liberaretur, & flatus absumerentur. Aliud præterea congestus est non speratum auxilium: nam herniâ (quâ per

Ventriculi debilitas.

per

efflophyllon aut Cissampelon esse existimavit. Verum Cissophylli appellationem propriè ad Asclepiada pertinere Tragus ait & Plinium Volubilem majorem Convolvulum vocasse L. n. c. ejusque florem nò ineptè Lilio albo contulisse. Quosdam tandem velle scribit Volubilem sub Clematide altera apud Dioscoridem L. 4. esse descriptam; alios Periclymenum esse dictitare; nonnullos rursus Smilacem lævem facere. Quæ opinio ipsi magis aridet, ut quam etiam Ruellius sequatur. Proinde si omnino quid sentiat, effari liceat, videtur ipsi sanè hæc planta Scammonæ (quæ Dioscoridi Colophonia, Dactylon, Colophonium, Apopleumonos, & Sanilum cognominatur) genus esse sylvestre, sed non noxium quale est Scammonium, quo officina utuntur.

Malocissus, quæ Democritus mollibus Hederæ foliis depingit, causè tenero, vite cuicunque, quod fuerit nactus involvete, videtur Geln. h. Iasionis, sive Afines, seu Convolvuli species major. Huic subscribit Anguill. ep. 5. dum ait, Malocissus Democriti apud Cassianum Bassium nihil aliud est, quàm Convolvulus, vocaturque à Catone Volubilis. Convolvulus (pergit Geln. h.) vulgò Volubilis, Liliatrum, secundum Ruellium: Item Clematis altera, herbaris nunc Volubilis major ex Ruellij sententia, sed non est Liferon, Campanella Ruellio.

Nullam hætenus inveni (inquit Turn.) descriptioni Smilacis lævis per omnia respondentem. Et enim Convolvulus flore magno nò in instar in aliis omnibus respondeat, dissentit tamen fructus, Lupini dissimilis. Aëtius quoque de curanda hydropse, ait Smilacem in sepius & propter aquas nascentem, siliquas proferre Smilacis hortenensis. Sed tale quicquam nusquam observavi in Convolvulo maiore. Smilax lævis Matthioli cum nec semen habeat Lupini, nec siliquas Smilacis hortenensis, nequit etiam esse meo iudicio Smilax lævis, nisi alij iudici Lupini mihi incogniti, aliæque siliquæ Smilacis hortenensis nunquam mihi conspexerint. Mihi quidem videtur Smilax lævis Matthioli primum esse Volubilis genus apud Mesitæum.

Convolvulum porò huncce majorem, Smilacem esse Dioscoridis negat etiam Cælidens: Sunt, qui putant apud Dioscoridem, Smilacem lævem esse; nam descriptio in cæteris valdè congruit, sed non ad eam altitudinem adolefcit, ut in ætate ad umbras quærat, neque tantum folia in Autumno decidunt, sed & caules & tota planta perit; idcirco magis visum est Smilacem lævem albo Gelsimino convenire.

Fuch. Matth. Acoftæ, Bellon. Turn. Cam. ep. (qui non audet affirmare, an legitimam Smilacem lævem referat) Smilax lævis. Lugd. Smilax lævis Matthioli. Dod. hist. & purg. Lob. Obs. & ic. Smilax lævis major. Dod. gall. Smilax lenis alba major. Lob. adv. Convolvulus major, Plinij Smilax lævis, vel lenis, Volubilis major vulgi. Trag. Tab. Volubilis major, ut & Cam. hist. ubi figura nova. Schvv. Convolvulus major (ita & Geln. h.) *Σκίλαξ Λαία*, Dioscoridis. C. B. Smilax lævis, Convolvulus i. major albus: Volubilis, Brunf. latifolia, Fallop. de decor. Volubilis major, Trag. Lon. Thal. Tab. Smilax lævis, Lac. Cast. Lugd. major, Dod. Lob. Ger. Campanula alba fily. Schvv. Convolvulus major flore albo, Eyft. Est semine nigro, aliquando rufescente.

Germ. vocant Windefraut / glatt Winde / oder Weigloeden; Belg. Winde & Wrange; Gal. *Liseron*, *Liset*, *Campanette* & *Phasioles* Fuchfio, minus commode: Ital. *Ilucchio maggiore*: Hipl. *Tedra Campana*, Lob. *Campanilla Terza*, Dod. *Corregiola maior* Matth. Angl. *Wyndweede* & *Winde* Lobel. Schmooth Smilax / Arbor Winde / Great Winde / Wyndwines de / Turnero: Hung. *Feyer vengyung b jukak*, Clematis altera, Nomenclatori Pannonico. Convolvulus quidem dicitur, quod arborescendat, & eis se convolvat: Lævis autem Smilax appellata, non alia ratione, nisi quòd asperis aculeis careat: *Liser & Liseron*, ut quidam apud Fuchfium annotat, à ligandis, quibus adnascitur plantis dicitur.

Nascitur passim per fruteta & sepes, sese involvens: amat culta & in iis etiam potissimum gignitur; Æstate floret, Autumno semen profert. Particulatim in monte Moutetz florentem adhuc Octobri observavi.

Fuchfius præter quod ei modicam amaritudinem in gustu præferentem attribuat, huic etiam, ut plures alij, vires ex Dioscoride, Plinio & Galeno ascribit. Sed si non sit Smilax lævis ut existimare videntur Turn. & Cæsalpinus, suspectæ erunt vires ei attributæ ex Smilace. Miror Tragum dicere folia gustata linguam urere cum amaritudine, & postea scribere stillatitiam aquam florum internæ & externæ valdè utilem in omnibus calidis affectibus, & ad ruborem oculorum. Volubilis magna, Laetaria, Fenis arborum dicta (inquit Mesin ver. Sylvij) Dioscoridi est temperata, vel paulò calidior; sicca ordine secundo: resolvit, maturat, terget, solvit, aperit officia vasorum; ob id datur cum tragacantho, mastiche, spica Nardi, sero lactis; obstructionem venarum mesentericarum, & hepatis liberat; ob id sanat icterum cum succo apij & intybi, vel sero lactis; bilem ustam clementer purgat, ob id febres putidas, præsertim biliosas, diuturnas; thoracem & pulmonem excrementis repurgat, ob id asthma confert, phlegmonem hepatis externam, præsertim cum polenta & oleo rosaceo & aceto. Cephalalgiam antiquam, præsertim cum oleo rosato aut chamæmelino & aceto. Succus ejus aurium ulcera sanat. Empirici id perhibent Fuchfio, succo Volubilis majoris ad calidas utuntur passiones, capitis potissimum & oculorum. Montbelgardi animadverti hortulanum diligenter hujus radices colligere, non solum quòd suo repectu multiplicitè odiosa, sed quòd porcis gratum & utile alimentum sit. Eà degustatà nec amaritudinem, nec acrimoniam sensi.

IASIONE VETERIBVS.

CAP. XXX.

Exploratum illud habeo (inquit Theophr. l. i. c. 1. de flor. gen. & differ.) per omnes partes differentias plures vario modo exultare; nam nonnulli etiam folio uno emergunt, descriptionem tamen plurium ostendentes, ut flos Iasionis: in hoc enim haudquaquam folium unum quoque discernitur, nec conceptaculo [legend. *μαχαίρα, πονηρία* quod *Gaza error* *z a vertit conceptaculum, Rob. Cnfl.*] pars infima eget, sed postrema in angulos exeunt, Oleæ quoque flos panè talis esse videtur. Hæc nos ita reddimus. Nonnulli flores etiam unico folio naturâ constant, delineationem tamen plurium ostendentes, ut flos Iasionis [nò sc. *αὐτὸς τῆς λανάνης*.] Non enim singuli flores in folia dividuntur, neque sanè conceptaculi pars inferior distinguitur, sed ex superiore parte projecturæ angulosæ exeunt. *τὸ τῆς λανάνης*, à foliorum numero differentias hoc in loco Theophrastus aptat: idcirco unifolium hunc ostendit. Imò verò ut acutiùs sentias, ait Scaliger, nullifolium: neque enim folium est quod non est divisum. Et quia multi flores sunt ab imo pertusi; hunc eà etiam describit differentia. *ὅτι δὲ αὐτὸς τῆς λανάνης*. Est enim *τὸ λανάνης*, ut ita dicam, capedo. Nicander *χεῖρα* in Theophrasti. Interpret *ὅτι τὸ χεῖρα* *τὸ λανάνης*, at ego amant. Sic enim habes *χεῖρα* captivam apud Sophoclem. Et *χεῖρα* ministerium recitante Acheron non

HISTORIAE PLANTARVM

non semel. Ex his Scaligeri verbis, quæ opinioni Rob. Const. refragari videntur, colligitur, quàm bene Theophr. à Roberto corrigatur.

Olea floribus autem similitudo cum Iasione, in quo consistat, apparet ex cap. 22. lib. jam citati, cum ait. Olea flosculi prostrati spectantur perforati. Sanè plurimi sunt flores in eo cum Iasione convenientes, qui licet appareant ex diversis foliis, tamen unicum sunt folium, quod & decidens substitit integrum sine conceptaculo; Leucoia verò omnia, Rosa, Cisti, Lilia, Trifolium hepaticum, & alij multi flores cum decidunt, extra conceptaculum separantur, unde manifestò apparet, foliis pluribus constare. E genere verò unifoliorum florum videntur esse Verbascæ, Phlomis, Iasminum, Trifolium fruticosum lateum, Sambucus vulgaris, Ebulus, Campanulæ omnes, Anthirina, &c.

Theophrastum l. 2. caus. c. 25. de plantis, quæ aliquid quærunt, cui incumbant, hanc intelligere credo, dicentem. Adde quæ arboribus sustinentur, atque amplexicaulia constant. Hæc enim aliquid, cui incumbant quærunt, seu inter minora Volucrum [Gaza in cod. Veneto & Basil. æzim: alij, ut Gesnerus & Scalig. ianovm. Rob. Const. Ligustrum Virgilij secundum Servium, i.e. Clematis sive Convolvulus] quod vitam apud aliud agit [cod. Venet. legebat æzim: in Basil. autem æzim: træg: melius] quod si obtinere non valeat, humile præcipit, atque humicauit [æzim: humile] fit. Hoc autem corpore levi constat, facileque arborescendit, offensatque. Et hinc noxam arboribus infert perstringendo, obumbrandoque pabulum auferit, cætera prohibendo.

Plinius Iasionem diversis in locis, diversis nominibus exhibet. Libro namque 21. c. 5. ait. Est flos non dissimilis illi [Lilio] in herba, quam Convolvulum vocant [ea est Iasione à Theophr. & ab autore dicta, Dalech. ex Scalig.] nascens per frutecta nullo odore, nec croceus intus, candorem tantum referens, ac veluti naturæ rudimentum Lilia facere condicentis. Item lib. jam citato cap. 17. inquit, Iasione unum folium habet [ad florem referendum Hermol.] sed ita implicat, ut plura videantur. Addit autè l. 22. c. 22. Et Iasione olus silvestre [Lasine olus repens, alij] habetur, in terra repens, cum lacte multo; florem fert candidum; Concilium vocant. Et huius eadem commendatio ad stimulos coitus. Cruda ex aceto in cibo sumpta mulieribus lactis ubertatem præstat. Salutaris est phthisin sentientibus. Infantium capiti illita, nutrit capillum, tenacioremque ejus cutem efficit. Rectè Hermol. apud Plinium pro Lasine Iasione legit, dicens. Quidam verbum Lasinen corruptum esse nescientes, Plinium culpant, quasi hanc ipsam herbam lib. 24. repetierit inutiliter, Laginem vocando, non Iasionem. Sed cum longè alia sit, ut ex superiore libro constat, nec ea vocabuli sit affinitas, quam putabant, modestè suæ parùm consulens, nisi recantant.

Iasione Scaligero est Convolvulus: Rob. Const. Smilax lævis Dioscoridis: Dalechampio Volutus major, Smilax lævis Dioscoridis, Convolvulus Plinij. Nobis autem inter plantas jam denominatas, melius placet Convolvulus major, sive Smilax lævis dicta.

Iasione Theophr. & Plinij censetur à Goropio, Lobelio, & Gesnero Convolvulus minor, quem Helxinen Cissampelon quorundam infra inscribimus, qui quæ Ruellio, Car. Stephano & Gottæo Liferon, sive Lalleron cognominatur.

Convolvulum folio Altheæ ad quam plantam à veteribus descriptam referri possit, ignorare se fatetur Clusius, nisi fortè Iasione Plinij sit. Vocatur hic Clusij Convolvulus à nobis peregrinus, de quo paulò post.

Dodonæus videtur innuere suam Campanulam cæruleam hortensem esse Iasionem Plinij & Theophrasti. Sic Penæ & Lob. in adv. scribunt Campanulam hortensem meritis putari Theophr. Iasionem. De Campanula cærulea agimus lib. 20.

Iasione Plinij, olus silvestre, lib. 22. c. 22. traditum, non abhorret à Rapunculo, auctore Cæsalpino, quamvis non repant caules, nec flos candidus inest. De Rapunculo agimus lib. 20.

Alia verò est Iasione (ait idem Cæsl.) apud Theophrastum: de qua idem Plinius alibi, quam Aquilegiæ puto. De Aquilegia scribemus lib. 30.

Laginem Plinij, quidam malè censent, auctore Lagine Plinij Hermolao, ut jam ex eo scriptum eandem esse cum ejusdem Iasione.

HELXINE CISSAMPELOS veteribus.

C A P. XXXII.

Helxine [æzim, car. æzim] cognomento Cissampelos [addunt interpretes] folia habet Heracleæ familia, at minora: ramulos verò longos [heraclea maxæ, Lacuna ex ver. cod. qui addit, æzim: & sic legit & Catac. at vulgatum exemplar præ] quibus circumplectitur quodcumque contingit adminiculum. Nascitur in sepibus, vinetis ac segetibus. Potus foliorum succus alvum solvendi vim habet. Cissampeli quidem hoc in loco cognomentum rectè adjectum interpretes ex Galeno & Paulo ad distinctionem alterius Helxines seu Muralis herbe [Parietaria] de qua suo loco agemus. Neque porro existimandum Helxinem, de qua agit Plinius l. 21. c. 16. harum alterutram esse. Siquidem alia est, quam Ixinen vetiùs nominare debuit cum Theophrasto hist. l. 6. c. 4. ex cuius verbis suam ipse historiam deprompsisse videtur. Hoc verò capite descriptam Helxinem, rectius Plinij Convolvulum, l. 21. c. 5. commemoratum, esse dixeris, eo nomine donatam, quod suarum vitularum ope vicinis sese advolat adminiculis. Quod autem Galenus & Plinius huic Helxine vim tribuant [diacorymbus], in eo minime (quod voluit Marcellus) Dioscoridi repugnant, quandoquidem, teste Sarraceno, utraque facultas & discutiendi & solvendi alvum, potest citra controversiam, uni eidemque plantæ competere. Marcellus Virgilius malè Cissampeli Helxines Car. Marcell. putè Dioscoride, quasi adulterinum reject, nihilo minus tamen nomina ejus in Helxines (quæ Parietaria est) capite, relinquens, ut sunt, Cissampelon, Cissampelon, Melampelon & Cissanthemon.

Ex hætenus dictis apparet duas diversas esse herbas à Dioscoride Helxines nomine descriptas. Una Cissampelos ab interpretibus cognominata, quam Cordus in Diosc. Convolvulum à Latinis vocari scribit, cuius quidem species duæ habentur, major & minor.

Helxine Cissampelo Elatinem similem esse scribit idem Cord. in Diosc. quam quidam inibi Orobanchen nonnullos facere tradit.

Altera verò Helxine, Parietaria Latinis dicta, Ga-Parietaria leno Perdicium & Herba muralis Cello.

Helxinem suam Plinius lib. 21. cap. 16. Ixion [Ixine, Ixine quæ Chameleon albus est, Dodon.] vetiùs nominare debebat (inquit Sarracenus in Diosc.) cum Theophrasto, ex quo suam ipse historiam desumpsisse videtur. Et hoc ipsum Cord. in Dioscoridem adnotuit, cum dixit. Magno errore apud Plin. lib. 21. cap. 16. Helxines appellatione Carduus quidam describitur.

HELXI.

minore, lacteum liquorem contracta remittens,
Germ. Hornwinden [*Convolv. frumentitium dixeris*]
appellata.

A Trago Volubilis minor (sic & Lon. Thal.) five *Volubilis*
secunda, Cymbalaria cognominatur, quam Cissam- *minor*,
pelon esse aut Helxinen, ut multi astruunt, negat, & *Trag. Lav.*
nihil aliud esse affirmat, quam Anginam & Peltem *Thal*
hortensium herbarum.

A Dod. gall. *Smilax lenis alba* minor inscribitur *Smilax le-*
ac postea inter nomina Volubilis minor appellatur, ^{nis alba}
 magnamque similitudinem cum Chamæisso [Hede- ^{minor, Dod.}
 gall.

na terreſtri | habere dicitur. Quæ opinio à Dodon.
purg. & hiſt. (ubi Smilax lævis inſcribitur) his verbis
retractatur. Non eſt Chamæciſſus, quod quando-
que ſuſpicatus. Tamenſi enim foliorum ramulo-
rum eſt.

quæ aspicimus. Tamen etiam nonnulli, lamellorum, & radicum figura & color descriptioni, quæ passim extat, conformes apparent: & flores quia speciosi ac elegantes Leucosis aliquo modo comparantur: quæ utiq; huiusmodi nomen non minus quam Cissampelo conveniat, non idcirco tamen Dioscoridis Chamæcissus. Vires quoque adesse oportet, quæ in hac Smilacis specie desiderantur. Chamæcissus calida & amara foliis est, hæc vero nec amaritudinem, nec caliditatem ullam obtinet: gustata siquidem qualitatem nullâ exerit, magis frigida quàm calida. Quod hanc nullatenus Chamæcissus esse abundè ostendit. Ignava autem est, nulliùque usus herba. At si levis Smilacis speciem esse, neque alio referendam satis est manifestum. Non desunt tamen inter hæc Matth. Euch. Ang. qui Scamniarum tenuem Plini quoque facit, & Gesl. ed. h. Cass. Lugd. C. Bauh. & Plinij Schorv. qui Helxinen esse velint, cognomen Cissampelo. Sed pro hac aliam offendo, Dod.

Scamniarum tenuem
 Scamniarum tenuem
 Scamniarum tenuem

Lob. adv. obi. &c. Convolvulus minor purpureus. Lugd. Helxine cissampelos Matthioli arvensis & separius. Turn. Convolvulus. Gch. Gaf. & Clu. Hist. Convol. minor, cui & Volubilis minor. Tab. Volubilis arvensis. Scammonia parva Gam. & Ang. cui & Orobanche Theophrasti. B. phyt. Convol. 2. five minor arvensis. Eid. pin. Smilax levis five Convolv. minor arvensis. Annotat autem pise quibusdam Orobanche Theophrasti 8. hist. 8. ubi Orobanche Theoph. 5. r. Gang. Gaf. 2. & Gaza Ervangā reddiderit, dici. ἐλξίνην verbō cognominat cissampeli nomine Diaforidem meminisse, quod folia Hedere similia habeat. Schyv. Convol. Helxines minor, ἐλξιν ηκ αὐτῆς ποτὶ Diof. φεῖα πρὸς Ἀπολλωνίω, & Ergia. circinvolvendo. Dicta est ἐλξίνη ἀπὸ φέλεω, quod significat trahere & arripere.

As de hac locutione Amatus l. 4. c. 42. quando ait:
 Græcè, *ἀντιπαραστήσει* G. Lat. Helixne cissampelos,
 Convolvulus; Arab. *Acsim*; Hîp. *Campanellæ* I. *Plu-*
chis; Gall. *Lizeron* *Compagine*; Germ. *Aurelinden*;
Wengiarinden. Hanc quoque Servius Gramma-
 ticus, non sine errore Ligustrum appellavit; brevili-
 què Galenus l. 6. simpli. Helxinen alteram Cissam-
 pelon dîctam, digerendi obtinere facultatem ait.

Convolvulum minorem & Volubilem minorem *Nomina*
 Germ. Klein Windkraut; Klein Zaunglocken; Klein *linguar.*
 Schellen; Belg. Kleyn Winde / Gall. Petite Liseron;
 It. Vincichio minore; Hisp. Yerba; Boh. Svolacee mensz
 y. Hlung. Fula^h, z. lak.

Passim observatur. Gignitur autem in cultis ar-
 vis frequentius, non raro tamen & in neglectis, ac
 secus margines agrorum : frugibus pluvioso præfer-
 im cæli statu molesta. Floret unâ cum majore.

Altera Helxines cissampeli species & ipsa quo-
que quęcunque proxima attingit, circumvolu- *Desfer.*

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



*Atriplicis
folio.*

*Centuncu-
lus Plinij,
Ang.
Elatine,
Cordi.*

*Helxine
cissampelos
altera
Atriplicis ef-
figie, Lob.*

Atriplex.

Orobancha

*Leoninum
legumen.*

tionem tortili cōscen-
dit, nullis usq̃ ca-
preolis, sed viticulis
suis, quas ex radice
mediocriter crassā,
multifidā plures e-
mittit, interdū
palmo paulūm al-
tiores, alias etiam
selequibitales, sub-
rubentes, ad qua-
rum genicula in pe-
diculis longis na-
scentur folia singu-
laria, triquetra, A-
triplicis (Ocymi
Trago, i.e. Fagotri-
tici) nonnihil ru-
bentia; flosculi ra-
cematim coherent
in pediculis ex fo-
liorum sinu exortis,

parvi, albi, semine succedente triquetro (veluti
Ocymi Trag. Fegopyri Dod.) acuminato, nigro.

Hæc est illa Centunculus Plinij l. 24. c. 35. Anguil-
laræ, quam nihil aliud esse tradit, quàm speciem Cle-
matidis. Helxinæ Cissampelo Cordus in Diosc. Ela-
tinem (ita enim hæc præfens planta ab ipso voca-
tur) flore valde exili, semine triquetro, lacteum li-
quorem non remittentem, quā solā notā eam à
Cissampelo distinguit, similem esse, ac propterea Se-
rapionem statim post Convolvulum eam describere,
ac Athin corrupto ab Helxine & Elatine nomi-
ne appellare scribit.

Lobelius in adv. à doctis persuasus, Helxinen
cissampelon alteram Atriplicis effigie putarat legiti-
matam Helxinen, cū tamen huic aliquantūm dis-
similis sit: Frequens namque (ait ille) amplexibus
multis, vites arripit, nec secus aut arctat, aut enecat,
vel isdem pabulum surripit, atque Caslytha; foliis
est hederaceis, oblongis, in angustum Atriplicis fa-
cie & modo desinentibus; flores item Atriplicis al-
bicant racematim; semine triquetro, nigro, Selami
Theophr. sed minore; radice exigua; uvibus magno
proventus vinetis, frugibus, ac sepibus adnascitur.
Sed de succo vel facultate subducendi alvum, mihi
ignota, nisi quis Atriplicem putet, eoque lubricare
posse alvum statuat, multo tamen imbecilliorum illa
maritima certum. Hæc ille, qui in obs. & ic. picturam
habet sub titulo Helxinæ cissampeli alterius, Atri-
plicis effigie. Nisi Elatine, ait Amat. in Diosc. alterius
Cissampeli species sit, quæ illa sit ignoratur.

An porro est herba illa Ruellio l. 2. c. 30. quæ Fa-
bam, Cicer & Ervum suo brachiorum complexu cir-
cumhigans enecat, & Orobanchæ vocatur; agricolis
quidem Græcis Ospreoleon, vel Leontobotanon,
h.e. Legumen leoninum, vel Leonis herba; rusticis
Galliæ Tenia dicitur, forsā à tenendo, quo tenaci-
noxa obvolvatur, cinnisq; vel cirris tanquam brach-
iis stricim amplexetur, ut ea penitus strangu-
let. Et hæc illi qui lib. jam citato c. 75. eam sequenti-
bus describere videtur. Orobanchæ cauliculus ses-
quipedalis aut paulū exelior, subrubens, sine foli-
is, hirsutus, pinguis, tener, flore subalbido in lu-
teum vergente; radix illi subest digiti crassitudine,
quæ dum ariditate flaccescit, scapus dehiscens in ri-
mas diffilit. Legumina, inter quæ nascitur, strangu-
lat, unde & nomen invenit. Estur oleris vice. Placet
tum cruda, tum patinis decocta sicut Asparagus. hæc
specie per ætatem inter fegetes & legumina identi-
dem offunditur. A recenti Græcia Ospreoleon, quasi
Legumen leoninum, aut Leonteos botane, quod est
Herba leonina dicitur. Nec mihi supercurrit idoneum

nomen, quo vulgus ruræ passim utatur, nisi quod
in Parisiensi agro Teniam suprà diximus appellari,
ubi de Orobanchæ inter vitia frugum abunde di-
ctum est. Ex his Ruellij verbis luce meridiana cla-
rius patet, cum duas diversas plantas confundere, preb.
vocando Orobanchen Teniam, quam posteriore
hoc loco ex antiquis describit, quam prius longè a-
liam habeat nomine Orobanchæ & Teniæ. Sed
Ruellium nullus admiretur amplius. Est enim ei or-
dinarium & assuetum, plantas & diversis in locis re-
petere, & mirè inter se miscere.

A Dod. gall. Helxine Cissampelos, Gall. *Liseron* Helxine
noir inscribitur, ac Const. Imperatoris *Maraxios* Cissampelo-
[*Hedera mollis*] Latinorum nonnullorum Convolvul-
us, aliorum Vitaleis, officinarum Volubilis media
appellatur. Ad Similacis autem lævis genus, Dodo-
naus Convolvulum suum nigrum sive Helxinen
cissampelon de purg. & hist. pertinere scribit, ubi
eam præterea Volubilem nigram, in *Helxine nigræ*
parat. appellat, & hæc subiungit: Cissampe-
los cognominatur, non modò ad differentiam alte-
rius Helxinæ, quæ & Parietaria; verum quod & Vi-
tibus crebris amplexibus sæpenuerò circumvin-
ciatur. Reperitur hujus & multò alia, in exemplari
quo Marcellus Virgilius usus est, descriptio, & ap-
pellationes complurimæ: sed Ruellij & Cornarij e-
ditiones magis probanda. Plinius l. 21. c. 16. non de
hac Helxine, sed de Ixine scribit. Exemplaria perper-
am Helxine pro Ixine habent. Ixine verò Chama-
leon albus est.

De præsentī nostra planta Tragus verba facit, ubi
l. 2. c. 33. de Orobancha, sive Cusso altero Serapionis
agit. Inter vitia, ait, frugum non postremo loco ha-
betur id, quod Germani *Spy* seu *Windkraut* ap-
pellant, quam etiamnum Anginam seu Orobar-
chan quamdam esse iudico. Cū verò Orobanchæ
Dioscoridis descriptio huic non per omnia quad-
ret, iudicium candido le&ori committo. Videtur
sanè mihi quod præfens vitium altera Cusso Sera-
pionis sit, de quo c. 44. scribit, ac Lebleb vocat, h.e.
Volubilem minorem; German. *Blumwinden* vel
Schwartzwinden. Hæc ille. Id hic silentio præter-
eundum non est, cū Orobancha Diosc. semen in
cibo ob dulcedinem ejus, quam præ se fert, edatur;
hanc autem jumenta in cibo fastidiant, Dioscoridis
Orobanchen esse non posse. Hanc porro, quam
Ruell. & Tragus Orobanchen esse suspicantur,
Gesn. coll. & h. Convolvulo similem herbar. dicit
præterquam flore. Et licet is locis jam adductis O-
robanchen esse neget, attamen in cat. pl. non solum
Orobanchen nominat, sed ad imitationem Ruellij
cum ejusdem Teniæ, planta valde differente con-
fundit. Orobanchæ nominatur, inquit, quod Ervum
strangulet, Leontobotanos. Forsan hæc fuerit, quam
absurdissima quorundam imperitia, nescio unde,
Hypocistis audent appellare, in Parisiensi agro Te-
riam appellant. Cam. epit. & hist. habet figu-
ram novam cum campanulis sub inscriptione Hel-
xinæ cissampeli, vulgò Volubilis minoris. Huic au-
tem adscribit nomina linguarum Helxinæ cissam-
peli. Lugd. Helxine cissampelos Dod. B. phyt.
Convolv. sive minor semine triangulo: Eid. B. pin.
Smilax lævis 4, sive Convolv. minor sem. triangulo:
Volubilis media sive nigra, Thal. Volubilis nigra,
Tab. Ger. Fromentone alterum genus, Cæf.
Polygonum hederaceum, Colum.

Nascitur in cultis locis, arvis, vineis, fegeti-
bus, ac sepibus circa Montbelgardum, etiam in
horto E. C. Basilæ observavi mense Octobri se-
minibus maturis qua itur in Moutez, Gere-
væ passim florentem & semine turgentem Iurio.
Videmur tempore, autore Dod. semen perfric-
tur, ex quo, nec aliunde, primo Vere succrescit.
Tenia

Tenax pestis (ita enim ait Ruellius non abs re dici posse quidam putant) quodd non facile extricari possit, ideo græcæ agriculturæ authores remedia, adversus natales ejus exortus condiderunt. In arvis ut aiunt non prodibit, si in quatuor eorum angulis & medio Rhododaphnæ ramuli pangantur. hoc eodem remedio putant legumen omne à noxa vindicari. Qui volunt hanc frugum pestem proflus aboleri, quinque testas cretæ depingunt, Herculis effigiem leonem strangulantem, referentes, & in quatuor agrorum angulis atque in medio collocant. Sunt qui delineatam eo modo testam in area tantum media ut hanc amoliantur perniciem, jubeant obrui. Democritus affirmat Orobanchen herbam confectum abigi, si mulier quæ in menstruis est, solutis crinibus & nudo corpore, in vallibus in manibus tenens, aream circumeat. Ita validiora coalescere legumina testantur, qui hac superstitione sunt imbuti; quippe cum herba gallinaceum verens gallum, delitescat. Sunt, è græcis qui longâ probant experientia, quæ ferendo sunt legumina galli cruore conspersa, nullam ab hac adversante herba sentire penitus injuriam, eoque rorata à nocuentis tuta esse asserunt. Cavendum tamen ne quæ sementi destinantur legumina, bubulo cornu contingantur; sic enim inanità & cassâ valescere produnt.

Quodd si hæc planta alter Cuslus Serapionis, seu Trago videtur, fuerit, poterit in medicina usurpari (licet Cordus nullum illius esse usum tradat) præsertim verò ad tumores lienis, in aceto prius coctus, dein tusus, ac cataplasmatibus instar impositus, id quod non semel faciendum, sed sæpius repetendum. Quid verò præter hæc efficere valeat, usus quotidianus fortè docebit.

CONVOLVULVS PEREGRINVS

pulcher folio Beticæ.

CAP. XXXIII.



FLORIS cum Convolvulo similitudo facit ut hanc plantam, aliqui non congenerem superioribus, nec formâ illis respondentem subnectam. Peregrina est peregrini Convolvuli elegantia, in foliis potissimum spectanda, quæ ex viticulis proxima fulcra arripientibus tenuibus, pilosis, pedalis aut cubitalibus longis pediculis hæret, argentei coloris, splendido tomato villosa, infima quidem & radici (quæ tenuis summo cespite vagatur) proxima, Beticæ purpureæ foliis similia, sed multò minora, crispis serratisque marginibus, reliqua etiam laciniosa & profundè incisa, gummosa Clusio si gustentur, subactia & subamara; flores inter Helxines cissampeli & Smilacis levis flores medij, his minores, illis majores, purpurascetes, calathi formâ, ex continuo unico folio conflati, longis pediculis hærentes, quorum basin ambit folliculus ex pluribus foliis com-

Tom. II.

positus. Radix Clusio tenuis, exilis, fusca per summos cespites repit & subinde alias plantas producit.

Ad quam stirpem Veteribus descriptam referri hæc planta, cui à viticulis, vicinis fruticibus aut herbis se implicantibus, Convolvuli nomen Clusius hisp. & hist. indidit, ignorat: nisi quis fortè Iasio nem, cujus Plinius l. 22. c. 22. meminit, esse existimet. Valentini Convolvulum folio Althææ; Hispani vulgari nomine *Campanilla* i.e. Campanulam; Lusitani *Verdezilla* appellabant, & ad vulnera curanda vire, efficacissimam esse tradebant.

Lob. Obs. & ic. Convolvulus peregrinus Clusij, Synon. Convolvulus Scammonij facie, an Helxine cissampelos Dioscoridis? Advers. p. 274. Sed apud Advers. facie. scaria nullam ejusmodi plantam invenio. Non etiam intelligere possum, cur dicat Scammonij facie, nisi referat ad florem. Tab. Scammonium minus Plinij 2. Hein Scammonium. Hujus iconem Gerardus habet, ac Papaver cornutum luteum minus, *Papaver Small yellow horned poppie* inscribit. Lug. Convolvulus folio Althææ Clusij. B. phyt. Convol. 6. (pin. 9. aliis Helxine cissampelos.) sive argenteus Althææ folio, flore ex purpura candicante, interdum omnino purpurascens.

In collibus juxta Tagum flumen læto solo, in Bætica, plurimisque aliis Hispaniæ locis nascitur. Floret Martio & Aprili. Ad Tagum quidem, etiam Decembri florentem Clusius inveniebat. Mihi autem, cum essem Monspefuli, allata est mense Aprili ex monte Seti. Similem vidi apud D. Zvingerum Bafilæ foliis ferè pellucetibus.

CANTABRICA VETENBUS.

CAP. XXXIV.

IN Hispania, inquit Plin. l. 25. c. 8. inventa est Cantabrica, per Divi Augusti tempora, à Cantabris perta. Nascitur ubique, caule junceo pedali, in quo flosculi oblongi, velut calathi; in his semen perquam minutum. Ea cum Distanno & radice Aristolochiæ, in vini hemina sæpius bibenda, contra serpentium morsus.

Cantabricæ nomine diversæ plantæ ab authoribus indigitantur. Turnero enim Cantabrica Plinij est Caryophylleus, quæ nobis est Beticonica altissimi sativa, de qua pertractabimus lib. 29.

Lobelius in adv. videtur existimare Caryophyllos silvestres esse Cantabricam Plinij, de quibus jam dicto libro, sub Beticonica altissimi silvestri agemus.

Cantabrica (inquit in nominatus quidam) est fortè Aquilegia (de hac lib. 30.) licet Ruellius aliam demonstret, quam rura Colubrinam herbam vocant.

Sunt qui Cantabricam Plinij, teste Lugd. Convolvulum minimum Clusij esse putant. Vocamus hunc nos Volyulum terrestrem, quem mox describimus.

Cantabrica minor rotundifolia Lobelij in adv. Cantabrica Plinij Anguillæ, est nobis Campanula parva, cujus meminimus lib. 20.

Sed & Campanulam rotundifoliam minimam Cortusum, teste C. Bauh. phyt. Cantabricam Plinij nominat. Hæc qualis sit, vid. lib. proximè citato.

Herbam quoque Rapunculo spicato similem in Baldo, Cortusum Cantabricam alteram Anguillæ cognominat. Tradimus hanc libro jam scripto.

140

*Rheseda flo-
ribus albis*
*Rheseda lu-
tea.*

*Rheseda flo-
ribus albis*
*Rheseda lu-
tea.*

stris.

Varietas

*Flore Com-
Solvants.*

Consol m
numm (p
filiis.

Scammon.
um tenue
Flm
Cantabri.
ca

The vine
has
Lupinus.

Rarius inventu Convolv. minimus aliis regioni- *Locus ex*
bus quàm Gall. provinciz, Allobrogum & Norbo- *Tempus.*

na ad margines aridos satorum & Olivetorum, ubi
Junio & Julio florem promit. Frequens est multis
Hispania & Lusitania locis, Clusio. Postea illam
etiam inveniebat in colle Thermarum urbi, vulgò
Baden, imminenti, quarto ab urbe Viennâ Austriacâ
militari. Floret Maio & Junio, nonnunquam &
Autumno. Apud Belgas semine ex Hispaniis acce-
pto nata, non nisi Julio & Augusto, ubi nullum se-
men perficere observabat, tamen magnâ diligen-
tiâ testaceis conservatæ: calidioribus autem locis
spontè nascitur, semineque fert dictum. Nos eam
descriptimus anno 1561. collectam quaitur Mon-
spelio Castelnœuf secus viam florentem Vere. Qui-
dam Isationem putant. Frater in montibus Euganeis
inveniri indicavit, & purgare.

CAP. XXXV.

ΣΚΑΜΜΩΝΙΑ, ex autoritate Diofcoridis, ramos ab una radice profert multos [res, aut quatuor] Diofcoridis
varia.
 tricubitalis [τριπυλῆς Orib. ut ver. quatuor cubito-
 rum] pingues & quadantenus hirsutos [ἐξ αὐτοῦ ἵστος
 διὰ τὸν ὄτον: μακρὸν τε Ruell. nonnihil crassitudinis præ
 ferentes, sed priorem lectionem tener Serapio, qui suam
 hiforiam ex Diof. transcripsit] foliis iidem hirsutis
 Helixines [non Parietariae sed Cissampeli.] aut Hederæ
 similibus, sed mollioribus ac triangulari: floribus al-
 bis, rotundis, in modum calathorum [ἐστὶ οἱ ἡγάθοι:
 ver. quidam ἡγάθων] concavis & graveolentibus
 radice prælongâ [ἄμυμον, Orib. ἀμύμων] crassitudi-
 ne brachiali [Cissæ Orib. & Herm. ac vulg. codex cu-
 bitali, que lectio non placet, cum nunquam nisi im-
 propriè, dicatur aliquid esse crassitudine, sed longi-
 tudine cubitali. Sed & Serapio ineptè vertit, radice
 grossâ, sicut pollex] candidâ & gravis odoris, lactei-
 que fucci plenâ. Succus legitur hunc in modum:
 capite exempto radix ita cultro incavatur, ut exca-
 vatio sensim à latiore orbe in acutum desinat, pro-
 indeque in id cavum confluit succus, qui conchis
 demum excipitur. Alij postquam scrobes in ter-
 ra [Add. Lacuna ex ver. cod. καὶ τὴν πρὸς αὐτὸς ποτὶς θαλάσ-
 σος φορτίου. Orib. ἀνεκείσθαι. i. mortarii inistat] con-
 cemerato sinu effoderunt, juglandis folia inster-
 nunt, in quæ radices incise succus diffundatur, cūm-
 que inibi siccatum tandem auferunt. Bonitate Delectui
 præstat qui pellucidus est ac levis, rarus & colo-
 reglutini taurino similis, rimulis fistulifve tenui-
 bus, atque fungosus, qualis scilicet ex Myria re-
 gione Asia deportatur. Neque verò in proba- Adulter.
 tione animadvertere solum par est, utrum lingue rimum.
 tactu albescat: hoc enim evenit etiam admisto ti-
 thymali succo, sed longe magis antea commemor-
 atis attendendum est: itemque si non vehementer
 linguam exalfaciatur exurât, id quod & misti ti-
 thymali argumentum est. Natione autem Syria- Improbab.
 cus & Iudæicus determini habentur, graves, den- Diof. Sy-
 si, ervi farina & tithymalo adulterati. Succus dra- racam ex
 chmæ unus aut quaternum obolorum pondere Iudæicam.
 haustus ex aqua pura aut mulla, præ inferna bi- Succus defec-
 lem pituitumque extrahit. Solvendæ alij gratia,
 binos obolos cum Scfama aliôve semine sum-
 pisse sat est. Efficacioris etiam purgationis causâ
 dantur

dantur fucci tres oboli, cum Vetatri nigri duobus, & Aloës drachma una. Fiunt & purgatorii sales, drachmis viginti fucci Scammoniaz in fenos salis cyathos adjectis. Horum modus proportionem virium: integer quidem, cochlearia tria: medius, duo: minimus, unus. Purgat & radicis drachma una aut altera cum iis quæ retulimus. Ipsius quoque decoctum nonnulli ebibunt. Ex eadem decocta in aceto contritaque cum hordeacea farina, cataplasma fit ischiadicis utile. Succus autem vulvæ appositus in lanna, partus enecat: tubercula quoque discutit, cum melle oleoqve perunctus. Eodem decocto in aceto illitæ lepræ auferuntur. Sed & eodem caput contra diuturnum dolorem ex aceto & rosaceo irrigatur. Vinum Scammoniaz ita fit. Radicis Scammoniaz per menses effusæ trita & linteo illigata drach. xv. in triginta congiugium unum mittitur ad dies triginta. Purgat hoc alvum, ac bilem & pituitam detrahit.

Scammonium, quod est Scammoniaz fuccus, copiosum quidem in Italiam advehitur, præsertim Venetias, quo ex Alexandria Ægypti & Syria importatur: sed quod probatissimum sit, rarum admodum invenitur, nec unquam fectum esse, ingenue fatetur Matthiolus. Quod autem Scammonium illud, quo omnes ferè officinæ refertæ sunt, Tithymali succo fit vitia: tum, hinc liquidd patere arbitrat quoddam decem vel quindecim ejus grana alvum pluries resolvant, cum sinceri drachma, Dioscoridis testimonio, id vix præstare possit. Plantam è cuius radice Scammonium colligitur, vidit primò Neapoli, allatam (ut quidam Sephasianus assererat) ex Gargano Apuliz monte, quæ omnibus notis ejus quidem judicio, legitimam Scammoniam referrebat. Sed profectò mirari nobis subit, quod Matth. in comm. it. non amplius Scammoniaz Gargani montis meminerit, sed aliam tradat, depingat, ac Constantiнопoli missam esse dicat. Hanc (Scammoniam Syriacam intelligit) ostendit etiam esse in annotationibus Andrea Martinelli supra Mesum depictam.

Ignorantem & incipium herbarum le Euchi. Roesslin ostendit, dum arborem Scammonem facit, & liquorem ejus succum arboris cognominat, cum nec frutex sit, sed herba, id quod Plinius his verbis docet, Scammonium quoque dissolutionem stomachi facit, bilem detrahit, alvum solvit, præterquam si adjectum aloës drachmæ duæ obolis ejus duobus. Est autem succus herbæ à radice ramosa, pinguis foliis, triangulis, albis, radice crassa, madida, nauseosa. Nascitur pingui solo. Radix circa canis ortum excavatur, ut in ipsam confluat succus: qui sole siccatus digeritur in pastillos. Siccatur & ipsa, vel cortex. Laudatur Colophonium natione Myrium, Priense: specie autem nitidum, & quàm similitudinem taurino glutini, fungo tum tenuissimis fistulis, citò liquefens, virus redolens, gummosum, lingue taci lactescens [hoc signum fallax & incertum esse Dioscorid. tradit] quàm levissimum, quàm diluiri albescens. - Hoc evenit & adulterino, quod fit ervi farina, & Tithymali marini succo, in Iudæa ferè, quod etiam strangulat sumptum. Deprehenditur gustu. Tithymalus enim linguam exalfacit. Vfus bimo, nec ante, nec postea utile. Dedere & per se ex aqua, vel aqua mulla, & sale, quaternis obolis. Sed utilissimè cū aloës, ita ut incipieret purgatione multum bibatur. Fit & decoctum radicis in aceto crassitudinem mellis, quo lepra illinuntur. Et caput ungatur in dolore cum oleo. Hæc Plin. quæ multum faciunt ad Dioscorid. intelligendum. Faciunt & ad Plinij lectionem rectam. Sunt enim de veteri codice transscripta. Nam vulgata exemplaria tribus locis emendant. Primò ubi dissolutionem stomachi legitur, in vulgatis stomachi vox in totum deest: Secundo ubi

Tom. II.

ervi farina habetur, in vulgatis herbæ farinâ falsò legitur. Tertiò ubi usus bimo legitur, pro eo vulgata exempla habent, Bulbi mōre: quam lectionem falsam esse, sequentia verba declarant: nec ante, nec postea utile: quæ neque ad Bulbum referri possunt, sicut neque Bulbus ad Tithymalum, de quo præcedit quoddam linguam exalfacit. Hoc tamen de Scammoniaz succo Dioscorid. nō tradidit, quoddam usus bimo sit, ut nec ante, nec postea utilis sit. Et profectò ego hodie novi in quibusdam officinis usum ejus ad decem annos servari. Et scribit Arabs Mesues Scammoniam per annos duodecim conservari. Scammonium Syriacum licet Dioscorid. improbetur, Plinius tamen contrarium sentire videtur. Commendatur enim illi præter Myrium & Colophonium, etiam Priense, quæ Priene civitas Syriæ est. Mesues Antiochenum & Armenicum laudat, Corascenum vituperat. Galenus in Simplicium censu Scammoniam præterit. Paulus Scammonia, inquit, eadem & discultriam, & biliosa extergentem vim habet, & magis succos, qui etiam tubercula discutit, & fetus necat appositus, & lepras exterit. Et in diuturno capitis dolore, caput ex eo cum aceto & rosaceo irrigatur. Sed & radix potè purgat, tum ipsa, tum decoctum ejus. At cum aceto & farina hordeacea cocta, ischiadicis imponitur. Idem 1.7. c.4. Scammonia, inquit, similiter ut veratrum purgat, & magis flavam bilem. Verum magis quàm omnia purgatoria, stomacho noxia est. Detur itaque non febrientibus, & stomacho bene affectis, pondere colorum quatuor cum sale, aut pipere, aut zingiberè, aut quodam oxyporo citò transeunte, stomacho grato, aut cum melle. Fiant & cataplasma cum gummi. Aëtius 1.1. c.25. ferè eadem habet. Et addit, ammiscetur ipsi sal, & thymi coma, aut pulegium. In his verò qui ferre possunt, præstat Aloën miscere. Datur & per se cum melle, aut pisanæ succo, si clanculum exhibere volumus. Et hi ambo Scammoniaz nomine succum solum intelligunt, & non radicem, aut herbam ipsam. Et hunc etiam solum utilem Theophrastus hist. dicit, & aliud nihil, τὸ δὲ σκαμμονιάς, inquit, ἐστὶν ὁ μόνος χρηστὸς, ἄλλο δ' οὐδέν. Recentiores Græci Scammoniam vocant σκαμμόνιον, i. e. lathy-

Scammonij
durario
Scammonij
delectus.Tempera-
mentum.Scammonij
correctio.Dacty-
limum.Conferitur
Scammonij
cum anti-
quorum.

aut maiorem aliquam dosim præscribunt, purum & merum succum imperant. Purgat Scammonij succus per inferiorem ventrem vehementer, nulli aliorum purgantium medicamentorum potentia cedens. Nulla enim parte, ut Oribasius ait, superatur ab iis quæ agitant & commovent. Efficit istud non vehementer aliqua calida facultate; sed aliâ quadam latente totius substantiæ proprietate. Nam gustu quidem nulla in eo caloris vehementia deprehenditur. Cuiusque siquidem liquori aut rei permisceatur, nullam ei vel amaritudinem, vel acrimoniam, aut alium ingratum saporem communicat. Quamobrem nec inter calidissima, ut plerisque videtur, sed inter moderatius calida & sicca habendum censet Dodonæus. Extergit autem & educit potissimum bilem flavam; serosos item tenuisque humores, & quandoque pituitam, ventriculo tamen magis, quam reliqua omnia medicamenta, ut Paulus tradit, noxium est Scammonium. Mefues verò non modò ventriculo grave atque molestum, verùm & intestina ipsum abraderet; interna viscera eroderet; venarum ora dilatare, totiusque huius substantiæ essentia cordi visceribusque reliquis obesse sentit. Immoderatum & minus oportunitate circa ejus usum animi sequuntur deliquia, ventriculi subversiones, alvi fluores, dysenteria & tenesmi. Occurritur his malis, eodem auctore, si Scammonium in cotoneo malo decoquatur; & mucagine psyllij, prunorum carne aut succo, aliisve lentis similiter succis permisceatur, addita mastiche, aut aliquo ex moderatè astringentibus. Plinius noxam ejus tolli posse affirmat admixtâ Aloë: Veteres Scammonium in malo cotoneo etiam decoderunt, sed omisso Scammonio ipsum malum edendum præbuerunt, quod absque stomachi subversione alvum subduxit: ut lib. 1. de facult. lib. 1. Galenus scribit: & de simpl. Quinque de causis corporibus læsiones inferre potest. Prima est, quod status quosdam mordaces gignit, ulque adeò ventriculum lacessentes, ut sumentibus nauseam commoveat. Nota hæc tollitur, si in excavato cydonio malo, clibano, aut prunis inassetur, pastâ undique circumlitâ: præsertim additis aut feniculi, aut dauci, aut apij semine, aut galangâ. Inflammata deinde ac redinis exuperantia corporis spiritus: quò fit, ut facile febris excitet, iis præcipuè qui obstructionibus viscerum, & humoribus putrescentibus obnoxij sunt. Sed id nocuenti aufertur, admixtis inter coquendum, quæ refrigerant, & fervorem extinguunt: cujusmodi est psyllij seminis spissamentum, prunorum decoctum, seu potiùs pulpa, rosarum & violarum succus, aut dilutum, aut aqua: quin etiam antè coctionem maceratur oleo rosaceo, aut violaceo, aut cotoneorum misti saporis succo, aut admixto rhoë, aut factivo spodio. Ad hæc, quòd magnâ tum attrahendum aperiendi facultate sit præditum, immoderatas alvi fluxiones facit: vasorum enim oscula plus quàm par sit, aperit. Hæc læsio admixtis rebus adstringentibus, cohibentibusque, nempe mastiche, cydoniis malis, succoque ab eis expresso, & myrobalanis, præsertim flavis. Abradit præterea acti succo, quo scætet, intestina: proinde & tormina, & dysenteriam, & tenesmum excitat. Sed deletur hoc incommodum additis humidis pinguibus, lentisque medicamentis: cujusmodi sunt tragacanthum, bdellium, amygdalinum oleum aut rosaceum: item prunorum pulpa per se, aut saccharo asservata, psyllij spissamentum, mastiche, cydoniorum mala post sumpta, & calida aqua post bibita: utpote quæ medicamentum oculis à ventriculo & intestinis expellant, & ita simul noxam prohibeant. Hinc est, quòd prudentes Medici, quòd celeris Scammonium à ventriculo & intestinis deiciant, hordei iustum cum saccharo superbiben-

dum præbent. Obest postremò Scammonium cordi, jecori, ac ventriculo substantiæ suæ totius proprietate. Vitium hoc aboletur, si illi tum calida, tum frigida admisceantur medicamenta, quæ cordi, jecori, ventriculoque opem suam præstant. Deicit Scammonium valentissimè bilem, quam à valis & à sanguine exhaurit. Ejus deiciendi facultas haud sanè aliis medicamentis abfimilis est, quæ purgant cum labore & molestia.

De dosi Scammonij non consentiunt auctores, De dosi Scammonij nam Scammonium posse ad 3. usque tutò dari censuit Dioscorides, quamvis rursum dicat posse interdum satis esse 3. s. ut liberalis fiat purgatio: duos verò obulos, h. e. scrupulum, posse commode alvum cieri. Videtur itaque dosin ejus esse à 3. ad 3. Paulus verò ait dandos esse iij. obulos, cum quo Aëtius & Actuarius consentiunt. Rufus usque ad 3. j. & radices usque ad 3. j. exhibet. Mefue tamen, quem omnes ferme juniores sequuti sunt, non audeat 3. dare, imò consilium non esse excedenda grana xij. sicuti minimum, quod dari possit, ut ventrem solvat voluit iij. esse grana. Eum autem loquutum esse puto propriè de Diagridio, de quo mox. Videtis igitur quanta sit varietas scriptorum. Vnde non est mirum, quod Avicenna admittit varietatem ponderum in hoc medicamento, quam varietatem ipse refert ad varietatem locorum, nam Dioscorides fortasse exhibet unam drachmam illius Scammonij, quod mite erat, & ortum in miti loco: vel quia Scammonium illud erat mite si non ratione loci, saltè ob vetustatem. Sed sit utuncque. Ego scio (inquit Fallop.) quod Scammonium aliquando exhibitum in pauca quantitate non evacuat: aliquando in pauca exhibitum evacuat præter modum: aliquodè è contra: unde nescio quid dicam de dosi hujus medicamenti: consulo tamen vobis, ut semper exhibeatis paucam quantitatem, quæ quantitas sit potius pro calculi: vocatur autem Calcar pauca Scammonij quantitas addita medicamenti purgantis pro rusticis, vel pro aliis robustioribus, & cervicosis quibusdam hominibus, quibus nihil fuisse videtur factum, nisi phamacum eduxerit usque ad ultimum, & plurimum ut ita dicam cacarint: & ideò phamacia pro hujusmodi hominibus debent habere calcaria, qualia etiam debent esse phamacia pro Monachis, & eò magis quia difficile in ipsis sit evacuatio, quoniam cum velcatur malis cibariis semper abundant crassis excrementis, & viscidis humoribus. Vnde præparetis quantum velitis, semper tamen difficile movetur. Itaque utamini semper pauca quantitate Scammonij, & stetis potiùs in dosi Mefue, quam etiam non excedetis, quàm in dosi Gregorum, quos nolim ut in hac re imitemini. Tractatus qui pro quo, Scammoniz loco aut Cucumerem agrestem, aut lac Tithymali, aut Euphorbium accipit. Sed Sylvius in Antibal. Scammonio deficiente, Ricinum probat.

Scammonia, quam Diosc. describit, paulò diversa est, attestante Cæsalpino, à Scammonia ejus, Floribus ex candido pallefcentibus, ex semine à Syria misso enata. Est hæc nobis Scammonia Syriaca flore majore Convolvuli.

Scammoniam aliam quandam Monspelij ostendunt, Scammonia Monspelica, à Gess. h. (qui portionem pingit in figura adhibita Scammonia Cordi) Clus. Lob. Cam. & nobis vocata, cujus est & altera varietas.

Ægyptij quoque suam Secamone[m] (Apocyn. aff. Apocyn. aff. nem) Scammonij speciem affirmant.

Cameratio apud Matth. germ. lib. 4. cap. 8. Volubilis five Convolvulus major videtur genus Scammoniz.

Scammonia tenuis Plinii, ita tradentibus Cordo in Diosc.

Scammonium modè calidum.

Scammonij noxa.

Scammonij correctio.

Flatuum mordaces gignit.

Inflammat spiritum.

Nimum movet alvum.

Abradit intestina.

Obest cordi

Auctores de dosi Scammonij ut interpretantur

Calcar majus

Subfistula

Aequivalens Scammonia Syriaca flore majore Convolvuli.

Scammonia Monspelica.

Apocyn. aff. Apocyn. aff. nem) Scammoniz major.

in Diosc. Ang. Cam. h. & Cæl. nihil aliud est, quam Helxine Cissampelos.

Planta, quam Tab. pro Scammonio minore exhibit, est nobis Volvulus terrestris.

Idem jam dictus autor exhibet & secundum Scammonium minus Plinij, quod Convolvulum peregrinum inferebimus.

Testis est Cæsalpinus alterum genus pro Scammonia ostendi foliis subhirsutis flore cæruleo, quam Mefues Volubilem lanuginosum vocet. An hæc Nil Arabum quibusdam.

Mechoaca Scammonij species, & non temerè quidem, ait Dodonæus, creditur. Ob malafymptomata, quæ excitat Mechoacan genus silvestre, Scammonium à Monarde vocatur. Vide Mechoaca. Et de his omnibus præter libro pertractatur.

Scammonium dici de Thapfia Diofcoridis l. 4. autor est Tragus l. c. 8. & Brunfels in Onomastico. De hac nos lib. 27.

SCAMMONIA SYRIACA FLORE majore Convolvuli.

E Syria delata Scammonia, etiam nostro æstuereit solo, licet nullum ad ecchyosin studium ad junctum: profert autem è radice longa, crassa, lacteo succo prægnante, multas aliquot cubitorum viticulas, proximis nudicis sese convolventes scandentesque; folia triangularia ceu hastilis barbatus, mucro, Smilacis laevis æmula, sed minora, glabra, tenuia; flores calathoides nonnihil purpureascentes, Helxines cissampeli floribus proximi.



Descri. Cæs.

Hanc ita describit Cæsalpinus. Tenuis viticulas

fert, bicubitales: foliis triangularibus, effigie sagittarum, parvis: flores ex candido pallescentes: fructus veluti pinguedine obductos, in quibus femina nigricantia: radicem grandem Raaphano similem, succosam.

De Scammonia nostra Syriaca Cordum loqui fupicatur, si folia non diceret spinosa in hist. l. 4. c. 109. cum ait. Scammonia est, cujus liquor est Scammonium, Convolvulo per omnia similis, quantum ad viticulas, flores, lacteum liquorem & qualitates attinet: folia quoque ab hujus foliis parum discrepant; sunt enim ipsius foliis similia, sed pilosa, triangularia, atque in alata sagittæ figuram redacta. De radice prius dixerat in Diosc. majorem esse Convolvuli radice. Et hinc etiam Cissampelum, tenuem Scammoniam vocari, quoniam multò tenuiorem radicem, quam Scammonia habeat. Verùm hæc descriptio Cordi ex Diofcoride concinnata est. Figura quidem malè picta aliquatenus nostram Scammoniam Syriacam exprimit: ramus verò appictus, nō est Scammonia Cordi, sed Monspeliensis. Quintam speciem Volvuli Mefues, esse plantam illam scribit Fallopius, ex cujus radice emanet Scammonium. Græci (inquit Dodon. purg. & hist.) σκαμμόνιον, Latini ferè Scammonium nominant; ita appellantes non modò stirpem ipsam, sed & densatam concretumque succum. Dicitur & à nonnullis σκαμμόνιον, à σκαμ, ab aliis

καμνός, officinæ succum crudum quidem Scammoniam; in cotoneo verò malo decoctum, Diagridium vocant: quasi διακριθὲν, i. e. lactymulam. Est verò ipsum Scammonium (ut cap. de Campana carulea affirmat) nihil aliud, quam species Smilacis laevis, radice crassa. Lactariam hanc, scanforiamque Volvulam (unde fortè, Lobelio advers. nomen Volvulo fuit) solo penicillo commentatoris pictor exprefit.

Cum tamen pauca sint plantæ, quas de facie & facultatibus, penitus notas habere, magis interfit boni Medici, & Pharmacopœi, quam Scammonium hoc Syriacum, Antiochenum & Norbonense. Anno igitur 1562. indefessus ille herbarum novarum vestigator Venetus pharmacopœus Sequinus Martinellus, ex Syriaco Alepo miserat plusquam centum libras glebæ Scammonij Antiocheni succi concreti, cui exprimendo interfuerat: corthas etiam non paucas lachrymâ plenas, seu Diagredio antiquorū, cum seminibus angulosis Volubilis. Hæc femina tum Patavij & Venetiis primo Vere temè mandata; in luculentam Volubilem, seu Volvulum abiit, adeo sinuosis Smilacis foliis, triquetris, vel potius Cissampeli foliis, floribus, & facie, ut planè nostræ Cissampelo eandem dixisses: verum radice insigni fuit, & mole grandem Bryoniæ radicem æquante atque teneritudine simulante: foris tamen pulla, aut cinerica, intus albidâ carne: cujus fissæ torulus sive cor medium exemptum, planè idem est, aut simile radici communis & probatoris Turbith officinarum: verum facilius aliquantò frangitur hæc, tametsi perinde gummosa succoque lacteo prægnat, atque Turbith. Hanc eandem postea Antuerpiæ, quò semen miseramus ferendo meminimus, speciosam factam, floribus & viticulis quinum & senum cubitorum, prorsum nihil diversam, cujus Guilielmus Dries, non minus peritus pharmacopœus, quam probus civis Antuerpianus, adnata, radicūque; pululationes excisas, exciscatæque ostentabat, adeo Turbith Alexandrinum ementita, ut discriminis perparum, aut nihil percipi posset. Hæc Lob. adv. Syon.

qui in obs. figuram habet eandem cum Dodonæo, titulo Scammonij, Adv. 272. In ic. vocat Scammonium syriacum; antiochenum, & Scammoneum. Gesn. h. est Scammonia & Syria allata. Ang. & C. B. (cui prima) Scammonea Syriaca. Cam. h. Scammonea Antiochena: Eid. hist. & epit. ut & Lon. & Cast. Scammonia. Rauv. Scammonium verum. Cæl. Scammonia floribus ex candido pallescentibus, ex semine è Syria misso nata. Matth. in comm. cum mag. fig. Scammonia. Lugd. Scammonia Matthioli.

Habui Lugduni, Genevæ & Montbelgardi in hortic. Basileæ in horto D. Plateri florebat Junio, & Julio, Augusto, & Septembri. is hieme recondebatur. In calidis, pingui exit solo, veluti in Afz Myfia, Syria, aliisque similibus. Reperitur & in Creta insula, Bellonio teste. Verisimile est, ubi suæ spontis est, citò & plurimâ deinde æstatis parte florere: nam & in Belgio, ut Dod. tradit, æstivis mensibus subinde cum flore videri potest. Scammonia Antiochena Camerario aliquot annos duravit asservata in fistilibus per hyemem, & æstatis initio floruit, sed femina nunquam absolvit.

Meminit idem Cortusum patritium patavinum, rerum naturalium summum indagatorem ex crassiss radicibus aliquot uncias succi extraxisse. Aiunt si propè Tithymalum feratur, adeo ejus caliditatem accendi, ut veneni naturam acquirat. Hujus tamen liquor caloris acrimoniæque vi per ætatem amissâ benignior nonnihil evadit. Quod verò non eas notas habet Scammoneum, quales illi Diosc. tribuit, causâ esse putatur, quod hoc tempore non obferent veterem parandi modum, ac non ex incisa, sed dissecta prorsus vel expressa radice, aut è supitibus & foliis contulis paratur: alioqui tanta copia Scam-

monij quo pacto quotannis ad nos adferri possit vel etiam lacte Tithymali sapienti adulterant. Pulcre mercuriale alicubi Ruellius inquit. Nulla medicina pars interior, quam quæ ab alio arbe quam nostro petitur.

SCAMMONIVM SVCCVS SCAMMONÆ DENFATUS.

Deser.

Vlnerat Scammonæ succus emanans lacteus concretus qui in magnas massas coagulatus importatur, tophosus & satis levis taurini glutinis instar nitidas & veluti pelluentes, colore fulvo, nigricante aut cinereo, atque is quidem color poussimum elucet in pulvere, in quem levi digitorum attritu fiat, odore nauseoso, sapore amaricante & mediocriter acri.

Diagridium quia & c. in præparatio, per concoctionem.

Scammonium, succus Scammonæ denfatus, per coctionem, aut etiam per macerationem paratus Diagridium appellatur. Confectio autem ejus per concoctionem hæc est. Accipitur cotoneum, extrahiturque durior ejus illa pars media, quæ semina continet (recisa tamen superiori prius laminâ) cujus loco in excavatam partem Scammonium inditur: mox laminâ, quæ prius fuerat recisa, pro cooperculo additâ cooperitur, utriusque palâ circumquaque malo cotoneo obducitur, ac ita coquitur in dybano, h. e. vase fictili crudo. Quidam tamen succo ex cotoneis expresso, Scammonium macerant, ac Diagridium parant. Accipiunt autem Scammonij partes duas, succi cydoniorum partem unam, miscert probè, ponunt in locum calidum & quotidie movent, donec mediocriter induretur ejus massa: deinde formant pastillos, eosque quantum satis est exsiccant. Alij alium probant modum, & quidem ex malis communibus, ita, ut acceptâ ollâ, aut testaceo mundo vase, males primò furdum ad digitalem crassitiem sternant, mox itidem tartundem Scammonij superponant, & sic subit donec vas plenum fuerit. Mox autem carbonibus accensis, ac in camino posito vase eoque optimè triticâ massâ operito, quantum satis sit, coquant. Satis autem cocta dicuntur, cum mala duruerint. Ex cotoneis autem, quàm ex aliis malis per coctionem tutior & cum minori molestia fit purgatio. Quare & amplior ejus dosi sumi potest. Ac rursum magis ex aliis malis, quàm ex maceratione in succo cydoniorum. Sicut & magis ad purgationem videtur facere, cum ex hoc succo paratum est, quàm si sine hoc detur. De dosi hujus ac etiam facultatibus vide plura ante.

Medus alius.

Officinæ Scammonium præparatum, quod ut diximus Diagridium vocant, compositionibus ferè omnibus, crudi ac non præparati Scammonij loco admiscetur. De hujus dosi loquutum putamus Mesuem.

NIL ARABVM QVIBVSDAM, sive Convolvulus cæruleus. CAP. XXXVI.


Deser.

Cæruleus Convolvulus tortilibus viticulis, tomentosis, proxima quaque, attriptions, in altum nititur, texturis topiatis perdoneus, nisi longiorum vitam teneritudo, frigorum malè patier s negasset: folia palmum circiter lata, paulò longiora, formâ hederacæ, in tres acutas lacinias sinuantur, laruginosa, colore ex herbido in flavum vergente, priora ad folia Sigilli B. Matris accedunt; folia Lob. ternis argulis singula, in teneriusculis pediculis: flores Smilacis levis, cyano colore adblinduntur, extra tamen in singulas quinque laciniarum zona excurrit albida, quo etiam colore totum floris in-

Folio hederæ.

Smilacis levis.

fundibulum tam extrâ, quàm intra tingitur, quinis folis herbæ concoloribus obvallatum, in quo stammina & apices latei altè reconduntur; flores Dodonæo sunt velati Smilacis levis instar campanulæ, sed per oras angulosi, & colore in caruleo purpureis floribus Lob. è pediculis calice exsertibus, lalmini aut calmini flori.



Vincè pervincæ si re. milibus sed ora quinis stellatum pminentibus angulis. Nola caruleæ vel asureæ effigies; semen nigricans Dodon. radix subest parva, fibrosa (gracilis, longa, Lob.)

lignosis nervulis fractu contumacibus trita, Cicladamen, Hederæve annosam imitata, nonnihil hirsuta.

De hac planta hæc Serapio. Habel, i. e. Nil, est Habel granum Indicum [granum Nil, Caranum, Indum, H. d. x.] cuius planta, autore Isaac Eben. Amran, similis est plantæ Lebleb, adherens arboribus duobus brachiis, vel tribus, habens ramos & folia viridia, & in radice cujusque folij florem coloris purpurei, similem pomulis in figura sua, quo decedente apparet semen in vaginis, in quibus latitant tria grana, minor grana Staphisagrie, levia, tribus paribus divisa, & ista grana sunt id quod de ea administratur in medicina. Hujus etiam meminit Bellunenensis in interp. in Avicidets. Habel Almesachin est herba quæ dicitur Funis pauperum, & est species Lebleb. Granum Nil est semen nigrum repertum in planta Volubilis cujus flos habet colorem azurum: & figuram Campanellæ simlem, terdenti mad longitudoem aliquam, & hujusmodi planta non est herba, ex qua Nil seu Indicum [sine hac est, & est folium Nil ex s. sine non ex] exornitur s. aut, ex q. consuevit ludum tingens est. conficitur ut quidam putant, sed est species Volubilis nota, & semen hujus plantæ granum Nil, in Oriente administratur ad evacuandum humores grossos phlegmaticos & melar cholicos, sicut ait Avicenna à quo in cura vermium administratur. Ex quibus ita dictis vel me taceret facile judicatu est, opinionem Tagaultij non esse recipiendam, dicens in l. can. Mesue, Nil erat unum esse istudem Græcorum, & vulgò Gallis passim Gueida, du G. eide dicit herbam notissimam, quâ in fœtores utantur in tingerdis pannis. Addam tamen verbis Belluneris argumentum ex ipso Mesue desumptum quo Tagaultij opinio sufficiens refelli videtur, nempe quod istudis semen vix possit mensurari pleno & vacuo: quum admodum compressum sit, nec quicquam simile habeat, cum reliquis fructibus, quâ Mesue loco jam citato recensentur.

Hæc est illa planta, quæ à Monachis in Mes. Vo. Volubilis lubilis cærulea nominatur, cuius semen Bellunenensis cærulea, dicit esse Granum Nil. Adod. gall. dicitur Lifer, n. ble; Cor jugulum nigrum. Dod. pure, & hist. (ubi eam pingit & describit) dicit accedere lævium Convolvulorum numero, optimè etiam exprimere C. m. panam cæruleam vocatam vulgò Campanam l. zu. Campana ram, & Convolvulum cæruleum dici recentioribus; exiliman autem l. guttrum esse nigrum, C. alium, l. isultram lib. ro. Nec sine ratione, quandoquidem Smilax læ-nigrum.

vis

vis major etiam album dicatur Lignstrum. Nam è caruleo purpureo colore subinde nigrum dici: veluti Viola nigra. Esse autem qui hanc Campanam granum Nil Avicennæ esse velint, c. 306. differens quidem ab eo Nil, quod describitur c. 512. Istud enim Isatis Græcorum esse; illud verò peregrinam ac Indicam stirpem: ut non modò Avicenna, sed & Serapio testetur.

Non desunt & aliæ Convolvulorum species, quæ ad Nil quoque Avicennæ referuntur, unicaulis, spinulis asper, alter absq; illis. Sed Mechoaca quoq; potest & Nil, & Scammonium Americanum esse. Anil etiam Arabum & Turcarum in Guzaræ à plerisque Nil vocatur. Nil tandem Germanorū, Pöpholix est.

Nunc quod ad nos attinet per Granum Nil Arabum quibusdam dictum præsentem intelligimus plantam. Lob. in adv. hanc intelligit per Alureum faum, sive caruleum Convolvulum hederaceum, vel similaceum, exoticum, quem in Ic. pingit eodem titulo: in obs. autem inscriptione Afurei; sive carulei Convolvuli, Campanulæ lasuræ herbariorum, adv. 274. Noctu florentis Pleutonariæ dictæ.

Gesl. h. Convolvulus peregrinus, vel caruleus, Nil Arabum. Tab. Ger. Cast. & Cam. h. Convolv. caruleus; de quo hic ait: Nil Arabum, vel potiùs Habal Nil Serapionis, Latine granum Indicum. Hasmilen circa Alepum ubi multum crescit, Persis Acafia, Italis Campanula Azurea aut flor di notte: quia noctu potissimum floret, sole oriente clauditur.

Lug. Volutus ceruleus, sive Campana Azura Lobelij. Dod. (ut ait Lug.) quidam Pothon caruleum Theophrasti esse credunt, ornamento & umbraculis sepulchrorum laudatum antiquitùs. Alij Pothon illum esse malunt Convolvulum purpureum duplicem Cortusij.

C.B. Convol. 5. sive caruleus hederaceo anguloso folio: Smilax carulea Dod. gall. [non invenio ita ab eo vocari] sine iconè. Scammonia similis flore caruleo, Ang. Nil Arabum, Eyf. Campana carulea, Dod. Bry. Convolvuli alterum genus, quod pro Scammonio ostenditur, Cæf. Campanula carulea hederaceo folio, Svver. Quibusdam Pothos caruleus Theophrasti: quibusdam Volubilis lanuginosa Mesuei.

Montbelgardi in horto E.C. floret Augusto & sequentibus mensibus, non facile autem maturescit semen. Hæc, inquit Lobelius, non nisi hortis Italia, Gallia & Belgia nota, ubi amonâ purpurâ porrectis attestique secus parietes & perticas funibus viticis, gracilibus, umbracula concinnant, atque fornices visu per jucunda. Peregrinam hanc stirpem, & aliunde illatam sub fine ætatis, si calida, fervensque fuerit, in Belgio flores facere scribit Dodonæus. Gesnero flores ephemeri sunt: noctu enim se aperiant (unde florem noctis vulgo quidam in Italia nominant) postredie vi foliis pereunt. Satus variè provenit, nunc infra palmi altitudinem consistens, at florens tamen: nunc altius excresecens, semel etiam ad cubitos fere novem, quæ planta semen initio autumnû maturavit.

Granorum Habel Nil in medicina, ut autor est Serapio, proprietates est (ex Aben Mesuai) laxare phlegma, & mundificare ipsum. Preparatio ejus est, quod benè teratur, miscetur cum oleo amygdalarum dulcium. Et melius ex eo novum, ponderosum, & non stypticum in sapore suo: & dosis à quatuor Kirat usque ad octo. Granum Nil (ex Habib) est cartamum Indum, calidum & siccum in primo gradu, & habet hoc, quod quando miscetur cum medicinis, facit motam in intestino duodeno, atque in illo quod sequitur ipsum, & est propinquum melaicis, & facit ibi punctiones, & quum sumitur in potu solum, non laxat eadem die, nisi completis viginû

quatuor horis post ejusunctionem, & quando admiscetur ei Scammonea, facit ipsum descendere, & tunc laxat phlegma viscosum, & operatio ejus est etiam in educendo cholera, & fortassis accidunt ex potu ejus juvenibus stypticitas in ore stomachi, & torsiones magnæ, & si nimis sumperint, faciet eos evomere, & fortassis inducit tenasmonem. Et dosis ejus cum aliis medicinis est drach. semis, sed simplex nunquam vidi dari in potu, nisi admiscetur ei Scammonea, quia juvat ipsum ad expellendum phlegma, & cholera, quoniam ipsum expellit humores duorum diversorum colorum per secessum. Grani Nil semen, ut Bellunenſis testatur, in Oriente administratur ad evacuandum humores grossos, phlegmaticos & melancholicos sicut dicit Avicenn. 2. can. qui Granum Nil, Carthamum Indum esse dicit, ac calidum siccum primo ordine statuit.

CAMPANULA INDICA.



Congener videtur rara hæc Campanula, ei quam Nil Avicennæ nupserum quidam esse volunt, tortilibus flagellis hirsutis rubescentibus circum perticas convolutis in altum nitens; folia hederacea sive Cyclamini, acuminata, qualia nepe primum pululantia esse solent Campanulæ lazuræ sive Nil Avicennæ, ad pediculum uncia longiorum, rubetem, hirsutum, falcata, subtus supraque pilosa;

flores campanulati seu calathi formâ, calyci insident in quinque acutas lacinias diviso, villoso, nigricanti, plures simul juncti ferè, pediculo ex foliorum ala prodeunte.

Primum visa Argentinæ apud D. Fridericū Meier qui Campanulam Indicam nominabat, nobis etiam Montbelgardo in horto E.C. provenit aliquoties, sed non maturavit semen.

An B. pin. Smilax lævis 7. sive Convolvulus folio subrotundo: qui 1. in prod. Convolvuli species altera, quæ ad Nil Avicennæ referri potest, Dodon. Campanula azura, Svver. Campanula Indica purpureo-violacea, Bry. Convolvulus Indicus flore violaceo, Eyf.

CONVOLVULVS BONA NOX

dictus, flore candido, grandis.

Scribit Clusius l. 2. exot. c. 18. se à doctiss. Viro Simone de Tovar urbis illius primario Medico inter fructus exoticos anno 1596. Hispani delatos, tertium accepisse, cui magna affinitas erat cum Convolvuli aliquo genere, quòd tota facies respondere videbatur, licet longè major esset, quàm ullus similis generis ipsi unquam conspectus. Etenim calix qui florem continuerat, quinque foliis unciæ ferè longis & latis invicem amplectentibus constabat, ut in Cappariis quibus includebatur caput trigonum membranaceum, tria grana in ta magnorum pif-

rum continens, coloris ex fusco cineracei, & penè fuliginosi; tres autem flores ex longis pediculis dependentes crassiusculo ramo in hæc ille apparebant; similia porro grana illo ipso anno ab eo Convolvuli peregrini appellatione, his additis verbis, accipiebat Clusius.

*Convolvuli
peregrinus.*

*Buenas
noches.*



Folia.



Caules.

*Spinula,
Flores.*

*Planta ex
seminibus
data.*

Sarmenta.

Folia.

Semina.

Buenas noches, plantæ ex occidentali India delatæ semina, quæ etiam stirps apud fortunatas Indulas reperitur, ubi *Buenas noches* vocatur, voce Hispanis consuetâ, quâ se congregantes vel discedentes, vesperi salutant. Hæc verò primo sui ortu bina profert folia Campanulæ Indicæ primum nascentis foliis similia, sed majuscula & crassiora, cui etiam similia edit folia recens natus Mechoacanus, antè quàm innas-

cantur alia folia. Multi porro ab unica hujus plantæ radice caules prodeunt, qui pedamenta adfixa, vel vicinas plantas multiplici ambiunt spirâ, Smilacis asperæ instar, cui etiam similia habet folia, majora tamen & molliora: in caulis etiam aliquot hamatas continet spinulas, quales & Smilax aspera, sed rariores ac minus horridas: flores autem pandit candidos & grandes, mediocri disco pares, qui matutino tempore dehiscences, noctu illicò flaccescunt, unde nomen accepisse videtur.

Cæterum ex seminibus à Touaro acceptis, quæ amicis communicaverat Clusius, unica planta insequente anno nata est ornato viro Honesto Lopez, quæ initio prodibat simili modo quem Touarus refert, deinde multa longa sarmenta proferebat, perticæ, multis spiritibus & nexibus sese circumvolventia, & tenellos veluti spinarum aculeos, præsertim circa articulos, generantia, qui nihil aliud erant, quàm radicum rudimenta, ut in plerisque plantis, puta Mayo, Harundine, & aliis quibusdam similibus interdum contingere videmus, quæ haud dubiè comprehendissent, si quis terrâ obruisset: folia habuit valdè viridia, Convolvuli foliis similia, sed longiora, & pleraque hederaceorum foliorum instar angulosa, atque in longum angustum mucronem desinentia, ut Smilacis asperæ folia; florum quidem gemmas ferre incipiebat, sed perfici nequiverunt, quia præmaturæ pruinz totâ plantam corruerunt. Hæc ille.

Ego duo semina & portionem capitis trigoni prædicti Convolvuli habeo inter fructus delatos ex Anglia 1605. per generum Cherlerum, qui plerosque acceperat ab honesto viro Iac. Gareto: grana sunt instar magnorum Pisorum, non tamen maximorum, angulosa ex compressione ut evenit quibusdâ Piis, colore, qualis ei tribuitur à Clusio, dura sunt officulorum modo. Est mihi etiam capitis trigoni fallor trigoni pars una triangularis ferè, mediocriter fusca: Semina in aquam injecta non sident.

C.B. pin. Smilax aspera 3, India occidentalis.

CONVOLVULVS PEREGRINVS cæruleus folio oblongo, C. Bauhini.

Defr.

Radice est singulari, oblongâ, rufescente, ex quacaulis multi, tenues, pedales, interdum cubita-


les, flexiles, ramosi, levissimis pilis pubescentes prodeunt, quos folia oblonga, inferiora quidem, uncias tres, quatuorve longa, vix unciam lata, inordinatè vestiunt, quæ sensim minoræ redduntur, & per marginem leviter hirsuta sunt: ex omnium ferè foliorum sinu, pedicelli tenuissimi, oblongi exurgunt, quibus singulis flos cæruleus ad exortum pallidus, Campanulæ formâ, unico folio constans, & ex caliculo prodiens, insidet: floribus succedunt capitula membranacea parva, quibus semina parva, nigra includuntur. Planta sanè ob florum copiam elegantissima, & quæ ob cauliculorum flexibilitatem fulciri debet. Hic in hortu meo ex semine, Campanulæ cæruleæ nomine accepto, sæpius crevit.

B. prod. Convolvulus 2. Eid. pin. Smilax lævis 7. *Synon.* sive Convolvulus peregrinus cæruleus, folio oblongo.

LOBVS CVM SEMINIBVS CONVOLVULO MAJORI ACCIDENTIBVS.

INTER fructus & cætera quæ gener detulit ex *Defr.* Anglia, anno 1605. ab honesto viro Iac. Gareto reperimus Lobum sive siliquam nigram magnitudinem articuli postremi pollicis simili quodammodo, sublongam unciam, tumidam, & leguminum modo in duas partes sese separantem, cortice duro satis, *Cortex.* qui nonnihil contrahēbatur, pediculo longiusculo: intus grana duo (an plura adfuerint nescimus, Lo. *Grana.* bus enim erat apertus) magnitudine pisorum mediocrium ferè, triangularia ut Convolvuli majoris siliqua, continentem, quorum latera duo minoræ ferè plana, tertium verò gibbosum extabat, leviter hirsuta vel tomentosa, colore fusco tribus costis, uti etiam circulo circa umbilicum cinereis, cortice duro, qui si abradatur flavescit. Quid continerent hæc officula nondum introspeimus, sunt enim nobis tantum duo. Injecta in aquam fluitant.

BRASSICA MARINA, SIVE Soldanella. CAP. XXXVII.



QVIA Brassica marina toto genere (quia enim ut inquit Adrian. Spieg. flore & folio herbæ atque floris Convolvulus; virtute verò Scamoniū est) differt à reliquis *Convolvuli
folio & flo-* Brassicis, ideò non Brassicis (de quibus lib. 21. scribimus) sed Smilacibus lævibus *Smilax.* & Convolvulis ea subjungit voluit.

Brassica autè marina, quæ hodie officinis Soldanella appellatur per terram suas spargit viticulas, à quibus folia prodeunt subrotunda, retusis alis prædita, latiora quàm longiora Chelidonij minoris similia, crassiuscula, liquore lacteo manantia, pediculis longis innixa: flos magnus, purpureus, quadrantaliter ferè, campanulatus, non ab similibus multum floribus herbæ, quæ pro Nil Avicennæ exhibetur, aut Smilacis lævis, indivisus; semen in lo-

in localis rotundis non tantum nigrum, sed & album, angulosum. Gustu est salso, subamaro.

Soldanellam aliqui etiam *Soldanam* vocant, & eam *Brassica marina*: à *Dioscoride* descripta: perique similem affinant. Imò nos non similem, sed planè illam ipsam esse cum multis aliis, ex hoc maxime concludimus. Quòd *Dioscorides* hanc *Brassicam* à laeva evariare dicit, quo modo certè *Soldanella* à *Brassica* penitus evariatur. Quæ marina *Brassica* [*ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος* : male *Lugd.* *Soldanella* : nec melius *Ryff.* in *Diosc.* *Soldanella*] inquit *Dioscorides*, dicitur, à lativa in totum evariatur, habetque folia longa [*ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος* forte legendum *ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος* *auth.* *Marth.* *ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος*, *prelonga* *Ruell.* qui tenuia addit, *quam ob causam, ipse videtur*] *Aristolochia* rotundæ [*ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος* *ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος*] similia, quæ singula deramis subrubris prodeunt, ex uno pediculo velut *Hedera*. Habet liquorem album, non mulcum, qui gustu subtilis est, & quodammodo amarus, compage pinguis. Et hæc est illa, quàm prior ævo *Theophrastus* l. 7. c. 4. *Brassicæ* [*ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος*] tertiz agrestis cognomento intellexit, cui solum læve esse parvum & rotundum scribit, ac multis ramis, multisque foliis constare : huic præterea succum acrem inelle & medicatum, quo Medici ad purgandas alvos utuntur. Eadem & *Plinius* tradit. *Raphani*, inquit, genus silvestre Græcis, cui lævia quidem [*ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος*] sed breviora ac rotunda, copiosaque atque fructuosas, sapor autem asper, & medicamenti instar ad eliciendas alvos. Cæterum licet *Dioscorides* prodiderit marinam *Brassicam* folia ferre rotundæ *Aristolochiæ*, longa, ac tenuia; ea tamen non abs re ab omnibus esse censetur, quàm vulgus officinarum *Soldanellam* appellat. Quippe quæ in maritimis nascatur, foliis lacteo succo madeat, ramulis constet rubentibus, & quibus prodeunt ipsa folia, *Hederæ* modo, quæ gustu salsa, & amara, & quadantenus acris sentiuntur. Quamobrem *Dioscoridis* codicem hoc in loco, sicut & in aliis permultis, mendi suspitione non vacare cum *Marth.* puto. Facile enim evenisse crediderim librorum incuriâ. ut folia *ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος*, i.e. longa, pro *ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος*, i.e. parva, hoc loco successerint : & certè facilis fuit unius litteræ lapsus. Siquidem *Soldanella* vocata omnibus notis marinam *Brassicam* repræsentat, exceptis foliis, quæ sunt *Aristolochiæ* rotundæ minora.

Cæsalpinus autem sic aptius legendum putat, foliis rotundis, longæ *Aristolochiæ* similibus, & non ut vulgati codices legunt, transpositis dictionibus, foliis longis rotundæ *Aristolochiæ*. Et hinc congruè *Dodonæus* *Soldanellæ* sive *Brassicæ* marinæ folia tribuit *Asari*, aut *Aristolochiæ* longæ (non ut ipse, rotundæ) rotunda. Quo *Dioscoridis* loco sic emendato, *Soldanella* omnibus planè notis *Brassicam* marinam *Dioscoridis* refert. *Ruellius* etsi in hoc nobiscum ceteri que consentiat, quòd marina *Brassica* hæc sit herba, quæ vulgò *Soldana*, & *Soldanella* dicitur, nullâ etiam (ut inquit) reclamante notâ; in eo tamen manifestè aberrasse deprehenditur, quòd *Soldana* folia *Aristolochiæ* longæ, atque etiam prælonga reddiderit. Etsi rectè quidem videatur *Matthioli*us existimasse pro folia *ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος* legendum *ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος*, tamen in meis (inquit *Dalech.*) *Dioscoridis* exemplaribus non legi *ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος*, sed *ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος* [*prelonga*] pro quo lego *ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος* potrecta, quod est verissimum. Facile, ego etiam nolim tam manifesti erroris cum *Matthioli*us inculcare *Ruellium*, quòd dixerit foliis prælongis : forte enim ad foliorum pediculos longos respexit. Nec video tantum *Ruellij* errorem, quantum dici *Matthioli*us, quia dixerit l. 2. c. 54. *Soldanam* esse folia *Aristolochiæ* longæ : id quod optimè fecit (uti & *Cæsalp.* legit) melius enim longæ quàm rotundæ folia referre videntur : rotundæ enim folia sunt longiora quâ latiora : *Soldanellæ* autem latiora.

ut plurimum quàm longiora, sicuti folia *Aristolochiæ* longæ, quorum longitudini latitudo æqualis : dein quoad totum folij ambitum & anchoræ formam, melius convenit *Soldanella* cum *Aristolochiæ* longa, quàm rotunda : deinde quoad pediculos, quibus prædita est longa, rotundâ non item. Verum *Matthioli* non fuit cognita longa, pro qua exhibuit *Clematitin* doctis multis nominatam. Ca. n. h. f. addit *Carolus Stephanus* existimare *Soldanellam* esse dictam, quòd ad solidandas rupturas faciat.

Videamus nunc quid *Turnerum* Anglum, unum *Volubilis* ex multis, qui *Volubilis* speciem facit, impellat, cur *Turner* adhuc dubitet an *Soldanella* sit *Brassica marina*, in d. cap. de *Cochlearia* neget. Etsi inquit ille, jam ab annis pluribus *Brassicam* marinam veram indagaverim, unamque invenerim à vulgò doctorum receptam, alteram verò quam ego solus pro vera *Brassica marina* habui : attamen cum utramque cum *Dioscoridis* descriptione confero, neutram per omnia convenire comperio. Ea quam ego veram *Brassicam* marinam arbitratus sum, nascitur intra primas maris aquas in litore, in ripis rivulorum præastringantium, & lapidosis insulis quas interdum mire perluit. Visa mihi in *Frisia Orientali* circa *l. Jorder* ubi *Luppelfruyt* à cochlearis forma in folio, dicitur. *Cochlearia*, nec non in *Anglia* in *Cestria occidentali*, juxta *Portlandiam* & *Portbecium*, verum nullum nomen aliud audivi, quam *Scurby wode* aut *Scurby wurt* : posset etiam appellari *Spountwurt*. Vbi primum erumpit, folia habet quinque aut sex, modò pauciora, modò plura, erecta simul omnia ad modum *Pyrolæ* aut *Betæ* tenerioris. caulis longus, teram versus rubescit. folia pingua, crassa, rotunda, *Asari* similia, minora, virentiora, sapore non nihil salso & amaro, gustanti fervida & acris, *Brassicæ* quodam sapore ingrato, fervore & amaritudinis conjunctæ ratione. caulis *Spithamam* æquat ferè, in quo quæ nascuntur folia, longiora sunt, acutioraque, iis, quæ statim à radice surgunt. flos albus, semen tenue, nigrum. Indigenæ contra *Scorbutum* utuntur. Ego verò non contra cum solum utilem expertus *Vires*, sed & contra hydropem, quemadmodum *Doctiss.* *Reirerus* *Rektor* *Scholæ* *Gruningensis*, & *Henricus* *Herbartus* testari possunt. Non ausim tamen pronunciare, esse veram *Brassicam* marinam *Diosc.* præcipuè cum magna ejus quantitas parùm; vera autem *Brassica marina* vehementer purget : deinde etiam quòd nullum in eo lac aut succum lacteum animadverterim. Idem nunc subdit. *Recepta* passim in *Italia*, *Gallia* & *Germania* *Brassica marina*, *Herbariis* dicitur *Soldana* aut *Soldanella*. *A Matthioli* verò exhibita, quoad radicem saltè, non eadem est cum nostra *Soldanella*, quæ in *Anglia* & *Belgio* nascitur, neque quæ venalis habetur *Francofurti* & *Antuerpiæ*. Quippe, ut reliqua omnia totius plantæ similia sunt *Volubili* aut *Helxinæ* *cissampelæ*, nisi quòd folia rotundiora sunt, non ita acuta : ita radix cum ejusdem radice convenit. nostra *Soldanella* verò *Soldanella* procul intuenti *Malvæ* similis videtur, tum floribus, tum foliis : propius si accedas, tam similis est *Volubili*, ut nihil aliud, quàm *Volubilem* quandam marinam dixeris. flores planè *Volubilis* vulgaris, campanam referunt, nisi quòd majores sunt, & ex cæruleo purpureasunt. Cùmque reliqua tota planta per fabulum serpat, flores recti stant & amœno decore litus pingunt. Semen aliorum *Volubili*um instat, nigricans, rotundum, viciorum *Volubili*um majus. folia rotunda *Aristolochiæ* rotundæ aut *Asari* : sapore non adeò acris, ac *Cochleariæ*; putgant pulverizata ad 3. j. sed non adeò vehementer, ut *Diosc.* innuere videtur de *Brassica marina* : inquit enim *καὶ ἡ ἀπὸ τοῦ ὕδατος*, ἐρπύλη θρασυτέρα. *Plinius* etiam de *Brassica marina* scribens ait vehementissimè ex omnibus

omnibus alvum solvit: neque tam sunt calida folia ac Brassicae marinae apud Diosc. Inquit enim *ἡ δὲ ῥα*

*Dabitur autem
sit Brassicae
marinae.*

Diosc. neque ullam habeat qualitatem, sive in odore, sive sapore, cur Brassica marina debeat vocitari, cumque tota planta tam similis sit Helixiae cissampelo & Smilacis sylvestri, quarum neutri ea conferatur, dubitate posset quispiam an Soldanella sit Brassica marina Dioscoridis. Quod si tamen Soldanella non sit Brassica marina, potest nihilominus aquis hydropicorum detrahendis recte deservire, quemadmodum alia Helixiae cissampeli & Volubilis mediteraneae genera idem praestant. Dicit Aëtius Smilacem sylv. quae ad aquas, fruteta & sepes confendit optimam esse ad hydropem: idem habet Nicolaus Myrepsus, Aëtium forte sequutus. Scribit Diosc. Helixinem cissampelon alvum solvere. Mesueus de quinque speciebus Volubilis agens, omnes facit purgatrices. Quare mirum non est, Soldanellam, cum Volubilis sit species, aliarum Volubilium modo purgare. Matthiolus, ut omnes tollat remoras, quae prohibere possint, ne Soldanella sit Brassica marina, inquit corruptum esse Diosc. textum, & *μαρὰ* pro *καρὰ* talis irrepsisse: quod quidem verisimile videtur. Nisi quod Aristolochiae folia aliis sint longiora, aliis breviora & rotundiora, ut in Cochlearia, & generibus quibusdam Malvae, aliisque plantis: tunc autem Soldanella non fuerit Brassica marina. Verum tamen verò apparet aut nullum in textu omnino esse errorem, aut ante multa saecula corruptum. Nam tum utraque vetus barbara versio Diosc. (ordine alphabetico) tum etiam Serapionis legit folia longa. In nullo autem codice graeco, qui hodie extet, aut veteri interprete, invenio *αἰμα λειψά*, seu folia tenuia, ut habet Ruellius. Quod miror non animadvertisse Matthiolum, hominem alioqui oculatissimum, ut multis in locis Commentariorum eius apparet. Hactenus Turnerus.

*Volubilis
species.*

*Ruell. lesio
mosaunt.*

*Error Matth.
Silv.
de Cachile
Serapionis.*

*Brassica
marina.*

*Lonic. not
Soldanella.*

*Brassica
marina.*

*Notus
Anguar.*

*Notus
Tempus.*

Errat in hac planta, ut prodidit Matthiolus, Mattheus Sylvaticus pandectarum autor, quod crediderit Arabum Chachile Soldanellam esse. Cuius error aperte convincitur ipsius Serapionis testimonio: quippe qui Cachile suum Vinea simile fecerit, folioque non Aristolochiam, sed Nasturtium imitari tradiderit. Brassica marina, Diosc. Ruell. Corn. Matth. Leon. Trago, Altom. Ang. Cord. in Diosc. & hist. Cast. Gef. h. Dod. gall. Lob. Cam. Lac. Monach. in Mes. Lugd. Sylvio, Valeriolae, Port. phyt. Alfon. Moresc. Turn. Carl. Io. Agric. Ryffio, Euch. Roess. & Lonic. in quorum figuris capreoli non placent, & aliis plerisque. Soldanella Lob. Dod. Levin. Lemr. Cam. Gat. Gef. h. Cord. Leon. Altom. Ang. Ryffio, Adolph. Occ. Cast. Lonic. Sylvio, Alfon. Moresc. Monach. in Mes. Lugd. Valeriolae, Euchar. Roess. Carl. Io. Agric. Tab. & aliis. Soldana Trago, Altom. Dod. Gaun. Brunfels. Apollini, Lev. Lemnio, Lonic. Lugd. & Fallop. Volubilis species, Mesue. B. phyt. Brassica maritima minor (hæc vox apud Matth. omissa) seu Soldanella officinarum. Eid. pin. Soldanella 2. Soldanella marina. Ger. Lutt.

Brassica marina vocatur Græcis *καυχήν* *καυχήν*, Germ. *Meerwinde*: Belg. *Zee winde*, i.e. Convolv. marinus: Gall. *Choux de mer*: Ital. *Caualo marino*: Hispan. *Veronica marina*: Arg. *Eec coole*.

In hortis plantata felicissimè ex semine adolescit. Soldanella passim ad mare provenit, potissimum circa Venetias, Genuam & similibus locis item ubique ferè in Belgico littore. Ad mare Montpelij æstate floret: autumno semen perficit.

Herba in totum stomacho inimica, acris vehementissimè, alvum ciet in cibo cocta: coquitur propter acrimoniam cum pingui carne, Dioscorides. *Aquas Marinae* Brassicae superius quam quoddam ventrem deiecit, utpote subsalsa & subamara gustu, fuerit sanè etiam ad externos corporis ulus, & ad omnia ea, ad quæ tales qualitates accommodantur, idonea, Galenus. Brassica marina assumpta aquas ducit, præcipue prærogative in acite. Utendi modus varius: siquidem folia ejus ex sale, aceto, & saccharo acetarij modo ad quinque aut sex bucellas comesta mitabiliter aquas per alvum ducunt. Eadem in jure carniū cocta, adjecto dein saccharo aut melle, propinatur. Possent & sicca in pulverem redacta ad 3j. aut ij. ex juve pulli bibi. Rectè autem cinnamomi pulvis & si milia corrigentia addentur; alioqui usui nimio ventriculo nocent. Pulvis in catapotis ad 3j. deglutitur. Sunt qui scribant multos tertianarios Soldanellæ curatos, Matthiolus. Puerulis ad 3j. & ulceris datur in conserva salviae vel rosmarini, Brasavola. In hydropre pro siccatione, & evacuatione aquæ, nullum vidi medicamentum præstantius, inquit Fallopius, & exhibetur vel in pulvere 3j. pondere; vel in decocto, vel asparagorum modo, si planta recens habeatur, quo modo est suavisissima, & siccatur, aperitque vias, & evacuat aquam. atque experientia hujus Brassicæ ductus ego exhibui etiam aliquando in hydropre asparagorum modo Volubilem minorem optimo cum succellu. Sed hæc folia species Volubilis in usu est: aliarum verò specierum nullā utimur ad purgandum. Contrarium sentit Altom. de acitis curatione agens. Quidam, ait, ex tumoribus siccum marinæ Brassicæ cum vino, aut sapa, seu aqua lactis approbant (hodie vulgus Medicorum Soldanam, seu Soldanellam appellat) cujus usum non valde admitto: namque ventriculo mirificè adversatur, & ipse pluries experientiā vidi noxam inferre, potius quàm auxilium aliquod hydropicis præstare, imò quoddam citius perisse observavi.

CONVOLVULVS MARINVS Soldanellæ affinis.



Convolvulus Desfer.

Quidam rarus, cujus folia inferiora quidem, quæ uncialibus pediculis committuntur, saepe Phyllidis in mores sunt, adverso line rotunda, vellea in medio excelsa, præterea in medio recto in latus ex porrectis; superiora verò folia, Hemionitidis altentis peregrina Clusij modo auriculis pulchris gemeratis (in quas nervi excurrunt) pinnata; flores ex florum albis prædeunt magni ut in Smilace levi fide Convolvulo majore. Provenit in horto D. Z. vii. gen. Basilea.

An est Hermola in Diosc. can. 66. decoraria sive An Hermola Venetia in littore passim nascens, & olivario foro rectorum tempore venalis, hederaceo fere

ferè folio; flore purpureo; Lili; pusilli effigie, se convolvens, quibus appropinquat; solvens alvum cocta & cruda oleris modo accepta.


Convolvulus marinus ad nostrum mare (inquit Impet.) se expandit supra terram, ad quinque vel sex cubitos, folia habens incisâ, crassa, saporis salis, flores campanæ modò albos; femina cōtinet in folliculo triangulo, hirsuto, Soldanellæ modo, cui congener, & quia vitibus similis illi, ejus est usus quum è terra prodit: est herba lactifera. Lugd. in ap. hujus iconem ex Rauvolfio ponit, ac Brassicæ marinæ genus inscribit, quod ab incolis Meudhendia Rhafè ad Almanforem Corigiolum nominari tradit. Sed nec Meudhendi, nec Corigiolæ nomen alteri suæ Brassicæ marinæ Rauvolfi attribuit, verum Scammonio Monspeliensi.

Fatetur frater C.B. phyt. & apud Matth. (à quo Brassica marina i. five major inscribitur) hujus sibi Convolvuli marini nomine & plantam & semen Imperatum Neapoli misisse; folia autem ejus quædam lacinia esse, quædam non; omnia tamen parte superiore sinuata. In pin. Smilacis lævis generibus adscribit, & Soldanellam i. maritimam majorem vocat.

CONVOLVULVS ÆGY.

PTIACUS QUINQUE-
folius, Casp. Bau-
hini.

CAP. XXXVIII.



Vitæculus est tenuibus, geniculatis, lævibus: ex quolibet geniculo folium, longo tenuissimo pedicello donatum, prodit, q. in quinque lacinias angustas, longiusculas dividitur, & quandoque inferior una alterave bipartitur, & cuilibet lacinia, tenuissimus mollisq; aculeus insidet. Supra folij exortum, pedicellus æquè tenuis, duarum triumve unciarum longus & nudus exurgens, florem magnum purpureo cæruleum, aliorum Cōvolvulorum forma, sustinet. Semen non conspectum, cum solum hujus

ramum, Convolvuli Ægyptiaci nomine, à nobiliss. Cortuso Patavio ante viginti annos acceperim, inquit C. Bauhinus, cui in prod. est Convolvulus 3. foliis lacinia, vel quinquefolius: Eid. pin. Convolvulus 7. Ægyptiacus Bauhini, Bry.

DE LIGNO COLVBRINO
in genere.

CAP. XXXIX.

PLURES stirpes inveniunt plurimum dissimiles, cum formâ tum nascendi modo, uno tamen eodemque nomine nuncupatas, Lignum Colubri-
Tom. II.

num, quod singulæ mirum in modum utiles, sint adversus colubrorum virulentos ictus & morsus, facile animadverteris, qui sequentes earundem descriptiones diligenter contulerit. C Bauh. Lignum colubrinum, Clematidum Indicam vocandam censet, quod pleræque sarmetitæ sint, & per arbores repant. Hoc verò lignum, five potius radicem, ut Garciz placet, serpentium moribus prodesse, hoc modo deprehensum est. In Zeilan insula, Serpentis genus est coronatum, seu diademate insignitum, Lusitani Cobras de Capel, (nos Regulum dicere possumus) maximè noxium. Est item animalis genus magnitudine viverræ huic serpenti inimicissimum, Quil, vel Quirpele vocant. Quotiescumque cum serpente congressurum est hoc animalculum, istam radicem (quæ multa istic nascitur) eâ parte præmordet quâ denudata est: etenim pars aliqua extra solum prominet. Præmorsâ radice, pedibus anterioribus salivâ conspersis, caput primum, deinde reliquum corpus sibi demulcet: postea serpentem aggreditur, nec eum dimittit, donec occiderit. Quod si illo congressu serpentem vincere non potest, denuò ad radicem confugit, ad quam se fricat, deinde in prælium redit, atque ita mortuū serpentem necat. Hoc spectaculo edocti Chingalæ (ij sunt Zeilan incolæ) istam radicem venenis resistere cognoverunt.

Tria porro hujus ligni genera in insula Zeilan esse prodidit Garcias, de quibus In genere ait. Non modò adversus animalium virus ejaculantium morsus ictusve efficax est hoc lignum, five potius radix; sed etiam ejus pulvis lumbricos necare; papulas, exenthemata, & impetigines tollere creditur, & cholericam quam vocant passionem (incolæ Morde-morbus, xi dicunt) sanare. Similiter utile esse medicamentum ferunt adversus febrium circuitus, uncia pondere propinatum, prius tamen tritum, & aquâ maceratum, per vomitus expurgatâ multâ bile.

Nullum autem ex tribus Garciz Colubrii ligni generibus, cum Acoftæ ligni Colubrii bina stirpes convenit, quas describit, & in provincia Malabar inveniri tradit. Idem mentionem facit & tertij Colubrii ligni generis, vastæ arboris magnitudine, de quo in alio libro se acturum scribit, qui ad nostras manus nondum pervenit, nec eum oculis nostris videre licuit. His addit & aliud lignum Clusius, quod an illis congener sit, ignorat. Sed singulorum adscribimus historiam.

COLVBRINVM LIGNVM

I. Garciz.

DVorum aut trium palmorum magnitudine asurgit, paucis virgulis, quatuor aut quinque duntaxat tenuibus: radix quæ maximè in usum venit, veluti tenuiorum nostrarum vitium radices, multis capitibus aut nodis se propagans, ita ut semper radix aliqua extra solum se exerat, & radice unâ exemptâ, aliæ in ejus locum succedant. Radix hæc ex candido cinerea est, solida admodum, amaro gustu; folia Persicæ mali, magis tamen virentia; flos longè à foliis racematim cohæret, pulcherrimo colore rubens; fructus Sambuci, sed rubens & durus, racematim cohærens, veluti in Persicæ fructu. riclymeno.

Primum & laudatissimum, secundum mentem autoris, hoc est, à quo subsidium querit viverra, vocaturque incolis Rametul, Lusitanis Pao da Cobra, i.e. Lignum Colubrinum. Hujus ligni Colubrii Garciz, fragmentum trium digitorum transverso.

rum longitudine anno salutis 1564. ostendit Clusio Samantice Vaseus, dono olim à Lusitania missum.

Synon.

B. pin. Clematidis Indica 3. foliis Persice, fructu Periclymeni. Ligni colubri 1. genus, Garz. Frag. Palo del Cebra j. e. Lignum serpentinum, seu colubrinum, Lin. (cor. par. 4. Ind. or. c. 31. Pao de Cobra lignum seu radix Lusitanis dicta, omnium venenorum antidotus, in Insula S. Laurètij Ind. or. par. 4. c. 7. In Insula Zeilan, & multis aliis regionibus; & in

Locut.

Goa Continenti nasci tradunt.

Vires & siccus. Serpensit. etiam. Cul. nera.

Teritur, primum hæc radix, & ex vino, aut aqua cordali proximatur à serpente percussis: teritur etiam ad cõtē fantali modo, & vulneribus inspergitur.

COLVBRINVM LIGNVM II. Garcia, Clusio scandens.

Malo punicea foliis arbor.



Descri. Clus.

ARbor est (cùm sola provenit nullis vicina arboribus) Malo punicea similis, spinis brevibus & firmis horrida, cortice candido, denso, rimoso, & amaro, non tamen veluti prioris cortex; foliis est luteis, aspectu pulcherrimis. Hanc autem (si juxta aliam quâpiam arborem proveniat) per summos ejus ramos serpere, atque Cucurbitæ modo amplecti solent.

De hoc ligno hæc Clusius. Secundi

generis Garciae descripti ligni fragmentum, quinque unciarum longitudinis, quodque ut conjicere licebat, duarum unciarum crassitudinem æquarat, mihi non modo ostendebat Londini anno 1631. C. V. D. Hector Nunez Medicus Lusitanus, sed etiam dimidiâ ejus parte liberaliter donabat. Ejus porro materies firma erat, candida, venis quibusdam distincta, non dissimilis Fraxini ligno: cortex autem qui eam integebat, candicans & quasi cinereus, utraque verò degustata, amaro sapore prædita esse deprehendebantur. Ejus qualem accipiebamus à Clusio fragmenti iconem lectoris oculis subjicimus.

Synon.

Garc. Lignum Colubrinum secundum. Clus. ex. Ligni Colubri 2. fragmentum. Lugd. Lignum Colubrinum Acolta, qui debebat scribere Garciae. Tab. Lignum Colubrinum. B. pin. Clematidis Indica 2. spinosa foliis luteis: Ligni colubri 1. altatum genus, Garz. Trag. & Clus. qui ligni frustum pingit. Secundum hoc genus in insula Goa nasci ferunt, sed nunquam Garciae videre cortigit.

Locut.

Vires.

Cortex.

Commendatur adversus venena veluti primum, eodémque modo usurpatur. Solum tamen lignum cum cortice & radice permixtum exhibere. Præfertur tamen radix.

COLVBRINVM LIGNVM III. Garcia, foliis Lentiscii.

Descri.

Ramos habet paucos, tenues, quatuor aut quinque cubitorum longitudine, qui, nisi alligati, sustentare se nequeunt, sed per solum sese diffundunt; folia rara, lentiscinorum effigie, oblonga,

non viridia, sed maculosa, sive nigricantibus ex candido maculis respersa. Radix tenuis est, dura, nigra, & odorata.

B. pin. Clematidis Indica 1. foliis lentiscinis, candidis maculis aspersis: Ligni colubri 3. genus, Garz. Frag.

Cùm Prorex in Iasnapatan insula Zeilan continetur, dono data est illi hæc radix. Similem in Continenti Goa nasci ferunt.

Hanc misit prædicabant, & adversus venena pollere aiebant.

COLVBRINVM LIGNVM HEDE- raceum foliis Bryoniae, Acolta 1.



NASCITUR in Malabar Hedera modo, colore Dracunculi majoris, sive Serpentariae, folia illi sunt Bryoniae ferè similia, integra tamen initio, nervoque prædita per longitudinem excurrente, & quinque aut sex venis in latera vergentibus; succellu temporis accedunt exigua foramina, quæ paulatim cum foliis incrementum sumunt: donec tandem omnino folia scindat,

et quæ Vitis foliis similia reddant; conspiciuntur enim interdum in eadem stirpe, folia integra, alia exiguis, nonnulla majoribus foraminibus prædita, omniaque ad invicem se dissimilia, ut ejusdem plantæ folia, minimè esse videantur. Tantam verò habet hoc lignum cum colubro similitudinem, ut (Acolta tradente) qui non norit aut de die non viderit, si ad Luræ splendorem noctu conspiciat, vivum colubum in esse existimet.

Acolta ex versione Clusij, Lignum Colubrinum prius. Cast. Lugd. Lignum Colubrinum 1. Acolta, B. pin. Clematidis Indica 4. Malabarensis foliis Vitis, colore Dracunculi.

Vulgò præstantissimum censetur remedium adversus colubrorum [unde sibi commune cum aliis nomen Colubri ferat] & viperarum morsus: incolæ sanè dum in agros tendunt, magnâ ex parte circumfere solent hoc lignum (sunt enim in ea Provincia multæ viperæ, variæque serpentum genera) aiuntque; solo ejus odore serpentes fugari; & si, dum colubros venantur, illos attingere hoc ligno queant, illic rumpi & extingui.

COLVBRINVM LIGNVM DVDA Sali Canarinis, Acolta II.

Ligni Colubri alterius (cui nomen apud Canarinos est Duda Sali) planta admodum brevis est & tenuis, triaque solummodò folia habet, mollia, levia, saturatius virentia: flos aut fructus non confusus, nec quicquam si vadit attente, et longæ & tenuis est, minimo digito miror, hinc inde nonnèquam contuberant: & ut mihi forte suspexit, exterior ejus cortex valdè tenuis est & cinereus,



nullo, dum gustatur, manifeste sapore præditus, deinde tamen gustum in ore relinquens suavem, & uti Moschus odoratum; filius est undique hic cortex, & sponte sese expedit ab alio crassiore, flavoque cortice subtus nascente, qui odorem Loti silvestris, sive Trifolij odorati vulgaris refert, & saporem Glycyrrhizæ dulciorem; præmansus odore admodum suavi, nec in jucundâ mordicatione,

momentaneâ tamen, præditus esse deprehenditur; ipsa materies lignosa est, candida, dura, & insipida; folia Napi saporem referunt; germen producit hæc radix supra terram circiter quatuor uncias longum, in caput extuberans.

Lugd. Lignum Colubrinum 2. Acoftæ. B. pin. Clematidis Indica 5. Malabarenfis altera radice serpente; Palo della Culebra, Cast. ap.

Invenitur in Malabar altera ligni Colubrii stirps, proveniens in locis humidis & inter arbores, præsertim verò secundum illas, quæ Angelins nuncupantur, nec procul à mari.

Tritam radicem cum aqua rosea aut vulgari, vel cum vino (indifferenter enim Canarini ut autor est Acofta utuntur) præfens certumque asserunt remedium adversus omnis generis serpentum morsus. Plurimus etiam ejus est usus in febribus continuis, tertianisque, syncope, ventriculi debilitate, & cordis tremore; daturque adversus omnis generis venena. Multi mihi sanctè affirmant, dummodo manu hanc radicem tenerent, nullos serpentes, vel alia similia virulenta insecta formidare: & certissimum esse, serpentes & viperas ejus aspectum minime ferre posse, sed fugere, celerique in aliam partem sese proripere, si quis ante serpentes projiceret. Perutilis etiam censetur iis quibus anhelitus ab ore vitatio aut dentibus corruptus foetet, modo eam continuâ mandant, dentiûmque cavis gestent.

COLUBRINVM LIGNVM CLVSII,

Pao da Cobra dictum, forte

III. Acoftæ.

Nillum dictorum Ligni Colubrii generum cum hoc convenire facile animadvertet qui descriptiones diligenter conferet: & hæud scio, inquit Clus. apud Acoftam, an Garciz ligno Colubrii congener sit lignum illud, cujus iconem ad me mittit Jacobus Caretus Londinensis Aromatarius; erat verò hæc icon delineata, ex fragmento ligni cum tubere, sive superiore radicis parte in nodum coacta, & suo etiamnum cortice (cujus superficiei ex clavo pallefcebat & rugosa erat, cortex verò exalbidus erat) testa, majorisque quam ipsum lignum amaritudinis, quod crassi alicujus fructus non qualis à Garcia & Acofta nostro describitur, fuisse videbatur.

Fragmentum verò illud Pao da Cobra nomine insignitum, repertum fuerat in magna illa navi Prætorum. II.



B. pin. eandem suspicatur cum Clematide sua Synon. Indica 6. quæ est Colubrinum lignum 3. Acoftæ.

RADIX MALACÆ QVÆDAM, toxicis sagittis resistens.

Radice quandam in Malaca inveniri rumorem sparsit Garzias, quæ adversus vulnera sagittis toxico illitis facta præsentaneum exhibeat remedium.

B. pin. Clematidis Indica 7. Cur autem non ostendit ob quam causam Radicem hanc Malacæ ad Clematidem referat. Indicare debebat, si Clematidis sit appellanda, qua in parte aliquam cum ea habeat cognationem.

ARBOR ANGELINA. CAP. XL.

Quæ arbor sit Angelina, cujus Acofta sub Colubrii ligno meminit, edoceri non potui, inquit Clusius, licet diligenter ab Hispanis & Lusitanis sciscitatus sim, atque ipsorum plerique existiment, peculiarem Malabar regionis arborem esse, nobis incognitam: quam mirum est Acoftam non describere.

An C.B. pin. Lignum durissimum, ferri duriciem æmulans 3. Angelina arbor apud Cacinum, ex cujus continuo truncis naves Tonas vocatas extruunt tam grandes, ut unâ 20. vel 30. dolia aquatica vehi possint, cujus lignum adeo durum ut ferrum atterat, Linscot. part. 4. Ind. or. cap. 14. & par. 7. c. 27. An arbor cujus pars imâ crassitie 24. orgyarum in Guineæ insula Formosa par. 8. Ind. or. c. 4.

HALICACABVM PEREGRINVM multis, sive Cor Indum. CAP. XLI.

Non nisi adminiculo clavicularum quibus peritæ advolvitur, humo furgit, caulibus striatis, glabris; foliis læto virore nitentibus, Apici alicujus scæ divisurâ, gustu viscida, in iis pili quidam minuti, è quorum alis pediculi exeunt floribus donati albis, quos turgidæ excipiunt vesicæ grana continentes, Piso parvo similia, nigricantia partim, partim albida, in quibus cordis effigies pulchrè delineata; radix subest digitali crassitudine, multo minore, fibrosa, lignosa, duruscula.

Defc. Cord.
eui Dory-
cnium &
Gratum
cordis.



Cord. hist. de de
setibit; Dorycnium
ex brevi caulis trū-
co plures singulares
& striatas emitit
juncea gracilitatis
viticulas, duorum
plerumque cubito-
rum altitudine, ten-
nua affixa virgulta
ascendentes. Equi-
bus per intervalla
striati pediculi tria
folia Apio similia
ferentes prodeunt,
& quodlibet eorum
in tres partes per
ambitum profun-
ditis incisae dividi-
tur. hanc quod sum-
mutat propinquo-
ra fuerint, eō mino-

ra etiam sunt [gustu viscida, in foliis sunt quidam pili
minuti] ex foliorum alis singuli exeunt pediculi lon-
gitudine digitali, gracilitate suā mediocri filo aequa-
les, in extremitate duobus brevibus, & retro flexis
capreolis contrario annexi sibiipsis oppositis, vir-
gultorum alas ac furculas apprehendentes, quod me-
dii viticulae ex ascendere & imbecillitati suae con-
sulere possint. In fine pediculorum ante capreo-
los fert flores candidos, parvos, exquisitius luteo
colore staminibus, quorum magna pars caduca ap-
pnd; qui verò abortivi non ceciderint, sed re-
manferint, è medio triquetros densos & aëre infla-
tos emittunt folliculos, magnitudine Halicacabi
vesicis aequales, tenui admodum membranā con-
stantes principio, viride mox in ruffo pallescente,
intus tribus membranulis à medio ad angulorum
intervalla usque transcurrentibus in tres camerulas in-
terseptos. Qui interdum non tribus tantum sed qua-
tuor constant angulis, verum hanc non est propria
eorum, sed monitrosa forma ex superabundanti in
ea parte nutrimentali humore caulam & originem
habens singulis camerulis, ubi in medio folliculo
conjunguntur, singula semina innascuntur magni-
tudine parvi Pisi, figurā rotundā, colore nigra, ab
una parte, nempe in annexa candidam & satis ma-
gnam maculam habentia, figurā quādam tenus A-
zari folium, vel latiusculum Cor imitantem, unde
etiam ipsa semina grana Cordis appellantur, ea foris
dura sunt, intus verò candidum & inflexo septo di-
stinctum nucleum complectuntur; sapore dulcem
radicem habet, digitali crassitudine, multis fibratam
cirris, [signis & durisculis] Aetiva est herba.

Hæc Cordi descriptio mihi placet, cui appositā
figura Tragi, & ascriptum à Gesnero, se nec Dory-
cnium putare, neque Solanis cognatum, etsi aliqui
Halicacabum peregrinum nominant. Cordus au-
tem in Diosc. prodidit nullum ex veteribus, tum
Græcis, tum Latinis Dorycnij herbam descripsisse,
præter Dioscoridem, qui historiam ejus ex Cræteva
desumpserit; Plinium & alios quosdam credidisse,
Dorycnium idem esse cum Solano furioso, quod
fallum esse Nicander, Dioscorides & plures alij te-
stentur. Revera autem esse hæc herbam Dory-
cnium opinatur Cordus. Scribit, inquit, à Venetis
Monachis, & à paucis in Germania Medicis her-
bā, quam Grana cordis & Halicacabum alterum vo-
cant, ab Halicacabi fructus similitudine. Habet hæc
omnes notas & vires, quas Nicander & Dioscori-
des Dorycnio tribuunt [Reprehendit hanc opinionem
Matthiæus, Gesn.] sola tamen folia non conveniunt,
quæ Dioscorides Oleæ foliis similia esse dixit. Sed

hoc me nihil mover; Desumpta ex Cræteva est hi-
storia, potuitque corrumpi locus iste, ubi de foliis a-
gitur. Respondent candidi flores, folliculi, unde et-
iam Halicacabus à veteribus & nostris appellatur.
Conveniunt etiam ad amissim in folliculis contēn-
ta, rotunda, dura, levia & colore varia semina. Con-
venit etiam eorum numerus, & commanducata
lacteum habent colorem & saporem, quas notas
Dorycnio Nicander tribuit. Quinetiam somnifica
sunt ejus semina, nec sine periculo vitæ intra cor-
pus sumuntur. Quapropter eōd omnes alie notæ
conveniunt, verisimile est in foliorum comparatione
mendum esse. Sevimus hanc herbam, vidimus &
gustavimus. Propterea non ex aliorum relatione
ista de Dorycnio scripsimus. Grana ejus comesta
suaviorem somnum quam Opium afferunt: Sed ca-
vendus est magnus illorum numerus. Hæcille de
Grano cordis, quod si vires possidet, qualis illi tri-
buit Cordus, non poterit esse Dorycnium Diosco-
ridis & Nicandri, qui omnino diversas illi adscri-
plerunt facultates.

Trag. Dod. gall. Euch. Roeflin, Vesicaria nigra si-
ve peregrina. Fuch. Ger. & Hort. Lus. Halicacabum
peregrinum. Matth. Vesicaria genus aliud. Dod.
purg. & hist. Gesn. Cam. h. Tab. (cui & Cardispermō.
Nomen autem germanicum, Ser Balsam opffel
cin ander Geschlecht / non convenit) Euch. Roeflin.
Lugd. (qui & Luchij & Matthioli figuram exhi-
bet) & Lon. Halicacabus peregrinus. Gesn. coll. Ca-
put Monachi, Halicacabus Fuchij, (supplet de hor.)
peregrinus, quæ Fuchium & alios Solanum Vesici-
arium peregrinum vocare scribit, cum tamen toto
genere à Solano Halicacabo differat, nec è Solano-
rum genere sit. Non probat etiam (ut & Matth.
Colum. & Dod. qui cum Grano, à Serapione Ab-
rong, & Abugi dicto, convenire dicit.) Dorycnium
à Cordo dici.

Lob. adv. dubitat, Pisum cordatum sitno potius pisum cord.
Isporum, quam Melanthij quædam species, aut Tri-
folium pulcherr. Mayul tamen amplexu amplexu.
judam sententiam quæ Isporum statuit, plantam
vulgò Cor Indicum vocatam, officinis Halicaca-
bum peregrinum. Idem ablo loco etiam exte-
bi non placere eorum opinionem, qui Vesicariam
cordis effigie, Dorycnium hariolantur. Eid. obs. & ic.
plant. Pisum cordatum, ut & Schvv.

Lobelio se opponit Columna dicens, neque Ve-
sicaria Indica, Pisum cordatum, vel cor Indicum di-
cta, à Peruviana quiddam sententia Isporum pu-
tata, Isporum est. Nec, ut idem Pena scripsit, pha-
sioli mæst. quod nonnulli etiam folium interpre-
tantur, habet, quod ipse ignorans, Dodonæo obji-
cit, ut intellexisse videatur.

Cam. ep. & hist. Vesicaria, sive Halicacabum re-
pens. Cast. Vesicaria altera. Solanum peregrinum,
Lac. Fabā inversā recentiorum, Cef. B. apud Matth.
Solanum 3. sive Vesicaria repens. Eid. pin. Pisum io.
Vesicarium fructu nigro, albā maculā notato.

Halicacabum peregrinum multis sive Cor In-
dum, Ger. Münch. Fopflun / h. e. Calvariam Mona-
chi Schwartz oder Welsch Schutzen / nigram seu
peregrinam Vesicariam appellare placuit Trago:
Cam. autem in ep. & hist. Bergsamen & Bergkör-
ner nominat. Belg. dicitur Dod. gall. Vreemde Eri-
den & Swerte Eriksen vom oner Zee; Galib. ca-
cabus mæst. Fuchius tamen Bergsamen & Bergkör-
ner appellat. Ital. Cam. in ep. & hist. V. lucchio forestiero.
Angl. Black winter Cherin.

Halicacabum peregrinum sæpius mihi provenit, sed semper non maturavit. Lugduni, Genève &
Basilæ cultam in hortis & flores profertentem
observavi mense Junio, Julio, Augusto & Se-
ptembri.

Cred:-

di Affe. Ceditur valere semen ad omnes cordis affectus, ob notam, quā insignitur. Matthioli græte scenas, attegias, tuguria, & pergulas intumbrabat: quin etiam adium fenestras topiario opere contegebat & opacabat.

CACUBALVM QVIBVS DAM
vel Alfine baccifera.
CAP. XLII.



Haud absimilis huius radix ab Hippia majoris, uti nec folia: at sarmenta longissima, duriora, repantia, nervum tranfmittant à quo cortex hirsutus facile strictu cedit, crebris geniculis tuberosis donata. verum florum hic prima est observatio, qui è turgidis Halicacabi utriculis vix tantillum foliorum, quæ numero quinque herbidopallore albescent, apices bifidos proferunt; pen-

nitidis latentibus staminibus simul & baccæ rudimento, quæ per maturitatem nigra, grana continens nigra, nitentia, rotunda, compellæ.

ser. Clus. Hanc ita describit Clusius: Sarmentis verius quam caulibus, iisque numerosis, prædita est hæc planta, geniculatis, flexibilibus, humanam altitudinem plerumque superantibus, præsertim si frutices, quos scandere possit, vicinos habeat, aliqui propter infirmitatem, humi diffusis: bina singulis geniculis & internodiis adnascuntur folia ex adverso sita, Alfinæ vulgaris foliis figurâ & colore similia, longè tamen majora, & ad Helxinæ foliorum amplitudinem accedentia, mollia: flores ex calicibus, seu folliculis prodeuntes ex herbaceo candidi sex foliis constant, quibus succedunt acini Piperis nigri, aut granorum Luniperi vulgaris magnitudine, folliculo illo inclusi, initio virides, per maturitatem nigri, semine exiguo & plano pleni: radix candida, valde fibrosa, longa & sarmentitia: quæ singulis annis novos caules promittit, alijs per hiemem marcidis & corruptis.

Alfine spec. Licet sapor insipidus & herbaceus fecerit, ut eam ad Alfinæ genera retulerit Clusius. Liberum tamen omnibus reliquit, ad quam voluerit classem referre. Sunt, inquit, quibus Alfine repens, *Alfine repens* (quam nonnulli *Lucas Ghynus* aut *her. Dodon.* & *Lobeli.* vocant) dicitur, quoniam multis cum Dioscoridis descriptione notis conveniat. Sed ob notas aliquas, quas cum Cyclamino altera habet, si denominanda non erat. Non in multis, ut idem esset, sed in omnibus convenire oportebat.

Alfine ma. Recentiorum planta, Alfinæ majoris facie, baccis Solanij, an Cacubalum (ait Lob.) Plinij: Intellexerat enim Valerandum Dourez ascripsisse hæc nomina. Cacubalum Plinij, Vera Polemonia Dioscoridis Constantini.

Alfine ma. Gesnerus autem negavit esse Cacubalum, aut Polemoniam. Lugdunensis contra Cacubalum Plinij esse affirmare videtur, ita enim eam inscribit, ac Tom. II.

dicit esse aliorum *Quinoides repens*: nec deesse, qui Clymenum herbam esse putent à Plinio l. 25. *Alfine bac.* c. 7. descriptam. Alfine baccifera (ita enim vocati *esera* potest magis particulariter) dicitur Alfine repens à *Alfine repens*. Clus. hisp. & hist. ap. alt. Lob. obs. & ic. Dod. Cast. & Cam. h. A Thelio Alfine maxima fructu nigro. A Tab. Clematis urens 2. Keinnen oder Waldrae *Clematis urens*. ben / non lævi errore, quem sequitur Gerardus, qui Clematin urentem multifloram, Double flowered Virgins Bower. Est B. phyt. Alfine 9. Itipin. Alfine 6. sive scandens baccifera: Cyclaminus altera Diosc. Chini.

In hortis in quibus alui quotannis suos renovat *Locus et* caules ex radice perenni; floret & baccas fert è *Tempor.* mine collecto in Gallia Campania. Copiosa invenitur Salmanticensi agro, umbrosis locis & circa fepes: nostris etiam nunc in hortis frequens & pergulas scandens: aliquot verò post annis abundè observabam, inquit Clusius pontatecm Eberstorf, loco paludoso inter arundines. Floret totà Æstate. Secus, authore Dodonæo, margines agorum inter vepres & sentes crebrò reperitur apud Italos, Germanos, Gallos ac etiam Belgas, ubi lætum fecundumque solum. Iulio mense huius flores; fructus plumis suis incanescentes Autumno dependent.

Dodonæo refrigerans hæc esse videtur & Alfinæ *Vires.* cultate ac potentia proxima. Vim refrigerandi adstringendique obtinere, oculorum inflammationibus cum potentia illini, succum aurium doloribus infundis, & omnia, quæ Helxing. emendare, prodidit Clusius.

NASTURTIVM INDICVM FO-
lio peltato scandens.
CAP. XLIII.

Peregrinæ elegantia est ex Indiis delatum Na- *Deser.* sturtium, cui cum nostri orbis Nasturtio, præter



saporem odoremque, nihil est commune: *Folium* folia peltata, circinnata: ferè rotunditatis, sæpè latiora quâ longiora, nonnunquam & Hederæ modo angulosa, supernè glabra, infernè brevi lanugine hirsuta, medio ferè ut in Cotyledone, unde radij in ambitum porriguntur, pediculum excipiunt palmarem & sesquipalmarem subrubentem, tortilem & capreolorum ritu bacillo depaßto selescircuvolvunt: quo

etiam complexu nituntur cum ramis caules: cæterum ex foliorum alis undatim tortiles pediculi rubentisque exorti florum sustinent delicias artificij arguti plenas: posticâ parte productum corniculum sextantem circiter longum ex flavo puniceum, in quinque lacinias digitatas, concolores, striatas, quæ reliquo flori committitur, faciens, quantum ternæ duo suprema florum folia sursum explicata à tergo suffulciunt, colore luteo prædita, miniatis lineolis ad basin striata, per suprêmâ orâ subrotundâ mucrone breviusculo donata: id quod in reliquis tribus est videre, minoribus licet & rotundioribus ac veluti cordatis radiatim digestis, quorû tamè basis nõ virgata,

sed rhomboide maculâ miniatâ insignis, utrinque barbato comans: Semen tricocon accedens ad Heliotropium tricocon, rugosum, mediocriter magnitudinis.

Nasturtium Indicum folio anguloso.

Nasturtium Indicum quoddam foliis angulosis depingitur à Dodonæo, Lob. Obs. & ic. ac etiam Lugdunensi, quod quia verum non est, nos hoc præfenti hoc titulo omittimus, ac genuinam plantam duntaxat exhibemus, quam Nervij semine satam in pensilibus hortis alebat Jac. Plateau: Huic (inquit Lob.) folia peltata; semina Betæ quadantenus, qualia nobis ostendit prædictus Cyculo Indiano ferè paria afferebat D. de Brancion, in siliqua admodum eleganti, qualem habeo à naucleris reduci- bus ex Peruanis Indijs. Siliqua autem, quam Dod. & Lob. obs. & ic. Nasturtio suo Indico appoluerunt, alterius est plantæ, de qua paulò post, nec semina continentur in siliqua: sunt enim qualia descripsi- mus. Figura adhuc eorundem caret flore, ac propterea non undique placet. Meliorem Lugd. pingit, sub titulo Nasturtij peregrini Myconij, Peruanum etiam à Peru, unde advectum est, dicti. Alibi pingitur pro flore sanguineo Monardis, semine ex Peru delato.

Iconi Dodonæi & Lobelii appropinquata siliqua non est Nasturtij Indici.

Flos sanguineus, Monardis.

Nasturtium Indicum.

Convulvulus.

Clusia.

Planta Clusiana nata de scriptis.

Cultura.

Locus.

Ubi regitur.

Locus & Tempus.

Convulvuli speciem facit Dodonæus, in quorum classem etiam admitti posse putat. Nasturtij autem Indici nomē ipsi datum est ex eo, quod sapore Nasturtium referat. Et hinc dicitur Cam. h. Nasturtium Indicum Dodonæi: Item in Icon. annexis N. 4. Nasturtium Indicum: Et N. 32. Flores & semina Nasturtij Indici. Cast. & Eyst. Nasturtium Indicum; sive majus, B. pin. Monardi ex versione Clusij Flos sanguineus, ubi Clusio videtur Convulvuli genus, fructu *χρυσάνθου* & formam referens, ex Hispanijs *Mastuerzo de las Indias*, h. e. Nasturtij Indici nomine missi. Sed nobis fructus *χρυσάνθου* & formam referens alius est. Imò ipse apud Monardem in exot. suis fatetur Nasturtium hoc Indicum non ferre fructum, Chrysalidi similem, sed tribus seminibus simul iunctis constantem. Mihi, inquit, & multis alijs semine nata est frequentibus sarmentis peticas scandens, folijs Asari modo orbiculatis, nunc minoribus, modo amplioribus, præsertim si fertile solum nata sit: flore admodum eleganti, aureo, Perficariæ siliquosæ (quam vulgus Noli me tangere appellat) florem non nihil æmulante, sed ampliore, quinque folijs constante, quorum terna inferiora, quæ umbilico adhærent, tenuia admodum & angusta, atque ubi in latitudinem sese expandere incipiunt, multis barbulis hirsuta, singula verò circa ungues punicea maculâ infecta, & calcari quinque radijs prædico, in longum protenso, qui rarissimè apud nos ad fugem pervenit. Surculi tetræ commissi satis feliciter proveniunt, & in Autumni finem egregiè virēt: subsequens tamen hiems plerumque corrumpere solet. Ceterum neque in Germania, neque in Belgio nata fert fructum Chrysalidi similem, sed tribus seminibus simul iunctis constantem.

Coronidis loco addamus, quæ pulchrè scripsit Arnold. Gillenius de Nasturtio Indico: Rectè ne is fecit, inquit, qui plantæ huic Nasturtij nomen indidit quoddam huius sapiat acritatem? An is qui à cinabarice venulis, quibus aspersi flores, Florem cruentum appellavit? Cur non liceat ad Violas referre, quarum gratissimum flores spirant odorem? Cur non ad Regios flores, quorum faciem huius flores egregiè exprimit? Cur non ad Asarum, cuius folio est? Cur non ad Convulvulos: amplexiculis enim est. Est Nasturtium ob saporem quem verè exprimit, à quo maxime dependet efficacia: Indicum à loco natali.

In hortis non solum ex surculis, sed etià ex semine æci duo faciliè pvenit, flores Iunio, Julio & Augusto.

Vires Nasturtio similes esse gustus demonstrat. Vires Quare in acetarijs & medicamentis, idem qui Nasturtij usus. Inguiter, calidus Flos sanguineus à Monardæ dicitur.

NASTURTIVM INDICVM folio anguloso.



Iconē huius Dodonæo tantum videre contigit, Nasturtij Indici nomine missam, sed coloribus suis expressam, plantæ Europæ peregrinæ, quam America, vocata Occidentalis India gignit, speciem exhibentem Convolvuli; folia lata angulosa & pulchrè depinguntur vi- rentia; flos luteus retrò propendens habet corniculum instar floris Regij quam Delphinium appellant.

Lob. obs. & ic. ac Lugd. Nasturtium Indicum ex Dodonæo.

Siliqua huic Nasturtio appicta, putatur à Dod. Icon. Lob. & Clusio siliqua Nasturtij Indici peruviana, de qua mox dicendum.

NASTURTII INDICI PVTATA siliqua Peruviana.

Siliquam (huius icon in præcedenti tabella exhibetur) admodum elegantem habet Lob. à naucleris reducibus ex Peruvianis Indijs, teretem, rotundam, unciali & duos digitos longam, coriaceam, strijs & rugis exarata, luteolam, summo & imo ventriosam, tanullum falcatam.

Diximus nos ante titulo de Nasturtio Indico folio peltato, hanc siliquam non esse Nasturtij, ut Lobel. loco citato annotavit, qui juxta radicem Nasturtij Indici iconem huius siliquæ Peruvianæ posuit, quam etiam videre est in Icon. & apud Dod. hist. Nos hanc siliquam etiam habemus, non occurrat unde acceperimus. Et hæc est illa, de qua loquitur Clus. apud Monard. de Florè sanguineo cum ait: videtur Convulvuli genus, cuius fructus Chrysalidos speciem refert.

An B. pin. Nasturtium Indicum 2. Peruanum Monardis, folio rotundo, Lenticulæ paulò maiori.

CYCLAMINVS ALTERA veteribus. C. A. P. XLIV.

Cyclaminum alteram veterum Medicos igno- rare eruditorum pace cum Ruellio dixerimus. Quin caput Cyclamini alterius in ipsius Dioscoridis quibusdam exemplaribus desideratur. In quibus autem habetur, sequentia leguntur. Cyclaminus altera, quam nonnulli Cissanthemon aut Cissophyl- lon vocant, folia fert Hederæ, sed minor; caules crassos, geniculatos, quique circa vicinas arbores capreolorum

Cyclami- nus altera Diosc.

Cissanthemon aut Cissophyl- lon. Ciss. Sophyllis.

capreolorum modo sese volunt. Flores visuntur
 candidi, odorati. Fructus verò *Addit Lacuna ex vet.*
cod. d'adms, γλαυκῆ uvæ acinotum instar, corym-
 bis Hederae similis, mollis, ac sapore aliquantulum
 acris, atque lentus: radix supervacuâ. Nascitur locis
 asperis. Hujus fructus drachmæ unius pondere po-
 tus *[Goupylus esse scribit in veteri vestigia diverse cuius-
 dam scripturae, sed vulgatam, quippe qua optimum habeat
 sensum, veram esse existimat]* cum vini albi cyathis
 duobus ad quadraginta dies, lienem liquat, ac per
 urinas & alvū absumit. Bibitur & ad orthopnoeam:
 ac potus *[modicus, pota]* quoque reliquias à partu
 purgat. Quoniam autem alterius Cyclamini radi-
 cem supervacuam esse scripsit Galenus, ista *[ex d'adms
 modicus, purgat ebibita]* vel ad reliquam plantam, vel
 potius ad ipsius fructum, vel acinos (quod facilius
 Sarrae crediderit) referenda sunt. Quare pro *modi-
 cus, potus [eporus]* legendum putat, nimirum *xapros, cu-
 jus fit mentio.* Verba autem Galeni de altera Cy-
 clamino hæc sunt. Porro altera Cyclaminus radi-
 cem quidem supervacaneam habet, sed fructum ad-
 modum efficacem: nam hic cum vino pluribus die-
 bus potus lienes sanat, urinam movens, ac ven-
 trem subducens: locos quoque ejicit, & asthmaticis
 prodest. Qualitas ejus gustanti acris est & sublentia.
 Hanc etiam Cyclaminum describit Plinius l. 25.
 c. 9. Dioscoridem ferè exprimens his verbis: Est &
 altera Cyclaminos cognomine cissanthemos, geni-
 culatis caulibus, supervacuis, à priore distans, circa
 arbores se volvens, acinis Hederae, sed mollibus;
 flore candido, specioso, radice supervacuâ. Acini
 tantum in usu, gustu acii, sed lenti. Siccantur in um-
 bra, tuncque dividuntur in pastillos.

Cyclaminus uterque, autore Mesue, est medica-
 torius, calidus siccus initio tertij ordinis.

Pro Cyclamino altera varietate exhibentur plantæ.
 Cordus enim Glycypticon seu Dulcamaram, quod
 Lobelio non placet, pro Cyclamino altera exhibet.

Sigillum B. Mariæ quidam existimant Cyclami-
 num alteram, quorum opinionem falsam esse, facile
 intelliget, qui harum descriptiones contulerit. Nos
 Sigillum B. Mariæ, Viticam nigram quibusdam sive
 Tamum inscribimus.

Bryonia nigra est nonnullis Cyclaminus altera,
 quam sententiam non approbat Lobelius.

Placet Cæsalpino Vinciboscum *[Periclymenum à
 nobis inscriptum]* convenire cum altero Cyclamino
 Dioscoridis, vel ob fructus molliem, quod nobis
 non probatur.

Periclymenon alterum, autore Lobelio quibus-
 dam dicitur Cyclaminus altera, verum ea opinio ei
 non placet.

Albine repens Luca Ghino est Cyclaminus alte-
 ra Dioscoridis. Nos de Albine repente sub Cacuba-
 lo quorundam hoc libro (ubi eam opinionem re-
 jicimus) agimus, ut & de jam dictis.

Dubitat Lob. in obs. & c. de planta quadam He-
 deraceis foliis, an sit Cyclaminus altera, de qua jam
 dicendum.

CYCLAMINVS FORTE AL- tera, Hederaceis foliis planta.

SI quid conjecturæ captari potest, cujusmodi
 Stirps fuerit Cyclaminus altera: cognata Hederae
 & Cyclamini planta accipienda videtur: Hanc
 multa adumbrare videntur, nulla autem exple-
 re asseri potest. In Italiæ collibus, quo loci &
 quâ radice jam non occurrit, repertæ plantæ
 inque sportulas conjectæ sedulis vestigatoribus
 iconem & descriptionem exhibeo, inquit Lobe-



lius in obs. Her-
 ba est Hederae fo-
 liis sinuatis pati-
 bus; in mollibus
 flexilibus, cubito
 prolixioribus, ni-
 labat memoria,
 cauliculis flores
 oblongi, galericu-
 lati, ex purpura
 pallentes.

Lob. obs. & c. Synon.

An Cyclaminos
 altera, hederaceis
 foliis planta?

Lug. Cyclaminos
 altera hederaceis
 foliis. B. pin. He-
 dera 5. sive hede-
 raceis foliis plan-
 ta.

QUAMOCLIT. CAP. XLV.



Planta est ana-
 dendras, foliis
 prodiens oblongis
 & latiusculis initio
 binis sibi invicem
 connatis, quæ diu
 durant, etiam sese
 pertica involvente
 jam ipsâ plantâ: re-
 liqua folia Myrio-
 phyllo alteri apud
 Matthiolum similia
 sunt ac tenuia ad-
 nodum, ut Con-
 volvulus tenuio-
 lius non ineptè vo-
 cari possit; caulicu-
 li rubent, sed magis
 vergunt ad nigre-
 dinem; flores ele-
 gantissimo rubore
 placent in quinque

angulos collectis oris. Peti florum similitudine; se-
 men in capsulis oblongis fert itidem oblongum &
 fuscum, quod aquâ maceratum plerumque rumpi-
 tur, ut Campanæ Lazuræ grana. Sapor ipsius her-
 bæ est subdulcis & modicè nitrosus; capsulae verò
 nonnihil piper vel brasina Piperis gustatu referunt,
 ut & semen, quod parum abest, quin haud minore
 caliditate fauces nonnunquam afficiat.

Inferiore parte adjectos vides folliculos duos
 effractos; superiore verò florum calyculos duos, se-
 motas laminulas tres, & exempta femina trina.

Quamoclit plantam novam ex India allatam, & à
 Cæsalpino sub nomine Iasmini, folio Millefolij de-
 scriptam (cujus semen ipsi communicatum fuit à To-
 sepho de Casa bona) repræsentare studuit Cam. in-
 ter figuras in fine horti sub 40. numero, quamvis
 ipsi Norimbergæ exilior creverit, quàm in calidio-
 ribus regionibus. Sed hujus naturalem formam re-
 fert Pona, Iasminumque Indicum alterum rubrum
 Myriophylli folio inscribit. Huic autem anno, 1604.
 virebat ex semine à Ferdinando Imperato accep-
 to, fructumque ad maturitatem producebat.

B. pin. Iasminum 6. millefolij folio: Gelseminum
 alterum rubrum, Cæl. Gelseminum Indianum
 pennatum flore sanguineo, Pona It. Convolv-
 ulus pennatus exoticus, Col. Quamoclit, Cam. sive
 Iasminum americanum, Clus. cur. post.

PIPER IN GENERE.
CAP. XLVI.Diosc. de
Pipere.

Longum.

Candidum.

Delectum.

Theophr. ge-
nera.Junipero si-
milis arbor.Piper lon-
gum.

Candidum.

Nigrum.

Brachym.

Radix non
est Zingi-
beri.Adulter-
vium.Piperis in
Italia ar-
bor.Adulter-
vium.

Cerevisia.

Longum.

Album.

Philostatus Vitici Piperis arborem assimilat, tum aliis partibus, tum fructuum racemis. Sed Dioscorides arborem pipetiferam neque delineat, neque cuiquam alteri comparat, ita scribens; Piper brevis arbor [*πῖπερ ἄνθος*] esse traditur, nascens in India, quæ inter initia prælongum fructum veluti siliquam promit, quod est longum piper, habens in tus [*πῖπερ ἄνθος* addit Lacum. ex ver. cod.] aliquid tenui Milio simile, quod tandem in perfectum piper evadit. Id autem suis temporibus dehiens, racemos emittit grana ferentes, qualia videmus. Ea acerba candidum piper faciunt. Piperis radix Costo similis est.

Eligendum est gravissimum, plenum, nigrum, non valdè rugosum, recens, non furfurulosum. Invenitur etiam in genere nigri, nutrimento destitutum, inane, leve, quod vocatur Brasina, de quo ceu & de Pipere nigro & albo postea plura.

Theophrastus, qui [*πῖπερ*] tantum fructum esse dixit, ejus duo genera facit. Vnum rotundum [*πῖπερ ὀρόβιον*] ut Orobus, cute, carneque constans, sicuti Lauri baccæ, subrubrum [*πῖπερ ὀρόβιον*]. Alterum verò oblongum, [*πῖπερ ἄνθος*] nigrum [*Lugd. contra rotundum nigrum, oblongum subrubrum dicendum videtur*] semina parva papaveris [*πῖπερ ἄνθος*] continens: longè hoc validius altero. Ambo calefacientia, idèd conferunt hæc contra cicutam.

Plinius qui Junipero arborem comparavit ita scripsum reliquit: passim verò quæ piper gignunt arbores, Juniperis nostris similes, quanquam in fronte Caucasi solibus opposita gigni tantum eas aliqui tradidit. Semine à Junipero distant parvulis siliquis, quales in Fæolis videmus. Hæ priusquam dehiscent decerpit, tostæque sole, faciunt quod vocatur piper longum, paulatim verò dehiscentes per maturitatem ostendunt candidum piper: quod deinde tostum solibus, colore rugisque mutatur.

Verum & his sua injuria est, atque cæli intemperie carbunculantur, suntque semina casta & inania, quod vocant Brachmasin, sic Ludorum linguâ significante abortum. Hoc ex omni genere asperissimum est, levissimumque & pallidum. Gratius nigrum, leniusque utroque candidum. Non est huius arboris radix, ut aliqui existimant, quod vocant Zingiberi, alij verò Zimpiberi, quanquam sapore simile. Piper longum facillimè adulteratur, Alexandrino Sinapi. Emitur in libras x.v. Album x.vii. Nigrum xliij. Vsum eius adeo placuisse mirum est. Ir alius quippe suavitas cepit, in aliis species in vitavit: huic nec pomi, nec baccæ commendatio est aliqua, solâ placere amaritudine, & hanc in Indos peti. Quis illa primus cibus experiri voluit? aut cui in appetenda aviditate esurire non fuit satius? Vtrumque sylvestre gentibus suis est, & pondere emitur ut aurum vel argenteum. Piperis arborem iam & Italia habet maiorem Myrtho, nec ab similem. Amaritudo grano eadem, quæ pipeti musteo credita est. Deest tosta illa maturitas, idèd quæ & rugarum colorisque similitudo. Adulterantur Juniperi baccis mirè vim trahentibus. In pondere quidem multis modis.

Galenus tria piperis genera prodidit. Piperis, inquit, radix Costo maximè viribus similis est. Fructus autem recens iam germinantis, est piper longum. Quare etiam humidius est, quàm maturum. Signum humiditatis est, quod repositum facillè perforatur, & non statim mordet, sed paulatim incipit, diutius autem tem. perseverat. At fructus qui velut uva immatura est, album piper est, quod nigro acrius est. Illud enim non valuit superallatum iam & superexsecatum est. Ambo verò vehementer calefaciunt & exsiccant.

Longum piper, fraudulenter præparatum deprehendes, si aquâ maceraveris. Solvitur enim quod præparatum est. Quod verò nativum est. Indissolutum permanet. Est autem id quo piper, longum adulteratur, flava quædam herba, quæ ab exteris adfertur; similis illi aspectu, non tamen gustu similis. Quare etiam facillimum est ipsam discernere à longo pipere. Verum par est monente eodem Galeno lib. de Ther. ad Pitb. nem te non ignorare fraudes quas in longo pipere struant. Quidam enim ipsum confingunt vero Piperi longitudine æquale, & imposito Pyrethri vel Napyros aliquantulo, quia sensum hoc piper mordet, gustum fallunt. Verum qui circa hæc peritus fuerit, & suave acutimque gustu judicare noverit, præsertim si pediculum ipsi adhaerent accuratius inpperit, verum piper invenit, & ab istis decipi non potest.

Sicco pede prætereunda non sunt, quæ posteritati relinquere voluit Ludov. Vartom. Piper, inquit, suburbanus Calecuti ager mittit, legit etiam nonnihil intra urbem cultores. Caulis piperis infirmus est admodum, instarque vitis absque adminiculo (pedamenta vocamus) consistere nequit. Hederæque non est ab simile piper, quippe quod serpit, & altiore complexu proximam semper arborem vincere consuevit. Dicta arbor, imò frutex dispergitur in ramos complures, intra gemitum acterium palmarum longos. Folia eius Mali Assyrii figuram expriment, sed hæc crassiora pinguiscula nonnihil, intercurtantibus ex aduersa parte minoribus venis. E singulis malleolis leni dependent racemi palmo haud ampliores, passulis non ab similes, confectiores tamen. Coloris est, qui & immaturioribus visis. Legunt itaque mense Octobri atque Novembri in colorem prasinum adhuc inclinales, ad solèmq; apricantem assandum imponunt tegetibus. Triudò nigrescit non aliter quàm huc affertur: absque ullo alio cultu putandè, minùsq; ligonizandi cura est illis, simpliciter ac sincero telluris proventu.

Apud Plinium lego, inquit Ruellius, Piperis arborem iam olim Italiam habuisse maiorem Myrtho, nec ab similem. Qui Lusitani regis diligentissimi studio, Liburnici magnâ parte meridiani sitis ambitu Mauritanie circumvectis, in novum orbem se contulerunt, natales reliquæque faciem stirpis ad nos reuertere repræsentarunt; autem qui plurimâ se vidisse fatentur, fruticem non arborem piper edere narrant, alba vi in sepibus proreptati simillimum, vicinas scandentem arbores, qui racemosum ostendat fructum, primum viridem, nec aliter quàm in Ligustro coacervatum, quem antequam legitimâ maturitate nigrescat, lectum, sub sole palmeis tegetibus expandant, sicque baccas Solis æstu corrugari, vel passas nigrescere commemorant. In eodem frutice longum piper aut album offendi negant, sed alias arbores, quæ sapore, piperis nonnihil ferant oblongum, compahtibus callis racematim cohercentibus, veluti Ponticæ Nucis julum, quod inibi longum piper incolæ nominant, namque tam emulâ facie longum piper expriment, ut nisi sapor fallaciam proderet, nullo in signi discerniculo notarentur. Vides quàm dissimiliter exotica arbores à variis authoribus sit depictæ, quis forsitan eam non viderunt, sed potius indigenam fidem sequenti repræsentarunt. Id tamen non est omittendum, arboraceum fruticem apud nos esse, quo velut vivâ sepe latiores hortorum areas verustatis potius causâ, quàm munimenti cingunt. As altitudine ternum cubitorum innotebit & vitiginea fronde viret, supra modum asperâ, utriq; lateribus acuminatâ, medio in mucrone definitæ, ambitu leviter sumbriato, latis ad Lupi salictarij, vel vitis albæ solum accedente. Ramos fundit breves in quibus excusso flore primum baculæ pendent, virescentes,

Longi a-
dulterium.

Lud. Vartom.

Piper He-
dera non
ab simile.Brionia si-
milis piperi.Piperis lon-
gi & album
plantæ di-
gestæ.Am Smilax
aspera.

viides,

virides, ut in Ligustro racemati coacta, quæ maturitatem adipiscētes nigrescunt, gustu & sapore piperis, sed minusculo. Eæ prorsus rotundi piperis faciem exprimunt; verum desideratur in eis retorienda illa rugosaque maturitas: abest etiā illa validior amaritudo, gustum piperis sapore complens, & os, cuius anima foetet; odoris jugunditate commendans. Piper olitores nostri nominant, quod attritum piper colore & sapore forsitan æmuletur: sit ergo nobis Piperastrum quoad melius vocabulum inveni-
 mus. Vides itaque quam cæca sit harum rerum effigies. [Si licet iudicium nostrum adferre suspicor esse Smilacem asperam, Piperastrum Ruellii.] Alij oculatā fidem referunt longum piper esse ex alis arboribus veluti nucamentū quoddam, exilibus granulis quam-
 matum compactum, quod veluti julus in Avellana nuce, vermiculosā facie dependet, piperato gustu; nunquam in album tamen vel nigrum piper coale-
 scere. Qui Vitici assimilant julum compactilibus granulis coactum in eadem arbore fructum, veluti quendam cohirentis semini conceptum contendunt, quale forsitan in salicibus apparere cernimus, & etiā Vitice, Nucēque pontica. Nec deest
 si qui tradat visum sibi in India piperis fruticem, Hederæ modo amplexicaulem, folio Mali Assyrii, sed carnosiore pinguique, racemis palmaribus, coloris immaturæ uvæ: hos legi mense Novembri, ac in-
 solatos, nigrescere. Necjūs ultro citroque adjunctis volumus fidem antiquorum placitis derogare. Variæ sunt forsitan diversis regionibus arbores piperiferæ: uti & varia palmarum multarumque stirpium genera, palmulas tamen ferentia. In Ægypto ut Straboni placet, granum piperi simile, paulo tamen majus nascitur Corsion nomine, quod piperis vicem & acrementum pensat, si alterius non detur occasio.

Lusitani, Matthioli ita tradente, navig. suis, hoc ævo confectis per Oceanum Atlanticum versus Austrum primo, & hinc deinde in Orientem ad Calcutram, Taprobanam, aliasque Indici pelagi insulas: item Hispani Liburnicis vecti ad Occidentales Indias, Peru, atque alias complures regiones, quæ antiquos Geographos penitus latuerunt, non modò pipere & hujusmodi odoratis simplicibus, universam repleverunt Europam, sed & stirpium historias, à quibus oriuntur posteritati memoriz prodiderunt. Quod postea fecit, ut planè nobis ignotasse videantur Theophr. Diosc. & Plinius aut ob regionum distantiam (indigenam potius in hoc fidem sequuntur, quàm quod fortè ea viderint, quæ de pipere scriptis tradiderunt) aut ob aliam quamvis causam, plantæ illius formam, ac notas, quæ piper in India gignit, ac quonam modo piperis planta suum edat fructum, an scilicet racematim, an corymborum modo, an in siliquis inclusum, an bacciferarum arborum more. At hi qui suis Liburnicis immensa tra-

jecerunt maria, propriasque perlostrant regiones, ubi piperis utriusque plantæ virescunt, nigrum ac rotundum gigni narrant à quibusdam infirmis viticulis, vicinas arbores altiore complexi scandentibus, acutæ Clematidis non dissimilibus, folio tamen Malum Assyrium æmulantibus. Quin & racematim proferri uvarum Labruscæ modo, confertis tamen: deinde mense Octobri per maturitatem decerpi, & sub ferventi Sole tegetibus palmeis expansum torrer, quousque nigrescat, & rugosum evadat, quod tridui spatio plerumque fit. Longum autem ut idem testantur, aliæ ferunt arbores, estque velut nucamentum quoddam, exilibus granulis compactum, quod velut julus in pontica Nucē, qui pulchre adspicitur, vermiculosā facie dependet piperato gustu: nunquam tamen in album vel nigrum piper coalescit. Galenus indigenam fidem &

Dioscoriden sequutus, eandem plantam tantum duci quàm longum piper edere credidit. Piperis fruticem vidi Neapoli, qui Lusitanorum descriptioni maximè respondere visus est, quod viticulosō caule esset, Clematidis acutæ modo. Sed & aliam arbusculam piper racematim proferentem vidi Venetiis, quæ prorsus illius plantæ faciem exprimit, quam vulgus Ribem appellat. Viret hæc in horto Medici Maphci à Maphico, in quo plurima simplicia notata digna visuntur. Quò sit ut mire non sit, si in piperis hystoria variant auctores. Quandoquidem cum variæ in Italia piperiferæ habeantur arbusculæ, facillè credendum est varietatis longè majores eas in India reperiri. Hæc ille, qui figuram sibi depictam à Portugalesibus exhibet. Matthiolum *Matth. non* autem negligentem Botanicum fuisse apparet ex eo quod visum piper Neapoli non descripserit. Si benè considerasset plantam Venetiis visam, comperisset à pipere plurimum differre & nihil habere commune, nisi quod racemum ferat: ea autem planta nihil aliud est quàm Ribes nigra quibusdam dicta, de qua nos præsentī libro. Iconem quam ponit fallam existimamus quales plures habet.

Nascitur piper apud Indos, ut Amat. scribit, eo modo quo apud nos Hederæ, sic enim piperis planta parietibus & arboribus hæret, circumvolviturque folio Mali Cotonei, sed rotundiore, quanquam piper quoque in planta folia Vitis ferente nasci à nonnullis visum est, & hodie Venetiis in nonnullis hortis conspicitur. Nascitur enim prius piper, affixum ramulo, tanquam verruca carni, sed postea pediculis tanquam Hederæ bacca pendet. Virides namque piperis racemos aceto servatos, ex India ad nos amici transvexerunt: ex quibus exactè censemus, quod piper dicto modo crescat, nascaturque, sed quum ad maturitatem pervenit colligitur & in strobis ad torridum solem ponitur, ubi eo modo, quo nos corruptum videmus, efficitur. Interdum autem granum *Albam piperis* hoc omphac ac immaturum est, albumque piper appellatur, ita ut piper nigrum, & album ejusdem sit arboris fructus, nec in alio differant quàm majori, vel minori maturatione. Diosc. & Galen. errant, *Diosc. & Galen. err.* quia piper longum ejusdem arboris fructum esse credant, quum revera piper longum alterius arboris fructus sit, quæ ex insula Somatra, Taprobanæ dicta adducitur. Hæc Amat. qui tunc maximè deest. Amat. err. piper, quod Piperis arborem folio Mali Cotonei tradat

Cord. hist. Piperis genera describit, verum cum *Cord. not.* vix quicquam, quod sit alicujus momenti, aut quod ab antiquis non sit dictum, tradat, nihil hic addemus, ait enim, cum illis, sicuti & Monachi, omnia tria Piperis genera esse ex una planta. Ex Dodonæo etiam nihil addam quàm quod dicit Antucrpium adducti ex India Piper conditum cum pediculis.

Salvo meliori iudicio in defectu piperis albi, *Quædam* pro eo potius apponendum censent Monachi *de piperis* piperis, quàm nigrum: quia in stipticitate & *substituit.* confortatione magis convenient inter se. Possent etiam poni nigrum putant, quia quod album sit in medio, & de utroque ipsorum participet. Similiter & caret longo, potius præcipiunt accipiendum album, quàm nigrum, quia album magis appropinquet longo, quàm nigrum: Et de diverso, in defectu nigri ponendum consulunt album, quia propinquius sit. Item quandoque duæ ipsorum species desunt, per reliquam supplendas arbitrantur. Sed quando simpliciter legitur piper, semper album intelligendum docent secundum aliquorum opinionem, quod etiam probat Nicolaus Prepositus in suis *placuerit dicitur de .f.* Analogiis, quia (ut aiunt Avic. & filius Serap. quod ipsum ponant autoritate Galeni) piper album confortet stomachum, plurimamque alia duæ species.

Piper 檳榔
grum a-
criss a-
diao.

De acrimonia Piperis hæc Cordus hift. Vtrumque odoratum & gultu acerrimum, fervidiffimūque ef, odoratius tamen acriūque candido nigrius sentitur : ideōque medias habet candidum , inter longum & nigrum qualitates : tardius enim longi, citius candidi, ciffiffimè autem nigri acrimonia gultu percipitur, quamvis Diofcorides candidum (quoniam acerbum fit) utroque ignavius efle tradat, quàm bene non video , cùm abfurdum quoddam inde oriatur : nam idem Diofcorides nigro ignavius candidum ideo efle ratio cinatur, quoniam acerbis, b.e. immaturis fit nigro, ergo cùm longum quoque acerbis, immaturis, imperfectūque fit candido, fequitur necelfario longum Piper omnium efle ignaviffimum, ergo videtur aut hæc ratio cinatio nullum in veritate locum habere, aut Diofcoridem male tradere , candidum tam longo quàm nigro ignavius efle. Hæc Cordus qui Piper rotundum feu nigrum, ex longo fieri odoratum, acriūque candido dicit, fed male , Quod autem quum Piper fimplici-
ter pronunciat, nigrum contra Monachos qui al-
bum præferunt, intelligat, noftro iudicio doctè
fentit.

Cord. not.

Piper simpliciter,
nigro int.
ligitur,

Sed quid de Pipere referant, quid se vidisse glo-
riantur, mox audiendum, circa Calecut (inquit Cro-
nemb.) in India copiosè provenit pipere, etiam in
urbe sed parvâ quantitate: truncus similis est Viti, si
plantetur juxta arborem, alioquin non potest assue-
gere: provenit Lupulimodo: plurimos fert ramos
duarum aut trium palmarum longos; folia similia
Melampoli. Ex ramulis prodeunt 5. 6. aut 8. pediculi
paullò longiores digito, quibus adhæret pipere par-
vorum horummodi modo, levis magis angulosus, vi-
ret in instar Agrestis. Mense Octobri & Novembri im-
maturi botri excinduntur, supra lineæ exponuntur
foli per tres aut quatuor dies, sic exsiccat & ni-
grum fit. Simile quid refert Ioon. Senecator, dicens:
duo genera Piperis in America sunt; alterum flavesc-
ens; alterum vetò rubescens, eodem fere modo
formâ fulscentia: dum virescunt Cynofolii habet
magnitudinem; frutes per se humilis est, lequicu-
bitum altus, foliis exiguis, sed abundans Piperis,
quod acriter in ore mordicat: maturum decerpunt
& foli expositum siccant. Est et tertium genus Pi-
peris, sed minoribus granulis, a prædictis non mul-
tum diffidens, quod similiter sub sole torretur. Sum-
mi illi radices Letuhi dictæ, satis boni saporis, quas si
plantare institunt, confidunt eas in minuta fru-
sta, quæ terrâ obruta radices agunt, & abundè pro-
ducunt. Hæc attestari videtur Marantha cum ait,
Piperis arborem cum Dioscoridi videre non licue-
rit, atque ex aliorum scriptis ejus fructus describere,
tria illius genera ejusdem arboris esse tradit:
& tamen hi, qui in novas Indias navigarunt, quique
arbores videntur, diversarum arborum fructus ni-
grum, candidum & longum esse affirant.

Veterum
quidam
et illustra
tur.

*Candens
flamma.*

Piper all
c. 1. 1. 1.

Illud potest Galeni hb. 9. c. 4. fec. locos
Vigniri & drachmas candentis cinijce flammæ
In Græco sic habetur:
ὁ καὶ δ' ὑποκρίνεται τὸν καὶ δ' ὑποκρίνεται
Appellavit itaque Cornarius candentem flammam
ipsum Piper album, à flammeo fervore quem ha-
bet, unde etiam *πυρρὸς ὑπόκρινος*, quasi ignitus can-
denter. Philo dicit. Quemadmodum autem Philo Pi-
per album hoc loco ænigmatice *πυρρὸς ὑπόκρινος* dicitur
Sic Andromachus senior in Elegiaci carmine, quo
Theniacam ex viperis describit, à Galeno r. lib. de
antidotis relato, idem Piper album *ὑπόκρινος* appella-
vit, à nitore videlicet quem habet. Sic enim ait
ἡλόκαυτος ὑπόκρινος ὑπόκρινος
ὑπόκρινος ὑπόκρινος ὑπόκρινος. Id est
Thoracæ melleis mox, aglati, æneis et nitentem
Cuiusmodi mixta an tinctoris hinc Pipere.

Quod ipsum tamen neque à Galeno animadvertit. ^{Galeni in!}
 lum est. Hos enim versus exponens inquit, non
 quære oportere de Aglaia, tanquam alterius ali- ^{Aglaia}
 cuius pharமாக nomen sit, quum neque in pedestri ^{Galeno,}
 junioris Andromachi descriptione, neque in ea que
 ad ejus ætatem per successionem pervenit, alicujus
 pharமாக nomen Aglaia reperitur, & ea omnia
 que hoc pharமாக sex drachmarum pondere reci-
 pit, consonè tum seniori, tum juniori Androma-
 cho sunt relata, & omnino nihil extra illa additum
 sit, ad quod Aglaie nomen referendum qui putes,
 ut fortassis Aglaiam epitheton Thuris, elegit auctori
 apponere visum fuerit: Sic Galenus. Ego itaque o-
 mino rem inquirendam, & quidem attentius du-
 xi, & lætè repertam etiam mihi fœliciter spero. A ^{Aglaia est}
 glaiam enim Andromachus senior nihil aliud quam ^{Piper al-}
 piper album, velut dixi, appellavit. Piper autem al-
 bum aliàs in versibus Andromachi non habetur,
 quum tamen junior Andromachus ipsum ponat,
 sed ita ut hac parte variant hæc hujus Antidoti de-
 scriptiones, aliàs nullà re differentes, quod videli-
 cet senior Piper longum in principio xxiiij. drach-
 marum pondere posuit, & eoloco pro eo junior pi-
 per nigrum habet eodem pondere: hoc vero loco
 inter res quæ sex drachmarum pondere recipiun-
 tur, senior album & nigrum Piper posuit; junior ve-
 rò album & longum retulit, ita ut diversitas tantum
 in nigro & longo pipere sit, quorum alterum alter
 xxiiij. drachmarum pondere, alter sex receptabilis
 verò in utroque inter res sex drachmarum pondere
 ammixtas habetur & *αγλαία* à seniore appellatur.
 Hæc Cornarius.

Piperis igitur simpliciter dicti nomine, intelligendum venit in primis Piper nigrum: In cujus genere Dioscoridi est Brasma, Plinio Brachmalis, quod Abortus piperis. Præterea Piper album, sive Andromach. senior in Theriaca Aglaïæ vocabulo insinuat, quamvis Dioscorides eximiat, esse epitheton ut annotavit Cornarius.

Piperinfulę Taprobanę candidius Melaga diſtū.
Piper caudatum, Piper longum, Piper Æthiopi-
cum filiquoſum, Piper floridę, & Piper longum Fel-
fel Alpini, de quibus mox ordine dicemus.

Piperis præterea genus, vel Piperastrum Ruelli *Smilax aspera*.
habetur, quod *Smilax aspera* creditur.

Piper etiam in horto Maphæi à Matthiolo visum *Ribes nigrum*
est Ribes nigrum à quibusdā dictum: De his jam *egimus.*

Piper Indicum sive Calecuticum siliquosum. *Piper Indi-
cum*
Piper siliqua parva Brasl. Pter siliquosum magni-
Siliqua
tudinis baccarum Aſparagi. Piperis Calecutici pa-
parva.
rum genus, siliquis oblongis: de his lib. 21.

Nose, Piper Lat. Germ. Pfeffer: Belg. Peper: *Lingua*.
Gall. Poinre: Ital. Pepe: Hisp. Pimenta: Arab. Fulful.
Boh. Peper.

Loca in quibus Piper potissimum provenit hæc
sunt. Malavar, Onor, Barfelo, Mangalor, Calcut,
Granganor, Cochín, Coulan, ubi lingua Malavari-
ca, *Molonga* appellatur. Crescit etiam in Queda
prope Malacam: & Malayvicè *Lada* vocatur. Hoc
Piper potissimum versús Pegu vehitur & regiones
Nordicæ Septentrionales. Piper otiam sequentes
Provinciæ ferunt, Pedir, Camper, Andragiri, Jambe,
Bares, Speriamon, Dampin, quæ regiones sunt Su-
matræ: Item in Java Bantam, & Iavæ plaga West-
fetten/ Anter, Chuconit, Molassery, Char gabaya,
Cherola, Charita, Cheretgin, Labuat, Buamar, Iffe-
bongor, Pariban, & locus quidam quatuor milliari-
us distans à Bantam Versus Orientem, Puncta vi-
dus. Hæcigitur omnia loca Piper alunt. Piper ma-
turescit in Java mensibus Septembri atq; Octobri.
Colligitur Novembri & Decembri, & in Bantam, &
potissimum in Chinam vehitur. Lingua Javanicè

prehensum sensum extrahendo leviter dentibus premere, ut grana in ore mancant; illa postea mandere non sine voluptate. Idem ipsum factitasse, & gustu suaves deprehendisse, quia levem quandam acrimoniam cum pauxilla acerbitate conjunctam in illis deprehendebat. Idem Clusius in notis in Garciam ait: Putat errorem esse Garcias si Piper ab aliis *Fulfil* dicatur, cum Arabes *Fisfil* vocent. Sed cum omnes totidem literis scribant, & diversitatem diversis literarum apices tantum efficiant, in omnium arbitrio est, utro malint modo, pronunciare, *Fisfil*, aut *Fulfil*. Piperis plantam ita describit Auctor geographiae Arabicae: Et in insula, h. e. terra Mali, nascitur arbor Piperis; neque nascitur nisi in ipsa, aut in Candaria, aut in Gerbathan: & nullam invenitur, nisi in istis tribus terris. Est autem planta, cujus stipes aliquantum similis est stipiti Vitis, foliis instar foliorum plantae Volubilis sive Faveoli, longa, non alta, racemis instar racemorum Vitis, quorum unusquisque occultatur folio suo propter pluviam, quod inflectitur, adveniente pluvia. Piper verò album non inflectitur ab ea, superveniente illa initio aut ante. *Hachi* filius Charii dicit de eo, quod quum est pluvia, inflectuntur folia ejus super racemos istos, & defendunt eos à pluvia, quum recessit pluvia, attolluntur sive remouentur folia à racemis, neque revertuntur, nisi tempore pluviae. Revertente pluvia, revertitur folia ad ipsos. & hoc est mirum. Hæc ille, quæ nisi fallor, ait Clusius, indigent peritorum hominum examine. Nam mihi suspecta sunt. Sed Arabes multa ejusmodi fabulantur, ut Indæ.

A C O S T A Piper aliud domesticum esse tradit, cujus usus sit, aliud sylvestre, quod ob amarorem negligatur. Domesticum, inquit is, planta samentosa est, scanditque Hederæ modo, arboribus, quas nancisci potest, sese circumvolvendo: nodis per intervalla prædita, ad quos nascuntur folia, Betele foliis similia, parte interiore saturè virentia, exteriore dilutiora, cuspidem mucronata, & gustu linguam vellicante. Horum foliorum alia aliis nigriora sunt: quæ dilutiora sunt fibratæque æqualiter nascentes habent, feminas cæsent (nam utrumque sexum in



foliis ejusdem plantæ constituunt) nigriora verò inæqualibus fibris, mares. Ad singula internodia, unde folia dependent, ex ipsa foliorum sede nascuntur uvæ, quarum maximè circiter quinquaginta grana obtinent, minores verò triginta. Radix pusilla est & summa tellure fibras agit. Summa autem similitudo est plantarum quæ nigrum Piper proferunt & album: alibi tamen folia tenuiora & molliora videntur: ejus etiam fructus magis aromaticus, meliorisque saporis quam nigrum.

Lugd. quæ quatuor exhibet figuras, Galenum notat quòd Dioscoridem secutus eandem plantam piper longum, candidum & nigrum proferre falsò crediderit. Figuras autem quatuor sub his titulis exhibet Lugd. Arbor piperifera Theveti: Piper nigrum & album: Piper Matthioli: Item in app. Piper ni-

Tom. II.

grum Acoftæ. Galeni sententiam Cùm quoque rejicit. Pingit autem racemos rotundi piperis & folia reperta sæpius inter grana, item longum piper, negat tamen in eadem planta crescere piper album & nigrum, sed consimili tantum, ut botros rubros & albos in diversis vitibus; rariores autem statui esse plantas quæ album, quàm quæ nigrum piper proferant: piper nigrum ait arundinibus sustineri quemadmodum ferè apud Belgas Lupulū. Caulem namque debilem esse, & sine ope alterius surrigi non posse, rami lunipetinis similes; grana viridia primum, dein matura facta atque siccata nigrescere.

Folia quæ pingit Linchot. non sunt Hederæ similia, sed Lauro: Nos figuras diversas proponimus; Prior quam ponimus nobis absentibus depicta est ex Clusio. (Hæc olim posita simpliciter pro Piperis uva; postremò verò pro piperis albi uva) vera quidem, verum per Sculptorem malè sculpta: ad latera additum granum caudatum, quod est Piper caudatū sub signo crucis; & Haermia sub signo Stellæ, sed utrumque semen per Sculptorem corruptum. Icon secunda, quam proponimus est ex Clusij exoticis; Tertia, quæ est ex Acoftæ & figuris æneis, displicet nobis, verum certò asserere non possumus non visâ plantâ quæ melior icon: Camerarij folia piperis exhibemus juxta iconē Piperis caudati sub litera A. Matthioli figuram nō exhibemus, quia ei non confuetum vera figuris exprimere, eam facillè possemus asserere falsam & numquam ei ita visam. Theveti effigiem non sine occasione omitimus, quam tamen Ambrosius Pareus assumpsit lib. suæ Chirurgiæ 26. c. 12. quia falsa est, quod apparet ex seminibus quæ pingit cum pediculis Hederæ modo adherentibus, cum uvam representent: Ex historia & iconæ præterea Clusij, quam hoc capite ponimus, apparet satis ineptè Thevetum appingere piperi truncum arboreum magnum, licet scribat esse arbuticulum: & cur scribit, Mali Medici foliis similia, & nihilominus in iconē sunt planè Hederacea.

B. pin. Piper i. rotundum nigrum: Piper nigrum, Matth. Lac. Cast. Garz. Frag. Clus. & Lug. Tab. Piper rotundū nigrū, Cord. hist. Lob. adv. & Cæs. Piper nigrū in Calecut, Lud. Romano. Piper rotundū Hippocratis, Garz. Quid sibi velit Matthiolus cū sua figura, q̄ & Cast. Lugd. Tab. & Ger. habent, nō assequor. de ea figura hic Guilandinus: si frutex ille Piper est, vel etiā Amomū, ut alij sōniant, parū aberit, quin vulgare Ribes, vel Piper, vel Amomum esse possit. Senit Piperis planta hoc modo: samentū ejus seu ramū juxta prægrandē qualicumq; arborem (magna certè ex parte juxta Fauſel, ut Palmā plantatā vidit Garcias) aut palū defoditur, atq; bubulū sterus, & cineres cū aqua inſpergūtur: infra annū deinde fructifera est, quòque vetustior est planta, eò feracior, quippe quæ ad ipsius arboris, cui maritata est, fastigiū sese circumvolvendo scandere soleat. In Couchin verò ubi plurimū nigrū nascitur, quinq; aureis emi solebāt cētēq; libræ: sed post quadriennii aut quinquennium, q̄ in alias etiā regiones importari ceperit, quindēcim aut viginti aureis emendæ erāt. Piperis autē nigri pretium in centenas libras est duorum Lusitanicorum cum semisse, natali loco: in Bangala duodecim Lusitanicis emuntur totidem libræ.

Piper nigrum rotundum in Insula Sumatra provenit & præaltas Cānas scādit. Maxima Piperis quantitas provenit in Malavar, tota ea maritima regione quæ à Promōtorio Comorin ad Cananor usq; pertingit. Nascitur etiā in Malacæ maritimis, sed bonitate superiori cedens & magna ex parte inane. Provenit similiter & in Insulis lavæ vicinis, & Sunda, & Cuda, aliisque locis. Sed id totū in Chinarum regionem deportatur, & loco natali consumitur, præter id quod in Pegu & Martaban exportatur. Poni-

De iconib.

Matth. nos.

Thevet. nos.

Eius ferè di ratio.

Pretium.

Locus.

Piperis nigræ.

lima etiam ejus pars quod in Malavar gignitur, in usum incolarum cedit, tamen regio admodum ampla non sit: non nihil etiam à maritimis ejus regionis populis absumitur: Pars desertur in Balagale bubulis coriis: & magna copia (tamen regio mandata sit vetitum) à Mauritanis per mare Erythræum exportatur, id suffragantibus ipsis incolis. Eæ sunt regiones quæ Piper gignunt, quamquam & inveniuntur supra Cananor, quæ Septentrionem spectat: sed adeo exigua quantitate, ut ipsis incolis non sufficiat, & externo importato opus habeant. Etenim non gaudet hæc planta locis desertis & mediterraneis. Quam verò procul à Caucaſo monte distat sint hæc regiones, ex topographicis chartis satis patet.

Vires.
Colica.

Tempera-
mentum.

Piperis nigri foliis utuntur incolæ adversus dolores colicos aliisque frigidos corporis affectus. Condiuntur aceto aut sale virentes adhuc & immaturi piperis nigri racemi & ului asservantur. Arabes & Persæ medici piper calidum tertio ordine constituunt. Sed Empirici cujusmodi sunt maxima pars Indicorum medicorum, frigidum piper faciunt, ut & pleraque alia aromata quæ excalfaciunt. Eiusmodi autem erroris causa fortè hæc fuit. Quod ut ait *Fracaſt.* lib. 1. de Contag. dum mistio perstat, dum igneæ partes separatæ sunt & dispersæ, sepultæque in aliis, alteratio nulla introsum fit, quare & Piper & Euphorbium, & reliqua tractata manibus frigida sentiuntur. At ubi casu aliquo mistio illa solvitur & mutatur, & partes quæ ejusdem rationis sunt, in unum coeunt, & majorem quantitatem & potentiam ad agendum acquirunt, tum acti fiunt, & agunt jam, unde & Calx, & Piper, & Euphorbium jam calida percipiuntur, quàm prius potentiâ solum calida essent, actu verò aliter se habentia propter eandem causam, nec seminaria intus locum sese alterant, quamquam è diversis consent, utpote mista, quod autem in tam pauca quantitate vis multainesse possit, declarant & Euphorbij, & Piperis, & similium particulæ minimæ & effugientes visum, quibus tanta vis à natura tributa est, adeo refert ignem in materia densa contineri, quamquam parva sit. Item: Quis putaret è Pipere, Iride, & Ptarmica sternutamentum conciliari? exhalant nimirum ex omnibus his ac circumquaque feruntur insensibilia corpora, quorû diversæ actiones sunt & facultates.

PIPER ARBOTIVVM, BRASMA.

Reperitur etiamnum Piper quoddam in genere nigri, nutrimento defectum, cassum seu inane æcleve, quod Brasma [*aprasma*] Diosc. vocat. Hoc non dubitamus nos asserere esse Piper immaturum. Lugduni sæpè vidimus, racemorum instar, quale habemus adhuc, de quo egimus in descriptione Piperis nigri, id manifestè demonstrat longum Piper à nigro multum differre.

Brachma-
sis.
Piper abor-
tivum.

Syn. C. B.

Vires.
Puritas.

Semina, inquit Plinius, cassà & inania vocant Brachmasin Indorum lingua, sic significante abortivum. Cæs. Brasina. Cord. hist. Piper abortivum, sive Brosina sive Brasma, Negociatoribus Gerbelor nominatum. Sed nec Brasma vocabulum quod apud Dioscoridem legitur, nec Brechmasin, quod apud Plinium, unquam his in regionibus audivit, aut auditum putat Garcias, cui Piper quod lingua Malavaricà à Canara nomen sumptit.

B. pin. Piper 10. inane: Piper Canarinum, Frag. Lugd. Linc. 4. par. Ind. or. c. 18. Hoc cæruleum est, intus cavum, in cujus spatio granula quædam continentur, quod paupercula plebis usus cedit, quare Canarium, rusticum vocari solet: & propter vilitatem ad exteros non effertur.

Est hoc inane illòque utuntur ad pituitam à capi-

te evacuandam, dentiumque dolores mitigandos: Dentei, nonnulli & in cholerico, quem vocant affectu, miris laudibus celebrant.

PIPER ALBVM.

Piper album magnitudine videtur nigro cedere, utrinque umbilico tantillum prominulo, exiguo, minimè rugoso, albedo sive cinericeo: substantia ejus interior bicolor est quæadmodum piperis nigri, & cava in medullis (præter albâ pelliculam quam habet) apparet; cortex, quo grana integuntur, nigricans facile detrahitur, quod non fieret si esset immaturum, ut Galenus & nonnulli volunt; sapore adeo est fervido pradium, ut jam supra triginta annos in capsulis meis reservatum fauces igneo ardore urat, quanto magis recens, quo argumento convincuntur ij, qui piper album nigro immaturius contendunt, nec aliâ ratione differre ex vestigiis reliquiarum corticum apparet delibratum.

Immaturus
non est

Ceterum piperis albi meminisse constat Diosc. nominantem *πῖπερ λευκόν*, *πῖπερ λευκώδες*, quod commodum maximè dicit ad ocularia medicamenta & ad antidotos theriacalesque compositiones. Hoc Galenus lib. 1. de antid. ex Androm. seniore, per *εὐραλίον* significat, quam Cornarius, uti dictum ante, cadentem Flammam, à flâmeco fervore nuncupat, & *Flamm. admodens*, quasi igneam candidum Philo dicit.

Synon.
Piper am-
phacodes.

Et licet Sylvius piper album ex longo fieri testatus sit: attamen piper candidum in propria planta provenit differente à nigro, ut Vitis albam ferens uvam, ab ea quæ nigram fert: Candidum quidem nigro calidius & odoratius est, vel Lobelio teste. Et hinc Cordo assentiri non possum, qui l. 4. hist. piper album ignavius nigro existimat, Dioscoridem secutus, licet cum in eo interim reprehendat, quod candidum etiam ipso longo ignavius putant. Sed errat & Matthiolum, qui in hist. germ. piper rotundum album ante maturitatem colligi, ideoque nec tam acre & gratum esse dicit, quàm nigrum.

Candidi autem plantæ rariores sunt, nec nisi cæcis Malavar & Malacæ locis rare nascuntur, autore Garcia. Vidit Clusius Vlyssipone candidum piper, & inde secum attulit grano non rugoso, sed pleno, acriore & odoratiori quàm nigrum, Vlyssipone tamen neglectum. Ex Indiis verò copiosum saltè quod medicamentis sufficeret, haberi posset, si Lusitani pharmacopolæ paulo diligentiores essent. Invenitur interdum Antuerpiæ apud Myropolas nigro permixtum: sic & racemos nonnunquam cum Zingiberis radicibus mixta conditis, ibidem reperire licet, oblongos quidem illos & graciles, neque ita sacros, ut sunt uvarum racemi.

Locust.

Matth. Lac. Garc. Frag. Clus. ad Garc. Cast. Lugd. Linc. 4. par. Ind. or. c. 18. Tab. Turn. & Lob. obs. Piper album. Piper rotundum album, Cord. hist. Piperis alterum genus candidum crassiori grano, Cæs. Piper 2. rotundum album, B. pin. cui & piperis alterum genus, quod in Taprobana Molaga vocant, Lud. Romano. Sabanh pute, seu piper album, reliquis paulo exilius, in Sunda, part. 4. Ind. or. c. 8. Nos cum Cæsalpino piper in Taprobana, Molaga vocatum, à pipere hoc candido se jungimus.

Synon.

C. Bauh.

Candidum piper solet magnatum mensis inferri: eo enim utuntur quemadmodum nos sale: venenis resiliere & ocularibus medicamentis prodesse asservunt, quod & Diosc. annotavit, atque utinam totam hujus plantæ historiam tam verè descripsisset. Oratos autem omnes Medicos volo, ut piperis candidi loco (quod calidius est & odoratius) nigrum non præscribant, nisi candidi sit penuria. Similiter ne longum piper candidi aut nigri loco substituant.

Vires.

Puritas.

PIPER

PIPER INSVLÆ TAPROBANÆ
candidius Mol. g.

L Vd. Vartom. lib. 6. Indicarum rerum de pipere Inſulæ Taprobanæ ita tradit: In ſulæ Sumatre urbe Pyder, procerioris piperis uberior eſt proven-tus, miraque copia: lingua patriâ piper Molaga dici-tur, i. e. longè procerius illo quod huc advehitur, multoque candidius, verùm inane ac mordax pluri-mum, ſed ponderoſum mind: venit enim inibi pi-per non pondere, ſed menſurâ, ut apud nos Triticum exponitur. Tanta eſt huius ubertas, ut inde an-nò ſingulo vicenâ naves onuſtæ evehantur: hæ Ca-taium proficiſcuntur, illic exponitur haud difficul-ter ob ſrigidius cælum. Arbor verò, quæ piper hu-jusmodi gignit procerius, craſſioris eſt caudicis, am-prioraque folia, eadēque carnoſiora habet arbori-bus urbis Calcut. Car. Piperis alterū genus in Ta-probana copioſum, & patrio nomine Molaga voca-tum, quod maximè apud Tartaros diſpenſatur.

PIPER CAVDATVM.



Piper caudatum nomen partim à ſapore, partim à forma invenit: grana ſunt pipere & albo & nigro ple-rumque minora, quedam equalia, ex rotundo ſublonga, & pediculus verſus turbinata, & ut vulgare nomē præ-fert, caudata, coloris nigricantis vel fulci, inter piper al-bum & nigrum medi-j, cortice craſſiſculo, extenſo, interdum non nihil vel rugoſo, vel criſ-po, medullam comprehendente, piperis vulgaris modo bicolore, duriuſculam, in cuius tamen medio non conſpicitur vacuus ille ſcrobicu-lus: ſaporidem nihilominus cum pipere vulgato, iam etiam ſupra an-num trigefimum.

An Monachis in Mel. diſt. 1. prima Cubeba Pandecta-rij, ſylveſtris fortè, cujus grana tra-duntur minora & ſicut piper acuta.

Olim Antuer-piam invecum pi-peris genus, quod Luſitani *Pimenta*

del Rabo (de quo dubitat Scalig. exerc. 148. ne ſit Cubeba, quamvis nihil aſſerat), caudatum piper ap-pellabant: Cubebis ſerè ſimile erat [ita deſcribente Tom. II.

Cluſio] pediculo ſubnixum exiguo, rotundum, ple-num, aliquantulum rugoſum, nigricans, eadē a-crimoniâ quâ piper præditum, aromaucum, rac-ematum (ut ab iis qui racemos habuerunt, didicit) cohærens. Amomum nonnulli periti perperam exiſtimarunt. Caterùm ſimiles uvæ ſeptennio poſt ex Guinea recens allatas, accipiebat ab hone-ſtiſſimis iſtèdemque humaniſſimis viris, V Vilhelmo Parduyn & Petro Gareco, Piperis ex Guinea appel-latione. Erant autem illarum quædam breves & un-ciales tantùm, nonnullæ verò tres uncias ſerè longæ, tenui ſtilo inhærentes, longiſculo petiolo grana rotunda, vel minora, vel craſſiſcula continen-tes, vicena, tricena, interdum plura, legitimo quidem pipere minora, non minùs tamen ſervi-di ſaporis, duræ & ſolida, ejuſdem etiam penè coloris. An porrò ipſa planta perinde arbores & perticas ſcandat, ut ejus quod ex Orientali India adfertur, hæcenus intelligere non licuit.

Quùm caudati piperis figuram curavimus pa-
randam non viſa erat racemoſa Cluſij: ea autem cum à ſculptore mindſ feliciter ſit effigiata (ceu in prima iconè piperis nigri ſub ſigno crucis videre li-cet) Cluſij etiam figuram proponimus.

Anguillara, cui dicitur Amomum & Piperis *Amomum*, ſpecies, à Portugalenſibus *Pimenta del Rabo* di-ctum, pro Pipere Æthiopico vendi ſolium, ait in Syria vocari Piper ſylveſtre, plantam deſcri-bi folio Vitis, quæ ipſi quondam viſa ſit Venetiis & Patavij. Lectoris perpendant an Anguill. non exiſtimavit eſſe Ribes nigrum quibuſdam dictum, fruticem ferentem hoc Piperis genus, licèt bacca ſucculentæ nullo modo reſpondeant. Lob. adv. Piper caudatum *Pimenta del Rabo* Luſitani (Cluſ. ad Garz. Frag. Lugd.) dicta, Amomo apta planta, *Amomum*. *Piper metſicren* vocata Belgis i. e. caudatum pi-per cujus folia prodidit eſſe foliis Vitis Anguilla-ra. Eid. Lob. de Baſſamo: Piper caudatum, Amo-mum creditum.

Apollo, ex Anguillara hæc pro ſuis venditat: *Apollo* ta-
ſunt, ait, qui piper ſylveſtre Syrium, *Pimentum del Rabo* Luſitanis vocatum (cujus plantæ tum Vene-tiis, tum Patavij in hortis quibuſdam viſuntur) A-momum exiſtunt, ſuffrutex enim eſt viügineis foliis, racemoſis floribus, candentibuſque in acer-rima ſemina Aphacæ magnitudine terminantibus: omni ex parte gravi, acrique odore præditus.

Lugd. Piper caudatum Cluſio. Imp. hiſt. nat. *Pepe di Rabo*, Piperis racemoſi genus, quod adferunt Luſitani, quidamque Amomum antiquorum exiſti-mant, novum Piperis genus. B. pin. Piper n. ra-cemoſum caudatum ex Guinea: Amomum Anguil-laræ: *Pimento del Rabo*, Linſcot. part. 4. Ind. orient. fig. 15.

PIPER LONGVM.

Piper longum nucamenta betulacea æmulatur, un-ciam aut ſeſcunciam longum, teres, ali-quando planum, coloris fulci vel cinerei, reticula-to verruculatur plexu, in ſuperficie aſperum, cujus pro numero grana pelliculis ſcoſſim privatis in-cluſa, Sinapiſ granis paria, foris nigricantia, intùs Grana. ſubalbida, guſtu non cedente nigro vel albo, quanquam non ſtatim apparente: pendet autem hi juli ex pediculo gracili unciali, alteri fini-in-ſerto.


Dioſc. *metſicren* dicitur, quod tandem in per-ſectum piper evadere credit.

Theophr. qui inquit longum piper diver-ſi generis eſſe, vocat piper prælongum nigrum, *Piperis lon-gi generis, di-verſi.*

Fructus Pi-
peris ger-
minatus.

semine papaveris: Galen. Fructus piperis jam germinatus esse piper longum contendit, quod si fraudulenter præparatum sit, si aqua mace-
setur, solvatur, si verò nativum sit, indissolutum permaneat. Magnitudine verò Piper hoc aliud superare ait corticemq; subtiliorem & minus rugosum habere.

PIPER LONGUM MONARDIS.



Gal. & Dio.
reprehenduntur.

PIPER LONGUM CLUSII.



Piper Indum.

Cord. refut.

Macropiper.

Folio Mori.

Arbor Juno
pero similis.

Zoeus.

gum & rotundum, cum pediculis qui demonstrabat diversam esse plantam: per illos enim apparebat, longum in rotundum non posse diffundi; semina etiam jam perfecta & matura medullâ suâ differabant. Vt D. Presburger annotat, Guilandinus piper Indum, Capsicum Actuarij, & piper longum Diosc. idem esse tradit. Cord. in Diosc. facit piper longum nigro & candido omnino dissimile. Idem verò hist. (ubi describit) censet esse cum Diosc. Galeno & Plinio rudimentum piperis albi & nigri. Sed si piper est immaturum cur granula medullâ albâ plena: cur in uvis piperis granum ejus integrum apparet, ac etiam illa, quæ minora sunt, inania & idem Brasina. Lob. obs. piper longum quæ ejus m. Ma-
cropsiper. Eid. adv. ang. Lang. pepper. ger. Lange-
pfeffer; Belg. Lange peper; Hisp. Pimenta: Item pi-
per longum à pipere nigro diversa planta, folio
Mori. Tab. piper longum minus.

Et licet Cæsalpinus, cui piper tertium longum dicitur, arborem à recentioribus describi neget, ac Solinum & Plinium eam Junipero tantum similem tradidisse scribat, non desuerunt tamen, qui eam delinearint.

Piperis longi apud Aromatarios multi culci pleni conspiciuntur: sed & Batavi nauleri magnam ejus quantitatem cum aliis aromatibus anno 1597. ex India ad nos attulerunt, & singulis annis adhuc adve-

hunt, quæ cum diffuset ab eo cujus Nicolaus Monardes meminit libro de simpl. med. ex Novo orbe delatis, ejus iconem ad vivum expressam exhib. exot. petam, post piperis nigri iconem, hæc adjiciendam (inquit Clus. apud Garc. arom. l. 2. c. 22.) putavi. Botanorum maxima pars duarum unciarum longitudinem raro excedit, tametsi inter recens allatos repererim ad trium unciarum longitudinem productos, nullum verò minimi digiti crassitudinem æquantem, sed graciliorem, & æqualis penè ubique crassitudinis, plurimis granis Milij repurgati granorum instar, oblique secundum longitudinem dispositis constantem, cineracei quodammodo externâ parte coloris, internâ albi, fervidi saporis. Plantam

igitur (pergit Clus. exot. l. 2. c. 20.) quæ longum piper profert, ab ea in qua nigrum nascitur, longè dissimilem esse scribit Garcias, sed (quod ejus viti pcedit volo) plurimum fallitur, meâ quidem sententiâ. Nam plantæ longum piper ferentis ramulum pedalem ternis foliis & binis fructibus præditum anno à nato Christo 1601. Amstelredami dono accipiebam ab eruditiss. viro Doctore Lamberto Hortensio, qui eodem anno ex Java redierat, ibidem ab ipso deceptum: acceperunt & nonnulli ab aliis illo etiam majores, sed omnium folia à piperis nigri foliis non multum differre mihi videbantur, nisi quod paulò teneriora dilutioræque viriditate prædita essent, meâ opinione, tum etiam breviora pediculo subnixâ, atque etiam pluribus nervis insignita: nam à medio illo nervo folium à pediculo per longitudinem secante, non modò quaterni alij nervi exoriebantur, sed utrinque quini & feni, interdum etiam & plures, pro foliorum videlicet amplitudine, illi tamen minùs eminentes quàm in nigri foliis, & inæquali ortu nati, multis etiam obliquis venulis per folium transversim evagantibus: & licet relicta essent ea folia, ac per multos menses inter chartas adservata, non levi tamen acrimoniâ erant adhuc prædita. Fructus qui juli quodammodo formam æmulabantur, oriri etiam conspiciuntur ad singula internodia, non in folij alâ: sed quemadmodum in pipere nigro, ex ipsius folij opposita parte, in altero videlicet ramuli latere, atque etiam alternis perinde ac in pipere nigro: erant verò illi fructus modò longiores, modò breviores, quasi ex multis granulis elegantis serie secundum pedicul longitudinem congestis constantes, virides tamen, quia ante maturitatem lecti, in quibusdam autem ramulis ad eum tenellum fructum conspiciebam, ut jam primum natus videretur, quàm ramuli abrupterentur. Horum etiam ramulorum internodia sive articuli breviori spatio ab invicem videbantur diffisi, quàm in nigro. Nulla autem istius piperis famenta vidi, sed, ut dixi, ramulos dumtaxat ab ipsâ planta abruptos, quorum magnas integram in tabellâ adpositâ à perito pictore exprimi curabam.

Bry. stat. Icon. Ind. Orient. de pipere longo hæc habent. Chiabæ est piper longum, crescit in Java, à præstantioribus & opulentioribus incolis præfertur, quippe quod rotundum Pipere salubrius putent.

C.B. pin. Piper 3. longum orientale: Piper longum, Matth. Lac. Cord. hist. Lob. Garz. Frag. Clus. ad Garz. & exot. l. 2. c. 22. Linscotto & Iavensibus Pipeleni: Piper longum orientale, Cast. Macropiper minus, Tab. Hujus arboris facies longè alia exilit Linscotto, ren autem Clusio.

Garcia, qui longum piper Pimpilim vocari ait, in Bengala nascitur, quæ regio quinquaginta leucarum spatio à Malavar distat, ubi candidum & nigrum gignitur, præter longi piperis in Bengala est unus autem cum femelle in angulas centenas libras. Aloy! Cud. Piper longum in eam invenit.

Piper

Piper longum intensâ mordacitate prædictum est & subamarum, quoniam immaturum: antidotis item & theriacis medicaminibus accommodatum, Diosc. Nonnulli statim ab initio curationis uvulæ relaxaræ ab inflammatione pulvere piperis lógi auxiliari conantur, quod quidem periculo non vacat.

PIPER EX FLORIDA.



Styli sunt palmaris longitudinis, plus minus, haud ita Myosuri spica abfimiles, crassitudine pari, fusci, veluti pulvere crispati, nudi tamen & politi circa imum, obsequiosi, sapore acriculo, ad piper accedente. In Musci mei thesauro habeo à quadraginta ferè annis titulo, *Poivre de floride*.

Considerandum an hoc piper sit idem cum pipere longo Monardis quod sic describit:

Toto Continetis tractu (in quo Nata, Carthago) & etiam in Novo regno, magnus est usus piperis cujusdam oblongi, quod majori acrimoniâ prædictum est Orientali, magisque aromaticum, & jucundiore odorem spirat, quam Azi, seu Capsicum; quin etiam præfertur piperi nigro, cum saporis, tum suavitatis causâ. Atque cujusdam plantæ fructus est, oblongus, crassitudine quidem funiculi, at dimidij pedis longitudine, confans veluti multis granulis, circa pediculum oblongum conjuncto & continuo ordine dispositis, seminibus plantaginis modo; quibus ademptis, pediculus nudus conspicitur. Recens viridis est, sole maturescit & nigrescit. Calidum est tertio gradu.

Non est porro illa plantula peregrina, de qua Clus. exot. l. 4. c. 5. ita scribit: Habet hæc plantula

PLANTULA PEREGRINA Clusij.



calidum, subacris & calidi saporis, odore autem Melilotum penè referentes. Quoniam autem Iacobus Garretus, qui plantulam Clusio mittebat, nullum nomen adscripsit, nec unde habeat ipsi significavit, ideo ad cujus plantæ genus hæc referri possit, ignorat, quod nemo inficias ibit, cum difficile sit, de plantis pinguam antea conspicietis, eisque mutilis & corruptis, certi quidpiam statuere.

Tom. II.

Monard. Ital. vocat suam plantam *Pepe longo di Carthagenia*: Item ex versione Clusij, Piper quoddam oblongum. Ejus autem iconem antè posuimus cum figura piperis longi, quæ sanè non ita respondere videtur, ut descriptio. Lob. obs. & ic. Piper longum Monardis. Cæf. Ind. Occidentalis quoddam genus piperis, quo indigenæ loco piperis utuntur. Lugd. ex Monard. Piper longum. Tab. Macropiper majus. Hic cum Lob. & Lugd. proponit figuram Monardis. B. pin. Piper 4. longum occidentale (sic & Cast.) dimidij pedis longitudine: Piperis longi genus ex Carthagine, Frag. Piper longum incolis *Chiabe* dictum, Linscot. 4. part. Ind. or. fig. 20. Ego hoc ad præcedens piper longum refero. Cæterum B. pin. plantulam peregrinam Clusij, ad piper longum Felsel Alpini pertinere scribit.

PIPER ÆTHIOPICVM siliquosum.



Siliquæ plures Deser.

Sex uno tuberculo pendent unciarum duarum, trium, quatuorve longitudine, rotundæ, pennæ anthesennæ crassitudine, nigricantes, incurvæ aliquantum, thorulis pro contetorum seminum numero distinctæ, alioqui etiam trigolæ, fibris longis, lentis, fractique cõtumacibus contextæ; interior substantia ex rubro nonnihil est cinerea: semina distinctis comprehen-

duntur loculis (carnoso pariete unumquemque distinguente loculum) ex rotundo oblonga, difficulter è siliqua avellenda, magnitudine minimi Phaseoli, foris nigra & nitida, medullâ duriusculâ rufescente, textura cancellata (præsertim juxta pelliculam, quâ integitur) favos apum imitata. Saportam *Sapor* siliquæ, quàm seminum ad Piperis nigri saporem accedit.

An Lon. *Cubeben*? Certum siquidem est figuram *Cubeba*: apud eum non esse *Cubebæ* vulgari, dubitamus igitur an piperis *Æthiopici*, licet non placeat *Piper Æthiopicum*, nec etiam nostra, quæ per ineptum sculptorem corrupta. Lob. adv. & ic. Piper *Æthiopicum* [ita etiam Tab.] Matthioli; Amomum officin. non. *Amomum*. nullarum & Longa vita.

Hæc *clm* (inquit Guill.) granum nominatur Serapioni Piper *Æthiopicum*. Verùm Piper *Æthiopicum* revera est aliud, in Barbaria dicitur *Crony*, formâ spectatur Phaseoli. Memini Venetiis Agyrtam siliquas pro Balsami fructu venditasse quæ res & *Impossum*. doctis, ut audio, imposuit.

Siliquas nigras quas pro Carpesio Paul. Hesius ad Marth. misit, cur probet legitimum esse Carpesium, nihil penitus argumenti sibi sese offert. Etenim quum Galenus Carpesium, præter id quòd her. *Carpesium* ha sit figurâ & facultate Phu similis, festuicis vel *Stemon* est. pulis tantum constare asserat, non siliquis, neque granis, non videt, quo pacto ejus acquiescat sententiæ, præsertim quum jam pridem compertum habeat, hæc siliquas nil aliud esse,

Q 3

Piper Nigrum. quàm Piper nigrorum ita Serapioni vocatum, qui
ejus historiam posteritatis memoriam commendavit
his verbis: Æthiopicum Piper Barbari nominant

Vires.

Crumi, & est in forma sua Phaeolis non ab simile,
semina tamen minora habet, & cortices, filiquas
breviores, colore nigro & gustu ferè acri; veluti pi-
per, atque è Nigrorum plaga advehitur, dentium
doloribus non inutile. Quæ quidem notæ adeò
conspiciunt in hisce filiquis, & granis intus con-
clusis, ut nullus relinquatur dubitationis locus. Ad-
de quod mansum (ut experimento constat) denti-
um dolores perinde ac Pyrethrum in masticato-
riis mulceat. Et non ex Syria vel Pamphylia (ubi
Carpesti plurimum provenire testatur Galenus) sed
ex Æthiopia adferatur.

*Dolor den-
tium.*

*An Piper
Cardano
Dispa-
sim?*

An hoc intelligit Cardanus, cum dicit. Vidimus
Diepæ piperis genus quoddam ex India allatum,
mucosum & pingue valde, in vaginulis conten-
tum quæ nigra erant, cum ipsum piper colore esset
ferrugineo & majus nostro quod ex Oriente defer-
tur. Itaque cum plurimum habeat humidi concocti,
gratius est ventriculo jecorique: & maxime, quod
saporis sit mitioris & longo piperi similis. Est nobis
piper Æthiopium filiquosum, pulcherrimum à Pa-
ludano missum sapore acri, vegeto.

Syn. C.B.

B.pin. Piper 6. oblongum nigrum. An Piper lon-
gum, Diosc. Habzeli & Piper nigrorum, Serap. Pi-
per æthiopium, Matth. Lob. Cast. Lugd. Tab. Cro-
ne & Granum Anescen Avicennæ, Ang. Carpes-
tium, Cord. hist. Piperis aliud genus æthiopium,
Frag.


PIPER LONGVM FELFEL Tavil, Alpini.

Defr.

Folio imbr.

*Tempera-
mentum.*

*Morbi fr.
gids.*



Synop.

B.pin. Piper 5. longum angustissimum ex Florida:
Piper longum, Felfel, Alpino. Plantula peregrina,
Clus. ex l. 4. c. 11. De Pipere ex Florida, seu & plantu-
la peregrina Clusij, nos ante diximus.

FRVCTVS SQVAMMOSVS cum granis piperis nigri; An Bra- sima Diosc.

Defr.

*Nuci Fau-
sel simili.*

EVValachria delatus fructus, quem VVilhelmus
Parduyus, Clus. exot. l. 2. c. 22. communicabat; e-
xilis erat, semunciam magnitudinis non superans,
exiguæ & immaturæ Nuci Fauſel non valde dissimi-

lis, exalbidis coloris, calice præditus quatuor squa-
mis constante, continens aliquot grana fusca, ro-
tunda, instar Piperis nigri, sed valde rugosa, quia
forsitan immatura, intus, alba, acris saporis; An Bra-
sima Dioscoridis?

An B.pin. Piper 9. abortivum: Ex qua Diosc. pipe-
ris scil. nigri genus callu. n seu inane & leve, ob nū-
trimenti defectum. Bresina, seu Brasina, Cord. hist.

LOBVS ÆTHIOPICO PIPERI similis, acris.

Lobus (inquit Clus. ex l. 3. c. 16.) non valde diffi-
milis Æthiopici Piperis lobis: nam & illorum
instar articulis distinctus, & granâ in singulis conti-
nebat nigra, crassiuscula, rugosa, acris saporis: alio-
qui lobus crassior erat piperis Æthiopici lobis,
cortice denso constans, foris rugoso, coloris ex rufo
nigricantis, supernâ & infernâ parte duplici ner-
vo à pediculo ad extremum lobum excurrente:
pluribus aliquot articulis præditum fuisse verisimi-
le; nam post quartum articulum præcisus fuerat.
Hujus figura comprehenditur in sequenti tabella, loc. 1. loco. B.pin. Piper 8.


CROPIOT RVGOSVS FRVCTVS acerrimus femine simili piperi Æthiopico.



EXoticus fructus
Cropiot, quem Cropiot.
(autore Clus. exot.
l. 2. cap. 21.) orn. vir
VValichius Syvertz
anno 1599. de nau-
tis ex America re-
deuntibus redeme-
rat; parvus & rugo-
sus erat fructus, nō
valde dissimilis sin-
gularibus ejus fru-
ctus articulis, quem
piper Æthiopium
appellant, & Avi-
cennæ esse putatur,
magnâ acrimonîâ
præditus; nigrumq;
semen continens,
ut piper Æthiopi-
cum. Solere autem
incolas eū fructum

admiscere Tabaci foliis, adscriptum erat: quum illius
fumum haurire vellent, ad capitis dolorem lenien-
dum. Erant autem aliquot ejus fructus funiculo tra-
jecti, ut in icone videre est: quod incolas fecisse ar-
bitratur ad eos commodius rescicandum, vel ut in
promptu haberent, quando illis utendum. Hujus
icon 2. loco exprimitur.

BODAGLAM FRVCTVS EXOTI- ticus, Paludano.



Piperis ferè ma-
gnitudine fru-
ctum exoticum no-
bis misit Paludanus,

cinereum, imâ parte angulosum nullo pediculo do-
natum, supernâ amplo hiatus cavernosum, interger-
minorum quorundam parietum beneficio in tres
cellulas distinctum, apertum, cæteroque per ambi-
tum

tumita æqualem, ut culicello dissectum, & mediani quandam fructus portionem dicas. Cellulas porro feminij quiddam continuisse suspicio est, quæ fortè exciderant, aut ad maturitatem non pervenerant. Totius aliqui structuram non malè fortè quis Mespilio comparavit, nisi quòd totus hic cavernosus, & feminij (si quod fuit) nil nisi vasculum corticosum esse videatur, qui dentibus facillè atteritur, sapore est acrisculum & ferè evanido. Est & gemellus, & compressiones quæ circa angulos imâ parte apparent, plures cohasisse immediatè & sine pediculo manifestè arguunt.

MUNGO.

Est fermen, inquit Garcias, viridè, quòd pèr maturitatem fit nigrum, Coriandri fici magnitudine. Nasci ferunt in Palæstina. Ejus meminit Avicenna l.2.c. 431. vocatque Messe [Meisse habent nostra exemplaria & additum margini Mes, Mex, Clus.] Bellunensis ejus interpretès Mens (Mex autem dici debere ab eruditis Medicis Arabibus edoctus sum.) Huic lectioni accedit ipsius Avicennæ testimonium qui l.1.Fen.3.doct.2.c.7. phibet ne aves cùm Mex edantur, q. periculum sit, ne cridum adhuc Mex cum eorum chilo ad hepar rapiatur: pabulum esse equorum; interdum tamen etiam ab hominibus edi: Guzarate & Decan incolæ in febribus hoc modo uti. Febricitans cibo abstinet per decem, non nunquam per quindecim dies: post quos hujus fructus decoctum illi propinatur in quo non nihil pulpæ remanet: deinde cortice delibratum Mungo & instar Orizæ coctum febricitanti exhibetur: panis verò triticeus non nisi post multos dies administratur: non quod frumento careant hæ provincie: nam etsi non stercorentur & colantur agri, quemadmodum apud nos, sed superficie tenuis duntaxat arentur, nativâ suâ pinguedine & ubertate etiam interdum sine pluvîa frumentum Novembri mense sibi commissum, medio Ianuario colligendum & maturum exhibent. Mungo frigidus est, quantum ex ejus facultatibus colligere licet.

B.pin. capite de Cubebis quarto loco dicitur Fructus niger Coriandro similis.

HAERMIA SERAPIONIS,
sive Piperella.


HAËRMIE nomine datum granum, pipere est super, Coriandro paulò majus, aliquando æquale, rotundum, colore fusco vel citrino, pediculus tenuis qualis pipere caudato, ab ejus vestigio ad adversum mucronem brevissimum, producuntur pulcherrimæ striæ crebræ, atque huic quidem cortici separabili substantia subest compressa, solidiuscula, punctis rubentibus guttata, in qua est sinus exsculptus, ad medium usque penetrans: sapor apparet adhuc aromaticus, ad Caryophyllorum saporem accedens, etiam in iis granis, quæ totos jam triginta annos & plures asservo, Lugduni per D. Val. Dourez data: Clusius aut granum contineri nigricans calidius gustus. Icon est cum Pipere nigro ubi stellâ notatur: ineptus sculptor malè eam imitatus est.

Haërmia, vel Piperella Serapionis est in figura sua sicut figura pipere minoris, nisi quia est in colore suo quasi citrina. Est autem granum parvum, minus pipere odoriferum, cujus odor est sicut odor ligni Aloes. Lugd. Mungo similis fructus. Cæterum non placet nostra Haërmia pro Mungo: quia hoc fermen Valerandi non mihi videtur aptum febricitantibus, & equorum pabulo, quod prædicatur de Mungo. D.B. Paludanus 1598. misit nobis pro Amomo.

Misus est Valerando Dourez ex Ormuz (inquit Clus. exot.) fructus pipere magnitudine, rotundus, striatus, qui Coriandri grana ita emulatur, ut primum intuentibus Coriandrum videatur, majus tamen & nigrum, membrana superior granum continet nigricans calidi gustus. Non ineptè quadrate videtur Negundo: sed neque etiam huic Mungo: Negundo, cui exactissimè conveniret, nisi calidus esset, Mungo verò frigidus, quantum ex ejus facultatibus colligere licet.

B.pin. Piper 7. sive Piperi similis fructus striatus: syn. C.B. Haërmia Serap. Fructus cap. de Mungo additus, fortè Negundo, Clus. ad Garz. Caryophyllus Plinius sive Negundo, Imper. Negundo, Garz. Acolt. Fragofo. Nos de Negundo & Mungo sub suis titulis.

In Haërmia duas esse virtutes contrarias scriptum reliquit Serapio. nam testatur eam & caliditate & piperis frigidityte participare; interim nec humiditate catere. Temperare, in doloribus frigidis gutturis & ventris siccitate utilem esse: non nihil eam abstergere.

NEGUNDO ARBOR MAS ET
femina.

Provenit in Baluchana & Malabar arbuscula, dâ Persicæ magnitudine, frequentibus ramis, qui recti si frequentiores latiorèsq. enascuntur, foliis Sambuci, simili modo per ambitum serratis Sambuci & aliquatulum hispidis: flos ex cinereo candidus, fructus niger, pipere magnitudine, aut paulò major. Malabar incolæ eum suis eduliis Caril nuncupatis inspergunt. Hæc Garcias.

De Negundo hæc tradit Acolta; Dux arbores multis India locis, præsertim verò provincia Malabar inveniuntur. Earum prior mas censetur Amygdalæ magnitudine, foliis supernè virentibus internè lanuginosis & hirsutis, foliorum Salvie modo, in ambitu serratis, quæ procul a Baluchia spicientibus Sambuci foliis similima videntur. Altera Negundo femina nuncupata. Eadem magnitudine quæ prior affurgit, folia verò habet ampliora, rotundioraq. neque in ambitu serrata, foliis Populi albæ perquam similia utriusque folia Salviam odore & sapore referunt.



magis amarā quāmati & acia: in plurimis foliis parte aversā summo manē inhaerens conspicitur spuma quādam candida, quæ nocte exillis emanat; flos cinerei coloris, plurimūque ad Rosifmarini florem accedit fructus similis piperi nigro, acris gustus, minimē urendis uti Piper, at Zingiberi propemodum paris.

*Describitur
in flore.*

*Nonnulli
linguar.
Vires non
est.*

Vulgare nomen est, teste Garcia, Negundo quam nonnulli in Balagate *Sambali* appellant; in Malavar *Noche*; qui Viticem esse contendunt, multū errant. Acosta ex veris Clusij, duas arbores facit: priorem marem censet & à Canatinis *Varalo Nigunda* appellari refert: alteram Negundo fœminam nuncupat quam ait *N-chilla* à Lusitanis, vulgo in Canaria *Nyergundi* dici; in Balagate *Sambali*, in Malabar *Noche*: utramque verò tam marem, q̄ fœmina ab Arabibus, Peris, & Decan incolis *Bache* vocari; Turcis *Ayr*.

Si Acostæ icon legitima est, folia quæ dicit Populi, ego potius Iuglandis dicerem, à forma quâ prædita sunt & materia. Meritò Negundo subnectenda subjiciendæve historię Haemię Serapionis, quandoquidem fructus qui existimatur Haemia, traditur à Clusio & Imperato pro Negundo, quem admodum & Cariophyllum quoque Plinianum querundam, aliis Amomum Lusitanicum censetur.

*Cariophyl-
lum Plinij
querundam
aliis Amo-
mum.
Vires.
Vuln.*

Contusio.

Tumor.

Vulnera.

Multis facultatibus prædita est hæc arbor, tene-riorum ramulorum cum foliis decocto, aut ipsis elixis, aut contusis, utilissimè contusa fovetur, modò non adit vulnus. Friguntur interdum iudem rami cum foliis in oleo, & contusionibus applicantur, resolvunt enim tumores & curant. Frequens est aded hujus usus, ut in omnibus doloribus, frictum cum oleo, aut elixum exhibendum censeant. Non desunt qui supra vulnera admoverint, unâque nocte dolorem sustulisse, materiâq; digestisse affirmant: deinde foliis contusis, ipsis vulneribus impositis ita ea emundasse. ut brevi ad cicatricem perducta sint. Vilem perhibent esse mulieres ad juvandum conceptum, ejus enim succo aut decocto epoto, uteros ad conceptionem præparari. Ego (ait Garcia) malim præmandi, valentius enim futurum existimo medicamentum. Masticata folia oris halitum commendant. Acrimonie verò cujusdam participant veluti Nasturtium: unde manifestum est calidam esse hanc plantam. Experti sunt nonnulli veneris stimulos & impetus cohibere, càmque ob causam Viticem esse contenderunt. Arborem moderatè calidam faciunt, ut notat Acosta, & semini paulò plus caloris tribuunt. Folia, flores, fructus, contusa aut in aqua decocta, vel in oleo fricta, utiliter impo- nuntur omnibus doloribus ex quacunque causâ provenientibus: præsertim verò in articulorum do-

*Quæ hali-
tas.*

*Veneris
stimul.
Tempera-
mentum.*

*Dolores fri-
gid.
Vulnera.*

Vulnera.

*Conceptum
in eo.*

loribus ex frigida causâ natis, atque in tumoribus & contusionibus mirabiles præbet effectus. Vlcenibus etiam vetustis folia trita imponuntur, felici successu, quandoquidem eorum materiam digerunt, eaque emundant, & ad cicatricem perducunt, modò corpus non sit impurum. Et sanè in vulneribus, apostematibus, & contusionibus aded utilem experiuntur, ut Chirurgorum operam minimè requirant. Mulieres horum foliorum decocto omni tempore universum corpus lavant: tantâque invasit persuasio apud illas, Negundo folia, flores & fructus, utilia esse ad juvandum conceptum, ut eum, qui contrarium persuadere conetur, lapidibus obruturæ sint. Obstetricibus etiam, quas illi *Dayas* vocant, apprimè nota est hæc arbor. Aded frequens est hujus arboris usus ad medendum in illis regionibus, ut nisi Deus præcisos ramos multiplici fœtura renasci faceret, jam diu fuissent consumptæ arbores, aut certè maximi pretij nunc essent. Sed quo magis præciduntur rami, edo felicius renascuntur, perpetuâque fronde virent.

CVBEBÆ. CAP. XLVII.

Cvbebæ grana sunt Piperi similia, interdum *Deser.* Capullū majora, pediculo longo stili instat dona- *Piperis* ta, cortice fusco, rugoso, interdum erugato, exte- *grano.* que, nucleo subiecto exiguo, rotundo, foris nigricante, intus albo: aliquando cassâ reperiuntur, eque efficaci vel etiam efficaciore sapore prædita, quàm *sapor.* nucleata, suavi, aromatico, acris, sed qui Piperis acrimonia multū cedat, pertiaci tamē.

Considerandum an Cvbebæ pingantur cum Piperis caudato?

Cubebatum quidem meminit Avicenna: verū *An Cube-* non describit: quare considerandum an vulgares *bærum no-* Cubebas intelligat, vires siquidem respondere vi- *strari me-* dentur. *mineri a*

Myrti sylvestris fructum ait Hermolaus Cubebas Mauricæ vocatas, quod quā verum sit, diligenter animadverteri cupit, præsertim ab iis dissentientis, qui hoc affirmant: Galenum certè id, quod Cubebas Medici appellant, Carpesium vocare tradit, esse autem odoratum semē Carpesium, hæc Cubebam, quā Paulus & Carpesiam quandoque vocat: Mauros sylvestris Myrti bæcas, Carpesium, & Cubebas esse putasse.

Serapio (attestante Brassav.) magno errore, arbo- *Serapionis* rem ferentem Cubebas, esse Diosc. Oxymyrfinem error de O *arbitratur.* Recentiores etiam (ut Pandec. & alij) *oxymyrfinem.* cum Serapione Carpesium Oxymyrfinem esse putant, & tamen Cubebæ Oxymyrfinem esse non possunt: nec Carpesium Galeni.

Actuarius, referente Ruellio, Carpesium à Bar- *Ruellio non* baris jam suâ zitate Cubebas vel Combebas dictas, *est.* esse professus est, & hoc nomen officinis vulgassimum, longè etiam rem esse à Rulco. Carpesium autem Actuarij & Nicolai Myrepsi Combebam vel Compedam nuncupari, & officinis Cubeba dici, testatur etiam Fuchsius de comp. med. qui Actuarius diserte fecisse scribit quod Combebas alio nomine Carpesia dici annotari. Sed licet Actuarius *Carpesia* vel *xapmima* vel *xapmima* vocari scripserit, Galeni tamen *xapmima* aut Dioscoridis Oxymyrfinem, seu Myrti sylv. fructus (nam cum Carpisiorum nō meminisse legitur apud Silvium de comp. med.) Cubebæ esse non possunt, id quod Serapio & alij quidam Neoterici existimant. Cubebas verò longè diversos esse à Carpesio fructus, Cord. Lob. & Pena confirmant: existimat autem cum Pena Lobelius fieri posse, ut sit nigro piperi congener. Est ipsi in obs. Cubeba officin. piper Hippocratis simpliciter *Piper Hipp.* & Piper rotundum Theophr. Guilandino. *Piper rotun-
dū Theophr.*

Veris, aiunt Monachi, Cubebis, si Plateario credimus, caremus: communes Cubebæ non solum non habent acutum saporem, sed cum quadam pauca amaritudine insipida sunt, & nullam præbent aromaticitatem: tres autem Cubebarum species esse scribit Pandecarius ex autoritate Plinij [apud Plinij non invenimus] quarum ultima, quæ pro domestica scribitur, potest esse communis Aromatariorum. Heus quā depravatus, si non peritū abolitus Monachorum gustus & odoratus. In Cubebis Monachi *Monachi* vulgariis acrimoniā & aromaticum saporem ac *saxantur.* odorem asperimus, quem concedunt & observant Hermol. Sylv. Fuch. Matth. & Cæsalpinus.

Quid hæc tempestas sit Carpesium arduum sanè fuerit Matthiolo explicare. Tamen Hermol. Ruell. Fuchsius ac etiam Monachi pro certo exploratum habent, Avicennæ, Serap. & Actuarij autoritatibus innixi, fructus piperi similes, qui vulgè Cubebæ vocantur, legitimum esse Carpesium: verū eos in errore versari existimat, qui credunt, ut Hermol. Ruell. & Fuchsius) vulgares Sepalsiariorum Cubebas, illas *Error mul-
tiplicum.* referre.

referre, de quibus scripsere Serapio, Avicenna & Actuarius, quando quidem qui dixerit Cubebas fructum vel semen esse, eorum reperit neminem: nec mirum prebatur potius putat, id usquam dixisse Galenum: cuius stipitis fructus vulgares Cubebe sunt, quid affirmare velit, non habet, cum ex Orientali plaga peregrinæ afferantur. Hæc Matthiolus qui scribit Monachos nostras Cubebas recipere, quod falsum est. Scribit Robertus sub vocabulo Opocarpas, *καραπας* aut *καραπας* aliud esse, quam Opocarpas: Actuarium *καραπας* appellare, & Nicolaum Myrepsum: sed Combebas, live Cubebas Mauritiorum, vel *καραπας* Græcorum differre à Cubebis officinarum: *καραπας* enim herbam esse Phu appellato generi similem.

Cubebe (tradente Linschott.) crescunt in Iava sylvis sua sponte ad ripam Sunda. Vocatur ab incolis *Coucambi* & *Cumic*. Malayensis, *Cubachini*. In Sunda saccus plenus, Barhrt (mensuræ genus est) ponderis 56. librarum dum carè venditur & in summo pretio est, sex aut septem millibus caxas dienditur. Arbores earum pomis nostris haud ab similes sunt: racematim coherent grana, sicut uvæ vitium quæque tamen proprio hærent pediculo. Iava incolæ Cubebas coquant antequam dividant, ne & alibi locorum feminetur atque proveniant.

Ab Arabibus Medicis, ut Garcias scribit, appellatur hic fructus *Cubebe* & *Quabebe* à vulgo *Quabebechi*: in Iava, ubi frequens nascitur, *Cumic*; à reliquis Indis, præterquam in Malayo, *Cubabini*, & etiam à quibusdam *Cubachini*, non quòd in Sina vel China nascatur, sed quòd perferatur: sylvestris autem est planta, & spontè nascens, non domestica, neque multorum generum, uti falsò Mosnachi putant: neque est folio Myrti: fructus autem neque piperis genus, neque Carpesium, neque Viticis semen, ut quidam asserere audent sunt, quorum sententiam utriusque historia & facultates planè dissimiles satis convellunt. Putat Silvaticus ex Arabum auctoritate Cubebas nihil aliud esse quam Dioscoridis Myrtum sylvestrem, quem Ruscum vocant; aut Carpesium Galeni. Sed fallitur.

Apud Acoftam It. appellantur Cubebe aromati- cæ & veneræ; vulgo Arab. *Cubeba Chini*; incolis *Cubal Chini*, non quòd in China proveniat &c. Hæc ille qui sua ex Garcia desumpsit. Ruellium autem & Monachos taxat, quòd existimant Carpesium esse Cubebas Serapionis & Avicennæ, quia ubi Galenus ponat Carpesium, Serapio scripserit Cubebas. Verùm Cubebas fuisse cognititas Dioscoridi, & Galeno citè negat. Lacuna per Carpesium intelligit radices, & idèò concludit pro Carpesio sumendas Cubebas Arabum. Monachi dicunt se vidisse varias species Cubebarum, quasdam sine sapore, alias amaras, & alias bonas. Sed fieri potuit amaras fuisse corruptas, bonas recentiores & melius conservatas. Ant. Musa & Serapio dicentes nos habere Cubebas, hallucinantur, confunduntque Carpesium cum Myrtum sylvestri. Pandeftarius existimans Galenum vocasse Cubebas Cauti, errat, quia est species Dauci sylvestris: Qui vult videre varietatem opinionum legat Monachos in Mefide Cubebis, Brallavallan, Ant. Musam, Platear. Pandeft. Luminare majus, Sim. Garuensem, Serap. Galen. Avicen. Matth. Sylv. Hermol. Lacun. Matthiolum & alios.

Cubebe nostræ non sunt Carpesium Galeni: sed nec ut Scalig. somniat, Plinij Caryophyllon. Rimento del raby Luntanis, quod significat piper caudatum, valdè veretur idem Scaliger ne sit Cubeba, nihil asserit tamen. Officinæ pro Cubebis substituerunt grana quædam odorata, formâ piperis, quem legitimi Amomi fructum putat Cæsalpinus. Sed & Cubebas vulgi; quas Medici accipiunt pro Carpesio,

putantes esse fructus Myrti sylvestris, potius Amomi fructum idem Cæsalpinus arbitratur.

B. pin. aff. Cubebas officinis vocatas, Actuatio dici *καραπας*, Arabibus Cubebe & Quab. be. Idem inibi cum Matthiolo negare videtur Cubebas r. vulgares esse Arabum Cubebas, aut Carpesium Galeni.

VIRES ET USUS.

Cubebe ex auctoritate Avicennæ, calidæ & siccæ sunt, aperiunt, attenuant, Cinamomo ignaviores, utiles ad genitalium & gingivarum putrida ulcera, ac aphthas; ore retentæ vocem claram reddunt, hepatis obstructions aperiunt. Urinæ vias emundant, arenulas extergunt, calculos pellunt tam renum, quam vesicæ. Salivam manæ à capite alliciunt. Hermol. Barbar. de Cubebis vulgaribus dicit: Carpesium si ore contineatur claram vocem facit pro- nuntiantibus: ob id Bernard. Justin. homo in primis doctus, & eloquens nunquam sine hoc semine conacionatur. Sed & illam dotem prædicant: majorem in coitu voluptatem sentire ab iis, qui habeant in ore, quasi non sit in ea titillatione mens commotio: nisi doceamur quemadmodum nos Venus adminiculation, & violentior transverfos auferat. Cubebe vulgares (teste Matth.) exalfacere valent tertij ordinis initio & siccant in fine ejus. Languentem ex pituita ventriculū, vel etiam ex flatu roborant: pectus à lentis crassisque humoribus expurgant, lienem juvant, flatūs discutunt & frigidis uteri affectibus auxiliantur. Diu cum Mastiche manfa, pituitam à capite trahunt & cerebrum roborant. Cubebarum apud Indos, inquit Garcias, magnus in vino maceratarum est usus ad excitandam Venerem: tum etiam in Iava ad exalfaciendum ventriculum. V. Virt. Emp. ad vertiginem accipere jubet 4. aut 5. Cubebas masticandas, & retinendas in ore, expuendam humiditatem quæ cumuletur, postremo etiam ipsas Cubebas. Idem ad eundem affectum suadet Cubebarum 3. j. Sacch. albi 3. j. β. seducendas in pulverem: accipiendum quantum supra minimum grossum dictum manere possit manè & vesperi: quàm autem accipiant obturandas esse nares, ut odor pulvris ascendat ad caput, sed & defluxibus à capite obnoxio manè masticandas præcipit Cubebas conditas vel non conditas.

FRAGRE SERAPIONIS.

Frage, ut autor est Aben Mesuai, assimilatur Ciceribus, & est calidum & siccum in secundo gradu, & ingreditur medicinas quæ præparant stomachum. Fraga assimilatur ab Isaac Eben amram Ciceris, & habet interius granum parvum, nigrum, rotundum, de foris verò rubeum, & ex succo ejus fit collutio ad factorem oris, & confert, & nos utimur eo in Nodach, i. e. in pulverizationibus & unguentis. Fragaria non idem est, teste Cæsalpino, quod apud Serapionem Frage vocatur.

AMOMVM IN GENERE.
CAP. XLVIII.

DE Amomo, quod apud Theophr. l. 9. hist. c. 7. a. Theophr. l. ij. ex Media, alij ex India advehi narrat, parcius tamen, at vehementius odoratum, ita dicit Dioscorides. Amomum frutex est [cuius fructus, Medice gen. ron.] velut botrus ex ligno perplexus sibi ipsi. habet etiam florè quædam parvum velut Violæ albæ folia verò Bryonia similia. Optimum est Armenium colore aurum referens [cuius fructus, Medice gen. ron.] habet etiam lignum subfulvum, admodum odoratum. At Medicum ed quod in campestribus & aquosis locis nascitur, invalidi-

gatur cum cecinit *Bostrych* & *duyus*. Matthioli sententia ad stipulari deprehenditur Junior Andromachus, qui nusquam Botry in commemorat, sed Amomum tantum. Hæc ille, qui quum nos (ait Amat.) vero carere Amomo sciret, utillum tamen habere-mus nos in Lusitaniam remittit, ubi ex India nunc delatam contendit: Amati tamen sententia fallitur, cum hæc uique Amomum verum incompertum sit. Sed Amato in Apologia refutatur Matthiolus di-cens, nunquam meis scriptis affirmavi Amomum ex India in Lusitaniam convehi, nec eo quemquam remissi. Scripsi quidem me à quibusdam non sper-nendæ fidei Medicis accepisse jam primum ex In-dia in Lusitaniam afferri Amomum, nec sanè plura quàm hæc.

Hamama Columbam, non pedem Columba, ut vult Garcias, significare scribit Clusius. Quod verò Garcias ait pedem Columbinum esse Diof. Amo-mum, præterquam quod illi impositum est ab illo Iudæo, scire debemus Columbam scribi per He in fine, Amomum autem per Elif. quæ sola scriptio-nis differentia constituit & significationum differen-tias; ut Amomum vel ejus notio nullam cognatio-nem habeat cum Columba. Itaque vanum est pe-dem illum Columbinum cum Amomo Diofcoridis conferre, propter solam allusionem nominum. An est Olivij Amomum, quod vidit in Musæo Calceo-larij colore ad aurum vergente, pallente scilicet & uram referente, quod Piperis genus esse apud Lu-sitanos non audent affirmare. Observat Maro-neæ (cujus sententiam vident lectores postea sub Amomo novo facie Cardamomi minoris) Amomi Amomo voce antiquissimam, quæ Theophr. etiam utitur, Indicam esse, non Arabicam ut existimant recentio-res, qui dum Amomi Etymon ab Arabicis frustra perquirunt, in ea bis peccat: siquidem duplici ut-tur incertissimo fundamento, uno quidem, quia Amomi vocem asserunt Arabicam esse non Indi-cam: altero verò quia ponunt tanquam notissimum antiquissimam linguam Arabicam ab ætate Theo-phraستي ad hæc uque tempora suam integritatem fersse. Significat autem vox Amomi & fruticem ipsam, & etiam racemum, qui est præcipua pars quæ in servit usus medico. Theophr. & Galenus satis je-junè pertractant de Amomo, cum ejusdem de-scriptionem omiserint. Verum Diofcorides & Plinius eas dederunt Amomi descriptiones, quæ si unà conjungantur Amomi notitiam & facilem & per-spicuam faciunt. Recentiores autem, qui utriusque auctoris de Amomo descriptiones invicem se jun-gere student, ipsi veterum Amomo magnas tene-bras obscurant. Diof. & Plinij unanimis est con-sensus in Amomi historia describenda: explodenda opinio recentiorum existimantium Plinium & Diofcoridem non convenire inter se in Amomi de-scriptione. Plinij est singularis diligentia, quæ ipsum superavit Diofcoridem in Amomo delineando, unde adhuc magis redarguendi recentiores asserentes Plinium ignorasse legitimum Amomum. Hæc Galenus Maroneæ, qui diligenter consensum Diofcoridis & Plinij demonstravit quem omittimus, quia patet ex utrorumque scriptis huic capiti præpositis, acetiam ex iis quæ excerpta ex Maroneæ Commentariis à nobis posita sunt postea sub titulo Amomi novi Cardamomi parvi facie sive Racemi Indici.

Amomum Humelbergio, apud Apuleium frutex est odoratus, transmarinus, cujus semen in usu esse scribit. Sed miratur Humelbergium, cur non indi-cet ubinam sit in usu, & quale sit. Latet nos præ-terea, an Castons Durantis, *duyus*, sive Hamanis & Hamanz icon vera sit, necne.

Bellon. in obs. ait terram adhuc proferte Amomum: hoc verò Constantinopoli, qui vult habere,

pèndum, nec (addit de neglect. cult.) sine admini-culo subsistere. Quale autem Amomum intelligat Bellonius nondum nobis constat, an fortè in Obs. per Constantinopolitanum intelligit Amomum ve-rum quorundam, de quo mox? Et de neglect. cult. a-lind, nempe Ribes nigrum.

Volunt præterea aliqui Cardamomum vulgare esse Amomum.

Nec desunt qui per Amomum, Amomum no-vum Cardamomi minoris vulgaris facie sive Indi-cum racemum (de quo paulò post, quod Clusius spurium vocat) intelligi dicant.

Amomum, autore Hadr. in nomencl. est Piper horten-sense ab holitorum gente dictum. Hoc Piper Ribes nigrum. Hadriani est Ribes nigrum.

Piper denique caudatum, *Pimenta del rabo* qui-busdam Amomum nuncupatur.

Est & Amomum Garyophyllodore quorundam. Est & piper Ethiopicum Matthioli, Amomum li odore. Officinarum nonnullarum.

Lob. in append. ac Icon. plant. & Cæs. (quod no-bis nondum aridet) putant Cubebas legitimum Amomum.

Rosa Hierichuntis multis est Amomum, quæ o-pinio quibusdam displicet & nobis etiam.

Pro Amomo Plinij vulgus Italarum Strychno-dendron ostendit.

Botrys falsò æstimata à multis Amomum, & pro Botrys eo malè usurpata fuit.

Sic quoque Sison falsò Amomum officinis di-citur.

Ammi Alexandrinum etiam ab aliquibus malè existimatur esse Amomum. Amomi nomine in offi-cinis vendi Bibinellæ tertium genus scribit Gualte-rius Ryffin reform. pharm. germ. l. c. 2. Est hæc no-bis Saxifragia hircina.

Ceterum aberrare eos, qui pedem Columbinum faciunt Amomum demonstramus sub Geranio Co-lumbino. Et hoc nobiscum sentit Ioh. Agric. Sera-pionem erroris inculsans, quod Amomum pedem Columbinum esse putat.

Galenus l. 6. simpl. sicut & codex de substitutis Acoruta imponunt, quem sequitur Cordus in Au-reæ Alexandrina, in Diatrion. Meslin Theriaca, in trochiscis Hedichroi, Placot. Borganuc. Matth. Turn. Lac. Bacchanell. & Apollo, quorum opinio minimè improbanda videtur: quum Acoti radix quam se-plasix falsò Calamum odoratum vocant, & odorata sit & acris & præter id adstringat siccetque. Quum Galenus Amomum similem Acoro facultatem obin-ere scribat, præstaret, inquit Clusius, legitimum Acorum, satis videlicet jam cognitum, medicamen-tis Amomum recipientibus admiscere, quàm alias plantas, quæ pro Amomo obtrudi solent. Fuchsius quidem Amomi vice Acoro utitur, ast ejus penuria Galanga majore. Idem & Amatus, qui Acorum, Galangam crassam censet. Dispens. Col. Amomi lo-co ponit in troch. Hedr. id quod dicitur, Calamus aromaticus. Hunc sequitur Tab. apud V Virfung, di-cens: Galenus scribit Acorum [Calamus] ead- dem habere vires cum Amomo: eo igitur utendum censeo in defectu Amomi. Amomi sive Pomi Hierosolymitanilocus (sic Michaeli Neand. placet) ex-plet Acorus. Hic si intelligit per Pomum Hieroso-lymitanum ut puto Rosam Hierico, nomen Pomi Hierosolymitani certè non placet.

Quid tandem Amomi loco accipiendum sit, & Diof. & Galenum declarare dicit Marantha. Et hinc ex dictis Diofcoridis colligit recentiores Medi-cos magno in errore versari, atque in illo quidem duplici. Primum quidem, quod semen, nescit quod, ex vera Amomi planta minimè excerptum usui ad-aptum: Deinde, quia putant Amomi faciem (si mo-

Cardamo-mum.

Amomum novum.

Piper cau-datum.

Amomum Garyophyl-li odore.

Cubeba.

Amomi.

Rosa Hierichuntis.

Strychno-dendron.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

Amomi.

do vetum reperitur) accipiendum esse; cum potius ejus lignum utile à veteribus judicetur, ut ex Dioscoridis lectione se accepisse gloriatur. Inquit enim adulterari ex Galeno solere Amomum herbà simili, quæ sit sine fructu: jam si fructus ad usum ducerentur, non posse plantam, quæ fructu careat, adumbrare: monere præterea Galenum fragmenta fugienda esse, & integros furculos capiendos. quod de fructu minimè intelligi possit, deligendum etiam esse, valde odoratum, modò cariem non contraxerit: cariem autem non ita semini videri propriam, sicuti ligno. Sed erroris hujus causa fortè Plinium fuisse qui l. 12. c. 13. Amomi uvam in usu esse asseruerit: Nec ipsum latere in usu etiam fuisse Amomi uvas, & racemos: ut 9. c. 10. ubi Asclepiadis pharmaca ad hydropem recenset Galenus: similiter & 7. c. 10. in stomaticis Hieræ, Amomi racemos: & 7. c. 10. c. 9. Amomi uvas. Sed dicendum esse præcipuam partem lignum, sive furculos fuisse, quos intellexerint, cum Amomi absolute mentio fieret: & cum aliam partem cuperent, veluti racemos, Valsæ explicatè protulisse. Sed de Amomo aliàs longè plura.

Amomi
quæ pars
accipienda.

Asarum. Amomi loco substituitur Asarum à Collegio Florentin. antib. Turnero, Borgaruco, & Monachis in Mesuem dist. 1. cen. 28. quos videmus meritò quoddam substituant Azarum purgans medicamentum, pro non purgante, in quo magnum facultatum discrimen. Animadvertendum tamen ab Adolpho Occone in Bened. lax. Nicol. pro Amomo tolerabilius substitui Asarum, cum compositio sit purgans, quàm in aliis compositionibus non evacuantibus.

Sabina. Porro ab Avicenna pro Amomo poni Sabina duplum planè displicet, ingratum medicamentum & parè fœtidum pro odorato.

Cubeba. Pro Amomo substituantur Cubebæ à Cordo, Placotomo, Turnero, & Borgaruco. Turnerus tamen deficiente vero Amomo uti posse putat Carpesio, quod quibusdam Cubebarum nomine notum sit.

Carpesium. Avicenna Amomi loco supponit Ammi quasi duplum, ut & Fuchsius in antiball. pro Amomo substituit semen Aneos, in Aurea Alex. & in Benedicta.

Caryophylli. Amomi loco præstabit Caryophyllos substitueret, qui longè præstare videntur auctore Matthiolo, quod & ipsum Gesl. in Hedychoi pastillis non improbat, & nobis præceteris antiballomenis summè placet.

AMOMVM QVORVNDAM odore Caryophylli.

Amomum Lusitanum Deser. Clariss. Paludani munere missos fructus inscriptione Amomi verui Lusitanorum adseruamus. Eisdem anno 1609. attulit ex Anglia Cherleus, sine nomine, datos ut censemus à Iacobo Garreto. Magnitudinem autem variat: quidam namque piper æquat, quidam etiam duplo ferè major est: omnes sunt cortice fusco, rugoso, umbilico, summo tenus, non quo parti adhæserunt, prædicti, quadripartito. Vnum vel duos continent nucleos nigros atrovirente membranulâ tectos, qui intergerino pariete dispescuntur. Totalis fructus figura externa pulchrè Mali Granati, colore excepto, respondet. Sapore est acriusculo, aromatico, ad Caryophyllos accedente. Manifestè differt ab Haeremia Serapiomis, ut consiciendi apparebit: inter cetera

Mali Granati fructu.

Sapor.



ryophyllos accedente. Manifestè differt ab Haeremia Serapiomis, ut consiciendi apparebit: inter cetera

ram notis, huic non adfunt pulchræ striz. Nos curavimus ex ipso fructu pingendum.

Garofalo Pliniano, semen aromaticum, inquit Imperatus, adfertur per Lusitanos, magnitudinis piperis nigri communis, odoris & saporis Caryophylli aromatici, odor tamen vetustate evanescit: Neotenci vocant nomine Indico *Negundo*: multum convenit cum descriptione Caryophylli apud Plinium. Et hæc ille qui alibi vocat Caryophyllum Plinianum, aroma nuper delatum ex India. Duos autem pingit fructus, & secundo loco Haeremiam nostram.

A Momi descripti Clusius exot. l. 1. c. 17. iconem & Descriptionem proponit his verbis: Mittebat

AMOMVM CLUSII.



ad me Londino Iac. Gareus anno 1601. fructum orbicularem, piperis grano plerumque majorem, nonnunquam etiam minorem, rugosum, fusci coloris, satis fragilem, qui apertus semen continereprehendebatur rotundum, nigrum, in binas partes scissile, non minus aromatici odoris & saporis quàm ipse fructus, atque aromatici Caryophyllos quodammodo referentis: botri autem in modum nascitur, ut ex multis

granis, quæ petiolos suos adhuc retinebant, & binis ternisque granis uni ramulo in herentibus conjecturam facere poteram: his adjecta erant folia, unius quidem formæ, sed magnitudine valde differentia: nam quædam septem uncias erant longa, tres lata, nonnulla quinque duntaxat uncias longa, duas cum semisse lata, alia trium unciarum longitudinem non excedebant, & vix duarum latitudinem attingebant, quæ etiam iis longè minora & angustiora præsertim quæ cum granis permixta reperta fuerant, pro loci quem in ramis aut ramulis occupaverant ratione: nulla autem inter illa reperi quæ serratas haberent oras: sed æquales omnia, & multis tenuibus venis, à nervo folia per longitudinem secante, in latera oblique excurrentibus, prædita, eorum mucrone nunc angustiore, obtuso tamen, nunc latiore & quasi orbiculato, cineracei & ex spadiceo coloris, & satis actis

Color & Sapor.

saporis: ramuli qui additi fuerant, tenues quadranguli, cineracei coloris cortice tecti, annotini videlicet, qui verò postea nati, spadiceo, retinentes adhuc vestigia ubi folia adhæserant, quæ ut plurimum, ex adverso nata esse demonstrabant, & illi etiam acriusculi saporis, perinde ac folia nec ingrati odoris. Additum præterea erat radicis cujusdam fragmentum cubitalis longitudinis, à nautis quos ex India redisse scribebat, relatum cum prædicto fructu & foliis: intelligebat autem ab aliis fragmentum illud ab arbore, sive frutice folia illa & fructum ferente, recisum: ejus materia valde dura & firma erat interna parte alba, externa & sub cortice latente, fusca ob vetustatem forsitan: erat autem gemino cortice tectum, interno quidem satis denso, fusci coloris & acris saporis, interno verò brevioris, ex cineraceo flavescentis coloris (quem ex argillacea terra in qua planta nata contraxisse venis simile est) acerrimique

rimique saporis. Eam porrò radicem multis tehui-
bus fibris firmatam fuisse, quædam adhuc inhaeren-
tes, & aliarum, quæ abruptæ, vestigia apparentia fati-
s innuebant. Ipse autem Gareus adscribebat, se,
licet omni diligentia adhibita, ut nautas qui hæc at-
tulerant convenire posset, ad percontandū in qua
provincia legissent & an nomen atque facultates ab
incolis intellexissent, illos nunquam invenire po-
tuisse. Similem autem fructum, petiolis tamen ca-
rentem, aliquot annis ante accipere memini, additā
ejus, qui mittebat, interrogatione an Amomum? Et
certè huic fructui sunt facultates Amomi, quod Dio-
scorides nobis proponit, facultatibus non valdè dif-
similes: etenim calfaciendi, adstringendi & exsic-
candi vim habet, & reliqua præstare posse arbitror,
ad quæ Amomum utile esse Diosc. l. i. scribit: aliquot
tamen notæ, iis quas Diosc. suo Amomo tribuit,
non respondent, veluti folia quæ Bryoniz foliis dis-
similia, radix crassior, quàm ut fructus videri queat,
tametsi in quibusdam fruticibus nec minores, nec
minùs crassas, quàm hæc sit quæ missa mihi, observa-
re meminerim, ut in Cistis pleriq; generibus & qui-
busdam aliis. Sed iudicio iis relicto qui in his rebus
sunt me peritiores, & magis exercitati satis officio
me perscrutandum existimabam, si eam quæ de fructu,
foliis & ramulis & radice observabam benevolo le-
ctori proponerem. Cæterum hunc exoticum fru-
ctum diligentius considerans, primarias quasdam
notas reperi, quæ me plurimum movent (profe-
ram enim ingenuè quod sentio (ut Plinij Caryo-
phyllon esse censei possit. Nam is l. 2. cap. 7. postea
quàm de Piperis egit, hæc subiicit: est etiam in
India piperis granis simile quod vocatur Caryo-
phyllon, grandius fragiliusq;. Tradunt in Indico lo-
co id gigni. Advehitur odoratis grati. Tametsi brevis
hæc sit & succincta descriptio, nec ulla facultates
fructus ipsius contineat, habet tamen insignes no-
tas, quæ cum iis, quas fructus quem lectoris oculis
subijcio possidet, collatæ, valdè similes deprehen-
duntur, veluti comparatio cum piperis granis, illis
tamen esse grandiora fragilioraq;, ut plerumque hæc
sunt grana, licet etiam parva repetantur, odor gra-
tus, & ad Caryophyllos aromaticos, qui nobis in u-
su, valdè accedens, cujus grati Plinij tempore ad-
ferebantur. Et certè hunc fructum manducatum, o-
ris halitum gratiore reddere comperiebam: ad
multos præterea alios usus utilem fore credibile est,
si quis periculum faceret.

AMOMVM NOVVM CARDAMOMI
vulgaris Facie, sive Indicus racemus.



in exot. Auctuario: de ea autem scribit sub titulo
Amomi spurij, quæ sequuntur. Anno Christi 1605,
mittebat ad me Ioan. Pona, plantæ cujusdam ali-
quot fructus uvarum instar confertim in ramulo
ratos, & aromaticum quidpiam redolentes,

Tom. II.

quos pro legitimo Amomo sibi datos scribebat: at-
que adeo eam opinionem Plinij auctoritate confir-
mare nitebatur, qui l. 12. c. 13. Amomi & Amomidis
mentionem faciens, subiicit: simile his & nomine
& fructe, Cardamomum, semine oblongo. Verùm
quidem est singulos uvarū quos accipiebā fructus,
aliquam cū minore Cardamomo, in officinis vulgò
recepto, similitudinem habere, certè uterq; fructus
triangularis est formæ. At Cardamomi vulgò recepti
theca oblongior est, & minùs crassa, multisq; striis
distincta semina continens crassiuscula, Meleagretæ
seminibus non valdè ab similia, odorata, subrusti co-
loris, nec ingrati saporis, licet acriusculi: ejus verb
fructus qui pro Amomo missus, theca brevior, cras-
sior & candidior est, nec adeo striata, seminaq; con-
tinet tenui membranâ involuta, nigra, oblongiuscu-
la, duplo quàm minoris Cardamomi semina majora,
splendensque & valdè dura, albâ quidè medullam
continentia, quæ acrimoniâ quandā tandem exerit,
sed nullius amaritudinis participem: atq; in super to-
ta uva cum suo fructu nativum odorem habere non
videbatur, sed ascititium potiùs & olei Lavendulæ
odorem quodammodo spirabat, quasi illo delibuta
fuisset, vel certè apud simile oleum adservata.

Antiqui utebantur uvâ Amomi ut apparet ex Plin.
nio & Galeno in Catageni in Medicamento Ascle-
piadis *Βότρυς Αμωμίου* [Αμωμίου *forte*] in Theriaca Andro-
machi senioris, & *Βότρυς Αμωμίου* [Αμωμίου *forte* leg.]
racemosi Amomi. Nescio (Cerch. Martin. loquitur)
cur Matthiolus dicat, sibi non cōstare Dioscoridem
semen in Amomo approbasse; ego contrariū inve-
nio in Anazarbeo, & meliorē partē Amomi esse fru-
ctum similem racemis parvarū uvarū: ait enim deli-
gito recens, seminis plenū, uvis parvis simile, grave:
celebrata igitur ab antiquis uva Amomi & non li-
gnū. Meū Amomū nuper missum per M. Cerchinum
Martinel. ex Malaca civitate Indiæ, habet multa gra-
na simul juncta, quæ referunt parvā uvæ racemum
&c. Plinius Cardamomū cū Amomo consert unde
apparet affinitas magna, nō solū nominis, sed formæ
& figuræ ac etiā virtutis: cū ratione dixit Pena. Nō pa-
rū affinitatis esse Amomo cū Cardamomo. Si Anti-
quitus magis erat notū Amomū ut diceretur qui no-
vit Amomum, statim novit & Cardamomum: hodie
dicendū ē contrariū: qui novit Cardamomū statim
novit & Amomū: Cardamomū enim nihil aliud est
quàm Cor Amomi ut nominis Etymologia ostēdit: ex Malaca
Meū Amomi racemū existimavit aliqui esse speciem
Cardamomi, nō cōsiderantes Cardamomū nō profer-
re grana, in racemo, nec rotūda sed lōga. Nostri
Amomū habet omnes notas quas in Amomo Diosc.
requirit. Probat hoc Colleg. Med. Venetorū cū di-
cit, Amomū præsentatum per D. Cerch. Martinellum
Aromatarium ab Angelo 15. mensis Septēbris 1604.
habeatur pro vero & legitimo Amomo, ac in cōfect.
Theriacæ ac Mithridatij, extētisq; medicamentis ad-
hibeatur. Rejicit autē Libellus contra Cerch. Marti-
nell. incerti auctoris, oblati Pharmacop. Mantuanis
dicens: Deberet explodi hoc novū Amomū ex omni
benè instituto pharmacopolio & ex tota Italia: nul-
lo enim modo convenit cū descriptione Diosc. & a-
liorum bonorū auctorū: Nicol. Stelliola contra opi-
nionē Patavinorū in suo libello de Theriaca & Mi-
thridatio, secutus opinionem Matthioli & Marathæ
dicit Diosc. describere plantam & notas ligni Amo-
mi & non seminis, unde concludi vult lignum non
semē aut fructū Amomi usurpandū in medicamen-
tis: quod ex Diosc. verbis apparet, Plinij auctoritas
est suspecta cū nullus sit ex antiquis vel neoteri-
cis qui certè affirmat Amomum nasci in India; quin
imò Garzias scribit falsam esse eorum opinionem
qui dicant nasci Amomum in India, ita ut existi-
mandum sit aut Plinij non benè cognitum Amo-

mun: præterea ejus verba demonstrent diversum esse à Diosc. Amomum, ita ut quilibet possit judicare quantum valeat auctoritas Plinii ut probet utrum uva Amomi & non ligno. Si Galenus intellexisset Amomi fructum aut semen, dixisset *καρπὸν καὶ σπέρμα* aut *σπέρμα καὶ καρπὸν*, licet 14. ultimi libri de comp. med. per gen. scriptum sit Andernaco interprete Amomi uvæ, malè tamen id factum, ut etiam libro 1. Antid. ubi idem nomen *βοτρυς* malè interpretatur per vocem uvæ, in eo etiam reprehensus fuit à Fuchio. Martinellus monstrat se parum in lingua latina versatum, cum vult Diosc. per hæc verba, *Deligitiorens seminis plenum, uvis parvis simile, grave*: manifestè voluisse meliorem partem esse fructum similem racemis parvæ uvæ. Traductio Ruellij uvis parvis simile parum fidelis videtur. Cerchini racemus non est planta, nec plátæ pars quæ sit tota simul cónexa & ex ligno se convolvat, quavis sit sicut racemus: fallitur idè dicens omnes notas Dioscoridis cónvenire. Grana quæ potius folliculi dici possunt nõ cónvolvuntur, nec soluta diffunduntur. Quò magis Cerchinus demonstrat similitudinè Amomi cū Cardamomum, eò magis corroborat opinionè, q̃ verissimè existimo, eorū qui dicunt ejus racemū esse Cardamomū: quandoquidem grana hujus racemi sunt plena semine, clausa, coloris flavi: semè contentū gustu acris, & non nihil amaricante: differentie Martinelli nõ possunt impedire quin sit species Cardamomi. Vti diximus racemus ex Malaca figurà nõ cónvenit cū Amomo, non est ex ligno se cónvolvens: nõ ex Armenia affertur, sed ex India: & quavis hic racemus haberet omnes notas veri Amomi, cum tamen habeamus Armeniū, stulticia esset usurpare Indicū: color granorū hujus racemi nõ est aureus sed potiùs malè coloratæ paleæ in hoc racemo nihil reperio quod possit dici lignū sed sarmētū, cui adherent quidā folliculi. Sarmētū nihil habet ruffi, sed est ejusdè coloris cū folliculis. Est ei aliquis odor, quia non potest dici odoratissimus: nullo modo cónveniunt ei voces, *grave, acre, gustu mordens, simplici colore, non evariante*. Si Martinellus vult jã dicta verba referenda ad folliculū, leve est, in odorū, insipidum: si ad semē nõ est grave, odorū habet, sed non odoratissimum, nõ nihil est acre, sed non mordicās. Plinius non solus scripsit de Amomo Indico, sed antè illum Theophrastus, ut apparet ex verbis ejus ante citatis ac etiam ex aliis: Quodnam sit Amomum Armenium considerandum.

Nic. Maronea Veronensis Philof. & M. Doct. in cōmēt. suo de Amomo inter alia hæc habet. In juria tēporū Amomi notitia deperdita est seculisq; nõnullis Amomū latuit ad nostra usque tēpora, quibus Amomi uva denuò in lucē prodit operā & industriā egregij & honestissimi Viri Cerchini Martinelli qui ex remotissimis Indiæ regionibus verū & legitimum Amomū ad nos transmiit, sanè hoc idè Amomū tãquā legitimū, nostrū Medicorū Veronensium Collegij agnovit & multi alij viri doctissimi amplexati sunt. Verūm, quia diversa sunt hominū ingenia, fuerunt aliqui, qui editis scriptis Indicū Amomū, tanquam spurium repudiarent. Idcirco decrevi Amomi Indici patrocinij suscipere, ipsā scilicet veri veritatē, atque ostēdere Indicū racemū esse ipsorū veterū legitimum Amomū: quo usus est Io. Pona in cōponendis suis antidotis, Michridatio & Theriaca, quia illū admisi, tãquā legitimū, quo tēpore Collegij nostri nomine, ego unā cū exc. viro Jacobo Dionysio præfui ejus recensendis Antidotis, quæ publicè parabat. Sū autem explanaturus Amomi historiam [Nos integram nõ ponimus, sed huc maximè faciētia tantum depræmimus] quam Dioscorides & Plinius nobis scripta reliquerūt, quò perferuntur quilibet possit, nū Racemus ex India alatus, possideat notas veri & legitimi Amomi, an verò, ut recentioribus placet, idè racemus referendus sit

inter species Cardamomi, vel demū nova plátæ existat, p̃stis vitis proflus incognita. Verū necessariū esse dixi, hujus descriptionē, antequā ad ipsam expositionē accedā, præmittere. Amomū igitur Indicū cujus descriptionē facimus, nõ est integra plátæ, sed fructus: cujus etiā exhibemus iconē, exprimitē naturālè Amomi magnitudinē. Est autē parvus racem⁹, abiq; pediculis ex unico sarmēto enatus, sibi ipsi arctè cohærens, & convolutus in uvæ modum, cōstās, dens, aut duodenis ad summū acinis, seu folliculis, fibrosis, se mutud cōprimētib⁹, tãquā de cōmuni loco inter se decertātib⁹, adeò ut sibi invicē parvas cavitates imprimāt. Racemum sustinet lignū teres, pollicari lōgitudine, fibrosū, odoratū, acre, foliis cōsertim exornatū, tū pusillis lquamarū serie distributis, quā parte folliculorū est expert⁹, tū lōgioribus foliis, senis singulos folliculos ambiētib⁹, quæ vicem quandā præstat calycis illius, quē in Nucè Avellana cōspicimus, ex lōgioribus foliis tria quidē cōstāt lōgitudine semunciali, tria verò paulò breviora sunt, eadē folia tenuia sūt, fibrosā, acris odorata: sed quæ privatim folliculos cōplectūtur, æmula sunt foliorū Mali punici, suis cacuminib⁹ sēpè cōtracta, rarò integra, ut vix extra Amomi acinos emineāt, q̃ evenire credēdū est, quia mutuo attriti foliorū luminitas cōstringūtur in lōgissimū itinere. Acinorū crassitudo, & figura orbicularis existit, qualis mediocris uvei acini, ornātur folliculi Amomi externis tenuissimis filamētis, seu nervis quasi lineis per longitudinē ductis, ternis etiā præditi sunt parvis sulcis, totidēque interpositis exiguis emineētis, quæ triplicē internorū seminiū serie cōscribunt, singulos folliculos replēt tres seminiū phalāges, tenai mēbranā ab invicē sejunctā, unaquæq; autē phalāx pluribus cōstāt seminibus angulosis, eadē tenai mēbranā involutis, adeòq; strictim sibi cohērentibus, ut triū duntaxat seminiū lōgiusculorū effigie præbeāt. Racemi totius & ligni color idem spectatur in aliquo pallidus, in alio cādidi⁹, in alio verò ex pallido ad subrufum vergēs, sed in cādido folliculo semina in sunt plerūq; evanida, in subrufo seminaolidiora, & perfectiora frequētissimè observantur: seminibus angulosis color externus ex rufo nigricās adest, internus albus, semina interna eadē solida quidē sūt, sed fragibilia, nõ fractu cōtumacia, ut Cardamomi semina. Racemo odorinef validus, sed *lax⁹*, ingenuus verò, nõ ascitius, qui vulgare Lavēdulā quodammodo redolet, suavior tamē, exēptis à folliculo seminibus major odoris actimonia inest, minor autē odoris gratia, eādē ratione, & racemus, & nuda semina acris sapore sunt prædita, sed in racemo hebetatur acrimonia, in nudis seminibus vehemētior percipitur, quæ vulgare capurā quodammodo sapit. Præmissa sic descriptione, ipsā expositionē aggredior, in qua tria præcipuè præstare conabor. Vñ erit expositio nōnē asserre verbis Dioscoridis sūmoperè consentaneā: alterum erit, rei ipsius veritatē perferuntur, in illis præsertim, quæ Dioscorides partim ex sua sententia scribit, partim ex auditu refert: quam sanè distinctionē cum recentiores prætermittūt, Amomi doctrinam non parū perturbāt: postremò suis cōgruis locis indagabo, nū Indic⁹ racemus eas obtineat notas, quas Diosc. sū Amomo assignat. Hęc præfati volui, existimās, ea allatura esse lucem illis, quæ à me posthac dicentur.

Ad Dioscoridis itaque verba hæc: *Amomum est parvus frutex* [*σύντοκος*] addo, *cuius fructus est*: alioqui Dioscoridis sensus videtur mutilus & falsus. Suspiciādū etiā codicē Græcū mutilū esse, desiderariq; in eo Myrruosi nomē quo Plin. Amomi fructū cognominat, seu aliā ejusmodi vocē adjungēda esse, vel Dioscor. dedit operā Amomi brevè notiorē attulisse. *Est sicuti uva racemū* [*βοτρυς*] seu racemi significatio apud Græcos duplex videtur, una cōmuni ssima, quæ

Galenus nō intellexit fructum vel semē. Andernacum nos.

Martinellus saxat.

Ruell. re. preh.

Racemus ex Malaca delatū non cōvenit cum Amomo.

Vnde delatū legitimum est nōm.

Collegij M. Veronensis sum. con. sensus.

Amomi fructus Racemi Indicis delatū Maronea.

Acini figura.

Semina.

Color racemi & ligni.

Odor racemi.

Interpretatio verborum Dioscoridis.

quæ comprehendit omnes fructus racemosos. Altera significatio denotat non universum genus racemorum, sed illorum quandam notissimam speciem, nempe racemum uvæ: Hanc significationem cognoverunt Marcellus & Ruellius, qui nomen *βῆρυξ* exposuerunt uvam vel uvæ racemum, quæ inter se non differunt. Recentiores autem aliqui hanc *βῆρυξ* significationem ignorarunt cum Ruellium reprehendunt, tãquam malè interpretantem hanc vocem *βῆρυξ* nomine uvæ, quæ in re suam proflus patefaciunt inficitiam. Veteres sanè Amomi fructum existimantur esse racemum. Dioscorides declarat Amomi racemum similitudine seu exëplo ipsius uvæ.

Ex ligno] et ligni nomen significare possit & integrum Amomi fruticem & angularis illius partes, nepe stipitem, ramos, lunculos, nihilominus tamen hoc loco denotat vinee armentum, cui uva cohaeret.

Convolutus in se ipsum *Αντιπεπλος ἑαυτοῦ*] sensus verborum est Amomi fructus est similis illi uvae ramo, qui est in seipsum convolutus seu complicatus. Verum tamen ille dicitur complicatus in seipsum, qui a contrariis omnibus locis sibi met cohaeret & convolutur: sunt vero loci differentiae contrariae, ante, retro, superius, deorsum & a dextris & a sinistris.

In *Isipism eaurp* Vox relativa nostram confirmat expositionem, vocem convoluti referendam esse potius ad proximum substantivum racemum, quam ad remotiorem fructum vel fructicem. Recentiores inquit Diosc. descripsit plantam convolutam, sed Indicam Amomum esse racemum convolutum non planta, quare non est Dioscoridis legitimum Amomum: patet solutio dubitationis ex Diosc. & Plinio, quia uva ipsa convolvitur non planta. Recentiores negantes Indicam racemum esse convolutum & sensui adversantur & vocis significationem non rectè accipiunt, si enim ex Plinio uva convolvitur, cur Indicus racemus uva similis non convolvitur etiā? Enimvero recentiores hallucinati esse videntur, in hac voce convolutus, tar quā significet Amomū alicui rei esse convolutum. Recentiores Indicam racemū, illegitimum Diosc. Amomū dicunt, quoniam ramulo adhæret herbaceo potius quàm lignoso, cū idem ramulus flexibilis & venosus appareat: Sanè verissimè affertur Amomi Indici pediculi flexibilē & venosum, sed non inde sequitur eundem ramulū esse herbacē. Duplex est lectio vulgata, una quidem quæ Græci exēplis seriem sequitur, altera vero est Latinorū interpretū qui perturbant ordinē verborū. Lēctionē vulgatā nōnulla absurda cōsequuntur, si fructicē exponamus plantā expertā fructuum Diosc. dupliciter errat. Sed quia Recentiores vulgare inq̄uētū lēctionē existimant Dioscoridē declarare Amomi plantā, exemplū ipsius uva illorū partes erant ostendere etiā alia Dioscoridis loca in quibus plantam ipsas cōparatione fructuū illustraverit. Adhuc uva exemplū ineptū est ad exprimendū fructicem. Recentiores autem quandam excogitarunt similitudinem cōmūnem Amomi plantæ & uva racemo quam vocarunt cōnexionem seu adhærentiam partium cum fructis tum uva. verū est similitudo tenuissima, indigna proflus Diosc. diligentia. Latinorū interpretū lectio (Amomū exiguē fructicē ex ligno fē convolvens in uva modū) pluribus de causis repudianda, sensum Diosc. immutat, obscura est. Errarunt recentiores illi qui nuper adversus Indicam Amomum scriperunt: siquidem illi vocem *βλαγυ* in amplius sua significatione racemi accēperunt, hoc pacto legentes: Amomum est parvus fructus in *Isipism* convolutus veluti racemus. Ex hac lēctione cōsequitur insallum & imp. sibile.

Habet autem & si nem parvum veluti *Viole alba*, *folia* verò *Vitis alba* *similia*. Ita Diosc. conjungit florum & foliorū descriptionē ad antecedentia ut nemo in-

Tom. II.

ficiari possit, quin antea Anomī fructū figuraverit, quēadmodū nos exposuimus. Verisimile est foliorum & florum Anomī historiam Dioscoridē accepisse potiūs ab aliis scriptoribus quān quod Anomī flores & folia ipsemet unquam viderit.

Optimum est Armeniacum.] Dignū inquisitione an Amomi nasceretur in Armenia, Ponto : causā dubitanti quia Theophr. antiquius adnotavit, odorata partim ex India, & Syria advehi, indeq; mitti ad Mare, partim ex Arabia deportari. Adhuc scribit Plinius Amomum in India provenire. Quibus accedit Dioscoridem per sepe ex exoticarū plantarū suas ignorasse regiones. Verissimū esse puto Amomi plantā indigenā Indiæ esse, ex qua olim deferrebatur primū in Sinum Persicū, mox in Mediā, Armeniā, Pontū importabatur, inde verò in Græciam & Italiam perveniebat. Equidem censco si Amomum in Media, Armenia, Ponto nasceretur haud difficile esse, hoc tempore ex illis regionibus illud exportare. Secūda succedit dubitatio an tres sint Amomi species, vel potius sint tria individua sub unica. *Quid aurem ad aures Colorem in lineā, hūcque lignum sub: um* } *χρ. ἴσ. ἡ χρ.α* non significat ipsūmet auri colorem prædictū esse, sed ad auri colorem inclinare: sanē ejusmodi color esse videtur medius inter album & aureū, quē Plinius pallidum, atq; secundæ bonitatis vocat. Ligni nomen intelligendum esse tenue farnētū, cui racementū hæret. *Subcitrū* color, *αυροπύρρον* magis ad fuscū vergit quā subaureus. Quod Diosc. Armeniaci Amomi nomine non intelligit fruticem, sicuti recentiores aliqui opinantur, non est difficile ostendere.

Odranum vāde δῶδος ἰανθῆς] Theophr.lib.de odor.
ribus, vero Amomo tribuit odoris vehemētiam his
verbis: vehemētiora pariter adhibent ut Costum &
Amomum. Sanē Indicū racemum vehemēter nares
excitare, verisimilū est, quāvis aliq̃ Recentiorū idi-
plum negare nō erubescit. Sed Medicū, quia in capē. *Recent. err.*
Medicum.
litibus & aquosis locis nascitur, invalidū. Magnū &
subviride] cū recentioribus Medicū Amomum sub-
vire exponamus fruticē, ista coloris subviridis ob-
servatio in ipso frutice erit prorsus plebeia & indi-
gena herbario. racemo est adhibendus, cui Plin. etiā tri-
buat. Et ad tactū molle ἀπαλόν, ἐν σμῖν lignū ligntu lam-
ramul, qui ipsos racemos suos fructūs ferūt. Medicū A-
momū venosū est nō suis fructib⁹ sed lignis, imo sua
fructib⁹ est ad tactū molle, seu fragile fragile autē &
venosū sibi adversatur. Patet Dio Coridē de racemo
nō de frutice loqui, nā si frutex venulosus erit, sicuti
plenq̃ interpretes exponūt, quid erit ad tactū mol-
le seu fragile nihil prorsus. Odore ad origanū inclinā-
te ὀσμήϊ οὐρανίου] non denotat odorē Origani, sed us.
quod accedit ad Origani odorem inter racemos Indi-
cos nullū adhuc observavimus subviridem. [Cur Ni-
col. Maronca ὀσμήϊ οὐρανίου interpresetur ad Origanium incli-
nante nesio, significat enim ad Rutam inclinante.] *Color sub-*
viridis. *Ligna.* *Maron nos.*

Pontica ^{in uerbis} *beirrum*] *circus* color ex ruffo & ru- *Ponticum.*
bro commixtis enafciur, fed fubcolor ex pallido &
cirro fit. Ex Indici aliquos obferuauimus fubcricos,
eodēq; cæteris præftantiores cū odoratores fint &
grauiores. Color fubcricus eft racemo assignandus
non fructui, præfertim cum Plinius colorē ruffum ra-
cemis tribuat, nō fructui. *Non longum*] Si Medici A-
momī racemum magnus eft, etiam longus: Huic
Diof. opponit Ponticum, non longum, de racemo
autem loquitur, non de fructu. *Subcricus
color.*

Neque fractu contumax] Ponticum Amomum non
est fructu contumax, veluti exempli gratia est Car- *Cardamomus*
damomi fructus: mediam obtinet conditionem in- *mi fructum*
ter duritię Cardamomi & Medici racemi fragilitatę.

Racemosum. Boissierodors] Ponticū Amomum est racemolum, quia uvæ effigiem habet non racemi, tãtũm cõmuniter sumpti: Amomũ racemosũ significat fructum, non plantã ut perperam recentiores scribunt: *Racem.* err.

verum quia negarunt Amomū racemosum esse fructū ellegie uva präditum, sed scripserunt esse plantā similem racemo: ipsorum partes erant, suam confirmare expositionem, Dioscoridis testimonio.

Fructu plenum] Si Amomum Ponticu est racemus, sicuti docuimus, inde colligitur eundem racemū ex acinis seu folliculis constare: qui intra propriā cavitatē fructus aut semina continet. Falsū est solū Amomū Ponticu esse fructus plenū, namq; & Armeniaci Amomi racemus debet esse fructus plenus cū optimus exsit. Dioscoridis testimonio. Dioscorid. 2. parum videtur esse constans in usu vocū *racemū* & *fructū*. Hoc in loco obijciunt Viri docti, si Dioscorides nō de Amomi planta sermonē habet, sed de fructu Pontico, quem dicit esse fructus plenū, propositionē esse nugatoriam, cū unū & idem sit subiectum atq; prædicatū, fructus est, fructus plenus, facile diluitur obiectio ex fructus & seminis significationibus. Namq; subiectū est Amomū Ponticu, seu racemus Pōticus, qui ex pluribus fructibus, seu folliculis constituitur. Sed prædicatū rationem habent interna semina angulosa, quā in eisdem folliculis continentur. Falsum ergo est quod assumunt recentiores, idē esse in propositione subiectum & prædicatū.

Odore sensum feriens] Homines recentiores qui Indico Amomo infesti sunt, racemi Indici suavē validūque odorem suis scriptis extenuant, tanquam ascititiū. Opponimus testimoniu ipsorum sensuum. Quis verit jure quispiam, quibus permoti cōjecturis putaverint quod Amomo odor ascititius. Recentiores frustra inquirunt, num Indici Amomi odor existat in ejusdē pericarpis vel in seminibus internis: cum Diosc. ipse collocaverit in racemo toto.

Eligitur autem recens & album vel subrubrum] Amomi color albus & subrubus ipsius racemi existit, nō fructicis, nāq; & Plinius eosdem colores racemis Amomi assignat. Omnes colores quos Diosc. observavit, nos præter ipsū subviridē in racemis nostri Amomi observamus: verū hōc colores non observatos fuisse à recentioribus illis viris, qui Amomo Indico bellum indixisse videntur, facile crediderim. Subrubus autem color esse videtur is, quem Diosc. supra vocavit subcitrū: albus verō color Amomi nō videtur esse simplex, sed remissior ob admixtā exiguam suffedinem: si tamē de Veterū Amomo licet judicium facere ex nostris Indicis racemis, quorū illi qui albi existūta sunt albi ut ad colorē cineritiū aliquatū vergant. Quod si recte ad colorē albu quē Diosc. præter bonitatem cū subrubro facit, dicendū est vel codicē Græcū esse corruptū ut Marcel. Virg. suspicatur, vel Dioscoridem adversari Plinio, qui pessimū esse candidum affirmavit, vel voce candidi intelligendū esse racemū subaureum, quē Plinius pallidum dixit: verū si lectio depravata est vel expungendæ sunt duæ voces (albu vel) legendūq; non albu sed subrubrum.

Non coactum vel connexum] ut est adulteratus racemus qui constat acinis seu fructibus, qui etsi à suo ligno aliās avulsi jã fuerint, postea tamē gūmi liquido in unū factiū racemū, conglutinati adeo fuerūt, ut unū continuū & solidū corpus præ se ferant potius q̃ racemū ex pluribus acinis constitutū. Suspiciari licet, in græco codice fortasse desiderari aliqua verba, quæ significat ipsam Gūmi liquidū, quo racemū Amomi adulterati Plinius scribit. Verū recentiores, qui R. e. l. u. m. interpretantur, & q̃ d. e. s. e. v. a. l. u. m. opumū Amomiū, neq; astricūm coherere, neq; esse cōvolūtū decipiūt. Nō cōctū vel cōnexū (scil. gūmi liquidū) quido ex Plinio addidit Marcello Virg. libeter assētirer, verba isthæc esse expūgēda, nisi ex Plinio haberem⁹, valde p̃ciū expositionē modō enarratā.

Solutum & diffusum] Diosc. legitimū racemū denotat, qui constat acinis ab uno famento enatis, se quidē cōtingētibz, nō verō conglutinis in unum.

Diffusū & solutum sunt voces polyonymæ, quæ excludunt cōtinuitatē & cōglutinationē: minime verō nomē diffusū significare potest diffusiū inter cōsēdē Amomi fructū. R. e. l. u. m. & d. e. s. e. v. a. l. u. m. exportat spais.

Semina plenum] Græcis autotibus plures fructus & seminis significationes sunt, sed hoc in loco semē id significat, quod in pericarpis cōtinetur. Amomum plenū est ipse racemus, cujus folliculi acinosi continent semina multa & perfectā, quæ totā eorundem folliculorū cavitatē replent. Recentiores profitentur Veteres Medicos solā Amomi plantā semper usos fuisse, neglexisse verō fructus & semina ejusdem Amomi, tanquam inutilia, sed non satis est affirmare, nisi eūcā cōstet, aut t̃ nobis id ipsum ostendatur.

Simile parvū uvis [Bergh. & c.] Recentiores cū videant nomen uvulæ vel racemū admodum favere Indico parvo racemō, cujus acini denos aut duodenos ad summum non excedunt, negant Dioscoridē dixisse unquā Amomū eligēdū esse simile parvis uvis aut parvis racemis, sed res est luce meretricia clarior, Bergh. & c. significare parvā uvā vel exiguū racemū. Verū si Diosc. in præsentia eligit Amomi plantā ut placet Recentioribus, illa non potest esse similis parvæ uvæ. Diosc. voce parvi excludit Medicum racemū magnū quem (utpote in validum) antea repudiavit. Recentiores novā afferunt expositionē verborū Diosc. Eligit Amomū plenū semine simili parvis racemis. Sed ejusmodi expositio itatim apparet falsa: siquidē seminis vox, q̃ est secūdi casus, regitur à voce plenū, & connecti non potest cū simili, q̃ est quarti casus, quapropter expositio cōmunis retinēda est, q̃ ait, Eligit Amomū semine plenū, simile parvis uvis.

Grave] Recentiores qui Amomū Indicum teprobant, tanquam illegitimū, quia grave non sit, in cadē re multiplices peccant, nam & sensui contradicunt & una similitudine confundunt signa Amomi tū legitimi tū optimi. Demū Amomi gravitatem faciūt absolutam, cū tamē sit cōparativa, quæ dignosci nō potest, nisi plures Amomi racemū invicē cōferantur.

Valde odoratum] Tantā racemus Indicus odoris fragrantia pollet, ut racemus quē jam multos dies aqua servēti maceratū, postea exsiccavimus, suam quandā nativam suaveolentiam spiret: quam obrem ignoro quid compulerit Recentiores ad negandū validā nostri Amomi odoris scilicet ipsi expositionem.

Sine carie & acre] Errant Recentiores inquirētes acrimoniā Amomi in ejusdē particulis, quarū per se nullus unquā fuit usus, nepe in solis folliculis, vel in solis seminibus: siquidē veteres toto utebāt racemo.

Gustum mordens] Eligit Diosc. quo excludat Medicū Amomū in validū. Recentiores racemi semina gustū mordere negant, sed hac in re dupliciter errāt, & quia negāt rē sensibus apertissimā, & quia racemi acrimoniā absolutam faciunt, non comparativam.

Simplex color non variū] Color varius in uvis tūc existit, quando in uno & eodem racemo acinorum hic viridis apparet, ille purpureus, vel quādo idemmet acinus ita existit. Sanē variū hunc colorē ignotū Recentioribus, in quibusdā Indicis racemis Amomi nos observavimus. Diosc. hoc loco racemum ipsum describit, non totam Amomi plantam ut Recentiores opinantur. Varius autem color imperfectæ maturitatis est nota, vt in uvis ipsis possumus observare.

Adulterant verō aliqui Amomum ipsa vocata Am. inde simili existente Amomo, inodoro autē & sin. fructu, quādo dicitur, ut in d. e. s. e. v. a. l. u. m. & c. h. u. m. p. i. Amomo, verū ipsē verborū cōtextus ostendit eadē voces adjectivas, connectendas potius proximiori substantivo Amomo, quā remotiori Amomidi. Deinde cū Amomi vox multiplex sit, quæ significat plantam absque fructibus & plantam fructibus onustam, atque fructum racemosum similem parvis

uvis : Amomo inodoro & sine fructu, hoc est, Amomo immaturo ut Plinius etiam scribit.

Quæ nascitur in Armenia, florēque habet similem Origano] Suspiciatur quoddam noster auctor de Amomide scripsit, potius quæ apud auctores legitur. Amomi plantam Dioscoridi solo auditu fuisse cognitā, non autem oculatā inspectione perceptam nobis suspicandi occasio: quod verò ex veteribus herbariis aliqui Amomum describentes plantam integram cum sua radice figuraverint, apud Plinium locum monstrabimus.

Oportet autem huiusmodi probationibus fragmenta vitare. Eligito autem quæ ab una radice habent surculos integros] Amomi radix non est utilis ad compositiones, quoniam radicem Amomi apud Veteres Medicos nulla unquam mentio habetur: sed radicis mentionem facit Diosc. ut manifestum faciat, ipsas plantas integras, suisque radicibus coherentes, non esse expositas dolis & fallacis. Recentiores ex incertiori Amomidis descriptione student confundere & perturbare certiorē & dilucidiorē notitiam legitimi Amomi racemosi. Hac ex Maronea in Dioscoridem dixisse nobis sufficiat.

Ostendit porro Maronea Plinium de Amomo verè scripsisse & consona iis, quæ Dioscorides de Amomo tradidit: quinetiam aptè monstrat, Indicium racemum omnibus Amomi Pliniani notis insigniri: præterea comprobatur, Plinium in describendo Amomo fuisse diligentem & dilucidiorē ipso Dioscoride. Nos ex Maronea explanatione in Plinium, quædam tantum adscribimus, plura desiderantem ad ipsius Maroneæ commentarium relegantes. Sciendum itaque est, quod quando Plinius dicit: *Amomi uva in usu est*.] Amomi nomen significat plantam ipsam, eiusdem verò plantæ fructus, dicitur uva Amomi. Recentiores qui Ruellio vitio vertunt quod Dioscoridis vocem *βότρυς* perperam exposuerit uvam cum significet racemum, eisdem erroris etiam Plinium ipsum tacite reprehendunt. Amomi uvam intelligit Plinius racemum, qui refert imaginem uvæ. Recentiores qui Plinium in Amomi frutice describendo ancipitè vident, inde colligunt, eundem auctore etiam uvam Amomi ignorasse, admodum fallaci argumento ducti.

Indica vire Labrusca.] Aliqui ex Recentioribus repronaverunt Plinij de Amomo historiam, quia illa admodum favet nuper invento Amomo. Garzias autem audiendus non est qui Amomum in India nasci suis scriptis negat: non credendum est vel Garziam omnes Indiæ vastissimas regiones peragrassè, vel omnia simplicia medicamenta cognovissè.

Frutice Myrtuosa] Nobis ardet opinio, quod Amomi planta sit frutex Myrti effigie prædictus, nāq; in Racemi Indici (ut sic loquar) pediculo folia insunt breviora, quæ non sunt dissimilia à foliis Myrtinis.

Punici mali foliis simile.] Amomum quod est simile foliis Mali Punici, atque à Plinio laudatur, non est altera Amomi species, sed est Amomum antea descriptum, illud autem est Amomi fructus vel planta: Amomum quod folia obtinet Mali Punici similia, est ipsamet uva, non plāta. Indicus noster racemus in seipso continet folia emula foliorum Mali Punici, sēna singulos folliculos ambientia in modum calycis. Recentiores autem quibus incognita sunt folia dicta, frustra obijciunt Plinio, quod Amomum descriptum longè diversum à Dioscoridis Amomo. Ex Plinio folia Mali Punici pertinent ad uvam Amomi, non ad plantā: sed ex Diosc. folia Vitis abesse spectant ad plantam Amomi, nō ad fructum. Racemi quibus insunt folia integra & longiora, quæ extra Amomi acinus perspicue eminent, sunt pulchriores visu & plerumq; recentiores, & in corruptiores existunt folia ante maturitatem decerpta, rugosa evadunt, quæ

Tom. II.

nondum animadvertere potuimus in Indicis racemis: sed acinos racemi rugosos. Plinius Amomo rufoprimum bonitatis signum assignat: idem Nardo tribuit colorem rufum, nihilominus tamen in Indicis racemis nō videmus colorē illum, sed subrufum: *sua*.] subruffi autem racemi Indici Amomi plerumq; omnium ponderosissimi & maxime odorati existunt.

Præcium] Quis assentietur Recentioribus scribentibus Plinium ignorasse Amomi uvam, quam nullus ror. Vnguentarius aut Medicus Plinij seculo ignorare poterat? Frustra laborant Recentiores, qui fingunt duas Amomi species à veteribus descriptas, cum illi unicum tantum cognoverint.

Folij Mali Punici & gummi liquido] Cum Amomi uvæ fragmentis in unum tactitium racemū. Recentiores frustra obijciunt Plinio, folijs folijs inodoratis Mali Punici & Gummi liquido effingi nō posse fructus odoratos, qui legitimum racemū æmulari possint: Plinius in sua narratione historica prætermisit Amomum striatum ut pote notissimum in ætate.

Minus venosa atque durior] vulgaris Codicis lectio hac in parte mendola est, legendum est minus venosa, atque dura.

Simile his & nomine & frutice Cardamomum] Constatanda opinio Recentiorum, qui scripserunt Amomum Indicium esse speciem Cardamomi racemosi: est species Cardamomi. Docet Plinius, Cardamomum simile esse Amomi speciebus, nempe Armeniaco, Pontico, Medico: qui verò exponunt Cardamomum simile esse his, Amomo & Amomidi scilicet, illi perperam faciunt unum Amomi genus & Amomidis, cum planta sit sui generis ab Amomo diversa.

Frutice] quoniam Plinius nunquam vidit Amomi fruticē, eadem ratione credendū est eundē nūquam vidisse ipsum Cardamomi fruticē, utpote peregrinū inutilemque Vnguentariis & Medicis. Existimandum cognovisse Plinium similitudinem inter plantas Amomi & Cardamomi vel ex veterū monumētis, vel ex ipsa similitudine fructuū Amomi & Cardamomi: Nostri ætate nemo adhuc vidit (quod scia) Amomi & Cardamomi plātas: *Et nomine*] Amomum, Cardamomū, & Cinnamomum sunt vetustissima nomina, & sunt inter se similia: Ex hac verò similitudine nomen licet facere probabilem cōjecturā unā & eadem regionē aluisse illas plantas atq; nomen eisdem imposuisse. Quāobrem cum ex historiis nostri ævi notis aptè Cinnamomū in remotissimis Indiæ Orientalis insulis provenire, credendū est in eisdem insulis, vel saltem proximiori earundē Insularū continenti etiā Cardamomū & Amomū nasci, indēq; in Europā deferri: Verū cum Pliniū inter Amomū & Cardamomū duplicem similitudinē descriperit, scilicet fruticis & nominis similitudinē, Recentiores ipsi qui affirmant nostrū Indicū racemū esse Cardamomū racemosū fateri coguntur, inter Cardamomū & Amomū, tertiam reperiri similitudinē notatu dignā, nēpe racemorū similitudinē, adeo ut uterq; Amomi & Cardamomi racemus eodem modo cohereat, convolvaturq; se ad uvæ similitudinē. Verū Veteres quidē vocarūt Amomū racemosū, sed Cardamomum nunquam dixerunt racemosum, vel quia Cardamomi racemus laxus, & rarus, nullam præ se ferat imaginem uvæ, vel quia Cardamomi fructus tenuibus haret pediculis & propterea suam racemi figuram diu servare non possit. Ex his colligendum est Galenum, Diosc. Plin. & alios veteres nunquam cognovisse Cardamomum racemosum.

Semine oblongo] Recentiores longitudinem seminis exponunt, tūquā similitudinē Amomi & Cardamomi: sed Plinius Cardamomū semine oblongo præditū esse dicit Amomi nullā mentionē factā. Plinius voce seminis intelligit Cardamomi fructum, qui exterius folliculo, interiusq; seminibus constat, sed Recentiores

R 3

iores hanc impugnant expositionem. Procul dubio omnes Cardamomi fructus cum sua theca oblongi; interna verò semina angulosa & brevissima, non oblonga: quia verò eadem semina seriatim deposita sunt, sibi invicem connexa tenui intercedente membranâ, quâ involvuntur, inde fit, ut unaquæque series seminum, unci tantum longioris seminis ostendat imaginem, quæ recentiores in errorem induxit. Cum dicunt Recentiores Cardamomi fructum non esse semen, veritati repugnant, nam ex Aristotele fructus & semen reidem sunt. Ex Theophr. seminis vox communissima, quæ sub se continet fructus & semina, tam nuda, quam in pericarpis contenta. Plinius ipse Balsami fructum semen appellat & nucleos Pineorum. Et si verò scripserit Plinius Cardamomum in Arabia provenire, attamen id falsum esse, novimus ex Neoter. tericorum historiis.

Recentior.

Contra Pl.
Cardam.
non adferri
ex Arabia.Cardamomum
quadruplex.Veridiss.
duo signifi-
cationes.Indici
eodem loco
refertur non
poteß.Plinij lectio
corrigitur.

Color.

Cardam.

Varius.

Locus.

præstitit. Quia verò in Indico nostro racemo omnia apparent legitimi Amomi notæ, recitæ à Dioscor. & Plinio, asserendum est hunc Indicum racemum esse verum & legitimum Diosc. & Plinij Amomum.

Quod Latinis Amomum, *ἄμωμον* Græcis, & Arabibus *Ḥamam* sive *Ḥamam*, & Constantinopoli in officinis *Amama* nominatur; mihi verò Amomum, racemosum dicitur, ego (inquit Bauh. in pin.) verum credi Amomum, Martinelli & Pona; de quo Nicol. Marogna Medicus librum latinè scripsit, quem Pona Italicum dedit. Amomum spiritum, Clusæ exot. auctario. Fructus 5, è VValachia, Eid. exot. l. 2. c. 22. Amomum verum Pona; Clusæ cur. post. & ibidem sub Amomo.

CARDAMOMVM VETERIBVS ET in genere. CAP. XLIX.

Cardamomum (exorditur Theophr. hist. l. 9. c. 7. *ἄμωμον* ex Theophr. alij ex Media, alij ex India, cum Nardo & reliquis omnibus, aut plurimis advehi narratur. Hoc ad unguenta utuntur. Simile his [*Amomo* & *Amomidi*] est Plinio l. 12. c. 13. & nomine & frutice Cardamomum, semine oblongo. Metitur eodem modo & in Arabia. Quatuor ejus genera, Viridissimum ac pingue acutis angulis contumax ficans quod maxime laudatur. Proximum de russo candicans. Tertium brevius atque nigrius. Peius tamen varium & facile tritu, odorisq; pravi; qui verius Costo vicinus [*quod verius Costo vicinus*. Dal.] esse debet. Hoc & apud Medos nascitur. Precium optimi in libris duodecim [*libras x. duodecim*. Dal.] Cinnamomi proxima gentilitas erat, ni prius Arabia divitiis indicati conveniret, causasque quæ cognomen illi felices ac beatæ dedere. Ceterum ex quibus autoribus Plinius quatuor genera faciat, non constat, teste Matthiolo: Dioscorides enim, Galenus & cæteri Græci, unius tantum Cardamomi meminerunt. Quæ verò commentantur de his Cardamomis Plinij, vide cap. præcedenti apud Nicol. Maroneam de Amomo novo Cardamomi minoris facie, vel Indico racemo.

Diosc. de Cardamomo tractans id non describit, sed duntaxat quibus in locis nascatur optimum, qualeque illud sit, docet his verbis: Cardamomum optimum est quod ex Comagene & Armenia & Bosphoro affertur. Nascitur etiam in India & Arabia: Elige verò id quod ægrè frangitur [*ἡ δὲ ἄριστη*] plenum est ac conclusum [*ὑψηλὸν*] quod enim ejusmodi non est, exoletum est: quod item odore nares percellit, & sapore acre & subamarum est. Vim habet calefactoriam. Cum aqua potum facit ad Comitiales, tussim, coxendicum dolores & resolutionem: ad rupta item & convulsa, ac tormina, & lumbricum latum ejicit. Cum vino verò potum renum affectionibus, urinæ difficultati, à scorpione ictis, & ad omnia venenum ejaculantia commodat. Cum Lauri radice cortice, drachmæ pondere potum, calculos atterit. Fœtus etiam perdit suffitu. Et scabiem eximit illiurum cum aceto. Miscetur etiam ad unguenta cum spissamenta.

Temperamentum adscribit Galen. simpl. 7. Qui sanè adscribit esse facultatis admodum calidæ, non tamen usque adeo ut Nafurtium: sed quanto suavius magisque fragrans est Nafurtio, tanto ei imbecillior ei calida facultas inest: nec enim ulcerare idoneum est vel ipsum per se illitum. Porro adjunctum habere quiddam etiam amaritudinis quâ lumbricos interficit, & cum aceto valenter ploras detergit.

Apud Galenum in theriaca Androm. (quæ & l. 1. Antid. & in lib. 1. de theriaca ad Pisonem habetur) Indicum

Racemo
Indico
Amomum

Synon. C.

Nomen ex
Theophr.

Cardamomum

mi 4. gen
ra Plinio

Precium

Plin. nuc.

De Carda

Diosc.

Delectu

Vires

Gomiti

Renes.

Venenum

Calculu

Scabies.

mentum.

ex Gal.

Indam Cardamomum non pro nigro, & Indorum colorem habente accipio (inquit Cornar.) sed pro Indico & in India nascente, ut Dioscorides docet. Porro idem Galenus 7. c. 3. ejusdem operis, in consuetudine Pamphyli, Cardamomum exenteratum habet: sic enim ego *καρδαμύμον* *ἐξεντερισμένον* reddo: & accipio non id cuius interna pars evacuata & ejecta est, sed cui exterior cortex sive pellicula, in qua continentur, detracta est, ita ut interna pars in usum assumatur, & sit *ἐξεντερισμένη*, velut ex interna parte acceptum: contrario modo ei quo glycyrrhiza *ἐξεντερισμένη* probatur, ex qua ejecta est medulla, & radix reliqua in usum accepta. Quanquam autem in Scribonio, & Marcello Medico Latino vetusto, per me ex officina Frobeniana edito, *ἐξεντερισμένη* vox reddita legatur per vocem animatum: Nam & Nalturium animatum, & cathy animatum, & misly animatum habent. & animatum ita pro exenteratum & inanatum, positum videri possit, per errorem exhibentium, qui animatum pro inanatum agnoverint: tamen velut etiam in relatis commentis meis scriptis, animatum pro pleno & integro, & evacuato contrario dictum esse potest, atque adeo pro interno, quod ad externum collatum, animatum, & velut anima præditum haberi: atque ita Galenus 2. de antid. dixit *καρδαμύμον ἢ λοβὸν χαλκίς, ἢ ἐπεντερίων* i. e. Cardamomi interni absque folliculis. Quanquam in Galeno ambiguum sit, an *χαλκίς* ad *λοβὸν*, aut *ἐπεντερίων* vocem referenda sit. Quum autem *λοβὸν* usus nullus à Dioscoride præscribatur, *ἐπεντερίων*, & quod supra *ἐξεντερισμένη* dixit, i. e. internum in capsulis comprehensum accipi debere videtur. Et hoc declarat Galenus ibidem, ex eo quod in sequenti medicamento *καρδαμύμον καὶ γάρυον* accipere jubet. Acutus tamen 12. c. 47. *καρδαμύμον χαλκίς, ἢ ἐπεντερίων* habet, i. e. Cardamomi medulla privati, tanquam rejecto interno grano, capsula ipsa accipiendæ sunt: sed ego vocem *λοβὸν* deesse puto, & legendum, *καρδαμύμον χαλκίς λοβὸν, ἢ ἐπεντερίων*: ut sit eadem quæ Galeni lectio.

Avicenna de Cardamomo duobus distinctis capitibus tractavit. Priore de Cardamomo Sacola, de qua suo loco dicemus: altero de Cardamomo Cordumeni. Quo capite eadem planè vires ei assignat, quas suo Cardamomo Dioscorides. Ex quo perspicuum est de Græcorum Cardamomo Avicennam hic verba facere. Item Serapio nomine Cardamomi eadem prolixius refert, quæ Diosc. & Galenus de suo Cardamomo. Sed Cardamomum ne Græcorum sit, quod vulgo in officinis habetur, id in controversia est. Gelsneri quidem iudicio, Cardamomum Græcorum, ut illud ipsum est, quod nostri simpliciter Cardamomum vocant, (cujus tamen tres ferè differentiæ magnitudinis inveniuntur) aut pro eo rectè usurpari potest. Matthiolus suspicatur Melegetas vulgo dictas, Cardamomum majus esse: sed illæ profectò longè calidiores sunt Cardamomo, & acrimoniâ piperi non cedunt: & quod Matthiolus ignoravit, Arabicum fere Arabum Cardamomum sunt, *sacolla* etiam & aliis nominibus apud Arabes dictum, apud Actuarius modò *Cacula*, modò *Cachrys*, modò *Capsicum*: quod postremum indocti aliqui in compositionibus quibusdam in Tapsiam mutarunt, (ut in Diamarg. Avicennæ quadam descriptione) quæ mortis quorundam occasio extitit, ut testatur Lacuna in sui Dioscoridis hispanici præfatione: alij verò in *Cessiam ligneam*, ut Matth. in epist. sed Gelsnerus Capsicum, i. e. Cardamomum Arabum esse legendum primus animadvertit. Quod si quis etiam Cubebis pro Græcorum Cardamomo uteretur non aberraret is ipsis iudicio. Ipsi Melegeta non videtur cum Matthiolo magis respicere aroma, quam alia Cardamomi nomine dicta semina: quæ

quidem, cum nonnihil subamata sint, ut Cardamomum Gelsnero visa sunt: Melegeta verò acerrima, absque amaritudine, nescit quid sonant Matthiolus, ut Melegeta potius Cardamomum Græcorum esse putant, quàm id quod nomen retinuit.

Cordus præter Melegeta, Cardamomi tria genera facit, magnitudine tantum distincta; Matth. duo solum. Cæterum cum omnia hæc quatuor genera, sua semina folliculis includant, ridiculum est, quod nugatur Matthiolus, Melegeta sibi præ cæteris videri Cardamomum Græcorum, quoniam folliculos habeat. Melegeta dicitur etiam *Nux sacra*, & *Nunte sacra* Myrepto, quasi *Nux Cachrya* vel *Cachrys*. Temere etiam Matthiolus pro Cardamomo Myrti Cardamomi baccas supponit, corruptam Martiati Rotæ *Ἀνθαλ. misubf.*

καρδύον versionem sectatus: melius Luniperi baccas aut Cedri substituit. Piper Indicum seu Siliquastrum quorundam, primus Gelsnerus ante plurimos *Gels. suum* annos Capsicum aut Cardamomum Arabicum sibi videri scripsit: in quo errasse se agnoscit: est sententiam illam aliqui non indocti sunt sequuti. Cæterum minus Cardamomum Serapionis, nullo capitulo aut folliculo inclusum, ipsi ignotum est. Quod si quæ compositio Cardamomum duplex majus & minus requirit, Cardamomum quodcumque habetur, ex tribus illis magnitudine tantum differentiis, duplicatum ponere approbat, aut Cubebas pro altero. Pro *Sacolla* autem & *Capsia*, vel *Capsico* *Cacalæ*, in lexico Græco rei herbariæ, quod D. Sambucus ad ipsum misit in numeris erroribus refferunt, verba hæc inveniri scribit, *καρδαμύμον, χαλκίς, & ρυτίς καχέλα, ἢ καυέλα, ἢ μέλα*. Melegeta verò vel *Melegeta* granum paradisi vulgò dictum, non est Cardamomi species: sed sui generis, quod & precij vilitas indicat, & nulla odoris aromatici gratia. Græcis veteribus incognitum fuisse putat: recentiores Græci *Capsiam* nominant, ut Actuarius: & alicubi *Sistereum*, si bene meminit ab Arabico nimirum *Seitarenge* (quæ vox tamen alibi *Lepidium* significat) in recentiorum quibusdam antidotis *Capsia*, interdum etiam *Casia* pro *Capsico* legi videt: vocatur & *Nunte sacra*, & *Nux sacra*, & aliis barbaris nominibus, de quibus nuncinquirere non vacat. Quod autem Gelsnerus Matthiolum Cardamomi duo tantum genera statuere scribit, se negligentem ejus lectorem ostendit, nos siquidem contrarium brevi ostendemus.

Cardamomi appellatio e grana quadam in phatmacopoliis habetur, & gustu & olfactu admodum aromatica: Manardus & Antonius Musa continent nos (inquit Cordus) verò Cardamomo carere, quoniam ab authoribus descriptæ notæ granis Cardamomum appellatis non conveniant. Quod quidem verum esse ipse fateor, non tamen continud proclamandum erat, nos vero Cardamomo carere. Dioscorides enim & Serapio integros Cardamomi utriculos sive fructus granis efferatos, ut olim afferbantur, atque non rarò nostrâ etiam ætate, descripserunt. Hodie verò ut plurimum cortices, quia lignosi & nullius qualitatibus sunt, abjiciuntur, & sola grana folliculis inclusa, propter saporis & odoris fragrantiam ad usum reponuntur: hinc etiam est quod Græci in compositis medicamentis semper expectant Cardamomum: *ἐπεντερίον* & *καρδαμύμον* Cardamomi, h. e. exenteratum & ex utriculis exempta viscera sive grana, Maius alterum & minus alterum. Arabes utrumque Cardamomum generali nomine, & *Cordumeni* & *Sacolla* appellant. Itaque in *Er. Mi.* vehementer errant ij, qui *Cardumeni* apud Serapionem Carui agreste interpretantur, idem enim est cum Cardamomo: nec aliquam suspensat quod Serapio, eandem rem alibi *Cordumeni*, alibi *Sacolla* nomine describit: in capite enim de *Cardumeni* ea recenset, quæ apud Dioscoridem de *Cardumeni* le-

guntur: in *Sacolla* verò remeo depingit modo, ut Arabes descriperant, & ut ipse viderat, & quemadmodum adhuc affertur *Cardamomum*. Iam cum Dioscoridis & aliorum Græcorum descriptioni, & *Cordumeni* & *Sacolla* apud Serapionem historiae per omnia conveniat, nemo diversum statuat esse *Cardumeni* & *Sacolla*. Arabes pulchrè etiam suis nominibus *Cardamomi* species distinguunt. Siquidem majus appellant *Heil*, minus verò *Helbane*, qui autem contrarium dicunt, errant. *Cardamomum* minus, nomen servat in Pharmacopoliis, Ger. *Cardamomle*, diversù à granis paradisi, quæ aliqui *Cardamomum* minus improprie vocant, minus fortè precio & viribus intelligendum: mole enim majora sunt, & aliqui majori *Cardamomo* substituunt. Haberidem *Cordus* in obs. silv. *Cardamomum* quoddam pinguis, acrius, odoratius, scabiusque veluti incultius quiddam.

Francosurti ad Mænum in nudinis *Cardamomi* tria genera hodie officinæ apud Cornarium agnoscunt [Manardus inter hæc, solam amaritudinem desiderat] maius quod ad fuscum & propemodum nigrum colorem declinat semen, medullam albam habens; minus, cuius color ruber est, tertium quod *Grana paradisi* vocant, fulvi coloris. Sunt autem omnia femina angulosa, & velut compressa. Sed ex his nullum propius ad Dioscoridis *Cardamomum* accedit, quàm quod minus appellant, & est, ut quod sapore acre sit, & leviter amarum. Majus nec acre est admodum, nec amarum. Grana verò *Paradyfi*, quæ vulgo *Paradyfi Förner* vocantur, acrimoniam ad vulgè excellentem habent, ut fervorem linguae inducant, & piperis loco cibaria condiant, in multorum usu. Minore itaque Cornarius utetur, si ita usus ferat.

Monachis in Mef. dist. 7. cens. 265. auctoribus, aliud esse *Cardamomum* Græcorum & aliud *Arabum*. *Cardamomum* Græcorum scilicet Diosc. & cæterorum, apud Arabes vocatur *Cardamenum* vel *Cordumenum*, sive *Cardameni*, vel *Cordumeni*. Arabes, vt Serapio & Avicenna, faciunt plura *Cardamomi* genera. Avicenna confundit species in diversis capitulis vt in capitulo *Cardamomum* & capitulo *Cibzbague*, & capitulo *Elbue*. Interpres etiam Serapionis, Simon Ianuensis in capitulo de *Sacolla*, quod est de *Cardamomo* (vt idem putant) erravit, ac etiam aliqua de suo addidit, videlicet *Cardamomum* maius esse *Heil*, & minus *Helbane* (quod putat minus corruptum) & esse masculinum: vt idem scripsit in sua clavi in litera *Cardamomum*: similiter erravit in capitulo 316. quod incipit *Cardameni*: quia non debuit intitulare ipsum de Carui agresti. Vt omnes communiter tenent, quando absolutè est scriptum *Cardamomum*, semper maius est intelligendum. Bellunenensis in suis interpretationibus ait, *Elbue* est *Cardamomum* minus, & est granum apud Italos appellatum *Melegerte* & dicitur etiam *Heilbue*. Quomodo Mesues ponit *Cordumenum* vt in *Diamoro*, & in *Athanasia magna*, & in *Diasulphure*, & in confectioe alseficere, & aliis pluribus: tunc non petit *Cardamomum* Arabum sed *Cardamomum* Græcorum, quod ipsi Arabes sub nomine *Cordumeni* describunt. Vnde sciendum quòd *Cardamomi* sint quatuor genera, *Cardamomum* maius & minus, & *Heil* & *Cordumenum*: Et omnia quatuor genera tangit Plinius 13. c. lib. 12. Fatentur Monachi se nescire quid sit *Cardamomum* Arabum maius, & *Heil* penitus ignorant; & *Cordumeni* Arabum, scilicet Dioscoridis *Cardamomum*, quid certè sit adhuc non benè percipiunt. Minus *Cardamomum* quod aliter *Helbangu* appellatur autoritate Bellun. tenent pro certo esse *Melegerte* siue *Meleghetam* usuaalem, quam omnes aromatarij agnoscunt, & hæc ponent

da in trochiscis de ligno Aloës Mesues. Loco *Cardamomi* majoris, ac etiam loco *Heil*, licet illis uti *Cardamomo* scilicet *M. eger.*

Legitimum *Cardamomum* hac tempestate non cognosci, ne ab ipsis quidem mercatoribus, qui ex Syria, vel Aegypto aromata ad nos covehant, *Matthiolum* competum habet. Quo fit vt Medici, ac pharmacopœi in componendis medicamentis aquæ errent in *Cardamomo*, atque in aliis compluribus, quòd *Cardamomi* loco variis quibusdam seminibus, odoratis tamen, indifferenter utantur. Quorum primum *Cardamomum* maius: secundum *Nigellam* quod *Melathij* est genus: tertium verò *Meleghetas*, vel grana *Paradyfi* nuncupant, cum tamen eorum nullum nec Græcum, nec Mauritanum sit *Cardamomum*, quandoquidem aliud Græci, aliud verò Afri pro *Cardamomo* intelligunt. Serapio Dioscoridis *Cardamomum* *Cordumenum* appellat, deinde auctore Isaac sui *Cardamomi* peculiare caput instituit, idque *Sacollam* nominat: quin & duum esse generum tradit, alterum maius, alterum minus, quorum nullum non modò Dioscoridis *Cardamomo* respondet, sed nec etiam ulli eorū, quibus officinæ indifferenter utuntur. Probatur itaque primum quòd omne officinarum *Cardamomum* Dioscoridis *Cardamomum* esse non possit, pluribus tum notis, tum etiam qualitatibus. Quippe quòd hæc in uniuersum parum, vel ferè tantillum densa sint, fragrantia non contumacia, & gustui nihil amaroris relinquunt. Quòd præterea ab Arabicis distent, si cum illis comparentur, facilè disparitas deprehenditur. Siquidem Serapioni maius *Cardamomum* semen est plantæ, quod oblongis quibusdam cœcluditur capitibus suis sanè similibus, quæ è rosis prodeunt, granis obnigris rotundis, *Pipere* longè maioribus, in quibus minuta semina concluduntur, angulosa, sarcta, & odorata: minus verò nullo contegitur capitulo maioris modo, quamquam colore convenient. Quod planè indicat, omne officinarum *Cardamomum* nec *Arabum* esse, nec pariter *Græcorum*, sed potius ab utriusque maxime distere. Quare putauerit *Matthiolum*, illud falsò sibi persuasisse Monachos, qui in Mef. scripsere, quòd *Arabum* *Cardamomum* minus illud semen sit, quod *Seplaxia* *Meleghetas* vocant, Andreæ Bellun. qui Avicennam mendis expurgavit, auctoritate freti. Sed cum Bellun. id asserat vulgari tantum opinione ductus, cumque notæ minimè eorum sententiæ adstipulerent, errasse Monachi facillè deprehenduntur. Semina enim quæ *Meleghetas* appellant (vt omnibus planè constat) capitulis excepta suboriuntur, quod minori Serapionis *Cardamomo* non evenit. Crediderunt Ruellius in suis de natura stirpium libris, & Fuchsius in sua methode, id omnino Mauritanorum esse *Cardamomum*, quod nos *Piper Indicum*, alij *Siliquastrum* appellant. Verum et si *Piper Indicum* in corniculis Rosarum ferè modo suum includat semen, quia tamen reliqua Serapionis *Cardamomo* nullis notis correspondent, Mauritanorum *Cardamomum* esse nequit: hoc enim suis in vasculis globulos quosdam concludit, non lenticulis similes, sed rotundos, & pipere crassiores, qui intra se minutum quoddam semen continent. Huc etiam accedit, quòd cum hoc *Piper* corniculatum, tum semine, tum corniculis ipsis tanta sit acrimopia præditum, ut non modò mansum, sed ori tantum admodum statim quasi ignis exurat; ablutum utique fuerit credere Serapionis *Cardamomum* esse, cum dixenti ipse magis adstrictoria facultate pollere, quàm acri. Cæterum scribit Avicenna maius *Cardamomum* grana ciceribus atris, minus verò lentibus minora proferre. Quòd cum fortasse Ruellius haud rectè percipisset, ei errandi anam præbuit. quippe minori *Cardamomo*,

non autem maiori femina, lentium modò nasci ait Avicenna: quàmquam Ruellius, ut suam tueatur sententiam, secus fortè legerit Avicennam. Tria genera Cardamomi ex Alexandria Egypti & India Orientali à Lusitanis adferuntur, inquit Matth. germ. & Italicus. Maius vocatur à quibusdam *Melegeta*, ab aliis Grana Paradisi. Medium & minus nò certò scio an unum horum sit verum Cardamomum veterum. Veteres testantur Cardamomum habere siliquas ut legitur apud Galen. Zenonem in suis remediis adversus venena rejecisse siliquas: præterea id videtur apud Gal. lib. 10. de antid. post Democriti descriptione, in Theriaca carmine descripta: Item l. 7. de comp. med. secund. loc. cap. 3. Facile autem dicerem maius Cardamomum esse veterum verum Cardamomum, si non deesset amaritudo, quam requirit Gal. lib. 7. simpl. si odore caput offenderet, & non facile frangeretur. Neutrum volo asserere. Non valè agunt qui Cardamomo vulgari utuntur loco veri Cardamomi. Cardamomum maius dicitur *Melegeta* propter similitudinem cum *Melega*; & propter gratum odorem quibusdam Grana Paradisi. Clusius in fine Dod. gall. scribit, antiquis Græcis vocari *καρδαμύς* Lat. Cardamomum, Arab. Cardamoni, Cordumeni, aut Cardumini. Ab hoc Cardamomo aliud habere Arabes diversum, cuius maius genus vocetur ab eis *Sacilla* aut *Chachuleminis* autem dicitur *Heil* & *Hilbane*. Officinis utrorumque Græcorum & Arabum Cardamomum esse incognitum: pro ijs alia duo haberi genera, primum & maius Grana esse Paradisi. Idem in exot. auct. quale sit Græcorum aut Latinorum Cardamomum nondum cuiuspiam constare opinatur, certum enim ait esse ab Arabum Cardamomo differre.

Acosta de arom. c. 64. de Cardamomo scripsisse ait Avic. cap. de *Caculaa* & divisisse in majorem & minorem. Magnam esse confusionem nominum huius medicamenti in scriptis Arabum. Et quamvis Serapio unum ex his vocet *Chaculaa*, & alterum *Heilbane*, sciendum textum corruptum & scribendum esse *Caculaa*, *Hilb*. *Caculaa* autem ut vocant omnes Arabes, aut *Caculee* ut dicit Avicenna, vel *Elachi*, significare Cardamomum, si verò non habeat nomen apud Græcos & Latinos, id accidisse quia non cognoverint: & hinc credi Galenum non scripsisse de hoc. Dicere Dioscoridem melius adferri ex Comagene, Armenia & Bosphorò, adferri etiam ex India & Arabia, quod si ibi invenitur illud quod tradit Galenus & Dioscorides non esse Cardamomum quo vulgò utuntur in India, sed duo fore & non unum si dicitur esse Avicenna & Serapionis Cordumeni, non esse quod contradicatur, quia non sit id, quod Avicenna & Serapio vocant *Caculaa* vel *Hilb*: Non competere etiam signa quæ Dioscorides attribuerit Cardamomo, nò enim difficile rumpi. Quod vulgaris vsus (ait idem Acosta) vocetur Cardamomum, quum non sit Græcorum ait in causa Girardus Cremonensis in sua versione, quia non noverat hoc simplex, præstitisset eum reliquisse nomen Arabicum. Non est etiam hoc Plinij Cardamomum quia quatuor tradit genera. Vulgare Cardamomum diversum est admodum ab eo quod Valerius Cordus tradit, cuius vnum genus maius est magnitudinis glandis, & minus magnitudinis Avellanae, quandoquidem Cardamomum maius non excedit magnitudine Pini nucleum. Ruellius dicit fruticem similem Amomo, ac colligi Amomum in Arabia, unde patet quod exhibet non esse Cardamomum, quandoquidem ex India fertur, in Arabiam, nec etiam ibi Amomum provenit. Dicit præterea ex Theophrasto auctoritate esse vicinum Nardo & Costo: verum in eo videtur deceptus, quia Nardus & Costus reperitur in Chitos & Mandou: *Caculaa* autem vel Cardamomum in

Malavar. Dicit præterea femina alba, ita calida ut velicas exsistent in ore quod non convenit Cardamomo vel *Caculaa*: cortex enim albus & semen nigrum. Andreas Lacuna dicit demonstrari tria Cardamomi genera, maius & minus, & alterum quod est Nigella. Maledicunt Arabibus sine occasione quasi confundant omnes species. Erravit Mercator, qui ei dixit ex Armenia vehi Venetias tria genera Cardamomi si saltem verum erat Cardamomum, quia verum ex India venit Alexandriam. Cardamomum igitur Græcorum non est Arabum. Præter rationem Manardus & alij dicunt Cardamomum Arabum medicamentum novum & removebat ab usu, quia Galenus & Diosc. eo non sint usi. Eo usi sunt Avicenna, Abenzoar, Isaach, Rhafis & alij. In formulis medicamentorum Græcorum & Latinorum antiquorum qui non scripserunt post Arabes, accipitur Cardamomum Galeni, nec accusentur qui culpà vacant. In compos. Arabum & Latinorum recentiorum assumatur Cardamomum majus & minus, quæ vulgaris & ejusdem figuræ, quæ quantitate tantum inter se differunt. Avicennam oportebat distinguere Cardamomum in majus & minus, quia diversis in locis proveniunt. Affirmatur reperiri in Zeilan aliam speciem Cardamomi majorem & minus aromaticam vulgari. Garzia ab Orta vult ut utamur vulgari majori & minori: Minus magis aromaticum. Andreas Bellun. dicit *Cacule* esse Cardamomum majus & *Alial*, vel *Hibaleil*, vel *Carbua* & *Hilba*, Cardamomum minus. Verum hæc nomina sunt depravata in libris arabicis, nec mitum si errarit Bellunenſis. Quod ait Matthæus Sylv. Indicos Medicos radice uti ad febrem, res non ita se habet.

Qui tandem novit Amomum Diosc. & Plinij, is teste Lob. adv. illicò noscet eorundem Cardamomum, utpote Amomo simile nomine, frutice, semine oblongo & idem discet nostrum siliquosum, Cardamomum officinarum, aut Græcorum non esse, aut descriptiones prorsum depravatas esse: Nam Galeni locus adductus de exenterato fructu Cardamomi, potest intelligi de glumis mundato: nec ullus locus adversatur ei. Dioscoride. Neutiquam tamen contemnendi usûs hæc siliquas putamus: tum quia tacito consensu & prærogativâ usûs receptæ sunt: & fortè Arabum sunt: Earum quæ maxima, *Melegetta* aut *Millegetta*, nomine Grani Paradisi notissima est. E quatuor aliis siliquis quæ inter se perquam similes sunt, ea quæ officinis majus Cardamomum vocatur oblonga triquetra lapidi dactyli concolor. Triquetra etiam siliqua sed brevior est media vocata, quam verius putant Cardamomum. Minima pariter triquetra, sed vix nucleum Pruni æquat. Alia quedam recens allata ex Indiis occiduis, pusilla *Melegetta* penè par, gustu Gingiber prorsum testante. Istas omnes siliquas Cardamomi esse, aut plantarum consimilium, nec Gingiberi absumi, non abs re quidam peregrinator narrabat. Dum Lob. in adv. notat Anguillaram, licet non nominet, non videtur observare Galenum meminisse *λεβών* sive siliquarum quod competit nostro Cardamomo. Item Diosc. dixit *αχί*, & *αμμόν*, plenum & oclusum quæ siliquæ optimè conveniunt. Anguilli. sententiam videant lectores post sub titulo Cardamomi cum siliquis triangularibus. Minus distinctè scribit Lonicerus de Cardamomo & ejus viribus. Hic ponimus totâ ejus historiam ne quid desit lectoribus, Ille igitur inquit. Cardamomum est fructus arboris: grana similia Rutæ feminibus continentur in parvis tenuibus lobis inclusa. Est autem Cardamomum duplex, hortense & sylvestre, sive majus & minus. Ex his domestica, sive majora prevalent, magisque odorata sunt, subrustica, acris, cum quadam dulcedine. Sylvestria & minora non adeo bona,

Lacuna
demonstrat
tria genera

Manard
reprehendit

Garzia
ab Orta
vult ut utamur

Cardamomum
siliquosum
notum
quodammodo
receptum

Gingiberi
absumi
non abs re

bonaminus odora, nec tantis viribus prædita, quam culta, quibus in Medicina utimur, separatis tamen officulis, pulveribûsque prius excussis.

CARDAMOMI ÆQUIVOCA- tiones.

Cardamomum genus maximum. Ceterum Melegetha, five Grana Paradysi, multis Cardamomum, quibusdam majus, aliis minus habetur. Cordo quidem, Cardamomum majus Melligetæ simile creditur.

Gingiberis filiqua. Siliqua Gingiberis pusilla Melegetæ penè par Lobelij cui consimiles plantæ apud Lobelium in Advers. dicuntur Cardamomi filiquæ, quamquam aliter sentiat Garcias, de hac autem filiqua scribimus lib. 18.

Cardamomum filiquatum quadruplex. Cardamomum cum filiquis quadruplex majus, & minus vulgare, medium & minimum. Hoc Cardamomum aliqui pro vero recipiunt, alij non ut Clusius.

Amomum novum Cardamomum facie. Cardamomi facie Amomum novum quibusdam Cardamomi species, negante Cerchino Marinella. Vide ante.

Substitutum. Cardamomo substituit Colleg. Flor. in antib. nunc Cardamomum officinarum, nunc etiam Nasturtium. Idem facit & Borgarucus: Sylvius pro Cardamomo majore minus, & contra. Idem & Placotomus.

Cordo in atom. ros. teste, cum simpliciter Cardamomum scribunt autores, minus Cardamomum [vulgate] intelligunt.

Piper Cardamomum. Cardamomum Arabicum interpretantur aliqui Piper Indicum siue Calcatitum filiquosum quæ opinio à plantisque rejicitur.

Quam potè Ruellij opinio sit erronea qui Capsicum aut Siliquastrum pro Cardamomo Mauritiorum proponit, omnibus notissimum est, inquit Garcias lib. 1. c. 24. De hoc Cardamomo scripsimus hist. n. g. 121.

Galenus nigrum Cardamomum habet l. 9. c. 2. x^o p^o m^o. Sed falsò isthic, sicut etiam in multis aliis apud Græcos Medicos locis, *vaporis dicitur* pro *vaporis* ubi *as* legi, in Comment. medicis in id opus à me scriptis (inquit Cornar.) ostendi: velut etiam vicissim Cardamum, i.e. Nasturtium pro Cardamomo apud eisdem suppositum habetur, tum ob scriptio- nis, tum ob virium aliquam similitudinem, altero pro altero agnito & recepto.

Tract. qui pro quo, nonnunquam Piper longum, quandoque Cinnamomum, interdum etiam Carui ut Agricola ex Manardo, pro Cardamomo substituit, quamvis Cordus eos vehementer errare dicat, qui Cardumeni apud Serapionem Carui agreste interpretantur. Quod idem asserunt Monachi, qui Simonem Ianuensem in cap. 316. errasse dicunt, quod incipit Cardumeni, quia non debuisse intitulare de Carui Agrestis: quoniam non sit de Carui agrestis, sed de Cardumeni. Nonnulli dicunt ipsi juniorum, ut Simon Ianuensis, Pandectaris, Luminare maius, & ceteri ita confundunt Cardumeni Arabum (quod quidem Carui agreste falsò interpretatum legimus) quod vix sit, qui sciat ab ipsorum laqueis abire.

Addunt Monachi, Cardamomum dumignorum, auctoritate Auicennæ possumus vti Hæmel *Summa Agrestis* aut Squinantho.

Rosa sylvestris. Maxime tandem errant, ut nobiscum equidem doctè sentiunt Monachi in Mel. dist. 8. cens. 766. Iuniores qui asserunt Cardumeni esse Peucedanum, Selsi, & Keisim. Lege in Oxymentelle, inquirunt, squillitico descriptione Democriti, ubi utrumque recipitur. Vbi & Luminare maius, etiam plura confardit.

Nigella tertium id genus quod Lacuna in officinis haberi asserit non est Cardamomum quandoquidem Nigella totis his regionibus non nascitur Garr. Alij etiam Nigellam citrinam perperam Cardamomum crediderunt. Cam. scribit in hort. Bononienses eam in suo antidotario substituere pro Cardamomo.

Cardamomi loco supponit Galen. aut Myrtum, Myrtus, aut Cyperum quem sequuti sunt Matthiolus in Diosc. lib. 1. cap. 5. Clusius in sine hist. gall. Dod. c. 20. Monachi in Mel. dist. 8. cens. 265.

Tragus tandem lib. 1. c. 114. inter nomina Geranii habet vocabulum Caradomomes, quod ait alio pertinere. Est ultimò & Cardomomum, Gesnero in a. script. Diosc. Geranium alterum.

CARDAMOMI GENVS MAXI- mum, Grana Paradysi, five Melegeta.

Melegetæ filiqua oblonga est striata, Ficus non- dum passæ ferè magnitudine, tenuis quidem illa, sed validiuscula, pediculo satis crasso hærens. Semen copiosum, membranis disclusum continetur, angulosum, spadiceum, penè splendens, sub- stantia siue medullâ albâ, sapore fervido Piperis,



sed qui non tam citò se exlerat. Cum jam parata esset figura ex Camer. hist. dono accipi à Cl. Paludano aliquot elegantes filiquas Melegetæ, quæ Cardamomum majus vocatur, ex quib⁹ statim animadver- ti iconem minus Ficum representare, nisi alium intellexerit fructum. Hæ in summitate lato & circulari sunt umbilico, in medio tripartito, quæ adpingi conveniebat: Præfens tabella proponit inspiciendum hoc Cardamomi genus maximum, & præterea tertium minimum sub sequenti titulo commemoratum. Melligeta, i.e. Grana paradysi seu Cardamomum piperatum Cordi hist. l. 1. c. 27. [Cardamomum officinarum tertium, Cornar.] oblongus est fructus, & magnitudine figura propemodum ovo æqualis, folliculo similis, cortice constans venoso, fractu contumaci, subrusto, aut in pallido fusco, supernum pythmenia, inferius pediculi vestigium habens, intra senitidis, angulosi, pipere minoribus, superficie rufis, intusque candidis seminibus, crebris, fungosisque membranis distinctis & interceptis plenus, gustu servidis ut piper & zingiber, quibus odore etiam non dissimilia sunt. Cortici nulla ferè in gustu qualitas. Afferuntur ex India, & regno Mellicortice exempta ejus grana raròque folliculo inclusa: eligenda sunt nitida, ruffa, sup⁹ effice extenta, minimèque rugosa, solida atque ponderosissima. Errant potè (ut idem adstruit c. 28.) quæ quot dicunt Melligeta majus Cardamomum esse. Cardamomis enim tenuis minimèque fervens, sed gratus ac jucundus est sapor: Melligeta verò piperis instar acerrimus. Idem in Diosc. ait Cardamomum majus quia parcius affertur, propterea quidam ejus locum Grana Paradysi aliis Melligeta nominata

nominata substituerunt, eaque Cardamomum majus vocarunt: improprie tamen & male. Nam sapore quo piperi similia sunt & odore, plurimum à Cardamomo differunt: fructus tamen live utriculi figura magnam habet cum majore Cardamomo similitudinem qui ovi plerumque magnitudine conspiciuntur, & gravis (quæ novimus) onusta sunt Cardamomi insar.

Matthioli sententiam de Cardamomo & Meleggeta ante posuimus. Ejus fasit tria genera in sua epitome: Majusita describit, Majoris capitulum fici fei pyri faciem refert, semine intus subrufescente, angulosoque.

Ruellij temporibus tota Seplasiarum caterva ad Mauritianos planè deficiens, hoc duplicis fastigij Amomum abutebatur, pro eo quod à Diosc. & veteribus Græcis perscribatur. Vnum ostendebant, Amomum appellantes, alterum viribus prælatum, vulgò Malagreta Hispanis; nostris officinis Grana Paradisi non minatur. Cardamomum minus hoc intelligunt quod vulgò Italis Melligreta.

Ostendimus autè ex Monachis, Cardamomum minus Heilbaugue Bellunenfi dictum esse Meleggetam & usurpandum in troch. de aloë. Mesues & pro Cardamomo majori ac etiam loco Heil. Sylvius contendit Cardamomum Serapiionis utrumque, tam majus, quod Granum Paradisi & Meleggetam vocatum putant plerique, quam minus nihil habere commune cum vero Diosc. & Galeni Cardamomo: sed Valerius Cordus contrarium asserit, nos sc. verum Cardamomum hodie non desiderare. Icon à Riffio exhibitæ videtur repræsentare Cardamomi maximum genus, de quo hoc capite agimus. An verò Riffius intellexerit quæ scripsit considerandum? Apud Lonicerum icon ferè similis iconi Matthioli, pro Granis Paradisi vulgò & Cardamomo majore.

Tab. Cardamomum majus Arabum. Lac, Cardamomum majus, vulgò Meleggeta, & Grana Paradisi, Cardamomum Dioscoridis: Cardamomum hortense ex Ragusei opinione. Lacunam taxat Garcias, dicens, cum satis protervè in Arabibus invecum esse: ejus Meleggeta nō esse Cardamomum Diosc. siquidem ignota fuerit Dioscoridis, neque Cardamomum majus coloris sit cinerei: Malageta five Meleggeta nonnullis Paradisi grana, cujus in Europa utus Cardamomi minoris loco, non esse Cardamomum, Avicennæ Combazgue dictum: cetera vide paulò post sub Cardamomo siliquofo.

Clus. apud Garciam scribit Matthiolum Cardamomi iconem Ficis formâ exhibere: cum tamen nihil aliud sit quam Meleggeta suo involucrio teçta, quæ sanè inter Cardamomi vulgaris five Saccolae Arabum genera ex Garcie sententia recipienda non sit: Adhortamur nos ut videant lectores quæ antè annotavimus capite de Cardamomis cum siliquis: olim enim Clusius videbatur confundere Grana Paradisi cum Cardamomo siliqua five thecâ longiore.

Lob. adv. Cardamomi siliquarum maxima Meleggeta aut Millegetta dicta à semine crebro, farcto, oculo & folliculo membranæo, Ficis foliis effigians nomine Grani Paradisi notissima est, & ex Occidia Aphrica frequens allata.

Lacuna (inquit Acoſta) concludit primam speciem Cardamomi esse Meleggetam vel Granum paradisi, & esse Cardamomum de quo scripsit Dioscorides. Sed Diosc. non vidit Cardamomum cum corce, quandoquidem Lacuna dicit esse Meleggeta: neque hanc cognovit Diosc. nec scivit ubi nasceretur. Majus dicit habere colorem rubrum: sed est clarum non ita esse. Cardamomum minus non esse illud semen quo utuntur in Hispania pro Meleggeta, vel Granum Paradisi, constat per mul-

tos qui fuerunt in Meleggeta, qui affirmant se nunquam in Meleggeta vidisse *Cacolaam*, vel Cardamomum. Si quis benè consideret, Avicenna vocat Meleggetam Cobenbague.

Platearius Cardamomum duplex assignat: majus quod dicitur domesticum, minus quod dicitur sylvaticum & illud esse pilosum & subalbidum. Ait Castor facit triplex, majus simile Ficui; medium longum; minus capitellum triangulare.

Cam. hist. ait Avicennam Cardamomum majus vocare *Saccolaa quebir*; minus *Saicslan ceguer*; quo nomine etiam hodie, teste Garcîa, cognita sint mercatoribus & Medicis; item *Sacculæ* & *Elactæ*; putatq; Cardamomum nostrum antiquis, tam Græcis quam Latinis in cognitum fuisse: Cordumeni autem Arabum fortassis esse Cardamomum Græcorum. Et maximum quidem, cujus iconem damus, continere in se Meleggetam, quæ à Cardamomis distinguenda veniat.


B. pin. Grana paradisi & Cardamomum sive officinarum, Matth. Lon. Lac. (cui etiam Cardamomum hortense) Cast. Lugdun. Grana paradisi, Cord. in Diosc. Meleggeta seu Cardamomum piperatum, Eid. hist. Millegetta, Lob. Malagetta, Garz. (cui & Combazbange Avic.) & ad Clus. cur. post. Cardamomum primum, Cam. epit. alterum, Casl. Cardamomum Arabum majus, Tab. Grana paradisi seu Meleggetas, Linscott. part. 3. c. 14. Hoc Cardamomi minoris loco aliqui utuntur, & Meleggeta dicitur, propter similitudinem, quam cum Melicæ semine habet.

Hujus folia sub Meleggeta in prodromo sic de *Foliorum* scribit: crassa sunt, uncias quatuor longa, tres lata, per quorum longitudinem costa elata fertur, à qua fibræ plurimæ per transversum abeunt, ut in Caryophyllorum foliis cum quibus maximam similitudinem habent: fructus satis cognitus habetur in officinis, ut & grana exempta: hujus folij pediculus sapore est aromatico, ipsis granis correspondente, non tamen ita acuto & aromatico, ut in foliis Caryophyllorum animadvertitur, quo signo potissimum à se invicem distingui possunt.

Cardamomum in India provenit, potissimum à Calcutio usq; ad Cananor. Itè in Malavar & Iajo, Cam.

CARDAMOMI CVM SILIQVIS sive thecis longis & brevibus.

PRÆTER Cardamomum, quod Meleggeta & Granorum paradisi nomine innouit, sunt & alia



tria, nisi duo malis, siliquati Cardamomi genera. Ex his maximum, unciam 1, aut seunciam longam, gracilem, triquetram, striatam, coloris cinerei fractu contumacem si-
Siliquati Cardamomi genera.
liquam habet, modicè turbinatam, feminibus numerosis, triplici versu, membranibus intercedentibus tenuissimis candidis, farctam; color granis spadiceus & cinereus ferè, figura ut Meleggeta angulosa, rugosa; substantia alba; sapor fervidus

usus

duo confimilis. Alterum genus semuncialis longitudinis habet filiquam, striatam, cineream, sed evidentius triquetram, ad tergemina Lathyridis semina accedentem, semine factam membranulis distincto, cinereo, (in meis filiquis etiam rubente) anguloso, sapore & substantia prioris. Tertium affigunt, quod sola magnitudine videtur à jam dicto differre, est enim filiqua omnium minima, ceterum quid differat præterea non video.

Icon.

In præfenti tabella Cardamomi filiquati duo priora depingimus; tertium verò omnium minimum, in iconè Cardamomi maximi effigiamus.

De Card. filiquatis Cardom.

Cord. in Diosc. Cardamomi genus alterum minus dicitur, quod fructum fert Avellanà ut plurimum minorem, triquetrum & minoribus granis, eisdem cum majore saporis & odoris, sed vehementius palatū & linguam penetrantibus, hoc frequentius est in usu & licet simpliciter hodie Cardamomum vocetur, in pharmacopoliis tamen Cardamomi minoris nomen servat & à Germ. Cardamomle dicitur & ab Arab. *Helbane*. Idem describit hist. l. 4. c. 29. Cardamomum mediocre, figurà oblongum, triquetrum, utrinque acuminatum, colore in candido fuscum, quantitate grandis avellanæ nuci æquale, majore Cardamomo minus, minore verò majus, idèoque mediocre nominatum, intus densè in se factis, majorique Cardamomo similibus granis plenum: cortice confas prædicti instat, venoso, sed multò tenuiore, in tribus suis angulis, quibus maturum dehiscit, singulas commissuras habens. Gustu Cardamomo majori grana ejus respondent. Afferitur & hoc ex Ægypto & India, sed paucissimum, idèque perquam rarò, cum utroque Cardamomo. Et

Card. minus, mediocre.

c. 30. Cardamomum minus mediocri per omnia simile est, paulò tamen minus, candidiori, paulò tenuiori cortice, & trium angulorum commissuris dehiscentem vestitum, quo detractò semina apparent densè in se facta, nullis membranulis distincta, majori Cardamomo similia, paulò minora, magisque angulosa, in ruffo cineracea, atque tam arctè sibi ipsis conjuncta, ut unum semen figurà bubulos renes æmulans, appareant esse. Saporem grana habent valdè aromaticum, tuncem, majoriq; Cardamomo similem, sed paulò tenuiorem. Afferitur & hoc ex Ægypto & India, folliculis suis exemptum, nonnunquam etiam unà cum folliculis, idèque copiosius, quam majus, solùmque vulgò hodie cægrificatur: majus enim cum parcius advehatur, paucissimis notum est: probatur quod majoris rotas habuerit. Ceterum cum autores simpliciter scribunt Cardamomum ut ait in dispens. arom. rosat. minus Cardamomum [usuale] intelligunt.

Matth. de Cardom.

Matthiæ depingit & describit vocans unū Cardamomum medium, alterum minus, quamvis nec pro Cardamomo Græcorum, nec Arabum recipiat. In prior. comm. negat etiam cognosci Cardamomum, medicos & pharmacopæos reprehendens, quòd semen quoddam pro Cardamomo majore exhiberent. Idem hist. germ. sit ne Cardamomum Græcorum dubitat: non tamen eos peccare dicit, qui loco veri ponant. In epit. sic describit: Cardamomum medium folliculo contegitur oblongo, colore minus rufescente. Minus minore còstat capitulo, ipsòque triangulari, semine subrotundo, asperiusculoq; semine omnibus acre & odoratum, majoris tamen acrius & odoratius [de quo sub Melegera] minus ut medium acridinis vehementia superat, ita & odoris fragrantia. Nos quæ sit sententia Matthioli de his Cardamomis & ubi proveniant antè annotavimus. Cam. apud Matth. distinguit in medium, minus & minimum, tres ponens icones.

Cardam. Guigari. 2/3m.

Anguill. in genere loquens de Cardamomo, dicit & ceteros rufos Cardamomum esse ve-

rum & legitimum, idque argumentis conatur probare: sed frustra, non enim distinguit Anguillaram minus à majore, forè quòd similia semina, & filiquæ non multum differentes, nisi magnitudine.

Lon. meminit Cardamomi majoris & minoris, si-
ve sativi & sylvestris, ubi non dubitarem eum loqui de aliquà specie hinc tradita: nos tamen cum obscurè tractet, ea in genere proponimus, lectoribusque ea discernenda relinquimus.

Garciam de hoc Cardamomo crediderim locutum cum ait: Cardamomum quod vocant aroma est illis in regionibus probè cognitum in quibus magnus ejus usus est. Hujus etiam magna pars in Europam, Africam & Asiam evehitur. Quam verò rectè sit illi inditum Cardamomi nomen, aliis disceptandum relinquo. Avicenna l. 2. c. 159. sanè peculiare caput insinuat de *Saccolaa* quod dūm esse generum tradit, Alterum *Saccolaa* quebir, i.e. magnum, alterum verò *Saccolaa*, *Saccolaa* cægru, i.e. minus. His nominibus cognitum est utrumq; Cardamomum cum Medicis Arabibus, tum mercatoribus. In Malavar vocatur *Eremelli*; In Zeilan *Encal*; in Bengala verò Guzarate & Decan, interdum *Hil*, interdum *Elachi*, idque inter Mauritianos: nam à gentilibus indigenis omnium provinciarum enarratarum *Dure* nuncupatur. Quod alterum Serapio *Saccolaa*, alterum *Hilbane* vocat, mendosum est exemplar, & *Hil* duntaxat scribendum erat. Etenim si *Bane* omnind adiciendum volumus, potius *Bara* dicendum erat, quod lingua Canarina magnum significat. Nihil igitur aliud *Saccolaa* est omnibus Arabibus nuncupatum, aut *Sacule* Avicennæ, aut *Elachi*, quam quod Cardamomum vulgò appellant, veteribus cum Græcis, tum Latinis planè ignotum, ut ex eorum monumentis colligere licet.

Siquidem Galeni notæ nostro Cardamomo non conveniunt. Nostrium Cardamomum in illas regiones deferretur è quibus Dioscor. suum de vehi scribit. Sed neque id frangenti contumax est, neque caput tentat, neque amarum, neque gustu adeò acri, ut Caryophylla. Plinius l. 12. c. 13. etiam quadruplex esse Cardamomi genus scribit, tamen Dioscoridi & Græcis unicum tantum extat Cardamomi genus. Sed nullum ex prædictis cum nostro quicquam commune habet, quod fragile esse debet, filiqua candicante, granis intus nigris. Sericur verò id leguminum modo, altitudine, quando summa, cubiti in quo dependit filiquula granule interdum usque ad viginti continentes, non ut Cordus lib. 1. in Dioscor. scripsit, glandis avellanæ magnitudine. Gerard. Cremon. *Saccolaa* ignorans, nomen illi ex Græcis pro arbitrio indidit, tamen legitimum Arabicum nomen integrum & non mutatum reliquisse præstitisset. Non multum fortè refragabor iis qui Cordumeni Arabum, Cardamomum Græcorum esse putant: quandoquidem Serapionis & Avicennæ *Saccolaa* Græcis est ignota. Quòd verò *Saccolaa* interdum negent non concedo, multis enim experimentis im probatum est, plerisque morbis perutile: eòque utrum dum censeo in omnibus compositionibus Arabum & recentiorum qui Arabes sequuti sunt. Mala-

guetam porò, sive *Meleguetam* à nonnullis *Paradisi* Cardamomum nuncupatam, cuius in Europa usus Cardamomum non est.

Malaguetam à nonnullis *Paradisi* Cardamomum nuncupatam, cuius in Europa usus Cardamomum non est.

Malaguetam à nonnullis *Paradisi* Cardamomum nuncupatam, cuius in Europa usus Cardamomum non est.

Malaguetam à nonnullis *Paradisi* Cardamomum nuncupatam, cuius in Europa usus Cardamomum non est.

Malaguetam à nonnullis *Paradisi* Cardamomum nuncupatam, cuius in Europa usus Cardamomum non est.

Malaguetam à nonnullis *Paradisi* Cardamomum nuncupatam, cuius in Europa usus Cardamomum non est.

Malaguetam à nonnullis *Paradisi* Cardamomum nuncupatam, cuius in Europa usus Cardamomum non est.

Malaguetam à nonnullis *Paradisi* Cardamomum nuncupatam, cuius in Europa usus Cardamomum non est.

Malaguetam à nonnullis *Paradisi* Cardamomum nuncupatam, cuius in Europa usus Cardamomum non est.

Malaguetam à nonnullis *Paradisi* Cardamomum nuncupatam, cuius in Europa usus Cardamomum non est.

Malaguetam à nonnullis *Paradisi* Cardamomum nuncupatam, cuius in Europa usus Cardamomum non est.

Malaguetam à nonnullis *Paradisi* Cardamomum nuncupatam, cuius in Europa usus Cardamomum non est.

peri-

peritum, bina capita de eadem re scripsisse. His cogitationibus occupato animo, Turcam mercatorem professione ludrum, in Cochim commodum tepino, qui diceret sibi mandatum, ut præter cetera aromata *gacollaa quibir*, h.e. Cardamomum majus, emeret: quod me movit, ut sciscitarem an in aliis etiam regionibus nasceretur. Tandem regiarum mercium in Ceilan curator (Factorum vocant) mihi retulit, istic quidem inveniri, nostro quidem multò majus, sed minus odoratum: remque ita se habere comperi, illius specimine (me curante) ex Ceilan delatos Accersitus præterea in Balagate ad curandum Illustrem Hamjan, cujusdam Regis in Balagate, nomine Verido, statrem, de industria medicamentum, in quo Cardamomum majus & minus arabica lingua præscripti, ut conspiciere possem, utrumque mihi exhibitum ad medicamenti compositione, eadem quidem utriusque forma, sed magnitudo diversa, nulla tamen cum Malaguetta similitudo. Optimum autem censetur minus, quod odoratus est altero, & facultate majus dici potest, meo judicio. Provenit utraq; in India, præsertim verò ab emporio Calcut usque ad Cananor, tamen aliis etiam locis Malavar, & in Ioa nascatur, non tamen adeò copiosum, neque cortice adeò candido. Multus ejus usus est in his provinciis, siquidem una cum Betre (veluti supra diximus) manditur pituitaque caput & stomachum expurgat, & serapiis admiscetur. Falsum autem est quod Sylvaticus c. 17. scripsit. Indos ejus radice adversus febres circuitus uti, nascitur in tuberibus quarundam arborum. Nam exili est admodum radice, nec nisi siccam provenit, solo autem ignibus perusto, ut facilius enascatur. Pandetarium Cardamomum in his invenitur alibi: in nostris autem exemplaribus apud Rhafim haud facile invenies. Nullam autem facultatem similem *qualem improprie Garzia* nostra Pandetarij, qui Matthæus Sylv. est, exemplaria tribuant. Ceterum, quicquid sit Garzia mihi videtur immerito Cordum, redarguere. vidimus enim hos fructus, eo modo, quo describitur, in quibus femina illa, que passim in Officinis dicebantur Cardamomum, non enim loquitur de feminibus, in theca contentis: sed de toto fructu.

Clusius in hist. gall. Dod. cap. 20. tradit Cardamomum Officinatum majus, diversum à Græcorum & Arabum Cardamomo, quod vocat grana Paradisi, siliqua longâ, durâ, lignosâ, ut nux *[nux Gaugæ]* longius & angustius in quo multa grana, angulosa, dura, firma, & boni odoris: Cardamomum autem minus Officinatum fructu duro, rotundo, instar Avellanæ, aut minore, in quo etiam grana parva, angulosa, minorâ multò quàm majoris: Idem ait Cardamomum antiquorum & Arabum utrumque nostrum Cardamomum majus, siliqua longiore: in ea Icone multæ sunt siliquæ simul hærentes, cum foliis Lupuli aut Vitis adpictis: habet etiam aliam Cardamomi minoris Officinatum cum ramis sine foliis: si ejusmodi plantas videri, oportebatur plenius describere. Suspiciamur etiam eum confundere Cardamomum majus siliqua longiore cum Melegueta. Pergit idem in exot. Amomum spurium, cujus singuli utrumque fructus aliquam cum minore Cardamomo in Officinis vulgo recepto, similitudinem habent (quale autem sit Græcorum & Latinorum Cardamomum, nondum cuiquam constare opinor, certum est ab Arabum Cardamomo differre) certè uterque fructus triangularis est formæ. At Cardamomi vulgò recepti theca, oblongiore est, minus crassa, multis striis distincta femina continetur.

Tom. II.

nens, crassiuscula, Melegueta feminibus non valde abimilia.

Lob. adv. officinis Cardamomum majus vocatum, oblongi siliquæ, triquetra, lapidi dactyli concolor est & par, semen cõdit angulosum Melegueta minus. Triquetra item siliqua sed brevior est media vocata, nec dispari semine, quàm verius putant Cardamomum propter amarorem & actimoniam non exiguam. Minima pariter triquetra, sed vix Pruni nucleum æquat. Ast plura dignetur lector videre antè ex Adversariis tradita, quæ non recipiunt pro veterum Cardamomo, ubi notatur Anguillara, quamvis non nominetur. In obs. quatuor Cardamomi agnoscit genera, majus, minus, minimum, & medium. Hunc sequitur Plantinus & Tab. Lobelius ergo & ex eo Plantinus addunt speciem non enumeratam in adv. quia hæc non comprehendunt siliquæ Gtingiberis, ut factum fuerat in Adversariis.

Cardamomum Græcorum, ut vult Oeco in el. Indo majore, aut illud ipsum est quod nostri simpliciter ita vocat, aut certè pro eo usurpari potest. Veronè in multo Io. ponæ reperit Maronea Cardamomum racemos esse raros & sparsos; Indici verò Amomi, densos, & in seipfos convolutos; veteres Amomum dixisse racemosum, minimè verò Cardamomum: idem observavit Amomi fructum ut imaginem referre, suamque elegantem figuram distinctissime servare, quia arctè suo ramulo adhæreat: at Cardamomi fructum etiam si suâ naturâ racemosum fortè, nihilominus tamen longè distare ab uvæ racemis: præterea quoniam tenuibus hæreat pediculis, suos racemos non diu servare integros: schinc videntur Cardamomi fructus qui ad nos efferuntur, ferè semper avulsi à suis ramulis. Sed de Cardamomo siliquo de quo hic agimus legant letores ex Maronea præcedenti capite de Amomo novo Cardamomi facie, multa notatù digna. Notandum tamen Maroneam suâ iconè, cui titulus *Cardamomi tres species*, videri duas ejus species in uno & eodem ramo pingere, quasi ejusdem plantæ; nos verò ante etiam meminisse duarum Iconum à Clusio olim exhibitarum.

B. pin. Cardamomum 3. majus officinarum: Sacco-
laa Arabum, aut Sacoule Avienæ, Elachi Mauritanis: Cardamomum medium, Matth. Lon. Cast. Lug. Cardamomum majus, Cord. in Diosc. (cui Heyl Arabum) & hist. Clus. ad Dod. Lin. cot. 4. part. Ind. or. c. 23. Cardamomum majus vulgare, Lob. Clus. in Garz. Cardamomum, Garz. Frag. secundum, Cam. ep. Eid. B. Cardamomum 4. medium, ut & Lob. & Tab. Cardamomum mediocriter, Cord. hist. Item, Cardamomum 5. simpliciter in officinis dictum: Cardamomum minus, Matt. Lac. Lon. Lob. adv. Lug. Tab. Lin. & Cord. in Diosc. & hist. cui & Helbane Arabum. Cardamomum verum, Ang. Cardamomum minus vulgare, Lob. Clus. in Garz. Cardamomum 1. Cels. 3. Cam. ep. Eid. B. Cardamomum 6. h. v. minimum, ut & Lob. & Tab. Cardamomum 4. Cam. ep. Nos Cordi Cardamomum majus seorsim describendum ducimus, nec ad hæc dicta referimus.

CARDAMOMVM MAIVS MEL-
ligethæ simile, sicut modo turbinatum, Cordo.

Cardamomum majus Cordo hist. c. 28. l. 4. Melligetæ similis fructus est, minor tamen, longitudine rarò sextatè superas, superius juxta pythimena latior, inferius propè pediculum angustior, & sicut aut pyri modo turbinatus, nullam commissuram

habens quā aperiri queat, colore foris in tinereo
lubrius, veposo & distractu difficili cortice cōstās;
intus seminib' crebro membranulis interseptis ac di-
stinctis. Colore, figurā ac magnitudine Melligetta
granis similibus, obtusioribus tamē angulis, plenus.
Sapor. Saporem grana habent quemadmodum & odorem
valde jucundum, aromaticum, tenuem, subacrem, ac
modicē amarescentē. Cortici nulla est in gustu gra-
tia, ideōq; eo exempta semina ad nos ex Syria & A-
gypto afferuntur, quamvis interdum etiā integri
fructus, quales jam descripsimus, advehitur. Eligito
Delectum. grana ejus nitidiora, ponderosiora ac odoratissima.
Fructus autem integri probantur maturi, h.e. super-
ficiem extentam habentes, undiq; praelusi, neq; ex
industria aperti, neq; teredinibus corrosi, pōderosi,
& consummatis denseq; in se farētis seminibus ple-
ni. Idem in Diosc. l. i. c. 5. Cardamomū majus hodie
quod affertur fructū habet lignosum, fractu contu-
macē, siccis propemodum magnitudine & figurā in-
tus angulosus & aromaticis granis Mali punici mo-
do plenum: hoc parvū affertur, propterea quidam
in ejus locū Grana Paradisi substituerunt. Scriptum
in annot. apud Cordum, Cardamomū majus dici
Heil. arabicē Heil diversum à Granis Paradisi, quod cum
parvū advehatur paucissimis notum esse.
Cardam. Meminit Corn. Cardamomi officinarū, cujus ad
maim offi-
cinarum
Cornario.
fusculū & propemodū nigrū colorē delinet semen &c.
Ejus verba vide ante sub Cardamomo maximo, Cō-
siderādum an intelligat Cardamomū majus, de quo
hic agimus: Meminit etiā Cardamomi minoris quo
Clus. nos. utendum censet, de quo mox. Memor est etiā Clus.
apud Garz. Cardamomi majoris propemodum ma-
gnitudine Cordi, verūm non demonstrat, quam
plantam intelligat. Exhibet Matthiolus pro Carda-
momo majore ficus similem iconem, quā ante
cap. de Melegbeta posuimus, quam Clusius, ut ante
dictum, dicit esse Meleguetā.

VIRES ET USUS.

Vires ex veteribus jam antē à nobis traditæ sunt.
Restat igitur hoc in loco, ut eas quas apud recentio-
Tempera- res annotatas invenimus, adscribamus. Cardamo-
mū & Grana Paradisi calida sunt & sicca ordine se-
cundo, inquit Lōn. Incorrupta decem asseruatū an-
nis. Vfus eorū salutaris, lipotimiā laborantibus. Verti-
Vertigo. gigni medentur in potu macerata, sicut & pulveri-
Yentricu- fata, in juscūlo exhausta. Quin & ita usurpata vētri-
culum roborat, concoctionemq; juvant, Cardamo-
mū cum tantundē ligni Paradyli pulverisatum cibi-
tumque ex vino generoso, rusticis auxiliatur, &
Cordi tre- vomitibus. Cordis tremorē pulveris hujus drachma
mor. ex vino sumpta, dubio procul emendat. Aniso mi-
xtum, cum vino propinatū appetentiam excitat.
In omnibus affectibus internis à frigore obortis uti
possumus Cardamomo, quod his magnoperē con-
ducit, præsertim muliebri sexui.

MELEGVETA SIVE CARDAMOMVM
malē quibuscūq; existimatum Clusio.

Elegantis alicujus plantæ fructum, reor (inquit
Clusius ex l. 2. c. 15.) decimum quartum, quæ for-
tassis crescit Cannæ Indicæ vulgō vocatæ modo: nā
caulis suprema pars, capita sive siliquis sustinens,
prioris similis mihi videbatur, lenta ut illius & fi-
brofa, multisq; foliolis seu appendicibus cepta: quæ
foliola, quem florē proferat, nemo indicare poterat,
nam Pharmacopœus qui hæc collegerat, in reditu
extinctus nullum nomen adscriptum reliquerat.

Defer. Erant hæc porro capita binas uncias longa, infer-
nā parte crassa, deinde paulatim ad supremam usq;
partē gracilescētia, quasi triangulari formā prædita,
obtusis tamen angulis cartilaginosa, externē fusi
ex rufō coloris, internē veluti in ternas cameras fe-

ciendū longitudinem membranacēā quadam car-
tilagine divisa, atque plena nigris, splendentibusq;
seminibus, milio majoribus, densē simul congestis,
& tenui membranulā involutis, intus albis & qua-
dam acrimoniā præditis. Nascuntur autem ea capi-
ta in summo caule, quaterina aut quina, atque velu-
ti ex eodem ortu prodeunt.

Cæterū qui anno à Christi nativitate 1601. ex
Java & Sumatra redibant, similes fructus, etiā in
Madagascari insula lectos adferebant, quos mihi ob-
trudere volebant pro Meleguetta sive Cardamomo
majore vulgō credito. Verūm quidem est, similitu-
dinē quandam esse in externā facie: sed qui vel me-
diocri diligentia utrumq; fructū cōfereat, discrim-
en observabit: nam Meleguetæ fructus, magnā ex
parte brevior & crassior est, hic verō gracilior & ob-
longior; Meleguetæ cortex etiā minis istius cor-
tice durus, imō satis fragilis: hujus præterea grana
nō tā numerosa quā in Meleguetā, majora tamen,
fusca & splendentia, singulāque peculiari candican-
te membranā involuta. Meleguetæ verō grana, li-
cēt trifariā quadā cartilagine distincta sint & singu-
la suā peculiari membranā involuta videantur, mi-
nora tamē sūt, magis rugosa & duriora istius fructus
granis: præterea nō ita splendent; & subrusti sunt co-
loris, acerrimiq; saporis. Si quis tamen Meleguetam
esse cerebrosius cōtendere velit, mihi cum illo litem
esse non cupio, modō non legitimus, sed ejus spu-
rium aliquod genus esse non diffiteatur.

B. pin. Granis paradisi sive Meleguetæ affinis fru-
ctus: Fructus 14. sive Meleguetæ spuria, Clus. ex l. 2. c. 15.

CARDAMOMI FACIE FRUCTVS
triangularis malignus. CAP. II.

Exoticus fructus, quem accepit Clus. exot. l. 2. c. 22.
E V Valachia à VVilhelmo Paduyno, erat trian-
gularis formæ, semuncialis etiā magnitudinis, ex-
albidi coloris, tenuiq; membranā tectus, Cardamo-
mi officinarum fructū perbellē referens, continen-
que multa grana inæqualia & rugosa, cineracei foris
coloris, intus albi, omnia in globum congesta, satis
validi & gravis odoris & actis saporis, qui brevissi-
mo, & vix apparente petiolo plantæ inhæserat, ca-
lice tribus foliolis constante inclusus. Qui mittebat,
consulem suæ urbis unum, ex his fructibus edile
scribebat, ex cuius esu morbum contraxisset: quæ
adeo causa fuit, ut granum leniter duntaxat gustare
vellem, nihilo minus (an ex odore, an verō ex degu-
statione acciderit, ignoro) caput mihi dolere cepit,
& haud dubiè peius mihi accidisset, si devorassetem.

AMOMVM VERVM QVORVNDAM.
CAP. III.

Amomi nomine à Valerando Dourez insigni
Apharmacopœo accepti aroma quoddā, magni-
tudine spicarum Stachadis Arabicæ, cujus tamen
portiones separatæ his angustiores erant: duas si-
mul junctas vidi Pedem columbinum hirsutum ex-
primentes. Constant autem foliolis multis squa-
mularum imbricato posito, compactis, ex luteo al-
bicantibus, simile aliquid & colore & formā cum
Origano (ante quædam m.) habentibus, odoratis, sa-
pore viscoso, amaricante & acri.

Garcias de Amomo scribens narrat se percontatū
à quodā pharmacop. Hispano quid esset Amomum:
eum respondisse Arabica lingua Hamama nuncu-
pari. Ejus verō Scholiastes nobis picturam exhibuit
ad Valer. Doræum Amomi nomine & Ormuz cele-
bri sinus Arabici emporio missam: non tamen cum
Plinij & Dioscor. Amomo convenire ille putat, nisi
id fortē sit quo se Garcias donatum asserit. Hamama
verō

verò interpretatū pedē columbinū significat: Medici Nixamoxa Regis in Decan potēssimi, dixerunt isthic non nasci, sed inter alia aromata quæ ad Regem ex Asia, Persia, & Arabia conficiendis alexipharmacis pferretur, Amomū etiam adferri, cuius ramulo me donant. Hūc cum Diosc. descriptione contuli, ad quā venisse quadrabat, & licet jās scus, Pedem tamen

columbinum referebat. Sciendum est Amomum apud Avicennā nihil aliud esse quā Pedem columbinum. Hæc Garcias. Qui ut Clusij verbis utar, utinam Amomi descriptionem pleniorē dedisset.

Acofia de Amomo nihil certi habet: scribit de eo loqui Diosc. l. i. Lac. Matth. Amatum enar. 14. Serap. Fuch. Galen. 6. med. & Ortam, dicentem sibi denominatum Amama arabicè, quod significet Pedem columbinum & esse Amomum Avicennæ, verū quia non vidit, non describit.

Ruglius dicit Cardamomum simile Amomo & colligi cum Amomo in Arabia. Clus. ad Garc. Lug. & Tab. Amomū. B. pin. Amomū 2. spurium soliosum.

AMOMIS SIVE PSEVDAMOMVM.



AB eodem Valerando pro Pseudamomo & Amomide mihi exhibitæ sunt fragmenta seu partes quædam nonnihil Amomo præcedenti similes, inter quas lineæ aliquæ portiones nigre, in quorum extremitatibus apparent partes squamiosæ breviores quā in Amomo minis albicantes, sapore viscidū, ut nobis videtur. Hujus figura sub Amomo in præcedenti tabella, in infima ejus parte.

ROSA HIERICHO. CAP. LII.

Ignosis & confertis statim à radice natis fruticat stolonibus, palmaribus, aut paullo majoribus, crassis, cinerei coloris, in numerosam ramulorum sobolem cancellatim divaricatis, superiore parte omnibus in globum veluti coeuntibus, per quos folia rara unciam seculumve longa, semunciam lata, laciniata, cinerea, hirsuta; flosculi secundum ramos intrinsecus ubique racematim quodammodo nascuntur, candidi: quorum unumquemque sequitur vasculum, duobus loculis, membranula distinctis, totidem semina orbicularia compressa ruffa, acria cōtinens, binis supra loculos extrinsecus veluti auriculis prominentibus ex adverso positis, ex intergerino calycis pariete, surgente stylo longiusculo; radix satis crassa, ligulosa, simplex.

Amomum (inquit Cord. in Diosc.) ut parens meus Euricius Cordus prodidit, est odoratus frutex, quē Monachi Rosam Hiericho, & Rosam Mariæ vocant cui sententiæ ego quoque subscribo. Antorius Musæ tamē huic judicio cōtradicit, eo fretus argumentato, q. folia tribuatur Bryonia. Si Bryoniæ folia habet, maneat Amomū, si verò dissimilia, tum primum hac de re merito dubitamus. Mutam remota, quod ea Rosa nares non vulnerat, quantumvis recēs, quod dictum quomodo intelligat, nō possum cōjicere. A Diosc. probatur ῥοσὴν ἰερικίδιον, h. e. odo-

Tom. II.



referens Due sunt Hiericentidis Rosæ species, una insipida, nec odorata quæ Amomis: altera gustu atomatica valde odorata quæ verè Amomū vocatur. Hæc Cordus, cujus annotationibus quidam addit, non probati sibi Rosam Hierichuntis vulgò dictam Amomum vocari. Huic autem addi pulatur Coldemb. qui absolute concludit, quod Rosa Hierichuntis vulgò vocata Amomū esse non possit. Ceterum hæc Cordus sibi odoratam pronunciat, cum tamen nobis Rosa Hiericho nec recens ac virens, nec etiam sicca odorata observata sit, nec folia habeat Bryoniæ. Quare oportebat cum tradere tibi Rosam hanc videri odoratam.

Cordus

Amomum non est.

adv.) vidisse & crevisse D. Trevissiano Patavij. Crescit enim haud difficile ex semine recentibz autem seminula compluræ racematim unā stipata, glumosa, foris minora; & intra fruticis, cancellatim, reticulatimque implexi glomum contenta. Non describit Lob. semina, sed valcula.

Coloniz vidi, ait Turnerus, suffruticem manu (in pugnum cōtracta) paullo minorem, per omnia frutici à Diosc. descripto respondente, quem ex Iudea peregrinationis Hierosolymitanæ voto desunctus quidam secum retulerat. Eadem Herbaris dicitur Rosa Hiericuntis, i. e. Ang. Rose of Hiericho. Ferunt, quotannis circum festum natalitium aperiri, unde à quibusdam nominatur Christus massæ rose. Hoc ipsum censerem verum esse Amomum, si odorē haberet (quem in Amomo requirit Diosc.) nec non folia Bryoniæ, in aliis enim omnibus muricæ convenit descriptioni, si quis in hujus generis plantam incidat odoratam cum reliquis nous (ex Diosc.) pro vero Amomo licet accipiat.

Rosa Hiericuntis.

Gesh. in cat. Amomum quod Euricio Cordo videbatur Rosa Hierosolymitana, Aspalathum esse judicat, & idem paulo post Radicem nigram Hippocr. nominat, germ. Rosen von Hiericho. Sed Rosa Hiericuntis nihil commune habet, nec simile quicquam cum Aspalatho & Radice nigra Hippocr. quicquid scribat Gesh. Nobiscū autem sentit Calp. Bartholin. Gesh. n. dicens: Rosa Hiericuntina, verè Rosa non est, neq; Amomū Dioscoridis, neq; Aspalatus. Neque nascitur hoc tēpore in Palestinz hiericuntinis hortis aut agris.

Aspalatus.

Radix n.

Gesh. n.

Quædam (inquit Scalig. in lib. 1. de plantis Aristotelis in scripto) cum exeunt, spica figuram gerunt, ac evadunt postea : ejusmodi sunt qui in Arabia dicuntur Benteli, & planta quæ nominatur Helioscopium. Benteli apud ipsos Arabes quid sit, quæstionem non inveni. Si non est Amomum, quid aliud asseram nescio. Est enim Amomum id omnino, quod Rosam Hierosolymitanam, aut beatæ Mariæ vulgus vocat, perplexo sarmentulo in racemi modum, quæ si nihil spirat odoratum, natalium humori, atque vetustati est attribuendum : non autem detrahendum speciei, propter accidentium absentiam quorundam. Athenæus 3. *Serm.* Bentelos concha genus margariferum prodidit apud Indos. Miror tantum judici virum asserere, ita temerè Rosam Hierosolymitanam esse Amomum, cum nec recens, nec vetus odorem spirat ullum. Idem mecum sentit Brasavolus : non defutere ait, qui Hierosolymitanam Rosam Amomum esse putant : verum hanc non esse dubito, quia non vulnerat nares odore. Confirmat & hoc Agricola, quod vel Hierichuntis rosa non sit velut uva, quale est Amomum Plin. l. 12. c. 23. & Andromacho in descriptione Galen. Confirmat idem & Sylvius & Fuchs. l. 2. de compos. med. & Amatus in Diosc. l. c. 31. apud quem icon male posita cap. de Rosa. Et Rissius in Diosc. cum Lacuna. Et Lohel. Adv. & icon. pag. 203. Tom. 2. Item Lugd. Rosa Hierichonthea. Falluntur igitur cum reliquis Michael Neander phyl. part. 1. Andernachus in med. veteri & nova comm. 2. dial. 5. Frischlinus in Nom. græco-latino c. 22. Bened. Curtius, Rob. Const. Lonic. & (teste Cronenburgio de comp. med. lib. 1. fol. 5.) Eurius Cordus, quem imitatur Cordus junior & Dasypodius, qui omnes ineptè Hierichuntis Rosam Amomum esse credunt. Ex horum numero est & Rhegin. qui & Lacum Hierichuntis, & vnam Diosc. Galeni & Aetii describit. Sed inter hos adhuc deterius Frischlinus c. 22. Aspalathum, Rosen von Zericho esse scribit. Plus etiam ridendus Cordus quod Rosam de Hiericho Amomum esse dicat : cum idem in expositione Theriacæ, nos Amomo vero carere asserat.

Bellonio Obser. plantæ quæ in valle Ierichò nascuntur, in memoriam revocant herbulam quam quidam impostores Rosam Hierichuntinam vocant : & quoniam radice in aquammersa expanditur, imposturæ hinc ansam arripuerunt, admirationi futuræ spectantibus, distantes in vigilia Natalis Domini duntaxat aperiri, aut partus doloribus confliantibus fœminis. Quibus ejus natura incognita : nunquam aliàs putant posse expandi, id quod nihilominus falsum est. Argumentum desumpserunt ex facæ paginæ loco, sicut plantatio Rosæ in Iericho. Qui locus intelligendus de Rosâ vulgaris rubra aut pallida, non autem de altera illa plantula. Quæ & alios fecerit plures, qui iconem exhibuerunt, arbitantes esse Amomum, cum Amomum nunquam sit. Nos eam invenimus in Arabia desertâ in litore maris rubri arenoso nascentem, adeoque in Iericho prorsus non provenit.

Hi omnino expellendi sunt, teste Matthiolo, qui pro certo asserere non verentur, eam stirpem esse Amomum, quam Hierichuntinam à Hierico Palestinæ oppido appellat plantam : hanc plerumque ad nos è Hierico deferunt ij, qui ad sanctissimum Redemptionis nostri sepulchrum peregrè proficiscuntur. Ea enim est quam nostrates mulieres Rosam D. Mariæ vocant. Constat hanc Amomum non esse, quod folia albæ Vitis non proferat, nec ullo spiret odore. Cordus lib. de conf. pharmacis fasus inconstanter de Amomo disseruit, quippe in compositione aureæ Alexandrinæ pro certo asserit Amomum novum esse Rosam Hierichuntis : in compositione verò Theriacæ,

sui ipsius oblitus habere nos Amomum negat : Vtutur Hierichuntica non citates mulieres tempore partus ad invigilandum parienti horam, quando quidem (ut ipsa fatentur) in aquam densillâ, non prius facit, quam fœtus nasci incipiat : tanta inter Christianos incepti superstitio.

Gabriel Giraudet in itinere hierosolym. In plantis hierosolymitanis proveniunt quidam flores qui dicuntur Rosæ ex Hierico, quarum insignes vires. Die natiuitatis Christi quâ natus Dominus nollet se aperire & expandere eque Rosæ & sunt valde utiles puerperis : eam parturit inponendæ in phyalam in qua aqua benedicta & subitò Rosa aperitur, tunc femina statim parit sine periculo. Vel hæc sola hist. Giraudet reddidit plurima eorum quæ scribitur spectâ. Rosa Hierichon non meretur nomen floris, quia flores minimi & non speciosi : Vires ejus tales non sunt quales prædicat, quotiescunque enim imponitur in aqua calida, expanditur : nec in eo parturientibus confert, quod se aperiat.

Est Carolo Stephano Rosæ species, quæ vulgò Rosa Hierichonthea dicitur, Rosæ de Hiericho, ex qua Amomum Dioscor. colligitur, ut putatis, qui dialogum illum conscripsit, qui botanologicè inscribitur : Cui etiam Marcellus & Barbarus assensere videntur.

Cæsar de Cubebis agens, inquit : Quæ Amomis vocatur à Dioscoride & Plinio, hodie Rosa Hierichonthea vocatur : fructus ejus cum sua radice palmaris, lignosus, ramulis frequentissimis implicatus, rotunda figura, quasi Chamæleontis albi caput, antequam dehiscat : fructus fert in medijs ramulis frequentes, figura Myrti tenuiores, duros, candidæ, quidem est totus fructus color : continetur in duplici cavitate pauca semina nigra, quibus satis, aliquando provenit planta folijs parvis ut Polygoni, sed ad frugem non pervenit.

Oportebat Colerum annotasse ubi viderit Rosam Hierichontheam florere, vel auctore citare, qui id scripsisset. Falsum est eam in Natali Christi florere.

Cordus inconstantiâ, latine taxat Matthiolum, quâ tamen facillè defenditur, ut notat Apollo, quoniam tamen Hierichuntinam legitimum esse Amomum contenderit. Paucis tamen dehinc interjectis folijs, nos vero Amomo carere, i. e. Rosam illam Hierichuntinam desiderari, non id eo suipius immemor appellandus, sed verius errore dammandus.

Rosa Hierichuntica vulgò dicta, Amomum esse nequit. Sed aliquid (teste Cam.) semine habet commune cum Thlaspi, parum tamen vel nihil accedens, quæ gustu percipiatur, nisi in radice & surculis, quorum sapor æmulatur Raphanum. Infestatur admodum à campis viridibus, ut Nasturtium, Eruca, Brassica & congeneres herbæ. Ejus sylvestrem speciem Syriæ tectis & rudibus nascentem invenit D. Rauvolffius.

Amomum tandem non esse Rosam hierichuntinam testatur etiam Maronea in com. de Amomo, ubi Amomi fruticem esse ait insecundum, sed valde odoratum, suapte quæ natura sibi met cohærentem, atque multo acutius, quam ipsa sibi adhærent Rosa Hierichuntina sicca, nihilominus tamen idem frutex Amomi non erit similis uvæ, quia veris fructibus destitutus supportur, & quia ipsius rami & surculi nullo modo possunt referre imaginem acinorum ex quibus racemus componitur.

Nimis securè scribit Baub. apud Matthiolum de re sibi incognita Rosæ hierichontheæ duas esse species, alteram totam lignosam inspidam, & inodoram ; alteram aromaticam & valde odoratam. In pin. dicitur ei Rosa Hierichuntica, vulgò dicta : Amomum, Cord. in Diosc. & hist. Amomis Diosc. & Plin. j. Cæsar. Rosa Hierichonthea, Turn. Lon. Lob. Garz. Cast. aperta

Benteli.

Amomum.

Rosa beatæ Mariæ sive Hierosol.

Bentelos concha.

Scalig. not.

Non Amomum.

Error existimantium esse Amomum.

De Rosa Hierichuntica impostura.

Rosa Hierichonthea.

Locus.

Hierichuntica planta.

Rosa D. Mariæ.

Cord. reprehenditur.

Superfluum.

Christi.

Piræ.

Fabula.

tristat.

Amomum.

Amomum.

Rosa Hierichonthea.

ei, sive.

Maria.

Colerum.

prehend.

Cord.

Matthiolum.

prehend.

Amomum.

non est.

Thlaspi.

Rosa Hierichonthea.

duo dupli.

Rosa Hierichonthea.

duo dupli.

est Amomum.

mian.

aperta & conclusa, Eyf. Rosa de Hiericho, & Rosa Mariæ monachis, Lugd. Rosa Hierichontina 1. & 2. Tab. major, Ger. In hortis facile & crescit & florēt: de hac Ioh. Sturmius Lovaniensis professor, libellum superstitionibus plenum scripsit. Eid. B. Rosa Hiericonthea 2. sylvestris: Rosa Hierichontis sylv. species, Rauv. Cam.

Münstero in cosmograph. teste, Rosa hæc dicta à Hiericho, non in agro Hiericho, sed ultra Iordanem, & regione Hieriche in Arabia nascuntur. Lutetia habui semen ab hortulano regio Robin, quod fatum Montbelgardi in horto E.C. plantam proferebat, quæ florebat Iunij principio.

APHYLLON INDICVM.

ser. Syn. Locm. **B**R. v. fratrib. icon. 4. part. Indiar Orientalis scribatibus, in Insula Sancti Laurentij plantam



Hollandi copiose invenerunt & vocarunt *Blätterloß*, quia nulla folia exadè habebat. Teneiores ramulos scorbuti curationi adhibuerunt non sine effectu. De hac planta apud alios auctores hæcenus nihil invenimus.

B. pin. Rosa Hierichontica exsiccata similis: *Blätterloß* Holandis, fruticulus ad scorbutum, Ind. or. par. 4. fig. 11.

FINIS LIBRI XV.

Tom. II.

33





HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XVI.



SCANDENTES POMIFERAE ET HIS AFFINES.

Scandentium classis altera, assurgendi modo serè solo, arbores imitatur, sarmentorum naturâ ab herbarum con-
diti, ne n. n. multum recedens, sed profectò eò ipso notabiliores, quòd fructuum mole, vastâque magnitudine cum
ipsis adeò cerrent arboribus. Ad hoc nunc gressum festinanter dirigamus,

COLOCYNTHE CUCURBITA VETERIBVS.

C A P. I.

Κολοκύνθη
ἰσίδιον
Diosc.

Cucurbita
species
Theophr.

Obus off.

Satio.

Mangonia.



IOSCORIDES quamvis Κολο-
κύνθη (quam ad Κολοκύνθη
differentiam ἰσίδιον cognom-
minat) non describat, vires
tamen recenset, de quibus
nos infra.

Theophrastus lib. 7. hist.
c. 4. simplicem non esse Cu-
curbitarum speciem affir-

mat, sed alias meliores, alias deteriores. Cucurbita, ait, partim genera esse existimant, partim negant, sed in uno eodémque genere alias meliores, alias esse deteriores affirmant. Cucurbita in olerum genere cum seminibus ipsis flores edit, quippe ei flos in postremo fructus, & crescentibus fructibus flos diu infixus servatur. Inter æstiva brevem radicem fortitur, tum propter tempus, tum & forsitan magis ratione naturæ, quæ tempus secuta est: patte ampliatur supernâ luxuriaturque: radice tamen pusillâ inhaeret. Semina distantia fert: succum aquosum. Circa quintum diem erumpit, aut sexto, (vel ut alij volunt) septimo, sed posterior, tardiusque Cucumere. Refert ad celeritorem proventum recentior feminis ætas. In olerum genere Cucurbita vel ex toto immatura atque incommutabilis permanet. Si quis mollem, parvâmq; absconderit, ita ut alimentum largè accedat, percoquatique, incrementum quoque largè consequitur. Sic enim nulla pars alimenti à sole detrahitur, nec flatibus resiccatur: quibus causis moles augeri non potest. Dulciores & molliores redduntur, pulvrem in sarculo excitantes sine rigatione, cum venti anniverfarij perflant, hoc generi rotundo convenit.

Magnam Cucurbitarum varietatem, diversitatēque à feminis natura dependere testatur Columella, elegantiss. suis verbis, quos hic subiicimus:

pregnansque Cucurbita serpit.
Vna neque est illi facies, nam si tibi cordi
Longior est, gracili capiti qua vertice pender,
E tenui collo semen lege, sive globosi
Corporis, atque utero nimium qua vasta tumescit
Ventre leges medio, sobolem dabit illa capacem:
Narcicia picis, aut Aëtas mellis Hymæti
Aut habilem lymphæ hamulam, Bacchæve lagenam.
Tum pueros eadem fluxus innare docebit

Docet itaque Columella in hoc carmine suo, quâ
ratione ex eodem seminio, utrumque genus, longa
& rotunda Cucurbita fieri possit. Quod autem in
carmine jam recitato hac ipsa de re omisit, in prosa
non multò post addit: Aquosis autem locis primo
quoque tempore, non tamen ante Calendas Mar-
tij, semen ponendum est, ut defertur possit. Equino-
ctio confecto. Idque de media parte Cucurbitæ se-
men inverfo cacumine posito, ut fiat incrementi
vastioris: nam sunt ad usum vasorum satis idonea.
At si esculentas merces præparabis recto cacumine
de collo Cucurbitæ sumptum [semen] ferendum
erit, quòd prolixior & tenuior fructus ejus nascatur.

Sed jam unde digressa est, revertatur oratio no-
stra. Plin. l. 19. c. 5. de Cucurbitis hæc memoriæ pro-
didit: similis [cum Cucumeribus] & Cucurbitis natura,
duntaxat in nascendo. Equè Hiemem odore. A-
mant rigua ac frigus. Seruntur semine in terra se-
quipedali fossurâ, inter Equinoctium vernum &
Solstitium: Parilibus tamen aptissimè. Aliqui ma-
lunt ex Calendis Martij Cucurbitas serere simili
modo reptantibus flagellis scandentes parietum a-
spera in tectum usque, natura sublimicatis avida.
Vires sine adminiculo standi non sunt, velocitas
pernix, levi umbrâ cameras ac pergulas operiens.
Inde hæc duo prima genera: Camerarium & ple-
beium, quod humi reptit. In priore mirè tenui pedi-
culo

Rotunda
longa ex
eodem se-
minio.

Esculenta.

Plum.

Cucurbita
prima ge-
nera duo.

culo libratur pondus immobile auræ. Cucurbita quoque o nni modo fastigiatur, vaginis maxime vitilibus, coniecta in eas postquam defloruit. Crescit quā cogitur formā, plerumque & draconis intortū figurā. Libertate verō pensili concessā, jam visā est novem pedum longitudinis. Cucurbitarum numerosior ulus. Et primus caulis in cibo. Atque ex eo totum natura diversa. Nuper in balinearum ulum venere urceorum vice, jam pridem verō etiam cadorum ad vina condenda. Cortex viridi tenet. Deciditur nihilominus in cibis. Cibus saluber ac lenis pluribus modis existimatur, qui perfici humano ventre non queat, sed non intumescat. Semina quæ proxima collo fuerint, proceras pariunt: item ab imis, sed non comparandas supra distas: quæ in medio, rotundas: quæ in lateribus, crassas brevioresq; siccantur in umbra, & cum libet ferere, in aqua macerantur. Cibus, quō longiore tenuiorēque, eō gratiores. Et ob id salubriores, quæ pendendo crevère: minimūque feminis tales habent, duritiā ejus in cibis gratiam terminant. Eas quæ femini servantur, ante Hyemem præcidi non est mos. Postea fumo siccantur, condendis hortensiorum seminibus rustica follethili. Inventa est ratio, quā cibus quoque servarentur, usque ad alios penē proventus: & id quidem in muria fit. Sed & Icrobe, o paco in loco arenā substrato, siccōque siccō operas, ac deinde terrā, virides servari tradunt.

Martio Cucurbitam ferendam esse annotat Palladius: amare verō solum pingue, humidum, stercoratum, folium. Hoc in Cucurbitis insigne est, quōd longas pariant & exiles semina, quæ in earum cervice nascuntur: quæ in ventre fuerint, Cucurbitas faciant crassiores: quæ in fundo, latas, si in versis cacuminibus obruantur. Vbi adolescere cœperint, administrandis adjuvandas esse. Quæ servandæ sint ad semina, usque ad Hyemem in sua Vite dependere debere, deinde sublata in Sole ponenda, aut fumo, alter semina putrefacta deperire. Diodes author est prope Magnesiam Cucurbitas amplissimas gigni. Menodorus Erasistratus amicus Hiceti, Cucurbitarum, inquit, alia est Indica, quam & Sicyam nominant, alia est Colocynthe, nempe vulgaris. Indica ut plurimum elixatur, vulgarem autem etiam assant. Cnidii etiamnum Indicas Cucurbitas vocant. Hellepontij, quæ longæ sunt, Sicyas nuncupant, rotundas verō, & globosas Colocynthas. Apud Athenarum Euthymedus Atheniensis lib. de Oleribus, Cucurbitam vocat Sicyam Indicam, quōd ex India semen ejus advectum fuerit: Megalopolitæ verō Sicyoniam appellant. Attici uno vocabulo Colocynthen vocant. Phrynicus diminutivo nomine protulit:

Vel exigua maza parum quidpiam, vel Colocynthij.

Nihil omnino longius Marcellus de Cucurbita repetendum censuit: Græci, inquit, dulcem & quæ edendo est, Cucurbitam feminino genere in secunda declinatione καλοκυλινδον dixerunt: Medicam verō & amarā, de qua nos paulō post scorsum acturi sumus, in quinta: & ab hac diminuta appellatione καλοκυλινδον. Est illud animadverendum in dulci Cucurbita ex duplici genere, duplex etiam nomen esse: rotundæ, & in globum tumentis, quæ Cucumeri similis sit, αμια: tereti & in longitudinem extensa, καλοκυλινδον: Latini utramque eodem Cucurbitæ nomine appellaverunt.

ÆQUIVOCA.

Cucurbitæ, sive Colocynthæ, & Colocynthidis sive Coloquintidis æquivocationes & substituta nunc proponimus. Cucurbita igitur, Græcis καλοκυλινδον, sive αμια, & καλοκυλινδον id est αμια cognominata, Latinis Cucurbita cameraria, Cucurbita plebeia, & Cucurbita sativa, est nobis Cucurbita folio molli, flore albo.

Sed & Cucurbitæ propriè dictæ genus quoddam Longa, est longum, cujus aliquot sunt differentiæ, Anguinæ dictæ.

Quædam habentur angusto collo, diversorum generū & ipsæ, magnæ & parvæ, Lagenariæ vocatæ.

An plebeia Cordi referenda ad modō dictam?

Cucurbitæ folio albero, flore luteo.

Cucurbitæ folio albero, amara, diversorum quoque generum.

Cucurbitarum generi annuerat Anguriam Gesnerus. Nos Citulum folio Colocynthidis lacinia to nuncupamus.

Κολοκυθες, Cucurbita sylvestris, agrestis, silvatica, Colocynthidis Cucurbita amara, Cathartica, ex Græcia, Cucurbitula, Cucurbita caprina, Cucurbita deserti, Cucurbita Elisæi Prophætæ: Coloquintidis vulgaris, quibusdam silv. Barbara, marina & Somphos Plinij.

Cucurbitæ sessilis, capitata, clypeatæ diversæ generis, & eis affines.

Cucurbita sylvestris & exigua, Græcis Somphos; Somphe, Latinis Barbara, & Marina Plinio, de qua ex eo post, Dodonæo autore adhuc incognita.

Cucurbita arborea Indica an Guanabanus, vel Guanabana Higuero, de qua H. n. g. l. i. cap.

Cucurbitaceus fructus arboreus Clusij l. 2. c. 12. Prus. Ind. exot. traditur à nobis H. n. g. lib. 1. cap. sub fructu In-pyriform. dico pyriformi granis intus nigris.

De Cucurbitino fructu Indico magnitudine ovi Cucurbit. Struthij vide postea hoc lib.

Cucurbitularum Americi Vespulij, Lagenularum Americarum Clusij exot. l. 2. c. 8. mentio fit in H. n. g. lib. 1. cap.

Kikajum Ionæ Prophætæ non est Cucurbita, sed Ricinus. Ricinus, ut ostendimus H. n. lib. 34. cap.

Cucurbita canina dicitur de Bryonia seu Vite al. Bryonia; ba, Basilio Fabro teste.

Chamæpitys dicitur Cucurbitularis Hadriano in Chamæpitis Nomend.

SUBSTITUTA.

Si semina Cucurbitæ haberi non possint, accipienda suadet Platearius semina Malorum dulcium. Ego verō malum Melonum, vel Cucumerum substitui.

Cucurbitæ succo deficiente, Traët. qui pro sumit succum Violarum in inspidiarum.

Ad quid Felix Platerus in clystere ad febres continuas præscribit Cucurbitæ seminum loco; semina aora ferè quatuor majora ferè rancida, quæ corrupta & corruptione calidiora reddita sunt?

DE CUCURBITIS IN GENERE ex Neotericis.

Inter scandentes pomiferas plantas præcipuè nota est Cucurbita, quæ Græcis Καλοκυλινδον, & Καλοκυλινδον id est αμια: item Καλοκυλινδον πικρα dicitur: Latinis Cucurbita, Cucurbita edulis, & Cucurbita sativa: à nonnullis verō Καλοκυλινδον per τultima syllaba: ab aliis αμια: à Plinio Cucurbita cameraria, quōd cameras, testudines, pergulas, topiarias hortorum scenas scandat ac operiat. Huic verō & altera, quæ nullis prope assistentibus fulta humi repit, plebeia cognominatur.

Arabibus autem Cucurbita Haraba, Hara, seu Charaba, & ut Trago placet, Vlla dicitur: Germ. Kürbis, linguar. Belg. Cawwoorden: Gall. Courge: It. Zucca: Hisp. Calabazas: Angl. Gourde: Bohem. Tyfeto: Hung. Tök. Græci potro ex adverso vocabulum imposuere, κα. Eryman. καλοκυλινδον nominantes, quōd scilicet pumili brevèsq; sint partus, quos ipsa passim eniitur, cum tamen corporis mole omnes herbarum arborūve fructus videantur superare. Cucurbitam verō Latini à concurvarum haud dubiè dixerunt, quōd faciliè si quid obstitit, aut fuerit impedimento, quo minùs extendatur, incurvescat.

Proverbium.

Quod citò fit, citò perit, sic vulgo dici solet, inquit Tragus. Quod sanè dicterium, si ulla alia de re, certè de Cucurbita quam verissimè dicitur. Ea namque unà Æstate, in sublimem conscendit, ut fastigia altissimarum arborum attingat. Autumno verò si vel unam pruina senserit, dejicitur, foliis & palmatibus prorsus marcescentibus. Qui fit ut quotannis Cucurbitam ferere necesse sit, id quod in nostris regionibus Aprilis mense facere solemus. Tum enim nonnulli ea accipiunt semina, quæ in ventre Cucurbitarum enata fuere, eorumque mucronatas partes in terram desigunt, pollicentes sibi hæc ratione feliciorum Cucurbitarum proventum. Alij semina priusquam ferant, in dulci lacte, aut aqua sacchari macerant, quò scilicet erumpant, & dulciores evadant fructus, id quod non raro contingit. Quamprimùm verò bina prima ac pinguis Cucurbitæ folia eruperint; continuò rigare huiusmodi oportet, aliter tardius augescunt. Iunio mense appetente, cum folia quaterna aut quina Malvæ Romanæ haud dissimilia prodierint, tum & capreoli Vitium claviculis similes progignuntur, quibus natura sublimitatis avida, palos, arbores, aut quodcunque apprehenderit, conscendit Cucurbita. Post hæc flos apparet, atque is quidem dudum generum. Primus namque lanuginosus, albæ Rosæ exigui similis, quinis aut senis foliis præditus spectatur, qui tertio ab ortu die sine fructu decidit. Qui hunc subsequuntur flores (diversorum colorum) magis exigui sunt, in quorum sine fructus in pyri formam silvestris turbinatus, conspicitur, qui in dies flore marcescente admodum augetur, ac aut in orbem collectus intumescit, aut in longum propagatur, quidam cornu instar recurvus spectatur, alius rectâ figurâ contentus est, alius grandis, alius contra exiguus evadit, quæ sanè varietas, diversitasque à feminis natura dependet, quod Columella versis testatur. Hucusque Tragus, qui unicâ figurâ tres Cucurbitæ species exprimit, ac Hebraicè Cucurbitam Kikaion (Ionæ 4.) vocat. Nos verò Guilandino potius assentientes Kikaion Ionæ non credimus Cucurbitam esse, sed potius Ricinum.

Diff. Tragi.

Icon Tragi.

Kikaion Ionæ est Ricinum.

Cucurbita species Martialis.

Mulieres enecant herbas.

Sinojensis ne ut nascatur.

Cucurbita. Sychia, nunc etiam Lob.

Colocynthis.

Matthioli in Dioscori figuram habet non multum dissimilem, ab icon Tragi, tres Cucurbitæ species demonstrantem. Cucurbita sativa, inquit, quæ per Æstatem in cibum frequentissimè vario sumitur apparatu, in triplici censetur genere, nempe longa, rotunda, & sessilis. Sed quamquam Cucurbitæ inter se formâ dissimiles habentur, non tamen propterea viribus, & naturâ sibi invicem repugnant. Siquidem (ut Columella tradit, & Plinius l. 9. c. 5. refert) forma varia in Cucurbitis arte & mangonio fieri facile potest. Diligenter custodiendum est, ne eò mulieres accedant: namque earum contactu facile elanguescunt incrementa virentium, tantòque magis, si eis fluxerint menses: tunc enim solo oculorum intuitu tenellos enecant fetus. Amant Cucurbitæ mirum in modum aquas: nam si propè in patefis vasculum aqua subiciatur, à quinque vel sex digitorum intervallo, ante posterum diem adrepentes cognoscuntur descendisse. Sine semine nascuntur, si per triduum antea spargenda semina oleo sesamino macerentur. Camerarius quoque in ep. & hist. germ. Matthioli ut in imagine, tria pinxit Cucurbitæ genera, nempe longam, rotundam, & sessilem.

De Cucurbitis, hoc titulo (Cucurbitæ, Sychia; Sychia, nunc, præmisso, hæc scribit in Advers. Lob. Tanta est Cucurbitarum, Cucumerum, & Peponum inter se cognatio, ut antiqui Græci & Latini, nedum recentiores, minus accuratè nomenclaturas discreverint. Euthydemus siquidem in oleraceo libro Sychiam Indicam nominat Colocynthidem: puta post Hippocratem: cui, uti etiam Theophrasto

videtur, quamlibet varietatem & differentiam genericam horum fructuum *σικυδιον* vox significare, *σικυδιον* namque bullæ est, unde *σικυδιον*, quæ vas, ollam & pyxidem significat, & sanguisugum vitreum, aut cornu instrumentum: indeque sortè Latinis Cucurbita, tamen si Varro in curvando dicta putetur. Aristoteles etiam Sychias Pepones appellat: & Galenus Pepocucumerem. Quare quò facilius percipiantur & discernantur ab invicem, quæ hodie in usum culinarium & medicum venerunt, genera cuncta non incommode *σικυδιον*, vel Cucumeres vocamus: quarum duo summa fastigia sunt, Cucurbitæ & Melopepones, varia nomina adepta propter fructuum, foliorumque varietatem. Et rursus: Admodum verisimile fit, Zucchæ nomen (sic enim Italici vocant Cucurbitam depravatam elementis) *σικυδιον*, aut *σικυδιον*, vel *σικυδιον* (utroque enim modo scribunt nonnulli Græci) designare nam *σικυδιον*, unde etiam Ficus Latinis derivatur, generalissima fuit appellatio Cucurbitarum, Cucumerum, & Melopeponum. Quare Cucumerinæ familie maxime vocari possunt Cucurbitæ, & commodiore etymo à curvando deduci, quasi curvando, ut loquuntur Falcones & Pyrenzi. Hæc ille. Quas alij Cucurbitarum differentias agnoverint, nunc est ostendendum.

Calabassi seu Cucurbitæ in India ad miraculum usque augescunt, quæ in hac sola provincia Chile nascuntur & Capallos nuncupantur: Cucurbitarum species prope infinitæ sunt, quædam immensè mole monitosa sunt, quæ dissecatæ & resiccatæ excavantur, & ex iis varia vasa effinguntur: ex minoribus pocula, aut pateras ingeniosè celatas concinunt: Bauh. pin. ex Ioseph. Acosta l. 4. c. 9.

CUCURBITA LONGA, FOLIO molli, flore albo.



Cucurbita lō. Deser. Cæga viticulis digitali crassitudine, angulosas, orgyas aliquot longas è radice tenerâ fibratâ emittit, quæ per terram sparguntur, aliquæ per gulas & perticas capreolorum ope scandunt, folia rotunda, pedem, aut sesquipedem lata molli lanugine tomentosa, cretis subindata nonnullis per ambitum incisa, ex pediculo tereti, longo, concavo; flores nivei candoris, lilacei, quinquepartiti, intus villosi, exterius brevior pilo obfusi, atque hi quidem aliis pediculo immediatè coherant, talisque steriles sine fructu marcescunt, aliis mediante fructus rudimento, qui delapso flore succrescit, inque insignem adolefcit magnitudinem, pedes quinque aut sex longos, cervicè crassâ, in ventrem modicè turgescens, qui, si quid, quod resistat, offendit, curvatur. Cortex recentiter tener, herbaceus, adulto durus, flavescens, medulla alba, insipida, medicè fungosa; femina uncialis longitudinis ferè, longa, plana, compressa, unâ parte lata, duobus angulis conspicua, infernâ, quâ germinare solent, plures angulos habentia, & sub

tunica

tunica duriuscula albi, medullam insipientia albam, dulcem, esui gratam.

Stitgardia præter vulgarem, longam, aliam observare inveniunt, minoris crassitudinis & longitudinis, cortice candidiore.

De Cucurbita folio molli, flore albo, cui competere videntur, quæ veteres de Cucurbita memoria prodiderunt, hæc scribit Cordus. Cucurbita (inquit in Diosc. dicitur sunt potiores differentia. Vna longos fert fructus, altera latus & sessiles: semine ejus Medici usuntur. Modò autem dictum genus in hist.

(ubi Tragi icon assumpta) diligenter sic descripsit: Cucurbita cameraria, quæ ante camerarum fenestras feritur, viticula ab una radice emittit, quæ in multas alias angulosas tenetas, & modicè concavas viticulas dividitur, folia ex intervallo proferentes, singula ferè rotunda, nisi in iis anteriori maxime parte tres plerumque acuminati anguli eminent: eadem eminentiis quibusdam brevissimis, rarisque per ambitum circumvallantur, & tactu mollia sunt, foliorum Althææ modo, magnitudinem eorum seu latitudinem secundum natium diversitatem variat: fecundo autem aprico & humido solo, apud nos in Germania pedem cum quadrante interdum latitudine excedunt: pediculus is est longus, tenet, leviter hirsutus, modicè concavus, & propemodum teres, si non modicè fœnaliculatus esset, quo latere, quo superiori foliorum parti responderet, capreolos secus folia producit singulos, quibus affixos baculos, & perticas apprehendit, in magnam altitudinem ascendens: flores juxta folia & capreolos fert figurâ liliaceos, partim steriles, partim verò fecundos, utriusque quinis, candidis, intus hirsutis, sequequencia longioribus, uncia paulò angustioribus, forasque modicè reflexis & repandis constant foliis, differunt tamen inter se. Siquidem steriles breves habent in medio apices & hirsutiores sunt, nec quicquam habent tumidi post se (ubi pediculis junguntur) quod sequuturi fructus spem faciat: fecundi verò in medio tria crassiuscula, bifidaque stamina continent, nec immediate pediculis junguntur, nam inter ipsos flores & pediculum parvum & leniter hirsutum extuberrat, quod tenera Cucurbita est, capitulum juxta annexum in angustum collum desinens, quod marcescente flore paulatim accrescit, deinde ab Autumno in magnam molem, quam Cucurbitam vocamus, auctum maturescit. Magnitudo & forma non est eadem omnibus Cucurbitis: quædam enim longæ sunt, quædam verò inferius vêtrosæ existunt, & superius in angustum collum coarctantur. Cum apud nos in Germania feliciter enatæ maturuerint, longæ quinos ferè: pedes longitudine, & dodrantem cum uncia assequuntur, maxime si pensili licentiâ concessâ, liberè pependunt. Ventrosæ autem interdum in duorum pedum longitudinem & pedalem latitudinem adoleſcunt: utrumque tamen genus frequentius minus capit incrementum. eam enim magnitudinem quam posuimus non semper, nec ubique consequuntur: color omnibus est in maturitate flavus, durusque & ligneus cortex: pulpa teneris est candida, gustu dulcis, maturis verò fungosa, seminibusque plena, præterquam in collo: nam eo loco ventrosæ nullum semen continent: longitudinem semini uncialis est, latitudo autem semuncialis: idem planum & compressum est, atque anteriori parte modicè acuminatum, posteriori verò latiusculum, duobusque eminentiis cornutum: corticem habet chenoſti, candidum, acuminatum, compressum, gustusque dulcem nucleum claudentes. Radice tota herba nititur candida, in multas tenues partes distracta: eaque semestri: in hortis fœta camera perticis extructas ascendit & obteggit, facitque juncus das frigidasque scenas, latis foliis arcens: feritur

etiam in hortis pensilibus, ante camera & fenestras, ut dictum est, unde hoc Cucurbitæ genus Camerarium Romani appellabant, ut Plinius testatur. Cord. eodem libro etiam tradit Cucurbitam, quæ una sit ex Cucurbitis, quæ postea tradimus, Jagerianis, considerandum. Cucurbita plebeia, inquit, viticulis, foliis, floribus & semine camerariæ similis est, fructum tantum dissimilem producit, cui duorum dodrantum, aut nonnunquam cubiti apud nos est longitudo, latitudo verò quincunx aut sextans, formâ sunt inæquali: nam inferius longum habent ventrem, à quo in longum, nec angustum collum desinunt, interdum etiam incurvantur. Est & alia, quibus distinguuntur differentia. Camerariæ altitudinis avida est: Plebeia verò humi prorepit, quoque verius viticulas suas spargens. Saporem habet dulcem, carnemque, cum tenera adhuc est, quæ edendo fit. Et hæc Cordus.

Cucurbitam longam folio molli, flore albo, vocavit Lob. in adv. Cucurbitam sive Zuccham in obs. & ic. omnium maximam anguinam. Ger. ut & Dod. gall. qui tertio loco describit, Cucurb. anguinam, hist. ubi Lobelij figuram habet, Cucur. longioram, Turn. Lon. Cast. Cam. & Tabern. (apud quem icon transposita per incuriam typographicam ut existimamus, sub titulo Cucurbitæ Indice minoris. Cucurbitam longam: & nec etiam Fuchl. & Hort. Lust. appellavere. Lugd. Cucurbitam camerariam longam. Ang. ep. 7. Cucurb. Zuccham longam, quæ in Helleſpontiorum. B. phyt. Cucurb. 4. Idem pin. Cucurbita, s. five oblongam flore albo, folio molli, Cucurb. fructu oblongo, Tragi. Cord. in Diosc. Cucurb. oblongam, Fuchl. Cucurbitam, Gesph. a. sativam longam, Cast. Cucurbitam falcatâ figurâ sæpè crescentem, quandoque cervicem tantum habentem recurvam, nonnunquam rectitudinem servatâ bicubitali, tricubitali, aut quatuor cubitali longitudinem.

CUCURBITA LATIOR FOLIO molli, flore albo.



TRagus hujus Synon. fructum pingit, tres enim species unâ effigie representat: Fuchsius separavit & hanc majorem vocavit, gal. Courge aut Courge gresse. Dod. gall. Cucurbitam 1. & ut Lugd.) Cucurb. camerariam majorem: hist. Cucurb. latiore, ventricosam ac crassam absque collo, & inferiore sede latiore, pyri turbinatam figuram quodammodo referentem.


Hort. Lust. Cucurbitam rotundam. B. phyt. & pin. Cucurb. sive majorem sessilem flore albo, Cucur. fructu in orbem collecto in tumescite Tragi: Cucurbitam sessilem, Matth. ep. Cucurb. majorem, Fuchl. Turn. Latiore, Dod. Zuccham rotundam, Ang. Cucurbita sessili fructu, Cord. in Diosc. Variat hæc, inquit, magnitudinē, variat colore corticis, nam sunt virides, flavæ, candidæ, quædam maculoso corce, quædam sulcis distinctæ, quæ d. tuberosæ.

CUCUR-

CUCURBITA LAGENARIA.

Differ.

Cucurbita lagenaria non variat foliis & flore; à longa prius descripta: verum fructu plurimum differt, collo angusto ventreque crasso, lagenas & phyalas representans: semina putamus magis fusca esse; quam longarum.

Autem
differentia.

1. Lagenariam, collo multo longiore, colore pallido, albique maculis ornata: Conditur & hac saccharo.

6. Vidimus tandem Cucurbitam mediam inter longam & lagenariam, corpore crasso rotundo, magnitudinis circiter capitis, collo tenui cubitum penè longo.

Symon

Tragedi appellat Cucurbitam camerariam & plebeiam Plinij, germ. fleschen Kürbs. Turn. Fuchl. Cucurb. minorem. Dod. gall. Cucurb. 2. minorem:

2. hist. Cucurb. priorem. Tab. Cucurb. lagenariam majorem, & alteram minorem. Ger. Cast. & Lob. obl. & ic. Cucurbitam lagenariam, hanc in Adv. duplicem agnovit. Lagenariam, inquit, voco, ut qua pe-

Lagenar.

maior.

regre proficiscentes lagenaria utuntur, præsertim in Galliis, Hispaniis & Italia: commodius namque gestatur vinum, quam vitreo aut sigulino vase, quæ o-neri sunt, & facilius franguntur. Semen illi minus, quam superiorum: folium alioquin, flores & reliqua non disparia. Ab hac tantum differt fructu minore, lagenulaque concinniore exprimente, eoque lubentius commodiusque gestatur itinerantibus. Semine, folio, & flore, delicateiore, non diverso.

Lagenar.

minor.

Varietates

C. Bauh.

B. phy. & pin. dicitur Cucurb., sive lagenaria flore albo, folio molli, Cucurbita, Brunf. Cuc. plebeia Cordi, Gesn. h. Cucurbita cameraria minor, Lug. Variat fructus quandoque lagenarum formâ; aliquando ventricosâ absque collo pyri turbinatâ figurâ.

DE LOCO IN GENERE.

Ante in genere ex Neoteridis, seu etiam ex veteribus, quædam de loco, tempore, satione, cultu, & mangonio commemorata sunt. Quare hic illud duntaxat adscribimus, quod apud Dodonæum in fol. lat. legitur. Cucurbitæ in hortis feruntur ac coluntur. Sub Autumni tempus ad maturitatem decimum perveniunt in calidis tamen regionibus citius maxime præcoces: Præcoces autem Cucurbitæ, tum & Cucumeres sic redduntur, ut Quintiliani tradunt. In copiosius aut siccitia inutilia terra cribrata mittenda, stercore admixto liquidior facta: & anticipato confecto tempore, Vere videlicet inchoante, semina implantanda, & cum sol fuerit, & calor, & mo-

Tempus.

P. ac. et ut

fuerit.

derata pluvia, copiosius sub dio expones, circæque Solis occasus in domum contestam inferes: atque hoc assidue faciendum, aqua irrorata, quando usus postulat: postquam vero perfectè deflabunt frigora & glacies, copiosi sive dolia in locum subactum & exculum defodiendi, ita ut labra æqualia sint tertæ, deinde reliqua cura adhibenda: sic ille ex Plinio.

VIRE ET USUS IN GENERE.

Cucurbita quæ editur, ex Dioscoridis quidem auctoritate, cruda trita imposita, tumores & abscessus mitigat. Ramenta ejus pueris infantibus, in partium circa cerebrum & membranarum ejus inflammatione utiliter per sinciput imponuntur. Similiter ad oculorum & podagricas inflammationes. At succus ramentorum expressorum, & per se, & cum rosaceo insutus, ad aurium dolores commodus est: & cuti summe à febris ardore ac æstu vexatæ silitus prodest. Totius autem Cucurbitæ servata & expressæ succus, cum modico melle & nitro potus, alvum leviter solvit. Et si quis in ipsam crudam exacuatam insusum vinum per noctem sub dio exponat, & temperatum jejunis bibat, leviter alvum molli. Quantum porro ad ejus in medicina usum attinet, Galenus de simpl. humidæ frigidæque temperaturæ esse scribit, utraque qualitate secundi ordinis. Quocirca ramentorum ejus succum ad aurium dolores cum phlegmone junctos, cum rosaceo utilem esse tradit. Sicutam quoque calidam illitam calidas phlegmonas mediocriter refrigerat: In esu autem humidam esse & sitim propellere: crudam quidem ad esum in jucundam esse, & concoctioni extremè rebellem, aded ut si quis ad ejus usum in alterius cibi inopia cogatur, onus frigidum in ventre situm sensurus sit: ut stomachus subvertatur, & ad vomitum concitetur, qui etiam solus liberare potest illum ab instantibus symptomatibus. Quare omnes homines, inquit 2. de Alimentis, post cocturam statim aut sartagine fixam, aut assatam edere solent. Diphilus scribit Cucurbitam parum nutrire, facile corrumpi, habitum corporis humectare, egeri celeriter, bonum succum generare, si ex aqua & aceto sumatur; juvareque magis ventriculum: meliorem succum nobis suppeditare conditam in lalgamum: potentius extenuare cum sinapi: concoqui minori negotio, ac excerni levissem. Mnesitheus, censet, quæ natura facile ab igne vincantur, & coquantur, ut Cucurbita, corpori alimentum subministrare, non multum sanè, sed humidius & nihil molestum. Epimarchus suo carmine videtur Cucurbitam seu inflatam dammare:

In esu no-

xia.

Diphilus.

Mnesitheus.

Epimarchus.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

Cucurbita.

Inflata.

Dammare.

tium circa cerebrum & membranas ejus vexat. Ita enim Paulus l. i. c. 67. habet: *οὐρανὸς ἐστὶν ὁ φανερὸς τοῦ πνεύματος καὶ ὁ ἀφανὴς τοῦ σώματος*. Et ibidem mox etiam ipse Cucurbitæ ramenta ad siriales præferibit. Plinius alibi aduersionem infantium, siriasin vocat, ut l. 30. c. 15. Ombus in canino simo inventis, aduersionem infantium, quæ vocatur siriasis, adalligatis emendatur. Et alibi infantium destillationes, ut l. 22. c. 21. Folia Heliotropij infantium destillationibus, quod siriasin vocant, illita medentur. Alibi etiam simpliciter græco vocabulo utitur. at l. 32. c. 10. Sirialesq; infantium spongia frigida cerebro humectato, rana inversa adalligata efficacissimè sanat, quam aridam inveniiri affirmat. His itaque modis Plinius siriasim reddere conatus est. Verum Alexander Aphrodisæus l. i. probl. 98. *οὐρανὸς* vulgus dicere, ardorem habere ait. *στῆλας*, inquit, *τὸ θεῖον ἐστὶν ὁ φανερὸς τοῦ πνεύματος καὶ ὁ ἀφανὴς τοῦ σώματος*. Et videtur sanè verbum à Sirio stellâ factum esse, de quo Pœta ait:

Sirius ardor,

*Ille sitim morbosque ferens morte alibus agris,
Nascitur & laevo contristat lumine celum.*

At verò quod ex strigimētorum, (quæ ramenta Dioscorides vocat) succo febrium ardores refrigerari tradit, id dicit quod Dioscorides ait, cuti sum nā à febri ardore ac æstu vexata illius prodest. Cæterum, ut ad institutum redeamus, veteres Medici apud Plinium Valerianū de Cucurbita ita senserunt, ut eam aquam copulatam dicerent. Galenus humidæ putat virtutis & frigidæ, idq; ex eo probat, quod ipsa in cibo sumpta stomachum relaxat, bibendi desideria non excitet. Cætera etiam in Cucurbita talia, ut aptere frigidæ potestatis exempla demonstrat. Crudæ & tritæ leniunt omnem tumorem. In cibo sumptæ molliunt ventrem. Succus earum, ut Galenus ait, ad compescendum velociter auriculæ dolorem tepesfactus infunditur. Idem succus & dolore dentium mitigat, si diutius in ore teneatur. Sed & rosaceo mixtus, & unctioe corpori admotus, febrium restingit ardores. Cinis arde corticis efficaciter potest combusta sanare. Eundem cinerem didicimus ab expertis vulnera in vetere jam in putredinem versa purgare, & ad cicatricem usque perducere. Seminū sicco illa vis traditur, ut in pulverem tritum & inasperum impleat vulnera quæ cavata sunt. Quidam illud in vino bibendum dedere, ut solutiones alvi fluentis inhiherent. Viticulæ quoque Cucurbitæ jam senescentes cum passo & aceto dysentericis datæ, miro modo faucia intestina componunt. Ex Simeonis Sethi sententia, Cucurbita concocta facilis, bonique succi est, & admodum nutrit. Sitim sedat, urinam cit, & ventrem movet. Calidis & siccis temperaturis prodest, & inflammationes ventris & jecoris sedat. Pituitolos autem lædit, colicæque affectus. Si malos humores assequitur, ab iis corumpitur, & malum succum generat. Semen genitale minuit, & veneris appetentiam extinguit. Sanguis ex ea procreatus, consistentiā tenuis est. Thoraci, pulmōni & vesicæ prodest. Succus ramentorum ejus cum rosaceo impositus, ad aures inflammatione laborantes confert. Integra verò illita, calidas inflammationes refrigerat. Tragus ait quoddam se vino, quod in excavata cucurbita manserit, purgare. Hoc an verum sit non sum expertus, id tamen potius existimari præstat Cucurbitas amaras folio aspero. Omnia Cucurbitarum genera, inquit, frigide & aque sunt nature, ut rectè dixerit Plinius, Cucurbitam nihil aliud esse, quàm congelatam aquam. Cucurbitæ ad ardentem febrem utrinque usurpatæ misficæ faciunt. Quamquam autem Cucurbitarum usus, propter frigidam, quam obtinent, humiditatem, stomacho non usque adedè conducatur, nihilominus tamen culinis passim familiares cernun-

tur. Sunt enim qui teneras illas & molliscentas adlucin cibis estare solent, eo quo sequitur modo. Corticem exteriorem abijciunt, interiorem verò & candidam substantiam unā cum mollibus ac immaturis seminibus bulliunt, posteaquē minutim conficiunt, ac cum cepa, butyro & sale coquunt. Hicibus ferè cum brassica capitata cōscissa & cocta convenit, macilentisque hominibus prodest. Nonnulli Cucurbitam immaturam orbiculatim instar malorum scissam, cum butyro in sartagine fringunt. Quidam purgationes ex Cucurbita conficiunt hoc pacto. Cucurbitam recentem excavant, vinòque repletam noctis spatio relinquunt, ac manè jejuno stomacho, illud vinum bibunt. Aqua ex immaturis Cucurbitis distillata, his qui ardentibus febribus ita laborant, ut nullis aliis medicamentis calorem restinguere possint, potanda exhiberi, nec non foris in epithemate cordi & jecinori, ut reprimatur calor impenus, admovent potest. Eadem ardori capitis, quam syriasin vocant, maximè infantium, efficacissimè magno experimento in linteolis imponitur. Quod si aqua distillata non suppetat, succus fumatur, parique ratione usurpetur. Aqua stillatitia & succus immaturæ Cucurbitæ, non tantum aurium dolori infillatu auxiliatur, sed & oculorum, omniumque aliorum membrorum inflammationes & podagras refrigerant. De Cucurbita ita cecinit Pœta:

Succi aquei, cursu rapidique Cucurbita, bilem

Incit, & illa cum non bene cocta ciet.

Quam bene gratæ tamen, cuiusq; admixta secundat.

Huic externa magis quam sua forma placet.

Cucurbitæ folia recentia, secundum Matthiolum (ex Cardano) jumentis illita, affricatq; muscas abigunt. eadem mamma puerperarum admodum lacificant. Oleum q; de Cucurbitarum floribus paratur, iis in oleo diutius insolatis, renum calores inunctum extinguit, & capitis dolores, præsertim in febribus mulcet: aridæ cinis ambusta, & pudendorum ulcera sanat. Estur passim Astate in cibis cum jusculis elixatum quoq; in oleo, aut butyro fixa, farina prius circumlita, & acerbæ uvæ succo aspersa. Si infanti dormienti paris longitudinis Cucurbita, vel etiam Cucumis, inquit Dodonæus, in lectulo adjungatur, & febricitaverit, mox à febris liber erit. Editur & Cucurbitæ pulpa cocta, quæ facillè subdidet, præcipuè autem elixa, quæ & præter substantiæ suæ lubricitatem, tum & humiditatem, alvum emollit. A. C. sa vel frixa quàm plurimum de propriâ humiditate deponit, atque idcirco minus facillè descendit, nec alvum adedè citè emollit. Semen urinæ acrimoniam contemperat, & eandem mediocriter provocat. Quidam (teste Amb. Pareo) dicunt suā industriā loco ex lecti cranij se supponere frustum corucis cucurbitini exsiccati, ac coalescere, decipientes in eo ignorantes. Diximus ante Cucurbitarum cortice carne exinanito peregrè proficiscentes ureorum vice frequenter uti, in eo vina condientes, quo per iter se à litis injuriā vindicare possint. Cæterum notissimam ait Lobelius, & de Cucurbitarum genere condituris aptissimam, arguinam vocatam. Hanc maxima copia in taleolas longas dissectam, saccharoque conditam, Lusitanos, Hispanosque venum in Septentrionem adferre, vocatq; Carbafadesiticulosos & æstu febrili vexatis gratissimas offulas esse.

Vnguentum ad achores singulare & certum (si Timot. Roess. credimus) recipit Cucurbitam, in qua oleum Olivarum fuerit, admovent igni, scutella terrea excipit stilans oleum, cujus capit drach. iij. & tantundem Salvie silvestris, coquendo simul in patella terrea nova, dum incipit bullire, tunc ceræ & cinerum Ficis nigre, singulorum drach. unam injicit, statimque ab igne demit, agitâque donec res-

Tenera in cibis immaturis.

Aq. distillata. Febri ardens.

Oculorum dolor ex inflammatione.

Ex Mart. Muscam abigunt. Lacificant.

Calores extinguunt.

Infanti febricitanti.

Vrina acrimonia.

Impositura quorundam de cortice supposito pro cranio.

Vices cortex substit.

Conditura apta.

Carbafade.

Vnguentum ad achores.

frigeratur. Cum verd uti necesse est, in aceto decoquit fuliginem, quo abluit caput, existat, deinde inangit unguento, semel in die, tertio quoque die lavat per mensem & sanat: cum pili apparent, inungit melle calido.

CUCURBITA LONGA, FLORE albo, protuberante ventre.

Defcr.

ANNO 1609. sub finem Septembris ex horto Princip. Montbelg. allata fuit Cucurbita, quæ longitudine sua plus quam tres spithamas equabat, ventrem oblongo orbiculari ferè, nisi lacune quædam depressiores, costarumque obscuriorum secundum longum præcurrentium finis aliquid adimerent, ambitus ventris duas spithamas & semissem ampliatur, ad extremum quadam sui particula in unum magis latus vergebat, inclinabatque: collum cum capite spithama longius protendebatur, ambitu suo spithamâ latius ampliusque extiterat, in medio tenuius, caput crassius teretiùsque evaserat, in eam ipsam, quâ ventris prius extremum, partem magis inflexum torquebatur, incurvabaturque, levis erat undique superficies, colore albo in luteolum tendente, pediculum capiti infixum gerebat quadrangularem, & aliquantulum Helicis in morem intortum ærebat, in quatuor dein superius alias propagines multiplicabatur. Aperta carnē veram proximam cortici unciam crassam obtinebat subflavescentem, subdulcem & aquosam nondum plenè maturam, reliquam carnem albissimam, spongiosam, mollem intra se additam condebat, cuius substantiæ longâ serie inhærescebant semina foris albidâ, duriuscula, tunica albâ, pellucidâ, humidâque donata, cum appendice ab eadem orta longiusculâ. semina contracta sublutea sunt interiùs, medullâ destituta, humore tamen aqueo repleta ferè, dulcia, esùque jucunda.

Colim.

Cava.

CUCURBITA LUTEA, COR-tice tenero.

Cucurb. Siciliana.

Cucurbita hæc lutea vix utraque manu amplecti potuit palmam alta, Martio sulcis latis & costis itè sulcos, cortice tenero, carne pallidâ, sapore aliarum Cucurbitarum. Est de genere, ni fallor, Cucurbitarum Sicilianarum capreolis carentium. Semè habet parvū, subrotundum: duravit ad Aprilem.

CUCURBITA OVALIS FERÈ, variegata, parva.

Provenit Montbelgarbi in horto E.C. Cucurbitæ genus parvum, longitudine palmari, ovali ferè figurâ, quod manu amplecti non poterat. Hæc ut Cucurbita amara pyriformis maculata est, minùs tamen ruffa, lineis etiam latoribus multò & magis albicanibus, maculis etiam pluribus: carne albicante, saporis aliarum Cucurbitarum.

CUCURBITULA PILÆ PALMARIS non multò major, rotunda.

Defcr.

Cucurbitulæ species minima rotunda, pilæ palmaris non multò major, lecta fuit in horto E.C. Montbelg. anno 1607. Octobri mense. Foris erat cortice tenui, fragilique, viridanti colore in summitate circumquaque imbuta, ad regionem autem petioli viror ille saturator sensim dilutus cernebatur,

& in petioli ambitu partim luteola, partim etiâ albicans videbatur: caro ipsius interior dulcedine perfusa sentiebatur, cui semina multa interjecta hinc inde sparsim fuerant, reliquis Cucurbitularum seminibus consimilia, quibus decorticatis pulpa alba simul & nonnihil flavescentis conspicietur & ad dulcedinem gratam tendens. Hoc semen Româ delatum per D. ab Andlavv, Canonicum Moguntinum, nobisque communicatum fuit.

CUCURBITA FOLIIS ASPERIS, sive Zucha flore luteo.
CAP. II.

Defcr.

Vlgatis notitiæ Cucurbita, flagellis sarmentisive longissimis, canaliculatis, modicè concavis, crassitudine pollicari, asperis, latè vagatur, & periticas, si quas nasci est, capreolorum innixu & voluminibus scandit: folia larga, Cucurbitæ flore albo longè majora humioraque, siculneis laciniis, aspera, atro vitore splendentia, & per ambitum serrata, ex pediculis dodrantalibus, solidis, modicè canaliculatis, & spinulis horrentibus: flores nonnihil odorati, fundo acetabuli

CUCURBITÆ ASPERÆ instar, in quinque icones quinque.




ICON II.



linea elata, costæ instar, pulpâ candidâ dulci & suavi.

Magna

ICON III.



ICON IV.



ICON V.



Tom. II.

Magna sanè turba est & penè innumera Cucurbitarum folio aspero, quarum duas icones ex iis quas jam sculptas emisimus præmittimus: Tres quæ sequuntur sunt etiam ex imaginibus à nobis emptis. Secunda à nobis proposita, est apud Dodon. lat. in fol. nomine Peponis majoris oblongi. quartam ponit pro Pepone rotundo minore: Eadem apud Tragum extat sub titulo Cucumetis, sive Zucconis marini.

Tragus de Cucumere, seu, ut vulgò loquitur, Zucco marino hæc inter alia prodidit. Intra paucos annos quamplurima peregrinarum stirpium genera è longinquis regionibus in Germaniam deportata sunt. Inter cætera verò, & hæc poma æstiva, quæ unà in Æstate totâ suâ substantiâ adoleſcunt, florent & maturantur, ad nos commigrarunt. Eorum nonnulla magna, alia parva, quædam rotundæ figuræ, aliæ oblongæ; rursus hæc dulcia, illa amara; quædam cerea seu aurea, alia luteola, sed pallida, nonnulla candida evadunt. Omnium verò eadem ferè folia, idem caulis, iidemque flores, licet hæc in his majora, in illis magis exigua appareant. Flores quidem ferè duplices, luteos, cymbali formam præsentantes, quorum priores nullo post se relicto fructu decedunt. Qui verò supersites manent, campanulæ similes, odore

suavi præditi, cum corrugari cœperint, jilicò pomus fructus consequitur, alius oblongus, alius rotundus, alius lavis, glabèrque, alius multis crassiusculis & prominentibus quasi costis striatus, alius albus, alius ex pallido luteus, alius nigricans, qui tamen cum Autumni tempore maturaverit cerei efficitur coloris. Porro omnium horum generum poma, corticem seu cutem exteriori lignosam habent, intus crocei sunt coloris, maxime ea quæ foris nigricant, lato & dulci semine referta, ita ut ducenta unum quandoque pomum contineat. Porro quod inter semina & corticem in omnibus generibus medium est, præstantissimum censetur. Quæ candida, foris & quæ ex pallido lutea sunt poma, carnem habent candidam, Rapòque formâ & sapore similem. Univerſa verò eorum generata durare per annum possunt, nec interea temporis putrilagini obnoxia sunt, siquidem ritè legantur, eaque quæ decet curâ conserventur. Postremò quòd in his pomorum generibus aureo nitet, seu cereo colore, subinde mutatur, nam vitidem rursus assumit colorem, quem mense integro servat, deinde aureum recipit, atque sic alternis mensibus, alio atque alio tingitur colore, quod non semel magnâ cum admiratione observavi. Sunt qui hæc poma Cucumeti adnuerent, asserantque Turcicos vocari Cucumeres, quorum sententiam probare non possum. Cucumeres enim omnes humide sunt qualitatibus, putrilagini facili obnoxii, quare diu durare non possunt. Ego vero hunc fructum, Summer Opffel / h. e. Mala æstiva, & Indianisch Opffel / h. e. Indica Mala appello. possunt verò cum multis eorum sint genera, ita suis appellationibus distinguantur, ut dicantur,

Mala Indica	{ Crocea Lutea Citrina Nigra }	{ Saffiangäl Fleischgäl Geldgäl Schwarz }	{ Indianisch Opffel. }

Vulgo Zucco marina dicuntur, quòd ex ultro-Zucco marini regionibus, partim ex Syria, partim ex India ad nos primùm venerint, quod testantur appellationes ipsorum. Vulgo enim Zucco de Syria, Zucco de Peru dicuntur. Et hæc habuit Tragus quæ de nomenclaturis hujus plantæ diceret, quibus nos haud contenti, certiora & magis probanda in medium adferemus.

Cucurbitæ folio aspero à Fuchſio Cucumeribus annumerantur. Alterius generis Cucumer est peregrinus, quem vulgus Turcicum nominat, vulgari multò major ac procerior foliis, floribus, & fructu, qui ut in vulgari Cucumere non est maculosus, sed tamen oblongus etiam, & admodum flavus. Et hinc est quòd multi eundem privatim Citrulum & Citreolum, quasi citrinum, h. e. flavum vocent. Hujus semina alba & lata sunt. Tertijs generis Cucumer est qui marinus dicitur, Turcico, quod ad folia, flores, & semina attinet, ferè similis, nisi quòd in hoc omnia sint minora: fructus verò rotundus. Vulgus Zucco marini vocat: Nec Cucumer Gallis Concombre ou Concombre marin: Officinis perinde atque Turcicus est ignotus. Et hæc Fuchſius qui Cucumeris Turci effigiem exprimit illâ icone quam secundo loco ponimus; Cucumeris verò marini imaginem illâ picturâ exhibet, quam quarto loco locavimus. Nos, ut liberè dicamus nostram sententiam, pronunciamus Fuchſium malè confuisse, miscuisseque Cucur-

bitam aspero folio cum Cucumere vulgari, Citrulo & Melonibus. Magna sanè est differentia inter Cucurbitam aspero folio & Cucumerem vulgarem. Turcicum verò Cucumerem ineptè vocari ait Citreolum.

Zucha quinquae Cordus
De quinque Zuchæ speciebus Cordus scripsit.

Zucha major longe, inquit, viticulis, foliis, capreolis, floribus, feminibus, radicibus & asperitate, grandi oblongæque Colocynthidi similis existit. fructu verò ejusque sapore ab illa differt. siquidem figura est longus, in longitudinis circumferentia viginti sex plerumque uncias complectens, latitudinis verò ambitu octodecim uncias raro excedit. Pondere autem quinque libras sex uncias superat, pediculo hæret crasso, anguloso, nigro, solido, & tactu aspero: à cujus annexu contigui inter se & tereti superficie exeunt anguli, ipsum fructum circa pediculum veluti crassioribus striis ornantes. colorem habet principio viridem, & candicantibus maculis confersum: in maturitate verò citrinum, superficie constat aliquantulum tuberosa, cavernosaque. gustu dulcedinem respicit. Colitur in hortis.

Zucha major rotunda, viticulis, foliis, capreolis, floribus, feminibus, radicibus atque asperitate jam dictæ longæ Zuchæ similis est, folia tamen figura aliquantulum ad Vitis & Ficis folia accedunt. Fructum fert globi modo rotundum, aut modicè in latitudinem depressum, crasso, anguloso, aspero, solidoque pediculo hærentem: longitudinis circumferentia viginti duas aut nonnunquam plures, paucioræve uncias complectentem, ambitu verò latitudinis viginti quatuor uncias nonnunquam excedentem, pondere autem quinque libras atque octo uncias habentem, colore & cavernosa superficie longam majorem Zucham æmulantem. saporem habet dulcem, aqueo succo dilutum. colitur ut longa. Zucha rotunda mediocris, viticulis, capreolis, foliis, floribus, radicibus, asperitate, atque omnibus aliis proprietatibus oblongæ & grandi Colocynthidi similis existit: fructum verò habet globi modo rotundum, aut modicè compressum: in superficie modicè, ita ut vix appareat, tuberosum, quàm grandis, rotundæ Colocynthis [Colocynthis Cucurbita amara] paullo majorem, pondere civilis libræ unius cum dimidia: principio viridem, deinde maculosum, in maturitate verò luteum: qui dissectus luteam carnem ostendit, & in medio ejus sex latorum, oblongorum, acuminatorum, candidiorumque seminum ordines, quibus candidus inest nucleus. Saporem habet fructus dulcem, semen verò dulciorem. scribitur prædictorum modo. Zucha rotunda minor, per omnia mediocris similis est, præterquam quòd folia latiora habeat, fructus autem minores, sed eminentioribus angulis striatos, & in superficie magis tuberosos, quorum etiam cortex multò lignosior & durior est quàm mediocris Zuchæ, carnem habent ferè croceam, & fenos seminum ordines. sapore mediocris Zuchæ respondet, cui etiam similiter colitur. Zucha magna rotunda, glabra, majoribus Zuchis viticulis, foliis, capreolis, floribus, feminibus, radicibus & asperitate similis est. fructum producit grandi & rotundæ Zuchæ figuræ similem, tam longitudinis, quàm latitudinis ambitu viginti duas plerumque uncias complectentem, pondere autem quinque libras duabus uncias excedentem, pediculo crasso, anguloso, aspero, nigro, solidoque hærentem, à quo eminentes prodeunt anguli, undique per fructus latera transeuntes, donec circa floris vestigium collecti, rursus conjungantur. colorem habet etiam circa maturitatem in

nigro subviidem. Si verò serenius & tepidus fuerit Autumnus citrinum colorem induit, quòd si cælum frigidum & triste fuerit, tepido loco fovendus est, ut citrinescat. Colitur prædictorum modo. Et hæc Cordus.

Gelsius hort. Zuccam marinam Italici vocant, Cucurbitæ speciem esse concludit, Zuchamve majorem rotundam apud Cordum Zucham Indicam Matthioli suspicatur. Sed & Matthioli Zuchæ Indici (ita enim inscribit) inter Cucurbitas refert. Sunt & alia, inquit, Cucurbitarum varia genera Italice peregrina, quæ diu per Hiemem recentes asseruari possunt. Ferunt has ab occidentalibus Indiis in Italiam venisse: una de Indiæ à pluribus vocitantur. His in post. comm. addit. Sed jam diu Italico solo proveniunt. Harum varia habentur genera, magnitudine, facie & colore differentia, referunt tamen omnes Melepeponum effigiem. Sed alia magnæ, imò maximæ, ventricosaque, alia parvæ, alia mediocres, & alia oblongæ, alia rotundæ, vario colore, quæ quidem omnibus notiores sunt, quàm à me describi debeant. Fructus decerpuntur Autumno & asservantur Hieme tota in eulinis. Semen in ventre condunt magnum, amygdalini nuclei figuræ, in quo nucleus concluditur dulcis & suavis. Saporis subdulcis, non ut nostratibus usque adeò insipidus: verùm gustui insuaves sunt, nisi præcipuis condimentis saturantur. In hist. german. & epic. cum add. ubi eadem leguntur, vocat (ut etiam Castor p. 490.) Cucurbitam Indicam, Ital. Zuchæ Indiane, oltramarine & marine.

Dodon. gall. vocat Cucurbitam aspero folio Peponem, eumque duplicem facit, longum & rotundum, ut ex iconibus patet. Longum vocat magnum [Pepon grand] iterumque duplicem facit, album, scil. & viridem.

Peponis 1. sive magni, ait, fructus est prægrandis, amplus & longus, duarum specierum, viridior niger, pluribus costis, cortice admodum duro, alter albus tectus cortice tenui, dulci.

Pepon 2. sive rotundus, folia habet minora, non ita profundè secta: sed & caules minores sunt, & plerumque in terram decumbentes: fructus nonnihil compressus, unus viridis, alter albicans, in quo semen minus quàm prioris, sed majus quàm Cucumeris vulgaris. Hoc genus quomodo describat Dodon. in foll. lat. haud scio. Icon. hist. gallicæ secundo loco exhibita, sit tertia in lat. quæ descriptioni non respondet. Iudicent igitur lectiores, an Dodon. cognoverit plantas quarum habet icones & descriptiones. Peponum (inquit in hist. lat. in fol.) aliquot reperiuntur species, vel magnitudine, vel formâ differentes. Peponi majori oblongo folia ampla aspera, aliquot profundius incisuris divisa: flores auri colore lutei: fructus magni, crassi, rotundi, oblongi, crassioribus striis veluti angulosi: color corticis quandoque obscurè virens, aliàs albidus: virentis autem Peponis cortex durior est, ac veluti lignosus, albidus verò mollior ac tenerior. Alterum Peponum genus, Pepon rotundum major, caulibus & foliis utrique asperis, tum & claviculari priori simile est: sed foliorum fissuræ minus profundæ, caulisque teneriores: fructus globosi, rotundiores, modò majores, frequentè minores: & quandoque virentes, duriorisque corticis: subinde cute molliore ac albicante: semina aliquando minora. Hujus generis & tertius est Pepon, asperis caulibus, foliisque fissis ac serratis priorem referens: flos magnus quæque ac luteus, veluti aliorum: fructus mediæ magnitudinis, cujus cortex

Zucha rotunda mediocris viridis.

Zucha rotunda minor.

Zucha major rotunda citrina glabra.

Cucurbita

Zuchæ Indici

Cucurbita Indica

Matthioli

Peponum

Pepon grand

Pepon minor

Pepon rotundus

Pepon citrinus

Pepon asper

Pepon albus

Pepon viridis

Pepon niger

Pepon durus

Pepon mollior

Pepon asper

Pepon albus

Pepon viridis

Pepon niger

Pepon durus

Pepon mollior

Pepon asper

Pepon albus

Pepon viridis

tex tuberculis nonnullis exasperatus, veluti Mali citrei cutis, qui per maturitatem similiter luteus est, proinde & Citrium malum eum colore, tum asperitate referens. Quartii generis Pepo, sive latus, forma ab aliis plurimum differt: de hoc nos postea.

Græcis *πέπων*: Latinis similiter Pepo. *πέπων* autem omnes fructus perfecti ac maturi communi nomine dicuntur: unde Medici quidam, inquit Galenus, fructum hunc *πεπονίτωνα*, i.e. Peponem cucumeralem nominari oportere contendunt. Plinius lib. 9. cap. 5. Cucumeres, inquit, cum magnitudine excessere, Pepones vocantur: Germanis *Plüger* (in hist. gall. *Pfeben* nominari dixit.) Belg. *Pepoenen* / Gal.

Pepons, *Popons* & *Pumpens* vocantur. Majores à nonnullis Turcici cognominantur: Secundi verò Martii 2. ni: Tertijs Hispanici: Quartii lati. Hæc Dodonæus, cui an perspecta fuerint sua Peponum genera dubitamus. Icones enim non respondent suis descriptionibus.

1. ptonibus. Prima autem ejus imago in Hist. gall. & lat. exhibita, ponitur à nobis pro Cucurbita aspero folio secunda. Secundum ejus Peponem hist. lat. describit foliis esse fissis, cum tamen icon foliorum fissuris careat: Hunc nos putamus in hist. gall. non describi, esseque Cucurbitam, quam fructu maximo

3. folio non fisco cognominamus. Tertia quoque effigies in hist. lat. quæ in gall. pro secundo Pepone datur & describatur, ut Tertium Peponem exprimeret, fructus tuberculis exasperatus, ut in descriptione habetur, pingendus erat, & Citro similis.

4. De quarta iconem, latorum Peponum, quæ in hist. gall. tertio loco posita fuit, agemus sub titulo Cucurbitæ clypeatæ affinis ovalis ad Citrum accedentis.

Cucurbitas aspero folio Lobel. in Advers. talibus descripsit verbis: Sicyopeponibus, Cucumeribus, Peponibusve oblongis, sive ovalibus, vulgarissimis, hortorum ruralium nullus vacat, eodemque vocat cuncta Germania & Anglia Pepones magnos, admodum Meloni vel Citrullo similes. Variant verò compressi, rotundi, Melonis effigie, folio minori, minisque incisis: cortice delicatior glauco, vel albedo, nitente: semine albo Citrulli. Latiores clypeiformes nihil proliam dissimiles in ramis & foliis. Minus autem distinet scribit Lobelius de his fructibus. Nos Cypseiformes ut & strumofum aliò referimus. In Obs. p. 363. Icon. p. 641. dedit Peponis oblongi vulgarissimi iconem, quæ ad nostram tertio loco positam accedit: nomen germanicum *Pfeben* non placet.

Suspiciamus Tabernomontanum per Peponem maximum oblongum intelligere Cucurbitæ aspero folio genus, quamvis ponatur capite de Melonibus: Itaque per Peponem Indicam minorem oblongum. Videtur nobis etiam Cucumis ejus Turcicus nihil aliud esse, quam dictæ Cucurbitæ picturam, accedentem ad nostram iconem primam.

H. Luf. Cucurbitam Indicam majorem & minorem tradit. B. phyt. & pin. Cucurbita 1. sive major rotunda flore luteo, folio aspero: Cucurbita Indica, Matth. Cast. Zucca major rotunda, Cord. hist. Cucurbita Zucca marina Italica vocata, Gels. Cucurbit. rotunda, Cxf. Cucurbita Indica rotunda, Lugd. Cucurbit. Indica major & minor, Tab. Citrullus major & Pepo major sylv. Ger. quoad iconem.

Varia hujus genera, magnitudine, facie & colore differentia: earum namque quoddam genus est, quod utrisque ulnis vix amplecti potest, & in insula S. Laurentij ejusmodi colore rubro, flavo & albo,

& saporis longè gratioris atque nostrates ubertim proveniunt. Palud. in notis ad

Linscot. par. 2. Ind.

or. c. 5.

Tom. II.

CUCURBITA ASPERO FOLIO.
flore luteo, semine in morem
intorta.

Cucurbita hæc nata fuit in horto Montbelgard. Deser.

Anno 1607. in Autumno matura facta, uncias circiter novem longa, parte superiori longiori tenuiorque duas circiter uncias in latum porrigitur. Superius à pediculi regione deorsum versus ad quatuor plus minusve uncias in longum protensa, sensim à graciliori habitu ad crassiorem extumescit, undique rotundatur, atque in morem semiarctæ intorquetur, in quibusdam verò ut in unum latus arcuatur, sic in oppositam assurgit: colore in virenti adhuc recentique fructu saturato virore nigricanteque conspersa, matura autem, reservataque diutius flavescit, extremis tamen ejus partibus adhuc viridantibus: superficie per omnia laevi, nullisque extuberantiis asperata, nisi una alterave verruca occurrenti. observantur etiam in toto longitudinis tractu costæ plurimæ à suprema parte ad inferiorem protensæ, neque tamen superficiem æqualem excedentes, asperioresque reddentes. Inferior ejus pars latior est tres uncias, ventricosisque & rotunda, costisque, ut superior, exarata, quæ tamen in nigrore illo viridis saturatoris coloris ferè oblescant, sub finem appendicula cernitur protuberans papillæ mammaram persimilis, in medio albescens.

Cucurbitam folio aspero, flore luteo, fructu non *Cucurbitæ* *quædam aspera.* magno, ex albo ad cinereum vergente, Augusto mense vidi in Ducatu V Wirtemberg. in pago Boll dicto, prope fontem admirabilem.

Cucurbitam folio aspero flore & fructu omnino nigro observavi in horto D. Jo. Lutz Pharmacopæi in urbe Kirchen.

Data fuit olim ab eodem Lutzio Cucurbita tenuis, longa, sesquicubitalis, circa medium angusta, costis magnis, & colore virente celebris, maculatave.

Novimus tandem Cucurbitæ folio aspero parvum genus, fructu non multo majore pugno, rubro, cum quibusdam maculis. Et hæc est Cucurbita 8. Bauhino in pin. sive Cucurbitæ parvum genus, fructu pugni magnitudine, cortice rubro, maculis aspersa, & semine rubro, Joh. Bauhini.

CUCURBITA ASPERA, FOLIO
non fisco, fructu maximo, albo
fessili.



Fructus magnus, Deser.

Caput ferè æquans, si rotundus flet, & non compressus, angulosus est & candidus: folia aspera cæteris similia, sicuti & flores lutei. Observavi in Brisgola & Cuten (schem arce illustr. equitum R. hodiensium, nondum maturu August. Hoc Cucurbitæ genus, aut simile diligenter consideravi in Abbatia Mafminter mense Octobris, fructu maximo.

T 2

specioso, quem narrabant interdum ponderare ad triginta libras. Albus erat, utrinque sessilis, costis eminentibus & latis distinctus: folia licet sint aspera admodum, differebant tamen ab aliis, quod non essent laciniata & hilla, sed rotunda, ferè ad folia Personatæ sive Bardanæ accedentia.

Pepo max.
Ind. com.
pressus Lob. Lob. obs. & ic. inscripsit Peponem maximum Indicum compressum: magnitudine à superioribus differentem, interdum 80. libras pendentem: foliis rotundioribus.

Pepo rotundus maior.
Ded. Dod. lat. eandem cum Lobelio iconem habet, nomine Peponis rotundi majoris: verum ut ante monuimus descriptioni non respondet iconi. Cæl. dicitur Melon sive Pepo modicè depressa & sessilis. B. phyt. & pin. Pepo 2. compressus maior, corticis colore & substantiâ varians; qui enim albedo est colore, substantiâ est molliore: qui obscurè virente, duriore.

CUCURBITA VERRUCOSA.

Cucurbita verrucosa
fructu ab aliis differt.



Cucurbita verrucosa Dalechâpio apud Lugd. ea vocatur, quæ aliis Cucurbitis, radice, folio, flore, capiteoliq; similis est, sed fructu differt, qui in aliis lævi & plano cortice tegitur, costis tamen in Indicis e-latis & eminentibus, in hac verrucarum acrochordonum modo nodis plurimis tuberosus est, ludentis lascivientisq; naturæ vitendo spectaculo.

B. pin. Cucurbi-

ta 7. (6. in phyt.) verrucosa Lugd.

Montbelgardi sata nobis provenit in horto E. C. V. virt. coloris albi.

Coloris albi.

An Sicyopepon strumosa Lob.

Considerandum an ad hanc Cucurbitam verrucosam, referendus sit Sicyopepon, vel Cucumis Pepon Lobelij strumosa, de quo in Adv. ait: Perelagans & rarus, folus alioqui ficulneis proximis, fructu Melonem magnum æquante, sed Limonia mala exprimente, tuberosoque cortice papillatum variegato: speciosa item tricolori strumarum bullatione: semine non dissimili, Sicyopepombus putata sive Cucurbitis folio aspero.

CUCURBITA SESSILIS FLAVESCENS folio aspero.

Deser.

Hæc Cucurbita flavescens est novem uncias in longum porrecta, diffusa verò novem uncias in latum, undique lævis, nisi ubi verrucosæ quædam eminentiæ, modò majores, modò autem minores, modò etiam duæ tresve in unam quasi corpus coalescentes, lævorem ejus exasperaverint: costas lævi impressione à se mutuo distinctas diversimodèque latis obtinet, latitudinis in medio sui ventriosi corporis sesquunciam latæ sunt, ad partem verò illam lævorem, cui in medio flos caducus

adnatus affixus erat in angustius contrahuntur, sed tantæ ibi latitudinis redditur ipsa, ut novem quocunque uncias æquet, itaque complanata est, ut toti Cucurbitæ sessilis nomen tribuerit, quod quasi humi projecta sedere videatur: pediculus ipsius inflexus, virelscens, asperior & octangulus est: pulposa ipsius substantia interius duas plus minùs uncias lata est, pallescens: cujus dein medium spaciū in totum complent fibrilla filamenta plurima seminum magnam copiam appensam inter se condentia: cortex durus.

Exprimitur hæc quodammodo iconem, quæ posita est sub titulo Cucurbitæ latioris folio molli, quod fructum attingit: folia autem diversa sunt, quia aspera, sicuti & flos.

In horto E. C. durant adhuc folia sequenti anno Lucum. mense Ianuario.

CUCURBITA SESSILIS ALBICANS folio aspero.

Cucurbita hæc sessilis teres & albicans senas & Deser. amplius uncias longa, octoq; in latum diffusa est ad floris regionem planiorem, costas habet sursum deorsumque summo lævorem politas, nullasque nisi quandoque duabus ad summum verrucosis per obliquum ventriosi corporis tendentibus eminentiis, asperiores redditas, superficialibusque sulcis ad invicem commissas: utque ad pediculum angulosum in angulum coarctantur, sic vice versâ in parte subjecta ipsi è diametro opposita in latum primum diffunduntur, donec ad floris ambitum undique sinuosum angustioribus suis finibus rursus coarctentur. In horto, &c. Non multum differt hæc à præcedenti flavescente.

CUCURBITA MEDIO-CROCEA.

Cucurbita mediocrocea variat magnitudine. Cucurbita Nam aliàs ad capitis humani magnitudinem accedit, sæpè etiam minor est. Coloris quoque situ variat: communiter enim mediâ parte sui superiore vel inferiore, vel laterali crocea sunt poma, reliquâ viridia, pallidis maculis aspersa: fit tamen ut aliquando de hoc, aliquando de isto colore magis participent. Quæ junguntur colores, virides velut pidatum regionum alpes in croceo elevat: cortex item durus, firmus, lævis: caro firmiuscula, sapore cucurbitino, subdulci: semina alba, magna, per ambitum fimbriata.

CUCURBITA ASPERA MEDIÆ magnitudinis, turbinata variegati coloris.

Cucurbitæ asperæ genus mediocritatis magnitudinis ferè pyriforme, variegati coloris provenit in horto E. C. quod suspensum in hypocaufto duravit totâ Hieme. Semina parva subrotunda, qualia ovati.

CUCURBITÆ TURBINATÆ majores albæ.

Non is missi tres fructus Basileâ à D. Jacob. Zvingero, quorum duo sex aut septem unciarum, pyriformes, basi ventriosâ, propter pediculum turbinatâ, & aliquantulum angulosâ: super-



superficies lavis est, ex luteolo pallida: caro unciam ferè crassa. Cucurbitæ vulgaris aspero folio insipida penè, gustique aqueo: semina ovata sunt, sapore dulci, grato. His similis tertius, nisi major esset, & turbine latiore & minùs acuto, ac quibusdam tuberculis, vel verrucis rariùs oblitus: Huic adaptamus figuram Guarinianam hunc fructum nostrà opinionione satis commodè exprimentem.

CUCURBITA ASPERA
pyriformis, parva,
alba.



Cucurbita pyriformis foliis est asperis: laciniatis; caules longi cum capreolis per terram sparsi, Cucumerum modo: flores latei duplices, steriles & fructiferi, ut in cæteris Cucurbitis aspero folio fructus pulcher, copiosus, albus, politus, longus uncias quinque vel sex, superius angusto collo, infra ventricosus, qui manu completi potest: cortex, ubi maturus, durus: caro pulposa, dura. saporis cæ-

terarum: semina qualia illis parva, lata, compressa, medullam dulcem & albam includentia.

An Ger. & Tab. Pyromelo, Byren Melonen. In hist. non describit, & cum Melonibus miscet. An B. pin. Melo 4. pyriformis.

Nulquam observavi nisi in horto Illustrum Equitum Rhodiensium in Heisterischen Briscoia, ubi mense Septembri supra terram sparsa adhuc florebat.

Hortulanus assererat comedi copiosè teneras cum oleo, aceto, pipere, & sale Cucumerum modo. Minùs tamen sunt palatui meo grati, illis enim peculiaris sapor.

CUCURBITA ASPERA
minima, turbinata, pal-
lida,

Clariss. Plateri munere & hanc habemus Cucurbitulam obiter turbinatam, cortice sub-

pallido, h. e. in flavum albicante: carne subduci: at semine oblongiore quàm Cucurbitulæ sphaericæ, in subflavum etiamque in citrinum vergeñte.

CUCURBITA ASPERA TVR-
binata, subcrocea.

Haud ita pridem ex Italia delatas binas Cucurbitas accepimus, æqualis ferè magnitudinis, pugno vix capaces, in pyramidem affabrè turbinatas, adeoque quàm proximè ad formam Pyrorum, à Germanis Spessbirt / quasi lardina dictorum accedentes, nullo collo angustiore, ut in cæteris Pyriforibus, testâ subfirmâ, cui obducta cutis lavis admodum & subcroceo lavore splendens: profusè eleganti & rariori facie. Caro qualis in cæteris, sed paullo dulcior. Semina minuta, candidissima, subrotunda, cæteris Cucurbitæ generibus ventriosiora. Plantam nondum vidimus: ubi semen terræ commiserimus, tum demum ejusdem formam describemus.

CUCURBITA ASPERA
ovalis, flavo colo-
re.

Minoris Cucurbitæ asperæ species perelegans. Defer. Ovalis Cucumeris mascululi penè magnitudine & figurâ quodammodo, spithamam longam, quam una manu non amplectaris. à pediculo per ejus longitudinem læves & obscuri quidam sulci descendunt: cortice est lævi, flavo, nec crasso testâ, & parum duro; circa pediculum angustior, parte oppositâ obtusior: colore est ex flavo croceo: caro cucurbitina, flavescentes, digito non crassior; insigni cavitare semina itidem cucurbitina, parva, sed subrotunda claudit, qualia Pyriformis variegata. Ejus planta tota aspera est & flore luteo.

Fructus calido loco suspensus fert Hiemem ad Lucan. Aprilen usque: sapor qui reliquis Cucurbitis: sata provenit in horto E. C. Montb.

CUCURBITA ASPERA PV-
gillaris, ex rotundo ob-
longa.

Haud inelegans Cucurbitæ genus in horto Montbelg. crevit ex semine, nescimus unde importato, quod majoris Pomi magnitudine ex rotundo in ovatam tendit figuram, cortice pallido subflavo. Caro uti cæterorum, subdulcis, ejus admodum grata.

CUCURBITA ASPERA MI-
nima sphaerica, crocea, va-
riegata.

Clariss. Platero Cucurbitæ parvæ admodum genus accepimus, sphaericum ferè, flavum, & croceo emblemate Damasceni Pannosetici in morem pulchrè variegatum: caro dulcis ut cæterorum, crassiuscula: semina ex rotundo oblonga, candida, mediocria. Huic similis quædam amara descripta.

An Pepo
Ind. minor
Tabern.



An est Ger. & Tab. in ic. & hist. (sine descriptione) Pedo Indicus minor rotundus, Flein rund Indianisch Peponen.

An B. pin. Pepo 4. rotundus Melonis effigie: Pepo oblongus, rotundus, luteus, viridis, Trag. Pepo sylv. Dod. Pepo rotundus compressus Melonis effigie, Lobel. & Lugdunen.

CUCURBITA ALBA ASPERA, fructu longo collo.

Deser.

Cucurbita hæc, folio asperiori inumbrata, octo uncias longa, lagenæ figuram similem representat. Collum ipsius à petioli initio ad ventris confinia tendens, rotundo capite donatum, æquabile est, nec ullis striis intercurrentibus exasperatum, tres cum semisse uncias longum, unam unciam cum dimidia latum: venter majoris & oblongior ovideam referens, longus est uncias quinque & aliquid amplius, unciam verò unam & aliquotulque ulterius jarus densiusque, multis itidem asperioribus sulcis inæqualior redditus, sed lævorem quandam tactui gratissimum, per omnes suas partes ad capitis usque teretis extremitates exhibens: paucis iisque minutioribus alicubi tuberculis aspersus: cortice duro. Provenit Montbelg. in E.C. horto.

CUCURBITA LAGENAM EXprimens, parva, aspera.

Deser.

ANNO 1606. in horto E.C. crevit Cucurbita lagenulam exprimens, sulcata, palmum longa, ac etiam brevior, quam una manus amplecti non poterat, cujusque pars inferior haud sessilis, sed veluti umbilico protuberans ad unciam semis; superior autem longum, curvum, satique angustum collum præ se ferens: color externus albidus, non nihil flavescens: pulpa flava: semina parva, inæqualia.

CUCURBITA ALBA VERRUCOSA.

Cucurbita hæc anno 1605. Martio mense ab aff. sine Lutzio accepta, semicubitalis erat, alba, angulosa, sessilis, costis multis interstitiis latis elevatis, tota verrucosa: cortex tenet: semen magnum album.

CUCURBITA VERRUCOSA parva.

EX Sicilianis sine capreolis, ni fallor, hæc una erat, tota verrucosa, infantis capite minor, & quodammodo pyramidalis, palmum alta, lutea: semine lato.

CUCURBITÆ FOLIO ASPERO plantatio.

Cucurbitæ folio aspero semine quotannis in hortis optimis & apricis proveniunt. Plantatio eorum sic se habet. Aprili mense lata & dulcia semina (quæ Amygdalo putamine detractio ac purgato conferenda rectè duxit Tragus) in pinguidolo panguntur, sed non nimis profunde, cubitali interstitio ab invicem distantia, sequuntur enim latum spatium, siquidem feliciter provenire debeant. Decimo à satù die erumpunt, eruptione binum foliorum Cucurbitis similia, inter quæ alia majora aspera, & nigricantia, formâ Malvam Romanam seu hortensem referentia profluunt. Cùm ergo in caules & viticulas planta hæc exierit, quod unius mensis spatium sit, tum suffulcire illam ac in altum adminiculis promovere oportet, quod nisi feceris, brevi totum agrum obducat, solet enim se longè latèque diffundere, flagellisque suis pernici reptatæ vicinis se alligare fruticibus veluti Bryonia. Fructus durare per annum possunt, nec interea temporis putrelagini obnoxia sunt, siquidem ritè legantur, eaque quæ decet curâ conserventur.

Quandoquidam autem longo tempore à putrelagine tuta sunt universa hæc pomorum genera, necesse est, ut mediam quandam inter frigidum, calidum & sicum, temperaturam obtineant. Possunt ergo non tantum in cibo, sed & medicinâ usui esse. Omnium horum pomorum caro, à cute & interna medulla purgata in olla cum aqua modica, sale & butyro decoqui potest, quo ritu Rapas & Mala decoquimus, èstque hic cibus non contemnendus, quod si loco aquæ vinum iis adjicias, gustum suaviorem obtinebunt, Mâlique decoctis similem. Ex semine putaminibus repurgato juscula dulcia parantur, instar jusculi Amygdalini. Hæc decoctio stranguriæ, calculo, ardori urinae apprimè conducit. Si quæ alia hujus plantæ sint juvamenta, ea progressu temporis cognoscere fortè poterunt. Cucurbitas Indicas, cùm subdoli sint sapore, credidit Mattheolus primo excessu refrigerare, & humectare secundo.

CUCURBITA CLYPEIFORMIS five Siciliana, Melo pepon latus à nonnullis vocata.



Cucurbita hæc Deser. Cereceta provenit absq; capreolis: folia profert Cucurbitis folio aspero nò multum dissimilia: fructus fungum representans tenero est exterior cortice, carne luteola, firmâ, saporis aliarum Cucurbitarum, semine pennè circinnato, palmam manûs ferè implet: labra reflectuntur & crispantur. In hypocausto duravit ad mensem Februarium, deinde putrescere cepit.

Memini & hoc, & aliud Cucurbitæ hujus generis in horto E.C. Montbelgardi observasse non rectum, longioribus ramis se spargentibus, quale pingit

git Dodonæus, qui eandem cum Lobelio iconem habet cum in Eriptione Peponis latioris fructus.

Lob. autem in obl. & ic. p. 542. Melopepones latiores clypeiformes vocat, & de his in adv. ait: Si-cyopepones, Cucumeres Peponesque latiores cly-peiformes nihil prorsum dissimiles in ramis & foliis [à Si. yopepone compressi, rotundo] horti alunt, rotunda galeri specie, aut clypei umbilicati, & ambitu ri-moso, atque plicis fimbriisque rugoso cortice, deli-cato, & concolori, nec diversi saporis à prædicto.

Gefn. in ap. hort. vocat Cucurbitam sessilem, ra-ram, albam, latam, compressam ab altera parte, pau-lò majorem Cucumere, marginibus partis latioris crispis veluti fimbriis eminentibus.

Nominavimus nos aliquando Cucurbitam Sici-lianam, & cum quibusdam germ. Muschel Kürbß. Primum nobis visâ Tubingæ & Esslingæ, unde semen delatum feliciter provenit in horto patris p.m. anno si hunc recorder, 1561. Ego autem hæc scribo anno 1606.

B. pin. Melopepo 1. clypeiformis: Pepo latus, Dod. gall. latioris fructus, Eid. & Gefn. h. Cucu-mis, Pepove latior clypeiformis, Lob. adv. Melo-pepo latior clypeiformis, Lob. ic. Cucurbita laci-niata Dalechampi, Lugd. Cucurbita sessilis, Gef. app. Melopepo clypeatus, Tab. Pepo maximus clypeatus Ger. Nos de Pepone lato Dodonæi postea sub Cucurbita clypeiformi cortice molli, & ramosa mox plura dicemus.

Sicyopepones latiores clypeiformes in talcolas scissos, fructusque in sartagine, & farinâ asperfos, suaves admodum mandunt, in Belgio, Gallia & ali-bi, ut refert Lobelius.

CVCVRBITA CAPITATA TA- bernontani sive clypeiformis.



Pingit Tab. Cu-curbitam hanc capitata, Bopff. l Kürbß / cujus icon multa habet simi-lia, cum Cucurbita clypeiformi sine ca-preolis, sive Sicilia-na, cujus etiam hæc genus est, quod mi-ror à Compilatore alio capite fuisse positum.

B. phyt. dicitur Cucurbita 5. Eid. pin. Cucurbita 6. capitata: Cucurbita sessilis alba lata, ab altera parte com-pressa, Gefn. h. Cu-curbita capitata, Tabern. Cucurbita

fungiformis, Ger. Cucurbita stellata sive sessilis, Cam. Cur frater inter capitata Tabern. & sessi-lem (prædictam) Cucurbitâ Gesneri non distinguit.

CVCVRBITA CLYPEIFORMIS cortice molli, & ramosa.

Hic fructus saturæ flavodinis, latam, planam-que ferè, circa petiolum viridem, asperam, an-gulosamque superficiem gerit, unciam circiter la-tam: mollem item corticem habet, raris sulcis exa-ratum, extremam circumferentiam multis quasi lo-

bis mollioribus, rotundioribus, sibi invicem succedentibus exornatam obtinet, supremam partem di-midiæ sphaeræ, depressæ tamen undique, minùsque



convexæ similem exhibet, inq; me-dio sui fovcolæ ali-quam decidui flo-ris latorem aspe-rioremque sedem spectandam offert; cortex corrugatur successu temporis: duravit ad Februa-rium menslem: ca-ro firma lutea: se-mina parva, citci-nata ferè, inæqua-lia.

An Dodon. gall. An Pepo la-
Peponum tertia
species, Pepo la-
tus, gall. Pepon lar-
ge, belg. Bredde
Peponen / & alius
Melon de Turque,

Torcsche Melonen valdè similis Peponi rotundo, ramis procumbentibus, foliis & floribus, caulibus tamen non ita asperis: fructu compresso, lato, & rotundo, tecto cute leni & tenui, rugato, in margine clypeum exprimente: semine albo, simili Cucume-rino, majore tamen. De Pepone lato in fol. lat. hæc scribit: Quarti generis Pepon, latorum Peponum nomen obtinuit: Ejus caules, folia, florèque alio-rum Peponum similes sunt: fructus autem haud longus, aut globosus, verùm latus & quodammodo planus, scuto alicui propemodum similis; in medio quidem crassior, per circumferentiam verò tenuior, & quibusdam locis reflexus, crispiorum instar; cor-tex hujus mollis, tenuis ac candidus est; caro inte-rior satis dura ac durabilis; semen quàm Cucumeris majus, formâ & colore conveniens: quia durior ca-ro Peponum latorum idcirco diutius, quàm reliqui asservari queunt. Et hæc Dodonæus, qui tum in hist. gall. tum lat. iconem exhibet plantæ non surrectæ, aut sponte se sustinentis, sed ramosæ & procumben-tis, cui capreoli, quibus præcedens destituitur, in qua fructus, quales descripsimus ante, negleximus tamen observare qualis esset planta: hoc certò me non fugit fuisse in horto E. C. Cucurbitas fimbriatas procumbentes & se latè spargentes, sed illud non observavimus an capreolos habuerit: Præterea in hist. lat. ponit, ut diximus, præter modo dictam a-liam iconem, nomine fructus Peponis lati, quæ ca-dem cum Lobeliana, de qua ante.

Peponis Indici minoris clypeati (Klein Indias Pepo Indi-nisch Schult. Peponen) icon apud Tabern. non mul-tum differt ab iconè Dodonæi, capreolos habente.

B. pin. Pepo 6. minor clypeatus: Pepo Indicus mi-nor clypeatus, Tab. Pepo Indicus fungiformis, Ger.

Lati Pepones eduntur non modo clixi, sed & in v. su. pingui aliquo fructi. Descendunt verò & per alvum haud segniter. alimentum autem adferunt, quale a-liorum Peponum, i. e. Cucurbitarum folio aspero.

CVCVRBITÆ CLYPEATÆ AFFI- nis, sive Sicilianæ genus parvum, utrin- que obtusum, quibusdam Me- lo-pepo rotundus.

In horto E. C. anno 1606. provenit genus Cucurbi-
tæ, quam Sicilianam vocamus. Ea pugno major Desfer.
est, uncias quatuor vel quinque longa, utrinque pe-

ne sessilis, magno Granato non multò maior, sed elatior, alba, costis uncialibus ex internodiis parvis distincta: cortex mediocriter durus: semina parva qualia ferè Siciliæ sive Cucurbitæ fimbriatæ, provenit in horto Montbelgardensi.

Melopepon
terres, Lob.
& Tab.



Lob. ic. p. 645. figuram habet sub inscriptione Melopeponis teretis, quæ foliis destituta minùs placet. Melopeponis teretis fructus pinguntur apud Tabern. cum ipsa planta carente capreolis. Melonem autem vocari & cum Melonibus confundi non placet. Planta nostra capreolis non caret.

B. pin. Melopepo 3. sive teres, ut & Lob. & Tab. Pepo maximus rotundus Ger.



B. pin. Melopepo 2. compressus: Melopepo, Ang. Pepo maximus compressus, Ger.

Provenit anno 1605. in horto E.C. Montbelgardi Cucurbitæ sessilis genus (quod videtur respondere iconi Lobelij & Tabern.) latum quantum expansa manus asplecti potest, altum quatuor uncias, costis magnis, elevatumque superiore parte, ad pediculum

compressa, & ferè plana figura.

SICYOPEPON COMPRESSVS, rotundus, Melonis effigie.

Refer.

Sicyopepones, Cucumeres Peponesve compressi rotundi, Melonis effigie variant s. à Cucurbita aspera folio, folio minori minùsque inciso, alioqui simili nec dispari flore, aut fructu, non nihil aliquando orbiculatim striato: cortice delicatior, glauco, vel albedo, nitente: semine albo Citruli. Hæc Lobelius in adv. qui in obs. p. 365. & ic. p. 642. figuram habet (ut & Lug.) sub titulo Peponis rotundi compressi Melonis effigie. Hanc eandem effigiem exhibet Dodonæus pro Pepone silvestri, quam nos Cucurbitam amaram vocamus: ea verò pictura accedit ad iconem nostram ex Fuchsio pro Cucurbita aspera folio quarto loca positam, cui Dodonæus, ut monuimus, similem habet pro Pepone rotundo minore. Nos peritioribus in horum pomorum cognitione indagandam relinquimus, uter melius, Lobelius an Dodonæus accommodavit suæ descriptioni imaginem.

Pepo rotundus
compressus
Melonis effigie Lob.

B. pin. Pepo 4. rotundus Melonis effigie: Pepo oblongus, rotundus, luteus, viridis, Trago. Pepo Indicus minor rotundus, Tab. Ger.

B. pin.

Sicyopepones compressos, rotundos, Melonis effigie in taleolas scissos, frictosque in sartagine & farinâ aspersos suaves admodum mandunt in Belgio, Gallia & alibi, Lob.

CUCURBITÆ GENVS, SIVE Melopepo compressus alter, Lobelio.

Melopepo
compressus
alter Lob.

Ob. hujus figuram exhibet in Ic. p. 642. sub Melopeponis compressi alterius inscriptione. Exat hujus descriptio, ni fallor, ni Hist. belg. sive teutonica Lobelij, quam fratri mutuo dedimus, necdum recepinus. Pingitur apud Tabern. Melopepo compressus, Breyte Pfeben / an ex ipsa planta melatet. Jac. Braun in hist. ipsius confundit cum Melonibus, non sine lapsu.

Melopepo
compressus
Tabern.

CUCURBITA ASPERA, CORTICE molli, alba, magnitudine Arantij.

Cucurbitæ genus magnitudine Arantij colle. Deser. Cæsum in horto D. Fœlicis Plateri anno 1601. mense Augusto, album erat & rotundum, costis multis, quibusdam latis, aliis angustis, pulchro ordine distinctis: cortice molli & tenero: medullâ fungosâ albâ exuccâ ferè, sapore nullo insigni: semine pro pomi magnitudine satis magno, longiusculo. In hypocausto reservatum mensis Martij 16. die rugas contraxit.

B. pin. Pepo 5. rotundus Arantij forma: Cucurbita Arantij forma, Eyslt.

PEPO INDICVS MINOR, angulosus, Tabern.



Nihil habemus adhuc certum & notatu dignum de Pepone Indico minore anguloso Tabern. dicto, germanic. Klein Indias nisch edeching Peponen. Ejus tamen iconem & nomen suspicamur esse genus aliquod Cucurbitæ folio asperato. An hoc capite bene ponamus hanc iconem asserere non audemus. Idem de sequenti dicimus. Considerandum item venit, an quæ inferioris describitur, sit

eadem cum præcedenti:

Cucurbita ista utrinque tuberosa, & extumescens, lata est uncias quinque, & quatuor ferè longa, petiolum habet inflexum, exasperatum, quinquantulum, striis per longitudinem aliquot sulcatum: regio amplior (cujus medio infixus hæret petiolus)

Deser.

tiolus) multis costis, modò majoribus, quasque geminis, modò minoribus, sinumque aliquem latum inter majorum interstitia relinquentibus inæqualior quidem, non autem aspera reddita est: costæ ipsius majores plurimæque à medio petioli centro deflectentes, versusque ventrem excurrentes undique prominent: alterà verò parte, quâ floris regionem spectat, iisdem quoque sulcis à costis latioribus inculcatis, & zonæ instar transversa Cucurbitam amplectentibus, donata est, sed in eo distat à priori regione pediculum respiciente, quòd hæc tuberosa cum sit, non tamen in fastigium ita strictum consurgat, sed latius, ut aliquomodo sessilis inibi evadat, circa verò ventris extuberantiam depressionem fortitur, quæ in altera regione ipsi adjacente minime conspicienda exhibetur, quia rectà ad pediculi culmen usque fastigiatur.

E. B. B. pin. Pepo 7. minor angulosus: Pepo Indicus minor angulosus, Tab. Ger. Huc & Peponem minorem Indicum 4. Tabernomontani, referendum censet Bauhinus in pin. Nos hunc postea pingimus & describimus.

CUCURBITA INDICA MINOR Tabern.



*P*inxit Tabern. in Icon. Cucurbitæ genus hoc surrectum, sine capreolis, titulo Cucurbitæ Indicæ minoris, Klein In dianisch Kuchh. Verum in Hist. ubi icon transposita, malè sub titulo Cucurbitæ longe nulla differentia ab altera Cucurbita Indica, quæ ibi posita, traditur, præterquam à magnitudine. Verum si sic vera, & herba sine capreolis provenit, genus erit pulchrum & à nobis nondum observatum. An ritè hunc locum ei demus, ignoramus.

An Cordo in obfilva, Cucumis recto caule, fructu Melonis aut Peponis parvi?

CUCURBITÆ INDICÆ MINORI Tabern. accedens, tuberculis abundans.


*P*rovenit hæc anno 1605. in orto E.C. Montbelgardi Cucurbitæ genus sessile, accedens ad iconem Cucurbitæ Indicæ minoris Tabernomontani. Ea palmo longior, crasso ventre, quem non utraque manu amplexus fueris, parte supremâ, in qua costæ latæ & magni sulci, angustior multò, alba tota, multis tuberculis, & veluti verrucis exasperata: cortice mediocriter duro.

CUCURBITÆ INDICÆ præcoces.

*D*E Cucurbitis Indicis spacio 25. dierum à fatu maturis scribunt Hist. & iographi novi rerum

Indicarum, quarum meminit Quiquerianus Galus in libro de laudibus prov. nciz. De magnis Cucurbitis quibus Brasiliæ ad piscandum utuntur, lege L. Olor. lib. 2. hist. Port. parte 15. Cucurbitas ad natandum aptas commemorat Levinus Apollinaris lib. 1.

CUCURBITA INDICA PARVA.



*I*nter fructus rã. *Desf.* *T*ros ostendit p.m. E. C. Princeps Fridentius, Dux VVirentenberg. Cucurbitæ genus ferè globosum, pugno paulò majus, versus pediculum nonnihil pyriforme, cortice crasso valdè, subflavo, maculis fuscis notato: seminibus Cucurbitæ molli folio longo, minoribus, angulosis; cortice duriore; medulla alba, ejusdem saporis cum prædictis.

CUCURBITA CLYPEIFORMIS tuberosa & verrucosa.

*H*æc Cucurbita lata depressaque est, planitie *Desf.* *H*scuto alicui similis, dodrantalis propè latitudinis, quaternumque unciarum altitudinis, circumferentiæ (à petiolo crasso, aspero, anguloso, albicanteque) ad summum ferè ipsius fastigium, hemisphæricæ rotunditatis & longitudinis, cum adnatis quibusdam tuberculis inæqualis magnitudinis, eandem interverterent, inæqualiorumque redderent: superiori sui parte uncialem undique planitiæque superficiem occupat, in quibusdam verò locis eadem declivior & prominentior, ad instar saxosæ extuberantiæ, constituitur ob tubercula mammata, verrucosaque: planitieci medium occupat convexa quedam, omni ex parte declinans globositas, suis quoque sulcis à summa globi parte ad imam, nunc altius, nunc verò levius incisa, suisque tuberculis exasperata, summitas verò ipsius latiusculam sortita est superficiem, quam sive tuberculum aliquid latum vocare malis, sive alij cuius rei assimilis, licebit. Duri atque crassi est corticis particeps. Pulpa ipsius interior carnosâ & firma, asservaturque diu. Semen ipsi parvum, latiusculum, quæ alius Clypeiformibus. Alebatur anno 1607. in E.C. VVirt. orto. *Lacini.*

CUCURBITA LATA, CLYPEIFORMI accedens, minus tuberosa.

*H*ic fructus flavidi coloris à tuberosa & verrucosa *Desf.* *H*ic clypeiformi Cucurbita in eo dissidet, quòd depressam undique, & in se consistentem coarctatamve magis formam obtineat, sulcis suis modò altius, modò verò levius cortici impressis, deinde quoque, quòd superiori sui parte, non ut ille monticulum planitieci medio incumbens, imminensve sustineat, sed rectà sursum versus, sulcis iisdem eo tendentibus mollior, clementerque elevatur,

tur, assurgitque, inque sui summa parte floris decidui vestigium albicans, latiusque gerit, qua parte pediculo hæret sessilis & nonnihil concamerata: cortex non multum durus: semina planè clypeiformis similia, subrotunda ferè: pulpa subflava. Duravit ad Februarium usque sequentis anni 1607.

Cortex.
Semina.

CVCVRBITÆ CLYPEATÆ AFFI-
nis, ovalis, angulosa, ad Citrum
nonnihil accedens.

Deser.

Fructus hic ovalem figuram per omnia ferè refert, longitudine sua ad quinque uncias protenditur, latitudine verò crassitieque quatuor uncias complectitur. ad petiolum viridem, angulosum, striatum, & scabrum, plures occurrunt majores striz, juxta eminentias protuberantes, ex minoribus plurimis in ventris sinuoso ambitu obvis in unam petioli extremitatem concurrentibus striis productæ. Venter in orbem circumdatus per transversum multis magnis majoribus, minoribusque sulcis est exaratus, interque medios sulcos tubercula inæqualis eminentiæ circumquaque se visui spectanda offerunt. Ad extremum fastigio acuminatio-ri quàm ad pediculi regionem apparebat, donatur. Colore est flavescente. Citrium medium æmulatur nonnihil: cortex durus: semina subrotunda ad clypeatas accedentia. Consideretur an huic, Pepo Citrio similis, quem capite de Cucurbita aspero folio ex Dodonæo delineavimus, conveniat: Icon certè non respondet.

Venter.

CVCVRBITÆ CLYPEATÆ AFFI-
nis à pediculo in conum
definens.

Deser.



quasi ambientem visendum exhibeat, quæque ab altioribus sulcis ex latiore ambitu ad usque inum petioli centrum excavatur, venter etiam compluribus altius incisus exaratus est, qui tandem secundum ductum suum continuum ad extremum ulque verticem sensim disparent, vertex ipse demum colliculum gracilem fastigio donatum exhibet. Cortex durus flavescent, caro ejusdem coloris: semina subrotunda, inæqualia. Provenit in horto E. C. Montbe'g. anno 1607, duravitque usque ad Martium anni subsequens.

Locum.

Tabern. inscripuit Peponem minorem Indicum quartum. Hunc Bauh. in pin. cum Pepone suo 7.

sive Indico minore anguloso Tab. eundem facit quod non probamus.

CVCVRBITÆ CLYPEATIS AFFI-
nes utrinque aliquo modo
turbinata.

Cucurbitæ genus folio aspero varians magnitudinis, etiam longitudinem, vel denique longitudinem, crassitiemque colli. Vnum enim genus, longum est in totum uncias octo propemodum. Venter verò ipsius in longitudinem quatuor unciarum protenditur, suæque crassitie trium est uncium. Collum denique, quæ extensum est ad quatuor uncias, crassitudine verò suâ duas uncias complet.

Secundum porro genus oblongum est secundum totum sex uncias, ventriositas verò ipsius extenta est ad quatuor & amplius uncias, crassa verò quatuor uncium. Colli demum spaciū inter ventrè & pediculum interjectum est unius uncie & dimidiatæ. Crassitudo verò ejus adæquat duas uncias.

Tertia varietas integram longitudinem absolvit: quinque uncias. Ejus verò venter ad tres uncias & dimidiam porrigitur, crassus autem est trium & amplius uncium. Collum denique productum est ad duas uncias cum semisse; crallum verò trium & si quid est amplius, uncium. Cæteroquin omnia genera in universum considerata in eo conveniunt, quod striis secundum ipsorum totum ductum sunt proficilla, excepto primo genere quod usque ad ventriositatem suam sulcatum est, reliqua pars rotunda est ferè, omnibusque striis destituta, tuberculis tamen aliquibus hinc inde compressa diversæ magnitudinis. Dein verò sub finem ventris cujusque differentie tuberculum aliquod prominens conspicitur. Pediculus denique viridis, in medio autem ipsorum genere albicans visitur, angulosus & ad tactum asperior: cortex durus flavescent: semina qualia Cucurbitæ latioris. Hi fructus diu in corrupti conservantur.

CVCVRBITÆ FOLIO ASPERO
amaro. CAP. III.

Dodonæus lat. in fol. Pepones agrestes vocat Pepones & tota naturâ silvestres, fructibus crassis, oblongis, striatis, durioris corticis ac colore virentibus, sed minoribus multò: pulpâ & interiori medullâ, unâ cum seminibus, veluti sativorum, sed admodum amaris: semine quoque paulò minore. Horum veteres non meminerunt, inquit Dodonæus, qui iconem habet, quæ non videtur multum differre, à sui Peponis rotundi minoris effigie, quæ eadem cum figura nostra pro Cucurbita folio aspero, quarto loco posita. Dodonæi imaginem Peponis silvestris Lobelius pro Pepone rotundo compresso Melonis effigie pingit. De Cucurbitis verò aspero folio amaris in Advers. loquitur, ubi ait: Scitas Colecythides in hortis Batavis, Gallicis & Italis vidi triplicis aut quadruplicis varietatis: fructum nempe pusillæ Cucurbitæ, aut pyri, aut lagenulæ effigie, ex fusco viridante, cortice nonnihil maculis variegato, reliquâ foliorum facie Cucumerem silvestrem referente, teterissimi saporis. Memini etiam exactè sphaericas, maximum Arantium aut Citrium vocatum Adami pomum æquiparantes, etiam nonnihil variegato cortice. Vides & nonnullam compressæ rotunditatis, subflavi corticis, quarum omnium eadem vires, & durus amaror. Sapissimè pusilli, Peponis oblongi effigie, ovum asferinum aut olorum æquan-

æquantes, corticis durioris, & viridi in atro, & cinereo maculati sunt.

De Cucurbitis asperis amaris nobis cognitis, deinceps seorsim acturi sumus. Et primum quidem eas describemus quas Cordus in hist. pl. delineat.

Trag. lat. vocat Cucumeris seu Zucco marini tertium genus amarum proflus, veluti Cullu quintidies. Meminit in hist. germ. hujus Cucumeris sub nomina Indiamisch Opffel.

Alicubi locis incultis sponte Pepones silvestres (Cucurbitas folio aspero amaras) gigni concedit Dodonæus; Verum in Germania ac Belgio non nisi fatis provenire.

Vti porro totâ suâ naturâ silv. Pepones valdè amari sunt, ita quoque temperamento calidi, sicci-que, & secundo quidem ordine intensio: expurgandi quoque non minorem vim, quàm silvestres Cucumeres obtinent, inquit Dodonæus. Vinum præterea quod calyci, exemptâ cum semine medullâ, infusum, tantisper in eo hæserit, donec amaritudinem plenè contraxerit, per alvum purgat, ac pituitosos biliôsq; educit humores. In summa hujus succus idem quod Cucumeris agrestis præstat: reficatus verò Elaterij loco succedere potest.

cameras perticis extructas ducat, ea enim ratione capreolis baculos apprehendet, & attegiasive fecinas faciet. Saporè fructus habet amarissimum & gravem odorem: seminis autem nucleus dulcis est. Seritur spectaculi gratia in latis hortorum areis. *Locus.*

B. pin. Colocynthis, oblonga: Colocynthis grandis oblonga, Cord. hist. Colocynthis grandis candida, solo colore ab oblonga differens, Eid. hist. Variat colore: alia enim primum viridem colorem in cortice ostendit; postea maculis candicantibus conspergitur; postremò totus in luteo pallet, sitque durus & lignosus: alia principio viret quidem, sed mox albicantibus maculis aspergitur, at in maturitate totus albicat. Cordus. hist. differentias sex proposuit, & ex eo Lugd. inquit frater.

Ego verò hîc primam Cordi differentiam describo, & de secunda nunc dicam. Tertia & quarta mihi est Cucurbita foliis asperis, sive Zucha. Quintam inscribo Cucurbitam aspero folio, amaram, turbinatam, &c. de hac mox, ut & de sexta, quam voco Cucurbitam oblongam, non angulosam, &c.

CVCVRBITA ASPERO FOLIO, amara, grandis, rotunda, viridis.

Colocynthis grandis, rotunda (ita à Cordo de *Colocynth.* descriptionis autore vocatur) oblonga grandis *grandis rotunda* Colocynthidi, viticulis, capreolis, floribus, foliorum magnitudine, radicibus, asperitate, atque omnibus aliis accidentibus similis & æqualis est. duobus tantum differt. folia namque in quinque partes divisa habet, fructusque minores superficie æquali, pondere civilem libram excedentes & globi instar rotundos, aut modicè planos, utrinque tam circa pediculum, quàm floris vestigium modicè eminentibus angulis distinctos: quibus color est primum viridis, in maturitate verò pallidus, qui dissecti substantiâ, feminum ordine & figurâ oblongis similis sunt, præterquam quod nonnunquam octonos feminum ordines habeat, ac totidem quoque oblongæ Colocynthidi contingere possunt. Sapore & odore oblongæ respondet.

CVCVRBITA ASPERO FOLIO, amara, turbinata, flava candicantibus lineis inscripta, parva.

Colocynthis turbinata, viticulas, capreolos, folia, & flores grandis & oblongæ Colocynthidi *Colocynth.* turbinata *grandis* similes profert, & similiter per terram repent, sed omnino *Cordi.* minores partes tenuiores habet. fructum producit pyri turbinatum (cujus pyramis circa pediculum est) ovo majorem in maturitate flavum, & candicantibus lineis per longitudinem distinctum, foris durum & lignosum, intus autem fungosâ carne plenum, in qua quatuor oblongorum, planorum, parvorum ac candidorum feminum ordines continentur. Radicibus nititur prædictis similibus, sed minoribus multò, quibus semestris est vita, è geniculis autem nullas in terram demittit radices. Saporè habet amarum, ut prædictæ Colocynthidis species, quibus etiam similiter colitur, inquit Cordus de Colocynthide turbinata, cujus descriptioni malè Gesnerus, vel alius apposuit Colocynthidis iconem ex Trago. Nec enim hoc capite Colocynthidem describere et animus fuit. *Radices.* *Error apud Cordum.*

CVCVRBITA OBLONGA, NON angulosa, colore viridi, amara, folio aspero.

Colocynthis oblonga, glabra, auctore Cordo, *Colocynth.* viticulis, capreolis, foliis, flore & radicibus *oblonga glabra, Cordi.* grandi

CVCVRBITA ASPERO FOLIO, amara, grandis, oblonga, viridis.

Colocynthis grandis, oblonga Cordi, ab unâ radice viticulam emittit digitali aut pollicari crassitudine, quæ in multas alias angulosas, undique per terram aliquot orgyiarum longitudine sparsas dividitur. hæ juxta exortum graciliores sunt. at aliquantulum reptando progressæ digiti ferè crassitudinem consequuntur, eadem dodrantali intervallo geniculis præcinguntur, secus quæ capreolos emittit, & singula erigit folia, longitudine & latitudine pedali, in tres partes Lupuli modo secta, tactu aspera & brevibus aculeis horrida, pediculis aut cubitalibus, teretibus, asperis, concavi que pediculis infidentia, ab iisdem geniculis radices in terram demittit tenues, quibus nutriendo fructui succurrit, flores secus foliorum exortum profert duplicis generis, fecundos & steriles. Steriles longo concavo que infident pediculo, Liliei figuram & quantitatem habent, præterquam quod intus hirsutus, & colore luteus sit, atque labrum ipsius in quinque tantum partes dissecetur, reliqua floris pars concava & continua est, in cujus medio cacherij simile capitulum eminet, retro ipsum florem nullo extuberat tuberculum, quod sequuntur fructus spem faciat. Fecundus autem flos breviori, solidiori & crassiori nititur pediculo, intusque tria crassa, hirsuta, luteaque tubercula, staminum vice continet, quibus in fundo floris melleus liquor circumfunditur: retro florem capitulum eminet, quod decidente flore in grandem & humi procumbentem excrescit fructum, longitudine plerumque dodrantalem, ea crassitudine, quæ utraque manu circumampli vix possit, duarum civilium librarum pondus habet, is primum viridem colorem habet, postea candicantibus maculis conspergitur, in maturitate postremò totus in luteo pallet, & circa pediculum eminentibus angulis distinguitur. dissectus, corticem primum ostendit durum, lignosumque, mox flavam, cartilaginosamque carnem, & in medio ejus sex ordines feminum candidiorum, acuminatorum, latorum & planorum. in quibus candidus est nucleus. Radice nititur semestri & admodum brevi, à qua alia multæ candidæ in diversas partes exeunt, longitudine cubitales, & funiculorum modo tenues, quod si quis plantam hanc humi repere nolit, supra

grandi & oblongæ Colocynthidi similis & æqualis est, folia tamen quoquo versus dodrantem vix excedant, & non longè à macrohe duabus incisuris, sed non profundis in tres partes dividuntur: fructum habet oblongum, eidem Colocynthidi similem, sed sine angulis & omnino glabrum, minorémque, nam longitudinis circumferentia quindecim uncias raro excedit; latitudinis verò duodecim uncias complectitur; colorem habet primum viridem, in maturitate verò obscure luteum, ac in pallorehi saturatum degenerantem; seminum ordine, colore, & quantitate, atque carnis substantia, colore ac sapore prædictas Colocynthides æmulatur, quibus etiam similiter in hortis colitur.

Tragus hujus meminit in hist. germ. nomine Colocynthis: in hist. lat. vocat Cucumeris seu Zucco marini tertium genus, amarum.

CVCVRBITA AMARA, MAGNA,
folio aspero, colore vario.

Defcr. **S**apor nomen dedit. Nam Colocynthis in modum amaricat caro. Magnitudo capitis humani ferè est, alias major, alias minor, quémque certis limitibus coëtere facile non sit. Cortex herbeus, guttis & maculis flavis perfusus, porracinis, h. e. ex viridi flavescentibus lineis latis intersectus, durissimus cæteroqui, ac firmus, non ita tamen ut in Cucurbitis vulgaribus non amaris. Semen majusculum est, album, oblongum, quale in Cucurbitis aspero folio, quibus etiam similia folia, flores lutei, rami, & cætera.

Varietates. Anno 1606. proveniunt in horto E.C. quædam duobus pugnis multò majores, aliæ minores penè orbiculares, & quædam verrucosæ. Durarunt ad mensem Martium anni sequentis hæc Colocynthises, si ita appellare malis, quàm Cucurbitas.

CVCVRBITA ASPERA, AMARA,
fructu parvo, globoso, colore vario.



Alia prioris
similia

tam amaram exprimere videretur eam assumpsimus. Et hæc fortè fuerit satz Colocynthis secundæ Lobelij, fructu maximi Arantij, de qua ante.

CVCVRBITA SIVE COLOCYN-
this amara, pyriformis, variegata.

Defcr. **L**ongius paulò à Colocynthis, quam officinarum ulus accepit, formâ recussit; præsertim fo-



lis: sarmentis longissimis, asperis, caliculatis, clavicularum beneficio ricas topiarias cõscendentibus: folio Cucumeris, magis laciniato, atrovi-
rente superius & molliore, inferius herbido & aspero: floribus Cucurbitæ folio aspero, duplicis generis, croceis: fructus succedunt pugillares, formâ pyri turbinatâ, viridantes, hirsique albicantibus virgati, consimilibus quoque notis temerè maculosis: car-

ne candida, odoris gravis dum virent, saporis amarissimi intollerabilis, cui semen immergitur copiosum, compressum, candidum, sive Cucurbitæ usitatoris, folio aspero.

Hæc Cucurbita proveniens in horto E.C. non Varietatum variat, cœu anno 1607. deprehendimus. In tres eodem namque horto parvæ quædam mediocris pyri magnitudine proveniunt, quædam pugno crassiores, & quædam ferè rotundæ: cortice tenui, non valde duro, coloris supra dicti: seminibus parvis, sublongis.

Tragus Colocynthidem alteram sive germani-Colocynthidem vocat, ac diversâ planè generis esse à Colocynthide vera, non solum ex fructu, verum etiam foliis, & universa formâ demonstrat. Spiræ à nonnullis, inquit, voluptatis gratiâ plantari consuevit. Semine quoque, quod habet latum, & Citrullis vulgò vocatis quadantenus simile, feritur. Folia proferunt non cineracea, sed nigricantia, aspera, formâ verò Cucumerem luteum representantia. Caules ejus seu sarmenta rotunda & aspera humi repunt, sicut Bryoniæ, neque unquam sublimia affectant, humiliter ac dejecto statu semper contenta. Per terram enim reptant, ita quidem ut una sæpe planta latissimum campum vestiat, nam plures obtinet clavículas, quibus vicinis te alliget fruticibus. Duo gignit florum genera, & ea quidem lutea, ac flori Cucurbitæ consimilia, quorum primum quidem cum nullum habeat in fine adjunctum fructum protinus evanescit; alterum verò fructum post se relinquit, in modum pyri mediocriter magni, maxime ejus quod Germani Regelsbyren vocant, turbinatum. Is ubi Autumno appetente maturefcit, citre cernitur coloris, intus fungosus, ac multis seminibus repletus, impensè etiam amarus. Hic bilem & pituitam leniter & citra periculum purgat. Colocynthis hæc arenosâ & humidâ gaudet terrâ, fructum fert copiosum, ut non raro ducenta lata poma una de planta legerit Tragus.

Dod. lat. in fol. Cucurbitam sylvestrem inscribit, Camarburg. ac de ea ait: Viticulis, caulibus, capreolis, ac foliis mollibus, ac veluti lanuginosis sativam æmulatur, omnibus ac singulis multò minoribus. Scandit verò & hæc lænas, umbracula, ac testudines hortenses: fructus Cucurbitis ventricosus ac lagenulas referentibus, forma quidem similis, sed magnitudine longè inferior, omnino videlicet parvulus, nec vulgari pyro major, utpote qui & manu concludi ac comprehendere queat. cortex hujus exterior initio viret, postea durus factus ligni quoque colorem assumit. interior medulla humida, & admodum succulenta

Li-

14

eripati.

*Siriliand
non fim-
brata for-
ma.*

Diosc text.

Θ - Cūcur. silv.
cis altera pli.
u - nid.

2- Cologymb.
a, sexes, Mos.

ea Ex Serap.
fc,

li-

CO-
ius

 ϵ for

Cucurbita minima, Arantio similis, fulcata, lutea, cortice est duro, carne flavescente, amara.
Tom. II.

nec possumus vesci. Vates autem Eliseus miraculis potens fretusque multis, farina adjecta pulmentum Colocynthisque silvestres dulcoravit, edendoque commodas reddidit: quare oportuit esse amarissimas.

PLANTÆ COLOCYNTHIDIS
nomine donata.

- Præter Colocynthidem vulgarem officinarum, Colocynthis nomen plantæ sequentes obtinuerunt. Cucurbitæ folio aspero amara, de quibus ante, ceu & de sequentibus.
- oblonga 2. Cucurbita aspero folio, amara, grandis, oblonga, viridis.
 - Rotunda 3. Cucurbita aspero folio, amara, grandis, rotunda, viridis.
 - Turbinata 4. Cucurbita aspero folio, amara, turbinata, flava, candicantibus lineis inscripta, parva.
 - Non angulosa 5. Cucurbita oblonga, non angulosa, colore viridi, amara, folio aspero.
 - Colore vario 6. Cucurbita amara, magna, folio aspero, colore vario.
 - Frustrigulosus 7. Cucurbita aspero folio amara, fructu parvo, globo, colore vario.
 - Pyrisformis 8. Cucurbita sive Colocynthis amara, pyrisformis, variegata.
 - Cuc. lagenaria 9. Cucurbita folio molli, flore albo, longa sive lagenaria.

COLOCYN-
this.

Defer.

Notiora officinis poma hujus quam herba, quæ per terram sparsa, striatis, asperis flagellis, folia per intervalla profert singularia, pediculis duarum triumve unciarum, vel etiam longioribus ha-



rentia, aspera, incana & hirsuta, præsertim verò parte inferiore pûctis albicantibus notata, lacinata, Citrulli divisa, sed minore, ad quorum pediculos exeunt toriles capreoli, & ipsi quoque hirsuti. flores luteoli. poma pugno æqualia, Lob. subflava, virentia, virosaque: deferuntur exempto cortice flavescen-

Nomina
linguar.

te: pulpa candida, fungosa, levissima, amarissima, horrenda & ingenter amaro gustu, fauces, viscera, intestinâque lædens, teste Lobelio, cui immersa femina parva compressa, dura (per æque lignum, Lob.) polita, alba, vel rufescentis, vel ut Dod. sordentis coloris.

Colocynthis hæc, surgosam obtinens medullam, græcè καρκινώδης, latinè Colocynthis, Cucurbitula, Cucurbita amara, Cucurb. silvestris, Cucurb. captina, Cucurb. deserti, Cucurb. Alexandrina, Thymbra, Autogenes & Tutrastra appellatur. Mesues Fel terra & necem plantarum nominat: Scapio Kandel, Habix autem Melonem agrestem nuncupavit. Avertthoes Haanthal dixit. Apud Eliseum Prophetam Regum 4. Colocynthises Pakkuoth Sa-

Fel terra.
Melo agre.
su

de, h.e. Cucurbitæ silvestres dicuntur à singulari nimirum Pakkuah, h.e. Colocynthis. Vocatur autem in Imaëlitica lingua Chandel: Germ. Züchßlin/ Co loquint/ Zücherfurb/ Wildfurb/ Gießfurb/ Erdgallen: Belg. Quintrappel: Gall. Coloquinre, seu Courge sauvage: Ital. Hisp. Angl. & Böhem. Coloquinrida. Colocynthis porro, ut Cordus placet, diminutivum est à Colocyntha, i.e. Cucurbita. Apud Cordum in Diofco. quidam annotavit eam esse propriè Colocynthidem, quæ est fructu longiore: Alteram verò, quæ in pharmacopoliis utimur, Somphon esse. Idem in historia ejus l.c. 97. posuit Colocynthis hujus iconem ex Trago. Verùm hoc loco non ponenda erat, quia Cordus hanc Colocynthidem ibi non describit.

Dodon. in fol. lat. p. 373. figuram Lobelij exhibet: descriptio verò & reliqua conveniunt cum iis, quæ tradita sunt in hist. purgantium. Idem p. 654. eandem rursus iconem habet sub titulo Colocynthis, iniquens: silvestre autem hujus (Anguriarum Angur) intelligi genus est Colocynthis dicta, de qua supra dictum fuit. Quia porro consimili esset facie [cum Cucurbita] sed multò minor tota, Cucurbitulam & cucurbitum, sive Cucumerulum vocantur Hippocrates & Aegineta, ducti, ut ait Lobelius, potius foliorum aspectu, quam planè contrariis facultatibus.

Lob. dicitur Colocynthis sive Cucurbitula amara cathartica, ut Icon. p. 645. B. phyt. & pin. Colocynthis, sive fructu rotundo major. Cucurbita agrestis, Brunf. Colocynthis vera, Trag. Colocynthis, Matth. Ang. Cord. in Diofco. (& Cucurbita deserti) Gesn. h. (& Cucurbita silv.) Lac. Lon. Lob. (& Cucurbitula amara) Lugd. Cast. Cam. Ger. Colocynthis prima, Dodon. gall. mas, Tab. Dodonæo alicubi Anguria silvestris. Colore est viridi, magnitudine utramque manum replente.

In Germania (inquit Fuch.) sua sponte non nascitur, lata tamen provenit, sed rarissime perfectionem attingit, quòd frigidior sit ejus terra, quàm quòd in ea fructum proferre possit. Ex orientabilibus enim & calidioribus locis ad nos defertur. Fuchio ad stipulatur Gesner. Cucurbitæ, inquit, silvestris species non reperitur, quod sciam: nam Colocynthis, dicta Cucurbita silvestris, nescio ubi sponte nascatur, nisi in Græcia fortè. Lobelius perhibet hanc serere Herbariarum voluptatis studiosos Vere, in Gallia, Germania, & Anglia, fructumque decerpere Septembri, ac proinde purgationibus minus aptum, eo qui ex Græcia, Hispanisque deferatur, exempto cortice. Nobis certè Colocynthis folio dissecto, sive officinarum Montbelgardi fata sæpius in horto E.C. & alibi provenit, sine fructu tamen.

Vim habet medulla fructus purgatoriam, si ejus quatuor oboli ex aqua multa sumantur: vel additis Nitro & Myrrha melle decocto excipiantur, & in pilulas cogantur. Ipsæ verò pilæ arefactæ teruntur, & utiliter infunduntur clysteribus ad coxandicum dolorem, paralyfin, & coli vitia: ut Cæsar quæ piritum bilem, strigmentaque, interdum etiam cruenta eliciant. Subditæ eadem, scetus enecat. Quòd si quis unam exemplum medulla obducatur luto, in eaque acetum ac nitrum fervefaciat, decocti jus illud, dentium doloribus collutione proderit. Sin multa, aut passum in eadem decoquatur, & sub dio frigeat, potu crassum humorem, strigmentaque alvi detrahet: stomacho tamen supra modum adversatur. Sed & subditæ ex ea balano alvi excrementa evocantur. Virentis denique succus prodest coxandicum dolori, intricetur, auctor Diofcoride. Gustu amara quidem est, inquit Galenus, sed quæ amarissimo medicamento epo-

to epot adfunt opera, ea evidentè efficere nequit ob purgatorium facultatem, quam validam in fe continet, nimirum cum iis, quæ expurgant, ante & ipſa per alia n excerni prævertens. Cucurbita, Colocynthis vocata Plinio, herbacea acetiſſa, per ſe inanis alvum. Inſuſa quoque clyſteribus, inteſtinorum omnium vitiis medetur, & renum, & lumborum, & paralyſi. Ejecto ſemine, aqua muſſa in ea decoquitur ad dimidias, ſic ſufficienter funditur obolis quatuor. Prodeſt & ſtomacho, ſatinate arizæ pilulis cum decocto melle ſumptis. In morbo verò regio utiliter ſemina ejus ſumuntur & protinus aqua muſſa. Carnes ejus cum Abſinthio & ſale, dentium dolorem tollant. Succus verò cum aceto calefactus mobiles ſiſtit. Item ſpinæ & lumborum ac coxarum dolores, cum oleo ſi inficiuntur. Præterea mirum dictu, ſemina ejus ſi fuerint pari numero adalligata febris, ſanare dicuntur, quas Græci periodicas vocant. Et hæc Plinius, ex quo Dioſcoridis loci declarantur, hæſtenu, ut ait Cornarius, à nullis interpretibus rectè intellecti. Primum enim conſuſa eſt lectio Dioſcoridis græca & duo modi ſumendi medullam ejus, in unum coaſuerunt, paucis particulis elapſis. Sic-igitur lectio diſtinguenda eſt, velut etiam nos reddimus. *αυθαμιον δὲ ἐξ ἑοῖ τοῦ ἐκτενέωντος τοῦ καρποῦ κακοπραπίου, τριγυθίων πηλός· καὶ ὁ δὲ ἐμμελὶς καὶ λευκοφάνους καὶ οὐκ ὀνίτος δὲ καὶ σμυνὴ καὶ μέλιτι ἐν ὕδατι χυμώπῳ.* Priorè modum docet apertè Aëtius lib.3. cap.35. Dantur ex medulla ejus ſcrupuli duo, in aqua muſſe cyathis duobus. Poſteriorem habet Plinius ubi ait: prodeſt & ſtomacho ſatinate arizæ pilulis cum decocto melle ſumptis. Deindereſtè dixit Plinius, Ejecto ſemine, aqua Muſſa in ea decoquitur ad dimidias. At in Dioſcoride periculis contrarium intellexerunt, ipſam medullam videlicet in aqua muſſa coqui debere: quod falſiſſimum eſſe Aëtius clare offendit eodem loco. Quòd ſi miſius purgare volueris, inquit, ſumito Colocynthidem juſtæ magnitudinis, eamque aperito ſupernè, & ſemen totum eximito. Deinde quicquid tomenti ſpeciem præ ſe fert in ipſa, ruſus citra ſemen in ipſam indito, & repletam ipſam ſapa, aut vino dulci veteri, per diem ac noctem macerari ſinito. Deinde excolatum perannum vinum calefactum bibendum dato. Hoc tamen intereſt, quod Dioſcorides aquam Muſſam, aut Paſſum, in ipſa priùs coquendum, deinde per noctem ſub dio exponendum præcipit. Aëtius autem per diem ſolùm ac noctem macerari ſinit. Atque ita etiam Paulus lib.3. cap.15. Et hic ſane uſus hodie quoque frequentiſſimus eſt Medicis, qui illa utuntur, modum inſuſionis Colocynthis, ipſi appellant. Medullæ hujus Colocynthis (quam Hipp. *σικυθίαν, σικυθίαν, καὶ σικυθίαν σπέρηρον* nominabat) apud varios Medicinæ autores, varia eſt doſis. Meſſus ceratâ decem; Paulus drachmam integram exhibere non veretur. Ruſſus itidem drachmam unam ex aqua muſſa propinat. At Aëtius ſcrupulos duos exhibet in aqua muſſe cyathis duobus: eodèmq; loco, imbecillibus etiam ſcrupulum unum ſat eſſe ſcribit. Nonnulli volent potum Colocynthis, exemptâ medullâ, ſimul & ſemine, luto oblitum incoqui aceto & nitro. Sed abſurdum illud eſt. Modum præparandi diluati Colocynthis plenius ſupra deſcripſimus ex Aëtio. Ruſſus itidem in libello de Purg. med. nullâ tamen medullâ factâ mentione, cum ſe tradit: Quòd ſi quis miſius purgare volet, ſemine Colocynthis ejecto, aſſuſoque intra corticem vino dulci, lento igne coqui ipſam oportet dum probè incalcuit, illud tandem potandum

exhibetur. Sed & Paulus lib. 3. cap. 13. eodem modo præparatur Colocynthidis dilutum in morbo comitiali propinat. De Colocynthida Serapio ex authoritate Dioscoridis & Galeni tractat. Nos eorum verba ante recitavimus. Addit autem hæc ex opinione Hæbiz. Colocynthida, quæ est Melo agreßtis, fumitur in potu, purgat phlegma grossum, quod advenit juncturis, & illud phlegma quod emittit suofuantes ab caput, & expellit humores qui aggregantur in corpore ex melancholia, & aliis malis humoribus. Et oportet quod ille qui colligit Colocynthidas, colligit eas in fine sui anni, &c. Illa quæ reperitur sola in arbore sua occidit potentem sine dubio, quoniam quando datur ex pulpa sua, facit torsiones fortes, & evomere fortiter, & est laxatio ejus sine juvamento, & inducit tetensinonem, & anxietatem animi, & coarctationem anhelitus, & frequentiam ejus & sincopim, & fudorem frigidum, & fortassis interitici, sicut dixi. Pomum ejus perfectè maturum confert potantem, & expellit humores, quos volumus purgare, & non est necesse, quod misceatur cum medicina alia. Sed est valde cavendum ne detur in potu in tempore magni frigoris, vel magni caloris, nam ista sunt duo tempora, in quibus nos docuit Hippocrates non debere dare medicinam laxativam, dixit enim in libro suo Aphorismorum, Non oportet quod detur medicina laxativa, quando ascendit scabari, & in magna Hieme: & intelligit in Junio, Julio & Augusto; & per Hiemem voluit intelligi, in Novembri & Decembri & Januario. In istis igitur duobus temporibus anni non oportet quod detur medicina laxativa, & propriè acuta, sed solum duobus temporibus aliis, volo dicere in Vere & Autumno. Quando igitur bibitur Colocynthida in hora magni caloris, nocet membris interioribus fortiter & nocet etiam stomacho, & expellit sanguinem per ora venarum, abradoendo ea. Et quando datur in hora magni frigoris, fatigat patientem fortiter, quia natura non assentit ei, quare facit torsiones. Si igitur volueris Colocynthidam rectificare, & miscere cum aliis medicinis, purga ipsam primo à granis suis, & à cortice exteriori, adeò quod remaneat pulpa sua pura, deinde tere ipsam cum gummi Arabico & Dragagato & Amilo cum omnibus istis, vel cum uno ipsum, & quando addis ei aliqua ex istis Medicinis, pone de ea quantitatem æqualem ei, sed si vis admiscere ei omnes, pone de unaquaque Medicina æqualiter, ita quod summa quæ proveniet, sit æqualis Colocynthide in pondere, & hoc quando facis medicinam laxativam, sicut sunt pilulæ. Verùm quando vis ipsam ponere in Hieris, & medicinis magnis, non oportet quod temperes eam cum aliqua medicina alia, nisi cum illis, quæ ingrediuntur in medicina illa nec cures multum repimere acuitatem ejus. Et quantitas quæ datur ex ea, quando præparatur secundum istum modum cum medicinis aliis, est à duobus dauch [] usque ad unum Kitar. Et scias quod Colocynthida quando extrahitur à pomo suo, & permanet sic diu, est minoris virtutis in laxando, & minuitur acuitas ejus. Et quando tenetur, & dimittitur sic tempore longo, fit adhuc in hoc minus, & magis remissa virtus ejus, sed quando dimittitur in pomo suo, non recipit immutationem, nisi in longo tempore. Et oportet quod non colligatur Colocynthida ex arbore, in qua ex vna radice non est ortum, nisi pomum illud solum, quoniam nutrimentum totius radiciß venit ad illud pomum

solum, & augeat in eo virtutem multam laxandi. Talis igitur Coloquintida interficit propter acuitatem suam nimiam, & fortitudinem, nam qui sumperit ex ea duobus davich, non retinebitur fluxus ejus, quousque moriatur. Et scias quod ego vidi in omnibus hominibus qui degunt in terris magnæ frigiditatis, quod in pluribus eorum vincit super naturam eorum cholera nigra, quapropter non possunt in eis operari, nisi medicinae fortes & acutæ, sicut est Coloquintida, & folia ejus, propriè & Esula, & Mezerion & Dam-defeni, & similia horum. Scamonea verò non est eis necessaria. Et oportet cavere, ne apponatur in aliqua medicina ex cortice Coloquintidæ, neque ex feminis ejus, quoniam cortex est durus & siccus, & adheret villis stomachi, & intestinis, & pungit punctiōne forti, & prohibet affellaciones: similiter etiam facit cortex femininum, sed feminis ipsius oleum est calidum molificativum. Et Arabes quidem infundunt semina ipsa in aqua pluviali donec recedat amaritudo eorum, & sic comedunt ea decocta, & alio aliquo modo, & præbet eis nutrimentum, verum quando comeditur ex eis nimis, inducunt fastidium, sed quando fricantur plantæ pedum in domo primâ balnei fricatione forti, facit eos hæc fricatio egerere & evomere, & confert, & non augeatur nocumentum. Et quando fuerit necesse apponi Coloquintida in clistere aliquo, oportet quod apponatur in decoctione clisteris integra sine contritione & repositione aliqua, quia tunc confert colicæ; & facit descendere humores grossos, crudos, & melancholiam. Sed folia Coloquintidæ quando aliquis vult purgare cum eis, oportet quod colligantur ex arbore sua postquam maturaverint poma ejus & citrinelcant, quando scilicet incipit aer infrigidari, in tempore videlicet quo diximus debere colligi poma ipsa, & siccantur in umbra, donec non remaneat in eis aliquid humiditatis, & sic reponantur, & quando fuerit necesse, quod exhibeatur de iis in potu, oportet quod temperetur cum amilo, aut Gummi Arabico, aut Dragaganto, cum vino istorum, vel cum pluribus, sicut diximus in Coloquintida ipsa. Quando igitur ponuntur cum eis, ex istis faciunt operationem mirabilem in expellendo melancholiam, & quando admiscantur cum eis medicinae convenientes ad hoc, sicut Aloës, Anisum, & Epithymum, & Sal Indum, & si dantur in potu cum Hiera picra, erit medicina jувativa multum. Ego non vidi aliquam ex medicinis laxativis magis conferentem in doloribus melancholicis quam folia Coloquintidæ. Et antiqui quidem defecerunt in memoracione ipsorum, & omiserunt usum eorum. Et ego tentavi & dedi de eis in melancholia, & alopecia, & tyria, & lepra, & inveni juvamentum magnum, & fortassis facient evomere illum qui sumperit ex eis, & nihilominus confert multum leprosis, & faciunt consistere agritudinem suam, & dolores suos & non permittunt augeri. Et scis tu quod ista est cura eorum, in quibus confirmata fuerit agritudo, nam à quibus membra ceciderunt, impossibile est quod renascantur eis propter hanc medicinam modo aliquo. Et scias quod Coloquintida quæ oritur in rupibus & locis altis, quæ non est inhibita humiditate pluvie, est fortioris & melioris operationis quam illa quæ est propinqua aquis, & imbibitur ex eis & quantitas quæ datur ex Coloquintida illi, qui est fortis, est pondus drachma semis, usque ad duos davich [] & est operatio ejus conveniens hominibus qui sunt

duræ naturæ ad laxandum, sicut illi qui degunt in regionibus frigidis, & qui utuntur in cibis eorum lacte, & caseo & similibus, quia istorum natura non movetur, nisi per fortes medicinas, & quando ponitur in clisteris, laxat humores crudos & melancholiam, & confert colicæ, quando ponitur de ea in medicinis, cum quibus clisterizantur à drachmis iiii. usque ad v. & coquitur & colatur aqua, & sic clister cum ea. Et scias quod folia Coloquintidæ quando accipiuntur ex arbore sua, & servantur, quousque annus unus pertranseat super ea, aut anni duo, aut tres, minuitur de virtute eorum & propter hoc necesse est, quod Medicus augeat in pondere eorum quando voluerit ex ipsis exhibere. Dixit Rasi quidam quod radix Coloquintidæ est melior medicina quæ esse possit puncturæ scorpionis, & Arabes habent ipsam pro communi & manifesta medicina ad hoc.

Et dixit Rasi Arabs quidam quod scorpio pūperat silium suum in quatuor locis corporis, & dedit ipsi in potu drachmam unam de radice Coloquintidæ, & sedata sunt statim omnia, quæ patiebatur. Rectificatio ejus est cum Bdelio. Christianus terit & linit super locum puncturæ, le-Ex Christi-
daturque dolorem ejus, maxime radice Coloquintidæ masculi: nam feminam ait mollem, albam, & esse debiliorem in hoc. Proprietas Coloquintidæ est (ut ait Aben Mesuai) quod mundificat ce-Ex Aben-
rebrum ab humiditatibus malis & expellit humores crudos, sed ipsa inducit punctiōnes, & tortiones, & tenationem in intestinis, & vomitum, & rectificatio ejus est quod admiscatur ei Dragagantum, & quidam admiscunt ei gummi Arabicum, sed Dragagantum est melius eo, quia juvat ad laxandum, gummi verò est stypticum & oportet quidem quod Coloquintida non tetatur multum, ne adhæreat intestinis, & ulceret ea. Melior autem est illa, quæ est matura, citrina in cortice suo, & interioris alba, & lenis. Cavendum verò est ab illa, quæ est sola in sua arbore, quia est mortifera. Dosis Coloquintidæ est à tribus Kirat [] usque ad sex. Coloquintida (secundum Abuberig) purgat choleram admistam humiditati viscosæ, non illam quæ est admista sanguini, quemadmodum facit Helleborus niger, & Scamonea, sed ipsa trahit à membris nervosis, & ille cui convenit potus Coloquintidæ est ille, qui habet agritudinem in capite suo, aut in velamine cerebri, quod est simile rethi, aut in alio velamine propinquo craneo, sicut est habens scotomiam, & hemicraniam, & cephalicam, i.e. Ovum, & Soda, & habens stuporem & paralyticum, & spasmodicum, & humiditatem oculorum antiquam, & stricturnam anhelitidum ab humoribus grossis, & dolores juncturarum, & sciaticam ab humoribus grossis, & agritudines renum & vesicæ. Et hæc Serapio ex autoritate Habix, Rasis, Christiani, Aben Mesuai, & Abuberig.

Meluzus Arabs inter alia huc reducenda vim ejus, potissimum cathartica, nobis sic descriptam reliquit. Immatura Colocynthis flatus tor-Ex Melu-
minosos & molestissimos excitat, immodicè purgat, ut etiam sanguinem educat. & sæpe mortem afferat pessima etiam ac venenosa est, quam produxit unicam tota una planta: quæ planta si loco illo est unica, multo perniciosiorem fructum parit, præsertim si locus ille est uliginosus, vel pulverulentus, vel thermis propinquus, vel serpentibus abundet. præstantissima femina, præsertim si est magna, ex-Ex Famina
xaciè quoque matura, alba, lenis, rara, levis, præstanti
uti ejus interior medulla albißima, rara, lenis, levis, quòque levior, eò melior: sitque ex agro, laxo,

Cautia

Oleum se-
minu.
Infusio se-
minu.In Clistere
quæ desit
modo im-
miscatur.

Folia.

Correctio.

Antiqua-
rum qua-
runtur
error.

Delectum.

Dosis.

laxo, arenoso, libero, Autumno lecta, cum languescente virore cæpente in luteum colorem mutari. Calida est ac sicca ordine tertio, ignea substantiâ & terrea per unctionem tenuatâ [eximie amara] constat. pituitam & alios humores crassos & glutinosos, magis ex profundis partibus & distantibus, ut cerebro, nervis, musculis, juncturis, pulmone, thorace, quam ex venis attractos, ut Dioscorides censet, purgat: ac etiam bilem flavam, ut voluit Humain. Quapropter dictarum partium morbis mixte subvenit, cephalalgia antiqua: dolori cranij totius, hemicrania contumaci, epilepsia, apoplexia, vertigini, aquosæ fluxioni in oculum, podagra frigida, ischiadi maxime, ac reliquis nervorum juncturarumque affectibus; asthma item, ac tussi antiquæ, dyspnæ ex thoracis repleti angustia. ac præterea summè omnium prodest colico dolori, tam à pituita quam flatibus, & hydropi. Omnia autem hæc sive sumpta, sive clystere, aut balano intestinalis immissa præstat, utero autem imposita, sætum necat. eadem cum aceto forti affricta, aliphos, lepram [psoram] elephantiam sanat. Oleum denique super cineres calidos incoctum, cortici ejus inanito, capillos illitu nigrat, eosque ne cadant, firmat, canitiem tardat. Idem auri instillatum ejus dolorem ac tinnitum sanat. Acetum autem similiter incoctum collutione dolorem dentium sanat: incidit enim, tenuat, terget, digerit. Ne autem cordi, ventriculo, hepati & cæteris visceribus noceat turbando, subvertendo, violenter trahendo, miscenda ei sunt dictas partes roborantia, ut Mastiche, Gallia & similia, uti miscentur glucinosa, lubricando citius deturbantia, acrimoniam mordacem obtundentia, ut gummi, Tragacantha, Bdellium, Mastiche, & similia, ne amplius vias exulceret [per quas fertur] & ora venarum adeo vehementer aperiat, ut inde sanguis maneat. Filius Serapionis Colocynthidem mulsâ cui incocta fuerit Ruta macerabat [eius drachmam unam in mulsâ cyathis duobus cum Ruta coquit Paulus, non Serapio] siccabat, lavissimè terebat, ex mulla prædicta dabat. Græcus quidam Colocynthidem rosato oleo fricabat, & cum æquali portione Ladani in catapotia formabat, utilia prædictis affectibus. Ego autem eam minutissimè forcipibus incido, glutino & iuvacine Tragacanthæ aut Bdellij perlino, sicco, tenuissimè tero: cum Ladano, vel mulsâ, vel Mastiche oleo rosato dissolutâ, in pastillos coquo citra molestiam purgatorios. Quod si noxam corpori impresserit, mulsâ, vel uvarum passiarum decoctum, cum oleo amygdalino, vel oleo nucum, eam abolet. Longam decoctionem sustinet, estque, ut mihi cum Serapionis filio videtur, contra filij Zezar sententiam, pulveranda tenuissimè, ut ejus facultas malefica permixta illi exquisitè alia plenius obtundatur, utque viscera celerius permeet, neque in ipsis ob partium minis tritarum crassitiem cesset: qua fortasse fit, ut in visceribus pigra retineatur, eaque ulceret, præsertim cum sensu perceptibiles fuerint ejus particulae. datur à siliquis sex ad decem, frigus & æstus vitantibus. Agitzæ, attestante Trago, Colocynthidem vino maceratam, aut decoctam, iis quos purgatos volunt, exhibere solent, ac ita quidem illos purgant, ut plerique satis concedant: hæc arte ferè omnes Iudei imbuti sunt. ab his ergo Medicis, qui valetudini suæ rectè consultum cupit, abstinere. Semen Lobelio constat non tanta virulentia ad purgandum, quam caro ipsa sive medulla: dedimus namque, inquit, multò majorem dosim, quam medullæ, majore

Tom. II.

commodo, nullo aut longè minore tumultu. Scribit Dodonæus ejusdem sententiam ad mortuorum corporum conservationem ac condituram utile, præsertim Aloe ac Myrrha admixtis. Pator p.m. luteris prodidit, se ex clystere, quem Colocynthidis ingressa erat, summè debilitatum, & ferè mortuum fuisse. Fernelius Colocynthidem calidam siccamque dixit ordine tertio, amarissimam; lentam pituitam, crassosque, ac glutinosos humores, pariterque bilem utramque (quod vix alij concessum est) detrahere, & aquam citrinam, idque maxime ex articulis, & distantissimis reconditis similique partibus. Conferre morbis inveteratis, contumacibus, quos neque Agaricus, neque Turpetum solverit. Vehementer autem ventriculorum, viscera, corpusque conturbare, venas aperire, & sanguinem elicere, quam Aloe, aut aliud quodvis pharmacum, potentius: intestina corradens gravibus torsionibus excruciare. Quocirca exquisitissimè tritam diluit oleo amygdalarum dulcium, additque tragacantha, aut mastiche concinnari in trochiscos, vel coqui ex jure pingui, aut ex alio quovis liquore leniente. Nec puerorum, nec senum, nec prægnantium (sævus enim vel supposita enecat) sed ætate duntaxat florentium & robustorum medicamentum esse, vixque nisi aliorum permixtione tutum. Dari à scrupulo uno ad drachmam dimidiam. Quòd si tandem omnino Colocynthide uti velis, accipere te jibet Tragus Germanicam nostram, pilococynthi- ro similem, utpote in expellendo non tam strenuam & immitem. Pilam ergo seu fructum Colocynthidis bene excavato, fungosamque ejus unâ cum seminibus medullam cyatho vini injicio, ac quatuor, aut quinque horis maceratam per linteolum exprime, expressumque succum, noctu cum cubitum ire voles, bibe. quod si feceris, videbis luce appetente, pituitam, crassos ac viscosos humores, nec non bilem citra noxam leviter exigi. Idem medicamentum colicis prodest, & ad putridas ventriculi febres facit, hydropicis apprimè conducit.

Bayrus l.6. c.24. Colocynthidem silvestrem coquit, prius tamen tritam, & in aceto infusam, donec mellis acquirat crassitudinem, sanificat gingivas circa dentem, & jubet eo claudere per modicum temporis, postea accipit dentem cum digitis, & sequitur sine dolore. Probet, qui volet. Nos fidem hujusmodi stultitiam non habemus, quamvis Schenk-kius l.1. obs. med. 424. de dentibus agens, eandem teneat opinionem.

CITRVLVS FOLIO COLOCYN- thidis secto, semine nigro, quibusdam An- guria.

C A P. V.

SPARGIT per terram sarmenta fragilia, hirsuta, foliis vestita amplius, in profundas lacinias dissectis, asperis & hirtis, è quorum sinu exeunt capreoli, nec non pediculi flores sustinentes luteos, quos fructus excipiunt magni & rotundi, quos ferè ambabus manibus ambias; cortex durissimus, sed lævis, nullis tuberculis inæqualis; atro-viridior, dilutissimè virentibus maculis perfusus: caro Cucumeris vulgaris, alba, firma, gratissima; poris; semen fungosâ medullâ occupante substantiâ immergitur oblongum, latum, compressum, nigrum, rugosum, durissimè corne prædurum, sub quo medulla alba, esai grata, ut Cucurbitarum

*Citruli ge-
nus aliud*



crassiora, colore buxco obscuriore, nullis lineis per ambitum notata.

Synon.

*Tetrangu-
ria*

Sicya

*Melopala-
stinus*

*Cucum. Sa-
racen.*

Cucumis

gularis f.

mel.

*Cucum. ci-
trinum.*

Anguria

Italor.

*Angur. Ge-
ra*

*Citrull. offi-
cinar.*

Melopo

Semen

*quar. cor-
municib.*

minim.

Brassicola

*hullucina-
tur.*

Cucumis

Hetrusci.

Gracca

terribus

ignota.

An Citrus hic sit Simeonis Sethi, cuius verba infra de viribus adscribemus, Anguria; Cucumis dicta, secundum vero communem sermonem Tetranguria, considerent lectores. Hermol. coroll. 3. 6. vocat Sicyam quorundam, Angurium vulgi, & Melonem Palestinum. Serapioni dicitur Batecha, Chatha, & Kurajic. Melo, Citrullus, & Cucumer. Iacob. Manlius Batecham Serapionis, & Albarbecam Avicennæ (quam nonnulli Cucumerem Sarraenicum, Anguriam interpretantur; & Languriam) unam & eandem plantam esse contendit.

Tragus Cucumeris genus facit, ac per omnia vulgaris simile ait, sed magis exiguum, latis & phœnicis seminibus intus repletum: foliis Colocynthidi peregrinis, aut Bryoniz similibus, multis incisuris dissectis. Hoc genus autem Citrullum, Citreolum, & Cucumerem citrinum vocat.

Fuchs quartum generis Cucumerem statuit, & officinas, quæ Citrullum vocant, respiciens, germ. Citrullen nominavit, gall. Citrulle. Cord. in Diosc. Cucumeris quandam speciem vocavit, & Anguriam Italorum. Dod. in fol. lat. Geln. de coll. stirp. & Tab. Anguriam. Geln. h. Anguriam veram. Lob. in Obs. p. 364. & Icon. p. 640. Citrullum officinarum. De hoc verò ait in Advers. Imitatur majorem aliquem Melonem effigie, & carne solidiore, fragili: sed sapore, vespensque magis Pepones vulgaris refert: unde Melopeponem, ut ancipitis naturæ, mixtæ de utroque nomenclaturâ dictum puto, nempe Mali five Melonis circinîtâ rotunditate, non tamen rotulis sulcata, & sapore magis Peponem, quàm Melonis dulcedinem melleam referente: quibus etiam, monente Galeno, discernitur à Melone. Semen verò unum è quatuor vocatis majoribus est; majus Melonis, minus Peponis, duriori cortice septum, nigro, omnium durissimo: alioqui tota planta similis Peponum plantæ, sed foliis altioribus, laciniis Colocynthidi propriis. Seritur etiam & manditur caro cocta, vel cruda, & platisque Pedemontij, Italique hortis enascitur.

Cæterum, hallucinari Brassavolam putat Matthiæus, quod existimavit veteres Græcos, præsertim Dioscoridem, & sive appellacione, Hetruscorum Cucumin, vel aliorum Italæ populorum Anguriam representasse. Facile adducor, inquit, ut credam, Græcos veteribus Græcis incognitas. Eas nunquam vidisse, vel cognovisse veteres, demonstrat Fuchs. Minus illis assentior qui Pepones Angurias esse dicunt. Anguria hæc, quam Dallaha appel-

Observavimus in horto E. C. Citruli genus majus, capitis humani magnitudine æquans, cortice cœctum duro, inæquali, anguloso, atro-virente, maculis ex luteo pallidis per longitudinem ex intervallis uncialibus notato. Pediculo hęrent gracili, si cum Cucurbitis eam confertas. Caro quoque quæ cucurbitina, firmior est, saporis Cucumeris vulgaris. Semina Cucurbitinis minora,

lat Serapio, planta est folia ferens Colocynthidis medicamentosa, majora tamen, aspera, & per ambitum divisa: caulem farmentosum, humi repentem, ut Cucumis & Pepo: florem edit aureum, fructum magnitudine mirum in modum extuberantem, ponderosum, lubrotundumque: cortice lævi, herbaceo colore, maculoso tamen, & eâ parte quæ humi jaceret, albicante, carne intus humidâ, aquosâ, in quibusdam prædulci in nonnullis autem subacidâ, insipidave, siquæ extinguentæ perquam idoneâ. Semen conclusum, latum, Peponum duplo majus, Cucurbitæ paullo minus, cortice solidiori, & nucleo grandiore. Est quoque feminis in colore differentia, quod uni nigrum, alteri rubrum innascatur. Seritur in hortis & viridatis, ac etiam in agris. Decerpitur fructus, & diu quoque allervatur in horreis. Triticum enim acervis insidens, non solum à putredine tueretur, sed coquitur, si immaturus decerpatur. Hæcille qui Anguriam inscribit, vocatque germ. Angurien; Gurden & Erdtappfel: Hisp. Cogombro: & gall. Concombre, meo judicio non absque errore.

Anguriz voce primo Aëtium usum esse censuit C. Bauhinus, qui alias Citrullum vocari tradit à citreo colore, ac propterea Anguriam. Citrullum dictam vocat, variareque ait colore corticis, nunc virente, nunc maculoso, subcandidis maculis: carne nunc rubente & dulciori, nunc candidâ: femine nigro, aut rubro, aut fulvo; rariis sine femine reperiri, Cæsalpino teste. Esse tandem narrat, qui Peponem Dioscoridis, Galeni & Plinij esse credant. Citrullus dicitur Trago, Geln. h. Lon. Tab. officinarum, Lob. & Ger. Anguria, Matth. Ang. Lac. Geln. coll. Dod. Lugd. Cast. & Cam. Cucumer, vel Cucumis citrullus, Fuchs. Dod. Geln. h. & Turn. Cucumer vulgo, Cæf.

In calidis regionibus Anguria suavior provenit, ideoque circa Romam, in Campania, Apulia, Calabria, & Sicilia, præstantiores habentur & mole vastiores. Dodonæus hanc Germaniaræ rarè ferri, rariis verò etiam mature scire scribit. Nobis tamen aliquoties feliciter provenit ac maturuit in horto E. C. Montebelgardij. Genevæ ex femine dicto Citruli, floruit Junio, Julio, Augusto & Septembri. Basileæ in hortis colitur Citruli nomine, semen officinis vulgare, oblongum, latum, compressum, nigrum, & rugosum, in quo differt à Batecha, cuius semen læve, æquale, five politum, nigrum & album, quod etiam majus.

Anguriz vires, quas hic primo loco tradimus, habet Simeon Sethi, non tamen asserimus cum intellexisse plantam, de qua præfenti capite sermonem instituvimus. Perpendant lectores an fortè Cucumerem vulgarem assignarit. Anguria, inquit, quæ Cucumeres dicuntur, secundum verò communem sermonem Tetranguria, ob frigidum & humidum temperamentum, noxia sunt, & mali succi. Exiis autem parvæ magnis anteferre oportet. Hæc utinam ducunt, & si in aceto macerentur, in acutis præsertim febribus, mitiorem calorem reddunt. Crebrior verò horum usus semen genitale minuit, in veneremque impetum aufert. Semen autem horum desiccum, caliditatem quandam possidet, contrariamque his actionem efficit, utinamque magis provocat. Pituitam Tetranguria in ventriculo gignunt, quæ cruda per venas diffunditur. Proferetæ qui his crebrius utuntur, illi propter humores temporis spacio in venis & aliis corporis cavitatibus coactos, longis corripiuntur febribus. Semen verò horum utinam, cit, sed minus quàm Peponum, quoniam celerit in ventriculo corruptum. Meliora in his sunt, quæ habent semen exiguum. Calidos autem & siccos stomachos juvant, & si in ardente febre cum aceto porrigantur, valde profunt.

Pro-

Proprium verò horum est, naufcas, ventriculi calore excitatas, sedare. Horum autem interiora esse oportet: nam quæ foris sunt, mali succi existunt, & difficulter admodum coquuntur, & ferè venenata. Habent verò & alias proprietates, ut animo deficientes propter excedentem calorem reficiant. Si autem pituitam in ventriculo nanciscantur, naufcas faciunt, & colicos affectus & hypochondriacas passiones. Hæc ille. Anguriæ fructus, inquit Matthiolus, frigidus est & humidus, ordine secundum, situm arcendæ apertissimus. Quo fit, ut Itali ardente Syrio ejus pulpâ internâ se refocillent. Confert adurentibus febribus, & linguæ ariditati quàm maximè. Acutos humores vincit, & iis præsertim auxiliatur febrientibus, qui humorum malignitate magis, quàm abundantia scaten. Siquidem Anguria (ut Serapioni placet) alvum in principio fortiter non citat: idèquæ in illis convenit, qui tenuis & imbecillis sunt temperamenti, macri & exangues: tenim iis alterantibus magis opus est, quàm ducentibus humores, verum quamvis id effici possit acidis medicamentis, insipida tamen, quæ nonnullam dulcedinem habent (ut Anguria) hisce in casibus longè magis conveniunt. Impossibile enim est, quin acida, & quæ cum aceto parantur medicamenta, incidant & attenuent. Id quod imbecillia corpora, macra, & exangua, haud quamquam sustinere queunt, quod ejusmodi acidæ potiones maciem augeant, & ventriculum lædant. Atqui etiam ubi quispian acida adstringentia propinaverit, impossibile quidem videtur, ut obstructions non augeantur, hæc in jecinore, & ejus meatibus extiterint. Etenim acida & adstringentia medicamenta exiceant, & nihil prorsus humectant. Porro insipida, & quæ crassæ sunt substantiæ, quibus aliqua, ut in Anguria, dulcedo insit, suo quidem temperamento humectant, ac simul refrigerant, generantque in ipso jecinore sanguinem aquosum, qui flavæ bilis fervorem & malitiam coercet tam in jecinore, quàm in veris. Caterum, ut Dodonæus concludit, Anguriæ caro, quæ cortici subest, cruda, sed frequenter cocta comeditur: alimentum autem confert exiguum, idque frigidum ac humidum, sanguinemque ingenerat aquosum, qui internarum partium inflammationes mitigat, & bilis acrimoniam ac fervorem contemperat. Cruda in ore commansa lingua in febribus asperitatem lenit, & sitim sedat. Semen facultate Cucumerum simile est.

CITRULO AFFINIS MELO

Indicus, sive Patheca.

CAP. VI.

EST apud Indos Melonis genus pregrande & rotundum, oblongius tamen aliquantulum, formæque quodammodo ovali, quod Lusitanis Indiam incolentibus Patheca (corrupto ab Indorum Batieci vocabulo) dicitur. Hunc Melonem per longitudinem non appetunt, ut Meloepones nostrates comesturi aperimus: sed per transversum secant. Et licet dulcedine à nostris superetur hic Melo, attamen suavis est, refrigeratque mirum in modum & humectat, tota carne sese in quandam liquorem resolvente, authore Garcia, arom. l. 2. c. 20.

Reperiunt autem Arabes & Persæ primùm hunc fructum ad se delatum, eamque ob causam Batieci inde appellant i. e. Melonem Indicum, quo nomine etiam ab Avicenna multis in locis appellatur. Batieci enim eorum lingua Melonem sonat. In India verò ab ipsis incolis Calangari dicitur. Meminit hujus Avicennæ lib. 4. Fenn. c. 29. de tertiana pura, ac eum multis laudibus commendat. Putarunt nonnulli id

Melonis genus, quod in Hispaniæ Castella nascitur, quòdque Budiecas vocant, esse hunc Melonem Indicum & depravato à Batieci nomine Budiecas appellatum. Sed magnopere falluntur. Nam plurimùm ab hoc differt cum foliis, tum plantâ totâ, quæ Melonum Indicorum modo per solum non extenditur & serpit, sed sese in altum extollit. Ajunt etiam in Africa Indicis similem nasci, sed cum non viderit author, affirmare hoc non auit.

De Citrulo affine Melone Indico hæc scribit Linschottanus: In Java magni atque elegantes Melones aquatici proveniunt. Fructus hic suavis est admodum, obscure virens, intus albus, magnitudine Cucurbitæ oblongæ: quem incolæ suis hospitibus præcipui honorarij loco apponere solent, propter insignem vim refrigerandi, qua pollent: In universa India appellantur Batieci.

Nos Citrulli officinarum semini latò, compresso & nigro simile, sed majus vidimus, magisque æquale, & lubricum, à viro celebr. D. Theodoro Beza exhibitum, cujus duo gênera, nigrum sc. & flavum. Genevæ plantata duobus foliis productis periere. Ex India allata fuere.

B. pin. Melo 7. Indicus fructus oblongus: Batie Indici, sive Indicus Melo, Garz. Patecas, Anguria, sive Melo Indicus, Linsc. part. 4. Ind. or. c. 10. Melones aquatici in Java, Batieci in universa India part. 4. Ind. or. cap. 6. & fig. 20. An Comolanga Lud. Romani, Clusii Garz. Scalig. Lugd.

Utilis verò est in biliosis febribus & ardentibus adversus jecoris & renum ardore, ut experientia Garcia didicit. Urinas cit: solentque sani cum fructum edere, quatuor horis à jentaculo, quoniam tum maximè sit infestus calor. Melius tamen facere videntur, si ab eis suas mensas auspicarentur. Hujus semina (quæ ante maturitatem candida sunt, per maturitatem verò nigra) somnum provocant, eaq; reliquis feminibus frigidis, tamethi eis non careamus, præstantiora æstimamus. Ignorant eruditi hujus regionis Medici, istius Melonis in Medicina usum: non solent enim ad hujusmodi minutias sese abjicere, & in suis curationibus experientiâ & consuetudine duntaxat nituntur, sed à me (Garcia) edocti, eisut ceperunt.

CITRULO VEL MELONI

Indico accedens Camolanga.

EMINIT Ioseph. Scaliger exerc. 81. part. 15. in Copal Indiæ provinciæ Camolangæ fructus, qui citatur, & sesquipede major est, Cucurbitæ colore, humi, instar Melonis, jacentis, pulpæque plurimum habentis. Cum Melone vero Indico similitudinem quandam habere videtur Clusio apud Garciam, quam Ludovicus Roman. l. 5. navig. c. 15. in hunc modum describit: Habent in Calecut fructus quosdam Cucurbitis similes, sed conditur æ Cucurbitis piores. Res est non indigna memoratu, huic nominem est Comolange. Oritur in culta tellure Peponium modo. An autem is est, cujus succum Turcæ, & Vngari in delitiis habent extinguendæ sitis gratia: vel Napeca Bellonij Obf. lib. 2. c. 6. quam vulgari Arabica appellatione Copous nominari scribit: ca.

Lugd. p. 187. vocat Camolangam. Müntz. Cofin. lib. 5. Camolangam provenientem in Calcut. Portugalesis hist. gall. l. 13. Malucanorum fructum, valde refrigerantem, Camulini vocatum.

CUCURBITINVS FRUCTVS INDI-

cus, magnitudine ovi Scrutij.

FRUCTUM hunc ex India allatum, accepi ab Illustr. mea principissima, Ducissa V. Virtemburgica, &c.

HISTORIAE PLANTARVM



Vulpa.

Semina

Pis.

magnitudine ovi Struthij, aut Limonij majoris, sed utroque extremo obtusiore, quam in ovo, facie Cucurbitina, pediculo digitali. Cortex crassus erat ac durus, fragilis tamen, tenui ac flavescens obtektus epidermide, quibusdam ceu foraminibus conspersus, parte concava fungosus, qui excavatus, poculi vices supplere posset. Pulpa intus contenta fungosa, & albicans, sapore

nullo insigni: seminibus facta parvis, compressis, Colocynthisin ferè similibus, longioribus paullo, rufis, & supernè cordatis, ruffa cum fimbria dilutionis coloris: sapore subdulci, & jam ob vetustatem rancescente,

Condimenta ex hac Camolanga componunt, vel Cucurbitis quas Caraballadas vocant Hispani, vel Citris meliora atque lapidiora, Scalig.

ΣΙΚΤΟΣ, ΣΙΚΤΑ, ΣΙΚΤΕ, ΠΕΠΟΝ,
Σικτοσ, Cucumis, Pepo, & Melopepon, veteribus, & Neoterici.

CAP. VII.

PAUCA veteres & obscurè de oleraceis modò nominatis pomis scripsere, ac fortè confusè Plinius, ac magis Neoterici. Nos igitur statuimus priusquam de pomis nobis notis scribamus, omnia proponere, quæ veteres de nominatis in titulo tradidè, ita ut posteritati anàs & occasio præbeatur, quomodo nostro seculo denominandæ sint, certius & liberalius judicandi & decernendi. De his igitur omnium antiquissimus scriptor Theophr. hæc passim prodidit. Humor Cucumerem [anivas] quoque comitatur, ex carne, & nervo: semina hujus [anivas] non congelita atque promiscua, sed discreta atque distincta: succus verò [anivas] aquosus. Megaresenses Peponibus [nec anivas] Cucumeribus [anivas] fortè legebat Gaza, abest tamen in cod. Basil. & Ald. cum venti anniversarij perflant, terram scalpentes, pulverem excitant, atque ita dulciores, teneriorèque reddunt absque irrigatione. Ad summam, omnia æstiva brevem radicem sortiuntur: etenim Pepo [i anivas] & Cucumis [i aniva] exiguum sortiuntur. Floret Cucumer eù in modum [qua Faba & Helvæ]

Theophr.
Sicyos, &
Sicya.

Sicyos, Pe-
po.

Gaza lect. pium

Tempus.

Oler.
Flor.

qui Pepo cognominatus est [in Theophr. græcè δ' ανις - nomen tantum legitur] etenim huic præposito germine accidit. Quædam plantæ figura subditi loci imitantur: Cucumis enim [i aniva] formam accipit loci, in quo facta fuerit. Saporum differentiam preparata Cucumeris [i anivas] semina capiunt, si lacte macerata terantur: circa quintum diem facta erumpit, aut sexto, vel (ut alij volunt) septimo, prius, celeriusque Cucurbita. Cum seminibus ipsis flores edunt in olerum genere Pepo [i anivas] & Cucumis [i aniva]. Quippe omnibus flos in postremo fructus, & crescentibus fructibus flos diu infixus servatur. Simples autem Cucumerum [i anivas] flo-

res sunt, qui postremis famentorum emergunt, & ob id eos auferunt: Cucumeris enim [i anivas] prohibent incrementum. Maturius ex recentioribus feminibus exit, in quem finem nonnulli semen lateat, ætè, aut aqua etiam præmacerata ferunt. Cucumis [i anivas] pluribus generibus constat, quod partim affirmant, partim negant. Illi tria genera notant, Laconicum, Scytalicum, Bzoticum. Ex his Laconicum melius rigatum evadit: reliqua verò duo non rigata præstantiora fiunt. Cucumis [i anivas] ut cætera hujusmodi olera, præhumida est & frigida. Cucumis [i aniva] vocata, quamvis arboris altitudinem capiat, in ramòque sese, Vitis arbutivæ modo diffundat, tamen vitæ admodum fragilis est. Itaque ante ætatem germinare non potest, sed ad Autumnum usque prorogari cupit. Tercio porò die Cucumis [i anivas] exit. Sua imbecillitate facile perit in annuis Cucumis [i aniva, fortè legendum i aniva]. hæc enim ne ad naturæ suæ quidem perfectionem pervenire potest. Ampliatur parte superna, luxuriatque Cucumis [i anivas] licet radice pumila inhæreat. De Cucumeribus [i anivas] fortè legendum ut alibi anivas] porò dictum est, quod feminibus in late, mulsove maceratis dulciores reddantur. Amaritudo autem Cucumerum [i anivas] per similitudinem sentitur. Enimverò foras versas rem hujusmodi excerni consentaneum est, utpote alienam. Quia porò Cucumeres [i anivas] pulvere oculculari nutriti, teneriorèque reddi creduntur, ideò Megareses ita eos tractare consueverunt. Si quis nunc parvos Cucumeres [i anivas] in mollicitia absconderit, alimentique copia largè accesserit, percoctaque fuerit, incrementum quoque largè consequuntur. Sic enim nulla pars alimenti à Sole detrahitur, nec flatibus reficatur: quibus causis moles augeri non possunt. Et hæc Theophrastus, qui & Cucumis silvestris [i anivas] alibi meminit. Quæ autem de Sicyo tradit, ea nobis videntur omnia convenire cum Melonibus nostris, de quibus post. Quæ porò de Sicya prodit, competunt fortè Cucumeri nostro vulgari.

Plin. l. 19. c. 5. de natura, & generibus, & historia nascentium in hortis, ait: Cartilaginei generis, extraque terram est Cucumis, miræ voluptate Tiberio principi expetit. Nullo quippe non die conigit ei, pensiles eorum hortos promoventibus in Solem rotis olitoribus: rursusque hybernis diebus intra specularum munimenta revocantibus. Quin & late mullo semine eorum biduo macerato [Hæc sit & hodie in saru nostrorum Peponum, Dalech.] apud antiquos Græciæ authores scriptum est seri oportere, ut dulciores fiant. Crescunt qua coguntur forma. In Italia virides, & quàm minimi [Melones minimos, & Cucum Malo Cydonio non amplius, res, adhuc habes Hispania, Dal.] In Provinciis quàm maximi: & citrini [cerini legit Dalech. qua voce aut or quoque usus est cap. 13. lib. 15. Apud Marcellum ex Plauti Antularia, in voce Flammæus, Hadrianus lunus pro carinarij legit cerinarij. Alibi Plautus cerinum & melinum colores memorat] aut nigri. Placent copiosissimi Africæ, grandissimi Mæliæ: cum Cucumis magnitudine excellere, Pepones vocantur. Vivunt hausti in stomacho [de Cucumere, hoc Diosc.] in postero diem, nec perici queant in cibis, non insalubres [de Melone idem] tamen plurimum. Natura [de Cucumere & Anguria, idem] oleum odere mirè, nec minus aquas diligunt. Defecti quoque, ad eas modicè ditantes adrepunt: contra oleum refugium: aut si quid obstat, vel si pendeant, curvantur: idque vel una nocte deprehenditur, si vas cum aqua subiciatur à quatuor digitorum intervallo descendentibus ante postero diem: si oleum eodem modo sit, in hamis curvatis. Idem in fistula flore demissio, mira longitudine crescunt. Ecce cum maxime

nova

nova forma [de Melonibus, idem] eorum in Campania provenit, Mala Cotonei effigie. Fortè primò natum audio unum: mox semine ex illo genus factum, Melopeponas vocant. Non pendunt hi, sed humerorundantur. Mirum in his, præter figuram, colorémque, & odorem, quòd marutitatem adepti, quam non pendentes [de Melonibus, idem] statim à pediculo recedunt. Columella suum tradit commentum, ut toto anno contingant. Fruticem Rubi quàm vastissimum in apicum locum transferre & recidere, dudum digitorum relicta stirpe, circa vèrnum Æquinoctium: ita in medulla Rubi semine Cucumeris insito, terrà minutà, firmoque circumaggratas resistere frigori radices. Cucumerum Græcica genera fecerunt: Laconicum, Scytalicum [αλακων, βαλενα, σταγέλλιν] que scytica. V. catum inde Cucumeris hoc genus, aut quòd ex eius sarmentis fierent habena, loricæ scyticarum, vel quòd iis sarmenta similia essent. Galli scytasus inde Courges nominantur. Est & inde sumptum nomen scytalus serpentis cum mentio sit c. 5. l. 32. Et nunc sicut Theophr. cap. 5. 4. dist. que scytica baculum significat. Dalech. Bœoticum. Ex his tantum Laconicum aquà gaudere. Sunt qui herbà, quæ vocatur culix nomine, trita, semen eorum maceratum feri jubeant, ut sine semine nascantur. Idem Plin. l. 20. c. 2. ubi de anguino, siue erratico Cucumere egit, de sativo, & de Pepono subdit. Multi eadem omnia [qua Cucumeri silv.] fativis tribuunt. Magnū etiam in eis momentum. Namque & eorum semen, quantum tres digiti apprehenderint, cum Cumino tritum, potumque in vino sufflentibus auxiliatur. Sed & phreniticis in lacte mulieris. Et dysentericis acetabuli mensura. Puerulentæ autem expientibus cum cumino pari pondere, & jodineris vitis in aqua multa. Urinam movet ex vino dulci, & in renum dolore clysteribus simul cum cumino infunditur. Pepones qui vocantur, refrigerant maxime in cibo, & emollunt alvum. Cato [Dioscoridi] ad hanc usque, insusum: Ruell. verò legit, ad hanc usque, & mentum] eorum epiphoris oculorum aut doloribus imponitur [contra infantum strasum imponitur] principii: & ad motum fructu pro anacolle matre, oculorum fluxu, nesciobet, Di. sc.]. Radix sanat plucra concreta in modum favi, quæ ceria vocant. Eadem contra vomitiones siccatur, & in farinam trita datur quatuor obolis in aqua multa, ita ut qui biberit, quingentos postea passus ambulet. Hæc farina & in smegmata adjicitur. Cortex quoque vomitionem movet, faciem purgat. Hoc & folia cuscun que sativi illita. Eadem cum melle epinyctidas sanant: cum vino, canis morsus. Item Millepedæ, spea Græci vocant, oblongam pilosis pedibus, pectori præcipue nocivam. Morsum tumor insequitur & patrefcit locus. Ipse Cucumis odore defectum animi. Coctos de asfo cortice, ex oleo, aceto, & melle jucundiores esse certum est.

De Cucumere sativa [αλεκων, βαλενα] hæc scribit Dioscorides: alvo, stomachoque utilis est, refrigerandi vim obtinet, si modò non corrumpatur, ac vesicæ prodest olfactu verò de se os animo recreat. Sed & ipsius semen modicè urinas cit, & cum lacte aut passio vesicæ exulcerationibus subvenit. Cæterum ejusdem folia cum vino imposita, canum morsus sanant: ex melle verò epinyctidas. Idem de Peponibus [αλεκων, βαλενα] ait. Ipsa quoque Peponis caro in cibo sumpta urinas movet: oculi verò in inflammationes imposita lenit. Eius verò rariorem infantum strasli laborantium principii imponitur: ac fronti quoque anacolle matris vice adalligatur ad inhibendas oculorum fluxiones. Porro luccus cum semine adjecta farina siccatur in sole, faciem smegmatis vice repurgat, illique nitorem corollat. Cæterum sicca radix ex multa drachmæ pordere pota, vomitiones movet. Quòd si quis placidè ac citra

molestiam vo nere à cena voluerit, oboli bini satifecerint. Sanat quoque cum melle imposita capitis ulcera concreta in modum favi, quæ ceria vocant. Et hæc Dioscorides qui neque Cucumerem sativum, neque Peponem, ut vulgaris notitiæ plantas, descriptis, sed nec aliorum veterum ullus suis notis nobis illas representavit. Dioscoridis autem Pepones [Peponi Dioscoridis est Cucumeris noster.] nobis quidem videntur esse Cucumeres nostros; Ejus verò Cucumeres, nostros Melones.

Cucumeres, ut tradit Galenus, urinam quidem, ut & Pepones cient, sed minùs quàm illi, quòd ipsorum substantia minùs est humida, idèque non facili, ut illi, in ventriculo corrumpuntur. Invenias autem qui ipsos bellè concoquant. Qui autem eo ipso fusi statim sese impleverunt, tandem longo tempore succum frigidum ac mediocriter crassum in venis coacervant, qui in ea concoctione, quæ in venis fit, haud facili mutationem in probum sanguinem recipit. Quam ob causam omnibus pravis eduliis abstinendum, etiam si ea quibuldam concoctu sint facilia. Nobis enim non advertentibus pravus succus ex ipsis post longum tempus in venis colligitur, qui postea exiguum ad occasionem putredinem nactus, febres malignas accendit. Et hæc l. 2. alim. Idem 8. simpl. Cucumis esculentus maturus quidem tenuioris essentia est, immaturus autem crassioris. Sed & abstergendi & incidendi facultas eis inest. Quare & urinam movent, & corpus splendidum reddunt, ac magis quoque si quis semine arefacto, contususque ac cribrato vice pulveris abstergendi utatur. Superat in eis frigida humidaque temperies, non tamen magnopere, sed quasi in secundo censetur ordine. Attamen si quis aut fermen, aut radicem arefaciat, haud etiam humidæ fuerit naturæ, sed jam desiccantis: idque in primo quodammodo ordine, aut etiam secundo, sed incipiente. Est & in istis major abstergendi facultas, quàm in fructu ipsius carne. Et lib. de euchym. & cacochym. Sunt autem inter fructus Cucumeres, & Pepones & Melopepones. Sed qui à bonitate succi tantum absumunt, ut nisi celeriter transeat, in ventre corrupti succum ex ea corruptione faciant mortiferis venenis proximum. Hinc sententia, ut assentiantur omnes, ad stipulante ipsa etiam experientia, ita Diophili Carysi jopinio reprehensione digna, qui apud Athenæum Cucumerem noxium damnavit primis mensis, ut qui raphani modo sursum feratur, ultimo cibo innocentior esse, concoctuque faciliorem, alioqui usum eis abdicavit. At contra cum pravi sit succi, ante alios omnes cibos sumendus, ut facilius per alvum subeat, nec non eo corrumpatur, quòd facile ei eveniet, si aliis cibis postremus ingeratur. Addidit his quæ vera sunt, urinas eo citi, refrigerandi vim habere, difficile in corpus distribui, ægrè per ventris anfractus evadere. Quinetiam horrores concitare, bilem creare, venerem arcere.

Plenilunio maxime gliscunt in hortis Cucumeres plenilunio res, manifestumque capessunt incrementum, & incrementum more marinorum echinorum implentur, ut tradit Athenæus, quod est aquei humoris incrementum. A mulis Cucumeres expetuntur, capiunturque mirra eorum voluptate, nec non odorem emittunt sentiunt. Quare munienda sunt cucumeraria, ne itumpeantes, ea depopulentur ac proterant.

Martio mense, inquit Palladius, Cucumeres semina minantur, rare sulcis factis, altitudine sesquipedali, latitudine pedum trium. Inter sulcos octo pedum spatium crudum relinquant, ubi possint vagari. Herbis juvantur, idè sarculo & runcatione non indigent. Semina si ovillo lacte & mulso maceres, dulces nascuntur, & candidi. Longi & teneri sunt, si aquam in patenti vasculo sub eis ponas, duobus palmis inferiori, ad quam festinando tales efficiantur.

Cuc. dub. est Longi.

Sine femi- cidentur. Sine femine nascuntur, si prius eorum se-
me. mina oleo fabino [semine ali] perungantur, & her-
ba ea quæ Culex dicitur, trita conficiuntur. Aliqui
florem Cucumeris cum viticulae suæ capite canna
inforunt, cui prius omnes nodos perforaverint: ibi
Cucumis nascetur in nimiam longitudinem tensus.
Oleum sic metuit, ut si juxta polueris, velut hamus
plicetur. Quoties tonat, velut timore perterritus
converitur. Si eius florem sicut in sua vite est, in
forma fictili clauderis, ac ligaveris, qualem vulcum
forma vel hominis, vel animalis habuerit, talem Cu-
cumis figuram præstabit. Hæc omnia Gargilius Mar-
tialis asseruit. Columella dicit, loco aprico & sterco-
roso si Rubos habeamus, aut Ferulas, post Autumni
Æquinoctium, his juxta terram recillis & excavatis
ligneo stilo, inter medullas lætamen immittamus, &
Cucumeris semen addamus, hinc nasci fructus qui
possent & inter frigora non necari. Hæc enim, ut
Afferentio hyemen odit. Inventa est ratio, ait Plinius, qua cibis
servarentur Cucumeres usque ad alios proventus:
& id quidem in muria fit. Sed & scrobe opaco in lo-
co arena substrato, scænoque sicco operatos, ac dein-
de terrâ, virides servari tradunt. Salsamari hodie
sale, aceto, Fœniculo, & Sampfuchio condunt. Alii
tritâ sinapi cum aceto.

Nomina Sine græcè dicitur, cognominaturque *ἡμαρ* ad
linguar. *ἡμαρ* sc. differentiam: & Attico more *σίκυς* & *σικύων*,
Sicyus Ety- & à Phrynichio Poëta *σικύων*. Demetrius verò, A-
mon, thenæo auctore, *σικύων* dictos esse ait ἀπὸ τοῦ σικύου
& *σικύων*, i.e. quod venerem ciant, cum contra veneri
refragentur. Inde proverbium fuisse commemorat
Proverb. Athenæus τὸν σικύων ὁρῶντα παρὰ τὸν τῶν χυλίων ὄνομα,
i. e. texens pallium mulier Cucumerem devoret.
Cum enim textrices magnâ ex parte, si Aristoteli
creditur, sint impudice, ut in iis venenis impetus re-
frenetur, flagitium edendos Cucumeres textricibus
consulebat: nam venerorum aviditatem inhibere
tradidit Diphylus. Quare *σικύων* nomen im-
positum fuit. At potius *σικύων* dicuntur ἀπὸ τοῦ σικύου
Ety. aliud *σικύων*, quoddam gignendos, spargendos, diffunden-
dos ramos caulēque valdè incitentur, non quod
venerem stimulent. Matron suis carminibus terræ
silium nominavit. Heracles Tarentinus Hedy-
geon, quasi terræ suavitatem. Recentiores Græci
Cucumeres *ἀγγούρια* vocant, & communi sermone,
teste Simeone Sethi. *τρεῖς ἀγγούρια*. Latinis verò Cucu-
mis & Cucumer dicitur, à curvitate ut Varro ni pla-
cet. Arabes *Chate*, *Cheta* & *cherhete* vocant: Germa-
ni Cucumern: Belgæ Concomeren: Galli *Concombre*
& *Cocombre*: Itali *Cocumero*: Hetrusci *Cedruolo* Hi-
spani *Cogumbro*: Angli Cucumbres: Bohem. *uvok-
kyorky* Hung. *gorka* & *Buburka*.

Aequosita. Tanta porro est naturæ cognatio, inter Cucume-
re, Pepones, Melopepones, & Cucurbitas, ut sæpe-
numero & proprietates, & nomina Latini, Græci-
que confuderint. Pepo enim, qui à Græcis Pepon, à
Theophrasto Sicyos & Persicyos dicitur, à Polluce
Cucumerum generi contribuitur. Nec desunt, qui
Sicyam hoc intelligant, quod vulgo Angurium &
Palestinus Melo dicitur. Athenæus certè Sicyam ve-
teres pro Cucurbita vocare solitos affirmat, atque
ita Nicandrum Poëtam uti Georg. vol. 2. Apud
Græcos certè Cucumeris appellatione Pepones
quoque veniunt. Plinius quoque tradit, ut ante
annotavimus, Cucumeres cum magnitudine exce-
sser: Pepones vocari.

Tragus. De Melone, Pepone, Cucumere & Citreolo in
genere hæc habet Tragus. In Italia & Gallia mul-
ta plantantur Melonum, Peponum, & Cucumerum
genera, quæ & in Germaniam commigrant. Ha-
bent verò Melones, Pepones, & Cucumeres ejus-
dem serè formæ folia, caules & flores, ac humi ina-
gis sparguntur, quam in altum sese attollant, devi-

culas quibus proximis completuntur frutices, Cu-
curbita longè magis exiguis obtinent. Folia Melo-
num & Peponum rotunda sunt, aspera, ac minora
Cucurbitæ foliis. Ramuli seu viticulae duplici eo-
que luteo emicant flore, quorum alter decidit, al-
ter verò (posterior) fructum facit, qui nihil aliud
est, quam pomum quoddam, sed diversæ formæ & Pe-
ponis coloris. Invenias enim Melones & Pepones alios
oblongos, alios rotundos, nonnullos luteos, quod-
dam vides. Hi omnes foris cernuntur striati aut
sulcati, intus verò succosi, seminibusque in utero li-
ratim digestis referti, odore suavissimi, jucundissi-
mique, sapore verò satis dulces. Melonum & Peponum
magna in agro Norimbergensi copia provenit,
nec non in Vngaria. Cucumeris folia asperiora sunt,
majora & latiora Peponibus & Melonibus. Radices
omnium rectæ sunt, multisque ac candidis capilla-
mentis fibratæ. Maturantur verò eorum poma in
nostris regionibus inter Æstatem & Autumnum,
h. e. Augusto plerumque mense. Quemadmodum
autem Dioscorides omnia Melonum, Peponum, &
Cucumerum genera sub τὸν ἡμαρ σικύων & τὸν σικύων
γῆ, h. e. lativi Cucumeris & Peponis voce compre-
hendit, ita Germani omnia prædictorum generum
poma, Melonen vocant. Cucumeres verò cum ma-
gnitudine excessere, Pepones, dictos *Pfiden* / Gal-
li *Pompons* nominant. At rotunda & citrei coloris po-
ma, Melopepones & Stapones à forma appellantur.
Quæ verò ex vitidi colore nigricant, gustūque
optimo prædita sunt, quidam Hircos & Hircinos
(Germani *Böschboden*) vocant. Galli *Pepons* Tur-
quos. Cucumerem luteum, Columella Anguinam
vocat. Reliquos Cucumeres vocant Citrinos, Ci-
trulos, Citreolos, & Citrullus: Serapio *Batecha*, &
Chartha, & Cura. i. e. Melonem, & Citrullum, &
Cucumerem. Iac. Manlius Bathecam Serapionis, &
Albathecam Avicennæ (quam nonnulli Cucumerem
Sarracenicum, Anguriam & Larguriam interpre-
tantur) unam & eandem esse plantam contendit.
Hebræi Cucumeres *Kissibim*, Chaldæi *Kattia* (à
qua voce *Charther* Serapionis non multum ablu-
dit) Pepones verò *Artichim* (quod à *Batheca* & *Albath-
eca* non multum abesse videtur) &, ut Thargum ha-
bet Hierosolymitanum) *Malpania* vocant. Hac de re
vide Num. xi. Et hæc Tragus, qui unâ iconē plures
comprehendit plantas, Melones, Pepones, Cucu-
meres vulgares, & Angurias, quæ vulgo officinis Ci-
truli dicuntur. Non distinguit præterea inter Melo-
nes & Pepones.

Cucumerum genera Fuchsio sunt Pepones & Cucu-
meres, Melones, Melopepones, Cucurbitas, & Cucu-
meres, quæ statim degenerant, figurâ tantum
& quantitate inter se diffident. Siquidem qui ma-
gnitudine excedunt, aut in longitudinem proce-
dunt, quales multis locis nascuntur, Pepones quon-
dam vocati fuerunt. Sed qui formam & effigiem
Mali referunt, & humi rotundantur, Melopepones
à Græcis vocantur. factio ex Pepone & Malo nomi-
nes, neque inter Pepones & Melopepones aliud,
quàm quod ex figura quondam sumebatur, discrimen
fuit. Totum hoc genus Palladius Melones,
quasi *melones*, i. e. pomos, à Malorum figura appel-
lavit, quo nomine major pars hodie Medicorum si-
mul cum officinis utitur. Sunt itaque in universum
tria Cucumerum sativorum genera. Primum genus
abolutè Cucumis, à nostræ ætatis Herbaris, & cum
adjectione Cucumis citrinus, h. e. flavus, à colore
quem habet cum maturaverit, appellatur. Aëtius,
quod equidem sciam primus Anguria vocari tradit,
quæ veteribus *stiva*, i. e. Cucumeres vocantur. Ho-
rum sanè plura sunt genera: nos quatuor potiora
commemorabimus quorum etiam picturas exhibe-
mus. Primi generis est vulgaris Cucumer, fructum
obtinens oblongum & maculatum, germanicè vo-
catur

catur gemin Cucumern / gallicè simpliciter *Concombre*. Sunt qui illum privatim Anguriam appellant. Ad quod sanè nomen alludentes, Germani nostri alio nomine *Gurden* nominant. Alterius generis Cucumer est peregrinus, quem vulgus Turicum cognominat, piori multò major ac procerior, foliis, floribus, & fructu, qui ut in primo non est maculosus, sed tamen oblongus etiam: Germani *Türctisch Cucumern* nuncupant: Galli *Concombre du Turc*. Fructus ejus admodum flavus existit, hinc est quod multi eundem privatim Citrulum & Citreolum, quasi Citrinum, h.e. flavum vocent.

Hujus femina alba & lata sunt. Tertij generis Cucumer est, qui Marinus dicitur, Turcico quod ad folia, flores & femina attinet, ferè similis: nisi quòd in hoc omnia sint minora: fructus verò rotundus: Vulgus *Zucco marin* vocat: Germani *Nieer Cucumern*: Galli *Concombre marin*. Officinis perinde ac Turicus ignotus. Quartij generis Cucumer est, quam

Officina hodie Citrulum vocant. folia habet ferè Colocynthidis, multifariam dissecta & incisa, fructum rotundum, herbacei coloris, & in eo femina lata, & colore spadicea, h.e. in rufo atea. Ego officinas respiciens nominavi hunc Cucumerem Citrulum, germanicè *Citrullen* / gallicè *Citrulle*. Alterum genus Cucumeris est, qui nunc simpliciter Peponem, antè nos *marabidus*, h.e. maturefcere dicitur. is enim mitis ac tener maturitate flaccescit: Germani *Pfchen* appellant, Galli *Pepon*. Tertium genus Cucumeris hodie Melon ab omnibus vocatur, Germani *Melaun* nominant, Galli *Mel* n. A priore forma & suavitatis differt: rotundior liquidum & Mali Cotonci quasi formam referens, mitiorque existit. Disfimen hoc sentientes pòsteriores, Græci *σικυδ* simpliciter dixerunt, quem nos privatim Cucumerem vocamus. Adjectà autem Peponis voce, hunc quem nostra etas privatim Peponem nominat, *σικυδ* *πείπων*, i.e. Cucumerem. Peponem dixerunt, mitem sc. & maturitate tenerum Cucumem invenientes. Sub quo eum etiam quem à tereu ac rotunda Mali effigie *μαλιν* peculiariter dixerunt, complexi sunt. Et hæc

Fuchsius. Videtur autem valde indistinctè de Cucumere, Pepone, Melopepone & Anguris scriptis, miscens cum iis Cucurbitas folio aspero. Præterea non sine errore Cucumerem fativum vulgarem, maculosum cognominat, & Anguriam dici credit: competunt siquidem ista duo nomina plantæ quam pingit nomen Cucumeris Citruli.

Dalechampius author est Plinium Cucumeris nomine Gallorum Melopepones, vulgo *Melons* dictos, Cucumeres, Anguriasque complexi, & de iis diversâ tradere, cuique suo generi tribuenda. Citrinos adhuc in Gallis vocari *Suerades blanches*; nigros autem, *Suerades rouges*. Cucumeres Italæ virides Plinij, esse Pepones, i.e. Melones minimos & Malo Cidonio non ampliores, in Hispania adhuc cognitos. Idem apud H. Lugdunensem ait dubitari à multis an Cucumeris nostratis viris capite de Cucumere sativo [*σικυδ* *πείπων*] exposuerit Dioscorides, an vulgari Anguriz. Sed Dioscoridem, cæterosque Græcos *σικυδ* nomine Cucumerem, Gallorum *Concombre*, intellexisse veris consensu assecutum esse Matthiolum. Dioscorides siquidem scribat Cucumerem silvestrem fructu solo à sativo differre, ut in quibus foliis, floribus, filamentis que lativum profus referre. Quare cum his omnibus Cucumis sativus silvestri proptus similis sit, nemini dubium esse debere Dioscoridem de Cucumeris vulgaris, non de Anguriz viribus *σικυδ* nomine tractasse. His accedere Plinij autoritatem, ita scribentis: Cucumeres crescunt, quæ coguntur formâ, &c. Hæc enim de Cucumere nostro verissimè dici posse, minime verò de Anguria. Nam Angurias in Italia in

magnam excrefcere molem, ac cum aquæ sint substantiæ, ac prædulces cum maturæ fuerint, facili a ventriculo descendere, quod Cucumeribus nostris evenire negat, quòd frigido glutinosoque sint succo, ac ob id concoctu contumaces, nec non nisi longo tempore labi. Præterea Cucumeres eodem Plinio auctore, in fistula flore demisso, mirâ longitudine crescere: & hoc in Cucumenibus nostris certâ experientiâ se compertum habere. E quorum semine qui postea sint orti, eandem retinuerint formam, ut in vite sua pendentes longi, & angulum modo contorti spectentur. Adhæc natura oleum odisse mirè, ut idem senserit, nec minùs aquas dilixisse. Dejectos quoque ad eas modicè distantes adrepsisse, &c. Hæc ille. Cucumerem Dioscoridis nobis videri nostros Melones dicemus paullo post. Inquiremus etiam an nostri Cucumeres sint Pepones Dioscoridis.

Apud Theophrastum, inquit Cæsalpinus, & Dioscoridem duo tantum Citreoli genera traduntur: appellat Theophrastus alterum quidem Sicyon, alterum verò Sicyan: uterque vertitur à Gaza Cucumis, quamvis aliquando distinctionis gratia Sicyos Pepo, & Cucumer vocetur, Sicya autem Cucumis.

Ex Theophrasti verbis colligere licet Sicyam significare Citreolum nostrum: hic enim figuram accipit loci, præcipue genus illud intortum anguis modo.

fortè & idem Sicyos intelligitur sc. Laconicus, qui melius evadit rigatus, id enim convenit nostris Citreolis; gaudent enim aqua ut Cucurbita longa: reliqua autem Sicyorum genera, quæ non rigata præstantiora sunt, optime quadrabunt nostris Peponibus, & Cucumeribus, qui maturi cibis expetuntur: hi enim pulvere æstivo gaudent, aquas oderunt.

Dioscorides Sicyon masculino genere vocat; quam Theophr. Sicyan appellat; Peponem autem quem Theophr. Sicyon. Sicyos autem Dioscoridis vites Citreolis nostris conveniunt. Ex Peponis quidem nomine colligere licet Peponem accipi debere aliquem ex iis, qui maturi expetuntur in cibis, ut nostrum Peponem, aut Cucumerem, aut utrunque, sed ex eo usu, quo *σικυδ* *πείπων* *μαλιν* *σικυδ* *πείπων* i.e. ejus testa veluti calvaria pueris imponitur ad calvariam, significatur potius noster Cucumer: rotundum enim ejus corpus, & testa modo fragile, & planitie ac levitate calvariam emulatur: idem comprobatur & facultas refrigeratoria, & vis repellendi: hæc enim in Cucumere magis est manifesta, quàm in nostro Pepone.

Apud Galenum reperitur Sicyos, & Pepon, & Melopepon. Quæ autem de Sicyis inquit, ea profecto cum Sicy Dioscoridis conveniunt, i.e. cum nostris Citreolis. Quæ porro de Pepone scripsit, cum Dioscoridis Pepone concordant, & nostris Cucumeribus quadrant: Sed unum tantum an sãm dubitandi præbet, quòd ipse inquit, homines in Peponibus, à carne intima, in qua semen habetur, abstinere: contra enim apud nos usu venit: gratior est Cucumeris interna caro, in qua femina, quàm externa propè corticem.

De Melopepone tandem quæ tradit, adamussim nostris Melonibus congruit, sed eandem dubitationem afficiunt, quam in Pepone iridi avimus: inquit enim in Melopeponibus homines carnem intumam, in qua femina continentur, mandunt; idque ipsi ad dejectionem confert. Qui verò eorum quasi carne tantum vescuntur, non tam citò eam, ac Peponum excerpunt: rarè enim ex nostris Melonibus internam substantiam, fibrosam comedimus: sed una cum semine auferimus: idcirco suspicor errore aliquo commutata esse in eo loco vocabula Peponis & Melopeponis, ut restitui in hunc modum restituar Galeni locus: Qui verò eorum quasi carne tantum vescuntur: non tam citò eam ac Melo-

Citreolus Cæsalp.

Si ya Theophrasti est Citreolus Cæsalp.

Sicyos est Pepon Diosc.

Cucumer.

Sicyos Galeni est Citreolus Cæsalp.

Pepon Diosc. est Galeni idem est cum Cucumere.

Melopepo Galeni sunt Melones.

Galeni de Peponis alia restituitur.

lopeponum excerpunt. Quasi hoc sit in causa, cur Melo-pepones tardiùs discedant, quàm Pepones: quia interna caro eorum non comeditur ut Pepo-num; vis enim ad dejectionem faciens magis in ea parte est: idè si ex Pepone aliquis tantùm carnem duriorem assumeret, ut sit ex Melo-pepone, sentiret tardiorẽ Peponis descensum: huc accedit, quòd in Melo-peponibus homines à carne intima, in qua semen habetur, abstinẽt, in Peponibus autem mandunt, idque ipsi ad dejectionem confert. Plinius omnes hos fructus, Cucumeres vocat: nam Pepones & Melo-pepones inter eos recenset, quã species. Cucumis tamen privatim ab eo intelligitur Citreolus noster Italicus, non solùm parvus, sed & grandis, qui peregrinus est. Cùm autem inquit, Pepones vocantur, cùm magnitudinem excessere, consentit cum nostris Cucumeribus seu Anguriis. Cùm præterea ait, Ecce cùm maximè nova forma eorum in Campania provenit, Mali Cotonei effigie: fortè Melo-peponas intelligit. Per non pendentes, qui statim à pediculo recedunt, manifestè Melones nostri indicantur.

Cucumeres
Plinij C. 17
quia?

Citreolus
italicus.

Anguria.

MELONES. CAP. VIII.

De ser. gene-
rais.



res unà cum intortis capreolis, quos excipiunt fructus non nihil pilosi, omnes ventrosi, modò sublongam aliam, contractiorem, rotundam figuram obinent, majores & minores, torosi & canaliculati, in superficie aliquas veluti à vineis corrolas scimitas reticulatas habentes, colore virente, & cinereo: cortice duriore, quàm Cucumeris. Caro subest per maturitatem coloris melini, mucilaginosà, humida defluens, ubi nimium matura, sapore suavi, mollium subinde redolens, aut saccharum resipiens: medullium occupat mucilaginosà quædam substantia, cui immerguntur semina, strobili quodammodo similia, minora, candida, sapida, & umerosa.

Sapor.

Varietates.

Sicyon
Theophr.

Multiplex in fructu est differentia, non tantùm colore cutis, carnis, saporeque, & odore, verùm etiam formà oblongà, sessili, &c. Consideratis quæ Theophrastus scribit de Sicyo, nihil invenio, quod non convenire possit cum nostris Melonibus: ubi Theophrastus habet *αγύριον*, Gaza interdum vertit Peponem, sed plerumque Cucumerem: quoniam *αγύριον* sit Cucumis agrestis vulgaris neminem exilimamus dubitare: is sàpè majorem habet similitudinem cum notis Melonibus, quàm cum Cucumere.

De Cucumeribus quæ tradit Plinius magna ex parte referenda mihi videntur ad nostros Melones Plinij vulgè dictos, cu in quibus, ni fallimur, confunditur Sicya Theophrasti, sive Melo-pepones Galeni; & Cucumeres nostri vulgares: mihi facillè persuadere sinam, à Tiberio Cæsare Melones potius expetitos, quàm Cucumeres vulgares. Quæ scribuntur de præparatione seminum, & de variis generibus, quæ etiam de Peponibus dicuntur, meliùs conveniunt, cum Melonibus, quorum sanè varia genera. quæ Dioscorides scripsit Sicyos lativæ nomine, videntur repugnare Meloni (nisi quibus obijciat, quod ait *φειδωλον*, quod potius videtur convenire Cucumeri vulgaris) folia Cucumeris sive stris, ut jam diximus, similia sunt, Melonum foliis, quàm Cucumeris vulgaris.

Quæ Tragus, de Melonibus tradidit, ante posui-
mus. Dalech. apud Lugd. hæc particulatim habet. Dalech.
Sunt etiam Cucumerum species, Pepones & Melo-pepones. Sed ex Plinij verbis, *Cucumeres cum magnitudine ex. effere* &c. intelligere licet Pepones in genere Cucumerum esse, & Melo-pepones in genere Peponum: quos Palladius Melones appellat à Mali Cydonij figura, quam referunt nomine composito Melo-pepones appellati. A Peponibus autem differunt, quòd Pepones majores sunt, magis striati, magisque succulenti, sed minùs grati, carne molliore & semine pauciore, oblonga figura, ut Cucumeres; Melo-pepones globosa. *Τίτμος* igitur Græcis, secundum Galenum, *τιτμω*, h. e. maturum significat, quod omnibus aliis frugibus maturis convenit. Sed peculiarem fructum hoc nomine appellarunt, quomodo atramentum quo scribimus *ύλας*, i. e. nigrum. Quare Medici non simpliciter fructum hunc nominare voluerunt Pepona, sed *αγκυριον*, Sicyoponem, i. e. Peponem cucumeralem. Aristoteli *αγκυριον* tantum dicitur, & Polluci. Quir etiam *αγκυριον* de quo Dio. Spermatorides, Galenus & Plinius leofum de Cucumeribus & Melo-peponibus tractarunt, Gallis *Pepon* & *Peponis* dicitur. Ejus permulta sunt genera, quæ Dalech. figurat, & colore distinguuntur. Est enim ven-
tricosus *Pepon*, qui à pediculo ad umbilicum usque *tricusus* striatus & canaliculatus est. Alius quam seminum *Pepon* vocant, miris striatus. Quidam totum corticem *Peponis* reticulati, miro naturæ artificio conspersam habent. Aliquorum fructus grandis est, humani capitis in stas, aliquando etiam major, nonnullorum longè minor. Sunt qui herbaceo sunt colore, alij flavo, alij pallido, nonnulli cinereo. Interior quoque pulpa varia: in quibusdam enim rubet, in aliis albicat, in nonnullis ex albo rufescit. In quibusdam dulcis & gustui suavissima, in aliis insuavis & insipida. Sunt item qui Hircini, & vulgo Turcici dicuntur. Melo-pepones etiam varij sunt, nunc magri, nunc Mali Cydonij figuræ & magnitudinis. Horum caro interdum candida est, interdum flava, quandoque pallidior, aliquando solidior, aliquando laxior. Præferuntur candidi, solidi, ac sic dulces, ut saccharo cordi videantur, quos idè saccharatos vocant, Galli *Succrini* & *Succredes* vocant. Præterea quibusdam semen pulpæ firmissime inhaeret, ut culcelli mucrone particulatim evellendum sit, aliis in medulla humida semen jacet, quæ concusso suo u separatur sponte, ac decidit à reliqua pulpâ disjuncta. Sunt præterea qui olitorum marginibus & Moschi odorem spirant, seminibus, quæ parte germinant, parumper apertis, & aqua rosacea, quæ moschum exceperit, maceratis. Est etiam quoddam hybernum, quod in area non maturefcit, sed flavescit laquearibus appensum, magna-
que voluptate Hieme comeditur. Hoc Hetrulci melle saccharo condunt Citrei pomi modo. Ac Citrus & Anguria Peponum etiam species sunt. Hæc

Melones
Palladij

Peponis
Dalech.

Peponis
Dalech.

Peponis
Dalech.

Peponis
Dalech.

Peponis
Dalech.

Peponis
Dalech.

d' verfas esse species, formâ, colore, & odore. Differentias adhuc speciei meminit, quæ servatur ad primum Ver. In hist. germ. vocat magnos Melones latine Pepones, parvos verò & rotundos Meloepones. Adhuc Melonum speciem reperit ait tenuissimo cortice, errarêque toto cæso, qui Pepones, vulgares Cûcumeres faciunt. Sed errat, ipse.

Lob. adv. vocat Melonem vulgi a Cucumerem antiquorum, & Melopeponem Dioscoridis, assignatque varietatem Peponum esse magnitudinis, coloris, & odoris. Inveniunt quippe speciem quandam Moschatellinam, quae vix Colocyntidem aut Arantium superet, odore moschi, sapore delicatissimo. Esse & alteram cortice, carneque albam, sapore etiam perjurando. Vel hoc uno arguente noster dem afferit Melones nostros, sive vulgi Italici Pepones, esse antiquorum (praesertim Dioscoridis) domesticum Cucumerem, sive Sicyam fativam, quia odore eximie fragrantia, & Cytonicimali, aut Pomorum redolentium æmulo restauret vires languidas & reficiat, spirituique & spatis revocet animo lapsis, utidem Dioscorides author est: eoque Melones, quasi Pomosos, meritis vocatos fuisse & recentioribus Graecis, quod ori ac stomacho; cibis sint gratissimos, omnium huius generis.

In Obsp. 364. dicitur ei Melo vulgi & Melopepo Σπον συμ
Dioscoridis : in Icon. p. 639. Melo vulgi & Cucumi nominib.
minis antiquorum. Brunfels. & Trago Melo, ut & linguar.
Gefn. de coll. (cui & Melopepo.) Dodon. in fol.
lat. vulgo Melones, Ital. *Mell. ne*, Hisp. *Melon*. Galic.
Melons, Germ. & Bohem. *Melon* / Belg. *Meloez*
nen. *Meloez* autem Græcis pomum significat, proinde
rectius *Μελιτοπον* hui Cucumis Dodonæo Μελιτοπον.
pellendus videtur, Papon videlicet Mali odorem
referens. Nam hujus suavis odoriferis malis o-
dore sæpenuerò vicini sunt, subire verò & ob-
fcurè moschum redolent, qui idcirco & Moscha-
tellini cognominantur. Galenus hunc pro Cucu-
mi habuile videtur, qui Græcis *σίκας ημεσας*, Lat. Cu-
cumi sativus.

Icon hujus proponitur à Tab. pro Melone, nec N^oic. Braun
illa displicet: verum sine ratione & imperitè per Ni-
col. Braun pro Melonibus & Peponibus propo-
nuntur icones tredecim, multum inter se differ-
entes, & diversarum admodum plantarum; nec ta-
men earum ullum traditur discrimen, nec ulla de-
scriptio.

B. phyt. vocatur Melo 1. sive vulgaris, mirè fru- Melonis
ctu varians. Eft enim, inquit, nunc oblongus, aliàs Guly
contractior rotundioris figuræ, aliàs modè de- riet dicitur
pressus, & f. filis: subinde major, qualem Tab. C. B.
& Ger. Melonis hispanici (de hoc nos seorsim post di-
cemus, nomine pingis, quatuor minor. Cortex
aliis alper, rugosus & tuberosus: & hic est Pep-
strumofus, Lob. adv. aliis lævis: nunc viridis, nunc
cineræus, nunc pallidus, nunc varius. Pulpa aliis
ruffa, aliis candida, viridensque, quibusdam suavior,
quibusdam moschi odore, quorum Dodon. & Cord.
[in Diosc. & hisf. Moschatellorum Pepinum nomine] me-
minit. Aliqui æstivi, aliqui hyberni ad Hiemem per-
durantes. Habentur Camerario monte Americi
& alij Italici, Pataviniiitem Zatti dicti, & Neapoli-
tani, in quibus semina ad cœ tenui cortice teguntur,
ut exorticata videantur, idcirco Gymnospermi di-
cuntur: Sunt denique & Pilosi. Cucumerum gene-
ra censetur Pepones & Melones, qui videntur po-
tissimum figuræ & quantitate differre: qui enim ma-
jores sunt & oblongi, Pepones dicti fuerūt, qui ve-
rò formam & effigiem Meli referunt, Melopepo-
nes, quod nomen adhuc hodie in usu est. Sicq; tria
statui possunt Cucumeris genera, primū Cucumer,
de quo aliàs: Secundū Melonū, Tertium Peponum.

Melo Vulg'is
Lob est ꝑ. ꝑ.
antiquo-
rum, ꝑ.
Melipero
Dioic.

Nelo albus.
Melo vulg.
sive P. pom
italicus est
Cucumis
antiqu.

Супом смт
номиніб.
linguay.

Melospiza:

- *Melomys*
Sulg Gair
- *rioides*,
C. B.

HISTORIAE PLANTARVM

Melo autem, Theophrasto Sicyon, Plinio Cucu-
Melopepo Galeni: fortè
Cucumis antiquorum. Haftenus C. Bauhinus, cui
& in pin. Melo i. vulgaris: Melo, Brunf. Trag. & Me-
lo, p. 50. l. 1. Tab. 6. 7. Pepo, Matthiae Fuchf. Lug.
& Cast. Pepo, grandis Melo, Cord. hist. Cucumis
Galeni & antiquorum, Dodon gall. Melo vulgaris,
Melopepo in Græcia, Guil. Melo five Pepo vulgi,
Cucumis Galeni, Dod. Melo vulgi, five Cucumis
antiquorum, Melopepo Dioscoridis, Lob. Melon
vulgo & Pepon, Sicyon Theophrasti, Melope-
pon Galeni, Cæf. Melopepo, Gefn. h. Lon. Lugd.

Sym.

nè virente, laui, lucente, quibusdam in partibus
rugas habente asperas, quâ inscriptiones: costis
duas uncias latis, non admodum elatis. Sub cortice
caro latet durior, unciam penè crassa, tenerior paul-
lo, grata admodum, & odorata: licet anni constituto
parùm commoda fuerit pro Melonum maturi-
tate: femina sunt valdè parua, latiuscula, alba.

Delatus hic Melo Vesutio, degustatù (que mensis
Octobris 7. die, in arce Beffordiana, quo nec melio-
rem, nec gratiorem, & odoratiorem comperimus.

MELO TURBINATVS.

MELO turbinatus primò non multùm largior,
quàm manu comprehendi possit, pediculus
versus in angustum desinit, ut solent pira. Costas ut
cetera genera habet, saùs eminentes, unciam pol-
tas, latis: in superiori parte cineritias, maculis ru-
bris notatas, earundem costarum partes depref-
sas, rubentes, pilisque quibusdam asperas. Maturus
rugosus non fit, jucundum spirat odorem, colore m-
que non mutat, & cortice exteriori rubet. caro du-
ra, multa: mollis verò pauca, sed lutea, sapore gratif-
fimo, & dulci: odore grato: pauco aqueo humore
imbuta: semen angulosum, maturum in horto E.C.
Montbelgardi Septembris principio.

MELO RETICVLATVS.

Deser. fru-
ctus.



MELO reticu-
lus pedem fe-
rè longus, qui cras-
situdine utunque
utramque manum
implet, profundè
corniculatus, corti-
ce est ex nitido ru-
bescente, deinde as-
però, rimoso, reticu-
lato, cinereo:
carne sublutea, sive
melina, satis firmâ,
sapidâ, subacidâ
medullâ intus fun-
gosâ, albescente: se-
minibus oblongis,
subluteis: aqueo
humore, subacido.

Hortulanus asse-
rebat facilè putre-
dinem contrahere,
ubi pluvia tangatur, quem propterea magna cum
difficultate colit Montbelgardi in horto E.C. matu-
rum medio Augusto.

MELO MOSCHATELLINVS, rotundus parvus, & pyri- formis.



TAm Môtbel-
gardi in hor-
to E. C. quàm alibi
Melonis hoc par-
uum genus prove-
nire observavi, o-
doris & saporis
gratissimi, de quo
Lobel. in adv. ver-
ba fecit (quæ ante
adscriptimus) & in
Icon. p. 640. icone
exhibuit pro Me-
lone saccharato.

A Ger. & Tab.
ic. & hist. (ubi sola
icon) inscribitur
Melo saccharinus,
ger. Süßer Melon:
A B. phyt.
& pin. Melo 2. sive
rotundus parvus.

Dantur aurei, parvi, in modum pomorum Arantio-
rum, Cam. vel ut Cæsmali rosei magnitudine. Me-
minit & Garzias Melonis genus in Hispania, quod
Budiecas vocent. Eid. B. pin. Melo 3. pyriformis mo-
schatus: Melo saccharinus variegatus, Eyst. Nos ico-
ne nostrâ priorem Melonem muschatellinum de-
monstramus.

MELO HISPANICVS.



Invenimus apud
Tab. & Gerardû
Melonis hujus Hi-
spanici figurâ, ve-
rùm nullâ additâ
descriptione. Qua-
re si nō sit figmen-
tum, qualia non-
nulla proponit, e-
jus delineationem
ij tandem addere
poterunt Historiæ
nostræ, quibus no-
tum erit Melonis
hujus Hispanici di-
scrimen.

B. in suo phyt.
& pin. si supra e-
jus intelligimus,
Melonem vulga-
rem majorem mo-
dicè depressum &
sessilem vocavit.

MELO MAGNVS CORTICE virente, laui, semine parvo.

MELO capite pueri nuper nati paullo minor,
longior nonnihil quàm crassior, cortice exter-

MELO LONGVS.

Melonem hunc pulcherrimum antehac nun-
quam visum observavi Granduilla, longitu-
dinis quatuor circiter palmorum, incurvum, ut cor-
nu vaccinum, non ita crassum ut vulgarem Cucu-
merem, sed multò longiorem, sapore, ut refertur,
pulpa, seminibus, ac etiam foliis iisdem, cum jam
diu.

Melo

Melo hic albus ita nobis denominatus, Mont-belgardii in horto E.C. ex feminibus per eundem E.C. delatis provenit. Erat hic pingendus & describendus: verum in horto nunc sine uestigio gelu, meque absente, id, me quidem adhuc dolente, neglectum fuit.

De loco & tempore Melonum verba facere reliquum est. Melonum igitur & Peponum, ut ante ex Trago constat, magna in agro Norimbergenfi copia provenit: nec non in Hungaria. Maturantur autem Augusto plerumque mense. Scribitur teste Dodonæo, locis tultis: tumulos amat, Soli vel maxime expositos, terram verò mediocrem, non minus pinguem, aut stercoreatam. In Germania & Belgio non nisi serè, & cum astrum calens, ac sicca fuerit intemperies, ad maturitatem perveniunt. Melones in gulæ delitiis crudos suavissimos habet universa Italia, Galloprovincia, Narbonensisque, & Vasconia: nec non inferior Austria & Pannonia. Cæteris regionibus ad Boream, ut Franciæ, Belgio, & Angliæ agrè, aut insipidiore proveniunt, nec plerumque maturitatem consequantur, præ imbrum copia, & caloris inopia. Nos Melonum differentias & genera varia vidimus Monspelij, Baliez, Lugduni, Genevæ, in Alsatia & aliis locis, quos particulatim non annotamus. Julio & Augusto maturantur.

Vires, quæ Melonibus ex veteribus competere possunt, ante recentissimos Dodonæo frigida ac humida Melonum caro est, difficultatque quam reliquorum Cucumerariorum concoquitur. Quod & Aëtius testatur, in ventriculo, si diutius hæreat, corrumpitur & malignis febribus occasionem præbet. Nos verò nequaquam Dodonæo concesserimus Melones difficultius concoqui Cucumere vulgari, ipsa carne molliori odorata, contrarii n, scilicet concoctionem minus difficilem, demonstrante. Ipse etiam qui ventriculo laboro frigido, & pituitam coacervante, non semel observavi, mihi Cucumeres facile nocere & difficulter ventriculum meum eos concoquere, tactu diu post escum eosdem resipiente.

Melones verò semper sine manifesta comedit. noxa. Mei autem Melonum caro per concoctionem in ventriculo vitietur ac corrumpatur, noxamque aliquam facile inferat, solent Viennenses Austriaci, diiores præsertim (quotannis enim serè non duntaxat domestici, verum etiam exteri regnorum adjacentium Melones divenduntur maxima in copia) cum pipere & saccharo eos comedere, vinumque generosum superbibere. Estantur tamen etiam cum paucis sale & pane. Vocant Melones duos idiomate Bluzer / & seminum Melonum emulsiorem Bluzer milch, h. e. Lac Melonum, præstantissimum in febribus ardentibus remedium. Seminum autem medullam aqua fontana aut alio aliquo liquore congruo prius contulam, per cribrum setaceum emulgem angustissimum, aut pannum adinstitutum accommodatur. Seminibus hic Melo peponum & Peponum cremor febrientibus utiliter ex hordeacea pitana, teste Matthiolo, propinatur, non solum enim refrigerat, sitimque exinguit, sed etiam obstructions tum hepatis, tum valorum expedit, & urinam provocat. Datur tussientibus, tabidibus, & marasmo affectis: atque etiam contra urinæ ardore valde prodest, additis pastillis ex Halicacabo, aut Glycyrrhizæ succo, Manne, Gummi Arabici, aut Tragacanthæ momento. Sed & magis confert, si seminum Papaveris cremor accedat, baccarumque Halicacabi, & Malvæ decoctum. Ex Melo peponibus in particulas sectis, Ari, Bryoniæque radicibus, & Limonium succo, ac caprino lacte, quod hæc omnia superet additis, aqua vitreis organis, ut vocant, destillatur, qua faciem mulieres adornant, & concinnam reddunt.

Tom. II.

MELONES ABDELLAVI Ægypti.



EX Melonibus Describitur. Quosdam à nostratibus planè diversos Ægyptij habens, quos Abdelevi vocant, ad differentiam aliorum quos Chaiair [Melonum apud Ægyptios genus Alpino sine icona. B. pin. Malo 6. (5. phyt.) sic e Melonum Ægypti aliterum genus,] nominant.

Quorum usus ad cibum haud multum jucundus percipitur, cæterisque omnibus insipidiore, ac molliori pulpa observantur. Habent tamen semina, quæ aliis omnibus longe magis ad refrigerandum præstare putant. Quare, omnes ea plus aliis in usu frequentiori habent aliorum Melonum semina parvi facientes. Planta à nostratibus non multum differt, sed fructus fert oblongos, acutos, extrema, & medium valde crassum habentes, Bahobab alibi narratis fructibus proximis. B. pin. vocat Melonem 5. (4. phyt.) Melo Ægypti. C. B.

MELONES INDICI, AM- plissimi.

IN America insula Madagascari, five S. Laurentij, Loca. Referente Theveti libri sui de America cap. 23. mirabilis crassitudinis Melones reperiuntur, & tantæ, quantam quis ulnis amplecti possit, coloris rubentis, & in quibusdam albi, alij lutei, salubriores multo nostris, potissimum Luteianis, cultis in aqua & fimo, magno sanitatis detrimento.

MELONES PERVANI.

Melone in valle Peruana tantæ felicitate proveniunt, ut radix caudicis crassitudinem assequatur, & viva aliquot annis in solo vigeat, quæ quotannis Melones profert, cujus luxurians non secus ac cæterarum arborum amputatur: Joseph. Acosta l. 4. c. 19. B. pin. Malo 8. Melo peruanus.

CVCVMIS VVLGARIS, VIR- idis & albus.

EX radicibus rectis, multisque candidis capilla- Describitur. mentis fibratis, hirtis, sarnentis, crassisque humifusis, alternatim adnascuntur folia, palmi uris, aut alterius quoquo versum amplitudine, tactu aspera, angulis hederaceis, & serrata, scandentia, Melonum foliis asperiora, & majora, latioraque, è quorum alis capreoli exeunt, & flores (Lob. liliacei, ex lateo pallentes, conniventisque nodu; aut marcescentes Volubilis ritu) quinquepartiti, semina majores, duplices: quidam enim decidunt sine fructu, alij producant fructus oblongos.

X 2

utrinque turbinate, viridanti colore, aut albo: viri-
dantes autem ubi maturi flavescent, semipedem
longi sunt, parum



& pufillo apiculo fubtus protenfo donatum eft, dif-
crepet : medullâ lactefcente, admodum fuavi, &
multi ufûs officinis.

Medulla. . scirepet : medullâ lactescente, admodum suavi, & multi usûs officinis.

Iam descripta: à nobis plantæ, Cucumeri scilicet, communis, an respondeat Sicya Theophrasti, considerandum: Eam autem, ni fallor, Plinius miscuit, cum Sicyo Theophrasti, non distinguens eam à Melonibus nostris. Eum namque nomine Cucumeris comprehendere nostros vulgares facili credimus, non autem longos illos, qui dicuntur artificiales. scio enim extare tale genus Cucumeris, præter Melonem longum: vidi recurvatos nullo subjecto oleo, ij dicuntur serpentini, de quibus post. An nostri Cucumeres vulgares à Dioscoride Pepones dicantur perpendendum, quamvis Matthiolus dicat non admittendam eam opinionem, nihil tamen occurrit quod repugnet, nisi obstet Galeni sententia de Peponibus. Indagandum præterea est, an radix Cucumeris vulgaris vomitum moveat: Quicquid autem in contrarium afferatur, conveniunt tam in ea, quæ Dioscorides de Sicyo fativo pronuntiavit, cum Melone nostrate, ut antea monuimus.

Sicyos Di
est Melo.

Melopero
Galeno.

Allubescunt ea, quæ Dod. in fol. lat. scripto pro-
didit. Passim, inquit, Cucumis pro eo habetur
qui Græcis *κίτρινος*, i.e. Cucumis laticus dicitur.
Galenus autem non Cucumis, aut *κίτρινος*, sed *Μελ-
λίτης* est. Nullius enim fructus Cucumerarij me-
dulla, carvæ interior editur, sed omnis abjicitur,
excepta hujus carne, quæ cum seminibus estur.
Quod scribit Gal. lib. 2. de aliment. Homines, in-
quit, à carne Peponum interna abstinent, Melo-
peponum autem mandunt : dicitur Belgis *Conz-
ommeren*. Sunt qui Angutiam dici velint, sed
omnino alius fructus est Anguria. Et hæc Dodo-
næus. Subjiciam aliorum opiniones, de nostro vul-
gari Cucumere.

Cucumerem luteum, quem Columella Angui-
nam vocat, Tragus ita delineat. Cucumeris pomum
eluteo & oblongo multum prominente quidam toruli,
licet formâ & colore elegantius sit Melone & Pe-
pone, tamen crassiorum est partium, & cibus non
perinde gratum, atque illa, quippe quod peculia-
rem quandam & agrestem habeat aporem; intus
candidum, & acutus fœminibus pro-us repletum.
folia hujus aptiora sunt majora & latiora. gaudet
mediocriter pingui Solo. Poma admodum oblon-
ga sunt, præterquam si per harundinem flos deduca-

tur. Serapio Kura vocat: Hebraei Kiffchum, Chai. Kura
dai Kattria, à qua voce Chasbeh Serapionis non
multum abludit.

Monuimus ante, Fuchsinum vocare Cucumerem ^{Fuchf}
lativum vulgarem, sed confundere cum Anguria.

Non planè discerni posse putat Matthiolum, an
Diofcorides reddat vires ejus Cucumeris, qui prop-
riè Infubrium & Venetis Cucumis dicitur, He-
trufcis verò Citrullus, omnibus noſſimus, an al-
terius, Hetruſci ſcil. qui aliis Italicis populis Angu-
ria vulgò nuncupatur. Siquidem non ex Dioſco-
ride modò, ſed nec ex aliis veteribus hæcenus
quenquam reperire, qui Cucumerem, qui Græ-
cis propriè *αἰνυ* appellatur, notis illis repræſenta-
rit. Sed quod Græci *αἰνυ* vocabulo Hetruſcorum
Citrullum, & Infubrium, Venetorum quæ Cucume-
rem, omnibus noſſimum ſignificant, facile con-
ſideri poſſe credit ex ipſo Dioſcoride. Quippe quòd
Dioſcorides aſſerat Cucumerem ſilveſtrem ſolo fru-
tu, à ſativo diſcedere: Huic verò ille, quem He-
trufci Citrullum, alij verò Cucumerem dicunt, per
omnia reſpondeat. Non poſſum igitur, ait, non
liberè pronuntiare, Dioſcoridem Citruli nobis vo-
cati, non autem Anguria vires deſcripiſſe. Quan-
obrem Fuchius magno errore putat Cucumeres, Fuch.
quos Citrullus Hetruſci nominant, Augurias eſſe.
Eadem repetit in comment. cum mag. fig. In hiſt.
gen. refert quosdam in Bohemia vulgares Cucu-
meres, Citrullus vocare, propter ſimilitudinem cum
parvis Citrui. Sed necdum in epit. eorum admittit
opinionem, qui nobiſcum, & verius, noſtro ju-
ſtamento judicio, vulgarem Cucumin, Peponem eſſe
contendunt.

Sed & Corn. ait Cucumem fativum, Græcorum
κικυς & *κικυος* (quam vocem in masculino & neutro
 enere profert) esse: recentiores verò Græcos dī *Angurium*
αγγυριον vocare: Sic enim Simeonem Sethi habere:
ἡγεμενα τῆς κικυος & *κικυος*, καὶ τὸν καλεῖται τὸν ἀγγυριον, frit *Teranga*
 & humida secundo gradu. Ex hac autem ap-
 pellatione Germanos partim Ingurum, & partim
Yurden vocare. Nāci hodie multum per omnem
 Sythiam & Sarmatiam, & apud Livones Pomum *Pomum*
 utenicum appellari. *Putenic*

Vide quæ Dalechampius de Cucumere fativo dixit, capite de Cucumere, Peponē & Melo peponē in genere ex veteribus & Neotericis. Habes eodem hoc capite nomina linguarum, quæ prudens lector hic transcurrit.

Cucumer latinè, *σίχνη* atticè, communis multis *Σίχνη*.

generibus dictio, omnem hanc in Latinis incertitudinem fecit, quod Cucumerem in Græcis ac Latinis audientes, ex ea quod nunc est, unum tantum genus, Cucumerem vulgo appellatum, fructu oblongo, & maculoso, significari crediderunt: quum Græci *διου* nomine, genera multa numerent, quæ aut cartilagine, aut cute foris obducta, in oleraceis extra terram crescent, & si hoc quod nunc Cucumis dicitur, illis primum, & supremum genus sit, atque posteriores Græci *διου* simpliciter dixerint, Cucumerem vulgatum, quumque Brassavolus, non tantum Cucumerem vulgi, sed omnia Melonum genera, i.e. Cucumeres, Citrulos, & Angurias, comprehendit annotaverit, verum per Cucumem absolute, Anguriam intelligi oportere, quæ Hetruscis Cucumis dicitur: at per Cucumem citrinum, voce hæc adjectâ, nostrum Cucumerem significari, ideo Hetruscis Citreolum vocatum, diminutive à flavo citrij colore: quem in extrema maturitate ostendit. Matthiolius evaginato ense, ac si pro aris, ac fide digladiaretur, sub voce *anuris*, ex comuni omnium sententia, Cucumem Latinis ex Diofco. intelligi contendit: i.e. Hetruscorum Citrullum, quâ illis Cucumis, nostris *abus* sit Anguria. Matthioli.

Sicyos (agrios addito) erraticum Cucumerem: at nullâ adjunctione, vulgatum etiam significare, non tamen tollit, plura ex aliis denotare posse, ut secundo sui Coroll. Hermolaus facillè indicat: præterea Dioscorides alvo & stomacho perquam utiles haberi Cucumeres ostendit, qui quum aded difficilis sint concoctionis, ut etiam secundo die, ex Plinio, consentiente Matthiolo, stomacho immorentur, atque ex Gal. de aliment. facult. cap. 6. suæ substantiæ proprietate, cocti sunt difficiles, præviq; succi, quâ ratione alvo, & stomacho amicentur, non solum naturaliter, sed etiam ex symptomate, doceat oblecto, ait Apollo Rad. i. supra El. Diarhod. commune, Matthiolus: nam sic omnia pari modo frigida, alvo accommodata dici possent: quicquid sit nostrum Cucumerem, & Hetruscorum Citrullum, pro Cucumere accipiam.

Cæterum, Anguill. epist. 7. narrat Cucumeres inveniri & viandes, & albos, & longos, & contortos, & glabros, ac asperos, omnes notos: Anguinem dictum viridem esse & contortum, & serpentem.

Apud Tab. effigies Cucumeris ex Hispanico semine nati proponitur sine descriptione, non indicato quidem discrimine à vulgari Cucumere, cujus imaginem ibidem quoque habet.

C. Bauh. phyt. & pin. né que apud Matth. vocavit Cucumerem i. sive sativum vulgarem: Cucumerem sativum Brunfels. Mitth. Fuchs. Dodon. gall. Lon. Cast. Cucumerem, Trag. Ang. Turn. Lac. Fracast. & Tab. Cucumerem vulgarem, Dod. Ger. Cucumer sativum, Cord. in Diosc. Cucumeres sativos & esculentos Lob. adv. & Ic. p. 638. obs. p. 463. Cucumim esculentum: Citreolum vulgo Cæsalpini: Sicyon Galeni quorundam, & ejusdem Melopeponem aliorum: fructu maturo subluteo: toto etiam albo: toto etiam viridi: magnitudine quoque & formâ vario, longum, recurvum: lævem, asperum.

Seritur in hortis: pinguis & aprica amat loca. Iulio & Augusto mense fructus edules, cum ipsis seminibus, sed Septembri demum ad perfectam maturitatem proveniunt.

Dioscoridis vires de Cucumere & Pepone posuimus ex veterum sententia, cum ea quæ circa Cucumeris vires memorizæ prodidit Galenus. Dodonæus eligit vires, nondum maturos: maturi siquidem & jam citrini facti esui haud sunt idonei. Semen frigidum quidem, sed multò minus quàm fructus. Aperiendi vim atque extergendi præterea obtinet: utinas movet: jocineris obstructions aperit: pectori ac pulmoni inflammatione laborantibus prodest: contusum, fortisque absterforij loco adhibitur, cutim splendidam reddit: Galeno autem non Cucumis, aut sicut, sed Melopepon est, &c.

Qui calidioris temperaturæ sunt homines, inquit Tragus, aut ab incuncta ætate ejusmodi cibis assueti, hiæce vesci possunt. At qui frigidioris sunt præditi ventriculo, si hoc cibo frequentius uti voluerint, facillè in febres incidere possunt. Cucumeres intrinsecus ad calidas affectiones usurpari possunt. Extrinsecus succus cum semine adjectâ fariâ, siccatus in Sole, cogitur in sinagma, quod faciem repurgat, & nitorem affert, sed cum vino illinire oportet: mulieribus hæc medicina convenit. De Cucumere ita cecinit Baptista Fiera,

Sic nocet humefens Cucumis, gelidusque Citrullus,

Et tremuli ardores cordis, dore levet.

Ne diuturna tamen sit concommitata caveto

Febris, in aspiduos si datur esca cibos.

Hic bilem, subigitque sitim, stomachoque calenti

Gratus erit, medicus si sapit arte coqui.

Vires Anguriz hinc Cucumeris Simeonis Sethi posuimus capite Colocynthis folio citreoli, siue la-

Tom. II.

cinati. Lobelius vulgari Cucumeri vires Cucumeris Dioscoridis adscribit. Miror autem eum in obs. Cucumeri vulgari attribueret vires ex Dioscoride, & Galeno, itemque Egineta Cucumeris eorum sativum in Advers. dixerit, Melones nostros, sive vulgi Italici Pepones, esse antiquorum (præsertim Dioscoridis) Cucumerem domesticum, ac etiam scribat in iisdem Observ. quasi sibi contrarius, Melonem vulgi esse Melopeponem Dioscoridis, ibidem Melonis iconem ponens, subjiciensque Peponis vires ex Dioscoride. Cucumer vulgaris, major quidem, decorticatur, ac transversim in orbiculos tenuissimos, quoad fieri amat, dissecatur sale aspergitur paropsidæque duplici excipitur, agitando eoulque donec aqueus humor majori ex parte eliciatur, deperditurque. Sic agitati Cucumeris orbiculi, cum Pipere, oleo & aceto comeduntur. Parvi aceto, sale, Pipere & Feniculo quodammodo conduntur: inferuntur etiam quandoque Garyophylli: per totum annum conservantur. Mirè, præter cæteras vires, appetentiam excitando, & fluanti ventriculo conferunt.

CUCUMER MINOR, PYRIFORMIS.



CUCUMEREM hunc minorem Ger. & Tabernamontani, Flein baren Cucummern/ Cucumeribus alius minorem eisdq; similem, nisi piro par esset, inepet, meo quidem iudicio, Nicol. Braun capite de Cucumere silvestri collocavit.

Bauh. phyt. & pin. vocat Cucumim 4. sive Pyriformem.

CUCUMERES LONGISSIMI.

Cucumis flexuosus, authore Lobelio, sive anguinus prorsum similis est vulgari flagellis, foliis & clavculis. Nos autem observavimus, ei folia esse minus aspera, quàm in vulgari, quædam etiam subrotunda, parùm laciniata, & angulosa, alia magis: fructus longi instar serpentis se contorquentes, albi, quasi canaliculati, & striati, pulpâ albâ, sapore vulgaris: semine albo. Ex his liquido constat, hallucinatum esse Lobelium.

Plinius per Cucumeres in fistula flore demisso, mirâ longitudine excrecentes, Cucumeres nostros longissimos in nuere videtur, eisdq; arte tam longos fieri & quidem è vulgaribus credidit. Ego autè nostros hos longissimos specie à vulgaribus differe, asserere non veror, & tales naturâ, nō arte esse, quicquid dicat Matthiolus, cui ut in pleriq; aliis suis cre-

*Cucumis
longus es-
dem.*



Icon Cam.

Cam. not.

*Cuc. oblon-
gus, Dod.*

*Cuc. flexuosus,
Lob.*

*Citrealus
anguis mo-
do intortus
Gef.*

*Mello Flo-
rentia.*

*Sicya Theo-
phrast.*

*Cuc. angui-
nis, Tab.
C. Bauh.*

art langer Gurken / h.e. speciem aliam Cucume-
rum longorum. Iconem autem ex ipsa planta viva,
ut ait, depingi curavit: folia ejus Melonum similia
scribit, itemque flores: Ceterum, fructum minus
canaliculatum, tuberculis interim inaequalem, vul-
garis admodum sed semen longe minus. Hos im-
brum frequentiam perferre non posse, multoque
gaudere sole, uti Melones, quibus similes penè fo-
rent, nisi differentiam faceret fructus sapor, atque
forma. Nos alius discernendum damus, an differat
Camerarij Cucumis, à Matthiolino & nostro, quia
in epit. simpliciter pro Cucumere Matthioli longo
suam iconem proponit. Verum in hist.germ. dicit
quodammodo diversam, & aliam speciem, ut ex re-
citatis ejus verbis ostendimus.

Dodonæus oblongos Cucumeres artem & cul-
tural primò ut fetum produxisse narrat, & crebrò
recurvos reperiri, indeque anguinos vocari.

Quem Lob.in Obs. p.363. & ic. p.639. Cucumim
anguinum, flexuosumve inscribit, tenerà cute, ni-
tore herbido, cum in Advers. incurva fragilitate an-
guinum flexum, & longitudinem, & crassitiem æ-
quaque scribit, indeque nomen habere.

De hoc Celsipinus ait: Alter Citreolus est fru-
ctus non abissimili [à Citreolo vulgò, h.e. Cucumere] sa-
pore, qui crudus ante maturitatem carne tenerà, &
fragili gratus est, sed formà dissimili: crescit enim,
quà cogitur formà, ut plurimum anguis modo in-
torta pluribus sulcis, vel potius striis discurrentibus,
simili modò horridus, colore candicante. Florentiæ
Mellonem vocant, sed huic minor authoritas quàm
Citreolo. ejus planta assurgit in pergulas magis, un-
de fructus pendent, qui si permittantur ad justum
incrementum pervenire, crassescunt in longitudine
multum, ut Cucurbita. Nuper tertium genus [Cu-
cumis Ægyptius Chate, ut opinor, de quo deinceps agen-
dam erit] advectum est fructu cubitali tenerimo.
prædicti ergo fructus recenter orti & immaturi gra-
tiores sunt, quàm perfecti & maturi, omnes oblon-
gà figurà constantes, Cucurbitis longis proportio-
nem recipiendentes. Ceterum, ex Theophrasti ver-
bis colligere licet, ejus Sicyam, Citreolum nostrum
significare, præcipuè anguis modo intortum.

Tab. Cucumim anguinum, germ. Schlangen
Herbs appellat, minus aptè. B.phyt. & pin. dicitur
Cucumis 3. sive flexuosus: Cucumis anguinus &
tortilis, Lac. Cucumis anguinus, Arg. Gefn. col.
Lugd. anguina, Tab. Ger. Cucumis sativus 2. Cast.
Citreolus alter formà anguis, Cels.

Ejus autem speciem haberi ait fructu cubitali. Sic
in regno Congiano insignis magnitudinis & suavi-

eandem retine-
runt formam, ad-
ed ut in vite pen-
dentes, angulum
modo contorti vi-
derentur. In hist.
germ. vocat Cucu-
meres longos, an-
guinos, recurvos,
sulcatis, albos, a-
speros, sapore &
odore eodem cum
vulgaribus: foliis
asperis, ut Melo-
num. Camerarius
in hist.germ. Mat-
thioli pingit Cu-
cumeres longos, à
longis Matthioli
quodammodo di-
versos, vocatque
germ. Ein ander

tatis haberi: par. Ind. or. l. 2. c. r. Videtur hæc nobis
Cucumis Ægyptius Chate. Nec Celsipini delinea-
tio abhorret.

CUCUMIS ÆGYPTIUS CHATE.

Cucumis Ægyptius folia habet minora, albiora, Daser-
tus admodum differentes, longiores, viridiores:
corutæ plano, molli, æquali, sapore dulciori.



Vocat hoc ge-Chate Ægyptius
Cucumerum Ægyptij Chate.
quæ planta à com-
muni Cucumere
altè quidè re non
differt, nisi magni-
tudine, colore &
mollitiæ, alpinus.
An est hic Cuc-
umis Cels. Citreo. 3. Genus
li tertium genus,
nuper advectum,
fructu cubitali, te-
nerimo? An Bau-
hini Cucumis ter-
tij, sive flexuosus
species fructu cu-
bitali. Idem vocat Cuc
Cucumim 5. sive
Ægyptium rotun-
dulum.

Horum ulum corporibus in cibo ipsi tum cru-
dis, tum coctis vescitibus, salubrem esse apud o-
mnes eorum locorum incolæ creditur. Sunt enim vires-
concoctu faciliores. Medici aliqui ibi nonnullis fe-
bricitantibus crudos etiam mandendos concedunt,
præsertimque peste affectis, quibus Cucumeres hos
crudos elatis summè conducere omnibus (qua
ratione nescit Alpinus author) persuasum sit. Co-
ctos in ardentibus febribus, utiles esse ratione con-
firmatur, quando refrigerant, atque humectant. In
renum & vesicæ calidis morbis, cum lacte coctos
Cucumeres multis diebus non sine multa utilitate
in cibo sumuntur. Lac etiam ipsorum seminum pro
iisdem malis per os sumere sæpe solent. Ad oculo-
rum verò, aliarumque partium calidas inflamma-
tiones pulpa contusa Cucumerum lacti mixta ut-
untur. Et ad sedandos podagricos dolores à causa
calida concitatos, succum lacte, oleoque rosaceo
mistum, partes liniendo, adhibent. Sullatitiam a-
quam ad libram ad jecoris caliditatem corrigend-
dam, & ad sanandos renes tum inflammatos, tum
à calculis vexatos multis diebus ægros bibere con-
sulant, quibus ipsam satis is conferre experientia
compertum est. sunt aliqui, qui ad hæc eadem
mala aquà stillatitià lacti eorundem Cucumerum
seminum mixta, uti solent.

CUCUMIS SILVESTRIS SIVE asininus. CAP. XI.

Cucumer asininus Seplasis dictus, Melonis fo-
lum quodammodo refert, sed mollius, quàm
Cucumeres vulgares, iis etiam magis incanum, præ-
sertim parte infernâ, vel cineritium, crassius, & aspe-
rius, longis & hirtis pediculis appensum, ex flagellis
ramolorum caulium te retibus, striatis & hispidis e-
natum: flores sævi floribus multis numeris mino-
res sunt, quinquefolij, calathi formâ, colore ex al-
bido herbaceo, tantillum in diluorem flavedinem
decli-

grum & album. alia medicamenta, scribit inutilia esse à trimatu: Elaterium verò à bimatu ad decennium utile esse deiectionibus. Dalech. Si quis recentiore uti velit. pastillos in novo fictili igne lento in aceto domet. Melius quo vetustius: fuitque jam ducentis annis servatum, ut auctor est Theophrastus. Et usque ad quinquagesimum lucernarum lumina extinguit. [Dioscoridi lucernarum luminibus obiectum, facile flagrat & ardescit. Dal.] Hoc enim veri experimentum est, ad motum prius quàm extinguat, scintillare sursum ac deorsum cogat. Pallidum [cum candore nuntiabil humidum Dal.] ac lave herbaceo aut scabro melius, ac leniter amarum. Putant conceptus adalligato semine adjuvari, si terram non attigerit. partus verò, si in arietis lana alligatum inscientis lumbis fuerit, ita ut protinus ab exitu rapiatur extra domum. Ipsum Cucumin qui magnificant, nasci præcipuum in Arabia, mox Cyrenis, alij in Arcadia tradunt, similem Heliotropio, &c. [Herbarij omnes comparant cum sativo. Suspicatur autem Dalech. in autore Græco, unde Plinius hac sumpsit, scripsum fuisse & cum cucum. & & & alteri Cucumeri similem esse, - Pliniumque legisse innotescit. Quidam tamen Heliotropio similem esse colore foliorum interpretantur.] efficacissimum contra scorpionum ictus & semine & Elaterio, & ad purgandum uterum, alvòque. Modus portione virium à dimidio obolo ad solidum. Copiosius necat. Sic & contra phthiriasin bibitur & hydropises. Illitum anginas [morbum faucium gravissimum, Plautin Mostell.

In angina ego nunc me velim verti, ut venefica illi Fauces præbeam, atque enicem sceleris stimularicem. Lucillius apud Nonium.

Insuperato abijt, quem una angina abstulit hora.

& artenas cum melle & oleo veteri sanat. Idem eodem libro c.2. Multi hunc esse apud nos qui anguinus vocatur, ab aliis erraticus, arbitrantur. Quo decocto sparsa mures de ejus medicina non attingunt. Idem podagris cum articulorum morbis decoctum in aceto, illiunt præsentaneo remedio.

Lumborum dolor. Lumborum verò dolori semine solo siccato, dein trito, triginta denariorum pondere, in hemina dato aquæ. Sanat & tumores subitos illiti cum lacte mulierum. Purgat eas Elaterium. Sed gravidis abortum facit. Suspensio prodest. Morbo verò regio in nares coniectum. Lentiginis & maculas à facie tollit in Sole illitum. Multi eadem omnia fativis attribunt.

Disse. De Cucumeris silvestris viribus, ejusque succo Elaterio sic inquit Dioscorides: Totus fuit ex amarum est. Succus foliorum instillatus ad aurium dolores facit. Radix cum polenta imposita, omnem veterem tumorem discutit. Eadem cum resina Terebinthina imposita, tubercula rumpit: cum aceto cocta & imposita, podagras discutit. Ad coxendicum dolorem per clysterem infunditur. Decoctum ejus in dentium dolore colluitur. Arida trita vitiliginis, lepras, impetiginis exurit: cicatrices nigras & maculas in facie depurgat. Succus radices seliqui oboli pondere minimum exhibitus: & cortex quartâ acetabuli parte, bilem & pituitam purgat, maximè in hydropicis. Facit purgationem citra stomachi læsionem. Sumenda autem est radice si libra, & cum duabus libris vini, præsertim Libyci, terenda: & ex hoc dandi sunt cyathi tres jejunis, tribus interpositis diebus, donec tumor satis contrahatur. Quod verò Elaterium dicitur, ex fructu Cucumerum paratur, hoc modo. Cucumeres qui ad tactum desiliunt electos ac repositos per noctem siccato. Postridie cribrum non densum crateri imponito, & ad cultrum supinum acie sursum conversâ, sirpides Cucumeres ambabus manibus prehensos dividito, & lumen per cribrum in sapientiam craterem

exprimito, ita ut insuper etiam quod carnosum in ipsis est, & cribro adhæret, exprimas, quo & ipsum in craterem illabatur. Quum verò totum exprelleris, sicut ipsum subfudere. Deinde in pelvim appositam quæ exprella sunt mittito. Quæ verò secula sunt, in cribro acervata, & dulci aquâ affusâ expressa, ipsa quidem abjecto: humorem verò in pelvi turbatum & linteo contestum, ad solem exponito. Et quum subsederit, omnem supernatantem aquam unâ cum eo quod concretum superstat, diffundito. Et hoc sæpè facito, donec superflans aqua constiterit: quâ diligenter guttatim exprellas, id quod subsidet in mortarium missum tento & in pastillos efformato. Quidam quòd humor citò resiccat craterem cribratum per terram sternunt, & medio excavato, triplex lintheum superfundunt, & super hoc Elaterium cum humore fundunt, resiccatur autem in mortario, velut dictum est, terunt. Alioqui pro aqua marinam affundentes lavant. Alij in postrema lotionem aquam mulsam affundunt. Optimum Elaterium esse putatur, quod cum albore humidum est, non grave, lave, gustu amarissimum, & ad lucernam admotum facile ardens. Quod verò prasinum est, asperum, aspectu turbulentum, Ervo & cinete plenum, hoc grave est & viciosum. Quidam ad Cucumeris succum ammiscent amyllum, quo levitatem & candorem consequuntur. Abimatu porro ad decennium usque, idoneum est Elaterium ad purgationes. Perfecta ejus potio est obolus: minima semiobolus: pueris ærei duo. Amplius potum periculum affert. Mover purgationem sursum ac deorsum pituitam & bilem ducens. Purgatio per ipsum optima est difficulter spirantibus. Proinde si per alvum purgare voles, duplo sale ammixto, & de Subio quantum ad colorem inducendum satis est, cum aqua efformata catapotia Ervi magnitudine exhibeto. Sorbeat autem insuper aqua tepida cyathum unum. Ad vomitum verò, aqua ipsum diluito & locos fusi lingua penitissimè cum pinna illinito. Si verò difficulter vomant, oleo aut unguento iirino diluito: & ne dormiant, prohibeto. Cæterum, his qui nimium purgantur, assidue vinum & oleum exhibendum est. Vomentes enim resiliuntur. Si verò vomitus non cesset, aqua frigida, & polenta, & posca, & pomorum fructus, & quæcunque stomachum densare possunt exhibeantur. Mover Elaterium etiam mentes, & in pello appositum fortis cat. enecat. Idem cum lacte in nares infusum, morbum regium depurgat: & diuturnos capitis dolores summoveat. In anginis efficaciter illinitur cum oleo veteri, aut melle, aut felle taurino.

Cucumeris silvestris fructus ipsius succum, Elaterium vocatum, & non minimè radices aut foliorum ad medicaciones perutile esse ipse quoque Galenus prodidit. Elaterium, inquit, mentes ciet, & sæturi interimit appositum ceu alia omnia amara & subtilium partium, maximè si aliquam habeant caliditatem, veluti Elaterium. Summè siquidem amarum est, leviter calidum, ut ex secundo sit ordine calefacientium. Porro tale protinus quoque digerendi vim obtinet. Sicigitur eo angina laborantes inungunt quidam cum melle, aut oleo veteri. Bonum item est regio morbo affectis fufum cum lacte in nares. Hoc etiam usu dolores capitis sanat. Atque Elaterium quidem ejusmodi est. At radices succus, ut & foliorum, licet similem vim habeat, imbecilliores tamen. Sed & ipsa radix ad similem facultatem possidet, abstergit namque, digerit, atque emollit. Porro cortex eo potentius delicat.

Ex Mefues aut. omnia de cer m. Sil. h. ec adf. Mefues. Elaterium, fructu ejusdem, sed parvis, alio modo, amassino: cujus perfecti ac præcipui ex eo succi laus

Articulorum morbi.

Lumborum dolor.

Tumores.

Elaterium purgans.

Disse.

Tolerum succus.

Coxendicum dolor.

Siccus et sicca.

Hydropis.

Moimpre paranda E. luterum.

Dofie.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

Elaterio.

laus est, secunda radicis. Idem fructus jam absolutus, si maturitate palleat, viridisque esse desierit, & amaritudine sit eximia, succumque remittat album & subpinguem, est calidior. Imperfectus autem tam est noxius ut sanguinem educat. Succus autem exeunte Astate excipitur, radix sine Veris colligitur. Eadem in medicamenta multum efficacia & celebrat recipitur. Calidus est & siccus ordine tertio: substantia ignea, & terra usque constat. Purgat potenter pituitam vomitu & deiectione, & interdum bilem, si vacuari parata est: ferosum [& non ferosum, ut *Silv. legit.*] excrementum, etiam & evulsu contumax, atque adeo à juncturis mitificè trahit, præsertim succo & radice, ob id earum dolores sanant, ischiadem etiam juvat apertè cataplasinate impositus, vel clystere injectus. Vim namque purgativam Scammonio proximam ei tribuit Ioannitius. Si enim vacuet immodicè etiam sanguinem trahit. Radices item ejus cum absinthio in aqua & oleo percoctæ, hemiplegiam molestant & curatu difficilem sanant, si ipso decocto tempora foveantur, & iidem radices eadem, & herbe trita cataplasmate applicentur. Succus quoque ipsius, naribus injectus cum paucò lacte idem efficit. Excrementa enim cerebri evocat, & nasi fontem ab horum putredine ortum per sanat: cephalalgiam quoque veterem, & epilepsiam. Idem cataplasma, præsertim si stercus caprinum addatur, tumores magnos, duros, & strumas resolvit. Succus quoque, & decoctum cum fructibus, tum radices hydropem juvat potu (valenter enim aquas ferolas vacuat), & icterum, & obstructionem hepatis & lienis. Pulvis radicis cum melle cicatricem ferendam tenuat, ecchymomata contusionibus succedanea dissipat. Succus radicis cum farina Fabarum, fordem faciei & foveitatem cutis illius terget. Radix ex aceto forti alphis affricata, eos delet & lentiginines. Resolvit enim, tenuat, terget, siccatur, solvit molestè, & sciatè aperit obstructa, & ora venarum. Ne ora venarum aperiat & ulceret hic succus, & eum torminibus, & Scanzia molestia vacuet: datur cum Bdellio, vel Tragaeantho, vel lacte dulci recenter mullso, aut mullsa & sale: promptius autem purgat cum paucò sale gommarum & aromaticis. Succus autem ex fructibus per maturitatem pallentibus elementer sine compressione multà extractus siccatur, ut Scammonium & Aloë. Nonnulli inter siccandum ei immergunt aromata nodulo ligata, quem exarabunt, dum siccando cogi incipit: alij aliam mittunt pro scopis variis. Triennio servatur, post sex menses utendus. Noxam autem ab eo corpori impressam delent aqua hordei, mullsa, vinum, oleum. Datur succus à granis 10. ad drachmam unius partem tertiam: Pulvis radicis à granis quindecim ad drachmam semissem. Radice hujus multum utuntur præctici Monspelienfes, cujus efficacitatem deprehendas ex unguento Agrippæ, Ciclaminis, & alius etiam internis, ut Anasarca & Ascite.

Rondeletio primum & post Lobelio ex Plinio conjectura fuit Elaterium verum ex medulla feminis candida plurima (quæ minus quam fructus, aut folia ingrata est, quæque præsertim Sole siccata, flammisque admota, tota utendo deflagrat) ex paucis ei hærentem mucagine medullosa, & non exipis Cucumerulis parandum esse. Perquam autem celebre fuit antiquis catharticum, ut de Hippocrate & Theophrasto liquet, Elaterium, quasi dicas exagitant, turbatè ciens medicamentum: vehementer namque supernè, infernèque alyum citabat, pusilla dosi, nempe oboli, vel scrupulo semisse, per se, vel adjecto salis altero tanto, & Stibij quod colorando fuisse esset. Probatissimum fuit, lavæ, non asperum, nec ponderosum, sed album, nec aridum, vel exutum, vehementer amarum, & lucernæ objectum

facile flagrans. Quæ notè lectori plantarum consulto, non rixandi, sed cognoscendi cupido, facile retegunt planè perviam hujus loci in Theophrasto *Theophr.* & Dioscoride salebroso intellectionem: cum namque ex Cucumerulis istis succus effluat admodum *Diosc. car. punitur.* tenuis, viridis, aqueus, igneque densatus, inæqualis, nigricans, ac objectus lumini neutiquam flammam alens, paucisque annis mucidus, putrisque futurus, verisimile Lobelio quidem fuit, vel Theophrasti, vel Dioscoridis Elaterium dici non posse, tum propter illas omnes, jam quas dixit, reprobi notas, tum quia nec durat, nec flagrat. Quare ipse superioribus annis cum in Gallia Narboneensi parasset Dioscoridis & Theophrasti instituto, curassetque parandum multis modis: tandem maximam Cucumerulidum copiam colligendam curavit, è quibus super cribro incisis, seminis rufi, & crebrò maribus pressi, medullam sive mucaginem Phyllij similem subter cribrum transmissam excepit, Cucumerulorum eorundem succo, affuso, & aquæ fontanæ nonnihil, quò facilius glutem remitterent trans cribrum: istud partim Soli sub dio expositum nigricans habuit, partim verò igne aut sub cineribus exsiccatum, albidum & pullum. Vtrumque tamen lacernæ admodum actum flammam dabat, & alebat suâ pinguedine: quin etiam quale ipsi adhuc in museo longè aridum superest, facilius uret, cujusmodi nunquam poterit parari ex sola Cucumerulorum aqua, mucosave carne, ut probè norunt, qui sæpius periculum fecerunt. Eapropter Plinius videtur ceteris melius & verius ex Theophrasto, aut quopiam alio *Plinius ad Dioscoridis* classico auctore, ad Dioscoridis sententiam accessisse, *sententiam accedisse.* quum ex fructu, & semine faciendum censet: mirum ut objectum flammæ flagret, quale optimum tradit Dioscorides: quem suum ducem ignay *Math. reo prob.* hic deserit Senensis commentator, & infulsè fugillare videtur, dum contentiosas textit ambages auctoritatum fartagine. Sanè par est, quo dictum modo, commodius, tutiusque purgare, adeoque diutius non putre durare, quia actis virulentusque succus medulla pingui seminis retunditur & mitescit, nec perinde (qua oleaginosum pingue) putrescit: mitior etiam vis in semine & par ratio, quæ in Colocythide.

Nunc à Theophrasto maxime dissentire videtur *A Theophr.* Dioscorides: quippe qui Elaterium dixerit à bimato *dissicant.* ad decennium deiectionibus utile esse. Theophrastus verò idem ducentis annis virtute mirabili servatum esse scripserit. Cordustandem Aginetæ *Aginetæ sententia ad viridem colorem inclinat, Dioscorides verò candidum.* impossibile siquidem contenderit viridem per se succum, eum exsiccatum, candidum fieri. Sed esse & alia quædam in hoc capite absurda scribit. *Diosc. caput manu.*

BALSAMINA CUCUMERARIA. CAP. XII.

EX radice parvâ, fibrata, semestri pronascuntur *Defect.* viticulæ unius aut duorum cubitorum, tenues, striatæ, angulosæ, quæ claviculæ ope, quas ad folia singula emittit, peticis se circumvolvunt: folia Bryoniæ, vel potiùs Vitis foliis similia, minora, concinnids divisa, hilari virore nitent, penitis glabra, pediculo unciam aut fescunciam circiter longo, ariore quodam & acrimonia levi prædita. è foliorum alis flores prodeunt, ex quinque foliolis acuminatis compositi, colore ex albedo lutei, flaminibus etiam luteis, quos excipiunt fructus sublongi, qui maturi rubent; vel ut ait Lobelius, superficie, carnèque nitentis purpureæ phœniceæ, turbinati, Cucumeris formâ, eodemque modo tuberculis horridis



Валланта
считается
на.
Считается
рыбам.

*Pomum m.
rabile.*

Ротмистр
Николаев

Balsam

Bals. Mo-
rordica.

Charanti
Charanti

...

Memoranda
ca.

Viricella
Pomum

Balsami.
ms 14772.

Quantities

genus, So
phas Plin

1890

cognominat, Balsaminam cucumerinam; aut si ma-
vis nobilium Cucumerariam vocabis, vel cum Cor-
do Cucumerem punicum, quod nomine eam in
hist. describit, id quod figura à Gesnero apposita
quoque declarat. Alij, ut Tragus, Balsaminam Li-
gurum Padanorum, Pomum mirabile Gallorum,
h.e. *Merueille*, & *Pommes de Merueilles*, nominant;
nonnulli verò Pomum Hierofolymitanum cum
Hetrusci appellant. Balsamine r. dicitur Arguill.
epist. Trago, ut & Fuchsi cui & mas. Balsamine a-
lia Gesn. h. Eid. in app. Balsamina Momordica a-
lia, & de coll. stirp. Balsamina pomifera herba. Cha-
rantia Hermol. Lon. Dod gall. & lat. Garantia vul-
gè Gallorum, Gesl. Charatia Italorum Fuchsio, quo-
niam septi modo in hortis, fenestrisque per cancel-
los opere topiario facile digeratur. Momordica
Matth. Cast. & Bapt. Sardo. Mamortica nonnullis:
Viticella aliis. Germ. *Balsampffel* & *Balsam*
frant h.e. Pomum Balsaminum, & Herbam Balsami-
nam. Balsaminez nomen inde accepsisse videtur,
quòd fructu ejus, five pomu in oleo macerato, balmi-
fici vix ad vulnera utantur. Italis est *GARANZA*, *Ca-*
TANZA & *GARANZI*. Videtur nobis illud Cucurbitæ
genus esse, quod à Plinio Symphos nuncupatum
legimus.

B. pin. Balfamina 1. (2. phyt.) rotundifolia repens,
five mas: Balfamina five Pomum mirabile, Trag.
Balfamina, Matth. Lac. Lugd. & Cæf. alba Geln-h.
Cucumis puriceus, Cord. hift. Balfamina mas, Cam.

ridis bullati, carne
purpurea : semine
Citriuli, vulgo di-
cti, copioso, iulco,
longiore ; quàm
latiore, modicè a-
cuminato, com-
pressoq; & aspero.

Ballanitamelle
multi ignorantes
Apothecarij cre-
dunt, ut etiam Lu-
minare majus in
Martiat. dict., sed
non rectè. Cogna-
tâ facie Cucume-
rino generi cum-
sit, verius cum Lo-
belio, qui in Obl.
p. 369. Icon. p. 648.

& Ger. Fructus maturus colore variat. modò pu-
nico, modò luteo rubescente. Balsamina mas fru-
tu puniceo, & Momordica fructu luteo rubesce-
nt. evit.

Non nisi lata provenit: melius ac felicius in Ita- Loca
Temper
lia calidiſque regionibus proficit, quàm in Germa-
nia ubi Auguſto plerumque menſis florer, & nun-
quam, aut tarò & tarò fructus matureſcit. Vbi ve-
rò primi n. excaleſcere cæpit, ſarmentis ſeu palis
ſuffulcenda erit, ut illis alligata à ventorum injuriâ
tuta eſſe queat.

Obtinent fructus Balsamines, tum & folia ex-
miam reficenda vim cum moderata quadam frigi-
ditate temperiei media proxima. Vñnera recen-
dit conglutinare folia imposita feruntur: cum vino
verò affumpta colic, intestinorumque dolores sopi-
re, & ruptis, convulsisque utiliter exhiberi. Oleum,
in quo fructus exempto semine, vel insolutus, vel
in calentia aque balneo decoctus, vel in simo [malè
f. m. d. ar.] equino micratus, vulnèrum inflammatio-
nes arctotidem & faciliè ac citò unit ac perlanat.

Doloribus ac ulceribus mammillarum auxiliatur: uteri exulcerationes ac inflammationes injectione curare posse exstimatur: punctis ac vulneratis nervis uulter adhibetur: ad verius combustionem, ex aqua, oleo fervente, ferto ignito, veligne multum confert: cicatrices extenuat. ramices quoque hujus unctione faneunt, si foliorum pulvis aliquot diebus interea exhibetur. Steriles quoque hoc fecundas reddi affirmatur, si post balnei conveniens utrum partes circa pubem ac uterum isto inungantur, ac demum vii mulier miscetur. Nonnulli (ir quique Fuch.) pomum oleo prulis imbutum aliquot dies infiant, deinde vel fimo, vel terra tantisper obruunt, dum profusus adhaerit, sic Balsami vires glutinandas vulneribus adhaerere pollicentur, inde tractum Balsamina vocabuntur. Quid multa? in vulneribus sanandis Tephlio non inferiores esse conicio, binque Balsamina appellatam. Ego vero de ea peculiarem experientiam nullam habeo. Poterunt itaque alij si libet earundem virium flectere periculum. Addit Tragax ex Hermolao: Oleum ex Balsaminz primi generis feminibus exprimi ad vulnera precipiunt. Alij asserunt poma haec in oleo maceranda, postea vulneribus glutinanda, misce prodesse, ita quidem ut si equo nigro auriculam praefundas, albo postea equo, cui talem fusa praecita sit, vi hujus olei agglutinare possis. An vero sic se res habet mihi non constat. Author Pandectarum multa de illa scribit.



HISTORIAE UNIVERSALIS PLANTARVM LIBER XVII.



SCANDENTES SILIQUATAE LEGUMINOSAE,
ALIAEQUE SIMILES, NEC SCANDENTES:
UT TRIFOLIA.

TERTIUS scandentium ordo, est siliquosarum. Sicutque haec illa siliqua, quae legumina sinu suo comprehendunt, ^{nonnulla quoque dicta, quae tamen si lubet, & libet discas cum Graecorum nonnullis, & Phaseolos cum Latinis, & Dioscoridis cum Dioscoride, & quorundam cum Galeno & plerisque, & Dolichis cum veteribus.} Est quidem siliqua neque caro, neque lignum, neque cartilago, si proprie loquere: neque temerè aliud nomen inueniat, quam membrana, vel corry: quod duplex: carneum & mollius, exterius superintectum: ac interius durius, quinquam tenue, quoddam nullus edomare queat stomachus. Maximus sane illarum stipatus. Siliquatū adiecimus Trifolia, non unā similitudine illis affinis, sed nec multiplici varietate illis cedentia.

PHASELVS, PHASEOLVS, PHASIOLVS, DOLICHVS ET
SMILAX HORTENSIS IN GENERE.

CAPUT L



CANDENTES ergo procedant siliquata, primumque Phasioli qui tum multitudine, tum elegantia, tum raritate ceteras multum antecellunt.

Distinguunt Phaselum [φασέλιον] à Phaseolo sive Phasiolo [φασέλιον]

Galen. Paul. Cord. in Diosc. Dod. Corn. Matth. Turn. Cels. & passim alij. Sed distinguit & Diosc. qui tamen pro Phaseolo Phasiolum legit, ac rursus pro Phasiolo, Smilacem hortensem [σμιλάκη ἡορτένσιαν] reddit. Quod autem distinguat, id non solum diversa Phasioli & Smilacis nomina sub diversis ac multum à se invicem separatis capitibus, sed discrepantes quoque earundem historias satis superque comprobare arbitror.

Sunt, inquit Gal. de alim. facult. qui Phaselum eundem cum Lathyro esse dicant: alij autem ipsius speciem. Dolichorum nomen à Diocle quidem scriptum est. scriptum etiam est in libro Hipp. de rat. vict. Existimo autem ipsos sic appellare semen plantae hortensis, quam nunc vulgo numero multitudinis bifariam nominant: quidam enim λολίχας [siliquas] alij φασέλιους [Phaseolus] nuncupant, vocem ipsam quatuor syllabis pioferentes: & eoque modo diversum ab eo, quod tribus syllabis pronunciant, φασέλιος scilicet efficientes. Quod ad Dolichos attinet, con-

jectare quis possit, eos nominare plantas hortens. ^{Coniectura Galeni, Dioscoridis, & Phaseolos.} vel ex iis, quae Theophr. 8. de plant. hist. scripsit. Ex eo autem quod ligna longa iubet affigi, posset quis conjectare, ipsam verba facere de iis, quos nunc Phaseolos, & Lobos [siliquas] diximus. Ipse autem id lobos [siliquas] appellat, quod semen leguminum continet. Et sane ipsos quidem Dolichos lobi [siliqua] continent: ob eam opinor causam fructum totum vulgò nunc lobos [siliquas] nominant. Cum Hipp. nullam prorsus Lathyrj [Cicerula] aut Hipp. Phaselj mentionem fecerit, suspicari quodammodo possumus, illorum seminum quoddam licere appellare Dolichon. Quod si quis Phaseolos quoque in Lathyrorum [Cicerularum] genera reponat, negare saltè non poterit, quin Lathyrj [Cicerula] in praedicta oratione Dolichi appellari queant. Nam & Diocles in leguminū catalogo Dolichos reponens, Lathyrj verò nomen prætereans, eandem præbet dubitationem. Dicere tamen quis possit & Ochros [Ervilia] & Lathyrj [Cicerula] & Phaseolos unum esse genus, verum pluribus appellari nominibus: fortasse autem propter quasdam differentias, quae in ipsis apparent. Veruntamen quod Dolichi non minùs Pisis nutrant, tum quod æquè ac Pisi flatu careant, iudicio esse debet, Dioclen Dolichos appellasse, quos nunc Phaseolos nominant. Vocet quisque quo libeat nomine, quos nunc vulgò Phaseolos & Lobos [siliquas] appellant, dum sciat ea talem obtinere facultatem, cuiusmodi Diocles

Doli-

Hipp illu-
francus.

Dolichis attribuit, ad cuius sententiam Hippocrates propè accedit, cum inquit: Dolichi [Phasoli sive filique C. r. n.] pisit magis per alvum secedunt, minus in flant, & probè alunt. nam ita res habet, nisi quodd integro, & etiamnum virides, unà cum suis filiquis ex oleo & garo ut plurimum homines mandant: nonnulli autem etiam vinum adiciant. Et: Phaseli & Ochni semina homines & Fœnugrecu n. prius in aqua quoad radicem producerint, macerantes, ventris subducendi gratia mandunt ante alios cibos.

Diffinitio
Pauli.

Paulus etiam de Phaselo, & Phascolo, quem Dolichum nominat, ut de diversis eodem capite tractat. Ochtron, inquit, & Phaselum macerata donec etiam radices succreverint, ex garo ante cibum sumpta, alvum subducunt, ac plus quàm Fœnugrecum alimentum exhibent. At Phaselum & Dolichon integra cum filiquis viridia comesta, excrementitia magis redduntur.

Diff. Cord.
Phasolum
quid.

Nonnulli, ut Cord. in Diosc. perhibet, Phaselum à Phasiolo distinxerunt, ita ut Phaselus sit legumen simpliciter tunc vocatum ab Italis Phasiolus: Phasiolus verò idem cum Dolicho. Sed istam differentiam nullus autor adhuc, neque ipse Dioscorides observavit. Quapropter cum videam, ait, à multis diversas has plantas confundi, distinguam eas, quibus ab invicem dignosci possint. Sunt enim ambæ legumina, magnam in foliis, floribus, filiquis, & seminibus affinitatem habentia. Phaseolus igitur nostro iudicio quem Dioscorides hoc nomine recenset, quemque plurimi distinctionis gratia Phaselum, seu ut Itali dicunt, Phasiolum vocant, est Phaseolus vulgaris Italicus, humilis minor albus cum orbita rubente, vel nigricante, caules sine adminiculo surrigens, quam plenius infra describimus. Alter verò, qui Dolichus ab aliquibus appellatur, propriè Smilax hortensis [oum d. hortensis] vel sicut Phasiolifera vocatur, idque ad differentiam ab omni alia Smilace. Cordi gravem errorem, Smilacem phasioliferam, levem vocantis, vide postea de Smilace hortensi.

Phaseolus
Diosc. An-
torum.
Phaseolus
quid Ital.
cum orbita
rubente.
Dolichus.
Smilax hor-
tensis.
Cord. err.

Diff. Dod.

Neque Dodonæo placet, ut quidam existimant, quodam ac phasiolum idem esse legumen diversis nominibus appellatum, sed fructus diversos ac differentes, veluti Galenus ostenderit. Idem autem suam sententiam ita confirmat. Galenus primum de Phaseli, deinde de Dolicho, qui Phaseolus dicitur disputat: & licet videatur addubitare, quale legumen sit à Theophr. Diosc. Hipp. & plerisque aliis Dolichum appellatum, tamen Dolichum colligit & resolvit fructum esse in Italia hortensis plantæ; in Caria verò, in agris nascentis, qui formam habeat Lathyris longiore, ac Phaseolus nominetur. Huic accedit Ægineta de Phaselo & Phascolo, quem Dolichum nominant, ut diversis tractans. Iam & Phaselus, Italiz quidem ac Romæ vulgare fuit legumen: Dolichus verò peregrinum. Nam sationis Phaseli, Columella & Palladius meminerunt. De satione verò Dolichi nemo Latinorum scripsit, utpote qui in Italia rarus fuerit, atque in hortis tantum satus, veluti Galenus innuit, cum subinde plantam hortensem nominans, ac in Caria feri referens; & similiter Dioscorides Smilacem hortensem eum nuncupans. Qui etiam scorlin, separato capite hanc perstringens, aliam ac differentem Smilacem hortensem sive Dolichum à Phaselo esse, quem Phasiolum; nonnulli docent ac docent, latine Sil. quam, nuncupant, evidenter demonstrat. Quas ob rationes dubium esse nequit, Phaselum trium syllabarum, à Phascolo quadrissyllabo diversum esse; non minus quàm Cicer, Cicercula & Cicera differunt, quæ tamen nomenclaturis affinia sunt: ac à veritate recessisse eos, qui unum legumen diversè nodè appellatum esse existimant. Hæcille, qui sibi ipsi apertè contradi-

Dolichus
Galenus.

Hortensis
plantæ.

Phaselus
Italia le-
gumen.

Dolichus
peregrinus.

Smilax
hor. Diosc.

Phaselus est
Diosc. Phasi-
olum.

Error mul-
torum.

Dod. not.

cit ejusdem Pempradis quartæ, l. 2. c. 1. dum ait. Cum apud veteres nullum aliud reperiat, quod Bona similis esse queat, quàm Phaselus, Bonam eandem cum Phaselo esse consequi videtur: quem Græcorum complurimi, Dioscorides quidem, Simeon Sethi phaselon nominavit. Habet enim in primis Bona fructum Dolichis similem, at majorem, quæ major est, cujusmodi Phaseli esse Dolichus innuit, diminutivâ voce, à similitudine Phaseli, nuncupatus. Iam & Bona alta proceraque est, qualem Phaselum esse Columella testatur.

Er grævus Attriplici [at triplici malè legit Dod.] consurgit Linga Phaseli.

Vulgarem item olim per Italiam fuisse Phaselum, ex libris Columellæ, Palladij, Virgilij notissimum est, sationis enim ejus & tempus & modus in his docetur: Bona verò hac ætate nihil familiarius. His accedit, quod minoris Bonæ fructus, Sparti fruticis sive Spartij Lobum magnitudine ac formâ & non raro colore, proximè referat: at Spartij lobos Diosc. tradit veluti Phaselos. Phasioli autem quibus Sparti fruticis lobi à Dioscoride similes perhibentur, idem sunt cum Phaseli. quam ob rationem quadrissyllabus perissyllabum, à trissyllabo perissyllabo differre nequit. Vides ita contradictionem, quadrissyllabum, à quadrissyllabum, à trissyllabo [Phaseli] trissyllabo differre & non differre. Hanc quidem contradictionem tollemus, si dixerimus quadrissyllabum Dioscoridis, à quadrissyllabo plurimorum non differre: differre autem quadrissyllabum aliorum, seu dolichorum, qui est Smilax hortensis Diosc. quadrissyllabum plurimorum, qui est quadrissyllabus ejusdem, quod Dod. non absque contradictione simpliciter asserit. Phaselum autem non esse Bonam [Phaselum] præter rationes infra in cap. de Fabâ adducendas, vel hæc solum id tam manifestè innunt, ostendunt atque demonstrant, ut nullus dubitandi locus superest. Nihil simile inquit, est Bonæ, quàm Phaselus. Sed an illum fugit, quia omnis similitudo claudicat, nec quod simile est, idem numero cum simili dicitur. Adde Phaselus à Bona multum dissimilis est. Bonæ folia subpinguia sunt, Phaseli non ita: Bonæ (l. quæ crassa, carnosa, mollibus seu flosculis lanosa & hirsuta sunt, non autem Phaseli: Bonam tegit oblongus dilutè virens unguiculus, nec Phaselum: Bonæ caulis quadratus, Phaseli rotundus. Bona igitur Phaselus esse non poterit.

Cur Dioscorides de Phascolo agit, & rursus de Phaseli hortensi si similiter repetit, si eadem res est Smilax & Phaseolus? Duo traduntur esse genera Phascolorum, cardium & subfulvum, ait Cornarius. Candidum, quod Diosc. Phascolon vocat. Cornarius meo iudicio perperam docet & delirans quosdam appellare scribit. Sicut etiam falsò à Phaselo separat, quem abundè de Phaselo [Phaseli] aut ejus speciem esse credit. Eos autem Germanis reprehendit, qui Phaselos, seu etiam Smilacem Welsch bonen, quasi dicas Fabas Italicas, nominant, siquidem idem faciunt, quod in aliis rebus ignotis & peregrinis facere solent. Omnia enim hujusmodi Welsch voce, ad rei alicujus nomen additâ appellant. In Phaseolis tamen hoc gravius est, quod rei ignotæ penitus nomen fingunt. Ceterum Phaseolum subfulvum Smilacem esse corcludit.

Matth. Phasiolum in duo summa fastigia quoque partiri videtur, in campestre scilicet & hortense. Hoc Smilacem hortensem, variis coloribus præditum etiam ait; illud autem Phaseolum à Diosc. descriptum, cardium ac vulgare in arvis in Italia.

Iis non assentior, inquit Turnerus, qui legumen quod mihi Dioscoridis Phasolum putaret ejusdem generis esse aiunt cum Dolicho Theophrasti, Smilace Dioscoridis, & Phascolo Galeni. Primo, quia in

toto

reto opere suo non consuevit Dioscorides duobus capitibus longè diffitis, de horrensi & siluestri planta eiusdem generis, sed eodem capite, aut ferè proximo agere. Atqui de Phaeolo agit lib. 2. cap. 107. de Smilace horrensi cap. 140. eiusdem libri, quod non fecisset utique si naturalibus duntaxat (vt Matth. velle videtur) differre credidisset. Quæ ratio si nõ valet, nec valebit Matthioli Secacul faciētis Eriugium, aut laurū Alexandrinā & Hippoglosson esse distincta. Altera ratio est. Dolichus Theophrasti, Smilax Diosc. & Phasiolus Galeni percutunt, neque ad frugem perueniunt nisi adminiculis fulciantur. At Phaeolus Diosc. in Longobardia feliciter satis sine adminiculis ad frugem peruenit. Non est ergo Phaeolus Diosc. idem cum Dolicho Theoph. Smilace hort. Diosc. & Phaeolo Galeni. Postremò ab ipsis dissentio quòd auctoritates, quas pro se adducunt in nonnullis penitus contra ipsos faciunt. Scripsum est enim ex auctoritate Hipp. apud Galenum, Diosc. & Actium, Dolichos minus esse statulentos, At Phaeoli Diosc. non tantum statulenti sunt, verum status etiam excitant. Galenus quoque eo loco, ubi Dolichos & Phaeolos eodem facit, absque omni dubio duas facit Dolichi species, eodemque modo Phaeoli duas. Cum enim in principio ferè capitibus distisset ex auctoritate Theoph. Dolichos putrescere & interire, nisi adminiculis suffulciantur, eiusdem capitibus sine ostendit esse præterea genus quoddam, quod adminiculis non egeat, Atque hos ego Phaeolos censco Dioscoridis, qui multum à Smilace differunt. Phaeolus ergo Diosc. & eiusdem Smilax horrensis duo sunt distincta legumina.

Faeolos Antiquorum nequaquam esse eos, quos vulgò *Faeolus* vocamus (Celsalpin verba sunt) patet ex eo, quòd Æstate feruntur, perficiuntur in Autumno, seruantur optimè incorrupti, & facillimè coquuntur. Galenus quoque Phaeolum testatur alium esse à Phasiolis: comedi in Alexandria, &c. Genus candidum recipitur in compositione quadam ad renes, sed eo loco Phaeolus legitur, non Phaeolus. Dioscoridis Smilacis horrensis descriptio partim Faeolos nostrates ostendit, præsertim siliquæ similitudo cum Fennigæ, partim Turcicos vocatos, cum feminis varios colores tradit.

Tria etiam sub genere Phaeoli, specie inter se diuersa cognoscit Manardus legumina, *Phaeolum commune* [Italicum] Phasiolum, quem & lobum vocari ait, & *Eruilam* [Pisa] & *Smilacem*, de quibus singulis separatim dicemus, à Smilace initium faciunt.

SMILAX HORTENSIS.

ARMENTORVM longissimorum beneficio Sæpticas & pergulas proximas, sese iis circumvoluens, confendit, foliis donata ternis, ex vno pediculo aptis, hederaceorum non angulorum similibus, asperis, satis neruosis, palmo quoque neruis amplioribus: flores furculo peculiari coherant plures, Pisi floribus multò minores: siliquæ pensiles succedunt, palmum & fœsq. palmum longæ, siliquarum Pisorum crassitudinem mediam attingentes, femina continentes nouena, vndena, longa, renes imitata: sinu in medio impressum habentia, læuore eximio, colore mirum in modum vario, cinereo, eburneo, luteo, glauco, rubente, omnibusque his inter se mixtis striato,

Tom. II.

guttato (Phasioli vulgò appellati) inueniuntur aut



omniñò niuei, aut nigri, aut flauī, aut purpurei, aut amethystini, aut cærulei, aut rubri, aut lateritii ferè coloris, vel albi nigris venis aut lituris distincti, ac etiam cinerei, & carnei coloris similib⁹ venis insignes, Clus.) sapor e viciado, leguminoso, nec omnibus grato. C. Bauh. Smilacem hortens-

Phasiolus
vulgare,
C. Bauh.

sem duplicem facit, vulgarem alium, alium peregrinum: vulgarem, alium maiorem, fructu longiore, & renis formam melius referente, qui communiter cædidos: alium minorem siliquæ angustiore: distant etiā crassitie & tenuitate. Hic variat floribus & feminis colore: flores plerumque candidi, pallidi, flauetcentes, purpurascētes, siue amethystini & vt Cordus hist. censuit, floribus colorem fructus sequuntur.

Verum in femine fructuue maior est coloris varietas, sunt niuei, flauī, ex flauo obsolet, purpurei, rubri, latericei ferè coloris, amethystini, violacei, atro violacei, nigri, initio purpurei deinde atrī: vel alibi nigris venis & lituris distincti: item carnei & cinerei, similibus venis insignes: item albi purpurascētes, orbibus albis variegati, vel spadicei nigris maculis aspersis: nonnulli incanī, atro colore, vel ab vna parte, vel vtrinque notati. Non minor sanè est varietas in Phasiolis ex America, Africa atque aliis regionibus, procul ab orbe nostro remotis, quam in his quæ in Europa nascuntur. Sunt enim maiores, minores, mirâ colorum varietate inter se discreti. Illorum nonnulli, aut prorsus candidi, aut flauī, aut cinericei, aut fusci, aut atrī, aut rubri, aut amethystini, aut variis coloribus non vno modo distincti: interdum albo & nigro, rubro & nigro, flauo & nigro: sic alius ex flauo & spadiceo simul mixti coloris, at circa hilum candidus: alius roseus, in quo rubri nonnihil elucet.

A Dioscoride ita describitur. *Σmilax ὀρενσις*, Diosc. testatur, cuius fructus *ῥαπτος*, & non semen, vt falsò quidam legunt] lobia [quasi siliquula dicas] & à nonnullis asparagus vocatur, folia habet Hedere [ἡδερῶ] similia, molliora tamen: caules tenues & capreolos propinquis fruticibus implicatos, qui ed vique adolefunt, vt topiarii operis attecias seu cameras opacent, vt tentoria & scenas efficiant, alius. Fructum autem (*ῥαπτος*) profert Fennigæco (*ῥαπτος*) similem, longiorem tamen & insigniorem, in quibus femina similia renibus concluduntur, non æqualia quidem colore, sed ex parte subfulua.

Quæ sit Smilax ita declarat Aëtius. Qui nunc ab omnibus Lobi nominantur, apud omnes Viteros Dolichi & Phaeoli appellabantur, & ab aliquibus Smilax hortensis. Lobi quidem, hoc est, Siliquæ, quoniam præ aliis præcipuè, ex omni siliquarum genere, quæ induuntur inuictæ sunt,

Smilax Aëtio.

hæ solæ vñ cum siliquis, siue tegumentis suis
vt plurimum comeduntur.

Nō est Smilax laevis Hermol.

Hermol. doctē sentit nobiscum *σμηλα καυτή* [Smilacem hortensem] non eandem esse cum ea, quæ laevis à Diosc. cognominata est: Recētiōres cum Actio Phasiolum à Dioscoride per Smilacem hortensem intelligere non candidum sed rubentem, quī & Lobus & Dolichus dicatū & lat. Siliquia.

Siliquia. Marcell. redarguit.

Sed non sapit hæc nostra & Hermolai opinio Marcello, qui tamen ipse, qualis sit Smilax hort. & quibus in regionibus inueniatur, nescit dicere. Sed rationem, ob quam nostram opinionem despiciat, ipse perpendit. Patum verisimile mihi videtur, inquit, ad eam altitudinem & frondium copiam posse legumen aliquod augeri, vt scenas & tabernacula vestiens inumbret. Theophrastū si inperisset, intellexisset vtique Dioscoridi eum auctorem fuisse, cur inter legumina Smilacē hortensem in tantum ascendere scripserit, vt topiā opus efficeret, satis quidem commodē ad exprimendum vocis & verbi captum.

Marcell. caput.

Serap. error.

Marcell. taxatur.

Quare Manardus meritiò Marcellum reprehēdit dicens: Phaselum esse, qui nunc vulgò Phascolus dicitur, quem & Virgil. vilem fuisse nuncuparit. Quod si animaduertisset Serapio, sub Lubiæ nomine, quod certè à lobo Græcā voce deflexum est, Phaselos cum Phascolis. e. Eruitha minimè confudisset. Marcellus expolit sententiam quam refert Hermol. non alio argumento, quàm quòd verisimile non videtur ad eam altitudinem legumen aliquod augeri, &c. sed semetipsum proprio gladio iugulat, siquidem ipse Smilacem, quicquid ea sit, in leguminum genere numerandam dicit, ac ipsomet interprete tanto incremento esse dicit Dioscorides, vt scenas & tentoria inumbret. Fateri igitur oportet, aut verbū Dioscoridis *σμηλα καυτή*, non bene à se conuerti, aut Smilacem, quæ ipsomet teste legumen est, adeò posse crescere, vt tabernaculi instar Solem arcëat, atque, vt sequens est, eius argumento eos, non reuinci, qui Phascolum pro Smilace intellexerunt, Serapio & Auicenna de Phasiolo nunc vulgò vocato ea proderunt, quæ Diosc. de hortensii Smilace. Nuper tamen etiam cognoui veram Smilacem in lumniam proceritatem ascendentem, grana quoque in siliquis producentē, Phascolo communi præterquàm colore (rubra enim, vel crocea sunt) similia. Multò tamen duriora videntur, quàm communes Phascoli.

Smilax Ge. r. ad Manard.

Corrai. error.

Corrai cur Smilacem fruticem hortensem vocat? Quid quæso Smilax cum frutice participat. Frutex à radice caudice multiplici, tan osusque attollitur. Smilax verò legumen à radice foliatum, sine caudice prouenit.

Brunfelsii error.

Corraium Smilacem vocando fruticem malè sequitur Brunfelsius.

Marcell. reprobat.

Dolichos, qui Galeno & Egineta Phasioli cognominantur, Siliquam Theoph. & Smilacē hort. Dioscoridis esse retur Tragus, nec errat: ac aliter etiam Marcellum, si is Smilacem hort. viridem vidisset, pronuntiaturum fuisse existimat.

Lonic. pro Dolicho & Smilace hort. falsò iconem Pisorum exhibet, nec minùs verè Smilacem laeuem dicit.

Simili errore & Cordus leuem Smilacem eandem statuit cum satia, quam Dolichon etiam appellat. Phasioli altera species, inquit is, Phascolo Dioscoridis, quæ aliqui dysfunctionis gratia Phaselum vocant. [Phasiolo scilbo, Italico, vulgari, humili, seu minori cum orbita rubente, vel nigricante] formā foliorum similis. Circumuo-

uitur hæc arbutis & hastis, suntque ex ea cotōne. Ætate: longiores hæc siliquas fert, propterea ab aliquibus Dolichus vocatur, & fructus eius lobi, quoniam insignes sunt siliquæ, in quibus figurā Phaseli semina nascuntur, nec tantum candido colore: nam inueniuntur nigro, croceo, rufoque colore, & mixtis etiam pluribus coloribus simul. Hic Phascolus, Smilax hort. & satia etiam appellatur: cū propriè loqui volumus, Dolichum, Smilacem laeuem siue satiam, & siliquas eius lobas appellamus. Germaniæ peregrinum fuit legumen hic Dolichus, nunc à plurimis non tantum ciuibus, verum etiam rusticis vmbre & ostentationis causa seritur. Læuem autem Smilacem eandem esse cum satia, Dolichus appellatā, palam fiet, si quis alios auctores de Smilace legat, qui eandem herbam, lenem & satiam esse iudicant, & duo tantum Smilacis genera esse dicunt, sc. asperum & lenem, quod in hortis nascitur. Adhæc si vtriusque descriptio & vires in Diosc. considerentur, quilibet iudicabit eandem esse herbam lenem & hortensem Smilacem. Propterea ipse Diosc. errauit, quòd credit lenem Smilacem proprium genus à satia haberi. Dioscoridem in hac re secutus est Galenus, qui ait lenem Smilacem asperæ similes vires obtinere, quod falsum est. Nam lenis Smilax terrestri constat substantia, vt omnia ferè legumina: propterea etiam grauius & tumultuosa facit insomnia. Asper verò Smilax longè alio constat temperamento, quod ex gustu percipi potest. Saporem enim nihil commune cum leni Smilace habet. Cū autem plantarum temperamenta & facultates, ipso Galeno teste, ex sapore iudicentur, necesse etiam est, asperam Smilacem nihil in viribus cū leni Smilace commune habere, vt Diosc. etiam indicat, qui Smilacem leuem tumultuosa insomnia facere dicit, asperam verò contra lethalia venena antidotum esse. Cū igitur tam breui Galenus lenis Smilacis vires perstringat, & minimè verum temperamentum illi assignet, faciliè colligitur, ipsum nesciuisse, quid lenis Smilax esset. Et hæc Cord. in Diosc. qui in hist. quoque satiam & leuem Smilacem eandem facit, ac Dolichum vocat. Eam autem licet inter Botanicos magni faciā, nihilominus tamen temerè nimium erroris acculat Dioscoridem & Galenum: nec videmus tantam similitudinē in descriptione Smilacis lenis & hortensis, quantam facit Cordus: conferatur descriptio seminum & siliquarum, præterea non conueniunt Phascolo nostro Smilacis lenis flores, nec etiam quod dicitur hanc folia per Autumnum amittere: quemadmodum Smilax phasiolifera in totum perit. Vires etiam non respondent. Quis obseruauit Phasiolos prestare, quæ Diosc. de Smilace leui prædicat: nos sæpius comedimus, nec tumultuosè somniamus. Videtur igitur Dedoneus non malè sentire addita fuisse capiti Dioscoridis de Smilace hortensii illa verba, *grauia somnia facit*. Andæster nimium in falsitatis accusat Galenum, cui notæ erat Smilax laevis, differens à Phasiolifera & Smilace aspera, non solum figura, sed etiam viribus. Quæ Galenus scribit de Smilace excusant etiam Dioscoridem ab errore, & demonstrant non idem esse Smilacem hortensem & laeuem: ac indicant ipsum & Cordum nesciuisse, quid esset Smilax laevis, & malè confudisse cum Smilace Phasiolifera, ambasque turpiter vnam & eandem dixisse. Math. in pronuntiando & determinando quid esset Smilax hortensis, sibi minus constitit. Nunc enim credidit illos, à veritate haudqua-

Dolichus cur voc.

Lobus.

Est Smilax laevis sed falsum.

Diosc. caput. & lenis.

Smilax laevis Cord. error.

Diosc. laevis error.

Galenus Diosc. dicitur.

quana

quam descivisse, qui dixerint Phaeolorum genus priori loco à Dioscoride descriptum, esse Smilacem hortensem. Nunc autem eos putavit nequaquam hallucinatos esse, qui asseruerint Phaeolos coloribus infectos (quos nihil ab hortensi Smilace differre existimat) Dolichos esse Theophr. Gal. & Pauli.

Lob. Phaeolus vulgaris, Turcica multicolor Fabae, Smilax hort. Dioscoridis, Dolichos Antiquorum, An Lobos Galeni?

Cardano Phaeolus Turcicus.

Compiler Tabern. non distinguit Phaeolos, ponit tantum figuras duodecim generum, nulla addita descriptione: plerique autem figurae nil demonstrant: ita confuit historiam.

Catallpinus, qui suam particularem habet opinionem, Smilacem hortensem facit Phaeoli genus peregrinum, quod in Italia feri ait in hortis operetopario, viticulas verò ferre longiores, admiculis egentes: siliquas breviores, sed latas & falcatas, instar Siliquae arboris: semina grandiora Phaeolis Italicis, ac magis depressa, laetioraque ac nitentia: colorem alius ex toto candidum inesse, qui magis probentur in cibis: alius melleum, alius maculosum: alius lineas nigras in candido circumagi, Phaeolos Turcicos vocari: hos recentes insuaves esse, perfectos coqui in cibis, ut reliquos, qua in re fallitur. Siliquae enim recentes coctae non sunt insuaves, sed gratæ esui, coctae cum iure carniū, vel butyro recenti, ut verè dixerit Diosc. olerum imodo esui aptum esse siliquam cum semine Asparagi modo chixim. Sed de viribus & usu mox plura suo loco.

B. pin. Smilax hortensis siue Phaeolus vulgaris 1. vel maior: Phaeolus, Brunf. Phaeolus, Dod. gal. & Cam. vulgaris (vel Fabae Turica multicolor) Lpb. Clus. pan. & hist. albus Ger. Smilax hortensis, Brunf. (quoad descriptionem Trag.) (cui & siliqua Theop.) Matth. (& Phaeolus hortensis), Fuchs. Turn. Lac. Cord. in Diosc. Gesn. h. Lugd. Tab. [qui, ut & Ger. fructus duodecim generum pingit] & Cam. Smilax sativa siue lenis, vel Dolichus, Cord. hist. Dolichos Theophrasti. Ang. Dolichus (siue Phaeolus) Dod. & Lon.

Porta Neapolitanus pro Smilacis hortensis siue Phaeoli figura male ponit Pisi maioris iconem.

Σμῖλας ἡ κρηναία & λῆβια Diosc. Σμῖλας Hipp. Diosc. Theophr. & plerisque aliis cum Galeno & Aëtio, cui etiam φασιόλης, nonnullis quoque λῆβια, ac λῆβια, Lat. Siliqua: Botan. vulgò Smilax hortensis, & plurima ex parte Phasiolis, Arab. Lubia, autore Fuchio Germ. Faseln / Welschbonen Matth. Streigfaseln / Windbonen male apud Fuchl.] Sprengelbonen / vocavit aliquando Gesn. Grassfaseln / Phaeole / WelschErbe / Rothoder rtheil / vnd ander viel farben. Belg. Roomschbonen / Gall. Feves peintes, Fasoies, It. Fagiuolo Turcheseo, Hisp. Fajones, Angl. Kidneybeans Boh. fasoeli, Hung. Tárér borse, Turcicum Pislum.

Smilax quidem nominatur, quod Smilacis similitudine confendat & vicina adminicula aut frutices apprehendat. Αἰθῶν autem ac λῆβια à siliquarum magnitudine. Sed verbum Lobia æquiuocationem facit: nam apud Dioscoridem fructum Smilacis significat: apud Galenum verò & Aetium Lobos est Phaeolorum siliqua.

Breuiter hic in memoriam revocare conveniat amplam Smilacis æquiuocationem. Nunc enim ita vocant, arborem glandiferam. Taxum similem Abieti, genere simplicem, Fraxinum ambiguum,

Smilacem asperam, cuius plura genera, Smilacem lauem, vel Convolvulum maiorem, Smilacem hortensem Dioscoridis, qui Dolichus est Theophrasti, de quo præsens nostra tractatio, Smilacem lauem minorem, quam Helxinem cassampelon cum campanulis vocamus, existimat tandem Tragus Eupulum esse Smilacem asperam. Ipsum etiam Scammonium Smilacis lævis speciem esse affirmat Dodonæus. Et Gelseminum repens videtur Cæsalpino Smilax lævis.

Smilacem hortensem habui variorum colorum in horto E. C. Montbelg. satam. Observavi Lugduni, Basilæ & passim alibi. Dolichum [siliquam vertit Gaza] ligno longo affixo ascendere, & frugiferam fieri, alioqui viciosam reddi, autor est Theophrastus, idemque innuere videtur Columella scribens:

Et gravis Atriplici consurgit longa Faselus.

Faseolos teste Plinio, ferere qua velis terra licet, ab Idibus Octobris in Calendas Novembbris, Virgilius autem occidente Boote ferere iubet.

S: verò Viciamque ferere vilemque Faselum,

Haud obscura cadens miser tibi signa Bootes.

Dolichos (ex autoritate Galeni) propter humiditatem copiosiore non reponunt, cuius occasione solent corrumpi. Quod si quis eos quoque securè velit reponere, sicuti Pateriphius factitabat, siccare ipsos penitus oportet. Sic enim hieme tota manent impures & incorrupti, eundem nobis usum, quem Pila præstantes.

Coquitur fructus vnà cum semine, ut iam antè obiter ex Dioscoride relatum, & velut Asparagus, oleris modo editur. Ciet vinam & grauius somnia facit [hoc postremum perperam à nonnullis adiectum] autore eodem. Nutriunt quidem non minus quàm Pila, Dolichi, consimiliter quoque flatu expertes sunt, verum incunditate, & in alui deiectione illis cedunt, ut testis est Aetius.

Simeon Sethi apud Fuchium, & Mauritanii in primo ordine calidos & humidos esse Phaeolos statuit. Galenus etiam de alim. facult. humidiores natura esse asserit. Reliqua ex Galeno vide antè. Qui ex iis magis rubri sunt, pergit Sethi, calidiores. Manifesta quoque in iis humiditas, quod cied putrescant. Humorem generant crassum & pituitosum. Medium locum habent, ut ait Galenus, inter ea quæ faciliè & difficulter concoquantur, celeriter & tardè transeunt, inflant & non inflant, parum & multum nutriunt. Ante alios cibos cum sapia sumpti, ventrem proritant. Cum Sinapi oblati, plurimum noxæ deponunt. Albi igitur Phasioli crassiores & difficilius concoctionis, ac humidiores sunt quàm rubri. Proprietate autem quadam turbulenta somnia faciunt, sed ad bonam habitudinem corporis conferunt, & vias mouent. Et horum decoctum menses mouet. Porta sibi persuadet Smilacem hortensem suis floribus papilionem ostendere, ac idè Venerem irritare & augere. Is tamen ut dictum, non Smilacis, sed Pisi maioris iconem exhibet. Sed Smilax sit, flos papilionem referat, ergone venerem excitat? At quæ consequentiæ necessitas, quæ necessitatis ratio? Vanitas & superstitio. Ait præterea, florem creare ex purpureo versicolore, fructum nigrum & rubrum, & propterea flatuosam habere naturam, ægrè perfici, brutæque insomniæ parere: nos existimamus eum (ut & Matth.) scripsisse non ex experientia, sed securam fortè Simeonem Sethi, & suam phantasticam imaginationem. Sethi autem opinio trahit originem ex lectione Dioscoridis praua. Nec persuadebit nobis clami-

pera.
Smilax lævis.
Smilax hortensis.
Helxine cissampelon cum campanulis.
Lupulus.
Scammonium.
Gelseminum.

Locus.

Tempus.

Repositio.

Vites & vius.

Primum.

Diosc. locus corruptus.

Temperamentum.

Alum.

Correctio.

Decoctum.

Menses.

tans, deteriores nigros & rubros Phaeolos albis aut variegatis: coloris enim ratione solâ non existimamus variam esse vim Phaeolorum, licet eandem sententiam tenere videatur Matth. ita scribens: Phasoli excalfaciunt & humectant ordine primo: atqui fulvi, flavi & rubri albis calidiores sunt. In cibis sumpti inflant, & ventriculo laborem faciunt, semen tamen generant, & venterem sollicitant, & praesertim si cum longo Pipere, Galanga, & Saccharo aspergantur. Id autem valentius praestant, si ex lacte bubulo coquantur, quousque rumpantur. Redduntur in cibo innocentiores, si cum Sinapi, aut Carni semine edantur cornicula dum viridia sunt: & tenera elixantur, & cum Pipere in acetariis eduntur. Phasoli masticati & illiti sanant equorum morsus. Adduntur etiam in fucis, quibus mulieres faciem concinnant. Aug. Gall. tradit agros impinguare, ac facere ut vermes non rodant frumentum.

Nona.

Semen.

Venus.

Acetarii.

Fucus.

Agros im-

pinguat.

PHASIOLVS VIOLACEVS.

CVM Smilacis hortensis in altum se extolentis quæ tentoria & scenas facere potest, ut scribit Diosc. vari coloris fructus passim observauerimus, ac etiam ipsi in horto E. C. ex diversis locis conquisitos coluerimus, eos nunc enumerare fas erit.

Smilacis

Phasolifera

Sania gene-

ra.

Descriptio.

Docum.

Stutgardia igitur nobis misit D. Schwartz Phasoli violacei nomine fructum, Smilacis hortensi similem, sed parum, ut Phasoli Italici sunt, totum purpureum siue violaceum. excepto umbilico albo lucido. Eundem misit D. Phil. Steph. Sprengerus nomine Phasoli Aegyptiaci. Habui quoque Basilea datum à D. Marc. Chmieleitio, cui provenit in horto siliquis valde longis & tenuibus.

PHASIOLI NIGRI.

LONGA & lenta habet samenta reliquorum Legumerum instar, quibus pertucis & pedamentis (si adponantur ait Clus.) se circumvoluit, & innititur: alioqui aded infirma, ut humi procumbant, & se spargant: iis innascuntur folia numero terna, longo pediculo inhaerentia, ut in vulgaribus Phaeolis, & eiusdem cum illis amplitudinis, nervosa: samentorum nodis vnde prodeunt folia, nascuntur oblongi pediculi, in quibus flores, bini, quaterni, seni interdum etiam octoni, ex aduerso ut plurimum nascentes vulgarij formati, hoc est, floris Pisi instar panem formati, coloris purpurascens, seu veris Amethystini: quibus succedunt eodem oblongi teretes lobi, initio virides, deinde maturitate flavescentes, in quibus bina, terna, quina, sena, vel etiam octona grana, vulgarij quidem formam referentia, sed minora, & coloris, quando matura, nigri.

Descriptio.

Clus. hist. Phasolus, Aethiopici appellatione missus ob nigredinem, ut veti simile est, vel forsitan quod ex Aethiopia prima eius origo. B. pin. Phasolus Aethiopicus vel niger, siue 2. Aethiopicus lobis flavescentibus fructu nigro.

Phasol. Aethiopicus.

Locus &

tempus.

Lugduni Batavorum notus, semine ex Italia misso. Floret cum vulgaribus, vel etiam aliquando paulo maturius.

PHASIOLI TVMIDI, NIGRI, splendentes.

IN Kirchheim vrbe Vvirtembergica, in horto D. Ioan. Lutzii insignis Pharmacopzi observatur Phasolos nigros, splendentes, tumidos, cum paruo hilo albo, ac similes Phaeolis humidioribus minoribus nujs: iis tenuiores sunt violaci. Et hic est fortè Clus. deamur tertius.

Rocus.

Idem Clus. hist. Phasolus 13. ex Italia misso semine, Phaeoli Aethiopici appellatione, simul nobis provenit Francofurti.

Floret paulo maturius superioribus, eam ob causam semen facilius ad maturitatem pervenit.

PHASEOLI ATRO VIOLACEI.

SUNT nobis Phasoli non multum differentes à nostris nigris, tumidis, nisi quod videntur paulo longiores & maiores, ac atro violacei, & minus tumidi, splendent ut dicti, eis est huius, vel vmbilicis albus, non multum etiam sunt dissimiles à violaceis, accedunt fortè ad Clusij Phaeolum 15. initio scilicet purpurascens deinde aurum.

PHASEOLI FVSCI, FOLIS CRASSIS & pinguibus.

PHASIOLVS Clusij 16. ex Guinea delatus suo lobo exemptus, terra creditus Pharmacopzo Delphensi crevit, ad speculi symbolum, ad palmarem altitudinem, cauliculo satis firmo & rotundo, binalique aut ternas foliorum alas protulit, in quibus, ut reliquis Phaeolis, terna folia, sed valde crassa, & pingua, longèque minora, Trifoli Alphaltis foliorum magnitudinem non excedentia. Ipse Phaeolus semunciam magnitudinem non superabat, satis densus & crassus, coloris fusci cum spadiceo commixti.

B. pin. Phaeolus Guineensis. fructu fusco spadiceo: Phaeolus peregrinus 16. Clus. hist. Sunt maiores & minores.

PHASEOLVS VVLGARIS ITALICVS HV-MILIS, SEV MINOR ALBVS, CVM ORBITA rubente, vel nigricante.

HVMIC sic describit Matth. Phasoli albi, & imagis vulgares, qui passim in campis feruntur, mense Maio, & quandoque post mensem sine pedameo per se subsistunt, sed in latum sese pandunt foliis hederaceis, maioribus tamen, & melioribus, venosis, torvis, ex vno pediculo prodeuntibus: flores emittit candidos, Pisi maiores, & quibus palmaria cornicula prodeunt, teretia, & in acutum desinentia, primo quidem exortu viridia, & per maturitatem albicantia. In his semina plura, quæ Phaeolos appellamus, continentur, facie quadrupedum renibus similia, alba præter umbilicum qui tantum in iis nigricat. In hoc capite Dioscorides de candidis tantum ac vulgaribus Phasolis disseruit.

Non probamus Matthiolum dicere, semina similia quadrupedum renibus, videretur enim mihi non bene observasse eorum renes, hæc semina humanis renibus, magis similia sunt, quam illis. Iconem habet Matthiol. non nihil differentem à Smilace, quæ diversâ valde est ab icone Camerarii, quam hic posuit in ep. & hist. pro phasolis: ei enim appollatæ duæ siliquæ: in icone autem Matthioli, tum parvâ, tum magnâ (quamvis flores, malè pingantur) sunt plures flores & siliquæ: ita ut ad septem ex vno pediculo numerentur. Hinc colligo eam Camerarii non esse Phaeolorum vulgarium, sed alterius generis de quo paulo post. Ipse etiam scribit in hist. se per Phasolum 4. Clusij non intelligere eum, quem in editione Matthioli proposuerit. Clusius autem ut paulo post dicitur, tradit suum phasolum binos flores magna ex parte sustinere, niucâ circa stilum nigra maculâ insignitum, quæ omnia demonstrant Iconem illam Camerarii ab eo non bene positam pro Phaeolo Italico vulgari

sive Matthioli.

Hac eadem censurâ dignus Casp. Bauh. qui in suo renouato Matthiolo pro his rhaefolis iconem ponit Camerarii, quod non placet, ob causas iam dictas, & postea repetendas.

In pin. vocat Smilacem hortensem sive rhaefolū vulgare 3. siliqua sursum rigens, & rhaefolum paruum Italicum: Phaeolum, Matth. album, Lugd. Phaeolum & rhaefolum, Ang. Cord. in Diosc. & hist. rhaefolum, Cels. Flore est, inquit, maiore candido papilioni simili, foris in viridi colore pallescente: foliis nullam asperitatem habentibus: sunt maiores & minores: sunt albi, subnigri, illi maculâ nigrâ, hi albâ notati: est & minor albidus, cum orbita rubente aut nigricante.

An Dodonæo hist. frum. & in fol. Dolichus alius minor [hunc vocat Bauh. in pin. Smilacem hortensem sive rhaefolum vulgare 2. & hortensem minorem: dubitat autem an sit rhaefolus Turneti: aut forte rhaefoli illi, quos Tral-lianus lib. 7. *quæstiones perperas*. & lib. 11. rhaefolos Alexandrinos nominat, si modò per Fasolum paruum Dolichos veniat intelligendus, quod verisimilimum videtur.

Lonic. pingit hoc titulo *Gross faseln* / rhaefolū, rhaefolus & rhaefolus; in descriptione tamen confundit cum eo phaeolum Tragi, sive pisum maius flore purpureo.

Cast. Phasiolus non se attollens, semine albo. Quamvis autē dicat hunc se non attollere, pingit tamen pro eo Smilacis hortensis modò ad pericam volutum.

An de hoc agit BELL. obs. l. 1. c. 3. In Creta Scarus piscis est saxatilis, qui delectatur miorâ citra rupes; vescitur etiam parvâ herba, quæ ei placet, & quæ alibi non provenit, quæ occasio, vt Scarus in Creta insula maneat. Incolæ qui norunt Scarum oblectari herba Phasiolorum, in agris ferunt, ac folia imponunt in nassis in mare diluculo (Siliquas pro fe rescuunt) vt alluciant eos, ac capiant, hinc illi nominant *Scarobulano*. Quod in Scaro melius est, est herba qua vescitur, cuius semper magna copia in eius ventriculo invenitur. Hòs esse credimus, qui à Galeno de alim. vocantur Dolichî, quique in Caria feruntur, figurâ cicerculis longiore.

PAULO dicitur Phasiolus albus, qui compol. renalem ex cicadiis, ingreditur. Manard. l. 1. ep. 4. Phaeolus communis, qui nunc vulgò Phaeolus, quem & vilem nominat. Item l. 9. ep. 24. Phaeolus, vel Phaeolus communis.

CASALP. Phaeolus, qui vulgò Fasolus, cui semen candidum, maculâ nigrâ. Plura hac de re videto antè.

Seui in horto E. C. Phaeolorum Italicorum semina, quæ primò vidi Tubingæ, floruerunt Augusto. Patauii frequenter in cibo vltus sum. Matthiolo feruntur in agris mense Majo, & quâdòque post mensem.

Diosc. Dioscoridis inflat, & flatus mouet, & agit concoquitur. Coctus autem viridis, si edatur, aluum mollit, ad vomitionem autem idoneus est.

patant, vt dictum, quoq; rhaefolis muliebrem fucum hoc modo: sumunt rhaefolorum alborum n micæ panis triticeî albißimi, an. lib. 1. Cucurbitam longam, teneram, virentemque vnam, dissectâ prius cucurbita, macerant simul omnia ex lacte caprino nocte vna, deinde addunt seminum Melopeponum vnc. v. nucleorum perficorum mundatorum vnc. iij. nucleorum Tom. II.

rinorum delibatorum lib. 5. Conterunt per se omnia in lapideo mortario, & deinde addunt pullum columbinum domesticum vnâ cum plumis in particulas dissectum, abiectis tantum intestinis, & omnibus simul mistis, ex vitreo organo; ad hoc parato, in vase feruentis aquæ collocati, aquam distillant, & subinde diligenter custodiant. Siquidem huiusce aquæ lotionem nitorem faciei conciliant, & cuti mollißimam addunt laetorem. Reliquas vires & vltus, sicut & temperamentum iam antè tradidimus.

PHASEOLI TVMIDI MINORES

NIVII.

Magnitudine vulgaris rhaefolis minores plarumque, nec vt illi, sinuati circa vimbrilicium. Interim puluinati magis, & tumidiores omni ex parte pro pòrtione sua. Colore niuei sunt, & splendicantes, vetustate verò absoleseunt & in eburneum; tandem etiam in pallidum migrant.

Sic describit Clusius: Totâ formâ, & nascenti modo à vulgari haud differt: valdè ramosa enim habet sarmenta, quæ vicinis pericis sese aduoluunt; easque scandunt, oblongos pediculos ex foliorum (quæ semper terna, vt in vulgari, simul nascuntur) sinu prominentia: in quibus bini, quaterni, interdum etiam seni nascuntur flores, ex aduerso semper siti, vulgaris Phaeoli floribus magnitudine & formâ respondentes, in illò, diam recessus aperti sunt; candidi; postea verò pallescentes: quos excipiunt oblongæ, propendentes: vt in vulgari siliquæ, seu Lobi: quina; septena; & plura interdum candidissima, & quasi ex ebore

Descript.
Clusii.
Sarmenta.

Florus.

Siliqua.

Semina.

Synonyma.



gem peruenit. Iidem Hist. Phaeolus peregrinus 2. cui iconem apponit Clusius, quæ apud Lobelium nomine Phasioli vulgaris extat.

An Taber. *weisse bonen von America*. Phaeolus albus Africanus. Quem si compilator per suum figmentum cum capreolis non intellexit, nescio quam plantam intelligat: Phasiolum hunc, accepi cum hac inscriptione: *Frixolas blancas de Guatimela*.

Satus in horto E. C. Montbelgardi peruenit, sed non maturuit. Iulio floret, fructus Augusto, nonnunquam etiam mense Septembri, maturefcit. Dum Viennæ vixit, semine, o amicis communicato Clusio natus, nec autem a ipso conpositus;

At: Phaeolus albus Americanus.

PHASEOLVS NIVEVS, MINOR,
circa hilum nigrâ maculâ insignitus
ET PVMILIO NIGER.

Descriptio
caulic.

Folia.



Lobi.

Semen.

Lobi Ame-
ricani.
Alubias de
Indias.

Lobus Indi-
cus.

Icon Clusii
transposita.

Phaseoli
pumiliones.
1.2.

Camer. et
var.

Phaseolus
Brasilianus
Tab. repreh.

C. Bauh.
not.

Caret longis
sarmentis,
& breui, firmo-
que caule con-
stat, pedalem
longitudinem
raro excedente,
& in breuissimos
ramos diuiso, ad
quorum folia
quidem superio-
ri similia nas-
cuntur terna nu-
mero, sed bre-
uiori pediculo
inherentia, qui
non purpurefcit,
vt in proximè
descripto [Smi-
lace hortensi, si-
ue Phaseolo Ana-
gyridi simili fe-

rè, colore rubefcente.] Pediculi ex alis prodeun-
tes, longi, crassiusculi, firmi, binos etiam flores
magna ex parte sustinent, formâ, colore præce-
dentis floris simillimos, deinde binos lobos illius
cylindraceis siliquis paulò longiores, & teretes,
in quibus fructus formâ par, sed colore differens,
nam niueus est, circa hilum nigrâ maculâ insi-
gnitus, & quibuldam nigris punctis interdum in
lateribus notatus. Satis præcox hic est, nec ullis
pedamentis eget, cum (vt dixi) breui, firmoque
sit caule.

Clusio descriptionis auctori in Pannon. Phi-
seolus 4. Lobi Americani minores, siue Pumiliones.
Item Phaseolus tertius, Alubias de Indias, id est, Lobi
indici.

Figura Clusii sub dictis nominibus, non habet
binos flores: sed plures, ideo aliò releganda, &
huc transferenda figura, quæ est sub alieno titu-
lo, nempe Phaseoli tertii, siue Americani elatio-
ris, verè enim comperimus in hist. Clusii transpo-
sitam iconem, ubi icon posita sub titulo Phaseoli
peregrini 4. cui additæ sunt siliquæ, quæ dec-
rant.

Camer. Phaseoli pumiliones albi, & nigri, quo-
rum hi magis, quàm illi alsioli sunt, quamuis
ambo frigiditate nostræ plagæ sæpiùs à maturita-
te prohibeantur. Intellego autem, quorum ico-
nem dedimus in Matthioli editione, & quos Clu-
sius in Pann. quarto ordinè proposuit. Existimo
autem ego Clusii Phaseolum quartum, diuersum
à Matthioli Phaseolo qui in Italia frequens, quâ
ob rem Camerarii figuram ad hoc caput reduco,
& separe à Phaseolo Matthioli.

Taber. Phaseolus Brasilianus Eresilgen boehn.
Quantum iudicare possum ex figura efficta
ad Clusii figuram, ad hoc caput referenda i-
con.

C. Bauh. in suo Matth. proponit eandem figu-
ram, quam Camerarius, sub inscriptione Phaseo-
li. Non autem placet Camerarium, & C. Bau-
hinum iconem eius plantæ, quæ Clusio Phaseolus
4. ponere pro Matthioli Phaseolo vulgari: diuersi
siquidem, vt antè dixi, quod facile apparebit,
conferenti utriusque iconem, nisi dicatur Mat-

thioli icon falsa.

Eid. B. pin. Phaseolus peregrinus 6. minore situ-
ctu, albo, nigrâ maculâ insignito: Phaseolus pe-
grinus 4. Alubias de Indias, Clus. pann. quoad des-
criptionem: & Hist. Phaseolus albus, Lugd.

Cœcit etiam hic mihi [inquit Clus. Viennæ
anno 1576. donatus à Dodonæo S. C. M. tu n
Medico, qui eius fructum præcedente anno, dum
Prægæ esset, in arcis horto obseruauerat, & le-
gerat.

PHASIOLI PARVI, ALBI, CVM
ORBITA MINIMA, RVBENTE,

Habemus paruum genus Phaseolorum albo-
rum, non tamen candidorum, cum mini-
ma orbita rubente, & paruo hilo albo.

PHASIOLI MINIMI, ALBI,
orbita magna rubente.

Sunt nobis Phaseoli minimi albi, minores quàm
Phaseoli cum orbita nigrâ: nescimus an sem-
per tales [ascriptum erat repertos inter aroma-
ta] his sanè similes sunt: orbita magna est, sed
rubens, cum hilo in medio albo.

PHASIOLI PARVI, PALLIDO
albi, ex America delati, Lobelio.



A Lob. in I-
con. pin-
guntur Phaseoli
parui, pallido
albi ex America
delati. Idem in
Hist. Belgica
Ereunge ghe-
maerberde bo-
onfenne. Fieri
potest, vt vnus
præcedentium
paruum Phaseo-
lorum esse
debuerit, Phaseo-
li parui ex
pallido albican-
tes ex America
Lobelio delati

B. pin. Phaseo-
lus Ameri-
canus vel Brasili-
anus 5. minor: Phaseoli parui ex America Lob.

Lugd. Phaseolus Brasilianus 1. Tab. Huius ma-
gna varietas, quare fructus duodecim genera.

PHASIOLI PARVI ITALICI,
NIGRI, CVM MACULA ALBA.

Gener Cherlerus attulit nobis ex Italia Pha-
siolos paruos, nigros: parte eua hilus par-
uus albus: parte verò superiore, gibbosâ, longa
& lata macula.

PHASEOLVS NIGRICANS HYLO
PROMINENTE

Phaseolus alter, Phaseolo vulgari haud dissimi-
lis est, sed minor, densior, nigricans, & hy-
lo pro-

lò prominente, & renis formam minime referente. Clus. apud Monardem. Eadem tradit Lob. in Obs. ex Clusio.

PHASIOLVS LATA SILIQVA, FRVCTV EXIGVO NIGRO, VMBILICO CANDIDO.



Vidit Clusius nò procul Olyssipone in monasterio quodam Phaseolus genus, vulgari admodum simile, ut vulgare putaret: perguilas istic vestiebat opere topiario, flore purpureo: at siliquae scabrae sunt, breviores & latiores, quam nostri vulgares, fructus est exiguus, Pisi vulgaris magnitudine, totus niger, nisi qua parte siliqua adherent, quae candida est: Brasilianis frequentem esse audivit. Clus. apud Monard. & ex eo Lob. obs. & Icon. & Tab. Phasiolus alter Brasilianus. Audiuit Lusitanis apud Brasilianos habitantibus, *Faba braua*, id est, Fabam siluestrem nuncupati.

Phasiolus alter Indicus Clusij: Phasioli genus vulgari simile. B. pin. Phaseolus Americanus vel Brasilianus 2. siue alter, fructu nigro, pisi magnitudine.

SMILAX HORTENSIS, SIVE PHASIO- LVIS ANAGYRIDIS SIMILIS FERE, COLORE RUBESCENTE.



Haber hic Phasiolus oblonga sarmenta, ex singulari caule statim secundum radicem ipsam prodeuntia, & in multos ramos diuisa, leuiter oblique se contorquentia, & humi procumbentia, nisi periculis, aut pedamentis sustineantur, quibus sese circumvolunt, reliquorum Phaseolorum modo: purpurascunt ea iuxta alas, ad quas etiam adnascuntur terna folia, minora amplius superioris foliis, & dilutiori colore virentia, longo petiolo inhaerentia, qui ex parte, qua folia susti-

net, contrariaque, qua sarmentis inhæret, ex atro purpurascit: flores in oblongis petiolis, plerumque bini, magni, Pisi formâ, foris ex candido pallescentes; interiore vero parte ex purpura caerulei: his succedunt totidem prælongi lobi, teretes, & quasi cylindracei, in quibus fructus reliquis Phaseolis minor; Anagyridis legitimæ fructui penè similis, rubescentis coloris.

CLVS. pann. Phaseoli 3. genus, Lobi Americani maiores, Phaseolus tertius Americanus elatior. Acceptus ex Hispania cum hac inscriptione: *Alubias de Indias*, id est, *Lobi Indici*.

Figura hujus Phaseolij mihi videbatur posita erat pag. 723. sub alio titulo, nempe Phasioli Pulcherrani secundi, quod non pertinet, id demonstrante manifestè numero florum: quæ occasio, ut ad hoc caput redxerimus ex Clusio suam figuram: in quo nos bene egisse apparet, ex ejus Hist. lib. 6. cap. 41. ubi ponitur pro Phaseolo peregrino tertio.

PHASIOLI RVBENTES FIGVRA PENE nostratium cum linea elata.

PVlchro tubente colore splendent; cortice & circa vimblici ambitum coccineo. Vmbilicus niger fœniculi majoris magnitudine, supra quem macula nigra, sulco diuisa. Parte opposita, quæ dorsum Phaseoli dici potest, linea elatior per longitudinem excurrit, & totum Phasiolum vsque ad hilum circumscribit. Nostratibus etiam sunt paulo ventriosiores, habitiorisque, ac ad Anagyridem accedunt formâ, & magnitudine.

Accepimus ab Illustrissima Principissa, & à D. Thoma Platero, Medico Basileensi, qui ex Hispania se importasse retulerat. Considerandum an affines, vel fortè iidem; cum Phaseolo Clusij Anagyridis simili.

Leon habebitur post cum Phaseoli Indici patris maculati Leone.

Florès.

Lobi
Fructus.

Lobi. Ameri-
ciani.
Alubias de
Indias
Icon Clusii
et anagyridis.

Descrip.
Cortex
Vmbilicus.

Anagyridis
forma.
Leone.

PHASIOLI EX GVINEA PALVDANO, spadicii, minimi.



ET hos quoque pulchellos cum aliis multis exoticæ elegantie Classis. Paludano deferimus. Parui sunt, Africanos magnitudine vix superantes, splendido leuore, spadiceo, aliàs dilutiori, aliàs obscuriore, plurimum tamen æquabili, colorati, hilum versus nonnihil angulosi: Hylo, qui pro corpusculi mo-

Descrip.

Hylo.
Pulcor.

dulo sat magnus candidusque modicè, suntati Pulpa subest cortici callosa, subfana, gustu phascolaceo.

Considerandum an differant, vel quantum à Clusij Phasiolo quinto, Laburni fructu.

An Phas-
lus fructus
Laburni.

PHASEOLI AFRICANI PARVI
nonnihil albicantes.

Descriptio

Folia.

Flores.

Siliqua.



garibus angustiores, vix culmum late-grana claudunt nonnihil candicantia, dimidio minora, Phaseolis nostratibus, circa germen fusca.

Phaseolorum Africanorum, parviorum, nomen missi per Carolum Paludanum Ill. E. C. Wittemb. Accepi etiam cum hac inscriptione: Phaseoli ex insula Diu Thome sub Aequatore sita.

Phaseoli ex
Insula D.
Thoma.
Locus &
tempus.

Satum huius Phaseoli semen in orto Ill. E. C. Montbelgardi floruit Augusto, & Septembri, quo mense quidem maturuit semen.

PHASEOLVS LABVRNI, FRVCTV
ex nigro subvirescente, siue Aegyptius
flore luteo.

Descriptio.

Sarcocolla.

Folia.

Flores.

Color.

Flos.



etiam] foliis perquam similia, ex atro virentia circa pediculum purpurascencia: flores in spica modum congesti, magni, nisi vulgaris forma, & magnitudine ferè, coloris flauo, in oblongo; crassiusculoque pediculo ad foliorum exortum prodeunte nascuntur: lobos non obseruabam quia flores duntaxat produxit ipsa planta, eosque val-

DE Phaseo-
lorum quo-
que mote scan-
dit & praefens

planta; folia ter-
na, minora, tri-
stioraque mul-
to, quam in vul-
garibus, paulo
duabus vnciis
longiora; non
totam semun-
ciam lata, ner-
vosa; glabra,
crassa: flores ex
obsoleta quadà
fuligine in luti-
dum pallorem
lauescunt, vix
dehiscetes: sili-
quae sesquipal-
mum longa, vul-

garibus angustiores, vix culmum late-grana claudunt nonnihil candicantia, dimidio minora, Phaseolis nostratibus, circa germen fusca.

Phaseolorum Africanorum, parviorum, nomen missi per Carolum Paludanum Ill. E. C. Wittemb. Accepi etiam cum hac inscriptione: Phaseoli ex insula Diu Thome sub Aequatore sita.

Satum huius Phaseoli semen in orto Ill. E. C. Montbelgardi floruit Augusto, & Septembri, quo mense quidem maturuit semen.

de caducos propter aduentia frigora: breves tamen angulique esse intelligebam ab his, qui conspexerant, & terna, aut quaterni grana continere: quae vero accipiebam parua erant admodum, Laburni grani non maiora, utroque tamen mucrone praerumque obtusiore, pulli coloris, seu potius ex nigro subvirescentis.

Clusio hist. Phaseoli peregrini generis. Phaseolus s. Aegyptius Patauo missus a Bernardo Paludano ex Syria & Aegypto reduce, anno 1578. qui terram anno sequenti credidit, crevit quidem, sed ferè admodum, deinde perit. E seminibus conseruatis & anno 1582. deindum satis, aliquot plantae egregie provenerunt, quarum una florem Septembri duntaxat mense tulit, ac ad frugem minime prouenire potuit. ipsa tamen planta Calendis Nouembribus perbellè adhuc florente: hoc semen Aegyptius à Paludano; at deinde ex Italia Aegyptiaci Phaseoli nomine sume accipi. Et forte Phaseolus hic peregrinus Dolichus est Bellonii.

Advertes apud Clusium in pann. iconem quae quae est p. 729. sub titulo Phaseoli quinti Aegyptiaci, non esse Phaseoli, quem intelligit Clusius, sed sub hoc titulo reponendam iconem, quae est pag. 727. sub nomine Phaseoli tertii, Alubias de Indias. In pann. p. 730. est alia icon, cui titulus Phaseolus quintus, siue Aegyptiacus: quam iconem Clusius omnino omisit.

Camer. in hort. Phaseoli Aegyptiaci à Clusio picti in pann. observationibus sine siliquis quas nos addidimus.

PHASIOLVS INDICVS PARVVS,
maculatus.

Icon eadem cum ea qua lib. III. c. 88. habetur.

PHASEOLVS INDICVS, PARVVS
rubens, hilo nigro.

Phaseolus parvus, sinuatus, hilo nigro, reliqua parte obscure rubens. Ill. Ducissa terre commisit, apud quam visus & depictus. Eicon in preced. habetur.

PHASIOLI NIGRI, FACIE
seminis Paeoniz, splendicantes, vmbilico albicante. Et

Alter

Alter *Ægyptius minimus*.



Magnitudine & figura ad semen *Pavoniae* feminæ quàm proximè accedunt. Quippe ex rotundo sublonga sunt, nigerrima pulcherrimè, & Succini nigri, politi instar, splendicanti, eà tantum parte, quâ adhærent, quàm umbilicum dicere solemus, albicantia. Existimamus, nisi fallit memoria nos accepisse à

D. Paludano, qui *Ill. nostro* misit. Perpendat lector, an possit esse idem cum *Phasiolo* præcedente, latè siliqua *Clusii*.

Est mihi præterea minimus *phasiolus* missus per insignem *Pharmacopœum Tossanum Carolum Burgundum Phasioli Ægyptii* nomine, qui *Piper* magnitudine vix æquat, angulosus, sublongus, colore spadiceo, ac ferè nigricante, splendente, umbilico candido, longiuiculo, cuius parte opposita impressio sinum efficit.

Eicon eadem cum ea quæ l. 3. c. 92.

PHASEOLI PARVI EX AMERICA delati, *Lobelii*, ex fusco purpurascetes.

LObelio in *lc. & hist. Belg.* dicuntur: *Elein boontens von America / In latèyn Phasioli parvi ex America delati*: An *Eid adu.* Permultæ acceptæ à *Naucleris*; *Fabæ*, *Phaseolus* ex America nouo orbe, æque *Hesperia Africa* allati, qui mixtæ naturæ videntur, sed propinquioris *Phasiolo*: nam eorum quidam exiguis, minor multum *Phasiolo*, ex fusco purpurascit.

Lugd. Phasioli parvi ex America dicuntur. Ego autem, vt verum fatear, quales sint hi *Phasioli*, nescio, quia eorum nullam inuenio descriptionem, de qua certus sim:

PHASIOLI EX ANGOLI

Paludano, pallidi, variegati,
hilo magno, spadiceo.


C*L. Paludani* munificentia in *Naturalium* nostro thesauro aliquot horum adseruamus: qui vulgaribus ventriosiores, laues, maculis insigniti, colore varii. Quidam namque obscurè faucentes, seu melini, dilutiore luteolo conspersi: quidam pallidi, & ferè albicantes, pullis maculis insigniti, & horum vbis varietas in colore notabilis. Hilo donantur magno, spadiceo, aut nigricante, à suprema parte, plus quàm mediam fructus longitudinem excurrente, minime sinuato, sed eminente. Tanta porro eorum durities, vt ex corundem collisione *Auculanarum* instar sonitum edant: considerandum an aliqui in figura *Lobeliana* pictorum, nomine

Phaseoli Indici rubri hac referri possint.

Hunc eundem ab illustrissima nostra *Principissa* accepimus, qui vna parte latior est, altera angustior, in ceteris cum nostris qui iam sculpti erant, planè similis.

Eicon habetur antecum *lcone phaseolorum ex Guinea Paludano missarum* etc.

PHASIVM AMERICANVM COCCINEVM, aliis *Abrus*, & idem nigrum.



Icon alia Clus. Exot. l. 4. c. 15.



Descrip.

Americanum *Pisum* coccineum nostrati est minus, granorum *Pavoniae* feminæ in morem ex rotundo oblongum, nitidum, mirificè durum; cortice rectum vel penitus nigro, vel bicolori, ita vt germinis regio nigricet, reliquæ vel hilari atro splendeat, vel tristiore spadicea colore sit tinctum: medulla insigniter durâ, bifida; flavescit, sapore leguminoso. Habemus etiam tota nigra: & alia, quæ colore spadiceo sunt, nihilominus nigra maculâ notati. Quod an naturale ipsis sit, an hoc accidat per vetustatem, experientia obseruatorem istarum rerum curiosum docebit.

Hoc *Pisum* sic describit *Alpinus*: Est arbor fruticosa, sarmentosa, volubilis, *Lobelia* modo serpens, ac altius se extol-

Cortex.

Medulla.

Sapor.

Alpini Descriptio.

Folia.

Siliquæ semen. Corallioformis annula.

Fructus Orobanchi. Descriptio. Clus.

lens, latiusque se expahens; foliis vel *Tamarindis* planè similibus, sed longè minoribus, mouentur etiam ad Solem: occidente Sole clauduntur, totaque clausa manent, quousque Sol denuo oriatur, quo tempore rursum aperientur. Flores audio ferè *Phaseolis* proximos, atque siliquas, quæ intus habent semina parua, rotunda rubra, dura, *Phaseolis* omnino similia, quæ *Corallia* planè æmulantur. Hic addit *Honorius Belhus*: Fructus figurâ *Phaseoli* non est, sed equali, *Orobanchi* grani.

Clus. in suis *Exot.* aliam iconem proponit sub titulo *Vicia Africana*, de qua hæc scribit: Eius semina à nautis *Batani* à *Guinea* redeuntibus

*Nascentis
modis.
Folia.*

Cauliculus.

Cultura.

Flor.

Siliqua.

Semina.

*Vicia
fricana.*

*Alpin.
re-
prob.*

Vicia rubra.

*Coccineum
Americum
Pisum.
Santalum
rubrum.*

*Phascolus
Abrus.*

magnâ copiâ subinde sunt allata, & ramulos cum suis siliquis, siue lobulis propendentibus, etiam mihi videre contigit. Sæpe porro istius plantæ semina terræ à me sunt credita, sed maxima ex parte non nata: imò [quod magis mirum] post triennium è terra eruta, ad eò incorrupta reperta, ac si pridè duntaxat fata fuissent. Semel tamen contigit, vt quæ recentia à Cl. V. Honorio Bello acceptam è Cretâ missa, terrâ in fictili commissa nascerentur quidem: sed plantæ, licet omnem diligentiam adhiberem, vt conseruare possem, breuè contabescerent. Prohibant autem illæ, Viciæ, aut Lentis modo, duobus duntaxat crassiusculis foliis inquit, ipso videlicet semine bifariam se diuidente, & in folia formante, vt in Leguminibus accidere solet: inter ista verò folia nascebatur cauliculus sustinens aliorum foliorum alas, quæ ex multis foliolis contrariò sitû semper nascentibus constabant, denis, duodenis, aut pluribus, nullo impari alam finiente, instar Viciæ siluestris, aut Lenticulæ: valde caduca est planta; quæ nisi fulciatur, procumbit, Pisorum instar; inter foliorum alas, quæ farmenta aut caules amplectebantur, satis firmi & oblongiusculi exoriebantur pediculi, sustinentes alternis denos, aut duodenos flores, Viciæ, aut Lentis floribus [vt arbitror] non dissimiles; mihi enim eos videre non contigit, sed oblongum duntaxat pediculum rescotatum apud honestissimum virum Christianum Porretum, deinde anno 1602. alterum similem mihi donatum ab honestissimo Viro Petro Gareto. Istis pediculis inhærebant deni, duodeni, aut plures pediculi breuiusculi, satis crassi & rigidi, è quorum singulis graciliore, breuiorque adhuc petiolo dependebat siliqua rugosa, spadicei foris coloris, vnciam, aut paulò amplius longa, semunciam lata, illaque aliquantulum plana, mucrone instar hamuli curuò, internâ parte albi, in qua continebantur quaternæ, aut quina semina durissima, orbicularis ferè, vel ovalis formæ, prorsus rubra & nitentia instar corallii expoliti, quum probè matura sunt, summâ autem parte, quâ siliquæ inhæserant, omninò atrâ, & præ leuore splendentia. Huic plantæ, Vicia Africana nomen indebam quia ex Africa eius semina semper delata memini. Cl. V. Prosper Alpinus lib. de plantis Ægypti, cap. 21. Abrus appellat, arboremque improprie [meâ quidem opinione] facit, quandoquidem volubilem, Libi ab [quod Phascoli genus.] modo serpentem, latiusque se expandentem, esse scribit, & radicæ se conuoluentem pingit. An Aloysi. Cadamur Arborea quædam, quæ in regno Senegæ faxiolos producant rubentes, cum macula nigricante, quæ est illis pro insigni, & à nostris oculus dicitur, alii hilum appellant. Phascoli autem, qui nusquam elegantiores videntur, instar nucis Avellanz faberrimè facti sunt, diceres torio aliquo insculptos ac scitatos, ad eò variantis naturæ ars in eis ludit, res visu conspicua.

Gesl. Pisa rubra ex nouo orbe allata. Lobel. Obs. & Ic. Coccineum Americum Pisum; An Orob. species: Pisa ex nouo Orbe delata, non delata, non decerpta ex quadam arbore, vt quidam putarunt. Casalp. Santali rubri semina. Alpin. Phascolus Indicus; vulgò falso Pronia Indica vocatus: missus est, Ginge & Abrus nomine. Lugd. l. 4. c. 41. Pisum Americum; Pisum coccineum, Americum. Eid. c. 12. Pisum Americum, Indicumue. B. pin. Pisum Indicum 2. minus coccineum: Fabrum genus: quod Ægyptiis Abrus, part. 2. Ind. or.

C. 4. Et hic maior coccineus nigra maculâ notatus, reperitur. Accepi inquit Honor. Bellus, femina phascoli ex Iemen, (ex Arabia felici quæ terræ commissa felicissimè nata sunt, quæ ab Alpino sub Abrus nomine descripti puto, licet ipse fructum non rectè [meo iudicio] descriperit.

Hæc ex Linchot. In vniuersa insulâ Madagascar, item in China, Phasolorum genus quoddam creuit, quod Latini Abrus vocant: Malayensibus autem Conduci appellantur, & Iauanis Sagg. Perelegantes sunt, parui, rotundi, nigra macula insigniti. Vtuntur iis tantum ad pondera, non ad cibum. Sunt enim sapore perquam amaro: quidam etiam arbitrantur venenatos esse.


Pisum Americum, coccineum, sæpius plantauimus in horto E. C. sed non genuit, sequenti interdum anno reperimus integrum. Frater mihi semina nomine Pronia Indica, & Phascoli Indici atro-rubentis ex Creta. Accepi mus etiam Lutetiâ cum denominatione Bois du Bresl. Plura semina huius etiam Parauio ad nos misit Saxonia. Datum præterea nobis est aliquando nomine Ginge Athiopici, & Abrus Ægyptiorum, à Paludano pro Phascolo Indico.

Hæc grana coccinea, nigra maculâ insignita, dura admodum sunt, diuque in terra latitant, quorum interdum Camerario prouenerunt rudimenta, instar Pisorum, sed ad frugem planta non peruenit. Semina veruista nequeunt vlla maceratione visci, sed recentiora intumescunt intra horas duodecim, vel citius, ac duplè sunt maiora colore, autem coccineum vertunt in sordide purpurascens, quæ si degustare volueris, deprehendes saporem Pisi nigri distracto cortice, ad eò fabaceum aliquid respiciunt. Mittuntur ad nos nominibus Ginge & Abrus. Affertent Alpino Phasolorum gustum habent, Ægypti in iure elixis vesci conueuerunt. Sunt verò præ cæteris omnibus concoctu difficiliora, ex quo stomacho maxime infesta sunt, statisque multis concitant & Hypochondriaci valde noxia obseruantur, paruum succum generant. Cæterum, quum diutissimè propter duritiem incorrupta maneant, serico filo traiecta, & collo monili instar suspensæ, & Armillarum locò in brachiis gestari possunt, ad ornamentum; quod nonnullas nobiles virgines, quibus familia grana donabatur, interiectis paruis vniouibus facere obseruatur; nam non modò corallinos globulos natiui coloris elegantia prouocant, sed etiam vincunt. Quidam teste Camer. perhibent utiliter adhiberi, in dentitionibus, febribus & spasmodicis puerorum.

PISUM AMERICANVM SIVE

Abrus coccineum malus, compressum, maculatum & non maculatum.

Perelegantes sanè & visendi hi fructus, Abrus coccinei dicti veluti, degeneres esse videntur. Pisi maioris amplitudinem æquant, eamque planè, quam hic pictam damus. Duri sunt, ex rotundo nonnihil oblongi, æquabili aliqui ferè circinatione, modicè compressi. Quorum alter miniatore diluore tinctus, nigra maculâ saturatius rubente lineâ circumscripta, tertia sui parte in ambitu conspicuus. Alter saturatiore coccineo rutulus, nitidus, & prædicto ventriosior, nullo nigro vestigio notatur: vtrique verò lineâ pyritormi concolori, acuminè versus germen (quod vtri-



utrique exigua)
protenso nota-
bilis.

Pro descri-
ptione & pictu-
ra milit amicus
noster Iacobus
Zuingerus qui
se accepisse per-
hibet à Bembo
Nobili Patavi-
no. Interna inf-
picere haud li-
cuit, quia noster
non erat fru-
ctus. Phascola-
ceum tamen ef-
fe non ambigi-
mus.

B.pin. Pisum
Indicum 1. ma-
ius. Variat fru-

ctus colore nigro, subfusco, variegato, umbilico
conueniente.

PISUM AMERICANVM ALIVD
magnum, bicolor, coccineum & ni-
gum simul, siue Phaeolus
bicolor, Anacock dictus.

Fructus hic durus, qui dentibus infringi non
potest, resiliens etiam malleo, iniectus in a-
quam subsidet instar lapidis, colore miniato fi-
cuti Abrus, eleganti atque splendente, verum me-
dia ferè parte, in aliis vix tertià: niger est, com-
pressus, nec exquiritur rotunditatis, sed in oblon-
gum vergens, ea praesertim parte, ubi umbilicus
est. Hic diuersarum magnitudinum est, & for-
mae; magnus, qui Lupini semine duplo ferè ma-
ior; mediocris cum eodem aequalis ferè, & par-
uus eodem minor. Est eis omnibus veluti um-
bilicus sublongus, qui parte adhaerebat siliqua,
ut existimamus. Apertis cum difficultate medul-
la est durissima ex albo flauescens: saporem no-
tabilem non animaduertimus. Accepimus à
D. Paludano nomine Phasoli Indici, ab Ill. no-
stra Principissa, Da. Anhaltina Ducissa Wirtem-
berg, pro Faba Indica. D. Thomas Platerus exo-
ticarum vestigator solertissimus dedit maiores &
minores. Gener Cherlerus in suo itinere Angli-
co plures etiam attulit maiores & minores. Plan-
tae Phasoli Iconem habet Clusius in Pann. ubi
male posita fuerat pro phasolo Aegyptiaco; nam
in Historia ablatis phasolis minoribus infra pi-
ctis ponit plantae iconem pro phasolos peregrino
1. siue lato albo, cum venis nigris: phasolos pi-
ctos habet idem Clus. ut & Lobelius. Qua-
lia autem sint folia istius plantae, & qualis stirps,
nobis non constat, nec scimus an aliquis anno-
tarit.

Lobel. in ic. & hist. Belg. horum meminit no-
mine phasolorum rubrorum Indianorum, du-
rissimorum: ac duo fructus ab eo figurati exhiben-
tur, qui etiam describuntur. Londino accipiebat
Clus. elegantissimum quendam phasoli (ut ar-
bitratur) fructum à Iacobo Gareto cuius iconem
& breuem historiam, propter venustatem & ra-
ritatem lectoris oculis subicere volui, praesertim
cum Phasoli ex Indis Orientalis inscriptionem
haberet. Is autem pontica nuce paulo minor

est, in medio tumidior & puluinatus, laevis, splen-
dens, durus, solidus, in aqua subsidens, extrema
parte (quā nimirum suae vaginae, aut lobo adhae-
sit) veluti diducto & hianti osculo supernè paulo
elatiore, & aquilino praeditus, duobus duntaxat
coloribus constans: superior enim pars ab elati-
ore rostellis parte; quasi lineā ad alterius extre-
mitatis infimam in fructu partem oblique ductā,
tota utrinque atra est, Ebeni nigredine & nitore,
inferior verò, omnino aurea, cui admixtum sit
pauillum Minii, praenaturae Mali. aurei colo-
rem refert, & ut altera nitet. Eius pulpam de-
scribere nequeo, cum confringere noluerim, ut
pote qui vnicus sit, inter reliquos exoticos fru-
ctus etiam seruandus.

Iconis trans-
positio.

Pingit Clusius duos phasolos, aut potius vnus
duas facies sine planta. Ille verò in pann.
duas etiam pingit facies phasoli modo dicti
cum planta, sub titulo quinti Aegyptii: verum
ibi obseruandum errore typographico accidisse,
ut sub dicto titulo tabella illa posita sit: phasco-
li quidem Aegyptiaci icon & tabula est p. 727. sub
titulo phasoli tertii.

Hoc praeterea notandum Clusium in hist. l. 6.
c. 41. iconem praedictam ex pann. posuisse pro
phascolo peregrino primo, siue lato albo, cum ven-
is nigris: verum abutit phascoli siue pisi duas
facies, quae iuxta radicem erant pictae, quae res-
pondebant nostro piso Americano, siue Ana-
cock. Praeterea pann. pag. 732. depictum habet
nostrum pisum, sub titulo phasoli Indici, nullā
additā descriptione: in hist. tamen loco ante cita-
to eam addit. Tandem in Exot. inquit: Hone-
stus vir Walichius Syucris anno 1599. de nautis
quibusdam ex America reducibus fructum Ana-
cock redemerat, cuius usum ipsi ignorabant: Er-
rat autem phascoli genus binis coloribus distin-
ctum, rubro & nigro.

Item l. 3. c. 3. de hoc fructu sequentibus agiti
Eruditus vir Simon de Tovar Hispanensis Medi-
cus phascolorum tertium mihi communicabat,
qui erat elegantissimus: isque duorum generum,
maior & minor, & magis orbicularis forma: co-
lor in utroque bifariam diuisus, nam mediā ex
parte corallii instar rubeat, alterā profus
ater erat, laevis & splendens. Similem,
maioris videlicet generis, multos ante annos
Viennae Austriae accipiebam, eiusque mentio-
nem faciebam l. 6. meae rariorum plantarum
Historiae, capite de phascolo. Vtriusque porro
generis anno salutis humanae 1597 Londino ac-
cipiebam ab honesto viro Ludouico Miraeo Cl.
V. Matthiae Lobelii Genero, ipsi à nauta quodam
ex India reduce donatos, & asserente, in quinquen-
tribus, aut quatuor maioribus in pollinem tritis
ut ad vomitum prouocandum: è minoribus au-
tem filo traiectis armillas fieri aduersus Epilep-
siam gestandas, arbitrati forsitan isdem facultati-
bus pollere, quibus neoniae grana: sed orna-
tus potius causa gestari existimebam, intelligebam
autem, ab incolis appellari Anacock.

Maior &
minor.
Descriptio

Vfui.

Armilla. &
picepica.

Anacock.

Phasolus
Aegyptius

Taber. phasolus Aegyptiacus Aegyptische
faselen oder Bienen.

B.pin. phasolus Indicus 6. peregrinus ex ru-
bro & nigro distinctus.

ANACOCK ACCEDENS PHASEOLVS
torus ruber.

Gener Cherlerus ex itinere Anglicano &
Belgico attulit secum phasolos de generis

(vt existimo.) *Anacock* : sunt enim eiusdem forme, ventriosiores, maiores, quàm staphylo-
Descriptio dendri fructus, ferè ouales, inæquales tamen. Color ruber, idem ferè cum *Anacock*, minùs tamen viu-
Color. idus & splendens, nullà maculà nigrà, vmbi-
Vmbilicus. licus idem, sed maior, circulus etiam elatus, fla-
 uescens : durus est, & in aquam iniectus, fun-
 dum petit : hic fortè fuerit idem cum *Phacolo*
Indico rubro Lobelii sine macula nigra, quan-
 uis nulla icon cum demonstrat.

PHASEOLI INDICI RVBRI
 durissimi Lobelii, cum nigra macula :
 & alterum genus sine macula, al-
 terum cum longa tenui macula.

Magnitudine & figura sunt fructuum sta-
Phasolus phylo dendri, læuoris eximii, rubore coral-
corallinus lino, inuictæ duritiei, altera parte lucente ni-
coloris cum gram maculam habentes, medullà præditi infi-
macula ni- gniter durà, sapore non ingrato. His non ab-
gra si nile figura est secundum genus, paulò tamen
 2. maius, & oblongius : nulla nigrà maculà dona-
Phasolus tum, tantæ etiam duritiei, & tam pertinacis, vt
alter ruber. à Wenceslao Terciasæ satum semelre totum in
 3. terra minime mutatum latuerit. Terti gene-
Phasolus ris *Phacoli* præcedentibus duobus maiores, co-
ruber cum lare rubro obsoleto, ex oblongo rotundi, vtrin-
linea ni- que nonnihil compressi, quemadmodum *Caska-*
gra ama- nea equina, quibus secundum longitudinem al-
rus. tero latere macula est nigra, longa, tenuis : me-
Medulla. dulla insigniter dura, sapor amaricans.
 Lobel. hist. Belg. Roode seer harte *Indians*
 sehe Boonfens. Icon. *Phasoli rubri Indians* du-
 rissimi.

Nos hoc in loco priorem *Phasiolum* macula-
 rum referendum esse ducimus ad nostrum *Pisum*
 siue *Phasiolum* bicolorum, magnum, alterum.
 B. pin. *Phaeolus Indicus* 4. ruber, ex phæniceo
 croceus, & ex rubro spadiceus splendens. Nos de
 hoc non agimus.

PHASIOLVS, SIVE PISVM
Indicum, compressum, sanguineum,
 Lupini quodammodo facie.

Descriptio. **F**igura ex triangulari in rotundum vergit, ita
Magnitu- tamen, vt vtrobique ferè sessilis videatur. Ma-
do. gnitudo Lupini albi ferè est. Color corticis san-
Color. guineus, lævis, pulchrè splendens. Vmbilicus
Vmbilicus. impressior, albicans, secus quem macula parua,
 nigricans, conspicitur. Accepimus ab Illustriss.
 Ducissa Wirtembergica. An idem sit, an tantum
 varietas risi Americani magni iam antè descripti,
 pro certo non affirmamus. Habet tamen cum
 eo magnam adfinitatem.

PHASIOLVS INDICVS EX RVBRO
 spadiceus, splendens.

Descriptio. **V**nciæ trientem non superat, latitudine se-
Cortex. munciali, modicè compressus. Cortice te-
Vmbilicus. gitur inter rufum & spadiceum medio, & ad
 Tannæ Gallis dictum accedente, læui, splendido,
 vmbilico dilutiore, vtrunque magno, per medià
 longitudinem eleuato. Parte oppositâ gibbâ :
 Estque ex iis quoque quos ab Illustrissima Ducis-
 sa Wirtembergica dono accepimus.
 Eius Escon. antè tradita cum Icone *Phaseoli Indici*
 parui maculati.

PHASIOLVS INDICVS OVATVS,
 spadiceus, vmbilico albicante
 breuiore.



Phasiolis In-
 dicis, san-
 guineo & nigro
 magnitudine
 suppar est, quip-
 pe paulò bre-
 uior, angustior-
 que. Color in-
 tercurrentibus
 maculis quibus-
 dam dilucioris
 coloris spadice-
 us est. Sed va-
 rietas in vmbi-
 lico, qui ex ru-
 bedine albicat,
 & ultra mediam
 laceris longitu-
 dinem non
 explet. Visus ap-
 ud Illustrissi-
 mam Principis-
 sam Wirtembergicam, quæ senis, ideoque interioris
 contemplari non fuit datum.

PHASEOLVS SANGVINEVS
 ouatus Indicus.

Perelegans & exotica raritate spectabilis est
 hic *phasolus*. Vnciam ferè longus est, digiti
 parui crassitudine, figurà ouatà, colore sangui-
 neo. Hylus latiusculus, atque niger per mediam
 ferè longitudinem excurrit. Dono nobis dedit
 D. D. Thomas Platerus Medicus, & naturalium
 solertissimus vestigator, ex Hispania allatum, ex
 India tamen primò inuectum esse, retulit. Eun-
 dem, cum jam figura nostra esset sculpta, com-
 municauit nobis Illustrissima Ducissa Wirtember-
 gica, itidem (vt ferebat) ex India sibi allatum,
 qui prædicto paulò compressior, in cæteris planè
 similis est. Anno 1605, gener Cherleus rediens
 ex Angliâ & Belgio attulit similem fructum, v-
 trinque compressum, vt cunctis ris, durum, (pl-
 dentem, qui iniectus in aquam subitò fidebat.

PHASIOLVS INDICVS
 ouatus niger.

Phasiolo Indico sanguineo iam descripto
 magnitudine, & figura ferè æqualis : colore au-
 tem variat. Nam totus niger est, & præ nigredi-
 ne, atque læuore splendet. Hilus itidem niger,
 magnitudine, & positu, vt in prioribus. Estque etiam
 hic ex fructibus apud Illustrissimam Ducissam
 Wirtembergicam visis, quem aperire, cum terræ
 esset creditura, non licuit, ideoque nec interiori,
 vel saporem addere.

Eius Escon. antè habetur cum *Phasol. Ind. ou. spadiceo*
 etc. icon.

PHASIOLVS INDICVS FVLVS.

Nostratibus *Phasolis* latior est, vix tamen
 longior. Color fuluus est, & mustelinus.
 Vmbi.

Vmbilicus magnus & longus, niger in area, ipso fructus cortice leuiter splendescente atque dilutior, & quodammodo ex ruffo albicante constitutus. Etiam hic ex iis est, quos apud Ill. Ducisfam Wirtembergicam descripsimus, referauit pro satrone.

PHASIOLVS, LATO, STRIATO,
siue radiato femine: alter punctatus,
cupula atto virente.

Sillique magnæ, latæ, compressæ. Semina vnciam circiter longa, paulo minus lata, renis formâ, in terminis regione sinuatâ, nigra, frequentibus albis striis virgata. Huic similia alia paulo minora, quæ licet radiata, siue virgata, variant nihilominus dispositione radiorû. Minoris huius generis, quod pictum in superiore parte nostræ tabellæ paulo minus, quàm sit, misit insignis Medicus Hercules Saxonia primariæ Cathedræ Patuiniæ Professor, is colore nonnihil variat, qui atro rubens etiam radiatus. Sunt nobis alia semina, quorum icon infima parte tabellæ nostræ, quæ alba dici possunt, punctis nigris guttata, maculisque rubentibus versicoloria, a gemine latiore maculâ, ad, & circa extremum seu capula expansâ atro rubente.



Clusius similem plantam sic describit: Caulis statim à radice in aliquot oblonga sarmenta diuiditur, lenta, vicinis stipites & virgulta reliquorum Phasolorum modo amplectentia: in singulis alis terna folia vulgaris Phascoli foliis similia, attriora tamen, ex eodem pediculo nascentia, extremo, (vt in vulgaribus) impari: ex iisdem alis bines ramuli prodeunt, multis floribus vulgari haud ab similibus, minoribus tamen, albis, vix in modum congestis, onusti: quibus succedunt oblongæ siliquæ: seu lobis, vulgaribus multo latiores, continentes ternos, aut quaternos fructus, planos, communibus Phasiolis latiores, albos, sed multis nigris maculis, siue venis, ab hilo in latitudinem ductis elegantissimè depictos.

Clus. dicitur Phasolus primus siue Africanus, Phasolus minor, varius, siue Purkicherianus. Eo quod huius fructum D. Purkicherianus primus in Pannoniam intulerit ex Neapolitano regno delatum, singulisque annis coluerit & eius genus vt dixi, conseruauit: quam ob causam apud rei herbariæ illius regionis studiosos, Purkicheri cognomen inditum, & vt Phasolus Purkicherianus nuncuparetur, obtinuit. Ante multos verò annos similem planè mihi missum miemini, Phascoli Africani nomine: & ex Africa Italos primùm accepisse, verisimile est. Idem

Tom. II.


in Hist. Phasolus peregrinus primus. Item Phascoli peregrini primi genus alterum.

Ponit quod animaduertimus, Clusius in Hist. postrema, pro Phascolo peregrino primo, iconem quæ est in Pannon. pag. 129. Phascoli 5. siue Ægyptiaci titulo: verum ex ea tabella ademit duo minima, quæ infra separatim erant picta; pro genere altero apponit figuram, quæ est in Pannon. sub titulo Phascoli primi siue Africani: verum non demonstrat, quâ inredifferant. Icon autem phascoli peregrini primi Clusii, est nobis in tabella capitis Phascoli bicoloris, seu Pisi Americani alterius, bicoloris: in eo Clusium imitati sumus, cum nesciremus diuersam plantam à seminibus bicoloribus appictis. Phasolum, qualem pinxit Clusius, radiatum, qui etiam inferiore tabellæ nostræ parte pictus est, misit Ill. Landgr. Guilhelmus, nomine Phasoli Americani: in descriptione tamen Clusii variare videtur: dicit enim album cum multis nigris maculis, aut venis: meus potius dicendus niger cum albis venis.

An Tabern. Icon. & Hist. Bresilgen Bonen 7. Phasolus Brasilianus primus: Nescimus, quam ineptam figuram proponat Compiler, quæ huc referenda videtur, considerato titulo. An Thomæ Hariot in hist. Virginæ Insulæ, Okendgier.

Clusio Georgius Purkicherus Poloniensis in Vngaria Medicus primarius communicauit, cui ad pergulam, aprico loco satus singulis annis fructum maturum dedit. Mihi deinde anno 1582: & aliquot sequentibus, egregiè prouenerunt aliquot eius stirpis, quarum nonnulli lobos dederunt, qui matura semina protulerunt: interdum etiam, quos ad maturitatem peruenire posse existimabam, ob Solis radiorum defectum, spem meam frustrati sunt. Prouenit nobis in horto Ill. E. C. Wirtemberg. folio Smilacis vulgaris, ex femine melle, ab Illust. Landgrauis, cui (vt scripsit) excreuit ad læuæ altitudinem, sed tantum floruit; nobis verò ad maturitatem ferè prouenit. Ab aliis etiam acceptum semen terræ commissum, aliquoties siliquis protulit, sed nunquā semen maturuit. Si plantamur deinceps tempestiue in vase plantabimus, & sub rectam proponemus, donec calum in caleat, & exponi possit.

PHASIOLORV M INDICORVM
latorum tres species, & Clusii latus:



Et nobis Phasoli Indici nomine à Doctore Paludano datus, seiscunciali ferè longitudine, latitudine vnciali, compressis: cortice obtectus flavo, ruffo colore variè intersparso, splendente quidem, sed non ylique quæque læui. Hilum album est longiusculum, area obscurè rubrà circumdatum.

Huic quodam

Z

Phasolus
peregrinus I.
De Trombus
Phascolus
latus.

Phasolus
Americanus.

Phasolus
Brasilianus.

Tab. repr.
bendit
Okendgier
Locus
Tempus.

modo similem vidimus apud Illustrissimam Ducissam Wirtembergicam, sed minorem: quippe longitudine vnciali, latitudine vnciam mediam non multum superante, itidem compressum. Sed color albus erat, rubris itidem maculis interstinctus, cuius picturam ex ipso etiam fructu effictam exhibemus.



Similiter & tertium quemdam apud eandem conspeximus, prædicto magnitudine tantum cedentem, quantum is primo loco descriptus, compressum. Sed colore etiam variantem, quippe ex nigro & albo variegatum, ita ut insignis sinus, albicans, punctis fuscis alperis, totam ferè fructus nigri longitudinem utrinque peruenat.

Ubi Clusius refert apud Monardem, Londini emit in Mercatorum porticu de Gallo Naclero Phaseoli genus, quod è Brasiliana noui Orbis prouincia aduectum asserbat. Nostro vulgari maior estis Phaseolus, latiorque, nec minus colore variat: etenim nunc flauus est, aut omnino niueus, modo ater, aut putpureus, aut albis pupureisque maculis distinctus. De simili planta natum referebat, qualis Europea est, nostrumque saporis gratia & leuitate longè superare, si eodem modo decoquatur. Londini satum prouenit vulgari similibus sarmentis & foliis, sed ad frugem non peruenit.

Videtur nobis Clusius, primum nostrum Phaseolum iam descriptum, pinxisse, ac fortè eadem tabella album, de quo capite sequenti.

PHASEOLVS NOVI ORBIS LATVS, TOTVS CANDIDVS Lob. h. 1. f. 11.

Descriptio.



Synonyma.
Phaseolus ex
America.

America-
rum Faba.

Locus.

STRIATO
noui Orbis Phaseolo minor est, à germine ad partem oppositam, vnciam latius, longitudine scissili, eburnei candoris & laeuioris.

Dicuntur Lob. in Belg. editione parte 2. Phaseoli ex America albi. Et Icon. Plantin. Phaseoli magni, latius, albi, Thevet. America-

rum Faba, omnino alba, valde compressa, nostrati-

Habeo ab Ill. E. C. missis à D. Paludano, & deinde mihi cum hac inscriptione: Phaseoli Brasiliani, maiores: ex quibus nos curauimus depingendos cum duobus minoribus Lobelij eadem operà, ac etiam Phaseolos rubros Americanos, striatos, planos.

PHASEOLVS LATVS ALBO EX NIGRO varius, angustifolius.

SARMENTA striam à radice habet multa pro-

sio rariorum plantarum Hist. primis Phaseoli modo, quæ, licet eadem ratione vicinis perticis sese circumvoluant, non tamen adeò luxuriant aut alè assurgunt. Ad horum nodos folia enatacuntur terna, ut in aliis Phaseoligenicibus, multò tamen angustiora. Sexti [nobis Phaseoli latius coloris regularum, cum striis per longitudinem nigris] foliis, quem Colonia apud Hopeti viduà conspicebat Clusius, non valde dissimilia: ex horum alis emergebat digitalis longitudinis cauliculi, paruos flores in vix modum congestos sustinentes, albos inuad, sed, ubi senescunt, pallescentes: iis succedebant plantæ, latæque vaginæ, Primi [Purkitcheriani] lobis ferè pares, breuiiores tamen, iniud virides, quæ maturæ fuluescunt, semènque continent planum, Primi iam dicti granis minus, sed similibus coloribus albo & nigro varium, nunc in longitudinem extensis nigris striis, nunc confuso ordine sparsis maculis nigris maioribus, aut minoribus per vultum Phaseoli corpus: nonnunquam integro fructu nigro, vel exiguis albis maculis consperso, aut dimidià duntaxat ex parte. Florebat Iulio, & Augusto: semen etiam maturum præbere incipiebat Augusto.

PHASEOLI LATI, CANDICANTES VIRGULIS NIGRICANTIBVS NOTATI secundum longitudinem, vel nigricantes: flore albo.

PLVRIEVS sarmentis assurgit, eiusdem cum peregrino iam descripto, [septimo Clusii] vel cum superiore, longitudinis, quæ vicinis palis sese applicant, & eos scandunt: ubi sese in ramos diuidunt, adnascuntur folia, Primi [Phaseoli latius striato semine] foliis similia, tertio numero, sed paulò minora: flores ex alis proferunt etiam Purkitcheriani, seu Primi, floribus similes, albos, vultate pallescentes, vix instar nascentes: quibus & plantæ, ut in precedente, succedunt vaginæ, illis haud maiores, continentes bina, terna, aut quaterna grana, plana, superioribus magnitudine respondentia, non adeò candicantia, sed colore interdum exalbescente, aliquando nigricantibus virgulis secundum longitudinem, vel confusè notata, interdum toto etiam pæne fructu, ut in superiore, nigricante.

Numeratur hic Phaseolus apud Clusium in hist. Peregrinus octauus seu emissus Pannonicarum stirpium Historiæ, alter, qui Viennæ Austriz, semine peregrinè accepto, ipsi prouenit.

PHASEOLI LATI, MAGNI TOTI ALBI, EXCEPTIS QUIBVS- dam radiis.

PHASEOLVM hunc acquirerebam, inquit Clusius, semine, quod N. V. Ioannes Boissot ex Hispaniâ acceperat, mihi communicato, natum erat verò is fructus Purkitcheriano maior, sed totus albus, nisi quidam radij sparsi varium quodammodo fecissent: terræ creditum semen producit, creuitque Purkitcheriani instar, similibus sarmentis, foliis, floribus, & vaginis, sed cum æstas sublequeretur tardior, humidior, & frigidior, neque hic, neque alij, quos seueram, Phaseoli exotici, ad frugem peruenire potuerunt.

Est autem hic Clusij rariorum plantarum Hist. Tertius, siue ordine peregrinus nonus, lib. 6. c. 47. phaseolus

PHASIOLI LATI, PRORSVS
NIGRI.

MULTI sunt ab vna radice assurgentes rami, superioribus quidem altitudine aequales, sese circumvoluentes, ex viridi purpurascetes, nodosi, & geniculati, quibus adnascuntur folia, Octavi foliis similia, secundum tamen articulationes, quibus connexa sunt, purpurascens: ex alis etiam prodeunt digitalis longitudinis ramuli flosculos, superioribus magnitudine & formâ, respondentes, vix quoque instar congestos, ferentes, sed quorum galea, seu cassis obsoletè purpurascit, bina lateralia folia, coloris sunt floridioris: his succedunt planæ, latæ, fulcæ & nigricantes vaginæ, semina continentis plana, Purkuchianis, siue versicoloribus Africanis minorâ, per maturitatem proflus nigra. Quartus est Clusio Hist. siue ordine Phaseolus peregrinus decimus.

PHASIOLI LATI COLORIS
TEGLARVM CVM STRIIS PER
medium nigris.

VNDICESIMO Phaseolo nascendi modo & reliquis ferè notis, per omnia ferè similis: sed huius flores Decimi floribus valdè similes, paullo tamen dilutius purpurascetes sunt: fructus autem magis dilutè rubedine præditus, tegularumque colorem quodammodo refert, quem rarè per longitudinem nigra striæ varium faciunt, aliquando autem plurius totum prætere trum reddunt. Hoc genus mihi natum semine, quod communicabat Cl. Vir. Ioachimus Camerarius Inclitæ Reipub. Noribergeris Medicus primarius: reliqua fructu ex Hispanijs misso. Clusio ex sex Viennæ natis vltimus, est ordine hist. pl. duodecimus.

PHASEOLVS CAPOTILLO
DEL ALDANA, SPADICEI
coloris.

PHASEOLVS (inquit Clus. Exot.) peregrinus tertius, ab eruditissimo viro Ioan. Castaneda Medico Hispanensi ad me missus anno 1600. cum hac inscriptione: *Capotillo de Aldana*: semuncialis erat magnitudinis, laevis, spadiceique proflus coloris, exceptâ parte supina, quâ suo lobo adfisse videbatur, durus & solidus.

PHASEOLVS BRASILIANS
CVM SVO LOBO, FABA SPADICEI
coloris, & circa hilum fuscum
candicans.

PRÆLONGVS (ait Clus. Exot.) erat hic lobus: nam decem vnciarum longitudinem habebat, vnius autem vnciæ latitudinem, aut paulo ampliorem: cartilaginea porò cute textus erat, quatenus dorso nervus à pediculo ad extremum lobum, secundum longitudinem excurrentibus, insignitus, fuscis extrinsecus coloris, intrinsecus ex cineraceo candicans, tenui quadam membranâ singulas Phaseolorum sedes (decem

Tom. II.



*



2

PHASEOLVS NOVI ORBIS EX
ATRO PURPUREVS, AUT SPA
diceus compressus duum
generum.

In nigro relucet color glaucus aut purpureus, longitudo vnciæ minor, latitudo semuncialis; germen album, sapor leguminosus, Huius generis politior vnus, maior, minus rugoso cortice, & eo quidem spadiceo.

Ioh. Bauhino dedit Ill. E. C. cui miserat D. Paludanus nomine Phaseoli Brasiliani.

PHASEOLVS AMERICANVS
MAXIMVS, LOBVS FABA OB
soletè rubente, hilo longo,
albo.

CLARISSIMVS Vir, D. Carolus Paludanus dedit Sereniss. nostro Principi, siliquam nomine Phaseoli Americani, ex breui, crasso, ligneo pediculo, palmum longam, vnciam & semis latam: cortice crasso, duro, externè fusco, internè albo. Secundum commissuræ longitudinem, veluti sulci aut costæ laterales duæ: est binalvaris, & aperta se contorquens, sapore nullo insigni. Membranæ intus spongiosæ, inter quas fructus

autem continuerat) distinguente præditus: ipsi verò Phaseoli longi, semunciam lati, spadicei coloris & circa hilum fuscum candicantis.

Hunc autem Loc.

lobum ab iis, qui recenter è Brasilia aduenierant, redemptum, Viennam Austria ad me [Clusium] mittebat, Richardus Garth, anno à nato Christo 1585. cum aliis quibusdam fructibus exoticis, quos sciebat me summa diligentia conquire.

Phaseoli.

Siliqua.

Cortice.

Z 2

Sapor.

multi phasolacei, vngue longiores, coloris obtoletè rubentis, videbantur nondum maturi. Hylus longus, albus, per longitudinem fructus, non eleuatus, nec eo est candore, qui in Leblab, eo etiam multo est maior: sapor fabaceus: dentibus facillè atteruntur.

PHASEOLI RVBRI, AMERICANI, STRIATI, PLANI.

Descrip.

ROTUNDIORES sunt, quàm Phaseoli magni, totti candidi, amantè rutilantibus lineis striati, Porphyritæ marmoris instar, præcedentibus minores, nonnihil rotundi, & plani, maiores, latiorèsq; Phaseolis vulgaribus: ex quibus aliqui oblongi sunt, subærulei, aut nigri, artificiosè stris albis variegati. Lob. Similes, si non eosdem Clus. sic describit: Samenta altè etiam affurgentia, similia folia, & flores in digitalibus ramulis vix modo congestos, paruos, octau [Phaseoli lati candidatis] generis lobis similes, in quibus semina terna, aut quaterna, plana, dilutè rubedine prædita, quæ nigris venis, siue radiohis secundum longitudinem distincta sunt, nonnunquam magnis, vel exiguis nigris maculis confusè aspersa: interdum etiam vtrinque prorsus, vel alterà duntaxat ex parte, nigra, emicantibus sparsim paruis rubentibus maculis, vt ex marmore aliquo *marmoris* tornata videantur.

Dis. Clus.
Samenta.
Flores.

Semina

Lob. in hist. Belg. Rot Orange ghemarbelde Boonen. Icon. Plant. Phaseoli rubri.

An Clus. hist. ex sex Viennæ natis quintus, aliàs ordine Phaseolus Peregrinus vndecimus.

Econ. antè habetur cum Phaseoli Latè striati &c. Icone.

PHASEOLVS SANGVINEVS, compressus, umbilico albo,

Descriptio.

LEGANTISSIMUM hoc Phaseoli genus, exotica suæ pulchritudinis exhibet notas. Totus sanguineus est; vulgari Phaseolo latior, multoque compressior. Per ambitum nonnihil angulosus. Umbilico in medio paruo, albo. A quo ad oppositum transuersum obliquit, nec nisi Lynceis ferè intuentibus oculis currunt venulae, obcuriores ex atro rubentes, quarum diuagatione in extremo nihil pulchrius conspici potest.

Umbilico.

Fruiamur hoc ex liberalitate magni nominis Medici Patauini Herculis Saxoniz, vt & plurimorum aliorum, exotice elegantia.

PHASEOLVS VVLGARI MINOR ET PLANIOR, SVBRVBO COLORE, foliis angustis.

Descriptio.
Folia.

ELIGANS genus Colonie conspicit angustis foliis Clusius, fructu vulgari Phaseolo minore & planiore, subrubro colore, ex Hispaniis accepto, *Eri-zoles* Guareli appellatione. Quin Dodonæus eius descriptionem in suam novam stirpium Historiam intulerit, non dubitat.

Eidem hist. Phaseolus peregrinus sextus. Dod. in fol. Phaseolus peregrinus, pericis & vicinis adminiculis sese quoque circumvoluens, cui terna ab vno pediculo folia etiam dependent, veluti Phaseolis, sed singula angustiora multò, ac



similiter nigriora: Siliqua breviores, planiores, ac magis compressæ, pauciores fructus obtinent.

PHASIOLVS LABLAB ALPINI.



PHASIOLVS niger, Lablab vocatus Alpino de pl. Ægypti

est arbor samentosa, quæ crevit ad Vitis magnitudinem, samentis quæ,

Vitis modo, extenditur, ac expanditur foliis, figuraque similis est omnino vulgari Phaseolo, flores ferè bis anno, Verè,

ac Autumno, Phaseolorum floribus aliquatenus similes, quibus siliqua

longæ, instarque Fabarum latissimæ cernuntur, quæ semina nigra, Phaseolis planè similia, continent, quorum alia nigra, alia subrubra cernuntur.

Hæc arbor viuit annos centum & amplius, perpetuoque viret. Ægyptiis frequens in cibis, nostris quæ non minùs suavis. Mulieres vtuntur decocto cum croco ad excitandos menses, præterea vtilis ad tussim, & dispnæam, & ad vrinam suppressam mouendam.

Clus. ab. Il. viro Io. Pinello duo Lablab generata à Prospero illi communicata accepit: vnum videlicet nigrum, vt quod descriperat in Pannoniis, alterum rufum: De Lablab autem quod affirmat Prosp. Alp. viuit annos centum & amplius, est difficile credituri, qui Phaseolorum & leguminum naturam norunt.

Honor. Bell. in epist. ex Cydonia Cretæ ad Clusium Augusto mense scripta. Iulio nuper præterito ex Ægypto semina accepit *Leplap* diuersi ab eo, quem in Pañ. Clus. describit, quæ terræ commissa felicissimè nata sunt, maximà suâ voluptate: differt fructu, siliqua, coloreque: nam hic siliquas proferi magnas, longas, latas, caulis

Lablab. Descrip.

Sementi.

Flores.

Siliqua.

Sementi.

Longæ Pjnt.

Menses.

Tussim.

Genera.

Nigrum.

Differ.

caulis color purpureus, ad nigrum tendens, pediculi & nuclei foliorum eiusdem sunt coloris: flores plures vno petiolo inhaerent. Ab Alpino recte planta delineatur: sed flores valde differunt: nam non in fine caulium, sed è foliorum cauis exeunt longo pediculis plures, quasi spicatum, magni, figurà aliorum Phaseolorum, sed colore atro purpureo, qui Italicè *PAUMAZZA* dicitur, Phasolique ad rubrum tendunt nigris maculis insignitis longo hilo (ut niger), & albo.

PHASEOLVS LEBLAB NIGER ET SPADICEVS, HILO LONGO, ALBO.

EX Phaseolorum genere quoque est, quod *Leblab* barbarà voce nuncupant. Magnitudine est Phaseoli vulgaris, cortice tegitur spadiceo, laui, saturè rubentibus punctulis asperso. Cuius ambitus partem tertiam cingit hilum eminens, candidum, decoram elegantiam fructui concilians.

Cl. Paludanus *Leblab* nomine misit fructum, descripto iam figurà similem, sed planè nigrum, & aliquantè minorem, & ad cuius hili initium duæ maculae flavae conspiciuntur.

Est nobis *Leblab* genus quoddam totum nigrum, excepto hilo, itidem candido, eminenti, ac iam descripto simili, magnitudo prædicto æqualis. Huicque similem habemus alium, colore ruffo, plius minis diluto: est etiam colore ferè rubro, nec non colore ferè flauo. Dentibus facile atteritur hic Phaseolus: sapor eius leguminosus quidem, sed nobis valde ingratus.

Clusius Pannon. & hist. rar. depingit & describit hoc Phaseoli siue leguminis genus, quod Paludanus misit, cui *Leplap* nomen inscriptum erat, his verbis: Siliqua brevis & lata est, quaternaque grana oblongiuscula, nigra, hilo nihilominus albo, admodum longo, prædita, continens.

Clusio aliquoties acceptum, & tetra, opportuno tempore, creditum, nasci noluit, respiciens fortè regionum Septentrionalium frigidiorè aëre. Sunt nobis siliquæ prædicti *Leblab*, quales pinguntur à Clusio, sicut & semina eorum ex diuersis locis missa, videlicet à Paludano, vt dictum, alia mihi data per D. Iacobum Zuingerum, & fratrem Casparum Bauhinum ex Creta delata. Verùm easerunt simul mixta per incuriam. Basileæ provenit *Leplap* in horto D. Heselii, simile caulibus & foliis Smilaci & Phaseolis vulgaribus, nisi quod folia multa, quaterna proferat. Gener Cherserus rediens ex Anglia & Belgio ditterforum colorum *Leblab* attulit.

PHASEOLVS PEREGRINVS ORBICVLARIS, CINEREI COLORIS, TECTVS atrà tenuique membranà.

MITTEBAT ad me [inquit Clus. Exot. lib. 3. cl. 4.] anno 1600. honestiss. vir Vilhelmaus Parduin Phaseolum peregrinum, qui lobo inclusus fuisse videbatur, planus, vncialis magnitudinis, orbicularis parè forma, medio tumidus, atque in binas partes diuiduus, cineracei coloris, atrà, tenuique membranà tectus, cui nulum nomen erat inscriptum.

Tom. II,

PHASEOLVS PEREGRINVS ANGVSTVS, NIGRICANS, ALBÀ, TENVI MEMBRANÀ tectus.

PHASEOLVS alter peregrinus, Clusio [etiam in Exot.] missus, anno 1600. per Vilhelmaum Parduin vncialis quidem erat longitudinis, sed angustus, solidus & durus, nigricans, in binas similiter partes diuiduus, tenui quadam membranà tectus, albà, quæ in latere vestigium retinebat, quo lobo inhaerisse videbatur.

PHASEOLVS BRASILIANVS MVLTIS, SPADICEVS, MAGNVS CVM MAGNO hilo nigro, plurimum ambiente

CASTANEA magnitudine est, orbiculatus, vnciali plius minus latitudine, pulvinatus, cortice tectus rugoso, spadiceo, dilutiore, saturatiore, circa hilum verò dilutiore & ferè albicante; cuius orbitam ferè totam ambit, hilum pulchrum, culmum latum, solo medio secundum longitudinem exaratum in principio punctum impressum habens.



Huius generis etiam alium dono accepimus ab Illustrissima Ducissa Wirtembergica cuius hilum vtrinque eminet, veluti crispitas habet fimbrias. Anno 1598. Cl. vir Paludanus misit nobis pro Fabis Brasilianis: quasdam etiam antè habebamus, non recordamur unde. Icon nostra facta ad iconem, quæ est apud Lobel. in Iconibus, & Clusium

apud Monardem. Faba autem facta secundum nostrum fructum.

An Lobel. & Peña in Adv. de hac aiunt, Faba (vel Phaseolus) quædam latissima & candida, compressæ rotunditatis, ambitu ferè vnciam aequat, gustu, concretionè, & Phaseoli similitudine: hæc non demptam ex arbore Phaseolifera, vt quidam putant, norunt amici quidam, qui seueruat, legumenque non ita dissimile Phaseolo habuerunt.

Lob. Obs. & Icon. Plant. picturam ac descriptionem Clusii exhibet simili titulo *Phaseolus Brasiliensis* à Brasilianis *Macouma* vocatus, ex cineritio candicans. Tab. Icon. & hist. *Phaseolus Brasiliensis*; *Bresilgenbonen*. Hist. Lugd. *Phaseolus Brasiliensis* Clusii. Qui, cum Olysioponè esset, quemadmodum apud Monardem perhibet, donatus est Phaseoli genere ex Brasilia America provincia delato admodum recenti, pollicari latitudine, crasso colore rufescente, magno hilo, & parte extremà veluti sessili. Eiusmodi quatuor, aut quinque singulis siliquis prægrandibus continentur, qui recentes & virentes adhuc tusi & impositi bubonibus venereis curare de-

cuntur: flore traditur ex rubro pallescente: ipse quidem duntaxat iuniorem plantam vidit sibi semine natam, quæ foliis Phaeolo vulgari ferè similis erat, nisi quòd minora erant, & auersâ parte hirsuta, præsertim teneriora folia, & extremi caules tenui mollique lanugine fuluescente obfiti. Brasiliiani *Macouna* vocant: similes planè, & colore, qui ex cinereo candicans, duntaxat differentes ex Mauritania delatòs idem Clusius vidit.

Colore cinereo.

PHASIOLI BRASILIANI MAGNI
VARIETAS, CINEREA, AUT EX
CINEREO NIGRICANS.

Descript.

Color.

Milium.

Icon.

Locu.

MAGNITUDINE à prædictis non variat, sed paulò orbiculatior, nec minùs pulvinatus, corticeque scabrofiore. In colore & hilo præcipua varietas. Hi siquidem cinerei, aut ex cinereo nigricantes, haud interim secus ac prædicti circa hilum dilutiores. Hilum verò sesquiculmum facillè adæquat, utrinque modicè eminens, quod in illis non apparet: per medium item sulco, vel striâ cavatâ excurrente. Ad hili finem, eâ nimirum parte, quæ sessilis, ex hili proxima striâ transversâ, iidemque cavatâ, tertiam fructûs crassitiem exæquans conspiciuntur. Figura prædicti hanc quoque non malè exprimit, si, quæ in hoc speciatim euariant, excipias. Hunc naçti sumus ab Ill. C. Vvirtemb. cui Paludanus miserat, ni memoria nos fallat.

Annò 1609, inter ea, quæ Gener Cherlerus adferebat ex itinere Anglicano & Belgico, erat modò descripti Phaeoli siliqua, continens fabas tres: hæc siliqua similis erat siliquæ depictæ à Clusio pro lobo peregrino cartilagineo: vnciarum quinque longa, duarum lata, colore fusco, cortice non duro, dorso insignita, ut illa, duplici crista cartilaginea & sinuosa. Verùm in eo differens, quòd habeat præter dictas cristas alias multas transversales, quæ non traduntur à Clusio necin eius icone apparent: hirsuta quoque est, internè glabra, non nihil ex cinereo colore lucida. Mea insuper siliqua destituitur pediculo, & Fabæ in siliqua pendens ex pediculo maximam partem ambiente eas, instar annuli: bene maturæ videntur, difficulter apertiri possunt, propter firmitatem nuclej, cortex exterior cinereus, ut dictum in descriptione. internè niger: nucleus verò externè niger, internè albus, insigniter durus: sapor nullus insignis, nisi quòd videtur ad Fabæ vulgaris saporem accedere.

Horum meminisse videtur Clusius, ut videre est capite præcedenti, cum ait: Macounam ex cinereo candicantem ex Africa Mauritaniz delatum vidi.

PHASIOLVS NIGRITARVM
COLORE FUSCO.

Descript.
Lobus.

Fructus.

EX GVINEA AVTHORE CLYSTO Exot. delatus fuerat. Februario mense anno 1598. peregrinus hic Phaeolus, cuius lobus, sex, interdum septem, nonnunquam etiam octo, ut mihi referebant, vncias longus, penè binas latus, planus, sinuosis oris, cortice non valdè crasso præditus, externâ parte nigro, valdè rugoso, tumenteque, quâ parte Phaeoli inclusi, internè cinereo, cuspidè lōgâ & mucronata, dorso satis elato, in quo terni, aut plures fructus, quibuldam veluti



cellulis distincti, ut in reliquis lobis cartilagineis, vel membranaceis magna ex parte contingit, orbicularis ferè in plano formæ, vncialis magnitudinis, coloris fusci, & tanquâ annulo, siue circulo totum penè ambiente.

Ceterùm hos lobos mihi communicabat Christianus Porretus Pharmacopæus Leydantis diligenti-

tissimus, qui à nautis redemerat. Plures autem huiusmodi Phaeolos non semel, sed aliquoties accipere memini, & anno 1597. & aliquot sequentibus accipiebam, eosque non vnus coloris, & omnino nudos, nullòque lobo inclusos. Quin & non valdè dissimiles anno à Christi natiuitate 1564. Vlyssipponē nanciscēbar recentē ex Pernambuco Americæ allatos, spadicei coloris tamen illos, & *Macouna* appellatione insignitos, è quibus anno insequente in Belgicam redux, aliquot mense Aprilis terra committebar, quorum vnus duntaxat germinabat, & in binorum cubitorum altitudinem exercebat: sed quum ferius germinasset, ad frugem peruenire non potuit, & præmatura Hiems corripuit antè quàm vllum floris etiam rudimentum dare posset. Huius porro, ut natus erat, iconem in tabella expressam olim dabamus scholio ad caput de Fabâ purgatrice, lib. simpl. med. ex Occidentali India delatorum, edito ab eruditiss. viro Nicolao Monarde Hispani Medico, quem tum Latio donabamus. An autem lobo huic simili inclusi fuissent, me latet, quoniam omnes nudos accipiebam: ab his tamen, qui attulerant, intelligebam prægrandibus siliquis fuisse obductos.

LOBVS CARTILAGINEVS
EX INSVLÂ MAVRITII, PHAEOLO SIVE FABÂ NIGRÂ.

ANNOTANTE Clusio Exot. inter eas plantas quæ in insula quadam deserta, ad quam quinque Bataucæ naues, quarum Præfectus Wibrandus à Wirvvic, anno reparatæ salutis humanæ 1598. appellebant, cui Cygneæ nomen Lusitanos primùm indidisse audio, Batau verò à principe Mauritio, Comite de Nassau, Mauritii cognomen dedere, nascebantur, vna erat lóbifera: nam eius binos lobos inde aduectos, ante maturitatem tamen lectos, biennio poss. Wibrando reducere, ipsius munere accipiebam. An verò plantæ, quæ similes lobos proferebat, in arbore asurgeret, an leguminis genus duntaxat esset, quosnam flores aut folia haberet, intelligere non licuit, quia ab illis acceptis, neminem eorum, qui in dicta insula fuissent, conuenire potui nec ipsum quidē Wibrandum, qui lobos per suum famulum ad me mittebat: eam ob causam nullam ipsius plantæ descriptionem dare possum, præterquam laborum.

Erant

Erant porro illi lobi diuerſæ quidem longitudo, equalis tamen latitudinis, non valdè craſſo, ſed cartilagineo potius cortice tecti, eoque ru- goſo, quia immaturi, fuſci coloris, breui, ruſſaq; lanugine obducto, quam adhuc retinebat in la- cunis, vbi attrita & deterſa non fuerat, ſupernâ, & infernâ parte veluti duplici criſtâ ſinuosa, & ſcunciam ferè latâ, à pediculo ad mucronem vſque lobi productâ, prædito: Phaſeolos autem continebant penè vnciam latos, orbicularis for- mæ, non tumentes tamen in medio, ſed depreſ- ſos, quia plenam maturitatem nondum erant a- depti, in ambitu vndiquaque ferè veluti annulo cinctos, vt plerique ſimiles Phaſeoli, valdè du- ros & nigros, nucleo tamen albo præditos, quò re- cente veſci licuiſſet, quia ingrati ſaporis non e- rat. Iſtorum autem loborum vnus, quaternas vncias longus erat, trèſque Phaſeolos continue- rat: alter ternas duſtaxat, & binos Phaſeolos habuerat: vterque autem binas penè vncias latus.



tiſ introſpic-
retur, non
item.

Eicq; eadem
cum ea qua lib.
3.c.68.

PHASEOLVS BRASILIANVS MAIOR PICTVRATVS: ET alter diluioſe colore.

LOBVS PEREGRINVS CARTI- LAGINEVS, PHASEOLO EX PV- nico nigro tanquam annu- lo cincto.

FIGVRA ſunt oblonga, & ad circulaſem accē-
derent, niſi ſegmentum, quod parte ſeſſili ad
circuli perfectionem requireretur, deſſet. Ma-
gnitudine præcedentibus ſuperiores ſunt, longi-
tudine ſcunciali, latitudine ab hilo ad ſeſſi-
lem leuiter ſinuataſem partem: vnciam faciliè ſupe-
rante. Nec minùs ventrioſi videntur, quàm præ-
dictæ duæ ſpecies deſcriptæ. Corticis color ſpadi-
ceus; pèr quem foliacea quædam emblemata
ſunt ſparſa eleganti aſpectu. Circa hilum dilu-
tior, & ferè flauſcens. Hilum nigrum quoque,
ſed anguſtius, & vix culmi minoris latitudinem
adæquat, aſt quàm in cæteris magis eminet: Ea-
dem tamen ratione fructus ambitum compre-
hendit, ſicut in iam deſcriptis, hoc eſt, ad partem
ſeſſilem vſque. Circa hili extremitas nec caput ni-
grum, nec ſtriâ tranuerſâ conſpicitur. Maior
quoque inter vtrumque hili extremum diſtanti-
quàm in prioribus. Hanc habuimus ex fructibus
à Paludano datis Ill. C. Wirtemb.

Huius generis vidimus etiam minorem apud
Illuſt. Principiſſam Wirtembergicam, & colore
pallidior, ſeu diluioſe, in cæteris ferè iam deſ-
cripto ſimilem.

PHASIOLVS BRASILIANVS MAGNVS, TOTVS NIGER, ſplendens.

CORTICE obtectus eſt duro, toto nigro;
laui, atque ſplendente. In cæteris ferè,
cum rubro ſplendente conuenit, ſed eo paul-
lò minor eſt. Hilus etiam totus niger trèſ fru-
ctus partes ambit, ipſoque fructu clatior eſt.
Rotundus eſſet, niſi pars ſeſſilis rotunditatem
caueret. Illuſtriſſima Principiſſa Wirtembergi-
ca ſeuit, apud quam videre, deſcribere, at-
que depingere datum fuit; aperire, vt pen-



ANNO 1599.

inquit
Cluſ. vt videre
eſt in Exot. pe-
grinũ quẽ-
dam lobum
nanciſcebat, cui
ſimilem ante vi-
dere non me-
mineram: pro-
pterea illius hi-
ſtoriam pere-
grè natis lobis
adiungendam
eſſe cenſebam.

Quatuor au-
tem vncias cum
ſemiſſe longus
erat hic lobus,
binas, aut pau-
lò amplius la-
tus, cartilagi-

neo potius, quàm duro & lignoſo cortice con-
ſtans, dorſo inſignitus duplici, veluti criſtâ carti-
laginea, & ſinuosa, ad extremum vſque lobum
protensa: rugoſus autem erat cortex, & coloris
nigri veriùs, quàm fuſci: hec porro ea longitu-
dine eſſet præditus, trèſ tamen Phaſeolos duſta-
taxat continebat orbicularis formæ, mediâ parte
aliquaſtulum tumentes, circiter vnciam latos,
in ambitu ferè vndeque tanquam annulo cin-
ctos, valdè duſtos, & ex puniceo, nigros. Quæ
arbor, ſiue planta hunc lobum protuliſſet, quæve
in prouincia naſceretur, intelligere non potui, ta-
men omnem diligentiã adhibuerim.

PHASIOLVS SECVNDVS NI- gritarum, non magnus pro lobi amplitudine.

ALTER lobus ex Guinea allatus, circiter ſep-
tem vncias longus, ſcunciam latus, quæ-
dam

Def. rrr.
Z. 4

Clusius redimebat anno 1595. durâ cute testus erat, coloris externâ parte ex fusco cineracei (eius dorsum tribus nervis secundum longitudinem insignitum, ut in plerisque similibus lobis) internè veluti membranâ fufultus, aliquot Phasceolos continens non valdè magnos, pro lobi amplitudine, nigros, longo hilo filiquæ siue lobo inhaerentes.

Accipiebat autem hoc breviorum eodem anno ab amplo viro Simone Parduyn consule Medioburgensi in Walachtiâ Zelandiæ. Et biennio post his non dissimiles à nautis Batavis ex Madagascar insula allatos, Amstelredami conspiciebat. Traditur hæc historia Exot. lib. 3. cap. 11.

PHASIOLVS PEREGRINVS

MAGNVS, COLORIS CASTANEÆ,
cum magno hilo, lævis



Descriptio.
Circæ.



pulpa in conspectum sese dat, superficie quidem tenus rati coloris, intrinsecus alba, dura, sapore

Descriptio.
Circæ.

An Phascolus tertius Nigritarum, ex Guinea adnectus, quem Clus. Exot. lib. 1. cap. 11. his verbis describit: Secundo [precedenti] non dissimilem, vncias cum semisse longum octo, sed nervis secundum longitudinem in dorso excurrentibus

magis eminentibus, interna autem parte nulla membrana (nisi attrita fuisset) præditum, cineracei ex fusco coloris, Phasceolos continentem superioribus maiores, spadicei coloris, nec hilo adeò longo præditos, ut illi quos honestus vir Petrus Garetus, Iacobi frater, Amstelredamo ad me mittebat.



An Gesn. epist. tertium Fabæ genus ab Adol. Fabio Occone missum?

Lobel. Obs. & Icon. Siliqua Phascoli Brasiliæ. Sed videtur nobis hæc siliqua Lobeli non esse Phascoli Brasiliæ: sed Fabæ, de qua hoc agimus capite.

Iac. Theod. Tabern. Icon & hist. Phascoli Brasiliæ tertii siliquæ. Schoten der dritten Bies silgen Bonen.

FABA, VEL PHASEOLVS INDICVS

MAGNVS, RYBER, SPLENDENS.



PRIMUM similis est iam descripto Phasiolo peregrino magno, coloris Castaneæ: eundemque diceremus, nisi color manifestè distingueret, leui interimi quoque interueniente figuræ atque proportionis discrepantiâ.

Vnciam vnâ & semis adæquat amplitudine, quamvis circinatæ rotunditatis non sit: Hilum.

quippe parte vnâ rotundiore, alterâ latiore, compressus, & vnciâ mediâ vix crassior. Hilum insignè, ac nigrum, duas ambitus partes comprehendit, reliquâ parte tertiâ hilo vacuâ existente. Cortex rubeus est, insigniter lævis, splendens, ac subdurus; quem aperire potestas non data fuit, quod Illustrissima Principissa terræ cõmmittere decreuerit, apud quam vidimus, descriptum, de proximis.

Eicõn eadem cum eâ qua lib. III. cap. LVIII.

FABA INDICA, SIVE PHASIOLVS

MAGNVS, COLORE EX PHOENICEO
CROCEO.

PRÆCEDENTI iam descripto figura & magnitudo respondet. Sed suo colore variat: nam phœniceus ex croceo, hic ex illo ita emicat, ut cuius lustrum præualeat non temerè dixeris, concomitante pereleganti læuitate, atque splendore quàm in prædicto tamen multò inferiore. Hilum quoque non nigrum, sed fructui ferè concolor, quàmvis saturatus. Dono accepimus ab Illustriss. Ducissa Vvitembergica.

PHASIOLVS SIVE FABA ARBORESCENS

ex Guinea, Paludano latissima, ferè quadrata.

FRUCTVS, quem misit D. Bernardus Paludanus titulo Phascoli, siue Fabæ arborescentis ex



Guinea, Par-
gaticibus no-
ui Orbis Fabis
compressior
est, trium vn-
ciarum latitu-
dine, acutior
ad hilum, op-
posita parte
latus, & tan-
tū non qua-
dratus, longi-
tudo fescun-
cialis: cortex
Castanearum
corticem cras-
situdoine æ-
quat, ex spa-
diceo nigricans,
oblique stri-
atus, amare-
tem substantiā

claudens, quæ situm iam in superficie contraxe-
rat, penitus verò nigricat, & odorem ingratum
spirat.

Eundem fructum dono nobis dedit Illustrissi-
ma Ducissa Wirtembergica, sed figurā paulò va-
riantem. Nam ad octavam figuram quā proxi-
mè accedit, ac prædicto latitudine quidem cedit,
sed crassitie superat. Cortex, & quæ intus latet
substantia, cum prædicto eadem, sed paulò dilu-
tior, fortè quia maturior: Nam in vniuersum præ-
dicto est habitior. Conferant lectores historiam
duarum sequentium Fabarum arborescentium
Clusii: eæ sanè cum nostris respondere viden-
tur.

FABÆ ARBORESCENTIS LONGISSIMVS
lobus, Phaseoli, lati, plani, spadicei.



VALDE
magnuse-
rat lobus, in-
quit Clus. Exot.
Lugduni Bata-
uorum conspe-
ctus apud Hé-
ricum Tilman-
num Mercato-
rem, qui diu in
Lusitania vixe-
rat, eumque ex
Guinea delatū
afferebat. Nam
viginti vnciarū
longitudine,
duroque &
crasso cortice
erat præditus;
atque rugoso,
coloris externa
parte nigrican-

tis, & fuliginosi, internā autem ferè spadicei (cam
enim videre poteram, quia propter nimiam sic-
citatem, & calorem in binas partes cum strepitu
dissilierat) continens magnos septem Phaseolos
binas vncias cum semisse longos, fescunciam la-
tos, valde planos pro magnitudine, & minimè
densos, coloris ex spadiceo nigricantis, & splen-
denti. Ipsum quidem lobum libenter in tabella
exprimendum curassem: verū quia in binas

partes dissilierat, & illæ instar cornuum atietis se-
se contorserant, commodè fieri non poterat: sed
ex alio simili iconem in tabella expressam hinc
subiiciendam curabam.

Eam porrò iconem suis natiuis coloribus in
charta eleganter expressam, seruata lobi magni-
tudine & latitudine, mittebat ad me anno 1601.
doctiss. vir Franciscus le Clerc Montifaur Medici-
cus Tornacensis, cum vno Phaseolo ex ipso lobo
exempto. Lobus autem vnā vntiā minùs longus
erat eo, quem apud Tilmannum conspiciebam:
nam eius longitudo nouemdecim vnciarum dū-
taxat erat, latitudo verò eadem cum illo, qui Til-
manni, circa pediculum tamen paulò angustior:
color externus fuscus, quem crassiores venæ, siue
striæ nigre, à pediculo ad extremum vsque lo-
bum secundum longitudinem ductæ exornabant,
internus color ex spadiceo ad rubedinem ten-
dens: ipse Phaseolus planus, niger, & splendens,
illi penè similis, qui in lobo Tilmannico: quā
autem parte lobo adhaererat, paulò angustior il-
lo mihi videbatur, deinde in latum se expandens.
Vnde autem hunc lobum habuisset, non adscri-
bebat.

Locus.

Lobus.

FABA ARBORESCENS, SIVE PHASEOLVS

LONGE MINOR, PLANVS, RYGOSVS,
spadicei coloris, neruo emi-
nentiore.

LObo haud dubiè inclusus fuerat alter Pha-
seolus, superiori quidem formā non valde
dissimilis, sed longè minor, fescunciam videlicet
tantū longus, vnciam latus, planus, rugosus,
spadicei quodammodo coloris, neruo, qui eum
ambiebat, eminentiore, & in binas partes diui-
dum esse indicante, vt Fabæ vulgares. Hunc
Clusio, quemadmodum ipse Exot. lib. 3. cap. 7. te-
statur, Paludanus ostendebat:

Descript.
Phaseolus.

FABÆ ARBORESCENS, PHASEOLO
plano, longo, nigro.



Phaseolū ac-
cipiebat
Clus. libro &
capite modò al-
legatis, à Cl. V.
Paludano, Fabæ
arborescentis
appellatione;
quæ ex Guinea
delata esset, &
ex simili lobo,
qualis Fabæ ar-
borescentis lon-
gissimæ, exem-
ptus esse crede-
batur: erat au-
tem valde pla-
nus, binas vn-
cias longus, aut
amplior, fescun-
ciam latus, eius-
dem penè co-

Locus.

Descriptio
Phaseoli.

loris cum eo, qui superiore capite descriptus, mi-
nùs tamen nigricans, quia forsitan minùs matu-
rus, non minùs tamen splendens illo.

Similem etiam, sed maiorem, crassio rem, & spa-
dicei coloris nanciscebar anno 1597: in Madaga-

Alibi.

carinulâ natum, ab eis, qui illo anno ex Iava
Amstelredamum redierant.

FABA ARBORESCENS; SIVE

Phaseolus obo columbino ferè simi-
lis, exalbidî coloris.

Descript.



signatus, laevis alioqui, & splendens, gravis, &
ponderosus.

FABA ARBORESCENS, SIVE

PHASEOLUS NIGER, AD OVVM
columbinum accedens.

Descript.

Phaseolum quartum (pergit Clus. lobo etiam
comprehensum fuisse, non est dubium illum
ad me mittebat anno redemptionis humanæ
1597. ornatiss. vir Iacobus Platau, rei herbariæ
peritissimus. Erat porro crassiusculus, eiusdem
penè magnitudinis cum superiore, totus niger,
præter exiguum maculam subalbam, quâ procul
dubio inhebrat lobo, durus autem, & solidus,
atque in aqua subfudens.

PHASIOLVS NOVI ORBIS, SIVE FABA

purgatrix latissimâ, cordis figura.

Varietas
habetur.



Cortice

Phaseolus.
Inquit Clus.
Exot. qui lobo
inclusus fuisse
videbatur: di-
versâ erat eius
forma, nam co-
lumbinum o-
vum ferè ex-
primebat, lon-
gior vicia, am-
bitu selscicam
ferè compre-
hendens, exal-
bidi coloris, cui
flavi quidpiam
circa extremâ
partem, quæ
lobo inhaere-
rat, fuliginosâ
maculâ erat in-



1605. accepimus inter ea, quæ Genes adferebat ex
itinere Anglicano & Belgico, maximum, plenum,
pulchrum, atro-durum, non sonantem, sine no-
mine. Adhæc anno 1608. tres alias purgatrices
Fabas dono habui ab Ill. mea Principissâ. Erant
autem duæ nigrae, compressæ, utrinque ferè pla-
næ, tertia coloris penè castanei, vna parte pla-
nior, alterâ gibbosa valdè, sinum cordatum mi-
nus demonstrans.

An Lobel. & Pena in Adu. de supra dicto lo-
quuntur, dicentes: Phasiolos, siue Fabas per-
quam raras habemus, quas ferunt repertas ma-
gnâ copîâ ad Cornubæ littora, & quod non pa-
rum mirum, eo loco nullam meminit villus na-
vem illam, nullumve naufragium factum, & ta-
men quotannis novæ inveniuntur, partim flui-
tantes, & partim effodiuntur immerse sabulis
littoreis, quasi, ut putant Cornubiensis maris
Anglici accolæ, secundis Austris, aut Zephyris è
nouo Mundo appulsæ fuerint. Tenebras, nobis
quidem iudicibus, effundunt Aduersaria, quæ
omnis generis ambiguitates & dubia continuo
pariunt. Fabas perquam raras, sed quales rogo,
quantas? describere fas erat, nefandum nudis in-
cedere nominibus: nec enim his docetur quid
res sit, sed per descriptionem ea tandem intelli-
gitur.

Lobel. Obs. Icon. Plant. Phascoli noui Orbis,

quod latus et
tinetur. telt.
Clusio, album
simum, & in
dus partes na-
tura scissæ, ut
sunt omnia
phaseolacea
pore prauis
quali ferè sunt
omnia legumi-
na, sed illis
linguis mor-
dicina, & ac-
quosa, si fal-
lor, ut purgan-
di facilitate sine
prædura.

Fabam iam
descriptam re-
perimus inter
Valeradi Dou-
rez selecta, cu-
ius hæc erat in-
scriptio: Faba
purgatrix, vel
poculus Phasio-
lus Peruvianus:
Sunt nobis tres
fructus, vnus
sonat, alter nō,
tertius flacci-
dior, & com-
pressior, qui im-
maturus vide-
tur, quem ha-
buit I. I. I. I.
E. C. missum à
Bernardo Pa-
ludano, nomi-
ne, si benè re-
cordor, Fabæ
Brasilianæ.

Quantum anno

Faba

Lab. qd
na rep-
duntur.

Fabæ purgatrices Clusii. *Clusio* apud Monardem nascitur in insula D. Thomæ dicta, & cordis effigiem, vt vulgò pingit solet, imitatur: idcirco à quibusdam *C. r. Diu Thomæ* nuncupatur. Eius obiter meminit Petrus Cietz part. Chron. c. 112. Phasiolus maior Fabæ purgatricis nomine missus.

Ceterùm silentio minimè premendamidem Clusius exultimauit opinionem, quam Nortuagos de hoc Phaeolo habere intelligebat: illos enim prorsus sibi persuadere scribebat doctissimus vir ipsi amicus, matinum esse Phaeolum, atque idcirco in Farris insulis nasci inter Algam, & ex profundo erui, quin & folliculos ostendere, quibus contineri rugantur, quum tamen nihil aliud sint (nam vnum quem mittebat, conspexit) quam ouorum *Raie* piscis putamina. Ipsi à forma renes marinos appellant, nonnulli etiam *Bona fortis calulus*; siue, quòd calamitatem à domo possessoris, siue etiam, quòd incantamenta, & nescio quam noxam, ab heri pecore arcere vel propellere, credantur. Similem præterea cum suo lobo proponit capite octauo lib. 3. Exotic. qui non minus crassus erat (vt ex icone, quam suis coloribus expressam, eruditissimus vir Franciscus le Clerc Medicus Tornacensis ad ipsum mittebat, coniecturam facere poterat) quàm lobus, qui ex Wingandeaovy relatus, & hoc libro descriptus est: quem quidem lobum videre sibi non contigit, nihilominus eius iconem, secundum eam, quæ ad illum missa, in tabella secunda expressam adpositam hic volebat.

Is autem lobus non erat valdè longus pro eà crassitudine, quam pictura, quæ ad viuum affabre expressa, referebat, sed quinque vnciarum longitudinem duntaxat habebat, binarum verè latitudinem, duro, crassoque cortice constans, coloris ex cinereo fulci, de crasso pediculo pendens. Binos Phaeolos solummodò continuisse videbatur, quorum alterum cum ipsius lobi iconæ ad ipsum mittebat, binas vncias latum, fescunciam longum, sumpta ab hilo, quo lobo adhaererat, ad infimum fructum mensurà, planum, medio tamen, aliquantulum extuberantem, lauem, coloris nigri & splendentis, quia perfectam maturitatem adeptus erat, aliàs ex fusco spadiceo: plerique autem omnes, quos videre Clusio contigit (multi certè, & quidem variae magnitudinis per sepe sibi sunt conspecti) cordis, vt vulgò pingitur, formam habebant, hoc est, eà parte, quæ lobo adhaererat paullulum erant caui, atque propter hanc formam, & quia in insula S. Thomæ (tametsi in aliis etiam Africæ regionibus inueniri non dubitem) nascitur, & inde plerumque Phaeoli illi allati, Cor S. Thomæ à quibusdam appellatur. *Hæc ex Clusio.*

Hos exhibet Iacob. Theod. Tab. ic. & hist. sub titulo; Phaeoli Americi purgantes, Purgierend Bonen auß America. Eisdem quoque Hist. Lugd. depingit, ac describit, vocatque Fabas purgatrices Monardis. An porro Fabæ vulgaribus similes, quarum meminit Ferdinandus Lopez de Castagneda Hist. Indice lib. 7. cap. 78. quæ vomitum cient, & alium valenter purgant?

Fabarum purgatricum solum fertile Carthago, Nomen Dei, & insula D. Thomæ dicta. Sed Clusius in Africæ etiam aliis regionibus inueniri non dubitat. Ceterùm, vt Monardes præcipit, pellicula illa tenuis, quæ per medium illas interfecat, & caparum tuniculam exteriorem æmulatur, vnà cum cortice abicienda est; alioqui tantà vehementia superne & inferne purgant, vt in vitæ discrimen sumentem coniciant. Assandæ deinde

sunt, vt illarum acrimonia infringatur, deinde in puluerem comminuendæ. Datur hic pulvis vino, aut saccharo exceptus, ad cochlear vnum, deinde haustus vini sumitur. Apud Indos hoc medicamentum celebre est, ob sumendi facilitatem: nam sine molestiâ bilem, pituitam, & crasso humores, multò lenius, & facilius, quàm superiora medicamenta [nuclei pinci cathartici, Auellana purgatrice &c.] purgant. Dantur in febribus diuturnis & importunis, in coli doloribus, & articulorum morbis. Dosis esto assatarum (quod ead in hoc, tum in præcedentibus obseruandum est, torrerem singula præstat) à quaternario numero ad senarium, plurimum, aut pauciorum, pro ægri viribus. Calidæ in secundo, siccæ in primo.

Samonai ratio.

Faculantesi

Dosis assatarum.

Temperamentum.

PHASIOLO NOVI ORBIS, SIVE FABÆ purgatricis laussimæ, variatio longior.





AB hilo, Descriptio
quod eminentius est, nec sinum facit, ad oppositam partem duos pollices, cum dimidio est latus, longitudo duarum est vnciarum, sic, vt ab orbiculata superiorum figurâ non parum deficiat, color spadicæus, dilutior, lubricitas & nitor, vt videtur, maior, crassities par.

Color.

Vnde habuerimus Phasiolus noui Orbis longiorem non recordamur. In ea summa opinione, Clusium in Exot. lib. apud Manardum cap. 49 huius meminisse, cum post traditam Fabam purgatricem formam cordis, scribit: Illi similes, hoc est, magnitudine, & colore respondentes; sed longiore formâ præditos Phasiolos videre meminisse.

PHASEOLVS, MAGOVNÆ, SIVE Phasiolo Brasiliano similis.



Phasiolus Macouæ similis, hoc est; spadiceo nigricante, sed planiore, longioreque formâ, hilo non admodum magno; Clus. de fructibus peregrinis. Est autem ipsi, fructus peregrinus secundus, pag. verò 43: Phasiolus Macouæ similis dicitur, cuius ad epistolam Petri de Osma Nec l. Mo-

*Haba de
India munda
larga.*

hardes inscriptam postremâ editione hæmirit, quique Diuo Maximiliano secundo Cæsari ex Hispaniis missus fuit, *Haba de India munda larga*, id est, Fabæ Indicæ prælongæ nomine. Aqua morsus inum petit: Iac. Theod. Tabern. Icon. Fructus peregrinus n.


Et eadem eadem ea qualib. III. cap. 46.

PHASIOLVS INDICVS BREVI SLIQUA
tumida atque nigra.

Descript.

Inet alia naturalia præcipue raritatis, quæ D. Paludanus Illustrissimo ac Clementissimo meo Principi Duci Vircembetico obtulit, est siliqua hæc Indica, vniâ latior, longitudine dipla, pulvinaris instar tumida, nigra, aut fusca, corticis Cassiæ fistularis in modum, modicis striis, rugosa, lucida. Ex cuius extremo altero eminet pediculi vestigium; Parte verò oppositâ angulus incurvus. Porro hæc siliqua in hypocaulo collocata, & colore laetescens, in duas dissiluit partes, quæ con-
torquebantur instar reliquarum siliquarum leguminosarum;

Color.



Icon.

*Descript.
Clusii.*

tum sunt crassiores. Saporem non addo, quod in-
regi fructus terræ sunt in concedat ab Illustris-
sima Duce. P. & tura facta ad ipsam siliquam, sed
patis minor propter ligni formam.

Prædictus fructus à Clusio in Exot. depingitur, ac describitur, sub titulo lobi membranacei nigri. Erat autem hic lobus binas viciâ longus, vnam latius, prius aut coloris tumidus instar lobi Ciceris, nec formâ valde illi abfimilis, maior tamen, membranaceo cortice satis duro cõstans qui præ siccitate dehiscerebat, & conuoluebatur, quemadmodum per se leguminum lobi, semina-
que continebat bina, aut terna, nigra, circumata ferè rotunditatis, plana tamen (quod mirum in adeo tumido lobo) forinâ non multum dissimili articulis lobi Acaciæ, non adeo tamen turgentia in medio, tenui admodum membrana recta, ea-
que etiam nigra. Eum lobum cum aliis quibus-
dam exoticis, mittebat ad sub Amstelredamò Petrus Garetus. Similes postea apud alios etiam videbam.

LOBVS QVADRANGVLARIS.

Descript.

Exoticum, inquit Clus. lib. 3. cap. 17. nec vulgare leguminis gentis esse videbatur, semel

dunecat mihi conspectum, quadrangulâri lobo *Lobus.* constans, quatuor crassioribus & eminentiori-
bus nervis prædito, quadrantem longus, & cir-
citer semunciam crassus, cortice satis denso, pro
legumine præditus, eoque oblique striato, co-
loris ex fulco fuliginosi, septena grana continen-
te quadrangula, in binas partes aliorum legu-
minum instar diuidua, quæ veritate duritiem
contraxerant. Hæc pauca de eo legumine ex
eius notis apparentibus, & manifestis dicere po-
teram, quæ lectorem boni consultiarum arbitror

LOBVS MEMBRANACEVS
planus, niger.

Lobus hic *Descript.
Lobus.* omnino planus erat, alioqui formâ valde similis superiori: binarum enim viciârum longi-
tudinem habebat, vnius latitudinem; extremitas paulò latior erat, color ex-
tro spadicæus. *Color.
Lucus.* Willemus Par-
duyn, ab his qui anno 1598. ex Guinea re-
dierant, accipiebat, & mihi
[Classio Exot.



lib. 3. cap. 18. Inueni dabit, ut eius historiam de-
scribere possem, quia quum vnicus illi esset, ad se
sedire volebat, quem adseruaret: porro maturus
he esset, an immaturus, nihil pronũciare quæo:
sed quum lobum esse constaret, nec agitata
strepitum ederet, opinio magis inclinât, eum au-
tè maturitatem fuisse lectum.

FABA, CYAMOS LEGVMINQ.
SA IN GENÈRE.



O Pes ac di-
uitia In-
dix, Americæ,
Africa, alia-
rumque exte-
rarum regionu
in præcedenti-
bus historiis de
Phasolis ad
nostras terras
apportata fue-
runt atque tra-
dite: quid no-
stra ferat tellus
nostris & pere-
grinis exhibere
aggredimur &
Cyamo exorfi,
quem recogni-
tor etas Fabam *Fabam.
Radix.* appellat, radi-
cè partim est
recta,

recta, partim serpente, strumosa, & fibris donata: ex qua caules surguntur duobus cubitis latiore solo altiores, quadrati, inanes; foliis aduersis, caesis, ex oblongo rotundis, ad vnam costam annexis: ex quorum alii flores oriuntur simul aliquot in nobis, congeneribus Pisum similes, quorum supremum folium vngue purpurascens albidum, striis purpurantibus pictum est, duolateralia in medio nigra, in ambitu alba, stamina occultans, colore est ex albo herbaceo: semen in siliquis magnis, crassis, carnosiss, hirsutis, surrectis, oblongum omnibus notum.

Sed veniamus ad ea, quæ de hac Theophrastus aliique Veferes scriptis promulgarunt. Is igitur lib. 8. cap. 1. frumentum prima & maxima genera duo tradit, alia quippe frumentacea, vt Triticum, de quo lib. 18. Alia chedropa, vt Faba Cicer, de quibus posthac agendum erit, Horum autem omnium generatio simplex, & vna est, quippe ex semine omnia exeunt, nisi quid raro parceque radice prosiliat. Ex leguminibus quidem Faba maturè serri potest: hæc enim suæ debilitatis gratia radices agere ante Hiemem desiderat. Sunt tamen, qui hæc serò ante autem serere, si minus primis fatibus expedire poterint. Legumina quarto die, aut quinto, proueniunt, Fabis exceptis. Hæc enim intra dies plures etiã quàm frumentacea exit, quibuldam enim in locis vel in decimo, quinto, aliis etiam vigesimo: hæc enim difficillime omnium prouenit, & si, cum fata fuerint imber plus æquè successerit, vel prouentu omnino difficillima reddetur. Sed an ea, quæ tempore verno seruntur, celerius exeant, cogitandum. Caterum germinando eadem ex parte radicem fundit & caulem, quæ nimirum parte siliquis semen adnectitur, in qua ea veluti principium quoddam germinandi haudquaquam obcurum: quod vel ad pudendi formam effigiatum sanè inspicere possis, vt & in Cicere, sed maxime in Lupino: his enim radix deorsum versis, folium verò, & caulibus sursum tendunt. Sed & multis foliis exit Faba, inque rotundis, qualiter leguminum maxima pars, quæ radice singulari subnixâ, multos superne ramos ex caulibus gerunt, Fabis tantum exceptis, quæ inter legumina sola potissimum erecto caule consistit, quæ geniculatus est, atque inanis, quamobrem culmus vocatus, ceteris leguminibus lignosior. Quot verò diebus hæc floreat, sic declarat idem Theophrastus: Leguminum floris diutina productio, atque inter cetera Erui, Cicerisque diuturnissima. Inter omnia verò Faba quidem summo descriptimine, & longissimo tempore floret: quadraginta namque diebus florere prodita est: sed alij, subinde alio atque alio emergente, florere assignant: particulatim enim florere aiunt, alij simpliciter referunt: flos enim spicatus confertim Leguminibus omnibus particulatim emergit. His enim primum pars inferna floret, quæ cum desierit proxima incipit, atque ita ad supernam itur successu assiduus. Hinc lib. 7. cap. 3. hæc (intellige florendi modo) cum Ocymo comparat, scribens: Ocymum verò particulatim primum inferius, deinde cum ea de florere parte, florere superius incipit. Vnde fit, vt diutius istud floreat, quemadmodum Faba. Eam porro diebus quoque quadraginta perfici volunt: ita tamen, vt intra tantundem spatium temporis hæc florere, atque perfici nata sit, cum cetera intra dies pauciores consumuntur. Nunc in Leguminum genere, colorum, saporumque ratio differentiam facit. Candida siquidem in omnibus generibus

Tom. H.

præstant dulcedine, vt Cicer, Faba, & alia generis eiusdem. Quæ, vt omnia Legumina, siliquis adheret, & veluti quoddam principium inde obtinet eminens, non concauum, vt Lupinum. Accidet imber post sationem superueniens omnibus prædicit, excipitur tamen ægrè germinans Faba, quæ florescens præcipue madescenti cupit: ob id serò eam serere volunt (vt dictum est) quoniam diu floreat: sed postquam deflorent, parum omnino aquæ desiderari assument. Consummatio enim iam in vicino est. Hæc fortè illud pulchrè subsequitur, quod de eius lib. 4. cap. 14. memoriz prodidit: post florem etiam, si adhuc humida, tenellaque afflatu vehementer vexetur, facile perit. Discutitur enim, quod in his tenuissimum est, & confutata inter se euadescit. Hanc ex ceteris nouale optimum præstat, quamvis frequens seratur, fructumque serat copiosè. Iam quod cultoribus situ pernecessarium, aquis fluentes huic magis prodesse, quàm celestes affirmant. Apud Philippos cum ventilatur, eius loci vento perflata, si cocti facili est, fit difficilis. Et hoc sanè mirum, quod cum alias minime molesta est, tum etiam tellurem raritatis suæ, ac putredinis causa stercoreari putatur. Ob id, qui circa Macedoniam atque Thessaliam colunt, cum Fabæ florent, arua inuenter confueverunt. Vermiculi etiam in Fabis, quàm quidem celerimè in leguminum genere erodunt. Midæ ab aliquibus dictæ nascuntur. Singula namque pro suo humore peculiare animal creant, cum secutis sc. imbribus calor repentinus humorem incluserit. Sed ita crosam, si credere nonnullis fas est, repleti posse affirmant. Caterum Midæ, vt aliarum herbarum & fructuum Imperium absentia sua consumperint, pereunt. Igitur ad hæc omnia tractuum natura plurimum refert, nec temerè, iam enim celum diuersum caliditate, aut frigiditate, aut humiditate, aut siccitate conflet: hoc autem fructus reddere, consummareque potissimè patet. Quapropter quibus locis fieri solent, non semper sunt. Seminibus autem non vis eadem ad germinandum, ac referendum vitæque datur. Quædam enim germinant, consummanturque celerimè, & referuari egregiè possunt, vt Panicum, Milium. Quædam germinant quidem, sed non celeriter, ceu Faba, & præcipue, quæ facile petcoquitur. Apud Apollonium maris Ionii Fabam nullo pacto erodi aiunt, ideoque seruandam reponi. Quin & circa Cizicum diu durare potest. Quod autem Faba tardi prouentus sit, causam assignat, crassitiem putaminis ambientis. Si præterea satè impluerit, adhuc multò tardius eam prouenire noster author scribit, quasi terra tunc pauimentetur, solideturque. Tertio, Quod verò Faba, & aliud quicquam ex leguminibus minus fruticet, imbecillitati certè tribuendum hoc est. Qua de causa maturius hæc serere solent, vt priusquam (vt iam sæpius dictum) Hiems adueniat, radiceantur. Faba tamen adeo detrimentis multis est, frequenterque, obnoxia, vt quamuis maturè prouenerit, tamen perfici plerumque non possit. Imbecillitatem autem eius vel sensu percipere licet: est enim corpore solido ac inani: nec radice numerosâ subnitiitur, quas ob res à quauis causâ statim offenditur. Maturè igitur serere Fabam solent, quod Hiemem anticipare debeat, quò possit radicari, & simul quia imbrem in flore amet, quia laxa est. Inter legumina autem magis æruginem sentit, tum quia folia vndique gerit, tum quia densa legitur, tum quia fructum terræ proximè gerit.

Aa

Fabarum
rigatio.Quomodo
sint cetera
difficilia
stercorari.Vermiculi
Midæ.

Duratio.

Cui tardus
prouentus.

Faba imbecilla.

Maturè
serenda.Ærugo.
Fructus
ra præcipue
maturè.

Quaestio quae
ratione Fabae
coctiles,
aut incocti-
les fiant.

Quid incoctile
ex incocti-
le?

Coctile, & in-
coctile;
durum.

Alimenti
causa.

Loca cal-
ida.

Ager cali-
dus.

Terra fri-
gida inco-
ctile pro-
feri.

Loca palu-
stris.

Imbres inco-
ctibiles
causa.

Aer frigi-
dus.

Putrescant enim inferiora potissimum, quoniam
minutis persilantur. Interea tamen maxime rara, &
fertilis flore, fructusque multoties parit. Solo leui
gaudet. *Ceterum non minus vills, quam incun-
da agitur quaestio, quamobrem Fabae, vt & re-
liqua semina coctilia, aut incoctilia fiant. Vtrum
ratione agri, an aeris, an certae affectionis: &
omniane, an aliqua tantum perdura effici pos-
sint. Fabis enim ac lentibus (inquit Theophi. de
caul. lib. 4. cap. 13.) id potissimum edentire vide-
mus. Fit saepe, vt & ager alias coctilia, alias & in-
coctilia ferat, tametsi eodem modo colatur: & ex
continuis segetibus sulco tantummodo atcente,
altera incoctilia, altera coctilia profert. Semina
quoque alias ex incoctilibus coctilia prodeunt,
alias contra ex coctilibus incoctilia, vt in exortu,
germinatione, crassatione, copia, bonitateque
nihil interfit, vt incoctilia sint, an incoctilia.
Ergo de his; & si quid aliud possit huic quaestio-
ni subiungi, primum illud dicendum, quod coctile,
& incoctile, ad feruescationem, resolutionemque atq;
(vt summam dixerim) ad nostri vltus rationem
dici solitum est. Quod enim resoluti facile po-
test, & coctura celeriter immutatur, id coctile est:
contra quod resoluti, immutarique nequit, vel
quit, vel quod aere mutatur, hoc incoctile est.
Tale autem sit vtrumque necesse est, si alterum
rarum molleque sit, alterum densum, durumque.
Sic enim alterum caliditatem, humiditatemque,
quibus resolutio agitur, suscipere valeat, alterum
nequeat, sed sua densitate, duritateque indomi-
tum semper resistet. Cum igitur coctile, & inco-
ctile ad hunc modum distinguatur: animad-
uertendum, quibusnam rationibus ea ipsa eue-
niant. Simplex igitur, veraque ratio illa est, quam
& inter primas disputationes reddidimus: quod
alimenti causa haec omnia facit, i. e. quali-
tate, quantitateque eius. Sic enim alimentum
commutare nimirum potest. Euenit namque, vt
quae in locis calidis, stercoreosis, tenuibus, soli-
que expositis sint, alimentum leue, atque facile
habeant: itaque fructum rarum, mollemque
praestant. Hac enim de causa non nisi coctilia
sunt in Lemno, quia huiusmodi solum est: quippe
omnino agrum eiusmodi coctilem quidam ap-
pellant, atque in eo coctili coctilia volunt. Sunt
& quae affert Aegyptus coctilia, soli, & aeris cau-
sa: calor enim coctilitati, atque omnino diges-
tioni pernecessarius est. Quapropter quae ster-
corantur, vixenit ferme diebus germinant. Quae
igitur agro feruenti, leuique proueniunt, his de
causis coctilia sunt: contra quae terra frigida,
spissa, lenta, & quasi figulari, atque etiam pra-
tensi, madida, & palustri exurgunt, omnia haec
incoctilia propter copiam, viresque alimentum, &
densa, duraque sunt, ex permissione terrenae, at-
que frigida partis. Congelatio enim & condensa-
tio, ex eisdem, quibus induratio fieri solet: ex quo
fit, vt locis palustribus, atque praemadidis, inutilia
ex toto creentur. Nihil enim remitti in aqua pos-
sunt, quamobrem non nisi solum pabulo, sunt.
Has ferè causas tribuere solo debemus. Sed cum
aquae quoque caelestis, & aeris qualitas alimen-
tum augeant: idcirco imbris incoctilia potius
sunt, vt pote cum plus alimentum, & crudius sub-
ministraretur. Hoc enim idem prope solum quo-
que eiusmodi facit, & aer, si ea frigiditate sit, quae
non statilis, sed aquatilis quaedam consistet: sic
enim coagat, spissabitque. Cum igitur cause in
haec digerantur, nihil vetat, quominus ager etiam
idem, alias coctilia, alias incoctilia ferat, vbi scilicet
pluuiarum, ac calis conditiones non similes, sed*

aduersae incesserint. Etiam segetum, quas sulcos
tantummodo dispergat, altera coctilia facere po-
test, si quidem solum diuersum sit. Vt enim in me-
tallis, sic & in aruis putandum, venas spariari vi-
cinas, diuersas inter sese, quae suis viribus diffe-
rentias reddere possint, tametsi aeris idem status
seruatur. Itaque interdum segetis quoque eius-
dem aliquam talem esse particulam, patitur ratio
naturae. Idem eueniet, & si aeris, statumque frigi-
ditas talis accedat, vt vel totum, vel pars concre-
cant: quod etiam in corruptione euenire vide-
mus, cum alia diuersa, alia similia sint, & si qua in
ipsis seminibus dissimilis habitudo sit. Infirmitas
enim facilius affici certum est. Infirmitatem autem
vel natura fieri possit, si quam mutationem rece-
perit. Quae de causa nihil prohibet inter Fabas
canlis eiusdem, alias coctiles esse, alias incocti-
les. Idem & in eadem siliqua euenit, vt quidam
referunt, si verè aiunt. Etenim fieri potest, vt alia
valida, alia inualida sit: Fabae infirmitatis argu-
mento, vel illud potest deduci, quod sola mutare
suum colorem videtur, vt nigra ex candidis effi-
ciatur. Concretionem verò, condensationemque
esse vi frigoris, quae incoctilia reddat, testificare
illud quoque videtur, quod apud Philippum eue-
nire Fabis solitum est. Flatus enim in eo loco ve-
hementer frigidus est, & Fabae incoctiles ple-
taeque efficiuntur. At si in paleis torrefactis in aere
relinquantur, nihil se mutant, sed incoctiles per-
manent: cum enim à paleis, tum suo mutuo con-
tactu teguntur, simulque terrae calore conseruantur.
Contra si exaltentur, sublimetque capiantur,
flatus amplius valet, nulloque tegmine defen-
dente, facile subit, atque coagit: tum etiam dis-
poliatur, tunc primum suis paleis, & calore cir-
cumplectente destituta, infirmissimae sunt. Ma-
gna autem commutatio mouere plurimum po-
test: sed si postquam tempus praeterit, & quasi
signis sibi iam constitere, diuidentur, nullam
offensam ex statu capiunt. Iam enim & putamen
ambieus id robustius factum est. Incoctile
autem effici, si diuilius relinquantur sub di-
tuo, vt quidam aiunt, ratio est. Plus enim,
quam modicum sit, refrigerant, simulque
indurantur. Huic proximum quodammodo est,
vt pluuia, quae protinus à satione secuta est, inco-
ctilem reddat: quod enim in pullulando infir-
mam inuenit, rigere vehementissime facit: quod
quidem ad cocturam, non ad exortum noceat.
Nec temerè dixerim, eorum alterum abesse, cum
vis illa in aliis; propterea quae alia sit. Tum enim
infecundum, & germinis sterile, vel difficulter
auctile quicquam redditur, cum initia generatio-
nis vruntur. Ex coctilibus quoque satis, iterum in-
coctilia fieri, ratio est, nam ab eisdem aduerso mo-
do dispositi, non temerè facilitas percoquendi
proueniet. Itaque si aer, aqua, & solum ita se ha-
beat, quidnam causa sit, cur non semina quoque
mutentur. Sin autem euenit, vt putamen cocti-
lium remittatur, incoctilium obtundatur, vt qui-
dam aiunt: & altera oscitate colorem suum im-
mutent, altera minus, & solutiora cum demetun-
tur, coctilia reddantur [etenim id quoque nar-
ratur] nihil absurdum: quippe obtentio illa du-
ritie concretionis, crassationisque est: quorum
nihil alienum ab eis est, quae sunt incoctilia. Et
nihil immutari oris habitu posse, illius sane est,
quod praedurum, indomitumque possit persiste-
re: aduerso autem reddi aduertum debet. Minus
quoque in inesse resoluti, duritiei concretionique
datur. Quod enim durum admodum est, resoluti
haud facile potest: quod etiam in acaesi euenit,

Fabae
coctilia,
aut inco-
ctilia.

Pluuia
facit
incocti-
les.

Ex co-
bus
coctilia
possunt

ait, incoctilia fieri quidam dixerunt : sed hoc minus verisimile est : Solis etenim siccitas, etsi inspidiora minis, suavia reddat, coctilia tamen nihil minus, sed magis potest efficere. Ceterum si verum id etiam est, prioribus rationibus nihil repugnat : nec quicquam dissonat, si cum vetustescunt, incoctilia reddantur. Sicciora enim sic quoque efficiuntur, tam ex aëre circumfuso, quam exhalatione humoris interni. Celerius quoque, magisque corrumpi, quæ coctilia sunt, ratio exigit : duriora enim hæc sunt, & proinde magis possunt animalia gignere. Concocta quoque eadem plenius sunt, quod etiam ipsum facit, ut celerius immutentur. Et hæc dari prædictis rationibus possunt. Sola autem ex leguminibus, vel etiam ex omni frumentorum numero Fabam & Lentem incoctilia fieri falsò dici existimandum. Sed quod hæc maxime experimur propter vsum frequentem, hinc sola hæc incoctilia dicimus. Ceteris item molli frangentes vti solemus, his autem integris, quæ certè non parua differentia est : etenim si attenuatis iis quoque vteremur, non aequè incoctilia esse percipiamus. Ceterum si quis illa tantummodò incoctilia esse contendat, nec istud irrationabile est : sunt enim ceteris ferme debiliora, debile autem facilius affici necesse est. Quod vulgariter quæritur, quæ inobrem ea, quæ cornu contingit, incoctilia fiant. Numquid stulta omnino quæstio sit : lapis enim multò durior est, cui semina sæpè occurrunt : & nullo minùs incoctilia fient, etiam si in cornu nihil offenderint, nec bobus aretur. Atque de his satis. Quemadmodum igitur ad coctionem, & omnino ad fructificationem incoctile aliquid est, ita etiam ad exortum, germinationemque esse potest. Et hoc enim feminum imperfectio quædam est, pariterque in omnibus evenit. Verum de his cogitandum amplius est. Validiora, vegetiora, suaviora, insuaviora, atque ad vsum cibarium meliora, deteriora, pro locorum natura redduntur, ut diximus : quòd sicciora, spissiora, constantiora procreantur locis montuosis, quam planis, atque etiam magis, quam pluvius. Sunt enim illa spirantiora, & in vegetando temperatiora : non enim cum semina plurima, crassissimaque eadunt, suavia quoque eadem esse necesse : sed alia opus est habitudine. Sarratio quoque plurimum conferre ad suavitatem videtur. Iuvat & vegetiora demeti, humore namque vniuerso consumpto, cum ad cibum deteriora, tum minora efficiuntur. Legumina verò, ut melius legantur, vegetiora demetunt, arfacta enim defluunt.

Plurima ex hæcenus dictis, quæ de Cyamo meo tradidit Theophrastus, Pinus lib. 13. cap. 12. Fabæ convenienter tribuit, sic de iis scribens : Sequitur natura leguminum, inter quæ maximus honos Fabæ : quippe ex qua tentatus sit etiam panis. Lomentum appellatur farina ea, [farina eius CH.] aggregaturque pondus illa ex omni legumine. Iam verò & pabulo venalis. Fabæ multiplex usus omnium quadrupedum generi, præcipue homini. Frumento etiam miscetur apud pleraque Gentes, & maxime panico solida, ac delicatius fracta. Quin & præco ritu Fabacia [Fabaca Turn. & CH.] suæ religionis Diis in sacro est, prævalens pulmentari cibo, & hebetare sensus existimata, insomnia quoque facere. Ob hæc Pythagoricè sententià damnata : ut alii tradidere, quoniam mortuorum animæ sint in ea. Qua de causâ parentando, vtiq; assumitur. Varro & ob hæc Flaminem eam non vesci tradit, &

Tom. II.

quoniam in flore eius literæ lugubres reperiuntur. In eadem peculiaris religio. Namque Fabam vtiq; è frugibus referre mos est auspicii causæ, quæ ideo *refrina* appellatur. Et auctionibus eam adhibere lucrosam putant. Sola certè frugum etiam exesa repletur crescente Luna. Aquà marinà, aliàque falsà non percoquitur. Virgilius eam per Ver feri iubet, circumpadana Italia ritu. Sed maior pars maius alt fabalia maturæ rationis, quam trimestrem fructum eius. Namque siliquæ, caulisque gratissimo sunt pabulo pecori. Aquas in flore maxime concupiscit : eam verò defloruit, exiguas desiderat. Solum, in quo lata est, lætificat stercois vice. Idèd circa Macedoniam, Thesaliamque, cum florere incipit, vertuntur aua. Nascitur & sua sponte plerisque in locis, sicut Septentrionalis Oceanus insulis, quas ob id nosti Fabarias appellant. Item in Mauritania siluestribus passim, sed prædura, & quæ percoqui non possit. Nascitur & in Egypto spinoso caule : quæ de causa Crocodili oculis timentes refugunt. Longitudo scape quatuor digitorum est, amplissima crassitudo. Nec genicula habet, molli calamo. Simile caput Papaveri, colore roseo. In eo Fabæ non supra trigenas : folia ampla : fructus ipse amarus, & inodorus Dal. Sed radix perquam lauta incolarum obis, cruda, & omnino decocta, harundinum radicibus similis. Nascitur & in Syria, Ciliciaque, & in Torone Chalcidis lacu. Circa Philippas Aterampon [Ateramum CH.] nominat in pingui solo herbam, quæ Fabæ necatur : Terampon, quæ in macro, cum vdam quidam ventus affluit.

Fabæ magnitudinem exprimit malorum fructuum ad eam collationes. Theoph. Torebinchi semen, magnitudine Fabæ esse scribit, similiter & Loti, Vitis Idææ. Taxi de vique fructum, Fabæ minorem affirmat. Plinius Tithymali Paralui fructu, magnitudine Fabæ esse ait. His iungito Anstoletem, qui & ipse animal. lib. 6. Fabæ magnitudinem expressit his verbis : Pullus ab incubitu decimo die totus persequens : oculi capite grandiores, qui Fabis [vulgatis] maiores. Et licet Aristoteles ita sentiat, antiquorumque Fabulæ, siue Fabellæ pusillæ sint, tamen non idèd nostrates è Fabarum centu amouent (inquunt Aduerf. Lob.) ut Dodonæo placet : sed id nos docent, eorum Fabam fuisse maiorem, quam hodierna, nec tamen specie diversam, sed congenicrem, & potius fructu, magnitudine, figurâ, quam plantæ natura, temperamento, aut lineamentis distare. Nam Theop. h. & Plin. Fabam, qualis nostras est, describunt caule recto, & vrico, solamque inter legumina, ut plurimum culmo tradunt, & multis lecis Diof. caulem Fabæ quadratum dicit, & florem Fabæ Peryclumeni assent. Sed id evenire, quia variant magnitudine, colore, effigie latiore, compressiore, tereti, rotunda. Et frequentissima hodie Fabæ nostra maior, raro vspiam tamen nisi lata provenit, ferunt quippe in scrobillas paxillo depressas. Quare ut non est difficile nosse itam vulgarem Fabam, maiorem, longiorem, minusque rotundam esse, quam Antiquorum Fabæ fuerit, sic eandem Phasiolum, Dolichumve asserere, neutiquam licet per eosdem auctores. Altera Fabæ minor, non multum videtur abesse à Græcorum Fabæ, Venetiis vulgò *Faba menada* dicta. Lob. Obf. Fabæ maior recentiorum, *Bôna* siue Phæsolus Diof. Dodonæo. Is etiam meminit Fabæ maioris, coloris ex rubro purpurantis. Ic. Pl. p. 57. Tom. 2. Tent. 65. Tom. 2.

Quod quidem eorum opinio planè reicienda

A a :

Exesa replei tur.

Fabalia.

Stercorat.

Locus.

Caulis spinosus. Scapus.

Dodonæi reprob.

Faba veterum minoris quidem sed non diversa.

Phasolus non est, nec Dolichus.

Faba menada.

da sit, qui Fabam non esse, sed alterius nominis legumen, nimirum Phaseolum, esse prodiderunt, confirmat Hist. Lugd. dum dicit. Dicit mihi quosdam aliquis, paruum, illud nigrum, quod summæ Fabæ adhæret, & quod hilum dicitur, in quo alio legumine, quam in Fabâ nostrâ reperitur: Nam quod in Americo Pîso, Indicæ nigrum spectatur circa germinis exitu cauum, atra notæ est impressa cortici, non verò laciniosum hilum, quod integro cortice auelli queat; vt in Fabâ. Quæ verò de Fabarum formâ, & magnitudine scriptum apud auctores leguntur, & quibus illæ à Fabis nostris differunt, tanti non sunt momenti vt sententiam nostram possint conuellerè. Nam diuersis in terris maiores & minores producuntur, & cum crescere incipiunt, & cum perfectæ sunt.

His adde Hæd. Iunium, qui etsi Rombertus approbare nitatur, Phaseolum Veterum, *φασκολιον*, esse vulgarem Fabam, ægrè tamen persuaderi potest, cognitione leguminis tantopere in vñu mortalium semper habiti, ita prorsus abolitam, atque ex animis hominum erasam, vt nunc demum velut redinuiam ab inferis, aliam nomenclaturam reuocare necessum sit, itaque bonâ Romberti veniâ, cum maxima doctorum turba, receptam vbique temporum, prærogatiuâ, vocem seruiabit, dum omnium consensu veritas obtinuerit. His meritis subscribit Turn. dicens: Nos cum Germanis ab annis multis Græcorum Cyamon Fabam vocamus. Verum Tragus contrarium probare conatur. Bonâ nostrâ radicem habet singularem, [vt Fabâ Theoph.] caulis est rectus, quadratus, concauus. [Diosc. de Clymeno cum Theoph. l. 7. c. 1. idem Fabæ tribuit] folia rotunda, flos lugubribus notis pictus, [de Fabâ Plin.] semen non conuenit: Galeno multis locis Fabâ rotunda, nostrâ Bonâ oblonga est, non nihil compressa. Huic obiectioni si respondeo, faciliè soluerentur rationes Tragi & aliorum. Haud faciliè in his regionibus semen, quale Galenus describit pro Fabâ, inuenias, cuius planta notas habeat ab aliis scriptas. Quod si Bonâ nostrâ non sit Fabâ Veterum,

Radix singularis.
Caulis rectus.
Folia rotunda.
Obiectio Tragi.

Bonâ nostrâ
Fabâ Veterum.

Cicerula non est.
Bonâ nostrâ
Dodonæi
Tragi.

Bonâ non
est Faseolum.

ostendat mihi quispiam, quod genus leguminis in Italia, Hispania, Angliâ, Germania, aut Gallia sit Veterum Fabâ: Tragus Cicerulam veram [sibi incognitam] putat esse Fabam Antiquorum. Sed cum Cicerula non sit rotunda, nec recta surgat, sed obliqua, nequid esse Fabâ. Habet etiam Cicerula folia oblonga, cum Fabarum folia, auctore Theop. sint rotunda. Amatus & Dodonæus, adiuti rationibus Tragi negant Bonam esse Antiquorum Fabam, sed quale legumen sit, non indicant. Ita nobis Fabam auferunt, sed nihil ei substitunt, quod fecit Tragus audentius, quam doctius. Ex istis duo Bonam volunt esse Faseolum, Sed Bonam non esse Phaseolum, ex ipsius Dodonæi verbis probo, qui scribit Faseolum esse Phaseolum Dioscoridis. Sed Phaseolum non nisi adminiculis adiutus surgit: suis tamen viribus stat Bonâ nostrâ, non est ergo Bonâ Faseolum. Galen. quoque de alim. fac. c. de Dolichis inquit, Dicere possit quis omnia hæc, Eruias, Cicerulas, & Phaseolos vnum esse genus, verum pluribus nominibus appellari. *Er paulò post*, de iisdem scribens, ait, siue hæc, vt dixi vnum genus, siue vnius generis differentia sint. Attamen scribit Theoph. Cicerulas & Eruias, obliquè, non rectâ surgere, instar Fabæ. Siue igitur Faseolum idem sit cum Cicerula & Eruiâ siue eiusdem generis, vt scribit Galenus, tum crescet Faseolum obliquè, vt reliqua duo, quæ auctore Galeno, solo nomine differunt. Ego cum Bonâ no-

stra rectâ surgat, Faseolum esse nequit. Præterea inquit Galenus Faseolum medium esse inter statulentas & non statulentas, At Bonâ, vt ait Dodonæus, citans Dioscoridem, est statulenta. Cum ergo inter statulenta & non statulenta, mediò modo se habeat Faseolum: Bonâ autem tam sit statulenta, vt Cumino addito opus habeat ad flatus auferendum: Bonâ Faseolum esse non potest. Miror interim Dodonæum citare Dioscoridem de facultatibus Faseoli, cum nusquam eius meminerit, nisi Dodonæus Faseolum & Phaseolum pro vno eodemque recipiat. Quod si faciat, mirari rursus subit, cur duobus capitibus distinctis de Faseolo & Phaseolo agat, si vnum & idem sunt. Miror etiam, eum facultates Fabæ Veterum tribuere Bonæ Faseolo, quas nemo Faseolo tribuit, nec tamen Fabæ Veterum nomen etiam nostrâ Bonæ concedere. Neque enim Galenus, neque quisquam alius dixit Faseolum conferre inflammationibus, testiculorum, & mammarum affectibus. Sed & Gal. & Dioscorides eas vires propriè Fabæ Veterum ascribunt. Quare videtur Dodon. inuitus, quatenus Fabæ Veterum facultates nostrâ Bonæ concedit, Bonam nostram facere Fabam Veterum. Ex rationibus supra dictis perspicuum euadit, Bonam nostram nec Phaseolum esse, nec Faseolum. *Iam Tragi & affectuum eius rationibus respondeamus.* Quod ad Fabæ crescendi tarditatem, non alia mihi videtur responsione opus, quam ipsius Theophrasti: satis enim respondet eodem loco, his verbis: Sed an ea, quæ tempore verno serantur &c. Plinio de radicum multitudine, iam responsum est à Theoph. scribente: Fabam plures non habere radices. Quod ad Fabarum fecunditatem Plinio memoratam, ascribendum terræ fecunditati: vnde Agricola vir sapiens scribit Veterum pondera & mensuras ex granis & leguminibus non posse restitui, propter eorundem diuersitatem ex regionum diuersitate. Quod ex Diosc. adducit de Fabæ rotunditate ex cap. de luniperò in nullo emendatò codice nec latino, nec græco inuenitur. Si quis textum Dioscoridis secundum Serapionem obiciat, non alio argumento melius probauerim Fabam non debere esse rotundâ, quam ipsis Serapionis verbis, ita scribentibus: Quædam reperitur, cuius fructus est parvus sicut Fabâ, nisi quia ipse est rotundus. Videtis hic Dioscoridè, vt citat Serapio, Fabam non facere rotundâ. Aut enim baccas Iuniperi minoris paruas, esse instar Fabæ, nisi quod rotundæ sint, non vt Fabæ. Quod ad rationem de Fabarum rotunditate, ex Galeno deducam, respondeo aut Galenum suam Fabam sub legumine aliquo comprehendere, quod nos pro Pisi genere accipimus, quemadmodum censent quidam apud Diosc. sub Fabis contineri Pîsâ, quoniam nulla Pîserum apud Dioscoridem facta mentio: aut certe eius Fabâ in hac nostrâ Europâ, nisi multum fallor, non reperitur. Plinius Pîsâ facit quadrata: secundum eum igitur nostrâ Pîsâ alba, rotunda, aut sunt Galeni Fabæ, aut Cicera alba, quæ Plinius rotunda alba facit, Cicere arietino minora. *Hæc Galenus Turnerus.* Quâ porro autoritate fretus Fabam tam audacter Bonam vocet hæcenus haud constitit, nisi, vt ita dicam, Germanismo fultus, idiomatèque Alemanico abusus, vt aliis doctior videretur, nomenclaturam nouâ hanc excogitaret. Si Bonâ & Fabâ diuersæ sunt plantæ, cur differentiam veram non ostendit cur non utramque diuersis descriptionibus & iconibus expressit?

Faba (nisi Hermol. coroll. 32.) græcè *πυραυ* & *ἀμυγδα* vocatur ad differentiam Ægyptiæ. A. Gelus &

Bonâ statulenta.

Dodonæi.

Responsum ad obiectiones Tragi.

Diosc. non facit rotundâ.

& Festus Fabam etiam Fabulum appellant. Aliter Theodorus Teramon, & Ateramon siue Ateranon apud Theophrastum accipit, pro coctibili sc. & incoctibili, non autem pro herbis ita nuncupatis, ut Plinius. Theophrastus certe alio loco facile significat, veritatem Theodori, quam Plinius sensum fuisse. Ateramna vulgò legumina Græci vocant, inobsequiosa & contumacia, quod genus seminis etiam Cerasbolon vocatur à Platone superstitiosa origine, quasi sterilia & incerta proveniant, quæ per boum cornua ferendo cecidissent in terram. Interdictum esse Pythagoricum cibo Fabam miscere inualuit opinio contra verum, sed venerem intelligi demonstrat oportere Gellius Totà Insulari & Liguria recentes Fabæ, vendendum voce, nuncupantur *Baiana*. In Etruria & Latio *Scaphi*trumque originem habet eruditam: Nam & *Baianas* Apicius appellat, & *Scapos* Fabarum Plinius.

Scribit Cord. in Diosc. Cyamum Græcos, Latinos *Fabam* vocare, Germanos *Bonen*, de quo non opus sit dubitare. Differre Fabas secundum colorem & magnitudinem. Describit autem in hist. lib. 2. triplicem differentiam cap. 162. *Fabam vulgarem sativam*, *Fabam nigram minorem*, & cap. 164. *Fabam nigram maiorem*.

Tragus, si quis *Bonen* (Fabas) ad Phasiolos Dioscoridis referat, cum eo minime contenderit. Serapio (ait idem) cap. 116. *Mes*, & fructum eius *Robilis*, nigras habere maculas scribens, videtur mihi, quod verisimilius sit, fabas nostras germanicas intellexisse. Quam alias [inquit cap. 14.] sunt magnæ, alias exigue, ex his quidem alias rufæ, alias candidæ. Vulgares agrestes Fabæ, tres, aut quatuor, quæ maiores plerumque binæ, drachmæ pondus æquant. Nostræ Fabæ descriptio, quam Germani *Bonen* dicunt, ei minime competit, cuius veteres rei herbariæ scriptores meminere. Phasiolos potius, quam Fabas, siue Cyamos, apud Dioscoridem vocatas sentio. Fabæ apud Aunc. *Narbatibus*, Serapioni verò *Hachille* dicuntur, Hebræis *Pol* Ezech. 4. Mirari satis non possum, Barbarum & Manardum, & alios plerumque à Fabis adeò abstinuisse.

Matth. in comm. cum magnis icon. Lat. & Ital. & ep. p. 182. Fabas [videtur] alias asseri magnas, alias parvas, subrotundas alias, alias cōpressas & alias colore albicantes, subrotundas alias, alias subnigras.

Anguillar a tradit solum magnas, parvas rubras, nigras, albas. Gesti de hort. albas, & rubras. B. l. lon. per Fabam Egyptiam intelligit Fabam veram, edulem, natam in Egypto. Videtur illi, Galenum etiam intellexisse lib. de alim. de Fabis communibus, ubi de Egyptiis loquitur.

Fabam denique appellant [ut nobis author est Dod.] *πύραρον*, unde *πύραρον* Athenensium festa Apollini sacra, quibus *πύραρον* [Fabæ & legumina] coquebantur, à quibus rursus mensis, quo hæc celebrabantur, *πύραρον* nuncupatus est, quise ferè cum Ochothi convenit. Nominantur *πύραρον* etiam testiculi: quod sint, & *πύραρον* patiendi autores. Ab his Cyamis abstinendum Pythagoram præcepisse plerique interpretantur. Quo symbolo eum delectatū aiunt rei veneræ vsum, non autem eleuatū Fabarum.

Faba frella, aut fradta *βερύλη* grecè appellatur, aut *βερύλη*, & Fabæ frellæ farina *βερύλη* dicitur. Fabæ Græcis *φασίλιον*, Diosc. etiam Phasioli, Lat. *Faseli*, Offic. & vulgò dicuntur, Germ. & Belg. *Bonen* Phaselus maior, aut Faselus sativus maior. Belg. *Grotte Bonen*. Altera potest dici Faseli minores, *petite Fene* Gallicè. Brabant. *Zeûsch Boonen*, & *Pæerden boonen*. Fabam vulgarem non esse Cyamum demonstratur in Hist. frugum, &

Tom. II.

in fol. Bonamior ut plurimū candida, subinde ex rubicundo colore purpurascens, semidrachmæ sexpennerò pondo. Hanc veterum Græcorum *βερύλη*, ac Latinorum Fabam esse non solum Officinæ, sed omnes passim crediderunt, quæ in re à veritate absunt. Dioscorides Egyptiā Fabam, vulgarem Græcorum magnitudine superare tradit: quæ tamen & ipsa parva est, Bonæque longè minor. Pendet enim Egyptia Faba auctore Galeno semibolum tantum. Bona verò semidrachmam, i. e. obolos integros tres, sæpè complet. Bona igitur non Faba, sed omnino alterius nominis videtur, Faseli sc. quem Græcorum complurimi *φασίλιον*, ac Diosc. *φασίλιον*, Simeon Sethi *φασίλιον* nominavit. Phasioli autem Diosc. iudicant cum Phasiolis à Galeno, in lib. de alim. sicul. appellatis. Bonam germ. dictam, veterum Græcorum & Latinorū *φασίλιον*, Diosc. *φασίλιον* esse, dubitandi nullus locus superesse videtur. Minor Bonæ colore alias tuballicans, aut subflava. Forcundum admodum legumen, quod maiorem multitudinem foliorum & florum, siliquarumque numero superat: alias nigra. Brabant. vñ à cum Flandris, Hollandis, Zelandis, ac aliis finitimis vulgò *Pæertsboonen*/hot est, Bonam equinam, & *Hein boonen*/parvas Bonas, appellant, platiq; etiam *Zecusche boonen*, Zelandicas Bonas. Est verò hæc Bona, Phasiolus quidam, & potissimum ille, quem Diosc. videtur solum novisse. His & alijs rationibus, si Diis placet, firmis, quibus Dodon. vulgarem, vetioremque sententiam non tantum infirmare, sed funditus euertere frustra se torquet, quid respondendum sit, ex antè dictis clarè elucescit.

Faba semen est, ut apud Cæsalp. legumina inter legumina maximum, & quod matur, eò magis in longitudinem depressum est: minora autem rotundiora sunt, & modicè oblonga: color albis albicans, alius niger: rubras quoque Fabas ipse vidit. *Faba*, Theophrasto, Plinio, Varroni, Galeno, Dioscoridi. Plura antè ex Plinio, & Varrone.

Schuu. Faba maior, *βερύλη* Diosc. Faba maior sativa, *Grosse rote Bonen*/Deutsche bonen. Faba minor, siue rubra *Hein rote boonen*.

Pro Faba, Vicia aliquod genus verius expiit Petr. Cresscentius.

C. Bauh. apud. Matth. Faba. *βερύλη* à fertilitate, inter legumina maximum. i. Sunt ut plurimum candidæ, sunt nigræ, & ex rubicundo colore purpurascens, & flores aut candidi lituris nigris conspicui, aut ex purpura nigrescentes: sativa est maior, & minor; Fabullum Gellio & Felto.

Had. lun. Faba frella Plinio nominatur, quæ Fabullum, contracta est, *βερύλη* Al. Gewelte Bonen Belg. *Gestoten* oft *gecapte*/oft *gemalen bonen*. Faba tunica, *concha Fabe* Scribon. *Valvulus* Columel. *opercula mentum*. *ἀποτομή*, *μόρον* Nicand. *θήκη* Aristoteli, *ἀδόν*, *ἀδόνει* Helychio, *ἀδόν* Apollonio. Gall. *La gonffe*. Siliqua, folliculus. Colum. cōcha, valvulus, à valvis simili operculatura, non autem à vallo, ut Nebrissenfis putat. Theca generaliter, quæ vestiuntur legumina. *ἀδόν*, *καρπὸς* Theophrasto. *θήκη* Aristotel. Fabæ oculus. *ὀφθαλμὸς* Arist. Umbilicus Fabæ, ubi bifores Fabarum valvæ committuntur. Fabæ scapus, fabalis siliqua Ouid. *καυὸς τῆς βωνίας*. Al. Bonen stengel/bonenhaln. Belg. *Boonstroo*/bonenstangel. Fabæ hilum, Nigrum in summa Faba. Belg. *swarde bande Bonen*. Gal. *Le noir de la Fève*. It. *Il nero della Fava*. Hisp. *El negro de la Hava*. Fabalis Plin. *Fabago* Cat. *Fabaginum acus*. *κυστήρ*: quilibet & purgamenta Fabarum. Belg. *efcaban*.

de bonen. Lomentum, sativa fabacea, *λεῖμμα*, *λεῖμμα*.

Vnge. Germ. *Bonen meel* / vt & Belg. Gal. *Farine de Feves*. It. *Farina di Fave*. Hisp. *Harina de las Havaas*. Conchis *Martialis*, Iuuenali, *Faba cum cotuibus suis elixa*. Germ. *Bonen die man vngewelt* Kochet. Belg. *Vngepelde boonen geecoofd*. Gall. *Feves bouillies avec l'esforce*. Ital. *Fave bollite con le sue gascie*. Hisp. *Hava cozida con su correa*.

Nomina linguar. *Faba vulgaris*, *vulgaris* & plerisque Herbariis, Germ. *Bonen*, Belg. *Bone*, Gall. *Feues*, *Feves*, *Fabue*. Ital. *Fava*, *Fabè* verò recentes & virides, *Baccivili*. Hisp. *Havaas*. Ang. *Braues*. Bohem. *Bob*. Hung. *Bab*. Arab. *Hachille*, *Haballe*, & *Bachale*.

Agrius. Cyami nomine, *fabæ* complures apud Herbarios inveniuntur: vulgares quippe, magnæ, albe, & purpureæ: parvæ, albe & nigre. Lupinum eleganter depingit Auicenna lib. 2. cap. 451. nisi quod illic *fabam* Aegyptiam affirmavit. Quæ eadem cum Colocasia Diosc. à Plinio scorsim traditur.

Lupinum. *rabam* in locis validis, non calamitosi feri præcipit M. Cato. Tempus assignat Varro, & Palladius. Huic circa septimum Idus Decembris feri potest. Nam post exactam brumam malè seminatur. Illi optimè feritur in Virgiliarum occasu, & quidem modii quatuor in iugero, sed nonnullis locis paulò amplius, aut minus si enim locus crassius, plüs; si macer, minus; quare observabis, quantum in ea regione consuetudo est ferendi, vt tantum facias, quantum valet regio, ac genus terræ: vt ex eodem semine aliubi, cum decimo redeat, aliubi cum quinto decimo, vt in Hetruria, & locis aliquot in Italia. In Sybaritano dicunt, etiam cum cehesimo redire solitum. In Syria, ad Garada, & in Africa, ad Dyrachium itidè ex modio nauci centum. Illud quoque multum interest in rudi terra, an in ea seras, quæ quotannis obrita sit, quæ vocatur *restibilis*, an in veruacta, quæ interdum requiritur. Cui Agrius. In Olynthia quotannis *restibilia* esse dicunt, sed ita vt tertio quoque anno, vberiores ferant fructus. Licinius. Agrum alternis annis relinquere oportet, aut paulò leuionibus stationibus serere, i. e. quæ minus sugunt terram. Dicitur, inquit Agrius, de tertio gradu, de nutritionibus, atq; alimonis eorum. Licinius. Quæ nata sunt, inquit, in fundo alescunt, adulta concipiunt, prægnantia enim sunt, matris parient poma, aut spicam, sic alia simile ei, à quo profectum est, reddunt semen. Itaque si florem, acerbumve pium, aliudue quid decerpseris, in eodem loco, eodem anno, nihil renascitur, quod prægnationis diem bis habere non potest: vt enim mulieres habent ad partum dies certos, sic arbores ac fruges. *fabæ* & legumina in oleatis vasis obrita cinere perdit in columia coaceruantur.

Ex medio centum. Caterum Dodonæo feritur maior in agris & hortis, floret Aprili ac Maio mensibus & particulatim quidem ac du: fructus Iunio ac Iulio ad maturitatem pervenit. Minor feritur in agris & frequentius apud Zelandos. Ego autem *fabas* vidi florescentes Monspelii mense Februario, & Florentiæ mense Aprili eas aptas. Genevæ mense Maio & Iunio florescentes, maiores & minores, nigrae & albae. Basilæ itidem observavi florescentes mense Maio, & Iunio aptas eas, solentibus maiores habere albas & purpureas; vel rubentes, quales etiam vidi in Watviler Alsatz; Montbelgardum Basilæ curavi utrinque coloris adferendas & ferendas in Horto Ill. E. C. vultgo solent habere minorem albam & nigram.

adferendo.

Antequam verò *Vires* & vsum aggrediamur, scito, quod *Fabarum arrosor*, dicatur, qui in creandis magistratibus sua vendit suffragia; & quibus hinc questus est, *Fabæ vilitate* dicuntur. *Fabibus vilitate* etiam dicitur de Homine qui sordidus est, & qui præ nimia parsimonia quotvis cibos elixat, vt impensis parcat.

Iam verò facultates etiam, quas *Fabæ* Veteres tribuerunt, annotandæ veniunt. Hippocrate igitur auctore, *Fabæ* aluum sistunt, & inflant: quia meatus aliud insuper accedens alimentum non suscipiunt. Aluum sistunt, quia totam alimentum faciem habent. *Fabarum* putamina [inquit Theoph.] arborum radicibus aut germinibus apposita vitam penitus tollunt: non tamen omnibus, sed iis, quæ nuper profusa erant, vt pote imbecillioribus, quia suâ duriâ, siccitatēque, alimentum, partim trahendo, partim arcendo auferunt: alimentum enim destituta protinus moriuntur. *Faba græca* (pergit Diosc.) status ac ventos gignit, ægè concoquitur, graui somnia inducit. Tuli tamen comoda est, & carnes gignit, medium inter caliditatem ac frigiditatem obtinens. Cocta verò cum polca, & vnâ cum cortice in cibo accepta, dysenterias & alui profluvia cohibet. Sed & ad vomitus in cibo idonea est. Minus autem inflat primâ aquâ de coctura diffusâ. At viridis, & stomacho magis incommoda est, & magis flatuosa. Farina *Fabæ* tum per se, tum cum polenta imposita, inflammationes ex plaga mitigat, & cicatrices concolorones efficit: & mammas grumulos lacte turgentes, ac inflammatas iuuat, & lac extinguit. Cum melle verò & Foenugræci farina, furunculos & parotidas, & sugillata d'cutit. Cum Rosa autem, & Thure ac oui candido, oculis procidentes & staphylomata ac tumores ipsorum reprimunt. Eadem cum vino subacta, confusiones & plagas oculorum sedat. *Fabæ* ipsa sine cortice commanâ, ad fluxiones sistendas fronti imponitur. Et cocta in vino, testium inflammationes curat: & ad pubem puerorum imposita, impuberes ipsos diu conseruat. Extent item vitiligines. Ad cortices *Fabarum* impositi, eullos pilos graciles, ac tenues renasci faciunt. Cum polenta verò & alumine scisso, & veteri oleo impositi, thromas d'cutiunt. Et ipsorum decoctum lanas tingit. *Faba* decorticata in duas partes diuisa, quâ parte ex natura coaluit, ad sanguinis ab hirudinibus eruptiones imponitur, ipsaque cohibet, si secundum semelitam partem apponatur.

Fabæ, vt memoris prodidit Gal. lib. 7. simpl. in ed. in exsiccano, & refrigerando secundum utrumque ad medium temperamentum propinquissimè accedunt. Caro *Fabæ* paulum quid abstergentis facultatis continet, sicut cortex nonnihil adstringentis: Idcirco Medicorum nonnulli totam *Fabam* cum oxycrato decoctam dysentericis, cæliacis, & vomentibus, quos *tuemus* nominant, exhibuerunt. Porro, vt edulium, flatulenta est, ac coctû difficilis, si quid aliud: excretionibus ex thorace & pulmone idonea, vt medicamentum verò, foris imposita, sine molestia desiccatur. In podagricis ea sæpenumèr vsi sumus ex aqua decocta, & deinde ad ipsi fusillo admissa. Ad nervorum tum confusiones, tum vulnerationes, farinam eius cum oxymelle impositum. Ad eos, quos ex ictu iam phlegmone occupauerat, cum polenta. Sed & testium, & mammarum aptum est cataplasma. Nam hæ partes, cum phlegmone tenentur, moderate refrigerari amant, maximè cum mammarum ex lacte ipsis concreto phlegmonem patiantur. Quin hæ quoque ab eo cataplasmate

Adagia Fabæ.

Pharmacopœia tenchis, germanica, mœcia.

Temperamentum.

Alui profluvia.

Inflammatio plagi, Mammarum, effectus.

Oculi, dentes.

Pili an.

Sanguis, ruptio, hirsutitas.

Temperamentum.

Caro.

Cortex.

Dysenteria.

Flatulenta.

Podagra.

Nervi.

Phlegma.

mate.

mate extinguatur, sicut puerorum pubes fatinā fabaceā illa plurimo tempore gloria permanet. Et lib. II. de alim. facult. sic inquit: Inflat is cibus quocunque modo appareat: nec per quamvis longam decoctionem id vitii potest amittere, quod pisinā minimē negatum est: deponit enim per illam quicquid habet flatulenti. Qui porro affectus singulos cibos sequi natos, animaduertere, & mente consequi vult, quandam totius corporis tensionem, quasi a flatulento spiritu persentiscet, maximeque, quia ad huiusmodi esculentum non fuerit assuefactus, aut ipsum minus rectē coctum assumpserit. Habent autem Fabae non densam, nec grauem, sed fungosam, leuemque substantiam: quae tamen ipsa non nihil absterioris possidet facultatis, similiter pisinā. Etenim manifestē fabacea farina cutis sordes detergere conficitur. Quod intelligentes mangones, ac mulierculae, in balneis quotidie hac vtuntur, velut alii nitro, atque aphronitro, & in vniuersum iis, quae abstergent. Illinant praeterea & faciem hac, quemadmodum pisina: nam quae in summa cute eminent lentes extexit, & maculas velut ex Sole contractas. Huius ergo facultatis nomine in alui quidem transitu diu cunctantur, sicut quae glutinosa, & crassi succi sunt sine vlla abstergendi facultate, qualia Halicam, Tragum, Similaginem & Amylum esse perhibuimus. Cum porro ferculum ex fresa Fabā paratum, quod ἰνφιαστί Græci nuncupant, flatibus non careat, multo amplius integrē Fabē inflabit cibus, quamquam fritā (nam hoc modo aliquando pro bellariis) statim deponit, sed tum concoctū perdifficilis, tardoque descensu incommodior redditur, & crassi succi alimentum in corpus diffundit. Quod si viridis, immatura, nondumque arefacta edatur, communē omnium fructuum, quos ante perfectam maturitatem ingerimus, rationem obtinens, corpori humidiorē alimoniam exhibebit, ac proinde maiorem excrementorum vim non tantum in viis intestinorum: sed etiam per vniuersum corporis habitum producet. Merito igitur minus quoque nutrit, sed promptius deicietur. Plerique autem hominum non crudas folias Fabas comedentes, vñ eas cum suillā carne decoquunt, veluti olera confueuerunt: ruri verō etiam cum caprina, & ouilla. Alii fabas inflare sentientes, Cepas admiscunt, cum in ollis ex illis pulmentum struunt. Sunt qui non simul elixatas, sed cum pulmento Cepas ingerant eructas. In omnibus namque dapibus quicquid flatuosum continetur, per calefactionem, & extenuantia corrigi comparatum est.

Auxiliatur & morbis raba, inquit Plinius: Namque solida fritā, feruensque, in acre acetum coniecta torminibus medetur. In cibo fresa, & cum Allio cocta, contra deploratas tussis, suppurationesque pectorum, quotidianā cibo sumitur. Et manducata ieiuni ore, etiam ad furunculos maturandos, discutiendo se imponitur: & in vino decocta, ad testium tumores & genitalium. Lomentum quoque ex aceto decoctum, tumores maturat, atque aperit. Item liuoribus, cum buffis medetur. Vocī eam prodesse, auctor est M. Varro. & ab alio etiam siliquarū cinis ad coxendices, & ad neruorum veteres dolores, cum adipis suilli vetustate prodest. Et per se cortices decocti ad tertias, siliunt alium. Nota est officinis (pergit Corn.) Fabā, cum suo lomento. Hinc forsitan existit & illud Martialis.

Gratum minus erit, scisso nec inutile ventris,
si clarā Stephani balnea luce petas.

A Fabis abstineto. Huius ænigmatis varia reperitur interpretatio. Plutarchus enim ad hunc enarrat modum: Abstinentum à tractandis Reipub. muneribus, propterea quod antiquitus in creandis magistratibus suffragia per Fabas vice calculorum ferebantur. Etrursus dicit ob id damatas fabas, quod Lethes & Erebi sint cognomines. His autem quid sibi velit, non satis constat, nisi dicatur Lathyrum & Erebinthum Cicetis genera esse, quae nomina a Letho & Erebo deducantur. Lethes autem Græcis obliuionem sonant, Erebum verò à caligine nomen habere: Inaspiciat voces, sapientiae studiosis. Sed idem ædopol in probl. physicam affert causam, cur Pythagoras à fabis abstinendum iussit, nempe quod omnia legumina spiritum & humorem impurum ingenerent corporibus, atque hanc ob causam ad venerem incitent. In eadem sententia Cicero fuisse videtur, cum scribit ad hunc modum: Iubet igitur Plato lib. I. de Diuin. sic ad somnum proficisci corporibus affectis, ut nihil sit, quod errorem animis, perturbationemque adferat. Ex quo etiam Pythagoreis interdictum putatur, ne fabā vescerentur, quod habeat inflationē magnam in cibus, tranquillitatem mentis quaerenti verē contrariam. Aristoxenus refellit hanc opinionem, affirmans Pythagoram nullo legumine sapientis vsum, quam fabā, quod is cibus sensum aluum subduceret, & laugaret. Porro Gellius, quod in cibus Cyamus repudiaretur, causam erroris fuisse putat, Empedoclis carmina, qui disciplinas Pythagoricas sectatus est, inter quas versus hic inuenitur.

Ah miseri à Cyamo miseri subduci e dextris.

Opinati enim sunt pletique ὀψάμων legumen vulgō dici. Sed qui diligentius, scitiusque carmina Empedoclis arbitrai sunt (Gellii verba sunt) ὀψάμων hoc in loco testiculos significare aiunt, eosque more Pythagoræ opertē atque symbolice ὀψάμων appellatos, quia sint εἰς τὸ κύνει δένει, καὶ ἀπὸ τοῦ κύνει, ad conceptum efficaces, causāque conceptionis, & geniturae humanæ vim præbentes. Idcirco Empedoclem versus isto non à Cyamo [Faba] edendo, sed à rei veneræ proluuiū voluisse homines deducere. Patet ergo quantum à vero aberret Gesh. in explicatione Fabæ Pythagorice, cuius verba hæc sunt. Pythagoras interdicto illo, quo à Fabis abstinere iussit, per Fabas oua intellexit, à quibus nimirum non aliā ratione abstinere voluit, quam à quorumvis animalium carnibus, par homini fore scelus existimans in aue aut auis oio peccanti. Itaque eius discipuli quotidianum illud iactabant, ἴσον τε (ταῖς) κύνεις ἐσθῆν, καὶ φαλάκρην τὴν κύνει, quod est, non differre comedisse oua, & parentum capita. Vocauit autem ouum Cyamon, quod quasi κύνεις [sectura animalis] esset, & conceptum eius intra se clauderet. Apud Ægyptios porro, referente Theone grammatico, tanta est fabarum religio, ut eos neque ferant, neque comedant, imò nec aspicere fas sit. Quin, Herodoto teste, apud Romanos inter funesta habebantur: quippe quas non tangere, nec nominare Diali flammī liceret, quod ad mortuos pertinere putarentur. Nam & lemnibus iacebantur, laruis & parentalibus.

Ceterum fabas venarem stimulare voluit etiam Palladius, ita enim scribit: Pauones, cum Idibus Februarii calere incipiunt, fabā leniter torrefactā in hbidinem prouocantur, si eis quinto quoque die tepida præbeatur. Sex Cyathi vni sufficiunt. Nunc iam contra pruinās sterces ingeratur Persico, vel faeces vini, quod maximè pro-

A Fabis cur abstinendum.
Reipubl. iure
para.

Plutarch.
notatum.

Lathyrus.
Erebinthus.
Lethes s. e.
obliuio.
Erebus, caligo.

Inflatio à
Fabis.

Pythagoras
venerat
Fabis.

Cyamus s. testiculi.

Gesh. nō.

Ægyptii Fabas videre nolent.

dest, cum aqua, in qua faba decocta est, permixta. M. Cato in bonum cibaria annua in iuga singula sumit fabæ modios viginti. Columella nauscantibus subus salutaris habetur eburnea scobis sale fricta, & fabæ minutè fræ commista, ieiunisque prius, quàm in pascua prodeant, obiecta.

Fabæ recentes [vt mea fert opinio, inquit Trag.] innoxie sunt in cibo; iis ergo vtemur: siccas operatilis relinquentes. Sunt qui ex farina fabarum placentas mellitas conficiant, alii, vt Alsatii, ea in faginandis porcis vtuntur, ad quam rem accommodatissima est, siquidem breui tempore eâ faginantur porci, non aliter, atque armenta Cyulo. Chirugi collectiones & tumores locorû, fabaceâ farinâ in aceto & vappa decoctâ, ac calidâ impositâ, oleoque admixto discutere ac sanare consueverunt: eadem farina vino decoctâ, ac calidâ imposita omnibus tumoribus imprimis conducit, siue in mammis mulierum, siue in locis genitalibus, aut quibuscunque aliis oriuntur. Fallopius de thermis cap. ii. Vnum habet præcipuum inter alia, licet sit empiricum medicamentum [in ardote vrinæ] & est aqua extracta & floribus fabarum, vel ex siliquis ipsis recentibus, ad sex vncias exhibita, per tres vel quatuor horas ante prandium, vel conam, addito Syrupo de Liquiritia, vel de Papauere. Idem in eodem casu apud probat Baccius de therm. lib. 3. c. 3.

Faba nostra (Adv. loquuntur p. 394.) legumen neutiquam contemnendum, imò tanti faciendum hodie, vt Vere & tota Æstate, multis in regionibus, magnum sit annonæ supplementum, & non parum multæ gentes panes ex fabis deplant veterinarie, etiamque plebeculæ non incommodos: farinâ autem, aut ipsa tota fresa faba pultes lapidas, & placentas conficiant, efficiantque vt de hac nostra faba dictum putemus, quod Antiqui scribunt, fabæ maximum honorem habitum fuisse, vt quâ panis attentatus sit. Bona maior, siue rasefus, quod ad facultates eius attinet, in alimentorum numero (inquit Dod.) non postremo loco, arida vt cætera legumina, decocta, & in cibis assumpta: nam recens quidem inflat, & status gignit. At rescicata & arida, probeque deinde cocta, minùs aut parum admodum flatulenta est, corpori alimentum mediocre, & illud mediocriter confert: descendit autem cum putaminibus quidem, nec omnino facili, nec omnino tardè, absque his autem aluum constingit, & potens quidem, quæ rubra est. Farina Bonarum, cataplasmatibus præsertim rescicantibus, deficiente fabarum, eius loco hac ætate admiscetur, & non inutiliter quidem. Sicut eius enim temperies parum à medio recessit, ita ad multa utilis est. Talia siquidem medicamenta, auctore Galeno, multis aliis miscentur, ceu materiæ quædam. Abstergenti autem facultatem fabaceæ farine, Bonarum nō habet. Cæterum facultate ac temperamento Bonaminor admodum similis maiori est, non tamen, tam hominum cibo, quàm equorum fagine seruit, ac utilis est. In cataplasmatibus, farina huius idem, quod maioris potest. Vt pueri puellæque non pubescent (auctore Cardano) lomento fabarum assidue loca ea lauibis: detergit enim atque ita prohibet donec cutis solidetur humore glutinoso. In Dysenteria feliciter dedit panem parauit, factum & farina fabaceæ, cui mucem moschatam & bolum præparatum admiscebat, & pistori coquendum dabat. Io. de Mont. exp. ad calculum vesicæ & renum accipit culmos Fabarum, comburit, cineres reponit in faeculum, affundit vinum, & per colat supra cinerem: agro

in balneo dat vncias duas vini, manè & vesperi, quod lapidem mirabiliter frangit. Herc. Saxonia perhibet, Polonos vt ad Plicam [morbum pilorum] litiuo fabis alterato. Gonorrhæam virulentam multi curant (teste Iac. Douyneto) vsu canium fabarum in cinerem redactarum. Caulis deurturur: cinis in aqua fluuiat 24 horas maceratur, colaturque per inclinationem: dosis est ad zuij, per se, singulis diebus noua maceratio faciendâ est: vsus est trium dierum tantum. Sal [vt Querc. defens. Herm. perhibet] siliquarum fabarum inter alios mirum in modum cauitus est & vrens, qui tamen ex iufculo iusta dosi exhibitus admodum diureticus est, vt nihilominus viscerum offensionem efficacissime operetur. Gallinas, si crebrò putamina fabarum edant, steriles fieri testatur Apollonius.

ARACVS FABACEVS, ET FABA

Kayrina, cui semina minora.

CAP. III.



Legumen Descriptio
Lapis quàm cubitale, cuius caules satis crassi, angulosi, inanes, nonnihil hirsuti: folia quaternaria, vel sena, coniugationibus duabus digesta, costæ adherent longiusculæ. Fabæ vulgaris folius similia, hirsuta, nigricantia, neque vllum est foliū, quod imparitatem faciat, pediculus enim, siue pæges in ca-

preolos abit, quibus proxima apprehendit: verum vbi cauli pediculus annectitur, pinnae adnascuntur binæ, veluti in Pisib: atque ex eodem oriuntur loco flores purpurei, similes ferè floribus Viciæ, vel Aphacæ, quibus decidentibus superueniunt siliquæ mediocriter longæ, magnæ, hirsutæ, quibus semina continentur, Pisi ferè magnitudine, grauioribus, & ingratislimi saporis, & odoris, per maturitatem nigra. Flos, quod Dodonæo placet, Bonarum formâ, colore è puniceo nigricans: siliquæ interiori sua parte, albos, mollesque floccos continentes, in quibus semina tria, quatuor, aut quinque rotunda. Erulicæ formâ & magnitudine, subinde paulum maiora, colore nigra, partium, candidum umbilicum habentia, quorum septem, octo, aut subinde nouem semidrachmam pendent. Substantia horum seminum rarior est, ac minùs dura, solidatæ, quàm Bonarum maiorum: dum autem manduntur, fetorem veluti quendam ingratum excitant.

Anno 1608. Augusto mense in horto Fr. C. Bauhini Basilicæ provenit, nomine Fabæ Kayrinæ, siue Egyptiæ, Augusto mense siliquæ erant maturæ, seminata semina Septembri in horto Montb. Ill. E. C. floruit Maio: flores purpurei quidem

Tampar.

Aquila è floribus.

Dysenteria.

Crisis culmorum.

Calculi Plicæ Gonorrhææ

Caulis.

Folia.

Pediculus.

Flores.

Siliqua. Semen.

Substantia.

Faba Egyptiæ.

quidem, ed internè striati, singulares, duæ coniugationes foliorum in vno pediculo ac etiam ternæ: laporis ingrati: siliquæ maturæ Iunio, nigra, asperæ: et adu angustiores, quàm in *cocco vico* Honorii Belli, in iis femina septem, magnitudinis parui Pisi, rotunda, nigra veluti pannus holosericus *velutrum* vocatus: lapor leguminaeus primò, postea odiosus, & quasi sulphureus, cum tantilla acrimonia.

Huius, ni fallor, sit mentio apud Matthiolum in Diosc. cum magnis figuris Lat. & Ital. Fabam siluestrem, *Fabam siluestrem*, sunt qui velint Galeni lib. 1. alim. Aracum domesticum, quia in re fortasse non malè sentiunt, nec vult is eorum sententiæ contradicere. Huic assignat in Epit. flores in purpura albicantes, semen rotundum fabaceo sapore. In Matthioli icon folia quaternaria, flores & siliquæ singulares. Camerarii autem icon folia quædam habet quaternaria, quædam senaria. Idem in hist. germ. apud Matth. refert, Aracum Galeni velle aliquos Fabam sylv. quum opinionem non in totum reiiciat Matth. In horto tandem, Aracum Fuchsi facit, ut Gesnerus picturæ inscripserit, vulgò Viciam Romanam vocatam Fabæ silv. Matthioli, & Pisi nigro, seu Phascolo Dodonæi cognatam plantam. Ego contra Camerarij mihi plantæ persuado, Aracum Fuchsi Gesnero non diuerfam à Fabâ siluest. Matth. vti etiam ex eius scriptura demonstrare etiam nunc possumus. Quum adhuc anno 1560. morarer Tubingæ cum celeberrimo meo præceptore Leonhardo Fuchsi, prædictam plantam primò vidi in horto eius florentem Augusto, quam mihi denominavit *Aracum*, quo etiam nomine plantam siccam cum descriptione misit D. Gesnero, quum curaret suas plantas pingendas. Aracus Fabaceus colleæus Monspelii, quadrisfolius est, qui item Tubingæ.

Dod. gall. Phitolus silv. dicitur, gall. *Fene sauvage*, & *Fene noire*. Faselus sylvestris, & Faselus niger Belg. Wilde Boonen & Swerte Boonen & Moorfsens. fortè est Cyamos & Fabâ. Idem hist. frumenti silvestris. Quæ de Fabâ sparsim apud Theoph. aut alios veteres reperiuntur, multa cum hac Bona conveniunt. Icon placet in latin. hist. in gall. siliquas binas pingebat, non singulares.

Lob. & Pena Adn. fabam silv. præ cæteris credimus delineationem Græcæ fabæ explere. Tab. & C. Bash. apud Matth. *Fabam silv.* vocant. Malè ab Hist. Lugd. eadem planta sub duabus descriptionibus & figuris traditur, duobus diuersis in locis. pag. quidem 451. sub titulo faba silv. pag. verò 472. Phascolus silvestris, siue agrestis. Gesn. de hort. accuratius perpendendum ducit, an Phascolus silvestris, vel niger à Dodon. dictus Phascolus Veterum sit. fabamque Veterum esse negat.

Schvven. cat. Sil. fabam nigram appellat, ni. *Wurzel beyer*, Pisum nigrum, *Schwarz boonen*, Wilde Erbsen, Mohren Erbsen. Pisum *etreg-napton*.

Prouenit spontè in Apulia campestribus locis, in Narbonensi Gallia, ac Aquitania. Apud Belgas rarum est legumen, neque alibi, quàm vbi factum est, prouenit. Sicitantibus in Belgio gaudet. imbribus ac humido cæli statu æruginosum efficitur, maxime cum in flore est, paucis à latrone diebus exit, citòque extollitur. Monspelii mense Aprilis florentem & siliquas habentem in itinere verlus Frontignianum inueni. Geneuæ ha-

bui in horto meo ex semine misso per D. Zuingerum Basileâ, florentem Maio: sequenti anno ex semine deciduo, item Martio. Basileâ copiosum vidi in prædio D. Plateri. In Italia spontè prouenientem repeti. Montbelgardi habeo in horto Ill. Principis ex semine Sturgardiâ & Argentiniâ misso, per doctissimum Medicum D. D. Melchiorrem Sebitzium nomine *Schwarz Erbsen*. Semina matura obseruavi Iulio: mihi etiam missa nomine fabæ silv. Matthioli Sturgardiâ, data Aprilis, florebant Iunio.

Sunt, inquit Matth. qui dicant, eandem cum domestica faba vires habere. Nos autem, si Matthiolus eandem plantam per Fabam silv. intelligit, quum hic tradimus, eandem vires, & facultates concedere non possumus, huic enim ingratis est sapor, Hunc quoque si gustasset Schvvenckfeldius, aliter quàm pares cum Fabâ maiore facultates habere sensisset. Apud Dodonæum nullum Bona hæc habet usum.

ARACVS FABACEVS SERRATVS, ET Cocco vico semine maiorè.



Ex montibus Euganeis circa Patavium attulit plantam D. Agerius Med. Argent. Bona silv. Dod. folio serrato nomine, præcedenti similem caule, flore, ut existimo, purpureo Vicia lepium, & siliquis, quæ, ut illæ, latæ, vncias tres longæ, singulares, ex breui pediculo hæreres, in circuitu hirsutæ: in iis sex Pisi numerauimus,

qualia me latet, quia non erant matura. In foliis tres coniugationes pulchrè dentatæ, præter alas binas: folia in capreolos desinunt, ad quorum latus præter coniugationum, foliolum vnum solum adest, minus cæteris.

Anno 1608. Septembri seminus Montbelgardi, in horto Ill. C. Wirtemb. semen, cuius inscriptio erat: *Cocco vico* Honorio Bello. Hoc anno sequenti plantam produxerat, quæ florebat Maio: similis autem erat præcedenti Araco fabaceo priori, verum flores bini, omnino purpurei, internè non striati, pictiue in foliis: ternus ordo paruorum foliolorum, quorum quædam planè similia sine serraturis, alia verò cum serraturis: alæ in principio pediculorum cristatæ, ut in Araco fabaceo serrato. Sapor non displicet in siliquis latis numeravi septem grana, sapor in virentibus leguminosus, cum aliqua ingratitudine.

An hic idem sit cum serrato nostro considerandum, folia quidem maiora, sed id à cultura accidere potuit.

Mense Iunio siliquæ maturæ, latiores multò, quàm in Fabâ Kerrina, Pisa autem duplè maiora, minus nigra, cum hylo albo: sapor idem.

Vires:
Matthioli
error.

Schvvenck
notatur.

Locus:
Bona silv.

Descriptio
Flor.
Siliqua.

Semen.

Folia.

Locus.

Cocco vico
Tempus.
Flor.
Folia.

Ala.
Sapor. Siliqua.
Semen.

Tempus.

LUPINVS VVLGARIS SEMINE ET
flore albo, sativus.

CAP. IV.

Descriptio.

Caulis.

Folia.



Flores.

Siliqua.
Semina.Sapor.
Radix.
Lupini Gu-
de dicti.Lupini Ge-
deria.Terram a-
vise.Variat se-
cundum re-
gionem.

Lupinus vul-
garis sativus, cubitalis &
sesquicubitalis
est herba, caule
mediocriter
crasso, ex viridi
flavescente, te-
reti, hirsuto, ra-
moso: folia al-
ternatim oriun-
tur, glauca su-
perne, & gla-
bra, inferius
magis albican-
tia & lanugino-
sa, in quinque,
sex, aut septem
segmenta radi-
catim ad pedi-
culum vsque
teretem, vncias

duas, aut tres longum, incisa: spore subamaro,
leguminoso: flores ad divaricationem ramorum
peculiari fureulo enato insident; colore albido,
pallidente, Cæsalpino flos candicans, aut ad cæ-
ruleum vergens, folio vno latiusculo sursum re-
flexo, lateralibus duobus quartum rostro caru-
leo [sub quo apices latent crocei] insigne an-
plexis: sequuntur siliquæ pro florum numero
plures simul iunctæ, fabacearum instar furellæ,
villosæ, pulposæ, compressæ, in ambitu crenatæ,
intus glaucæ, in quibus semina quina, sena, &c.
membranis dissepita, orbiculata, & nonnihil an-
gulo la, compressa, quæ scilicet parte siliquæ adhaerent,
cauitatem quandam, veluti umbilicum exiguum
habentia, foris alba, intus lutea, sapore amaro, ta-
dix dura, alba, multifida.

Lupinorum autem appellatio non aliunde du-
cta videtur, quàm quod sicut lupus terram appetit,
& in fame terra vescitur, ita Lupinus tellurem,
vt Plinius ait, ad se amat, vt quamvis fructuoso
solo coniectum inter folia, vepresque, ad terram
et tamen radice perueniat. Lupinus etiam, velut lu-
pis expositus & relictus, dictus videri potest, ex
eo, quod, vt idem Plin. ait, impune iacet, vel dere-
lictus, si non protinus secuti imbres, ab omnibus
animalibus amaritudine sua tutus. Duo sunt Lu-
pini genera, Dioscoridi, Plinio & Galeno, sativus
& sylvestris. Nos de hoc agemus pauld post. Re-
medium eius [sativum] ne metentes fugiat exilien-
do, vt ab imbre tollatur ait Plin. lib. 18. cap. 14. Nec
vilius, quod feritur, natura assensu terræ mirabi-
lior est: Primum omnium cum Sole quotidie cir-
cumagitur, horasque agricolis etiam nubilo de-
monstrat. Terram amat, terraque operiri non
vult. Cætera, quæ de hoc Veteres prodidere, sa-
tioni, cultura, loco, tempori, viribus & vsui refer-
uauimus.

Cæterum, Lupini cognitionem, vt & multa-
rum aliarum plantarum, nonnunquam impedire
potest regionum varietas. In Hetruria enim ac
quibusdam aliis locis [vt Maranthe observauit]
amarissimus est, atque iumentis cum maximè auer-
santur: in Campania verò modicam aut nullam
habet amaritudinem: estque iumentorum ita

gratum pabulum, vt eo per Hiemen vescan-
tur.

Auicenna, Tragi testimonio, Lupinum elegan-
ter depinxit, nisi quod falsè Fabam esse Ægypti-
acam affirmavit, id quàm à veritate abisti nemini
obscure esse potest. Serapio tria Lupini genera
commemoravit, vnum sativum & duo sylvestria,
vocatque *Tarinus*, & primum genus *Regales*, *A-*
uerroës Tormos. Apuleio *Thermos orinos*, Lupinus
montanus. Dioscoridi *βίσημος*, & Brechon
appellatur. A Galeno, ob varias, quibus pollet,
vtilitates *πρωξενος* dicitur. Apud Hebræos *Tal-*
tan vocatur, vide *Arch. Monisteri*.

Nullis pestiferis, auctoritate Matthioli, plantis
strangulatur Lupinus: cum ipse noxias omnes
strangulet herbas, quæ illi adnascuntur. A Mau-
ritanis *Tarinus*, Arinus, seu *Tormus* appellatur.

Lupinum [inquit Corn.] Feigbonen appel-
lant, quasi *Ficus Fabam* per antiphrasim &
Luporum *Pisa*, quasi dignum sit illis edu-
cium.

Sed nec ita procul [Lob. & Penâ iudicibus in
Advers.] absunt à Fabacis, & Phaeoli fructus,
quos *βίσημος* Græci vocarunt, quia calidiores cat-
eris leguminibus essent, aut potius, quod *βίσημος*
[calida aqua] lavarentur, & macerarentur, quo
amarorem exuerent tristitem & molestum, à quo
etiam *πρωξενος*, vnde Virgili Epitheton. *Tristif-*
que Lupini *Συσφύλλης calamus*. Idem Obs. inter
alia fabæ ficulnæ nomen huic tribuunt. Iconi.
verò Plant. p. 64. Tom. 2. Lupinus sativus:

Notat Hist. Lugd. quod folia huius sub vespere,
Solis occasum veluti præsentientia, flaccida
facta deorsum vergant.

Illud tandem memoratu dignum, quod *Car-*
mer. in horto perhibet: Lupini albi, inquit, in
quorum genere reperiuntur maximi, flore ante-
quam aperiantur, subcaruleo, intus verò albo,

Plautus nominat Lupinos, Aurum comicum
nam in scena nummis ex Lupino factis, pro au-
reis utebantur Comici. Et nunc etiam in Italia
pueri ex his nummos efformare solent, vnde
Horatius:

Nec tamen ignorant, quid distent ara, Lupinis.

Voluit namque hoc versu significare, illos mini-
mè latere, sed scire quantum probati nummi di-
stent à falsis, itemque boni viri à malis. Notabis
autem Salomonem Albertum apud Horatium
hoc in loco legere *Eruda*, pro *ara*.

Cæterum Lupinus sativus omnibus passim au-
toribus & officinis Lupini simpliciter dicti no-
mine innotescit. Græcis vocatur *βίσημος*, *βίση-*
μος; Germ. *wißf bonen* / *Feigbonen* / *wolff-*
bonen, wolff & *ßbonen*: Belg. *Vûd-boonen*
& *Lupinen*. Gall. *Lupins*: Ital. *Lupino domestico*,
Hisp. *Entramuces*, & *Entramocos*. Ang. *Lupines*.

Ne porro, quæ distulimus, hoc in loco negli-
gamus, ad Veteres reuertimur. Lupinum igitur
[autore Theop. lib. 8. hist. cap. ii.] ex iis, quæ sil-
vestria quasi putantur proprietatem quandam
tum in generatione, tum in germinatione sortiri
placè videretur. Nisi enim hoc protinus [licet ro-
bustissimum sit, ab arca terræ mandaueris, malè
proveniet. Atque in totum condi hoc legumen
subter terram reculat: quæ de causa ne subarantes
quidem id ferunt, & sepe si in materiem, aut her-
bam prædesam quampiam incidat, eam vi sum-
mâ impellendo deducit, radicæque terram con-
tingit, & germinat. Et vnum hoc [pergit Plin.
lib. 18. cap. 14.] feritur non [aratro] arato. Nihilque
aliud nullo impendio constat, vt quod ne feren-
di quidem gratia opus sit afferre. Protinus feritur

ex aruo [ex arca Theoph.] ac ne spargi quidem postulat decidens sponte. Coli non vult, itaque adeo non eget fimo. Lupinum teste Theoph. Ciceri & Eruo, quæ omnium maximè durant, longè diuturnius est. Condi in fimo maximè conuenit, quoniam in humido vermiculi vmbilicum eius in sterilitatem castrant. Si depastum sit in fronde, in arari protinus solum opus est.

Querit maximè fabulosa, & sicca, atque etiam harenosa loca. Ex densiore terra rubricam maximè amat. Cretofa tantum limosaque odit, & in iis non prouenit, teste Plinio, Theophrasto quoque perhibente, solum arenosum & vitiosum potius poscit, atque in totum cultus promouere non vult. A nobis Montbelgardi plantatus in horto E. C. feliciter prouenit, sed à muribus deuoratur, vt euenit anno 1588. Matthiolo feritur in agris, sterili solo in Hetruria.

Primum omnium feritur, secundum Plinium, nouissimum autem tollitur: vt cumque Septembri ferè mense, quia si non antecessit Hiemem, frigoris obnoxium est. Ter præterea floret. Apud Germanos quidem (Dodon. loquitur) sub finem Maij; deinde Iunio, aut initio Iulij: tertiò verò Iulio, aut Augusto mensibus, si anni tempestas calida siccaque fuerit, fructus sapè ad maturitatem peruenit. Nobis semen maturum factum Augusto, Septembri & Octobri, floret Iunio. Genecæ florentem habuimus Iulio, Basileæ etiam Maio. Cæsalpino feritur mense Augusto, ac paulò antè colligitur.

Lupino, iuxta Plinium, multiplex vsus: nam non duntaxat homini, & quadrupedum generi vngulas habenti, communis: sed pinguefcere hoc etiam satum, arua, vineaeque dixit, ita vt optimi fimi vicem repræsentet. Sed ad terram rubricam alendam post tertium florem verti debet, in sabulo post secundum. Maceratum autem calidà aqua homini in cibo est. Puerorum ventribus impositum pro remedio est. Bouem vnum modii singuli satiant. Lupini semen; *πολύχρονος* est, inquit Galenus lib. 1. Alim. Eluxum enim, deinde in aqua dulci maceratum, tantisper dum in hac omnem fidi ingentiam exuerit insuauitatem, ita demum manditur cum Gato, ac Oxygæro, vel etiam sine his, sale mediocri conditum, non quomodo Hordeum, & alia, quæ variè apparantur. Lupini dura ac terreftris est substantia: quocirca ipse concoctum difficilis est, succumque crassum gignit ex quo non probè in venis concoctum, succus, quem crudum vocant, procreatur. Cæterum cum inter parandum, quicquid habeat amaritudinis, depomat, *αἰνέοις*, qualitatibus, quæ sensu deprehendatur, expertibus, similis euadit. Par igitur est ipsum, neque ad deiectionem, neque vt adstringentia ad fluxum ventris cohibendum esse accommodum, sed tardè descendere, & difficilè deici, ac pertransire. Idem lib. 6. simpl. Lupinus edi potest coctus, multis antè diebus per macerationem amaritudine in aqua deposita, sique tunc nutrimentum succi crassi. Cæterum vt medicamentum ita præparatus, ex genere est emplasticorum. At vbi natia etiam dum manet amaritudo, extergendi, digerendique vim obtinet: interficet lumbricos, tum illic, tum addito melle linctus, tum ex posca potus. Quin & decoctum eius lumbricos eicere potest, tum etiam foris idemdem persulum, vitiligines, achoras, pustulas, psoras, gangrenas, vlcera maligna iuuat. partim extergendo, partim citra mordacitatem digerendo, siccandoque: expurgat iecur & lienem, cum Ruta & Pipere suauitatis gratia, assum-

ptum. Elicit menses, ac factum cum Myrrha & melle impositum. Porro Lupinorum farina sine mordacitate, digerit. Nec enim liuida tantum, sed & cheradas, & phymata curat: sed tunc in aceto, aut Oxymellice, aut posca coquatur oportet: idque pro agriorum temperamento, & affectus diuersitate, quod ex vsu est eligendū. Digerit item, quæ liuida sunt: & quæcunque modò diximus, præstare posse decoctum, eadem omnia efficit & farina. Sunt verò etiam, qui eam ischiadicis cataplasmatibus modo illinunt. Lupinum satium notum esse, Diosc. tradit, & eius farinam cum melle delinctam, aut cum aceto potam lumbricos expellere. Sed & ipsos aquà maceratos, si amari adhuc edantur, eadem facere. Et decoctum ipsorum cum Ruta & Pipere potum, idem facere. Vnde etiam splenicis prodesse: & gangrenas, vlcera fera, theiomata appellata, scabies incipientes, vitilignes, maculas, pustulas, vlcera capitis manantia, ipso vtilissimè perfundi ac foueri. Idem etiam menses & sætus detrahere, cum Myrrha & melle appositum. At farinam pergere cutem & liuida. Cum polenta & aqua mitigare inflammationes. Cum aceto verò, coxendicum dolores, & panos lenire. Strumas dissipare Lupinum in aceto coctum, & impositum. Ita etiam Carbunculos rumpere. Cum aqua verò pluvia coctos; donec succum remittant, faciem depurgare. Cum Chamæleonis nigri radice coctos, oculi scabiem sanare, si decocto tepido eluatur. Radicem autem coctam cum aqua, & potam, vrinam mouere. Edulcatos tritos, cum aceto potos Lupinos; stomachi fastidium lenire, & appetentiam ad cibum facere.

Seruntur (inquit Matth.) in Hetruria non modò ad alimentorum usum, sed ad agros impinguandos: Dulcorantur in Italia, ibique frequenter eduntur cum sale. Excalefaciunt & siccant manifestè, abstergunt, aperiunt, digerunt, resoluunt, & attenuant. Cæsalpino teste, Lupini semen aquà calidà præmaceratum; amaritudinem demissa, gratum gustui redditur, vt citra aliam coctionem edentur. Quod Theoph. dixit, viridem à nullo animali mandi propter amaritudinem, de fructu intelligendum est: nam hodie etiam pro boui pabulo feritur inter rapas. Lupini sati (vt vult Aug. Gall.) impediunt vermes frumentum rodentes, & agros macilentos impinguant.

LUPINVS EXOTICVS HIRSVTISSIMVS



Elegantissimum huncce Lupinum Cl. D. D. Felix Platerus *Arabia* Basileensis summus amicus noster in pereleganti suo Herbario sic eo habet. A quo mutua acceptam plantam hoc loco describere ac depingere par est. Ramus est subitans, vili-

Mense

Phyma

Ischiad

Lumbri

Gangren

Inflammationes

Carbunculi

Oculi scabiei

Fastidium

Temperamentum

Theoph. explicatur

Agris colligitur

Folia. Iosissimâ hirsutiae byssâ oblitâ in ramos brachia-
Flor. atus, qui *folia* longis pediculis harentia emittunt,
 quinquepartita, penitus villota, foliis Lupini
Siliqua. sativi alioqui haud multum dissimilia. Ramotum
 summitatibus *flor.* insident aliquot caerulei, hî-
 ates, minores quàm Lupini vulgaris, succedunt
siliqua alterno situ posita, penitus villosa, surre-
 ctæ, viciales, longiores, nec dum fructum con-
 tinentes, brevibus pediculis harentes, ad quo-
 rum exortum alia quædam lanuginosa, præan-
 gusta folia prodeunt.

Huius semen existimamus esse, quod floren-
 tiâ à Casabona magni Ducis Hetruriz hortu-
 lano, nomine Lupini siluestris Candix accepi-
 mus, quodque hîc sua magnitudine appingi cu-
 rauius, maius nimirum & crassius vulgari. To-
 tum luridum est colore, & aliquantum variega-
 tum, compressum, asperum, eo loco vbi umbili-
 cus, exactum.

Lupinus sil-
vest.
Candia.
Semen.
Color.
Locus. In horto Corolocastrensi provenit Lupinus
 caeruleus, Hispanicus, latifolius, hirsutissimus, quæ
 in dicto horto legimus anno 1608. pulchrè flo-
 rentem. Omnino è respondet iconi huic no-
 stræ. Aiebat plantarum studiosissimus Arnold.
 Gilenius Med. Cand. Castellæ nomine Lupini
 Indici missum, cum illi plantam ostenderemus.

Descrip.
Clusii. Clusius hunc, ni fallor describit, nomine Lu-
 pini caeruleo. purpurei. Natum, inquit, quoddam
 Lupini genus fuit Lugduni Batauorum, semine
 peregrè accepto, crevitque in cubitale, aut
 maiorem altitudinem, satis firmo scapo & in ra-
 mos diuiso præditum: cui, vt in aliis Lupini ge-
 neribus, inhærebant folia ex vno longo pedicu-
 lo dependentia, septena, aut plura, molliora ta-
 men, quàm in eo, qui flauum profert florem,
 paulò etiam latiora, longioreque lanugine ob-
 sita: flores extremum caulem, & ramos, tribus
 quatuor, aut pluribus ordinibus ambiunt, ver-
 ticillatim, aut coronæ instar, in orbem dispositi,
 quaterni, & quini, iis qui albi sunt, ferè æquales,
 sed coloris ex caeruleo purpureiscentis & elegan-
 tis: quibus successerunt siliquæ non disparces
 vulgari sativo, in quibus fructus illo non minor,
 verum alterius coloris. florebat Iulio mense,
 semen Septembri maturum fuit. Cum anno
 1565, è Lusitania per Baturiam in Granatensem re-
 gnum transfret, meminit februario mense agros
 Lupino confitos videre, cuius flores albi, aliquid
 caerulei commixtum haberent: an huius fuerit
 generis, ignorat Clusius.

Folia. Clusius hunc, ni fallor describit, nomine Lu-
 pini caeruleo. purpurei. Natum, inquit, quoddam
 Lupini genus fuit Lugduni Batauorum, semine
 peregrè accepto, crevitque in cubitale, aut
 maiorem altitudinem, satis firmo scapo & in ra-
 mos diuiso præditum: cui, vt in aliis Lupini ge-
 neribus, inhærebant folia ex vno longo pedicu-
 lo dependentia, septena, aut plura, molliora ta-
 men, quàm in eo, qui flauum profert florem,
 paulò etiam latiora, longioreque lanugine ob-
 sita: flores extremum caulem, & ramos, tribus
 quatuor, aut pluribus ordinibus ambiunt, ver-
 ticillatim, aut coronæ instar, in orbem dispositi,
 quaterni, & quini, iis qui albi sunt, ferè æquales,
 sed coloris ex caeruleo purpureiscentis & elegan-
 tis: quibus successerunt siliquæ non disparces
 vulgari sativo, in quibus fructus illo non minor,
 verum alterius coloris. florebat Iulio mense,
 semen Septembri maturum fuit. Cum anno
 1565, è Lusitania per Baturiam in Granatensem re-
 gnum transfret, meminit februario mense agros
 Lupino confitos videre, cuius flores albi, aliquid
 caerulei commixtum haberent: an huius fuerit
 generis, ignorat Clusius.

Flor. Clusius hunc, ni fallor describit, nomine Lu-
 pini caeruleo. purpurei. Natum, inquit, quoddam
 Lupini genus fuit Lugduni Batauorum, semine
 peregrè accepto, crevitque in cubitale, aut
 maiorem altitudinem, satis firmo scapo & in ra-
 mos diuiso præditum: cui, vt in aliis Lupini ge-
 neribus, inhærebant folia ex vno longo pedicu-
 lo dependentia, septena, aut plura, molliora ta-
 men, quàm in eo, qui flauum profert florem,
 paulò etiam latiora, longioreque lanugine ob-
 sita: flores extremum caulem, & ramos, tribus
 quatuor, aut pluribus ordinibus ambiunt, ver-
 ticillatim, aut coronæ instar, in orbem dispositi,
 quaterni, & quini, iis qui albi sunt, ferè æquales,
 sed coloris ex caeruleo purpureiscentis & elegan-
 tis: quibus successerunt siliquæ non disparces
 vulgari sativo, in quibus fructus illo non minor,
 verum alterius coloris. florebat Iulio mense,
 semen Septembri maturum fuit. Cum anno
 1565, è Lusitania per Baturiam in Granatensem re-
 gnum transfret, meminit februario mense agros
 Lupino confitos videre, cuius flores albi, aliquid
 caerulei commixtum haberent: an huius fuerit
 generis, ignorat Clusius.

Tempus. Clusius hunc, ni fallor describit, nomine Lu-
 pini caeruleo. purpurei. Natum, inquit, quoddam
 Lupini genus fuit Lugduni Batauorum, semine
 peregrè accepto, crevitque in cubitale, aut
 maiorem altitudinem, satis firmo scapo & in ra-
 mos diuiso præditum: cui, vt in aliis Lupini ge-
 neribus, inhærebant folia ex vno longo pedicu-
 lo dependentia, septena, aut plura, molliora ta-
 men, quàm in eo, qui flauum profert florem,
 paulò etiam latiora, longioreque lanugine ob-
 sita: flores extremum caulem, & ramos, tribus
 quatuor, aut pluribus ordinibus ambiunt, ver-
 ticillatim, aut coronæ instar, in orbem dispositi,
 quaterni, & quini, iis qui albi sunt, ferè æquales,
 sed coloris ex caeruleo purpureiscentis & elegan-
 tis: quibus successerunt siliquæ non disparces
 vulgari sativo, in quibus fructus illo non minor,
 verum alterius coloris. florebat Iulio mense,
 semen Septembri maturum fuit. Cum anno
 1565, è Lusitania per Baturiam in Granatensem re-
 gnum transfret, meminit februario mense agros
 Lupino confitos videre, cuius flores albi, aliquid
 caerulei commixtum haberent: an huius fuerit
 generis, ignorat Clusius.

LUPINVS LUTEO FLORE, semine compresso, vario.

Descriptio. Lupinus luteus insignibus aliquot notis à
Floribus vulgari distinguitur: potissimum autem flo-
Gensita. re luteo, aded vt decerptus pro Genistæ fallat,
 verticillatim dispositus, interposito spatio sæpè
 duos, vel tres, nonnunquam etiam septem ob-
 seruavi verticillos. Odore grato ad Leucoi lu-
 tem accedente: deinde verò semine, quod compres-
 sa formâ & magnitudine albo ferè par, colore va-
 rium est, albo fuscq; maculosum, areolâ albâ ceu
 zonula circa germinis regionem cinctum, sili-
 quis lanuginosis clausum, reliquis plantæ vul-
 tus, satiuo, seu albo Lupino similis, *folia* digita-
 ta, vtrinque hirsuta: caulis teres, brachiatus, vil-
 losus: radix simplex, recta.

Locus. Dodon. Hist. gall. & latine videtur iconè Lu-
 pini siluestris lutei, luteum huic repræsentare.
Flor. & bel. & Pena Adu. Lupinum floribus Genistæ



Türkischer Veiel. Tab. Geel seigbonen/ Lupi-
 nus luteus. Casp. Bauh. apud Match. Lupinus
 silu. luteus Germ. Viola Turcica. Semina sapo-
 re amarissimo. Hist. Lugd. Lupinus silu. Dodonæi.
 Clus. Hist. Lupinus flauo flore.

Lupinus luteus sæpius à me factus in horto E.
 C. provenit: sed semen non maturuit: florentem
 vidi mense Augusto & Septembri in horto Ge-
 nerosi D. Baronis à Morouie Bessfordiz, eius au-
 tem coniunx vocabat Spanisch Veiel. Mensis
 Octobri pulchrè aliquando floruit & semine ferè
 maturo fuit in horto E. C. anno 1594. satius Ap-
 rili floruit Iunio quoq; anno 1578. cum D. Guil-
 lelmus Landgrauius misisset, sed non maturuit
 ob siccitatem aris, vt puto. Generæ habui pri-
 mum in horto, flore odorato Iunio, foliis mino-
 ribus, quàm in vulgari; maioribus, quàm in co-
 eruleo. Basilæ vidi in horto D. D. Felicis: semina
 etiam matura collegi in horto Generosi D. Baro-
 nis à Polviller. Anno tandem 1597. Augusto
 mense in horto Montbelgardeni plantæ aliz flo-
 rentes, aliæ semine maturo vario effecæ, cum se-
 ptem florum verticillis observavi. Gen. Io. Henr.
 Cherl. attulit Monipelio, confirmavitque autho-
 ritatem Lobelii, scribentis: Monipeli in sativæ &
 cultis, herbariorumque hortis visitur Lupinus
 floribus luteis. C. Bauh. licet apud multos spon-
 tæ oriatur, apud Germanos tamen hortensem fi-
 cit. In Germania verò provenire Dodonæus scri-
 pfit, etiam sæpè ad maturitatem.

LUPINVS SILVESTRIS, PURPUREO FLORE, SEMINI ROTUNDO, vario.

Descriptio. EX siluestrium Lupinorum genere est vnus
 caule cubitali, robusto recto, tereti, striato,
 solido, alis satis frequentibus concavo, & ramo-
 so: *folia* Lupini sativi, nonnihil hirsuta, multò
 minora, in quinque, sex, vel septem radios lon-
 gos, angustos, filia: pediculo harent longo, sa-
 pore ingrato & odioso: flores longâ serie crebri
 agminatim ascendentes, Cicercularum & Pifo-
 rum flores referunt, coloris purpurei: quibus suc-
 cedunt siliquæ rectæ, semina continentes parua,
 stigmatis variata, rotunda: radicem porrò demittit
 satis profundè, non magnam tamen, glandulis ad
 fibræ adnatis strumolam.

Dioscoridis videtur *βίσημος* [Lupinus
 silv.] satiuo in omnibus similis, minor verò. Quo
 in loco



in loco, autore Cornario, Diosc. dicit *pro melle*. Sed declarat rem hanc Plin. lib. 22. cap. 25. Lupini quoque inquit, siluestres sunt, omni modo minores sativis, præterquam amaritudine.

De hoc Matthiol. Ital. cum magnis fig. Lupini silv. floribus roseo colore rufescentibus. Lupinus

agrestis, Ital. *Lupinus sativus*. Aliter apud eundem Hist. germ. Vbi figura notata est litera N. sua Epitom. Camerar. Lupinus silv. flosculis è cæruleo purpureascentibus, aut subrubentibus: siuctus minuti, colore fordido, vario & nonnihil liuente aspersi: quide feigbonē. Idem in horto paruitatem fructus exprimens, Lenti comparat, crassioram tamen assermat. De hoc & sequentes.

Cæsalp. Lupini genus sponte provenit in locis arenosis, brevius: folus angustissimis: siliquis tenuibus, flosculis cæruleis. Tab. Klein feigbonen, Lupinus minor flore rubente. C. Bauh. apud Matth. De Lupino flore purpureascente, latifolio, hirsuto, seu siluestri Dioscondis, dicitur in historia exhibitâ simul figurâ, prout sponte in loco Gramuntio propè Monspelium provenit, qui luteo flore & ramosior est. Lupinus cæruleo flore angustifolius [cuius iconem proponit ex Tabernam.] foliis multo angustioribus, & minoribus, vt figura ostendit, communiter in septem partes diuisis: flosculis quàm in illa minoribus, quibus siliquæ multo minores succedunt, vix conspicuâ lanugine hirsutæ, quibus semina minuta, rotunda, colore fordido, variis maculis aspersa & amara reconduntur. Hec Fraxer. Ego verò Lupinum purpureascentem, quem Monspelii obseruari, etiam apud nos cultum, latifolium dicere non possum, nec etiam hirsutum, quia ita levis hirsuties, vt eius mentionem non fecerit Lobelius in sua descriptione, nec etiam Camerarius. Cur separemus Lupinum minorem Tabern. à Monspellulano purpureascente, consideratâ solâ iconem, non videmus. Nec Tabern. dicit suum Lupinum cæruleum, sed *Wortich* / subrubrum. An Anguill. Lupinus siluestris Dodon gall. Lupinus est siluestris, cæruleus, & ruber, quem postea in Hist. frum. Lupinum silv. purpureum vocat: in fol. autem Lupinum purpureu, flore ex purpurâ cæruleo, aut subrubente. Lob. & Pena Adv. Obs. & Ic. Pl. p. 65. Tom. 2. Lupinus silv. flore purpureo, & puniceo, fructu minore, guttatis, aut fortuitis asperso maculis pullis, cineris ceis & casis. Sed horum Icon cum floribus verticilli modo dispositis non placet, in luteo tantum obseruari. Clus. vocatur Lupinus flore cæruleo.

Lupinum silv. flore purpureo Monspellii primum, dein Florentiæ florentem in agris Aprilis mense vidi. A Landgrauio Hassiâ missa grana nomine Lupini cærulei, florem mense Nouembri & Decembri, Montebelgardi Autumno clemen-

Tom. II,

tiori primò produxerunt. Habni etiam Argentinâ ex horto D. Friderici Meier, quæ satâ vix maturare quidd tardius florent, quàm luteus etiam, aut albus. Matthioli siluestrium Lupinorum innumeræ exoriuntur plantæ in Hetruria, quæ Maio mense in campestribus visantur. Lobelio in satis & culus Gramuntio luto circumiectis non procul Monspelio sæpè occurrit. Lupinus flore cæruleo (pèrgit Camer.) crescit sua sponte in Italia circa Viterbium, & Pisam, Neapolim & Romam, ac apud Samnites & alibi. In inferiore Germania, ait Dod. fructus raris ad maturitatem peruenit. Clusius tandem in Gallia Narbonensi inter segetes non procul Monspelio ultra flumini Ledum sponte natum obseruabat.

Dissentiunt circa vires Diosc. & Gal. Ille enim hunc eadem, quæ sativum, præstare scribit. Gale-nus autem amariorem dicit, & ad omnia valentiorum sativo, facultasque valentioris. De vitibus & vñ Lupini silv. ita Plinius nobis sentitæ videtur. Lupini quoque siluestres sunt, omnimodè minores sativis, præterquam amaritudine. Ex omnibus quæ eduntur, sicco nulli minis ponderis est, nec pius vitilatis. Mitescent cinere, aut aqua, calidis. Colorem hominis frequentiores in cibo exhilarant: amari contra aspidas valent. Vlcera atra, aridi decorticatque triti, supposito lin-teolo, ad vitium corpus redigunt. Strumas, parotidas in aceto cocti, discutiunt. Succus decocto-rum cum Ruta & Pipere, vel in febris datur ad ventris animalia pellenda, minoribus triginta ap-norum: pueris verò impositi in ventrem ieiunis profunt. Et alio genere tosti, & in defuncto poti, vel ex melle sumpti, lidem auiditatem cibi faciunt, fastidium detrahunt. Farina eorum aceto siccata papulas, pruritusque in balnei illita cohibet, & per se siccata vlcera. Liures emendat. Inflammationes cum polenta sedat. Syluestrium efficacior vis est contra coxendicum & lumborum debilitatem. Ex iisdem decocta lentigines corrigunt: si verò ad melis crassitudinem decoquantur vel sativi, vitiliginis nigras & lepras emendant. In silv. Lupini semine, ait Portus, guttatim & fortuitè aspersè maculæ pullæ & cinere, verè à serpentum designationi satisfacit: vnde contra aspidas valet.

Vires & sus.

Color.

Vlcera.

Struma.

Animalia ventris.

Farina.

Aspid.

CICERA ANTIQVIS CAP. V.

Cicera Columellæ bubus Erui loco fixa datur, in Hispania Bætica, quæ cum suspensa mola durâ est. pauld in maceratur, dum lentescat. Atque ita mista paleis subtritis pecori præbeatur. Sed Erui duodecim libræ satisfaciunt vni iugo, Cicera sexdecim: eadem hominibus non inutilis, neque iniucunda est. Sapore certè nihilo differt à Cicercula, colore tantum discernitur. Nam est obsoletior, & nigro propior, feritur primo, vel altero sulco mense Martio, ita vt postulat soli latitia, quod eadem quatuor modis, nonnunquam & tribus, interdum etiam duobus, ac semodio iugerum occupat. Nos sanè de hac Cicera penitus nihil, quod dicendum occurrat, apud alios inuenimus, quàm quodd à Cicere ouino, teste Cornario, sit diuersa.

us.

Sapor.

Satio.

CICER. IN GENERE CAP. VI.

Cicercis duo fastigia summa licet Diosc. Gal. & Plin. constituant, attamen Theophr. qui hos

B b

tempore multum antecessit, aliter longè sentit,
ita siquidem scribit.

Epilobides [Cicer] magnitudine, & sapore, & odore [*καὶ τοῖς χυμοῖς, καὶ τοῖς χρομασι* : succis & coloribus] & formā plerasque differentias ostendit, ut *Arietinum* & *Columbinum*. Candida inter omnia dulcedine præstant.

Columbinæ

Porro summa illa duo genera *satiuum*, & *filue-*
Satiuum, stre. Satiui quidem differentiz aliquot.

Scripps,

Dioscorides sativi alterum genus *Arietinum* appellat. Silvestre, foliis sativo simile dicit, ast odore acri [gravi, Plin.] semine differens.

Plumis diff.

VENT 14.

Ar1615714772

Columbus.

Venercloth.
Finger cloth.

1947

Plinius differentias Ciceris plures sumpsit etiā
à magnitudine, figura, colore, sapore. Est enim,
inquit, atrietino capiti simile, unde ita appellatur,
album, nigrumque: est & Columbinum, quod
alii Venerum vocant, candidum, rotundum,
leue, Atrietino minus; quod religio perutigillis
adhibet. Est & Cicercula minuti Ciceris, in-
qualis, angulosi, velut Pisum. Dulcissimum au-
tem id quod Erui similimum: firmiusque quod
nigrum, & rufum, quàm quod album. Patet er-
go & Plinium duo hęc sic fice Ciceris genera, A-
trietinum, & alterum Columbinum, quod & Ve-
nerum dicitur: *describat* id, nempe Eruium
Theophrastus vocat, quod his declarat: dulci-
ssimum autem id quod Erui similimum.

Column 2.

differeat.

PHYSICIAN.

Valens dis-

Jerencia.
Francia.

[illegible]

Columela hoc Punicum appellat, qui & ipse duo Ciceris genera tradit, inquit: Cicer Arietinum vnum vocatur, & alterum Punicum, quod toto mense Martio scri potest. Tandem Galenus quoque duorum generum meminit, Arietini videlicet & Eruii [*εραϊνός*]. Ita siamque scribit Alim. lib. 7. cap. 22. Cicer nigra lingua, in Bithynia maximè prouentientia, Arietinaque ipsa nuncupant. Item simpl. 6. Erebinthus [Cicer] legumen est huiusom. Quod vero Arietinum appellatur, &c. At alterum Eruium appellatum, Erebinthus sc. agrestis, ad omnia efficacior domestico est, hoc est tum calidior, tum siccior, quanto & acrior & amarior.

Religione

differe.

Theophrastus (auctore Celsus.) Arictinum & Columbinum differre scribit. Aetius & Columella quoddam Orobianum cognominant, Eruc simile. Dioscorides sativum & silvestre tradit: ut sativum, quoddam Arictinum. Silvestre genus videtur significasse Theop. cum dixit quoddam odore differre: & Aetius Orobianum hoc idem videtur appellasse, nam ei vim tradit, quæ profecto Cicci sativo per se non inest, nisi cum Eruc admisceatur, ut Diosc. admiravertit. Est ergo Cicci silu. Hæc Celsus, sed male. Nam apud Theop. pro Columbino, ut vertit Gaza, legitur *ορεβαν*, & pro odore in versione Theop. Gazæ, legendum colore. Dioscoridis primum existimamus idem, cum Orobian Theop.

Calale. 43

624 08.

Plinius, teste Cornario, Cicerulam contextui
suo inferuit, Cicerque dixit, imprudenter sanè
duas diuersas res confundendo: de Cicerula sub
Lathyro dicitur. Cur Cicer præterea Serpillum
è quibudam appetletur, videre est ex Marcello
hist. n. g. lib. 28.

CICER ARIETINVM.

Defect:

DEPT.
CARPENT.

1991

Sua vi furrigitur Cicer, caulibus hirsutis, du-
rioribus, ramosis: folia pinnata, hirsuta, cla-
uicularum expertia, quorum singularia haud ma-
le foliis Ononidis comparaueris, denticulata, si-
ue serrata: ex quorum alis flores emicant singu-
lares, colore purpurascente, vel albo: siliqua te-



teret; farsa
seminar, Pilo
aquali, colore
albo, ruffo, aut
nigro, cuius ca-
piti appositum
corniculum:
sapor ad Pisa
accedit, vt &
radix.

Cordii Diol.
Est quoddam
genus rufum,
quoddam can-
didum, quod
Columbinum
dicitur, & ter-
tium nigrum,
quod priuatim
Arietinum ap-
pellatur. Des-
cribit hoc in

Hist. cui Gesn. figuram ex Trago addit.

Trag. Cicer, Germ. Zysser Erbsen. Ruffum
germ. Roth Zysern. Nigrü. Schwarz Zysern. A-
bum, Weiss Zysern. Auic. lib. 2. cap. 132. nigri me-
minit Cicis. Omnis Cicris species ad Pisa-
referenda nobis videtur. Erebinthi appellatione
(meo iudicio) à Dioc. comprehensa lib. 2. cap. 95.
Serapio cap. 80. Cicera *Chemps*; alba, *Karsenne*,
nigra verò *Chubes* nominat.

Fuchf. Tria præcipua sunt Cicerum genera, album, rufum, & nigrum. Nos ex iis tribus nigri tantum picturam damus. Differunt potiffimum in floribus: hoc enim, purpureos, album verò candidos flores producit.

Corn. Cicer alterum Columbinum, quod & Venerum dicitur Plinio, est, quod *ἑρβιακόν* [Ervinum] Theophr. dixit, & Columella Punicum appellavit. Nostri Rixhern corrupta voce Latina dicunt. At verò Cicera à Cicere omnino differunt. Officinæ etiam hodie Cicer ruffum, ac nigricans alio præferendum sciunt.

Matth. in Dioſc. In Cicerum genere habetur candidum, quod & Columbinum vocatur. Eſt & rubeum, Venericum dictum. Habetur item & nigrum, cæteris minus, quod Arietinum appellant. Eadem tradit Matth. in poſt. com. Italiciſ, quo in loco & milius pingit & deſcribit.

Anguil. Ciceris species tres, albi, ruffi, Arietini. Albi duplices, Arietini & Eruiui, à se indicem tantum figurâ differunt. Vtium simile capiti arietino, alterum politum, ut Eruium, id demonstrat Gal. lib. 9. de comp. med. s. loc. Arietini meminit etiam Hippoc. Ruffi duæ etiam species, Arietinum & Eruium. Niger simplex colore tantum differens.

Dod. Gall. *épiſarbois neirs*; Lat. Cicer Arctetinum, offic. Cicer. Idem de frum. poſtea deſcribit, floribus aut candidis, aut ex purpura ruſcentibus, ſeminibus colore aut candidis, aut ex ſubrubente purpura nigris.

Lonicera duas habet figuras, quamvis vna
sufficeret.

Lob. & Pena Adu. Cicer sativum Arietinum
Dioscoridi Offic. Cicer rubrum; color albus qui-
busdam: alia obsoletè nigricant, plurima ex fulco
purpureascunt. Obl. Cicer sativum Arietinum.
Ic. Pl. Cicer Arietinum Diosc.

Cæſalp. Cicer ſemen propè teſticulis ſimile,
colore aliis ex candido palleſcit: aliis ruffus: aliis
niger. Erebinthon Græci vocant.

Camer.

Camer. Ept. Cicer. Item horti, C. cerea albi, purpurei, & nigri.

Tum quoque tria constituit genera. Arietinum, Nigrum, & Columbinum, vel Venereum, quod non meminit de vidisse.

Cicer, Cicer Arietinum, Cicer sativum Hist. Lugd. Epig. Germ. Ziser / Birghern / Ziser: Vndt Rûcher Erbs. Belg. Ciceren. Gall. Ciche, & Poix ciche, & Poix Pechu. It. Ceci. Hisp. Grauanco. Arab. Chemps, Hamos, seu Athamos. Angl. Ciche. Boh. Cygeua. Hung. Bagoly & borso / Bubonis Pisum.

Ciceris rubri à nobis sati in Horto E.C. Montbelgardi, facile proueniunt, si eos non inueniant mures, qui auidè colligunt, tempore pluuioso facile corumpuntur. Habemus etiam Ciceris flore & semine albos, quorum semina missa Sturgardia: Aprili sata, florere Iulio. Geneua etiam mihi missi sunt rotundi flauescentes, omnium quos videris, minimi, politi, qui sati prouenire cum flosculis albis, florentes Augusto: Geneua alioqui frequentes, satis magni, augulosi, & copiosi, Monspeli in usu vulgares. Geneua; Lugduni, & Basileæ, Ciceris magni, flauo, tubescens vel nigricantes, flore subpurpureo, frequentes in hortis. Cicer nigrum recepi ex Anglia missum per D. Gargillum, & Sturgardia. Seritur Vere, autore Matth. appetente, pingui solo, & maturefcit Aestate, demetitur arescentibus siliquis: nam si citius extirpetur, semen rugosum euadit. Dod. In Italia, Hispania, & Gallia passim in agris feritur. Fuchs pullo, crassoque solo gaudet. Floret Iunio & Iulio mensibus, atque subinde in siliquis semen producit.

Cicer, vt placet Dioscoridi, sativum aluo commodum est, vrinam ciet, status gignit, bonum colorem inducit, menses & foetus educit, & lac gignit, Cataplasmatis modo imponitur, maximè cum Eruo coctum, ad testium inflammationes & fornicarias verrucas. Cum Hordeo verò & melle, ad scabiem, vlcera capitis manantia, impetigines & cancrofa, ac maligna vlcera. Alterum porò ipsorum genus Arietinum appellatum. Vtrumque ciet vrinam, si decoctum ipsorum cum Rosmarino detur, ad morbum regium & hydropem. Lædit autem & vesicam exulceratam, & renes. Cætera, quæ Diosc. de curatione verrucarum prodidit, tanquam superflua & magica hîc à nobis commemorantur. Sunt autem hæc: Contra myrmecias & acrochordonas iubent aliqui noua luna earum capita eminentiâ suæ singulis Ciceribus tangere, deligataque in linteolo semina illa post se abicere, vt acrochordones decendant. Non admodum consuetum est, autore Gal. Alim. vrbanis hominibus ex Ciceribus pulmentum conficere, à rusticis verò nonnunquam vidit parari: quemadmodum & ipsorum farinam cum lacte elixari. Non enim vt Fabæ & Pisi possunt continui, vt ex ipso fracto pulmentum, quod epuratum dicitur, fiat. Apud multas autem gentes mos est Cicera in aqua elixa mandere: nonnulli verò nuda ipsa sola, alii sale modico condientes, estant, nostrates verò ex siccis caseis quiddam farinæ simile facientes, id ipsis aspergunt. Est autem Cicer edulium non minus, quàm Fabæ, flatulentum, sed valentius nutrit, quàm illa. Ad venerem autem incitat, creditumque est etiam semen generare, vnde quidam equis admixtissimis ipsum exhibet. Inest præterea Ciceribus facultas abstergerendi maior, quàm Fabis, adeo vt quidam ex ipsis calculos in renibus constantes manifestè comminuunt. Nutrit autem cum de Fabis ageremus, sermone in

Tom, II

fecimus omnibus immaturis fructibus communem. Eadem porò & de frixis Ciceribus adiuuasse existima, quæ de Fabis frixis diximus. Quandoquidem friza omnia statum quidem deponunt, verum difficilis coquantur, & ventrem magis sistant, crassiusque succi alimentum corpori exhibent. Quæ præter iam dicta l.b. 6. simpl. tradit, hæc ferè sunt. Cicer ventri commodum, ciendæ vrinæ idoneum, lacti generando aptum: prolicit verò & menses: porò, quod vocatur Crium, hoc est Arietinum, cæteris efficacius vrinam prouocat: decoctum eius calculos tenum confingit: alterum verò Cicerum genus (vocatæ autem Orobrum) eadem vi pollet, puta atrahendi, digerendi, incidendi, extergendi. Sunt enim calidi & modicè humidi, participes item sunt amaritatis: cuius vi & lienem, & iecur, & renes expurgat. plorasque [Gerard. addit & lepras] & lichenes extergunt, tum abscessus post aures prouenientes (napardus Græci vocant) & testes induratos discutunt: tum etiam vlcera, quæ Caecothæ vocant, cum melle sanant. Quorum vsum in cibis idem supra docet. Nigra autem sunt ea, & exigua, in Bithynia præcipuè nascens, Arietinaque vocata. Huius ex aqua decoctum potare præstiterit. Vescuntur & virentibus adhuc Ciceribus homines, ante adeptam maturitatem, quemadmodum & Fabis. Cæterum de viribus Ciceris Plinius agens, etiam filu. generis meminit, velut etiam Galenus fecit & D. osc. quem ita declarat: Cicer & filu. est foliis satiuo simile, odore graui. Silargius (imatur, albus soluitur, & inflatio contrahitur, & tormina. Tostum salubrius habetur. Farina vtriusque vlcera manantia capitis sanat, efficacius silucitris. Comitiales & iocinorum tumores & serpentium ictus. Ciet menses & vrinæ grano maximè. Emerdat & lichenas, & testium inflammationes, regium morbum, hydropicos. Lædunt omnia hæc genera exulceratam vesicam & renes. Gangranis vtiliora cum melle, & his quæ Caecothæ vocantur. Verrucarum in omni genere primà Luna singulis granis singulas tangunt, eaque grana in linteolo deligata abiciunt post se, ita fugari vitium arbitantes. Nostri præcipiunt Arietinum cum sale discoquere, ex eo bibere cyathos duos in difficultatibus vrinæ. Sic & calculos pelli, morbumque regium. Eiusdem foliis, samentisque decoctis in aqua quàm maximè calida, morbos pedum lenit: & ipsum calidum, tritumque illitum. Columbini decocti aqua, horrorem tertianæ & quartanæ minuire creditur. Nigrum autem cum G. illa dimidio tritum, oculorum vlceribus ex passo melleitur. Hæc ille. Cicera difficulter concoquantur, inquit Simeon Antiochenus, & extrema gignunt. Venerem stimulant, magisque quàm Fabæ nutriunt, obstructions tollunt, & menses educunt. Habent salam simul, & dulcem qualitatem, & ob saluginem ventrem mouent, propter dulcedinem autem vrinam. Inflationes quoque faciunt, & lac gignunt extergendique facultatem obtinent. Nigra medicamentolam vimi habent: vrinam enim vehementissimè mouent, & calculos renum, & vesicæ frangunt. Nullum verò leguminis sic, vt Cicera, præcipuè autem nigra, & parua, lapides frangere potest. Id verò magis eius ius: quod tamen vesicæ morbis supra cætera legumina officit. Cicera verò rubra calidiora, & crassiorum sunt partium, quàm alba. Omnia autem vrinam ducunt. Madesacta nocte vna in aqua, & sumpta, lumbricos eiciant, sed qui vitur, sexiciunet horas oportet. Imposita vt cataplasma

Menses.

Calculos.

Pfora.

Parotia.

Vlcera.

Inflammatio.

Gangrena.

Obstru.

Lac.

Lentis.

*Tumores.
Scabies.*

*Dioscor. &
Galenus me-
tuntur.*

*Reicitur &
pinto Tragi.*

ma parotidib. molliunt & discutunt tumorem. Farina horum aceto subacta, & scabiosis inuncta prodest. Ius eorumdem idericos iuuat, & urinam albam reddit. Oportet verò iis neque ante cibum neque post vti, sed in medio. Tragus dicens ciceris in aqua decocti ius calculum pellere, melius placet, quàm qui euidenter frangere affirmare non erubescunt, inter quos est Diosc. & Gal. Si tanta vis est cicerum, maximè Bithyniensium, vt euidenter frangat calculos, pretiosiores erunt auro & cæteris omnibus lithonthyrtis: nullum enim existimamus veraciter dici posse frangere calculum, nec etiam si fietet, euidenter id appareret. Cur porro Tragus primum decoctum effundat, conderatione eget. Matth. non reicit primum decoctum, quia ita scribit. Puerperis confert in aquam infusum: manè bibitum, ita vt post sex horas nihil comedatur, lumbricos ex intestinis eiicit: prouocant, absterunt, attrahunt discutunt, incidunt, & status excitant. Farina ex Intybi stillatitia aqua decocta & illita, iocinoris tumores resoluit, & serpentum moribus medetur.

CICER SILVESTRE MVL- TIFOLIUM.

*Descriptio.
Radix.*

Folia:



*Flores.
Folliculi.
Semina.*

Icon.

*Matth. no-
tatur.*

Cicer siluestre multifolium, perenni radice, crassa & dulci donatum est: ramos bicubiales & altiores profert; striatos, tortuosos, concauos: folia hirsuta, pinnata, satui ciceris posita, sed longiora, angustiora, nec per ambitum crenata, ad Lætis maioris folia propius accedentia, nisi in obrutum

& subrotundum mucronem desinere, subdolia: coniugationes multæ, ad tredecim supputati, ex foliorum alis pediculus palmaris exit, rigidulus, spicam breuem sustinens florum subluteorum, quibus racematum coherentes succedunt folliculi breues, ventriosi, hirsuti, semina continentes, autore Dod. exigua, dura, plana, splendens, gustu Phasioli.

Dolemus iconem nostram depictam nobis absentibus, ex iconem, quæ non placet, quæ est apud Lobelium, ac ex non bona deteriore factam.

Cicer silu. i. Tab. Icon. wildt Zisererba. Cicer Matth. in Hist. Lugd. & Cicer silu. i. Dalech. Sed hic duas icones vnius plantæ exhibitas existimo. Cicer siluestre Matth. Clusio exili candicante flore.

Cicer silu. omnibus serè notum esse, Matth. in Diosc. quidem scribit, ast nec describit, nec depingit. In post. com. cum mag. icon. & Italicis ponit figuram, sine descriptione. Idem in Epit.

Cicer silu. satiuo simillimum esse dicit, sed folia non denticulata, & filiquas minores, roundioresque, plantam verò in vniuersum hirsutiorē, atque alperiorē. Cicer autem, de quo hic agimus, non est hirsutius, neque asperius satiuo, neque etiam simillimum, icon quoque Matthioli non tale demonstrat: suspicamus eum eiusmodi imaginariè scripsisse, in com. siquidem non describit.

Cicer silu. Camer. Epit. Matth. Eidem in horto, fructu tamen nonnihil differens, quia maior & oblongior.

Cicer silu. herbariorū aliud, Lob. & Penz Adu. folliculis Coluteæ, quod longius videtur recedere à Diosc. silu. Cicere. Matthiolus huius picturam mentionemque ridiculè inculcat in Indice, non describit. Obleru. & Ic. Pl. Cicer silu. Herbariorum. Cicer silu. ad me [Geln. horti] Dalech. Lugduno misit. An Anguil. Cicer siluestre.

Ciceris silu. quemadmodum à Matth. depingitur, fructum, aliquando ad Dodon. Cl. Cortulus misit. Odor autem herbæ qualis sit, compertum Dod. non habet: is autem si fuerit, seuus dubio procul. Videtur eidem in Hist. cicer hoc silu. primum magis quàm reliqua cum silu. cicere conuenire.

Cicer siluestre Matth. Petrus Turn. Angl. mihi Heidelbergæ attulit, dicens radicem crassam, dulcem, saporisque Glycyrrhizæ habere. Plantam siccam D. Agerius dedit, & semina, quæ per me fata in horto Ill. E. C. Iulio mense floruerunt. Gigaur, vt Hist. Lugd. scribit, in saluoso saluato, quod Rhodanus alluit prope Lugdunum.

CICER SILVESTRE MAIVS THALII.

Cicer silu. maius, scribit Thalius in Hæc. Silu. conuenit serè cum eo, cuius Matth. iconem exhibet, nisi quòd folia non sint rotunda, ita vt Icon Matthioli habet, sed oblonga, nigra, hispida, non dentata (quam ipse quoque notam in suo requirit, Lenticulæ foliis similia. Sunt & costæ, quibus folia inhaerent, Matthioli plantæ costis longiores multò, pluribus iidem foliis præcedit. Caulibus vitigineis humi reflectuntur, brachiatis, ac latè expansis. Flores profert in densa spica confertim conglomeratos, Lenticulæ similes, luteos, quos subsequuntur membranæ vesicæ, agminatim coherentes, subflauæ, pilosæ, in acutum mucronem prominentes, minores siliquis ciceris Arietini, quibus conduntur parue siliculæ plenæ seminibus rotundis, paruis, flauescens, similibus serè Lou satui sex inibus.

Vocat autem hanc speciem maioris nomine, quòd eiusdem duæ alie species reperiantur, quarum altera mediam magnitudinem obtinet, altera longè minor est.

Misit mihi ramum pro cicer Thalii Cl. D. Doldius, quod an ab antè à nobis tradito diuersum, dicere non ausim: tredecim in eo coniugationes foliorum: flores planè similes videntur: verum foliola apparent longiora, quàm demonstrat Icon Camerani: verum ea varietas pender fortè à cultura, talem habeo collectam Argentinx in horto Frid. Meier: non sunt tamen hispida, quòd de suo prædicat Thalius, vix apparent pili, quemadmodum etiam in præcedenti.

De hoc autem hæc Doldius scribit. Hanc pro cicer silu. maiore Thalii agnosco, omnia respondent, excepto eo, quòd vesicæ dicat habere agminatim

minatim coherentes, subflauas: cum huius sint nigrae, neque vesicae siliculas inesse intelligere possum, sed ipsae siliquae agminatim iunctae, vesicas singulas referunt, semen subflauum, compressum. Serpit longè, folia dulcia sunt, & radix, vt ad Glycyrrhizas silu. referri possit.

Prouenit, auctore Thilio, Cicer silv. mains, locis pratensis, Minus autem, quod duplex, in montibus Hirciniae adiacentibus, ac meridiano Soli expositis nascitur.

CICER SILV. TRIFOLIUM.



Digitalem demittit radicem, singularem aliquando, alias in paucas fibras diuisam, lignosam, dodrantalem, quae terrae verus in plura capita, squammatum diuidi incipiens, ex singulis vnum, vel plures tollit caules cubitales, & in ramos aliquando subdiuisos, linquescientes, hirsutos: pediculis autem longis

trifolia haerent coniunctim folia, maiora quam satui Ciceris, rotunda, hirsuta, circumquaque serrata: flores Ciceris, mediocriter magni, quos siliquae excipiunt binæ ferè, ex vniculo longo pediculo, vnicia longiores, hirsutae.

Cicer silv. 2. Tab. Ic. vult. Zisererbs 2. Cicer silv. verius, è Sabaudorum finibus. Non abs te quis coniecerit, inquit Lob. Oblitust Diof. silv. esse: flores purpureas, semina Ciceris multò minorum, compressa, & potiùs Cicerulae similia. Item, Ic. Pl. Cicer silv. verius. Cicer silv. Dodon. in fol. alterum, quod ad iconem, tertium, quod ad descriptionem. Ponæ tandem in Baldo, Cicer silv. alterum Dalech.

Genea: prouenit in monte Saleua.

OCHROS IN GENERE

CAP. VII.

Ochri (Eruilæ Corn.) Pisus magis secedunt, minus instant, & probè alunt: ex autoritate diuini Hipp. de diat. lib. 2.

Theop. Ochrorum meminit, vnicò tantùm in loco. Hist. sc. lib. 8. cap. 3. dicens: Legumina alia oblongiori sunt folio, vt Ochros (Cicera.) Caulis autem procidentis.

Multò plenius de hoc egit Gal. alim. lib. 125. cap. Ochton [Oxæ, Eruilam vertunt] homines, quomodo & Fenugraecum, prius in aqua, quoad radicem præduxerint, macerantes, ventris subducendi gratia mandunt, ante alios cibos, garo intingentes. Succum autem, cum coctus est, atque in corpus distributus, habent copiosioris alimentum, quam Fenugraecum. Atque in Alexandria iu-

Tom. II.

uenem quandam nouit arti Medicæ deditum, qui per annos quatuor singulis diebus solis his præobsonio, utebatur, Phaeolos, dicit, Fenugraecum, Eruilam, & Lupinos. Attigat autem interdum & Oliuas ex Memphis, & olera, & paucos fructus, eos, qui citra coctionem manduntur. Propositum enim ei erat, ignem nunquam accendere. Omnibus certè illis annis sanus fuit, nec vlla in re habitu corporis, fuit deteriore, quàm ab initio. Mandebat autem fructus huiusmodi cum garo scilicet, oleum aliquando solum ei adiciens, nonnunquam etiam vinum, alias acetum, interdum verò salem tantùm, sicut & Lupinos. At de salubris quidè victus ratione in lib. de tuend. sanat. copiosè tractauimus: tractabimus autem postea etiam summam in opere hoc. Nunc autè iis, quæ de Eruiliis & Phaelis dicta sunt, id quoque addatur, hæc ædulia medium quodammodo locum obtinere inter ea, quæ succum bonum, aut prauum, generant, inter concoctu facilia & difficilia, tardè & celeriter transeuntia, flatulenta & flatu expertia, parùm & multùm nutricia. Nullam enim efficacem habent qualitatem instat quorundam, quæ acres, aut acerbos, aut salios, aut amaros, aut dulces habent sapes. Et cap. 26. Lathyrus [Cicerula] substantiâ Ochris (Eruiliis) & Phaelis similis. Tandem cap. 28. Ochros (Eruilia) Hipp. Diocl. Ceterùm vide plura sub Phaeolo & Dolicho Veterum.

Theodorus (Cæsalp.) Eruilium vertit id quod Theophrasto Ochros vocatur, quamuis aliquando Cicerum vertat, quasi putauerit idem esse, Eruilium, & Cicerum, & Ochrum.

PISUM IN GENERE, EX Veteribus & Neotericis.

CAP. VIII.

Pisum, quantum quidem ex Theophrasto colligere licuit, oblongius producit folium, caulem verò humi procidentem. Huic morbus, vt omnibus seminibus, ob alimenti, calique temperiem euenit: videlicet cum plus, minùsue est, vel etiam cum non tempestiue humescit. Sic enim & vermes Ciceri, Cicerulae, Pifoque innascuntur, & eruca. Pisum omnium maximè fragile est, nam & rubigini est opportunissimum, propterea quòd folia habeat numerosa, & radicem imbecillam.

Ceterùm, quemadmodum Dioscorides Fabam, cuius vires indicat, non describit: ita quoque nec Pisum describit, nec eius meminit. Vnde turpiter errant, qui Cicer arietinum Dioscoridis censent esse Pisum vulgare, quòd germanicum Erweisen sono accedat ad Erebinthum: necnon ii, qui putant Pisum, Germanis Erbe dictum, Eruil esse Latinorum & Orobum Græcorum, vocabuli similitudine adducti. Nihil enim probat vocum ista similitudo in linguis tam dissitis. Ita enim Pullegium Polium fuent, inquit Turnerus, quia Germani Poley interpretantur. Ieiunum ergo & infirmum apparet esse eiusmodi omne argumentum, à nudo nomine petitum, nisi descriptio & facultates conueniant: at descriptionem & vires Pisi cum Orobo & Erebintho non conuenire suis dictu est locis. Erebinthus, auctore Theophr. in terram non procedit, sed oblique surgit, Pifa autem in terram eaduca sunt. Ergo. Pisum folia habet longa, Erebinthus non item. Ergo. Galenus de Cicere arietino, & Pifo, vt de duobus diuersis leguminibus, duobus distinctis agit capitibus.

Correſſio.

Theophr. error.

Pisum morbus.

Rubigo.

Error inueniatur. Non est Cicer arietinum.

Non est Eruil.

Plinius quoque vno capite Cicera à Pisis separat. Erebinthus itaque, latine Cicer, non est Pisum. Orobum Theoph. oblique crescere affirmat. At Pifa nostra cuiuscunque generis, sunt *δὲ γὰρ εὐρύωρα*. [humi strata.] Galenus etiam scribit omnia Orobi genera, planè esse amara, At omnia Pisorum genera, planè dulcia sunt, sine omni amaritudine. Ergo. Cæterum, verba Plinii de Pifo, nos in dubium vocant, ancipitesque faciunt, an ei cognitum fuerit, neene Pisum. Ita enim inquit: Cicercula minuti Ciceris, inæqualis, angulosi, veluti Pisum.

Eruilium
Gulgo.
Mes Almes
Almelis.

Legumen, quod Eruilium vulgò vocant, teste Manardo, non est id quod Arabes *Mes*, vel *Almes*, vel *Meise*, neque id, quod *Almelis* vocant. Auicenna asserit *Almelis* esse Erbum. Quòd verò Erbum Auicennæ (Orobum Græci appellant) nos Eruum, sit tam ab Eruilia nostra, quàm *Mes* Auicennæ diuersum, clarum est: Eruilia oculum non habet. Scribunt præterea Auic. & Isaac in cortice *Mes* esse ponticitatem, [ita enim ipsi appellant saporem acerbum *σφοδρὸν*] linguam adstringentem, qui sapor ab Eruilia alienus. Eruilia quoque non sunt Pifa: scribit enim Plinius, Pifa habere angulos, vt Cicercula, quos in Eruilia nostra non videmus. Quoniam nomine hæc ses ab Antiquis censetur, quam Eruilium Plinii voce nonnulli, vel parum ab ea descedendo *Rouilium* vocant, *Pisaretos* Veneti, *Rodiones* alii, hoc operosius est valdè iudicare. Sunt tamen quæ ipsum mouent, vt credat Eruilium esse id, quod Theoph. & Dioscor. Dolichon vocauerunt, & Galeni tempore Phasiolus, vel Lobus dicebatur, & à Theodoro Siliqua appellatur: quamquam Siliqua existimanda est aliud legumen iuxta Latinos Auctores. Eruilia solus inter legumina edi ab hominibus siliquas simul cum semine, nemo est qui nesciat: cum & crudæ aliquando ab otiosis, & coctæ à nobilibus, confecto præsertim ex iis delicato quodam pulmento, libentissimè mandantur, aliorum leguminum siliquis in cibum iumentorum proiectis: Si igitur, Eruilia sunt Dolichi, quis ambigat malas esse, & esum harum prohibendum fuisse vulnerato prope genu. Hæc Manardus existimans Eruilium esse. Pisum. Sed falsam & infirmam eius esse opinionem quotidianus ostendit vsus. Hodie enim non vnus solum plantæ siliquæ eduntur, sed duarum, nempe Pisorum vulgarium, cuius varæ species, & Smilacum hortensium, siue Phaseolorum dictorum vulgò. Sed dicere quispiã poterit [autore eodem] de Phasiolo i.e. de legumine, quod Latine dicitur Eruilia, sub Phasioli nomine scripsisse Dioscoridam.

Manard.
not.

Eruilia.
Phasiolus
Diosc.

Orobum non
est.

Quod ad Orobum attinet, Mundella in exam. simpl. med. Ant. Musæ Brasl. eum existimat nequaquam Eruilium esse posse domesticam, quæ Ianuario mense feritur, & paxillis quibusdam posita in hærens, eosque scandens, fructum parit, de qua Manard. lib. i. sed Eruilium, quæ Ferrariensisibus *Ruione* dicitur. Quicquid autem illud est, certum est nullo modo Orobi facultates Eruiliæ conuenire posse, cum quia Orobus grauedinosus traditur à Diosc. & sanguinem per vrinæ meatus, si, vt ille & Galenus aiunt, largius sumatur, euocans, tum quia in cibis eius vsus damnatur, tanquam ingratus, amarusque est secundum Galenum. Satius verò Eruilia Brixianis lingua ipsorum vulgari *Rouaier*, nostris autem Veronenfibus *Bisi* appellata, neque amara est, sed potius dulcis, & ad cibum homini non tantum non damnata, sed suaui, & quæ plurimum come-

dentes oblectare possit. Sanguinem verò per vrinæ ductus, quod quidem aut Mundella viderit, *πῶς ἔστιν* aut aliunde accepit, nunquam ciere visa est: siue. que capiti grauitatem adfert, vt ex iis, qui eâ creberrimè vici consueverunt, manifestum est. Quare plurimum hallucinantur Pharmacopole, qui Orobi vice Eruilium altitè seruant, eamque pro Orobo vendunt. Præterea quis vnquam suspicari posset in Eruilia hac nostrâ illam secundæ sedis exiccationem inesse, quæ in Orobo ad curandas gangrænas pollet:

Nos *ἡ ἀνδρὶς* græc. Pisum Latin. dicitur, Offici- *Pisum. L.*
nis hoc nomine notum. germ. *Erbs* oder *Erbsen*. *weissen. gall. Pois.* Sic autem à Pifa, loco, in quo copiosissimè nascetur, nominatum est, inquit Fuchl. Hist. c. 240. Duo apud nos genera Pisorum repetiuntur. Vnum in aris caducum, humi serpens, quod genus Germani *Blein* seldè *Erbsen* nominant. Huius, vepote vulgaris, picturam haud damus. Flori papilionis forma circa umbilicum, granis rotundis, & vt Plinius lib. 8. c. 12. ait, angulos multos, inæquales, habentibus: mirari satis non possum, vnde plantæ suspicio orta sit, vt Pisum nostrum legitimum esse dubitauerint. Scio autem esse, qui legumen hoc, quod hodie passim Pisum appellatur, putent esse cicer Arictinum: quorum sententiã probare non possum, quòd Plinio teste, cicer Arictinum non sit dictum, quia valentiæ effugiem arictini cornu exprimit. At non placet Fuchium discrimina florum & seminum in Pisis non ostendere.

Pisorum, sic enim vocant vulgò, sed perperam, *pisum* in Germaniâ satia genera celebrant, quæ genera *Tragos* seldè *Erbsen*, *Blors* *Erbsen*, & *Pfal* oder *groß garten Erbsen*, dicit. *Pisum* agrestis, flore candido: Ex his nonnulla repetiuntur, quæ sububricant, vbi decreta fuerint, *pisum* floribus veluti rosei coloris comantia. Inter legumina verò agre stibus, quæ nullo admiraculo fulcitur, humi serpunt [potius decumbunt.] Omnia Pisorum genera aliofca sunt, Hiemi que impatientissima.

Pisi nomen huic legumini vno consensu imponunt omnes. Manardus statuit Phasiolum & Dolichum. Ego cicer Arictinum Diosc. esse iudico, quod ille lib. 2. cap. 59. sub Erebintho describit, quæ vox cum germanica appellatione *Erbsen* seu *Erbsen* satis conuenit. Hebraei siue Thalmudistæ potius, *Par Keden* vocant.

Arabes, quod sciam, Phaseolorum haud meminere, nisi fortè *Mes* ad eos pertineat. Peregrinos Phasiolos tertio loco à nobis descripiot. Serapion. *Mes Rouilias* esse iudicamus.

Duas figuras habet Lonicerus cum his titulis, *Groß* oder *Blorgerbeyß*, & *Blein* oder seldè *Erbsen*. Item *Erbsen* Græcis, vnde Latinis Pisum: magna dicuntur *Groß* *Florgerbeyß*, *groß garten Erbsen*, parua *Föld Erbsen*. Vnæ sunt species colore, magnitudine, & figura, satia & siluestres. Et Paul. pòst aliam Pisorum figuram ponit sub hoc titulo, *Blein* *fäselen* *Dolichos*: cum tamen in descriptione longè aliam plantam intellexerit. Ibidem in prima descriptione ex duabus plantis, nempe Phaseolo Italorum, & Phaseolo Tragi, vnã fingit descriptionem: omnia pro suo more confundens. Pisorum duas habet figuras Matthioli sub titulis Pisi maioris & Pisi minoris: sic duas Pisorum faciens differentias: traditque Dioscoridem de Pisis non scripsisse, ac præterea Brassauolum credidisse Eruilium, quæ Theoph. Gal. ac Paulo Ochros

Ochros appellatur, legitimum esse Eruum, & nominis vicinitate deceptum.

Piscolus vulgò Calsalp. teste, appellatur semen candidum. & rotundum: flores colore aliis rubente, aut vario, cui in siliqua pauciora insunt grana, grandiora & rotundiora: cui plura, eadem minora sunt, & magis facta. Græci Phasiolos & Phaeolos appellant, vt Galaninaduertit, alios à Phaselo: Siliquas lobos appellant, vnde & ipsi Phasioli lobii, id est, siliquæ dicuntur: eodem Dolichos appellari testatur apud Theoph. Hippoc. & Diosclem. Siliquam apud Theop. Theodorus vocit. Dioscoridi Phasiolus, Plinio Faeolus vocatur.

Pisa à Pisa loco (inquit C. Bauh.) vbi olim copiose nascebantur: quæ diuersorum generum sunt, maiora quæ hortensia, cuius fructus dum virides rotundi, rescicati angulosi sunt: colore candido, aliàs sordido: hæcque duplicia, vel sine folliculis comedantur, vel simul cum folliculis, & leptoloba dicuntur: sunt quadra: sunt minora, quæ vel hortensia, & ramis affixis in altum scandunt, & ramulare Pisum dicuntur: vel in agris feruntur, & humi serpunt, & sunt alba (quæ maiora & minora) vel viridia, vel cœrulea, quæ rariora, vel ruffa, quæ nostris cinerea dicuntur. Est Pisum proliferum, vbi plures siliquæ simul iunguntur: sunt ipsa Americana rubra, sunt & siluestria, de quibus omnibus in Historia.

Tracy, Pisum, Germ. Erbs. Gall. Pois: It. Pisello Pifo: Angl. Draf. Boh. Erbs: Hung. Borsó.

ra, nunc rotunda; nunc quadrata, interdum flaua, rubra, & virentia.

Cæterum Pisorum, titulo iam à nobis propositum, Erulæ nomine meminisse exitumatus Mundellam & Manardū: de hac nos antè, Klein oder feldt Erbeis/ Pisa flore albo, minora alba, Fuchl. Pisi vnum genus in aruis caducum. Trag. Veldt Erweyssen, Pisa agrestia flore candido.

Dolichi non sunt illud Pisorum genus, vt rectè contendit Matthiolus, quod Ausonius vulgò dicitur *Rouiglione*, Tridentinis verò *Arachia*, vt Manardo placet. Quandoquidem hanc sub Orbi nomine, tam Galenus, quàm P. uul. descripsit. Idem in com. cum mag. figur. Pisum minus dudum generum statuit, album & cinereum, quod Erulam vocant quidam, Ananienses & Tridentani *Arachia*, alii *Rouiglione*, atque Tragum perperam putasse Pisum cicer esse Auetinum. Et in com. Ital. cum mag. figur. *Piselli minori il semen bianco & l'altra heretino*. In Epit. Cam. Pisum minus, græc. *Tracy* uis. It. *Pisello minore, duum generum, album & tubn-grum*. In Hist. germ. *Kleine feldt Erbsen*. Pisum minus. Flores albi. Hæc variis in locis Matth. quem miror vni minorum Pisorum suorum tribuere modò colorem cinereum, modò subnigrum.

Meminit Cam. in horto in genere Pisorum vulgarium & siluestrium. Huc tandem quoque refero Tabic. & Hist. Pisum minus 2. Sic fleine feldt Erbsen, quamvis Compilator nihil certi de eo scribit.

Ex Pisis, paruis, albis Montbelgardi agri conseruntur, vt etiam in horto Ill. E. C. V. de Bèffordia adhuc in horto in fine Augusti. Apricis gaudet locis, autore Fuchlō, figuram namque impræcussissimum. Tepicum itaque locum, & cælum frequentis humoris desiderat. Iunio & Iulio mensibus floret, & subinde etiam semina in valulis profert.

Locus 80
tempus.

PISA POTISSIMUM VULGARIS, parua, alba, siue aruensia.

Generali quadam notione Pisa circumscribimus, quorum differentias petet studiosus lector ex synonymis. In genere ergo hoc legumen, sicuti alia, brevis durationis, tenui est radice, fibrosa: caules fistulosi, alienæ opis indigi, & nisi palis sustentetur procidui: folia genicula aduerso situ ita complectuntur, vt

ab eo transdigi videantur: quanquam in adnatis furculis, eorundem sit pinnata dispositio, eo quod furculi superest, in capreolos testiles, quibus proxima quæque accipit, abeunt: flores ex geniculis pediculo nudo insident, forma ad Gemistæ flores accedentes, sed colore albo, vel purpureo, vel ex albo virente, vel variegato: *sili.* quæ iis succedunt, bixæ ferè, cyb. dracca, penhiles, bifores, & carnosâ pulpa, minus tamen multò, quàm in Faba, in quibus reclusa ad commissuram annectuntur pisa, aliàs maiora, aliàs mino-

PISI PVLCHRA SPECIES folio anguloso.



Pisi varietatem in horto Frederici Meieri; quem Argentina colit, collectam dedit D. Agernus. Cuius viticula, quàm vulgati multò teneiores, delicatioresque apparent: ad foliorum originem foliola bina, lata & Aphacæ Dod. folis quodammodo & mulantia, obtusiora, imatrimque parte angulosa,

quasi ferrata. In pediculis verò, qui in capreolos desinunt, quaternæ tantum foliola hærent geminâ oppositione. Pisi vulgaris minora, plerumque etiam denticulata. Flores singulares tenuibus pediculis hærent quàm in his multò

Bb 4

minores, rubelli in sicca planta: quibus singulis singula succedunt siliqua.

PISA PARVA VIRIDIA.

Pisa viridia, minora, rotunda, eiusdem valde magnitudinis cum Pisib ex purpureo variegatis, ni minora, quaterna, vel quina vna in siliqua, coloris ex albo virentis, unicoloria, dempta ea parte, qua siliqua adherent, quae pars nigricat, in foliis discrimen non animaduerto.

Pisi tertia species, Dod gall. fructu albo, aut viridi; interdum cinereo, aut nigricante. Graecè *ἄραρις* Plin. Eruiha, Gal. *Pois*, Germ. *Erweyssen* Belg. *Erweyssen*. Ital. *Rouiglione*, Venetis *Pisarel- li*. Idem in fol. & Frum. Pisum minus, flores vt plurimum candidi, aliquando tamen ex purpura obcuri; semina vt plurimum luteo, subinde vi-

Ochras. Er-
uilia.
Rouiglione.
Pisarelli.

Ochras. Er-
uilia.
Rouiglione.
Pisarelli.

Pisum mi-
nus.
Fructus ro-
tundo.

Dodon. no-
satur.

Pisum pe-
reginum.

Piscolus Si-
ridis.

Lobel nota-
tur.

renti colore. Graeci *ἄραρις* à luteo ochrae colore quem interior fructus medulla refert. Plinius & alii Latini auctores Eruiham, Recentiores ac Officinae passim Pisum, & Pisum minus nominant: propter similitudinem cum Piso, licet fructus rotundus, & non angulosus, quale, Plinio teste, Pisum est. Mirum Dod. in post. omittere Pisa alba, & alios colores. Figura sui Pisi minoris est cap. praecedenti sub titulo Pisi maioris. In frum. hist. figuram eandem habet pro Piso maiore & pro Piso minore. Quid existime de Pisi figura, quam olim posuit pro mediocri & minore Piso, dictum sub comofo, quod non bene distinxit nec historia, nec figura à ceteris, quamuis minoribus magis conueniat.

Pisum peregrinum [ait *Cesalp.*] & in Italia semen Piseolo nostro paruo in ceteris simile, sed colore viridi etiam cum perfectum est, diuque durat incorruptum. Piseolus viridis appellatur: foliis paulo oblongioribus: floribus purpureis. Theoph. solum ei tribuit oblongius, Plinius eadem confirmat: frigoris impatientissimum, ideo in Italia non nisi verno tempore feritur. Serapio ait Oculum habere pupilla in albo nigra. Galenus Pisum substantiam tradit similem Fabis. Ast nos in nostris Pisum viridibus, non animaduertimus folia paulo oblongiora, nec flores purpureos: quamobrem iterum diligentius erit consideranda huius Pisi planta.

Lob. & Pena Adv. Obs. & Ic. Pl. Pisum minus ex luteo virefcens. Mirum non meminisse Lob. Pisi albi. Sui Pisi minoris figuram bis ponit hoc loco. pro minore & ante pro maiore.

Pisa minora viridia mihi prouenere Montbelgardi lata in orto Ill. E. C.

PISA MINORA EX PURPUREO variegata, Vicia similia.

Parua haec sunt, nec Vicis multo maiora, in quibus tamen puncta quaedam ex cineritio purpurea conspiciuntur, vt in vicis vulgaribus, à quibus ideo non ita facile distingui possunt. Herba verò, caulis, vt siliqua, multum à Vicis vulgaribus differunt, quia anguliores, rotundiores, nec hirsuta.

An Dod. gall. Pisum tertium colore interdum cineritio. An Matth. in Diosc. cum mag. fig. Pisum minus cinereum & in Ital. *Seme beretino*.

Protenere mihi in orto Ill. E. C. etiam eodem loco culta, quo cetera Pisa & Vicia, eodemque etiam tempore matura.

Deset.

Logus.

PISA MINORA, RVBRA, VARIEGATA.

In agris cum aliis Pisib albis hoc Pisi genus non raro ipse collegi. Est autem forma & colore maiori simile, flore purpureo, semine variegato.

TRAG. hist. germ. Das Klein geschlechte Fas-
selti. Quidam volunt Arabum *Mes*, aut *Almes* esse Pisum. In Auic. scriptum est *Meisse*. In Serap. *Mes* & *Rouilie*, existimo intellexisse die *Heine braune*, seldt *Erweyssen* / aut nostras *Fabas germanicas* aut tertium genus peregrinum Phasiolorum. Et Hist. lat. Phasiolorum secundum genus.

Camer. hort. Pisa rubra, Trago Phascus (minor.)

Phasclu
minor.

PISA MAGNA, RVBRA, VARIEGATA.



Hominem magnitudine multum excedit hoc Pisi genus, florem fert purpureum in medio, & in latiori parte roseum, in superiore siliqua magna, succulenta; Pisa intus valde magna, non rotunda, vt minor, sed angulosa, vel potius compressa, pulchri coloris, variegata ex rubedine & albedine, coarctata, crasso vbi coquuntur, à

Deset.
Flor.

Siliqua.

Caricet.

Germanis magni sunt in cibo.

Cam. hort. Pisa rubra, Italica, grandia, Phaeolus Trago. Tab. 20. & Hist. Pisum quadratum Plin. *Fascl* Eibsen. Trag. Hist. germ. *Fasclen*. Diosc. lib. 2. cap. 99. *caulibus*. Si quis etiam velit *Ciceres* non reluctabor. Idem in Hist. Lat. Phasio. li, *Fasclen*.

Paulus Phasiolos, Dolichos cognominat: Diosc. tamen si cognouisset Phasiolos Dolichos quoque Graecis cognominari, ex Theoph. vtique & aliis id indicare potuisset. Existimamus ergo Phasiolos esse eos, quos Germani *Fasclen* vocant. Si quis tamen ad Cicera referat, cum eo minime contenderim. Phasioli differunt maxime in eo à Piso maiori hortenli in geniculis, qui inter folia & ramulos visuntur non planè purpurei apparent, quod in nullo Pisorum genere deprehendas: flores non albi, vt in Pisib, sed in anteriore quidem sui parte rosei coloris, in posteriore verò putput saturata: semina habent rotundos angulos: alia quidem spadicea: nam plura eorum sunt genera. Tragus pro Phaeolis exhibet figuram, quam pro Piso quoque ponit.

Lob. & Pena. Adv. Pisum angulosum hortorum, quadratum Plinii, semine ferrugineo, & rufo colore, videntur angulosa Plinii Pisa. Obs. minor. An Pisum angulosum hortorum, sit quadratum Plinii: Pisum maius Dod. Perperam Cicera retinetum Tragi. Hist. *Arueias*.

Lobel. non distinguit Pisa, vt Tragus, nec distinet

Pisum quod
dratum.

Ciceres.


finet de Pisis scribit. Figura, quam habet, est pagina sequenti pro Piso minore.

Lonicer. confundit hoc Pisi genus cum Pasiolo Italorum.

Dod. gall. Huius Pisi mentionem facere videtur. Item de frument. & in fol. vbi figura cum inscriptione: *Pisi maioris alia icon.* Sed iam ostensum Dodonæum non exactè distinguere Pisa maiora.

Pisa magna rubra variegata colimus in horto Ill. E. C. Montbelgardi, colunt etiam alij. Basilæ & Genevæ vidi. Montbelgardi Iulio matura quidem, & Augusto adhuc florentia.

PISA MAIORA, ALBA.



Pisa alba maxima, Pisis vulgaribus sunt similia, flore nunc purpureo, nunc albo: semina quidem alba, non autem ita angulosa, siue compressa ut illa: maiora quam sint Pisa comosa, nec ita rotunda.

Fuchsl. hist. Pisi alterum germ. *Groß garten Erweissen.* Item Ic. Pisi maius, *Groß*

Erbs. Fuchsl. non scribit an cultum intelligit: si illud curavit depingendum, quod *Lupicor.* non placet quod in generali descriptione Pisi dicit, florem circa umbilicum purpureum: non enim omnia Pisorum genera partem habent purpuream.

Lob. & Pena Adu. Pisi vulgaris maius. germ. *Erweissen / Angl. Pease Crook Erwitten.* E quadam vire Pisa inter Asiam & Olympum montes sita Pisi allatum, & dictum volunt, græcè *λεκυθος* quasi dicas oui vitellum: flore effigie Papilionis. albicante, sui medio purpureo: quibusdam Germaniæ locis sponte germinant. An Lob. benè distinguat Pisa, iudicent lectores. Pisi maius album nihil habet in floribus sui medio purpureo: optatim etiam annotatum locum Germaniæ vbi sponte proveniat. Ic. Plant. Pisi vulg. maius.

Dod. gall. *Pois ramiers: gall. αἰών & λεκυθος, Pisi.* Brabant. *Groote Erwiten / Roomsche Erwiten / quibusdam Stoc & Erwiten:* hæc species verum Pisi descriptum à Plinio & Antiquis: in hist. frug. ostendit, non esse Faselum aut Dolichum. Flores purpurei: semina sicca, angulosa & cinerea [grisea] Figura, quam Dod. ponit, est Fuchsiæ, nec mihi videtur bene describere, neque distinguere Pisa maiora: quamquam in Hist. gall. potissimum tradere videatur, Pisa maiora, varia. Idem in Hist. lat. frug. & in fol. Noster, inquit, vulgè *Roosche Erwiten & Groote Erwiten / aut Stoc & Erwiten* appellant, ac Latine Pisi Romanum, aut maius. Theophrastus & alij Veteres Græcè *λεκυθος*, Latine Pisi, Planque etiam

λεκυθος, sed parum propriè. *Lecyθος* siquidem non peculiare aliquod legumen, aut frugis genus, sed pulmentarium ex leguminum farinis est, ut Gal. lib. de Eucharistia & Cacocharistia testatur. Hæc Dod. cui flos candidus cum purpurea nota circa umbilicum. Apparet Dodonæo non bene notas differentias maiorum Pisorum ex descriptione: pro maiore figuram habet Pisi minori Lobelii, quamquam apud Lobelium etiam posita sit pro maiore: ea ponenda erat capitè sequenti, vbi figura maioris Pisi non bene posita pro Pisi minore. Addit præterea Dodonæus aliam figuram cum inscriptione: *Pisi maioris alia icon,* quæ convenit cum Pisi vario minore.

Tab. icon. & Hist. Pisi minus i. *Hein Erbsen Tabern. uoc.*

Quam Tab. compiler ponat suo more inditendè figuram sub prædictis titulis sine descriptione, quod referam nescio, nisi hoc loco ponam.

Lonicerus quoque huius Pisi meminit, non tamen describit, picturam tantum ponit.

Matth. pluribus in locis de hoc agit. In com. in Diol. cum mag. fig. Pisi maius. Pisi rotundo & candido semine: flore papilionis figura, circa umbilicum purpureo. Idem in Ital. com. cum mag. figuris. *Piselli maggiori*, i. e. Pisa maiora: fructu albo, flore in quibusdam albo, in aliis purpureo. Item in Epit. cum add. Cam. Pisi, Græcis *λεκυθος*, Ital. *Pisello & Biso.* Alterum maius semine rotundo & candido. Flores umbilico tenus purpurei & quandoque in uniuersum candidi. Tardem Hist. germ. Pisi maius flore cœruleo [leib farb] aut albo: errant qui Cicer Arietinum volunt *Groß garten Erbesen.* Nec Matth. videtur bene distinguere Pisa: maius semine candido, nihil habet purpurei in flore.

Pisa alba maxima Basilæ, Genevæ, Montbel. gardique vidi Iulio matura, ea habemus in horto Ill. E. C.

PISVM ERECTIVS COMOSVM.

Erectius vulgari Pisi, caule firmiore, crassiore, potissimum parte superiore, striato, inani, suâ vi assurgit: ex intervallis foliorum alas, costâ mediâ, cui annexæ, in tortiles capreolos abeunte, producens, sed nullo flore, nullo fructu, præterquam in summo caulis fastigio, quod floribus albis, numerosis, in orbem politis densè stipatur, quos siliquæ vulgato sativo eadem radiatâ serie comantes, excipiunt, geminæ, aut tergemine eidem pediculo appensæ. Pisa continentes alba, sativi vulgatis minora paulo, orbiculata, ad arvehisia accedentia: permixtis pinatis foliis, quam in reliquo caule minoribus, tamen dixi fibrosa ut in cæteris.

Camer. hort. Pisa atro-carpa. Compiler Tabern. Ic. & Hist. ponit figuram sine descriptione, hoc titulo: *Pisum proliferum. Büsch Erbsen.*

Iconè Tabern. assumpsit C. Bauh. apud Matth. pro Pisi maiore, quod non placet.

Trag. Pisorum genus *Kloz Erweissen & Psalz* floribus albis. Dod. gall. Pisi 2. flores platurumque albi: fructus rotundus, etiam sicca. Dodonæus videtur innominato Trag. ex eo suum genus secundum facere: figura, quam ponit nomine Ochris ex *Erulia Pisi moyens & peries*, huius plantæ non convenit, sed potius minori: An Pisi comosum, flores alterius coloris habeat, præterquam albi, nescio. Dodonæo non fuisse notum hoc Pisi, & noluisse citare Tragum, satis demonstrat omnium in postremis hoc Pisi genus

Libus &
tempus.

scriptis. Verum alienis se ornare plumis, hoc ei commune.

Pisum, quod comosum voco, antehac mihi non visum, Stutgardia missum, & à mein horto Principis plantatum, ad altitudinem hominis non excreuit, maturuit cum cæteris Iulio. Anno 1594. missa per D.D. Schwartz, cum hac inscriptione: Pifa magna, quorum plures siliquæ vno pediculo, seu caudice continentur. Sata Apuli floruerunt Iunio

PISA SINE TVNICIS DVRIORIBVS IN SILIQUA MAGNA ALBA.

Descr.

Pisum album ramosum in magnam altitudinem excreuit, siliquæ albæ magnæ, sine duriori tunica, totæ mandi possunt. In cæteris vulgari Pifo correspondet.

Cam.hort. Pifa leptoloba, quæ simul cum foliulis comeduntur, cuiusmodi Lobel. memorat è Vilda Lituaniz oppido allata.

Locus.

Habui ego in Sulz vrbe Alsatz ex horto nobilis viri à Pfaffenlap munerè vxoris eius Claræ à Rinack, quæ in horto Ill. E.C. sata prouenerunt Montbelgardi sæpius, ac aliis in hortis.

Vires &
vsum

De Pifo maiore anguloso, aliàs sordido, agens Dod.has ei facultates assignat. Pisum veluti Hipp. tradit, minus Fabis inflat, per alium autem magis secedit. Galenus, Pifa cum Fabis totâ substantiâ quandam habent, inquit, similitudinem, eodemque cum Fabis modo sumantur: his duabus tamen rebus ab eis discrepant, tum quod non equè ac Fabæ sunt flatulenta, tum etiam quod detergendi facultatem non habent: ideoque segruius quàm illæ per alium secedunt. Idè de Pifo minore, colore luteo subinde virente: Facultate & viribus Pisum istud Faselo simile est, nullam effectricem qualitatem insignem habet, & medium quodammodo locum obtinet inter ea, quæ boni ac prauis sunt succi: multum ac parum nutriunt: facilè ac difficilè concoquuntur: tardè & citò descendunt: flatulenta sunt ac flatûs experta, veluti Galenus lib.de aliment.facult.de his, & Faselis scriptum reliquit. Mart.Rulandus in Balnear. lib.1. classe 3.cap.1. ad scabiem, lepram, vice ra, & omnia cutis vitia, balneo vitur sæpius experto, ex Pisis cum foliis Quercûs in aqua fluuiat decoctis. Idem eiusdem operis.lib.1. classe 3. cap.4.ad achoras, &c. Pisor. Miii.decoq.in f.q.a. quæ: horum iuri admiscetur tantundem laxiui fortis, & facta ebullitione referuetur vsui. Caput eo lauetur quotidie ante cibum, & mox siccetur. Sunt, qui scribunt, autore Matthiolo, Pisorum iure hausto purgari puerperas, & lactis copiâ augeri, auriginolos sanari, & aquæ intercuti succurri. Sed procul dubio decipiuntur, quod hæc haud possit præstare, quod refrigeret & siccet: Verum errandi ansam cæteris præbuit Tragus, quippe qui perperam putarit Pisum Cicer esse arctinum. Errorè hunc debent diligenter vitare, qui suis puerperis Pisorum ius propinant: quin etiam iis, qui sumperunt purgatiuum medicamentum extergendi ventriculi gratia. Nulla enim Pisis inest absterforia facultas, vt docet Galenus. Idcirco Pifa dimitantur (inquit Saxon.) & in eorum locum Cicer, Faba, Lupini, aliaque id genus absterforia addant Poloni in balneis ad Plicam tollendam. In Germania, teste Trago, nullum in culinis frequentius legumen habetur Pisis, tam diutius,

Trag. repr.

quàm pauperibus familiare: cum radice Petroseolini decoctum, in cibo puerperis vtilissimum est: nam eo iure per vinam superflua multa purgantur, præsertim si decoctioni Macis & Rosmarini quid addicatur. Adfert quoque lactis copiam, vnde facilè colligi potest, Pifa, boni [vt vocant] nutrimenti esse. Breuiter citra periculum in omnibus ferè morbis iure decocti vti possumus, neque hîc curo, quid alii asseuerent, aut negent. Hortius ad dysenteriam pestilentialem scribit Pifa [Erbfen] nocua: cæterum, inquit Schola Salernitana de Pisis,

Sunt inflatina cum pelibus arque nociua,

Pelibus ablatis, sunt bona Pifa satis.

Turnerus tandem omnibus, quotquot ventriculorum, aut henem habent flatibus obnoxium, nimium Pisorum vsu, quacunque ratione præparatorum esse fugiendum suadet, nisi addatur Anisum, aut Cuminum, aut Mentha, aut aliud aliquid æquum. Cuiusq; igitur puluerem Menthæ pul- ti Pisorum addant:

PISVM GVINEÆ ALBVM, siue Cicer.

EX his aliis, Ciceribus & Pitis nostratibus paria, alia maiora, omnia ex rotundo nonnulli oblonga, leui nodique superficie, vnicolori, flavescente, nisi quod germien album, zonulæque modò obliqua, modò, recta, latior, nunc angustior dilutus flavescit. Saporidem qui nostratibus Pisis, quemadmodum & consistit.



Idem Pisum adhuc siliquæ suæ inclusum dono accepimus ab Illustissi. Ducissa Wirtembergica. Magnitudinem siliquæ, quæ minus Pisum continet, sua proportionali magnitudine docet pictura. Maiores habet Ill. Principissa. Cæterum singula siliqua singula continet Pifa. Siliqua autem non dura est, sed qualis ferè cæterarum, per ambitum compressior, & velut cristata, colore extrinsecus ex ruflo & flauo mixto & variegato: extrinsecus scabra, intus lævis. Ista Pifa misit Cl. Paludanus Ill.C. prædictæ, nomine Phaseli Guineæ, nobis verò anno 1598. utulo, Cicerum Indicorum.

Tertius lobus (inquit Clus. Exot.lib.3. cap.16.) paucis ab hinc annis ex Guinea inferri cepit ab Hollandis & Zelandis, qui exercendi mercimonii gratiâ illuc commeat: Illum autem Ciceris genus esse arbitrat Clusius, eam ob causam Cicer Nigritarum appellabat. A variis porro ipsi communicabatur, à Cl. V. Paludano videlicet, Wilhelmo Parduy, & Francisco Pennino. Erant autem hi lobi parui, semuncialem magnitudinem

Phaseli.
Guineæ.
Ciceris
dict.

non excedentes, tumidi: mucrone, hami penè instar, incuruo: rugosi foris, & ex spadiceo fusci coloris, internè candicantis, & læues: eos vnicum semen continere obseruabar. quasi orbiculare, minoris Pisi modo, non vnus tamen coloris, nam vel prorsus album, vel omninè nigrum, vel rubens, vel interdum etiam *variegatum*, ex albo & rubro variè distinctum.

PISVM BRASILIANVM FLAVESCENS
area fusca germen cingente.



Pisum Guineæ persimile, magnitudine par, aut etiam maius, itidem ex rotundo oblongum, cortice flavescente: verum Brasiliano huic germine candidum maius est, figura ouata, cuius circumscriptione cingit vndique area latiuscula coloris fusci. A germinis verò parte vna per vniuersum fructus ambitum zona quædam

candicans apparet, manifestum diuisi Pisi, sicut nostratis, argumentum.


Phasioli Brasiliiani nomine misit D. Paludanus ad Ill. E. Comitissam, ex cuius ego dono habui. Idem misit anno 1598. nomine Ciceris Indici.

PISVM BRASILIANVM PHOENICEVM
& nigrum.

Al. Paludano hoc nobis est, Ciceris Indici nomine: Piso Brasiliano magnitudine super, Ciceri æquale, aliàs ferè phœniceo, aliàs nigricante læuore conspicuum, non tamen rotundum, sed angulosum: hilo candido, fusca area circumsepto, à quo vtrinque elauata quædam extenditur costa, fructui concolor. Hoc idem nobis missum Stutgardia, per Ill. nostram Principissam D. Sibillam Anhaltinam, Ducissam Wirtemberg. & per hortulanum Ill. C. W. pro Faba Ægyptia duorum colorum: phœnicei, & nigri. Gener Cherlerus rediens ex Anglia & Belgio anno 1605, attulit coloris phœnicei & rubri, iniecta in aquam fundum petierunt: dentibus facillè confringuntur: nucleus albus in duas partes dividitur: sapor nostrorum Pisorum.

Eicon cum præced. habetur.

PISVM INDICVM VARIEGATUM.



Magnitudine nostrum Pisum maius variegatum æquat, verum rotundius paulò est, colore ex rubro & albo variegato, alba maxime area circa umbilicum existente: qui magnus latis ac penè fuscus, cuius partem oppositam rubram striæ albæ peruadunt. Eicon eadem cum ea quæ lib. III. cap. XII.

Colegi

PISVM INDICVM QVODDAM
rotundum, fuscum.

Am descripto Piso paulò maius est, orbiculatus, & à perfecta rotunditate non ita multum abscedens: colore obscuriore, & propè fusco, obscurè maculatum, summotenus area albicante insignitum. Vitis ac depictus apud celestissimam meam Ducissam Wirtemb.

Colegi

PISVM INDICVM MAIUS NIGRVM

Pisi Indici magni genus ab Ill. Ducissa Wirtembergica datum, Piso vulgato duplo maius est, penè orbiculatum, nigrum, parte quâ umbilicus est, compressa, per cuius medium costa elatior descendit.

PISVM INDICVM VMBILICO
eminente.

Pisum indicum quoddam esse facies arguit & figura: cicerè paulò maius est, sed orbiculatius, coloris pulli obsoleti, maculis subcinereis, aut candicantibus distinctum. Umbilico parte superiori eminet, quod in aliis Pisis non obseruatur. Etiam huius vltimam & picturam impertit Ill. Cels. Wirtembergica. Huius vt & trium immediatè præcedentium Icones habentur antè, sub titulo, Pisum Brasilianum flavescent, &c. Et Pisum indic. variegatum.

PISA INDICA FOLIS LONGIVSCVLIS

Pisi Indici pictura ex viva planta à nobis ex primitur. Hoc neque Pisorum caterorum, nec etiam Phasiolorum modo excreuit, sed folia profert multa, terna, longiuscula, magna & parua, ex longis pediculis hærentia: Flosculi minip,

LATHYRVS SIVE CICER
cula in genere.

CAP. IX.

Folia.
Caulis.
Vermes.

Substantia.
Locus.

Vfus et fa-
cultas.

Lathyrus non
venimus
Dioles nisi
minime O-
lor.

Cicerula.
Cicer.
Lathyrus.
Plinius err.

mixta foliorū
principia: sa-
por manifestus
nullus.

Pisa Indica
anno 1608. fara-
talia mente lu-
rio erant, qualia
icone in præ-
sens exprimi-
mus.

LATHYRI MAIORIS SPECIES
flore rubente, & albedo minore, du-
metum, siue germanicum.

Germanice
Lathyrus Descrip-
tor g. simulant
flagella, adu-
bitos aliquot
porrecti, an-
guloſa, & mem-
brulis aucta,
in varios ramos
diuſa: ſilia ex
pediculis pal-
mo longiori-
bus, longa, ve-
noſa, & acuta,
bina in ſiliis pe-
diculo, in ſiliis
tuncque in ca-
pſulis abſente,
proxima ſul-
tra complexus,
flores longis in-
tere pediculis,
Flores.

Pisum emuli, rubentes, minores quam Na-
bonensis Lathyrus: ſiliqua rubra, anguſta, pen-
rotunda, graua continent minora quam Vicia
ſatiua, quædam oblonga in Lathyrus, ſiue cata-
puta mir ore, nigre in ſiliis anguſta & ma-
culoſa. Hilus mediam partem ſeminis occupat:
ſapor leguminosus: radix ſubſt perennis, longa,
digito craſſior, ſingulis annis germinans. Eadem
eſt, ni fallor, quam reperi, colore partim albo, ſac-
nonnihil ex ſurco pallido.

Trag. in hiſt. lat. pingit ſub titulo Bœcher-
non tamen bene ſimpliciter ponitur, videtur e-
nim tradi ab illo in hiſt. germ. ſub titulo Pi. ſili.
wilde Bœcher & Vogelſwickſchen, breuiter ter-
minis deſcribens, dicit: Recentiores legumen,
quod nos Piſum Græcorum interpretati ſeruius,
Eruum & Orobum non ſine errore nuncupant.

Apud Fuchſium eadem icon eſt ſub his nomi-
bus Eruum ruſſi, & ſilueſtris Orobi, gall. Veſſe noire,
Eru. & deſcriptione autem Fuchſii, quæ ſerè nulla,
non poſſum iudicare quam intelligat plantam,
non diſtinguit ſuum ſatiuum Eruum à ſilueſtri, ni-
ſi colore ſeminis. Icon, quam ex Fuchſio repræſen-
tam, bene conuenit cum noſtro Lathyrus ger-
manico, à nobis iam deſcripto.

An Eruum Gulandini, quod Mochum in Italia
nuncupari ſentit? ſed plantam, quam Matth. pro
Eruo ex Fuchſio ſupponit, Mochum eſſe perne-
gat. Mochum Eruum eſſe verè dicit Matth. interim
tamen Mochum ignotam ſibi plantam ſtatuit,
quando non Mochum, ſed vagam aliam ſurpe-
pro Eruo picturæ exprimit.

Apud Cordum in Hiſt. non bene ponitur icon
ex Trago, pro Phaeolo ipſius Cordi.

Eruum officiis, inquit Matthioli, Orobus
Græcis, vulgò Mocho, Arabibus Herbum, Keiſene,
ſiue Kerſene, Italis Eruo, Germ. Eruen, Hiſp. Ier-
uus. Gall. Eruum ſic quæcuſſimum in Hebraea
naſcitur, ac ſeritur. Figura Matth. non malè con-
uenit cum Lathyrus magno, flore minore ger-
manico, vel cum Lathyrus maiore anguſtiſolio
flore maiore. An deſcriptio competat iconi con-
ſiderandum. In poſtremis com. ſuam omiſit effi-
giem, relinquens verba, quæ poſuerat, & aliam
ſurrogans nomine Climeni latiore ſolio.

Dodon.

Dodon. vocat Lathyrum siluefrem, floribus rubentibus, negatque esse Eruium quod perperam plerique aliquando crediderint. *Loniceri* descriptio non placet, videturque Lathyrus species confundere, dicens: *Bichern*, Græcis Lathyros, Latinis cicercula, aut Pisum Græcorum,

An Lobel. & Penæ sit Cicercula altera considerandum: an Phaseolus Diosc. Nonnulli Phaseolum suspicati sunt. Ego, vt verum fatear, Lobelium non intelligo, hæc descriptio videtur posse continere cum Lathyro Narbonensi, nec demonstrat quæ in re differat à sua Lathyride Narbonensi quam negligenter describit, non demonstrans flores.

An Camer. horti, Lathyrus silueftris alius angustifolius, de quo sub Lathyro maiori flore.

Hist. Lugd. Lathyrus satiuum angustifolius, quem Erui nomine depinxerat Matth. priore commentariorum in Dioscoridem editione, id est, in hoc genere, quod latioribus est foliis Matth. Clymenum esse vult, Cord. Eruium satiuum, Trag. Pisum Græcorum. Et Lathyrus silu. Dodon. Eruium satiuum Fuchsi: flores rubescunt: semen vt in Lathyro satiuo cōpressum, inæquales habet angulos, verum minus est, & durius, & colore in atrum degenerante. Malè assumpti Hist. Lugd. pro suo Lathyro iconem Matthioli, cui non sunt siliquæ latæ: absque iudicio præterea dicit Lathyrum siluefrem Dodonæi esse Eruium satiuum Fuchsi. Pisum Græcorum Tragi non est Clymenum Matthioli, sed Lathyrus anguloso semine, cuius figuram non habet Tragus.

Clus. in Pannon. Clymenum Matth. siue Lathyrus Dodonæi, vel Eruium satiuum Cordi. Item Hist. Lathyrus silu. Dodon. Clymenum Matth. Eius duo genera latifolium & angustifolium. Lathyrus Dodonæi, nostro quidem iudicio, diuersa est à clymeno Matthioli, quamuis eius sit species. Eruium satiuum Cordo esse non potest, diuersum indicante ipsa voce satiuum. Icon quidem, quæ appositæ est Cordi Phaseolo, est eius plantæ, quam intelligit Clusius pro Lathyro Dodonæi, ni fallor, quamquam icon in post. Hist. Exot. non sit huius Lathyrus, sed clymeni Matth. Lathyrus igitur angustifolius Clusii, est noster germanicus, de quo hoc loco agimus.

Eruium, Cæsalp. loquitur, quod vulgò *Rubiliam* vocant, tanquam Piseolus silueftris est: vendunturque eius grana recentia, aliquando pro Piseolis: deprehenduntur autem, quoniam decoctione rufescunt, & duriores permanent: cum perfecta sunt, nigra redduntur, sed decorticata, pallida sunt: gracilior eorum siliqua: folio consistat bipartito, angusto, digitali semine longitudine, medio capreolo, flore purpureo, qui gentinus in longo pediculo est: caules fert Piseolo similes: oritur sponte inter segetes. Quoddam genus in siluis nascitur, pluribus in eodem pediculo floribus, roseis: siliquis tenuibus, nigris. Plinius modò Eruium, modò Eruiam vocat. Theodorus Eruium vertit id, quod Theophrasto Ochros vocatur, quamuis aliquando ciceram vertat, quasi putauerit idem esse, Eruium, & ciceram, & Ochrum. De Ochro Theoph. & Gal. De cicera mentio est apud Columellam, qui pabuli potius generibus, quam leguminibus eam adnumerari testantur: nam bubus datur Erui modo. Hæc Cæsalp. Sed, vt verum fatear, nondum asserere possum, de quibus plantis scribat: Lectores igitur considerent, an fortè intelligat Lathyrum nostrum maiorem germ. & Narbonensem.


Eruiam, autore Anguill. hodie & Antiquis di-

cta & xec. Hodie in Italia Bononiensibus *Rouiori* Patani *Erbeggia*. Ast perquirendum quæ planta dicatur Bononiensibus *Rouiori*, & Patani *Erbeggia*, & an conueniat nostro Lathyro magno, Germ. vel Narbonensi.

Lathyrus maioris speciem flore rubente Montbelgardi habui in hortu Ill. E.C. à me satim: pro- venit copiosè in dumetis inter *Chasten*, & lapidem limitum Montb. viâ versus *Charmont*, & in monte vitium *La Chanx*: aues semina perquirunt & siliquas perforant, vt ea deuorent: abundat etiam circa Bessfordia castellum in sepibus, præterea inter *Mendiere* & *L'Isle*. Inueni aliquando vno miliari à Basilea prope *Brenzach*, in monte Marchionum Badensium mense Augusto cum siliquis & floribus prope *Morimont* in vitium colle, quem deserunt, abundabat mense Augusto siliquis serè maturis in dumetis. Inter Colmariam & Polauerier anno 1595. 9. Iulii. Prope *Than*, mense Augusto obseruavi cum flore suo rubente eodem anno: Iulii 4. inter Colmariam & Slestadt obseruavi Lathyrus magni speciem à præcedente non differentem, quod adhuc animaduertierim, nisi florum colore albo: cæterum in aruis & inter dumeta prouenit, inquit Fuchs. Læto, ait Dodon. pinguique agro circa eorundem margines prope sepes, dumos, ac senectute enascitur, quæ capitulo suo apprehendens conscendit & superat.

Locus.
Tempus.

LATHYRVS MAIOR LATI- folia, flore maiore purpureo ciclosior.



Nostri siue german. Lathyrus omnibus partibus speciosior, membranis albis, venosis, secundum caules prolixos apertis: folia bina, folia. nervosa, rigidiora, in obtusum mucronem desinencia, vnciam circiter lata, pediculo membrano in circuitu facessente adnæscuntur: flores sin-

gulari.

gulari appendice, dodrantali interdum, nituntur, multo iuncti, magni, purpurei, & colore grato, quos sequuntur siliquæ, vncias tres longæ, aut etiam maiores, vix semunciam latæ, nonnihil compressæ.

Matthioli in Diosc. clymenum dicitur, licet quæ planta sit clymenum in Italia nondum potuerit inuestigare: proponit tamen figuram plantæ, quam D. Cortusius ei misit, quæ satis representare videtur Lathyrum maiorem, latifolium, absque tamen vlla descriptione.

Lathyrus Narbonensis (aiunt Lobel. & Pena Adu.) latiore folio, valde verisimile est, à Lathyridis cataputiz grans, quæ Orobinis similia Diosc. dicit, nomen factum: In Narbonensi agro fre-

Cataputiz
grans.

Lobel. meta-
tur.

quentiore & impit ea, cui latiora, superne acuta, bina, nervosa, per intervalla oriuntur folia, sita & amulatione auriculari lepusculi arrectarum, aut Bupleuri Herbariorum. Item Obs. Lathyrus Narbonensis latiore folio, Anglis & Edelinge/ clymenum Matthioli, Erum latium cordi, Pisum Græcorum Tragi, Adu. 398. Ic. Plant. Lathyrus latiore folio: Figura Lobelii melius conuenit cum Lathyro maiore, angustiore folio. Pisum Græcorum Tragi, quod descriptionem attinet, differt à Lathyro Narbonensi, vti etiam figura Lathyrus germanici. Erum Cordi latium, est Lathyrus latius, non clymenum Matthioli, nec Pisum Græcorum Tragi, quod antè monuimus. Lobel. nimis obiter hanc plantam describit, nec demonstrat discrimen inter hanc & Lathyridem suam, & cicerculam secundam, Nec placet quoddam Lathyridem hanc, non potius Lathyrum vocet; Lathyrus enim dicitur de cataputia minore officinarum.

Cultura.

Clos. not.

An Thalia Lathyrus silu. maior, seu purpureus, caulibus quadratis. Hist. Lugd. Lathyrus satuus latifolius: Clymenum Matthioli. Camer. horti, Lathyrus silu. luteus, Clymenum Matth. flos dilute rubellus, imprimis elegans est. Planta ipsis pedamentis fulta, satis altè surgit, ideoque topiatio operi commoda est. Clus. Pannon. clymenum Matth. siue Lathyrus Dodonæi. Item hist. Lathyrus silu. Dod. clymenum Matth. duo genera, vnum latifolium. Sed diximus antè Lathyrum silu. Dod. diuersum à clymeno Matth. Icon ab eo proposita, eadem est cum Lobeliana. Verùm per genus Lathyrus latifolii ego intelligo clymenum Matthioli.

Scribit Pona in descript. montis Baldi, Erum latium Cordi, Pisum Græcorum Trago. Matthioli pro clymeno pingit, nos autem dicimus tres diuersas plantas.

Clymenum
Matth.

C. Bauh. not.

Casp. Bauh. apud Matth. clymenum Matth. Lathyrus, siue cicercula Dod. Lathyrus latifolius silu. Lugd. cicercula Cæsalpino. Ego aliter quàm frater C. Bauh. sentio: separo enim Dodonæi Lathyrum à clymeno Matthioli. Cicercula Cæsalpini esse non potest, quod satis demonstrat descriptio: tribuit enim ei siliquam latam & breuem, semen album, quæ non competunt clymeno Matthioli.

Locus &
Tempus.

Lathyrus maior, purpureus, repertus à nobis verno tempore in itinere Monspelio versus Peroux in sepibus, inter Valentiam & Viennam in agris. Florentem insuper vidi Argentinæ in horto D. Fridetici Meieri Iulio, & Augusto, & Septembri. Iac. Gargillus Scotus misit mihi ex Anglia eam, cui latiora folia, cum hac inscriptione: cicercula purpurea maxima Anglica.

LATHYRVS MAIOR NARBONENSIS ANGUSTIFOLIUS.

Locus

Descriptio.

Torr.
Flores.

Hanc Lathyrus speciem cum longioribus & angustioribus foliis, Monspelii obseruavi, vnde etiam similem attulit Gen. Chetlerus p. m. Folia huic sunt bina cum capreolo in medio bifido, vt in latifolio, folia ad originem pediculi foliati & laciniati quaterna, quorum duo maiora, & alia minora duo, quæ minùs feliciter in nostra icone expressa: flores magni, ex longo pediculo, latifolio similes figura, & flore purpureo.




Camer. horti, Lathyrus alius angustifolius à priore tantum hac notâ discrepans, & facillimè Hiemis, sarniam tolerans.

LATHYRI SPECIES LVTEA.

Lathyrus quædam species nobis visa fuit priorem anno 1608. florens Iulio in horto D. Fridetici Meieri, cuius semen ei missum fuerat pro legerum semine. Similis atque Lathyro silu. Narbonensi flore rubente, vel albo, folia enim habet bina, longa, ex quorum medio capreolus in aliquot partes superne diuisus prolixe, flosculus luteus diuersus à nostrate Lathyro siluestri luteo dametorum, cui flores sunt simul in vno pediculo iuncti: folia etiam sunt minora, & tota planta multò maior, ramosiorque, quatenus hucufque obseruare potuimus.

LATHYRVS LVTEVS SILV. DAMETORVM.



Ex radice repente, angulosis fistulosisque flagellis late se propagat, infirmis tamē & humi pronolutis, ni sustineatur bicubitalibus & altioribus: folia quædam calamos pinnatis alis amplectuntur, alia extremis adnatorum insident, bina, opposita, vt Lathyro siliqua hirsuta, vel cicercula, breviora, inter quæ tortiles capreoli enascuntur: flores cæteris Lathyrus similes, ex longis pediculis parui, lutei: siliquæ succedunt glabræ, quæ in curuæ, non gestant, interdum nonnihil incuruæ. Semina parua sex, vel septem, penè rotunda, lucida, non variegata.

negata, sublutea.

De hoc Dodon. agit in Hist. dicens : Terra glandibus simile quoddam legumen. Huius meminit & Traquas Hist. germ. vocans wild federn mit gelben blümen. Et Hist. lat. nomine Pisi silv. Græcorum flore luteo & vogels wiesen. Advers. Aracum appellant, & Ciceram luteo flore : & Ochræ vicium quorundam.

Thalio in Hærcynia, dicitur Lathyrus silv. floribus luteis.

A Gesnero de coll. stirp. fit Aphacæ, vel vicæ, aut potius Orobi species, floribus flavis.

Tab. Ic. & Hist. viciam appellat, Geel wiesen / Cicer. Vicia, Gall. Vesse. Belg. vitsen. Magno sanè errore Lathyro luteo Compilerator accommodat nomina Viciæ simpliciter dictæ : denominati non describunt.

An Cæsalp. hunc intelligit, quando ita scribit : Aracus exilis est planta, dodrantis altitudine : foliis Cicerculæ : flores fert luteos : siliquas longiores, tenuiores, rotundas, & nigras, in quibus semina rotunda, nigra & scabra : oritur inter segetes, gracili folio.

Aratus, inquit Theophrastus, in Lente nascitur : semen scabrum & durum. Galenus idem testatur ex Lente, inquit, degenerat : semen ineptum cibis, alibi inquit. Quod Aracon vocatur in Asia silvestre quoddam rotundum, ac durum, Erucæ exilius, in fructibus cerealibus repertum, quod seligentes proiciunt. Alibi Aracus ab eodem vocatur, semen Lathyro simile, adeo ut multi putarint, ab eo nequaquam genere diuersum esse, quandoquidem & vsus ipsius omnino, & facultas Lathyræ facultati similis est : nisi quod Araci duriores sunt, minisque facile elixantur, & idè concocti difficiliore. Hæc Cæsalpinus, ex quibus pauca quadam conueniunt cum nostro Lathyro luteo.

Lathyrus flore luteo Montbelgardi in horto Ill. C. Wirtemb. spontè & plantata floreus Iulio : passim etiam circa lepes, & in pratis, vt in ferarum horto E. C. flores adhuc Augusto cum siliquis. Obseruavi copiosam circa Bessfordiam, Basileæ mense Aprilis & Maio, ac Iunio extra portam lapideam. Lugduni au bois de la bonne Allemande floreus Martio, cum radice nodosa. Genevæ in pratis, sicut & Montpelii. Quidam volunt Erucæ genus, quidam cicerculam silv. Fuchsius præceptor meus, cum apud illum essem, Lathyrum. Frater Casp. attulit Patavio nomine ciceris Larinorum. Passim, inquit Thalys, locis cædis ac pratensibus provenire intuitus sum.

LATHYRVS SILIQVA hirsuta.

Radice est singulari, tenui, annua : angulosis caules, cubito longiores sunt : folia bina Lathyræ eius, quæ flore albo, & rubro est : at florum purpurascensium pediculi longi sunt, sesquipalmes aliquando ; licet & vix palmes interdum existant, in quorum fastigiis plures dispositi flores, qui delapsi siliquas relinquunt, longiores ; quàm in Lathyro flore albo, rubroque, angustioresque, verùm breuiiores & latiores, quàm in maiore germanico, sescunciam ferè longas, nõ totam semunciam latas, hirsutas, asperas : semina comprehendentes maioris germanici seminibus similia, minora, ruffa, vel nigricantia, rotunda, superficie crispâ.

Dodon. suum Aracum sic describit : Similis Tom, II.



Lathyro Aracus est, caule enim, folisque, eum omnino refert : flores habet ex rubra purpura in puniceâ inclinantes, siliquas paulo minores atque in his grana angulosa quoque & Lathyræ similia, sed minora, durioraque, minusque compressa ; colore obsoleta, nigroque proxima. Rarum & hoc etiam le-

gumen, quod neque ab aliis, quàm rei herbariarum studiois scitur.

Gall. lib. de Alim. facult. & arach. appellati scribit, & posteriorem nominis syllabam, per x, in Aristophanis Hæcadibus, notatam inveniri, ad differentiâ videlicet alterius Arachi, per x, qui cerealium frugum vitium est. Latini Ciceram nominant.

An Anguill. Aracos & Aracis. In Italia Mocho, Aracus, in Græcia hodie Araca.

An Adv. Aracus, aut cicera. Quamvis, inquit, distinxerit Galenus Aracum citra aspirationem scribendum, ab Aracho aspiratione scribi solito, vitiumque & exitium quoddam istud posterius Lentium & aliorum leguminum dixerit : tamen utrumque videtur ab indole sui cognati leguminis quasi in spurium abiisse. Est enim prorsum cognatus & similis, fortassis idem ille Aracus, quem quidam cicerculam alteram voluit : nec abs re, cum eius grana sordidiùs nigricantia inter Pisæ, Orobos, & Vicias pullulent, à quibus videntur degenerasse. Quod idem Columella affirmare videtur, quando nihil sapore, sed tantum colore à cicercula dissidere, eoque cicera vocari asserit. Tandem Obs. & Ic. Plantæ Aracus, aut cicera, Ital. Mocho, Adu. 398.

An hist. Lugd. cicera, cuius icon ex Lobelio proponitur, descriptio autem ex Dodonæ Arace siue cicera. Verùm nos dubitamus an Lob. eandem intelligat plantam.

Lathyrum huius hirsutâ reperi in agris Char. Lucus mont, necnon versus Chasseno circa agrorum Tempus limites : item versus Andincourt florentem Iulio & semine maturo Augusto. Transiit in hortum Montb. Ill. C. Wirtemb. vbi in magnam excelsit altitudinem. Lugduni quoque vidi. Frater C. Baub. obseruavit Basileæ. Hunc etiam conspexi, ni fallor, florentem Genevæ Maio & Iunio. In ducatu Wirtemb. propè fontem admirabilem Augusto, & in horto Friderici Meier Argentinz,

LATHYRI SPECIES QVÆ ERVILIA SILVESTRIS DONI.

Angulosos, aliarum Lathyrorum instar, Desf. les profert cubitales & bicubitales, quibus, nullo intercedente pediculo, amplexicaulia ad-

Ec 2

Folia.



Flores.

nascentur folia, oblonga, modò simplicia, modò in capreoloe abeuntia, non raro non tantum in hos degenerantia, nouam foliorum sobolem è lateribus, aut mucrone, iucundo naturæ lusu, patientia: flores ex foliorum sinu prodeuntes, singulares, & breuibus pediculis hærentes: siliqua vni-

as duas longæ, semunciam latiores, secundum longitudinem pinnatæ, quibus quina, senu, plûs minus continentur *Pisa melina*, & obscurâ quadam flauedine, non exactè rotunda, sed ex mutuo compressu utrinque sessilia; lineâ quadam albicante media longitudine prædita: magnitudine *Pisi albi* vulgaris, cum quo magna similitudo: idem quoque sapor.

Matth. in Diosc. cum magn. figuris Latin. &

Italica, *Arachis niger*. Planta, cuius imaginem expressimus, *Arachium* secundo loco à Galeno descriptum, & Theophrasti per omnia refert. Matthiolus suo more proponit solum iconè sine descriptione: ea icon accedit ad *Eruiliam* siluestrem Dodon. non tamen placet flores ex longis pediculis plures pingui in Epitome dicit caulem subasperum, siliquas *Pisi* minores, in quibus semen asperum, rotundum, pullo colore, quæ non respondet nostre plantæ. Cam. & C. Bauh. alias icones habet, in quibus flores melius dispositi & appicti: considerent lectores, an in descriptione epitomes Matth. non idem eueniat quod in figura, nempe mixtam, & confusam ex duabus plantis.

Dodon. gall. dicitur *Eruilia silu.* *Pois sauuage* flores albi, siliquæ rotundæ, semen rotundum: *Pisi* simile, minus, amarum, viride, durum admodum siccum. Herbarii serunt in hortis: *Pisorum* quarta species videtur, *Pisorum* siluestris species nominatim ea, quæ *Eruilia* siluestris Hermol. & Barbaro dicitur: Eidem de frum. *Eruilia* silu. siliquæ *Lathyri* similes, minores, in quibus rotunda semina, *Eruiliis* minora, & duriora, colore sublutea, sapore subinde subamara. Rarum & peregrinum legumen, quodque à studiosis herbarum tantum ac raro quidem in hortis feritur. *Eruiliam*, siue *Ochroa* siluestrem appellauimus alio destituti nomine. A veritate recessit Matthiolus, qui legumen istud *Aracum* & quidem nigrum fecit, plus huic similitudinis cum legitimo *Eruo* est. Item Hist. colore sublutea, aut nigra, sapore subinde amara. Huius leguminis cum *Eruo*, si non idem, affinitas maxima, & tanta quidem, ut pro *Eruo* succedaneo citra errorem haberi queat, atque omnibus medicamentis eius loco adhiberi. Suspecta nobis est descriptio Dodonæ, cui pro ratione stat voluntas, qui variè, prout voluit, & ipsi placuit, semen descripsit.

Lob. & Penz Adu. *Ochrus* silu. siue *Eruilia*. Siluestris indolis, velutique degeneres à *Pisi*, *Ochrisque* *Eruilia*, quasi eruentæ & eiciendæ

dictæ, raris nisi in hortis Septentrionalium Herbariorum hodie feritur: iuxta tamen sepes, vias, in *Linguagotia* spontè reptat imbecillioribus viticulis, membranula triplici, aut duplici secundum longitudinem veluti pinhatis, ima folia oblongiora & latiora, in clauiculas desinentia ferentibus: superne foliola verè partim in plura & minora diuiduntur, partim etiam clauiculis donantur candidis, & interdum purpureis, flore & siliqua cicerulæ, cui admodum similis. Item Obl. *Ochrus* silu. siue *Eruilia* Adu. *Cicer Oroboides* quondam. Ic. Plant. *Ochrus* siue *Eruilia*, Teut. 79. Tom. 2. Lobelius in Obl. proponit figuram Dodonæ. Dubito an proueniat in *Linguagotia*, siquidem inibi non obseruati quod ait de foliis, quæ superne in plura & minora diuiduntur, dubium mihi mouet, quia non respondet figuræ: si ipse non posuisset figuram Dodonæ, suspicatus fuisset, eum tradere *Lathyrum* flore albo, quæ *Montpelii* prouenit in segetibus, ubi etiam quædam flore rubente.

Genezæ prouenit mihi in horto, à quo tempore præterire triginta anni, quibus nunquam, vlla, donec anno 1601. ex semine dato per D. Fridericum Meierum nomine *Ochri* Dodonæ in horto Montbelgardenfi Ill. E. C. fata excreuerit, quæ tandem Augusti mensis principib. exaruit semine maturo.

LATHYRVS ANGULOSUS semine.

Angulosus, prolixis satis caulibus præditus, in ramos multos diuisis: folia pediculo hærent latiusculo, duobus ad exortum appendicibus, caulem complectentibus: sunt ea verò gemina, oblonga, acuminata, glabra, striata, inter quæ prolixius pediculi reliquum in tortiles abic clauiculas, quibus proxima apprehendit: ex pinnatarum appendicum sinu pediculi exeunt singulares, florem gerentes vnicum, maiusculum, album, quem excipit siliqua lata compressa, semina, claudens angulosa, candida, raris fibrosa, gracilis.



Quidam vocant *Cicer*, inquit *Tragus* *Eruia* *hern* / *cicer* *Aretinum*, alii *columbinum*, per nos quidè licet, verum dicimus *Pisum* *Græcorum* veterum: dicet enim *Plinius* lib. 18. c. 12. *Cicerulam* habere angulos ut *Pisum*. Idem in Hist. Lat. *Pisum* *Græcorum* satinum quod quidam *Eruum* & *Orobolum* non sine errore nuncupant. Icon, quæ est apud *Tragum*, non est *Lathyri* satini, sed maioris siluestris.

Officinis & Græcis apud *Lonicum* *Orobolum*, Latinis *Eruum*, Germanis *Erbsen*.

Fuchsi

*Fuchf. mo-
r.* Fuchfio *Eruum album*, & *fatuum*, & *des* Græci:
floribus candidis, vel in candido cæruleis, aut
puniceis: Verùm is nimium obiter describit, non
distinguens *latium* à siluestri, nisi solo feminis
colore. Quidam apud Fuchfium in Hist. Lugdu-
ni imprella annotat, *cicerculam* magis videri. Idè
de comp. med. Orobum, ait, hodie non cognos-
citur à nostratibus Pharmacopœis. Non enim
est hoc semen, quo pro eo aliquot annis vti cœ-
perunt: Ochri enim semina sunt.

*Lathyrum,
Cicercula.* Fuchfius, præterea teste Matth. in Diosc. hal-
lucinatur in suo plant. voluminè, *Cicerculam*
vulgò vocatam, *fatium Eruum* esse existimant:
et si omnes rei herbariæ periti à Galeno *Lathy-
rum* appellari non dubitent. An *Cicercula* An-
guillara à Theophrasto *adueges*, in Italia *ceserchea*,
cesera & *manaroba* vocata.

*Phafol. mi-
nor.* *Eruum album* ex Italia Gêsn. appellat, quod I-
talus *Moch* in Hetruria dictum sit, quorum utrū-
que quoniam summa illa amaritie quam Orobo,
i. e. *Eruo*, tribuit Galenus, caret,] an verus sit
Orobus dubitari potest. Eruditi quidā, vt Fuch-
sius, ni Gêsn. fallatur, pro *cicercula* accipiunt.

*Phafol. mi-
nor.* *Phasiolus minor* est, vt vult Cordus, qui ab
aliquibus angulosum *Eruum* appellatur. Flores
eius candidi, & semina colore candida. Radice tu-
berculis exiguis plerumque plena. Ast Cordo
icon alterius plantæ ex Trago non benè ad-
dita.

*Phafol. mi-
nor.* Bellonius scribit in Alexandria *Egypti* abun-
dare genus *Pisi*, quod Græci vocent *adueges*, Ve-
neti *Mauerette*, Romani *Cicercchia*, Galli *des*
Sars.

*Phafol. mi-
nor.* *Cicercula prima* Dodonæo gallico, *adueges*, cuius
flores albi, semen quoque album, angulosum,
Columellæ & Palladio *Cicercula*. *Lathyrus* non
est *Eruum*, vt quidem existimant. Idem lib. frum.
& hist. lat. in folio. Dodonæus olim posuit ico-
nem Fuchfii, quam etiam nos proponimus pro
Lathyro, siue *Cicercula*. In pos. hist. lat. eam ex-
hibuit pro *Araco*, siue *Cicera*, quod non placet:
non tamen displicet noua icon, quam in lat. ponit
pro *Lathyro*, siue *Cicercula*.

*Phafol. mi-
nor.* *Lathyrus* idem Narbonensem alteram consti-
tuunt *Aduersaria*, angustiore gramineo folio, cui
ibidem enata in vdis, folia admodum angusta,
graminea, venosa, & mucronata, bina, è pediculo
in tortiles, capillaceasque clauiculas desinentes,
Catanae [leguminaceæ] ferè sunt: defluxis al-
bidis, & luteolis floribus succedit siliqua com-
pressior, duplò breuior, latior superiore [Narbo-
nensi] latiore folio, ybi grana angulosa, pusilla,
Pisi, aut *Eruilæ* sapore. Obs. Angustiore grami-
neo folio *Lathyrus* Adv. 398. Lobelii descriptio
non conuenit, eo quòd non distinguat à sua *La-
thyride* latiore folio, cui nimis similem facit: icon
demonstrat eam, quam nos hoc capite tradimus
an florè luteolo extet, sub iudice lis est, miror
etiam Lobelium albedo flore dicentem, & non
albo. Illud præterea notandum, quod dicit semi-
na pusilla, qualia fortè in spontanea, non item in
fatium. Quæ causa sit vt in Iconibus Plantini,
omitatur icon proposita in observ. me fugit.
Malè tandem *Lathyrus* Lob. & Penæ dicitur, cum
Lathyrus dicendum erat.

*Phafol. mi-
nor.* *Cicerculam* vocat Cæsalp. scribens, semen esse
alterà parte depressum, quasi effigie cunei: cor-
tice leuissimo, albo, aut nigricante, aut vario, in
siliqua brevi, & lata: plantam autem breuiorem
Eruilo, humi procumbentem, multis ramis: folia
simili modo bipartita, & angusta, breuioraque:
flores purpureoscentes: ferè gracili folio: caput ten-
Tom. II.

tare, & officere luminibus.

Cæterum *Cicerculam* hanc refert frater C. Bauh:
Bauh. ad Clymentum Matthioli, cui penitus assen-
tiri non possum, vt suo capite dictum.

Græcis *adueges* dicitur (quemadmodum apud
Hist. Lugd. legitur): Larinis, vt Columellæ & Pal-
ladio, *Cicercula*: Gallis *des Gesses*: caules habet an-
gulosos: flores candidos: siliquas latas: semen
album, latum, compressum, inæqualiter angulo-
sum. Hunc *Eru* nomine depinxerat Matth. Figu-
ra Matthioli quam proponit Hist. Lugd. nullo
modo conuenire potest, siliquæ enim non sunt
latæ.

Lathyrus Dodonæi Camer. horti appellat,
flore purpureo, & alterum albo. *Pisum an-
gulosum* tam vulgò tam à viticolarum, quàm seminum an-
gulis dictum, & *cerbes*. Orobum Fuchfii, *Pha-
siolum* minorem *fatium* Cordi. *Cicerculam*
vulgarem, *fatium*, flore albo Clus. in Hist. nomi-
nat, *cicerculam* Plinii & Columellæ, *adueges*, *La-
thyrum*, Gall. *Cerres* & *Pois cerres*, appellant: Pati-
fientes *des Sars*.

Seui in horto *Lathyrus* flore albo Montbel.
Locus & gardi semine Stutgardia in horto Ill. Ducis
collecto. Semen maturum fuit Augusto. Monpel-
li vidi in tegetibus florentem Aprili, annua est
herba. Stutgardia autem in horto Ducis obserua-
ui florentem Iunio, flore omnino albo, ac etiam
partim albo, partim rubente, qui quantum dissi-
rat à sequenti, hæreo.

LATHYRVS FLORE RVBRO, & alius albo.

Flore & foliis proximè accedit ad *Lathyrum* Deser.
flore albo, inter segetes Montpellierenses ob-
uius: *flos ruber*, quales *siliquæ* & *semen*, tam non
succurrit. Aprili florebat Genevæ in horto.

Idem fortè cum precedenti, sed colore va-
rians.

An Dodonæi gall. *cicercula minor*, *deux* A. An *Cicer-
cula minor*.
racus, Lat. *Cicera* flore rubente. Item Hist. *Aracus*, Ci-
trum. & in fol. Similis *Lathyro* *Aracus* est, *raile*
enim, foliisque eum omnino refert: flores habet
extrinseca purpura in puniceum inclinantes, sili-
quas paulò minores: atque in his grana angulo-
sa quoque & *Lathyrus* similia, sed minora, durio-
raque, minusque compressa, colore obsoleta, ni-
groque proxima.

Rarum & hoc etiam legumen, quod neque ab
aliis, quàm rei herbariæ studiosis sentur.

Galib. de aliment. facult. *deux* appellari scri-
bit, & posteriorem nominis syllabam, per z, in A-
ristophanis *Holcadibus*, notatam inueniri ad dis-
ferentiam videlicet alterius *Arachis*, per z, qui cea-
realium fugum vitium est. Latini *ciceram* nomi-
nant, quòd videlicet *cicercula* similitudinem ha-
beat, atque solo potissimum colore ab eo diffi-
deat. *Cicera*, inquit Columella, sapore nihil à
cicercula differt, colore tantum discernitur: nam
est obsoletior, & nigro propior. Item Palladius,
in Martio, nunc *cicera* seritur, quæ distat à *cicer-
cula* solo colore, quo sordet, & nigrior est.

Est porò & alius *Aracus*, flore, fructuque can-
didis, cæterum magnitudine & formâ feminis,
reliquisque omnibus, priori similis, quem non A-
racum, sed *Lathyrum* minorem esse, fortè quis
dixerit.

Lathyro similis est *cicera*, vt Hist. Lugd. quo-
que tradit, caule & foliis. Flores habet ex rubra
purpura in puniceum inclinantes. Hanc *Lathy-
Cicera*

rum Hist. ex Dodonzo tradit, & ei adaptat iconem cicera, quam Lob. posuit pro Araco, aut cicera. Verum hæremus dubii, an Dodon. & Lob. eandem tradant Aracum.

LATHYRVS QVÆDAM, QVIBVS DAM
Egyptia Aracus.

Aracum
Egyptia
Caulis.
Folia.

Flores.

Aracus Egyptius Lathyro albo similis, infirmus, clauicularum ope bacillis iuxta depa-
ctis sese implicat, caulibus angulosis, quibus
membranula secundum longitudinem adnatæ:
foliis culmum latis, acuminatis, crassiusculo pedi-
culo adnexis, binis, striatis, inter quæ capreoli o-
riuntur: ad basim autem pediculi duæ veluti alæ
& flores ex longo petiolo inflexo singulares in-
sident, Pisti floribus æquales, supremo folio la-
to sursum expanso, foliis carneo, intus cæruleo,
excepta infima orâ rubente, colore prædito, alis
duabus foris coccineis, macula cærulea medium
peringente, intus cæruleis, excepta angusta pur-
purascente orbita: carina ex herbaceo albicat:
siliqua latæ, selunciam longæ, compressæ non ni-
hil, insigni sulco fimbriato altius exarata, semi-
na continent bina vel terna, magnitudine La-
thyri albi, angulosa, ac ferè quadrata, à crassiori
latere ad oppositum deversa, & in angustum
compressa, coloris infusci, minutissimis maculis
anthracinis confecta, gustu Pisorum dulcescen-
te, & dentium attritu substantia qualis Pisorum
æquabili.

Cicercula Egyptiaca, autore Clusio, à statu
vulgari non valde differt, floris color diuersus, in
hac internè elegans, cæruleus, foris ex cinera-
ceo purpureus: grana frequentibus maculis
nigris insignita. An Bellonio cap. 19. Obs. lib. 2.
Græcis vulgò Lathyri?

Existimo Clusium eandem nobiscum tradere
plantâ, quamuis icon non in omnibus responde-
re videatur, folia enim breuiora & latiora, quam
in nostro albo, vel Egyptiaco.

Locus
Tempus

Est nobis in horto Ill. E. C. missus per Dm.
Ioach. Camerarium pro Araco Hispanico, flo-
rens Iulio & Iulio. Redditus etiam nobis à D.
Iacobo Zuingerio: Basileæ eodem nomine.
Missus præterea pro Cicercula Egyptiaca per D.
Scholtzium. Argentor. obseruatus in horto D.
D. Melch. Sebizii, & Frid. Meieri cum flore & si-
liquis Augusto. Adhuc D. Doldius misit Norim-
bergâ siccam plantam nomine Araci Camer. &
Lathyri Egyptii, ascibens: flos pulcherimus
candidus, cæruleis lineis aspersus, quandoque
cæruleus cum puniceis: semen angulosum, la-
cum, & maculosum: caulis membraceus, folia op-
posita, & diuiscantia. Clusio primùm hæc
planta nata Viennæ Austriæ, semine in Egy-
pto collecto, & Constantinopoli misso: flo-
res tulit Iunio & Iulio, atque etiam in Septem-
bri: semen maturum fuit Augusto, & Septem-
bri. Francofurti etiam singulis annis provenit ex
semine communicato.

LATHYRVS FOLIO TEN VIO.
re floribus rubris.

Descriptio
Radix.
Flores.

Hæc aliàs est cubitalis, aliàs vix palmaris, ra-
dice tenui fibrosa: coliculi crebri, per quos
filia tenuissima, longæ Caryophylli holostei,
vel graminæ: flores rubri, pro plantæ proportio-
ne magni, similes Lathyro flore rubro: eadem
sortè fuerit cum modò dicta, foliis tantum ludēs.



Hanc Gener
Cherlerus attu-
lit Monspeho,
nomine Lathyr
graminei, cubi-
to multò altio-
rém: siliquis la-
tis, in quibus
semina tria, qua-
tuorue, Orobie-
xistimati magni-
tudine, vel Vici-
æ luteæ, penè
rotunda, apera-
ta, fuscis macu-
lis obfusa, hilo li-
neis fuscis pi-
cto.

An Lob. icon.
Lathyrus angu-
stior gramineo
folio?


Quæ itur Monspeho Frontignanum reper-
mus, locis siccis & fluestribus mense Aprili flo-
rentem. Cuidam docto viri videbatur hæc
esse Araci species, vocarique vulgò gallicè A-
rouce.

Locus
tempus

CATANANCE IN GENERE.

CAP. X.

Catanance [κατανάνη] altera folia habet lon-
ga, inquit Diosc. velat coronopodis: radi-
cem tenuem, iuncum: capita [κεφαλαία] Dod. ex
vet. exempl. Nōt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1

CATANANCE LEGUMINOSA
quorundam.

Catanance leguminosa dicta, Lathyrum familiae congener legumen est, tenuibus, ramosis caulibus, quibus nulla apte membranae: folia & longitudine graminea, interdum angustiora pediculis destituantur, venosa, acuta: flores tenuibus pediculis insident ex foliorum sinu ortis, pal-
mum nonnumquam longis: si-

lique uncias tres longa, plus minus angustia: grana decem, duodecim, aut plura continent nigricantia, rotunda: radice nititur inutili.

Vocat D. Agerius Lathyrum angustifolium, ipse in huius radice observauit Orobanchen. Dubitant Advers. Erum silv. Herbariorum, sitne *catanance*, siue Amatoria, aut Necessaria, non bulbosa Vnguimilua Diosc. Quasi necessitate inconcussa, & fatali adigeret ad amandum, Catanancen vocarunt, quasi amoris illicium necessarium. Plinius: cuiusque coeui cordati viri, consilio figuras harum tacerunt: nec Diosc. vires, sed historiam duntaxat alienam citat. Quodpiam genus leguminis fuisse hanc descriptionem ostendit, cui non male quadrat ea herbulam, quae Lagopi angustifolii foliis visitur. Alteram catanancem cicercis nomine non nouerunt. Dubium idem mouent Obs. & Ic. Plan.

Genea: prouenientem intuitus sum catanancen leguminosam, quemadmodum & prope Schweghaufen in Sinconia. Et quia folia graminea fortitur, facile ab olitoribus euellitur, ideoque radix eius annua non est, licet anno sequenti ex semine deciduo sponte regerminet.

Hac, teste Lobelio, in hortis Herbariorum Iulio & Augusto siliquas fert: visitur etiam in agris littorum maris Septentrionis.

LEPORIS AVRICULA
Cesalpini.

CAP. XL

Leporis auricula vulgo appellatur, auctore Cesalpino, herba multis ramis, humi stratis: foliis indivisis, praelongis, instar leporinae auriculae: strobilis luteis in summis ramulis, ut Securidaca: siliquas fert longas, tenues, hirsutas, inuicem implicatas: seminibus distantibus: prouenit lato solo.

Dioscorides Clymenum vocat: ei, inquit, caulibus Fabae, quadratus: folia Plantaginis: folliculis supra caule inflexis, ut Polyporum Cirri: proba-

tissimum est de montibus: celebratur succus ad sanguinem sistendum.

Plinius clymenum a Rege quodam appellatum scribit: vnum quidem foliis Hederæ, ramosum, articulis præcinctum, graui odore, seminibus Hederæ. His intelligit, quam alibi Periclymenum vocari diximus.

Alterum Græcorum sententia, Plantagini simile, caule quadrato, folliculis inflexis, ut Polyporum Cirri.

ISOPYRON VETERIBVS.

CAP. XII.

Isopyron aliqui Phasiolum vocant, ut nobis auctor est Diosc. eò quod Phasiolo simile sit, & in summo folio pampirum ferat [*ἰσώπυρον τὸ πᾶσιλον ἔστιν ἀπὸ τοῦ φασίου λέγουσι*]. In summo caule sunt capita, tenuia, seminibus referta, similibus Melanthio in gustu. At folium Aniso simile est. Huius semen cum aqua multa potum dolores circa thoracem, & tussis sedat. Conuenit etiam sanguinem spuentibus & hepaticis.

Hæc paulo aliter Plinius ita refert: Isopyron vocant aliqui Phaseolum iuxta veteris codicis lectionem. Nam vulgata exemplaria Phasioli vocem non habent, Corn. Iquoniam folium, quod est Aniso simile, in Phaseoli pampinos torquetur. Capitula sunt in summo caule, tenuia, plena seminibus Melanthii. Contra tussim & cetera pectoris vitia, cum melle, aut aqua multa, item iecinori vultuina.

Galeno Isopyron, aut Phasiolon, semen amarum & acerbum habet. Proinde extergit, & secocat crassos humores, simulque contrahit, ac adstringit corpora. Et ob id reiectiones sputorum ex thorace adiuvat, & hepatis repurgat. Et sanguinem spuentibus non aduersari sed ipsos insuper adiuuare creditur. Nam propter mixtam temperiem conuenite videtur, etiam ad contraria.

Ignotum est hodie omnibus, quod sciam Isopyron, inquit Corn.

ISOPYRON, CESALPINI.

Semen est simile Erulio, atrum, rotundum, Squod dum viride est, coquitur, ut Piscolus, sed perfectum negligitur: eius planta sponte prouenit inter segetes, caule ferè simplici, cubitali, procumbente in terram, nisi adimnicula habuerit: folia fert non diuisa, ut cæteris leguminibus contingit, sed integra, ternorum digitorum latitudine, in tres capreolos delinencia: florem in albis foliorum fert luteum, siliquam Piscolo, teste Cesalp. tenuiorem.

Aliqui, ut Diosc. notat, Isopyron, Phasiolon, appellant, nonnulli verò, ut Plin. perhibet, Fascoion vocant.

PISVM SILVESTRE.

CAP. XIII.

Tres, quatuorue singularum foliorum con-
gationes costæ aptantur in capreolos delinencia: sunt ea autem Capparium foliis aequalia, modò leuiter acuminata, obliquis venis striata.



Pisum sil.

Elueſtie Pannonicū, in Fraconia alicubi darm-
gichſtrau. [Tabern. verò icon. Piſum, ſilue-
ſtre, wilberſen. Piſum ſilueſtre, de quo aiunt
Aduerſaria, in Heluetia, & ſuperiore Germania,
non lectus ac Phaeſus ſilueſtris [Galega verna]
obuiam ſe dat peregrè eunti. Quidam in ſuo v-
niūſ paginæ ratiōrum ſtirpium libello, affirmat
in ſaxis littoreis, nulla terra oportis, tantam ſe-
getem Piſorum ſpontè enatam in Angliæ Suffol-
cia inter Otfordum & Alburnum, etiā Au-
tumno 1555. vt mille hominibus ſuppeteret.

Locus

Hoc Piſum diu ſiccum habui ſine nomine, ne-
ſcio vnde: verū anno 1591. Toſſianus Carolus
doctus pharmacopœus Burgundus eius ſemina
miſit nomine Piſi Indici, quæ Plantæ in horto Ill.
E. C. & hortulo meo Montbelgardi, nec primo,
nec ſecundo anno ſtorem protulerunt: Piſum
ſilueſtre Cluſio primū conſpectum vltra Dra-
uium flumen in Pannoniā, iugis arcti Grebeſi
vicinis, anno 1579. copioſè inter ſaxa naſcens:
vnde poſtea Ill. Heros Balthaſar de Battyan, qui
Cluſium in eam provinciam deduxerat, maturum
fructum illi adferri curauit. Subſequentē
deinde anno aliis locis Viennæ vicinioribus ob-
ſeruabat, veluti in ſiluoſo illo monte ſupra Gum-
poſtkirchen, item ſupra Poſonium, & in Ley-
tenberg. Floret Iunio, ſemen maturum ſit Iulio.

Tempus.

APHACE IN GENERE ET EX
Veterum placitis.

CAP. XIV.

Aphaca diſſert ab *Aphia* quæ olus item eſt, vt
Aphaca: diſſert & ab *Aphaca*, quæ arbor.
Aphacām Theoph. modò leguminū generi,
modò inter ciera copnumerat, & vt verum ſe-
teatur Hermolaus, idem; an diuerſum genus ſit,
ſerè ambigit. Sed Aphacam[us] teſte Cor[re] Plinius
ita deſcribit, vt Dioſcoridem exprimat, aut certe
eum autorem, vnde Dioſc. tranſcripſit. Meminit
Aphacēs aliquot locis Theophrastus, ſed in his
ambiguos reliquit Lectores, an de olere, aut fru-
g: loquatur. Strangulari: certè Aphacas à Secun-
daca lib. 8. hiſt. palam dicit. Gal. lib. 1. aliment.
Aphacen cum Vicia, quam *Bicora* apud Aſianos
vocari dicit, coniungit. Et quatuor Theophi: A-
phacam non inter legumina, ſed inter Cichoracea
deſcribat, ait Caſalp. attamen videtur aliquando
etiam eam inter legumina reſcenſere, vt cum in-

Pisum Gal.

ex alē ſinu ſur-
culus longus
enāſcitur,
thyrtum co-
moſum gerēs,
ſlouum, Vicia
maiore paul-
ſo: ſiliquæ ſuc-
cedunt Piſi
aruenſis pa-
res, non niſi
compreſſæ,
glabræ, ſemen
claudentes.
Foliorum ma-
gna ſimilitudo
cum vicia ma-
xima ſiluatica,
ſed firmiora &
magis polita.

Cam. horti
vocat Piſum

quit, celeriter perit, vt Dolichus, eius ſiliquæ ſe-
nter Jatz: in Aphacis naſcitur Secundaca: ſerò
inter legumina ſeritur, ſed in his videtur aliquam
ſpeciem Lentis ſignificare. Gal. Secundacam non
in Aphacis, ſed in Phacis [Lentibus] naſci ſcribit.


Aphacem autem tanquam Vicia æſinem tradi
ad brutorum pabulum colligi ſolitam à ruſticis.

Plinius Aphacen vocat, vt ab altera Aphaca di-
ſtingueret, quæ inter cichoracea reponitur. A *phacy*
tandem ſit ex [*phacy*] paruus eſt, autore Dioſc.
naſcens in aruiſ, altior Lente, tenuibus ſollis, quæ
verò in ipſo naſcuntur ſiliquæ, maiores Lente, ſe-
mina continent tria, aut quatuor nigra, [in cod.
Baſil. *per dion*, pro *per dion*] Lente minora. Aphac-
ca, inquit idem, tenuia admodum folia habet, pu-
ſillo altior Lenticula eſt. Siliquas maiores fert, in
quibus terna, aut quaterna ſemina ſunt, nigriora
& madidiora, & minora Lenticula. Naſcitur in
aruiſ. Aphace & vicia ſeminum figura non eſt
rotunda, veluti Fabarum, vt Gal. tradit aliment.
lib. 1. cap. 36. ſed al. quanto latior, quomodo Len-
tium. Caterum Vicia nomen apud nos quidem
eſt trium, & quæ ſolo nōminatur. Attici verò
vicia, aut Fabam appellant.

Aphaca ſemina, autore Dioſc. vim habent ad-
ſtringentem, vnde alii, & ſtomachi fluxionem
ſiſtunt, ſi ſitica, & ſeſela Lentis modo coquantur.
Naturam ad ſpiſſandum Plinius Aphacæ tradit
efficaciorē, quā Lenti. Reliquos autem viſus
eodem. Hanc quoque cum iſſis ſiliquis inte-
gram plantam ruſtici reponunt, vt bruuiſ peru-
dibus ſint pabulo. Per ſumem tamen quoddam
noti, ait Galenus, qui hanc quoque comedunt
potiſſimum Vere, cum etiam virent, quemad-
modū Fabas, & cicera eſitare conſueverūt. Sunt
autem non inſuauia modò, ſed concoſta etiam
difficilia, aluumque inhihent. Perſpicuum ergo eſt
quod, cum natura ſint eiufmodi, alimentum,
quod ex iſſis diſtribuitur, haudquaquam boni
lucii, & craſſum, ad ſuccum melancholicum gi-
gnendum idoneum, ſeu de Lente dicitur. Verū
illi quidem multa bona inſunt, his autem nihil
bonorum illius adeſt. Idem Gal. 6. ſimpl. Aphacæ,
inquit, vim habet adſtringentem, quemadmodū
Lentis. Sed & ſimiliter vt Lentis, editur, & ægruiſ
quidem, quā illa, concoquitur, ſed validius ſi-
cat. Caliditate quoque moderata participat.

VICIA VULGARIS SATIVA.

CAP. XV.



Annua. Deſer-
A eſt planta
Vicia coli ſoli-
ta, caulibus cu-
bitilibus &
proceriobus,
anguloſis,
ſtuatis, hirsu-
tis, cauiſ: folio-
rum coniuga-
tiones decem,
aut duodecim
coſtæ adhe-
rent longæ,
tandem in
torſiles clau-
culas, quibus
proxima attri-
bit adminicu-
li, deſcendit:
vncialis, aut

paullò minor, angusta, per extremum lata, hirsuta, eadem interdum alternatim rachi alligantur, ex vniuscuiusque costa *stos* aliquando enascitur vnus [interdum plures] quem *siliqua* excipit quadrantalís & longior, vnciam ferè lata hirsuta, *semina* claudens Pisis aruenfibus paria, nigricantia, compressa.

Biunfello Eruum. Inuenit Hermol. è Recentioribus, qui viciam esse Aphacen existiment. Ast cum Marc. Virg. non facìle Aphacen ratiocinetur aliquis Viciam notissimam omnibus frugem esse: & si congener, aut similis illi sit, siluestrem existimandam esse.

Tragus in Hist. germ. vocat *wicken*, aut Viciam *Roswicken*/ *Grosowicken*/ *Zam vnder feldewicke*/ Lat. *Eruum*, Auc. *Erbum* & *epocor*, cui opinioni tamen resistit Manardus. Is autem dicit *Orobum* *Græcorum*, *Eruum* *Latinorum*, & *Almelis* *Arabum* esse *wicken* in Virgilio *Vile*, in Serap. *Heisne* & *Kesen*, aut *Keser*. Hæc Tragus, qui meo iudicio Viciam satiuam & maiorem vocat, picturam autem eius non exhibet.

Vicia maior, inquit Gesn. *Zitscher wie Erbs*. Fuchf. Vicia & *Eruum*, quo Officinæ non sine magno errore pro *Orobo* vtuntur. Hunc Germ. *wicken* simpliciter, vel cum adiectione *Samwicken*. Gall. *Pesse* vocant, de qua Varro. Effigies Fuchfij minús conuenit: videtur enim composita ex Vicia multiflora, & vulgari satia, folia enim similia Viciæ multifloræ; flores autem vulgari; quam ille, qudm ei Tubingæ contiuerem, vocabat Aphacen maiorem: nos Viciæ satiaæ veviore figuram iungimus.

Quibusdam, vt Dodon. placet, Os mundi dicitur, Belg. *Witsen*, nec est *Eruum*. Idem de Frument. & in fol. Vicia; de qua Varro, Gal. in Asia Pergami *Elexon*; ab Atticis verò *epocor*, aut *wicor* nominati ait. Officinæ præterque perperam *epocor*, ac *Eruum*.

Theoph. Aphaces leguminis meminit: hæc an cum Vicia nostra conueniat, considerandum est.

Dodon. gall. habens iconem Aphaces Fuchfij pro Vicia & pro Aracho, mered in post. eam reiecit, tanquam ex duabus compositam.

An Anguill. Vicia nigra? Lob. & Penk Adv. *Cicor*, Vicia, de qua Varro. *Epocor* Atticis. Item Obs. Vicia, Angl. *Fiche*/ Belg. perperam *Orobis*. Ic. Plant. Vicia Teuc. 88. Tom. 1.

Cordo in Diosc. *Orobum*, *Eruum*, omnes passim Germ. *wicken*/ sed errore seducti: est Latinorum Vicia, & Græcorum Aphace, scli *Boria*.

Figuram habet Lonicerus sub titulo *Zaitwicken*/ *Roswicken*/ quæ Viciæ non videtur.

Existimo Matthiolum in Diosc. per Aphacen intellexisse plantam; de qua hoc loco agimus, quamvis viciarum generata confundat, vti etiam earum nomina; & icon eius aliam plantam denotare videatur, quæ vt Fuchfij, ex variis plantis composita est: necesse correxit in post. com. Italicis. In Hist. germ. huius plantæ Historia confusior, quia Aphacen; germ. *Wick wicken* vocat, i. e. Viciam siluestrem. Figuram eandem habet, quâ olim pro Aphace. In Epit. Matth. cum addit. Cam. simpliciter dicitur *Bixor*, Vicia Ital. *Vescia*. Mihi quidem Camerarii figura placet: ast Matthiolo patrocinate, nullam attulit ei lucem, nec patrocinateus est.

Clus. Pann. Vicia vulgaris satia. Item Hist. Vicia. Hic Veram viciam expressimus (inquit Hist. Lugd.) Math. autem nomine Aphaces depinxit, quam Gal. cum Vicia coniunxit. Hist. Lugd. intelligere Viciam vulgarem satiuam non

dubito, verum quicquid sit veram non exprimit: nam Aphace pictura Matthioli est Viciæ inter frutices prouenientis.

Vicia secunda C. Bauh. apud Matth. siue angustiore folio, Vicia Matthioli, Vicia vulgaris satia Clusio, Aphaca verè Lugd. Arachus Dod. gall. Cracca primum genus Dod. in fol.

Matthioli figuram Frater retinet, quæ falsa: sunt enim appensæ siliquæ foliis: an Matth. intellexerit satiuam viciam, non abs re ambigitur: ei enim Viciæ semen est minus, quàm in Aphaca: præterea in Vicia utraque, tum satia, tum silv. folia non sunt acuminata. Vicia latia non bene meo iudicio dicitur angustiore folio: multæ siquidem silv. Viciæ sunt magis angustiore folio, quàm satia. Hist. Lugd. habet quidem Matth. figuram falsam, sed per eam non intelligit Viciam satiuam. Dod. Arachum vocans, de silv. Vicia loquitur, non de satia, nec etiam figura eius Fuchfiana conuenit cum satia, aut silv. Dodonæi in hist. Lat. Cracca primum genus, non est Viciæ satia, sed silv. satia laudabilem figuram posuit p. 521. pro Vicia.

Vicia, auctore Casalp. semen est nigrum, aut maculosum, Lente rotundius: flores purpurei, aut in cæruleum vergentes: Differunt semina inuicem, crassitie, rotunditate, amaritudine: amarior, quod tenuius est, & rotundius: huius siliqua brevior & aspera.

Vicia vulgaris satia copiosè in agris Montbelgardensibus feritur, & potissimum circa *Blamothrum*, vnde Montbelgardum adfertur; pro pabulo Columbarum eis gratissimo, quum interea Gallia, vti mihi affirmatum, non facìle iis velscantur, anates verò, si comedant; moriantur. Semina matia Julio & Augusto.

VICIA ALBO SEMINE

Mitisco foliorum lusi penè imponat alicui; veluti Proteus aliquis, vt eadem non eadem putari possit: ex his enim alia ferè rotunda, alia longa, & angusta: *stos* vnicus, vel geminus, multæ purpuræ pictus, qua in re à Vicia, Aphace dicta, seiungitur, breui pediculo hærens: *siliqua* diuersæ quoque, *seminibus* copiosis (nouem etenim grana in vna numeravi) grauidæ, albis penitus, aut subpurpureis varis, aut virore pallentibus, ad Pisorum vindium minorum (quæ magnitudine quoque adæquant) figuram, palloremque atcedentibus: à quibus tamen seiunguntur, quod quæ siliquæ adnectuntur, non, vt illa, nigricant.

Huius meminit Tragus in Hist. germ. sub nomine *Wick wicken* suspicaturque Fabam Veterum. Idem in Hist. lat. *Eruum* candidum vocat; conicitque esse Fabam Veterum. Inter Ciceris Arietini genera reperitur quoddam coloris pallidi. Hoc genus Erui (quod germ. *Wick wicken* vocant) Pisum esse proclui errore quis iudicare possit sed neque ad Pita, neque ad Orobo commodè refertur potest. Hoc *Eruum* Fabas esse eas, quarum Veteres seorsim sub Cyami appellatione mentionem fecerint, suspicatur Tragus. Anguill. Vicia alba.

Habui Montbelgardi in horto Ill. E. C. Adhuc propè Bessfordiam reperi in agro satam cum Pisis. Argentinae Iulii principio dedit D. Agerius platam virentem, cum siliquis delatam ex Moltheim nomine Pisi gallici, ita nominantibus

Iesuitis, qui semine eius velscantur.

Arach.
Cracca.
C. Bauh.
Garri
[sic]

Locus
Tempus

Folia dupli
cia.
Eru
siliqua

Locus
Tempus

VICIA VVLGARIS SILVESTRIS
femine paruo & nigro, frugum.

Semen.

Siliquis.

Sepalum.

Kittus.

Matth. si.
graculum.

D. Bauh.

V. rasil.



A Vicia la-
tiuā se-
mine potissi-
mū differe
videtur, quod
admodū par-
uum & rotun-
dum, copio-
sum (ad octo-
na eximere
memini) in si-
liquis angu-
stioribus, lon-
gioribus, ma-
gisque tereti-
bus, quā vi-
cia lepiam,
minūs hirsutis
& ferē glabris,
quā sicca ni-
grescunt.

Aphace al-
tera Manard. (de qua Diosc. & Gal.) inter legu-
mina reponenda: Vicia adeo similis, ut eius no-
men etiam hodie adhuc apud turā retineat, &
silu. Vicia dicatur quā in aguis sapissimē spontē
nata videtur.

Trago in Hist. lat. Vicia minor, & Vicia terti-
um genus: Idem Hist. germ. *Das Ort wischen*
geschlecht: potest comprehendī sub Orobanche
aut Erui angina Theoph. Hoc licet non pinga-
tur à Trago, descriptio tamen, & iam dicta nomi-
na huc referre cogunt.

Viciam minorem appellat Gesn. Vogel wist
cuius siliquæ subrubræ, antequam maturescant
rūben wist.

Matth. in Diosc. nomine Vicia nostram Vici-
am vulgarem silu. femine paruo intelligere vide-
tur: nullas amen descriptio commoda, figurā ac-
cedit iconi Fuchsi, quod folia attinet: siliquæ
cum floribus appensæ foliis, siliquæ certe:
quidam vidit tale aliquid in genere Viciarum.
In post. com. Ital. nihil corripit: dicit errare eos,
quā hanc Viciam Aphacen putent, uti olim dixe-
rat. In hist. germ. idem siliquæ habet nomine
Vicæ & wischen. Qui eius patrocinium suscepit,
nihil hic patrocinatur. Aphaca Vicia species,
quā nostri (ait Corn.) vogels wischen, & wild-
wischen appellant.

Casp. Bauh. qui Viciam vocat apud Matthioli
falsam eiusdem figuram retinet, ac sativam vul-
garem esse: cui cur assentiri non possim, antē di-
ctum.

Dod. gall. *Lepeux* & Arachum Galeni lib. de
elim. faculi, dicit, & nominat gallicè *Vesse*, aut
Vesse sauvage, Belg. *Broef*. Idem hist. frum. &
in fol. *Cracca* primum genus. Hoc vitium Græ-
cis *Lepeux*, Gall. *Veseron*, quasi Viciolam, aut Vi-
ciastrum, Germ. *Wild wies* & S. Christoffels
Braut / Brabantis *Croc*. Ruellius etiam *Cracca*
appellari refert. Fuchsi *Aphacen* appellat. Matth.
vero *Viciam* fecit, sed utique à veritate recessit.

Figuram Fuchsi habebat olim Dod. quā me-
rito in postremis reiecit: an Aphace Fuchsi, si
eius *Cracca*, ut vult, dubito, figura non indicat:
non porro descriptio conveniet, iudicent alii.

Lob. & Penz Adu. *Aracus*, siue *Aracca*, & *Croc*: *Aracca*
ca maior. *Vicia* silu. Semina non compressa, ut
Vicæ & Aphacæ. Item Obl. *Aracus*, Gallis *Cro-*
ques. An vera Aphaca Diosc. Dalechampio?
An Anguil. Aphaca, Patavinis *Vesione*, & *Ce-*
setone.

Aphace, Cordo Vicia est, quæ spontē in arvis
nascitur, quā Germani *Feldwischen*.

Lonicæ figura, quā sub his nominibus pro-
ponit, *Wild wischen* / *Feldwischen* / S. Christoffels
Braut / Græcis Aphacæ, vulgō Vicia silvestris:
non convenit Vicæ vulgati minori.

Hist. Lugd. Aphaca vera, Vicia Matthioli.
Aphacæ rectē fortasse dicitur legumen, quod
Matthiolus nomine Vicæ exhibuit. Hist. ean-
dem nobiscū Viciam intelligere facili existimo,
verū figura Matthioli falsa, non bene con-
uenit.

Abundat in agris Montbelgarden sibus: eandē, Locu-
ni abat memoria, florentem reperi cum suis flo-
ribus purpureis passim in legetibus circa Mon-
pelium mense Martio, Aprili, & Maio.

Huic affinis, si non eadem, angustioris folia
ac tenuissimis, longiusculis, flore pulchro, pur-
pureo, à me reperta, cum essem Montpelii, inter
saxa, quā iter Frontignanum mense Aprili. Frater
C. Bauh. similem Basileæ collectam misit. Dedit
nobis D. Agerius Viciam, ex cuius radice erumpit,
ut in Cistis, & Ledo, Orobanche, cærulea.

VICIA SILV. QVASI INCANA
flore albo.

Mltos ex eadem radice, quæ perennis est, Descri-
profert ramos, teretes, striatos, ped. des, e-
tiam cubitales interdum, quos ambiunt foliorum
alæ, quemadmodum in vicia vulgari fativa, & sil-
vestri, sed densiore lanugine obductæ, & quasi
incanz: capreolis, quibus, vicino gramini se im-
plicat, extremam alam occupantibus: flores in
superis foliorum alis, terni plerumque, Vicæ
vulgaris floribus persimiles, candidi coloris, su-
periore tamen folio, obsoleti coloris venis inter-
ne distencto, inferiore foliolo eiusdem coloris:
floribus succedunt siliquæ, seu vaginæ planæ
(quantum videlicet ex illarum rudimentis colli-
gere licuit) Vicæ vulgaris siliquæ similes: radice
fibrosa est, tuberculisque ut Leguminum pler-
que radices viuaes, donata.

Clusio dicitur Vicia silu. albo flore, tamen in Pan-
nonia, quā in post. Hist. siue genus primum.
Hungaris *Waryw borso* / hoc est *Cornicis Pisum*,
nuncupatur.

Nascitur in arvis desertis apud Chyzreg op-
pidum in Pannonia situm. Maio mense floren-
tem anno 1579 Clusid. ntaxat observabat.

VICIA SILV. FLORE AL-
bo alia.

Viciam silvestrem flore albo in Austria col-
lectam dedit nobis D. Agerius, ea videtur
similis foliis luteis, pilosis: stas in sicca pallidus
apparet: siliquæ principium, quod ad-
fuit, latiusculum, pilosum.

VICIA

VICIA LUTEO FLORE SILV.




EX vna radi-
si, in numero-
si, indeque fle-
xuosi exeunt
cauliculi, angu-
losi, in alas al-
ternatim diuisi:
quibus folia hæ-
rent Vicia satia-
uæ similia, dena,
duodena, plûs
minûs, quorum
costa in tortile
claniculam ter-
minatur. Alarû,
foliorumque
commixtis flo-
res singulares,
ex breuissimis
pediculis pen-
dent, speciosi sa-
tis, ex luteo pal-

lidi, quibus silique succedunt vulgata Vicia fili-
quis breuiiores, habitiores, crassiores, latioreque,
albâ hirsutie pubescentes, in quibus semina qua-
terna, aut quina, fusca, maculata, aliquantûm an-
guloſa, compressa que: sapore leguminoso.

Montspeli obseruauit mense Martio & Aprili.
Montbelgardi mense Maio: semen maturum Lu-
nio. Quotannis ex semine deciduo repullulat, ac
totam Hyemem perfert.

VICIA SEPIVM PERENNIS.



Prope sepes
provenit,
caule duorum,
triûmve cubito-
rum longitudi-
ne, foliis non
multum à foliis
Vicia vulgaris
satiuæ abluen-
tibus, subindeta-
mè variantibus,
in tarsû dispositis
per coniugatio-
nes, quales ali-
quando in vno
folio tredecim
num. rari, quan-
quam toleant
multo etiam
paucioribus cõ-
stare: singula-
ria folia à Vicia

satiua eò potissimum differunt, quòd quâ parte
costæ adnæctuntur, latiora sint, indeque sensim
atque uentur in mucronem [sicet & quædam ro-
tunda satis reperiantur] minûs hirsuta, sapore sa-
tuo, viscido, flores vniuo pediculo rubenti hærent
plures, ad sex vsque, quod non bene exprimitur
in nostra Fuchsiana icone, è calyce purpureo; v-
nicolores, non bicolores, vt in Vicia satia & sil-
uestri vulgiori: quamquam intenuonem quan-
dam, & remissionem coloris in partibus floris
est obseruare: siquidem folia eius inferiora satu-
tiora purpurea tincta sunt, & penè nigricant:

superiora dilutiùs purpurea sunt. Siliquarum infi-
gne discrimen: tam feliciter siquidem florum
vbertatem vna duntaxat, aut altera siliqua exci-
pit, minor, multoque breuior, latiuscula interim
& compressa, glabra, non vt satia & hirsuta, per
maturitatem nigra, præque nigredine penè lu-
cens, semina claudens Pisi sapore, medullâ luteâ,
formâ variâ, modò longiora, interdum fusque de-
que aut alutisecus compressa, non exactè ro-
tunda, plûs quàm dimidio sui siliquæ adhærel-
centia, intercedente apophysi longissimâ, vt in
Lathyro maiore, minora quàm Viciarum satia-
uarum, coloris albi, punctulis discursantibus,
quantûm hætenus obseruare licuit: radix pe-
rennis, reptatix, Aristolochiæ clematidis instar, fi-
bris multò minoribus, dulce quid [satorum legu-
minum de more] respiciens.

Trag. germ. sub titulo *Wass ander wiesen ge-
wache/ wald wiesen/* & Orobi silv. sepium Vi-
ciam pingit. Latinus verb, nomine alterius maio-
ris Vicia generis, & Vicia maioris silv. An au-
tem in descriptione, & inter nomina sit secun-
dum genus, dubium mouet, quod ait, semen
grandius, quàm in satia, quod hætenus non
dum obseruauit.

An Gesn. de hort. Vicia floribus rubicundis,
eidem de coll. stirp. Aphace Fuchsi, genus Vicia
siluestris:

Apud Tabern. dicitur *Cracca maior*, *wyschen*.
Græc. *αράχνη*, Vicia, & *Cracca*, Arab. *Apaki*. Ital.
Aphaca. Belg. *Croef*. Boh. *wischen*. Quàm bene
autem Tab. distinguat nomina Viciarum, faciliè
peritioribus constare poterit.

Fuchsio dicitur Aphace, & vulgò Vicia silv. &
Os mundi. *wild wischen* germ. Aut *S. Cristoffels*
Frut. Gall. *l'esse sauuage*, aut *l'essera*. Figura Fuchsi
satis commodè exprimit Viciam nostram, at de-
scriptio minûs placet. Dodonæus olim sic: Vi-
ciæ Fuchsi accommodarat, quamuis aliam plan-
tam intelligeret, quod in Hist. frum. & in folio de-
monstrauit, vbi suæ Viciæ vetiorem figuram ap-
posuit.

Aberrant tandem, qui censent Aphacam nihil
à Vicia differre vt ostendit Galenus.

Plinius Dioscoridis Aphacam ad verbum retu-
lit, inquit Matth. *αράχνη* Græc. Lat. *Aphaca* & *A*-
phace. Arab. *Apaki*, *Asaki*, siue *Albika*. Ital. *Apha-
ca*. Germ. *wild wischen*, & *Vogels wischen*. Figu-
ram eandem, quam Fuch. pro Aphaca habet
Mathioli, verum descriptio non placet. In
post. com. Ital. & Hist. germ. eandem figuram
proponit, non demonstrans de qua planta lo-
quatur. In Epit. tandem Matth. cum add. Ca-
m. r. alia Aphacæ species nuncupatur, Vicia se-
pium figuram aliquam fortè ponit Lonicerus, sub
dictione *wischen* quamvis de ea non loquatur in
contextu. Multum etiam differre Vicia silv. Lobe-
lii Obs. quamuis eandem faciat C. Bauh. apud
Matth. dicens: *Vicia latior folio*, *Aphaca* Matth.
Vicia maior silv. Trag. *Vicia silv.* Lob.

An potè Clus. Pannon. & Hist. Vicia pluri-
mum in Belgica vepribus se implicans?

Minimè tandem gentium Vicia vera cum A-
phace Marthioli, quod Hist. Lugd. placet, conue-
nit. Diximus enim antè figuram Matth. non con-
gruere cum Vicia satia, est namque Vicia quam
sepium perennem vocamus.

Copiosè provenit in sepibus & pratibus circa
Montbelgardum, nec non spontè in horto Ill.
Et C. floret Aprili mense. Circa Beffordiam quo-
que florentem obseruauit in tepibus Augusto, &
in fine eiusdem mensis cum semine deciduo:

Siliquæ

Semen.

Orob. silv.

Aphacæ.

Cracca maior.

Tabern. maior.

rator.

Os mundi.

Vicia minor.

linguæ.

Matth. rator.

C. Bauh.

nui.

Hist. Lugd.

error.

Locus.

tempus.

Basilica & alibi quoque à me obseruata est.

VICIA SILV. LUTEA CVM
galea fusca.

Locus.



Flos.

Folium.

Siliqua.

lum, ut in illa: folia verò diuersa, quinque tantum coniugationes supputauit, foliola breuiora, latiora, ad foliola Vicie sepium perennis accedentia, paulò rotundiora tamen, folia desinunt in capreolos: siliqua etiam quamvis nondum matura nobis videbatur, attamen ad modò dictæ Vicie siliquam, eam suo tempore accessuram, colligere haud difficile fuit.

VICIA MULTIFOLIA CVM
latis siliquis.

Flos.



Flos.

Siliqua.

siliques singulares etiam, primò valdè hirsutæ, postea minùs, sed tactu asperæ, vnciam vnâ & semis breuiores, & vnciam semis ferè latæ, in iis grana quinque obseruauimus, cuius sint coloris: vel magnitudinis, dicere, non possumus, quia immatura.

Vicia silvestris nomine dedit mihi ramum D. Agerius, collectæ circa Bononiam, cui tribuebat florè luteam cum galea fusca: in hęc sanè inferiora labra lutea apparent & nescio què obscurum colorem habet, flores maiores, quàm luteæ à nobis descriptæ, bini ex breuibz pediculis iuxta fo-

HELENIVM ÆGYPTIVM EX
genere fortè Viciarum.

Planta gracilior, quàm sequens, in asperis & petrosis nascitur: dodrantalibus cauliculis erectis: foliis ab radice longioribus sequenti, nullà ferè diuisurà, in canle autem crebris diuisuris, gracilioribusque: flosculi ferè veluti in capitulis rubentes: & exiguas ac breues siliquas folliculis inclusas: radice nititur tenui, colore buxo. Huic & sequenti non absimile videtur Helenium Ægyptium apud Diosc. descriptum ex sententia Crateuz.

LUPINVS SILV. ITALORVM
rusticorum, Castalpi dictus.

Planta hodie à rusticis [italicis] Lupinus siluestris vocatur: oritur prope flumina præcipuè in maritimis: caulibus humi repentibus, cubitalibus, circa radicem subrubentem: folia fert diuisa Lentis modo: foliolis sc. coniugatis in pediculo dispositis, colore, & figurà Lupini, infernè candidantibus, supernè virentibus: flores in racemulis oblongis, colore sanguineo siliquas vaginà inclusas, tenues, asperas, interceptas, ac depressoas, quasi Lentis, inuicem hærentes: eà pinguescunt immatæ, & à morbis curantur.

VICIA MULTIFLORA PERENNIS,
NEMORENSIS, SIVE DVMECEUM.

Perantonasiam floridæ nomen meruit Vicia, quippe quæ velut iubam, numerosissimos confert, eodem vergentes, paruos, capreolos, aut purpurascētes flores Vicie proferat, spicæ æmolas, in furculo peculiari ex alarum sinubus orto: folia angusta admodum, acuminata, hirsuta, in alam digesta, Vicie vulgaris satius ferè instar, in agro lighali diori natæ, costæ extremum in capreolos abit quemadmodum in Vicis & Lentibus: caules bicubitales, striati, in ramos satis rectos diuisi.

A Clusio ita describitur:

Cubitalibus est ramis, striatis, lentis, infirmis, & humi, nisi capreolis sese sustineant, procumbentibus, obliquè, modò in hanc, modò in alteram partem, secundum foliorum alas, inflexis, è quibus frequentes plerumque ramuli enascuntur: foliorum ala oblongæ, tenues, deorsum incuruæ, seu nutantes, & in binos capreolos desinentes, duodenis, vicens, vicens senis, aut pluribus, interdum oblongis, angustis que foliolis succrectis, & ex aduerso nunc æqualiter, modò in æqualiter nascentibus, præditæ sunt: flosculi elegantes, Vicie silu. albo flore, quali incanæ floribus formæ non dispares, minores tamen, & Astragali montani (Clusio Onobrichidis quartæ) flosculis propemodum respondētes, coloris ex cæruleo purpurascētis, vici non nunquam, aut plures, spicæ instar in oblongis nudis ramulis, ex superiorum alarum sinu exeuntibus, nascuntur: deinde vncialis longitudinis siliquæ exiguum semen continentes: radix tenuis, latè serpens, & sub tellure se condens, singulis annis nouos, frequentioresque ramos proferit.

Ea

Est apud eundem Pannon. Vicia silu. spicata flore: & Hist. post. Vicia silu. Pannon. 2. Hungaris Waryo borfo [Cornicis Pifum] quoque dicta, [omne namque silu. Viciae genus ita nuncupant] quæ plurimum à Belgicâ, vepribus se implicante differt.

Trago germ. die fünffte wickel / Aphace Diolc. germ. S. Christoffels Braut. Lat. Os mundi. Quibusdam Schwarz linsen. In Lat. autem, Vicia silu. altera, Vicia alia in dumetis, Vicia quinta, Vicia postrema, quæ in dumetis nascitur, arden.


Dod. gall. Vicia secunda silu. prima quæ potest vocari Arachn. gall. l'esse saunage. germ. wilde wicken Belg. wilde Wüsen. Item frum. & Hist. in fol. Nostri wilde wizen, hoc est, Viciam silu. aut germanicam, non in propriè G. l. gam silu. aut germanicam quis ipsam nominat: nam Galege quædam species videtur.

Gesl. de Lunatis, Trago Viciae genus in dumetis nascens. Et de coll. stirp. Vicia quædam silu. floribus coruleis. An eadem ibidem Vicia quædam [peces] an Aphace.]

Tab. ic. & Hist. Aracus, Vicia, Aphaca. Vogels wicken.

Viciam multifloram habemus in horto Montbelgardi C. W. in medico, & ferarum, passim etiam abundat in dumetis & pratis. Obseruavi Basileæ florentem Iunio & Iulio, Bessfordia prope castellum etiam in pratis, & Montpeli cum flore Maio in fegetibus prope Castelneuf. Aliquando Gesnero plantam siccam cum descriptione missi, sine nomine. Frater C. Bauh. attulit ex horto Patuino nomine Anthillidis primæ Dioscoridis Guilandino.

VICIA PARVA, SIVE CRACCA MINOR CVM MYLTIS SILIQUIS HIRUTIS.



Ex radice exili & inutuli, quadrati, tenues, & infirmi exeunt coliculi importuna alarum vbertate luxuriantes; filia Lentis foliis paria, lauia, pinpata, raro sibi mutuo reponderia, ad medium nervum annexa, ad septendecim; qui in tortiles capreolos variè paruos facellens septem infulto cõ-

plexu arripit, strangulat, excretescens interdum ad tres cubitos: ex foliorum alis hinc inde enatis pediculis stesuli insident racematim, quatuor, vel quinque, eodẽ spectantes, pusilli, ex albo subpurpurei, quos siliquæ excipiunt semunciales, hirsuta, quarum singulæ bina grana insunt Viciae sepium minora, rotundiora, magis m. ulata.

Trag. germ. das fliss wickigste wicken: potest e. mprehei diub Oubai che. in Emangi-na Diosc. & Theophrasti. Idem. in Lat. Omni. m Tom. 11.

minima Vicia: quantum & genus. Tragi Viciam minimam, quod referam non video, nisi sit Cracca minor.

Tab. ic. Cracca minor Klein wild wickelen Hist. etiam Vicia, Aphace & Aracus.

Lob. & Pena Arachum vocant, siue craccam minimam: & aracum, siue craccam minorem, habentque figuram Dodonæi, & contine in Aduersariis quatuor granula contineri in siliquis, quod non dum animaduerti, sicut recte uat. Dod. qui binatantum in illis deprehendimus. Dicitur autem Dod. g. l. Vicia silu. x. Atachi species In Hist. verò frum. & Latin f. l. Craccæ alterum genus, Brabantis Broc.

Abundat in agris, etiam in horto Ill. E. C. a me lata, quæ se propagat semine deciduo, quoniam. Frater C. Bauh. attulit Patuino pro cicere silu. Cortusi: sis Basileæ obseruauit, & Geneuæ florentem & siliquas habentem vidi Iunio & Iulio. Montbelgardi florentem & semine maturo Augusto.


Cracca minor.

Arachn.

Locus:

Tempus

VICIAE, SIVE CRACCAE MINIMAE SPECIES CUM SILIQUIS GLABRIS.



Est praecedenti tenior, foliis similibus interdum, tamen rarioribus, pediculo tenuissimo, longo, ex foliorum alis natio: si s. in natio v. i. ens, hinc purpureus, saepe vel duo, vel tres, quem sequitur siliqua, praecedentis cracca siliquæ par, glabra, torosa, duo, tria, aut etiam quatuor grana continens.

Deser.

Hanc fecit Lob. & Pena considerunt cum Dodonæi craccae altero genere, de quo ante.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. & passim in agris floret Iulio mense, semine maturo Augusto. Hanc & Geneuæ quo dñm obseruauit in agrorum limitibus.

Locus & tempus.


VICIA SILVATICA MAXIMA PISO siluestri similis.

Omniū Viciarum, quotquot hactenus videre licuit, maxima est, multorum cubitorum, foliis ad Viciae sepium folia aecedentibus, multo maioribus, & Piso siluestri respondentibus, sefucialibus, viciam latis, modicè obtrusis: flores surculi cuiusdam longissimi extremum occupant numero si, purpurei, subsequeantibus siliquis pari cum Pisorum magnitudine, compressioribus, latis, glabris: radix crassa, nodis intercepta, reptatrix, caulium complurimum propagine ferulis, perennis.

Memisse huius Tab. con. & Hist. credimus, & hoc quidem titulo Pisi silu. minoris, Klein wild Erbsen.

Pisum silu. minus.

Locus



ter Weil & Basileam cum siliquis Nouembri.

Viciam gl-
maticam autē
voco Vicia
genus hoc à
me olim re-
pertum pro-
pe Tigurum.
Hac mihi
prouenit
Montbelgar-
di in horto
Ill. E. C. Ean-
dem copiose
reperi circa
fontē admi-
rabilem Bol-
lensem cum
flore & sili-
quis mense
Augusto, &
veniendo
Rheinfeld ih-

VICIA ALIQUA.


Description. IN ramorū cacumine flores congestos possi-
det, Polygalis Gelsneri pares, nec ab simili fi-
gura, sed colore cæruleos: folia pinnata costæ
annexa, Vicia foliis longitudine paria, angusta:
costa extrema in capreolos desinit.

Nobis attulit Gener Cherlerus, ubi collegerit,
non recordatur.

VICIA SILV. CVM LENTIS
siliqua.

Caulis.

Folia.



Dodran-
talē ha-
bet caulem gra-
cilem, angulo-
sum, glabrum,
ramosum folia
duarū, triū-
ue vnciarum,
tarsi effigie,
singularia,
cracæ minimæ
foliis non ma-
iora, per extre-
mum obtusa &
veluti cordata:
costæ extremū
in tortiles cir-
rhos abit: ex
alæ sinu enatus
pediculus vn-
cialis florem ge-
nit vnicū, Len-

Siliqua.

Semen.

Locus.

tis flori similem, quem excipit siliqua vnciā lon-
gior, semunciam lata, glabra, compressa, duo,
aut tria claudens semina, orbiculata, Lentis ma-
ioris.

Pictor nosset malè pinxit folia acuta, quum
sint cordata quodammodo.

Nemausi in Gallia Narbonensi collectam mi-
hi attulit Gener Cherlerus.

VICIÆ PARVVM GENVS, FOLIO
longo.

Locus.

Cvbitalem Monspelio allatam dedit ramum
Frater C. Bauh. angulosum, foliis alatis, costā



in capreolos
facessente: sin-
gularia folia se-
scuncialia, &
duarum vnciar-
um, aminea
vix culmū lata,
in acumen des-
inentia: siliqua
longo surculo
peculiari he-
rent, multi, o-
blongi: sequun-
tur siliqua crac-
æ minores,
nonnihil lon-
giores.

VICIÆ PVLCHRVV GENVS MVL-
tisolum, siue Galegæ species
quibusdam.

Costæ lon-
gæ in ca-
preolum des-
inenti alligan-
tur folia inter-
dum viginti, in
acumen desin-
entia, glabra:
florū idem po-
situs ex longo
pediculo, pau-
ciores, vt ani-
maduertere
adhuc licuit;
paullō maiores
singuli, quales
ferè Viciæ se-
pium, purpu-
rascentes, nisi
fallat sicca plā-
ta. Ramosa est
hæc Vicia.

In foliis fideis nullum manifestum animadu-
erimus saporem.

Argentini anno 1595. habui ex plantis fideis D.
Agerii, qui postea anno 1600. dedit nomine Ga-
legæ alicuius ex monte Apennino.

VICIA, QVÆ PITINE ANGVIL-
LARÆ, LATA SILIQA, FLO-
re luteo.

Pitine Anguillaræ dicta, legumen est, ex radi-
ce tenui & annua caules plures proferens
angulosos, cubitales, dodrantales, & selsquicubi-
tales, ramosos, tenues, imbecilles, nec nisi ca-
preolorū ope, quibus se proximis circum voluūt,
humo surgentes: folia ex intervalis bina, opposi-
ta, cauliculis sine pediculo adnascuntur, triquetra,
Helxines cissampeli, lævia, tenera, striata, sursum
plerumque spectantia, & caulem veluti comple-
xa, ex quorum alis subinde rami prodeunt, foliis
eodem vestiti, nec non clauiculæ tortiles, itidem-
que pediculi duabus vnciis longiores, quibus
singulis singuli insident flores lutei, Lathyræ lutei
floribus



floribus simili-
les, quos *siliqua*
exciunt vn-
ciales, aut fef-
cunciales, latius-
culæ, modicè
falcate, com-
preffæ, in qui-
bus sex, feptem
ue femina, Len-
tibus minora,
non ita com-
preffa, fed paul-
lò rotundiora.
quæ modò ni-
gricant, modò
rubeſcunt, mo-
dò variegata vi-
dentur.

Hæc eſt illa,
quam Dod. paſ-
ſim *apocynum*, A-

phacam, & Aphacen Dioſc. & Plinio, ac Galeno
dictam ſcribit. An autem nomina Italica *Vicioni* &
Ceſerone quæ Lob. & Pena in Adv. & Obſ. hunc
plantæ tribuit, conueniant dubium mouet, quòd
Anguillara ea alteri adſcripſerit. Nunc ſi Geſne-
ro fides non abroganda, malè Anguill. *arum* ex
Theoph. conuertit. Pitine namque pro Serpillo
corruptum apud Theoph. eſſe vocabulum, ob-
ſeruauit primò Geſn. quod idem poſtea, ad plan-
tam ſiccā, quam ei inter alias Monſpelicias
traſmiſi, annotauit.

Aphaca, Camer. horti teſte, ſeu Pitina Theoph.
depingitur à Dodon. Lob. & Lugd. Lugd. qui-
dem hiſce vocabulis: Orobanche, legumen, aut
leguminis vitium, *deſcriptum* Theoph. Gal. & Plinio.
Aphaca Dod. quam Theod. in Theoph. Eru-
gam vertit, alii Eru anguinam. Sed dicam liberè,
hæc planta non placet pro Lugdunenſis Oro-
banche, Cæſalpini ſententiam potiùs approba-
rim, qui Cuſcutam Orobanchen putat. Eius ta-
men opinionem, & eorum qui eum ſequuntur,
apprimè recipio, qui Aphacen ſtatuit: Theo-
phraſtus enim ſcribit Securidacam in Aphaca
naſci, quaſi ſatua ſit Aphaca.

Cæſalp. porrò hanc vocat Aphacam flore lu-
teo, Dioſc. Gal. & Plinii. Aphacen, cui ſemina ma-
didiſſima, & minora Lenticula: per madidiſſima ve-
rò ſignificare videtur, lubricum lentorem, qui pe-
culiaris eſt in Aphace ſeminibus. Dicitur à Tab.
Elatine tertia.

Quotannis ſemine deciduo ſe propagat in
horto Ill. E. C. aliàs ſpontè Montbelgardi copio-
ſè prouenit inter ſegetes. Monſpeli obleruauit,
nec non in Italia, vt Bononiæ. Baſileæ florentem
& ſiliquas habentem menſe Maio. Hanc Geneuæ
vocat *Peſere*.

VICIA FOLIIS ARACVS Anguillaræ.

A Racos Galeni prouenit inter ſegetes foliis
ſimilibus Viciæ, ſed anguſtioribus. Flos eſt
coloris ruſſi, & ſemen ſimile Eruo, verùm caret,
inquit Anguillara, nomine vulgari.

An non fortè à nobis ſub alio nomine tradita,
Lectores inueſtigent.


Tom. II.

LENS.

CAP. XVI.



Lens minor.



Legumen Deſer.
hoc inſi- Cauter.
mis caulibus
humī proſter-
nitur, niſi in
propinquo ha-
beat cui ca-
precolorum am-
plexu innitens
ſeſe eugat: ra-
dix it dem pu-
ſilla: ſilva pin-
nata Viciæ, mi-
nora, h ruita:
flores purpura-
lunt, vel albeſ-
cunt: ſiliquæ
breues, com-
preſſæ, ſemina
duo, aut tria
continent, cir-
cinata, com-
preſſa, colore
albido, vel ſub-
nigro, ſeu ful-
co, patua, val-
de læuia, quæ
cortice demp-
to in duas par-
tes ſcundun-
tur: *Lent alia.*

Eſt & alia
vulgari Lente
omnibus par-
tibus ſpecio-
ſior & maior,
[ob id dicta
meiùd maior
Lens] herbâ, ſo-
liis, flore albo,
ſiliquis, vt &
ſmine, quod
Lentis vulga-
duo aut tria
ris grana fa-
cilè æquat.

De Lente hæc ſcripſit Theoph. Lenti caulis
in larus tendit. Hæc præarida ſine vilo odore,
maximè inter legumina fertilis eſt, & ſommatim,
quæ ſemen ferunt puſillum. Lentem porrò [eu-
ius in leguminum genere ſera ſatio eſt] vt traſſet-
cat, paxillo demittunt.

Inuenio apud authores, inquit Plinius, æqua-
nimitatem fieri veſcentibus eâ. Hinc Rhodig. [vt
Dalech. notat] lentos dictos vult patientes, lenes,
minimè iracundos, quamuis & pigros, incurio-
ſos, ſegnes, ſic etiam vocent. Genera Lenti in A-
gypto (pergit Plin.) ſunt duo, alterum rotun-
dus, nigrusque: alterum ſua figurâ. Vnde vario
uſu tranſlatum ſit in Lenticula nomen.

Hinc etiam Marſialis rem exigua & ſerè nul-
lius momenti ſignificare volens, ita canit:

Accipe Nilicam Peluſia munera Lentem

Valior eſt aliſca, carior illa Faba.

Cæterum, inſit Tragus, Lens, quæ de Theoph. Len- Differentia
tis vulgaris, ſeu agreſtis, grana alia ſubruffa, alia Trago.

Æquanimi-
tatem pa-
rit.
Lenti qui
dicantur.
Genera duo
Plin.

Exigui mo-
menti.

D d

ex luteo pallida; nonnulla ex cano nigricantia apparent: humidâ verò cali tempestate prorsus nigra euadunt. Serap. *Hader*, Hebr. *Aflach*, Chald. *Iamina*, aliàs *Theulſcha*. Lens fatiua maior & latior. Lentis vulg. granula haud temerè supra quatuor in filiqua. Lentes in Vicia degenerant.

Lonicer. pingit, dicens: *Linsen* vocari Græcis Phace.

Dodon.
tabul.

Dodonæo in fol. additæ duæ sunt icones: vni titulus *Lens*, alteri *Lens minor*, cum tamen duarum in descriptione non faciat mentionem. Sed *olla*, quod dicitur, *Lenticulam attigit*. Quemadmodum enim olla fictilis Lentem amare videtur, ac velut vltro venire ad Lentem: ita Dodon. ad exhibendum absque descriptione figuras vehementer propensus, ac velut ad id natus, duas nullâ additâ descriptione proponit.

Etymol.

Lentem ex Etymi vi dictam esse *Cornario* videtur, quasi lenis dicta sit, lenitque significationem habeat. Nec Germanos aliter *Linsen* appellare, quàm velut *Linde*.

Nomina
linguarum.

Phakos Græcis [aut or est Matth.] eadem quæ *Lens* Latinis. *Hader* Arab. *Lentichia* Ital. Germ. *Linsen* / Hisp. *Lenteyas*, Gall. *Lentille*, Boh. *Sfocowice*. Et quod Matth. omisit, Belg. *Lens* sin, Angl. *Lentiles*. Idem in post. com. Ital. duas facit species, minorem albam, cineritiam paulò maiorem. Et Hist germ. Lentem maiorem, & minorem.

Lalagotus.

Aduersaria nomenclaturam dictam, non tantum non habent, sed nihil insuper addunt.

Anguill. præter iam recensita nomina, *Lente* in Italia dici perhibet. Frustra denique mihi videntur à Lob. Obf. & Ic. Pl. duæ poni figuræ: præterea magis vulgarem existimo minorem, quàm maiorem.

Gesner. cum Cordo contentus nominibus vulgaribus, vt & *Tabac*. & *Hist*.

Lentem Italicam *Cam*. horti grandiore dicit, & candidiorem vulgari.

Lentes in Aracum mutati obseruauit Marantha.

Lentes in A.
rachum.
fars.

Lens Cæsalpino semen est candicans; aut rufescens, flosculis candicantibus, vel purpurascens: differunt amplitudine seminis, & exilitate: probatur latum & candidius, rufum & paruum deterius est: perfectum Græci *Phacon* vocant.

Casp. Bauhin. apud Matthioli. Lentium genera duo habet, maius & minus. Gerard. *Græc* lentils Lentem maiorem, minorem verò *lesle* lentils appellat.

Lotus
Tempus.

Cælum amat, inquit Plin. siccum, solum autem tenue magis, quàm pingue. Lens floret Monspelii Aprili, Lugduni, Geneuz, & Basileæ frequens. Montbelgardii eâ conferuntur agri. Maior ex semine Sturgardiâ missa provenit, Aprili floret, Iunio & Iulio maturæcit. Lens vulgaris seu agrestis, autore Trago, solo gaudet medicriter pingui, soletque appetente verno tempore feri, erumpit è terra instar Vicia. Lens fatiua non ita pridem è Lotharingia ad me allata. Teste Schy. calidiore solo, & sudo proferi gaudet. A Cæsalp. feritur locis aridis.

Vires
visus.

Lens si assidue edatur, ex Dioscor. autoritate visum hebetat, ærè concoquitur, stomacho incommoda est, inflat eum, & intestina: alium autem sistit, si cum cortice edatur. Præstat, quæ faciliè coquitur, & quæ dum maceratur, nihil nigri remittit. Vim habet adstringentem. Vnde alium sistit decorticata prius, & diligenter cocta, pri-

mâ in coquendo aquâ diffusâ Nam primum ipsius decoctum alium sistit [Nemo] Codi. Baid. non
sal. m. b. v. videtur Corn. legitur contra Gal. men-
tem: Inducit lens graui somnia, ad neruosa, &
pulmonem, & caput incommoda est. Melius autè
suum opus perficit ad alui fluxiones, addito ad
ipsam cum aceto intybo, aut Portulaca, aut Beta
nigra, aut Myrti bacis, aut Malicorio, aut Rosi
siccis, aut Mespilis, aut Sorbis, aut Piris, aut Pal-
mulis Thebaicis, aut Cotoneis Malis, aut Cicho-
rio, aut Plantagine, aut gallis integris, quæ post
cocturam abiciuntur, aut Rhoë, qui obsoniis in-
spersitur. Oportet autem acetum diligenter
cum ipsa coquere, alioqui alium perturbat. Tri-
ginta Lentes decorticatæ ac denoratæ, ad stoma-
chi subuersionem profunt. Lentis etiam Poda-
gram, cocta cum polenta & imposita. Cum mel-
le verò, sinus gluunat, crustas rumpit, & vlcera
repurgat. At cum aceto cocta durities & strumas
discutit. Cum Meliloto verò, aut Malo cotoneo,
oculorum & sedis inflammationes curat rosaceo
amixto. Verùm in maioribus sedis inflamma-
tionibus, & magnis sinibus, cum Malicorio, aut
Rosis aridis decoquitur, amixto etiam melle.
Ad nomas gangranicas similiter, aut ammixtâ
etiam aqua marinâ, Ad pustulas autem, & herpe-
tas, & sacros ignes, & pernioles, velut antea di-
ctum est. Cæterum ad mammas lacte turgentibus,
& lacte in ipsis in grumos coacto in aqua mari-
na cocta, & imposita commoda est. Plinius v-
sum eius medicum ferè velut Diosc. habet. Lens
optima inquit, quæ facillimè coquitur, & eaque,
quæ maximè aquam absorbet. Aciem quidem
oculorum obtundit, & stomachum inflat, sed al-
uum sistit in cibo, magisque discocæ cælesti a-
qua: eadem soluit, minus percocta. Crustulas
vlcerum rumpit eaque, quæ intra os sunt, pur-
gat, & adstringit. Collectiones imposita sedat,
maximèque exulceratas, & rimosas. Oculorum
autem epiphoras cum Meliloto, aut Cotoneo.
Et paullo post: Ad sedem cum rosaceo aut Co-
toneo. In his, quæ acius remedium exigunt,
cum putamine Punicæ, melle modico adiecto. Et
rursus: Propter dissolutionem stomachi triginta
grana Lentis deuorantur. In cholericis quoque
& dysenteria, efficacior est in tribus aquis cocta
in quo vltimè semper eam torrere antè &
tundere, vt quàm tenuissima detur, vel per se,
vel cum Cotoneo, aut Piris, aut Myrto, aut In-
tubo erratico, aut Beta nigra, aut Plantagine.
Pulmoni est inutilis, & capitis dolori, neuosissi-
que omnibus, & felli: nec sôno facilis. Ad pustu-
las utilis, ignique sacro. Et mammis in aqua ma-
rina decocta: in aceto autem durities & strumas
discutit. At Galeno teste, Lentes adstringunt
quidem, sed non validè, & caliditatis & frigidita-
tis in medio consistunt, & secundo ordine sic-
cant. Proinde corpus quidem ipsarum siccant, &
ventrem sistit. Decoctum verò propellit. Qua-
propter etiam prior aqua diffunditur, cum cohi-
bendi gratiâ sumuntur. Et rursus: Nemo ex
Lentibus panem facit: atidæ enim sunt, ac fria-
biles, corticemque habet adstringentem, & quæ
ipsorum est veluti caro, crassi est iucci, ac terrei,
austeram qualitatem habens exiguam, cuius cor-
tex multæ est particeps. Succus verò in ipsis est
adstringenti contrarius. Quocirca si quis in a-
qua Lentes coxerit, deinde aquam sale, aut garo,
aut cum ipsis oleo conditam sumperit, potus is
alium deicit. At ex his coctis Lentibus, ad eum
modum, quem diximus, paratus cibus facultatè
habet succo contrariam, vt quæ ventris fluxus

siccet, stomachum, intestina, & totum denique ventrem corroboret. Quamobrem celiacis, & dysentericis, cibus est accommodus. Lens verò decorticata, ut illam adstringendi vehemētiam, & ea, quæ ipsam consequuntur, amittit: ita magis nutrit, quam quæ cortice spoliata non est: verum succum crassum ac paruum gignit, tardè que commeat, non tamen alui fluxus desiccatur, ut ea cui cortex non est ademptus. Aegineta quum subruentia pustula euaserunt [à morsu vipere] ipsas scarificat, ita ne excoriet, deinde multà aqua fouet, Lenticulam coctam cum melle obducit, dum conlescant. Considerandum sanè, an consultum sit applicare Lentem, quæ adstringit, morsui viperino: veror ego quidem adhibere, ne venenum intro repellatur. Qui igitur Aeginetæ subscitib, is cum illo *Lenticulam angulo tenet* [negotium, quod fieri nullo pacto potest, tentat] siquidè Lens angulis caret. In caliditate & humiditate, inquit Scvhenk, medium tenet, desiccatur tamen ordine 2. valenter quoque adstringit, ventrem sistit. Decoctum verò prouocat, inflat, lenit, glutinat, extinguit, purgat, discutit.

Sed in *Lente unguentum* [in Lenticula fabulam] Celsipinus narrare videtur. Ineptè enim vili legumini mirandum effectum adscribit, qui minimè congruit, nec in tempore adhibetur. Dum enim Dioscor. & alii Lentem & oculorum acie hebetare, stomacho grauem esse, intestinis noxiam, nervis, pulmōni & capiti inimicam, & turbulenta insomnia gignere, scribunt, is ex Arabum sententia decoctum earum ad febres pestilentes, quas lenticulares vocant, laudat, quia exanthemata in illis erumpentia, Lenticulas representant. Sed cum plura inter se dissimilia confundere, quis non videt? Eum mercedè imitatur, qui mentionem inducit vilis cuiuspiam aut nihili vel hominis, vel lateris rei, aliis de egregijs verba facientibus, in quem adagium hoc quadrat, in *Lente unguentum*.

Ceterum, *mera aut egregia nulla de Lente*, minutum enim est, ac vile legumen. Prouerbiū autem est, *Mira de Lente*, apud Græcos dici solitum, quoties res humilis & pusilla splendidis excomiis, magnificisque laudibus attolleretur.

Porro, *Dives factus iam desit gaudere Lente*. Pauperum siquidem ac tenuium cibus est: quæ fastiditur simulatque lautior fortuna contigit. Prouerbiū in eos est, quibus ad vberiore conditionem euectis, fastidio sunt ea, quæ prius inopes boni consulebant. Dixit hoc Aristophanes in adolescentem, qui cum pauper haberet consuetudinem cum anu, nactus diuitias, cepit illam fastidire. Et licet dictum sit Lentem esse pauperum cibum, non tamen conuenit ut eadem ad fastidium iterentur, ne Athenæi trimeter prouerbia lis obiciatur:

Te Lens Deus corripit & fortuna Lens
Sed de his satis. Nam Zenonius est & Lentem coquere, id est, Sapientis est, in re minutissima se artificem declarare.

OROBVS SIVE ERVVM IN genere.

CAP. XVII.

Mvtant semina & pro temporum ratione vt leuiora, faciliorque reddantur: vt si [Eruum] Eruum, quis *Vere* serat, faciliè, gratumque Tom. II.

exit, non graue, quemadmodum si Autumno seratur. Floris inter cetera legumina, diutina productio est. Huic porro quemadmodum Ciceri & Fabæ, primum pars inferna floret, quæ cum desierit, proxima incipit; atque ita ad supernam itur successu assiduo: qua de causa multoties Erui, auulsà semen ex ima parte defluxisse cernitur, videntente adhuc omnino, herbæ atque supernæ. Cuiusmodi habet in latera magis dispersum. Numeratur inter ea, quæ omnium maximè durant. Stere inter radicales consueuere contra papilionas [radices] Seritur aliis maturis, sic tamen, ut non prius ante Ver. Candidum in omnibus generibus præstat. Et licet semina eius siliquis, Cylindratibus inclusa proueniant, attamen non interlecta, sed quasi inuicem contingentia constant. Fructus rotundos Geln. esse dicit, modo Piperis, quod apud Theop. nondum reperio.

[Eruum] inquit Diosc. parus frutex [Bauvionos] omnibus cognitus, angusto folio, tenuis, semina in valvulis [B. lobatis] habet.

Apud nos (Galenī verba sunt) semen quoddam siluestre, rotundum, ac durum, Eruique exilius in fructibus cerealibus repertum, quod Arachum nominant.

Erui, quod Plinio faciliè concesserimus, non operosa cura est. Hoc amplius quam Vicia runcatur. Nasitur & Phalangion in Erui, bestiola Aranei generis, si Hyems aquosa sit.

Eruum autem, si Columella credimus, lætat loco macro, nec humido, quia luxuria plerumque corrumpitur. Potest & Autumno feri, nec minus post brumam Ianuarii parte nouissimā, vel toto Februario, dum ante Calendas Martias, quem mensem vniuersum negant Agricola huic legumini conuenire, quod eo tempore satum pecori sit noxium, & præcipue bubus, quos paulo suo cerebroso reddat, quinque modis iugerum obleritur.

Cicera bubus Erui loco fresa datur in Hispania Bætica, quæ cum suspensa mola diuisa est, paululum aqua maceratur, dum lentescat: Atque ita mista paleis subtritis pecori præbetur. Sed Erui decoctum libæ satisfaciunt vni iugo, Cicera sexdecim, eadem hominibus non iniurios, neque iniucunda est. Sapore certè nihilo differt à cicercula, colore tantum discernitur. Nam est obsoletior, & nigro propior, seritur primo, vel altero sulco mense Martio, ita ut postulat soli læticia, quod eadem quatuor modis, nonnunquam & tribus, interdum etiam duobus, ac semodio iugerum occupat. Erui ruffi meminit Actius, cuius auctoritatem confirmat Hermolaus, dicens: *Eruium, Herbūm, aliud candidum, aliud ruffum*.

Erui præter notas à Diosc. ei attributas, hæc ferè addit Marantha: Eruum semen habet Paralii Tithymali, aut catanances primæ: magnitudine Athiopidis feminis, aut Lithospermi, aut Dorycnii, aut Lathyndis. Ex hac descriptione faciliè deprehenditur error multorum, qui varias plantas, pro Erui ostendunt: quarum nulla descriptio aridet: cum omnes semen habeant longè maius semine Lithospermi, aut Athiopidis: nam vel ipse Theoph. Orobi semen minus Sambuci acinis esse asserit, quod cum Diosc. consentit.

Orobis plurimis qui angulosi, quem duplicem faciunt. Matth. in primis com. proponebat iconem pro Erui, quæ mihi videtur esse Lathyri, quam Germanicam voco flore rubente.

Brassauolus credidit Eruiam, quæ Theoph. Gal. ac Paulo Ochros appellatur. legitimum esse Eruium, nominis vicinitate fortè deceptus.

Nec ad stipulandum vis est, teste Math. qui Eruciam Pisi genus, Eruum esse contendunt.

Hallucinatur Fuchsius, qui cicerculam vulgò vocatam, Eruum sativum esse credidit.

Hunc eundem errorem committit Turnerus, dicens: Ego Orobum Fuchsi cicerculam esse puto, quam Galenus Lathyrin vocat.

Eruum videtur Cornario, altera Vicia species esse. Nostri enim, inquit ille, maiorem & minorem Viciam latinà voce parùm corruptà, distinguunt. Officinæ peregrinum ab externis peti- tum Orobum habent in vsu: quum tamen verus Orobus etiam apud nos proveniat.

Cornarius se opponit Turn. cùm ait, Galenus, Paulus & Aetius, nulli Eruo omnem auferunt amaritudinem, In Eruo autem Fuchsi, cùm nulla sit penitus amaritudo, Erutum esse nequit. Quin ipse Fuch. de compos. med. testatur eos omnium maximè errare, qui pro Eruo seu Orobo Vicia filu. seu Aphace vtantur.

Vires & vi-

sus.

Eruius

Farina orobina ad medendi vsus conueniens. Capiti onerosum est, inquit Diosc. aluum est turbat [negamur] Sanguinem per vrinas trahit [dicit] Boves autem pinguescit, littothum apponatur. Præcedentia non legit Otibaf. auctore Matthiolo. Preparatur Erui farina hoc modo: Habituosa & candida grana deligito, & aqua permiscendo respergito: ac vbi sufficienter combibere fueris, tum domum torreto, donec cortex disrumpatur & decidat. Deinde molita, & tenui cribro excreta reponito. Est Erui farina aluo commoda, vti- nam diet, bonum colorem inducit. Ast vberior eius vsus, in cibo, aut potu, cum torsionibus [torminibus] sanguinem per aluum & vetricam ducit. Purgat autem vlcera cum melle. Lentigines item, & maculas Solares, itemque alias, & totum corpus. Siftit etiam nomas, & duritias [scilicet] Lacuna ex vet. cod. [negamur] ac gangrenas. Mollit quoque duritias in mammis. Et ferina vlcera, & carbunculos, & fauos emarginat, ac rumpit. Cum vino subacta & imposita, canum, hominum, & viperarum morsus sanat. Cum aceto verò, vrinæ difficultates, & tormina, & ad egerendum contentiones [tenesmos] sedat. Commoda est & his qui alimentum ex cibo non percipiunt, nucis magnitudine fistula accepta cū melle. At Erui decoctum assutum, pernoctiones, & pruritus in vniuerso corpore fouendo sanat. Hæc Diosc. quem Plinius ita declarat, vt ex ipso transcripsisse videri possit. De Eruo, inquit, quædam in mentione eius diximus, nec potentiam ei minorem Veteres, quàm Bissacæ tribuerunt. Contra serpentium ictus ex aceto, ad Crocodilorum item, hominumque morsus. Si quis Eruum quotidie ieiunus edat, lienem eius absumi certissimi Auctores affirmant. Farina eius varos & maculas cutis toto corpore emendat. Serpere vlcera non patitur, in mammis efficacissimum. Carbunculos rumpit ex vino. Vrinæ difficultates, in flationem, vitia iocinoris, tenesmus, & que cibum non sentiunt, atrophæ appellata, tostum, & in nucis auelanz magnitudinem melle collectum, deuoratumque, corrigit: item impetigines ex aceto coctum, & quarto die solutum. Panos in melle suppurate prohibet impositum. Aqua decocti pernoctiones, & pruritus sanat fouendo. Quin & vniuerso corpori, si quis quotidie ieiunus biberit, meliorem fieri colorem existimant. Cibus idem hominis alienum. Vomitiones mouet, aluum turbat, capiti & stomacho onerosum. Genua quoque degrauiat. Sed madefactum pluribus diebus miscet, bubus, iumentisque vtilissimum. Siliquæ

Vlcera,

Lentigines,

Carbunculi.

Animalium

morsus.

Tenesmus.

Lienem;

Prur.

Color & cor-

poris com-

modus.

eius virides, prius quàm indurecant, cum suo caule, folisque contrita, capillos nigro colore inficiunt. Cæterum Eruum medicaminis vim obtinere, epistolis D. Augusti (qui per hoc curatus) memoria extat.

Boves tum apud nos, ait Galenus, tum apud alias plerasque gentes Eruum prius in aqua dulcoratum pascuntur. homines verò ab hoc semine prorsus abstinent. Est enim insuauissimum, & prauis succi. In magna tamen fame, quemadmodum Hipp. quoque scripsit, necessitate coacti ad ipsum nonnunquam accedunt. Nos verò ad eundem modum, quo Lupinos, præparentes, Orobis cum melle vitmur, ceu medicamentis crassos thoracis, ac pulmonis, humores expurgantibus Porro inter Orobos albi minis sunt medicamentosi, qui ad flantem, aut pallorem recidunt. Qui verò cocti bis fuerint, & in aqua idem dem dulcorati, insuauitatem quidem deponunt, sed vnà etiam cum ea abstergeri & incidendi facultatem, vt sola in eo relinquatur terrestris substantia, quæ alimentum sit, quod citra insignem amarorem deficcandi vim habet. Et hæc traduntur in lib. de Alim. simpl. vt & sequentia: Orobus deficcatur quidem excessu secundo infuso, calefactum primo. Porro quatenus amaritatis est particeps, eatenus incidit, extergit, atque obstruções expedit. Cæterum si sumatur copiosè, sanguinem per vrinas euocat. Idem de Antid. Candida Erui farinam admisceat Scille: nam quæ candida non est, amara supra modum esse consuevit. Et rursus de compos. med. Vitat hanc non solum in dolore capitis, per consensum stomachi oborto, sed omnibus aliis etiam circa caput obortis affectionibus. Articulos etiam dissoluit.

Animaduertendum præcipit Matthiolum, quod quanquam ad eruinam farinam conficiendam, candidum Erui semen Dioscorides elegerit, Galenus tamen candidum pallido, ac rufescente, longè miris præstat scribit. Eapropter & Brasauolum Galeni rationem minime habuisse: cùm sibi ex Dioscoridis tantum sententia persuaserit, album Erui semen in medicamentorum vsu, tam rufum, quàm pallidum viribus antecellere. Sed de hisce Matthioli commentariis, nostrum quoque, si animus est, percipito iudicium: Galenus quidem Erui candidam farinam Scillæ admiscet, ast solum eam ob rationem, quòd candida supra modum amara non sit, tamen nostro iudicio si talis esset, amaritudinem in Scillæ trochiscis haud augeret: ipsa enim Scilla est valde amara: Ad hæc ignoro, cur præferat albam, si alia viribus antecellat.

Nunc quis non cum Marantha irridendos censeat, qui Eruum se nunquam potuisse cognoscere asserunt: propterea, quòd in nulla planta (etiã si delineationi respondere videretur) vim educendi sanguinis per vrinam animaduertierint? nam vel huius rei nunquam periculum fecerunt vel si facere aggressi sunt, non ita vt decet, sunt experti: Vnicà enim exhibitione, pauca quantitate contenti, effectum hunc exposcebant, non considerantes Dioscoridem velle, non nisi largius in cibo, aut potu assumptum id efficere.

Quæsieram tandem ex Gesnero, quid de Eruo sentiret. Miror equidem, respondit, Galenum in trochiscis Scillinis, Erui loco panis micam eis addidit rubere: cùm hæc dulcis, Eruum verò (ipso teste) amarissimum sit: adeò vt vel totam Theriacam suo sapore amaro inficiat. Ego pharmacopolis nostris suis, vt Dictamni vulgaris radicem [sic

Thora
Pulmon
Orobis

Temp
men


Ani
uit

Aut
iudi
de f
Erui

Erro
rudi

est Fraxinella] Erui loco potius quam paniamedulla ponant: nam & amara ea radix est, & vim contra venena ac pestem non vulgarem habet. Inter legumina præter Lupinum, nullum adhuc amarum inueni: posset autem Erui loco etiam Lupinus, præsertim siluestris, vt pote amarior, ficiorque accipi.

OROBVS SIVE ERVVM multis.



Cauliculi huic Orobos quadrati, tenues, multis alis concaui: folia ad nerulum palmarem annexa Lentis, vix tamen exadè ex aduerso respondentia: siliquis & ex alis, & ex coliculis, Lentis, albidis, infimo folio maculâ fuscâ notato: siliqua tenues, cylindraceæ, longitudine circiter vici- li, articulatæ

torulis, in quibus semen rotundum (angulosum redditur vbi ficcum) leguminoso duntaxat gustu.

An semen, quod iam afferunt pro Orobo Siculo, quodque Fuchs de comp. med. Cicerculam potius arbitrat? An Orobus, species leguminis in Creta proueniens, quo Lob. Obs. vtitur, & adhuc nomine gallico caret.

Matth. in com. suis in Diosc. editis sibi multis constat, ita enim in prioribus scribit: Ervum officinæ Græcorum more Orobum appellant. Ceterum, quod ex Alexandria, Syriaque, Venetias conuehitur, aliud semen representare censet, quam Erui, quod frequentissimum in Hetruria nascitur, ac scribit. Folia mittit Ervum, quod vulgè *Moch* vocant, Lathyri, vel Cicerculæ vulgè vocatæ æmula: florem Pisorum modo, admodum rufescentem: siliquas formâ teretes, ac oblongas, in quibus semen, colore in aliquibus pallido, in nonnullis candido, in quibusdam verò rufescente. Ignorandum non est, quod et si Ervum ab agricolis seratur, habetur tamen inter spontè nascentia: namque & per se inter legetes frequens oritur. Verum cum à paucis cognoscatur, illud inter viciæ species annumerant. Idem in Epit. edita anno 1571. scribit Ervum duum esse generum, candidum, & rufum: Galenum verò tertium addere, pallidum. Orobum esse plantam samentosam, foliosamque, humi procumbentem, ramis sese implicantibus, foliis parvis, longiusculis, lente minoribus: flores edere paruos, subpurpureos, & quandoque candidos: siliquam Pisi breviorē, gracilioremque, in qua rotundum concludatur semen, conclusa inter granum & granum siliquâ. Proponēbar primū iconem Matth. representantem nostram Lathyrum maiorem flore rubente, siue nostram germanicam

valdè differentem à planta, de qua hoc capite scribimus: In Epitome verò omittit, & reponit aliam iconem satis commodè exprimentem nostrum Orobum angulosum. In com. cum mag. ic. anni 1583, meliorem habet: omittit autem ea, quæ in præcedentibus scripserat, ponitque sequentia: Non diu est, quod legitimum habetur & scribitur Ervum, iam vbiq; in Italia. Alterum quoque vidimus Erui genus, quod Creticum vocant, nostratū sē simile, sed minuiore semine, & siliquis gracilioribus. In com. Ital. cum mag. ic. anni 1568, quæ sunt ante modò dictam editionem anni 1583, eadem tradit: verū sibi duas habet icones, priorem similem modò dictæ, sub titulo *Ervum*: alteri inscriptum est, *Orobos di Candia*. In Hist. germ. Iconem comment. cum mag. fig. habet, vbi etiam *de Cretico* & Ervum. Sed vti dictum sibi contrarius videtur Matth. nec fortè scit, quid scribat. In primis enim com. & Epit. statuit Ervum frequentissimum in Hetruria nasci, & vocari *Moch*, ab agricolis seri, per se inter legetes frequenter oriri. In post. com. omittit nomen *Moch*, ac non diu esse asserit, quod legitimum habeatur, & seratur: nihilominus tamen in iisdem post. com. retinet verba antè citata, quod agricolæ serant, quod spontè frequens oritur, & inter viciæ species numerosetur. Præterea plantæ, quam in post. com. exhibet pro Orobo, quæ eadem cum nostro Ervo, non inest amaritudo, quæ eo autore requiritur in Antiquorum Ervo.

Camer. ad Epit. Matth. iconem notam ex Gesnerianis, vt puto, sub titulo Erui apposuit.

Orobos hodie si Anguillæ credimus, in Abruzzo vulgaris, retinet nomen antiquum corruptum ex Ervo, ac vocant *Ervum*.

Epit. Dod. gall. Cicer sativum, Columbinum, Venericum, & Orobizum [describunt.] Lat. Cicer ercillum, non est Ervum, vt multi Neoterici putant, qui Theriacæ, & aliis medicamentis indunt: Et hoc idem affirmat Hist. Frumentorum.

Orobos, inquit Gesn. à Græcis dictus est Ervum, quod ad Theriacæ compositionem requiritur. Legumen est multis capreolis, siliquis secundum semina interceptis, ita vt in furnis coniecti panes: semen foris album, intus rufescit. Facile prouenit. Circa Lugdunum [unde semina accersui] agros eo conseri audio. Inuenitur & siluestris: sed non in Germania, quod sciam.

An Ervum Guiland. in Theone, quod in Italia *Mochum* nuncupari cum Matthiolo sentit, cum hic tamen interea *Mochum* ignotam sibi plantam statuat.

An qui vulgè, Cæsalp. autore, in Etruria *Moch* appellatur, serunturque in alpihus ad pabulum brutorum: Planta in totum similis cicerculæ tenuioribus foliis: seminibus simili modo angulosis, candicantibus, vel nigris, minoribus, & in sua siliqua magis fæctis, asperioribusque: hæc columbis gratissima est ad fæctificandum. Dioscorides Orobum vocat. A Theodoro apud Theoph. Ervum conuertitur. Sed & Plinio Ervum, Galeno autem Orobus dicitur. Si Cæsalp. Cæsalp. restituit eundem nobiscum Orobum intelligit, comparatione cum cicercula non placet.

De hoc Lob. & Pena Adu. Cicer orobum tantoperè simile est Narbonensiu Orobo: Dioscoridis latine Ciceri eundem fecit Orobum vulgatum & receptum officinis Dodonæus. Orobus receptus Herbariorum: *Robus*, color rubescit. Antiquus fuit, qualis in russis bobus, & Orobis cernitur. Hodie nihil panis ab illo dudum dicitur

diffidet receptus in officinis Italicis & Norbonensibus. Orobus semine & siliqua præsertim, nisi quia huius altero tantò minor est, compressior, nec vno loco, sed variis ex alarum geniculis, secundum summum & imum caulis exorta, pendula, alioqui terna & quaterna claudit semina, Cicere minora multò, tangenti hebetius angulosa, & vno latere aliquantum acutiora, gustu Lentis, folio & facie Pisi, Lentis, aut Vicie: ramosis, sparsis, luxuriantibus, caducis ferè ramulis: minus tamen est *maritimus*. hic, quàm Cicer Orobrum, & satium, minusque ingratus gustanti: nec enim nostro ingenio conuenit, stirpium vel figuras, vel qualitates, plumbea, Lesbiana ad nostram sententiam exigere, aut flectere, vt nimis multi fastidiant: sanè par est alterutrum horum leguminum, verum esse Orobum, cum è tam multis nihil penitus similius occurrat.

Nomina. Item Obl. Orobus receptus Herbariorum. Ital. *Macho*. Hisp. *Terno*, & *Ternus*. Provincialibus *Eres*, quasi *Eryum*. *Mochus*, siue Cicer *satiuum*. Dioscoridis Dodonæo. Idem Ic. Pl. Tom. 2. pag. 72.

C. Bauh. qui duas icones proponit, quæ paulò meliores nostrâ emptiâ, quæ nobis non placeant, apud Matth. ita scribit: Orobus, *opobas* quibusdam *napa* *in epistodas vno tui coar*, quod eo boues vescantur, & saginentur: *Eryum* Lat. quod satium est, & siluestre. Satium, vel maiore siliquâ, & semine, vel graciliore siliqua & semine: rursus qui maiore semine, candido est, aut pallido, aut rufio: Siluestre, varium est. Hic tantum de satiuo. *Orobus satiuus maiore siliqua* C. B. *Orobus & Eryum*. Matth. Cord. in Diosc. Gesn. hort. Cast. Lugd. *Orobus receptus Herbariorum* Lob. *Eryum verum*, siue *Orobus* Camer. Tab. *Cicer satium* Dod. gall. *Mochus*, siue *Cicer satium* Dod. in fol. II. *Orobus satiuus minore siliqua* C. B. *Orobus Creticus Matthioli* (in cuius editione postrema, & iconibus, figura non habetur) & Lugdunensi.

Locus & Tempus. Orobus Matthioli Geneuz in horto nostro proueniebat facillè, virens adhuc Decembri ex semine deciduo, florens Maio. Lugduni quoque habebam. Basileæ frater C. Bauh. Montbelgardi ex semine stutgardia misso, & lato, Aprilis & Iunio floruit: semina maturum Iulio. Honorius Bellus ex Cydonia Cretæ misit, hæc additâ inscriptione: Orobus *opobas* siue *opobas*, quod rustici ferunt singulis annis, & boues eo saginant Antiquorum more. Nos non videmus, quæ in re differat à semine, quod nunc existimatur & perhibetur Orobus: est enim ferè triangulare cum umbilico nigricante: color totius ex albo cinereo: sapor leguminosus, & Pisorum vulgarium. Huic simile paulò maius legumen misit Araci nomine: sapore & formâ non differens, sed colore ferè glauco. Nascitur Hispaniæ & Italiæ compluribus locis. In Germania verò, ac Belgio [si vera Dod. perhibet] non nisi in hortis, & à paucis sentitur. In glaucois affatim oritur. *Aduers*.

OROBVM CICER LO-
belli.

Cicer Orobrum Theoph. ab Orobo nigredine tantum distans. Difficile tamen sit statuere quodnam sit Dioscoridis domesticum primum nam nouum, quod hic damus, tantopere simile est Norbonensium Orobo, siliquâ præsertim, vt æstos nos reddat, esse illud, quod dulcissimum &

Eruo simillimum à Plinio dicitur: sed ambigimus iam, siue idem istud cum Diosc. satiuo: cui eundem fecit Orobum vulgatum, & receptum officinis: doctus & perbohus scriptor Dodonæus, qui nondum hanc nouisset.

Norbonæ & Gallo-provinciæ plerique satis per messes flauet hæc, *caluo* assurgens lescuipedali, geniculato lateratim, quasi in obliquum flexo, leuiter striato, fistuloso: *foliis* in imo nervulo ptiloxo hærentibus, Lentis, aut Araci: à medio item ramulis donatur, & foliatis pediculis: & iuxta summos alarum geniculos complures confertæ siliquæ, vno ferè exortu nixæ, lescæ, teretes, inter transuersa pusilla interualla foras protuberantibus singulis quasi torulis, ternis & quaternis, articulatim distinctis: ipsa intus semina nullâ membranâ distincta. Pisum Arietinum ferè æquant, obtusè triangula: Orobo duplò maiora, colore albida, pallida, & subfulva, non ingrati saporis Ciceris aut Pisi.

Cicer *orobum* Theophrasti Lob. & Penz Adu. & Ic. Pl. Obl. autem Cicer *orobum* Adu. p. 400. Cicerula Plin. F. Pennini.

OROBO SIMILIS LATHYRVS
Cretensis Honorii Belli.

Emen, quod misit nobis Honorius Bellus ex Cydonia Cretensi, huius inscriptionis: Lathyrus, *aracela*, dicens à rusticis quotannis ferri: Hoc sanè Orobo antè dicto, vel Araco Cretensi ab eo missis, simillimum est: adde vt nullam discrimen admaduertam, nisi in colore, qui medijs est inter Orobum & Aracum ab eo missum: saporidem, cum Pisorum sapore. Satum Montbelgardi in horto Ill. C. Wittemb. prouenit.

OROBO SIMILIS ARACVS CRE-
tensis Honorii Belli.

Misit nobis ex Cretæ Cydonia Honor. Bellus semen, quod ita inscripsit: Aracus, *araca*, à rusticis quotannis feritur. Id sanè vix differt ab eo, quod misit pro Orobo: triangulare enim, vel quadrangulare quoque est, paulò tamen maius, & colore ad glaucum accedente: sapor leguminosus, qualis Orobo, & Pisi. Si prouenerit satium, obseruabimus qualia folia & flores.

ARACVS VETERIBVS.

CAP. XVIII.

Aracus res scrabra & dura in Lente videtur, autore Theoph. qui Arachidnam ipsi similem scribit. De hoc Gal. inquit: Aracos Aristophani in Holcadibus. Semen hoc Lathyro [Cicerulæ] semini est adsimile. Fueruntque nonnulli qui putarunt, ipsum non esse generis à Lathyro [cicerulæ] diuersi: quandoquidem & usus ipsius omnis, & facultas, Lathyri [cicerulæ] facultati est adsimilis, nisi quoddam Araci sunt duriores, minusque facillè elixentur. Quæ causa etiam est, cur Lathyris [cicerulis] concocta sunt difficiliora.

ARACHIDNA

ARACHIDNA VETE-

RIBVS.

CAP. XIX

Arachidnæ radix, eiusque, quod simile est Araco, &c. Pars ipsa carnosa radicem simplicem, crassam, altius infigendam mittit, ceteras verò, quibus insidet, fructus tenues, ac summo celsite coherentes agit: loca arenosa potissimum amant: neutrum folia gerit, neque foliis quicquam simile, sed quasi binorum fructuum, partibus inter se appositis, sæcunda potius extant, quod mirum profecto est. Et hæc apud Gazam Theophrastus testatur, cuius textum Honorius Bellus corruptum suspicatur, ut mox videre est, sub eius Arachidna.

ARACHIDNA, AVT POTIVS

Aracoides Honorii
Belli.

DE Arachidna Cretica, cuius plantam siccam, & semina ad nos misit ex Creta Cydonia, hæc ad nos perscripsit Honor. Bellus: Planta omnino noua est, & nullum Botanicum huc usque vidi, qui earum plantarum genus aliquod describeret, quæ duæque à Theophrasto vocantur, licet Cæsalp. Dentariæ speciem Arachidnam faciat, quæ cum Theophrasti Arachidna, meo quidem iudicio, nihil commune habet.

Planta autem nostra, cum vtrinque fructum ferat, id est, & infra, & supra tercam, merito mibi Arachidna, aut potius Aracoides vocata videtur. Et licet Theoph. lib. i. cap. ii. Arachidnæ, aut id, quod Araco simile est, foliis catere assermet, tamen textum corruptum esse, merito quis debitare potest. Nam cum Theoph. stirpem similem

Araco describat, necesse est similitudinem harum esse, aut floris, aut fructus, aut foliorum. Aracus verò duplex ab Auctoribus habetur, vnus Lathyro similis, qui inter Lentescit, & græcè per x scribitur. Alter verò per y teste Galeno i. de alim. fac. c. 27. Siluestre quoddam semen rotundum, ac durum, Eruoque exilius, quod & Theoph. l. 8. c. 8. assermat, asserens: quod Aracus in Lente oritur, res scabra, & dura. Cum autem planta nostra, caule, foliis, & lobo similis sit Lentis, semenque durum, & Araco non dissimile ferat, Orobo, Lathyroque minori, fructumque sub terra circa radices, & in caule gerat, merito Aracoides dicenda videtur. Et ea Theoph. verba, quod folia non ferat, ad Arachidnam Egyptiam potius referenda videntur, quam ad Aracoidem

nostram, quam ita describo. Herba est dodrantalis, foliis leguminosis, Lentis, vel Vicie, minoribus, obtusis, cordatis. Vitiulis tenuibus, quorum extremis flores hærent purpurei Vicie. Circa radices sub terra fert siliquas paruas, Lenticulæ similes, in quibus modò vnum, modò bina semina, rotunda, nigra, in altero verò non nigrum, sed Orobo simile. At quos fructus in caule proferat, pluribus occupationibus prædeditus hæcenus obseruare non potui.

A rusticis *ἀγρεῖδα* [agrestis Lens] vocatur. Inter segetes & legumina inuenitur, negligiturque, idè vobis radicis tantum fructum mitto. Mitto etiam Orobi semina, Araci, & Lathyri, ut horum leguminum in hac insula nascentium differentiam commodè obseruare possitis. Hæc ille.

Nostra hinc restat obseruatio. Nigrum semen Vicie latius simile est, dentibus durum attritu: sapore Pilorum: medulla alba. Album verò simile formâ, sapore, & duriâ: eius figuram ex planta sicca, quam misit, parandam curauimus: lata enim non prouenit.

Iconem quoque Clusii, quamvis falsa videretur, delineandam curauimus, Proponit autem illam Exot. lib. 4. c. 16. quam ita describit:



An Theo- Araco
phraſto Araco
quom? Non mi-
nus admirabi-
lis est huius
plantæ natura,
quàm eius, cui-
us rariorum
plantarū Hist.
l. 4. cap. 52. Ara-
chidnæ appella-
tione memini:
propterea illam
eſſe ſuſpicabar,
quam Theoph. lib. ii.
Hist. pl. cap. iii.
Arachidnæ cō-
iungit, &
eius rariō dōd-
rante eſſe, fructum-
que ſuperne
inferno mino-

rem ferre, ſcribit, tamen ſolia, aut quidpiam ſo-
lius ſimile habere neget. Quem ſequutus eſt Plin-
ius.

Itius plantæ ſemen cum ſuis ſiliquis, tam ſu-
pernis, quàm ſub terra latentibus in Creta lectū,
ad me ante aliquot annos Honor. Bellus mitte-
re inuemi, quod à me ſatum, & quibusdam etiā
amicis communicatum, nulli eſt natum, an ob ni-
miam vetuſtatem, ignoro. Eam ob cauſam eius
hiſtoriam, ut auebam, in meum librum euulga-
tum inferre non potui. Quum vero Io. Pona An-
no 1603. ſemina mitteret in Lugduno-Batauæ A-
cademiæ horto ſerenda, inter quæ nonnulla à
Bello communicata cognoſcebam, cum illis inte-
gram huius plantæ ſtirpem, ſiccitate proſus con-
tractam reperiẽbam, quam, ubi aliquot horis in
aqua maceratam expliciſſem, ut commodiùs de-
ſcribere poſſem, exprimendam curabam.

Statim porò à radice hæc planta in plures ra-
muloſ diuiditur, ſemipedalis, aut dodrantalis, ad
ſummum, longitudinis, tenues, anguloſos: quos
alternis ambiunt exiguorum foliorum alæ, Lenti-
culæ, aut Araci foliorum aliſ ſimiles: ea folia ex-
timâ parte latiuſcula, & quodammodo cordis (ut

Deſcriptio
Folia.Flores:
Siliquæ:
Semina.Agreſtis
Lent.Antorum
obſeruatio.

Icon. Cluſii.

Locuſi

Deſcriptio
Ramuli:
Folia.

Radix.

Siliqua

Semen.

Icones.

Siliqua sub
terra non
crefcunt.

Etymon.

Descr.

Culiculi.

Folia.

Flores.

vulgo pingi solet) formam imitantia, per mediū, secundum longitudinem, neruo secta, qui extima foliorum partem nonnihil superat: nascuntur autem in singulis alis ex utroque latere quaterna aut quina, vel ex aduerso sita, vel inæquali serie, ipsa verò extrema alai capreolum desinit, & sese conuoluit, vt in Lenticula, & Vicia. Illius florem non conspexi (quem Lenticulæ, aut Araci flori similem esse autumo) sed siliquas duntaxat in alarum sinu nascentes, latiusculas, unciam longas, aut paulò ampliores, fuscas, nonnihil villosas, mucrone incuruo & quasi hamato præditas, continentes bina, aut terna semina nigra, rotunda, non angulosa, vt Araci, quæ maturitate dissiliunt: radicem habebat Lenticulæ, aut Araco similem, è cuius capite summā quasi tellure plures paruas, tenues, albas fibras quaquaversum spargebat, è quarum singulis dependebant singulares, interdum geminæ, siliquæ breues, & rotundæ, extrema parte in curuum mucronem desinennes, tenellæ, & candicantes, continentes vnicum, vt plurimum semen, nonnunquam [quæ maiores] & alterum, rotundum, illo non minus, quod siliquæ in plantæ ramis nascentes proferunt, sed albicantis, aut subfusci coloris. *Hæc Clus.*

Arachidna Cretica, an potiùs Aracoydes Theoph. verè *Arachidna* Hon Belli, cum suis fructibus, inferno sc. & luperno. Hæc Ponz in descript. montis Baldi ex semine inferiori crescit, & in hoc obseruauit, & vnica radice duos diuersos cauliculos, & folia oritur, vt ex eius figura patet.

Postquam ipsam plantam ab Honor. Bello acceptam, in qua nullos obseruauit capreolos, descriptissem iam, atque iconè propriā effigiatam proposuissem, Ponz, sicut & Clusius etiam iconem exhibuere. Clusii igitur iconem, additis ex Ponz figurâ floribus, expressam quoque damus.

Cæterum, consideratâ plantâ, quam Ponz nobis misit, & collatâ cum ea, quam accepimus ab ipso Honorio, quamque curauimus depingendam, obseruatâ etiam descriptione Clusii, non possumus nobis persuadere illas siliquas, in curuum mucronem desinennes, sub terra crescere, aut vnquam creuisse: ramos in iconè cum siliquis longis plantæ alterius censemus, ceu Viciæ alicuius: si quis haberet plantam integram, cum vtrisque siliquis in caulibus & radicibus, & videntem, saltè communicaret, rem gratam faceret, tollereturque nobis suspicionem nostram, iconem quippe per incuriam ex duabus plantis compositam.

CHAMÆBALANVS LE- guminosus.

CAP. XX.

EX radicis argumento Chamæbalanon, quasi terrestrem glandem dicas denominarunt: siquidem ex filis tenuibus, longissimis, pendulæ sub sunt glandes, crassiusculæ, oblongæ, pulpâ candidâ, dulci, non nisi alta fossione inueniendæ: vnde infirmi emergunt *culiculi*, sed longi, cubitales, vel maiores, ramosi, humi procumbentes: in quibus obseruare est bina ferè folia, eaque subaspera [si credamus Math.] ex aduerso sita, Viciæ similia, vnciam circiter longa, reliquo pediculo in capreolos abeunte: flores leguminosi, Pisi, plures congesti, priuato inhærent



futculo, put-
pue, Matthi-
cho pumice,
& odorat:
ind. p. p. c.
nunt.

Apios Ru. Ar. chie-
ellie, & scilicet,
alios Chamæba-
lanos Rom. ra-
dix silu. Plinio
& Theoph. e-
tiam Apio s.

Ruellise ve-
ram Ichada
inuenisse pu-
tat, inquit
Cord. in Diosc.
sed fallitur.

An Cordo
Ornithogali
flore purpur-

co, quod ait se ignorare, an à Diosc. descriptum? Notatum à quodam apud Cord. Arachidna Theoph. quoddam *Erdrnuß* interpretari: & alibi *Turnerum* Apion Fuchsi, Altragalum facere. Verū Cord. eo capite nec Apion Fuchsi tradit, nec Altragalon *Turneri*, nec huiusmodi Chamæbalani nostræ leguminosæ, de qua hic agimus.

Trago hist. germ. pingenti, vocatur *Erdrnuß*/ *Schbroter*. Lat. *Panis porcinus*, *Nux terra*, *Ficus terra*, *Erdrugen*, *Erdrandel*. A quibusdam *Archi-
nira* Auicennæ, & *Bubor marien* Serapionis, & *Malum terra*, aut *Cyclaminum* Diosc. idem habetur cum *Erdrnuß*. Sed aberrant, quamuis M. Virgil. Florentinus, & Peothus id existimant. Is (Tragus) dicit esse Raphanum silu. qui in Theoph. *ix. 25*, & in Diosc. *am. 2* dicitur: vocat Chamæbalanum terreitum, *Archi* & *Grund* Eschel.

Tragus in Hist. lat. non reprehendit Marcel-
lum Virg. & Peothum: sanè si Marcelli verba
considerentur, quibus ait, radice subduli, peco-
ri gratum esse Cyclaminum, quis possit suspicari
de hac radice loqui? verum si cõserat, quæ paulò
põst dicit: vidimus nos aliquando cyclamini ra-
dicem globosam, & latitudine amplissimi panis,
ex qua folia erumpebant, & inter folia flos pe-
diculo potiùs, quàm colculo. Planè concludet
Marcellū ibi de vera Cyclamini locutum, & nō
de *Erdrnuß*, quamuis malè dixerit pecori gratam
Cyclaminum.

Apios quoque *Fuchso* dicitur, *Erdrnuß*, *Er-
ctelen*. Gall. *Raue Rayfort*, aut *Ciche sauage*, quæ
nomina gallica non placent. A Dod. gall. Belgis
Erdrnoten & quibusdam *Häysen met steerten*.
Neotericis Chamæbalanus, & glandes terrestres.
Quidam docti Altragalum existimant à Diosc. de-
scriptam: ab aliis Apios. Item Hist. lat. vbi quo-
que figura. Belg. *Erdeckelen*, & *Nuces cauda-
te*: nominant quidam *zaua* *Caradise*, Terre glandes.
Et de frum. cum Apio non conueniunt, Altraga-
lo similiores sunt.

Quibusdam, inquit Corn. in Diosc. Ornithoga-
lon ea radix rectè dicitur, quæ à nostris *Erdr-
nuß* & *Schbroter* & *Erdrseigen* vocatur. Alii in-
terim ad Cyclaminum referunt. Alii rursus Apio
esse volunt. Quod autem Apios non sit, vis eius
purgatoria obstat. Considerandum porro, an
Cornario sit Altragalus, & ita astragalitis, *Erdr-
moran*, de quo scribit in Diosc. lib. 4. cap. 52. De
quibus agemus titulo de Altragalo Veterum, vbi
etiam Altragali æquiuocationes.

Raphan-
silu.Tragus
tatur.

Fuch. vq.

Glandes
refra.Apios n
est.
Nuc. ca-
ta.

Cyclam-

Apios.

Apios Lonic. vulgò panis porcinus, Sc. wbro/ Nux terra, Chamabalanus.

Apion, cuius picturam damus (inquit Riff. in Diole.) Fuchsius falsò *Beidel fern* *Erduß* / *Sewebrot* / siue *Schweinbrot* appellauit, nominibus scilicet rebus aliis dicitur, vt Cyclamini, & Ornithogalo: quo nomine germanico, siue gallico, hodie appellatur, scire nondum potui. *Hac Riffius*. Nobis autem iudicibus, germanica nomina huic plantæ melius conueniunt, quàm Apios nomen.

Sententiæ Ruellii de Apio, Matthiolus haud subscribendum iudicat: siquidem Apios falsus, & non verus, vt crediderunt, Fuchf. Tragus, & Lonicerus, Ital. *Nosi della terra*, hebet figuram propriam. Sulpicatur Lusitanum pro Astragalo eam plantam accepisse, quæ Fuchfio, & quibusdam ex recentioribus, Apios Diole esse creditur: sed magnas inter has plantas differentia.

Amatus porro, quantum videt, Tragopogonum putat, quam Fuchfio Apios admentitur. Germani plantam hanc, Terræ nucem appellant. Sed quam habeat cum Tragopogono cognationem, sanè nullam videt.

Non placent Winckeri verba, qui *Erduß*, Apium vomitorium vocat.

Nescit Baccan. an Ruellio credendum, qui dicat Apion familiarem herbam. Apud Cam. hort. Apios Fuchfii, Astragalus aliorum. Chamabalanus *Erdfels* Tab. ic. & Hist. Apios, Herbam esse, dicit Faurardus. Apios quorundam, Apios Herba Hieron. Bock. Eidem & Fuchfio radix siluestris: ipsi viderint, inquit Gelf. Fuch. Roel. *Erdomandel* / Apios, *Arachyda*, *Ficus terræ*. Theop. Golius & Amatus Apion nominant simpliciter.

Astragalus Turnero, non est Apios. Quare errant Amatus, Tragus, & Fuchf. Et rursus. Astragalus circa Coloniam nominatur *Erdfels*. Belg. *Erduß* / Germ. *Erduß*. Angl. *Peeß* *Heartshnt* / à foliis Pisi, aut Ciceris, & radicibus Nuculæ terrestres similibus. Est reliqua omnis descriptio conueniret Dioscoridis, tamen in humidis quibusdam locis quia radicem comperit parum admodum adstringentem, dubitare cepit: at rursum cum in locis siccis manifesta adstrictione præditam animaduertit, nihil amplius cubitauit Turnerus, quin verus esset Astragalus, est Fuchf. contendat esse Apion. Descriptio Astragali Dioscoridis, conuenit cum planta, quam Turnerus exhibet, in omnibus, quantum indicat exceptâ radice: tota enim radix non est Raphani radici similis, est glandulosis tuberculis sit donata, vt species quædam Raphani. Quem autem exhibet Matth. folia habet rotundiora, non tam longa, & serrata, vt Cicerum. Expendant docti, eamque elegant, quæ descriptioni optimè quadrat.

Fuchfii Apios longè abest à legitima *Nux uardz* / autorib. Aduers. Anglis & Germanis. An autem Terræ glandes, siue Pseudo-Apios Germanorum Astragalus Diole? Germ. *Schwartz Kettig* / Raphanus niger. Item Obs. vbi figura, *Terra glandes*. Perperam Ornithogalon & Apios Cordo. Belg. *Mus caudatus*. Et Ic. Pl. *Terra glandes*. Ego quidem vbi Cordus Apion dixerit, quod Lobel. perhibet. haud inuenio. Est & apud Hist. Lugd. figura, sub titulo *Apios Fuchfi*. A Thelio in Haec. *Astragalus aruenfis*, seu *Chamabalanus* appellatur: *Glandes terra, vel terrestres* Clus. vocat, Hung. *Fodi monyaro*, hoc est, terrea auellana. Dicit C. Bauh. apud Matth. esse *Pseudo-Apios* Matthioli, Autumasse quosdam

Matthiolum Astragali nomine in prima editione exhibuisse. Apios Fuchfii, & Tragi Horro. *Luf. Terra glandes*, *Erduß* / *Erdeichelen* appellantur. Sed cui cognita Apios satis apparet, quantum discrimen? quam contrariæ facultates?

Ex Burgundia accersitam in horto Ill. E. C. Locus & tempus, Montb. plantauit: postea reperi in agris non longè à pago *Charmonrey*. Montbelgard & Burgundiones vocant *des Magussans*. Basileæ reperi extra portam lapideam in agris supra collem quæitur Binnigam, ad dextram, florentem Iunio, flore rubello, profundè radicè. perquisiui fodiendo priusquam reperi. Qui radices perquirent, cauant ne perfringant tenues radices à quibus pendet bulbosus: Patauui vidi in horto D. Cortusii, & Geneuæ copiosè in vineis extra portam à S. Geruasio denotantur.

Serit & radicè (inquit Dod.) potest, sed radicè citius perficitur: vna enim glans sita in plures breui tempore multiplicatur. Secus aruorum margines multis in Brabantia locis gignitur. Floret Iunio & Iulio. Post mensem effodiuntur & colliguntur radicum glandes. Pseudo-Apios Matthioli floret Iunio mense præcipuè: Passim nascitur vbiq. in Bohemia in campis & præsertim in vineis.

Vidit Ruellius per inopiam frugum ruri pauperes hanc radicè vesci. Pastores quandoque his nucibus vescuntur: Caterum experientiâ didicit Tragus, nausæas, & vomitiones illas ciere, aliàs eius indicio planè innoxie sunt. Sed vereor ne

Tragus, qui putabat *Erduß* esse Apion, sibi etiam persuaserit, eas & vomitiones ciere. Adhuc Terræ glandes, quod Dod. asserit, coacti, ac in cibo sumptæ, difficilids, quàm Rapa, aut Pastinaca, concoquantur, sed alimentum tamen non minus, quàm Pastinacæ subministrant: minus quàm ille inflant, tardius descendunt, ventrem etiam adstringentes, Crudæ difficilids concoquantur, & agnids descendunt. Temperamentum autem obtinent calidum quidem mediocre, siccum verò paulò intensius, cum non exigua vi adstrictoria, vnde etiam non solum ventris fluxum, sed & sanguinis flores, præsertim ex vtero, aut per vesicam, reprimunt. Hæc Tragus Chamabalanus vires assignat. Quarum quædam ex Astragalo adscriptæ videntur: Dixit enim Dod. glandes istas aluum constringere, non secus ac Astragalon. Radices sunt (inquit Lob.) neutiquam purgantes, imò ab opiohibus esitari solitæ: mirati fuimus Augerium Ferretium libello de lue vener. hanc radicem sibi, aliisque adeò veram esse Apion persuasisse, vt profiteri ausus sit, se præparatas, ministratasq. illas rapulas veneris egrotis dedisse, adque lotiones & fomenta vsurpasse: monuisse potuerunt illius primæ qualitates alimentosæ, & ignauæ potius, quàm medicatæ: Sapor illis subdulcis, glandis, aut Castaneæ adstringens, ac vt Castaneæ tardius conficiuntur, statulentum, suauem tamen, succum creant. Veneris incentiuæ sunt. Sanguinis vteri, renum, & ventris fluores compescunt. In Bohemia, vbi abundant multi comedunt Castanearum modo. Et licet edantur ad satietatem, teste Matthioli, mouent quidem nausæam, sed non euacuant per aluum. Nunc autore Cam. horti, ex huius floribus aquam destillant quidam, quæ ita rosaceam ementitur, vt pro illa non raro vendi soleat.

ARACI, VEL APIOS LEGVM-
nosæ species Tossiano Carolo.

CAP. XXI

Descriptio
Caulis.
Folia.

Radix.

Icon.

Arachis.
Apros.
Locus

lore purpureo præditi, vel ex purpureo ad incarnatum vergente, cœlesti, pulchro, scribebat qui mittebat: radix ad Galegæ vernæ radicem accedit. Pictor ordinem foliorum non bene expressit, qui erat pingendus, qualis est in Orobo pannonico, radice bulbosâ Clusii, quem æmulari videtur.

Carolus Tossianus stirpium diligentiss. indagator ascripsit huic plantæ: *Arachi*, vel *Apros Fuchsi* species.

Ex *Champagnole* Burgundiæ planta tum sicca, tum virens in horto Ill. E.C. plantanda missa anno 1590.

ASTRAGALVS QVIBVSDAM
Aracho Tossiani Caroli similis.

CAP. XXII

Locus

Flor.
Radix.
Caulis.
Folia.

bent, quæ *Arachis* foliis longiora sunt, de cæte

Caulis est cubitali, vel maiore, tenui, glabro: Folia ex intervallicis quaternis vno pediculo nixa, duarum, triumve vnciarum longitudine, cummullata, in acutum mucronem desinentia, striata, viridantia: flores extremo furculo heret, quinque, vel sex congesti, pediculis mediocriter longi, magni, Galegæ vernæ, colore

rois valde similia, sed non in capreolos desinentia: florum pediculi palmo minores, angulosi, in quorum extremitatibus flores plures, quales *Lathyro siluestri germanico*, vel luteo: iuxta principium foliorum, & pediculorum appendices acuta.

OROBVS QVORVNDAM
radice bulbosâ, flore albo.

CAP. XXIII



Raciles Gpromit cauliculos, erectos, firmos, angulosos, pedales, & cubitales: folia per intervallicis, vni costæ inhaerentia, quaternis plerumque ex aduerso sita, erecta, angusta, trium ferè vnciarum longitudinis, gubitu aliquantulum acido intio, deinde amarulo, nullis capreolis prædita, quod caules

fatis firmi, adminiculis non egeant: flores in longis nascuntur furculis (picæ inltar cõgesti, florum Pisi, aut Viciz formâ, leni, aut octoni, candidi coloris: deinde oblongi lobi nigricantes, prioris lobis [*Astragali maioris Fuchsi*] pares, semine nigro, interdum etiam maculoso, pleni, qui per maturitatem cum strepitu dehiscunt: semen abiciunt: radicibus nititur quinis, aut senis, minimi digiti longitudine, crassiusculis, *Asphodeli*, aut *Pæoniæ* femina minoris, oblongis bulbis ferè similibus, minoribus tamen, foris nigris, intus albis.

Est *Orobus Pannonicus Clusii* [cuius descriptionem proposuimus] tertius, albus primus, siue *Asphodeli* radice.

Inuenitur magnâ copia in pratis non procul *Walterstorf*, *Maurpach*, *Niedeling*, & thermis Badenibus Austriæ vicinis. Obseruabam etiam in montosis vltra *Danubium* locis, ad cæduarum siluarum margines.

Floret cum superioribus [*Galega* minore vernæ, & *Astragalo* maiore *Fuchsi*] semenque perficit Iunio.

GLYCYRRHIZA.

CAP. XXIV

Est frutex, autore *Diosc.* virgas habens longitudine duorum cubitorum, circa quas folia densa, *Lentisco* similia, pingua, & ad tactum glutinosa. Flor est *Hyacintho* similis. (Sed hoc, inquit *Marantha*, ad colorem solum referri debet, figurâ enim *Staphydis Agriæ* floribus similes sunt.) Fructus magnitudine pilularum *Platanis* alpeior

asperior, qui *siliquis* habet instar Lentis, fulvas, parvas. [Matth. exempl. *τροχίς μαύρος*, i.e. fulvas, longas.] Radices longæ sunt, buxi coloris [Ca. *σπινθόρ*, fulvo colore] Gentianæ modo, subacribæ, dulces quæ expressæ succum reddunt *γλυκύ*. Hæc addit Lac.] Lycium.

Plinius, qui Glycyrrhizon inter spinosa foliata numerat, foliis eius aculeatam mordacitatem inesse scribit, & à quibusdam Adipson appellari. Hist. lib. 21. cap. 19. Et *rursus*: Sunt qui est Acanon Eryngio adscribant, spinosam, breuemque, ac latam herbam, spinisque latoribus. Alii Eryngem falsè eandem putauerunt esse, & Glycyrrhizam, quare subiungi eam potius refert: Et ipsa sine dubio inter aculeatas est, foliis echinatis, [Plin. malè legit, *ἐχίνος*, pro *γίνος*, Lentisci] pinguibus, tactuque gummosis, fruticosa binum cubitorum altitudine, flore Hyacinthi, fructu pilularum Platani magnitudinis.

Nascitur plurimum in Cappadocia, inquit Diosc. & Ponto. Esse præstantissimam vult Plin. in Cilicia, secundam in Ponto, radice dulci, & hanc tantum in usu. Capi eam Vergiliarum occasu, longam, ceu Vitem, coloris buxi. Melioremque nigram & lentam, quam fragilem.

Facit succus, auctore Diosc. ad arteriæ asperitatem, quem lingue subditum eliquare oportet. [Meum exemplar addit Matth. habet *υγιον* *ἡ βουκκὶς*, *δύχ*, medium autem inter caliditatem.] Conuenit & ad ardorem stomachi, & ad thoracis ac hepatis affectiones, scabritiemque vesicæ, & renum affectiones, cum passo potus. Idem situm eximit sub lingua eliquatis: & vulneribus commodè illinitur, & ad oris affectiones manducatur. Quin & decoctum radicum recentium ad eadem facit. At radix sicca in puluillum detrita pterygis vultu inaspergitur. Quædam [ait Plin.] exiguo gustu famem ac sitim sedant, conferuntque vires, vt Glycyrrhizon, Hippacæ, & butyrum. Quoddam situm, famemque sedet, Adipson idè quidam appellauerunt eam, & hydropicis dedere, ne sitient. Idè & commandata stomacice est, & vlcibus oris inaspera sapè & pterygis. Sanat & vesicæ scabiem, renum dolores, condylomatæ, vlcera genitalium. Dedere eam quidam potui in quantis, zij. pondere, & pipere, hemina aquæ. Commandata sanguinem ex vulnere sistit. Sunt qui & calculos eâ pelli tradiderunt. Glycyrrhizæ, siue dulcis radicis succus Galeno in primis vilis est similiter, vt eius fruticis radices, dulcis, simulque leuiter adstringens. Proinde asperitates lenire potest, nec modo in arteria, verum etiam vesica scabra, idque temperatæ mediocritate. Quocirca fuerit sanè natura eius familiaris nostræ temperatæ: nam tale monstratum est esse dulce: sed cum adstrictio quædam coniuncta sit, vniuersum eius temperamentum quantum ex caliditate & adstrictione est, tepidæ potissimum caliditatis fuerit, quam proximè accedens ad symmetrum. Porro quoniam temperie quoque est humidum, id, quod modicè est dulce, iure sanè etiam sui congruens medicamentum est, nimirum modicè humidum, simul & humanâ naturâ frigidius. Refert Diosc. radicem siccam ad leuorem redactam, pterygiorum, seu vnguium oculorum, idoneum esse illiti remedium.

GLYCYRRHIZÆ DIOSCORIDIS

ECHINATA NON REPENS.

VT minus nota, ita minoris hodîe vsus Dioscoridis Glycyrrhizæ, cui, non vt vulg.

Tom. II.



quadam.) stolones autem plures, virgultel, hominis proceritatem subinde assequuntur: folia Lentisci, maiora, acuminata, coniugatim rachi aligantur, viroris saturati, & tactu nonnihil glutinosi: flores è florum alis exeunt parui, cæulei: sequuntur fructus ex pluribus oblongis siliquis echinatis glomerati, ad imum coherentibus, quorum singulis singula insunt.

Summitatem Glycyrrhizæ echinata appingit Matth. vulgari Glycyrrhizæ repenti. In Epist. anni 1571. peruertit descriptionem Dioscoridis. Qua de re consules caput proximè sequens.

C. Bauh. apud Matth. Glycyrrhiza echinata siliquis. Dulcis radix Matthioli in compendio. Glycyrrhiza Matth. in mag. figuris. Et hac Frater, cui non concedo Matthiolum hanc intellexisse pro Glycyrrhiza. Et hoc satis demonstrat radix in eius iconè, præterea implet fatetur primum pilulas: adde illum scribere suam frugiferam copiosè in Germania prouenire in Bambergico agro, quis autem nescit Glycyrrhizam vulgarem radice repente, ibi crescere, & non echinatam, vt vult. C. Bauh. Nec est eaigitur quod, quæ à Cæalp. traditur.

Nunquam potui, inquit Lacuna, in Italia, nec alibi videre fructum nostræ Glycyrrhizæ ordinariæ, donec mihi Dodonæus demonstrauit ramulum collectum Antuerpiæ in horto Guilielmi Andrea: omnia exemplaria Diosc. sunt corrupta, legendum in siliquis prouenire grana similia Lenticulæ. Fieri tamen potest, vt reperiatur aliud Glycyrrhizæ genus cum siliquis similibus Lenticulis, quod nobis describit Dioscorides, à me non visum, nec etiam ab illo alio, quod intellexerim. Apud Lacunam in margine, quidam notat, Glycyrrhizam cum fructu spinoso non producere radicem longam, vt cætera. Proponit autem Lacuna ineptam figuram, ramuli siquidem non bene exprimunt Glycyrrhizam echinatam. Nec nouit discrimen inter hanc & sequentem.

Nunc Glycyrrhizam Italicam ad descriptionem Dioscoridis melius accedentem à Condenbergio aridam cum fructu echinato missam accepi.

Dod. gall. Glycyrrhiza vera, Glycyrrhiza Diosc. Et Hist. in fol Glycyrriza vera Diosc. officinis & vulgè incognita.

Glycyrrhiza echinata (aiunt Lob. & Pena) siquæ est sterilis, vt Matth. sibi re verâ certum esse audire.

E e

gata, & radio Radicæ, res tenues, cum quaque, repentes, sed crasse, latè, re claque depa cta, si nphes, brachii longi tudine ac cras sitie, buxi in quit Dod.] lu teiue intus co lous, foris ra rio altius, sed tamen quan doqstè nigri cans, minori verd dulcedi nis gratia, (Dod. ait dul ci sapore cum Saporis austeritate

Color.

Scolonei

Folia

Flores

Fructus

Semina.

Matth. not.

Glycyrrhi

za echina

tus siliquis

Diosc.

restituunt.

Icom Lacu

na ineptu.

Glycyrrhi

za incogni

ta

Matth. re

preh.

Glycyrrhiza
echinata.

Lobelia.

Locus &
tempus.Scythica
Theoph.
Locus.Scythica,
Plinius.Hippace
Equestris.

tione postremis commentariis prodit, tres fo-
rent Glycyrrhizæ species: nobis quot notæ, tot
frugiferæ: Ac primum Dioscoridis dulcis radix,
cuius vltus officinis rarior. Dedit Valer. Dourez
Glycyrrhizam spinosam Anthiochenam, sed ni-
hil nisi filiquas vidimus. Et Obs. Glycyrrhiza
echinata Dioscorid. Scythicæ & Callisichur.
Germ. Süßholz/ Süßwurtzel. Ang. Liciores.
Gall. Raigalisse, & Raiglice. Hisp. Regaliria & Re-
galiza. Ital. Regoliera, quæ nomina vulgaria
quàm bene huic Glycyrrhizæ tribuantur iudicent
Lectores.

Anthiochena, quàm à Valerando acceperunt,
non est mihi duersa ab echinata, qualem facit
Compil. Tabern. dicens: Glycyrrhiza echinata
Diosc. Süßholz.

Lob. meminit etiam alterius, quàm nominat
spinosam Anthiochenam. Glycyrrhizam echi-
natam Diosc. Anglicè hedgchogpe licorice
nominat. Glycyrrhizam veram Dioscoridis
Schvvenckfeldius.

Semina & filiquas sæpius habui, seminâuique,
sed non prouenit, præterquam semel Montbel-
gardi vbi tertio anno echinos produxit: semen
autem maturum factum Octobri: excreuere ma-
gni caules bicubitales: radix crassa, magna. Plan-
ta hæc, (teste Lob.) in hortis Germaniæ, & Bel-
giæ, tantum voluptatis causâ colitur, longeq; vul-
garâ dulcedine, & gratiâ vincitur. Flores, inquit
Dod. Æstate, Autumno pilulæ cum filiquis per-
ficiuntur. Vere herba regerminat, nouosque
caules producit. Hieme siquidem cum caulibus
folia intermonuntur, radice interim viuace.

SCYTHICE RADIX VE-
teribus.

CAP. XXV.


Scythices natura haud ita cognita hodie, que.
Smodum aliarum radicum dulcium. Imò
cum raris in terris etiam olim propagaretur, haud
mirum si pauca ab Autoribus tradita hisce etiam
temporibus extant.

De hac autem ita scribit Theop. Dulcis autem
etiam Scythica [Σκυθική] & quidam eam δούρο-
ντας vocantes nascitur apud Maiotim. Ut ille ad
anhelitus [δούρονα] tussim siccam, atque in totum
ad thosacis affectus, & ad vbera in melle. Potest
& sitim sedare, si quis in ore teneat. Quâ de cau-
sâ tum eâ, & Hippace Scythas vnde decem & duo-
decim dies durare credunt.

Sed hæc paulò clariùs, Plinius ita tradit. Inue-
niete herbas & vniuersæ Gentes. Scythia primum
eam, quæ Scythice vocatur circa ærotiâ [Μεο-
tidem Corn.] nascens, prædulcis. Aliam [prædul-
cem aliam Corn.] vtilissimâ [vtilissimamque] ad ea,
quæ [pasmata] [asthmata] vocant. Magna & ea cõ-
médatio, quod in ore eam habentes, famem, sitim-
que nõ sentiunt. Idem præstat apud eandem Hip-
pice [Hippace Corn.] dicta, quod in equis quo-
que eundem effectum habeat. Traduntque his
duabus herbis Scythas in duodenos dies durare
in fame, & siti.

Cæterum, Hippacen apud Theophrastum,
Gaza Equestrum vertit, quasi radix esset dulci
radici par, ad abigendam sitim famemque: Sed ca-
seum equinum, inquit Gesnerus, non radicem,
aut herbam esse, Dioscoridis Pliniique testimo-
nio constat. Hermolaus vnâ literâ discernit, sic
vt Hippice herbam, Hippace caseum designet. Et

Hippace apud Theoph. legitur. Quare non pro-
batur Gaza, qui Equestrum transtulit. Sed in hoc
etiam errauit Gaza, quod sitim tolerare vertit,
vbi græcè simpliciter δούρον [vitam agere] legitur:
vt intelligamus Hippacen cibi loco, Glycyrrhizâ
verd sitis remedium esse. Apparet etiam Plinium
errasse, qui vtrique Hippacæ & Glycyrrhizæ, v-
trumque seorsim attribuit remedium.

GLYCYRRHIZA RADICE
repente, vulgaris, Germanica.

Armentose
Radices lon-
gæ latæque, im-
plexu vago re-
pant, colore
buxeo, foris ni-
gricantes, sapo-
re melleo cui
stipes multum
dulcedine ced-
it, subhirsutus,
nonnihil pur-
purascens: folia
in alam fraxini
instar disposita,
quorum singu-
laria minora,
per ambitum
integra, aut ou-
rentia, modicè
viscosa, dum ad-
huc tenera: fa-

poræ acerbo, & subacido, Trago autore, Dictam-
no vulgari aut Ciceri sunt similia: flores racemo-
si, purpurantes, Dod. dilutè cœrulei, singula-
ribus trifolii bituminosi floribus persimiles: hos
excipiunt filiquæ glabræ, in quibus semina parua.

Dulcis radix, siue Glycyrrhiza, autore Cordo,
eadem est cum Scythica. Errauit Plinius, quod
dicit sine dubio inter aculeatas esse Glycyrrhizâ,
foliisque eam echinatis [aculeatis] describit. De-
cepit Plinium duorum istorum vocabulorum si-
militudo γάρα & γάρυ: Nam facilis est ex vno in
alterum lapsus.

Tymolipia, inquit Tragus, Latini radicem dul-
cem: nostri Liquiritiam, & Glicoriciam vocant,
Serapio autem Sus nominat. Dioscorides ei va-
ria attribuit nomina. Theoph. Scythicam appel-
lat. De hac radice dulci legatur gal. & Auic. &
Constant. Mirari satis non possum cur aculeatis
plantis glycyrrhiza à Plinio annumerata fuerit,
& echinatis foliis descripta. Hinc necesse est, vt
edicamus Plinium folia glycyrrhizæ nequaquam
vidisse aut asperas illas, quas diximus, filiquas
intellexisse.

Sed miratur Tragus Plinium, qui ipse interim
haud mirandus folium, sed potius omnino reii-
ciendus. Pingit enim filiquas hirsutas, ac asper-
ras tradit, quod ego non obseruavi, quasque ab
eo visas non credo: sed in Diosc. duntaxat le-
gisse, & iconi suæ falsâ appinxisse. Nec præterea
assentior Glycyrrhizam Pabergenensis agri esse
eandem cum Diosc. Glycyrrhiza, de qua antè e-
gimus, cui filiquæ glabræ, non verd hirsutæ, vel
aculeatæ, quas pingit, id quod etiam testatur Do-
donæus.

Fuchs, qui Scythicam Theoph. quoque statuit
& δούρον à quibusdam vocitari tradit, non descri-
bit, sed malè descriptionem Diosc. huic attri-
buit

buīt, quia planta, quam iconē proponit, non conuenit.

Sed quid de hac Matth. intelligamus. Dulcis radix, ait, quam Græci Glycyrrhizā, & Officinæ græcum nomen corruptentes, vel potius Barbaros secutæ, *Liquiritiam* vocant, & Heltrufci vulgò *Regolisia*, planta est paucis non cognita. Sed non possum non valde admirari Plinium, quodd Glycyrrhizā inter aculeatas numerarit plantas. Sine controuersia dici potest Plinium Glycyrrhizā minimè nouisse: Cuius erroris causa illud faciliè esse potuit, quodd sui potius Græci codicis fidem secutus fuerit, quam rei veritatem, in quo fortasè facili, lubrico que Librariorum non aduertentium lapsu *ἐχίνω* pro *οξύω* scriptum legebatur: vel quodd græcæ linguæ non exactè potius, vocabulorum, uocumque similitudine deceptus in hoc errauerit. Hæc huiusmodi opinio adeò firmiter veritati coheret, vt faciliè u quoque, deprehendi possit: à veritate defilicere, qui credunt Glycyrrhizā olim spinis fuisse præditam, sed mangonio longi cultus edomito rigore spinarum aculeos amisisse, & tandem mitigatam esse: cum ea etiam, quæ hoc æuo spontè per se nascitur, nullibi aculeata spectetur.

Hæc ille, cuius icon non representat Glycyrrhizā Diofci. ea enim est radice Gentianæ, fructu asperiore: Matthioli verò, radice est repante, siliquā glabrā. Plinius non errauit; vt ille ait, ob imperitiam linguæ græcæ, aut latinæ, quam multò melius intelligebat ipso. Cuius peritia [non dicam ignorantia] in lingua Græcā, & Latina, qualis fuerit, satis nota plurimis est. Addit adhuc in com. cum mag. ic. Glycyrrhizā re vera duum esse generum: vnam frugiferam, alteram verò sterilem. Frugiferam [quam describit Diofci.] fructum proferte pilularum Platani magnitudinis. Hanc primum ad se misisse Io. Hesiun Medic. Norimberg. Nec antea viquam à se visam. Et hæc eadem com. Ital. cum mag. quoque icon. ascribit, sed vtrobiq; ineptam ponit iconem, relicta meliori, confundens duas plantas: priori namque suæ iconi demit summitates, & supra ponit fructum echinatum Glycyrrhizæ Diofcoridæ. Falsò etiam scribit eam, quæ pilulas fert, non longè à Norimberga prouenire: faciliè crediderim ei missas pilulas Norimbergæ ex orto aliquo, in quo culta fuerit particulatim. Frustra tandem aliquam Glycyrrhizā sterilem dicit. *Vltimò* falsam habet eandem figuram, Iconum p. 38. ex duabus plantis compositam. Diofcoridis etiam descriptioni præter veritatem addit radices samentosas, quod postea figmentum penes confusam descriptionem in Hist. germ. repetit.

An Anguill. de hac agit, quando scribit: Glycyrrhizā, quam descripsit Diofci. (non) habemus in Italia, verum inuenitur versus Thraciam quæ florēs edit glomeratos, spheræ instar, quibus superueniunt siliquæ spinosæ: radix nostratī similis omnino. Sed intelligere velim Anguillaram, si per Italicam, eandem, quam nos, intelligit, falleretur: enim in radice, quæ differt ab ea quæ spinosas fert siliquas, quæ non repit.

Glycyrrhiza læuis à Lacuina vocatur, Castill. *Regaliza*, aut *Orosu*. Catal. *Regaltia*, Port. *Regoliz*: cui nō bene perfectum fuit discrimen inter Glycyrrhizā vulgatē, quam pingit pro læui, & echinatā, de qua scriptum, Dulcis radix communis, Glycyrrhiza.

Glycyrrhiza communis, aut Glycyrrhiza germanica Dod. gall. Edem in fol. Glycyrrhiza vulgaris. Hanc etiam esse, inquit idem, palam est

Tom. II.

Officinæ corruptā voce *Liquiritiā* vocant.

Theoph. *οξύω* *πίζω*, &c., vt ait, nonnulli *εμπύκνουν*. Plin. Scythicā herbam. Et verè *εμπύκνουν* Scythicæ *πίζω* siue multum dulcis, hæc dici potest; est enim omnino dulcissima, & quā altera Glycyrrhiza dulcior. Scythicæ, à Scythiæ regione, in qua gignitur, nominatur. Potest & hæc *ἐχίνω* citra aspirationem, & *ἐχίνω* propriissimè nuncupari: ex quo siquidem gustu famem & sitim præcipuè sedat.

Lobel. & Penæ Glycyrrhiza siliquosa, com. Glycyrrh. siliquosa, munis, quæ dulcedine echinatam vincit.

Glycyrrhiza, quæ vulgò corruptè Liquiritia, suffrutex est (autore Cæsalp.) cuius radices sunt prælongæ, digiti crassitudine, laementosæ, intus flauescentes, serpunt in terra, virgas ferentes multas, bicubitales, lignosas, annuas tamen: siliquæ breues. Dioscorides fruticulum inquit esse. Theoph. Scythicā vocat. Phnius folia tribuit ei echinata, pro Schino [Lentisco] Echinum legens. C. Bauh. Quæ Glycyrrhiza Cæsalpini non ea, quæ echinata, vt voluit Casp. Bauhinus.

Proponit Tabern. confusam & figuram, & Tabern. dicit descriptionem, dicit enim siliquas asperas.

Sic & Gerardi figura non bona, potissimum quoque si spectes siliquas, quæ vix diuersæ pinguntur à Dioscoridæ Glycyrrhiza: siliquis figmentum ex Tab.

Schvv. in cat. Sil. Glycyrrhizā vulgatē, & radicem dulcem Francicā vocat, & Gerard. Sil. silis, Gemein Susholtz.

C. Bauh. apud Matth. Glycyrrhizā alteram siliquosam appellat, quæ quibusdam malè itetilis censetur.

Glycyrrhiza radice repente, vulgaris, germanica, à nobis dicitur, Germ. Susholtz / & Susholtz, Belg. Susholtz & Cælestir: aut Cælestis, Gall. *Riglice*, *Rigolisse*, & *Regolisse*. Ital. *Regaltia*. Hispanis verò *Regaliza*, & *Regaltia*, Gerard. *Red geschogge Licorice*. Angl. *Licorice*. Boh. *Leforce* / Polon. *Lafrycia*. Hung. *edos gyoker*.

Glycyrrhiza [inquit Fuch.] multæ, nec ignaua [frugifera Matth.] aliquot Germaniæ nostræ locis, Bâbergeni præsertim agro, producit. Et hodie nusquam ferè non seritur in hortis: his, quæ semel comprehendit, tam pertinaci fertilitate coheret, vt vix vnquam possit radicis extirpari, tam restibili fecunditate regerminat. Audio & Fullaci in Carinthia prouenire: & illic etiam in Franconia Bambergæ, in agilis coli: tertio, aut quarto anno effodi, hoc modo: sulcus longus, nempe per totum agrum ducitur, duos ferè pedes latus, profundus tres, aut quatuor dodrantes: sic maiores radices eximunt, relinquunt minores. Iulio mense, teste Trago, appetente, stoculi prodeunt. Tam folia, quā caules Hieme quotannis pereunt, quo fit, vt quotannis radice omnia hæc nouo pullulascere necesse habeant. De dulci radice Germania gloriari potest, in primis verò Bâbergenis ager, qui vnicus toti Germaniæ satis Glycyrrhizæ suppeditare potest. Abundat hæc (autore Matth.) Apulia, præsertim Gargand monte, vnde quotannis succus in pastillos condensatus ad nos conuehitur, & radicem, quāti plurimum. Visitur etiamnum in viridariis, pluribus locis in Italia, non modò ad spectaculum facta, sed ad medicamentorum vsum. Pleiadibus occiduis [inquit in Hist. germ.] radix colligitur. Nascitur & in nostro hortulo [ait Gesn. horu] in quo duobus, aut tribus annis absque flore, & fructu caulem edidit tricubitalem ferè, quarto primū

Plurimum
radice
plantatur

anno flosculos, & siliquas ostendit. Hæc cum scriberem ad cubitos quatuor excreuerat, decem, aut pluribus (aliquot enim resecueram) ab una radice caulibus sub finem Iunii mensis: neque dum tamen flores ostendebat. Prouenit autem plurimum plantata radice. Folia tactu glutinosa sunt, & leuiter subolent nescio quid aromatici Calami ferè, sub noctem præsertim: quo tempore folia omnia demittuntur, interdum verò surriguntur. Idem de coll. stirp. inquit, floret Iulio, & semen fert Septembri. Communis, nullis non nota, pergit Lobel. quæ ex Hispaniis Londinum, Antuerpiam & Lugdunum defertur, & vili vbique locorum distribuitur, non paucis Galliarum Narbonensis locis multum sponte oritur, etiam prope *Larva* oppidum. Iunio, & Iulio siliquas fert. Schuuekfeldio Augusto & Septembri floret. Habebam ego Montbelgardi in horto Ill. C. Wirt. allatam Stutgardia, & Lugduni ex fasciculis Francofurto missis. His ita hæcenus dictis, addit Dodonæus: Frequens est in Hispania, & Belgarum horti hæc non destituntur. Rarius autem in Germania ac Belgio floret, ideoque etiam sterilis à nonnullis, sed tementè, credita: cum tamen floret, sub finem Æstatis floret.

Vires
vires

Viribus antea ex Theoph. & Plinio sub titulo Scythice enarratis, adiungamus eas, quas Tragus Matth. & Dodonæus in præfenti testantur. Quare præstantissimâ hæc, nobilissimæque plantæ secundum commentariorum suorum librum, Tragus concludit, dicens: Non solum radix hæc una cum succo extracto magni facienda, verum etiam suo modo vtilior, commodior, & salubrior ipso Saccharo esse mihi videtur, ita quidem si altero ex his carendum mihi foret, Saccharo sanè, quàm Glycyrrhizæ carere mallet. Pro illo namque melius videretur possem, quemadmodum & Veteres non Saccharo, sed melle prætereaque medicamenta temperasse legimus. Saccharum equidem, sicut & alia aromata, ad officinas & diuitum culinas spectare potius videtur, qui verò tenuioris sunt fortunæ, melle, & dulci radice contenti erunt, & plus commoditatis inde, quàm ex Saccharo & aromatibus percipient. Nemo enim ignorat amara, & Saccharum sitim excitare, quàm dulcis radix & succus eius restinguunt. Dolendum est autè tam præpostero nos prædictos esse iudicio, ut noxia expectamus, salutaria respuentes: id quod in ægris, præsertim verò febricitantibus comperimus, quibus confectioibus Saccharo alitius aromatibus permixtis, sanitas non confertur, sed aufertur, sitique non adimitur, sed additur, quæ tamen aliis & commodioribus medicamentis restinguenda erat. Sed ut ad Glycyrrhizæ vires propius accedamus, Matthiolum inspicimus, & Dodonæum. Cæterum autem quandoquidem hæc radix dulcis est, temperatè quoque calida & humida est. Cortex eius amaritudinem quandam tamen habet, & calidioris est qualitatis particeps, sed hunc abradere oportet: Humectat autem magis recens, & succo plena radix, quàm arida. Vtilis est ad rauedines, tussis, difficilem respirationem, perineumoniam, pleuritidem, sanguinisque ac puris sputationem, phthisim, & ad omnes thoracis morbos, exasperata lenit, inflammationes sedat, acrimoniam, & falsilaginem humorum mitigat, contemperatque crudiores humores concoquit, & sputi exitum faciliorem promouet: vlcera expurgat in eclegmate, vel alio quouis modo sumpta: aut aliquandiu mansa, succo sub lingua detento. De-

Temperat.
vires vires
vires.

Radix

costum eius renibus ac vesicæ exulceratis confert: vrinæ stillicidio medetur, acia vniuersum omnibus malis occurrat, ab acris, falsis, & mordacibus humoribus excitatis. In quibusdam monasteriis Hollandiæ (addit Hist. gall.) ex succo Liquiritiæ & aliis aromatibus paruos panes efformant, qui tussis proinde frigidæ & inueteratæ, & aliis similibus pulmonum & thoracis affectibus.

FOENVM GRÆCVM SILVE-
stre, siue Glycyrrhiza siluest.
quibusdam.



pari alam claudente, quod tamen non est perpetuum, sunt ea verò, si singula seorsim contempleris, Pisi silvestris foliis similia, superne ex viridi glauca & glabra, inferne ex viridi flauescens, ac hirsuta, sapore eo, quem radici inesse dicebamus: ex foliorum porro alis pediculus ciciter palmaris enascitur, qui leguminaceos crebros flores ex flauo pallentes sustinet: siquæ non minus floribus frequentes, incuruæ, dorso sulcata, unde si neruum auferas, ex duabus compositæ videntur, quarum singulæ suis membranis dissepiantur, semen claudentes Fœnugræci, minus, lucidum, cui sinus insculptus.

Fœnugræcum silvestre Tragus nominat, Lotumque sylvestrem, à Diosc. descriptum, quam & Trifolium minus, & Lybicam vocet, perpetuam esse iudicat.

Inepit simili modo Lonicerus, qui Lotum trifolium, aut Lotum campestrem appellat. Ger. Steintwicken/ aut wild fœnugræc/ & wild bockeforn.

Dodonæo est Fœnugræcum silu. Tragi, & Recentiorum, & hæc in Hist. frum. In fol. autem Fœnugræcum silu. 1. Belg. Wilde Fenigric/ Germ. Wildbockeforn.

Lobel. & Penz. Adu. & Ic. Pl. Glauz vulgaris, Obl. insuper Fœnugræcum silu. Tragi Angl. Sca Trifoly.

Gesn. Glycyrrizam silu. eam herbam putat: quam Dod. Iconum suarum lib. 2. p. 36. pro Hedyfaro pinxerit. Quod an verum sit videndum. in hist. gall. id non fecit.

Cordo, cui Polygonon dicitur, Gesn. addit figuram ex Tragi lib. 2. cap. 5. ubi etiam annotatum, Polygonon, Cordi quidam non rectè Hedyfatum

dysarum, neque melius alii Fœnugræcum silu. nominant. Glycyrrhiza siluestris.

Clusius, à quo Glauz vulgaris, & Glycyrrhiza silv. Gesneri dicitur, scribebat olim apud Aco-
stam, Herbam mimosam multis notis convenire
cum Polygalo Cordi, cuius folia noctu interdum
contrahantur, ac spinis careat caulis, nisi pro spi-
nis sumere libeat, tenues illas & mucronatas ap-
pendices sedi foliorum alatorum inhaerentes.
Hanc tamen opinionem lib. Exotic. Clus. omisit.
Vocatur Hungaricè *Penz leuelei* / eddōs siu, h.e.
Numularis dulcis herba.

Habeo à me satum Montbelg. in horto Ill. E.
C. Fœnugræcum silu. Tragi, folio Glycyrrhizæ.
Multis hoc odiosū est, ramis nimirum se nimium
spargentibus. Genetz proveniens observavi prope
collē *la Bassie* mense Martio, & florens Junio.
Lugduni abundat, vbi Dalechampius Glycyrr-
hizam silu. vocabat, quod nomen non displicet,
dulcis enim est herba. Basileæ vidi extra portam
Lapideam inter spinas. Item eundo Bernam inter
Morat & *Morges* mense Julio prægnans semi-
ne. Inter Basileam & Leurach cum suis siliquis
inftar cornu effigiatis, multis simul mensis Au-
gusti principio. Item iuxta Castellum Befordien-
se semine maturo Augusto. Invenitur à Clusio in
siluis, pratorum marginibus, vmbrosis, atque
etiam in pratibus apertis.

FOENUGRÆCO SILVESTRI

Tragi in quibusdam accedens
planta.



Palmati est
altitudine,
caulibus dona-
ta teretibus,
hirsutis, striatis,
crassiusculis: fo-
lia Tribuli ter-
restris paria,
perquam hirsu-
ta, conjugatum
costæ, duum
vinciarum, ex
caulis geniculis
ortæ, adhaerent:
indidemque
flores copiosi
dimidiati ver-
ticillum efficien-
tes, parvi, palli-
duli, quorum
vincique suc-
cedit *siliqua* hir-

suta, in acumen desinens, in duas partes lindi fa-
cilis, quarum vnaquæque suis vndique membra-
nis conuestita, semen continet copiosum, Fœnu-
græci sativi, minus: *radix* duum vinciarum, sim-
plex, gracilis.

Hæc planta in multis accedit Stellæ legumi-
nosæ, de qua postea.

Circa Monspelium ad Episcopi Monsp. Ca-
stellum, lapide circiter vno ab vrbe distans, in
loco arido, vix vnam, aut alteram observavit, at-
que collegit Gener. I. H. Cherlerus.

HERBA MIMOSA.

CAP. XXVII.

Inter ea, quæ anno 1809. Gener. Cherlerus ex
Angliæ reportabat, erat *Herba mimosa*, de qua
Tom. II.

hæcille. Herba, semen, & ramulus Herba mimo-
sæ, per D. Cargillum missa, cui tradiderat D. Ga-
retus, qui acceperat à Comite Comberlandio, *Locus*,

Icon Ac. silv.



qui collegerat
in insula, quæ
cepit in Ame-
rica, quæ vo-
catur S. Ioan.
de Porte Ric-
co. Sunt au-
tem eius ra-
muli tenues
in partes divi-
si, in quibus
creberrimæ &
tenuissimæ,
veluti spinule,
non tamen
pungentes, ad
Muscicamulos
accedunt: ipsi
verò ramuli
sunt conglo-
merati, abun-
dantes semi-
nibus, quæ ad-
hæreere viden-
tur illis veluti

Delet.
ramulorum.

Semen.

spinulis, ea aliquid cum Lente simile habent, ve-
rùm minora, & minus orbiculata, in acumen de-
sinentia, compressa non nihil, & in medio parum
per tumescencia, dentibus attritu facilia. Con-
stant membranâ tenui, fusca, & minimo nucleo
internè albo: saporem nullum animadvertimus.

Iconem Acolitæ dudum sculpendam curaveram-
us, anno sc. 1506. sed quia veriorum Clusii, quæ
cum nostro ramulo, semine, & herba congruit,
agnoscimus: eam parandam censuimus. Dicitur
autem Acolitæ in lib. Arom. Italicè edito, *Herba*
Molle, *Herba Delicata*, & in versione Clusii *Herba*
mimosa, vbi sequentia de ea leguntur. Invenitur
in quibusdam [Asia] hortis, planta quinque pal-
morum longitudinis, vicinis arbutis, aut parie-
tibus incumbens, tenui caule, eleganti viriditate
prædita, nec admodum rotundo, per intervallâ
exiguâ, & pungentibus spinis, foliis superiori-
bus haud abulimilibus, Filicis famina foliis mi-
noribus. Gaudet humidis & petrosis: manu-
que admota senescit & marcescit, remotâ verò
pristinam viriditatem recipit, sed non celeriter
ideoque *Herb. vicia*, & *Mimosa* dicitur.

Icon.

*Herba Mol-
le* *Herb. Dali-
cata*.
Locus.
Delet.
Ac. silv.
Cataliz.

Locis.

Mimosa
quare ita
caur.
Natura.

Naturam habet plurimum ab arbore tristi differen-
tem: nam singulis noctibus Sole occidente se-
nescit & ficitur quodammodo, sic vt conta-
buisse videatur: oriente verò Sole vigorem de-
nud recipit: quantoque Sol magis feruet, eò ma-
gis viret, totoque die folia ad Solem convertit.
Odore & sapore est Glycyrrhizæ: vulgoque ab
indigenis folia manduntur aduersus tussim, ad
pectus repurgandum, & vocem clariorem effi-
ciendam: renum etiam doloribus vtilis esse cen-
setur, & recentia vulnera glutinare.

Odor, et
sapor.
Vires.
Tusis.
Renum do-
loris

Vulnera.
Fœnugræci
cum silu.

His Clusius (qui olim apud Acostram hanc mul-
tis notis cum Fœnugræco silu. Tragi convenire
dixit, & nunc in Exot. hanc suam opinionem o-
mittit) addit: Multarum (presertim in leguminū
genere) folia, noctu se contrahere, & compri-
mere solent. Herba porro Mimosa appellatione
ad me mittebatur sicca planta à Jac. Careto
extremo Octobri, anni 1599. quam ab Ill. Comi-
te de Comberland ex Insula D. Ioannis à porcu
dimite nuncupata, reduce, hinc cum terra impo-

sicam recepisse scribebat, conseruare tamen non potuisse. Huius verò iconem, quàm commodè fieri potuit, ex illa sicca exprimi curabam, vt eius historię ex sicca etiam planta concinnata, addi posset.

Descrip.

Radix.

Cauliculi.

Virga.

Ramuli.

Capitula.



quentes, lōgas, tenuesque fibras agentes, instar ramorum Periclymeni vulgaris, qui per terram diffunduntur: erant verò cubitalis longitudinis illæ virgæ, interdum ampliores, teretes, lentæ, quibusdam spinulis latiusculâ basi eas insidentibus præditæ, quemadmodum in Rubi ramis videre licet, minoribus tamen, rarioribus, minusque firmis: ex rursus in alios graciliores ramos diuidebantur, frequenioribus spinulis obritos, quorum nodis inter binas appendiculas alternis exoriebatur tenerissimi ramuli suis foliis obstiti, quæ numerosa serie quâdam, & pari vtrinque numero, in ala nata erant, nullo singulari alam finiente, tenella admodum, & virentia, non dissimilia Acaciæ foliis, quæ (dū primū prodibant, tenui, incanaque lanugine pubescebant, vt ex ramo suis paruulis ramulis, & foliis onusto, quæ addiderat, deprehendere poteram, quique fibras aliquid adnatas etiam retinebat. Adiunxerat & bina capitella, quæ, in ea planta nata, ab Illustri supra dicto Comite accepisse scribebat, cum aliquot ramis sua folia adhuc retinentibus. Constabant ea capitella à multis, tenuibus, angustisque & spinosis veluti foliis, inter quæ latebant semina orbiculata, plana, nigra, in medio nonnihil tumentia. Flores à me conspecti non fuerunt, & haud scio, an allati fuerint. Vtrum porro huius plantæ virentis, & adhuc in terra hærentis, folia, manu admotâ, marcescant, vt scribit Acosta, eiusque rei causâ nomen fuerit inditum, ii referre possent, qui plantam virentem & crescentem viderunt, atque ærutam capz impoluerunt.

ASTRAGALVS VETERIBVS.

C A P. XXVI.

Descrip.
Diosc.

Astragalus [ἀσράγαν] inquit Diosc. est parvus à terra frutex [βαυσαν] foliis & ramulis similis [ἐν τῇ σῆδι] Ciceri: flores sunt purpurei, parui: radix subest rotunda, velut magnus

Raphanus [ἀραβίαν] inquit Diosc. I c b. & Pena Adv. Colum. [ἀσράγαν] inquit Diosc. propagines habens solidas, nigras, duras, velut cornua inter se implicatas, gustu adstringentes.

Variat nonnihil à Diosc. lectione Plinius, breuiter ita scribens: Astragalus folia habet longa, incisuris multis obliquis [Columnæ incisuris multis superfluum videtur, & legendum obliquis:] circa radicem caules tres, aut quatuor foliorum plenos, florem Hyacinthi, radices villosas, implicatas, rubras, præduras.

Gal. lib. 1. c. 1. secund. loc. medicamentum ad caluescentes habet, quod recipit Iridis Astragalitidis, siue, vt alii, Illyricæ sextantem. In quem locum ego (inquit Corn.) in com. med. annotau, videri mihi Iridem Astragalitidem eandem esse cū Astragalo simpliciter appellato, eò quòd huius radicem soliditas, & vires, Iridis Illyricæ soliditati, ac viribus respondeant, ad vetera vlcera explenda, ac repurganda. In ea sententia adhuc sum & habet Iridem Astragalitidem etiam Aëtius libro tert. cap. tert. Potest itaque Astragalus, Iris appellari, & additione Astragalitidis declarari. Astragali appellatio talum significat, quòd radicis figurâ, & soliditate talum refert. Nostri putatur ea esse, quam Ἰερδμόρεν vocant. Sed fœdi erroris in simulare licet Cornarium, qui, vt aliquid noui, & minimè vulgaris in lucem ederet, sibi persuaserit, ne dicam leuibus idearum formis inxerit, Astragalum, & Iridem Astragaloidem, easdem esse plantas. An præterea per Ἰερδμόρεν intelligat Chamæbalanum quorundam, considerandum. si eam intelligit, radix non est similis magno Raphano, vt is in Diosc. legit.

Conuenientius adhuc nomen, & Etymon, quàm Cornarius, Columna tradit. Seminum, infir, forma ἀσράγαν, plantæ huic nomen indidit Astragali: ἀσράγαν quidem talum, & talorū lusum significat, quorum formam & vltim huius plantæ semina referunt: tereti formâ quidem sunt in superna, infernaque parte plana, vel acetabulorum more concaua: possent etiam ita appellati à tuberosa, carnosae formæ aditæ compressa, & melius à multitudine fibrarum nodosarum ad similitudinē flagelli, vnde ἀσράγαν ὡς ἄστῃ à Pollice dicitur. Diosc. plantæ habitum similem Ciceri fecit, non folia Ciceri similia: florem Hyacinthi, colorem intellige.

Ceterum Astragalum voluit aliqui, vt Ternerus, quem antè, hoc libro 17. tradidimus, titulo Chamæbalani leguminosæ, hanc fortè etiam intelligit per Ἰερδμόρεν antè dictam Cornarius. Necdum constat, quæ planta sit Astragalus Matthioli, nisi sit Hedysarum clypeatum per pictorem accommodatum descriptioni Dioscoridis. Adhuc Astragalitidē Iridem galeni & Aëtii non existimamus esse eandē cum Astragalo, & Ἰερδμόρεν/ vt putauit Cornarius.

Astragalus maior dicitur à Fuchio. Astragaloides autem, & Astragalus silu. Thallio & aliis. Non desunt præterea, qui Astragaloidem reddi-caulem, hirsutum vocitant. Alii verò Astragaloides Ciceri Ponæ, Onobrychin quorundam purpureo flore. Alii Astragalum Montpelianum. Quidam Astragalum quendam montanum Astragalum montano candidiorem. Nonnulli Astragalum Syriacum appellant. An Astragalus fortè lanuginosus Bæticus. Astragalus Dioscoridis quibusdam. Habetur & Astragalus siluaticus vernus à quibusdam, & calega nemorensis verna, de qua paullo post.

Credetur tandem Astragalus Columnæ, calega nemorensis

Plinius
Folia.

Flos.
Radix.

Radix
galienus

Corn.
gustum.

Acqui-

Chama-

lanus
minor.

Hedysa-

clypea-

Astrag-

maior.

Astrag-

caulem.

Astrag-

caulem.

Astrag-

caulem.

Astrag-

caulem.

Astrag-

caulem.

Astrag-

caulem.

nemorensi valde similis, si non idem.

Nascitur (teste Diosc.) locis vento expositis, vmbrosis, & niuosis. Multa in Memphide Arcadie. Ait contra (autore Plinio) legitur, in Phœneo Arcadie in petrosis, apricis, & idem niualibus. Ita etiam Paulus habet calenum secutus. Quum itaque hi omnes *ex quibus* legant, inquit Corn. etiam in Dioscoride rectam lectionem esse, *ex quibus* apparet: & non *ex quibus*, velut quædā exemplaria habent: maxime cum nulla sit arcadiæ Memphis.

Colligitur exitu autumnii, quum folia amiserit, siccatur in vmbra.

Radix, vt Diosc. tradit, in vino pota alvum fluidam sistit, & vrinas mouet. Facit & ad vlcerata vetera, acida inspersa. Sanguinem quoque cohibet. Tunditur autem difficulter ob suam soliditatem. His addit Plinius: Vis ei ad spissanda corpora. Vrinam mouet repetitissimo liquore, sicut pleraque quæ aluum sistunt. Sanat & dysentericos in vino rubro tusa. Eadem gingiuarum supurationi vtilissima est fusa. Galenus fruticem huac paruum, radices habere adstringentes asserit, proindeque ex iis esse, quæ non ingenerose siccant.


ASTRAGALVS ROMANVS, SIVE

Hedysarum clypeatum siliquâ asperâ.

Ramis est cubitalibus, bicubitalibus, & tricubitalibus concauis, procumbentibus, glabris, crassiusculis, multis ex radice statim ortis: per quos alternatim ferè nascuntur folia palmata, & ferè dodrantalia, alia instar hærentia, quinque, aut sex coniugationibus, extremoque folio impari, constantia. folia singulatia, Glycyrrhizæ foliis quodammodo similia, paulò breuiora, latioraque, & glabra, exceptis marginibus, breuibus pilis ornatis, sapore nullo manifesto, nisi tantillum adstringente: ex alarum sinu prodeunt surculi singulares, qui in spicam digestos ferunt flores, amœnos, Genistæ, sed rubentes: à quibus siliquæ, compressæ, asperæ, ternis, aut quaternis, aut quinis seminibus orbiculatis, clypeoli effigie locatis, complures videntur.

Icones factæ sunt binæ. Prior demonstrat folia præcipuè, & flores: altera verò siliquam, & semen. Illa rursus facta est ad plantam siccam delatam à genere meo Cherlerò nomine Astragali Romani quorundam, hæc autem ad Iconem Plantini, cum nostra siliqua, & semine. Falluntur (inquit Dod.) qui Onobrychin alteram ad Securidacæ genus referte student. Falluntur & ii

Alia icon.



ac Dod. descriptam, Onobrychin 2. Dod. Nec deesse scribit, qui velint Helenium esse Ægyptium, quod non conueniat, siquidem radix sit rubra. Hedysarum alterum clypeatum Lobelii, quod in hortis Belgicis alatur, hist. Lugdunensi cognominatur. Helenium Ægyptium, eiusque speciem quidam dixerunt, alii verò appositè Hedysarum censuere.

In hortis Belgii Dodoneo conspicitur interdum contigit. Ponæ verò in horto montis Baldi. Mœtæ belgardi in horto E. C. satum aliquoties mihi prouenit, & primo quidem anno flores protulit Septembri, & Octobri, qui non maturuerunt. Argentina tamen apud Fridericum Meierum Septembri maturum obseruauit, qui mihi indicauit à se obseruatam hanc plantam in pratis Senensium cupiosè prouenientem, quam equis pro pabulo exhibeant. Perit Hieme, ni reponatur. Hanc attulit Gener Cherlerus collectam in via Romana Viterbam versus. Florentiæ item in horto magni Ducis Hetrurici.

Locus & Tempus.

Vius.

ASTRAGALVS MATTHIOLI.

SOMNIO herclè vexabatur Matthiolus, cum Astragalum quendam in agro Tridenino, in vallis Ananiensis montibus sibi prouenientem olim imaginaretur, siquidem in post. com. istius Astragali figuram omisit quasi fictitiâ. Nos enim suspicamur illi quondam aliquam plantam, nomine Astragali demonstratam, quam postea per pictorem Dioscoridis descriptioni aptarit (pictoribus enim omnia licet, vt licuit apud eum in aliis plantis) Ea verò planta fuit fortè Hedysarum clypeatum, quibusdam dictum Astragalum, vt antè indicatum. Retractauit hinc meritis & Hist. Lugd. in vltimis suis editionibus sententiam suam de Astragalo Matthioli. Siquidem consilium sicci botanici, aut vinolenti, nec cogitatum sapientis, sed opratum quilibet audientia certò petièpietur. Quamuis autem Astragali figuram apud Matth. C. Bauh. ex secunda commentariorum editione proposuerit, attamen ignorare se fatetur qualis sit planta, etsi non desint, qui eiusdem Pseudo-Apium esse censcant.

Matth. mor.

C. Bauh.

ASRAGALVS MAIOR
Fuchito.

Descriptio.

Astragalus
maior.
Radix.
Caulis.



Flores.

Siliqua

Ervum
Orobanch.
Descript.
Clusii.

Flores.

Astragaloides
des.

Locus &
campus.

Quam mihi olim D. Fuchsius cum apud eū Tubingę esse Astragalum maiorem designauit, radice est satis longa, & crassa, dulci: caulibus rectis, cubitalibus, striatis, angulosis: foliola Viciarū modo disposita, nouem, vel vndecim: interdum vnguib. longiora, aliā multo minora, ex ro-

tundo oblonga, ad costam vnam adnexa, subcartulea, quę exsiccata nigrescunt: flores ex pediculis longis, satis magni purpurei, ex eodem pediculo plures, formā Viciarum: quibus succedunt siliquę longę, teretes, admodum affines plantę, quam paullo pōt describam, quibus multa inter se similia, quędam diuersa.

Commemorat hanc Clusius his verbis: Ervum siue Orobus rei herbarię studiosis, Pannonicus purpurascens secundus, folia habet sena, octona, interdum decem vni costę hærentia, Lenticulę foliis haudquaquam maiora, tenella, viridiaque, gustu amariante, calidiusculo: flores purpurascens colore, qui vetustate in cœruleum commutatur: radix in diuersa tendens. Icon apud Clus. in hist. post. quemadmodum etiam apud Lobelium, optimē exprimit plantam, quam nos descripsimus: in Pannon. errore typographi pro Orobo Pannonico secundo pag. 738. male ponitur icon Trasi.

An Lob. Obs. sicut & Ic Pl. Astragaloides altera Herbariorum. Huius figuram habere videatur Lonic. sub nomine feldmeiden: quomuis non sit ea, de qua in contextu loquitur. C. Bauh. frater, qui Patauio misit, et hæc nomina adscripsit, Glycyrrhiza Gesneri, Aphace Cortusio: verum vbi Gesn. ita vocatit ignoro. Astragaloides simpliciter à Dod. scribitur, eique flores ex cartuleo purpurei, minores quàm Vicie conseruntur, siliquę verò teretes, oblongę, nigricantes, in quibus semen Vicie minus, non rotundum, ac globosum. Nonnulli, inquit is, Ervum silu. vocant.

Inueni Genevę mense Iunio in colle la Bastie florentem: itē mense Maio. Argentinę vidi in horto D. Frid. Meieri cum siliquis Iulio. In Belgicis hortis aliquando videre meminit Clusius, & Aphace nomine à rei herbarię studiosis appellari. Sed multo tempore. Dod. teste, dorat, Hiemps, frigorisque patiens. Ad hortos Belgii aliunde allatum, peregrinum eē legumen. Iunio ac etiam feris floret, siliquę interea perficiuntur.

ASTRAGALOIDES, SIVE ASTRAGALVS
siluaticus, Astragalo magno Fuchsi, vel
Chamæbalano leguminosę
affinis planta.



Chamæbalano similem voco, cui ex radicibus longis, quasi repentibus, varēquo implicatis, partim tenuibus, partim tuberosis, Chamæbalani Dodon. perquam similibus, nisi ē tuberibus plures capillares fibrę prodirent, externē nigris, internē albis, sapore subdulcibus, caules exsurgunt multi, pedales, angulosis, folia aliquate-

nus Chamæbalano similia, sine capreolis, glauca, & ferē nigricantia, oblonga, obtusa, nervosa, ex breuib. pediculis, quaterna vel sena, præter foliola, quę ad pediculorum exortum sunt: flores Pisorum rubentes, quibus succedunt siliquę satis longę, teretes, ex pediculo non admodum longo, in quibus semina medio crinter magna, lutea, sapore ferē Pisorum, quę se contingunt vtrinque compressi.

Ab Astragalo maiore Fuchsi differt, cui folia ex vno pediculo plura, & breuiora: differt etiam caulibus: qui breuiiores, & radicibus.


Thalio in Harc. Astragalus siluaticus, apud quem Camerarius scribit, dici vulgō Christiani rura; aliis Cicer montanum nuncupari, describit à Cordo. sed à nullo, quod sciat, depingi.

An Ruell. Astragalus, qui à Diosc. describitur, frequensque est apud suos. Rura, inquit, nostra montanum, vel rusticum Cicer nominant: Cicerulam esse diceret. Vulgus nonnullum siluestres Cerras [cicerculas] vocat. Astragalum itaque Ruellius agnoscere visus est, vel Cordo teste: cui cum ratione est adhibenda fides. cernitur Bnöllen Braur. Idem in hist. describit Astragali nomine quo in loco Gesnerus annotauit Christiani Wurzeli & Bnöllens Wurzeli ab aliquibus Cicer montanum appellari.

Mense florentem Aprilis, prouenientem verò cum siliquis obseruavi mense Octobri in monte Rosberg prope Masnister & locis vicinis, in silvis & dumetis. Item circa fontem Admirabilem in ducatu Wirt. inter vepres.

ASTRAGALVS RECTICAVLIS
hirsuta.

Anonymum quandam ramum inter siccas meas adferro, rectum, cubitalem (altiorē fuisse sicca insinuat) rigidum ac firmum, totum pilis candicantibus ac lanuginosis oblitum, crebro foliorum vestitu præditum. Ea costę hærent quindecim communiter, ordine & posita vt in Galega, minora, angustiora, tota villosa, in ac-

POLYGALON VETERI-
bus.

CAP. XXVIII.

men desinen-
tia, sapore ama-
ro, flores longo
pediculo in-
dent trifolii
pratenfis, hian-
tes, pallidi, in
glomerem con-
gesti, ex villosis
calyculis pro-
minentes. Hæc
vbi locorum
nactus sum, nō
recorder. Ele-
gans tamē tur-
raritas, tum va-
rietas, figuram
merebatur, &
nomen ali-
quod.



Lobel & Pe- Synonym.
na Aduetlac. Caput gall.
Obf. qui Caput Belgarum.
gallinaceum Bel- An Onobry-
garum vocant; chris?
dicunt: An O- Polygala
nobrichis Diof- vera Da-
coridis? Polyga- lech
la vera Dale- Glauca.
champi; Onobri- Polygalum
chis Dodonæi. Rheicum.
Dodonæo au-
tem gallico, O-
nobrichis quæ-
dam, & vixit
species secunda.
Item in fol. &
de frum. Ono-
brichis Diof.
Plin. & Galeni
Gesnerō de
hott. Glauca, vel

Onobrichis Dodon. Et in append. *Polygallum Rhe-*
ricum. Hist. Lugd. *Polygala multorum*, quibusdam
Onobrychis. Tab. 10. & Hist. *Onobrychis*, & a-
nentopf / wildschaffneract. Clus. *Onobrychis*
Dodonæi, quæ brabantis & ansemmen, id est,
Custa gallinacea cognominatur. Pona in Baldo
nominat *Polygalam Diof.* Dalechampio, *Lobe-*
lium imitatus, Gesnerus tamen fuit primus au-
ctor huius appellationis, quicquid scribit Lo-
belius.

Crista gall.
inuen.

Polygalon Gesneri diligens simplicium inda-
gator Leonhardus Rauwolfius prope Arela-
tam in Provincia mense Maio collegit. Vidimus
nos hanc florentem mense Aprilis, in monte A-
penino. Genitur ab indat in pratis iuxta Arne
& Noldodochum. *Polygalon* in peregrinatione
Rhetica Cuius reperi flore albo, ut et erat Ges-
neri non recordor autē an aliis notis à præcedenti dif-
ferat. Montbelgardi prouenit in horto ex semine
in Briscia collecto. Clus. sicut & Pona in Baldo
gramineis locis, siccioribusque pratis nasci per-
hibent. Sed & plerique superioris Germaniæ
locis exit, inquit Dodonæus. In Bohemiæ agris
secus scrobes, per quas pluvia delabitur aqua,
Onobrychis frequens est, apud Brabantos &
Flandros ab herbarum studiosis in hortis subin-
de feritur. Augusto cum flore & fructu repe-
ritur.

Locus &
tempus.

Curia Rhetorum [sic enim Pontifella inibi
narrabat] plurimi sunt prata, in quibus hæc pro-
uenit, multum enim ex eius elu lactis vaccis &
cæteris animalibus copiam contingere pro indi-
bitato creditur.

Vf.

POLYGALON GESNERI.

POLYGALVM MINVS
faxatile.

Multarum notarum argumentum *Polygalon*
indigitabat Gesnerus herbam, è radice me-
diocriter crassâ, longa, cortice obiectâ nigro,
intus albâ, ramos præferentem multos, palma-
res, vel etiam cubitales, rubentes: è quibus orti
pediculi *sulca* coniugati dispositi sunt: nec, Len-
tis, inferius magis albicantia, & pilosa, superius
viridatâ magis: summis ramis *spica* in fides *florum*
Viciæ, vel Aphaces aut Lentis, sed colonis purpu-
rei è calyce piloso: sequuntur *femina* concepta-
cula subrotunda, modicè compressa, spirulis as-
perata, & per ambitum gibba, cristam serratam
membraneam erigentia.

Tota quanta est, vix palmum superat. Radice
La, candida est, longiuscula, modicè pro-
plantulæ modulo crassa, diuisa in capita, paucis
fibris donata. Ex qua *foliola* statim emergunt co-
stæ hærentia, repanda, capitis gallinacæ, sed ob-
tusiora, latioraque, pilis candidis obsita. *Caliculi*
graciles sunt, consimilibus foliis vestiti, superne
diuisi: quorum extremis *slofcula* insident luteoli,
aut palliduli, hiantes, exigui, pauci, *Astragalorum*
positi, nec in spicam abeuntes, ut in *Polygalo*
gesneri, capitula sequuntur exigua, rotunda, ali-
quot apiculis superne donata.

Descriptio
Radix.

Folia.

Caliculi.

Flosculi.

HISTORIAE PLANTARVM.

Locus &
Tempus.



POLYGALO GESNERI AFFINE
Caput gallinaceum.

Radix.



Caules.

Herb.

Hanc plantā attulit gener Cherlerus, colleam circa arcem Episcopi Montpelienfis in locis incultis, asperis & saxosis, Iunio mense.

radice mox germinant, alia per caules, trium plūminis vnciarum longitudine, foliis coniugatum dispositis constans, duplō minoribus, quam Polygali Gesneri, acuminatis, vtrinque hirsutis, & argenteo splendore subinde micantibus: foliorum per ramos pediculi longiusculi squamulas habent appositas, rubentes.

In sabuleis & campestribus ad semitas prope montem Lupi Montpeliesi meruit gener Cherlerus. Existimo me eandem vidisse anno 1594. apud Fratrem C. Bauhinum.

ONOBRYCHIS IN GENERE.

CAP. XXX.

Onobrychidi Diosc. *folia* Lenti similia tribuit, artamen paulō longiora: *caulem* verō palmi altitudine: *florem* puniceum [rubentem Plin.] *fradice* paruum [exiguam & gracilem Plin.]

Verū non satis constat (inquit Ryff. & Corn.) quæ herba sit. Quidam enim Herbarii Rutz siluestris speciebus annumerant. Corn. quidem Onobrychidem & Onopordon, vnam herbam esse putat altero nomine à crepitu, altero à ruditu alitni ducto. Et fieri potest vt vtrumque accidat asino, ex herbe elu, vt & pedat, & rudiat. Cur autem in hanc abierit sententiam, Plinius ipsum mouit de vtriusque viribus non multum diuersa tradens. Onobrychidis igitur nomen plurimus plantis attributum est, in primis Polygalo Gesneri, Altragalo Montpeliano, Hedyfaro clypeato, & Meliloto 5. Tragi. Est & Clusio planta dicta Onobrychis flore purpureo, subcæruleo alia, tertia pallido, montana quarta, ac denum quinta peregrina. Galegam porō voluit esse quidam Onobrychin. Hanc Cæsalpinus similem Capragini [galega] scribit, flore scilicet rubente, Coralli modo, siliquis nigris, longis. Simili modo & alteram, latioribus foliis, flore purpureo. Visa tandem est aliquibus Onobrychis Polygala Tragi, & Onobrychis 4. lutea Dalech. Vltimo sunt, qui Auiculariam Sylui Onobrychidem vocent.

Nascitur in humidis, Diosc. autore [circa fontes Plin.] & incultis locis.

Ceterū vim habet inquit Diosc. herba trita imposita, tubercula diffundendi, cum vino verō pota, vrinæ stillicidium sanat. Cum oleo illita, sudorem mouet. Sed hæc Plinius. Siccata in farinē modum, & inspersa vino albo, strangurias finit. Aluum silit. Succus eius perunctis cum oleo sudores mouet. Et hæc lib. 24. c. 16. Sed rursus lib. 27. cap. 12. de Onopordi [quod idem Corn. cum Onobrychide facit] viribus non multum diuersa tradit. Onopordon, inquit, si comederint asini, crepitus reddere dicuntur. Trahit vtiuas, & menses. Aluum silit. Suppurationes, & collectiones discutit. Hoc autem postremum etiam de Onobrychi Diosc. in sibi adscriptis dicit. Galeno Onobrychis rarefaciendi, ac discutiendi vim habet, proindeque folia eius, virentis etiamnum, illita ad morem cataplasmatum, phymata digerunt: rarefacta verō, si cum vino bibantur, strangulant. Quin etiam sudores elicit cum oleo inuncta.

didrantes, tenues, subhirsuti, ad medium vsque foliosi, cætera nudi, *spicam* gerunt vnius, duarum, aut trium ferè vnciarum, *floribus* congestam purpureis Polygali Gesneri, quæ tamen hic in latum diffunditur per extrema, non autem in metæ formam fastigiatur: floribus etiam adhuc non omnino delapsis succrescunt *siliqua*, Accacix siliquarum quodammodo formā, vñleo, aut duobus peltatis orbiculis constātes, quodam veluti isthmo loculos determinante, quod si vnicum est conceptaculum, breuem mucronem profert (id quod etiam in extremo, vbi plura sunt, obseruare licet) margine alias æquali, nec cristato, vt in Polygalo Gesneri, vmbone protuberante propter contentum *semen*, Cracæ minori par, nigricans, rotundumque, nisi quippiam, vñculi instar, inæqualitatem faceret: singuli porō orbiculi præter tunicam semen integrentem, extrinsecus reticulatum habent obductum plexum, circa oras hærescentem, alias liberum, spinulis mitibus asperatum, radiis rectis, in margines expositis: *folia* quædam à

ONOBICHIS QVIBVSDAM
purpureo flore.

Alis mul-
tis con-
caua cubita-
lem superat
lōgitudinem,
ramis tereti-
bus, hirsutis,
medullā fun-
gosā fāctis :
folia Lentis,
longiora pau-
lō, hirsuta, den-
tis, aut duo-
denis pinnā-
tim vnicoltā
adnexis con-
iugationibus,
impari vno
numerū clau-
dente : flores
purpureo-vio-
lacei, Trifolii

formā, in spicam sextantalem comosam dispositi,
pediculo insident Spithamam logo, hirsuto.

Hanc sic describit Clusius : Cubitales plan-
tumque habet caules, multos [si vetusta sit plan-
ta] rotundos, duros, humi procumbentes, in qui-
bus frequentia folia, Lenti similia, angusta, hirsu-
ta, seu lanugine quadam obducta, quindena sus-
binde, & totidem alia ex aduerso vni costā ha-
rentia, vno impari extremam alam occupante,
gustū amaro, & ingrato : ex alarum cauis oriun-
tur ramuli similibus foliis septi, ex quibus do-
dantales exeunt pediculi, striati, ferentes mul-
tos flores, Trifolii florum æmulos, oblongiuscu-
los, eleganti purpurā nitentes, inodoros, confert-
os, & velut spicam trium interduum vnciarum
longitudinem æquantem efficientes, nonnun-
quam etiam longiorem, præsertim quando in
semen abeunt, quod bifidis, breuib, turgidius-
culisque valculis continetur, exile, nigrum, du-
rum, sapore ingrato, vt alia legumina : Radix illi
magna, longa, dura, in obliquis nonnullas fibras
sepe spargens, & subinde ad cauliculorum exor-
tus, recentes fibras agens, viuax, & perennis.

Onobrichis prima, flore purpureo Clusio. Ono-
brichis Clusii prima Tabernam. Onobrichis Panno-
nica prima Clusii, seu, vt ego dicerem, [ait Pona in
Bald.] Cicer Astragaloides.

Mense Iulio Argentinæ in horto Frid. Meieri
florentem obseruavi, sicut & in Pfortzheim in
horto Pharmacopæi D. Gtiemingeri. Habui &
siccam à D. Agerio colorem referentem. Fre-
quentem inueniebat Clusius ad Danubii ripas
supra Posonium apud Petronellam oppidum
[quod nonnulli, ex loci situ, ruderibusque anti-
quis Carnuntum Veterum esse coniiciunt, à Plini-
o numeratum inter Pannoniæ vrbes, quod-
que se modò subditum agnoscit generoso Do-
mino & libero Baroni ad Vnuerzagt] ad viarum
margines, & frequentissimè toto illo itinere ad
Badenses thermas tendente, multisque aliis cir-
ca urbem Vienne Austriæ locis, tam citra, quàm
vltra Danubium.

ONOBICHIS QVIBVSDAM SVB-
cæruleo flore.

Mltos ex
eadem
radice prome-
bat altera vi-
mineos cauli-
culos, pedales,
nuquam non
etiam longio-
res, humi fu-
sos, crebris no-
dis distinctos,
& in his alata
folia, hoc est
tredecim,
quindecim,
septem, & de-
cem, aut pluri-
bus & oblon-
gis foliis vni
costā inheren-
tibus constan-
tia, extremo

semper imparem numerum faciente : prodeunt
deinde ex alis tenues pediculi, seu virgulae, floscu-
lor, in spicam confertos, ferentes, Pili, aut Vicia
florum formā, sed longe minores, colore dilutè
cæruleo, vel ex cæruleo purpurascente :
his succedebant exiles filiquæ quasi duplica-
tæ, continentes pusillum semen, renis formā,
nigrum : radix minimi digiti crassitudinem fer-
mè æquabat, dura, lignosa, contorta, obliquè se
spargens, & altè sub terra se cōdens, rarisque fi-
bris donata, quæ summā parte in aliquot capitā
extuberabat, & quibus singulis annis nouos cau-
liculos fundebat.

Onobrichis subcæruleo flore, siue Onobri-
chis secunda Clusio, qualiter & Tabernæ voca-
tur.

Rara est, nam paucas duntaxat plantas inue-
niebat Clusius publicā viā secundum orbitas, in-
ter Schwefer & Gözsforspf infra Viennam
Iunio florentes, & non procul à Znaim Mora-
tiæ oppido, dum Pragā, & inde per Germa-
niā proficisceretur. Etiam in hortum translata
florebat toto Iulio, & subinde semen perfere-
bat.

ONOBICHIS QVIBVSDAM
flore pallido, vel
Polygalon.

Sesquicubitalibus assurgit tertia ramis, rectis, ^{Ramis, Falcis;}
firmis, duris, viridibus, in quibus folia Lentis,
siue Viciæ silvestris, longa, angusta, duodena, aut
quindena, & totidem ex aduerso, eidem costā
herentia, vno etiam, quod extremæ costæ insi-
det, impari, lanugine obsita, gustu ingrato & a-
maro, deinde nonnihil acri : ramuli extremo cau-
le ex alarum sinu prodeuntes, palmares, striati,
in dodrantales spicas, flosculorum Trifolii floreæ
æmulantium, oblongiusculorum, pallidorum de-
sinūt, quibus impressi nigricantes quidam radii :
his succedunt filiquæ, prioris filiquis similes,
mucronatæ, duobus valculis constantes, in qui-
bus semen Fœnogræco penè simile, sed minus &
nigrum : radix crassa, dura, lignosa, longa, aliquot

Securidace recurva siliqua (inquit Cam. in Hist. germ. Matth.) reuocant in memoriam parum herbam à Gesnero depictam, & Polygalam dictam: fortè est Polygala auctoris depicta in suis lat.com. quamuis ex figura eius nihil certi concludi possit. Idem in Epit. Polygalam vocat. Sed audiat Camerarius de his certiora scientem. Figura ex Gesnero posita, facta est ad plantam Monspelianam olim à me ei missam, quæ adhuc penes me est nomine Astragali Monspelienfis: nunquam aminaduerti Gesnerum fecisse Polygalam, antequam autem ille curauit pingendam plantam, de qua hoc in loco agimus, habebat Polygalam foliis nonnihil similem & floribus, sed siliquis longè diuersam. Verùm, quum teste Camer. ex figura Mattholi non possit concludi, quæ eius Polygala fuerit, quis approbabit eum in Epit. pro Matth. Polygala exhibere plantam de qua verba facimus, non parum tamen ab ea differentem.

Polygalon Mattholi, quod Hist. Lugd. placet, siue Astragaloides Lobelii, aut Anthyllis clauiculata, radicem edit nigram, lignosam, fibratam, dimidium pedem longam, superne in multa veluti caulium principia diuisam, crassiuscula, laminulis corticosa, ex quibus folia multa exeunt, humi strata, longa, ex foliolis composita, Lente similibus, vtriusque ordine ex aduerso digestis. Flores in cacumine nudarum virgularum emicant, oblongi, lutei: deinde siliquæ Lentis similes, nigre, ex quarum vertice tenuis villus exoritur, capiteolo, clauiculaque similis. Suspicio Anthyllidem Dalechampii non diuersam à nostro Astragalo, quamuis quædam videantur minis conuenire, nempe color floris, qui fortè visus in planta sicca, cum multi flores exsiccati, lutei videantur. Capiteoli, qui traduntur & depinguntur sunt fortè in Astragalo, vbi flos excidit, & tunc siliquæ minis curuæ: de hisce tamen iudicent Lectores.

An Casalp. Astragalos humi strata, similis Helenio Ægyptio [de quo antè inter Vicias] foliis numerosioribus, tenuioribusque: floribus similiter sanguineis racematim in summis ramulis, siliquis autem corniculis similibus, rubentibus: radice crassa, ac lignosa, superne in multos ramos inuicem diuisa, vnde germina erumpant.

Figura à Compilatore Tab. [titulo, Polygalæ Mattholi 4. creutzblum posita,] multa habet similia cum Astragaloides herbariorum Lobelii, variata tamen est, & fortè confusa, vt dictum, cum Polygala Mattholi, & altera, quæ vulgaris dicitur, siue Tragi.

Ceterum, quam Polygalam censuit Matth. [inquit C. Bauh. apud eundem] eandem Lugd. & Tab. sub ipsius nomine posuere. Verùm Castori Astragalus dicitur, Lob. Astragaloides herbariorum. Secundo, Astragalus Alpinus à Cam. in locum Polygalæ Matth. substituitur. Astragali Monspelienfis nomine à Clusio proponi videtur, & in Hist. Lugd. Astragalus purpureus vocatur. Displicet nobis icon Tab. falsa, à Fratre pro Polygala Mattholi posita, à qua multum differt. Lobelii Astragaloides mihi idem videtur cum Astragalo Alpino proposito à Fratre. Astragalus insuper ei dictus Alpinus, quem secundo loco, suo Matth. appingit, est ex meis plantis siccis, vt antè dictum. Astragalum autem purpureum Hist. Lugd. alium puto.

Crescit secus vias in itinere Narbonam versus, prope Gigat vno à Mospelio militari: quo loco florentem vidi mense Aprili. Visus mihi Bononiæ Tom. II.

quoque in monte: item inter Sascul & montem Gibbi, vnde accersitur Petroleum. Gener Chelidrus attulit flore albo collectam Nemausi.

ASTRAGALVS QVIDAM MONTANVS,
vel Onobrichis alijs



M Vltà folia promittit ab eadem radice, Lenticulæ, aut Tragacathæ foliis proxima, vni similiter coactæ inhaerentia, molliora tamè viridia quidem illa, sed lanugine quadam cadicante pubescentia, lento primum gustu, deinde nonnullam amaritudinem relinquentes, postremò linguam velli caute: nascuntur inter foliorum

alas cauliculis, ferè dodrantes, supini, exiles, quadam lanugine obducti, aliquot stipescenti onusti, Viciæ silv. aut Lenticulæ florum magnitudine, colore ex caruleo purpurascens: quos excipiunt siliquæ pusillæ, geminis cellulis constantes, semine (quod cum adhuc maturum non esset, probè non potui obseruare) plene: multas ex eadem radice, quæ longa, crassiusculaque est, & obliquas fibras agit, propagines, & ramulos dodrantes, humi fufos, in latera emittentes.

Astragalum hunc quorundam montanum, Clusius Onobrichidem quartam numerat, quam si quis non inter Onobrichides, sed inter Astragalos referre malit, Astragalus est ipsi Alpinus. Onobrichis est Tab. Clusii 4.

Crescit in summo Sneberg iugo, atque in Etcheri summis scopulis, quibus duobus locis florentem, & siliquas iam formantem Augusto Clusius eruebat.

ASTRAGALVS MONSPELIANO CANDIDIOR, & Onobrichis quorundam.



A Stragalus hic multa cum Monspellulano habet communia, à quo tamè differt: folia multò candidiora, interdum longiora & maiora: pili longiores: caules non multum maiores: quibus insident flores multi purpurei, si benememini multò plures, quam in Astragalo Mō. Fi

Deser. Cla-
ssis

Folia.

Cauliculi.
Flosculi.

Radix.

Astragalus
purpureus.
Locus.

pellulano, conglomerati, densâ pilorum lanu-
gine hirsuti.

Similis, si non hæc ipsa planta videtur ita de-
scribi à Clusio: Hispani aliam [supple plantam]
proponebant; Astragali facultatibus quidem re-
spondentem: sed formâ radice minimè. Nam tã-
meti folia Ciceris, aut Lentis, pusilla habeat to-
ta canentia: cauliculos breues, duos, & in his
flosculos Pisi formâ, pusillos, congestos, & pur-
pureos, summis pediculis inhaerentes: radix ta-
men magna ex parte singularis, & nihil commu-
ne cum Astragalo habens, omninò repugnat.

H. fl. Lugd. Astragalum purpureum Herba-
riorum quorundam esse tradit, qui in Iurâ mon-
tium laxosis collibus proveniat, radice gran-
di: foliis Ciceris siluestribus, viscosis, gustu adtrin-
gentibus: flore ex albo purpurascente. An Lob.
& Penâ Adn. Astragali per similes pusilla planta
palmaris, quam, dum in collibus quibulda callo-
Prouincia edent, subiegerunt, elegantem iniquâ
speciatu indigna: radicibus namque prorsus lig-
nosis, implexis, corticosis, denso exortu nume-
rosos producentibus cauliculos, fruticantes, du-
ros, sed breues, vix binas, aut ternas vncias ex-
cedentes, & foliola emittentes pusilla Lentis,
Astragali, aut potius Tragacanthæ, quam tota
refert rigidiuscula incana hirsutie: flosculis lu-
teolis, aut albidis, Ornithopodi, gustu præfisco
& æquè duro. Onobrichis quorundam. Sed
Placa Onobrichin etiam esse censebat, discrepet
tamen historia. Lusitani Herua de S. Lorenzo
nuncupabant.

Genevæ collegi in monte Saleue florentem
mense Iuno. Crescit etiam vt Clus. testatus est,
in vinetorum, & agrorum marginibus secus vias
per Lusitaniam & Hispaniam, floret Aprili.

Siccata huius in chbano puluerem vulneribus
& ulceribus vtiliter inspergi asseuerare quosdam
legitur apud eundem Clusium.

ASTRAGALVS SYRIACVS.



Flos.

elegantia, magnitudine & rubore ornatur amœ-
nissimo.

Hanc exhibent Ic. Pl. eodém nomine, quem-
admodum & H. fl. Lugd. quæ & descriptionem
Obt. proponit. Astragalum Syriacum, Syrisch
Cicern Tabern. vocat.

Astragalus
Syriacus.

An Clus. Pannon. Onobrichis peregrina, ra-
ra plâta, quam Londini vidit in Io. Richzi phar-

macopcei regii horto, cui folia mollia, incana lan-
nugine pubescentia, vt Tragacanthæ legitimæ
folia, & eodem modo costæ inhaerentia, quin-
dena & plura, interdum etiam viciena quina, vno
extremam costam occupante: cauliculi tamen
in hac oblongiores sunt: fusco cortice testî, len-
ti, fractu contumaces, humi fusi, & plerumque
nudi, qui extrema parte frequenter ramulos suis
alatis foliis oñstos proferrunt, & in viciâ, vil-
losoque pediculo multos flosculos in caput, &
globum congestos, Tragacanthæ floribus proxi-
mos, candicantes, deinde membranaceas sili-
quas, Erui siliquulis minores, & Dorycnii vul-
ganter nuncupati, siue Hispanici, valvulis pares,
singulata femina Fenogreco similia continen-
tes. Si quis verò hanc etiam non inter Ono-
brichides, sed inter Astragali congeneres plan-
tas, cum quibus magnam similitudinem habere
videtur, referre malit, Astragalus peregrinus
esset.

Al'epo Syriæ suam plantam Lob. primum ha-
buit, postea in vrcis pensilibus D. Brancionis
Melchliniæ Italo femine enatam sit. Clusii flo-
rebat Iulio & Augusti initio, quæ flores & se-
men, semine Londino misso: protulit.

ASTRAGALVS FORTE LANV-
ginosus, Bœticus.

CAP. XXX.



CVbitales,
Caut am-
phiores sunt
hunc Astragalo
cantes, mirum
ferè digiti
crassitudinem
quantantes, pæ-
tagoni, siue
angulosi, duri,
subrubentes,
& lanuginosi:
folia lanugino-
sa, & incana, in
longa costa ex
adverso sem-
per inter se op-
sita, veluti in
Vicia & Cice-
ris foliis, gustu
primum ad-
stringente, de-

inde seruido, flores copiosi, Lupini, aut Fabæ vul-
garis florum æmuli, secundum oblongos ramu-
los, seu virgas ex alarum sinu prodeuntes naf-
cuntur, serie quadam digesti, albi omninò; sed
antè quàm aperiantur, & explicentur, ex luteo
foris nigricantes: fructum ferè dicitur (nam flo-
rentem duntaxat observabam, ait Clus.) in lobis,
qui gustatûs, fauces, os, & linguam inflamma-
tione torqueat: radix pro stirpis magnitudine
amplissima, brachialis nonnunquam crassitudi-
nis, palmaris verò longitudinis, deinde in binos
aut tres ramos diuisa, foris nigra, rugosa, intus
candida, dura & lignosa, ingrati saporis, quæ æ-
refacta, cornu duritie superat. Cæterum Astra-
gali nomine, licet multæ plantæ hodie insignitan-
tur, nulla tamen meo iudicio, ad Dioscoridis de-
scriptionem propius accedere videtur, quàm hæc
quam Lusitani Alfabeca vocant, Bœtici autem

GATAQUILLUS

Garanancillos, hoc est, Cicer exile. Si facultates etiam, quas ex eius temperamento contrarias deprehendere licet, nō refragantur, legittimum Astragalum esse confirmarem, cum cuius historia plurimis notis conuenit. Videtur porro ea esse, quam Amatus, Apocynon facit, & Lusitanis *Astramococ decan*, id est, Lupinos caninos vocari ait.

Primum hanc plantam collibus quibusdam supra Vlyssipponem, quos Tagus fluuius alluit, inter vepres obseruabam, atque mense Decembri cruebam anno 1564. deinde sub exitum Ianuarii insequentis, siluosis locis non procul Hispali, dum Gades proficiscer, florentem inueniebam. Phaseoli nouum genus in epistolis Honorii Belli respondet Bœtico Astragalo. Nobis autem hanc opinionem non placere, indicabimus subsequenti Poræ Phaseoli genere nouo.

Lobel. Obser. & Ic. Pl. Astragalus Lusitanicus Clusii cognominatur, vt & Tabernæ, qui insuper flein Spanische cicern vocat, & Alphabeticam Astragalus fortè Clusii Hist. Lugd.

PHASEOLI NOVM GENVS foliis Lentisci.

C A P. XXXI.

NOua prorsus & elegantissima etiam hæc est planta (inquit Honor. Bellus in epist. ad Clul. ex Cretæ Cydonia) quæ apud me nondum nomen inuenit, sed interim ob similitudinem quandam seminis, quam cum Phaseolis habet, Phaseoli nouum genus vocare mihi liceat. Ad sesquicubitalem assurgit altitudinem, modò simplici caule, modò pluribus stolonibus ab vna radice prodeuntibus, digiti minimi crassitudine: folia illi pinnata, h. e. longo pediculo vtrinque herentia, semper contrariis petiolis, Lentisci æmula, sed mucrone obtuso, vt Securidaca folia: è foliorum cauis, siliquas fert rotundas, pollicaris crassitudine, tumentes, & multo aëre plenas, colore rubras, in quibus continentur sex, aut octo semina ad luteum tendentia, compressa, Phaseoli figura: quos flores proferat, compertum mihi non est: nam eam spontè nascentem in Spagia insula aduersus Matonem Peloponensi sita, frequentissimam inueni anno 1592. dum Venetias petebam, mense Aprilis, quo tempore siliquæ ad maturitatem nondum peruenerant: à nautis grana cruda libentissimè edebantur, græcèque *Lupinis siluestres* vocabant, licet nihil cum Lupinis commune habuerant: huius plantæ semina his diebus ex eadem insula ab amico accepi, quem, vt colligeret, rogaveram: nam insula habitatoribus caret, & non nisi aduersis ventis à trirēibus petitur, & à piratis: eam ob causam semina citius habere non potui.


Sed ad hæc Honorii Belli scripta, Clusius sequentia tradit: Valdè respondet hæc planta (nam ea etiam semine misso mihi nata, anno 1597.) Bœtico Astragalo, quem inter Hispanicas plantas descripsi, ac quantum quidem ex eius facie conicere licet, superiorem Hiemem in horto pertulit, & nouo Vere denudè germinauit, nullum tamen floris specimen adhuc dedit: nescio an proximo anno (si per Hiemem conseruare potero, perenni enim est radice) dabit. Ego quidem haud possum mihi persuadere Phaseolum exoticum Belli eundem cum Clusii Astragalo: descriptiones namque & vites nimium dissident.

Phaseol. peregrinos, vt fortè eiusdem generis, Co-

Tom. II.

ral arbor posset commodè sequi, si non iam collocata esset antè inter arbores siliquosas, quod etiam posset referri Fabæ aliæ & Phaseoli Americani.

ASTRAGALVS DIOSCORIDIS quibusdam.



Astragalo Descriptio.
Dioscoridis apprimè similis plantula (sicquæ Rauuolfii) humilis: radice longâ, purpureâ, ad Raphani crassitudinem, longitudinemque accedente, masculis fibris donatâ, quæ vel ipsâ radice citius nigrescunt atque indurantur: Harum aliæ deorsum vergunt, sursum aliæ, curuitate cor-

nutâ, sapore dulci cum modica siccitate. Coliculos erigit aliquot, vix digitatos, radici concolores, terram versus reflexos, quibus adherent nouem, aut decem foliola Lentis, aut Orobi, Inter quæ flores emergunt violacei: quos sequuntur verriculi tumidi, quorum aliqui Coluteæ ferè æquales.

Astragalus Diosc. Christian Wargel & Astragalus verus Dioscoridis Rauuolfio. Astragalus Diosc. vulgò Christiana radix. Depictæ radici non dedit proportionem, quamuis exigua sit planta, minor tamen longè apparet in icone quàm in vius.

GLAVX HISPANICA.

C A P. XXXII.



Ternis, aut quaternis à radice assurgit cauliculis, dodrantem altis, gracilibus, incanâ lanugine pubescentibus: foliis serie quadam secundum costam longitudinem vtrinque digestis, siue ala foliorum millos vestiente, Onobrichidis, aut Astragali prioris [Onobrichidis quibusdam flore purpureo] in-

modum, mollioribus tamen, superne virenti-

FF 2

Flor.

Radix.

Glaux.

bus, infernè canâ lanugine obfufis, gultu nonnihil amaro: *flor* extremo cauliculorum fiftigio innafcitur confertus, capituli, fpike breuioris & obtufe inftar, Glycyrrhizæ vulgaris florum formâ, & colore perquàm fimilis: *radix* candicans eft, & exilis, quæ, an vitæ fit, afferere nequeo.

Græcis *glauz*, perinde atque Latinis appellatur hæc planta: quæ appellatio, fi quibusdam minùs probabitur, permittant quælo Glaucem Hispanicam à Clufio (cuius & descriptio proponitur) tantisper, nuncupari, donec magis aptum nomen inuenerit. Nullâ adhuc inter eas (ait idem in Hifp.) quæ Glaucis nomine à recentioribus defcribuntur, magis ad amiffim Diofc. descriptioni respondentem inueni. Cæterum Glaucem Diofc. Clufii, Lobelius Obf. ne fibi quidem in fpectione notam fatetur. *Glaux* Clufii Schielfraus, Tabernæ. Antillis altera Lenti fimilis Dod.

Glaux Hifpanica curdica. Locus.

tempus.

Cur autem *Glaux* Hifpanica dicatur, ratio redditur, quia nusquam alibi, quàm ad ripas fluminis Thormis Salmaticæ alluentis, paulò infra eam urbem à Clufio obferuabatur, nomine vulgari carens, mense Iunio: verùm is locus procul à mari diftat iuxta quod Diofcorides *glaucem* nafci tradit.

ONOBRYCHIS CÆSALP. FLORE

rubente, Corallii modo, fimilis Galegæ: Et alia flore purpureo latioribus foliis.

Locus. Flor. Siliqua.

Onobrychis fimilis Capragini, breuior, in montibus riguis nafcitur: flore rubente, Corallii modo: filiquas nigras fert, longas, vt Vicia. Altera latioribus foliis confat, rarioribusque, flore purpureo: filiquis fimilibus. Diofcorides *filiâ* ei tribuit Lentis, longiora paulò: *caulem* dodrantalem: *florem* purpureum: radicem parua: in vliginofis & incultis. Plinius circa fontes eodem modo defcribit.


GALEGA.

CAP. XXXIII.

Radix.

Folia.

Flor.



furculis, ex foliorum alis exortis, Vicia floridæ, iubam longam efficientes, colore albo, vel ex al-

Hinc inde per terram fpargitur: tenues radices albas: caules verd tollit bicubitales & altiores, ftriatos, inanes, ramis compluribus brachiatos: *folia* Viciæ, pinnata, impari alam claudente, longiora, spinulam mollem ex extremitate proferentia, fapore leguminaceo: *flor*es peculiari- bus infident

violaceo: *filiquæ* teretes, tenues, oblongæ, in *filiquis* quibus *semen*.

Corn. non fatis conftare dicit, quænam hæc fit Onobrychis, & Ruta filv. fpeciebus Herbarios quofdam annumerare fcribit.

Dod. gall. Fœnugræcum à quibusdam filueftre dictum, aliis verd Glaucem aut Polygalam vocatam, nullam cum Galega fimilitudinem habere fcribit. Sed hanc Italos Galegam, & Rutam caprariam, nonnullos etiam corruptè Gralegam nominare afferit.

Hier. Fracafiorio *Herba gallica* vocatur. Hertrufcis *Lauannefe*.

Gefnerus aut dici in Italia *Castracæ Lauanna*, *Thorina*, vel *Taurina*, *Martanica*, *Sarracena*, *Capragina*, *Herbanefa*, Fœnugræcum filueftre, & teftè Braffauolo, *Giarga*.

Quidam Onobrychim Veteribus nuncupatum effe iudicant, alii Glaucem, nonnulli Polemonium effe volunt, alii Polygonum, fed non tam Matth. quàm Diofcoridis fingularum defcriptiones repugnât. Gefnero qui cum Lob. Obf. Galegam vocat, (quafi Gallicam) appellatur Ruta Capraria Italorum: nam & *Regalicum*, & *Galenii herba* quibusdam dicitur, vel Galega, aliis Taurina, & Martanica, ab aliis herba Necla, vel Fœnugræcum filv.

Cardanus eius meminit, ficut & Monachi in Mef. qui in Italia [autore Manardo] à quibusdam Gyrcam vocari fcribunt. Braffauola *Giargam*, & fortè eadem fuerit, quam Marc. Empir. Cicharbam vocat, mifcens aliis quibusdam medicamentis ad caput pruriginofum & vicerofum. Mattanica verd an fortè à Marte dicitur? Nunc teftè Agricola Rutam agreftem, vel Caprariam, nonnulli Polemoniam Diofcoridis vocant, cuius fententiæ eft Leoniceus & Manardus. Alii tamen hanc herbam Sarracenicam cenfuerunt appellandam. Sed ridiculum eft, Rutam caprariam, feu Galegam, quam nonnulli Onobrychim credunt, pro Polemonia oftendere. Et cum videant illi boni vin hanc nufquam in montibus, afperisque inueniri, vt de Polemonia docet Diofcorides, fed pinguibus locis atque humectis: iniquant hoc mirum non effe, quandoquidem plantæ variis locis nafci confueverunt, quod & nos admitteremus cum Marantha, fi vel vnam ex aliis notis coherere videremus.

Non facile adducor [ait Matth.] vt credam, quæmadmodum cenfet Braffauolus, eam effe Polemoniam, quam noftrum Hertrunæ vulgus appellat *Lauannefe*: alii verd Galegam, alii Rutam Caprariam nominant, & Ruellius *Herbam Glaucem*, quædam verd *Lauamam*, quod propè rituos aquarum nafcitur, vbi manus lauantes Ruffici, hæc planta faponis vice fibi furdium lutum abftergunt: fed Glaucis faciem nõ repræfentat: Ruellius hallucinatus.

Caprago [autore Cæfalp.] vulgò appellatur, alibi Galega, in Hertruria *Auante*: flores habet cæruleos, vel purpureos: filiquas nigras, Viciæ breuiiores. Ruta Capraria, & Galega Italorum, quorundam *Lauannefe* Hift. Luzd. Fœnugræcum filu. Grifrauth, *Stedenfraut*, Tabern. Galega vulgaris, quam nonnulli Rutam Caprariam, Fracafior. Onobrychin, Clufin Pannon. Galega *Ponæ* & Camer. cui & Ruta capraria.

In vliginofis locis, fcrorum aggeribus, in montibus, & denique paffim prouenit, teftè Matthiolo. Cæfalp. frequenter afferit in arvis fugiferis: *flor*es *Alfate*, perfici Autumno. In Pannonia omnium abundantiffimam vidit inter *Mu-*

Onobrychis
Ruta
Fœnugræcum
Glaux
Polygalum
Ruta
Capraria
Gralegum
Herba
Necla

Polemonium

Regalicum
Galenii herba
Taurina
Martanica
Sarracena
Capragina
Herbanefa

Polemonia

Herba
races
Polemonia


Lauanna

Locus
tempus

gam & Drauum flumina, paullo supra eorum confluentes. Cæterum per me lata in horto E.C. Montbelgardi primo anno caules protulit, & per Hiemem multis duravit annis. Sed non maturum obseruavi Septembri. Spontanæam reperi in Italia inter Patauium, & Vincentiam, & inter hanc, & Villanouam, & circa fossas vrbis Patauinæ, in montibus Euganeis Februario germina prorudentem, inter Veronam & Castelfranco, inter Ferrariam & Bononiam: Geneuæ habebam in horto Ianuario virentem: vidi in hortis, Tiguri D. gesneri, Tubingæ D. Fuchsi, Bernzi in pluribus, Basileæ D. Felici Plateri, & Fratr. C. Bauhini.

Succus herbæ Fœnugraci filii, datus à Bayro, in cochleari, liberabat pueros ab Epilepsia, expellebat vermes, quod postremum etiam ipsa bullita in patella herba cum oleo & semine Lini super umbilicum ligata præstabat. Hanc magni faciunt (pergit Matth.) nonnulli suis experimentis nixi, non modo aduersus pestilentiam, & lethalia medicamenta: verum etiam contra ferarum omnium quæ dentibus, aut aculeo venenum emittunt, tum morsus, tum ictus, in quem usum herbæ eius succum bidendum præbent, ac etiam emplastri modo vulneratis partibus imponunt. Laudant aliqui succum, sequi iudicium pondere, haustum pueris comitali morbo vexatis. Succo & semine Camer. vermes quoque necat. Decoctum in aceto paratum cum Theriaca, & Tormentilla ac Cardobenedicto, teste Ingrassia plurimum valet in peste, & febribus malignis cum petechiis. Quorum omnium quoque testis est Dodonæus qui contra venena assumpta eandem laudat. Celsipino tandem autore, Galegæ succo tumentes ob venenum boues sanant, infuso in os. Quidam aquam distillatam in peste exhibent.

GALEGA MONTANA DALE-champii.



Cvbtalis planta est Galegæ Dalechampia, montana dicta, caule striato, ex quo per ex intervallo orti pediculi, longitudinis mediocris quinas, senâue annexo agmine sustinent foliorum coniugationes, quæ Galegæ vulgò notæ foliis, quàm simillima: flores in pecu-

ri appendice spicam æmulantur, colore prædicti luteo pallescente, figura florum Genistæ quoque: radix subest multiplex, tuberosa, & longissimis fibris donata: siliquis, quas mihi obseruare non licuit, testatur Dalechampiuss esse nigras, seminibus plenas Lenticulæ similibus.

Galega montana Dalechampi. Hist. Lugd. & Pona in Bildo.

Inuenimus nos in monte excelsio & nivofo,


Tom. II.

qui Thuici dicitur, quum essemus Genetæ. Nascitur hæc in asperis (ita legitur in Lugd.) montibus, non in eorum quidem salebris, aut præcipitiis, sed in ipsis cœnitiis, si qua vda planities illis occurrat.

Efficacem [apud Lugd. Hist.] esse aiunt contra venena, lumbricos, morbum caducum & pestem, non minus, quàm Galegam alteram. Sed vereor ne hæc imaginariè sentiantur, & non per experientiam: quam ob causam nulli consulerim temerè eâ vtendum. Dolemus nos, quum viridem haberemus non diligenter à nobis descriptam, ac saporem annotatum, quem debuerat obseruasse, qui vires adscripsit. Animaduertant alii.

Vires & vires.

GALEGA NEMORENSIS verba.



Vetis minus Galega siluatica, pedem altos habet caules, cum incipit florere, foliaque satis angusta, & mollia, postea maiores, angustulos, ex radicibus multiplicibus, fibrosis, nigris, perennibus, numerosos surgentes: in quibus folia ex duabus, tribusue coniugationibus composita, quorû sin-

Tempus Causa.

Folia.

Flores.

Siliqua.

semina.

gularia Parietariæ foliis paria, vnciam, aut fescunciam lata, vncias circiter tres longa, in longum mucronem desinentia, tribus secundum longitudinem decurrentibus costis, bina quoque foliola caulem, foliorumque pediculos amplectuntur veluti pinna: flores in longo pediculo veluti spicati, sex, vel septem, aut octo, quales leguminibus, purpurei primum, postmodum cærulei, quos siliquæ excipiunt, vncias duas longæ, nigre, in quibus semina rotunda, exigua, interdum verò oblongiuscula, amaricantia. Radix quotannis iterum pullulat.

Camer. inter figuras in fine horti, Orobus Siluaticus vernus, sicut & Thelio in Harc. qui præterea vocat, Orobum Cysiosphyllum. Georg. Amilius Theologiæ doctor, contendebat Astragali speciem esse, vocabatque Astragalum siluaticum vernum. Laurænt. Hiei. Aphaces speciem ex aliorum sententia faciebat, Aphacem siluastrem nominans.

Orobus silu.

Astragalus aphaca. Hist. Lugd.

Hist. Lugd. [cuius figura non placet] Phasolus siluæ, & Phasoli tertium genus dicitur, quod Dalech. in siluis comperit.

Galenus aiunt Lob. & Pena Adu. Phaselum à Dolichone discernere, Pliniumque videri cum innuisse, & Maronem per Phaselum. Ea verò, quæ dixerint, de Phasolo potius accipienda, quàm de Phasolo. Idem videri Columellam intelligere. Sibi verò videri Phaselum esse, quod dant

Ff 3

huius operis extremo. Phaselum à Phasiolo dixerunt. Plinio, Maroni, Columella, Dioscoridi.

Clusius Pan. est Orobus Pannonicus, purpureus, primus. Idem in fol. ait: Erui, siue Orobi nomen apud rei herbarie studiosos obtinuit Orobus Pannonicus. Folia ei sena, octona, aut plura, vni costæ adnata: semen interdum, rotundum & exiguum, nonnunquam verò oblongiusculum, varium: radix per intervalla extuberans. Tota planta calidiuscula est.

Pona in Baldo, Orobum i. pann. Clusii vocat.

Schv. in cat. Sil. Orobum silu. vernum. A. rachum latifolium Dod. wald eruen waldw.

Locus.
& tempus


Inueni Genevæ in colle la Bassie sub arboribus florentem mense Aprili & Maio. Item Montbelgardi inter arbusa. Obleruavi & Bononiz, ubi Orobum vocat. Copiosè nascitur, autore Clusio, in montana illa silva Leitenberg supra Manderstorf similiter supra Medeling & omnibus montanis illis silvis quadam serie productis à Danubio ad Alpes: variis item Pannoniz locis. Floret Aprili, atque etiam Maio: semen autem profert Iunio.

Vires & usus

Semen amaricat (inquit Schv.) & calidiusculum est, & absterforiæ facultatis.

GALEGÆ NEMORENSI VERNÆ valde similis, si non eadem.

Radix.



Radix colore fusco, intus pallido, multas nodosas fibras, duras, longas, simplicatas habens, in quorum medio, sinibus, & extremo inveniuntur veluti bulbi conerescentes, quibus radix se propagat: Inveniuntur etiam aliquando [Mau mensis sine inueni inquit Column.] quadam carnosa, crassa, purpurascens, cui succedunt lobi Arachi filiquis ferè pares, in quibus semen continetur: radix est tuberosa, nigra, dura, cui propagines adnascuntur, samentibus radiculis in hærentes, vix siuiles, sed minores. Sed miror Clusium non posuisse huius Astragal descriptionem capite de Orobo pannonico [Galega vernæ purpurea nemorensis] cum quo tanta similitudo: quæ obsecro similitudo Astragalo Columnæ cum Cicere, verè orne Clusius minus benè interpretatus sit, suum Astragalum Alpinum, siue Hist. Hisp. secundum, quem eum esse existimat, quem Fab. Colum. hoc in loco, pro legitimo Dioscoridis Astragalo, exhibet: multum differentem à Chamæbalano, seu Glanibus terrestribus.

In montibus (inquit Column.) vallibus, locis umbrosis, & Sole illustratis ventosis oritur, hæc ubique. Floret Maio, & Iunio mense perficitur. Nascitur, ait Clus. in montibus, quos dixi, vento perflatis, & apertis.


Caulis.

Folia

succosa, dura, læuia, ut *imperfita*, dici possent, nec aliud quicquam representare videntur: quæ tamen se non explicant, sed ita abundant superfluè. *Caulis* tres, quatuorve emittit tenues, quadratos, Ciceri similes, parum è terra se attollentes, inque ipsam inclinatos, ex quibus per intervalla, ut in Cicere, posita sunt *folia*, pedicellis hærentia, primò bina, dein quaternà, bina ex opposito, postea quina, postremò ternà ex opposito intercurrentia, formà ad Rusci folia accedentia, maiora verò, duplo longiora, teneriora & læuia, ad nouellâ Hedera folia accedentia: pedicelli autem, quibus insunt, in imo ubi cauli hærent, singuli aurículas habet, ut in Cicere & similibus leguminosis visitur: aurículas bina illa folio la pedicello, & caulis geniculo hærentia intelli-

GALEGÆ NEMORENSI VERNÆ SIMILIS FLO- re albo.

Pro Orobo Pannonico Clusii albo a. collecto in montibus Tyrolensibus plantam dedit nobis D. Nicolaus Agerius, cuius folia similia Galege vernæ, in quibus discrimen manifestum, quod non trineruia secundum pediculorum principium, nullæ pinnae flores mihi videntur minores: id notandum in ea planta, quæ vnicà fuit, caulem in suprema parte diuisum fuisse, in foliorum



foliorum, & in alium longum pediculum, in cuius suprema parte erant plures flores, iuxta diuarcationem verò siliquæ, prouenire incipientes.

Clusius autem suum Orobolum ita describit: Aliquot ab vna radice prodeunt caules cubitales, striati, recti, folia alternatim proferentes pennata, quaternis foliis fa-

tis amplis, & mucronatis constantia [quibus adnascitur aliquando in extrema ala quintum] viridibus, per quæ aliquot venæ transversim à medio nervo excurrunt, subacidi quidem initio gustus, sed postea amarifculi: flores ex alarum sinu breui petiolo insidentes prodeunt quini, aut feni, antrosum spectantes, Vicæ floribus non dissimiles, albo colore præditi, qui in binis foliolis sursum refflexis pallefcit, odoris expertes: lobis, quales in primo genere [Galega nemorensis verna] ferè, in quibus semen fuscum, maius: radix minimè vitæx est, sed prolato fructu petire solet, vt plerisque Leguminum generibus accidit.

Eruum, siue Orobolum Pannonicum 4. album 2. ad Phasioli filu. aut Vicæ genus commodè referri posse, existimat Clusius.

Arachus (inquit Dod.) latifolius cauliculos fert, qui non attolluntur, sed humum versus inclinantur: foliis luxuriat, quæ ad vnum pediculum ferè quinque, raro tria, lata, & in rotunditate oblonga: congesti flores, colore aut candidi, aut dilute purpurei: in siliquis semen, Vicæ minus. Plerique Eruum Venetum appellant, non tamen Eruum, aut Erui species, sed siluestre legumen, quoddam haud aliud, quàm ad Arachum, per ch, genera, referendum videtur. At eadem Icon Dodonæo cum icone Orobi Pannonici 4. aut albi 2. Clusii. Fortè Dodonæi, sua descriptione comprehendit etiam Clusii Orobum Venetum, flore purpureo.

Rarum hanc plantam in Austria primum inueniebat Clusius, nec nisi in Alpibus illius Provincie nascentem, vnde delata, & in hortum translata, altero anno flores ipsi protulit Aprilis, & Maio, deinde semen. Anno 1579. obseruabat Maio florentem maximà copiam, in eà Pannoniæ parte, quæ inter Drauum & Saurum est flumina in Danubium illabentia, quæque ob eam causam Interamnis Pannonia nuncupatur, in monte quodam siluoso Greben arcu vicino. In collibus (vt Dod. perhibet) herbosis apud Bohemos subinde reperitur: in hortis Belgii facillè proficit. Floret Vere, Æstare siliquæ cum semine perficiuntur.

Tom. II.

GALEGÆ N. MORENSI VERNÆ SIMILIS multiflora, flore purpureo, & albo.



Insignis Botanici & Med. Argent. D. Agernus obtulit nobis nomine Orobi latifolii, coloris albicantis plantam, collectam in horto Bononiensi, cui magna similitudo cum Galegæ vernæ: siliqua constant duabus, vel tribus conjugationibus, quæ paulò breviora videntur, nectrinertia, ad principium pediculi alarum, vt in illa: florum Flores;

pediculi longi, in eorum summitate flores plurimi (multo enim plures quàm in illa) minores, in vtramque partem conuersi, non in vnam tantum, vt in prædicta.

Hanc ni fallor, Clusius his delineat: Multos ex eadem radice fundit ramos, pedales angulosos, & ad singulas foliorum alas, modò in hanc, nunc in alteram partem inflexos, humique vter plurimum diffusos, folia in singulis alis quaternis, aut sena, vni colæ inhaerentia, bina semper ex aduerso sita, nullo extremo imparem numerum faciente, Orobi Pannonici primi [Galegæ nemorensis vernæ] foliis parè similia, sed dilutè virentia: flores oblongis virgulis ex alarum cauis prodeuntibus innascuntur, numerosi, in comam flexi, pusilli, quatuor foliolis, vt reliquorum leguminum flores constantes, hoc est, superiore latiore, sursumque reflexo & expanso, binis minoribus ad latera, quarto inferiore cauo, & quodammodo carnato, coloris purpurei: oblongi, lobis, mucronati, Vicæ loborum parè æmuli, rotundiores, & magis teretes, maturitate rufescentes, semen continent orobaceum oblongiusculum, albicantis coloris: radix dura, lignosa, multis fibris in diuersa tendentibus donata, vitæx est, & singulis annis frequentiores caules proferit.

Orobolum Venetum primus purpureo flore, & alter siue secundus, qui foliorum duntaxat & ramorum, colore differt, qui ex viridi pallefcit, & floribus, qui prorsus sunt albi, Clusii. Orobum Venetum primus, & alter Clusii: seu purpureus, & albo flore, Ponæ in Bald.


Cum in Belgica, tum Viennæ nata à semine Venetiis missa nomine Orobi. Florent Maio.

SECVRIDACA FLORE LVTEO, SILLIQUA lata oblonga.

CAP. XXXIV.

EX radice statim multos emittit caules, subito longiores, ramosos, procumbentes, folia laxa, lentis maioris, sensim latefcientia, sex, octo, & conjugationibus, ad coctam anna-

Ff 4



Semen.

Hedysarum
Pelecinum.
Desc. Diosc.Pelecinum.
Plinius.
Desc. Plinius.Securina.
Seladig.
Plin. notan-
tur.

Legum.

Antiqui
num Hedysari
genus.
Neotericis
quibusdam
duo.
Hedysarum
maius.
Plinius err.
ad arch. not.

& hinc aggeribus veluti fossim interceptantes, geminum conceptaculum, ruforum, quadrangulorum membranis distinctorum.

Semen [ait Cæsalp.] est apud nos peregrinum, omnium amarissimum, vti vel minimum eius degustetur, ingens amaritudo sentiat, depressum est, quadrangulū figurā, ancipitem securim præ se ferens, colore rubro: exeat & pallidum: flores fert luteos, in longo pediculo plures, in orbem dispositos: siliquas digitales, depressas & aduncas.

Dioscorides Hedysarum & Pelecinum vocat, fruticem minutis foliis, Ciceri similibus: siliquis verò cornicula referentibus, in quibus semen silium, quod ancipitem securim amuletur [vnde & nomen acceperit,] gustu amatum.

Idem ferè Plinius habet. Pelecinum in segetibus diximus nasci, fruticosam cauliculis, foliis Ciceris. Semen in siliquis fert corniculorum modo aduncis, ternis, quaternisve, quale Gith nominamus, amarum, stomacho vtile. Est herba [tradit alibi] quæ Lentem enecat, & hoc quidem complexu suo: vocaturque Securidaca, quam Græci à similitudine Pelecinon nominant.

Apud Theophrastum Gaza Securinam vocat, & in Aphacis nasci scribit: quo in loco Scaliger in Phacis legendum præcipit. Sed perperam & Plinius loco proxime citato, & Scaliger apud Theophrastum quædam (Lentem) pro aphacis (Vicia genere)legerunt. Is enim ipse, vt & Dioscor. in segetibus nasci scribunt. Theophr. etiam Securidacam in Aphaca gigni, & Aphacam à Securidaca strangulati prodidit. Adde Theophrastum etiam hac in re Plinio refragari, qui Atacum rem duram & scabram in Lente nasci tradidit, non Securidacam. Nec contrariatur, quod Galenus Lentem in Securidacam degenerare testatus fuerit. Aliud enim est, degenerare in aliud, & inter ea nasci.

Dioscorides igitur, Plinius & Galenus vnus tantum Hedysari, Pelecinii, siue Securidacæ meminere. Matthiolus autem cum Neotericis aliis quibus duorum fecere mentionem, maioris scilicet & minoris. De maiore ita Matthiolus: Hedysarum Diosc. Galeno & Theoph. Plinius deceptus Securidacæ Lentem complexu strangulati scripsit; & quædam pro aphacis legit & verit. Hæc Matthiolus, qui non descripsit suam figuram falsam. Olim in icone malè posita erant siliquæ, singulares ex breui pediculo, quas in post. com. recti-

net, quibus insuper adaptauit flores dilutè purpureos, non tamen annotauit, vbi terrarum eiusmodi colorem obseruauerit. Ego quidem semper luteos offendebam, & decerpebam. Et quamuis Dod. olim Matthioli Securidacam dicebat non multum ad Dioscoridis descriptionem accedere: postea tamen in re herbaria doctior factus suam mutauit sententiam, Hedysarumque primum appellauit.

Criterim Pelecinum, Securidacam, & Hedysarum Gesneri hort. dixeris, qualiter & Cæsalpinus appellat. Plinius, inquit is, eā Lentem strangulati, Galenus verò Lentem in Securidacam degenerare, testantur. Verum me iudice, non est possibile tam diuersam plantam, quam Cæsalp. describit, quæ eadem cum nostra Securidaca, posse in Lentem degenerare: scribit enim Theophr. de caus. pl. Mutationes euenire putandum, vt aliquid similitudinis faciant, non vt omnino speciem expriment alienam: igitur aut non est Securidaca Galeni, aut Galenus errauit.

Hanc tribus in locis triplicibus insigniuit nominibus Hist. Lugd. liberalissimè quidem absque duce. Ex primū quidem, inquit appellari Latinis Securidacam, vel vt Turnerus, legendum censet Securidacam. Hedysarum maius, siue Securidacam Matth. Item Hedysarum Dodon. Et rursus, Hedysarum Dod. Hic vides auream esse libertatem. Aurea est: sed non quæ propter Rempublicam herbariam, aut potius marliuplendi gratiā suscepta fuerit: tres siquidem vnus plantæ figuræ Historia proponit, quarum prior ex Matthioli falsa quod annotare debebat seuerus ille Cenfor H. st. Lugd. C. Bauh.

Hedysarum, siue Securidaca maior, auctoribus Lob. & Pena Adu. Ancipitis Securiculæ amulo semini secur accepta [mat. h. g.], siue Securidaca, vox, quam etiam ἡδυσάριον, ob suauolentiam vocant. In Obf. & Ic. Pl. eodem nomina leguntur. Figuram porro in Obf. & icon. quod concernit pulchrè repræsentat Securidacam, de qua hîc agimus, non item descriptio, in qua inter alia flores describuntur purpurei, quales nunquam videre conigit.

Nellius insuper semen aptius Veterum securim, Clusii iudicio, refert, quàm eius, quæ ab omnibus Hedysarum (ἡδυσάριον, ἡδυσάριον) legitimum censetur, & Securidaca vera.

Hæc à C. m. Securidaca maior nominatur, & ἡδυσάριον, à Græcis, fortè per antiphrasim, cum semen sit amarissimum. A C. Bauh. apud Matth. Securidaca siliquā oblongā. ἡδυσάριον ἡδυσάριον. Hedysarum Matthioli, Ital. Hedysar. & securidaca, Cam. Lob. & Penz Securidaca maior. German. gros pfeilschen.

In Germania (id annotante Dodon.) inculta provenit, floret in hortis Maio & Iunio mensibus. Sed in Hispania aliquot locis inter segetes spontè nascentem Clusius obseruauit, vulgatissimam porro hanc esse scribit per vniuersam Pannoniam, Austriam, Stiriam, Moraviam atque Bohemiam, cum in pratis, tum in agris, & secundum vias. Florere Iunio, interdum tota etiam Æstate: semen maturum esse Iulio, & Augusto. Variare etiam interdum floris colore, qui vel totus candidus sit, vel exalbescat, vel intensus purpureascat. Notant itcm Adu. eam in aruis & segetibus, quas rapidi torrentes ex Alpibus Taurinis præcipiti alluione, plerumque vastant, & ad Ceuacum via, satis multam oriri, leguminisque modo serpere & fertilitate restibili, se se reparare. Securidacam flore luteo, siliquā latā ha-

et habebam in horto. Vidi Basilicæ in horto D. Fæli. Plateri florentem adhuc & filiquas ferentem Septembri, Montbelgardi verò etiam Augusto.

Stomacho in potu vtile Hedyfarum [autore Diosc.] Additur & in Antidot. Cum melle verò subditum ante coitum spem partus adimere creditur. Hedyfari quoque meminit Gale nus simpl. med. 6. sic inquit: Hedyfarum, aut Pelecinus. Huius fructus semen colore rufum est, vtrinque anceps, tum guttatum est stomacho, & viscerum obstructions expurgat. Idem præstant totius fructus ramuli.

SECURIDACA ALTERA, sive minor.



Lignosa, simpliciter radice, & candida nititur, ex qua emergunt caules, striati, cubitales, aliquando vix duas uncias longi, folia pinnata Securidacæ maioris, minoræ, per extremam otam latescencia, sæpè & filia, flores singulares, pediculi fastigio ordine ascendentes insident ex luteo pallidi, quibus succedentes

filiquæ, ut minores quàm Securidacæ prioris, ita multò magis incurvæ, parum abest quin vtrinque finis coitu circum efficiat, torosiores, quàm Securidacæ iam dictæ, & propemodum rotundæ: in quibus geminus granorum crassorum, quadrangulorum, versorum, intergerinâ membranâ dissepitus.

Securidaca minor, Astragalus Monspel. Præceptores nostri [ajunt Lob. & Pena Adv.] Securidacæ speciem inficiabatur. Senensi licuit pictoris operâ nobis illudere. Addunt iidem in Obs. Hedyfarum alterum Dod. Huius altera differentia in vireto Morgani, Hiemis, cœli, & Soli nostri patientissima. Item Ic. Pl. Tom. 2. p. 27. Iconem habet Hedyfari alterius Dodonzi. Verùm, quod monuimus, Securidaca minor Matth. aut Dod. diuersa est ab Astragalo Monspelien-sium.

Apud Dod. gall. titulo, *Securidaca Latini*, quibusdam Pelecinon, Græcis ἡδύφαρον, effigies mala: in Hist. autem lat. titulo Hedyfari alteri, bona.

Ait Gesn. Pelecinus falsus Goldenbergio, pingitur à Dod. Tom. 2. sponteque apud nos nascitur. Ast vellemus eum annotasse vbinam terrarum in Germania obseruauit, si intelligit eundem nobiscum Pelecinum. Nos nunquam obseruauimus:

Hedyfarum, siue Securidacam minorem appellat Matth. & Cam. hort. & Epit. Matth. Astragalum Monspelianum, Clusius. Verùm diximus cap. de Astragalo Monsp. non bene pro eo à Clusio poni Securidacæ minoris iconem.

C. Bauh. apud Matth. Securidaca filiqua falcata.

Hist. Lugd. quæ duas icones vnius plantæ proponit, Hedyfarum minus Matthioli, & Hedyfarum alterum Dod. inseribit.

In hortis meis Genevæ & Montbelgardi mense Maio florebat, & filiquas proferebat, Hiememque perferebat.

SOLEA EQVINA.

CAP. XXXV.

Soleæ equinæ dictæ herbulæ radice alba, paucis donata fibris lignescit, Matth. gracilis, quatuor digitorum longitudine: à qua statim plures proferuntur caules, palmares, aut dodrantales, angulosi, striati Matth. vnde folia exeunt Securidacæ minoris pinnam digesta, & per extremam oram latescencia, leuiterque in corculiorem fissâ: hinc, ex sinu videlicet foliorum flosculi exeunt lutei, singulares, quos filiquæ etiam excipiunt singulares, nullo pediculo, tres



circiter uncias longæ, culmum latæ, nonnihil incurvæ, compressæ, artificis naturæ rarum spectaculum, dorsum his cœtinuum, opposita pars ambriatis sinibus laciniosa, vel, ut Matthioli ait, filiquæ oblongæ, pressæ alterâ parte, incurvæ, incisuris distinctæ, & foraminum rotundorum speciem referentibus: proveniente

trinque foraminum orificio. Semen lunatum, bicornè pro contenti seminis figura, numeroque, totidem equinæ soleæ simulacra representat.

Sferra cauallo, Lunaria Alchymistis, si denominanda mihi esset (inquit Matth.) pro arbitrio, vocarem Securidacam minorem. Italis Sferra cauallo sic appellatur, quod equis calceos teretes calcata extrahat. Chymistis Lunaria minor quibusdam Securidaca etiam nuncupatur. Hanc ego plantam Securidacam montanam appello, cum non parum videatur habere cum minori Securidacæ cognationem, tum facie, tum viribus: Hæftenus Matth. Ego autem malim dicere, vocari Sferra cauallo, à figura Soleæ, siue ferri equini quàm à vano, ut quidem existimo, rumore, qui tribuitur etiam alteri plantæ, ipso Matth. teste.

Cæterò, Ferrum equinum, Ferro de cauallo, Itali vulgò nominant, ut notat Gesn. hort. & Dod. de frum. cui tota insuper amara est, & Hedyfaro naturâ assimilis.

Lob. & Pena Adv. Ferro cauallo. Ferrum equinum. Soleam equorum refrigentem fabulati sunt. Quidam nomen Lunariæ affinxerunt. Hæc illi, qui describunt.

Cam. in Epit. Matth. posuit iconem Sferra Ca-

Hist. Lugd. repræb.

Locus & tempus

flosculi, filiquæ

vs Semina

Lunaria.

Alchymistarum.

Sferra cauallo.

Lunaria minor.

Matth. remittit.

Ferrum equinum.

Solea equina.

- ualli, quæ partim conuenit, quod siliquas attinet, cum Ferro equino: partim autem videtur esse alterius plantæ, quam consueui nominare, Solex, vel Ferro equino similem, de qua mox.
- Medica** Hedyllarum, siue Ferrum equinum Tab. Medicæ species Cast. Dur. Sed ad Securidacem [ait Cæsalp.] reduci posset & ea, quam vulgò vocant *Sferra cauallò*, alii Lunariam, oritur in montibus, in totum minor Securidacæ.
- C. Bauh.** C. Bauh. apud Matth. iconem *Sferra cauallò* ponit, quæ non respondet nec descriptioni, nec iconi Matthioli: scribit enim Matth. folia cordis faciem referre: quæ non referunt folia iconis iam dictæ: idem accidit Camerario. In nostra iconone radix pro portione plantæ transiit picta, & flosculi omitti.
- Icon** Soleam equinam vidi Patavii in orto D. Cortusi: spontaneam reperi inter Nemausum & Valentiam redeundo Montpelio florentem & siliquas habentem mense Maio. Prouenit Montbelgardi in orto E. C. semine per hortulanum Magni Ducis Hetruriz Florentiæ mihi misso.
- Locus.** Nullum, quod Matth. sciat, habet in Medicina vsum, quamuis non desint herbarii, qui eam in potionibus vulnerum addunt. Chymistæ hac tantum ex argento viuo argentum purum fieri fabulantur.
- Tempus**
- Chymistarum error**

ORNITHOPODIO AFFINIS, VEL POTIUS SOLEX, VEL FERRO EQUINO, HERBÆ.

- Radix** Longissima radice, nigricante, lignosâ, subdulci, licet sit ubi & pluribus nitatur radicibus: viticulas producens multas, palmo longiores, interdum dodrantes, & cubitales; rimosas, tenues, subrubentes, in quibus folia Lentis pinnata, paulò quàm Ornithopodii maiora, non continuâ vsque serie, costæ ad caulem vsque adhaerentia, vt in Ornithopodio Dodonæi iam dicto, cum costæ, quæ caulis adnascitur, sit aliquotusq; foliis vidua, vt in Ferro equino,
- Folia** subamara: flores octo aut nouem in ramulorum extremis, corona instar radiatim penduli, colore & effigie Meliloti, quam nobilem vocant, quibus succedunt siliquæ, crebris internodiis interceptæ, aduncæ, in acutum desinentes, siliquis Ferri equini similes (in quo ab Ornithopodio dicto diffinitur, cuius siliquæ Scorpii caudam æmulantur, teretes) minores tamen, minùsque incuruæ, nec ita latæ, in quibus semina incurua, oblonga, rubra.
- Florae**
- Siliquæ**
- Semina**
- Hedyllarum** Hedyllarum minus Geel Steinwicken Tabern.
- An Ornithopodium?** An Gesnerus hanc intellexit de hort. pro Ornithopodio Dodonæi, ait enim Ferro equino



cognatam videri herbam, Dodonæi Ornithopodium.

An eadem de coll. stirp. Meliloti filu. species humilis, binis è regione foliolis, cuius lutei flores, suauem quandam & ferè lactis odorem referunt: in prato infra turrim in hard/flor. Maio, & Iunio. Siliquas curuas, & vnguium specie profert Iunio adulto, vel in fine Iunii.

Confundit meo iudicio Cam. apud Matth. in Epit. præsentem hanc nostram plantam cum *Sferra cauallò*: duas siquidem hoc titulo plantas depingit, Soleam scilicet equinam, & huic affinem.

Montepeli prouenit prope patibulum, florens Aprilis & Maio. Basileæ vidi cum flore Iunio. Genevæ passim viret Februarii principio, florétque Maio. Montbelgardi frequens est. Genet Cherlerus collegit circa Wasserfall.

LUNARIA RADIATA ROBINI.

Mist ad nos Lutetiæ Regis Gallorum insignis Botanicus Robinus, amicus noster, Lunariæ radiatæ siliquas plufculas, formâ & exoticâ elegantia pulcherrimas. Vnicam longitudine vix superant, colore sunt ex ruflo subcinereo, vtrinque dentatæ, nervo per medium corrente distinctæ: in quibus gemino versu semina continentur exigua, compressa, Lentis colore, ac rotunditate, verum multis numeris minora, leuiterque sinuata, sapore, quantum ex sicco deprehendere licuit, minime notabili, aliquo tamen modo ad leguminosum accedente.



Semen commisimus terræ Montbelgardi in orto Ill. E. C. Wirt. quem colimus. Mense verò Aprilis prouenit & floruit Iulio, siliquasque produxit. Radix longa cum aliquot fibris, cauliculis multæ, sibi inuicem apposita, nonnihil cordata ultra 29. supputauimus: desinunt in vnicum foliolum sine capreolo, vt Securidaca dicta, cui valde similis: inter superiora folia exoritur pediculus longus, in cuius extremitate flosculi hiantes, quales ferè in dicta, vel in Vicia, quæ Cracca minor dicitur, rubelli, plures simul: sequuntur siliquæ, quales descriptæ, recuruæ, septem supra vnum pediculum supputauimus: folia sapore sunt subdulci.

Securidaca peregrina, quam Clusio misit Iac. Antonius Cortusus, significans missam à Cl. V. per Gregor. Honorio Bello, qui eam nascentem obseruabat in sco.

Siliquæ

Color

Semina

Radix

Caulis

Folia

Flosculi

in scopulis apud Sebenicum Illyriae urbem. Ipse Cortulus ascripserat *Scolopendra leguminosa*, vel *Hedysarum peregrinum*, quod postremum nomen aptius illi convenire videtur. Hæc Clusius, qui nondum in lucem ediderat suam iconem cum nostram parandam curassemus.

MELILOTI MAIORIS QUARTA species Trago.

CAP. XXXVI.

Quarta Melilotus Tragi licet foliis, tenuis-
simisque virgis & adnatis, nec non
longâ radice, floréque luteo & multiplici tertîa
[Medicæ silu. flore luteo] respondeat: tamen flu-
res huius maiores, & magis crocei apparent, quo
nomine à superiori [tertia] differre videtur. Est &
aliud discerniculum, & certius quidem, quo in-
vicem quarta hæc à tertîa Meliloti species discer-
ni queat, nimirum forma silicarum, quas hæc
Melilotus gignit, ex vno flore plerumque ternas
duntaxat aut quaternas, digitum longas, vngui-
bus avicularum similes, terete seminio Orobo
haud dissimili refertas. Germ. *Vogelwicken* dicta,
fortè Serapionis Melilotus, nam descriptio satis
quadrat.

Quemadmodum autem & Dodonæus, qui
Trifolium corniculatum vocat, & Frater, cui &
Trifolium 74. dicitur, nullam huic plantæ lucem
afferunt: ita nec ego, qui adhuc diuinare non
possum, an sit mihi nota. Si Tragus locum, ubi
proveniat, annotasset, ibi posset perquiri.

MELILOTVS QVINTA Tragi.

Vitaci radice repiat multis adnatis variè se
propagans: fibris aliquot donata, crassitie
radicum Convolvuli maioris, lignosâ candida-
que matrice facta, sapore amaricante: hinc emer-
gunt longissimi caules, crassitudine cum radice
pari, striati, intus concavi, ramosi: folia pinnata,
Securidacæ, pinguicula, atro-virentia, octo aut
duodecim foliorum coniugationibus constan-
tia, impari vno extremam alam claudente: ex foli-
orum alis pediculi producantur palmares, &
breiores, angulosi, quibus pendulæ impositæ
sunt coronæ florum Securidacæ, quorum folium
supremum purpurascens sursum expleatur, late-
ralia bina in album languescunt, carina penitus
albet, sub rostro atro-purpureo stamina occul-
tans argentea: flos interdum totus albet, solo
carinæ rostro purpurascens: siliqua succrescunt
vincias duas, aut tres longæ, angulosæ, tenues,
crebris notis articulatæ, semine longo, mediocri-
ter amaro.

Tragus Hist. Ger. die fünfte stein wicken/pul-
chra Lotus campestris. Idem in lat. Meliloti ma-
ioris quinta species.

Fr. C. Bauh. attulit Patauio nomine Aphacæ
maioris Cortuli. An Casalp. Alterum genus.
Securidacæ, quod in silvis grandioribus oritur:
ramis tenuioribus, siliquis instar Meliloti vulga-
ris, & semina intus habet oblonga, subalbidâ:
flosculos simili modo, in orbem dispositos, al-
bos aut subrubentes.

An Hist. Lugd. In pratis & terrarum ægeribus
gignitur Loto Enneaphyllo non dissimilis: foliis
eodem ordine collocatis, sed non perpetuo no-

uenis: flore simili, sed purpureo: semine iisdem
corniculis incluso.

Hedysarum Scorpiuron, aliis Onobrichis,
Cam. hort. *Vogelwicken*/ Melilotus tertîa, &
Serapionis Trago. Lonic. qui fallitur, non enim
Trago tertîa est, sed quinta: Ornithopodium
quoddam maus. Dod. Hedysarum purpureum,
Pärpurbraun Pelschen/Tab.

Montbelgardi pluribus in locis, à me etiam
plantata in horto flore Junio, & Iulio, suo rep-
tatu molesta. Basileæ etiam & Stutgardia copiosè
obseruani. Obseruauit & Clus. maximè viuacem
vulgatissimam, per vniuersam Pannoniam, Au-
striam, Siciam, Morauiam, atque Bohemiam,
eum in pratis, tum in agris, & secundum vias,
Florentem Junio, & interdum totâ etiam Æsta-
te: semen maturum Iulio, & Augusto. Pennæus
suam crescere aiebat agro Geneuensi non pro-
cul à Pontetremalos inter dumeta.

Locus & tempus.

POLYGALO GESNERI SIMILIS planta.

Palmam alta, alatis donata fibris Polygali Ges-
neriani, multò tamen minoribus, hirsutis, ad
Altragali Montpeliani filia accedentibus, siue
magnitudinem, siue etiam figuram respicias, nisi
obtusiora essent, paulloque longiora: flores ex-
tremo fastigio caulium hærent, multi pro plan-
tulæ modo, rostellis adhuc rubro apparente ca-
duci enim erant, positi sed florum, quintæ spe-
ciei Meliloti maioris Tragi.

Descriptio
Folia.

Flores.

Hanc in recognitione mea Rhætica cum D. Locus,
Gesnero in Rhetorum monte Albula reperi, flo-
rentem Junio. tempus

SCORPIOIDES LEGUMINOSA.



Radicem habet. Radix.
Scorpioides
leguminosa
lógam, tenuis,
simplicem, in
capita aliquot
subinde diui-
sam: ex quibus
non tantum
prodeunt coli-
culi palmares,
& selquipal-
mares, hirsuti,
verum etiam
folia, quæ Or-
nithopodii fo-
liis æqualia, ex-
igua, hirsuta,
acuminata, &
nonnihil in-
cana, pinnata

Coliculi.

Flores:

tim digesta in coniugationes decem, aut plures
ad costam adnæscuntur: quanquam & ex ipis
caulibus consimilia quoque folia oriuntur: flores
extremis ramulorum hærent coarctati, Orni-
thopodii floribus haud abssimiles: quibus super
veniunt intortæ siliquæ sensim attenuatæ, modicè
compressæ, strætæ.

Lob. & Pena Adu. & Ic. Pl. Tom. 2. Scorpioides
leguminosa.

SCORPIOIDES LEGUMINOSA

altera.

Viriculi.

Folia.

Flosculi.

Siliqua.

Locus.

Notabili hæc tum à Scorpioide leguminosa Herbariorum, tum ab Ornithopodio differētia discrepat. Viriculus hæc quidem, vt istæ emitte, læues, cauos, dodrantes, aut maiores, in ramulos diuifos : Sed foliola ordine vtrinque ad costam aggesta, pauciora, angustiora, rariusque disposita, & quoad figuram ferè equini foliolis simillima, quippe quæ cordata, ferè notabili neruo donata sunt. Pedicellorum extremis flosculi hærent singulis gemelli, flauis, cum Ornithopodii flosculis tam figurâ, quàm magnitudine apprimè conuenientes. Quibus gemella succedunt cornicula multiplici discrimine quoque à dictæ Scorpioidis siliquis variata. Tercia quippe sunt, ac recurua, minimè tamen compressa, sicut illa, ac proinde multò angustiora, gracilioraque, glabra : nullis interim nec striis, nec lanugine donata, oblectis tamen quibusdam articulis distincta : quæ semen continent exiguum.

Hanc primò nobis exhibuit D. Agerius diligentissimus Botanicus, in agro Neapolitano locatam prope Fundi iuxta vias inter Scillas, ex qua & descriptionem, & figuram damus.

STELLA LEGUMINOSA.

CAP. XXXVI.

Arturo Cor-
tusi.

Folia.

Flosculi.
Semen.

noso.

Dodonæus.

Num eadem sit cum Stella illa decantatissima herba, Hibernis celebrata, humi depacta, fides esto [inquit Lob. Obs.] penes illos qui viderunt, & referunt. Caterùm Stellam leguminosam, siue Arturo Cortusi depictam quoque exhibent Ic. Pl.

Stellam leguminosam Lobelii vocat Hist. Lugd.

Chariss. Frater C. Bauh. ostendit mihi anno 1607. plantulam plurimùm accedentem Stellæ leguminosæ, si non eandem, folia Lentis candidia accedunt Astragalo candidiori. Multùm etiam similis plantulæ Monspelienfi, cui titulum fecimus, Fœnugræco sily. Tragi in quibusdam accedens plantula.

ORNITHOPODIUM FLORE

flauescēte.



simul iuncti pediculis perquam benibus : siliqua perinde copiosæ, pedem auiculæ digitarum exprimentes, teretes, quarum singulæ Scorpii caudam referunt, nodis quinque, aut septem distinctæ : semina Dod. scna, septenauæ, minuta, rotunda, Napi, aut Rapi similia continentes.

In figura ex Fuchianis hic apposita maximè displicent siliquæ. Et quamuis similitudinem aliquam habeat in foliis, melius tamen placet Dalechampi figura, posita pro Ornithopodio tui-berolo.

Vocari potest, inquit Dodonæus, Ornithopodium, Brabantis Vogeloeit / Gallis Pied d'oiseau, Lat. Auis pes, licet nullum nomen, quo appellari posset, habeat, nisi sit Polygala [maior] Dioscoridis, vt nonnulli existimant. Ex Arachidum quoque est numero. Verùm Gesnero Ferro equino Italorum cognata videtur. Sed vereor, ne Gesn. describar, & intelligat aliam plantam, quàm Dodonæus : quia Ornithopodii Dodonæi siliquæ & foliorum dispositio non ita respondet Ferro equino, vt plantæ quam descripsimus : siliquæ enim huius, caudam Scorpionis imitantur, quatuor, aut quinque sunt articuli, non incurui, qui non exprimuntur in mala nostra figura.

Ornithopodii autem, siue Pedis auis elegans varietas oritur, vt annotant Lob. & Pena Adu. marginosis herbis Grinviçii Regiz, ad Tameisim flumen, non procul Londino : vix tota binos, aut ternos superat pollices : ramulis in terram sparsis, exilioribus, & crebrioribus, venustis ordine positis, quàm superior, [Polygalon Gesneri] quæ non aliis ab ista natalibus gaudet. Idem in Obs. Ornithopodium vocant Polygalam Diosc. Dodonæo ; qua in re Dod. detrahunt, cum id non affirmet, sed dubiè ex aliorum estimatione proponat. Ic. tandem Pl. dicitur Tom. 2. Ornithopodium perpusillum. Hist. verò Lugd. Ornithopodium Dodonæi. Item : Pusillum Ornithopodium Penz.

Data nobis est hæc planta, à D. Petro Turnero inter stirpes Anclicanas. Nascitur [inquit Dod.] in aruis, segete potissimùm demersâ : reperitur & locis incultis, veluti in collibus, pratiquæ siccis & apertis, ac secus vias, aruis verò nata minithopodium penz potest anterior.

ORNI.

ORNITHOPODIUM TUBEROSVM
Dalechampii.

Radice donatur multiplici huc illuc fusâ, tenuibus fibris capillatâ, crebris tuberculis nodosâ, duris, rotundis: *cauliculis* multis, humifere sparsis, aut paululum exstantibus: *foliis* Vicie, minoribus, in singulis ramulis ex aduerso dispositis numero imparibus: *floribus* in summis ramulis ex albo rubescente: *siliquis* exilibus, curuis, ferè ternis, velut articulis quibusdam distinctis: minuto semine.

Nascitur in aridis & sabulosis.

Herniariam quidam vocant, quia omenti & intestini prolapsum mirè auxiliatur sumpta & admota. Item experimentis constat totius plantæ decoctum ac puluerem, renum calculos frangere & eiecere.

ANTHYLLIS PRIMA QVIBVSDAM,
flore luteo, foliis Lente minoribus.

Quædam (Lunaria) gracili solo nascitur, tenuibus ramulis, dodrantalibus, sparsis: *foliolis* candidantibus, Lente minoribus: *stipulis* luteis, aduncis, vt vulgare Melilotum: quidam Anthyllidem primam putant: at sapor non ineft falsus. Cæsalp. l. 6. c. 33.

POLYGALON CORTVSI.

ITa mihi olim denominabat Pataui Nobilis Cortusius, plantam, cui crassæ, lignescentes, duræque *radices*, dodrante longiores, nunc simplices, nunc multifidæ, intus albæ: quæ statim plures emittit virgulas lignosas, dodrantes, aut breuiores, humi stratas, quibus coniugtim hærent *folia*, vt plurimum nouena, similia Ornithopodio quorundam, nisi essent breuiora, & rotundiora, solidiora,

spissiora, & magis alba, saporis adstringentis, neruo vno secundum longitudinem prædita: *flores* ramulorum nudorum extremo insident lutei, vt Ornithopodii iam dicti, vel Polygalæ Valentinæ primæ Clusii: *semina* item consimiliter in *siliquis* longis, crebris internodiis interceptis.

Polygalæ, cuius imaginem in Ital. & magnis *floribus* appinximus, misit ad me [inquit Matth.] Veronâ Calzolarius. Quæ an legitima sit, pro certo decernere non ausim, quod tam pauca eius tradantur notæ, facilè tamen adducor, ad credendum legitimam esse, & præsertim cum ipse Calzol. scribat multipliciti sibi experimento constare, huius plantæ vltim lacini mulieribus copiosum efficere. Cam. in Histor. Germ. relicta *Matth. 4. 1.* Matthioli figurâ non vndique spernendâ, ponit aliam ex Gesnero à Polygalâ Matth. differentem. Matthiolus autem non descripsit Polygalam suam, contentus pro suo more solâ figurâ. Qui porro patrociniū eius suscepit, non bene patrociniatur illi, sed figuram ex Tabern. apponit malam. Poly. alia Matth. 4. *Erub. 1. 1.* Erubescens, non nihil differt [inquit Tabern.] à cæteris, floribus planè similibus, folia etiam conuenient, nisi breuiora essent paulò & latiora. At Compilerator corrumpit figuram Matth. vel Astragalum Lobelii, posteaque ex figura sua falsam descriptionem concinat, ne bene Erubescens dicit: ea enim amara est planta, Matthioli autem non amara, sed adstringens: flos etiam duersus, nempe luteus. Quæ obsecro conuenientia, aut similitudo foliorum? consideratis etiam Tabern. figuris, vni folia Lini, alteri folia leguminum, cum multis foliolis ex vno pediculo. Lobelium Adu. quo argumeto Senensis Polygalam legitimam vindicet, piget referre: vocatur autem ab ipso in Obf. Astragaloides herbariorum, Astragalus Matthioli, vel iam demum Polygalâ eiusdem. Verum Lob. non nouit Polygalam Matthioli, quæ multum differt ab Astragaloide ei dictâ, cui flores tribuit ex pallido puniceantes. Astragali quoque figura apud Matth. partim ficta, partim etiam aliena, de qua suo loco

An Histor. Lugd. Lotus enteaphyllos Dale. *An Loto* champii, radice firmatus breui, subnigra, valdè *Enteaphyllos* fibratâ: cauliculos edens multos, per terram sparsos, vel supra terram paululum exstantes: *folia* Loti, in singulis pediculis nouena: qua ex causâ Enteaphyllum cognominarunt: flores luteos inserta congestos: semen paruum in corniculis longis & gracilibus: ac qui pratis & terrarum aggeribus gignitur. Descriptio sanè hæc Dalech. cum nostra planta conuenit, si radicem demas, fortè Dalechampion non fuit delata integra planta.

Genevæ in horto nostro tota Hyeme virebat, *Locus & tempus.* florebâtque Maio. Hanc olim inueneram primò in Rhætiæ monte Nombro: Postea verò è montibus quibusdam Episc. Basil. transtulit Montbelgardum in hortum Ill. E. C. V. Vir.

POLYGALA QVIBVSDAM.

CAP. XXXVIII.

Polygalâ nostrâ Lenticulæ foliis & facie *Descriptio* crassioribus, pusilla, & tenera planta, in Gallo-Prouinciâ pascuis montosis prouentu multo *Locus* feritur, *stipulis* sunt lutei, minores Cytisi, aut Araci, *siliqua* & semine minutis, quæ laetis augent prouentum, gregi & armentis, Lob. *Polygalâ nostrâ* G.

Lob. & An-
guill. not.

C. Bauh.

Lob. & Pena Adu. & Polygala Dioscoridis, Obs. Polygalæ nullum scio (ait Anguill.) vulgare nomen: planta est similis Lenti: sed crassior: ei flos luteus, cum tenui siliqua. Seminatur in Provincia & datur animalibus: provenit etiam in Italia in montibus Bononiensibus, & in Samnitibus, siue *abruzz.* Lobelius similem ponit cum Anguill. descriptionem, qui ambo sese risui exponunt, cum neuter vulgare nomen addat: nam si feritur, ut aiunt, multo proventu: non potest esse innominata. Hanc porro eandem suspicari cum Polygala lutea (ut frater C. Bauh. facit) non possum: quia Polygala lutea à vulgari colore solo distat, quod animaduertim, cui folia non respondent Lenti, nec vires conveniunt ei attribute à Diosc. Aliquando suspicatus sum Anguill. Polygalam, eandem cum Cortusi, & Matthioli Polygala, verum cultura, de qua scribunt, mihi adhuc incomperta, dubium mouet.

GLAUCE VETERVM.

CAP. XXXIX.

Diosc. descr.

Descr. Plinii

Plin. not.

Locus.

Vires &
vfus.
Lac.

Glaux (Γλαυξ) inquit Diosc. Cytiso [cod. Bas. *κρίση*] aut Lenti, similia habet folia, quorum infernæ partes albidiores, supernæ virides sunt: ramulos per terram producit [*κλωνία* & *ἀπὸ γῆς*]. Marc. *ἀπὸ γῆς* legendum censet quinque, aut lex, tenues, palmi altitudine à radice: flores Leucoïto similes, sed minores, purpureos. Hæc ita tradit Plinius. Glaux antiquitus Eugalaeton vocabatur, Cytiso & Lenticulæ foliis similis, auersa candidiora: rami in terram serpunt quini, senive, admodum tenues à radice: flosculi purpurei exeunt. Plinium Glaucium cum Glauce confundere scribit Cornarius: dicitque Glaucem herbam Officinis & Herbariis, esse hodie ignotam.

Dioscoride & Plinio autoribus inuenitur iuxta mare.

Hæc cocta cum farina hordeacea, & sale, & oleo, atque sic absorpta, lac in mammis extinctum nutritibus reuocat, Diosc. A cuius lectione recessit Plinius, scribens: Coquitur in forbitione Similaginis, ad excitandum vbertatem lactis: eamque qui hauserint, balneis uti conuenit.

GLAUX LEGVMINOSA
Herbariorum.Descriptio
Caulis Ra-
dis Folia.

Flor.

Glauc.

Locus.

Caule assurgit rotundo, pedali radice, exili, singulari, nitente, à qua statim folia erumpunt Ocyroidis, aut Halimi, albida, glauca, oblonga: è medio autem caule aliquàmulta exeunt minora, minutim, Lentis modo, aut Vici diuisa. In summo caule pallido, conspicui flauent, aut puniceant flores, congesti in glomerulum, ex calyculis multis constatum, obidentibus squamosis folliculis, acerosisque veluti glumis, ubi semen.

Tota planta lato aspectu.

Glauc, vel Glaux quædam leguminosa Herbariorum floribus purpureis, Lob. & Penz Adu.

Ast dicant, qui sunt Herbarii illi, qui memineruntque obsecro similitudo Ocyroi, aut Halimi, Lentis, aut Vici?

Iuxta agrorum, viarumque margines obuam sese dat in Francia, Anglia, & Belgio, iuxta autores.

TRIBVLVS TERRESTRIS.

CAP. XL.



Prolixam latius agit radicem, fibris capillaribus donatam: coliculis emittit plures, palmares, aut etiam dodrantales, ramis multis diuisis, albicantes, per quos folia pinnata Lenticulæ, incana, pilosa: flores pediculis insident, è sinu foliorum ortis, lutei, parui: quibus succedunt muricata capitula, spinis manuculis ha-

rentia, ad Spinachiorum accedentia, semen continentia.

Tribulo (Theoph. tradente) peculiare est, quod integumentum fructus aculeatum gignit, quod Tribulus terrestris dicitur. Duo eius genera. Vnum, folium Ciceris [*ἐπίβλητος*] habet: Alterum spinosus est folius. Humi iacent ambo, & quaquaversum ferè disperguntur. Serius germinat, qui folia spinosa habet, & circa villarum septa provenit. Semen præcocius [Tribuli] Sesamo [*σισυμῖδος*]. Plin. arenaceum, *ἀμυγδαλέος* simile, Serotini verò rotundum, nigricans, siliqua clausum. Cæterum Tribulus spinosa planta est, ac aniculis, qui iuxta folium aculeatum, altero quoque folio conditur. Hic porro vel semine aculeigero constat: habet enim in semine aculeum: Qua de causa id quoque proprium ei (ut sic loquar) præ omnibus licet utique adnotare. Ad hæc solum iuxta aculeum gerit.

Tribulus terrestris [inquit Diosc.] foliis quidem est Portulacæ [*ἀνδροχῆν*]. Lob. putat legendum Araci] similibus, at tenuioribus: viticulæ verò [*μακρά*], Vetus Cod. Lacun. & Orib.] per terram sparæ, in quibus spinæ sunt rigide, præduræ: iuxta amnes & rudera nascitur. Græca verò Diosc. verba sic habent: *τὴν κλωνίαν μακράν. ἢ γῆς ἐπὶ σποδῶν. ἢ περὶ αὐτῶν ἀκάνθων σπυρίαι*, quæ sic reddit Ruellius: Viticulis in terra stratis: spinis secundum folia rigidis, quæ Ruellii versio non ita aridet, ut Cornarii, qui legit: & sarmen- ta per terram sparæ: & in ipsis sunt spinæ acerbæ: siquidem illud, *ἢ περὶ αὐτῶν*, non videtur referri, ad *σποδῶν*, sed ad *κλωνίαν*.

Tribulo proprietates [ait Plinius] quod & fructum spinosum habet, & secundum spinam solum. Eius genera duo. Vni Cicerulæ [Theoph. Ciceris, *ἐπίβλητος*] folia. Alteri, aculeata. Hic & serilis floret, magisque septa obsidet villarum: Semen ei rotundius, nigrum, in siliqua: alteri arenaceum: alii Acanaceum legunt vulgata exempl. *σισυμῖδος*, Hist. Lugd.] Lolium & Tribulum, & Carduum, Lappamque non minus quam Rubum, inter frugum morbos potius, quam inter ipsius terræ pestes numerauerim. Et hæc de Plinii sententia.

Sed

Sed Tribulum fagibus infestum esse, vel ex Virgilio manifestum est, nam ita canit:

*Lappaque, Tribulique, interque nirentia culta
Infelix Lolium, & steriles dominantur Avena.*

Tribulus Theophrasti, Venetis vocatur *Basapio*, inquit Anguillara, Tribulus terrestris (autore Belloh.) vulgo in Creta vocatur *Atriuolo*. Tribulus sacrarum literarum, in Gallia non prouenit.

Esse [ait Clus.] Diosc. *τρίβλον χερσίδιον*, Tribulum terrestem affirmare non velim: sed optime quadrare videtur alteri ex terrestribus Theoph. descripto, *αερίδι* videlicet, tamen hic non sit valde præcox, locis saltem ubi obseruabam. Hisp. *Abroios* appellabant: folia sunt subacti gustu, cum quadam adstrictione: fructus quinquepartito diuisus (quatuor spinis singulæ diuisuræ constant) in quo totidem semina: radix interdum minimi digiti crassitudinem æquat.

C. Bauhin Math. Tribulus terrestris folio Ciceris, Theoph.

Soliti erant (vt Adu. annotant) proicere hosti murices infestis aculeis armatos: quos quia protererentur, *τρίβλους* nominabant: vnde huic siliquæ plantæque muricata Tribuli nomen. Senensi duo Tribuli. Alter, quem Pisis à Cythino missum scribit. Alter, Dioscor. foliis Portulacæ quem in Veneto littore vidit. At quidam peritus locorum illorum & herbarum Italus nobis dicebat Senensem illum prædictum Commentatorē nunquam nisi aridum, aut picum vidisse vulgatissimum Tribulum, eoque describere nesciuisse: deinde Portulacæ marnam illic frequentem pro Tribulo Portulacæ foliis accepisse.

Τρίβλον χερσίδιον, Tribulus terrestris dicitur [inquit Hist. Lugd.] quod siliqua, plantaque muricata sit, It. Tribulo terrestre, Arab. simpliciter Tribulus *Hafab*, siue *Haserik*, Hisp. *Abrojos*, & *Abrolhos*.

Terrestris autem Tribulus [*τρίβλον χερσίδιον*] dicitur [teste Dod.] ad differentiam alterius in aqua nascentis. Est autem duplex *φινδελανδρος* (spinoso folio) & *αερίδι* [præcoquus.] Cum *αερίδι* autem Theoph. hic magis conuenit, quem & terrestem Theoph. Tribulum, non omnino abs re, quis nuncupauerit. Dioscorides enim, qui vnius terrestris tantum meminit, hunc omisit. Suum siquidem Tribulum, non Ciceri, sed Portulacæ, similia tradit habere folia, actenuiora, & *κλυσματι*, siue tenuiores, tenerosque ramulos, per terram stratos, in quibus spina æcerbæ & duræ. Qui certè Tribulus *φινδελανδρος* magis similis est, quam *αερίδι*, siue præcoquo.

Cæterum, Tribulus terrestris Veterum & Recentiorum, Calcitrapa à quibusdam esse censetur.

Ad aruorum semitas, in quibus Melopepones Salmantice feruntur, frequentissimè prouenientem reperiebat Clusius, hortulanis valde molestum, & exosum, quoniam fructus eius [qui per maturitatem facile de planta decidit] firmis aculeis pedes illorum nudi grauiter offunduntur. Florebat isthic Iulio, semen verò Augusto & Septembri maturum. Meminit etiam olim Monspeliano agro obseruare, sub ipsis ferè vrbis mœnibus inter oliueta, vt & Lobel. qui dicit: Videas pratenses, puluerulentas, & sabulosas planities maritimas Adriatici, Thyrræni, & Gallici Mediterranei maris isto Tribulo itineranti infestas & propemodum imperuias. In Lio Venetæ postremum insulæ sabuleis, cuius Pharmacopœorum

Tom. II.

notissimum dicebat Italus, eoque minimè Pisis accensendum. Hunc vidimus nos, flores & semina ferentem mense Augusto, in fossis circa Monspelium prope muros exedificatos à Papa Urbano. Montbelgardi prouenit in horto Ill. C. Virt.

Adstringit & refrigerat: estque omnis inflammationis cataplasma. Cum melle verò feruida oris vlcera, & tonsillas, & putredines in ore sanant, & gniguias. Exprimitur & succus ex eo ad ocularia medicamenta. Fructus ipsius viridis potus, calculosis prodest. Drachmæ quidem pondere potus, & impositus commoritis à vipera particulatim opitulatur. Commodus est etiam ad lethalia medicamenta, cum vino potus. Decoctum respersum pulices necat. Cæterum, qui ad Strymonem fluuium habitant Thraces, viridem quidem herbam equis in pabulum dant, fructum verò, qui dulcis est, & probè nutrit, in panes effingunt, ipsoque pro pane vtuntur. Hæc ita Plinius tradit. Succus ex hoc colligitur ad oculorum medicinas. Est enim refrigerantis naturæ, & idèò vtilis contra inflammationes, collectionesque. Vlcers per se erumpentia, & præcipuè in ore, cum melle sanant. Item tonsillas. Potus calculos frangit. Thraces, qui ad Strymonem habitant, foliis Tribuli equos saginant. Ipsi nudeo viuunt, panem facientes prædulcem, & qui contrahit ventrem. Radix castè pureque collecta, discuit strumas. Semen adalligatum, varicum dolores sedat. Tritum verò, in aqua sparsum pulices necat. Galeno teste: Dominatur in hoc terreum frigidum, quod adstringens etiam alibi ostenditur. Et propterea ad inflammationes, dum adhuc generantur, & omnino ad omnes inflationes commodat. Fructus, qui tenuium partium est, calculos in renibus atterit potus. Et quamuis Galenus Dioscoridem sequutus terreem & frigidam qualitatem huic tribuat Tribulo, Salmaticenses tamen eius decoctum, ad pituitam, crassosque humores incidendos, & euacuandos felici successu clysteribus iniici prodebant, teste Clusio. Nullius hodie commodi, nisi Asinis, quibus pabulum est, Lob.

Vires & vltus.
Inflammatio:
Oris vlcers:
Succus.

Radix & fructus.

Oculi.

Radix & fructus.

DE LOTO IN genere.

CAP. XXXXI.

IN genere de Loto verba facturi, hanc duplicem agnoscimus. Est enim & *Lotus arbor*, de qua Historiæ libro 2. diximus: & *Lotus herba*, de qua nunc agemus. Quæ auctore Theoph. in pluribus formis est, & ferè ceu æquiuocis: Huius enim species plurimæ sunt, differentes & foliis, & caulibus & floribus, & fructibus.

Lotus [inquit Diosc.] quam aliqui Trifolium vocant, folia habet terna, Loto arbori similia. Censendum autem est, Matthiolo teste, Dioscoridem Trifolii huiusce folia, Loto arboris comparasse foliis, non quod terna folia Loto, perinde ac Trifolio, ex vno pediculo exeant, sed quod vnumquodque per se Trifolii Alphatidis folium, Loto arboris folium referat. Cæterum in caule tantum [auctore Theoph.] foliata Lotus.

Lotum porrò satiuam, & silu. ægyptiam, Arabes indifferenter vocant *Handachocha*, *Garch*, & *Thuf*.

G g 3

LOTVS SATIVA VETERIBVS.

CAP. XLII.

Lotus sativa
Trifolium.
Vires et G.
luc.
Oculorum
morbi.

Exer quod
ruidam.

Temperam.

Aequivoca

Lotus sativa

Melilotus
vulgaris.
Alleluia.

Alilibus [infit Dioscor.] Lotus sativa [Lotus sativa] nuncupatur. Nascitur in hortis. Succus inde expressus (de yndels, cod. Bas. 1786, Dalech.) & ad mel ammittus, argema, nubeculas, albugines, & quæ pupillis oculorum tenebras affundunt, depurgat.

De Loto herba sativa, eadem sanè, quæ Dioscor. habet, prodit Plinius: Loton (ait) qui arborem putant tantum esse, vel Homero auctore coargui possunt. Is enim inter herbas subnascens Deorum voluptati, Loton primam nominavit. Foliis autem Plinius attribuit ea, quæ Dioscor. expresso succo hic adscripsit.

Lotus, inquit Porta, radice & fructu croceus est: Plinius radice lanas, pelles & cortices tingere dixit, sed Dioscorides capillos rufare.

Lotus sativus, auctore Galeno, quem aliqui Trifolium nominant, modicè extergentem vim habet, arq̃ita etià siccitatem. Verum in caliditatis & frigiditatis coniugio medius quodammodo est, & temperatus.

Sed Loti tandem sativæ, siue vrbanae inspicimus æquiuocationes. Passim igitur Lotus vrbana vocatur legitima, sativa Lotus habetur. Est verò nobis Lotus hæc, Lotus corniculata glabra & hirsuta minor, de qua suo loco. Sunt qui existimant eam plantam esse Lotum vrbana quam vulgares Herbarii & Officinæ falsò Melilotum appellant, quorum ego opinionem non improbo, inquit Senensis Commentator.

Non desunt etiam Recentioribus, quorum opinionem tuetur Gesn. in suo libro animalium, qui putant Lotum sativam esse Trifolium illud, quod in pratis passim, atque alibi etiam provenit, sed errant, auctore Matth. cui Lotus vrbana reiecta prior est Melilotus vulgaris, odorata.

In tanta Dioscor. breuitate, inter tot Trifolias herbas difficile est statuere de Loto vrbana. Matth. censet, ait Turnerus, Melilotum vulgarem esse Lotum vrbana. Amatus autem Alleluia esse indicat. Ferrarienses verò viri docti, diuersam ab utraque Lotum vrbana ostendunt. Ea primo obitu Trifolio acetoso persimilis est. Sed Trifolium acetosum in silvis tantum provenit & incultis: Hæc verò in hortis tantum. Trifolium acetosum nihil habet. quod caulem referat: flores enim pediculo insident à radice statim orto, candidi, triplo maiores floribus eius quam pro Loto vrbana exhibeo. Hæc autem caulem habet breuem, cuius summo flores insident duo, tres, plures, paucioresve, lutei, sapore acido Trifolii acetosi. Hanc potius Lotum vrbana opinor, quam vel Alleluia, vel Melilotum. Vt enim Melilotus non est esculenta, ideòque nec in hortis colenda: ita Alleluia et si idonea in hortis colitur, utissima acetatis, vulgò tamen in hortis non nascitur, ut reliquæ dux. Itaque hæc quia in hortis duntaxat reperitur, pro Loto vrbana potius quam illæ dux habenda est. Bis mihi visa est, semel Ferrariæ, semelque Clauennæ.

LOTVS SYLV. VETERVM.

CAPVT XLIII.

Lotus silv.
Lotus Liby.
a.

Observant Diosc. Lotum silv. (Lotus silv.) quem aliqui Melilotus vocant, plurimum in Li-

bya nasci: caulem ferre bicubitalem, aut etiam maiorem: alas habere multas: folia Loto Trifolio similia, quod in pratis provenit: semen simile Fœnogreco, sed multò minus, in gustu medicatum.

Cæterum, diuersas apud diuersos hoc nomine donatas comperies plantas. Matthiolus licet nondum audeat affirmare, an Lotus silvestris, quam copiosam hoc in capite in Libya gigni tradidit Dioscorides, nascatur in Italia, Herbam (ait) quandam sapius vidi, ac legi in incultis & pratis, nascentem foliis Trifolio amulis & c. attamen descriptionem suam repetit ex Dioscoride, cum additione florum luteorum, qui non conveniunt plantæ depictæ, cuius icon representat nostrum Trifolium rectum, hirsutum valde. Abstulit adhuc in post. com. iconem priorem Matth. cum descriptione, ponens pro Loto silv. Loti sativæ, annuæ, flore cæruleo, & figuram, & delineationem.

Cæsalp. tandem, Lotum silvest. Diosc. quam & Theoph. inter odoratas recensuerit, vulgò Trifolium, & corrupto vocabulo Trifolium vocari scribit, flosculis luteis, & candidis. Quænam ergo sit Lotus silv. Diosc. haud est promptum acere Turnero, cum ea, quam ipse credit Lotum silv. florem habeat cæruleum pallidum.

Vim habet calefaciendi, leniter adstringentem, depurgantem maculas faciei, & à Sole provocatas, si cum melle illinatur. At si per se tritus, aut cum Maluæ femine, ex vino, aut passio bibatur, vesicæ doloribus opitulatur, ut nobis auctor est Diosc.

LOTVS CORNICVLATA GLABRA

& hirsuta minor.

Nigro cortice radice, lignosa, multifariam parvita, coeuntibus in vnam portionibus longissima euadit, raris fibris donata, reptans, sapore subdulci, & adstringente: virgula tenues humi ferè procumbentes, brachiatis foliis sustinent ex intervalis, terna Trifolii, aut quina, quorum duo inferiora cauliculo adnætantur, pilosæ, sunt quæ nullos aut paucos pilos habent, acuminata, pinguis, adstringente sapore prædita: flores densè tanquam in umbella stipati, Genistæ floribus similes, lutei: quorum supremum solum reliquis latius, rotundiusque, sursum flexum, for-



is, intusque lineis purpurantibus striatum, infundum sursum quoque mucronem spectans, apices luteos continens, ipsumque utrinque geminis foliis, tanquam alis coercetur, quibus delapsis cornicula, siue filigines tenues subnascuntur.

Trifolium est C. Bauh. so. siue corniculatum glabrum & minus, seu Melilotus.

respen-



*Lotus pentaphyl-
lus.* Cæsalp.
*Melilotus vul-
gò appellatus,*
cuius flores
officinæ pro
Meliloti Anti-
tiquorum sub-
stituant, quâ-
uis autem iis,
preter colorem
croceum nulla
qualitas legiti-
mi Meliloti in-
sit. Tabern.
*Trifolium sili-
quosum minus,*
*flein schos-
tenflee.*

Trag. in
Hist. germ.
Edeker steins

Flee Dasi sibiengeschecht potest esse Serapio-
nis Melilotus, non tamen malè conuenit cum
Hedyaro Diosc. quod Pelecinum vocat, & quo-
rundam Securidacam. Nostri Herbam flauam, &
Herbam leporinam vocant: quidam etiam
Vnser frauen schüchlin esse volunt. Hanc idem
in Hist. lat. nasci tradit in agrorum limitibus &
secus itinera, hoc quidem titulo: Aliud quoddam
Meliloti genus, Melilotus nobilis, Meliloti septimum
genus. An insuper eidem Hist. germ. Lagopus,
hasenfuss / quem Diosc. non describit, nec etiam
Gal. Agineta, & Plin. ex denominatione tamen,
vt etiam ostendit Apuleius, apparet herbam simi-
lem pedi leporis, nullam igitur nouit plantam
preter flores quosdam, è genere Trifolii, & Loti,
quæ planta auf dem Gawe vocetur hasenfusslin:
existimat autem verum *lagopus* Antiquorum, di-
ctum Dioscoridi Leporis Cyminum, & Lepoti-
num pedem: *Hasenflee.* Hanc suspicamur nos
Lotum vrbani Matthioli.

Lotum pentaphyllum Gesn. dixerit herbam,
quâ imperiti quidam pro Meliloto hæcenus
abusi sunt: in odorem proflus. *Gelle Tubenfrö-
pffe* / cuius species duæ sunt. Matthiolum Lotum
vrbani nominare non probauerit, sed Lotum
Fuchii putarit.

Meliloti alterum genus, Fuchf. Melilotum ger-
manicam vocauit, quodd in Germania pro vera
Meliloto sit vsurpanda ob adstrictionem. Hanc
suam autem opinionem stabilire nititur antiquo
manuscripto Herbario, qui hanc pro Meliloto
pingat. An de hac Ruell. sciens in pratis herbam,
quam officinæ *Andachocum* & *Coronam* vocant
regiam. Sed an Lotus sit vrbana non audeat asse-
rere, quodd à Diosc. non describatur. Sunt tamen
inquit, qui verum Melilotum defendant.

Nulla certe hæcenus Matthiolo sese obtulit
planta, cui Lotus vrbana merito subscribi possit:
hæc est, inquit is, vera ac legitima Lotus satua.
Sunt tamen alii, qui existimant, eam plantam Lo-
tum esse vrbani, quam vulgares herbarii, &
officinæ Melilotum falsò appellant, vt potè quæ
foliis confert Trifolii effigie, nascaturque non in
pratiantum, sed etiam in viridariis & hortis.
Verum horum sententiam eur planè probem,
aut refellam, nihil equidem habeo, cum ii suâ
potius opinione duci, quam rationibus, aut au-
ctoritatibus niti videantur. Inclinat tamen ani-
mus ad credendum, quodd ita, vt illi rentur, facillè
esse possit. quandoquidem vulgaris Melilotus &

in hortis prouenit, & folia Trifolio proxima pro-
fert: quin & omnibus nouissima est herba, que-
madmodam Lotum vrbani olim fuisse, apertè
innuit Diosc. qui eam vt triuialem non depinxit.
His illud accedit, quodd in hunc vsque diem pro-
prium ferè seruauerit nomen, eo tantum aucto
ex Loto in Melilotum: vnde postea facillè fa-
ctum esse potest, vt eadem legitima Meliloti lo-
cum occupauerit. hæc ille: Qui sub titulo Loti
vrbani ponit iconem Loti nostræ corniculatæ
glabræ, quam Melilotum quoque officinarum
nominare videtur. Verum hanc suo more non
describit. Et licet retineat in post. com. cum mag-
fig. maiorem verborum prædictorum partem,
omissa tamen in his iconem, vt & in Epit. aliam re-
ponit, Trifolii scilicet odorati, sub eodem Loti
vrbani titulo.

An Amato Lotus silu. Trifolium silu. Offic. Meli-
lotum: Hisp. Lulit. Melgas: & Ital. Gal. Melilot.
Germ. Guldentlee oder Steinflee

An Brunt. Tom. 3. Rhaph. 14. Trifolium 7. flore
luteo, Latinis Leporaria vocatum?

Lotum silu. non tamen Dioscoridis Dod. gall. vo-
cat. germ. Wildentlee / Steinflee / Edelsteinflee
Vogels wiesen / Vnser frauen schüchlin. Gail.
Tressle sauage i aulne. Belg. Steenclaueren / &
Geelsteenclaueren wilde claueren, & quibdam
Vogels Ditsen. Quidam, autiple, Meliloti spe-
ciem putant, idèd vocatur latinè Melilotus silu.
aut Melilotus germanica.

Trifolium corniculatum primum, similitudinem
maximam habet [eodem teste in fol. & de frum.]
cum Serapionis, & Isaaci Meliloti, quam Alchilè
sive Melich vocant.

Lonic. Melilotus germanica, & Herba flaua, Loti
silu. 9. species.

An Lob. & Penz. Adu. Melilotus coronata: Non
de nihilo erat, quod quidam persuasi fuerunt,
illam Lotum, quæ siccioribus pratis & viarum
marginibus latatur, Sertulam esse campanam,
aut saltem pro Meliloti esse vtendam. Plebi gal-
licæ Corona regia dicitur, indidemque Romanis
Sertula fortè dicta. Eà Pharmacopœi, Galli præ-
sertim, plurimum vtuntur æquè tunc atque Meli-
loto. Nusquam non Angliæ, Galliæ, Belgicæ, fre-
quentissima siliqua Loti siluestris. Item Obs.
Melilotus coronata, Trifolium corniculatum Dod. Me-
lilotus germanica Fuchii.

An de eadem loquitur pag. 500. Melilotus Adu.
Sertula campana & corona Regis. Angl. Meliloti /
It. Melilore, & Trifoglio cauallino. Hist. Lugd. Lotus
satua Matth. Hort. Camer. Melilotus nostra germ.
Hort. Luf. Trifolium siliquosum, Melilotus nobilis
Tragi.

In pratis prouenire solet, ac etiam collibus sic-
cis. Genere duas species obseruari: Hirfutam
florentem Maio & Iunio cum filiquis. quam ma-
rem voco. Glabram alteram, aut saltem pilos ha-
bentem paucos, florentem Septembri secus vias
Montbelgardi & Basileæ, quam feminam nomi-
no. D. Agerius attulit ex Italia, cuius radici ad-
hæsit Orobanche parua.

LOTI CORNICULATÆ MAIOR species.

Est altior multò quàm vulgaris, caulibus enim
cubitus, ac etiam sesqui cubitus altiori-
bus allurgit foliis per ramos tribus ex vno pedi-
culo, vncialibus circiter, duobus itidè pediculi ex
Gg 3

An Lotus
silu.

An trifoli-
st. luro.
Lotus silu.
Nomina
linguar.

Meliloti
species.

Trifol. cor-
niculatum

Meliloe
germ.

Locus &
tempus.


Mat.

Famici.

Descriptio
Caulis.
Rosa.

Floret.

Siliqua.

Lorus pentaphyllos.
C. Bauh.
169An Melilori
Species.Lorus.
Locus.

hirsuta Gelsnero. *Melilori vulgaris* alia species foliis subhirsutis Celsalpino. Nobis autem non satisfacit C. Bauh. differt enim Celsalpini *Melilotus* altera, à Loto pentaphyllo. Ea siquidem Celsalpino breuior est Loto corniculata, & siliquæ incuruæ sunt, quæ non conueniunt Loto maiori corniculatæ, de qua hîc agimus: præterea *Meliloti* vulgaris alia species Celsalp. in veteribus ædificius nascitur: nostra autem inter vepres, & spinas, in sepibus.

Trago fortè vocatur *Melilori quarta species*, Ser Dierit Blee / Vogelwurzene, quæ Serapionis *Melilotus* esse possit. Ego tamen non ausim asserere Tragum intelligere Loto corniculatæ maiorem speciem, quamuis id suspicer, & eam *Lonicerus* quoque sua figurâ demonstrat. Est *Trifolium corniculatum* Dodonæo tertium, de quo Tragus. Gelsnero *Lorus* altera maior *hirsuta* & erecta, g. su adstringenti.

In Dumetis & sepibus prouenire, solet inter Montbelgardum, & Souhait.

LOTUS CORNICVLATA SILIQVIS singularibus, vel binis, tenuis.

Descriptio.
Radix.

Caulis.



culcus exit singularis tenuis, vncialis & longior: in cuius cacumine, flos luteus, hians, ex caly-

pèribus caulem cõplexis. flores pecularibus furculis & in summo caule in orbẽ congesti, maiores, lutei, foliis quibuldam coronæ subiectis: sequuntur siliquæ numerozæ, vnciales, & seiscunciales.

Est C. Bauhino *Trifolium* si. siue corniculatum maius & hirsutum: *Lorus* pentaphyllos maior, modicè

cibus hirsutis: siliqua pletumque singularis [ra-
fissimè binæ] vnciam longa, teres, semine copio-
fissimo, ad vicenarium ferè numerum, tenuis
Portulacæ pari, ruffo, rotundo, sapore legu-
minoso reserta.

Hanc attulit Genèr Cherlerus ex Gallia Narbonensi.

DE MELILOTO VETERVM

in genere.

CAP. XLIV.

Sertula campana, teste Theophrasto, viridis quidem nihil: aut siccata plenius olet, & plus temporis odorata durat.

Melilotus [Melilotus] optimus est Atticus, & qui in Cyzico, & Chalcedone prouenit, quique Croco similissimus [Xeriscor, Crocum referens, Corn.] & odoratus est. Nascitur & in Campania circa Nolam, in luteo languesciente colore vergens [Xeriscor] & infirmo odore. Sed vocem Xeriscor, melino colore reddit Cornarius. Nihil enim aliud (inquit) vult ea vox, quàm coloris similitudinem in *Meliloto*, ad *Malum* *Cotoneum*.

Cæterum *Meliloton Serram Campanicam* Cato dixit: Celsus *Serrulam Campanicam*.

Ita & Plinius l. 21. c. 9. quæ appellationis etiam rationem reddit, quod sit in Campania Italiæ laudatissima. Græcis in Sunio: mox Chalcidica & Cretica, vbiunque verò asperis & siluestribus nata. Coronas ex hac antiquitatis factitatas, indicio est nomen *Sertulæ*, quod occupauit. Odor eius Croco vicinus est, & flos. Ipsa cana placet, maximè foliis breuissimis atque pinguisimis. Et eiusdem libri c. 11. *Melilotos* vbi que nascitur, laudatissima in Attica, vbiunque verò recens, nec candicans, & Croco quàm similima: quanquam in Italia odoratio & candida.

Sertulam ergo Romani veteres dixerunt, quod flos eius coronamentis dicatus sit, & quia ex ea antiquis coronæ & sarta factitatas sunt: Coronam autem regiam, quoniam luteis floribus supernè coronetur.

Duorum porro generum *Melilotum* Auicenna facit, vnam videlicet lutei floris: alteram candidi. Auicennæ autem *Meliloton* eandem cum Dioscoridis *Melilotum* esse de viribus ac facultatibus amborum testimonium in fine adducendum ostendet.

De *Melilotum* hæc Serapio. *Alkizelmelich* Alchilhelmich, corona regia, Ysaac Eben amram] est herba, quæ habet folia rotunda, viridia, & ramuli eius sunt subules multum, & folia rara, & fructus habent vaginas, subtiles, rotundas, sicut virgæ puerorum paruulorum, & sunt in eis grana pauca, glauci coloris, rotunda, minora granis Sinapi. Et quod de ipsa administratur, sunt illæ vaginæ, cum eo, quod est in eis ex granis.

Hodie verò non omnes Autores eundem habent *Melilotum*. Quidam enim, teste Cordo, humi stratam *Trifolii* speciem, quæ luteos habet flores, pro *Melilotum* accipiunt, sed malè. Neque recens enim, neque sicca aliquam odoris bonitatem habet: *Melilotus* verò fragrantissimum habere debet, præsertim eius succus. Propterea hunc Diosc. cum *Samplicho* inter alias odoratas herbas describit. Il tamen melius faciunt, qui *Steinklee* appellatam Loto siue *Trifolii* speciem, pro *Melilotum* accipiunt. Odorata enim est valde, præsertim quæ luteos habet flores: hi siccati melius etiam olent. Dicitur hæc à nobis *Trifolium*.

lium odoratum, siue Melilotus vulgaris.

Tragus etiam Melilotum 7, seu nobilem, siue Meliloti exigua speciem alteram, quæ quidem ab aliis Melilotis Scrapionis accenseri, ipsius tamen iudicio non male ad Hedyfarum, aliàs Securidacam, & Pelecium stuticem dictum, referti posset, pro Meliloto recipit.

Gesnerus ait Loto pentaphyllo imperitos pro Meliloto abufos.

Fuchsius, Meliloti alterum genus, quod Melilotum germanicum vocat, pro vera Meliloto, ob adstrictionem, vsurpandum censet.

Matthiolus Lotum vrbnam, quam & Melilotum officinarum falsam affirmat, nominare videtur. Pro vera Meliloto, Melilotum vulgi, cuius flores officinæ pro Meliloto Antiquorum substituant, quamvis præter colorem croceum, alia nulla qualitas legitimi Meliloti insit, agnoscit. De his singulis agemus sub Loto corniculata glabra & hirsuta, minore.

Dicit quoque Gesn. Melilotum veram Tiguri in aruis, alibique locis arenosis præcipue flore luteo, & alteram speciem albo nasci, eamque vulgus Trifolium aureum appellare. De hoc agimus sub Trifolio odorato, siue Meliloto vulgari.

C. Bauhinus Meliloti vulgaris speciem aliam Cæsalpini habet, quam nos Lotum corniculatam maiorem facimus.

Melilotum porro Ægyptiis dictam *Alchimelech*, Melilotum verum potius, quam Lotum vrbnam, aut Sertulam campanam dici putat Alpinus. A nobis Melilotus Ægypti inscribitur.

Melilotum veram, eam esse plantam tradit Matth. cuius flores Germani colligant, ac pro Meliloto passim vtantur, quemadmodum & Bohemi, consultius fortasse, quam Itali. Vocatur hæc Melilotus falsa dicta, à nobis Trifolium odoratum, seu Melilotus vulgaris odorata flore luteo.

Melilotum adhuc alium vulgò appellatum, si liquas ferentem incuruas, multi legitimam Melilotum putant: sed hæc, inquit Cæsalpinus, fortè ad Melilotum Scrapionis reduci potest. An hic Medica nostra silu. surrectæ?

Theophrastus Loti nomen æquiuocum esse ait, cum eius genera plura sint, inter quæ & illud recensetur, quod Melilotum vocatur, sic enim Cæsalpinus legendum censet, non Melias sitos, quod Gaza Mel frugum vertit.

De Meliloto Græcorum non inter Trifolia, autore Cæsalpino, querendum est. Scrapio tamen inter Arabes Melilotum intelligere videtur Loti genus, quod Trifolium Balsaminum appellatur, inquit enim Herbarum esse foliis rotundis, &c. Putauit autem id à Diosc. Melilotum vocari, colore croci, odoratum. Hanc tradimus esse Lotum odoratam, annuam, flore cæruleo.

Herba S. Marie optimè conueniunt, quæ de Meliloto traduntur, tum apud Dioscorid. tum Plinium, & Auicennam. Et hæc nobis est Mentha Saracenicæ, siue Costus hortensis, de quo H. n. lib. 25.

Melilotus Græcis, Latinis melilotus, Serrula campana, aliis Corona regis, Germ. Steins Hee, Belg. & Wallacet Gall. melilot, Ital. meliloto & Trifolio Casalino, Hisp. Corona de rey, Angl. Melilote.

Hodie probatissima, legitimâque Melilotus, si Hist. Lugd. fides habenda, non modò in multis Campaniæ locis, sed etiam in Gargano Apuliz monte prouenit.

Tom. II.

Melilotus, authore Dioscoridè, vim habet ad.

stringendi, inflammationemque omnem emolliendi, præsertim oculorum, vuluæ, sedis ac testium, si ex passo decocta imponatur, addito interdum oui luteo affato, aut Fœnugraci farinâ, Lini semine, aut Tritici polline, aut denique capitulis Papaueris, Intybõe. Sanat & recentes meliceridas per se cum aqua, & vlcera manantia in capite cum terra Chia, & vino, aut galla inuncta. Stomachi dolorem in vino decocta, itemque cruda cum aliquo ex antè dictis leuat. Dolores etiam aurium cum passo mitigat succus ex ipsa cruda expressus & instillatus. Denique capitis dolorem ex aceto & rosaceo irrigatus lenit. Meliloto, si Plinius vera dicit, oculis medetur cum lacte, aut cum Lini semine. Maxillarum quoque dolores leniuntur: & capitis cum rosaceo: item aurium è passo, quæque in manibus intumescent, vel erumpunt. Stomachi dolores in vino decocta, vel crudâ, triaue. Idem effectus, & ad vuluas. Testes verò, & sedem prociduam, quæque ibi sunt vitia, recens ex aqua decocta, vel ex passo. Adiecto rosaceo illinitur ad carcinomata: Deferuefcit in vino dulci. Peculiariter & contra Meliceridas efficax. Sed animaduertendum vulgatos codices falsò habere lacte, pro luteo oui: disertè enim in Diosc. *ad λουδου*, legitur. Copiosior autem, vt Galenus ait, in Meliloto est substantia calida, quam frigida (primi videlicet ordinis calida & sicca, Dod.) habet etiam quiddam adstringens, sed & discutit, & maturat. Vtraque tandem Auicennæ Melilotus odorata est, & nonnullæ amaritudinis particeps, ac simul digerendi facultatem cum nonnulla adstrictione habens. Quòd porro in Meliloto, vsum sibi vendicent filiquæ, & semina, quæ in eis continentur, ex autoritate Isaac Eben amram apud Scrapionem iam constat. Ex quibus facillè est coniecere, inquit Matth. non esse mirum, si emplastrum, quod de Meliloto Officinis dicitur, sæpè Medicos fallat, cum in id legitimi Meliloti seminis farina nunquam recipiatur. Quod autem Diosc. Melilotum tradit adstringentem & malacticam vim habere, sciendum est, ait Dod. eam non habere propriam, sed quatenus in inflammationibus, aut aliàs collectos humores discutit ac digerit: nam eatenus, quod durum est ac tumescit, emollit, quæ propriè non emollit, sed digestio, & per halitum discussio est, cuiusmodi facultatem *διασπορῆς* Græci nominant.

MELILOTVS ÆGYPTIA ALCHIMELECH

vocata.

Supra terram expansa planta est, parua, modice repens, ferè nihil aut parum in altum se attollens: foliis Trifolii filiquosi, minoribus tamen, floribusque paruis, multis, longis, racemi modo ordinatis, croceis, odoratis, à quibus promanant siquæ parue, oblique: semen continentes minutum, rotundum, subnigrum, declinans ad rubrum, odoris non omnino expers, sapore stiptico, cum aliquo amarore.

Melilotum autem, Ægyptiis dictam *Alchimelech*, Melilotum verum potius puto (inquit Alpin.) quam eam plantam, quæ Lotus vrbana, aut Serrula campana dicitur.

Huius plantæ semina tantum apud Ægyptios in vsu sunt. Quæ putant ii quoad calorem & stipticitatem esse temperata, sed ficcare, resoluerè, ac stipticitate roborare, ex quo ad hepatis tumorem.

Vires & vlus
Inflammatio

Melicerida:
Vlcera capitis
Stomachi
dolor. Aurium d. or.

Plin. corrig.

Temperâ:

Vfus filiquæ
quarum
seminum

Emplastrum

Diosc. explicatur.
Malactica
Sic

Descriptio:

Folia.

Flores.

Siliquæ.

Semen.

Synon:

Vires & vlus

Temperam.

Hepatis tum.



Pleuritis

Vteri strangu-
latoMenfese
Ventriculus
debilis

vexatis, ipsorum decoctum ad libram bis in die calidum bibunt. Mulieres quoque veteri strangulationibus, flatibus, ac doloribus eo subueniunt, præsertimque ex eo etiam infestationibus paratis, quæ etiam Fœnugræci, Linique feminibus parata, & Camomeli floribus, efficacius ad illius, & aliarum partium duros tumores administrantur, atque ad euocandos menses retentos. Ad roborandum ventriculum, & aperiendas obstructions venarum decocto summè proficue videntur.

LOTUS SILIQVOSA FLORE FVSCO tetragonolobus.

Descriptio

Radix

Caulis

Folia

Flores.

Siliqua

Semen.



amplectentibus, vt in Loto siliquosa lutea Monspeliensium, vel Loto corniculata, sed longè maiora, hirsuta: flores ex foliorum alis, Pili quidem formâ, minores, holosericum coccineum, vulgè dictum saurum, prouocantes: siliqua sesquipedalis circiter longæ, angulosæ, crassiusculæ, quatuor membranarum, ceu sagittarum alis appositis donata: in quibus continentur semina magna rotunda, subflava, quæ dentibus resistunt, sapore Pili.

Lotus pulcherrima tetragonolobus, flore ru-

bermo. *Pisum rubrum* quorundam Camer. hort. & Iconum. Lotus siliquosus rubro flore, *Pisum rubrum* Oelling. ri: Semen eius missum Lupini nomine, licet eius planta Lupino prolixius sit dissimilis: *πεταγανθός* non nullorum, & *πεταλόφ*, quem non minus, aptè tamen *πεταλόφ* n. *πεταλόφ* forsitan appellare liceat. Aliquoties ex Italia missum semen *Sandalida* appellatione, Clusio. *Anthillidem* inquit Anguill. votant in Candia *sandalida*. An autem Anguillara hanc intelligat asserere non ausim; quia non describit. C. Bauh. *Trifolium* 60. siue *Siliquefium rubrum*.

Ante plurimos annos eum ex semine à me facto planta in horto E.C. Montb. proueniret, Lotus siliquosa, flore fusco denominata descriptaque fuit, nec antè à me visa, nec à quoquam descripta. Floret Iulio, semina matura Augusto. Anna planta est. Semina eius missa E.C. ab hortulano Ducis Florentiae anno 1594. cum inscriptione *Semina Sandalida Candia*.

LOTO SILIQVOSÆ ALIQVOMODO SIMILIS, Coronopus ex Cod. Cæs.




Herba Stella, si hdes iconi habenda, quæ in codice Cæsareo reperitur, Descriptio longè differens planta est à Coronopo. Depingitur enim in hoc Coronopus, tenuibus ac viticulosis cauliculis, ex recuruis coruorum pedum digitos referentibus siliquis, vt ipsa figura ostendit. Cæsareani autem veteris Locu-

manu scripti codicis fidem, nobis inquit Dod. asseruit Bern. Paludanus, qui huiusmodi Coronopum, qualem icon exprimit, à se visum ac repertum haud longè à Tripoli, & ad radices montis Libani nobis coram narrauit.

Sed inter nothas Coronopi voces hæc ascribitur. *Harrenaria* & *aspis* [sanguinaria] C. Bauh. *Trifolium* 57. facit, & Coronopum ex codice Cæsareo Dodonæi vocat.

LOTUS ORNITHOPODII siliquis.

Vnica ex radícula, albâ, duriusculâ, paucis fibris donatâ, *caliculi* exeunt aliquot, teretes, in aliquot ramulos ex seiscunciali intervallo diuisi: ex quorum geniculis *folia* hærent quina, quorum inferiora duo superioribus tribus magnitudine cedunt, nullo sapore manifesto prædita. Extrema *stoculi* occupant lutei, quales in Loto corniculata glabra, nigris lineis striati. Quibus succedunt *siliqua*, ex vno geniculo duæ, tres, ac plures, seiscunciam, aut ad summum vacias duas longæ, falcatæ, compressæ,



sa, atro-purpurea, *femini* extuberantias pulchrè exprimentes. Nobis in unica siliqua ad 14. semina animaduversa.

Lotus alia peculiaris Camer. hort. Ic. verò Lotus peculiaris siliquis Ornithopodii. C. Bauh. phyt. Trifolium 6. siue Trif. siliquis Ornithopodii.

Gener Cherlerus attulit

Basileâ florentè cum suis siliquis mense Augusto D. Zwingeri. in quo semen maturum collegi Septembri. Vidi etiam apud Fratrem Norimbergâ missam.

LOTUS SILIQVOSA LVTEA Monspelienfis.



VT fibris multis oblitam habet radicem, quæ alioqui crassa, lignosa, longa: ita plurimum aliquid caput: foli. Loti corniculatæ, quina, quorum duo cauli adnascuntur, maior a tria simul coheret, iam dictæ Loti folia magnitudine vincetia: stros vnicuique cauliculo in cacumine vnicus, magnus,

luteus, quatuor striis ad latera donatus, ex longo calyce erumpens: siliqua lucescit vnica sefcunciam longa.

Trifolium genus, à siliquarum magnitudine Monspelianis Lotus pratenfis siliquosus cognominatum, Clusius. Trifolium 61. siue siliquosum luteum C. Bauh. phyt. Lotus trifolia pratenfis siliquosa Monspelienfium, siliqua, quam Fœnugræci maiore, sed recta, & superius retusa, quibusdam secundum longitudinem impressis striis, Fœnugræci flauescens semen, dum maturuit, diffiliente & ostendente, Lob. & Penæ Adu. & Icon. Pl. Quorum figura non placet. In nostra verò sculptor appendicem folia malè præcidit sculpendo. Tab. icon. & Hist. Trifolium siliquosum Schottenslee: & rulum. Lotus trifolia siliquosa Monspeliana Schottenslee Von Nempeler. Sed vel hæc dux figure vnus plantæ duobus diuersis in locis [quæ diuersarum plantarum essent] à Compilatore

Taberna posita, palam omnibus faciunt, eum instar nocturæ cæcutire, vt qui imaginariè herbarum figuras, quò plures aliis nouisse videatur ctingit.

An porro Polygala Cæsalpinj? quæ in maritimis nascitur, similis vulgari Melilot: latiore folio, molli: flore singulari, in summis ramulis grandi, pallido: siliquam fert longam, & quadrangulam, exiguis feminibus, gustu adstringente.

Genevæ toto anno in horto virens nullos flores protulit, quæ aliàs passim inibi inuenitur florens in pratis mense Maio, etiam Aprili Monspeffuli, ac quoque Iunio Curie Rhetorum. Basileæ vidi florentem Septembri anno 1595. in horto D. Chemeletii. Frequens est autem Clusio, in omnibus Pannoniæ, & Austriæ pratis, sed Narbonense paulò durius videtur, quod idem quoque asserit C. Bauh. qui non longè à Bruct/ quæ, itur ad Thermas Helueticas, collegit.

An Polygala

la

Locus:
tempus


TETRAGONOLOBO LOTO similis siliqua.

A Pud ill. nostrum Principem piæ memoriæ inter fructus peregrinos visa hæc siliqua, uncias duas longa, simbris ornata quatuor, vt Lotus siliquosa flore fusco: quæ [vt solent legumina] ita conuoluta & contorta erat, vt comòdè minis exprimi potuerit. Plum, quod continebat fuit ferè quadratum, rubrum, magno vmbilico albicante notatum.

Descriptio

Semen.

TRIFOLIUM ARGENTATVM, floribus luteis.



Basis huius singularis, lignosa, gracilis, caules fudit palmares & longiores, tenues, hirsutos: fulsa terna altera parte argenteo nitore splendètia, pilosa: altera verò viridantia: flores cacumini caulium heret magni, lutei, hirsuti, è laciniato villosocalyce.

Defect.
Radix.

Folia.

Flores.

Trifolium 34. Synonyma: siue asperam Narbonense lu-

An Lotus fruticosus

teum. C. Bauhino phyt. An Lotus asperior fruticosus siue Narbonensis incana Lob. Obs. & Ic. Pl. Lotus asperior fruticosus Lobelii, Hist. Lugd. Lotus Narbonensis incana Grauelech wilcar Steinflee / Tabernæ.

In via Monspelio Frontigninianum versum, & in monte Seti floret mense Aprili.

Locus: &
Tempus

TRIFOLIUM RECTVM MONS- pellulanum.

Trifolium hoc etfi nonnulla cum Trifolio albo Dodonæi habeat communia, haud dif-

Descriptio

seu tamen discernitur, caules habet rectos, robustos, bicubitales, ramosos, minus teretes, quàm iam dicti Trifolii, imò nonnihil angulosos, glabros penitus, aut parum hirsutos: folia quina, bina minora, caulis apposita ad pediculorum exortum, reliqua tria extremo hærent pediculo, maiora, quibus folia Trifolii illius albi magnitudine cedunt & rotunditate, superant verò lanugine: flores confertim conglomerati priuatis furculis ex foliorum sine ortis, corollæ instar penduli, albicantes, inferioris folii rostellis atro-purpureo: siliqua in orbem radiatæ, numerosissimæ, tennes, 24. interdum, omnium pediculis medio-criter breuib, in furculi caput coeuntibus, vnicâ breviores, teretes, glabræ, fuscæ, seminibus refertæ nigricantibus, papauerina æquantibus.

Lotus silv. Diosc.

Lob. & Penæ Adv. Lotus silv. Diosc. cuius caules numerosi, bicubitales, à radice lignosâ, fibrosâ: folia terna, mollia, rotunda, fusco viore, læuia: flores lutei: vaginulæ numerosæ, teretes, rubentes, nitidæ, intus semine sinapi pari, cinericio colore. Sapor, qui leguminum quorundam & medicatus. Item Obs. Lotus silv. Adv. Hisp. Trebol. Sainage.

Lotus Libyca.

Hist. Lotus Lugd. p. 509. Libya Dalech. siue Lotus silv. flore ex albo subrubente, qui cum Loto Diosc. maximè congruere videtur, ita scribentis: Silv. Lotus, quam aliqui Lybicam appellant, plurima quidem in Lybia gignitur (hic enim ex græco legendum: λωτός ἀγρός, ἐν τῇ λιβύῃ ἔσται, ἐν τῇ λιβύῃ ἔσται λωτός, non ut vertit Ruell. Lotus silv. quam Trifolium minus appellant, absurdè, quia enim planta cubitalis & sæpe maior, ac ob id Trifolia omnia magnitudine superans, Trifolium minus rectè dici posset): caule bicubitali, & sæpe maiore, alis multifoliis, Loto Trifoliz pratensis similibus (non ut Ruell. interpretatur, foliis Trifolii pratensis.)

Ruell. rostratus.

Montpelii (inquit Clus.) Trifolii genus reputatur, cubitale aut amplius, & quodammodo fruticans ad læuam pontis Iuuenalis, quæ ad Graciantiam siluam iter est, ad Ledi fluminis ripam quod nonnulli *Oxytriphylon* Scubonii nuncupabant, aliqui *Lotum silv.* nec desuerunt, qui inter Cythi genera referrent. Similem porro, si non eandem, apud Granatenfes obseruabam, cubitali altitudine, & multis ramis præditam, per quos secundam nodos, & ramulorum diuaticationes sparsa erant terna semper folia, vni petiolo inherentia: flores summis ramis nascebantur, pusilli, candicantes, in globum quodammodo congesti: quibus succedebant cornicula, siue lobi, semen exile, rotundum, nonnunquam oblongiusculum, continentes. Eius autem plantæ duplex erat genus: vnum, candidioribus ramis, & albâ radice: alterum, caule & ramis ex albo purpurascens, similiter & radice, quæ tamen in quibusdam plantis magis rubere videbatur: Granatenfis quidam Medicus Lagopum esse volebat, refragantibus tamen notis. Ioannes Placa Professor in Academia Valentina [in quo regno frequentem obseruabam] *Perempsam* Arabum vocabat, eamque duplicem faciebat: primam, humidis nascentem, Granatenfi similem: alteram, montanam lanuginosamque. Granatenfes Mauritani *Enziuar* suâ linguâ appellant, & ex vtriusque radice, quæ sauis crassa, & magnæ ad nectonis particeps est, præsertim autem ex rubescente, serapium conficiebant ad dysenteriam vile. Huius semen ex Italia missum Loto fruticoso nomine, & natæ ex eo plantæ hanc Clusius.

Lotus fruticosus.

Nobilitate & doctrinâ insignis Medicus Iac. Vtenhofius misit Montpelio nomine *Trifolii Scribonii*. C. Bauh. phyt. *Trifolium* 46. siue rectum Montpelienis flore rotundo.

Montepessuli prope aquas. Semen missum Florentiâ per D. Iosephum Calabonum nomine *Trifolii fruticosi* Candiz, satum Montbelgardi id horto Ill. C. W. prouenit: erat semen minimum nigrum in parua & tenui siliqua: nos re. seruamus in olla Hieme reponenda. Ad ripam (ait Hist. Lugd.) Ledi amnis haud procul Montpelio in stagnum maximum defluens visitur. In Angliæ vdis.

TRIFOLIUM ALBUM, RECTUM hirsutum valdè.



Myltis hoc Trifolium ex eadem radice stolonibus, rectis, cubitalibus, & bicubitalibus fruticatis, gracilibus, lignosis, teretibus, hirsutis, & ramosis: folia canâ lanugine pubescunt, terna, quædam subrotunda, potissimâ propria & parua, cum paruis duabus appendicibus: superiora in obtusorem mucronem desinunt, & ex iis quædam maiora, ad quæ appendices etiam magnæ, ita vt sint quina folia, sapore insigniter citra morsum vllum, aliamve ascitam qualitatem adstringente: flores extremis ramulis emicant plures iuncti, positi patulo: singularium forma, quæ Trifolio Asphaltio, sed color candidus, ex calyce valde hirsuto & viroso: iuxta calycem & flores foliola longa, breues, crassiusculæ superueniunt siliqua, coloris spadicei, forma stercoris magni muris caudati: semen in iis flauescens.

Lotus siluest. quam copiosam in Lybia gigni tradidit Dioscor. an nascatur in Italia non animum [inquit Matth.] affirmare. Equidem herbam quandam sepius vidi ac legi in incultis & pratis nascentem foliis Trifolio amulis, bicubitali caule, quàm plurimis adnatis, luteis floribus, & quibus cornicula prodeunt semine plena, Fœnugreci, modo, odore non ingrato. Sed an hæc sit vera Lotus silv. nondum compertum. Ceterum turpi erroris notâ inuendus est Matthiolus, vt qui figuram absque descriptione proponit, habet is quidem descriptionem, sed ex Diosc. repetitam, addito luteo florum colore, quam inposit. com. simul cum figura demit, & substituit Lotum satium pro syluestri. Eius patronus omisâ priore figurâ Lotum etiam satium supposuit non factâ mentione prioris iconis. Figura igitur, quam olim exhibuit pro Loto Libyca in multis conuenit cum nostro Trifolio, albo, recto, hirsuto. Alia species est Medizæ, siue Trifolii peregrini Dodonæo gall. quam aliqui Glaucem [itali s.]

[talís Gess. hort. in append.] existant, alii Anthyllidem, Polygalam alii. Verùm Dodonæi iudicio maiorem videtur habere similitudinem cum Oxytriphyllo, à Scribonio descripto. Idem in hist. frum. & in fol. Trifolium candidum vocat: quod studioforum plerique Glaucem, alii Cytisum faciant, nonnulli herbarii Oxytriphylon. At Scribonii Oxytriphylon à Trifolio bituminoso non differt. Cytisus frutex est. Cum Glaucè autem similitudinis quoque nihil, aut exiguum habet.

Lob. & Penæ Oxytriphylum alterum Scribonii, & herbariorum, quorum Icon displicet: siliqua enim longiuscula, quales solent esse in Trifolio recto Monspeliano.

Trifolium autem, de quo hic agimus, Valer. Dourez Oxytriphylon Scribonii Lari vocabat, vti competimus eius manu adscriptum. Missum etiam Monspelio per Nobiliss. virum D. Iac. Vtenhouium Medicum, cum hac inscriptione. *Trifolium candidum Dodonæi. Inter meas plantas Monspeulanæ inuenio me adscripsisse. Pes leporinus, Glaux quibusdam.* Dedit plantam siccam D. Rentzius, hoc titulo: *Dorycnium Casabona Florentia & in horto Bembi.*

Frater attulit nomine Loti siliquosæ collectæ in via Monspelio versus Frontignanum, ei in Phytopinace dicitur Trifolium 62. siue siliquosum villosum. Cur autem hoc Trifolium ei dicatur 62. non videmus, potius erat dicendum 47.

Lotus filu. Matth. appellatur ab Hist. Lugd. An Cæsalp. Glaux, quæ in asperis nascitur, præcipue maritimis?

Genevæ nobis in horto provenit. Abundat teste Lobelio & Pena Monspelii iuxta Gramontiam siluam. D. Agerius attulit ex Italia cum Orbanche adhærente radici.

TRAGOS DVPLEX CÆSALPINO.

Post Trifolia, Medicam, Lotum corniculatam, Glaucem, Polygalamque, Cæsalp. Tragum ponit, eamque duplicem tradit, ita scribens: Tragus in maritimis nascitur: ramulis multis ab eadem radice procumbentibus in terram, lignosis, tenuibus, dodrantalibus: foliis pusillis, nigricantibus: in cacumine siliquas candicantes fert: & fructus Glauci similes, sapore vehementer astricto. Alterum genus in totum grandius, bicubitali altitudine: foliis Glaucis, latioribus, vtrique sapor acerbus, tum foliis, tum fructui, qui velut grana Tritici asseruata, & in aculeum, infirmum tamen, definit. Dioscorides hoc nomine vnam numerat: inter fruges alteram, quæ & Scorpium vocatur, in maritimis nascens, pusillus frutex in terram procumbens, oblongus, non magnus, dodrantalis, aut maior: folia autem non habet: in ramis veluti acinos pusillos, rufos, magnitudine Tritici, acuto cacumine, gustu multum adstringente, numerosos. Plinius inquit, Herba Tragos, quam aliqui Scorpion vocant, semipede alta, fruticosa, sine foliis: pusillis racemis, rubentibus: grano Tritici, acuto cacumine, & ipsam maritimis nascens: alibi eandem Tragion, & Scorpionem vocat, veprem sine foliis, racemis rubentibus ad medicinæ usum. Sed quod sine foliis traditur, repugnat prædictæ plantæ: At suspicor hanc conditionem adiectam esse propter æquiuocationem, cum Scorpio Theophrasti, quam Theodorus Nepam verit, cui nulla folia, nisi spinæ pro foliis habeantur, vt in Asparago, quod Plinius significauit cum de Tra-

gio [Trago] dixit, veprem esse sine foliis, non enim Tragos spina est, sed hoc Nepæ Theophrasti conuenit. Hæc Cæsalpinus, qui quas plantas tradat pro Trago perquirant Lectores. Quam dicit siliquas & fructus ferre similes Glauci, Trifolium album, rectum, hirsutum valde, iudico, Dodonæo Trifolium candidum dictum, de quo præcedenti capite locuti sumus.

Considerandum an primus sit fortè, quod Monspelienfes Dorycnium vocant. Nostrium An Dorycnium rectum Monspeulanum dicerem. Tragum secundum Cæsalpini, si responderet fructus, siue seminis descriptio: planta alioqui multam habet affinitatem cum eius Glaucè. Neuter porro Tragus cum Trago Diosc. conuenit, & Plinii, qui bene representatur Hist. n. lib. II. per vnam marinam, vbi Tragi æquiuocationes.

ABSUS FOLIIS TRIFOLII.

CAP. XLV.



Est herba palmarum magnitudine, vel aliquantò maior, foliis Trifoliis, sed rotundioribus, quaternis singulæ alæ appendis. Flores paruos, albos, & semina Piri seminibus proxima ferens, quam Prospero Alpino de plantis Egypti, cap. 31. teste, incolæ sermone vernaculo Absus vocant.

Flores

Locus

TRIFOLIUM HALICACABVM, SIVE veticarium.

CAP. XLVI.

Caules fundit cubito longiores, villosi lanugine obductos, in ramos alternatim ortos, diuisos: filia terna, non raro quaterna, sena, aut septena, hirsuta, ita certè vt extremum folium longè reliqua magnitudine excedat, Oleæ folio maius: ex alarum ortu prodeunt pediculi, quorum cacumini insident siliquis flosculi lutei, parui: quibus succedunt insignis magnitudinis turgidæ vesicæ, fusæ, lanuginosæ, semina claudentes duo, teste Dod.

De Cæsalp.

Folia

Flosculi

Vesica

Cicer. filia



Atachis similia, Cicer. filia al;

Dod. error. tetrum, Dodonæo missum ab Alphonso Paucio, Acad. Ferrar. Professore. Sed non placet pro hoc apud Dod. poni iconem Ciceris silu. trifolii, ni forte error Typographi, qui posuerit alterum pro tertio.

Inuenitur [inquit Anguill.] planta admodum similis Dorycnio: verum quum nesciam an sit fornifera, non possum illud certò statuere.

Trifol. Halicacabum, seu Vesicarium Camer. *Trifolium Halicacabum*, seu *Vesicarium* vulgò dici ait, aliis verò Cicer. silu. quibusdam etiam, ac satis ineptè Dorycnium. Folia plarumque quaterna, vel quina gerere, vt Loto annumerandum videatur.

Latius C. Bauh. phyt. *Trifolium* 55. siue *Vesicarium*. Scribit Clus. Trifolii quoddam genus, satis amplis foliis pro plantæ exiguitate, à magnis & membranaceis vesiculis, quibus semen suo pericarpio continetur, appellari.

Locus & tempus. Montbelgardi prouenit mihi in horto Ill. Ex. C. V. Virt. ex semine Francofurti allato, quod adhuc Octobri floruit, & semina protulit.

VULNERARIA RVSTICA.

CAP. XLVII.

Deser. Radix

Caulis

Folia

Sapor

Floris



Radix longa, recta, lignosa, sapore leguminoso: caules dodrantes, teretes tenues, hirsuti, nonnihil rubentes: folia pinnata, Galega, pinguicula, infernè hirsuta, modicèque canescentia, supernè ex luteo virecentia, sapore subdulci & subacri, atque in extremis ramis floribus subiecta sunt, lata

sunt, digitata, oblonga, membranea: flores in ramulorum fastigio glomerati, luteoli, odore nullo excellent: quorum singuli ex vesicula lanugine argentea, villosa emicant, parui, folio supremo reflexo, sub quo lateralia duo parua, quantum minimum rostrata stamina lutea continere amplectuntur.

Synon. & Nomina Dod. dicitur gall. *Anthyllis prior*, *Anthyllis magna*, additis Diosc. *Anthyllon*, *anthyllon* & *anthicellon* Plinii. Glauciola quorundam, à nomine Glaucæ, quia Glaucem existimant, quamvis non sit vera Glaux. Eidem in fol. *Anthyllis Lenti* similis, ab Auic. *Zahara* vocata: qui sic describit: Herba hamilis: cauliculi dodrantes: folia Lentis modo, ex pluribus formata, vtraque verò mollia, tenui lanugine incanescunt: flosculi in cauliculorum fastigiis lutei, complures, veluti in umbella coniuncti, post quos siliquæ paræ, in quibus semen exiguum, radix tenuis, duriscula. Hæc ille, cuius icones propolite respondent nostræ vulnerariæ rusticæ, verum discrepat eius descriptio, & multò magis gallica. Nec conuenit ea planta cum *Anthyllide* Diosc. quod fa-

Dod. errore

Anthyllis
Diosc. nō est

cilè animaduertent, quibus nota erit planta, cuius picturam exhibet Dod. Quænam obsecro similitudo cum Lente, qualem in *Anthyllide* requirit Dioscorides.

Gesl. de hort. *Vulneraria Consolida*, aut *sideritis*, cognomine *ruffica*: quidam Germani inquit simpliciter *mündfraut* in Bernensium agro *Gachheil* nominant.

Lob. Obs. *Anthyllis leguminosa* Belgarum, *Anthyllis prior* Dod. *Glaux quorundam*. Ic. Pl. *Anthyllis leguminosa* Belgarum.

Hist. Lugd. *Lotus latifolia Dalech.* cui flores priusquam aperiantur subrubentes, cum reclusis sunt lutei. Semen paruum in breuibz siliquis. *Anthyllis* quorundam maior. Item alibi *Anthyllis prior* Dod. Si *Rapodus* aliquid peritici habuisset stirpem, non posuisset figuras & historias vnius plantæ in diuersis locis.

Tab. *Lagopodium* flore albo weisser *Batzentflee*. Er rursus, *Lagopodium* flore luteo, Geeter *Batzentflee*. Sed Compiler Tab. non demonstrat vbi obseruauerit flore albo, nec etiam describit vt oportebat.

Clus. *anthyllis leguminosa* flore luteo Lobellii, cuius genus purpurascens flore Fertaria accipere meminuit.

Ponæ in Baldo *Glaux Guilandini* & Belgis *Anthyllis leguminosa*.

Vulneraria rusticam, siue *Panaces Chironium* læue denominatum Gesnero, & *vulneribus* admodum commendatum, vidi Geneuæ, Lugduni, & passim in Germania florens mense Maio: Montspeli vidi flore purpureo mense Martio delatam ex montibus circa Gangen. Gener Chellerus attulit ex montibus supra Apenninum in pratensibus quibusdam Iunio collectam, flore [vt ait] sanguineo, vel rubro, & ex Gotthardo flore exquisitè albo. In aridis quidem [vt refert Hist. Lugd.] in macris, & sabulosis prouenit, & agrorum marginibus, Lob. teste, Lutetiani agri, Narbonensis, Germaniæ & Angliæ. Brabantis hortensis est. Dod.

TRIFOLIUM IN GENERE.

CAP. XLVIII.

Trifolium, Triphyllon Græcè, siue Triphyllon plura complectitur genera, [aiunt Monachi in Mef.] & species & differentias.

Multa sanè [teste Brunfels.] Trifolia sunt genera, quorum septem in recepto sunt vsu. Tametsi porro plura passim in pratis ac viridariis Trifolia inueniantur genera, omnibus planè nota, non tamen de his, vt placet Matthiolo, tradidit Diosc. cap. de Trifolio, sed de eo tantum genere, quod à bituminis odore *Asphaltitis* dicitur, de quo etiam scribit Gal.

Innumerabiles auctore Trago Triflorum inueniuntur species. C. Bauhinus verò septuaginta sibi notas tradit.

Trifolium tandem, tradente Brunfelsio, pratense olus est, & futuræ tempestatis prænuncium. Notum est etiam, quando album Trifolium abundè flourerit, sequenti anno, futuras esse aquarum inundationes. Sophocles venenolum esse putat, nam in eo serpentem inuenies nunquam. Fracast. de cont. Trifolium omne ad contagiones valere scribit.

Nos etiam complures plantas Trifolii nominè do-

ne donatas numeravimus, novimus. At sane inter se longe distantes, si vel radices solum, caules, folia, flores, & fructus, si sporem etiam eorundem & gustum, locum item & tempus, vires denique, temperamentum, & usus, trutinam non vulgari pensiculis. Numeravimus autem sequentes. Foenugracum, Foenugracum silu. Dalechampii. Loti genus edule, *legum.* Hon. Bello dictum. Trifolium Aphalites, siue Bituminosum à Diose. traditum. Et aliud huic planè simile, sed inodorum, siue non foetidum. Trifolium item Americanum. Pro Trifolio insuper bituminoso & Oxytriphyllo quidam exhibent Lotum sativum nobis existimatum: Trifolium odoratum Fuchio. Corn. Lonicero. C. Bauh. Trifol. Caballinum Gesf. Balsaminum Cæsalpino. Novimus & Trifolium 48. C. Bauh. de quo nos sub Loto silu. ex codice Cæsareo. Trifolium odoratum Matth. quod est Equinum Dodonæo, Vrsinum Trago, Aureum Gesnero, nobis Trifolium odoratum, siue Melilotus vulg. odorata, flore luteo & albo. Trifolio huic præcedenti, siue Melidoto vulg. odorata affinem folio angustiore. Trifolium Italicum folliculis rotundis C. Bauhino, quod nos appellamus Melilotum magno semine, rotundo, rugoso. Trifolium Italicum siue odoratum Italarum Gesneri, à nobis Trifolium Italicum inscriptum, siue Melilotus Italica corniculis incurvis. Est & Triphyllon Securidaceæ genus. Adhuc Trifolium pratense, cum quo Amatus confundit bituminosum siue Aphalites. Et aliud maius purpureum, brevius & longius epicum. Maius purpureum Clusii, siue maius secundum. Acre & maculatum, quod an ad præcedentia, vel sequentia, referri possit, nondum nobis certò constat. Alpinum Rheticum Astragaloides Montanum aliud, minus, Thalo purpureum, varians flore rubro, & albo. Stellatum purpureum Monspessulanum. Angustifolium spicatum. glomerulis Personæ Cherleri. Parum rectum, flore glomerato cum vnguiculis. Capitulo glomerato, rigido. Pratense album, siue mas. Maius albo flore incanum Clusii. Pratense, flore albo, minus, & femina glabrum. Parum album Monspessulanum, pilosum cum paucis floribus. Albo incarnatum spicatum, siue Lagopus maximus. Idem flore albo. Angustifolium Hispanicum, siue Lagopus angustifolius, flore dilute rubente. Trifolium quibusdam quod vulgò Lagopus dicitur, nobis verò Lagopus trifolius quorundam. Trifolium caule nudo glomerulis glabris & membranaceis, & Lignum cum glomerulis. Cum glomerulis ex caulium geniculis. Cum glomerulis tomentosis secundum caules. Folliculaceum, siue Vesicarium minus, purpureum. Parum quoddam, siue Lotus pratensis purpurea, Dalechampii. Pratense luteum mas, flore minore, semine multo. Saxatile hirsutissimum, siue argenteum. Pellatum Creticum. Trifolii genus procerum Gesnero est Medica vera, à nobis dicta Medica maior, erectior, floribus purpureis. Novimus & Trifolium, quod cognominatur Medica silu. flore luteo, & rubro. Trifolium cochleatum marinum, aliis Medicam marinam vocatam. Medicam scutellatam, Dodonæi. Trifolium cochleatum primum. Trifolium 19. siue scutellatum C. Bauhino, quæ nobis Medica orbiculata. Cochleatum 2. Dodonæi, nobis autem Medica echinata glabra, cum & sine maculis nigris. Trifolium 20. siue cochleatum C. Bauhini, nobis Medica magna turbinata. Echinatam magnum hirsutum,

Tom II.

siue Medicam echinatam magnam, hirsutam. Cochleatum fructu duro spigoso C. Bauhini, siue Medicam nostram hirsutam echinis rigidioribus. Tortuosum quibusdam dictum, siue Medicam minorem Gesneri: an nostram Medicam echinatam hirsutam. Echinatam arvense secundum C. Bauhini, quod nobis Medica echinata minima Coronatum, siue Medicam coronatam parvam Cherleri. Trifolium siliqua falcata C. Bauh. siue Medicam nostram lunatam. Trifolium 29 Trifolio siliqua falcata simile C. Bauh. siue Auriculam muris & leporis Cam. Trifolium halicacabum, seu vesicarium. Corniculatum glabrum & minus C. Bauh. vel Lotum corniculatum nostram glabram, & feminam: & hirsutam, marem. Corniculatum majus & hirsutum C. Bauhini, quod Loti corniculati maior species à nobis appellatur. Lotum corniculatum siliquis singularibus, vel binis, tenuibus Cherleri. Sil. quosum luteum C. Bauh. quod Lotum siliquosam luteam Monspelicium vocamus. Siliquosum rubrum eiusdem dictum à nobis Lotus Siliquosa flore fusco tetragonolobus. Trifolium 57. C. Bauh. quod nominamus Loto siliquosa aliquomodo similem Coronopum ex codice Cæsareo. Trifolium siliquis Ornithopodi C. Bauh. de quo agimus titulo, Lotus Ornithopodi siliquis. Trifolium argentatum floribus luteis. Trifolium rectum Monspessulanum flore rotundo C. Bauh. hoc nobis Trifolium rectum Monspessulanum. Trifolium asperum Narbonense luteum C. Bauhini. Candidum Dodonæi, quod nos album, rectum, hirsutum valde dicimus. Acetosum, siue acidum flore albo & purpurascens, quod Oxys appellatur. Acetosum flore luteo, à nobis Oxys lutea nuncupatum. Trifolii maioris & foetidi nomine, semen Anonidis non spinose, purpureo flore, Clusii. missum. Aculeatum Creticum. Hepaticum, siue Trinitatis herbam flore cæruleo, multis aureum dictum. Hepaticum flore albo. Hepaticum flore rubro. Hepaticum flore pleno. Trifolium palustre. Fragaria certè, si Tragum sequimur, *trifolium* dicemus. Porro Foenugracum silu. nobis nominatum, Lotum silu. iudicamus Diose. quam & Trifolium minus nuncupat Tragus. Sed inter Trifolia etiam recensetur. Melilotus 5. Tragi. Ceruinum aquaticum Gesneri. Adulterinum. Baste harsille Aretii & Iosephi Simleri de albis. Nucifruticea & Trifolium apud Diose. de Maiorana quoque dicitur, quemadmodum & de Medio. De Orchide [albo, calcari longo] & staphide agria Monachis in Mef. & de Satyrione Fuchio de comp. med. Tulipa demum quibusdam, Camer. hort. teste, Triphyllum Satirium vocatur. Trifolia tandem arbores & frutices traduntur Hist. n. g. tom. 1.

FOENUGRÆCVM

CAP. XLIX.

IN Trifoliorum classem cooptandum meritis Defecti Foenugracum, vel ob *folia* quæ terna, maiuscula, crenata, modò oblonga, modò latiora quàm longiora, supernè virentia, infernè glauca: tota planta [inquit Cæsal.] femicubitum non excedit, estque ramosa. *Flor.* Flores ex foliorum sinu exeunt Lupinorum floribus pares, subcandidi: *siliqua* siliqua palmares & sesquipalmares, brevissimis pediculis hærent falcata, mycetone tenui, longo, inani *Hh*

echinata
magna hirsuta
Medica la-
nata
Auricula
muris &
leporis Cæ-
sar.

Lotus
corniculata,
glabra
femina
& hirsuta
Loti cor-
niculata
maior spe-
cies

Lotus silu.
quosa floribus
fusca tetra-
gonolobus.
Coronopus
ex cod. Cæs.
Lotus Orni-
thopodi silu-
quis.

Trifolium rectum
Monspess.
Trifolium al-
bum, rectum
hirsutum
Calde
Oxys
Anonidis

Fragaria
Foenugr.
silu. Tragi
Maiorana.
Medium
Orchis
albus, calcari
longo
Tulipa
Arbores
Nucifruticea

Defecti
Folia

Flor.

<i>Nomen</i>	<i>semen</i> flauescens, odoratum, inæquale, inferiore earum parte continetur fere quadratum, Cæsalpin. teste, odore quodam, culm decoquitur medicato, succumque reddens glutinosum, seminis Lini modo: <i>radix</i> lignosa, singularis.
<i>Nomina Telæ.</i>	<i>Télæ</i> , & inter Diosc. reiectæ anas appellationes <i>théus</i> <i>agorês</i> [forte <i>agorês</i> vt Plin. Jalis <i>théus</i> , <i>agorês</i> alius, aliis <i>théus</i> , aliis <i>agorês</i> , Romanis <i>Fœnugræcum</i> . Egyptiis autem <i>ionis</i> dicitur. Sed maior pars Græcarum appellationum à filiquum est similitudine sumpta: hæc siquidem corniculis similes sunt. <i>Cosatis</i> quidem simpliciter à cornu dicitur. <i>alpas</i> enim cornu significat. Sic <i>Aigoceros</i> à caprino cornu quemadmodum à bubulino <i>Buceros</i> , quod nomen Theophrastus plantæ indidit. <i>Fœnugræcum</i> porro, quod Diosc. <i>Telin</i> vocat, Plinius Siliciam dicit. <i>Columella</i> ab ique alio attributo Siliquam, Varro Siliculam.
<i>Silicia. Siliqua. Silingia.</i>	<i>Caterum</i> Loto filu. semen simile <i>Fœnugræco</i> [<i>théus</i>] Diosc. adscribit, sed multo minus: folia verò circa ramos Loto similia, trifolia, sed minora, & maius dorsum habentia.
<i>Epiceræ.</i>	Scritbit Hermol. in Diosc. <i>Epiceræ</i> ab Hipp. vocari, quoniam semen habeat simile corniculis.
<i>Carpum Carphos dion.</i>	Inuenio (inquit porro) & <i>Carpum</i> in nostris, & Græcis Autoribus vocatum. Item <i>Carphon</i> , quasi <i>stoscolum</i> , Diosc. quoque dixit <i>Boton</i> vocatum: quidam Lobon (siliquam legendum,) non Loton credunt, Ego & Lotum dici posse video. Plinius Anonim similem <i>Fœnugræco</i> , Diosc. Loton <i>fenariæ</i> , aut <i>Rutæ</i> faciunt, vt æstimare liceat, Lotum <i>fenariam</i> cum <i>Fœnugræco</i> eandem videri, aut persimilem.
<i>Lotum fenaria.</i>	Sed quid de hac re Corn. Quod Plinius inquit, <i>Fœnugræcum</i> <i>Carphos</i> vocari dicit, videtur etiam Diosc. agnoscere, si <i>agorês</i> [<i>festuca</i>] & non <i>carphos</i> legatur. <i>Buceras</i> autem & <i>Agoceras</i> appellationes sunt Hippocraticæ, velut Galenus in glossis testatur, & lib. de alim. vbi quomodo in cibum veniat, exponit, Non modò <i>Telin</i> , inquit, sed etiam <i>Buceras</i> , aliqui verò <i>Agoceras</i> , nominant hoc semen, Nostri hodie cibum <i>Fœnugræci</i> ighorant, sed medicum vsum retinent officinæ, maximè Chirurgorum, qui partim Latinâ voce corruptâ appellant, partim ad Græcæ vocis similitudinem <i>Bockeborn</i> nominant. <i>Vulgus</i> tamen <i>Sibengereit</i> vocat, quomodo alii Lotum fatinam appellant.
<i>Synonyma linguarum.</i>	<i>Dodon.</i> <i>Tragus</i> , <i>Lonic.</i> & <i>Cordus</i> , singularis præter hæc tenus recensita ribil asserunt, quemadmodum etiam <i>Anghillara</i> , cui <i>Fœnugræcum</i> fatinâ dicitur. <i>Gesh.</i> & <i>Cæsalp.</i> Est siquidem hodie adè notum <i>Trifolium</i> <i>Fœnugræcum</i> , attestantibus id Lob. & Penâ Adu. vt qui <i>Letos</i> norit, neminem latere possit, quodd duntaxat differre videtur siliquâ, quâ maiore est, magisque adunata, & acutiori stylo. Item Obs. & Ic. Pl. <i>Fœnugræcum</i> .
<i>Satio.</i>	<i>Silicia</i> , teste Plinio, scarificatione feritur, non altiore quatuor digitorum sulco, quantoque peius tractatur, tantò prouenit melius. Rarum dictu, esse aliquid, cui prodest negligentia. Satum
<i>Locus.</i>	

Montbelgardi *Fœnugræcum* in horto E. C. facile prouenit. Genevæ, & non longè à Montpellier, vbi copiosè à multis feritur, vidi flores Novembri, & ex semine deciduo vites totâ hyeme ad mensum Ianuarii, quo mens quoque florebat Lugduni in horto Pharmacopæi Verdani. Florens præterea obseruauit Aprilis principio, & cum siliquis Maio.

Siliquis, vel *Fœnugræco*, vt refert Benzo, abundat regio Peruana, ita vt vinum etiam inde conficiant, quod bibunt.

Farina *Fœnugræci* molliendi & diffundendi vim habet. Trita verò cum aqua multa cocta imposita, ad internas & externas facit inflammationes, Cum nitro verò & aceto trita imposita, splenem minuit. Decoctum ad infusus commodum est, in muliebribus affectionibus, quæ ex inflammatione, aut præclutione vteri consistunt. Expressus ab ipso in aqua cocto succus, capillos & furfures, & achoras, manantia capitis vlcera repurgat. Cum asserino adipe pessi vice apponitur, molliens ac dilatan locos circa vterum, Vitide *Fœnugræcum* cum aceto, debilibus & exulceratis locis commodum est. Decoctum verò ipsius ad egerendum inanes alui contentiones, & ad graueolentes egestionis dyentericas prodest. Quod autem sit ex ipso oleum, id cum Myrto capillos repurgat, & cicatrices in pudendis extendit Diosc.

Vis eius [inquit Plin.] siccare, mollire, dissolvere. Succus decocti seminarum malis pluribus subuenit, siue duritia, siue tumor, siue contractio sit vuluæ, seu & infuso prodest. Furfures in facie extenuat. Spleni addito nitro decoctum & impositum medetur. Item ex aceto. Sic Scieriori decoctum. Diodes difficilè parientibus [instante partu tempore Dalech.] semen eius dedit acetabuli mensurâ, tritum in nouem cyathis lapæ, vt cum tertias partes bibissent, calidâ lauerentur: & in balneo sudantibus dimidium ex relicto iterum dedit, mox à balneo reliquum, pro summo auxilio. Farinam *Fœnugræci* cum Hordeo, aut Lini semine decoctam aqua multa contra vuluæ cruciatu subiecit. Item impositum imo ventri. Lepras, lentigines, Sulphuris pari portione mistâ farina curauit. Nitro ante præparatâ cute, capillus diuiliencia, perungit præcipiens. Theodoros *Fœnugræco* miscuit quartam partem purgati Nasluti acerrimo aceto ad lepras. Damion *Fœnugræci* semen acetabuli dimidia mensura cum lapæ & aqua nouem cyathis ad menses ciendos dedit potu. Nec dubitatur, quin decoctum eius vtilissimum sit vuluis, interaneisque exulceratis, sicuti semen articulis atque præcordiis. Si verò cum Malua decoquatur, postea addito mulso, potus inde ante caterrâ vuluis, interaneisque laudatur. Quippe cum vapor quoque decocti plurimum profit. Alarumque etiam graueolentiam decoctum *Fœnugræci* semen emendat. Farina portigines capitis, furfuresque cum vino & nitro celeriter tollit. In hydromelite autem decoctâ addita axungia genitalibus [tumentibus, inflammatis Dalech.] medetur: item pano, parotidi, podagra, chiragra: articulis, carnibusque, quæ recedunt ab ossibus, aceto verò subacta luxatis. Illinitur & lieni, decoctâ in aceto, & melle tantum. Carcinomata, subacta ex vino, purgat: mox addito melle persanat. Sumitur & sorbitio à farina ad peius exulceratum, longamque tussim. Dni decoctum donec amaritudo definat: postea mel additur. Est ex calefacientibus manifestè (Galeno talim. autore

autore) eundem vsum ad cibum exhibens hominibus, quem Lupini : præsumunt enim ipsum ex garo, ventris subducendi gratia. Et ad hoc multo magis idoneum est, quam Lupini, ut quod ex propria substantia nihil habeat, quod difficulter egrediatur. Editur etiam cum aceto & garo, velut Lupini. Et cum vino, & garo, & oleo, plarique Fœnugræcum edunt, ut Lapinos. Quidam etiam cum pane edunt, & satis hoc ipsi obsonii est, minus quidem ventrem subducens, sed neque caput tentans, quemadmodum id quod cum garo editur aliquorum capita tentat: neque stomachum subvertens: quod in quibusdam efficere Fœnugræcum solet. Succus ipsius cum melle sumptus, ad omnes prauos humores, qui in intestinis habentur, subducendos, est accommodus: suo quidem lentore leniens, calore autem dolorem mitigans. Quod autem absterforix facultatis sit particeps, intestina etiam ad excretionem insigat, sed parcius ei mel est admiscendum, ne mordacitas exuperet. In diuturnis verò thoracis circa febrem affectibus, pingues cum eo palmulas elixare oportet, ubi autem succum ipsum expressum copioso melli miscueris, ac rursus super carbones ad medietatem crassitiam coxeris, tum de mum longè ante cibum vi. At lib. 3. simpl. Fœnugræcum, inquit, calidum est ex secundo ordine, siccum ex primo. Et propterea feruentes inflammationes exacerbat: minus autem calidas, & in scirrhum induratas discutiens curat. Sed hæc Galenus,

Cæterum seminis decoctum maceratis in eo linteolis, & fronti adhibitis, oculorum fluxiones auertit, & non solum capillorum pediculos (Milben) extirpat, si caput hoc abluis, sed etiam efficit ut pulchriores, & longiores euadant. Semen clysteribus adicit Tragus, quibus aduersum tormina ab exulceratione orta usurpat.

Germina, teste Prospero de Pl. Aegypti cap. 42. mox à feminibus erumpentia, ex ipsique statim profilitentia plebei comedunt, præsertimque mulieres pingues fieri cupientes: per urbem multas massas terræ plenas seminum recenter productis germinibus vendendas iiferrunt.

Sciendum porro vnguentum ex Fœnugræco quod præparatur, & nō à Telo insula, nomen habet, à Diosc. præparari, quod recipit Fœnigræci lib. 5. olei lb. nouem: Calami lb. j. Cyperi lb. ij. quæ simul ad dies 7. in oleo macerantur, ita ut ter quotidie commoueantur. Deinde excolantur, & reconduntur. Alii pro Calamo Cardamomum: pro Cypero, Balsami lignum simul macerant. Quidam oleum antea his spissant, & postea Fœnugræcum in ipso macerantes excolant. Hæcenus Diosc. Plinius autem aliter hoc vnguentum, aut corruptissimè, præparari prodidit, qui dicit: Telinum sit ex oleo recenti, Cypero, Calamo, Fœnugræco: consentiens quidem hæcenus cum Dioscoride: sed quod addit: Meliloto, melle, & melino, Maro, Amaraco: Corn. ad Telinum pertinere non putat: & quædam exemplaria pro melle & melino, habere mello, nullā certā significatione: & melinum recipi in Telinum, satis absurdum esse. Hodie bene parari posse, sed non haberi. Cæterum vim ei tribuit Diosc. molliendi abscessus, & maturandi, ac concoquendi. Maximè autem conuenire ad omnes circa vterum duritias. Infundi etiam ægrè patientibus, quum excretis antea humoribus loci obaridi fuerint redditi: itemque ad sedis inflammationes. Vtiliter etiam infundi, frustra ad egerendum nitentibus. Fursures quoque & achoras

Tom II.

detergere. Et ad ambusta & perniones cum cera. Maculas etiam Solares deterere, & medicamentis ad faciei nitorem inducendum paratis misceri. Eligendum esse recens, & quod Fœnigræci odorem non admodum referat, & manus purget, & in sapore dulcedinem cum amaritudine repræsentet. Tale enim esse optimum.

FœNUGRÆCVM SILVESTRE

Dale champii.



Minus est satiuo, caule tamen dodrantali interdu: folia geit ternaria, & inter flores. hæc flores per totum caule: corniculatas siliquas multo breuiiores, fescunciales, recuruo, vâcuoque & tenui mucrone donatas, quàm in satiuo tamen latiores, semen quidem continentes minus

Descriptio
Caulis.
Folia.

radicem longam, lignosam, surculosam. An de hac Anguill. ait: Fœnugræcum silv. quo in multis locis vtuntur pro Meliloto: Hist. Lugd. Fœnugræcum silv. Dale champii. Gener Cherierus attulit Monspelio collectum in via Frontigniana versus Balleruch, florens Maio & Iunio, Iulio siliquas ferens.

Locus & tempus

TRIFOLIUM, SIVE LOTVS HIRAZUNE, edulis, siliquosa.

CAP. L.



Lotus, Trifolium, aut Loti genus est edule, si non. Bello credimus, in foro enim eius siliquæ, antequam durefcerint, reincipiant, venales reperiuntur, à pueris & foeminis libentissimè eduntur, succosæ sunt & dulces, Pisi recentis gustu: multos, tenues caules à radice profert, folia Trifolii, angusta, crassiuscula, aliquantulum

Folia.

mucronata, terna semper sibi coniuncta: flores luteos Pisi, quibus succedunt siliquæ rotundæ

Hh 2

Locus:
Semen.

Siliqua

Sapor seminis

Descriptio

Folia

Odor
Tactum
Flores.

Semen

Huius Trifolii Varietas

Trifolium Asphalites
Trifolium Asphalites

falcate, ac pro ratione plantæ, magnæ; inter segetes inuenitur, & in marginibus agrorum frequentissimè, herbaque omnibus nota est. Huius semen Astragalo Monspeliensium non multum ab simile Clusio videbatur, quod cum atis ab honorio acceptis terræ commiserat, sed non natum erat & illi, & mihi; habebam enim ego à chariss. Fratre C. Bauhino, quod ab eodem honorio nomine *hieracium ex Creta* acceperat. Continebatur autem in siliquis corniculatis, vncialibus, semicirculi initar incuruis, geminis, cōcauā parte canaliculatis, pedicello paruo in foliatum exitum, corniculorum extremum capiente, dependentibus, denso sarcto, paruum, leuiter compressum, quale ferè Fœnugraci, sed minus, sapore dulci. Color tum siliquæ, tum seminis ex ruffo obsoletus.

Hieracium, seu *hieracium Cretica*, Belli. *Lotus Cretica*, Galp. Bath.

TRIFOLIUM ASPHALTITES

sive bituminosum odoratum, & non odoratum.



IN fruticem excrefcit Trifolium bituminosum, cubitalem & sesquicubitalem, virgulis rigidis, incanis, ac etiā nigricantibus. striatis: folia tetra, per primam adolefcētiā rotunda, mox oblongātur, in acuminatum mucronem desinentia, incana tidentem & hirsuta, odore bituminis fastidioso, tactu glutinoso.

so flores non planè glomeratim congesti, sed oblongiori capitulo dispositi, colore purpureo-violaceo, quorum singuli vnum folium latius furrigunt, duo lateralia replicant: quorum complexu quartum comprehenditur apiculus luteus continens: ex calycibus oblongis, striatis, villosis: semen nigrum, asperum, hirsutum, in cuspidem desinens foliaceum, eiusdem cum reliqua planta odore, Calsp. sapore medicato. Congener huic, totoque ad eodē vultu idē iamdiu colo, excepto eo, quod folia quidem odore omni penitus destituta sunt: flores verò suauiter, licet obscurè, redolent.

monachi in Mes. Trifolium Asphaliticum, siue acutum, aut odoratum, præfens Trifolium appellant. Matth. autem Trifolium Asphalite, & rursus lib. 4. c. 19. Lotum Egyptiam, quam, vt & reliquis Loti species, Serapio Handachochā indifferenter nominat, & cuius semine Oleum exprimitur, Mauritaniis ad articulorum dolores expetitur. Neque enim fieri ex vulgaris Trifolii semine, vt quidam aberrantes existimarint, sed ex omnium Lotorum semine, & ex eo tantum Trifolio, quod Asphalites Græci vocant. Idem

hist. Germ. Trifolium Asphalites, hargflæ vocat.

Cast. Dur. Trifolium bituminosum. Bellon. Obs. Trifol. cognominatum Menianthes.

Dodonæus Trifolii huius meminit his verbis: *trifolium*, & vi. Dioscor. scribit *trifolium* Græci nominant, plerique *Menianthes*: alii *Asphalites*: nonnulli *hieracium*: Nicander etiam *trifolium*: Romani Trifolium acutum, aut odoratum: nostra atas Trifolium bituminosum. Auicennæ Trifolion est, non autem, vt quidam existimant, Handachocha. Sub Handachocha siquidem nomine Auicenna Dioscoridi Lotos dictas comprehendit. Describit Trifolium istud etiam Scribonius Largus cap. 163. Mirum hinc quid olim legebant apud Diosc. *trifolium*, nec mentionem faciebant villam Oxytriphylly Scribonii.

Lonic. describit & depingit, primo anno prouenientem plantam dicens: Lotus, quem Diosc. describit, simpliciterque Lotus nominat, ex aliis præcipuus est, diciturque Græcis Trifhyllon, Lat. Trifolium, Dioscor. etiam Asphalition [hargflæ] ab odore, & Oxytriphylion, ac Menyanthes. Hæc ille, qui describendo Diosc. secutus, ait habere folia similia Loto arbori.

Gesl. de hort. Trifolium quoque simpliciter vocari scribit, & Asphalites [bituminosum] quod cum aduleum sit, Oxytriphylion etiam dici mereatur: quamvis hoc aliqui Veterum [vt Plin.] specie distinguant à duabus aliis eiusdem generis speciebus.

Trifolium Asphalition Turn. Angl. vocari tradit Pidge trifely Claien.

Lob. & Pena Adn. describunt ac dicunt, Asphaliteum seu Menianthes Diosc. Idem Obs. Trifolium Asphaliteum siue bituminosum, & Trifolium odoratum Plinii, quod synonymum in K. Plomiserunt.

Camer. hort. Trifol. bituminosum. Gal. lib. de Ther. ad Plon. de hoc Trifolio Asphalite, siue Hyacinthino. Matth. in epist. Galen. negligentia arguit in legendo Diosc. lib. 4. cap. 106. Ex Sophocle tamen & Simo Medico Plinius idem prodidit, & Aboali cap. 697. cum errore florid, id quod Scaliger animaduertens exoter. exerc. 153. dist. 10. inquit, hoc non casu, sed sapientis cuiusdam cogitatu productum ad experimentum fuisse. Sed Iul. Alexandr. respondet, librum illud haudquaquam à Galeno fuisse editum, & ob id non esse opus aliquo defensionis genere. At de his inferiùs agemus.

Hist. Lugd. vnius plantæ duas figuras exhibet: sub titulo Trifolii Asphalitis, vnam quidem rotundis foliis, alteram verò longioribus.

Tab. communia nomina retinet. Asphaliticum Trifolium, inquit Marantha, quod in Campania insignem bituminis odorem habet: in Hetruria transplantatum, nullum prorsus spirat: quod in causa fuit, vt ibi pro Asphalite non haberetur.

Textor de peste vulgò Trifolium foetidum nominat.

Trifolium bituminosum Calsp. Dictamnium ab incolis Iluz propter vires aduersus venena celebratas nuncupari scribit, & à Dioscoride Elicion, quod nos hæctenus apud Diosc. non legimus.

Casparus Bauhinus Trifolium Bituminosum *trifolium bituminosum* & *asphalites* nuncupat: ac apud Matthiolum hæc scribit: folia, quæ ante caules prodeunt, rotunda sunt, vt figuræ Matth. minores ostendunt, cum verò caulescit, & adulta est, acumi-

acuminata redduntur, quare neutiquam binæ figuræ retinendæ, vt fecit Herbarii Lugd. author, alterum rotundis, alterum longioribus foliis nominans, idcirco vnâ figurâ exprimere volumus. Et rursus in animad. in Hist. Lugd. ait: prior figura prius prodeuntia folia exprimit, altera verò cum & rotunda & longa exprimat, seruanda erat, reiecta priore. Nos huic animaduersioni ita respondemus: Si Matthioli prior icon falsa erat, poterat reici, vel retineri, monendo falsam eam esse: verum cum non sit falsa, sed bene exprimat nuper natam plantulam, & iam dudum sculpta esset, cur Typograpus Rouillius nactus perfectiorem & plures partes exprimentem, non curasset etiam sculpendam, & vtramque proponendam? Ea etiam quam exhibet C. Bauh. imperfecta est, non enim exprimit prima exeuntia folia, nec posset per eius iconem nouam nouella plantula agnosc, cum ille voluerit vnâ figurâ, vtrique exprimere folia, eccur non fecit, & ita minus mancans habuisset iconem.

In agro Lucensi, circa Lunam & Carram di Massa, & vniuersam Hetruriam nouissimum. Hyemis frigora apud nos, insit Camer.) fert. Semen ex Italia allatum, terræque mandatum plantam profert foliorum odore bituminoso, Italicæ nihil vel parum inferiorem. Semen itidem sapore italicum refert. Sin autem, semen in Germania educatæ plantæ rursus feritur, statim sapore & odore producta planta deficit. Et vel hinc patet verissimum illud esse, quod Porta prodidit, è variis nimirum terræ qualitatibus in quas illis varia herbarum genera exoriri, natali solo, cœloque familiaria. Sic tophacea terra Asphaltites Trifolium producit, vnde mons Neapoli imminens tophaceus, à Galeno Trifolinus dictus est, ex huius Trifolii copia. Nascitur, Hippocrates non Cous, sed Hippiatros apud Dodon. ait, locis fragosis, vt Ruellii conseruare habet. In Belgio ac Germania, nusquam suâ sponte, sed in hortis tantummodò satum prouenit, vbi Iulio & Augusto demum mense floret. In maritimis, Cæsalp. testis, nascitur gracili solo, copiosum in Ilua. Ego verò florentem obseruavi mensibus Octobri, Aprili, Maio, & Iunio Monspelii circa Castelnou. In horto præceptoris Fuchsi Tubingæ, & Tiguri apud Gesnerum. Patauii virentem Decembri. Basileæ in horto D.D. Fœl. Plateri, & Theod. Zvingeri florentem mense Iunio, & Septembri cum semine maturo, ob loci fortassis humiditatem: ubi non fert Hyemem, nisi reponatur, nec primo anno caules producit: floret Augusto. In Creta nihil vulgatus.

Semen & folia, auctore Dioscot. in aqua pota, pleuritidis, vrinæ difficultati, morbo comitiali, in principio aquæ intercutem, his, quæ vtero strangulantur, auxiliantur. Ducunt etiam menses. Exhiberi verò debent seminis vnc. iii. foliorum vnc. iiiii. Opulantur etiam commorosis à bestiis venenatis folia trita: cum aceto mullso pota. Quidam narrant totum decoctum fruticis & radicis, & foliorum, si commorosis à serpentibus affundatur, dolores eximere. Verum si ea aqua, quæ quis curatus fuerit, alii, qui vlcus habeat, affundatur, ipsum eadem pati, quæ illi, qui commorosi fuere. Quidam etiam in tertiana febre, folia, aut semina tria cum vino bibenda exhibent: in quartana quatuor, velut quæ circuitus febriles exoluant. Ammiscetur etiam antidotis Trifolii radix. At Veteres alii, quod Dod. testatur, non radicem modò, sed & semen ipsis admiscuerunt vt ex plurimis compositionibus. lib. 2. de Antid.

Tom. II.

apud Gal. videre est: Theriacis, videlicet Aëlii Galli, Zenonis Laodiceæ, Claudii Apollonii, Eudemi, Heraclidis, Dorothei, & Hera.

Trifolium Plinius scit credi præualere contra serpentium ictus & scorpionum, ex vino aut posca, seminis grans viginti potis: vel foliis & tota herbâ decoctâ: serpentisque nunquam in Trifolio aspici. Præterea celebratis autoribus, contra omnia venena pro antidoto sufficere 25. grana eius, quod Menyanthes appellatur, tradit. Multa alia præterea in remediis eius scribit. Sed ipsum contra sententias eorum grauissimi viri autoritas mouet. Sophocles enim Poëta venenatum id dicit. Simus quoque è Medicis, decocti, aut contriti succum, insulum corpori, eadem vredines facere, quasi percussis à serpente tradit. Ergo non aliter vtendum eo censuerit, quàm contrâ venena. Fortassis enim & his venenis inter se contraria erit natura, sicut multis aliis. Item animaduertit semen eius, cuius minima sint folia, vtile esse ad custodiendam mulierum cutis gratiam, in facie illitum. Ita Plinius.

Et hanc sententiam Simi Medici à Plinio adductam [inquit Corn.] habet etiam Galenus in lib. de Ther. ad Pison. Trifolium, inquit, herba quæ Hyacintho similis est, quum Veris tempore prægnans sit, & semen agresti Nicotia simile habet, si quis tunc ipsam valdè decoquat: Deinde morsum phalangii, aut etiam viperæ, eâ aquâ perfundat, sanat ipsum, & statim doloris exortem efficit. Si verò quis in alio non commoroso, sanum locum eodem fomento perfundat, eundem sensum, & eisdem dolores, omnes commoroso similes inducet, vt hic effectus reuera admiratione dignus sit, eandem herbam & morsum sanare, & sanum locum bestiarum venenatarum modò malè afficere. Nec Galenus. Nec alia est Dioscot. sententia. Non enim de eadem numero aqua, Dioscotidis verba accipienda sunt: nam hæc res nihil miri exhiberet: sed de ea, quæ eadem specie est, quæ contrariam vim in commorosis, quos lædit: non sine admiratione ostendit. Impudenter itaque Galenus damnatur, velut qui Dioscot. sententiam non intellexerit, ab his, qui ipsi parum intelligentium stupiditatem hac parte declarant. Gratiam autem habeo pro Galeni patrocínio aliis, qui librum illum inter spurios referre mallent, quàm pati, vt Galenus hic cæcutisse dicatur. Siue autem genuinus, siue spurius Galeni liber sit, non propterea à vico docto, qualis Matth. videri ambig, tam frivole stupiditatis, aut ignorantie stigmatem notandus, sed potius fideliter, quod equidem verè ingeniosum virum decet, excusandus fuit, vt qui non simpliciter locum sanum dixerit, sed duntaxat à dicto morsu liberum, quod Galenus his verbis innuit: Sanum locum in non commoroso. Nec locus simpliciter sanus medicamentum tale quod requirit.

Hippocrates [ait Dodon.] Trifolium non solum menses prouocare, sed & fetus cum sumptum, tum appositum expellere tradit: Mulier, inquit, si ex partu non fuerit purgata, Trifolium in vino albo bibendum dato, hoc etiam menses educit & fetus. Et alio loco: Idem etiam (de Trifolio scribens) appositum menses erumpere facit, & fetum eiicit. Cæterum Trifolio, quod Asphaltion Galeno dicitur vis calida & sicca, vti bitumini, vtriusque tertio ordine, proinde potum laterum dolores ab obstruktionem iuuat, & vrinam, mensesque prouocat.

Matth. vbi prob.

Matth. vbi prob.

Matth. vbi prob.

TRIFOLIUM AMERICANVM.

Descriptio.

Caulis.

Folia.



Flores.

Fructus.

dantenus similia, latiora tamen & per ambitus magis crenata, flores in summo ramulorum exeunt, exigui, subcandidi, spicatum digesti, fructus inde rotundi, aliquantulum plani, Aphaces (Vicia latâ siliquâ, flore luteo) à nobis (inquit Dod.) descriptæ semini ferè similes. Radix in plures diuiditur.

Ceterum Trifolii Bituminosi speciem odor grauis, & eius odori haud multum dissimilis, Dodonæo ostendere videtur.

C. Bauh. phyt. Trifolium n. siue Americanum. Tab. Trifolium Americum Indianis her. fle. Ita & Lob. Obs. & Ic. Pl. & Cam. hort. Hist. Lugd. & Dodonæo Trifolium ex America in Belgium illatum est, vbi Iulio & Augusto floret. Cæsalp. Trifolii quoddam genus latifolium ex America allatum, odore ingrato.

Locus.

Nos Trifolium Americanum primò vidimus Basileæ in horto D. D. Fælic. Plateri. Eius semen Sturgardiâ accepimus, ferendum Montbelgardi in horto Ill. C. Vvrt.

ARBOR TRIFOLIA INDICA.

CAP. LI.

Descriptio.

Caulis.

Folia.



Haud quicquā curans adminicula, per se rectâ surgit, caule, vel si maui, trunco, quadrato, breuissimis pilis hirsuto: foliis ornata quorū priora exciderant, parte inferiore quoque hirsutis, ternis, angustis, Trifolii bituminosi, ex longo pediculo, saporem manifestum

non animaduerti:

Sata in horto Ill. Principis, palmâ non multum altior erat Iunij principio.

LOTUS SATIVA, ODORATA, annua, flore cæruleo.

CAP. LII.

Planta est cubitalis, & sesquicubitalis, caule recto, gracili, striato, nonnihil anguloso, multis alis concauo, inani: folia Meliloti vulgaris, terna iuncta, pinguiscula, per ambitum crenata, longiora quàm lauiora, sapore acriusculo: floribus verò glomeratis, pallide cæruleis, Trifolii pratensis vulgaris æmulis, minoribus, præcipua ex pertinet odoris suauitate quaesita est gratia: quos echinata excipiunt oblonga capitula, semine miliaeo fuluo resecta: radix gracilis, simplex, alba, paucis anctâ fibris, rectâ ferè demittitur.

Lotus sativa Cordi, Camer. hort. & ad Hist. Synon. Matth. Lotus odorata, aut sativa petitis stirpium.

Matth. in com. in Diof. cum magnis iconibus tam lat. quàm italicis, & Hist. germ. Lotus sil. siue Lybica, an nascatur in Italia, non audeat affirmare, quòd non meminerit, à se ibi eam vspiam vifam, Verum in Bohemia copiosam admodum prouenire, floribus in capitulis cæruleis, vocari germ. wilder Steinklee / & Sibengezeit. Et in Epit. ab Arabibus handachocham nominari. Et hac Matth. Vbi verò Lotus hac Matth. spontanea, vel silv. de qua hoc capite agimus, compariatur nobis nondum constat, nec scimus cur non potius dicatur sativa, quàm vulgaris Officinarum Melilotus, siue Trifolium odoratum vulgare. Olim Matth. dicebat se sæpè vidiſſe herbam quandam floribus luteis, de qua dubitabat, an Dioleoridis esset. Iconem etiam proponebat: nunc illam plantam reiciit, & silentio planè præterit, quasi nunquam vidiſſet, vel falsa commentus esset: hic silent, silent etiam eius glossatores & patroni.

Castori Lotus silu. sed malè nostro iudicio. Dod. Lotus nuncupatur, Latin. Lotus virbana, & Lotus sativa, quibusdam Trifolium, nunc & Trifolium odoratum, Gall. Trefle odoriferant, Germ. Sibengezeit / Belg. Scien ghetude cruyt. Fuch. his addit, Officinis simpliciter Trifolium dici. Tragus hoc depingit & describit, dicens.

Scribon. Larg. [Oxytriphylly nomine] plantam hanc depingit. Germ. Sibengezeit appellat, propterea quòd singulis diebus septies odorem habeat & toties etiam amittat, quamdiu in horto creuerit. Decerpta autem & exsiccata odorem suum perpetuè retinet, qui certè pluuiosa temporis constitutione, & tempestate imminente multò vehementior est, sic sanè ut totas zedes odore suo compleat, quo nomine tempestatum nuncia, German. verò wetterfraut haud iniuriâ dici posset.

Sunt porò qui præter omnem rationem huic nostro Trifolio peregrino, Nardi nomen tribuant. Ast Latine aliter appellari non potest, quàm Trifolium acutum & odoratum. Epigæ ger vnd wolrichender fle. quo de Diof. lib. 3. cap. 114. Cognominatur à Nicandro in Theriacis Menianthes & Tripetalon, à Diofcor. verò Nicnion, Asphaltion, Oxytriphylon. Columella denique lib. 6. cap. 16. Trifolium Symorianum.

Quoties

Quoties in Galeno, Plinio, Rhase, & Nicolao, Trifolii mentio habetur, toties Trifolium odoratum hoc intelligendum, quemadmodum Manlius rectè docet.

De odorato Latifolio scripsere & Arabes, Serapio cap. 9. & Auz. lib. 3. cap. 343. apud quos bæcilii nomina leguntur: *Handachocham*, *Lyrhos*, *Garch*, & *Thuff*. Quod si scripta horum examinauerimus, deprehendemus Trifolium odoratum, domesticam illis esse *Handachocham*, pratense verò siluestrem. Et hæc *Tragus*, cui si verum Trifolium bituminosum cognitum fuisset, hanc plantam nunquam existimasset *Asphaltion* Dioscor. Plinii, Galeni, & aliorum, vt Scribonii. Lectores igitur admoniti sint, ne fidem viribus à Trago huic plantæ tribuas, quum sint Trifolii bituminosi: *Oxytriphylly* quoque nomen non malè conuenit Trifolio bituminoso.

Hist. Lugd. pag. 506. Trifolium odoratum alterum, siue satium. Et pag. 508. Lotus silu. altera Matthioli. Sed & nimium rudis in re botanica, confarinat Hist. Lugd. si vel leuem plantarum cognitionem habuisset, non duas vnus Trifolii figuras pro diuersis exhibuisset.

Plinius Loti satia foliis, Corn. teste, ascripsit, quæ Dioscor. expresso succo attribuit. Officinæ Trifolium odoratum vocant, *wolricheiden* Hæc, alii *sibengegeit* appellant, quòd septies in die odorem mittat.

Confusè sanè *Lonicæ* hæc describit, qui modò Trifolium odoratum, & Lotum satium: modò Trifolium acutum, Plinii *Asphaltion*, Arabum *Andachocham*, Officinarum simpliciter Trifolium cognominat.

Gesn. de hort. quam olim malè Lotum silu. esse putabat, nunc Lotum satium, Herbam cascadeam *Sigerfraut*, *Stündfraut* appellat. Item Trifolium caballinum in Italia plerisque vulgò vocatum. Aliis etiam *Triphyllon*, *Trifolium*, & *Trifolium minus*, *Sibengegeit* interpretatur, sed falsò.

Robert. Const. apud Amat. in Diosc. *Cytisus*, Trifolium odoratum esse non potest [vt vult Amat.] quia Trifolium odoratum Herbariis, vt *Lonicero*, nihil aliud est, quàm *Asphaltion* Plinii, & trifolium *Dioscoridis*, quod singulis annis emoritur. Ecce stirpium peritus (si diis placet) non obserauit aliam etiam plantam dici trifolium odoratum, qualis est Matthioli & Amati trifolium caballinum, quod multum à *Loniceri* trifolio odorato differt, nempe, quod nostra Lotus satia est: malè etiam, vt antè dictum, vocat *Asphaltium* Plinii, & trifolium *Dioscoridis*.

Quam rectè porro *Anguill*. Lotum hunc, in Flandria, & Hispania *Ballamum* dictum, siluestrem vocet, intelliget is, qui titulum huius capitis vel obiter inspexerit.

Mich. Neand. in *Physicis*, trifolium *ὄξυτρίφυλλον*, aut *ἀσφαλίων* vocat, at confundit trifolia, nec bituminosum bene olet, quod asserit.

Loti alterum genus peregrinum apud nos *Ialos* [inquit Cæsalp.] trifolium *ballaminum* vocant, ob odoris vehementiam, qui spirat è semine, flore non in spica, sed in rotundis capitulis cæreleo. Serapio hoc intelligere videtur per *Melilotum*, inquit enim, Herbam esse foliis rotundis, &c. putauit antè à Diosc. ita vocari colore *Croci*, odoratum. Lob. & Penz. Hortorum odora Lotus, est verior Diosc. Germ. *Sibengegeit* fraut. Belg. *Schüengreyden clauier of fruyt*. Cum arbores, frutices, & alia, specie, *fatom* 1.

cie, fructu, & floribus differentes plantæ Loti dicantur, quapiam bonitatis commendatione, potius quàm inter hæc conuenientia, videtur hæc nomenclatio huic trifolio attributa, quasi quòd cæteris trifoliis excelleret, inque paradijs & latioribus locis oriretur, dictum foret trifolium *λότος*, siue volupe, & voluptas, à verbo *λάω*, vt sit adlusum ad *λατοράδους* *Villicos*, & Epithetum apud *Homerum*, qui vocat *rosidum* Lotum, Deorum lubescientiam. Proinde coniectura plena fert, veram urbanam illam, verè dici Lotum, quæ domi hodie colitur, decerpiturque. Et Obs. Hortorum odora Lotus, Perperam Trifolium *Asphaltium* Diosc. *Fuchio*. Lotus, satia, siue trifolium odoratum alterum *Dodon*. Lotus silu. *Anguill*. & *Matth*. An Mel *Frugum* *Theophrasti* Angl. *Gardenclauier*. Hisp. *Trebol Real*.

C. Bauh. phyt. trifolium 45. siue odoratum, vel Lotus hortensis. Quibusdam *μυρὶν αἶμα* *Theophr.* 7. hist. 14. Mel *frugum* Gaza verit.

Ponz in Bald. Lotus siluest. *Anguillare* & *Matth*.

In hortis tantum habui, vt *Geneux* ex semine deciduo, florentem Maio & Octobri, virentem Ianuario. Sicuti *Lugduni* quoque *Batiliæ*, & *Montbelgardi* quotannis se renouabat. *Dodon*. authore florèt Iunio, Iulio ac Augusto in hortis cum in superiore, tum in inferiore Germania, in Italia, Gallia, ac aliis regionibus scribitur, nec spontè prouenit quod *Anguillara* testatur. Et licet in *Baldò* reperitur, tamen & ibi primum lata fuit.

Extractus, ait Diosc. succus addito melle oculorum argemas, nubeculas, *λευκωματια* [albugines vocant] & quæ pupillas oculorum obscurant, expurgat. Vim autem mediocriter concoquendi, & resiccandi possidere Gal. ait, & in caliditate, frigidatisque coniugatione mediam quodammodo, ac temperatam esse. Quæ certè facultates, id attestante *Dodonæo*, in hoc odorato trifolio conspicuæ sunt. Nostri, pergit *Dodon*. oleum in quo folia, floresque odorati huius trifolii macerata, recentia vulnera glutinare tradunt, & ad puerorum enterocælas, bubonocælasque plurimum commendant. Interponitur & arida herba vestimentis, quæ ne à tinea rodantur, defendere putatur. *Dodonæus* (nescio inquit Cam.) quibus rationibus adductus, existimat haberi posse pro *Oxytriphyllo* *Scribonii*, ad venena & morbos pestilentes commendato.

Frequentissimè feritur apud *Heluctios* propter quoddam casei secundarii genus, *Claronensem* vocant, quod hac potissimum herba condire solent. Vide *Gesn. de operib. la&c*. Eius olei vsus est ad corroborandos nervos. Et hæc sua *Camerer* Gesnero desumpsit, qui malè horti sui Medici *Dodonæum* citat, cum *Tragus* eadem scripserit, nec vnquam *Dod.* horum meminere. Trifolium hoc in vino decoctum, vt vult *Matth. Ger.* melle aut saccharo præparatum, & epotum emollit ac dissoluit omnis generis apostematata, lenitque dolores. Conducit etiam vtero indurato.

Cum vino dulci verò, farina seminum *Linii*, seu *Foenugræci*, capituli que *Papaueris* fiunt fomentationes, & cataplasmata, vteri, intestini recti, pudendorum tumoribus calidis aptissima. His adiciunt quidam ouileum, aut oleum commune. Cum gallis autem & creta incoctum, & illitum manantia capitis vlcera sanare traditur. Cum vino coctum & stomacho applicatum dolores sedat. Aceto tandem, & oleo rosaceo permixtum, & admotum, mitigat dolorem capitis.

Cancer
huius folio-
rum.

Macula fa-
cies

Folia.

Elusculi.

Semen.
Radix.

Melilotus
minor.

Trifolium
virginicum.
Genus du-
plex.

Lotus silu.

Melilotus
3.

Aqua decoctum, & oleo rosaceo ammixtum can-
cro medetur. Succus florum expressus, obscuri-
tati visus succurrit. Calidè in aures instillatus,
dolores mitit. Perperam adhuc Fuchsius, Hist.
Lugd. hoc notante, trifolii Asphalitis vires o-
mines à Diosc. assignatas, huic trifolio attribuit.
In Belgio, concludit Anguill. & Hispania mulie-
res ex eo oleum parant, quod maculas faciei ab-
tergit, & vtile est matrici & calculosis.

TRIFOLIUM ODORATUM SIVE MELI-

lotus vulgaris flore luteo.



HOminis p-
ceritatem
alsequitur,
multis alis ru-
bescentibus,
trifolio bitu-
minoso nō di-
similibus: folia
trifoli praten-
sis, vel potius
Loti satuae,
crenata: si scu-
li in spica di-
gesti, foliorum
numero & fi-
tu, vt in Geni-
stæ floribus,
sed valdè exi-
gui, odore sua-
ui, mellito, co-
lore plurimum
luteo, rariùs al-

bo: succrescunt veluti vascula parua, nigra, ma-
gnitudinis Lentis, ex breuib. pediculis, continen-
tia, semen luteum, paruum, veluti cornu con-
tortum: radix crassa, profunda, plerumque cauli-
bus productis, pereuns.

Figuram huius Meliloti malè posuit Brunfels.
meo quidem iudicio, nomine Fragariae. Vulgaris
& maior Melilotus, autor Tragus, ad Melilotum
Dioscoridis lib. 3. cap. 41. refert, quam ille Zoode-
tem, & Orthanon cognominat. Marcellus &
Manardus Sertulam campanam vocant, Cato
Sertam campanicam, Auerthoes Alchilamelech
hoc est, Coronam regiam appellat. Quibusdam
Trifolium vrsinum, germanicè Berentflee di-
citur.

Cæterum, huius Meliloti duplex est genus:
Vnum, quod florem spicem profert lutei colo-
ris, & alterum, flore quidem etiam comans spi-
ceo, sed candidi coloris, quod in Hist. germ. Groß
gemein Steinflee mit weissen blümlin, Melio-
tum maiorem candido flore nuncupauimus.

Corn. Lotum silu. vocat, de qua Plin. vt etiam
de Libyco nihil habeat, quamque officinæ ex
Meliloti generibus faciant, ac Groß Steinflee
& Gilden Steinflee vocent. Et sanè, inquit,
Meliloti appellatio, Lotum refert. Et quia nul-
lam præ se fert gustu adstrictionem, inter Meli-
lotos Fuchsi quidem iudicio, rectè connumerari
non potest, idè Saxifragiam luteā, Steinbrech
appellauit, dicens: perperam eum officinæ non-
nullæ pro Meliloto vsurpant.

An Monach. in Mef. dist. 11. cens. 328. Trifolium
maximè odoratum, quod vulgè Romæ Tribu-
lum, (quasi Trifolium) appellatur, quodque largè
mulieribus, & alius venditur. Ad hanc dubitatio-
nem quid Matthiolus? Trifolium, inquit, odora-

tum, Romani & Hetrusci vulgè vocant Tribula.
Hoc equi audissimè in pabulum suum sequun-
tur: vnde factum est, vt quidam Trifolium equi-
num appellauerint. Florem edit alium, atque
etiam alicubi luteum. Item in com. cum magnis
fig. & in Ital. Lotus vibana: quam eam Trifoli
odoratam plantam esse cenfeo, quam antea Cy-
tium faciebamus, quamque Romè vulgè Tribula
dicunt, & alibi in Italia Trifoglio cauallino, sob cau-
sam dubio procul iamam dictam. Germani hu-
ius flores colligunt ac pro Meliloto passim v-
tuntur, quemadmodum & Bohemi, consultiùs
fortasse, quàm Itali. Huius Trifolii odorati ne-
que Dioscorides, neque Gal. quod sciam, quic-
quam meminerunt. Non desunt, quid velint
esse plantam, Theophr. Mel frugum appellatam,
quam ipse recenset inter Loti genera. Et Hist.
germ. nominatur Lotus vibana, sicut & in Epi-
tome etiam cum addit. Camerarii, & Melilotus
falsè dicta. Hacille. Qui pro Loto quondam vi-
bana, Lotum corniculatam exhibebat, mutans
nunc sententiam, nec causam indicant.

Ad eundem modum, Senensem fortè securo
Cast. Dur. Lotum satuiam vocat, quod mini-
mè congruit.

Amat. profectò ad aliorum errores obseruan-
dos mediocriter oculatus, ad suos ipsius talpis
cæcor: sic enim clamat. Qui herbam Mauram,
Flauram, vel plantam Leonis dictam, Trifolium
esse putarunt, omninè hallucinati sunt, quum
herba Maura illa dicta, Trifolium odoratum,
Dioscoridis Cytus sit. In dignoscenda liqui-
dem Cytiso herba multi decepti sunt, ignoran-
tes, quòd vera Cytisus ea sit herba, quam vulgus
Trifolium odoratum, Itali Trifolium caballinum
nominant. Ex quibus palàm sit Amatium ipsum
in dignoscenda vera Cytiso, talpis cæciorem ef-
fè: Trifolium namque hoc odoratum Cytisus
Dioscoridis non est, quod ex lectione historiar
vtriusque manifestum euadit. Adhæc icon huius
plantæ apud Amatium est lib. 4. c. 12. sub titulo Lo-
ti siluestris.

Dodonæus Syluam plenam speciebus huius
Meliloti profert: dicitque vocari à quibusdam
Trifolium odoratum: Tr. caballinum: Tr. vrsinum:
Melilotum germanicum: Melilotum officinarum: Cy-
tisum Veterum: Melilotum Auicennæ: Melilotum Ve-
terum: Sertulam campanam, & Coronam regiam.

Malè Lonic. meo iudicio hanc plantam bis
pingit lib. 5. ac primum quidem cap. 93. nomine
Meliloti Dioscoridis, herbæ regiz, ac Meliloti lu-
teæ: Et rursum c. 94. sub Meliloto alba.

Gesn. de hort. Melilotus vera flore luteo, &
albo: vulgi Trifolium aureum.

Lob. & Penz. Adu. Melilotus germanica &
gallica. Obs. Melilotus germanica, quo nomine
& in Ic. Pl. Tom. 2. p. 43. appellatur, Melilotus
lutea, & alba Auicennæ, Trifolium odoratum
Dodonæi.

Lotus silu. Cæsalp. quæ vulgè Trifoli, & cor-
rupto vocabulo Tripuli vocatur.

Cam. hort. & ad Hist. germ. Matth. Trifolium
caballinum dicitur, quod Bononienses loco verè
Meliloti vsurpent: & Melilotus vulgaris, quæ po-
tius Lotus sit.

Hist. Lugd. duas icones vnius plantæ ponit.
Prima, p. 507. cui titulus, Lotus satui altera
Matthioli. Melilotus officinarum: Hæc opinio de
Loto nititur duntaxat opinione, non rationi-
bus. Et alteram, p. 51. quæ inscribitur Melilotus
vulgaris, siue Trifolium odoratum Dodonæi.

Thal. Hæc. Trifolium odoratum: Dod. seu

Melilotus vulg. flore tam citrino, quam candido.

Tab. ic. p. 907. & Hist. p. 206. Lotus silu. flore albo. *weisser: oder wilder Steinflee.* Item Lotus silu. 2. precedenti in omnibus similis, exceptis radicibus magis fibrosis, & spinis caulium. Et rursus Ic. p. 910. & Hist. p. 211. Melilotus vera, Lotus vrbana, Melilotus vrbana, nobilis coronata. Sertula regia. Sertula campana, quibusdam Melilotus saxifraga, & lutea. Arab. *Alabile lemelech.* Ital. *Meliloro.* germ. *honigflee/ gemein oder groß Steinflee / Schüchlein & Unser leiben frauen schuchlein.* Passim prouenit, tota Estate ferè floret, flore albo & luteo. Compiler Tab. cui tanquam imperito indulgendum, proponit tres icones vnius plantæ, & nomina tum latina, tum germanica inter se confundit, nec vllam descriptionem exactam exhibet, ac falsè vnam ex suis Melilotis dicit spinosam.

Iconem duplicem Theod. Dorst. habet, sed Meliloto non conuenientem

Gefn. de coll. stirp. Trifolium odoratum, quodd Matth. Cytisum facit, omnino est Lotus. Ast licet hæc dicat Gefn. ego tamen hanc pro cytiso apud Matthiolum non inuenio.

C. Bauh. apud Matr. & in phyt. Trifolium 43. que odoratum, seu Melilotus offic. flore luteo, & albo.

In fluuiis, & fluminū ripis prouenit, Cæs. Ego obseruavi montis pelii. Basileæ etiam florentem Octobri inter horraum Xenodochii & propugnaculum. Copiosè quoque mense Iunio & Iulio ad ripam fluuii Birsæ. Genevæ passim Iunio mense. Adhæc prope Asphac, vnde in hortum Ill. E. C. transuli flore, albo: floret Augusto. Eadem copiosè prouenit inter Sulz & Bollswiller. Genevæ abundat iuxta Arue fluuium.

Romæ mulieres Trifolium hoc distillant, pro suffumigiis, & aliis variis odoramentorum lasciuiis faciendis, Monachis in Mel. autoribus. Scit Matth. eius succo oculorum nubesulas deleri. Virgatur tota planta vnguentariis, quodd odoratum aquam ex ea faciant, in qua chirothecas macerant, ac lauant. Utuntur [inquit Dodon.] hoc vniuersæ Germaniæ officinæ in omnibus medicamentis, ac compositionibus, pro Veterum vera Melilot. Odorata siquidem est, & nonnulla amaritudinis particeps, ac simul digerendi facultatem cum nonnulla adstrictione habet. Hinc igitur emplastris & cataplasmatis digerentibus, ac resoluentibus, nec non concoquentibus, tum & acopis omnibus vtiliter admiscetur. Ex huius tandem floribus [teste Cæs. alp.] per destillationem extrahitur aqua, quæ per se quidem nequaquam grata est, at aliis odoratis ammixta, valde gratum & perseverantem odorem spirat.



MELILOTVS MAGNO SEMINE
rotundo, rugoso.



crenata, nonnunquam & integra: *flosculi* meliloti, vulgaris Meliloti, veluti in spicam digesti, suauolentes: pericarpia Pisi magnitudine, rugosa, semen modò vnum, modò duo continent.

Camer. inter icones Melilotum hanc depingit, vocatque Italicam. Cui inscriptioni in horto addit, vocari & Melilotum veram, in Martis autem incolis hodie *Malatro*, in Romano agro *Coronellam*, ad imitationem Antiquorum, qui Romæ Sertulam campanam nominabant. An Anguill. Illyricorum *Diselina*? C. Bauh. Trifolium 54. siue Italicum, folliculis rotandis, quod Northus. à D. Io. Ostryvaldo Loti vesicanz nomine habet.

Sata in horto E. C. floret Iulio, semina profert matura Augusto & Septembri, quo mense apparuerunt plantæ nouellæ ex semine deciduo. Semen huius misit Tossanus Carolus pro Melilotto Hispanica.

semen continet. Aded coactæ breuitatis reperitur interdum, ut palmarum non superet, *radice* prolixa, & simplici, cuius pichuram exhibemus.

Vbi collegit, aut vnde attulerit Genner Cherlerus p. m. non occurrat.

DVorum cubitorum altitudinem allequitur, *radice* simplici, rectâ, lignosâ, albâ, gracili: caulis angulosus, purpurascens, rigidus, levis, arcto tubulo peruius, plurimis ramis brachiatus: *folia* tri-gemina, pediculis rubescentibus appenduntur, supremo margine rotundata, leuiterque

Melilot. Italica. Melilotus vera. Malatro. Coronella. Diselina. Trifol. Italicum. Lotus vesicaria.

Locus. Tempus.

MELILOTO VULGARI NOSTRATI affinis, folio minore & angustiore.

Angulosos & prolixos caules profert, minores quam vulgaris Meliloti, diuisione parifolia itidem tergemina, odorata, sed non parum tum longiora tum angustiora, quam nostratis vulgaris, per ambitum crenata: *flores* lutei confimiles spicati sed singuli minores: pericarpia circularibus lugeis rugosa, singula vnicum

TRIFOLIUM ITALICUM, SIVE
Melilotus Italica corniculis
incurvis.



gura Meliloti Syriacæ, & nostra figura displiceat, alterâ iconè proponimus ramum ex Lobelio, qui in tabella simpliciter cum magis recurvis sil quis est: Siliquam etiam ex nostra Syriaca separatim, & ramum cum flore eius, quæ provenit Basileæ: in Syriaca, quod monuit Lobelius, siliqua videtur magis curvâ, falcatâne. In Italica porro, quod ait idem Lobelius, esse minis falcatas propter degenerationem, asserere adhuc nequimus.

Corn. dicit, notam officinis Melilotum herbam & Germanis dici welschertlee [Italicum Trifolium] quibusdam etiam Coronam regiam. Verum ne scimus in quibus officinis fuerit Italicum Trifolium in usu eius tempore.

Fuchs. vocat Meliloti tertium genus, & Italicam Melilotum, maioris, ut loquitur, discriminis causâ, quam optimam & legitimam arbitrat, scribens ex Italia in Germaniam delatam, flore luteo, odorato, semine in sil qua lunato.

Quamvis autem Tragus iconem eandem habeat cum Fuchsio, nomine Meliloti maioris, cuius alia passim species extat, non tamen videtur de eadem planta scribere: siquidem Meliloti

huius aliam speciem, ne dicam passim, sed hæcenus nullibi, extare animadverti. Quam ob causam puto illum intelligere Medicæ speciem per suam descriptionem, de qua alio loco.

Genes. appellat Trifolium odoratum in Italia sic dictum, & indicat Lotum siluestrem, & non Melilotum. Dodonæo Gall. olim vera Melilotus, quæ usurparetur Romæ, & in Italia, ideoque Melilotus Italica vocata sit, Germ. Italanische/ aut Römische Melilot, Gall. vray Melilot. Alibi tamen aduersus Fuchsum dicit cum vera Meliloto non per omnia communicare. Fuchsius, inquit, Melilotum Italicam [welschen sicus fle] nuncupat, & cum vera Meliloto convenire existimat: cum qua tamen non per omnia convenit. Siliquæ sunt recurvæ, in quibus semina parva, ac forma Gemis: radicibus firmioribus, longis, tenuibus & fibrosis: & varium & mutabile caput.

Melilotus Syriaca, omnium, quas noverunt Pena & Lob. huius familiar, optima & elegantissima, quæ est Syriaca Alepo ferri cepta. Patavii sata, quasi soli satini oblita, non nihil corniculis minis falcatis, lanatis, & ignavio odore degenerat. Hanc Obs. describunt melilotum Italicum & Patavinum. Trifolium corniculatum alterum Bod. Ic. Pl. Tom. 2. pag. 43. melilotum Italicum & Patavinum. Et precedenti pag. 42. melilotum Syriacum odoratum, melilotum, sertulam campanam. & coronam regiam. Miramur nos Lobelium non meminisse Meliloti Italici, cuius mentionem facit Matth. & alii plures, quæ non primum anno 1562. ferri cepit ex Syria, & degeneravit in Italia, ut Lob. ait, sed longè antè extabat in Gargano monte, teste Matth. cuius recordatur Fuchsius, anno 1540. Licet porro Lob. lib. Ic. Pl. duas proponit icones, non propterea facimus duas diversas plantas, quandoquidem ipsemet dicit Italicam & Patavinam ex Syriaca degenerare.

Hist. Lugd. melilotus, siue Sertula campana nuncupatur.

Thal. Harc. Trifolium corniculatum alterum D.D. meliloti maioris tertiam speciem Tragi. Figura quidem Tragi, non descriptio autem, Meliloti Italici correspondere videtur, quod Thalis non animadvertit.

Calp. Bauh. phyt. Trifolium 44. siue odoratum corniculis reflexis. melilotus siue Sertula campana Matth. ic. p. 440. melilotus Syriaca odora Lob. part. 2. p. 42. Item Trifolium 52. siue corniculatum 2. melilotus maior Tragi. melilotus Italica & Patavina. Non sciendum erat C. Bauhino Trifolium 52. sed dicendum potius 45. vel 44. Nam & Matthiolus de Italica differens, non separat à Meliloto Tragi, quod iconem atinet.

Is autem in Diosc. vocat melilotum legitimam, seu odorat, Sertulam campanam, Arabum Alchil-melich, Hilp. Coronam de Roi, ubi figura deest, quam ponit in com. cum mag. fig. & Hist. Germ. welsch steinflee: Boh. Romanice. cognominat. In Epit. verò cum Cam. glossis figertraut appellat, quod nomen non placet, cum alterius plantæ sit.

Vidi Monspelii & Basileæ in horto D. D. Iacobi Zvingeri. Portione nomine Meliloti vera ex Syria Val. Dourez, pulchrâ & integrâ me donavit Frater. Probabilissima [quod Matthiolo nemo negat] legitimaque Melilotus non modo in Campaniæ pluribus locis, sed etiam Gargano Apuleiæ monte provenit. Cuius semen in tenuibus corniculis inclusum nuper Venetia affert cepit. Testantur hoc Adu. quæ dicunt: E Syria.

Melilotus,
notâ
Trifol. Italicum.
Coronam regiam
Corn. nat.

Melilotus, Italica

Tragi. nat.

Trifolium
vatum,
tas silv.

Melilotus
Gera
Fuchsi

Locus

Melilotus
taurina

Melilotus
Syriaca
Lob. nat.

Lob. nat.

Sertula
pana
Thal. nat.
Trifolium
odorat

C. Bauh.
nat.

Melilotus
legitimam
M. affert

Locus

Pyriaco Alepo ferri coapta fuit, & coli superiori-
bus, nec antea, annis 1562, & tertio, cuius etiam
culei refecti Venetiis, in Martinelli ad Ange-
lum officina, prostant: exilior, odore Meliloti
Germanicz, vel Gallicz, sed multo fragrantiore,
acin decenniu perdurante. Sata Patavii, degenerat.

SECURIDACE GENVS TRIPHYLLON.

CAP. LIII.



Pedales ha-
bet, graci-
les, sed robu-
stos caules, foliis donatos
ternis simul
iunctis, per ex-
trema latiori-
bus, crenatis,
quibus, veluti
ad caulium ar-
ticulos, medio-
cribus inter-
uallis distan-
tes, silique fal-
catz verticilla-
tim apponun-
tur, Meliloti I-
talicz siliquis
pares, denz,
aut duodenz,
caulem coro-
nantes, semencia longiores, graciles, striatz.

Dalechampia dicebatur Securidacez genus.

Describit hoc & depingit Hist. Lugd. titulo
Hedyari minimi, cuius radix tenuis, brevis, can-
dida, flos luteus, circa caulem copiosus: semen
ruffum, bipenni simile.

An Dodon. Hist. frum. & Lat. in fol. Fœnugra-
rum silu. alterum, recentiori etati Fœnugra-
co legitimo similis, flores per pusilli, siliquaz te-
retes, tenues, paruulz, oblongz, tres, quatuorve
simul, in quibus semen exiguum.

An Lob. Obs. p. 502. Et Ic. Pl. Tom. 2. p. 45. Fœ-
nugracum silu. Herbariorum?

In agro Monspelienfi & nemore Gramuntio,
crescit, Hist. Lugd. In Hispania plerique incul-
tis locis sponte exire Dod. accepit. xortis hic in
Belgio [ait Lob.] duntaxat quibuidam repeti-
tur, ex Hispania delato semine.

LOTVS SYLV. EX CODICE

Czlarco.

CAP.

LIIII.



Depingi-
tur caule
recto, foliis
Trifolii, & e si-
nu horum, pe-
diculis flores,
deinde siliquas,
proferentibus,
quz tenues
sunt, & quam
Fœnugraci mi-
nores, vt ima-
go ostendit.

Huiuscemo-
di autem silue-
stris Lotus ha-
ctenus inco-
gnita latet, &
non nisi in ve-
tusto Biblio-
thez Czlarz

codice reperitur, annotante Dodonæo.

Hist. Lugd. Lotus silu. ex codice Czlarco, sicut
& C. Bauhino, cui Trifolium 48. quoque dicitur.

Trifolium

TRIFOLIUM PRATENSE, ET LOTVS

pratenfis Veteribus, & in genere.

Licet de vulgarissima Loto, Trifolio pratenfi,
Veteres particulatim nihil prodiderint, nec
Dioscorides de hoc caput proprium conscripse-
rit, nihilo tamen minus hanc non penitus sicco
pede transiit, sed de hac l. 4. c. 107. egisse videtur,
cum ait, siluestris Lotus quam Trifolium minus
appellant plurimum in Libya gignitur, caule bi-
cubitali & lapo maiore: alis multis: foliis Trifo-
lii pratenfis, &c.

Oxytriphylon (inquit Scrib. Larg.) foliis, &
specie, & numero similis communi Trifolio, nisi
quodd huius pleniora sunt, & frutex eius duorum
pedum interdum, aut etiam amplior conspici-
tur, & odorem grauem emittit, quorum nihil cir-
ca pratenfe Trifolium inuenitur.

Trifolium
cubumot

Nostri (inquit Corn.) Herbarii Trifolium
flee vocant, & tria eius genera agnoscunt, quz
florum colore discriminant, purpureumque, ac
album, & luteum appellant, quz pratenfia sunt.

Trifolium
pratenfe
Cornar.
differentia

Alter sanè de Trifolio pratenfi Tragus scri-
bit, dicens: Hoc inter omnia Trifoliorum gene-
ra, quz sanè multa sunt, non solum formâ, sed
& visu notissimum vulgò habetur. Eius duo exi-
stunt genera, colore duntaxat florum, & magni-
tutine differentia: hoc enim album, illud purpu-
reum fert florem, hoc maius, illud exiguum
censetur.

Tragi diff.
serenita

Sed Trago contrariatur Fuchsius, dicendo,
Triâ apud nos passim in pratis prouenientia
trifolii inueniuntur fastigia: quorum primum:
à floribus purpureis, Trifolium pratenfe purpu-
reum. Germ. Bräun wysenflee, Gall. Treffle pur-
puree. Alterum iudem à floribus suis candidis,
Trifolium pratenfe candidum. Germ. weyß wys-
senflee, Gall. Treffle blanc, Et tertium luteum,
Germ. Gel wysenflee, Gal. Treffle jaune appella-
uimus. Quod ad folia ipsa attinet, non admo-
dum differunt: quoduis enim horum generum
tribus constat foliis, quz in primo sunt latiora
& herbacea, in secundo autem longiora & an-
gustiora, magisque pallescentia, candicanteve,
in tertio sunt minorâ & rotunda, atque ad Fœ-
nugraci folia accedentia. Sunt qui hoc genus
Lagopum esse putant.

Fuchsi diff.
serenita

Folius

Lagopum

Ceterum [ait Matth.] Trifolium pratenfe in I-
talia trium est generum, foliorum & florum di-
uersitate differentium. Primum foliis exit subro-
tundis, & amplis: maculosis, longo pediculo
nitentibus, obsequioso, flexilique: floribus in
capitulis subpurpureis, aut albicantibus, in cau-
liculorum summitatibus emicantibus. Nascitur
in pratis & herboso solo. Secundum cauliculis
assurgit lentis, obsequiosisque, foliis in vnoquo-
que pediculo ternis, variâ tamen facie perinde
ac bituminosum: namque quzdam, quz ad ra-
dicem sunt, Acetosi Trifolii modo, quod Orys
vocatur, trina ex vnico pediculo emergunt, ac
cordis faciem quadantenus imitantur, cætera ve-
rò longa sunt, & in cacumine acuminata, vt in
Asphaltite: flores in capitulis sunt illi purpurei
in flocci modum. Prouenit sponte in pratis, &
viridariis, & herbosis locis. Tertium, vt primum,
circinatis, sed brevioribus foliis. Distant & flo-
rum colore, quod in vno flores albicant, in altero

Matth. diff.
serenita

ro rubescant, in tertio lutei spectentur. Pratenſe Trifolium tempeſtates prænuntiat, nam [vt Plin. eſt autor] inhorreſcit, & folia contra tempeſtatem ſurgit.

Adm. error. Aduerſaria Trifolii pratenſis triplicem varietatem perhibent, aſt diuerſos colores non oſtendunt.

Cæſalp. porro Trifolium pratenſe vocat, quod in ſœnalibus campis, & inter ſegetes ad pabulum iumentorum ſecatur, inſermis caulibus, aut ſtratis in terram, aut procumbentibus: cuius multa differentię, magnitudinis, & paruitatis, tum foliorum, tum caulium, tum fructus.

Turn. diſſerentia. Turn. duplex genus tantum agnoui, dicens: Eſt Trifolium quoddam vulgare in pratis naſcens, flore vel albo vel purpureo.

Eucharis error. Induſtin & Euchar. de Trifolio flee, Triphyllo fleiſchblum, Triblat/ heymſchenflee / & wildenflee ſcribit, non demonſtrans quodnam intelligat, vires etiam confundit, ac pro Trifolio poſita icon, Oxios, ſive Trifolii acidi.

Trifolii in pratis naſcentis, inquit Amatus, tria genera paſſim videntur, alterum foliis rotundis, & magnis: alterum verò acutis: tertium foliis quoque rotundis, ſed minoribus, quæ omnia floribus lacteis, quandoque rubris, nonnunquam verò purpura ornantur. Harch. item Trifolium pratenſe à colore triplici triplex numerat, candidum, purpureum, & luteum.

Nomina linguarum. Graeci τριφυλλιον τ. tris φυλλων αἰσιν τριφυλλιον, & non raro, λανθάνον τριφυλλιον nominant: Latini Trifolium pratenſe dicitur: Ger. dreyblat flee/ wiſenflee; & fleiſchblumcr, Belg. Clauſcym. Angl. herbe trefolic. Gall. Treſſe, Triplet, & veterè eiſdem Gentis lingua, Viſumaru, vt tradit Marcell. Scriptor antiquus. Ital. Trifolio. Hiſp. Trenol. Hung. Lo here.

Locus & tempus. Naſcitur in pratis, vnde etiam nomen naſtum, ac paſtuſtribus locis, præſertim iis, qui ſubinde, fluuiali aqua rigantur. Floret Maio & Iunio, ac reliquæ deinde æſtatis maxima ſæpè numero parte.

Vires & vſus. Haud dubiè mediocriter concoquendi & exſiccandi vim poſſidet, vt non tamerè quidam ex Recentioribus Herbariis tradant Trifolia pratenſia albo muliebri profluuiio miſcific conſerre. Eadem etiam inflammationibus impoſita, eas concoquunt, & ad maturitatem perducunt, Fuchſius. Trifolio pratenſi nihil vtilius pecori veterinariæve ſaginandæ. Id etiam inter palatii irritamenta recentent Lobel & Pena. Reſtiferat, exſiccatur partium tenuitate: inflammationes cataplaſmate, ventris torſiones, coſticolę, dolores iniectione mulcet, ac exſiccandi & mediocri concoquendi vi menſtruis albis mederi prodir, Lobelius. Aſt conſiderandum an vires à Fuchſio & Lobelio attributę Trifoliis vulgariſus conueniant, ſaltem non conueniant purpuraſcenti, ſive rubenti maculato: folia enim guſtu acria, vt paulò poſt dicemus. Semen & flores ex aqua muſſa, aut vino decocti & ebibiti, vel clyſtere iniecti, inſteriorum roſiones ac dolores ſedant, & viſcidos, lentosque adhærentes inſteſtimis humores educunt. Ex aqua verò decocti, & ex oleo admoti, duros emolliunt abſceſſus. Ex ipſa verò herba, cataplaſma vtiliter inflammationibus imponitur. Volunt nonnulli Trifolium flore purpureum coſectum aut ebibitum, menſes prohibere. Album verò prouocare. Paſcuntur herbam cum boues & iumenta, tum vtiliſſimè vituli, & agnelli. Flores apibus grati ſunt, de his enim vt de Thymo meliſſi-

Semen & flores ſoreſtina.

Abſceſſus inflammatione.

cant, Matthiolus. Sunt qui Trifolii pratenſis ſuccum, miris laudibus efferant ad oculorum nubeculas, albis quidem maculis in foliis notati, ad albas, nigris autem ad nigras, Horat. Luſ. Succus in vniuerſum ad cicatrices & vulnera commendatur. Eaſdem penè obtinet facultates, quas Fœnumgræcum, ſed non perinde vſitatum.

TRIFOLIA MACVLATA ET ACRIA.


CAP. LV.

Quandoquidem adhuc minus nobis conſtat, quomodo Trifolium maculatum, & acre, à vulgari & ſequentibus ſit diſtinguendum, ideo caput particulare hoc eis tribuimus, donec diſcrimen melius innotefcat. Ex maculatis igitur, quæ ad certam claſſem referre ambigimus, primum ſeſe offert Hæmorrhoidum, de quo Geſn. horti, quod circa Lugdunum videtur, ſpecies alia Trifolii pratenſis, maculis nigris. Poſt hoc eſt & altera ſpecies maior, in collibus & aruiſ Tiguri frequens, acri guſtu, vt abſceſſu tertio calida videri poſſit. Sed quod ſit Geſneri Trifolium acre, mihi non adeò competum eſt. Frater etiam quod intelligat, me lateat. Refert ad Cluſianum poſt dicendum. Trifolium, vt diuinantur Aduerſaria, pratenſe purpureum & album pratæ alunt, ſæpius guttatis & ſalcatis ſuperficie foliorum maculis. Meminit & Cæſalp. Trifolii maculati, albo flore, à dicendis alieni, de quo forſitan agimus titulo, de Trifolio albo, glabro, minore, ſermina.

Trifolium guttatis maculis (inquit Lob. Obſ.) Euphraſie ritu ocularibus decoctis & collyriis noſtra ætas feliciter commiſcet.

TRIFOLIUM PURPUREVM VVLGARE.

CAP. LVI.



Ecce ignotum prato vulgare iſtud Trifolium, cui ex radice craſſiſcula, aduolenti ſerè, digitali, fibrata, viculari tenues, ſtriata, partim humi repunt, partim ſurguntur, ſubhiſcunt: ſed de trium foliorum, nunc rotundorum, aliàs oblongorum, interdum ſpiculatis lineis albis notatorum, nonnumquam obliquis candicantibus ſtriis virgatorum, numero poſitæ notius: Flores autem glomerati modò rubent, modò al bent, odore non inſuau, guſtanti ſiccitatem offerentes: anno 1607. menſe Iunio obſeruati Trifolium vulgare purpuraſcens in area paſſim arcis Montbelgard. in horto & extra urbem habere maculata folia: maculas autem eſſe albicantes, ſemirculares, ad cordis

Oculorum nubecula. Succus. Vulnera.

Trifol. h. morboſum.

Trifolium acre.

Trifol. guttatis maculis.

Trifolium maculatum.

Vſus.

Deſcriptio.

Radix.

Folia.

Flores.


cordis formam nonnihil accedentes, & folia aliquamdiu masticata acris esse.

Brunsfels. Herb. germ. Trifolium primum, Gemein fleck / Dryblat & fleischblum à colore rubente instar carnis ad sumum exsiccatæ. Et Tom. 3. Trifolium maius vbi perperam pro Trifolio purpureo vulgari, apposita icon Melampyri.

Trifolium pratense Fuchsio & Trago. Trifolium simpliciter pratense Lobelio & Tab. quibus addit Thalius vulgare, & alterum flore rubro. Flore purpurascens Lonic. dicitur. Caputis florum purpureis Gesnero. Purpureum, Lobel. & Penn. Adv. Cæalp. Camer. Hort. Luf. C. Bauh. cui & Trifolium, in phyt. nominatur.

Passim in pratis provenit. Vide paulò antè vires, titulo: Trifolium pratense, & Lotus pratensis, Votenis, & in genere.

TRIFOLIUM PURPUREUM maius, folio & spica longiore & breuiore.



AD cubitū & sesquicubitum excrecit, caulis crassiusculis, valentibus, variè diuaticatis: in foliis subinde ludit, interdum semunciam vix excedens, subrotunda, frequentius oblōga, acuminata, trium vnciarum semunciali latitudine, concinè per ambitū crenata, admodum venosa, ctipa, trigemina, pedicelo nixa in vaginam valdè laxā pinatam, trium vnciarum, aut longiorem, caulē completentem, desinente, flores rubentes in spicam palmarem & maiorem, satis crassam dispositi, ex calycibus in pinnas longas, tomentosas, dissectis.

Tragus vocando Cytisum insigniter labitur. An Hort. Luf. Trifolium montanū pur-

pureum? Clusius in Pannon. describit & iconem exhibet cum spica breui. In post. verò hist. cum spica longa. Describit & depingit Lonicerus ex Trago, quem citat, & Cytisum silv. Com. II.

lumelle facit, à Dioscor. diuersum: quamvis ipse non norit. Lobel. Obi. Lagopus al. C. Bauh. phyt. Trifolium 32. siue spicarum folio pinnato.

Observatum à nobis florens Iunio prope Locust. Champe Genere, & Banica in horto D. H. Plateri. Inuenitur, autore Clusio, non in Hamburgensi Pannonia monte, & ibi vicino Prellenberg, sed aliis etiam Pannonia, & Austria, Stiriaque montibus, alpistibusque pratis & siluis. Floret mente Maio & Iunio.

TRIFOLIUM MAIUS CLUSII secundum, non album, sed rubrum.

TRIFOLIO maiori albo non valdè dissimile est alterum genus, vel amplitudine, vel si tria folia tamen paulò angustiora, & crassiora flosculorum, qui confectum nascuntur, spica, eaque summo caulis fastigio inherens, sine vlla pinnæ vestigio, & quasi inter folia latens, cui plerumque adhaeretur alia breuior, rursus inde tota, sed verò differunt colore, qui non albus est, sed ruber, & odore, cuius sunt expertes: radix, pariter radici ferè par.

Clus. in Pann. & in fol. Trifolium maius 2. seu maius purpureo flore. C. Bauh. Trifolium 4. seu montanum purpureum maius: Trifolii altera species & maior in collibus, Gesn. hort. Et, maius secundum Clusii, sine icone: variat, folio acuto non crenato, & obtuso crenato.

In Hamburgensi monte & aliis Pannonia & Austria montibus, Alpistibusque pratis, praesertim siccioribus Viennæ vicinis, tum pariter in Moravia & Bohemia siluis copiosè inuenitur.

TRIFOLIUM MAIUS TERTIUM purpureum Clusio.

MAIORE multò excrecit altitudine, quæ plerumque cubitalis est: caules etiam habet crassiores, nodulos: folia ex lingulis geniculis alternatim prodeuntia, longa, striataque, dorso magis eminente & elato, laxā quadam veluti vaginā in binas appendices desinente, caulē amplectentia, deinde ternā numero ex eodem petiolo nascentia, superioribus duplò longiora, illis tamen non minùs dura, & per oras denticulata, gustu nonnihil adstringente: huic spica oblongior, & maior, elegantissima tuborum flosculorum è caliculis hispidis emergentium serie composita: radicem habet superiorum radici similem, viuacem & singulis annis plures caules proferentem.

Clus. Pannon. Trifolium maius 3. seu maximum flore purpureo. Tragus Grossen geyffle / & Cytisum appellauit. Lobelius alterum Lagopus nuncupasse videtur. Hæc is, qui in rariorum Hist. post. non ampliùs Tragi Cytisum facit, nec mutati consilii rationem assignat.

TRIFOLIUM MONTANUM minus Thallo, purpureum.

RENIORIBUS constat canticulis, & foliis acutè mucronatis, & capitulis etiam, estque flore quandoque purpureo, quandoque candido.

Trifolium
montanum
vulgare

Thal. *Trifolium aliud montanum*, etiam satis vulgare, foliis oblongioribus, acutè mucronatis, minus. C. Bauh. phyt. *Trifolium nonum*, seu purpureum minus: variat flore albo, & rubro.

TRIFOLIUM ALPINVM RHETICVM

Atragaloides.

Descriptio



Non ita nobisum alibi, quàm summis montium iugis hoc Trifolium, cui radix crassa, longa, in plura capita aliquando diuisa, terram versus comosa, substantia albâ, dulci: ex qua pediculi germinant longiusculi, inâ parte vaginam imitati, folia tria, oblonga, vncialia, aut sextantalia, angusta, acumi-

nata, glabra, obliquis venulis intertexta: inter hæc surgunt caliculi nudi, enodes, vix foliorum cacumen attingentes, quorum fastigio insident glomerati flores, magni, rari, purpurei, semen Cræcæ minoris, compressum in siliquis lenuncialibus, foliaceâ vaginâ textis.

Flos. Semen

Trifol. alpinum

C. Bauh. phyt. *Trifolium* 42. siue alpinum minus flore luteo. Io. Pona in Baldo, *Trifolium angustifolium alpinum*, radice sapore subamaro. Planta admodum rara & peregrina, florum colore purpureo, admodum venusto.

Locus & tempus

In Rhetia in monte propè Burmum inueni, florens mense Iunio.

TRIFOLIUM STELLATVM PURPV- reum Monspell.

Descriptio



Bipalmates, non planè surrectos, quosdam etiam in terram prociduos fudit ex gracili lignosâ radice caules, totos densâ lanugine obritos. folia terna longis nixa pediculis, cordata, tantillum per oras superiores crenata, penitus hirsuta: florum glomeris diuulsi, coloris purpurei, per-

quàm villosis constant calycibus, quorum pinne

Caulis
Radix.
Folia

Fig.

diductæ radiatam stellam representant. Multa habet communia cum *Trifolio* ex albo incarnato, cui folia non cordata.

C. Bauh. phyt. *Trifolium* 35. siue stellatum, quod multum similitudinis habet cum *Lag. p. maximus* L. bellâ, at diuersum est.

Prouenit Monspellî circa patibulum, vbi florens legimus mense Aprili. Montbelgardi in hort. E. C. ex semine deciduo pullulauit.

TRIFOLIUM ANGUSTIFOLIUM

spicatum.



Commu-
ne quid habet cum *Cytisio* Tragi: radix vicia, tenuis, longiuscula, lignosa: caules ex câ plures, satis firmi, palmares, aut pedales, simplices, in quibus folia terna, graminea, hirsuta, pediculo nixa vncialia, caulem longi, florum vaginâ obnoluerunt: spica duarum circiter vnciarum

longitudine, aut maior, ex floribus purpureis congesta, in calycibus lanuginosis, pinnas quinque protendentibus.

C. Bauh. phyt. *Gramen* 121. siue *Alopecurus minimus*. Item *Trifolium* 39. siue *spicatum angustifolium*. Lob. & Penz. *Lag. p. altera angustifolia*. Hist. Lugd. p. 432. *Alopecurus graminea Dalech.* Et p. 442. *Lagopus altera angustifolia*.

Abundans inueni inter Monspellum & Lugdunum, florens mense Iunio.

TRIFOLIUM ALBO-INCARNATVM

Spicatum, siue *Lagopus maximus*:



Satis prolixa radice donatum est, gracili, fibrata, caule plures dodiantales, & cubitales, hirsuti, simplices: folia ex piloso pediculo, vaginâ suâ breui, hirsuta, caulem complexo, terna, subrotunda, latiora, quàm longiora, crenata, non cordata, spica duarum aut trium vnciarum floribus constat albis, diluta

dilatâ purpurâ remitte, ex calycibus admodum villosis, in pinnas quinque desinentibus. Semen maiusculum, subrotundum, lucidum, pallidum, accedens ad Melioli vulgaris: saporis Pisorum.

Lob. & Penæ Adu. Obi. & Ic. Plant. *Lagopus maximus folio & facie Trifolii pratensis.* C. Bauh. phyt. Trifolium 36. huc spicatum flore subrotundo. Dod. in fol. *Lagopus maior folio Trifolii.* Hist. Lugd. *Lagopus maxima.*

Genere observati in prat. is prope fluvium Arne florens Maio: vt & alibi: Annua est planta, ex semine deciduo, siquidem maturo Iulio & Augusto, se confertuat.

TRIFOLIUM ANGUSTIFOLIUM HISPANICUM, siue *Lagopus angustifolius* flore dilute rubente.



Lagopi maioris genus, semine ex Hispaniis accepto natum, cuius iconem ad Clusium mittebat Iacobus Plateau: id vnicum fert caulem gracilem, & satius firmum, nodis quibusdam distinctum, & in aliquot ramos diuisum, nascentibus ad singulos nodos, pediculis, satis laxâ sede caulem & ramos amplexantibus, quorum extremis teria insident folia, vt in trifolio albo incarnato, non orbiculata tamen, sed longiuscula, & angusta, carinata, siue dorso elatiore, canescentia instar foliorum vulgaris Lagopi: summi rami desinunt in longas caliculorum spicas, è quibus emergunt flosculi vulgaris floribus similes, & ferè concolores, hoc est, dilute rubentes.

Lagopus angustifolium Hispanicum Clus. observare meminit Salmanticensis agro, dum in ea vrbe vivebat, ad vinetorum aggeres.

LAGOPUS TRIFOLIUS QVORVMDAM.
CAP. LVII.

Nomen ex argumento spicæ indeptus est, quæ molli villo, cinereo, purpurascens, leporinos pedes imitatur, *flosculus* albidus & minutus, Scorpioidis, tantillum prominulis, quos semen excipit exile, fulvum: coliculi palmarum, aut sesquipalmarum alti: vel etiam spithamæ, ramosi, toti canâ lanugine pubenti, in quibus hirsuta Trifolii folia, vnciam circiter longa, culmum lata, sapore subadstringente, strenuè siccante: radícula subest exilis, lignosa, tortuosa, candida, fibrata.

Nostri in ist Corn. Jad Græcæ vocis imitationem *hasenpförlin* vocant. Aliqui *hasenflœ* [selum Trifolium:] Nam huius genus quoddam esse videtur. Apud Hipp. Galenus *Lagopyron* exponit, quæ appellatio, Triticum leporinis significare videtur. Trago, & *ultima melilo-*
Tom. II.

tus, alba, & *Lotus campestris* dicitur. *Lonic. de-*
pingit & vocat *pedem leporinum* & trifolium hu-



mile. *Lagopus* [teste Dodon. gall.] à quibusdam dicitur *Leporis cuminum*, *pès leporis* & trifolium humile. Addit idem in Hist. sum. & in fol. vocari à nonnullis *ragopyron* Hippocratis. At *Lagopyros* non Trifolium, sed Triticum similis. Lob. & Penæ Adu. *Lagopus genuinus antiquorum.* *Lagopyrus Hippocrati.* Item Obi. & Ic. plan. *Lagopus Pes le-*

Lotus cam-
Pes le-
Lagopus,
Trifolium
humile.

Leporis cu-
minum.

Error quo-
rundata

Lagopyrus
Hippocr.

Ragopus
genuinus
Antiquorum.

Trinitas
Matth. re-
preh.

Amatus
not.

Hist. Lugd.
not.

Lagopodium

poris. *Lagopus* [inquit Lacuna] Trifolius annu-
merata planta, Herbaris *Trinitas* dicitur. Dubi-
tat Matthiolus an Germanorum vulgò *Lagopus*
legitima sit: Sed quæ tanti dubii necessitas? cur
affirmare non audeat: Apud Amatum pro *Lago-*
po quidem pingitur, verum alia herba, nempe
Tiunitatis, ab eo describitur. Brunfels. nihil sin-
gularis adscribit, sed vulgata retinet nomina.
Hist. Lugd. *Lagopus vulgaris Matthioli.* Item *Lago-*
pus vulgaris *Fuchsii.* Sed cur frustra Lugd. con-
tra Philosophum entia multiplicat? Cur duas fi-
guras vnius plantæ ponit? Infinitas hac ratione
ne dicam Botanicus, sed quivis conforis discipu-
lus icones appingere posset. Tabern. *Lagopa-*
dium vocat.

C. Bauh. phyt. Trifolium 38. siue spicatum humile, seu *Lagopus.*

Lagopus Germ. *hasenflœß*, *hasenflœ pförlin*,
farzle, & *hasenflœc.* Belg. *hasen Doortkens.*
Gall. *pie de lieure*, Castil. *pie de liebre*, Portug.
pie de lebre. Ital. *pie de lepre.* Hisp. *pie de lebre.*
Angl. *hares foote* Boh. *Sagcunohs*.

Genere viget mense Iunio & Iulio cum flore,
Basileæ adhuc Octobri in arvis, Montbel.
gardi quoque, ac spontè in horto E. C. Augusto.
Non parum huic est adstrictionis: siccitatis ve-
rò tantum vt mirum seminis pro fluuio laboran-
tibus præster præsidium Lobel. Aluum sistit si
cum vino bibatur, aut in febris ex aqua: adalliga-
tur & ad inguinis inflammationem Diole. Replet
caus. Sunt, inquit Matth. è Germanis, qui ea v-
tuntur ad detergendam sitim in dysenteria.

TRIFOLIUM GLOMERULIS PER-
sonata: Chetleri.

In humum reclinat palmares caules quos à re-
pitante radice emittit, plures, hirsutos, flori-
bus vestitos ternis iunctis, per extremum la-
tioribus, pilosis: vni cuiusque coliculi fastigio
capitulum hæret vnicum, maiusculum, in
Personata modum glomeratum, & aristis lon-
gis, sed lanugine quadam albicante intertextis,
horrens, *flosculus* inter aristas apparentibus par-
uis, purpureis, basin autem amplectuntur
terna folia, magna, squammatim incumbentia
subeuntiaque, lata, albicantia, per margines pur-
purascencia, similibusque struis virgata, & c.

Descriptio

II 2



TRIFOLIUM PARVUM RECTUM FLORE
glomerato cum vnguiculis.

Descriptio.



neis appendicibus imâ parte amplexis, nixa, breuius interdum, præsertim in summis ramis, hærentia: flores tum summo caulium fastigio, tum eorum lateribus glomeratim coherant minuti, vnguiculum auiculæ imitati, ex calycibus maiusculis, glabris, striatis, per extrema denticulatis, duris.

Locus & Tempus.

Nemaufii agens Cherlerus ex locis hispidis & saxosis euulsi, ubi rariùs occurrit. Maio floret: ingruente æstu, vt alia multa fathiscit & exsiccatum abit.

TRIFOLIUM CAPITVLO GLOMERATO RIGIDO.

Descriptio.

Tenuem singularem habet radicem, paucis fibris donatam, ex qua surgunt caules aliquot, dodrantes, subhirsuti, atro rubentes variè diuicati: folia terna, longiora, quàm stellati maioris, tantillum hirsuta, oblonga, per extremum rotunda, Lagopi Fuchsi similia: caulium fastigia ornant capitula singularia, glome-

quid Garyophyllatæ aquaticæ florum foliis simile habentia.

Montpelii in squalidis & siccis locis circa Episcopi castellum collegit Gener Cherlerus eidem nupiam alibi visa.



TRIFOLIUM CUIVS CAULES EX
GENICVLIS GLOMERVLOS OBLO-
gos proferunt.



Descriptio.

Est in quo Trifolium hoc cum Trifolio paruo, recto, glomerato flore cõueniat: Est etiam in quo manifestè differat. Tenuè hoc, sed duram & lignosam agit radicem, quæ plures quidem vt illa emittit furculos, sed pedales, teretes, rigidos, pallidè virentes, & ad singula genicula

recuruos. Folia quàm in illo altero tantò maiora, longiora, trigemina, neque cordata, neque serrata, longiusculis pediculis insidentia, qui ex membræa quadam articulos vestiente appendice prominent. Geniculis porrò capitula etiam oblonga denso flosculorum purpureorum agmine stipata insident, quatuor, quinque, aut plura, sed pro singulis geniculis singula, quorum calyculorum nullis striis donatorum apices recurui, rigidi interim in acutum faiscunt mucronem, nec tamen ita durum, vt spinosum ausim dicere, nullis item denticulis præditum.

Dedit Frater C. Bauh. qui à Genero Cherlero acceperat Nemaufii in incultis rupetis collectum.

Locus & Tempus.

TRIFOLIUM GLOMERULIS TOMENTOSIS per caulium longitudinem.

Angulosi & glabri caules: folia terna iuncta, parua, ex oblongo rotunda, glabra, crenata, pedicula donata ferè vnciali, cuius exortui adnata gemina pinna maiuscula, ex lato mucronata, caulem complexu suo comprehendit, indidemque stili minuti, palliduli, glomerati oriuntur, quos sequuntur



glomeruli folliculorum tomentosorum, candicantium, concolorumque. in quorum singulis semen vnum pusillum, rufescens, nitidum, apophysi veluti donatum, quemadmodum in Foenogreci semine animaduertitur.

Ex squalidis Gallo-prouinciæ quibusdam locis collegit Gener Cherlerus mense Iulio.

TRIFOLIUM FOLLICVLACEVM, SIVE Vesicarium minus purpureum.

Humi fusos producit ex tenui, simpliceque radice caules dodrantes, foliis ornatos ternis, paruis, per extremum obtusis, circumcirca crenatis, pediculo longo appensis: è quorum sinu exit periculus vnciam longior, flores sustinens in orbem glomeratos, paruos, rubentes, quos membrani ex-



ciunt utriculi, satis laxi, bicorni fastigio debilescentes. Hæc pulchella planta se per terram spargit, degustata nullum habet manifestum saporè.

De hoc Clus. in Hisp. & hist. post. agit, vocans *Trifolium pratense Salmanticum*, Hispanorum *Trebol de prados*, & simpliciter etiam *Trebol*, quod ipsi & cetera Trifolii genera sic appellent. Ceterum folia huic tribuit in ambitu quoque serrata. Quæ occasio, quod figura Clusii minus placeat, quod talia in eius pictura non exprimantur, nec folliculi, in quibus semen exile, subrotundum, contineri scribit, bene appareant. C. Bauh. phyt. Triplinum 6, siue pratense folliculatum. Lob. Obs. & Ic. Pl. picturam, Clusii descriptioni, vt & nostræ, Tom. II.

minus commodam habet. Clusii, namque sine crenis proponit: vocat autem *Trifolium pratense Salmanticum*. Tab. *Trifolium hispanicum*.

Ex semine è Belgio misso Genevæ mihi prouenit: floret mense Aprili, estque semen maturum Iulio. Clusio autem totà Aestate floret.

TRIFOLIUM CAULE NVDO GLOMERULIS glabris: Et aliud paruum cum glomerulis, lignosum.



Ex radice crassiuscula caules exeunt simplices, nudi, glabri, pedales: in glomerem florum purpureorum fastigiat, subiectis foliis, exilibus, viridantibus: sequuntur utriculi flosculorum numero reimpendentes, laxiusculi, squallidi, veluti nervulis intertexti, albi, è quorū orificio adhuc

flosculorum prominent reliquæ: folia tergemina, glabra, subrotunda, ferè vncialia, pediculo hærent palmati & sesquialmari, è radice.

In viis quibusdam haud ita frequentem, quæ Locus & Nemauso ad Gari pontem pergitur, obseruauit Tempus atque decerpit Gener Cherlerus Iunii initio florens adhuc, sed & vel tunc glomeratum.

TRIFOLIUM PARVVM QVODDAM, SIVE Lotus pratensis purpurea. Dalech.



Descriptio

Lotus pratensis purpurea [inquit Hist. Lugd.] radicem gignit gracilem, candicantem, paruum capillatam: canticulos multos, ferè pedales, turculosos: folia Loti nunc terna, nunc quaterna, exigua: flores in ramulorum vertice copiosos, purpureos. In pratis & humidis locis nascitur.

TRIFOLIUM PRATENSE ALBVM à Fuchio depictum, siue mas. CAP. LIIIX.

Folia huic hirsuta, oblonga, venosa, crenata, terna ex longo pediculo appensa, per caules cubitales, simplices, plures ex radice crassiuscula, inque plura capita interdum diuisa: exorti flores glomerati, albi, Trifolii pratensis, purpurei, alio-

qui similes. Genevæ variisque aliis in locis observati florentem Augusto, Septembri & Octobri.

TRIFOLIIS AFFINE, QUADRIFOLIUM Phæum Lobelii.

CAP. LIX.

Descriptio:



Quadrifol.
hortense.
Locus quadrifol. Tab.
retrahitur.

Lobel. Obs. *Quadrifolium phæum* & Ic. Pl. Tom. 2. p. 33. *Quadrifolium phæum* fuscum hortorum. C. Bauh. phyt. *Quadrifolium hortense album*. Tab. Lotus quadrifolius Dieb. leterich. ter Steinflec. Alii mirum dici Quadrifolium, quum in figura Lobelii etiam sint quina.

TRIFOLIUM MAIUS ALBO FLORE incanum Clusii.

Descriptio



Ternis, aut quaternis interdum affurgit virgis aut coliculis, pediculis, firmis, rectis, ceteris circa quos nascuntur rara folia, oblonga, angusta, dura, nervosa, carinata, & dorso elatiore, terna semper ab uno eorum prodeuntia ut in reliquis Trifolii generibus, incana, in ambitu vix dentata, ab radice frequen-

tiora & maiora: flores extremis ramulis, in quos cauliculi separantur, inhaerent parvi, frequentes, conferti, & spicam quodammodo formantes, albo colore, & non nullo odore præditi: radix viuarum minimi digiti crassitudinem æquans, fusco & decolor cortice tecta, longa, aliquot fibris donata.

Clusio cuius descriptionem proposuimus, *Trifolium maius primum*, seu maius albo flore. C. Bauh. phyt. *Trifolium* 10. siue *montanum album*.

In pratis siccioribus Metropoli Austriæ Viennæ vicinis, tum in Moravia & Bohemia floret Maio & Iunio.

Trifol. album.

Locus & tempus

TRIFOLIUM PRATENSE FLORE albo minus, & femina, glabrum.

CAP. LX.



Contra. Cuori est habitu quam mas, coliculis brevioribus, infirmis, per terram sparsis, per quos folia terna, parva, rotunda, glabra, retusa: flores glomerati, minores, ex longioribus appèsi pediculis, coloris albi. Hoc ni fallor, Montebelgardi quadrifolium, & quinque folia reperitur. Ex hoc genere suspicor parvum, maculatis foliis, flore albo, reperitum ad fontem admirabilem in Ducatu Wittembergico: Maculatum etiam est Iulio circa Montebelgardum. Passim ac sponte proveniuntem variis in locis observavi.

TRIFOLIUM PARVUM, ALBUM MONSPESVIANVM PILOSVM CVM paucis floribus.

Trifolio nostrati pratensi albo respondet, sed multo minus est foliis pilosis, floribus albis, duobus plerumque aut tribus simul iunctis: pumila est admodum planta.

Montepelii hoc legimus florens mense Aprili.

TRIFOLIUM PRATENSE LVTEVM mas, flore minore, semine multo.

CAP. LXI.



Ad pedalem altitudinem & cubitalem excrescit hoc Trifolium, caulibus tamen non penitus surrectis, quos à radice albâ, minimi digiti crassitudine, fibrosa, sapore leguminoso Pilorum aut Fabarum, evulsu difficili, promittit plurimos, hirsutos: folia hirsuta Trifolii pur-

purei & albi: flores, parvi, lutei, ex multis stoculis minimis, formâ (si parva licet componere magnis) Genistæ alicuius, aut Coluteæ, congesti, globulum exprimentes, quibus succedunt semina multa, Meliloto officinarum quodammodo similia.

Melilotus

Melilotus minor, Sertula campanica, & Fleiner steinflee Brunfels. *melilotus exigua*, Trago: *medica* Dodonæo: *Trifolium arvense*, Tabern. *Trifolium luteum*, Gesnieto: *Saxifraga lutea*, Fuchsio. Meminit tantum Trifolii lutei Matthioli, nec distinguit nisi colore à cæteris. C. Bauh. in renouato addit iconem.

Cæterum, nomina linguarum uisitata, sunt Gall. *Trefle peris idune*. Germ. *Geelflee / Geelwisenflee & Klein steinflee* Belgicè *Cleynsien Claiern* & *Cleyn geel Claiern*.

Geneuz florens uidi Maio, ubi uirebat Hyeme: Basileæ Octobri: Lugduni, & Montbelgar: di etiam spontaneum.

TRIFOLIUM PRATENSE LUTEUM,
fœmina, flore pulchriore, siue
Lupulino.



Cum Trifolio pratensi luteo mari multa habet communia, radicem exilem, duram, cauliculos graciles, hirsutos, folia trigemina, neruola, florem luteum, sed magnitudine & singularium flosculorum formâ differentem, duplò enim & triplò maiores huic sunt glomeruli. Lupulorum capitula imitati,

minores, contrarioque situ squamarum, quarum unaquæque cristata supremum constituit flosculorum folium, reliqua tria sinu suo occultans. Huius porro Trifolii pratensis videntur duæ species: minor passim proueniens: altera magna & robusta ad cubiti altitudinem surgens, cum pulchris magnis floribus, in qua femina parua lutea animaduerti. Pulcherrimum hoc Trifolium pratense luteum, magnum & robustum, fœminam uoco.

An fortè Brunfels. Leporina? Thalium trifolium luteum alterum lupulinum, & vulgò lupulum siluaticum appellat. Casp. Bauh. phyt. trifolium 4. siue pratense luteum, capitulo Lupuli. Hort. Lus. trifolium arvense luteum, lupulinum. Geelb wisenflee / wiser frawen hopffe. An Tragi, Meliloti genus 8. & penult. Lonic. Tragum imitatus huius meminit, ac uocat *Lagopum, pedem leporinum, & trifolium humile*.

Speciem maiorem inueni in margine agrorum montis Rolsberg prope Masmunster, florentem Octobri, Minorem aliqui frequentem Montbelgardi, Montpelii & Geneuz. Frater C. Bauh. collegit Basileæ in pratis.

TRIFOLIUM SAXATILE HIRSVTISSIMUM, siue argenteum.

Svb hoc nomine apud Fratrem obseruauimus plantulam, cuius radix dura, lignola, cortice Tom. II.

uestita rufo, cuius figura reptionis suspensionem iniicit: supernâ illâ parte in maiusculos diuariat trunculos, plures cauliculos ex radice multiplici erigentes, sed palmâ breuioribus, quos folia Trifoliorum ritu digesta uestiunt argentea, mollicella, albicantia, breuissimis nixa pediculis. Ex quorum sinu glomerulum mollissimum, pilosorum, flauescens stipatu congestum prominet, quod ex flosculis faulcentibus compositum arbitramur.

C. Bauh. phyt. Trifolium 41. seu saxatile hirsutissimum, quod in helueticis ingis & caulibus summis legit.

TRIFOLIUM PELTATUM CRETICUM.

CAP. LXII.

Qvod apud Fratrem obseruauimus cum inscriptione Trifolii odorati Cretici, & apud D. lat. Zvvin-



gerum, cui ascriptum erat *Macreia, Radiculâ est tenui, longiusculâ, fibris donatâ, quæ cauliculos ex se promittit deas, trêsvncias. altos, glabros, folia exigua, quæ longiusculis insident pedicellis. Flosculi quini plus minus cauliculo summo incubunt congesti, pallidè luteoli: quos siliquæ excipiunt com-*

pressæ, latiusculæ, simile semen sed exiguum, ac vix vnum aut alterum complectentes. Hæc, referente Fratre ex testimonio Honorii dum teneræ sunt, recentèsque, dulcissimæ, esuique aptæ sunt: at ubi induruerint, amarissimæ.

C. Bauh. phyt. Trifolium 27. siue peltatum Creticum. Item apud Matth. Trifolium 8. siue Peltatum Creticum.

MEDICA IN GENERE.

CAP. LXIII.

EX Trifoliorum, & eorum quidem, quorum evaluæ cochlearum modo intorquentur, genere & Medica est. Hæc natales suos ipso nomine fatetur, locumque vnde uenit, vocabulum indicat. Externa olim Græciæ [inquit Plin.] à Medis est aduecta per bella Persarum, quæ Darius attulit. Hinc Gentile nomen obtinuit. Similis est Trifolio, caule, foliisque geniculatæ, quicquid in caule affurgit, in folio contrahitur. Hæc paulò aliter Diosc. tradidit. *Medica* recens nascens similis est trifolio in pratis nascenti. Verum in progressu folia contrahuntur, & caules trifolio similes producit, in quibus accrescit semen, Lentis magnitudine, siliquæ modo intortum.

Medica ab Hispanis uocatur *Erucaye*, *Alfafa*, *Alfalfa*, voce fortè diductâ ab *Alfafa*.

Cor. *Albi-
scat.*
Andacocca.

Nomina
linguarum

Aequiuoca

*Saxifraga
lutea.
& Conf.
vno.*

*Error quo-
randam.
Laburnum.
Cytisus.*

Duratio

*Tempus se-
ctiois*

quam Auicenna simul cum nomine Cor & Al-
riscat lib. 1. exprimit: licet lib. 3. capite de tremore,
vbi oleum de Andacocca multum laudat, videat-
tur eandem per Andacoccam intellexisse. Gallis
Saint-John, & *Eon de Bourgogne*, & *grand Treffle*,
Picardis Faignasse, Germ. *Vicchfien*, oder *bürgün-
disch* herb, *hailfiter*. Sub Medicæ nomine, quæ
nobis verior videtur, & ut existimamus, per
Hermol. Marcellum, Gesnerum, Math. Ama-
tum, Bacchan. Dodon. Clus. & Cæsalpinum rece-
pta est, & à nobis Medica maior erectior florib.
purpureis dicitur, hæc occurrunt æquiuoca. Me-
dica filib. lutea & ruffa. trifolium cochleatum
marinum, alius Medica marina. Medica scutella-
ta. Medica orbiculata. Medica echinata glabra
cum maculis nigricantibus, & sine iis. Medica
magna turbinata, Echinata magna, hirsuta, hir-
suta echinis rigidioribus, Echinata hirsuta, E-
chinata minima, Coronata parua Cherleri,
Lubata, Lunata similis filiqua, de qua sub Au-
ricula muris Camerarii. Medicæ nomen quo-
que, quamvis perperam, & apud imperitos for-
tissimè cognitionis herbarum, teste Dodonæo ob-
tinuit trifolium pratense purpureum. Olim tri-
folium candidum, dicebatur Medica tertia Do-
donæo, quæ opinio in postremis reicitur. Nos
de hoc agimus sub titulo, trifolium pratense al-
bum. trifolium quoque luteum, Trago dicitur
Medica Dioscoridis, & apud Dod. Medicæ spe-
cies. Porro medica Tragi non est Saxifraga lutea
Fuchsii, ut vult Rob. Const. apud Amatam. Est
hæc nobis Melilotus vulgaris. Quæ verò sit Me-
dica Cornario, quam dicit à vulgo Medicorum
vocari Bursam pastoris, & à vulgo Germanorum
deschenfraut, inquirendum.

Apud Euch. Roels. Lonicerum & Ryssium
ineptè ponitur icon Laburni pro Medica. Cytisum
Matthioli à Cortufo missam, non Cytisum,
sed Medica speciem esse [inquit Hist. Lugd.] au-
tumant periti herbarii: hæc vocatur à nobis Cy-
tissus candidus filiqua incuruâ. Ad hæc Medicæ
speciem esse putant Ferrum equinum dictum
Gesnero, quod nos Soleam equi inscripsimus.
Medica etiam de Helenio dicitur in ascript. Dio-
scor. de eo hist. ng. l. 25. de Medio quoque Me-
dica traditur in spur. Diosc. de eo hist. n. lib. 20.

Tanta dos eius [inquit Plin.] vt vno sat
amplius quàm tricenis annis duret. Plinio con-
trarius esse videtur Palladius, qui semel satam
decem solum annis permanere scribit. Cæterum
Medicam diu durare, vel Plutarchi testimonio
comprobatur, similitudinem ex hac in libello
contra Epicurum desumentis egregiam. Sicuti,
inquit, herbæ Medicæ semen multis flexibus,
& per obliquum terræ innascens, ob asperitatem
multo tempore perdurat, ita dolor vncinos &
radices disseminans: carnique implicatus adha-
ret non diem modò, aut noctem, sed annos &
aliquot lustra, ægrè aliis doloribus tanquam cla-
uis violentioribus expulsus discedit.

Locus, in quo Medicam proximo Vere sa-
turuses, autore Columellâ & Palladio circa Ca-
lendas Octobris proscindendus est, & is tota
Hyeme putrescere permittendus. Mense autem
Februario, iterandus est, & purgatis lapidibus
diligenter occandus. Et tandem circa Martias
Calendas, subactò sicut in hortis solo, forman-
dæ sunt areæ pedibus 10. latæ, & 50. longæ, ita
vt eis per semitas aqua ministraretur, & facillè pos-
sint ex vtraque parte runcari. Tunc iniecto an-
tiquo stercore in Aprilem mensem (hoc enim
tempore Medica serenda est) referuentur, para-

ta. Singuli cyathi feminis occupant locum hæ-
tum pedibus quinque, longum pedibus decem.
Sed mox ligneis rastellis obruantur iacta
semina, quia Sole citius comburantur. Post fatio-
nem ferro locum tangi non licet, sed rastellis li-
gneis frequenter herba mundetur, ne teneram
Medicam premat. Prima messis eius tardius fiat,
vt aliquantulum semen excutiat. Cæteræ verò mes-
ses quàm volueris citò peragantur. Vbi secueris,
sepius riga. Post paucos dies, cum fructare cæ-
perit, omnes alias herbas runcata, ita & sexies
per annum metis, & annis decem poteri tene-
re continuis.

De Medica, inquit Varro, in primis obserues, Locus
vt ne in terram nimium aridam, aut variam, sed
temperatam semen demittas. In iugerum vnum,
si est naturâ temperata terra, scribunt opus esse
Medicæ sesquimodum: id scribitur ita, vt semen
iactatur, cum frumentum seritur. Medica porro,
vt Theoph. tradit, sepius diminuta, tonlaque
melior, lapidiorque euadit. Sed nec huic sterco-
ratio prodest, quin potius stercoreis & vrinæ cau-
sâ perit, vt quidam dixerit.

Medicâ nutriti boues lactantes, vt plura con-
tineant lactis, iubet Sorion in Geoponicis, item
que Varro, Columella & Palladius: Aristoteles
contrâ hist. animalium inquit: Pabuli genus ali-
ud copiam lactis exinguit, vt Medica herba, &
præcipuè ruminantibus: aliud auget, vt Cytissus
& Erum. Qui in Hispania rem obseruauerunt
[vt notat Camer. horti] vbi quotidianus eius vi-
sus est, referunt: nullo cibo tam viridi quàm ari-
dâ prius magisque laxari, saginati, & pingues fieri
iumenta, peculque omne: parcius tamen dari,
quoniam inflet, & multum sanguinem creet,
quem deducere postea necesse sit, annotante
Virgilio Marcello. Medica, inquit etiam
Varro, obicitur modice, ne parum, aut nimium
saturentur, vtrumque enim ad corpus alendum
inimicum. Fieri itaque potest, vt lactis abundan-
tiæ conducat, modò non ad satietatem vsque
prebeat, id quod etiam Plinius vetat, alioquin
nihil mirum Aristotelem vera scribere, & vniuer-
so in sanguinem, adipem, & carnes, alimento re-
ducto, non superesse, quod in lac conuertri de-
bebat. Agrum stercoreat, ac adeo est suauis, ac
nutritus, vt pecus arcere necesse sit, ne ve' dis-
rumpatur, aut sanguinem detrahare oporteat.
Animalium vitiiis plerisque medetur. Ad viciem
mularum, vt Columella prodidit, nulla res tan-
tum, quantum Medica prodest. Semen, vt tra-
dit Diosc. siccatum iucundi saporis gratiâ condi-
taneo salis admiscetur. Viride, quibus refrigera-
tione opus est, illitu suffragatur. Herba totâ pro-
gramine viuuntur ii, qui pecora alunt.

MEDICA MAIOR, ERECTIOR, FLO- ribus purpurascens.

Aldequam luxuriat obsequioso fœnore Deser-
cultorem fouens, caulibus, ut numerosis,
ita prolixis: folia terna oblonga, per extre-
mam oram, quæ obtusa est, crenata: flores co-
piosi velut in spicam digesti, purpurascens: si-
liques cornu caprini instar contortæ, in quibus
semen minutum & candidum: radix subest lon-
ga, tenuis, & lignosa.

Hanc tradit Hermol. dicens: Imperitiâ vulgi
Melica vocari cœpit. Semen eius sub dente Pha-
teoli recentis saporem præsentat. Propter altitu-
dinem radicis huius reliquæ herbæ intereunt,
sine ipsius damno.

Ex Hispania [inquit Marcell. Virg.] integros
herbæ

*Vfus
Lact. aut
boues.*

*Lac. aut
gus.*

*Aristot.
vbi dicit
ex aliis
causis.*

Agor.

*Mucien
larum.*

Semen

herbæ; quam inibi Medicam censent, cum suo semine caules afferri nobis curauimus. Siliquam non licuit videre &c. miramur autem nos ei allatos caules cum suo semine, & siliquas non etiam adfuisse.

Medicam appellat Ruell. ex aliorum sententia *Fœnum Burgundense*, quod rura *Fœnaciæ* dicant. At etiam Marcellum magis eius cognitionem obliterasse. Gesnero *Medica vera*, Clusio *sariua & legitima*. Anguill. *Medice species*. Medice quoque meminerunt Matth. Lacuna, Amat. Bacch. Lob. Pandect. Cæsalp. Camer. Hort. Luf. & alii.

historiæ Lugd. Confaricator imperitus stirpium omnia confundit: descriptio quidem competit *Medicæ*, de qua agimus hoc capite. An item Dodonæi icon, dubitamus. Quia Dodonæi & historiæ, & figura dubia: hic præterea nullum certum ponit discrimen inter *Medicæ*, sed suo more commiscet. C. Bauh. phyt. *Trifolium* 30. siue *siliquæ cornutæ*. *Medica Dod.-gall.*

nâc quondam, Hermol. Marcell. Virgil. Aug. Gallo, & aliis testibus, plena erat Venetia, sed pridem per



Gotthos perijt, referuata autem in Hispania, inde nudò in agrum Neapolitanum, quasi postliminio introducta fuit. Cæterum, Tiguri primò apud D. Gesnerum, cui, ut ipse perhibet, ex semine peregrino prouenit, deinde Basilæ in hortis quibusdam florentem mense Iunio & Iulio, vidimus. Genæ agros eâ confitos obseruauimus, quos aliquoties in anno refecabant ad impinguandos equos. Circa Burmiam in Rhetia spontè prouenire reperi. Montbelgardî in horto meo & Illustrissimi Principis de semine mihi prouenit, ac multis durauit annis.

De huius viribus & vfu iam suprà in genere pertractauimus.

MEDICA SILVESTRI.

CAP. LXIV.

Medicæ siluestris genus est, radice crassiusculâ lignosâ, sapore subdulci, virgulta emittente cubitum longa, vel etiam longiora, teretia, striata, glabra, in multos, lentos furculos subdivisa: folia de more ternâ, angustâ, oblonga, supremo margine veluti corrofa: flosculi furculorum fastigiis conferti, globuli serè modo insident, crocei, quibus delapsi siliqua suboriuntur contorta, compressa.

Taber. *Lens maior repens*, Gross. *Friedschende linsen*. Icon Tabernæ quidem placet, ast non nomina, quæ huic in eum dubio procul finem adscripsit, ut nouitate placeret, non aliis, sed sibi ipsi.

C. Bauh. phyt. *Trifolium* 31. seu *frutescens, luteum*

Ast nos in hac herba nihil fruticosi obseruauimus, existimantes hanc plantam comprehensam esse sub *Trifolio* 30. siliquâ cornutâ, flore luteo.



In sepibus Locis & segetibus tempus. prope Monspe-
lium & Lunel, mense Maio & Iunio reperitur cum flore luteo, variisque aliis in locis tum à nobis tum ab aliis reperta fuit.

Calida est in secundo gradu, subacris, sapore scilicet nitroso,

tenuiumque partium Gesn.

TRIFOLIUM COCHLEATUM MARITIMUM, siue *Medica marina*.

CAPUT LXV.

Descriptio



Quantum quantum est, totum villosâ, incanâque lanugine obductum est: caules pedales, ac etiam cubitales, ramis frequentibus brachiatis: per quos folia ex breuibus pediculis ternâ, parua, obtusa, frequentia, sapore nullo manifeste, flores multi simul congesti, lutei, *Trifolii lutei* serè similes: si-

lique orbiculares, in se contortæ, rariæ crassâ, cubito longior, tenera, gustu quodam ingrato, saluginoso, & amicante. Gesn. hort. *Trifolium marinum*.

C. Bauh. phyt. *Trifolium* 24. siue *Cochleatum maritimum*. Guilandinus *Trifolium album*, & *Cochleat* & Cicer sacerdotale vocabat: alii *Cytisum maritimum*. Lob. & Pena Adu. & Ic. Pl. T. 6. p. 38. vti etiam Tabern. cum Camer. hort. & icon. *Medicam marinam*: Eius autem figura facta est ad plantam siccam, à me [I. Bauh.] Gesnero missam, & anno 1561 collectam, quæ adhuc diligenter inter siccas meas coaceruatur: Quamuis nec Gesneri, nec nostri hic meminerit, sicut in pluribus aliis.

Trifol. maritimum.
Trifol. album & Cochleat & Cicer sacerdotale.
Cytisum maritimum.
Medica marina

C. Bauh. not.

Dalechampus hanc depinxit, vocans *Anthyllidem* priorem descriptam à Dodonæo, cuius opinioni assentiri non possum, nisi dicam non diligenter ab ipso neque descriptam, neque depictam.

Clusius, à quo parum aliquando absuit, quid

HISTORIAE PLANTARVM.

384

Helenium.

Aegyptium.


Tecus & Tempus.

Medicam marinam, *Helenium Aegyptium* Crater. Prole cap. de *Helenio* dēfer. tēdē esse sibi persuaderet, ed quod multas habet notas, adhuc hodie nihil assermat. *Casalp.* Trifolii quoddam genus, in incultis præcipue maritimis proueniens, cuius Ag. tus T. bul. modo, &c. vide ante sub Trifolio pratensi in genere.

Venetis floret ad maris litus Mense Maio, & etiam Septembri. *Clusius*, qui Marinam Medicam vocabat, quod Medicæ sit simillima, & in maritimis Mendici præferim obiectis nascatur locis, prouenit, inquit, passim in Hispania, & Gallia Narbonensi. Inueniebam etiam in Oceani littore, ad Tagi fluminis Ostium, ad D. Ioannis propugnaculum nondum tunc absolutum, & Caxcays, sub Olyssipone Decembri florentem anno 1564. Floret aliqui Æstate & Autumno, & subinde semen profert.

MEDICA SCUTELLATA.

Descriptio:



Cobuitales, hirsutæque habet caules, eosque crenatos: folia ternaria, maiuscula, latiuscula, acuminate, subtus hirsuta, circumquaque crenata: flores pauci, lutei, quos, volutatum instar, cochleæ teguntque sequuntur rugosa, turbinate, veluti è scutellis quatuor, aut quinque compositi.

ut in inferiori maior superioris conuexum suo cavo excipiat: radix lignosa simplex.

Ad hanc nostram Scutellatam Medicam, quemadmodum & ad sequentium aliquas videtur referri posse vna è Medicis Turneri, qui satis indistinctè de his ita scripsit: Medicæ notas, præter eas, quas recensent Diosc. & Plinius, has obseruauit. flos est luteus: ex tribus foliis medium longiore pediculo semper vititur. Simelque cum Sole occidente conuoluitur, oriente expanditur. fructus per maturitatem cochleatus, cornu caprini ferè instar, nisi quod voluminum finis non promineat extra circinatum orbem: idem aliàs læuis, aliàs hirsutus, aliàs denique spinosus. Maxime Medicæ folliculus, & plurimum læuis: Minoris hirsutus aut echinatus: semen Fœnugræco simile tum colore, tum figurâ.

Fructus cochleatus.

Dodon. notatur Trifol. cochleatum.

Nobis videtur Dodonæus Trifolium cochleatum primum pro Medica, quam hoc loco tradimus proponere, quamvis icon non bene eam demonstrat.

In iconè etiam Lobelii & Penz. Adu. huius Medicæ portio quædam exprimitur, licet non bene ab aliis distinguatur, nec describatur. Aliud quoque in titulo Lobelii, & aliud in iconè, quam etiam Plantinus assumpsit Tom. 2. p. 17. quæ tres Medicæ seminis varietates promittit, & duas tantum ostendit, scutellatam videlicet, & turbinate.

Hanc autem non posse Veterum Medicam ef-

ferat, ostendit Plinius, scribens de eius longâ duratione, quæ non cadit in annum Medicam scutellatam, & similes.

Historiæ quoque Lugd. consarcinator confusè de hac scripsit, proponens in sua tabella (cui titulus, Medica siluaprior, fructu triplici & diuerso) cochleas nostræ Scutellatæ, sed non describens, nisi id faciat his verbis: obliquis voluminibus sinuatum. Duæ præterea tantum fructus differentiæ in eius figura conspiciuntur, cochlearum nempe scutellarum, & turbinum: cum tamen titulus triplicem & diuersum promittat. Meminit is demum Trifolii cochleati folliculo spinoso, sed in iconè nihil tale demonstrat. Ut autem veritatem non faciamus exulem, fatemur vades eius perpetui. Medicas non distingui, Medicamque surrectam flore ceruleo cum abis confundi, ac quidem cum ea, quam siluestrem lunatum vocat: Laudabile proinde fuisse sumptum stirpem hæc nunquam tractasse.

Compiler Tabern., qui Medicam Anglicam vocat, *Englisb Schneiden Klee*, satiam habet figuram, & ad eam concinnatam descriptionem. Trifolium cochleatum, seu Medicæ præterea Dodonæi in Baldo, C. Bauh. Trifolium 18. siue cochleatum fructu latiore acuto.

Passim prouenit Monspellosi, maxime in festibus, Vere florens. Montbelgard in horto E. C. floret Iunio & Iulio, fructu maturo Augusto, ac deciduo, quotannis se propagat, modò Hiems non sit severior.

MEDICA ORBICULATA.



Subest ei vna Descriptio. In infinitis tendens caules pedales, aut palmates, per terram ipariss: folia ternaria parua, glabra, ferè triquetra, per extremum lata, & non nihil crenata, maculis interdum nigris respecta: flores exigui, flauis, oblongis pediculis donati: siliqua helicoides compressa, membranacea, extaribus, quatuorue

orbiculis, altero alteri imposito constantes, magnitudinis ferè vnguis, ubi maturuerunt, nigricantes, semina continentes ruffa, plana, sed recurua. C. Bauh. phyt. Trifolium 19. siue scutellatum fructu latiore, folio obtuso. In montibus Euganeis, ut & Monspelii colligitur.

MEDICA ECHINATA GLABRA,

CVM MACVLIS NIGRICANTIBVS

& sine his.

Bicubitalis per terram spargit caules glabros & in iis folia ternaria, glabra, per extremum latiuscula & serrata, quorum quædam cordis effigiem nonnunquam exhibent, quam cum plâta primò prouenit, aspersæ maculæ nigricantes repræsentant. Flores lutei, parui, duo, aut tres: siliqua

siliqua cochleata, parum compressa, mucibus per margines horrida.

C. Bauh. phyt. Trifolium 22. siue cochleatum maculatum. Medica Arabica Camer. Et sequenter, Trifolium 23. siue cochleatum fructu nigro hispido. Trifol. cochleatum alterum Dod Medica folio spinoso Lobelio. Hæc ille. Nos tamen, Medicam Camer. Arabicam diuersam à Lobelii Medica spinoso folio, & Dodonæi Trifolio cochleato altero, asserere non ausimus. Nimirum sunt breues Dodon. & Lobelius.

Cæterum, Trifolium cochleatum alterum (inquit Dodon.) gallicè *L'herbe aux Limaçons* vocatur, quod plerique Recentiorum Medicam indicant, quamuis cum descriptione Medica non conueniat. Est enim Medica Arabica stelle Camer. hort. foliis eruentia macula ut hinc, Lobel obs. & ic. pl. Tom. 2. p. 37. sub Medica folio spinoso, figuram Trifolii cochleati alterius Dodonæi habet. Medicam porro Arabicam Hort. Lus. germ. Arabis Schneckenflee vocat. Meminit huius, ni fallor, Cæsalp. sub Trifolio pratensis in genere.

Genex mihi in horto mense Maio vigebat: Argentinx D. Melchiori Sebizio cum floribus & siliquis hispida, foliis glabris non maculatis, Iulio.

MEDICA MAGNA TURBINATA



Cubitalis & sesquicubitalis caules emittit, hirsutos, multos ramos filios, foliis tergeminis, hirsutis. Trifolium pratensis purpurei panibus, aliis veluti triquetris, per oras incisilis, quorum pediculi longiusculi, pinnis caulem ambiunt: flores parui, lutei, pediculo hærent vnciali, & sesquicubitali, quos sequuntur fructus

turbinati, sex aut plurium circumuolutionum, rectè commissurati, duri: unaquæque spiræ gemino denticellorum ordine calata est: medium secante zonula perpetua: semen completum, rehis instar sinuatum, Fornugraci semini par, aut etiam paullo longius. Annua est planta.

Lob. & Penz. Adv. Medica, cui siliqua Cupressi figura, cuius portio quidem aliqua, sub titulo Medice, tres seminis varietates ostendunt, exprimitur, ast non placet icon. Hæc etiam à Plantino Tom. 2. p. 37. proponitur.

C. Bauh. phyt. Trifolium 20. siue cochleatum fructu compresso oblongo. H. Lugdunensis, inquit, una figurâ tres exprimit differentias, ut & Lobelius. Si frater triplicem hanc differentiam ostenderet, ipsi fidem haberemus, nos duplicem duntaxat obseruamus, scutellam sc. & turbinatam.

Montbelgardi in horto E. C. ex semine per D. Christophorum Scherertz Stutgardia missio, & Aprilis terra mandato, floruit Iulio.

MEDICA ECHINATA MAGNA

hirsuta.



Folia huic hinc prima Descriptio subrotunda, postmodò nonnihil acuminata, & serrata, terna vni pediculo innixa: caules ad duos, tresve cubitos per terram spargitur: flores multos, coarctati ex longis pediculis, lutei: siliqua simul aliquot coherens, spinis duabus, aut tribus, vel etiam quinque, ferruminata, breuissimis veluti spinis obtusis, exasperata. Genex in horto mihi Locut. prouenit. Echinus, qui particulatim in tabella Icon. hac est pictus, sequentis Medice est.

MEDICA HIRSVIA ECHINIS RIGIDIORIBUS.



Per terram se expandit cubitalibus & longioribus caulis. folia parua hirsuta, & per extremam oram lata: siliques lutei: echini cochleati, pauci, & ferè singulares, longis siliquis deque vergentibus rigidiusculis spinis horietur, non admodum densis: conuolutiones sunt tres, aut

quatuor.

In figura nostra empticia spinæ nimis breues Icon. & crebræ, idè in tabella præcedenti, melius erant exprimendæ.

An Lob. & Penz. Adv. Medica siliquis spinosis? Medica fr. C. Bauh. phyt. Trifolium 21. siue cochleatum, siliquis spinosis fructu duro, spinoso. Medica siliqua spinosa Adv. nosis quam Lob. ic. Tom. 2. p. 37. sub Medica pingit. An Trifol. cochleatum fructu duro. autem Lob. (vt equidem C. Bauh. vult) intelligat eandem Medicam nobiscum, asserere non ausimus, quia paucis tantum verbis spinosæ meminit. In iconum quoque tabella, in qua Lob. tres Medicas dicit se tradere, nullam video spinosam. Fratrem eandem nobiscum intelligere existimo. Ponit in Baldo Medica spinoso folliculo. Cast. Medica. Durantes pro Medica pingit cochleatam spinosam. An Camer. hort. Medica annua, semine minuto, hirsuta?

Mense Septembri ad mare reperi Monspelii. Locus & Tempt.

MEDICA ECHINATA HIRSVTA.

Descriptio



Cassul-
cula est &
prolixa, sed
singularis ra-
dis, alba: can-
tes multi, te-
nues, per ter-
ram spargun-
tur, dodranta-
les, & cubita-
les, striati, hir-
suti: folia ter-
na, subrotun-
da, ad Trifo-
lium pratense
luteam acce-
dentia, nullo
notabili sapo-
re praedita, pi-
losa, albeteen-
tia, maximè
parte interio-
re: flores parui, lutei, simul aliquot congesti, eod-
emque modo simul coaceruata ex eodem pedi-
culo longiunculo, capitula, Piso non maiora, con-
tortis helicibus constantia, globosa, quatuor, aut
quinque, atque etiam plura, mollibus spinulis
echinata.

an Trifol.
pratense?
Tribulus
Trifol. e. bi-
narium
An Lotus?
Locus &
tempus.

Hist. Lugd. Tribulus terrestris minor repens
Dalechampi. C. Bauh. phyt. Trifolium 26. siue
echinatum aruense maius. An Lob. Obs. Lotus
Italica altera?

Floret & semina tertio mense Aprilis & Maio.
Passim prouenit maximè inter segetes prope pa-
tibilum Montepessuli Frater C. Bauh. inuenit prope
Perot in litore maris. Hanc eandem habui
Genevæ in horto.

MEDICA ECHINATA, MINIMA.

Descriptio



Hec est
caulis
circa p. da-
libus, vel mi-
noribus, te-
nibus, quos
ornant folia
terna, Medica
echinatae foliis
similia peni-
tus, parua, hir-
suta: siliulae
pusillae, luteae,
multae simul
congestae: se-
quantur eius-
dem pediculi
fastigio heren-
tes quam pro-
ximè, glome-
rati echinuli
muricati, tres,
aut quatuor, vel quinque iuncti, Orobigrano
non maiores: radices tenues.

Tribulus
Trifolium
Medica

Locus

Hist. Lugd. Tribulus minor rectus Dalech. C.
Bauh. phyt. Trifolium 26. siue echinatum aruense
secundum. Cam. hort. Medica pusilla capsulis
echinatis. An Ponz. in Baldo, Tribulus filix. Da-
lech.

In pratis prouenit Genevæ ad Nosodochiū. In
arenosis & sabulosis locis Dalech. legit. Ex ne-

more prope Lipsiam, & et Rosendal vocato, Ca-
mer. attulit.

MEDICA CORONATA CHERLERI,

parua.



Pedibus De-
donata est
caulis, tenui-
bus, subrubé-
tibus: & qui-
bus alteratim
ex longis in-
teruallis siliu-
li exeunt sin-
guiares, vicia-
les & longio-
res, qui extre-
mo mucione
tenuis, qua-
ternarius ge-
stant echinu-
los, Tribuli
terrestis affi-
ni Hist. Lugd.
Verum singuli
vici ferè, aut
siliqua-alera

circumvolutione constant, vtrique denticula-
ta, gemellam coronam imitata, echinos sustinean-
ti: tutulo ad exortum breui pediculo haerent
tergemina siliua, hirsuta, aliquando subrubra, se-
rè cordata, in ambitu crenata, tam exigua, ut si-
mul omnia denticulatus vnguis digiti non nisi faci-
le possit tegere.

In faxosis, aridis, & squalidis Galliae Nubonè.
his, maximè verdè in collibus inter Nemausum &
Vicetum obseruant & legit Cherlerus: estque
vna ex rarissimis plantulis.

MEDICA LUNATA.



Lata,
compre-
sa, pollicis un-
gue maior sili-
qua, ad Auri-
culam muris
Camerarii ac-
cedens, sed
specie fieri &
maior, striata,
in circuitu lo-
ngiuncula spi-
nula, Cristam
galli non ma-
le exprimit.

Lob. Obs. &
Ic. Pl. Lunaria
radiata Italo-
rum: Medica
lunata, siue
falcata. Casp.
Bauh. phyt.

Trifolium 23. siue siliqua falcata. Consecrinator
Hist. Lugd. non distinguit Medicam silu. alteram
lunatam seu falcatam, à cæteris Medicis. Cate-
rum pulchrum semina misit Clariss. D. Cornutus
nomine Medicæ Alaphalaga. An porro, Casel.
Trifolii quoddam genus, cuius siliqua valde la-
ta, de quo sub Trifolio pratensi in genere. An
Cast. Durin sine Medica lunata

AVRI.

AVRICULA MVRIS CAMERARII.



Est aspera, & pilosa, pinnata, eo quidem ordine, ut extimum impar sextuplò ferè conjugatim dispositis in alam foliis maius sit, principio angustiore, medio ampliore, denique in mucronem desinens: sapor utriusque aliquantum feruidus: flores, cuiusmodi leguminibus, parui, crocei, hirsutis, viridantibusque foliis ambi: siliqua lata, compressa, similes Medice lunata; sed paulò minores, in se conuolutæ, hirsutæ, semen claudunt figurâ renis, alterâ parte gibbosum, alterâ sinu incisulato cauum.

C. Bauh. phyt. Trifolium 29. Trifolio siliquâ falcata simile. Camer. hort. Auricula muris, à semine, & Auricula lepòris, à foliorum figurâ appellata.

Anno 1597. mense Augusto floruit in horto Montbelgardensi E. C. ex semine partim missò per D. Hoenstetter Medicum, partim in horto D. D. Martini Chmieloci Basileæ, maturo, mense Septembris: Annua est plantâ. Cæterum, ubi spontè nascatur, ignorat Camer. nisi fortè in Creta, vnde semen Epithymo immixtum desertur.

Saporem non nihil fertidum habet, siquidem Camerario credendum, ac diutius commandata, saluam prolicet. Liquor stillatitius dulcis est primo gustu, postea verò non nihil linguam vellicat, fortè putridis vlcetibus, si quis periculum faciat, non incommodus.

OXIS, SIVE TRIFOLIUM ACIDVM,
flore albo & purpurascente.

CAP. LXVI.

Est Trifolii annueranda planta, quæ à vulgaribus Herbariis *Panis cuculi* vocatur, vel quòd Cuculus auis eâ vescatur, vel quia hæc erumpente Cuculus vocem suam edere incipiat, in officinis autem Trifolium acetosum ab acido sapore, ac à Plinio Oxy eadè ob causam. Ex crassiusculâ squammatâ, alba, vel ex albo rubente radiculâ longâ & crebrâ pendent fibræ albicantes, indidemque emergunt pediculi infirmi, tenues, rotundi, palmares & longiores, ternâ gerentes folia, latis magna, latiora quàm longiora, cordata, hirsuta, ex viridi flauentia, sæpè reflexa, ut capitulum ad pediculum co-

Tom. II.



tus turbinatam reddat formam, sapore acido: inter hæc alia surgit pediculi, florum singuli sustinentes, vnicum, magnum, albicantem, striatum, tenebrum, folliculus pentagonus, quò attracto semen exilit rufum: nucleo Persici simile, striatum.

Brunfels. Trifol. ac. Tom. 3. cum foliis. Matthiol. Cast. Dur. Histor.

Lugd. & Thal. Trifolium acetosum, & herb. ger. Trifolium 5. Oxy, autore Dodonæo, *Alimonia* vulgi Alexandro Benedicto. Lob. & Penz. Adu. pusilla videtur Lotus.

Oxy autem Plinii nunquam ad Lotos pertinere, doctè Gesn. existimauit. Patet igitur vel hæc Lobelium memoriâ lapsum.

Anguill. non vult affirmare Oxy esse speciem Trifolii acidi. Cordus, qui describit, dicit Oxy *Alleluia* vocari. Ruell. Oxy Plinii; vulgò *panis cuculi* dicitur, & Herbariorum Trifolium 4. dum quod acidum nominant. Cus. Hulp. Oxy vulgare.

Trago si non refragandum, fieri potest, ut sit Oxy seu Oxytriphylon apud Dioscoridem. Oxytriphylon possit etiam dici siluestris Acetosa, seu Oxalis wild sicut ampfer. Sunt qui *Luyula* & *Bathael* nuncupent. Vide Messem, Matth. Syluaticum, Leonh. Gilbertum, & Jac. Manlium super vng. Marciaton. Oxytriphylly quoque nomen apud Dioscor. videtur eidem Hist. Germ. superfluum & pertinere ad *Gaidhpflee*, Trifolium acidum. Hæc ille, cui si notum fuisset verum Trifolium bituminosum, ei reliquisset nomen Oxytriphylon, quod non malè conuenit.

Ad stipulatur nobis Cornarius, dicens: Oxytriphylon cum Oxy nihil commune habet. Oxy Plinii crediderim esse Trifolium acetosum dictum. Hinc malè videtur Cæsalpino Plinius per Trifolium alterum, acuto folio Oxytriphylon intelligere Trifolium acidum, quod alibi Oxy vocat.

Nec defunt Monachorum testimonio, qui per Triphylon intelligi putent Trifolium acetosum, *Alleluia* nuncupatum. Fracast. Luyula, fortè Oxy Plinii.

Trifolium autem acetosum differt sexu. *Fœmina* [inquit Cam. in Epi t. Matth.] flore albo, venis purpurascens distincto. Mas totus purpureus, rarus inuentus.

Tab. Oxy & Trifolium acetosum floribus lateis.

C. Bauh. phyt. Trifolium 13. siue acetosum vulgare. Variat flore lacteo, purpurascens & luteo. Hæc Frater, qui quo Autore dicat vulgare Trifolium acetosum flore esse luteo, me latet. Ego nunquam me audire aut meminisse, aut quemquam scribere obseruavi. Paulò pòst quidem scribam de luteo, sed differente à vulgari.

Fuch. Roessl. pro *Alleluia*, *Panis cuculi*, seu Trifolio cuculi, iconem Trifolii albi exhibet. V.

K k

et autem Oxyos icon est pro Epithymo malè posita, malè quoque Trifolii titulo ubi potius ponenda est dicta icon Trifolii albi.

Ceterum Oxin Plinii, siue Trifolium acidum, quidam existimant Oxytriphylon Dioscoridis, non sine insigni errore. Oxytriphylon enim & Oxytriphylum, de Trifolio, bituminoso Vetenibus dicitur. Nec finitè bene Lotum sativum quidam putavere Trifolium Asphaltites & Oxytriphylum. Nobis hæc est Lotus sativa, odorata, annua, flore cœruleo. Malè quoque quibusdam Scubonii Oxytriphylon: dicitur nobis Trifolium rectum Monspeliense. Pessimè tandem à nonnullis pro Oxytriphyllo altero Scubonii habetur, de quo nos sub Trifolio albo, recto, hirsuto valdè.

Linguarum
Nomina.

Locus &
Tempus.

Vires & vi-
sus
Eutrophia
Futura
tempestatis
nuncia.
Tempera-
mentum
Ventriculi
argores
Aqua
Fibris men-
sa
Succus
Bisphlegma
Faucium
calida, flu-
ida
Affectus
cordis &
Gentriculi
Pora
repreh.

Conferua
Pessimè

Defecti

Oxytriphylon, Oxy, Oxy Pliniana, Acetofella, Oxalis minima, Trifolium acetosum, acidum, panis incultus, & Alleluia. Gall. Pain de veau. Germ. Saur: Büch: Ganch: & Guchganchlee & Saselke. It. Saffen. Ross. & Büschampffer. Büch: Ganch & Guchganchbrot, Guchenchlauch / & Ganchlin. Belg. Coctoutis brot. Angl. Wed saur. Hung. Alleluia sui.

Oxyn flore albo observavi Genevæ semine maturo Iunio. Patavii cum siliquis Decembri. Bononiæ al burgo di S. Catharina. Basileæ copiosè Augusto circa Dornach in montibus. Frater autem C. Bauh. in monte Montets. Ceterum opacis plurimum provenit locis prope sepes & itinera. Jac. Gargillus invenit flore purpurante prope Newbaüss que est ultra parvam Baniicam in Marchionatu: nos autem inter Bessfordiam & Raupach in dumetis florens Martio. Montbelgardi passim florens Aprili, vitens Augusto.

De eius viribus hæc Plinius. Oxy datur ad stomachum dissolutum. Edunt & qui enterocelelen habent. Observasse autem scilicet scribit Fuchsius, atque adeo multorum experientia cognitum, quod eius herbæ copiosi flores crebras illius anni pluvias, & aquarum inundationes certò portendunt: pauci contra, siccitatem. Tota planta, auctore Matthiolo, refrigerat Oxalidis modo. Quare deuorata, sitim & ventriculi ardores extinguit. Iecur refrigerat & cor roborat. Stillatia huius aqua datur vultu potanda acutè febre laborantibus, sed multò magis præstat succus ex saccharo potus. Illinitur idem per se erysipelatis & inflammatis locis: osque eo colligitur, cum lingua, palatum, faucesque calidà fluxione laborant. Placet autem Triphyllon Alleluia dictum ad affectus cordis, vel ventriculi potus & oris eius, commendari. Propter temperamentum quod ex sapore proditur, non autem propter cordis figuram, ut Porta vult. Siquidem multa sunt, quæ talem figuram habent, nec cardiaca comprobantur. Displicet quoque quod laudet propter rectas, longas, & rigidas vaginulas ad serpentum morfus. Quis enim consulat, ut applicetur planta adstringens & refrigerans morfui serpentum? non invenio Plinium aliquid tale de Trifolio acido scripsisse. Suspicio Portam confundere cum modò dicto Trifolio, Trifolium Asphaltites. Præ ceteris demum, teste Io. Bokelio, ad pestem laudatur conferua Trifolii acetosi verno tempore cum

Sacharo præpara-
ta sumpta manè
ad Castaneæ
quantitatè.

OXYS LVTEA.

CAP. LXVII.



dependentia: gustus acidi: floris forma stellata eadem, sed color luteus: quem cornicula, siue stilique seu vocales sequuntur, solum spectantes, crassiusculæ, foliosæ ex quinque loculis constituta, quæ ubi ad maturitatem pervenire leuissimo tactu femina plurima, parua, ruffa, vel flaua C. Bauh. alperæ exiliunt è lateribus: oculis quamplurimum conuenientibus, ut ne appareat siliquas dissilisse. Radix longiuscula, gracilis, fibrata.

Huius Trifolii his meminerunt nominibus (Oxy, siue Trifolium acetosum flore luteo) Clusius Dodon. Cam. Tab. & Lob. qui præterea Obs. Oxyn luteam corniculatam repentem, & Oxyn luteam Clusius, cum Hist. Lugd. inscribit. C. Bauh. phyt. Trifolium 12. siue acetosum corniculatum luteum, qui antè vulgare luteum quoque dixit, quasi ab hoc diuersum, ita ut duo genera faciat. Ponit is iconem in renouato Matth. ubi vocat Trifolium acetosum flore luteo Castori.

Vmbrosis quibusdam circa Hispalim locis nascitur. Apud Belgas, atque adeo in omni solo facta provenit, quæ & semel facta, postquam florere cepit tota deinde æstate flores producit, & semen fert: plantæ tamen omnes, ut Clus. dicit, Hiemis inclementia pereunt, sed & semine decido renatæ si rigida Hiems subsequatur plerumque corrumpuntur, profusque genus interit, frigidioribus præsertim regionibus. Hæc Clus. Ego quidem cum Monspeli essem vidi flore luteo mense Iunio, & postea Octobri florentem circa Gangem. Heidelbergæ copiosè in horto D. Sprengeri, & Basileæ D. Zyvingeri, vnde in hortum Montbelgardensem transfusi, in quo se quotannis semine propagauit.

TRIFOLIUM ACVLEATVM CRETICVM.

Arum est hoc Trifolium Cretæ munus, cui Deia cauti in ramos alternatim oriundos, creberimos, angulosos, denudè in minores ramulos diuaticatos, humique suos, striatosque diuiditur, ubique verdè quæ rami, surculi, diuiduntur, duo exeunt pedicelli breues, oppositi, singuli folia terna, parua, oblonga, in acumen spinosum desinentia, glabraque sustinentes: videmus quoque diua-

que diuaticationibus subsunt, adunci, rigiduli,



mordaces deorsum spectantes aculei: superius verò ex ipso ramorum coitu pediculus exit brevis, cui ex calyce viridante emicans infidet flos amoenus, magnus, purpureo-violaceus, Lysimachie speciosae similis, è quinque foliis compositus, medium obsidentibus apicibus luteis: siliqua

quatuor, aut quinque, costis canaliculatis, latiusculis, ad mucronem turbinatum coeuntibus constant, semine in singulis contento lato, ruffo.

C. Bauh. phyt. *Trifolium* 33. siue spinosum Creticum cœruleum, quod in horto Montbelgardensi apud Fratrem Io. Bauhinum legimus: accepimus etiam à Laurentio Rosenavv nomine Trifolii spinosi, semper virentis ex Candia, Cysti flore. Clus. in post. Hist. vocat *Trifolium spinosum Creticum*, Honorio Bello, Orbitochorto, dubitatque an Tribulus terrestris Diosc. *Orbitochorto* sit, aut saltem genus aliquod. Sed nota Dioscoridis, nobis quidem iudicibus, videntur melius respondere iam recepto Tribulo terrestris: siquidem Trifolio Cretico non sunt folia *trifolia*, qualia requirit Dioscorides.

Casabona praefectus horti Ill. Ducis Florentiae ex horto eius Pisano misit Stutgardiam semen cum hac inscriptione: *Orbitochorto*, Trifolium aculeatum, flore Cysti, rarissima planta Candiae. Sata Montbelgardii in horto Ill. Princ. mense Aprilis, prouenit ex semine mihi misso Lutetia à Robino, floruit principio Iulii. Nata quoque erat Moguntiae in Reuerendissimae eius Celsitudinis horto, semine ex Italia quidem misso, sed ex Creta accepto.

TRIFOLIUM PALUSTRE.

Geniculata radix, longa, alba, prorsum incedit fibris subinde demissis, firmata, pediculi inferius latiores vaginæ instar, dodrantes, tria habent annexa folia, magna, fabaceis formæ & magnitudine respondentia, læuia, inter hæc caulis surgit cubitalis, læuis, gracilis, virens, thyrsus gerens florum, ex albo purpurascens, qui Dalech. priusquam dehiscant candidi, nonnunquam subrubentes ac rotundi: eum reclusi in quina folia diuisi, oblonga, tenuissimis & candidis filis, veluti lanugine, siue pube quadam elegantissimè crispata, folliculi inde parui, rotundi, siue rotunda capitula aut vascula, in quibus semen Helianthemi simile, ex fusco flauescens: amari gustus.

C. Bauh. phyt. *trifolium* 16. siue palustre. *Isoyron* Diosc. quorundam, aliis *Menianthes palustre* Theoph. 4. Hist. II. *Mensiflorum* Gaza vertit. Thallio Harc. *Trifolium palustre*, seu *castoris*, *Isoyron*

Dodon. Limonium verum Cordi, oder vasserweisen mangols, quoddam nempe irriguis pratis & consimilibus locis gaudeat, à quibus Limonio suum apud Græcos nomen antiquitùs obtigit.

Tragus idem Limonii pratenfis nomine describit, sed apparet ipsum incidisse in locum, ubi stirps hæc florifera quidem fuerit, sed floribus eius absque fructu intercedentibus, vnde ipse existimauit, nullum herbæ huius fructum prorsus esse.

Compiler Tabern. duas exhibet figuras, nec ostendit qua in re differant præter magnitudinem. Hort. Lus. *Trifolium palustre fibrinum castoris*, Biberstee/Lügentlee. Dodon. Gall. *Isoyron* vocatum est à quibusdam, teste Dioscoride, *rhafalon*. Item in fol. *Faselus hircinus*, aut *Bona hirsuta*, Belg. *Boixboonen* Harch. in Enchir. quoque *Limonium* vocat, verum confundit cum eo *Pyrolam*.

Lonic. *Limonium*, *limonium pratense*, & *Beta siue stris*. Hæc ille, qui nomina solum absque descriptione ponit, ideoque consule nimis capite de *Pyrola* duas figuras ponit.

Lob. & Pena [qui in Adu. quærunt, *Trifolium paludolum*, siue potius *Isoyron*, quàm *Melanthii* species?] scribunt, cur huic Trifolio, a quatuor vocato, quod potius *Isoyron*, Matth. *Isoyron*, *Melanthium* quoddam prætulerit, vix coniectari licere.

Caterùm, Gesnerus eorum opinionem non probat, qui plantam hanc *Limonium*, aut *Dioscoridis Isoyron* esse affirmant. *Isoyron* siquidem Diosc. Anisi folio constat. Lotus [inquit is, forsitan est palestris VVoifelli].

Hist. Lugd. *Menianthes palustre* Theophrasti. *Isoyron* Dodonæi, cuius sententia, tum Dioscoridis, tum Plinii authoritas, maximè refragatur. Hist. Lugd. duas proponit icones. Priori titulus est modò dictus. Altera verò, *Menianthes palustre* Dalechampii inscribitur.

Nascitur vliginosis ac palustribus locis, sterili ac macro solo, aquarum tamen affluxu semper madefcente, extra aquam citissimè flaccescens. Primò vidi Tiguri florens Maio, postea Genevæ semine maturo Iulio.

TRIFOLIUM HEPATICVM, SIVE TRINITATIS HERBA, flore cœruleo.



Hæc plantæ Deser.

Folia sunt ex longis pediculis triquetra, auersâ parte Matth. Cyclamini modo subpurascens, superiore verò albis quibusdam maculis respersa: caulis ex radice tenuis, florem in cacumine sustinens stellatum, cœruleum: semen colore non diuersum, oblongum: radices tenues, plurimæ subrubentes.

Græcis & Mauritanis [inquit Hist. Legd.] inco-

*Hepatica
Elymen
Herba Tri-
nitatis Ger-
m.
Varietas.*

gnita videtur fuisse, hæc quæ hodie ab Herbariis. *hepatica*, dubio procul quodd Hepaticos iuuet, & herba *Trinitatis*, à foliorum figura nominata est. Huius flores colore variant, aliàs cœrulei, aliàs purpurei, & quandoque nuci. Nonnunquam etiam folia [florum] maiora, maculis, notulisve variegata spectantur.

Balaris.

*Epimedium
Lichen non
est.*

*Hepatica
nobilis.*

Dodon. gall. *hepatica*, Et Lat. *trifolium aureum*. Baptista Sardus, inquit, *Trinitatem*, & *Trinitatis herbam*; [re & Itali apud Gesn.] nominat. Sunt qui *Balaris* esse suspicantur, quam *Trifolium* herbam esse Hesych. scribit: Sed *Balaris* descriptione non extante, nihil definiti potest. Ceterùm *Trinitas* à Cordo *Epimedium* redditur. His autem (inquit Trag.) qui hanc herbam *lichen* esse statuunt, assentiri non possum. Omnes empirici eam *Hepaticam* esse statuunt. Germanis *Edel leberfräut*, *hepatica nobilis*, Hieron. Braunsch. *Guldenflee*, *trifolium aureum* vocatur. Ego quoque [sic & Lonic. Matth. germ. & Cast. Dur. p. 464.] appellant. hic præterea pagina sequenti 465. *Trinitatem* nominat, atque ita duas figuras & descriptiones vnius herbæ ponit; [vocabo *trifolium aureum* seu *magnum*.

*Hepaticum
Trifol.
Trinitas
Herbar.
Hepatica
terrestris.*

Lob. & Penz. Adu. *hepaticum trifolium*, siue *trinitatis*: Obs. quoque *Hepaticum Trifolium hepatica* & *Trinitas* herbariorum. *Epimedium Tragi* Cordo. Gesn. *Hepatica* terrestris, & aurea flore cœruleo & rubro Tabern.

*Hepatica
trifolia.*

*Brunfels.
Taurum.*

*Lagopus
Pes leporis.*

*Amat. ro-
prob.*

Camérarius, cui in horto, *Trifolium Hepaticum* flore cœruleo dicitur, scribit apud Matth. *Trinitatem* inueniri flore rubente, & interdum albo [maculosoque Cæsalp.] Tardiùs autem eas florere, quàm cœruleam. Hoc ita confirmat Clus. Planta quam nonnulli *Trifolium nobile* [Edlen flee] vel aureum, & *Hepaticam trifoliam*, appellant, flore, vel est cœruleo, & præcior: vel ad cœruleum tendente, & ferius florens.

*Lagopus
Pes leporis.*

*Amat. ro-
prob.*

C. Bauh. phyt. *trifolium 14.* siue *Hepaticum*. Pingit Brunfels. lob *Hepaticæ* [hyrsflee] titulo, vocatque ex Hieronymi Herbario, *hepaticam tertiam*, & *Trifolium aureum*. Brunfelsium reprehendit Amatus dicens, *Lagopus*, herbam illam, quam *Trinitatis* appellant, esse, credendum est: Hæc herba *Trinitatis*, *Pes leporis* dicitur, & à Brunfelsio inter *Hepaticas* reponitur, quæ in re nulla præstanda fides. Sed miror Amatum *Trinitati* tribuere cubitalem cauliculum, ac dicere alia in descriptione, quæ non multum conuenire videntur: hæc etiam non nascitur in segetibus, quod Diosc. tradit de *Lagopo*. Brunfels. quoque non ex se, aut ex autoritate Hieronimi, bene vocat *Hepaticam*. Robert. Confl. apud Amatum, Alteram herbam *Trinitatis*, *pied d'Alexandrie* ou *d'Aluette* vocat, quæ *Lagopus* Lusitano, Matthiolo absque nomine cap. de *Trifolio*. An autem Robert. congruè tribuat ei nomina gallica, mihi nondum constat.

Rob. Confl.

Trinitatem vulgò dictam flore cœruleo Brunfels. inter *Hepaticas* numerat, licet non inueniam (ait Matth.) inter Græcos antiquos, aut Arabes, qui eius meminerint.

*Tora, &
Taur.*

Cæsalpinus *Triada* seu *Trinitatem* ab Hermolao, & aliis quibusdam *Toram* & *Tauram* appellari scribit. Nos id apud Hermolaum nondum legimus. De *Tora* agitur lib. 34. vii quoque de *Anthora*, quam à nonnullis *Hepaticam auream*, & *Trinitatis* herbam nuncupari Thalius in Hæc. tradit. Alia porro est herba *Trinitatis* nomine donata, vocaturque *Viola tricolor* à quibusdam etiam *Iacca*, de qua suo loco

*Viola tri-
color.*

*Nomina
linguarum.*

Hepatica, hepatica nobilis, aurea, trifolia, Trini-

tas, Trinitatis herba. Trifolium hepaticum, nobile, aureum. Germ. *Leberfräut*; Edel: Vond Gulden Leberfräut. Edel: Vond gulden flee. Belg. Edel: Vond Gulden lebercrut. Gall. *hepatique*. Boech. *yatrunk* trogyliti.

Offendi *Trinitatem* variis in locis. Ceterùm, loca, quærit viginosa, & opaca, hinc in fructibus frequens.

Probatur maximè à recentioribus Medicis ad vulnera glutinanda, tam foris illita, quàm intus: item ad enterocelas, in quæm usum puluerem dimidii cochlearis mensura ex vino anistro propinant. Tota planta decoquitur in vino eodem ad columellæ, fauciumque inflammationes. Refrigerat enim, siccât & roborat. Quare aduersus intemperies calidas, & inflammationes hepatis, & febrium calores perutilis.

TRIFOLIUM HEPATICVM FLORE albo.

Quoniam autem in *Trifoliorum* historia veritas [inquit Clus.] obiter etiam meminisse hoc loco libuit *hepaticæ Trifoliz* flore albo, quæ Belgici hortu alunt munero Alphonsi Panti Ferratensis Medici, qui eam nobis Mechliniam misit. hanc etiam non solum Viennensi agro sed omnibus in siluis Pannoniæ & Austriæ interioris spontè nascentem obseruabam. Nam Viennensis salus omnes *hepaticas*, præter eam, quæ pleno est flore, alit. Nos in montanis Sabaudiz Syluis etiam vidimus.

TRIFOLIUM HEPATICVM, SIVE Trinitatis herba flore rubro.



Hepaticæ Trifoliæ rubro flore alunt Belgici hortu, munero Alphonsi Panti, qui Mechliniam mittebat: Viennensis ager alit eam, quæ incarnato, siue rubello est flore: apud Nisam Silesiæ, & Ienæ Thuringiæ etiam spontè nasci Clusius ab amicis intelligebat.

TRIFOLIUM HEPATICVM FLORE pleno.

*P*urpureo cæruleis multiplicibus floribus stipatam elegantiam peregrinam, præclaro D. Io. Brancioni, doctissimum p. m. Alonsus Panticus Ducis Ferrari. Medicus misit: cæteroquin *folia, radix*, cum superioribus hand abfinitia.

Lob. Obs. & Ic. Pl. Tom. 2. p. 35. *Hepatica trifolia polyanthos*. Clus. Pannon. *Trifolium nobile* *hepaticæ* cæruleo flore, quod Panticus Mechliniam misit. Item in fol. ait: Post meum Viennæ discessum, inuenta est apud arcem Sternberg Locust. Mag.

LIBER XVII.



Mag. Dn. de Heufenstain in silvis illis, quæ ab illa arce ad niueum montem extenduntur, etiam illa Hepatica trifolia, quæ flore czruleo est, & pleno. Taber. *Hepatica aurea multiflora*, gessit gulden Leberfrant. Camer. ad Hist. Matth. *Trinitas flore plenz.*

EPIMEDIUM QVORVNDAM. CAP. LXVIII.



Pro Epimedio ostenditur hodie planta, pulchra sanè & nostris oris rara: *radix obliqua* agitur, nec altè demersa, gracilis satis, sed longa, lignosa: hinc surgunt *pediculi* dodrantes, atque etiam cubito altiores, tenues, politi, rigiduli, in ternis *surculos* diuisi, quorum singuli sursum

internos alios diuiduntur, ita ut vnicuique *solum* hereat unum *Hederaceum*, ex rotundo oblongum, rigidulum, acuminatum, neruosum, auersà parte glaucum, superius ex vindi pallefcens, iuxta *pediculum* pinnis duabus subrotundis, quarum altera alterà longior, donatum, circumcirca mitibus *denticellis* crenatum: *pedicularis* quidam ramus paulò infra primam ramorum diuisionem palmaris aut dodrantis in ramulos diuisus, quorum vnusquisque plures gerit *flores*, priuatis petiolis hirsutis nixos; quatuor foliis purpurantibus constantes, quorum medium occupant *apices* lutei.

Epimedium nominat Anguillara, dicitque Dioscoridem in eolapsum, quòd putet carere flore & semine. Aduers. Lob. & Penæ *Epimedium* quoque tradunt, suspicanturque Epimedium hoc esse *Epipetrum*, ut Plinius legisse videtur Theophrasto memoratum, non autem ut vulgò legunt Epimetrum. Epimedium (inquit Dod.) appellatur: sed legitimum affirmari nequit. Diosc. enim *florem* & *semen* ei esse negat: Plinius etiam nunquam florere refert. Hist. Lugd. Tabern. & Camer. Epimedium. In mon-

Tom. II.

tibus Liguriæ planta proueniens dicitur Cæsalpino.

Observauit Patavii in horto Iesuitarum, D. Locup. & Cortusii & Triuelani, Ferrariæ in monasterio S. Dominici à l'angelis, in montibus Euganeis inter balneum Aponense & Arqua, vbi Genèr Cherlerus etiam observauit copiosè *florens* Martio & April. Stutgardia *florens* Maio, in horto Ill. E. C.

ANONIS, SIVE RESTA BOVIS, vulgaris, purpurea & alba, spinosa. CAP. LXIX.



Longè late-
que *radice*
spargit albidas
fractu perqu
contumaces,
ramis verò li-
gnosis, simplici-
bus & frequen-
tibus fructu-
cat, cubitum
vnum, aut alterum
longis, tenuibus,
rotundis, hirsutis,
tuberculentibus,
lertis, spinis
longis & rigidis
armatis, interdum
verò nullis, prius-
quam decidant
folia: *folia* spi-

Descriptio

nis ferè proximo ortu, incondita, sublonga, Ciceris singularibus foliis simillima, nigricantia, hirsuta, in ambitu crenata, sapore leguminoso, tactu glutinosa, odorataque: teste Cæsalpino, *flores* Coluteæ, sed colore purpurascete, albo, vel carneo: *siliqua* parua rotundum *semen* continent, *Vicia* formæ & sapore.

Optandum esset, ut omnes Antiquorum descriptiones, qui de Medica materia, aut de plantis aliquando egerunt, tales essent. Felicissimè si quidè vnus omnium Theophrastus autem de rebus hanc expressit, scribens: Ononis in ramis aculeata est: annuam fert frondem, Rutæ folio similem, quam toto caule profert, facitque tota veluti coronæ formam per intervalla disposita: *florem* minutulum, & in siliqua non vndique septum edit. Nascitur pingui & glutinoso solo, præsertimque in segetibus, atque cultis: quam ob rem aratoribus inimica. Nec faciliè perit, cum semel alto & pingui solo hæserit. Descendit enim quamprimum, & quotannis regerminat per latera se spargens: iterumque in interiora terræ nitens descendit, sequenti anno copiosius nascitura. Eruenta tota extirpandaque penitus est: Quod, cum terra imbutibus maduerit, egisse oportet. Faciliè enim tunc tota perit. Si quid enim ex ea reliquum fuerit, ex eo iterum renouatur. Estate germinare incipit: Autumno autem incrementi sui finem habet.

Folio Rutæ.

Anonis (inquit Diosc.) quam aliqui Ononida [Ononis] vocant, ramos habet dodrantes & maiores, fruticosos, multis geniculis præditos, & qui alas multas habent: capita rotunda: folia parua, tenuia, velut Lentis, ad Rutæ, aut Loti pratensis folia accedentia, subhirsuta, odorata, non iniucundi odoris. Muria conditur antè quàm spinas producat, estque cibo gratissima. habent ras

Lori pratensis
siliqua,

in vitream metam coniciuntur, ex qua incalens aqua balneo collocata elicitur aqua, quæ epota semilibra pondere, non solum renes à calculis liberat, & urinam prouocat, sed etiam vesicam, & eius ceruicem à glutinosis excrementis obsecam expedit. Cæterum, quoddam Veteres hanc herbam, antequam spinosa fieret, muria condierint, factum est, quia in cibo sumpta fætidum oris halitum emendare tradebatur.

Anonis spinosa lutea.

A Nonidem spinosam luteo flore habeo col-
loctam Lutetia, quæ minor vulgari purpu-
rea & alba.

Matth. in Dioscor. & post. comm. Ital. Anonis
flore aureo.

**ANONIS LVTEA NON SPINOSA, DA-
lechampi Natrix.**



A Nonis
vulgari
similis est, vir-
gultis cubitali-
bus, in frequen-
tes ramos fil-
sis, spinarum
expertibus. su-
lia terna co-
herent, oblon-
ga, hirsuta, per
extremum cre-
nata, viscosa,
odorata, apor-
re nullo eui-
dente: flores
longis nitun-
tur pediculis,
Anonidis spi-
nosæ purpu-
reæ maioribus
lutei, conferti:

*filiquæ viciales, te retes, hirsutæ, semen continent
colore pullo, inquit Camer. Herba tota est hir-
suta, & pinguis, odorata, sed hircinum quiddam
olet.*

Camer. in Epit. Matth. figuram ex siccis meis
plantis D. Gesn. missis sub his nominibus ponit.
Anonis lutea, montana. Natrix alius. An Bellon.
de plin Creta prouenientibus, Vera Melilotus
odorata, crescens in collibus herbosis, similis fe-
rè Ononidi? Lob. & Pena Adu. vocant Natticem
Plinii Herbariorum, & describunt distinguentes
ab Ononide lutea. Huius fortasse meminit Mat-
th. cum ait: Anonis interdum constat flore au-
reo, sed quibusdam in locis aculeis vacat.

De hac ita Cæsalp. Diosc. Cicer. filu. tradit, odo-
re graui. Hoc genus videtur significasse Theoph.
cum dixit inter cæteras differentias, quoddam o-
dore differre: & Aëtius Orobiazum hoc idem ap-
pellasse videtur: specie Ononis [vnde quidem
Ononim lauem appellant] flosculos fert & fili-
quas exiliiores Cicere, & semina in his parua &
rotunda, subflaua: tota planta constat odore val-
de medicato, Theriacam imitante, vnde vulgò
Theriacaria herba vocatur, laudata ad vermes, e-
necandos. Quod Cæsalp. flosculos dicit Cicere
exiliiores, non conuenit cum nostra Anonide,
cur idem floris colorem non tradat, nos latet. O-
nonim luteam non spinosam (inquit Hist. Lugd.)
sunt qui Melilotum maiorem, Melilo-
tum filu. pinguem, & Natticem Plinii cognomi-
nent. Et hæc, quod non solum radix euilla, sed &

herba tota virtus hirci: aut, vt aliqui exponunt,
bituminosum & grauem fæctorem redoleat. Cæ-
terum hæc in Piceno (ait Plin.) à feminis abi-
gunt, quos mira persuasione Fatus (Faunos a-
lii) vocant: ego species limphantium hoc mo-
do animorum esse crediderim, qui tali medica-
mento iuuentur.

Dodon. Anonis flosculo luteo. Clusius Anoni-
dis nostræ hirci ferè meminit: Anonis mitior,
non spinosa, siue secunda, flore luteo [præsertim
si in hortis colatur] purpureæ aded similis,
vt ab ipsa antequam flores explicentur] nisi dili-
genter in ter se conferantur (vix discerni queat:
paulò tamen pinguior apprehenditur, nec aded
grauiter odorata: præterea vbi spontè nascitur
candidior est: eius item flores, qui lutei sunt, bre-
uiori spica nascuntur.

Scribit Pona in Baldoperperam Anoni luteæ
multo: pharnacopæos pro vera Melilotu vi.

Anonim luteam non spinosam Monspelii lo-
cis arenosis collegimus, & quidem florentem
Augusto & Septembri, Aprili & Iunio. Hanc a-
lias vidi Esslingæ in horto Volmarii pharmaco-
polæ. Genevæ copiosam iuxta Arne ultra flu-
uium circa superiores partes florentem Iulio.
Frater C. Bauh. misit cum hac inscriptione: Na-
trix Monspelii, prope Buttonet campus refer-
tus: Item in Castelnau, quibusdam Melilotus vn-
guosus: florere Iunio. Frequentem obseruauit
Clusius in Gallia Narbonensi, tñ in Hispania &
Lusitania florentem Iunio, & Iulio. In aridis,
glareosis & sabulosis gigni tradit Hist. Lugd.

Eadem teste aduersus omnia venena prodesse
& adnotam & sumptam experientia comper-
tum est.

**ANONIS NON SPINOSA PUR-
pureo flore.**



A Lunt Si-
lestica
prata Anoni-
dis quoddam
genus à vulga-
ri diuersum,
quod ab aliis
minimè ob-
seruatum Clus.
in Pannon. ex-
istimat. Mul-
tos hoc an-
nuatim ex ra-
dice durâ, li-
gnosâ & pe-
renni fert sur-
culos cubita-
les, rotundos,
lentos & vi-
mineos, fir-
mos tamen &
admodum ra-

mosos, mollique lanugine obductos: multa folia
alternatim caulem latâ basi amplectentia, inter-
dum singularia, plerumque autem terna, ex eod-
em pediculo prodeuntia, molliora & ampliora,
quàm vulgaris: summi virga & rami desinunt
in oblongam spicam florum vulgari quidem si-
milium, sed colore magis sanguineo, filiquas de-
inde persimiles vulgari, quæmadmodum & semen
fert. Tota planta lento quodam humore grauiter
& hircinum olente obrita est, Fraxinellæ ferè
odore, & nullo aculeorum vallo munita.

Vocatur autem hæc à Clusio tam in Pann.

*Melilotus
vera.*

*Locus &
tempus.*

Vires.

Descriptio

Anonis trifolij
Trifolium
fruticosa
Anonis sine
spinis

quàm post. Hist. Anonis non spinosa, siue mitior prima, flore purpureo, cuius semen è Silefia ci missum Trifolij maioris & scetidi nomine. Dedit nobis D. Agerius Ononidem purpuream sine spinis, cōflectam in S. Haunonia, ea nostrati spinosæ alioquin huiusmodi respondens coni Clusii.

TRIFOLIIS AFFINIS ANONIS

pusilla glabra fruticans Cherleri.

Descriptio

Ignosis, palmaribus & breuioribus fruticat surculis, subrubentibus, tenuibus, glabris, quos folia stipant crebra, tergemina, glabra, viridantia, circumcirca crenata, oblonga, Medicæ nostratis foliis quadantenus similia: ex quorum sinu prodeunt, per totos ramos flores mascululi

conformatione leguminosorum, lutei, calyce in quinque segmenta flore longiora, acuta, ex rubro nigricantia, diuiso: succedunt stilique turgide, nigricantes, glabræ, Cracæ minimæ minores, semina quatuor, aut quinque sinuata continent.

In figura



sunt eiusdem ferè magnitudinis cum ipsis natalibus foliis.

Locus & tempus

Circa Monspelium in rupetis & squalidis collegit, & ad nos attulit Gener Cherlerius. Floruit autem Maio, & paulò post aliquas tunc, aliis subinde atque aliis profliantibus stoculis.

TRIFOLIIS AFFINIS ANONIS

minima hirsuta Cherleri.

Descriptio.

Pari cum lutea minima glabra surgit altitudine, lignosa, duraque & albicante, dimissa radice, in multos ramos hirsutos, rubentes, vel incanos filia: filia terna, angustiora, longiora, per extremum duntaxat crenata, alioqui calyce ignara, hirsuta: calyces per ramos crebri, magni, pilosi



admodum, in quinque longas aristas desinentes, pediculis contorto, deorsum terram spectantes, cancellis suis strom complexi paruum, cetera al-

bidum, testello ferrugineo. Tota est tactu viscida.

In rupetis Monspeliciis & Nemausinis vtcunque obuam animaduertit & collegit Cherlerius.

Locus

FRAGARIA FERENS FRAGA RVBRA & alba.

CAP. LXX.

Ad Trifolia accedit vel foliorum numero Fragaria, fert enim in singulis pediculis terna, sed Rubo minora, venosa, hirsuta, per ambitum serrata, supende viridia, inferius autem albican-

Deser.

tia, cauliculum palmi altitudine, ramosum & hirsutum, flores Ranunculo minores, in quina folia lectos, candidos, fructum globosum, inaequalem, per maturitatem rubrum, odoratum, sanguineo, dulci, vinoso, gratissimoque succo: prægnantem, seminibus multis & exiguis abundantem, radicem fibrosam, capillarem, oblongam, subrusam, perennem, gustuque adstringentem.

Maximè sui vel incitæ vel negligentiæ notâ Brunfels. Tom. 3. Rhap. 14. pro Fragaria Melilotum vulgarem exhibet. Ita ut merito à quolibet in dubium vocari possit, an Fragariam vulgarissimam herbam aliquando vident.

Brunfels.

Præter fraga rubra & alba, Camer. teste, reperitur aliud genus, inter hæc coloris mediū, seu flauescens, maius multo & rotundius, quod vulgò Brösling dicunt, tardiusque maturescit. Pol. lent vocari fraga serotina.

Tabern. Trifolium fragiferum. Herba quæ fraga fert [ait Hist. Lugd.] Fragaria ab herbariis nominatur, quæ quomodo à Græcis appellata sit, nondum constat. Fragariam autem ex quinque foliorum genere esse quidam arbitrantur, quod falsum. Sunt etiam, qui Rubum Idæum non spinosum esse putant, quorum sententiam non improbat Cronenburg. & Fuchsius, quibus non subscribunt Lob. & Dalechampi.

Fraga si

rina

Trifol.

giferum

Quinqu

lium.

Rubus Id

æum.

dan.

Apuleius Græcis *xyloxy* appellari scripsit, quod si verum est, longè alia est à Comaro, quæ ex Diosc. Galeno & aliis describitur. Fuchsius tamen vidit codicem manu scriptum, in quo hæc verba: Comaron Graci, Romani Fragum. Quicquid sit, ex numero Mororum esse constat. Græci Comaron appellant, ob fructus arboris eiusdem nominis. *Fragaria* à verbo *frago*, quod odorem reddo significat, nominata est.

C. Bauh. phyt. Fragaria vulgaris. 1. fructu al-

Marm

Fragaria

quæ dicit

C. Bauh.

differe

bo. 3. hispidis foliis. 4. bis fructum ferens, Fragaria, ut Cæsalp. notat, fructus differentie pauci, in figura, & magnitudine: nam quædam diff-

Tabern.

rotunda sunt, ut Arbuti fructus, quædam ob-

longa,

longa. Quoddam genus in Alpibus Bargeis vi-
sum est bis in anno fructificare, Vere sc. & Au-
tumno: eius fructus modicè compressus & stri-
atus est, sapore Rubi Idæi. Plinius Fraga tantum
meminit in Italia. Non autem idem est, quod a-
pud Serapionem Frage, de quo H. n. lib. 15. post
Piper. Apud Theoph. Chamæbatus [Humiru-
bus] vocatur, malè. Diosc. inter genera Penta-
phylli intelligit, inquit Cæsalp. quam opinionem
postea refutabimus.

Cæterum, Fragaria meminerunt Fuhs. Lob.
& Pena Adu. Obs. & Ic. Pl. Tragus & Gesnerus.
Qui duo præter rubrum & album, singulare ge-
nus tradunt, quod Harbeer appellant. Cronem-
burg. cum Cordo, cui Gesn. ex Trago figuram ad-
dit, Fragulam vocant.

Cæterum, legisti, si nō neglexisti, Fragariam fer-
re in singulis pediculis terna folia, nec plurā, licet
asserat Braslaus in Veronensi agro nasci Fra-
gariam, cui quinque pediculo insint folia, quæ-
que fraga gignat, in cibis gratissima.

Τὴ φρούρα λευκονέρι. Had. Iun. herba appellatur,
Fragaria vulgo, & Fragula, germ. Erdbeerfrucht
Gallis Fraiser, Ital. Fragaria & Fragole. Ipsi fru-
ctus Virg. ac Ouidio fraga, Servio Mora terrestris,
Germ. Erdbeer Belg. Erdbeysen, Gall. Fraises,
Gallo-Belg. des Chapirons, Ital. Fraga, Hsp. Miezga-
do, Mayüta, Angl. Strawberry, Bohem. asody,
Hung. Epöry.

Passim in montibus, non raro in conuallibus,
in siluis, ac aliis similiter aliquantum vmbrosis
Fraga gignuntur: proficiunt & in hortis. Viret
toto anno herba: Vere latius fibris suis expat-
iatur, ac deinde floret: Iunio, prius ac tardius fru-
ctus maturi sunt.

Coqui, autore Trago. ex Fragis pulcriculas vti-
lissimas conficiunt, quæ ob refrigerationem vim
inflammatione laborantibus rebus quàm sanis
exhibentur. Aqua è fragis destillata præstantis-
simo est remedio internis quibusvis icoris &
pulmonis, aliisque totius corporis inflammationi-
bus, siue resurguendis ad eadem Fraga ipsa
faciant. Leprosi, quibus nimium calet sanguis,
faciesque plurimum rubet, aqua fragorum distil-
lata longo tempore vitam ac valetudinem tueri
possunt, si bis aut ter quotidie illam bibant men-
sura utrum ligularum. Aqua fragorum destillata,
pari ratione bibita, cor confortat, vitia thoracis
expurgat, morbum atque discit, sanguine
purgat, & emendat. Herba Fragariz tussis succus
malignis & calidioribus vulneribus apprimè
conducit: nam glutinat ea, & ad sanationem per-
ducit. Aqua fragorum vlcenibus oris & anginae
auxiliatur gargarisati. Eadem faciei ruborem &
maculas tollit, collutu. Vlcera tibiurum hac aqua
ablui & purgari debent, linteolisque in ea ma-
defactis semper illis imponi: nonnulli ad oculos
collyria ex Fragis conficiunt, nam sal illis admi-
scent, posteaque destillant alii Fraga cum sale,
æneo vase, recondunt, ac per octiduum cella vi-
nariae committunt, quoad in viridem aquam mu-
tentur: eā postea ad oculorum suffusionem vtun-
tur. Succus igitur fragorum expressus ad multa
vtilis, visum imprimis, vt Camer. notat, & retentæ
vriæ, Longo tempore asseruatur, viresque ve-
tustate acquirit. Decoctum ex herba & radice
diutius vsurpatum cum passulis ictericis prodest.
Stillatitia aqua manantem sanguinem sistit.

Serapio (inquit Fuchs.) Fragariam calidam &
siccam in secundo ordine tradit. Alii frigidam &
humidam in primo: Nonnulli [qui tamen pro-

sus meo iudicio hallucinari videntur] in tertio
ordine scribunt. Ego folia ipsa gustu modicè esse
amarā, & adstringere deprehendi, vt siccam esse
hac ratione, & minimè humidam oporteat. Folia
flores, fructus, & radix adstringunt. Differunt
tamen inter se, quòd folia potissimum recens na-
ta, plurimum in se habeant aqueæ substantiæ,
parum verò adstringant: adeò vt verisimile sit de
his locutos esse, qui frigidam & humidam in pri-
mo ordine Fragariam statuerunt. Est enim co-
rum temperies ex terrenā essentia, & aquea te-
pidā. Fructus immaturus frigidā terreā substan-
tiā præditus est, vt frigidus & siccus hoc nomine
dici mereatur. Maturus autem non parum siccū
temperati calidi, qui dulcis est, modicamque ad-
strictionem habet, ita vt calidus & siccus dicen-
dus veniat. De fructu itaque intelligendi erunt,
qui Fragariam calidam & siccam esse affirmant.

Expetuntur tandem in cibis Fraga (inquit
Cæsalp.) quorum gratia & coluntur in hortis. Re-
fugerant & humectant, pichrocolis conueniunt,
& siticulosos, sed copiosiore cibo caput tentant,
& inebriant: eorum succus incipientibus inflam-
mationibus commodus, præcipuè gutturis: vetu-
state vires acquirit efficaces ad oculorum suffu-
siones & ad faciei vlcera: Aqua destillata prouo-
cat menstrua. Herba adstringenti sapore constat
& subamaro, ad calculum vtilissima, & lienosis,
hepaticisque. Ad calculum fraga matura in phia-
lam aqua ardente optima plenam coniecit, post
horas 40. circiter, colato, & rursus noua in ean-
dem aquam ardentem iniicito, ac sic relinquito
optimè recta & munita ne quid expiret. Prima
autem fraga quæ post colatutam supersunt, per
lintheum validè exprimere poteris, & expressum
eum liquorem seorsim seruare. Cum vi voles,
ter aut quater in mense cochlearium plenum
sumes manè & addes puluerem de Saccharo
cando. Gratum, probatū, efficacissimumque hoc
remedium est, quod ultra 20. annos calculo con-
sistati, præ cæteris omnibus, quæ innumera
eis diuersi medici præscribere, Gesnero com-
mendarunt.

In cibis ex-
petuntur.
Tempera-
mentum

Inebriant
Succus
Guttur.
Oculus, phia-
lica.

Menstrua
Herba Cal-
cina.

FRAGARIA NON FRAGIFERA, VEL non Vesca.



subtusque canescentia, ex his fibris pediculis duas
vncias longis, ad exortum gemina, vtrinque

FRAGARIA STE-
tilis, vel po-
tius non vesca;
radice nititur li-
gnosā, satis
crassā, cortice
ruffo, adstringē-
te obductā,
multis hinc in-
dē enatis fibris
capillatā, sarmentis
suis per ter-
ram serpenti-
bus tenuissimis
rum fibrarum
productione
dennū radices
agens: folia hu-
mi sula, tripar-
tita, in ambitu
ferrata; molli
lanugine suprà

Coliculus

Flor

Calyx

Semina

Fragaria
flu.
SterilisLocus &
tempus

mucronata membranulâ eleganter alatis: coliculus teres, hirsutus, vno aut altero folio tripartito stipatus, sextantis, flosculum sustinet pulchellum, candidum, inodorum, quinque foliolis constantem, ex calyculo decem mucronatis, hirsutis folliculis donato: in medio flaminula plurima: semina ex capitulis, Pentaphylli aliquantum similibus.

Lob. Obl. *fragaria flucstris* minimè vesca, siue sterilis. Gein. hort. *fragaria species* sterilis. C. Bauh. phyt. *fragaria sterilis*.

Fragaria sine fructibus vesca: Montbelgardii in horto Ill. E. C. floret Martio & Aprili.

Coliculus *Flor* *Calyx* *Semina*

PENTAPHYLLON SIVE QVINQVEFOLIUM Veteribus.

CAP. LXXXI.

Non scandit quidem Pentaphyllum, nec ceu Fragaria, trifolium est, sed huius instar ferpit, ac similia folia, nec fructum valde dissimilem, adeo ut nonnunquam à quibusdâ confundantur, profert. Quæ ratio est, quod hunc ei demus locum.

Dioscoridis
lectio valde
illustratur

Quinquefolium (itaque describente Dioscor.) ramos fert, lomentuos, tenues palmi altitudine, in quibus est fructus *ἴσ' ὅν ὁ καρπός*. Folia habet Mentæ *ἡ δὲ φύσις*, similia quinque in singulis pediculis, raro plura, per ambitum terræ modo diffusa: florem cum pallore rubentem, auri speciei *ἡ χεῖρα*, *χρυσόειδης*. Radicem subrubram, & longam, Veratro nigro (*ἡ δὲ ῥίζα μέλαινα*) crassior.

Theophrastus
de PentapelesPentaphylli
SedaTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatioTheophrasti
variatio

Theophrastus, autem *πενταπύλλον* (vetroque enim, inquit Theophrastus, appellatur nomine) radix cum effoditur, rubra, siccata verò, nigra & quadrangula (*τετραγώνου*) exiit, habet folium Vitis (*ἡ φύσις*) paruum quidem, alio colore simile: crescit & perit cum Vite (*τὸ δὲ αὐτὸν*). Folia omnia quinque, vnde & nomen: caules verò super terram (*ἐπὶ γῆς*), quam particulam Theod. omisit) tenues mittit, ac internodiis (*ἡ δὲ ῥίζα*) crebris constat.

His similia Plinius tradidit. Quinquefolium nulli ignotum est, quod etiam frago gignendo commendatur. Græci vocant Pentapeles. siue Eamazelon (vel ut alii Chamazelum, Hist. Lugdun.) siue Pentaphyllum. Quum effoditur rubram radicem habet, hæc inarescens nigrescit, & angulosa. Theophr. legit *τετραγώνου* quadrangula sit. Nomen à numero foliorum habet. Et ipsa herba incipit & definit cū Vite. Hæc quidem ex

Theophrasto mutuata esse constat (licet mentio eius non fiat) præter illud, quod gignendo fraga etiam commendari scribit. Nec hoc obscurum est, & ambiguum, ut Hermolaus, Cornar. Matth. in post. com. Ital. & Hist. Lugd. somniant. & ante hos Leoniceus, qui errasse in hoc Plinium maximè credidit, quod Quinquefolium etiam fraga ferre dixerit Pentaphyllum, atque Herbam fraga ferentem pro eadem accepisse, ac Pentaphylli notas, simul ac vires, eidem herbarum, præter Pentaphylli nomen, adscripsisse censuit. Nam quæ herba etiam fraga gignendo commendatur, & nulli ignota est, inquit, non quinis, sed trinis duntaxat constat foliis. Existimarem quidem in re tam nota, esse codicis potius, quam Plinii errorem, ac pro Pentaphyllo, Trifolium legi oportere, nisi alia nomina subiungeret, quæ sunt Pentaphylli propria. hæc illi.

Verum triplici in errore versari Leoniceum, sequentibus rationibus Collinius perpicuum fecit. Primum quidem, quod Quinquefolium illam esse arbitrat, quæ in hortis, & agrorum limitibus, tum semitis, viisque passim conspicitur, quæ quidem vulgò, & Quinquefolium, & Pes coruinus dicitur. Hanc enim Quinquefolium esse, de qua hic loquimur, affirmasse illam plarisque constare: cum de nostra hac defensione, de qua sua accusatione sermo fortè incidisset: autumumque terræ ramusculum (nam & in hortis res agebatur) ostendisse, dixisseque illam Quinquefolium esse, in qua Plinius tam evidentem errauerit. Deinde, quod perimperitiam, herbam fraga ferre nullam posse credidit, nisi eam, quæ trina folia habet, quamque melius Trifolium dici adfuerat, & quam docti, vulgusque, Fragariam noscunt pariter & appellant. Tertio, quod folium quid sit, quoque modo accipi oporteat, in saluberrimæ herbarum descriptione, parum intellexisse visus est, quas rationes postquam variis fulciuit aliis, concludit tandem verum esse autorem Plinium, & calumniatorem Leoniceum.

De ratione nominis Pentaphylli annotat Marcellus. Non Pentaphyllum (*πενταπύλλον*) tantum vocari suâ ætate Theophrastus dixit, verum (*πενταπύλλον*) etiam, factò ab aliquibus nomine à pennis auim, ut credidit Gaza: ut autem nos opinamur, quia in quinque folia se pandit & extendit. Fecit eadem etiam foliorum formâ, ut pentatomon (*πεντάτομον*) in quinque partes diuisum (diceretur). Sic à Dioscor. inter nomina, *pentadactylon* (*πεντάδακτυλον*) quod ut in hominis manu quinque sunt digiti, sic in ea planta totidem foliorum diuisiones. *pseudofolium* (*ψευδοφύλλον*) quoque dictum, quod Apium mentitur, sitque illi in foliorum sectionibus quadantenus simile. *Calipendalon* (*καλιπένταλον*) à foliorum pulchritudine, (*καλιπένταλον*) à foliorum duritie, ut & *ζυλόλατον*. Quemadmodum & in his (*δοσαντόν* & *ἀλφάριον* & *πυράριον*) latere ex figura, aut virtutis eius aliquam rationem, verisimile est. Vocatur & *δυσμάρτις*, Manus Martis. his addit Hermol. Pentaphyllum & Pentapteron in Theophr.

Quinquefolium & Quinquennam Theodorum conuertisse. Atium hanc *Hermubor anem* (Mercurii herbam) vocari tradidisse. *Agyptios* etiam *Diffiphi* cognomine, *Dacos Drocia*, *Italos* *Diffiphrum*, *Solutam* & *Thebeon*, quaquam corrupta putet nomina. Nam & *Therumbros* & *Theonestron* quoque dictam idem Hermol. inuenit.

Sexta decima herba (inquit Albert. Magnus de virt. herb. à Chaldeis *Carulin*, à Græcis *Quinquefolium*, à Latinis *Serpentina* vocatur, & secundum Alexand. Imper. herba *Mercurii* dicitur, à quibusdam *pentadactylus*, *pentaphyllum*, à quibusdam *Calipendalo*. Nec sibi pugnat Theophrastus, & Dioscorides, licet is de radice & folio agens, *Serpentina* addiderit, *Quinquefolii* radicem effossam, siccataque nigrescere. Nam hoc à Diosc. idem dictum non est, quoniam satis fore sibi credidit, si qualis ea esset cum foderetur, dixisset. Adiecit etiam vitigineum *Quinquefolii* folium esse, non quantitate, sed colore & formâ, quodque naturam Vitis sequeretur. Sed illud videndum etiam quomodo hic *Menthæ*, ille *Vitis* folio *Quinquefolium* esse dicat, quæ malè inuicem comparari possent: quemadmodum & floris color in pallido albus, simul & auri flauo colore dici. Hoc tamen non adeo difficile videtur. Videmus enim aliquando in pallore hominis, vtrumque colorem illum.

Nascitur, auctore Diosc. in aquosis locis, & Locus iuxta canales & aquæ ductus.

fecit. Primum quidem, quod Quinquefolium illam esse arbitrat, quæ in hortis, & agrorum limitibus, tum semitis, viisque passim conspicitur, quæ quidem vulgò, & Quinquefolium, & Pes coruinus dicitur. Hanc enim Quinquefolium esse, de qua hic loquimur, affirmasse illam plarisque constare: cum de nostra hac defensione, de qua sua accusatione sermo fortè incidisset: autumumque terræ ramusculum (nam & in hortis res agebatur) ostendisse, dixisseque illam Quinquefolium esse, in qua Plinius tam evidentem errauerit. Deinde, quod perimperitiam, herbam fraga ferre nullam posse credidit, nisi eam, quæ trina folia habet, quamque melius Trifolium dici adfuerat, & quam docti, vulgusque, Fragariam noscunt pariter & appellant. Tertio, quod folium quid sit, quoque modo accipi oporteat, in saluberrimæ herbarum descriptione, parum intellexisse visus est, quas rationes postquam variis fulciuit aliis, concludit tandem verum esse autorem Plinium, & calumniatorem Leoniceum.

De ratione nominis Pentaphylli annotat Marcellus. Non Pentaphyllum (*πενταπύλλον*) tantum vocari suâ ætate Theophrastus dixit, verum (*πενταπύλλον*) etiam, factò ab aliquibus nomine à pennis auim, ut credidit Gaza: ut autem nos opinamur, quia in quinque folia se pandit & extendit. Fecit eadem etiam foliorum formâ, ut pentatomon (*πεντάτομον*) in quinque partes diuisum (diceretur). Sic à Dioscor. inter nomina, *pentadactylon* (*πεντάδακτυλον*) quod ut in hominis manu quinque sunt digiti, sic in ea planta totidem foliorum diuisiones. *pseudofolium* (*ψευδοφύλλον*) quoque dictum, quod Apium mentitur, sitque illi in foliorum sectionibus quadantenus simile. *Calipendalon* (*καλιπένταλον*) à foliorum pulchritudine, (*καλιπένταλον*) à foliorum duritie, ut & *ζυλόλατον*. Quemadmodum & in his (*δοσαντόν* & *ἀλφάριον* & *πυράριον*) latere ex figura, aut virtutis eius aliquam rationem, verisimile est. Vocatur & *δυσμάρτις*, Manus Martis. his addit Hermol. Pentaphyllum & Pentapteron in Theophr.

Quinquefolium & Quinquennam Theodorum conuertisse. Atium hanc *Hermubor anem* (Mercurii herbam) vocari tradidisse. *Agyptios* etiam *Diffiphi* cognomine, *Dacos Drocia*, *Italos* *Diffiphrum*, *Solutam* & *Thebeon*, quaquam corrupta putet nomina. Nam & *Therumbros* & *Theonestron* quoque dictam idem Hermol. inuenit.

Sexta decima herba (inquit Albert. Magnus de virt. herb. à Chaldeis *Carulin*, à Græcis *Quinquefolium*, à Latinis *Serpentina* vocatur, & secundum Alexand. Imper. herba *Mercurii* dicitur, à quibusdam *pentadactylus*, *pentaphyllum*, à quibusdam *Calipendalo*. Nec sibi pugnat Theophrastus, & Dioscorides, licet is de radice & folio agens, *Serpentina* addiderit, *Quinquefolii* radicem effossam, siccataque nigrescere. Nam hoc à Diosc. idem dictum non est, quoniam satis fore sibi credidit, si qualis ea esset cum foderetur, dixisset. Adiecit etiam vitigineum *Quinquefolii* folium esse, non quantitate, sed colore & formâ, quodque naturam Vitis sequeretur. Sed illud videndum etiam quomodo hic *Menthæ*, ille *Vitis* folio *Quinquefolium* esse dicat, quæ malè inuicem comparari possent: quemadmodum & floris color in pallido albus, simul & auri flauo colore dici. Hoc tamen non adeo difficile videtur. Videmus enim aliquando in pallore hominis, vtrumque colorem illum.

Nascitur, auctore Diosc. in aquosis locis, & Locus iuxta canales & aquæ ductus.

Leonice
lumnianusPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
SedaPentapeles
Seda



gitali, colore
rubro, sapore
adstringente
& exsiccante,
exsiccatà qua-
diata euadit.

Synonyma
Camer. *Quinquosol.*
hort. *Penta-*
phyl- luteum.
phyl- *A Tormentilla diffusi-*
luteum. *luteum.*
Lob. *luteum.*
& Per. *Obf.*
Quinquosol-
ium sine Pē-
taphyllō vul-
gare. Ic. Pl. p.
690. icon sub
falso titulo

[Pentaphyllum maius flore subluteo, interdum albo] eius enim titulus est p. 689. Pentaphyl-
lon, Quinquosolium vulgare: ubi icon non
conueniens, & transposita: est namque Penta-
phylli recti maioris.

Ex quatuor Pentaphylli generibus, quæ in I-
talia videntur, inquit Matth. primum à Diosc. historiâ
nihil prorsus dissentit. Radix huic tubrubens, li-
cèt id neget Braslausolus, quod alijs, vt mihi eam
effodienti, verum esse deprehenditur. Sed con-
tingere potuit [ait Apollo] hanc notam Ferrariæ
deficere, vlginofo fortè loco: vocatur Quinqu-
foli prima species & maxima. Hinc autem mirari
subit, pergit, Matth. Manardum Ferrariensem virum
alioqui doctrinâ insignem: quippe qui tam facile
sibi persuaserit, id legitimum esse Quinquosoliū,
quod Græci Heptaphyllum, officinæ verò, herba-
riorumquæ vulgus, Tormentillam dicunt. Siqui-
dem hæc septem ex vno tantum cauliculo pro-
fert folia. Pentaphyllum verò quinque, vnde &
illi nomen. Hoc radices Elleboro similes habet,
crassiores tamen; oblongas: illa verò admodum
breues, strumosas, simulque in vnum compactas
globum. Gignitur hæc plerumque in incultis, si-
ciculosisque locis, in altis præsertim montibus:
illud verò in campestribus, & prope aquæ du-
ctus, & in riguis. Quæ sanè omnia aperte decla-
rant, hacin re Manardum cæcitiuissè. Ceterum,
nunquam admiratus sum Plinium in hoc (in quo
tamen à Leonico, vt arbitror, immeritò repre-
henditur) quod lib. 25. cap. 9. tradiderit reperti
Quinquosolium, quod Fraga gignendo com-
mendetur: Quandoquidem Quinquosoli gen-
us est, quod à quibusdam Diapensia vocatur, in cu-
ius summis cauliculis capitula spectantur fragis
non dissimilia. Hæc ille, qui asserit, Plinium non
huic Quinquosolio, sed Saniculæ Fuchsi, quam
Diapensiam nominat, fraga attribuisse. Cum ta-
men Quinquosolium vulgare parua veluti Fraga
potius, quam Sanicula, aut Diapensia habeat.

Idem in post. comm. Ital. eadem dicit, ait Leonice-
num non reprehendi, imò potius eum sequi-
tur, ac cum Leonico ait se mirari satis non posse;
Plinium dixisse, Pentaphyllum notum ex eo;
quod fraga ferat: ipsum Quinquosolium con-
trarium demonstrare. Trago Pentaphyllum
tertium, maius & vulgatissimum, quod officinæ
hodie verum Pentaphyllum dicant esse. Et
licet hanc ipsam plantam Tormentillam esse
statuat potius, quam Pentaphyllum Diosc. &
gum.

Est autem multi vsus, eodem tradente. Potest
enim radices decoctum, ad tertias deductum, si
ore contineatur, dentium dolores sedare. Pu-
treddines etiam in ore, si colluatur, sistit. Et atte-
ritæ asperitates, si gargariletur, eximit. Aluo
quoque fluenti, & dysenteria opitulatur. Arthri-
tici item, ac ischiadici, si bibatur. Eadem cocta
in aceto trita, imposita herpetas cohibet: strumas
disscutit: duritias, tumores, articularum dilata-
tiones, aneurysmata appellata, abscessus, ignes fa-
tros, pterygia in digitis, condylomata, & scabies
sanat. At succus radices, teneræ, ad hepatis &
pulmonis affectiones facit, & ad lethalia medica-
menta. Folia bibuntur cum aqua multa, aut vi-
no diluto, & modico Pipere, ad febres per circui-
tum repentes, in quartana quidem quatuor ram-
ulorum folia, in tertiana verò trium, in quoti-
diana vnus (v. vnum). Auxiliatur etiam comi-
tialibus pota ad 30. dies. Sanat item breui mor-
bum regium foliorum succus ad aliquot dies triu-
cyathorum mensura potus. Vulnera quoque &
fistulas, folia cum sale & melle imposita lauant.
Opitulatur Quinquosolium etiam herniæ inte-
stinalium: & hæmorrhoidas sistit potum & im-
positum. Secatur & ad lustrationes ac purifica-
tiones adhibetur & purgandis domibus, [Plin.]
Qui reliquum vsus medicum sparsim pro occa-
sione exponit, planè prout Diosc. habet, omnia
tradens. Galenus Pentaphylli radicem fortiter
siccare dicit, sed minimè acrem esse. Et idem
etiam multi vsus esse, quemadmodum & alia
omnia, quæ tenuium partium sunt, & siccant ci-
tra mordacitatem. Est enim & hæc radix, siccandi
vi prædita ex tertio ordine, manifestâ caliditate
minimè participans. Idem 5. sec. loc. c. 9. Quin-
quosolium tradit ab alijs Eupatorium vocari,
eiusque radicem in vino coctam dentium
dolores leuare: hoc autem etiam Diosc. tradit.
Hæc herba, si Alberto magno supersticioso illi
credis cum folio Trifolij inhumata, generat ser-
pentes rubeos & virescentes, de quibus si fiat puluis,
& ponatur in lampade ardente, videbitur ibi co-
pia serpentum. Et secundum Alexand. Imper.
radix sanat plagas & duritiem, trita & emplastrata.
Amplius scrophulas diluit velociter, si succus
eius bibatur cum aqua. Sanat etiam passionem
pectoris seu dolores, si succus eius bibatur. Sol-
uit etiam dentium dolores, si succus ore teneatur,
actiones oris curat passionem. Et si quis secum de-
ferat, opem dat & auxilium. Amplius si quis
vult à rege, vel à principe petere aliquid, copiam
dat eloquentiæ, si secum eam habeat, & obtine-
bit quod voluerit, videlicet etiam in lithiasi
& dysuria succus eius habitus.

PENTAPHYLLVM SIVE QVINQVE- folium vulgare repens.

Non secus ac Fragaria, flagellis suis cubita-
libus & bicubitalibus, teretibus, hirsutis, ru-
bentibus serpit: folia minora Fragariæ, quinque-
partita, magna, hirsuta, singulis segmentis, in
ambitu altis incisis serratis; pediculis quadran-
talibus & maioribus, gustu viscido: flores Potenti-
illæ, lutei, quinque foliis constant latiusculis,
apicibus in medio croceis, quinque foliis virenti-
bus in pediculis singularibus, palmo longiori
fastigio insidentes: capitula superueniunt exi-
gua, minutis seminibus repleta, quæ cum pericar-
pio spoliuntur, acetabulo florem tegente prote-
guntur. Radix longa, crassitudine interdum di-

Theophrasti, contrarium tamen cenſeo, quod ante quadraginta circiter annos, quum Geneue publicè præſſet præparationi Theriacæ, quæ apparabat peritiſſ. & diligentiff. Pharmacopæus Valerand. Doureæ affinis noſter, contra doctorem Medicorum & Pharmacopæorum ſententiam aſſcriui Tormentillam non reſpondere antiquorum Pentaphyllo, led vulgare Quinquęſolium, & poſſibilem ex nota, quam tribuit ei Theoph. quam non legerat, Doctiff. vir D. Saraccenus ſenior, radices videlicet ſecatas, quadratas exiſtente, quod non conſpicitur in Tormentulla.

SARRAC. NO-
LAIN

Lonisc. error:

Lonic. l. 5. cap. 273. editionis annis 1573. frustra
vnius herbæ duas figuras habet cum inscriptio-
ne Pentaphylli.

Icon trans-
posita.

C. Bauh. phyt. Pentaphyllon; siue maius repens. Brunfels. Pentaphyllum luteum minus. Thall. Harc. Pentaphyllum maius. Dec. gall. Pentaphyllum luteum maius. Item in H. fl. lat. in fol. Quinq. uesolium alterum, humilius cuius radice relictae, quae ad radices cernitur, ut à Theophrastio scriptum: quod conuenire potest cum nigro Hippocrati: Figura sub alieno titulo est, nepe quinq. uesoli maioris, quum uerus titulus sit Quinq. uesolium alterum uulgare. Schvv. cat. Sil. Quinq. uesolium officinarum. Clut. Pentaphyllum uulgare. Tabern. Pentaphyllum Diosc. Brunfels. germ. nomine Pentaphylli minoris exhibet figuram Pentaphylli maioris repentis, sed non admodum concinam.

Brnsfelf. no
Lainr

Error quod-
fundum

Turnerus (licet vnicum faciat Dioscori-
des, ali vero quatuor, quorum Santiculam, vnum
facit genus, abique omni quidem ratione, tri-
singnes nouit differentias. Quinq; esofolium vul-
gare passim nascens, Secundum multo maius, in
palustribus proueniens, & locis aqua inundan-
tibus. Quod an sit palustre Cordi, dubitamus. Ter-
tium, quod videtur nobis Fragaria sterilis.
Pentaphyllum, siue Quinq; esolium vulgare. Germ.
Fünffingerkraut & Fünffahrl / Belg. Vyfma-
gervut / Gall. Quinq; feuille / Ital. Cinque foli.
Hisp. Cinco en rama. Angl. Cencosly & Fyn-
finger große. Boh. Penticstf & Hung. Koz ő
leuelő fu.

Nomina
linguarum

Loans

Temple

Passim p[ro]uenit Lugduni, Monspelii, Bessordig, Montbelgardii, nec non sponte in horto E.C. ubi obstruunt climata eius descendere perimurum ad pedes octo, vel plures, quærentia terram & radicante: Genevæ abundat florens Ianuario Basileæ adhuc Octobri, inter portam cineritâ & lapideam iuxta vias & hortorum margines, in aquanis ductibus & riguis.

Vires & v
fus
Soda frig
da
Epilepsia.
Endores
Dysenter
Cancer.
Tempera
mentum:

*Aqua
Ulceris*

Tremula

Темпера
мент

Succus per nares attractus curat Sodom frigida[m], Baius. Decoctum instar Ligni Indici paratum vtiliter exhibetur in epilepsia. Sudores ciet, Thom.Eraſtus. Radix & pot. simum extractum ritè paratum in dysenteria commendatur. Radix ex aceto decocta cancro ulcerato adhibetur. Camerarius. Sicce est temperatura, quæ vtrique corpori prodest, maximè contra alarum fluxiones omnes. Herba Pentaphylli cum melle & aqua cocta, vlcera oris sanat, gingiuis medetur, arterięq[ue] cabritas gargarisato & collutione n[on] laeuat. Aqua destillata isdem pollet viribus. Cocta in aceto serpentina vlcera cohibet, fistularum, inquit Tragus, & cancri, aliaque manantis & putrida vlcera. Aqua destillata tremulas manus iuuare traditur, si exilia sæpe abluantur, ita tamen vt per se ferre succentur, non enim parum ficcare oportet, quod alia in abluunt manuum facimus, Tragus. Citra morsus defecati minimè caliditatis habens, penetrat, adstringit, alui pro fluxibus. Dysenterię, intestinorumque

lapsui, igni sacro, & vulneribus remedium con-
ueniens. Bibitur contra febrium circuitus. Suc-
cus foliorum continuis diebus potus, regium
morbum sanat. Pulvis Quinquetolii ad umbram
exsiccati, potus cum vino, optimus est ad dolo-
res ventris.

PENTAPHYLLVM RECTVM.



Sesquipedali altitudine peretangens Pentaphylli genus est nobis rectum, siue climatis à vulgari multum differens, cuius radicis crassa, propter plantulae modulo, ruffa, & subnigra, lignosa, adstringens, cortice squamato tecta: *folia ex longis pediculis exierit quicunque parua sunt*

perne ad medium vsque ferrata, mollicellis pilis
longiusculis, ac raris obfita. Interque in binis
quas habemus, plantis, *caulibus* surgit ligu-
lularis, *foliis* veltitis ex longo intervallo, lon-
giusculis, quae pediculis adhaerentibus, qui ex bifi-
do foliolo, seu vaginâ quadam emergunt, cili-
suprema breui pediculo haerent. Summitas in ra-
mos aliquot diuicaticas *subscissas* sustinet, quan-
tùm ex siccis apparet, creceos, Pentaphylli vil-
latis, & villosi calyculis foliaceis emergentibus, in-
quorum medio villi tomentosi, decidentibus fo-
liolis etiamnum manifesti in conspectum ve-
dant. Vnde nacti sumus hanc plantam non re-
cordamur.

PENTAPHYLLON ALPINUM SPLEN-
dens, aureo flore.



Plehra
Péaphyl
li species, in
multa capit
diuina, in qui
bus multa
squammæ: *ra*
dices multæ
uiffæ, è qui
l'us ex vncia
libus, aut lon
gioribus pe
dicellis foliol
quaquaversi
denfo agmin
panduntur.
Tormetilla
ferè facie, me
dia parte ferè
rara. p. l. ta 8
ferè è c. ti
a iquo

aliquot pilis, vix ac ne vix quidem conspicuis in quibusdam partibus obsita. *Coliculi* aliquot palmares, summotenus diuisi *stefculi* sustinent pulchre luteos (quantum quidem ex sicca iudicare licet) foliis latiusculis constantes, in quorum medio *stamina* saturatiora ac ferè crocea. Eadem, certè aut non multum differens videtur, quam describit Clus. sub nomine *Quinquefolii* tertii his verbis: Ex radice fibrosa & nigricante, ramos promit humi se spargentes, & subinde oblongas alias fibras agentes: qui summo capite, multa folia proferunt. *Pentaphyllo* vulgari ferè similia, in quinque profundas fissuras diuisa [quarum singula instar vulgaris *Quinquefolii* per ora serrata sunt] molliora tamen, aliquantulum in cana & splendens, adstringentis gustus: ex horum medio cauliculi exeunt palmares, multifidi, qui pro stirpis exilitate satis magnis floribus præditi sunt, eleganti & planè aureo colore, multis in totis croceis staminibus: semen aliorum *Pentaphyllorum* more, in Fragi rudimentum congestum, fuscum, exile.

Clus. Pannon. & Hist. in fol. *Pentaphyllon* aureo flore, siue *Quinquefolium* tertium, cui nomen *Pentaphylli alpini* aureo flore indidit. C. Bauh. phyt. *Quinquefolium* 6. siue minus, repens, luteum, alpinum. Schvv. cat. Sil. *Quinquefolium* alpinum splendens.

Datum nobis hoc *Pentaphyllon* ab Agerio in Stiria collectum. Dono etiam accepimus à D. Iac. Zvingero. Crescit [inquit Clus.] in summis Austriacarum Alpium iugis, quæ tamen herbosa sunt, & sub lunis sinem floret, in hortis autem Maio.

PENTAPHYLLVM MINVS MOLLI lanugine pubescens, flore luteo.



Multa ex una radice capitata ramosa, humi fusa, aliquot foliis *Pentaphylli* vulgaris & elatioris formæ similibus prædita, hoc est, quæ quinque foliolis in ambitu serratis, mollique lanugine pubescentibus constant, sed non, ut villa [præcedens] incanis, gustu initio exsiccante, deinde non nihil linguam

vellicante: ex iis capitibus prodeunt dodrantales interdum cauliculi, similibus sed minoribus, foliis ornati, gestantes in summo multos flores luteos, elegantissimos, quinque foliis, ut superius, constantes, medium florem occupantibus multis luteis staminibus: semen in caput, & veluti Fragi rudimentum congestum, fuscum: radix longa, dura, satis crassa, foris nigricans, & tenuibus fibris donata est: sed & rami illi humi fusi plerumque fibras agunt, & vicina loca occupant.

Clus. Pannon. & in fol. *Pentaphyllon* 4. siue repens minus, flore luteo. Prima species. Cuius

Tom. II

figura in Pann. transposita est sub alio titulo, nempe *Quinquefolii* quarti secunda specie. Camer. hort. *Pentaphyllum* Pannonicum, in campis asperis, circa Monacum frequens. Pannonico 4. Clus. non ab simile. C. Bauh. phyt. *Quinquefolium* 4. siue minus repens, luteum primum.

Nihil illo vulgari secus vias, locis siccis & nudis Pannoniæ, Austriæ inferioris, Moraviæ, & Bohemiæ. Florere incipit ineunte propemodum Vere.

Icon in Pann.
non. trans.
posita.
Pentaphyllum
Pannonicum

Locus
Tempus.

PENTAPHYLLON PARVVM HIR- sutum.



Radix densatur crassa, longâ, nigra: foliis parvis hirsutis, ex pediculis duarum vnciarum longis: cauliculis multis, humilissimis, quatuor vel quinque vnciarum: floribus luteis.

Descriptio

Clusius (sum sic describit: Cui præcedenti nascitur, atque etiam floret, minus tamen frequens, humiliter fuscum, cuius cauliculi

Descriptio Clusii

non virent, sed purpurascent, & graciliores sunt, folia angustiora, magis v. llosa, & illorum ora altius serrata: flores etiam magis aurei: in catenis conueniunt.

Clus. Pannon. & in fol. *Quinquefolii* quarti siue *Pentaphylli* repentis minoris aureo flore, 2. species. Cuius figura quidem bene competit huic nostro *Pentaphyllo*: sed in Pannon. transposita est sub titulo *Quinquefolii* 4. prima species.

Icon transposita.

Trago *Pentaphylli*, siue *Quinquefolii* minimi genus, sub initio Aprilis florens, sine caule, foliis per terram sparsis, flore luteo, instar *Anserinae*. Tragi quidem descriptio conuenit non autem figura. C. Bauh. phyt. *Quinquefolium* 5. siue minus repens luteum secundum. An Thal. Hart. *Pentaphyllum* minus, fistulosecens, quod radice constat lignosa, multifida, densa foliorum agmine, brevioribus caulibus digitali longitudine, minoribus foliis, locis aridioribus. An Gesner. de coll. *Pentaphyllum* minus, quod locis apricis & siccis nascitur, præcipue collibus, floret Martio, aliàs etiam Septembri. Schvv. *quinquefolium* vernum minus Tabernæ. In collibus siccis & secus vias, Aprilis occurrit in Silesia. Dod. gall. *Pentaphyllum* luteum minus. *Quinquefolii* tertia species *Apollini* rad. 1.

Trago. hort. tur.

Quinquefolium vernum.

Passim prouenit, ut versus la Crotte Mont-belgardi: Bessfordiæ versus Castellum vidi florens Septembri, & copiose en plein Palais, florens adhuc Nouembri.

Locus
Tempus

PENTAPHYLLVM MINVS FOLIO subtus albicante.

Radix lignosa minimi ferè digiti crassitudine, quæ in fibras tenuiores abiens, longè latè.

Descriptio

K x 5

que vagatur, cortice nigro obiecta, sapore adstringente, ramulos emittens complures, etiam palmares, humifusos, in alios ramulos divisos, hirsutos & nonnihil rubentes: in quibus folia, quae pollice texeris, quinquepartita, singulis leg. uetis circa mucronem leuiter incis, superne varentia, inferne albicantia: *folioli* parui, lutei, quinque foliis constant, apicibus multis luteis medium occupantibus, subsunt autem flori quina folia hirsuta, foris viridia, intus ad luteum vergentia, quibus interiecta totidem foliola dimidio minor, viridantia.

Icon.

Figura nostra Fuchsiana non in omnibus placet: folia enim paulo acutiora, ad latera nimium ferrata.

Synonyma

An Camer. hort. Pentaphyllum minus?

Fuchsl. Quinq. folium x. siue minus, quod Pentaphyllo luteo haud dissimile est, non tamen passim, ut illud, quinque folia obtinens. Hoc cum non haberet aliud nomen Fuchsl. quo ipsum appellaret, inter Quinq. folii genera connumerare sibiuit: Gall. *Quinq. feuille petite*, Germ. *Hein fünf finger kraut*. Sed ut verum fatear. Fuchsio non fuit notum Quinq. folium, quod pingit. An Lob. & Pena. Adu. Pentaphyllum minus luteum, omnium minimum, rarissimum filiohis pratis & herbis molcosis occurrit, ubi Tormentilla, radice non se defixis ramulis propagante, foliis quae terram spectant, albican- tibus.

Martius & Presb.

Martih. Pentaphyllum, siue Quinq. folium tertium, folio paulo, subalbido, per terram repens. Hecille in Diosc. & com. Italicis, quem quandoquidem in H. st. Germ. longae aliam penit. descriptionem & diuersam admodum figuram] quid de Pentaphyllo minimo scriberet, nescisse existimo.

PENTAPHYLLI MINORIS MAIOR SPECIES FOLIO NOTUS ALBICANTE.

Descriptio

Est mihi Pentaphyllum quoddam nescio ubi adli. *ca. n. folia multo maioribus*, quam in precedente, ex longis pediculis de drantalibus & quinque foliolis, ac multis septenis, oblongis, extrimis subrotundis, serratis, subtus albican- tibus: caulibus palmatis, in summitate floribus luteis multis, ex bre- vibus pedicu- lis. Radice nigra, longa, cum fibris crassis.

Icon

An à prae- cedente in to- tum differat, asserere non audemus, locus, in quo creuit, varietatem fortitan induxit, icon quam ponimus, est ex emptiis, non bene exprimens, folia enim nimium acuta.

Trag. ta- xator

Tragus figuram habet sub titulo Quinq. folii exigui: ea non competere videtur vlli sua- rum descriptionum, si folia minus, essent acuta,

responderet nonnihil huic nostro Pentaphyllo. An Thal. Pentaphyllum medium, medio mo- do se habens, quoad folia inter maius & minus.

PENTAPHYLLVM RECTVM MAIUS.



Nec minus Deff. Alrenuè adstringit huius radix, quam vulgaris lupini, multis adnatis autem, rubescens: caules cubitales & maiores, plures, duri & rigidi, recti, ceteris, subrubentes, villosi, circa summum in- liquot alas, nodos longas, nodos breues diuini: folia hirsuta, Alceae ferè similia, varian- te diuina.

quintupli, septuplici, singulis segmentis pro- fundè serratis, flores odore Agrimoniz, Quinq. folii lupini maioris instar, colore luteo inten- siore, diluore, & albo interdum.

Lob. & Pena. Adu. Pentaphyllum album & purpureum pra. omnibus procerius & specio- sius, &c. Item Obs. Pentaphyllum maius flore subluteo, interdum albo & rubro. Et Ic. Pl. p. 690. Pentaphyllum maius flore subluteo, interdum albo. figura est transposita p. 690. Pentaphyllum album & purpureum. Hecille, qui ob- scurus est in Obs. siquidem eandem facit plan- tam album & rubrum Pentaphyllum, cum sub- luteo, siue nostro, de quo hic agimus: in iconibus autem separat, nouam proponens figuram, quasi album & purpureum differant à subluteo. Lectores igitur rem diligentius examinent, & considerent, quae de Pentaphyllo albo cum ra- dicibus bulbosis scriptum ex Schvvenckfeld.

Dodon. Quinq. folium 2. maius. Poterit il- lud esse, quod Hipp. lib. de vlcer. commendatur, & altius dicitur. Figura est transposita sub titulo nostro suo, sed Quinq. folii altius non vulga- ris.

Gesl. app. hort. Quinq. folium luteis floribus rectum, non serpens VVoysello. C. Bauh. phyt. Quinq. folium 8. siue rectum luteum. Tab. icon. p. 119. Quinq. folii Theoph. maius, Grosse geel fünf finger kraut. Idè p. 120. habet aliam figuram, Quinq. folii Theoph. albi, weisse grosse fünf finger kraut, quae an diuersa plantae, consideran- dum, icones sunt valde similes. An Schvv. cat. Sil. Quinq. folium, siue Pentaphyllum verum maius, 5. Camer. hort. Pentaphyllum rectum maius.

Obseruavi spontaneum in Asia, sicut & Montebelgardi in horto ille. C. ubi habuimus ali- quando flore albo. Geneuz in horto satum primo anno flores non protulit, florebat Maio ut Lugduni & Hieme perferebat. Basilae apud D. D. Felic. Platium Iunio & Septembri florens videbam.


PENTAPHYLLON RECTVM MAIVS
tenuius, villosius, Pannonicum.

Collegit D. Agerius in Pannonia Pentaphyl-
lon nostro recto maiori simile, cubitalibus &
maioribus tenuioribusque caulibus, longis pilis
hirsutis, non ita firmis: folia per caules, longos
habent pediculos, dodrantes, longis etiam pi-
lis hirsutis, ad principium duæ pinnae, foliorum
instar, tenues, simplices, vnciam circiter longæ.
diuiduntur autē folia in sex vel septē portiones,
profundē serratas, quales in prædicto, sed mino-
res, villosiores, candidiores: rami diuiduntur
in tenuiores ramulos, qui designant in capitula
minora, quorum calyces minores, cum longis pi-
lis, candidiores: Cuius coloris sint flores, nos
latet.

PENTAPHYLLVM SIVE QVINQVEFO-
lium maius radice bulbosâ, flore albo.

Radix eius [autore Schvv. cat. Sil.] longa, sub-
rubra, cui sæpè annascuntur bulboli Fili-
pendulæ modo. Flores Maio, semen fert Iunio, &
Iulio, in agro Vratisslauiensi. Vocatur Weisse
Sunff fingertraut.

Consideres velim an hoc Pentaphyllum sit si-
mile Pentaphyllo recto maiori, quod flore albo
ludit [quo etiam colore, obseruauimus, quod-
que nostro iudicio exhibet Tab. vt antè dictum,
perpendendum etiam an sit quod Lob. icon. p.
690. pro Pentaphyllo albo & purpureo ponit, de
quo scripsimus prædicto loco.

PENTAPHYLLVM RECTVM, FOLIIS
profundè sectis, subtus argenteis,
flore luteo.

IN numero-
sa capita di-
uiditur radix
rubens, ligno-
sa, satis crassa:
è quorum sin-
gulis caules re-
cti tolluntur,
rigidi, robusti,
dodrantes &
u bitales la-
nugine albâ
penitils obdu-
cti, quâ deorsû
rubri apparēt:
folia partim
è radice lon-
gis pediculis
appensa oriū-
tur, partim è
caule, subtus
penitils inca-

na & villosa, superiùs viridantia, in quinque pri-
marias lacinias breues diuisa, quarum vnaquæ-
que profundè rursus subleatur: caulibus scapus in
multos diuiditur furculos, quibus flores insident
satis magni, lutei, è calycibus lacinia, albidis,
lanuginosis.


An Lob. Obs. Pentaphyllum petrzum Muto-
nis, caubus Tornaco proximis frequens. C. Bauh.
Quinquefolium 7. siue folio argenteo: exiguum
alterum Tragi, luteum minus fuchii. Tragi qui-
dem, vt antè diximus, descriptio cōuenit, alit ico-
nem eius, vt Fuchii, ad aliam plantam refero
Tom. II.

Tab. icon. Quinquefolium petrzum maius.
Groß Stein fünf fingertraut. Schvv. cat. Sil.
Quinquefolium petrzum maius argentatum
Tab. siue 10. quo officinæ nō rectè pro verò vtū-
tur. Sed cur Schvv. non adiecit, in qua regione
hunc vltim obseruauerit. Volmaro, cum Es-
thæz essem dicebatur Pentaphyllum rectum.

Matth. in post. com. Ital: picuram ponit sine
vlla descriptione sufficiente pro Pentaphyllo, si-
ue Quinquefolio 1. & Pentaphyllo albo. In Hist.
germ. Pentaphyllum album, siue tertium. Quia
autem nec secundo in com. Ital nec etiam tertio
in Hist. germ. respondet, ei non bene notum hoc
Pentaphyllum fuisse constat. Adde nos flore albo
nunquam offendisse. Quare nobis melius sensis-
se videtur ad Hist. germ. Camer. qui Pentaphyl-
lum minus, cui in Egit. flores luteos tribuit, al-
bum à foliis albis, & non à flore [vt Matth.] nun-
cup in scribit.

Thal. Haré. Pentaphyllum canum; Gesn. de
coll. Pentaphyllum erectum magnum, candidum
subtus, tribus aut amplius è radice caulibus, flo-
rens Iunii initio.

Obseruavi Montbelgardi in muris quorun-
dam hortorum circa La Croix cundo versus pati-
bulum ad sinistram; florens adhuc Augusto.
Lugduni Maio. Genevæ virens Aprili & florens
Iunio. Basileæ, vt è quadraginta annis, in cat. pl.
Bas. annotati, abundat inter portam lapideam &
cinericeam, florens Iulio, item in itinere versus
Krenzack Ostobri. Ceterum, Schvv. teste, in Si-
lesia, ubi vulgaris notitiæ, passim in aggeribus, &
secus arua, macro & arenoso solo fructat, & Au-
gusto floret.

PENTAPHYLLON VEL POTIVS HEPTA-
phyllum flore rubro.

Valde
prolixas
habet radices,
& secundo
reptatu luxu-
riantes, rubē-
tes, lignosas,
fibris capillari-
bus aliquot
donatas: folia
quina, aut se-
ptena Penta-
phylli vulga-
ris, sed non eò
ordine sita,
verum ceu in
alam disposi-
ta, subtus in-
cana, hirsuta,
supremâ partē
viridantia,
profundè per
ambitum serrata, pediculo non admodum longo
nixa, cuius inuam in vaginam amplam degenerat,
caulem amplectentem: caulibus flores gerit ma-
gnos, rubentes, è quinque, aut sex foliis compo-
sitos, cum concolotibus apicibus, & turbinato
capitulo, fragi æmulo.

Iconem exhibemus Cordi, qui Pentaphyllum
palustre vocat, & cuiusdam heptaphyllum Plin-
ii fragiferum.

Lob. & Penæ Ady. Pentaphyllum purpureum
Icon. Pl. Pentaphyllum rubrum palustre. Thal.
Haré. Pentaphyllum palustre, Plinii fragiferum
existimatum, quod consimilia quidem capitula,
Pentaphylli
purpureum
palustre

florē deperdito, Fragaria proferat. Et quia in eadem plantā huius generis, folia tam septena, quam quina in pediculo inharētia simul sepe conspiciuntur, unde & pro heptaphyllo quoque haberi possent. Idem cum aliis Tragus observauit, qui describit tertio loco inter fraga.

Quinquefol.
aquaticum
Quinquefol.
palustre ru-
brum.
Pentaphyl-
l. rubrum.
Locus &
Tempus.

Tab. ic. Quinquefolium palustre, siue aquaticum, Wasser Junffingertraut. C. Bauh. phyt. Quinquefolium 9. siue palustre rubrum: Dod. gill. Pentaphyllum rubrum. In fol. Quinquefolium 4. cuius flores obscure rubetes: Gesn. hort. Quinquefolium palustre, floribus purpureis.

Plantanda in hortum Ill. E. C. Montbelgardi attuli ex Melfni Danigon, vbi pluribus durauit annis: repta non parum se multiplicat potissimum si humiliori sit loco plantata, profert etiam semen. Mense Martio in palustribus Ludichibus vidi reliquias siccas. Tiguri obseruauit circa lacum Bartsenfer. Insignis Medicus D. Leonhard. Doldius scribit ad me, circa urbem Norimbergam frequentissime prouenire cum foliis septem, aut sex potius quam quinque. Virginosis, inquit Schvv. Silesia putridis montium delectatur locis, ad piscinas & paludes fruticans. Iunio floret.

Vires & v-
sus.

Adstringit tota herba presertim fructus, ait Camer. Hinc teste Schvv. potum sanguinis profluuiis medetur.

PENTAPHYLLOIDES SUPINVM.

Descriptio.



Folia plurima, pediculis longis, ex radice caulesculā, longā, multorum capitum, annectuntur coniugatum, singula serrata, ad Geranii supini folia accedentia: caules cubitales, inanes: numerosos gerunt flores, paruos, luteos, ex brevibus pediculis: succedunt capitula parua, Fragis immaturis similia.

Pentaphyl-
supinum.
Tormentil-
la facie.
Quinquefol.
fragiferum
repens.

Lob. Obs. & Ic. Pl. Pentaphyllum supinum Tormentilla facie. Hoc, teste Clusio, nonnihil affinitatis cum Anserina Tragi, seu Potentilla Fuchsii, habere videtur. Tab. icon. Quinquefolium fragiferum repens, Kriechend. Erdbeer Junffingertraut. C. Bauh. phyt. Quinquefolium 13, vel Quinquefolium simile repens. Dod. in fol. Quinquefolium tertium repens, siue supinum. Addit fragiferum Schvv. quod in Dod. non legimus.

Locus &
Tempus.

Collegi florens Augusto Argentinae in horto D. D. Melchior. Sebizi: Frequens in agro Viennensi Clusius, in extremis pratorum marginibus secundum silvas: In Silesia Schvv. in locis montium graminosis.

Descriptio.

PENTAPHYLLOIDES ERECTVM.
Radice præditū est pluriū capitū, crassiusculā, lignosā, cortice saturatius rubente,



strenuē ad-
stingente re-
cta, ē qua pe-
diculi plerique
prodeunt pal-
mates, quo-
rum extremo
connectuntur
terna folia. his-
suta, serrata,
Fragariae xmu-
la, longē mi-
nora, rursū-
que eident
costæ vna aut
altera consi-
milium folio-
rum coniuga-
tio, quā lon-
gius à supre-
mis illis ab-
sint, minorā:

inter hæc caulis nascitur cubito altior, hirsutus semel atque iterum, quinis iunctis foliis insignis, superius in ramulos aliquot diuiscatur, qui multos flores gerunt, albos, Pentaphylloides lupini dupl. maiores, subiectis radiatis foliis viridantibus, hirsutis, floris umbilicum occupante capitula fragum ferente, vt in ceteris Pentaphyllis quod constat seminibus oblongis, serratis: huic (existimo) accedente cultura, folia multo maiora, foliis coniugatis septenis aut quinis ad costam annexis, Paltinacæ aliquatenus similibus, inter quæ fortuita intercedunt folia quadam minora, veluti in Agrimonia: pediculus interdum cubitalis.

An Clus. Pannon. & hist. in fol. Pentaphyllum 5. seu fragiferum, Plinio forsitan non incognitum. C. Bauh. phyt. Quinquefolium 14. siue Fragiferum. A quo etiam accepi nomine Fragariae alterius seu silu. Cortuso, & Potentilla Recentiorum Gaillardino, qualiter etiam denotabat doctus Medicus D. Hochstetter Pfortzheim. Schvv. cat. Sil. Quinquefolium fragiferum erectum, Strehend. oder Alsfrech Junffingertraut.

Nascitur in Leytenberg locis umbratis in media silua supra Manderstorf sita, quo loco duntaxat aliquot annis Clus. obseruauerat. Nascitur in Pannonia, inquit Clusius, non modò in siluis cædis, sed etiam gramineis campis. Floret Maio, fructus paulò serius maturescit, effluuntque semina, quemadmodum in reliquis Quinquefoliis. Supra Peterstorf etiam in siluis secundo ferè à Vienna miliari obseruatur.

Herba, radix, & semen, vt Schvv. pethibet, sic. Facili candi & adstringendi vim obtinent.

PENTAPHYLLON ALBVM.

EX radice multis fibris donatā, pediculi plures exoriantur, palmates & scilicet palmates, tenues, angulosi, hirsuti, folium singuli sustinentes, quinquefidum, supernè glabrum, viridè que infernè argenteā lanugine villosum, cuius segmenta singula carinata ferè, quædam longiora, quàm minimū, alia minimè serrata, in obtusum mucronem desinunt, quàm in Tormentilla argentea longiora, superna parte virore non ita obscuro, nec ita glabra: ex clyceibus hirsutis: flores peculiaribus quoque pediculis



diculis longiusculis insident, Fragaria, colore perinde lacteo, staminibus in medio luteis: sapor herbae glutinosus.

Camer. hort. Pentaphyllum albo flore, maxime conueniens descriptioni. Hipp. lib. de vlcenib. In Hetruria vocatum Pentaphyllum argenteum.

Fuehl. Quinquifolium, siue Pentaphyllum maius candidum, Groß weiß fünf fingerkraut/ Gall. grande Quinquifolium blanche.



riuntur cauli- culi exiles, & tenues; dodrantes; humi pro- cumbentes, in summo ternos, aut quaternos flores proferentes, Pentaphyllo vulgari similes, sed profusus albos: quibus excussis, apparet calyx lanugine obductus, semen continens planum, seminis Ranunculi ferè æmulum, in rudimentum fragi congestum: radix crassiuscula, nigricans, in ambitu sese diffundit, & multis fibris hirsuta est.

Clusio descriptionis auctori, Panh. & in fol. Synon. Quinquifolium, siue Pentaphyllum 1. seu maius Deser. Albi. albo flore: cuius meminerit Anguillara, his verbis: Pentaphyllum leuon, de quo Hipp. lib. de vlcenib. quamuis eo nomine &c. verum in eius descriptione multa sunt, quæ non videntur conuenire, cum Pentaphyllo albo 1. Clusii. An portò Pentaphyllum album Clusii, diuersum sit ab eo, quod cum Trago, Fuchsius, & alii tradunt, cuius descriptionem iam antè dedimus, asserere non audeamus: non separaremus, nisi diceret Clusius, se duntaxat scribere, quæ à nemine adhuc euulgata sint. Schvv. non separat. Considerandum etiam an Anguill. Pentaphyllum non sit potiùs argenteum, flore muscolo.

Prouenit, auctore Clusio, non modò in colle illo nemoroso supra Manderstorf oppidulum tepidarum aquarum scaturigine nobile: sed etiam in omnibus illis montosis siluis, quæ à Danubio procurrentes, ad Alpes vsque pertingunt. In siluis item supra Nemethvvyvar, & Zollock, apud Entzestorf, & plerisque siccioribus pratis, vno ab vrbe Vienna miliari: in Moravia præterea, atque in montibus vltra Drauum am-

nem, Pannoniâ interamni. Floret Aprilis & Maio, interdum denuò Autumno.

PENTAPHYLLUM FOLIIS INFERNÆ & SUPERNÆ INCANIS.

Folia obseruantur duntaxat ternas, confertissimæ, superiori parte crenata, suprà, subtusque cinericea, candicante lanugine obducta, pediculis ornata breuissimis: cauliculi duarum vnciarum gerunt flores singulares, maiusculos, candidos, ex calycibus internè externèque hirsutis dependentes: globus sequitur pilosus, albidus, pilis quibusdam nigricantibus, aut rufis præditus: radix crassa, lignea, nigricans; vel atro rubore perfusa: ex qua plura capita squammata, ex reliquiis, vt existimamus, pediculorum foliorum Veterum conspiciuntur.

Cæterum, misit nobis olim Pentaphyllum hoc nostrum, p.m. D. Becchius Medicus Bassienensis; idque nomine Quinquifolii albi Hippocratis. Clus. verò Pannon, & in fol. suum vocat Pentaphyllum 2. minus, flore albo: quod fortè describebat Lob. in Adu. Suo tamen tribuit flores Fragarum.

PENTAPHYLLON ALBUM I. CLVSII.

CAP. LXXII

Multa folia habet, Quinquifolio vulgari similia, in quinque partes vsque ad pediculum diuisa, in ambitu minimè serrata, vt illa, sed extremis duntaxat foliorum pris, subtus incanâ quâdam lanugine pubescentia, gustu initio gummoso & emplastico, dein de nonnihil amaricante: aliquot sub his exo-

ria floribus magnitudine non inferiores, quod eodem nomine, quo Lob. suum vocavit, insigniri possit, Pentaphyllum minimum & petraeum. Cum tamen Lobeliu diuersum sit à Clusii, quia flores muscosi.

An Gesa. hort. app. Quinquefolii albis floribus species quaedam in locis montium nascens? C. Bauh. phyt. Quinquefolium 2. siue album minus.

Locus

Nostrium à prædicto D. Becchio collectum in Baldo. Suum eruebat Clus. inter saxa & scopulos, summis Austriacarum & Stiriacarum Alpium iugis. Floret sub finem Iulii, interdum etiam Iulio & Augusto, prout iuga illa maturius, aut serius à niuib. sunt libera.

Tempus

PENTAPHYLLVM, SIVE POTIVS HEPTAPHYLLVM argenteum, flore muscoso.

Deseri pto



Radicem habet crassam, longiusculam, fibratamque, ex rubro nigricantem, nunc singularem, nunc in multa capita diuisam: pediculi palmares circiter, argenteà lanugine obducti, folia sustinent, in quinque, aut septem segmenta, vt plurimum, diuisa, per extremum serrata, subtus argenteo nitore splendentia, mollique villosa testæ, superius atro-virentia, glabra: caules dodrantaes & maiores, tenues, paucis foliis vestiti, ramosi, muscosos, confertos gerunt *flosculos*, Alchimilla modo, singulos quaternis foliolis virentes, foris incanis, hiscutique. Adfrictionem aliquam percipimus in foliis.

peracti tamen sapore prædita, ex tuberosa radice prodeuntia, gracili, septem, aut octo nihilominus vncias longo pediculo subnixa, in quinque profundas, & ad pediculum vsque ferè perungentes lacinias diuisa, neruo singulas lacinias à pediculo ad summum mucronem secundum longitudinem secante, & venis quibusdam ab eo neruo in latera excurrentibus prædita. *Caulis* & flores profertret, mihi incomptum, ait Clus. sed *radix*, quæ, vt dicebam, tuberosa instar radicis Tormentillæ, & solida, parte externâ aliquantulum sulca, internâ verò alba, & cuiusdam acrimoniæ particeps, duorum aliorum foliorum, quæ abrupta, vestigia adhuc retinebat, plenaque, & aliquot libris donata erat.

Pentaphyll. petraeum

Tormentilla

Argentaria petraea.
Herba stellata speciei.
Pentaphyllum petraeum

Heptaphyllum montanum
Argentaria montana.
Tormentilla alba.
Leontopodium.
Stellaria argentea.
Argentaria petraea.
Alchimilla minor.
Argentaria
Heptaphyllum

Lob. & Pena Adu. [vt & Ic. Pl.] Alpinum petrosum & minimum Pentaphyllum cognominatur, quod quidam Tormentillæ annuerant, cui multum sanè simile est: flosculi candidi interdum & purpureascentes. Gesa. hort. Argentaria petraea, quæ videtur species Herbe stellæ à quibusdam dictæ, ob radiatam foliorum speciem. Bergsinnar, Steinsinnar. An eadem de coll. Pentaphyllum petraeum, in faxis iuxta aditum fodinæ ferratiæ in monte supra *Sergans*, vbi plantæ erant paucissimæ, florebantque Augusto? Gesa. cum apud eum essem vocabat heptaphyllum montanum, & Argentariam montanam. Ille lib. de Lunariis in descriptione Montis fracti ait, Argentariam, speciem herbæ stellæ, siue pedis leonis. Tormentillam albam vocabat Dalech. Bened. Aretio Heptaphyllum montanum, Schaffrüppen. C. Bauh. phyt. Quinquefolium 12. siue heptaphyllum alpinum sericeum, & quorundam Leontopodium Dioscoridis. Camer. in Epit. Matth. Stellaria argentea, vel Argentaria petraea, vel Alchimilla minor, & heptaphyllum montanum. Item horti, Argentaria heptaphyllum

montana. Tabernicon. Pentaphyllum petraeum minus. Item pag. sequenti 124. Quinquefolium alpinum, heptaphyllum Clusii. Clus. H. sp. heptaphyllum flosculis candidis [virentibus.] Tormentilla candida nist. Lugd.

Locus

Lobelio occurrit in celsioribus montium iugis, gelidisque cauitibus, quales sunt Sabaudia, in Austensi valle, & Noribonæ ad Calcaris, hortique DEI, ardua, & in verticibus editissimis Mindenii. Gesnero in faxis, vel locis saxosis montium Helveticorum. Clusio in Pyrenæis iugis apud Cantabros, florens Maio, in Alpibus Alobrogum ferè. Nobis in montibus Geneuæ propinquis. Montepelii in cacumine montis *Esperon* mente O. Robri.

PENTAPHYLLVM INDICVM.

Deseri



IN sportulis [autore Clus. Exot.] D. Nicolai Colu Medici, anno 1601. ex Orientali India adferrebat. Amstelred. arbu. Pentaphylli Indici planta, cum duabus alis eiusdem generis, formâ quidem prorsus similibus, magnitudine verò nonnihil differentibus. Singulæ porro plantæ bina duntaxat habebant folia, eaque tenella,


peracti tamen sapore prædita, ex tuberosa radice prodeuntia, gracili, septem, aut octo nihilominus vncias longo pediculo subnixa, in quinque profundas, & ad pediculum vsque ferè perungentes lacinias diuisa, neruo singulas lacinias à pediculo ad summum mucronem secundum longitudinem secante, & venis quibusdam ab eo neruo in latera excurrentibus prædita. *Caulis* & flores profertret, mihi incomptum, ait Clus. sed *radix*, quæ, vt dicebam, tuberosa instar radicis Tormentillæ, & solida, parte externâ aliquantulum sulca, internâ verò alba, & cuiusdam acrimoniæ particeps, duorum aliorum foliorum, quæ abrupta, vestigia adhuc retinebat, plenaque, & aliquot libris donata erat.

PENTAPHYLLI EFFIGIES, LEVCAS quibusdam.

C A P. L X X I I I.

LEUCADEM putam ex plantis habeo Valer. Dourez. *radix* crassa, nigra, squammata, in capita diuisa: tota alioqui planta, quæ vncialis, aut sesuncialis, cinereo tomento obducta: folia plerumque terna, Fragaria modo, minora, magis villosa, candidioraque, serrata.

Lob. & Pena Adu. testibus, non penitus nihil



TORMENTILLA.

CAPVT LXXIV.



caulem ambientia, Pentaphylli, hirsuta, sed diuisurâ septemplex: flores parui, lutei, Quinquefolii. In huius coliculis observatur aliquando adnatum tuberosum quoddam excrementum, concretione Pomorum quercinorum, in cuius antistibus stabulantur vermiculi, seu teredines.

Tormentilla verò [quemadmodum Apollonius prodidit] à septenis foliorum diuisuris, heptaphyllon [vel ut Hermol. Septisolum] quoque vocatur. Eadem in Quinquefolii specie reponitur, ob folia quippe duo iuniora, quæ tam exigua sunt, ut in foliorum numero à quibusdam reponeunda non videantur. Et hinc fortè factum, ut Brassavolus hanc Plinii Pentaphyllon suspicatus sit, ut & Manardus, quem propterea cæcutinisse Matthiolum dixit. nec ille, qui Matthiolum reprehendit eo loco, cum tamen ipse in dolis, ac versutis, & non Matthiolum, quem suo nomine metitur, magis quam in comitatu confidit, inquit enim Tormentillam Quinquefoliam, siue Quinquepetalam Theophrasti tam aperte respondere, ut nulli magis: Nempe hunc in modum cum inter cætera dicitur 9. de Hist. pl. c. 14. Quin-

Tom. II.

quefolium crebris internodiis constat, ut ne hylus quidem hinc deiciat, nisi & duo folia excipias, quæ & certè ob eorum exiguitatem in numero foliorum recensenda, non videantur. Quæ postrema apud Theophrastum reperiri, nunquam vel somniauerimus. Cæterum, quum hæc absolute pronunciet Apollonius, ei hinc erandi, aut verius Matthiolum suggillandi, aniam facile iniuria, invidiaque suppeditant.

Germani [inquit Trag. lib. 1. cap. 171.] hanc plantam Tormentillâ à Latinâ voce derivato nomine nuncupant, alii Birchwurz, à Betula, quod in iis silvis, quæ magnâ copia Betulas producant, & hæc luxuriat, nonnulli Blutwurzel, aut Rôthel wurzel [languinatam aut rubram radicem] vocant, eò quod Dysenterias, & vitia intestinorum curet. Dicitur & Bistorta [Cæsalp.] à nodis nimirum radices quibus intorquetur, ut ea, quæ priuatim Bistorta dicitur (nam est procul dubio prima Pandæarii Bistortæ species) & à plerisque Ferula. Ego autem puto nomine Pentaphylli insigniendam. Idem cap. sequenti ait Tormentillam nobilissimâ Pentaphyllon Theophrasti & Dioscoridis esse statuo. Quod verò ita sentio, Theophrasti me mouet descriptio. Tandem lib. 2. c. 37. Miror [inquit cûr Alex. Bened. Sparganion nominet. hæc ille. Quod autem Tormentilla Theophrasti Quinquefolium non sit, solâ Theophrasti autoritate refellitur, ut iam sub Pentaphyllo vulgari docuimus. Male igitur sentiunt Tragus, Gesn. Michael Hamelbergius, Valeriola, & alii, qui Tormentillam, Pentaphyllon esse existimant: hæc enim septena folia habet, rarò pauciora, præter id, quod teste Maranthâ, alie notæ non respondent.

Querentibus porò Lob. & Penz in Adu. & Oblan Tormentilla, vel heptaphyllon. Chrysozonum Dioscoridis sit: scitè, nostro iudicio Dodon. negativè respondet, dicens. Tormentilla fruticis modo haudquaquam, ut Dioscoridis Chrysozonum attollitur, nec flos eius similis est Coronarii Verbasci floribus, ut Chrysozoni: ergo Tormentilla Chrysozonum non est.

Nominatur verò Tormentilla (ut Lob. & Penz notant) quia tormentum cruciatumve dentium sanissimum placat, atque venenatarum quarundam rerum compescit furorem cruciantem: Meminit & Hermol. Tormentillæ, quodam esse scribens, qui ad Saxifragam referant.

Græcè ἑπτάφυλλον, Septisolum, Latine vulgò Tormentilla nominatur, Germ. Birchwurz, Rôthelwurz & Tormentill / Gall. Ang. & Belg. Tormentille, Ital. & Hispan. & Hungar. Tormentilla, Boh. Wurzgrif.

Observavi passim Basileæ, Monspelii, & Genevæ in pratis, ubi folia protumebant Martio, florebat Maio, Iunio, & Iulio ibidem audiui Rhizotomum vocantem Mamor. Memoribus (ita tradente Hist. Lugd.) opacis, montosis etiam, siccis macilentisque locis gaudet. Serò & altate floret.


Tormentilla omnibus vulnerariis potionibus, emplastris, & vnguentis adiungi potest. nam vetera & putrida sanant vulnera, & abscessus, vino, vel aqua decocta, collutione & inspersu. Est & in omnibus medicamentis, quæ adversus venena & pestem componuntur, adhibenda. Est porò radix potenter resiccans, & ex eorum quæ tertii sunt ordinis, numero, & partium tenuium: caliditatis quàm minimum tenet, adstringentis facultatis particeps. Herba autem & radix simul tusa ac imposita sanant

duricias & tumores, & collectiones iuxta aures lubnatas, coxendicula dolores sedant, cuius fluenti scabiei medentur, nec non & mariscis, aliisque id genus affectionibus, maximè verò hoc efficiunt, cum ex aceto imponuntur. Nec inuenias aliam radicem, quæ dysenterijs & lienterijs, aliisque quibuscunque alui fluxionibus coercendis aptior sit. hinc ad has affectiones ex ea pastilli, pulueres, electuaria, potiones, & faculi conficiuntur. Opiliones etiam hac radice ægotantibus omnibus subueniunt. Succus radicis & herbe recentis expressus manè & vesperti temporibus illitus, vertigini medetur. Idem potus veneno omni in cibo, siue potu hausto resistit, sicut & pesti, nam per sudorem venenum expellit. Potest etiam manipulus herbe & radicis vino decoqui, ac decoctum ad eadem calidum bibi. Vtiliter etiam emplastra & vnguenta succo Tormentillæ conficiuntur. Radix cum herba vino per noctem, inque balneo Mariæ distillata, ad omne venenum vtiliter quoque propinatur. Eadem aqua cum Tutia præparata, vel Succino albo, oculis instillata, distillationibus illorum medetur. Aqua & succus secreta mulierum medicina est, ad sistendos menses. Sicca radix in puluerem redacta, singulis vicibus aduersus pestem, omneque aliud venenum drachmæ pondere siue in potu exhibetur. Eadem ex vino rubro pota dysentericis succurrit. Verùm obseruandum est, si febris Dysentericæ coniuncta sit, ut puluerem illum ex aqua, in qua densa chalybis extinguitur fuerit, aut ex aqua Tormentillæ distillata, drachmæ pondere exhibeas, idque bis per diem. Sunt qui radicem cum albo ovi admixtâ dimidiâ nucis Myrtillæ & tantumtem fauce Auenæ, subigant, ac in ferreo cochleari super carbones lentè decoquant, subinde vertentes placentulam illam. Fluxiones mirificè cohiberi aiunt, si quis quotidie vnâ talem placentulam deuorauerit. Alia proinde ratio has placentulas deuorauerit. Quis quibus cholera, fastidia & vomitus excitat, profuerit hæc est. Accipe puluerem radicis Tormentillæ, & cū albo oui subige, deinde verò super latere candentem decoque & reconde. Quod si quis prædicto morbo laborauerit, ei huius placentulæ pattem drachmæ pondere contusam, ex aqua Balsaminæ propina.

POTENTILLA SIVE ARGENTINA.

CAP. LXXXV.

Descripti.



EX radice palmaris & longiore, tenui, subadstringente, siue promit Agrimoniam, pinnata intercedentibus paruis foliolis) quorum singulari in ambitu serrati, superne glabra, inferne candicante hirsutie vestiti, Cætil. foliorum sect. omibus tenuioribus maxime. Quinquefolium referentibus, sic

ciore & adstringentiore sapore, quam radix. Cætil. liculos nudos spargit, qui more Fragariæ radicis in summo dixi in terram, ac folia gerunt: alios cauliculos inter folia attollit simplices: quibus flores insident grandifolii, Pentaphylli, quinque foliis constantes, lutei: fructus similis, grandifolius.

Quo nomine Græci & Latini hanc herbam appellant, à nullo, quod Fuchs. sciat, adhuc proditum est. Recentiores quidem Potentillam, ab eximii viribus, quibus pollet, vocant: nonnulli Agrimoniam siluestrem, ob formæ affinitatem, quam cum vtroque habet, nuncupant. Dicitur & Argentina, siue Argentiella, ab argenteo foliorum splendore: Germani verò Genfendy (Anselmum) quoddam anseres in cibo delectentur, appellant.

Possit inquit Tragus, Anserina hæc, quod ad formam attinet, non ineptè Eupatorium dici. Possit & Goss. gârby [Millefolium maius] appellari. Nam singula eius folia in star pinnæ animum pulli, sed maioribus incisuris dissecta apparent, quoad reliqua Millefolio non dissimilia. Millefolium itaque maius Latinis dicitur, nam & hoc nomine à Diosc. insignitur, tamen si quædam nomina, quæ eo capite commemorantur, ad alterum Millefolium pertineant, quod Stratiotes vocatur. Ea sunt Stratiotice, Achillion, Supercilium Veneris. Hæc ille, qui describit, & bonam figuram exhibet, verum nomina commiscet: est enim neque Eupatorium, neque Millefolium.

Quidam [vt locat Hist. Lugd.] Stephanomelidem Pini esse coniectantur valem ex aqua lar gum fuet ti p i n a r e s, sic dictam, quod coronis melius eius flos innectatur.

Caterum [teste Lob. & Penâ, qui in Adu. Obs. & Ic. Pl. Argentinam vocant] tantopere est hæc sicut Agrimoniam, vt non raro mulierculas Agrimoniam se collegisse ratas fallat: discernitur autem rei ratio viticulorum.

Gelseo hort. dicitur Argemone altera: & in cat. pl. Thaliærum Herbariorum. sue ætatis. Quod amen Argentina non est [aurestante Cordo in Diosc.] licet hoc opinentur Ruellius & Anguill. Potentilla 2. optime à Fuchs. & Matth. depicta.

Hæc Lun. nominatur Argemone, Inguinaria Plin. Agrimoniam siluestrem, Anserina, Argentina, Potentilla, aliquid in terra, & quorundam Adhærent. Germ. Genfendy, Genfing, Belg. Siluerkruyt, Sicut in laudis, Gall. Argentine, Rei d'oye. Ital. Argentina, Hung. Lud. pasit, Anserum gramin. Boh. Strabunt aut Eusy Maydlo.

Octauum passim florentem Maio, Iunio, ac Iulio. Frequentem scribit Cæsalp. in Germania, circa semitas & loca aquosa, potissimum iuxta flumina, quorum nulla amantior, frequentiorue alumna. Amat viginosa. Æstate, dum floret, egi debet.

Quum folia eius & radix [inquit Fuchs.] adstringant, temperamento à Pentaphyllo [Millefolio Trag. legit] nihil differre videtur. Quare hæc, potissimum autem radix, ex tertio ordine hirsutiora est, minimumque euidens caliditatis habet. Erat itaque mirum in modum, qui hanc humidam esse statuunt, nullâ aliâ moti ratione, quam quod in humidis locis proveniat: quâ verò Naturam aquat cum, haud obstante quod in aquosis nascitur, non etiam in tertio desiccat ordine. Debuisset certe illi hæc sententia deterere non levis illa adstrictio, quæ certissimus est siccitatis index: adstringentia enim, Gal. lib. 4. simplic. 6. teste, terrena sunt de crassa corporis consuetudine.

Potentilla. Argemone. Siluestre. Anselmum. cur. Argemone. Argemone. rina. Eupatorium. rium. ius.

Tragus. preb.

Steph. melis.

Agrimoniam. affinis.

Argemone. Thaliærum. Gelseo. Ruellius. Nominum. Lange. Impurum. Plin.

Locum. Tempus.

Error. rindus.

Adit.

Altrictoria igitur & exsiccatória vi pollet. Quare Recentiores fluxionibus & puncturis oculorum prodesse; recentia vulnera glutinare, & excrementa sanare, mulierum menstrua compescere, artus & membra confirmare, recte tradunt: nam id ipsum posse adstrictio, quæ in hac herba haud modica est, abunde docet. Et cum habeat Quinquemfolii temperamentum, eius etiam facultates obtineat necesse est. Dentium itaque dolorem finit, excrementa oris vlcera sanat. Dysentericis & alui profluuiis, coxendicis articulo- rumque doloribus subuenit. Sanguinis eruptiones sistit, aliæque, quæ à Diosc. Quinquemfolio attribuantur, potest. Quod verò adiciunt, hanc etiam lumbricos exterminare posse, id minus recte faciunt. Ea siquidem facultas, non huic, sed illi inest herbæ, quæ verè Tagetes dicitur. Proinde non sine magno errore, Potentillam cum eo confundunt. Anserina cum aqua & sale decocta, acies exhibita, qui ex alto deciderunt, auxiliatur, ut quibusdam apud Tragum videtur, sanguinem concretum dissoluendo. Verum hoc illi nequaquam probatur. Herba vino decocta & pota torminibus, & dorsi dolore laborantibus subuenit, mulieribus, quæ albis profluuiis vexantur, conducit, nam adstringit haud secus atque Pimpinella Italica. Aqua Anserinæ destillata rubentibus oculis utilis est, si lintecolis in ea mac- fatus imponatur. Hac ratione maculas quasvis extergere, fluxiones & dolores sedare dicitur. Experimento egregio didicit Io. Agricola Potentillæ succum vna cum pulvere Colchici vul- garis mariscis ani mederi. Viribus eximius pol- let (aiunt Adv.) ad frangendum calculum, inte- riora vulnera & vlcera maligna, & dysenterias, viscera roborando, similiter Agrimoniz: cuius potius, quam Tagetes, temperamento exsiccan- te, siue calore moderato est, sed altrictiõne supe- rat: multum sanguinem grumosum potu dissol- uit. Hanc inditum pelui, frigidâ aquâ semiple- ne, & operculo occlusâ, destillare, siue vapores in concanum operculi subuehere, quod sublima- re vocant, ferunt. Huius stillatitiam ad lentig- nes, pannos & maculas, fuscumque colorem So- le contractum delendum, Anglæ mulierculæ ad- hibent. His addit Hist. Lugd. Datur utiliter po- tui sanguinem reicientibus. Herba sicca farina ex sua ipsius stillatitiâ aquâ pota, albas veri fluxiones sistit, sed valentius addito Corallo & E- bonis ramentis. Sunt qui ad enterocelas præse- runt, tum in cibis, tum in potionibus. Etenim vlcera sanat præsertim pudendorum, & quæ oris partes erodunt, firmat commotos dentes, & la- xas gingivas, si in aceto decoquatur, & os sæpè colluatur. Dentium dolores mulcet, prolapsam columellam restituit, addito Aluminis mo- mento. Barth. Cyrrichter in secr. pract. lib. i. cap. 2. ad dolorem capitis à sanguine & bile, Anserinam ex aceto ros. & sale, primò pedibus apponit, & si non cessat, succum cum aqua rosa- cea temporibus applicat.

PES LEONIS SIVE ALCHIMILLA.

CAP. LXXVI.

EX radice minimi digiti, aut pollicari crassi- tudine, plurimis fibris donata, strenuè adstringente & desiccante: caules surgunt aliquot tenues, teretes, hirsuti, ramosi, do- drantales & cubitales, quibus insident flosculi



hirsuti, alia cauli, pediculo aut breui, aut nullo adhaerent, interceptaque folii continuitate, reli- quo pediculum ambiunt, ut ab eo perforentur: cæterum, folium ad Maluam accedit, ex luteo vi- rescens, infra hirsutum, in octo, aut nouem angu- los obtusos, seu plicas diuisum, in singulos angu- los singulis nervis à pediculo prodeuntibus, continè in ambitu crenatos.

Hæc vulgò Herbariis, Pes leonis [Leontopo- dium] & planta leonis, à foliis instar leonini pe- dis latis, & rotundis nominatur: minimè verò est Dioscoridis Leontopodium, id quod Brun- self. Euch. & Cornarius volunt. Notum est [in- quit Corn.] Leontopetalon officinis & herba- riis, & ab ipsis corruptè Para leonis (Leontop) appellatur. Sed erronea admodum est hæc o- pinio. Quandoquidem Alchimillæ descriptio cum Dioscoridis Leontopodii delineatione [te- ste Dorst.] minimè conuenit, De Leontopodio scribimus Hist. n. g. l. 3. ubi & eius æquiuocationes assignamus.

Euch. præterea vocando Alchimillam, Artinel- lam, Leucopiedion, Plantam siue Pedem leonis, Leontopetalon diuersarum plantarum nomi- na confundit.

Brunself. ait eos non perperam agere, qui Den- tem leonis, Leontopodion & Leontopetalon Dioscor. nomen, quamvis descriptio non quadret. Sic vult, sicut ubet Brunself., cui pro ratione nouitas placet. Qui tamen non Dentem, sed pe- dem legisse debebat. Horum autem opinionem de Leontopodio & Leontopetalo, nobiscum reiciunt, Fuchs. Matth. & Dodonæus.

Nec audiendus (monente Matthiolo) Brun- self. in suo Onomast. Dodon. Lob. & Pena Adv. & Hist. Lugd. qui Stellariam vulgò vocatam Leontopodium esse scribunt, id quod ex amba- rum plantarum descriptione constat.

Quod verò Hier. Brunsch. Sinaw, græcè Al- chimillam, Artinellam, & Leucopiedion vocari scribit, apud quem Græcum inuenerit ista nomi- na non reperio.

Dicitur autem Alchimilla, quod Alchymista- rum præconiis celebrata sit, & cetera seu d'gion siue Adidoy Cordo, à Germ. Chirurgis Sanicula maior, quod sit illi, tum facie, tum viribus ad- modum affinis.

Pes leonis, siue Alchimilla, Germ. Sinaw / Nomina letwen fûß / oder lewten tapen / Gross Sanickel. Belg. Sinawe / vnser frauen mantel / Gall. Pied ou Tape de Lyon, Ital. Pie de Leone, Angl. Ladies mantel.

herbidi, vm- bellatum con- gesti, quorum singuli, octo- nis constant foliolis, maio- ribus quatuor, totidemque minoribus, al- ternatim posi- tis, in quorum medio apiculi lutei: semen mi- nia luteum: Papauerino simile: folia, alia statim à radice exoriri- tur, longis, sel- quapalmari- bus, pediculis hirsutis, alia cauli, pediculo aut breui, aut nullo adhaerent, interceptaque folii continuitate, reli- quo pediculum ambiunt, ut ab eo perforentur: cæterum, folium ad Maluam accedit, ex luteo vi- rescens, infra hirsutum, in octo, aut nouem angu- los obtusos, seu plicas diuisum, in singulos angu- los singulis nervis à pediculo prodeuntibus, continè in ambitu crenatos.

Semen.

Folia.

Leontopo-

dium.

Planta Leo-

nis car.

Leontopodii

Dioscoridis

non est.

Eysor quo-

rundum.

Leontopeta-

lon

Para leonis,

Euch. norð-

tur.

Brunself.

repreh.

Stellaria nō

est

variorum

lupus.

Bransch.

Sinaw.

græcè Al-

chimilla.

Artinella.

Leucopiedion

vocari

scribit.

apud quem

Græcum

inuenit ista

nomi-

na non

reperio.

Dicitur autem

Alchimilla,

quod Alchymista-

rum præconiis

celebrata sit,

& cetera seu

d'gion siue

Adidoy Cordo,

à Germ. Chirurgis

Sanicula

maior, quod sit

illi, tum facie,

tum viribus ad-

modum affinis.

HISTORIAE PLANTARVM.

Locus & tempus

Montbelgardi in horto plantata feliciter pro-
uenit. Eam prope Masinunster, Geueuz, Balilex
& Florentia vidi vixentem Martio, & florentem
Maio. Matth. vt plurimum in montibus pro-
uenientem obseruauit, præsertim in pratis & pas-
cuis, erumpentem Maio & florentem Iunio.

Vires & usus.

Folia & radix adstrictione vehementi partici-
pant, atq; adeo exsiccant. Recentiores, teste Fuch-
sio, idipsum in secundo efficere ordine tradunt.

Temperam.

Quare vulneribus glutinandis aptissima est. De-
cocto enim ipsius lauantur vulnere omnia vul-
nera. Linteum quoque in eo madefactum illis
commode imponitur. Mulierum mammas im-
pensè laxas linteum decocto eiusdem intin-
ctum & impostum, duras solidasque efficit. De-
coctum denique hoc epotum, interanea vulne-
ra, rupturasque glutinat. Et quod dictu mirum est,

Mamma laxa

Ruptura. Rames

tanta eius plantæ in glutinando vis est, vt rami-
ces intestinorum, in pueris potissimum, sanare
possit. Herba & radix vulnerariis potionibus
adiunguntur, pulueribus, emplastris & vnguen-
tis: Sic & folia tumonibus & vulneribus im-
posita, dolorem sedant, inflammationemque tol-
lunt: idem efficit aqua destillata: nam calorem
extinguit, & ab inflammatione defendit, & san-
guinem sistit: sistit & alba mulierum profluvia,

Vulneraria potiones.

**Folia. Tu-
mores. Inflamma-
tiones**

facitque ad conceptionem, superfluas humida-
tes siccando: Succus eius potus comitialibus sub-
uenit. Aridæ puluis in suo ipsius decocto, aut stil-
latitiâ aquâ sumptus, rames intestinorum, po-
tissimum in pueris sanat. Datur idem puluis ex
vino, aut iure, cochlearis mensura, quindecim
aut viginti diebus, iis quibus adempta sit con-
cipiendi facultas, à nimia vteri humiditate, ob
quam iniectum semen contineri non potest.

**Alba pro-
fluvia. Succus Vul-
ni**

AGRIMONIA SEV EUPATORIVM, CAP. LXXVII.


**Descriptio
Caulis.
Folia.**

Caulis vt plurimum erigit singularem, cubi-
tum & selquicubitum altum, hirsutuna: fo-
lia palmam longa & longiora, ex quatuor ferè
foliolis vtrinque pinnatim sitis, circumquaque
serratis, extremo impari, multis minoribus in-
teriectis composita, sapore subdulci, cum qua-
dam adstrictione: flores suauolentes longâ se-
rie alternatim scapo adnascuntur crocei, quin-
que foliis constantes: quibus succedunt lappula
pulpâ albâ, dulci, plenæ: radix in nigrum ver-
git, crassa, sapore adstringente donata.

Flores.

**Lappula.
Radix
Descrip-
tio.**

Eupatorium (describente Diosc.) herba est è



cremiorum ge-
nere (eupatori-
dus), succu-
losa potius
quàm fructi-
osa, non enim
fructicat, quæ
vno tantum
scapo surgit) v-
nicum profe-
rens thyrsium,
tenuem, ligno-
sum, rectum,
nigrum, hirsu-
tum, cubita-
lem, aut etiam
altiorum: folia
ex interuallis
fissa in partes
maximè quin-
que, aut etiam
plures, Quin-

quefolii aut Cànabis potius foliis similia: sunt &
subnigra, & ferræ modo in extremitatibus diui-
sa (legendum Græcè *neuropteris*, ferræ, non *neuro-*
pteris, Illic modò incisa: quamuis si sic legatur,
non mutatur sententia, sunt enim Illic folia
ferræ modo incisa Hist. Lugd. ex Corn.) Semen
è medio caule enascitur, subhirsutum, ita deor-
sum nutans, vt etiam siccatum vestibus inhz-
reat.

**Diosc.
histor.**

Similiter Plinius inquit: Eupatoria quoque
regiam auctoritatem habet, caulis lignosi, nigri-
cantis, hirsuti, cubitalis aliquando & longioris:
foliis per interualla Quinquefolii, aut Cannab-
is, per extremitates incisis quinquepartitò, ni-
gris & ipsis, plumosisque, radice superuacua.

Plin.

Ex his ergo delineationibus patet, hanc no-
stram Agrimoniam, verum esse Diosc. Eupato-
rium. Hoc tamen reuocat in dubium Cæsalpinus
diuersis in locis. Ac primum quidem lib. 3. cap. 4.
dicens: Galenus Eupatorio facultatem tribuit
incidendi, quæ non videtur inesse Agrimonia:
Facit & difficultatem, quod scribit Diosc. lib. 6.
vbi ad epôtam Mandragoram præcipit excitan-
dos à sopore zgotantes olfactoris, inter quæ
Eupatorium in primis nominatur, quasi vehe-
mens in eo sit odor, qui nequaquam Agrimo-
niæ inest. Idem lib. 12. cap. 16. Eisdem facultates,
tum Auicenna, tum Melues tradunt Eupatorio:
inquit enim Auicenna, Eupatorium est ex her-
bis aromaticis: idè non videtur esse Agrimo-
nia, cui præter adstrictionem nullus conspicuus
inest sapor, neque odor, neque amaritudo. Ast
Cæsalpino iure merito se se opponunt Tragus,
Fuchs, Cordus, Robert. Const. Dodon. & Ferd.
Imp. quorum opiniones ordine recitabimus.

**Agrim.
Seru.
pator.
Dubiu**

Re/pn

Maio itaque mense [inquit Trag.] radix Agrimo-
niæ, dum adhuc tenera est, odoratissima depre-
henditur. Quod cum ita se habeat, non malè
Agrimonia Eupatorium Antiquorum esse sta-
uitur. Hæc nimirum ea est planta, de qua tot
& tam varæ, Veterum, præsertim verd Arabum,
extant sententiæ. Quidam enim ex his asserunt
Eupatorium habere folia similia Cannabinis, aut
pentaphylli, quorum quidem sententia maximè
probanda videtur. Alii, inter quos præcipuus
est Auicenna, dicunt, folia habere Cannabis, o-
doratum esse, floremque ferè Nymphææ simi-
lem, atque in hac sanè descriptione, nihil desi-
deratur, nisi quod ad florem attinet. Habet en-
im Agrimonia nostra florem multò magis exi-
guum, quàm Nymphææ. Quod si verd colorem
citreum vtriusque plantæ, non totam substan-
tiam contulisse Auicennam dicamus, tolerati
vtrique sententia eius potest. Nam altera Nym-
phææ species luteum profert florem, sed Eupa-
torio longè maiorem. Tercius Arabs, Mesues
nimirum, Eupatorium ita describit, vt statuat, il-
lud folia habere Centaurææ minoris. Est autem
posterior hæc sententia, manifesto cum errore
coniuncta, nisi tu verba Mesue aliter interpre-
teris, ne tunc vt dicas, Eupatorium serrata habe-
re folia instar Centaurææ maioris, aut flosculos
illius, substantiâ & formâ cum Centauræa mino-
ri conuenire. Hoc igitur pacto descriptiones A-
rabum admitti debent, nec à Græcis dissentiant.
Reliquum igitur est, vt quoties Eupatorii in au-
toribus sit mentio. Agrimoniam hanc intelligen-
mus. Quod verd Barbari hanc, Ferrariam mibo-
rem, Concordiam, Marmorellam, & Scelam vo-
cant, quæ nomina partim Saniculæ tribuenda
videntur, nihil impedimento fuerit, præsertim
scientibus eam herbam verum esse Eupatorium,

**Errat.
suec**

**Ferr.
Conco-
Marm-
la. Scel-
Eupati-
ynd.**

ab Eupatore rege, qui illud primus inuenit, nominatum, Hepatorium autem, & Hepatitis, & Inuolucrum maius, quod iecori potissimum medetur, à Dioscoride cognominatum. Serapio autem Hepatorium suum vocat *Casus*, vel *gasit*, seu *gasil*, Auerth. *Olibarda*.

Nec desunt, vt & hoc annotemus, qui cum Apuleio Eupatorii vocem Marrubio tribuant, & alii quidam Coniiz: verum nec ipsi quodnam verum esset Eupatorium, assecuti sunt. Proinde praefacta quadam ac immedicabili cecitate, captos esse eos iudicat Fuchsius, qui hanc verum & genuinum Eupatorium esse, ex notis, quæ ad amissum, nullâ reclamante, conueniunt, non animaduertunt.

Nullus, inquit Cordus, verum Eupatorium cognouit, præter eos, qui hodie Agrimoniam vocatam herbam, Eupatorium vocant, vt fecit Agricola. Nam reuera Eupatorium est ea, quæ nunc falsò Agrimonia vocatur, qui error Dioscoridis etiam ætate fuit. Dudum de hac scripserunt Leonicens, parens meus, & alii plures, quibus etiam Ruellius subscribit, Germani, Sermerig, & Leberfletten vocant. Eupatorium Græcorum est nostra Agrimonia, inquit, A. mat. Robert. Const. & Dodonæus.

In vetere versione Orisbasi, teste Dodonæo, de simpl. Agrimonia, Lappa inuera vocatur, quod scilicet lapparum infer aspera deorsum dependant.

Eupatorium Græcorum & Arabum F. Imperato quoque vulgaris est Agrimonia, dicitur odoratum Diosc. Eupatorium reperit in monte *Matefe*. Scribit etiam Cast. Dur. Eupatorium Dioscoridis odoratum reperit in monte *Caprarda*.

Hic adde C. Bauh. dicentem phyt. Eupatorium siue Veterum, Agrimonia dicta, Eupatorium Diosc. est aliorum Græcorum: & Eupatoria Plinii: quibusdam Argemonia in arvis nascens. Item: Eupatorium siue odoratum. Quem tamen satis mirari non possum, cur hæc duo Eupatoria separet. Diosc. vnus tantum meminit.

Cæterum, inquit Corn. In errore versantur adhuc hodie officinæ, vulgus Herbariorum & Medicorum, qui in Diosc. cap. de Eupatorio, Argemones nomen ad Eupatorium transferunt, quos sequuntur, qui Eupatorium, *Aggermenig* aut adhuc corruptius *Odermenig*. [Agrimoniam] appellant. Corruptè quidem eo loco, *enot rautio aptulian*, legitur, cum legendum sit, quamuis etiam corruptè, *apptulian*: vnde quosdam errore seductos Diosc. dixit, qui Eupatorium Argemonem vocarint. Verum nobis hæc correctio suspecta est, quia Anguillara ait, Eupatorium, siue Agrimoniam hodie in Græcia Artemisiâ vocant.

Quid tandem Lob. & Penz in Adu. qui Eupatorium Melue esse idem cum nostra Agrimonia negant, respondendum sit, ex hæcenus in medium alatis, satis superque constare arbitror. Vocat idem Obl. & Ic. Pl. Eupatorium Græcorum & Dioscoridis Agrimoniam officinarum. Nec sine errore Theod. Dorst. Eupatorium, Agrestem Saluam Barbarorum vocat.

Eupatorium, vel *ημυθωειν* & *ημυθωειν* Græcis: Lat. Eupatorium, siue Hepatorium. Offic. Agrimonia, Germ. *Odermenig*, *Synchwurts*, *Leberfletten* Agrimonien Belg. *Agrimonie*/Leuercrut. Gall. *Eupatoire*, *Agrimoine*, Ital. *Agrimonia*, Hisp. *La Agrimonia*, & Angl. *Agrimonie*, Boh. *Rzeczyce*, & Starce, Hung. *Apoburytayan*.

In satorum & viarum marginibus, & circa sepes & in pratis passim prouenit. Æstate floret. Basilæ quoque Septēbri & Octobri florere obseruatur. Genevæ prorumpentem vidi Aprilis principio. Autumno semen maturum est. Maio mense colligenda & siccanda, quæ in medicis vsus eligitur.

Huius folia, autore Diosc. cum adipe suillo veterè trita & imposita, vlcera, egrè cicatricem recipientia, sanant. Herba verò ac semen, si cum vino bibantur, dysentericis, hepaticis & colicis Trag.] & à repulibus bestiiis commotis opitulatur. Galenus *μυθωειν* easdem facultates exponit. Eupatorium herba ipsa tenuium partium, incidendi, extergendique facultatem citra manifestam caliditatem obtinet. Quare obstructions iecoris expurgat. Inest itidem ei & adstrictio

quædam, per quam robur visceri addit. Hodie, attestante Trago, Eupatorio frequentissimè, non sine magno cetèrè commodo, ad reponenda luxata membra vtuntur. Aqua distillata potu tum

sim emollit, pituita in crassam incidit, morbum arquatum expellit, febri laborantibus conducit, tinea ventris enecat. Exulcerationibus oris, aliisque vlcibus si vulneribus, & ex illa colluantur, & purgantur, succurrit. Radix exsiccat & moderatè adstringit, quare intemperiem ferè omnem corrigit, obstructions aperit. Præterea decoctum dilutumve colose limpidi vini gilui placet. Hinc in vino rubro stipitico decocta putredinem vulnèrum & vlcèrum abstergit, si ea lauentur. Eadem contusa & vulneribus malè agglutinatis superligata denuò aperit. Autore Rondelet. Agrimonia cum aceto forti emplastri modo imposita verrucas tollit. Notatu dignissimum, si verum, quod scribit Timoth. Rosselius

Agrimoniam cum veteri axungia porci applicatam extrahere spinas. Ioannes Schenck. Obl. Med. [ex autoritate Diosc.] gangranam ex mortu hirudinum, Helidæum Agrimoniam contritâ, emplastri modo impositâ, curasse scribit.

Quisquis tandem est Medicus, qui post hæc Eupatorio vti velit, Agrimoniam vtatur confidenter. Nihil itaque sapiunt ii, qui in Sympo de Eupatorio, pro hoc, Spinam Arabicam substituunt, pro noto puta ignotum.

GARYOPHYLLATA VULGARIS

Flore paruo luteo.

CAP. LXXVIII.



Fragrantif. Simus Caryophyllorum odor, quem radix spirat fibrosa, ruffa, rotati plantæ nomen indidit, caule cubitali, hirsuto, tenui, in alas diuiso: cuius flores luteoli Tormentilla, quibus succedunt echinata, glomerataque capirula, longis arstis horrida: folia hirsuta, nonnullam cū

Locus & Tempus

Vires & vici
Vlcera
Dysenteria

Temperamentum

Obstructio
nec scoriaLuxata
membra
Tufus
Morbus
argutus
Febri. T. nra
Vulnera

Gangranam

Serpule
Eupatorii

Descriptio

Agrimonia similitudinem habent.

Bruefcliquam Tom. 1. Rhaph. 2. Caryophyllatam vocat, eandem in 4. herbam Benedictam nominat.

Reprehendit Matth. Syluaticam quod parum rectè tradiderit, dicendo, Lagopum eam esse herbam, quam Herbariorum vulgus Caryophyllatam appellet.

De hac Veteres, quod Matth. sciat, nihil memoriz prodiderunt. Nisi fortasse fuerit Geum, cui Plin. lib. 26. cap. 7. radículas assignat ternas, nigras, bene olentes. Vtrum autem sit Geum Plinii vulgaris hæc Caryophyllata Lob. & Pena Adm. quoque dubitant.

Sic & Trag. de hoc dissidio nihil iudicat, sed Nardum siluestrem vocat, quam quidam Sanamundam nominant.

Eadem repetit Dodon. gall. & Gesn. Qui præterea Auantiam, & Oculum leporis, atque Geum, Caryophyllatam vocari tradit, id quod ante eum Antonio Musæ Brassuolo quoque placuerit.

Caryophyllatam vulgi Caxalp. nuncupat, cui apud Plinium inter Argemonias numerari videtur, culm ait, radix Thus redolet.

Hist. Lugd. Caryophyllata Matthioli, & Caryophyllata vulgaris, qualiter & Clusio dicitur.

Taber. icon. & Hist. Caryophyllata, & Herba Benedicta, quam quidam Lagopum, alii Eupatorii speciem volunt, sed errant, inquit, Plinius vocat Geum, & Scalig. Getiam. Item Caryophyllata 4. siluatica, flore luteo. De hac quarta plura vide sub nostra aquatica, dubius enim sum, quod referri debeat.

Camer. Epit. Caryophyllata. Item horti Caryophyllata vulgaris: Eturcius: montana si nulis vulgaris, elegantior tamen & maioribus floribus prædita.

C. Bauh. phyt. Caryophyllata 1. siue vulgaris. Caryophyllata 2. siue vulgaris maiore flore, fortè Fuchsi. siluestris.

Gerardo, Caryophyllata, VVallonum Gloria silia.

Baccharis, [vt vult Corn.] officinis ignota est, sed Herbariorum vulgus Herbam Benedicti, siue Benedictam vocat, aliqui etiam Chirothecam nostræ domus, vnser framen bendischuch, appellant. Verùm Benedicta non videtur nobis respondere cum Bacchari Dioscor. nec nomen Chirothecarum placet, quoddam fortè Digitalis sit, Hanc autem non esse Diosc. Baccharem, vt nonnulli suspicantur, descriptio plantæ, quæ non conuenit, vt Monachi in Mss. testantur, comprobant.

Sed vt liberè dicamus, quod sentimus: Minimè, cum Fuchsi, Caryophyllatam, Dioscoridis Lagopum credimus, dicimusque eorum sententiam, qui Geum Plinio dictam velint, periculo vacare, quoddam eadem facultas vtriusque radicibus insit.

Cæterum, Fuchsius Caryophyllatæ, seu Herbe Benedictæ siue Sanamundæ vulgè appellatæ duo genera animaduertit, hortensem, flore minore, & siluestrem flore maiore, magis ad croci colorem accedente. Nos Fuchsi duas si guras apponimus, quia suspicamus tam etiam, quamuis nullam differentiam demonstrent, nec discrimen à Fuchsi positum in us obferuare possumus.

Caryophyllatæ figura malè apud Euchar. Carduo benedictæ appingitur.

Caryophyllata qualiter Græcis & Antiquis

Latinis nominata sit, nondum compertum. Est autem ab odoris suauitate, quam radices de se præbent, nominata. Vulgus herbam Benedictam, à diuina sua efficacia, & Sanam mundam appellat.

Germani Benedicten wurtz, Belgi & Brabant Caryophyllate, Gall. l'herbe benigte, Refize, en gallie, Augl. Nicno, Boh. Benedyfr, Hung. Vadsel rus.

Vidi spontè prouenientem non longè à Monspelio, Basilæ mensis Octobri inter propugnaculum & portam cinericeam, intra vitæ ad muros & propè portam lapidesm, & alibi florentem Maio & Iunio, cum flore & semine Augusto, Patavii virentem in quodam horto Decembri, & in horto D. Musali Ianuario, Florentia in horto D. Nicolai Ferraiensis, Lugduni passim, Genevæ virentem mensis Februarii principio, & cum flore Maio. Cæterum, Matth. teste, gignitur in montibus, & in viis iuxta septa, quod mirum in modum sepius opacis gaudeat. Vlgaris in Germania, inquit Tabern. in terra firma, & humida, vmbroso loco, in hortis prope muros, in sepius & dumetis: transfertur in hortos propter summam vilitatem.

Geum Plinii medetur non modò peccoris doloribus, & lateris, sed & cruditates discutit, cundo sapore. Recentiores & perugustus etiam herbarius, annotante Fuchsi, calidam & siccam esse in tertio ordine statuunt. Folia sanè in gustu non mediocrem adstrictionem ostendunt, vt & iudem radix. Eadem luto & sordibus elata seccatur, & imbre aceti respersa, arcas & vestes iucundo commendat odore. Decoctum huius sumitur ad perficiendas concoctiones, sedandosque colidolores. Manuscriptis Herbarius facultatem habere dissoluendi, digerendi, & obstructions tollendi scribit. Tomentum item ex vino decoctionis eius menses ciere. Contra venena tritam cum vino sumptam valere. Concoctionem præterea roborare, dolorem ventriculi, & intestinorum à frigidityte aut floribus ortum decoctam in vino sanare ait. Mirificè etiam ad interna vulnera huius herbe decoctum confert. Externa verò ex eà collui debent. Acetariis etiam folio expetita herba. Eadem Tragus sic tradit.

Vilus huius radicis vulgaris est, vt vere in vinum imponatur, quoddam optimo acicundissimo & odore & sapore commendat. Hoc vino cor exhilarari & obstructions iecoris aperiri, nec non frigidityte & crassiss humoribus affectum stomachum iuuari multi testantur. Radix Benedictæ vino decocta ac calida pota, dolorem ventriculi, & intestinorum à frigidityte, aut flatibus ortum, sedat. Vinum in quo radix Benedictæ decocta fuerit, purgat & mundat omnia vulnera, cuiusmodi sunt fistulæ & careinomata: idem fœdas maculas extirpat, si illo facies aliquando singulis diebus abluatur, maxime verò in primis diebus puerperis. Caryophyllata, inquit Matth. non est viribus inefficax, argumento quoddam radices manifestum Caryophylli spirant odorem: Eà Recentiores vtuntur potà ad thoracis interna vulnera. Quin & eius succum admittit æruginè, cuniculosis, contumacibusque viceribus, vtiliter iniungunt. Eadem oblecta spiritus recreat, & frigidum roborat cerebrum. E pota prodest celiacis, dysentericis, fœmuri in proflumini, & cruenta expuentibus. Tam intus sumpta, quam foris illita enterocelis auxilio est. Temperamentum ei exalefaciens, & exsicicans.

Herba benedicta
Syluatica
notat.
Lagopus
non est

Geum Plinii

Nardus siluestris
Sanamunda
Auantia
Oculus leporis

Eupatorii
species non est
Gessio

Gloria silia
Baccharis

Cornu duplicis lapidis

Lagopus non est
Geum Plinii non est

Fuchsi diffinitio

Fuchsi notatio

Euchar. error
Caryophyll.
gymna

Herba benedicta
Nominata
lingua

Locus
tempus

Vites
vitis

Tempus

Colic.

Neque
Geum.

Acetariis

Vinum

Fistula
Fœda
cui

Vicere

Cereb.

Enter.

Vitis.

et manifesto sunt indicio eius radices: quippe quæ gustu odoratæ, adstringentæque deprehenduntur. Quibus qualitatibus non modò attenuare, discutere & adstringere valent, sed etiam robore. Menfes, *vt attestatur Lobel. & sanguinis* grumos propellit, obstructions reseruat, venenis aduersatur. Radix huius, *vt tradit Tabern.* in cibo, & potu, & medicamentis quocunque modo sumpta, cerebro succurrit, spiritus, vitales recreat, omnibusque oculorum vitis subuenit. Radix masticata oris fortorem emendat. Eadem ieiunè commanducata, corroborat, & ab omni contagio præseruat. Ex herbâ & radice, in balneo Maria destillatur aqua ad eisdem vsum idonea. Similiter & vinum ex radice paratur, & Conferua. Radix colligenda Martio.

GARYOPHYLLATA MONTANA

flore magno, luteo.



Folia Garyophyllatæ montanæ & palustris vulgarioris respondent, sed multò minorâ, vncialia, multa per terram sparsa, villosa, nonnihil laciniata, per extremum rotunda, serrata: inter hæc surgit *coliculus*, sex circiter vncias altus, foliis paruis, & in profundas oblongas laciniâs fissis,

cuius summo flos insidet magnus croceus, concolorum staminum congerie medium occupante, ex calyce hirsuto in laciniâs mucronatas, alternatim maiores minoresque cælo: radix satis crassâ, nigra, fibrata, valdè odorata.

Gesl. hort. Geum tertium alpinum Matth. in Diosc. cum mag. fig. Garyophyllata montana, cui flos aureus, radix odore Caryophyllorum, & gustu adstringente. Lob. Obsv. vt & Ic. Pl. Caryophyllata maior rotundifolia, & Garyophyllata montana Matth. qualiter etiam Hist. Lugd. inscribit, dicitur: Quandam, inquit, Caryophyllatæ ram & petelegantem speciem, Italo semine ortam, nihil dissimilem à Septentrionali rotundifolia impertiuit Coldenbergius; nisi folio quadruplo maiore, & radice crassiore digitum æquante, minisque fibrosa foret. Si Lob. eandem cum Matthiolo cuius figuram exhibet intelligit præcedenti descriptione, miror eum non meminisse coloris.

An Anguil. Garyophyllata alpina. Clus. Pannon. & in fol. Garyophyllata montana 2. Caryophyllata alpina aureo flore, à Matth. Caryophyllatæ montanæ nomine descripta: pictura tamen non valdè feliciter expressa. Camer. in Epit. Matth. Caryophyllata montana, Ital. *Garofanata saluatica*. Item hort. Caryophyllata alpina altera, à Pennæ floribus albis reperta, in monte Lupo Gallie. Tab. ic. & hist. Caryophyllata montana Berg Benedicte in vult; Berg Maginfratit. Tom. II.

Auantia montana flore luteo, caule vnam alto. C. Bauh. phyt. Caryophyllata 6. sine Alpina lutea, cuius flos licet communiter luteus sit, inuenitur tamen & purpureus & albus. Gerard. Caryophyllata montana.

Planta hæc, quam Gesnero in peregrinatione Rhetica Caryophyllatam alpinam nominavi, reperta in monte Braulio, florens Iunio, vt & alibi. In summis etiam [autore Clus.] duntaxat iugis montium Pannonicorum; nec in omnibus tamen, sed inter graminâ, vel sub fruticibus nascitur. Iunio floret, Augusto semen maturum est. Reperitur [teste Matth.] in Bohemiâ montibus, è quibus Albis fluuius, oritur.

Eisdem cum altera pollet viribus; sed præstantioribus. Radix non solum excalefacit, & succat, sed etiam cohibet, ac roborat.

GARYOPHYLLATA AQUATICA

flore rubro striato.



Radice fibrosa minima, extrinsecus rubente nonnihil, intus albâ, sapore adstringente, & subdulo, eadem caules profert multos interdum paucos, aliquando cubitales, fæctos, hirsutos, nonnihil rubentes: ramulorum summis subinde etiam prinatis pediculis, breuibus, hirsutis, rubentibus,

nonnihil nutantibus flores insident, patuli, Alpina floribus terè æquales, striati, non multum elati, & supra calycem parum admodum se proferentes, extrâ purpurei intensius, intus dilutius; odore grato, ex foliis quinis; à tendi principid sensim in latum se diffundentibus, intra quorum septa apices multi, crocei, echinatum capitulum obuallant: insidet autem flos quasi calathio patulo rubente hirsuto, in quinque laciniâs hirsutas, totidemque ligulas in laciniarum spatia distributas diuiso: folia Caryophyllatæ vulgaris foliorum formâ, sed longè maiora, alia à radice statim orta, alia in caulibus, pediculo sextantali, sapore cum radice compati.

Camer. in Epit. Matth. ybi noua figura, Caryophyllata aquatica. Item hort. Caryophyllata palustris.

Hist. Lugd. Caryophyllata montana Dalech. radice inodorâ, fatique gustus: foliis Caryophyllatæ similibus: flore luteo, lineis pluribus distincto. Aquosis locis gaudet. Quæ Dalechampi Caryophyllata, si non eadem cum nostra, saltem ericilli valdè similis. C. Bauh. phyt. Caryophyllata 3. siue aquatica, nutante flore. Item Caryophyll. 4. siue aquatica 2. Et rursus, Caryophyll. 5. siue montana Dalechampi. Ad hæc Caryophyll. 7. siue alpina minor. Et tandem apud Matth. Caryophyllata aquatica.

Cam. in suo Matth. Caryophyllata 3. vel Geum aquaticum Gesneri Clusio, floribus pallidis, sub-

Genus aquaticum.

purpureis, aliquando multiplicibus, magis rubentibus, aliquando sanguineis.

Clus. Pann. & in fol. Caryophyllata 1. siue alpina nutante flore, radice impensè adstringente, odore iniucundo: floribus quinque vt plurimùm foliolis, nonnunquam fenis, aut septenis, suauiter rubentibus, constantibus. Item Caryophyllata 3. siue Geum aquaticum Gesneri: cuius iconem suis coloribus depictam ipsi communicauit Pennæus, quam ex Gesneri depicto herbario se desumpsisse fatetur. Flores huic sunt sanguinei-coloris, duùm generum: nam alter flos multiplici foliorum texturâ & serie constat, alter simplici, vtriusque medium, quemadmodum in aliis Caryophyllatis, occupante villosâ congerie. Iconi fuit adscriptum Geum aquaticum flore simplici & multiplici. Tabern. hist. Caryophyllata 4. siue siluatica, Herba benedicta silu. wild Benedicet würg & wald Garasch/

Fraba be.
med. silu.

radice simili vulgati crassiore, minus fibrosâ, odore multò minore: foliis paruis similibus Hederae terrestri, pilosioribus: caule cubitali, rotundo: floribus pulchris, luteis, rarò pluribus, quàm tribus in vno caule, sequitur florens albus. Prouenit copiosè in S. Petri silua inter S. Remig. & Lâuterbürg, abundanter reperitur in Brabantia prope Mechliniam in silua, non longè à domo aquatica Bûrgenstein. Radix habet exsiccantem & adstringentem saporem. Gesn. hort. Geum 2. ruale, Caryophyllata & Benedicta species. Teago Benedicta silu. Lob. & Penz. Adu. Septentrionalium rotundifolia papposo flore Caryophyllata: radice non perindè Caryophyllum aut Nardum halante, vt vulgaris: flore speciosiore, & coliculis pallidiusculo. Quæ descriptio non in omnibus placet, colorem enim non tradit. Figura quæ aliqui satis bona, exhibetur eodem etiam titulo, Icon. Pl. p. 694.

Geum vicia-
le
Benedicta
silu.
Caryophyll
rotundifolia.

Lob. mor.

Locus
Tempus.

Florentem in horto mense Aprilis & Maio, ex montibus allatam Geneuæ habui, semen decidit mense Iunio. Crescit authore Clus. mediâ ferè

Montium regione locis vdis & riguis, sub arboribus. Floret isthic Iunio: in hortos translata Maio, aliquando etiam maturius. In Brabantia siluosis conterminis Mechliniæ, & in Northmannia frequens, in Anglia verò plurima, teste Lobelio.

GARYOPHYLLATA PENTAPHYLLÆA.

IN Rheticis Alpibus non procul Clauenna, hanc. I. primùm nasci, putauimus [aiunt Lob. & Penz. Adu. esse Tormentillæ, aut Pentaphylli speciem: verùm radix Gerani fibrosior, foris que rubiginosa, paruum quid suauiter redolens, Caryophyllatam testatur. Quinetiam erigit caules pedales, cui hærent folia quinquepartita, ambitu serrata, Pentaphylli aut Tormentillæ, flore luteolo pallentè, staminulis lanuginosis, croceis, papposis, minoribus Caryophyllato.

Lob. & Penz. Adu. & Ic. Pl. Alpina Pentaphylla Caryophyllata. Ceterùm, Lobelius prædicto titulo duas diuersas proponit figuras: Prior quidem in Adu. pingitur, sine pilis, & tantùm cum foliis quinis: Posterior verò tota pilosa est, & septisfolia, quæ sanè effigies non male conuenire videtur cum Ranunculo nostro montano albo, hirsuto.

Tabern. Ic. & hist. Caryophyllata 1. siue alpina, quinquefolia. Sed & Tabernæ figura longè à Lobeli diuersa, est enim tota glabra, licet ipsa hirsutam esse scribat. Nos igitur propter figurarum varietatem Lobeli & Tabernæ, nullam proponimus. Casp. Bauh. phyt. Caryophyllata 8. sine Quinquefolia maior. Item Caryophyll, 9. siue alpina, quinquefolia minor, quæ foliis sit quadruplò angustioribus quàm prior, totaque minor & tenerior, in monte Fractio præueniens, cui Cast. Durant. pag. 197. Caryophyllatam montanam non absimilem pingat. Gerard. hist. Angl. Caryophyllata montana alpina pentaphylla.

FINIS LIBRI DECIMI SEPTIMI.

HISTORIÆ









HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER DECIMVS OCTAVVS.



FRUMENTACEA, GRAMINEA, HARVNDINEA, IVNCEA.

Producā ad Colophonem Arborum, Fruticum, & Suffraticum historia, tempus est ut ad Herbarum historiam accedamus. Maximum hinc opus nature, Frumenta ordiemur, & cibos suos homini enarrabimus, satēri- que cogemus; ignota esse pleraque, per qua vivat. Fruges, inquam, Cereales, in cibos potius, quā medicina- nam cedentes, non ad Cerere, ut Poētā negantur, reperiās & exculās, sed ab ipso totius uniuersi Creatore in ipso Mundi exordio productas: subinde gignente eas, & vñsibus affatim ministrante Tellure, lato præcipuis orbis regionibus prouentu. Post Frumenta, & inter ea, & de Graminibus dici cogit Botanicus ordo. Quippe etiamst Frumenta non sint, sunt tamen pecudi, quod frumentum homini. Adde quod plura eorum sunt Frumentacea. Sed & forme similitudo, & quodd illorum quadam in hac abeant, inter illa de se dici possunt. Et quid propius ad Gramina accedit, quā lunci & harundines. Ut & hinc venia sit hac illis adiicientibus, & aequi studioso- rum, ac Historia nostra compendio consulentibus.

TRITICVM VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. I.



Radidimus priori libro, quæ de Leguminibus dicenda vide- bantur, nunc ad Frumentacea, quæ, teste Plinio, non eadem v- bique; neque vbi eadem sunt, iisdem nominibus occurrunt, deuenimus. Sunt autem ea,

quæcunque geniculato culmo, & arundinaceis constant foliis, semēque panificio, & pulvis aptum ih spicis aut iubis producunt. Horum quidem omnium quamplurimis terris commune, & nobilissimum est Triticum.

Huius (ut auctor est Theopht.) genera plura notantur, cognōmina ex locis sortita, ut *Africum*, *Ponticum*, *Thracicum*, *Affyrium*, *Aegyptium*, *Siculum*: quæ & colore & magnitudine, & specie, & proprietate inter se differunt. Quædam vel aliunde cognōmina sortiuntur pro suis viribus, tum aliis, tum vel maxime, quæ ad cibum pertineant, ut *Canchrydias*, *Stelengis* *Alexandrinus*. Nec verò ab re fuerit, si illa quoque pro differentiis cap- ies: & aliud præcox, aliud serum: & aliud au- ctu amplum multumque reddens, aliud ieiunum quoddam parumque ferens: & aliud spicam gra- diorem effundens, aliud paruum: & aliud diu in folliculo manens, aliud aptum breui absolui, ut

Africum: & aliud culmo tenui constans, aliud *Ex diuersis* crasso: quod etiam ipsum *Africo* datum est. Cras- *habitu*.

so tamen & *Canchrydias* dictum consistit. Item aliud tunicis paucis, aliud multis vestitur, ut *Thracium*: & aliud vnicalamum, aliud multica- *Ex Gairibus*.

lamum, & magis minusque. Adde etiam si quid aliud his, aut prædictis ratione virum proximum sit: cuiusmodi namque differentiæ naturaliores profecto apparent, quibus trimestrium annu- merari genus par est, & bimestrium, & si quid in- tra pauciores dies valeat consummari. Et in *Eubæa* genus quoddam intra quadraginta dies cras- sati, perficique posse affirmant, idēque firmum esse, ac ponderosum, nec modo trimestris leue: quamobrem famulis id præberi inquit, etenim nec multum in hoc furoris esse volunt. Igitur ge- nus id celerrimum quidem ad consummationem, sed inuentu rarissimum est. Et bimestria verò quædam habentur, quæ ex *Sicilia*, & in *A- chaïam* aduecta sunt: sed hæc paucum reddunt, parumque fecunda habentur: quanquam cibo facilia, & iucunda sunt. Nascuntur & alia quæ- dam genera in *Eubæa* & præcipue apud *Cari- stum*. Trimestria verò permulta, & vbiue habentur: leuia hæc & parum fecunda, & vnicalama sunt, atque in totum infirma.

Dele. Sur.

Leuissimum igitur Triticum, quoad simplici rat. one ager licet, Ponticum est: ponderosius ex ut. que in Graciam aduehi solent Siculum datur, sed eo ponderosius, quod Bæotia fert: quod inde afferunt, quod athleteæ, qui Bæotie ternos semestertios vix possint consumere, cum Athenis fuerint, facile quina consumunt: leue satis, & quod in Laconico agro conficitur. Horum igitur causa in terris, cæloque intelligi debet. Nam & Asia ultra Bactra quodam in loco, adeo grande frumentum fieri tradunt, ut nucleis Oliuæ suæ equiparent magnitudine granâ singula. In Pisis autem dictis adeo firmum nasci asserunt, ut si quis plus comederit, dissipatur necesse sit: & Macedonum ita plerique interisse aiunt. Absurdum sanè, & lenitati trimestrium ablonum, quod in Pontico euenit: Vernum enim durum admodum est: hybernium autem molle est: lenitate enim molle plurimum differt.

An ex re-
gionibus
genera con-
stentia.

Reliquum est, ut propriæ naturæ causa detur, quam in pluribus differentias recipere magnas, cum in exortu, consummationeque, tum in propriis speciebus videmus, cum magnitudinis atque paruitatis & figuræ. Adde copiam paleæ, & incommoditatem ratione vltus cibari hominum. Fortitan & genera regiones efficiunt, vel omnia, vel certe aliqua: assimilant enim sibi ipsis quodam modo, & aut differentiam aliquam generis pariunt, aut etiam minus vult reddunt, ut Tritico Thracio euenit. Fit enim multis cum tunicis, seroque provenit: quod utrumque vis sanè frigidis facit. Quæ de causa ceteris quoque agris, Thraciæ istud satum maturè, serò erumpit, ac auge- scit: & quod maturè apud alios feritur, serò apud alios exit. Consuetudo enim velut natura effecta est. Nam & quod in Asiano agro Acipisyanagis vocato habet vim disrumpendi, quoddam magnitudine nuclei est, agri proprietate, naturæque vires eiusmodi fortuitur: nec aliò translata seruari incommutabilia possunt. Nec minus locum habet in cæteris, si quis cum agro, cæli quoque adiciat qualitatem. Hinc enim fructuum diuersitates exultant, imò hinc sterilitates sequuntur, cum planta in alieno agro nequeat hospitari. Hac

Cæli quali-
tas, diuer-
sitate ge-
neris.

Plinius.

Theophrast.

quorum multa transcripisse videtur Plinius.

Genera

prima duo.

Hyberna

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Frumenti ipsius, inquit, totidem (duo ut frugum) prima sunt genera, per tempora sacris diuina. Hyberna, quæ circa Vergiliarum occasum [No- uembrem] sacra, terrâ per Hyemem nutriuntur, ut Triticum, Far, Hordeum. Æstiva quæ Æstate [Mio] ante Vergiliarum exortum feruntur, ut Milium, Italix duntaxat ritur. Alioquin in Græcia & Asia omnia Vergiliarum occasu feruntur. Quædam autem utroque tempore in Italia. Ex his quædam & tertio, Veris scilicet. Aliqui Verna, Milium &c. appellant. Sementina, autem Triticum &c. Et in Tritici genere pars aliqua pabuli est quadrupedum causâ sati, ut Fartago. Sementina autem interpretatur Dalechamp. quæ primo & potissimo sementis tempore, nempe circa Vergiliarum occasum, quod æstiva [sementina] ut ait Theophrastus, antonomastice Græcia vocauit, terræ mandantur. Tritici, (pergit Plinius) genera plura, quæ fecerunt Gentes. Italico nullum equidem compara- rem candore ac pondere, quo maxime discernitur: montanis modo comparetur Italix agris extorâ, in quo principatum tenuit Bæotia, deinde Sicilia, mox Africa. Tertium pondus erat Thracio Syriæque, [deinde &] deinde Aegypcio, athlesarum cum decreto, quorum capacitas humentis sim- lis, quem diximus ordinem fecerat. Græcia &

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Æstiva.

Ponticum laudauit, quod in Italiam non perue- nit. Ex omni eadem genere grani prætulit [Can- chrydium, Stilegyn, & Alexandrium Theodra- contion, & Istelepant, & Selinusium CH.] Dra- contiam, Strangiam & Selenusium, argumento crassissimi calami: ita pingui solo hæc genera as- signabat. Leuissimum & maxime inane, seu tenuis- simi calami in humidis feri iubebat, quoniam multo egeret alimento. Hæc fuere sententiæ Ale- xandro Magno regnante, cum clarissima fuit Græcia, atque in toto terrarum Orbe potentissi- ma, ita tamen ut ante mortem eius annis fere 145. Sophocles Poeta in fabula Triptolemo fru- mentum Italicum ante cuncta laudauerit, ad ver- bum tranquilla sententia.

Et fortunatam Italiam frumento [carere] canere cauidio.

Quæ laus peculiaris hodiæque Italico est. Quo magis admittor, posteros Græcorum nullam men- tionem huius fecisse frumenti. Nunc ex his gene- ribus quæ Romam inuehantur, leuissimum est Gallicum, atque è Chersoneso aduectum: quippe non excedunt in modum vicienas libras [sili- quæ granum ipsum pondere Turn.] si quis granum ipsum ponderet. Adicit Sardum selibras, Alexan- drinum & trientes: hoc & Siculi pondus. Bæoti- cum totam libram addit. Africum & dodrantes. In transpadana Italia scio vicienas quinas libras faris modios pendere: circa Clusium & (Senas Dal.) senas. Lex certa naturæ, ut in quocunque genere panis militari tertia portio ad grani pon- dus accedat: sicut optimum frumentum esse, quod in subacta congiug aqua capiat. Quibusdam ge- neribus per se pondus, sicut Balearico: [quod modio Vet.] modo tritici panis pondo xxx (xxxv Dal.) reddit. Quibusdam in binis mistis, ut Cy- prio & Alexandrino, xx. propè libras non exce- dentibus. Cypricum fuscum est, panemque nigru- facit: itaque miscetur Alexandrinum candidum, redduntque xxv. pondo. Thebaicum libras adici- cit. Marina aqua subigi, quod plerique maritimis in locis faciunt occasione lucrandi salis, inutilissi- mum. Non alia de causa oppotuniora mor- bis corpora existunt. Galliæ & Hispaniæ frumen- to in potum resolutum, quibus diximus generibus, spumati concretâ pro sermento utuntur. Quæ de causa leuior illis, quam cæteris, panis est. Dif- ferentia est & calami. Crassior quippe melioris est generis. Plurimis tunicis Thracium triticum vestitur, ob nimia frigora illi plagæ exquisitum. Eadem causa & trimestria [& trimestre Dal.] in- uenit, detinentibus terras niuibus, quod tertio serè à satum mense & in reliquo orbe metitur. To- tis hoc Alpibus notum, & hyemalibus prouinciis nullum hoc frumento latius. Vnicalamum præ- terea, nec vltimum capax: feriturque non nisi te- nuï terra. Est & bimestre circa Thracium sinum quod quadragesimo die, quàm satum est, matu- rescit: mirumque, nulli frumento plus esse pon- deris, & sursutibus carere. Vitur eo & Sicilia & Achaia, montosis (montuosis CH.) utraque par- tibus Eubææ quoque circa Carystum. In tantum salitur Columella, qui ne trimestris quidem pro- prium genus existimauerit esse, cum sit antiquissi- mum. Græci trimenon vocant. Tradant in Ba- ctris grana tantæ magnitudinis fieri, ut singula spicas nostras æquant.

Quod verò dixit Plinius: Est & bimestre &c. Theophrastus aliter habet. Scribit enim esse Tri- tici genus trimestre celerius maturescens, utin Eubæa quod intra quadraginta dies perficitur. Esse & trimestria, quæ ex Sicilia in Achaia trans- portantur.

portantur. Est & eiusmodi in Eubœa, maxime in Carysto. Præterea à Theophr. diffidet, cum ait, Tradunt in Bactris grana tantâ magnitudine fieri, vt singula spicas nostras æquent, cum Theophr. scribat, In Asia trans Bactra aded grande gigni frumentum, vt nucleo Olue par sit magnitudine.

Nunc, eodem Plinio autore, frumenti genera, non eadem vbique (vt diximus) neque vbi eadem sunt, iidem nominibus. Vulgatissima Far (Triticum muticâ spicâ secundum peritiores) quod adorea Veteres appellauere, Siligo, Triticum. Hæc plurimis terris communia. Atinca Galliarum propria, copiosa & Italia est. Aegypto autem ac Syria, Ciliciæque & Asia, ac Græciæ peculiaria Zea, Olyra, Tiphe, Aegyptus Simulaginem conficit è tritico suo, nequaquam Italica parem. Qui Zeâ vntur, non habent Far. Ex omni genere durissimum Far, & contra hyemes firmissimum. Patitur frigidissimos locos, & minus subactos vel æstuosos, siccitæque. Primus antiquis Latio cibus, magno argumento in adorea donis, sicuti diximus. Pulse autem, non pane, vixille longo tempore Romanos manifestum, quoniam inde & pulmentaria hodiæque dicuntur. Et Ennius antiquissimus vates obdionis famem exprimens, offam eipuisse plorantibus liberis patres commemorat. Et hodie sacra spica atque natalium pulse fitilla (pulse fitilla M. fitilla Ch.) conficiuntur: viderique tam puls ignota Græciæ fuisse, quàm Italia polenta. Tritici semine audius nullum est, nec quod plus alimenti trahat, Siligiem propriè dixerim Tritici delicias: candor est, & sine virtute, & sine pondere, continens humidis tractibus, quales Italia sunt & Gallia comata. Sed & trans Alpes in Allobrogum tantum Memoriarumque agro pertinax, in ceteris ibi paribus biennio in triticum transfit. Remedium vt grauissima quaque grana eius serantur.

Dioscorides duo duntaxat Tritici genera proponit: alterum recens, perfectè maturum, & colore luteo: alterum *ῥεωμύαλον*, id est Trimestre, quod ab aliquibus *ῥεωμύαλον* appellari dixit: hac voce etiam Trimestre significat. *Τῆρες* enim significat *ἐν τῷ δὲ τῷ ἔτει*, id est, hoc ipso anno, quod Dores *ῥεωμύαλον* dicunt, vnde *ῥεωμύαλον* *πυρρὸν* est, vt exponit Galenus, *ὅ ἐκ τῆς ῥεωμύαλης ὁ ῥεωμύαλος ὁ ῥεωμύαλος ὁ ῥεωμύαλος*, hoc est Triticum huius præsentis anni, nempe vere satum.

Prima & vtilissima, inquit Columella, sunt hominibus frumenta Triticum, & semen adorea. Tritici genera complura, ait Columella, cognouimus. Verùm ex his maximis ferendum est, quod Robus dicitur, quoniam & pondere, & nitore præstet. Secunda conditio est habenda siliginis, cuius species in pane præcipua pondere deficitur. Tertium erit *trimestre*, cuius vsus agricolis gratissimus. Nam vbi propter aquas aliâve causam matura satio est omissa, præsidium ab hoc petitur. Id genus est siliginis. Reliqua tritici species, nisi quos multiplex varietas frugum, & inanis delectat gloria, superuacua sunt. *Adorij* autem plerumque vidimus in vsu genera quatuor, Far, quod appellatur *Clusinum* candoris nitidi. Far, quod vocatur *Venticulum* rutilum, atque alterum candidum, sed vtrumque maioris ponderis, quàm clusinum. Semen trimestre, quod dicitur *Halicastrum*, idque pondere, & bonitate est præcipuum.

Spica, autore Varrone, quæ mutica non est, in tritico, & ordeo tria habet continentia. *Granium*,

glumam, *aristam*, & etiam primitus spica cum oritur *Vaginam*. *Granium* dictum, quod est intimum solidum. *Gluma*, qui est folliculus eius. *Arista*, quæ vt acus tenuis longa eminet è gluma. Proinde vt grani theca sit gluma, & apex arista. Arista & Granum omnibus ferè notum, gluma paucis. Itaque id apud Ennium solum scriptum scio esse in Euemeri libris versis, videtur vocabulum eymon habere à glubendo, quod eo folliculo deglubitur granum. Itaque eodem vocabulo appellantur fici eius, quam edimus, folliculum. Arista dicta, quod arescit prima; granum à gerendo, d enim feritur, vt spica gerat frumentum, non vt glumam, aut aristam gerat, vt Vitis feritur, non vt pampinum ferat, sed vnam. Spica autem quam rusticis, vt acceperunt antiquitus, vocant *specam*, *Specam* & à spe videtur nominata. Eam enim quod spectant fore ferunt. *Spica mutica* dicitur, quæ non habet aristam. Arista enim quasi cornua sunt spicarum quæ primitus cum oriuntur, neque planè apparent, in qua sublatent herba, ea vocatur vagina, vt qua latet conditus *gladius*. Illud autem summa in spicam matura, quod est minus quàm granum, vocatur *Frit*, quod in infima spica ad culmum stramenti summum, item minus quàm granum est, appellatur *Vtruncum*.

Hermolaus parum ex aliis, parum ex sua observatione hæc habet. Triticum & laruum & siluestre, cultu annorum tria miscet. Degenerare Triticum in Hordeum, ex eodè nque nasci pede vtrumque fabulosum existimatur à Theophrasto. Triticum multis integrit tunicis: eculmus altior quàm Hordeo: spica quoque remotior à folio, palea suauior, mollior, succosior: spica verò inconduæ explanatæque. Culmus spicam sustinet, quæ & spicus & spicum à Cicerone dicitur in Arato: spica, granum & Arista, quæ vt acus eminet è folliculo siue gluma. Sunt porò Arista partes in spica prima, quæ à Græcis *ανθηρες* dicuntur, & *ανθηρες*. Stipula sunt folia culmum ambientia: est autem culmus, idem quod & calamus. Quod minus est, quàm granum, vocatur *Frit*: quod verò ad culmum cacumina in firma spica geritur, minus item quàm granum, *Vtruncum* appellatur. In Tritico marcescente gurguliones gigni, vt etiam Cantharidem constat. Tritici multa discrimina: Sitanion vocatur, genus id Siliginis trimestre, frumentago dictum Theodoro, differens crassitudine furculorum. In nomine sunt *Assyrium*, *Aegyptium*, *Ponticum*, *Thracium*, *Siculum*, *Africum* quoddam facillè absoluitur folliculo: Thracium verò multas habet tunicas. Habetur & cachrys, siue canchrys, culmo crasso, quod etiam Africo tribuitur. Ponticum leuissimum, Siculum ponderosum, ponderosius Bæotium. Ponticum & Aegyptium sine Lolio nascuntur, item Siculum, præcipue Agrigentinum. Cum Siculo melampyron nasci perhibent alii, sed innoxium neque Lolii modo graue, caputve tentans. Nominatur & Alexandrinum, oblongo femise, quod fortasse idem cum Aegypto, & Calymno. Dracontias & Selenisium, & Stengias crasso cuncta calamo. Iam aliud trimestre, aliud bimestre. Sitanium idem esse video cum trimestri, satium Doricè vocatum, & Atticè titinon; quasi purum. In truculento Plauti Etanio pro Sitanio legitur mendosè. Euboicum intra diem quadragesimum à satù meritur, firmitate ac pondere præcipuum, non vt trimestri leuitas, ob id cibatio panis vtile: nam & furfuris parum habet, inuenturatum. Bimestria in Achiam è Sicilia primum veniè, parum fecunda, sed cibo facilis & lita

cunda. Olynti & in Eubœa apud Cerinthum genus effoditur terræ, quâ triticum oblinentes, quid seruant. Trimestria vbiq; sunt, verum inutilia, & infirma singulari calamo. In Asia quodam loco trans Bactra frumentum nucleis Oliuæ par nasci referunt. In Pissotis tam firmum, vt multos Macedonum largiore vlos eo saties peremerit. Omni frumento nocent imbres in flore. Item iam planè crassato, triticum plus quàm hordeum vlgine comœat in Lolium. Camatias in Thessalia Tritici genus est, quod admisso pecore nihil patitur, etiam bis derosum. Præter lupinum nihil aque in spica durat quàm Triticum.

Camatias
triticum
genus

Ruellius Ruellius qui suam historiam ex Theophrasto & Varrone, Columella & Plinio, Galeno & Hermolao congeffit, ait speciatim vnum apud Gallos tritissimum esse genus, macrum, triste, Hordei similitudine, cuius granum folliculo non faciliè deglobatur, nullis tamen aristis vallatum, quod Vere non feratur. Sermone vernaculo, *Succursus gentium*, siue *Surgeon* dici, cuius agricolis vsus propè nimius cùm annonæ premat penuria. Dicit adhuc, Trimestre, quod Græci Trimenon, vel Sitanium vocent, totis Alpibus notum esse, & hyem illius prouincias, nullum hoc lectius. Vnicalamum præterea Gillos *Mirtia* vocare, quod Martio satum tertio hinc mense maturescat.

Mirtia
Cordus

Cordi verba haudquaquam negligenda ducimus, præsertim quod videantur ad dicta Veterum intelligenda non nihil facere. Ea autem sunt hæc:

Robus Siligo

Semestris
Trimestris
Hyemale
Æstiuum

Sunt Tritici species, *Robus* & *Siligo*. *Robus* vocatur densius, solidius, & ponderosius. *Siligo* rarius, & leuius pondere: sed candidius Triticum. Est & alia Tritici distinctio: *Semestris* & *Trimestris*: illud ante hyemem, hoc verò initio Veris feritur, quare alterum *Winterweige*, id est hyemale Triticum: alterum *Sommerweige*, id est Æstiuum Triticum, Germani vocant. An verò idem sit *Robus* cum semestri, neque negare, neque affirmare auctemus. Credimus tamen, haud sine causa, non differre *Robum* à semestri, nam à Semestri non distinguunt id Auctores, neque Columella cùm species Tritici recenset, Semestris meminit, sed *Robi*, quasi idem cum eo crediderit & ipse. Quemadmodum quoque *Robus* *Siligini* præfertur pondere & magnitudine, ita etiam Semestris Trimestri, quod & Sitanium dicitur, & *Siliginis* species exstitit.

Triticum
Germania
triplex
Trige

Tragus triplex Germaniæ Tritici genus describit, quorum primum hybernum censet, alterum æstiuum dicit, tertium non vulgare, nec vbiq; notum scribit, de quibus separatim tractabimus. Constat, inquit, Triticum omnium frugum fertilissimum esse, siquidem culturâ suâ minimè destituitur. Legimus eni n, vno ex grano Tritici triginta aut quadraginta quandoque spicatos culmos exiisse. Sed hanc feracitatem terræ bonitati & culturæ diligenti ego adscripserim. Huc nimirum respexit Seruator noster Iesus Christus, cùm in parabola ad populum, sementem quæ in bonam terram cecidisset, aliam, quidem centuplum, aliam verò sexagecuplum, aliam denique trigecuplum fecisse fructum dicit. De Thracio Tritico Plinius peculiariter meminit, quod illud à latrone quadragesimo die maturetur. Sed hæc Plinius ipse non vidit, at potius legit in Veterum scriptis, tum aliorum, tum præsertim Theophrasti, qui lib. 9. Hist. plant. cap. 3. in Mela facta intra triginta, aut quadraginta dies meti scribit, rursus verò in Chalcia Rhodiorum Insula locum quandam esse aded præcoquem & fertilem: vt hor-

Feracitas
terra boni-
tatis cul-
tura ad-
scribenda

Plin. nat.

deum satium in eo, cùm in aliis fereretur locis, meteretur, &c. Hæc verò quæ tam à Plinio, quàm Theophrasto, prædicantur, credere, quàm experiri malumus. Nostrium certè Triticum hybernum, nouem mensibus in agris moratur, quod non solum omnes norunt agricolæ, sed & Plinius & Varro testati sunt. Aegypti septimo à latrone mense fruges suas horreis committunt, vnde frumenta illorum iurè Septimestria dici possent, at qui talis fertilitas nostro solo negata est. Idem de Sitanio quod nostri *Amelforn* nuncupant iudicium est. Hoc quia tertio postquam satum fuerat mense, horreis apud alias Nationes recondi fertur Trimestre Dioscoridi nominatur. Apud nos quinto demum mense maturatur, vt omnes norunt. Tanto intervallo fruges alio atque alio solo procreant inter se distant, vt vel hinc appareat, suum cuique frumento tempus in singulis regionibus deputatum, frugisque pro diuersitate terræ alio atque alio gaudere cœlo.

Fuchsius quoque tria summa genera Tritici eos obseruare dicit, qui frumentariz rei periti sint. Primum quod *Robus*, Germanis simpliciter *Weizen* nominetur. Secundum quod Trimestre & nonnullis Sitanium, Germanis *Amelforn* dicitur, haud dubiè non aliâ ratione, nisi quod ex hoc genere Tritici amyllum optimum conficiatur, Tertium, quod non vndiquaque notum. Atque alterum non differre à primo, nisi quod spicam multis aristis vallatam, & in duos versus dispositam obtineat. Sed consideratione dignum, an Triticum Setarium à primo differat tantum aristis: Montbelgard enim obseruo in agris nostris vulgare triticum spica mutica & aristis vallatum: si intelligit idem Triticum cum *Amelforn* Hier. Tragi, quod suspicor, is plurimum fallitur, hoc enim est ex genere Zeæ. Minus non separatur, nisi per Molendinum, de quo sub titulo Zeæ Verax.

Dodonæus triplex quoque Tritici genus tradit, *Robum* Columellæ, *Siliginem* Plinii, & *Setarium*, quod Trimestre vocant.

Triticum aliter ex Dalechampii sententia, qui sua Veteribus accomodare studet, Hist. Lugdunensis diuidit, vt eius duo summa sint genera vltè frequentiora. Vnum candidum, vulgò Gallis *Blé blanc* nuncupatum: alterum rufum, Veterum *meis*, quasi *meis*, vulgò *Blé rouge*, Columellæ *Robus* à flauo colore quem Rubrum primâ syllabâ productâ, & Rubrum Veteres appellauerunt, Græci *ῥαβδος*, vnde Seruio Nitedula, mus agrestis robeus, & in illud Vergilii, *Sanguineis frontem moris*, &c. Robeus color Diis attributus, & in Veteri inscriptione, vt Prator cui hæc regio sorti obuenerit, litaturum se sciat, aliâque quis magistratus, Volcanibus x. Cal. Septemb. omnibus annis, vitulo robeo, & verre. Rursus Tritici candidi rufisque duæ sunt Gallis notæ species. Vna cuius spica aristas habet, altera cuius spica mutica est, id est aristis caret, auctore Varrone. Priorem nulla peculiari appellatione Galli designant: posterio-rem *Blé meut* vocant, quasi Triticum muticum. Quod autem spica aristis vallata sit, vel iisdem careat, quidam frugis & naturæ proprietati, quidam agri conditioni macri, pinguis, tenuis, crassi, stercoreati, minimè lætificati tribuunt. Triticum enim candidum aiunt in pingui, crasso & stercoreo agro spicam muticam ferre, in macro, tenui, & non lætificato aristis horridam. Adiciunt quidam cœli statum quo leges adolefcit: humidior etenim spicam aristis carere, siccior aristis muniti. Addunt alii & ventorum status, quoniam si vehementior

hementiores ieruant, aristas decutiunt: si leniores spirauerint, aristas spicarum collisū non frangunt. Sunt & qui segetis densitatem raritatemque nonnihil ad id valere putant. Nam densiore segete, spicas muticas, rariore, cum aristis prodire. Ex candido Tritico panem lauiorem, quam ex rufo pistores fieri asserunt, sed leuiorem, & qui minus alat: atque in hoc genere muticum aristato præterunt, etiam si mutici granum gracilius sit, & minus: plus enim farina à mutico reddi, & futuris parum; farina verò minus ab aristato, & futuris plurimum. Præterea mutici farinam candidissimam esse, ac niueam, aristati nigriorem, ac sordidiorē. Candidum Triticum, Latinorum Siliginem frugem esse, Veterum scriptorum testimonio confirmari potest, qui Siliginem Tritici genus faciunt, &, vt Triticum nostrum candidum, candore ac leuitate cæteris generibus præstat literis prodiderunt.

Duo Tritici genera celebrauit Cornarius. Et prius quidem (quod Columella Robum) tum simpliciter weizen (Triticum) tum winterweizen (Triticum hyemale) posterius (quod Columella Trimestre, *trimestre* Diosc. Trimenon Plinius dicat, Aestuale) Sommerweizen vocat, sicut etiam reliqua frumenti genera iuxta seminationis rationem, winter & Sommergetreide (Hyemalia, & Aestualia frumenta, appellat. Potest, inquit, Setanum (Trimestre) Triticum horum dici, quum vere seminatum, æstate metatur: Columella Robum probat, quo Autore, nullum (sicut multi credunt) naturæ trimestre semen datur. Quod quidem Columellæ dictum reprehendit Plinius. Sed non videtur satis considerasse id, quod Columella subiungit, Sed sunt nihilominus quædam alius potiora, quæ sustinent veris tepores &c. Tertium Tritici genus ignotum & neglectum arbitrat, eò quod Columella dixerit, species eius in pane præcipue, pondere defici. Etrepetit cap. 9.

Nec nos tanquam optabilis fallat Siligo.

Tritico nihil est fertilius: hoc ei natura tribuit, quoniam eo maxime alat hominem: vepote cum medio, si sit aptum solum, quale in Byzacio Africa campo, centeni, quinquageni modii reddantur. Misit ex eo loco Diuo Augusto Procurator eius ex vno grano (vix credibile dictum) quadraginta paucis modis germina, extantque de ea re epistolæ. Misit & Neroni similiter cccxli. stipulas ex vno grano. Cum centesimo quidem & Leonitini Siciliae campi fundunt, aliique, & tota Boetica & imprimis Aegyptus. Fertilissima Tritici genera, ramosum, aut quod centigranum vocant. Cæterum, ob summam Tritici in Asia fertilitatem, Imperatores Romani, attestante Vrsino, qui ei Provinciæ præfuerant, aut in ea res gesserant, Africam signabant capite obuoluto pelle elephantis capiti detracta cum promulge, adiecta spica & subdito aratro cum cultro. Sed & ea soli fertilitas Siculos ad omne delictiarum genus se effudit, vt omnibus voluaptatum generibus præter modum addicti forent ac dissoluti. Hinc Platoni Siculæ mensæ, vt & Italica, & Thesalæ, lautissimæ ac maxime opipare, quemadmodum & Asiæ. Macrobi. 7. Saturnal. Modum cum seruat, qui sui potens est, & in mensa Sicula, vel Asiæ. Brod. c. 33. lib. 5.

Græcis *trige* vocatur, quasi *trige*, pro *trige*, *trige* *trige*, secundum Etymologicum. Hebræis *Chitab*, vel *Chimab*, Columellæ *Robus*, si Trago credimus. Arab. *henta*, *henta*, *hanta*. Gerin. *weizen* / Alfatia, Born. Belg. *Jerwe*. Angl. *wet*.

Tom. II.

Ital. *Fourmento* & *Grano*. Hsp. *Trigo*, Gallis generis vocabulum speciei tribuentibus, *Froument*, voce ex frumento Latino deflectâ. Sed frumentum apud Latinos Tritico latius patet. Hinc plerique etiam *far* frumentum appellant. Høng. dicitur *Buze*, Boh. *pšeuice*. Significat verò Triticum generaliter omne frumentum quod ex spicis tritum, ac trituratione repurgatum est: in quo significato, ait Dodonaus, Iurisconsultus nonnunquam hac voce vitur, vt si de verb. obligat. propriè tamen idem cum eo est, quod Græcis *trige* est.

Solo pluuio atque frigido semina conueniunt ad Tritici sicut & cæterorum frumentorum fructificationem, quod aperta & rara substantia sunt: soluta enim hæc sunt. Verum (vt simplicius agam inquit Theophr. de caus. plant. lib. 3. cap. 26.)

Solum pingue Tritico accommodatius est, largius enim callosiusque alimentum expolcit. Triticum trimestre solo tenui melius fit. Alimentum enim subministrati modicum eo potest, hoc est leue leui. Aficum & Dracontias appellatum, & Strangias, & Selenisium, letum exgunt agtum. Hæc enim vberius succos hauriunt. Argumento calamus est, quem crassum gerunt. Ad summam, quodcumque huiusmodi sit, solo frigidi apte committitur. At si aliquod genus tunicis multis contegitur, ceu Thracium, hoc solo hyberno conuenientius dabitur, frigus enim huic nihil efficere potest. Rarum, solumque, ceu Canchrydias vocitarum, agro pluuio seferendum profectò est, quippe cum alimenti capiam id quoque desideret: quamobrem & culmo crasso exurgit. Et in cæteris verò semper ad alimentum referenda ratio est: nunquam tamen ratione aeris prætermisâ, etenim solum apicum & ad summam ferenum, infirmioribus commodius est: contrarium validioribus, lutosum fideis & patuo alimento contentis. Sic Triticum solo pluuio vberius quam hordeum geritur, & omnino contra imbres validius est: fert idem etiam solo non stercoreato copiosius. Ratio, quod suo naturali colore plenius concoqueret possit, & si num non æquæ requirat, quoniam in se habeat quod ex fimo acquireret. Ad summam, Triticum robustius est, & maturius feritur, & locis frigidis magis committitur. Robur autem facere, caloris planè interest naturalis. Quin & quod tunicis inuolutum pluribus sit, sit vt tutius maneat: quapropter solum, quod longo interuallo temporis colitur, Triticum magis quam hordeum fert, Triticum enim alimentum eius soli validius magis vincere potest. Omnino [vt simplici ratione dicam] publicæ ac summæ differentiæ illæ sunt, ægri natura, seminum firmitas, infirmitasve, atque aeris habitus: qua de causa hæc considerari vbi que necessarium. Frigora subiecta omnibus in locis vtilia sunt: sic enim fata plenius radicanter, canchrificanturque ita, vt ineunte vere haudquaquam modica magnitudine careant, sed præcipue in bonis. Austinum enim atque omnino serenum tempus celeriter edit, æruginemque fortificat. Quæ densè fuerint seminata, spicam prius effundunt, quam quæ rariore, quod altera largius radicanter, & multiplicius deorsum scindantur, quia locus superat, altera protinus sursum excurrant. Tritico atque reliquis, quæ spica pusilla, infirmæque sunt, anceps satio datur. Sunt enim in singulis generibus alia præcoccia, alia serotina. Quamobrem alia properant, alia differunt. Triticum etiam quod hyeme feritur, quia numerosa radice sit, viresque suas ad leu-

Locus, p. pus, satio, cultura, & id genus alia.

dicendum primum intendat, multitudinem culmi educit, est enim multicalamum: trimestre contra paucis radicibus, paucisque culmis consistit, quae de causa sursum continuò nititur, atque celeriter consummatur: quod enim minus est, perfici facilius potest. Hinc etiam alterum largè fructificat, alterum parcè: & alterum faciliè, alterum graue est. [vt antè iam diximus] cum plus alimenti, & turbulentius trahat. Excursus quoque ratione properè agitur, cum in condendis radicibus haud multum teratur temporis, vbi pote paucis. Qualitas quoque temporis plurimum fauet, nam & radicofum illud, si eo tempore oberatur, velocius enascetur, & in culmos spargetur pauciores, & spicam paruum, atque paucis fertilem geret: & trimestre, si maturè seratur, frigus tolerare non poterit suae causae imbecillitatis. Sed mirum, atque diuersum eueniet, si quod tempore breviori conficitur, graue, fastidiosumque sit: vt Aenenses de eo referunt, cuius cura æquinoctio delegata est.

Catonis apud Plinium sententia est, in agro sicco & non herbofo, nec umbrato Triticum seri. Non transferendum est ex frigidis locis semen in calida, neque ex praecocibus in serotina: idque in contrarium præceptum quidam falsè diligentia. Serere in iugera temperati soli istum est Tritici aut Siliginis modios quinque. Farris aut Seminis (quod frumenti genus Plinius ita appellat) decem. Et alia distinctio. In denso, aut cretoso, aut vliginoso solo, Tritici aut Siliginis modios sex: in soluta terra nuda, & sicca, & leuata, quatuor. Macies enim solimior, nisi rarum culmum habeat, spicam minutam facit & inanem. Pingua arua ex vna feminis radice fruticem numerofum fundunt, densamque segetem è raro semine emittunt. Ergo inter quatuor & sex modios pro natura soli, alii quinque non minus feri, plurisue præcipiunt: item in confito, aut cliuoso, vt in macro. Huc pertinet oraculum illud magnopere custodiendū, segetem ne defruges. Adiecit iis Accius in Praxitico, vt fereretur, cum Luna esset in Ariete, Geminis, Leone, Libra, Aquario. Zoroastres Sole xii. partes Scorpionis transgresso, cum esset in Tauro. Sequitur huc delata & maximè indigens cura de tempore fruges ferendi quæstio, magnaque ex parte ratione siderum cōnexa. Quam obrem sententias omnium, in primis ad inperientes, exponemus. Hesiodus, qui princeps omnium de agricultura præcepit, vnum tempus ferendi tradidit à Vergiliarum occasu. Scribebat enim in Boeotia Helladis, vbi ita feri diximus. Inter diligentissimos conuenit, vt in altum quadrupedumque genitura, esse quosdam ad conceptum impetus & terræ. Hos Græci ita definiunt, cum sit calida & humida. Virgilius Triticum & far è Vergiliarum occasu feri iubet: Quo fit, vt horum siderum aliorumque exortus & occasus digerendi sint in suos dies. Sunt qui & ante Vergiliarum occasum feri iubeant, duntaxat in arida terra, calidique prouinciis. Custodiri enim semen corrupte humore, & à proximo umbre vno die erumpere. Alii statim ab occasu Vergiliarum sequi imbrès, à septimo ferè die. Aliqui in frigidis ab æquinoctio Autumni in calidis feris, ne ante hyemem varent. Inter omnes autem conuenit circumscribere, ferendum non esse magno argumentum, si hyberna femina, cum ante brumam sunt M.] septimo die erumpant: si autem vix xl. Sunt qui properent, atque in æquinoctio ferant. Ex contrariis aliis, vel vire potius se-

rendum, quam male in Autumno. Atque vbi fuerit necesse, inter Faonium [Spirare is incipit circa 7. aut 8. Februarii. Lugdunenses vocant, Le vent sueller, quod arborum folia eliciat.] & vernum æquinoctium. Quidam omiffa celestis cura, vt inuultu, temporibus definiunt. In Græcia & Asia frumenta omnia Vergiliarum occasu feruntur. Quædam autem vtroque tempore in Italia. Ex his quædam & tertio, Veris scilicet: Varro qualiter nouenis diebus fruges abolui tradit, & mense nono meti. Frumenta cum defloruere, crassefcunt, maturanturque. In Aegypto septimo à fatu mense frumenta metuntur.

Triticum erumpit die plurimum septimo, crassefcit autem, inquit Theophrast. maturaturque intra quadragessimum, quam tardissimè octauo ab fatu mense plurimè parte metatur, Aegyptiis, vt aiunt, septimo. Varro quindecim diebus in vaginis esse dicit, quindecim florere, & quindecim arescere. Triticum pergit Plinius, quo ferius metitur, copiosius inuenitur: quo celerius verò, hoc speciosius ac robustius. Lex aptissima, antequam grauum indurefcant, & cum iam traxerit colorem. Oraculum verò biduè celerius melle facere potius, quam biduè ferius. Siliginis & Tritici etià ratio in area horreòque. Far quia difficulter excutitur, conuenit cum palea sua condi: & stipula tantum, & arstis liberatur.

Sed de mutatione Tritici in formam alienigenam, in Lolium, & vice versa, & ex semine in Autumnam, mirandum sane est. Aqua Tritico florenti obest. Vermem maximè etiam sentit in radice, ea nimirum humefacta. Euenit verò vt Triticum bestiolas ita gignat, quia dulcius est: quæ de causa palea quoque huius suauior. Vermis generatus in eo, vbi alimentum assumpsit, quod in culmo est, spicam aggreditur, & vel totam erodit, vel alteram partem.

Ærugo, quamuis frumentorum commune vitium sit, tamen magis infestat Triticum, quod tunicis integitur pluribus, & folium spica gerit proximum, vnde frugem suam effundit: residet enim in eo humor putrefactus, qui euginem creat. Adde quod spicam gerat erectam, densioremque. hinc enim humor minis potest defluere: quæ de causa spicam aliquantulum inclinari melius est.

Triticum perit ex nimio stercore, si non imbrès secuti sunt. Quocirca Solo pluuio, crebra & largior sterco ratio commodior est. Siticulosius atque gracilibus modica prodest. Hyeme sicca & suda, Vere pluuiofo & humido secundam segetem esse monitrat hoc carmen veteris Poetæ apud Festum.

Hyberno puluere, Verno lupo, grandia farræ Camille metes.

Expressit & Virgilius hanc sententiam his versibus,

Hyberno latissima puluere farræ,
Larus ager, nullo tantum se Massia cultu
lustrat, & ipsa suas mirantur Gargara menses.

Triticum non penitus exsiccati patitur, quod ad reddendam farinam melius minus arefactum putatur. Quæ de causa in aceruos componi affolet: ferè videtur enim in aceruo crassefcere potius, quam attenuari. Triticum puluerulentum putrescit celerius: & quod in domiciliis opere testorio leuigatis conditum: quoniam id caloris plus sentiat, Pulvis enim calidus est, vt pote siccus, vt illimentum calcis calorem susceptum vtiq; feruat. Nam & cum vniuersum, altumque aceruatum est, patet: sic enim plus caloris exoritur. Triticum & hordeum & leguminibus durat, quia calidius est.

Tritici in
singulis in-
geribus
quantum
serendum.

est, & tunicis pluribus tegitur. Triticum in spica nondum messum durare maximè potest. Conne-
xia est ratio, ut nobis, autor est Plinius, frumenti
feruandi. Horrea operosa tripedalī crassitudine,
pariete lateritio, exadificari iubent aliqui. Præ-
terea supernè impleri, nec afflatus admittere, aut
fenestras habere villas. Alii ab exortu tantum æ-
stiuo, aut Septentrione, eaque sine calce construi,
quoniam sit frumento inimicissima. Alibi contra
suspendunt granaria lignea columnis, & persilari
vndique malunt, atque etiam a fundo. Alii omni-
no pendente tabulato extenuari granum arbi-
trantur: & si tegulis subiaceat conferuere. Mul-
ti ventilari quoque vetant. Curculionem enim
non descendere infra quatuor digitos, nec am-
plius periclitari. Columella & Fauonium ven-
tum confere frumento præcipit: quod miror e-
quidem, sicissimum aliqui [sicissimum Vet. sic-
cissimum locum quærenti Dal.] Sunt qui rubeta
rana in lumine horrei pede è longioribus suspen-
sa, inuehere iubent. Nobis referre plurimam
tempestiuitas condendi videbitur. Nam si parum
tostum atque robustum collectum sit, aut cali-
dum conditum: inimica in nasci necesse est. Diu-
rperitatis causæ plures. Aut in ipsius grani co-
rio, cum est numerosus, aut succi pinguedine,
qui pro humore sufficit tantum, aut amaritudine.
In tatico maximè crescunt animalia, quoniam
spissitate sua concalescit, & fursure crasso vestitur.
Quidam ipsi in Triticum diuinitatis gratia as-
pergunt amurca, mille modios quadrantalī. Alii
Chalcidica, aut Carica Creta, aut etiam Ablyn-
thio. Est & Olynthi, ac Cerinthy Euboeæ terra,
quæ corrupti non sinat. Nec ferè condita in spi-
ca leduntur. Vilissimè tamen seruantur in sero-
bis, quos siros vocant, ut in Cappadocia, & in
Thracia. In Hispania & Africa, ante omnia ut sic-
co solo fiant curant: mox ut paleâ subternatur.
Præterea cum spica sua conduntur [condantur
Dal.] ita frumenta, si nullus spiritus penetret, cer-
tum est nihil maleficum nasci. Varro autor est,
sic conditum Triticum durare annis quinquagin-
ta.

Horreum locūve Triticū destinatus, aqua salsa
ante omnia conspergitur, scopisque optimè ex-
terius liccat, sic enim Triticū conseruationi ma-
gis est idoneus, Octobri repositum Ianuario a-
gitetur nouilunio. Idem fiat mense Martio ter-
tibus postremis septimanis. Aprili quoque, sed
semel tantum in nouilunio. Toto Maio intactum
relinquatur. Sequentibus verò mēribus reli-
quis singulis semel tantum, idque sicut antea in
Nouilunio & Sole feruente ventiletur. Quod si
fortè vermiculi & gurguliones generantur, asper-
so sale, betulaeque scoparum furculis ficcis im-
positus arcebis: sic frumentum ab horreorum stipa-
toribus atque æconomis celebris Monasterii
Massouensis in Sunchouia frumenti feracissima
in pluris annos conseruari solet. Cum versare-
mur in Ducatu VVitembergensi in pago Wolff-
schlügen Nürtingensis præfatur: hoc literis
mandatum inuenimus. Anno 1590. Maiū mensis
25. die, tam sæua, violentaque tempestas coorta
est cum horribili procella ventorumque turbine,
& tremenda nubis fecundissimæ rupturæ, nim-
borumque effusione, tanquam grandine, ut cul-
mos frumentacos in æquis ferè omnes grandine
comminuerit humi que strauerit. Interea tamen
clementissimus Deus suâ illa paternâ benedictio-
ne rursum de æter affuit, ut frumentacei culmi ab
ima vique radice, maiori quàm prius, cum ari-
stæ copia, nullaque interueniente fatone, de

Tom. II.

nouo progeminauerit, tantoque vberior suc-
cessit frugum prouentus, quantò maior calami-
tas agros prius attegerat, agros enim nouales,
requietolue planè prius se ferre videbantur. Hanc
igitur tempestatem tanta messis subsequuta fuit,
ut post nouenas septimanas tam diu grandini
succedentes, optimas fruges in horrea coegerint,
idque non illic solū, sed aliis passim in locis
pluribus illius tractus aruis contigisse certum est.

Optima porò è Triticici generibus ad secundæ
valetudinis vsum habentur, inquit Dioscorides,
quæ recentia & perfectè adulta colorem luteum
referunt: hæc sequuntur trimestria, quæ non-
nullis Sicilia nominantur. Itaque cruda illa in
cibo sumpta teretes lumbricos gignunt: com-
manducata verò & imposita commoritur à rabio-
sæ cane auxiliatur. Confectus eorum similagine
panis plenius alit, quàm cibarius: qui verò sit è
trimestrium farina, leuius alimentum præstat, fa-
cilèque in membra digeritur. Farina eorum cum
Hyoisiam succi, cataplasmatis instat imponitur
aduersus neruorum fluxiones & intestinorum
inflationes: lentigines autem ex aceto mulso
tollit. Furfures in aceto decocti [vulg. exem-
plemittuntur] & calentes adhibiti lepras re-
mouent, suntque contra omnem incipientem
inflammationem vtile & accommodatum cati-
plasma. Cocti verò cum Ruta decocto luxuriar-
tes turgentelæve mammas [αγαυήντας Vet. codex
teste Lacuna habet] compescunt, &
morsus à vipera, torminosique conueniunt. Far-
inaceum fermentum, calfacien h extrahendique
vi præditum, priuatum callos in plantis pedum
extenuat, & tum alia tubercula, tum etiam fu-
runculos ex sale maturat atque aperit. Porò è
Sita tio Triticio farina, contra venenatorum ictus
ex ætæto aut vino commodè imponitur. In glu-
tini verò modum decocta si delingatur sangui-
nem reicientibus [αἱμακτονόως Vet. αἱμακτονόως] o-
pitulatur. Contra tussim & exasperatam arteriam
cum Menta & Butyro decocta efficax est. Ipsius
autem Triticii pollen si ex aqua multa aut hydre-
leo decoquatur, omnem discutit inflammatio-
nem. Sed & panis tum crudus, tum etiam coctus
ex aqua multa impositus, inflammationem om-
nem demulcet: quippe qui plurimum emolliat &
quadantenus refrigeret, maximè verò si herbis,
aut uve quibusdam ad id accommodatis immi-
sceatur. Vetus autem panis & aridus tum per se,
tum quibusdam admixtus, alui profluvia sistit.
Recens verò muria maceratus & impositus, li-
chenas inueteratos sanat. At glucen [αἰνία δὲ,
&c.] Hæc verba ad capitis vique calcem non le-
guntur in altero codice manuscripto. Goup.] quod
è Similagine aut polline [ἡ ὑψηλὴ, vulg. ἡ ὑψηλὴ]
conficitur ad glutinandos libros, sanguinem rei-
cientibus prodest, si liquidius ac tepidum co-
chlearis mensura sorbendum exhibeatur. Cate-
rum, quæ in molendo crassior sit ex Zea & Trito-
is farina, ex qua puls fit, Crimnon [κρίνον] ap-
pellatur. Abundè autem nutrit & facile confi-
ditur. Quæ verò ex Zea maximè prius tosta sit,
alium magis adtingit.

Amylum autem appellatum ab eo est, quod si-
ne mola fiat. Optimum quod è trimestri paratur
Triticio, natione Cæcicum aut Aegyptiacum.
Conficitur verò ex Triticio eiusmodi puro quin-
quies die, ac si fieri potest, etiam nocte, aquâ per-
fuso: atque vbi emollitum fuerit, tenlim aquam
citra agitationem effundi oportet, ut ne simul
vtilior succus excludatur. At vbi mollissimum e-
ualisse constitit, diffusâ aquâ pedibus calcari

Vitis.

Nova.

Morsus canis rabidi.
Panis.Farina.
Neruorum fluxiones.
Lentigines.Furfures.
Lepra.

Mamma turgentis.

Furunculi.

Haemorrhoides.
Tussis.Pollen.
Inflammationes.Profluvia alui.
Lichenæ.

Crimmon.

Amylum.

opporret: deindeque infusa alia teri. Tandem in-
natantes fustores necesse est collendi: reliquum
verd' colo transigendum, mixque vt excolatum
fuerit super tegulis notis ardentissimo sub Sole
ficari densiusque oportet. Namque si paulisper
vdim manserit, acelcit. Porro contra oculorum
fluxiones, caſa vlcera, & pustulas efficac est. San-
guinis etiamnum reiectores potius cohibet, & ex-
asperitas fauces lenit: lacti quoque & obsoniis
admiscetur. Paratur & Amylum ex Zea macera-
ta etotaque ad vnum aut alterum diem, & malle
tutice in modum manibus sabacta, tandemque
seruentissimo in Sole, vti dictum est, exiccata. Sed
huiusmodi Amylum ad vnum medicum ineptum
est: ad reliqua verd' idoneum.

De Tritici, eiusque farina, itemque panis & pa-
lez atque Amyli [iuxta veteris codicis quidem
lectionem] vsu passim hac Plinius lib. 22. cap. 25.
Siliginis grana combusta & trita in vino ammi-
neo, oculis illita epiphoras sedant: tritici verd' ser-
ro [ea indurata conficitur oleum e Tritico a me-
dicamentariis] combusta iis, quae frigus viderit,
praesentaneo sunt remedio. Farina Tritici ex ace-
to cocta neuorum contractionibus, cum rosaceo
verd' [rosa verd' Dalechamp.] & fico sicca myx-
is, decoctis suffructis totillius gargarizatione pro-
sunt. Sextus Pompeius Pratorii viri pater, Hi-
spaniae citerioris princeps, cum horreis suis venti-
landis praesideret, correptus dolore Podagrae,
mersit in Triticum sese super genua: leuatiſque
siccatibus pedibus mirabilem in modum, hoc po-
stea remedio vsus est. Vis tanta est, vrcados ple-
nos faciet, (Acerus Tritici defolios & sepultos:
qua astuti rusticos Triticum furati solitos Gal-
scribit cap. 4. de Nat. fac.) Paleam quoque Tri-
tici calidam imponi rancum in commodis experi-
ti iubent, quaque decoctae sunt aqua foueri. Zea,
ex qua alicam fieri diximus, efficacior etiam hor-
deacea videtur, trimestris mollior. Ex vino rubro
ad Scorpionum ictus tepida, & sanguinem ex-
creantibus: item arteriae. Tussi cum caprino se-
ro aut butyro. Amylon hel etat oculos, & gulae
inutile, contra quam creditur. Item sistit aluium,
epiphoras oculorum inhibet. & hucera sanati ite
pustulas & fluxiones sanguinis. Genas duras e-
molliit. Datur cum Opio, his qui sanguinem re-
ieciunt. In vesicae verd' dolore semina Amyli
cum ouo & passillis onis luffernae facta, a bal-
neo. Panis [panis facultates attigit Dioscor. lib.
2. cap. 107.] hiciple, quo viuunt, innumeras pen-
e continet medicinas. Ex aqua & oleo aut ro-
saceo mollit collectiones: ex aqua multa durtias
valde mitigat. Datur & ex vino ad discutien-
da quae praesturgi opus sit, & si magis etiamnum,
ex aceto, aduersus acutas pituitae fluxiones, quas
Graeci rheumatismos vocant, item ad percussas, lu-
xatas. Ad omnia autem haec fermentatus (non
quidem fermentatus n [Zizitum] autopyron dici
vult Plinius: sed *zizitum* id est confectum e fi-
rina minime castrata, simul & fermentatum ad ea
remedia commendat) qui vocatur autopyros, vi-
lior. Illinitur & paronychia, & callo pedum in
aceto. Vetus aut hanticus panis (Ammianus Mar-
cell. ad vsus diuturnitatem excoctum vocat buc-
cellatum. Brod. cap. 11. 4. vauitibi Egypt. Lucianus) tu-
sus atque iterum coctus, sistit aluium. Vocis flu-
diosos [aut quardos], aut eos qui clorans vocem
tutodire volunt, ne aspera & rauca fiat: aut
quardos, qui canoram, suauem, plenam, lenem
vocem suis modulationibus adhibere maxime ni-
tuntur & studet] & contra distillationes, siccam
esse primo cibo, vtilissimum est. Sitanus

(hoc est e trimestri) incussa in facie, aut
desquamata cum melle atpissimè curat. Candi-
dus agris, aqua calida frigidanae madefactus, leuif-
simum cibum [intritum panis vocat Celsus lib. 1.]
praebet. Oculorum tumori ex vino imponitur. Si
& pustulis capitis aut adiecta arida myrto. Tre-
mulus panem ex aqua esse ieiunis statim a balneis
demonstrat. Quin & grauitatem odorum in cu-
biculari vitus emendat, & vini, in saccos additus.
Pistura verd' non omnibus facilis: quippe & He-
teritia spiritam farris tosti pisente pilo pre-
ferrato, fistula serrata, & stellata intus denticulata,
vt nisi intenti pisent, concidantur grana, ferròque
frangantur. Maior pars Italica ruidio vitur pilo,
rotis etiam quas aqua verset obiter, & molat. De
ipla ratione pilèdi [pinendi] Magonis propone-
tur sententia. Triticum ante perfundi aqua mul-
ta iubet, postea eualli [vel vt alii legunt euallari,
vallo suo eiici, ac excludi, deglubi, gluma corti-
cèque suo spoliari] deinde Sole siccatum pilo re-
peti.

Lib. 13. cap. 7. explicat sententias Dioscoridis de
Amyli, his verbis: Amylum fit ex omni Tritico
ac Siligine, sed optimum e trimestri. Inuentio
eius Chio insule debetur: & hodie laudatissimum,
inde est appellatum ab eo quod sine mola fiat.
Proximum e trimestri quodam minime pondero-
so tritico. Madescit dulci aqua ligneis vasis, ita
vt integatur [intingatur CH.] quinquies in die
mutata. Melius si e noctu, ita vt misceatur pa-
riter emollitum, prius quam aceſcat. Linteo aut
sportis siccatum tegulae infunditur illius fermen-
to, atque ita in Sole densatur. Post Chium maxi-
me laudatur Creticum, mox Aegyptium. Probat-
ur autem leuitate ac laetore, atque vt recens sit,
iam & Catoni dictum.

Palearum quibus plures Gentium pro ſeno v-
tuntur eodem Plinio lib. 18. cap. 30. teste, pessima
ex Tritico praterquam iumentis opere laboran-
tibus, Culmum saxosis locis, cum inaruit, baculo
frangunt substratu animalium. Si Paleae defecit, &
culmus teritur. Ratio haec, maturis defecit, mu-
ra diu resperſus, dehinc siccatus in manipulos co-
uoluitur, atque ita pro ſeno bubus datur. Sur e
qui accendant in aruo & stipulas magno Virgilii
praeconio:

[Saep' etiam steriles incendere profuit agros

Aeg' leuem stipulam crepitantibus urere flammis.]

Summa autem eius ratio, vt herbarum semen
exuriant.

Galenus auctor est Triticum vt medicamen-
tum fons impositum primi esse ordinis exalta-
cientium, tamen nec reficere, (Plin. Sexti Pomp.
historia Triticum siccare ostendit) nec humecta-
re manifestè posse habere verd' etiam quiddam
legoris, obstruentisque naturae. Porro, quod ex
eo coſhicitur Amylum, eo tum frigidum esse, tum
siccus. Quod verd' ex pane fit cataplasma, vim
habere magis digerentem, quam quod ex Tri-
tico nimirum cum & Salemi & fermentum panis
admixta habeat, quippe cum fermentum
vix habeat arte heri digerendi quae qua
in alto resident. Glutino tandem, quod ex Simi-
legine & polle Tritici fit, idem Galenus meatus
obducendi ac cercoquendi vim attribuit, qui-
buletur quae partibus impositum fuerit. Ast con-
siderandum an Amylum, sicciſ sit Tritico, & an
non potius humidus: quindòquidem cortex &
fufur ab eo separatim, quod videtur sicciſ fari-
na. Praeterea perpendendum an Amylo ex ma-
ceratione in aqua non imprimatur humiditas. Ve-
rò Solis calore ea imprecia & acquirat humidi-
tas,

Siliginis
grana.

Triticea
farina usitata

Tritici pa-
lea.

Amylon.

Genas duras

Rheuma.

Paronychia
Callus pe-
dum

tas, fortè quæ etiam naturalis resoluatur, & eâ ratione siccus redditur. De quinque autem panis ex Tritico generibus, Galenus purissimum dicit esse Silignitena, id est, siligneum. Et hoc est quod etiam Plinius dicit, E Siligine lautissimus panis, pistinarumque opera laudatissima. Deinde semidaliten, id est, similagineum, ex Similagine Tritici farina. Et mox distinguit vocabula, semidalim quidem Græcam vocem esse asserens, Siliginem verò non item. Nimirum hanc Græcos à Latinis accepisse, sicut Semidalim à Græcis acceptam Latini in Similaginem conuerterunt. Maxime igitur, inquit, nutrit Siligneus. Deinde Similagineus. Tertius est medius, syncomistos & Autopyrus appellatus, cui nihil furfurum decessit, sed ex toto Tritico constat. Quartus est fordidus, magna ex parte è furture conitans. Et postremus omnium furfuraceus totus.

Farina crassior ex Zea & Tritico Germanis nota est, inquit Cornarius, & ex ea pultem faciunt modò crassiorem, modò tenuiorem, ut forberi possit. Vnde Galenus dixit *καλίστην ὃ τὸ ἐξ αὐτοῦ πορρῆται, πέλκτω*. Vocant autem nostri Græsimel, eò quòd arenæ speciem refert. Idem Galenus crassam Triticeæ, & ex Zea farina partem, Crimon esse dixit, & magis quàm polentam nutrit, sed ægrius concoquit. Vnde videri possit in Dioscoride legendum esse, non *ἐξ αὐτοῦ*, quod faciliè conficietur reddidit, sed *ἀπὸ τῆς πορρῆται*, ut accipiamus quæ non concoquuntur. Sed graue hoc malum esset, & priuatiua particula non respondet ei quæ difficultatem significat. Itaque recta est *ἀπὸ τῆς πορρῆται* vocis lectio: & Galeno *ἀπὸ τῆς πορρῆται* vox comparatione ad Polentam dicta est. Apud Hippocratem sapè habetur, *τὸ ἀπὸ τῆς πορρῆται ὁ δὲ καὶ τῆς πορρῆται*, & aliquando simpliciter *τὸ ἀπὸ τῆς πορρῆται*, ut cremor farinæ crasse accipiendus videatur. A veteris codicis de Amylo lectione Pliniana, vulgata sic enariatur, *Datur cum ouis his qui sanguinem reiecerint*: Sed Opium, ut quod concoquat, & dolorem eximat, aptius videtur legendum. Deinde tribus ouis, mensura passis significatur, quod accipiendum est, quantum trium ouorum euacuatæ testæ capiunt, ut hoc cum ouo & Amyli semenciâ feruet factum, à balneo sumatur. Potest tamen fieri ut cyathis vox decuratur scripta cyperit, & ita pro vera lectione, passis cy. tribus: falsa supposita sit, passis tribus. Amylum nostri partim corrupta Græca voce Amydum vocant: partim Brassimel & Sterese, quod in femininarum vsu peptis inducunt, ea & inalbet, & firmet.

Cur Triticum homini in cibo facilius sit, quàm ceteris animalibus quauquam validioribus, quorum multa eo satiata intereunt, docet Theophr. de caus. plant. cap. 10. lib. 4. quæ huc transcribere nimis longum est, & præter institutum. De Tritici præparatione ad faciendum vinum, itæmq; Aquam vitæ, consules alios. Nos in Alfaria sèpius bibimus vinum, quod solent cum Tritico parare, ac *εἰς τὸν οἶνον* vocant: Mustum autem iniecto paucò tritico decoquunt aliquandiu, inderemânet vinum dulce & generosum ad maluiticum accedens, quod præstantius aiunt secundo anno.

TRITICVM VVLGARE, GLVMAS TRITVRANDO DEPONENS.

Vulgare Triticum culmos habet proceros, trium cubitorum altiores, ex radice capil-

lata ortos, foliis graminæis donatos: spicam verò in summo culmo palmarem circiter, muticam aut



breuitas admodum aristatum rudimentis donatam, ac etiam longis, in qua granâ fluctuantia, turgidula, oblonga, sulcata, superiore parte hirsuta, triplici glumarum, quas tribulorum verberare deponit, vallo clausa, ita ut gibbus duabus, sulcus vna muniat.

Fuchsi.

Considerandum an Tritici alterum genus, Setarium Fuchsi dictum, à primo Robo sc. [ita vulgare vocat] non differat, nisi spicâ multis aristis vallata, & in duos versus dispositâ. Ego, ut antè monui, obseruaui Montbelgardi in agris vulgare Triticum spica mutica & aristis vallatum: si intelligit idem Triticum cum Amelforni Hier. Tragi, plurimum fallitur. Hoc enim est ex genere Zeæ vernæ.

Triticum Brunfels. in 4. Gesn. hort. & de coll. Cord. in hist. Dod. [qui Triticum dicit spicam vltimum muticam habere, interdum tamen aristis cinctam] & Tab. siue Robus, Colum. & Dod. Gall. Tritici primum genus Trago, Fuchsi & Lon. Triticum spicâ muticâ Hist. Lugd. & Ger. Triticum aristis carens Cæf. Triticum i. siue hybernium aristis carens C. Bauh. pin. cui videtur Siligo Veterum; quam Plinius Tritici delicias vocauit. Siligo spicâ muticâ Eob. Obs. pag. 14. Icon. plant. p. 25.

Synonyma

Prouenit in omnibus ferè habitati ac culti Orbis regionibus, à quibus & complura eius notantur genera, cognominâ ab ipsis natalibus sortita, quæ colore, magnitudine, specie & proprietate inter se differunt: testis Theophrastus. Latum autem pingueque solum Triticum postulat, idque magis apicum & siccum; quàm riguum. In siccò enim, ut Columella refert, melius coalescit: in humido vero ac viginoso degenerat, & post tertiam sationem in Siliginem; hoc est, lanius & candidius Triticum conuertitur: quæ tamen & rursus in Robum, id est, præstantius Triticum biennio transit, si in conueniens solum translata, grauiissima eius grana serantur: author Plinius. Seritur frequentiùs Autumno: interdum Vere, Autumno satum per hyemem in herba est, & plunibus culmis attollitur, & frequentioribus radicibus firmatur. Altiùs mensibus vtrumque ad maturitatem peruenit, Dodonæo referente.

Locus

Degeneratio.

Fuchsi passim prouenit Triticum primi & secundi generis: floret Iunio mense: in Iulio autem metitur.

TRITICVM CVM MVLTIPlici SPICA GLVMAS FACILÈ DEPONENS.

Radice fibrosâ, culmum geniculatum, foliaque eum vulgaris vsus Tritico habet com-

Descriptio



Blé qui truche.

russicis *Blé qui truche* appellatum, ob spicâ sc. eius in alias fissam, pluresque minores adnatas veluti ramos spargentem: *trucher* enim in ramos diuidi Lugdunenses Coloni dicunt: Triticum ramosum, Centigranum vocatum & Triticum fertilissimum Plinio.

Synonyma: Casp. Bauhin. pin. Triticum 4. siue spicâ multiplici: Triticum ramosum Plinii, spicâ ramosa Cæsalp. Triticum 5. species, & *Gran del graspo*, i. e. frumentum racemosum Angullaræ: Triticum multiplici spicâ Lob. Ic. p. 26. & Germ. *Blé qui truche* H. Lugd. Triticum typhymura multiplici spicâ Tabern. Triticum racemosum Portæ: spicis modò paucioribus modò pluribus, ita ut Mart. 24. spicas vident.

C. Bauh. Considerandum quantum differat ab hoc Triticum Casp. Bauhin. pin. tertium, siue rufum hexastichon, Triticum rufi genus aliud H. Lugd. An color facit differentiam à nostro coloris albisissimi.

Locus & Tempus: Triticum pulchrum genus hoc, spicâ multiplici, quod primum Heidelbergæ vidi, mihi datum ab insigni Pharmacopœo Sprengero nomine Siliginis, satum feliciter prouenit Montibelgardi in Horto Ill. E. C. cui valde infesta sunt aues.

TRITICVM RVFVM, GRANO MAXIMO, Far siue Adoreum Veterum putatum.

Descriptio Triticum rufi præter Aristatum & Muticum H. Lugdunensi multa alia sunt genera, pro diuersa locorum natura, sitique. Haud procul Lugduno in pagis monti alto, siue Aureo propinquis, Triticum genus colitur, quod incolæ vocant *Blé rube*, & *gros blé*. Spicam fert muticam, granum maximum, sed ad conficiendum panem minus vtile. Ex eo decorticato puls fit cum lacte, in cibo rusticis gratissima: quamobrem istud ad eas delicias non segniter colunt. Sunt qui Far, siue Adoreum Veterum esse putant, ex cuius pulve Romanos diu victasse Plinius lheris ante prodidit.

Casp. Bauhin. pin. Triticum 2. siue rufum grano maximo.

TRITICVM RVFVM HEXASTYCHON.

Descriptio Aliud Triticum rufi genus est *ἑξάστυχον*, Galli vocant, *Froument à six quarrés*. Quidam, ut circa pagum Enicum in Allobrogibus, *Blé riguet*, qua-

munia ad spicæ facillimum discrimen, quo in hoc præter quatuor illos versus aristatos, qui in summa spica solitari, circa medium complures undique sibi adiungunt, multiplicative congectione in ventrè crescant: granum etiam multò candidius & delicatius. H. Lugd. p. 376. Triticum rufi genus, Lugdunensibus

si rigidum Triticum, quodd rigidissima firmissimaque spica sit, sex ordinibus distincta, cum in aliis quatuor tantum reperiantur.


Triticum rufi genus hoc aliud H. Lugdunensis sine icon. p. 376. vocat in pin. C. Bauh. Triticum 3. siue rufum hexastichon.

TRITICVM DICTVM FAR CLVSINVM Dalechampio.

Far Clusinum Dalechampio, aduectum ex Italia, & in agro pingui satum creuit ad hominis altitudinem, vel etiam procerius: caule sex geniculis distincto: foliis totidem: radiculis quinque vel sex, fibrosis: spicâ palmum longa, prælongis aristis horrida, folliculis amplis, densis, multiplicibus, granum ambientibus longum, exile, profundius lacunatum, aridum, quod vix exculpitur, ac euoluitur.

Sed & Far pro omni Frumenti genere à Veteribus usurpatum fuit. Hinc Far triticeum pro Tritico, & Far hordeaceum pro Hordeo, & Far adoreum, pro Farre apud Colamellam lib. 8. cap. 5. deditur. Videtur & Plinius lib. 18. cap. 7. Far, pro Faris farina, siue pulve, siue grano decorticato, accepisse, ubi Populū Romanum farre tantum è Frumento trecentis annis usum fuisse, è Verrio tradidit. Porro decorticati Faris grani crassior farina, ex qua pulvis sunt, Græcis *εἰς αὐτὴν* dicitur. Lat. *Simila*, Gall. *Froumentée*, quibusdam Italico nomine usurpato *Semoule*, quasi Simila. Dioscorides tamen ex Zea quoque, sicut ex Tritico crimon fieri testatur, atque etiam ex Olyra.

TRITICVM CINERICVM MAXIMIS aristis donatum, trititando glumas deponens.



Speciosum vi-
Slendæque
magnitudinis
est calamis pro-
ceris, geniculatis, foliosis: aristis maximâ, ferè sequepalmaris, duobus granorū ordinibus compactâ, glumis hirsutis, cinereis (vnde nomen) in longissimas asperimâque aristas desinentibus, quibus tribuli verberare in area facile excutitur semina.

Trago Tritici Synonyma: Fuchsi. Tritici tertium genus. Hoc in hist. non vndique notum ait, geniculâque habere quaternâ, aliâs præcedenti [i. e. secundo trimestre], siue Setanio, de quo sub Tritico vulgari.] per omnia propemodum simile esse: in Asia & agro Tubingeni gigni.

Dodon;

Dodon. Gall. infcribit Typham cerealem, Gall. *Meteil*, Belg. *Koofische terwe*. Figuram autem habet fortè ex Trago: àn bonam iudicent alii. In Frugum Hist. & Lat. in fol. sub Triciti typhini titulo pingit, ac ait: Reperitur frumenti quoddam genus, grano & culmis Triticum referens, quod culmos quidem habet breuiores ac tenuiores, spicam verò aridis longis & duris Hordei similitudine munitam, granum autem durum, densum, colore fulthum, Triticum minus, quòdque facillè è glutinis suis exterritur.

Nascitur in quibusdam Hispaniæ, ac Insularum Fortunatarum aguis: Phalaridis enim semini, quòd illinc aduehitur, permixtum reperitur: vnde collectum atque in hortis factum, eà, quæ descriptum est, forma prodiit. Suspiciari quis posset, semen hoc Typham esse, cuius Theophrastus & Galenus meminerunt. Sed cum Typha granum, multiplici folliculo inclusum, difficulter deglubatur, huius autem facillè, Typha propriè esse non potest: licet tamen ex Typha natum, & degeneratum esse possit, nam quòd ad reliquas notas attinet, ei simillimum est. Inter ea enim quæ Triticum ac Zea similia, leuissimum est, tenui ac simplici culmo assurgit, vt de Typha Theophrastus scribit. Semen eius paruum quoque est, & exile, densum item & coactum, atque colore quàm Triticum magis rufio, vt Galenus de Typha scriptum p. c. d. d. t. 1. m. & spica aristas habet longas ac duras, quales Typha esse ex Veterum plerique locis manifestum est. Quæ omnia tam magnam huius frugis cum Typha similitudinem ostendunt, vt plinè non aliud, quàm ex Typha Triticum, ac Typhinum quoddam Triticum esse videatur. Nam & Typha, auctore Theophrasto in Triticum transiit, si piska ac purgata, seratur. Rationi autem consentaneum videtur Triticum ex Typha natum similitudinis plurimum cum ea retinere, non secus ac Triticum ex Zea genitum, quòd culmo spicæque Zeam refert. Huic non admodum dissimile videtur, quòd Hieron. Tragus *Wälschweizen*, hoc est, Triticum Italicum aut Romanum cognominat: nam & huius spica aristas habet longas & asperas, est tamen culmis spicis, atque granis maius, spicas etenim habet pleniores, rotundiorèque quàm Triticum, semen verò pulcherrimum atque Triticum simile, vt Tragus refert. Seritur frequenter in Alfatia, rariùs in alijs Germaniæ regionibus, idque locis potissimum montosis, præsertim vbi a pri fruges depascuntur, nam ab hoc vno ferè abstinent, quòd durioribus eius aristis offendantur.

Quandoquidem autem Dodonæus, cuius verba hæcenus recitauimus suam priorem corrigit sententiam, nec authenticum tradit discrimen inter Typham cerealem, typhinumque Triticum, idèò vtriusque descriptionem hoc capite comprehendimus, sicuti & Lobelii Obs. p. 14. & Icon. pl. 26. Triticum aristis circumuallatum, quia tantum proponit figuram Dodonæi Latini: necdum separamus cum Casp. Bauhin Phyt. à Triticum tertio Tragi, donec demonstrat harum plantarum differentiam. Sed ipsemet in postremis [pin. scil.] vnam eandemque esse concludit. Triticum p. siue Typhinum simplici folliculo, inquit, est Triticum tertium genus Trago, Fusch. & Lon. Triticum Matthiolo, Lac. Cast. & H. Lugd. p. 377. Typha cerealis Dodon. Gall. Typha Dodonæi, & Typha Fuschii, Hist. Lugd. p. 392. Triticum aristis circumuallatum Lobel. & Ger. Triticum aristis munitum Casp.alpino. Cæterum plura obseruè dixisse hoc in loco videtur nobis C. Bauhinus, Imprimis au-

tem Triticum Matth. Lac. Cast. & Hist. Lugdunensis p. 377. exhibitum, ad vulgare referendum ducimus, idèòque ab hoc separandum. Deia cum mirari sibi, quòd Triticum aristis circumuallatum Lobelii, [quod hic Triticum typhinum Dodonæi esse perhibet] ad Triticum suum p. iam memoratum referat, itèaque rursus ad decimum, quòd typhinum simplici folliculo Hispanicè cognominat, & Triticum typhinum Dod. & Hist. Lugdunensis, quæ Dodonæi figuram cum histo-

ria habet, nostro iudicio ad hoc caput pertinentem. In eo præterea hallucinari videtur, quòd Tragum Frumenti genus, spicà cærulea H. Lugd. p. 377. à Triticum suo nono diuersum dicat, & Triticum 4. faciat, siue Triticum aristis longioribus spicà cærulea. Triticum *Loca* vocatum alterum Lob. Icon. Triticum nigrum peregrinum 1. Tabern. Triticum luidum Gerardi. Cæterum, Tragus frumenti genus spicà cærulea H. Lugdunensis, in Sebastianis, vulgò *Bugey* (Allobrogum Sabaudianorum gens est, nunc Oeno ac Rhodano fluminibus clausa, olim longius patens) Tragus gus frequentissimus est: incolæ seruat is præci nominis vestigijs *Bid Turgnet* vocant. In montosis aridis, & ventosis locis nascitur, & absque noxa nebulas, pruinas, gelè ad, aliisque celi iniurias in montosis locis frequentes tolerat, ventisque agitata semissimè granum retinet. Spica cum maturat, aristis densis horret, & cæruleo colore nitet, contrà quàm in alijs frugum generibus, quarum spica flauescunt. Haud multum alimenti præbet. Est apud varias Gentes multiplex varietas frugum, quatum numerum, nominumque ancipitem significationem persequi difficillimum foret. Et hæc H. Lugdunensis, de Trago Frumento, cuius figura pro Triticum cineritio melius placeat quàm vel icon Typha Dodonæi, vel effigies Typha Fuschii, p. 392. frustra repetita. Reprehendit autem Hist. Lugd. cap. de Typha Dodonæum his verbis: *Téps*, Lat. etiam Typhæ & Typha dicitur, à Ruellio, Typha cerealis cognominatur: quoniam planta alia inter arundines locis humidis prouenit, quæ Typha nominatur. Theophrastus inter ea quæ Triticum & Hordeum similia sunt numerat Typham, subiungitque esse omnium leuissimam, simplici culmo assurgere, solo tenui contentam. Mnesitheus Typhas tertio loco post Triticum & Hordeum numerat, item & Dioctes. Sed Mnesitheus Olyram & Typham eandem rem esse putat, quem ob id reprehendit Galenus lib. 1. Alim. vbi eius de Typhinis panibus & Typha, oratio scripta habetur. Typha autem Galeni quamnam nostrarum frugum speciem refert, ignorant plerique docti Herbarii. Dodonæus Typham appellat eam frugem quam Gallis *Meteil* vocari putat, Germanis *wälsche weizen* & *Koofische terwe*, id est, Triticum Italicum, aut Romanum. Fuschius eam pro tertio Triticum genere depinxit. Sed fallitur Dodon. Neque enim Gallorum *Meteil*, non vbique noti, seu peregrini Triticum species est, sed partim ex Triticum, partim ex Secali miscellanea seges, quam Lugdunenses vocant de *la Mescla*. Calamo, geniculis, spicà aristis vallatà Olyram Typha refert, nisi quòd spicas habet longiores & asperiores, rotundiorèque & in vnum magis coactas. Semen folliculo vnioco includitur, grano Triticum simile. Fruges hæc cortice & aceribus purgata Zeæ modo in Triticum redit, quòd & de Typha Plinius scripsit. Hæcenus Hist. Lugd. quæ Triticum cineritii quatuor imagines proponit.

H. Lugd. Icones 4.

Quid tandem C. Bauh. per Triticum 8 siue Ty- *Trig.*

Tragus frumenti.

H. Lugd. Icones 4.

Dod. lat. p. 377.

primi mul-
risici folli-
culi. phnum multiplici folliculo, Typham inter frumentacea Theophrasti, Thypham Galeni, Typhen Plinii intelligat, & an huc referri possit, aliis indicandum relinquimus.

TRITICVM SPECIOSVM GRANO longo.

Descriptio Speciosissimum Tritici hoc genus, hactenus Noabis nondum obseruatum ex horto Stuchardino accepimus, quod satum in horto Montbelgardenfi in spicam exiit spica Tritici vulgati longè maiorem, sex aut septem vnciarum aristis doctantibus, pedabbus plùs minùs. Glumæ vnciales ferè, granum oblongum & vnciæ triente & quàm vulgati duplo ferè longius continet, è glumis facili separabiles, in quo cum vulgato & cinereo conuenit.

Triticum
grano lon-
go. Hist.
Lugd. De hoc, ni fallat inscriptionis vicinitas, apud H. Lugdunensem hæc scribuntur. Circa Matiscum in humidissimis Sebustianorum tractibus deterrimum & frigidissimū Tritici genus prouenit, grano longo, exili, subato, multis glumis vestito. Rustici vocant *Long gran*, id est, longum granum, famèque vel egestate compulsi panem ex eo conficiunt. Alii subus & gallinis edendum obiciunt. Ad Brizam Thraciam fruges hæc videtur accedere.

Long gran Casp. Bauh. in pin. Triticum 5. siue semine oblongo, cui congener dicit Frumentum *Sourgeon* Rucili.

TRITICVM SYLVESTRE, AGRIOLARI Cretensibus.

Lotus Agriostari quod Triticum sylvestre significat, auctore Hen. Bello. frequentissimè in Creta inuenitur, negligiturque. Herba est Tritico similis, folia & caules tritici ferens, spicasque aliquantulum asperas, nigriores, & aristas breuiiores, eius grana minora sunt Tritico satiuo, & altera parte obtusa, ita ut secalis grana potius quàm Tritici æmulentur. Hæc semina nulla alia causa tibi mitto, nisi ut tibi compertum sit, non in sola Sicilia Triticum oriri sylvestre, quemadmodum Poëtæ tradiderunt: & quod non absque ratione Cretenses Triticum primò à Cerere in Creta inuentum fuisse sibi persuaferint, quemadmodum Diodorus Siculus in suæ Bibliothecæ l. 6. scriptum reliquit.

Classificatio
ca. Felicissimè & abundanter Clusio nata erat hæc planta, sed antè quàm caules proferre inciperet, ab eo cui repurgandi horti curam dederat, pro inutili herba euulsa & abiecta fuit, licet serie quadam & ad normam, quemadmodum nata erat, nata.

ZEÄ IN GENERE, EX VETERIBVS & Neoticis.

C A P. II.

Zea duplex
Diof. **Z**eam Diofcor. duplicem facit. Alteram enim simplicem: *ἀνθή* alteram Dicocon [*διόκων*] appellat: quòd in duobus putaminibus siue folliculis grana bina coniuncta [coniunctum semen, Corn.] ferat. Hordeo autem potentius nutrit, ut idem tradit, & ori grata [*ὀρί*], Corn. tamen *διόκων*, h. e. stomacho commodam, ex Galeno legendum asserit: sed panificia ex ea co-

secta, minùs quàm ex Tritico nutriunt.

Est verò Spelta Diofcoridis quidem dicocco, si Dodonæo non refrigandum, quæ Theophrasto & Galeno Zea. Hic autem Zeam vniuersa sua facultate, in medio quodammodo Tritici & Hordei esse, in lib. simpl. med. scribit. Quare ex illis cognosci posse iudicauit Cornarius magis alere panes ex Zea factos, quàm hordeaceos: & minùs quàm triticeos, & insuper stomacho commodam esse. Nam in Græcis non vocem *διόκων*, h. e. ori gratam, legendum esse præcipit, sed *διόκων*, i. e. stomacho commodam: Et hæc esse Galeni l. i. de aliment. lectionem ait.

Porro, antiquissimi ac prisca Latinorum, teste Dodonæo, Zeam siue Speltam, Far nuncupauerunt, ut locupletissimus testis est Dionysius Halicarnassæus. Nominabant [inquit] prisca Romani sacras nuptias, vocabulo suo *gassania*, quia coniuges velarentur eodem Farte, quod nos Græci *ζῆα* dicimus: idem affirmat Asclepiades apud Galenum, x. *τῶν* lib. guta scribens: *οὐκ ἔστι ζῆα, id est Farris, quod ζῆα appellant. Appellatur verò Far istud Latinis quoque Ador, Adoreu & semen Adoreum*, ac à Posterioribus propter frugis præstantiam, peculiari nomine *Semen*. Hoc populum Romanum tantum, è frumento 300. annis vsus, Verrius tradit. Genera huius Columella quatuor scribit: *Far Clusinum* candoris nitidi: *Far* quod vocatur *Venniculum* rutilum, atque alterum candidum, sed utrumque maioris ponderis, quàm Clusinut: *Semen trimestre*, quod dicitur *Halicastrum*, idque pondere & bonitate præcipuum. Ex his cum Halicastro conuenire Spelta posset, si trimestris esset, ac Vere fereretur, verum cum Autumno feratur, Venniculo albo magis similis esse videtur. Nam veluti Venniculum, sic & spelta, pondere præstat accèdida est. Et hæc Dodonæus.

Ceterum qui Zea vultur (Plinii verba sunt l. 18. cap. 8.) non habent far. Est autem hæc Italica, in Campania maximè, semènque appellatur. Hoc habet nomen res præclara, ut mox docebitur: propter quam Homerus *ζῆα* dixit: non ut aliqui arbitrantur, quoniam vitam donaret. Amylum quoque ex ea fit, priore crassius. Itè cap. 10. apud Græcos esse Zeam scribit, tradique eam, cum sit degener, redire ad Frumentum, si pista feratur, nec protinus, sed tertio anno. Cap. 11. Zeam in Africa degenerare referunt. Ait & alibi Zeæ granum pulchrius esse, quàm Tritici. Libr. 22. cap. 25. Zeæ medicinas prosequitur, de quibus alibi dictum.

Apud Galenum Mnesitheus panem ex Zea neminem affatum comesse citra sanitatis dispendium posse tradit. Quod si quis, ait, si panem non assueuerit, etiam si minimum sumplerit, ægrotabit. Est enim grauis, & concoctu difficilis. Qui verò regionem incolunt vehementer frigidam eo semine coguntur nutrir, ipsùmque ferere, quòd frigoribus perstrenuè resistat. Hæc Zea de qua ex Diofcoride & Plinio diximus, conuenire non possunt, neque Zea Theophrasti, qui eandem quam Diofcorides Zeam intellexisse videtur: sic enim scribit. Inter ea quæ Tritico hordeoque sunt similia, ut Zea, Olyra, Typha, Avena, & Aegilops, Zea est firmissima, copiosissimèque fructificat, multiplicem altamque radicem effundit, calamo multiplici crassoque assurgens. Fructus autem est leuissimus, & cunctis animalibus admodum iucundus. Deinde subiungit. Sunt autem hæc duo, Zea scilicet, & Typha Tritico simillima. Herodotus verò, alius Zea meminisse videtur,

videtur, cum scribit: tritico hordeoque plerique videntur. Apud Aegyptios autem his in videri uti summum dedecus putatur. Videntur autem Olyris, quas alii Zeas cum z nominant.

Zeam Germanis notam esse, & quidem simplicem, *μολικον*, tinefel appellari, *δίκων* verò speltam vocari, testatur Cornarius. Zea igitur, & *ζέα* Græcorum, Latinorum Zea, quibudam annotante C. Bauhino, idem cum Olyra est: sed horum sententiam haud dum probandam censemus: sicuti neque tragi qui Far Clusinum Columella credidit. Lobelio in Aduers. videtur xypà cerealis. Ast ab aliis melius Frumenti peculiaris species, quæ Latinorum semen est, statuitur. Semen autem Latini à substantia frugis appellatur. Eius hodie differentia plures habentur. Zeam, Speltam vulgò vocari scribit Dodonæus: Germanis Spelz, nonnullis verò Tinefel, & Tinefel-forn, Belg. Spelte. Gall. *Espeautre*: Itolorum plerisque *Pirra farra*: Hetruscis *Biada*. In subtribus Alga, quasi Alica. Hebraeis, *Kuntha*.

DE CHONDRO ET HALICA SIVE ALICA.

CAP. III.

Chondrus & *ἀνέ* ex factitiarum rerum numero sunt, teste Cornario & Dodonæo. Fit autem utraque ex Zea, & Chondrus quidem ex Zea Dicocco, Diolcoride auctore. Theophrastus & ex Hordeo sylvestri bonum fieri Chondrum tradit.

Galenus Chondrum ex Tritici genere esse ait, quod nihil aliud sonat, quam ex Triticeo genere ipsum confici, non quod Tritici aut alterius frumenti aliquod genus sit, veluti nonnulli perperam sibi persuaserunt. Non enim frumenti aliquod genus, sed res planè, ut diximus, factitia.

Galenus & aliorum Græcorum Medicorum interpretes *χόνδρος*, Latine Halicam sive Alicam interpretantur, Chondrum omnino idem cum Halica esse putantes, quia in re, non parum à veritate recesserunt. Chondrus siquidem & Halica differunt, veluti absurdè vnus pro multis, Paulus Aegineta non vno ostendit loco: aut videlicet de vtriusque seorsim agens, & suas cuique vires ac facultates tribuens, ut lib. 1. cap. 7. aut vnam alterius loco substituens, veluti cap. 19. 39. & 62. lib. 3. Differunt autem hæc inter se, non quidem toto genere, sed quodammodo, veluti genus & species, aut potius ut vnus generis duæ species. Non Halica sive Alica, Latinis ac Plinio generalius est nomen, Græcorum cum *χόνδρος*, tum *ἀνέ*, ipsis peculiariter nominatam, sub se continens. Est enim vna Halica ex Zea, quæ semen appellatur, propria quidem ac genuina, quæ à Plinio lib. 22. res Romana esse fertur, Magni Pompeii tempore nondum in vsu. Hæc à Paulo Aegineta Græcè *ἀνέ* dicitur, & à *χόνδρος* ipso præparationis modo differt, non enim gypso & arena veluti hic repurgatur, sed creta candorem perfectionemque suam assequitur. Est verò & altera Halica, ex Zea in Africa degenerante, cognomenito adulterina, Græcorum Chondro similissima: gypso siquidem & arena, veluti Chondrus perficitur: licet tamen Halica quidem ex degenerante, Chondrus verò ex Dicocco Zea, fiat. Nam præparandi ratio apud vtriusque nationes consimilis, eandem esse rem profus ostendit, quemadmodum & ea dissimilis

Tom. II.

res diuersas. Non enim tam species frumenti, quam præparandi consiciendique ritus ac modus considerandus. Frumenti enim aliqua diuersitas, speciem rei factitiæ non videtur mutare, modò in præparandi ratione nihil varietur. Siquidem ex Zea & Hordeo Far: ex Zea & Hordeo sylvestri Chondrus: ex Hordeo & Tritico pisanæ confici possunt.

Qua autem ratione Chondrus consiciatur ac præparetur, in libris de Agricultura, siue *ἀγρονομικόν*, Constantino imp. dicatis à Cassio Dio: ysis Vucensi, docetur his verbis: Zea tunditur & in feruentem aquam iniicitur, ac premitur, deinde gypsum album tustum cribratum, & arenæ albißimæ ac subtilissimæ ad gypsum pars quarta paulatim admiscetur, donec Zea probè repurgetur. Præparetur autem in canicularibus diebus: na acescat. Postquàm verò rursus totus perpuratus fuerit, per cribrum densius excutiat.

Optimus est Chondrus, qui primùm excussus est: secundum locum habet, qui succedit: deterior autem tertius est.

Halicarum verò præparationem Plinius lib. 18. cap. 11. tradit. Halica fit, inquit, ex Zea, quam semen appellauimus: tunditur granum eius in pila lignea, nam lapidis duntia conteritur. Nobilius, ut notum est, pilo vincitorum pœnali opera, primò inest pyxis ferrea, excussus inde tunicis, iterum iisdem armamentis nudata conceditur medulla, ita sunt Halicæ tria genera, minimum, ac secundarium, grandissimum verò aphærema [*ἀφαίρημα*] appellant: nondum habent candorem suum, quo præcellunt, iam tamen Alexandrinæ præferuntur. Postea mirum dictu, admiscetur creta, quæ transit in corpus, colorémque & teneritatem adfert.

Deinde paulò infra: Halica adulterina fit maximè quidem ex Zea, quæ in Africa degenerat. Pin sunt cum arena, & sic quoque difficulter conterunt vtriculos, fitque dimidii modii mensura, posteaque gypsi quarta pars inspergitur, atque ut cohesit farinario cribro subcernunt. Quæ in eo remansit, exceptitia appellatur, & grandissima est: rursus quæ transit, archiore cernitur, & secundaria vocatur: item cribraria, quæ simili modo in tertio remansit, cribro angustissimo, & arenas tantum transmittente. Alia ratio vbique adulterandi. Ex Tritico candidissima atque grandissima eligunt grana, & semicocta in ollis, postea arefaciunt Sole ad initium, rursusque leuiter aspersa molis frangunt. Ex Zea pulchrius quàm ex Tritico fit granum, quamuis id Alicæ vitium sit, candorem autem ei pro creta, lactis incocti mixtura confert. Cæterum de ipsius utilitate lib. 22. cap. 25. ita ait. Alica res Romana est, & non pridem excogitata, alioqui non pisanæ potius laudes scripsissent Græci. Nondum arbitror Pompei Magni etate in vsu fuisse, & idèd vix quicquam de ea scriptum ab Asclepiadis schola. Esse quidem eximie vtilem nemo dubitat, siue eluta detur ex aqua mulla, siue in forbitiones decocta, siue in pultem. Et paulò post. Pisanæ quæ ex hordeo fit, laudes vno volumine condidit Hippocrates, quæ nunc omnes in Alicam transeunt. Nec dissonant ab his quæ Galen. 1. de aliment. prodit. Ex genere Tritici inquit, est Alica, quæ multum alit, & viscosum succum habet, siue in aqua sola cocta, accipitur ex vino mulso, aut vino dulci, aut etiam adstringente: proprium est enim vnumquodque vsus tempus: siue cum oleo & sale condita. Iniicitur etiam aliquando acetum ad ipsam, & dicunt Medici ita præparatam, chondropisanæ factam esse conditu-

Mm

sam. Quidam verò ex Alicæ Prisanæ [*χονδρον-
εινός*] agrum nutritum esse dicunt. Aliqui verò Ve-
terum, velut Diocles & Philotimus, prisanam tri-
ticeam (*πρίσανον τριτρίν*) ita præparatam Alicam
[Chondrum hoc modo apparatus] appellant. Et
vno quidem horum modorum, eo videlicet qui
prior est, Alicam etiam coqui ac edi apud Ro-
man. solitam Martialis in xenis hoc dist. ostendit.

Nos Alicam, nullum poterit tibi mittere diues,
Si tibi voluerit mittere diues, eme.

*Alimentum
optimum.
Tempera-
mentum.*

At idem Galen. Sump. phar. Alicam, inquit, est etiam alimentum optimum, quemadmodum etiam Triticum, sed non est huius loci de alimento distinguere. Verum ut medicamentum meatu obducendi vim habet. In temperamento verò similibus est Tritico, plus viscosi quam illud habens, quo etiam magis quam illud alit. Est est velut materia quedam idonea ad suscipiendum acetum, & aquam marinam, & muriam, & alia huiusmodi quæ vehementer siccant. Quapropter quidam ex his quæ multum siccant, ipsam esse putauerunt. Est autem ex his quæ magis concoquere possunt, quemadmodum & Triticum, quæ minimè siccant. Verum ob siccantium pharmacorum mixturam, id quod ex ipsis compositum est siccandi vi præditum, multos medicos fallit, ut ad ipsam Alicam referant siccandi causam, omnis his quæ sunt amixta. Et hætenus quidem Cassi, Plinii & Galeni verba, ex quibus manifestum est, Alicam à Chondro differre, & Chondrum cum secunda Plinii Halicæ conuenire, utramque item rem facturam esse, & non pecuharia frumentorum genera, Dodonæo attestante. Sed ex iis quoque clarum fit, monente Cornario, etiam ex Tritico Alicam fieri: & tum res eiusmodi facturas, nomina inter se commutare, tum pro ipsis naturalibus nomina factitiorum usurpari & vicissim.

*Alicæ Ery-
mon*

Videtur porò Alicæ Latinis ab alendo appellata esse, sicut Græcis *χονδρον* ob excellentiam, id est, granum dicitur. Utuntur tamen etiam Græci medici iuniores Latina voce *ἀλίκη*, pro Alicæ. Et aliquando *χονδρον ἀλίκη* coniunctum dicunt.

*Chondrus
Sives ex
Dioscoride.
Alicæ.*

Cæterum *χονδρον* auctore Dioscoride, potentius quam Oryza & alit & aluum cohibet, sed stomacho longè vtilior. Decoctus in aceto illuctusque, lepras tollit, & vngues scabros pellit, ac incipientibus agilopiis medetur. Eius decoctum dysentericis dolore vexatis insulam idoneum est. Chondrus, uti Paulus lib. i. tradit, egregiè nutrit, & glutinosos parit humores: verum puls ex eo confecta nocet, quoniam quamprimum crassescens incocta permanet. Probatur magis *χονδρον* ipsius ex integro Chondro benè decocto, expressus Prisanæ similis: *ἀλίκη* in cæteris Chondro quidem respondet, sed aluum magis adstringit.

DE ATHERA, ET ΚΟΛΛΑ SIVE GLVTINE.

CAP. IV.

*Athera
quid?*

Athera sortitio est, inquit Dioscorides, *ἀθήρα* *πολλὰς ὕλης*, i. e. veluti pulcicula liquida infatibus conueniens: comoda etiam ad cataplasmata. Fit autem ex Zea tenuissimè molita. Apud Belgas verò non ex Zea tantum, sed ex quasvis etiam prior farina coquitur: veluti, Secalis, Hordei, frequentissimè autem Tritici, cum tenui censura vel alio liquore permixta, Plinius etiam ex Olyra facit. Est autem edulium, quod citò concoquitur, facilièque nutrit, infantibus idcirco & senibus conueniens: interiora tamen viscera non-

nihil obstruens. Datur capite dolentibus, ex tenuissima Secalis, vel Hordei farina: dolorem enim sopit, & sanum clementer conciliat.

Athera crassius & solidius est gluten, Græcis *κόλλα*, ex Similagine & farina Tritici, quo chartæ glutinantur. Quod propter eam, quam habet obstruendi vim, sanguinis excreationibus prodest.

In vtriusque medio *παλιν*, siue puls, est solidior quidem ac spissior Athera: liquidior verò Glutine, & minis Glutine, plus autem quam Athera viscera obstruens. Atheræ, aut potius pulvis genus est, edulium, quod Galenus ex multa Tritici farina lacti permixta fieri scribit, quo hac attate Belgium, ac vniuersa inferior Germania frequentissimè vitur. Cibis boni fucci & multi alimenti, sed eos qui ipso assidue vtuntur offendens. Nam in hepate obstructions parit, & calculos in renibus gignit auctore Galeno.

ZEA SIVE SPELTA.



Culmo foliisque Triticeis respondet, spica palmaris aut sesquipedalis, aliquando mutica, interdum aristis circumuallata, longioribus brevioribusve, gemino granorum versu, vel ita dispositis granis, ut alternatim vnus principio medium alterius respondeat, glumis pertinaciter hærentibus, nec tribuli ictu semen relinquentibus, quo nomine à Tritico vul-

gari distinguas licet, alioqui glumis & tunicis exuta grana vix inter noscas.

Dodon. gall. Zeam hanc pingit sine aristis. H. Lugdunensis contra p. 385. Zeam duplicem exhibet, modò non. Casp. Bauhin. pin. Zea 2. siue dicoccos vel maior: *ζέα δικοκκος* Dioscor. Zea Theophrast. & Galeno. Zea, Brunf. Cordo in Dioscor. Lon. Ger. Spelta prima Trago. descr. Secunda, Eidico. Zea dicoccos, Matth. Gesn. apud Cordum. Zea altera Matth. Lac. Cast. Zea primum genus Fuchf. Turn. Zea, Romanis veteribus semen, nunc Spelta Dod. gall. Zea vulgò Spelta, Far antiquiss. Ador posterioribus, & Semen Adoreum Dod. Typha Ang. Far primum Cæf. Zea maior seu dicoccos Lugd. pag. 385. Zea ador, Tab.

An Lob. in Ic. plant. p. 27. Robus, siue Triticum Insularis Gallo-Belgis Loca vocatum. Ibi siquidem nulla alia figura pro Zea. Scio fratrem Casp. Bauhinum à Zea diuersam statuere, & in pin. Triticum 7. facere, cognominatèque Triticum aristis longioribus spica alba, Triticum typhinum Ger. quantum Tabern.

In multis Italiæ, Galliæ & Germaniæ locis provenit. Nasctur qualicunque solo, etiam hamidiore, quoniam folliculum, ut ait Columella, quo continetur, firmum ac durabilem, aduersus longioris

gioris temporis humorem, habet. Lato tamen pinguique solo melius proficit. Seritur vt Triticum, Septembri vel Octobri mense: Iunio floret, Iulio autem maturitatem consequitur, demetiturque.

ZEA VERNA, ZIMMER.

Triticum quod vulgus VVirttembergicum Zimmer vocat firmos habet calamos, tres cubitos altos, quatuor, quinque aut sex geniculis

donatos: folia plusquam semunciam lata: spica verò duorum est versuum, sibi mutuo aequaliter respondentium, aristata, in singulis autem versibus ordines duo seminum maiusculorum, quæ glumæ involuunt validdæ, aliàs albicantes, aliàs quasi ferrugine infectæ vel rubentes, binæ quidem vndique, extrema



verò, externa tantum parte.

C. Bauh. phyt. Triticum 2. æstiuum siue *reyn-vos* p. 106. Dioscorid's, Tritici genus alterum Tragi. Triticum trimestre Cordi, Olyra Dodonæi gall. Item Triticum 3. siue amyleum, Spelta secunda Tragi. Et rursus Zea 2. siue dicoccos Dioscoridis, Spelta 1. quoad descriptionem: 2. quoad iconem Tragi. Ego Dodonæum se corrigentem sequor, nec Dioscoridis Triticum existimo: nec hoc Cordus trimestre vocare videtur. Iam nec Amyleum Triticum, à Tritico altero Tragi separandum: quin nec Spelta secunda Tragi eadem est eum Amyleo Tritico, quod eadem cum Zea altera. Eid. pin. Zea tertia, siue amylea, vel zeopyrum Amyleum: an Far halicastrum trimestre cognominatum, Col. Triticum secundum Trag. Fuchl. Lon. Olyra, Dod. gall. Lugd. Triticum trimestre Cord. Amyleum frumentum & Far halicastrum, Dodon. Frumentum vel Triticum Amyleum, Tab. Triticum amyleum, Ger.

Si Fuchlus per Tritici secundum genus, Sitanium scil. de quo cap. de Tritico, hanc Vernam zeam intelligit, malè, meo iudicio, eam haud differre ait à Tritico, nisi quoddam spicam multis aristis vallatam, &c. obtineat.

Dodon. gall. Olyram Plinii esse statuit, negatque Siliginem. Latinus zeæ generibus accedere haud perperam dixit Amyleum Germanis dictum frumentum, *Amelforn*, æstiuum, siue trimestre genus. Addit Tragum & Fuchium trimestre Triticum esse existimasse: sed cum granum habeat glumis conditum, ex Tritici generibus esse non posse: inter Farra autem citius reponendum fore, inter quæ Halicastrum fortè sit futurum, quoddam teste Columella, vere feratur.

Io. Marhardus Med. Halz Sueuerum vocabat

in Ind. suarum plant. mihi missarum, *Typham*, Frumenti genus, Zimmer.

An Lob. Ic. plant. p. 27. Triticum, *Loca* vocatum alterum, & Triticum lucidum Gallo-Belgarum: Non me latet quidem aliam esse opinionem Fratri, eumque separare à tritico altero Tragi, ac facere triticum 4. in pin. siue Tragum frumenti genus spica cærulea Hist. Lugdunensis, quod ad triticum cinericeum retulimus.

Anno 1596. mense Augusto obseruavi inter **Locus** & urbem Rotemburgum & Nideravv fontem ac- **Tempus** dum tritici genus hoc, quod mihi denominarunt *ivelsche forn*, an bene, nondum mihi constat. Inveni eodem mense etiam inter *Birchen* urbem & *Bol*: serunt verno tempore, circa festum Diui Georgii, tardè metunt, scilicet primum Septembri.

ZEA MONOCOCCOS, BRI.

ZA QVIEVS DAM.



Culmis sur- **Descriptio**
git gracilibus & sesquicubitalibus, læto solo maioribus, foliis angustis: spica summo culmo sedet strigosa, sed pulchra, triticum quatuorve vnciarum longitudine, semunciam lata, compressa, duplici contexta versu granorū, quos glumæ simplices arctè obtegent, in aristis asperas desinentes Ra-

dix fibrosa: Icon nostra planè dupliciter: iam sculptam emimus.

Dod. Gall. inscribit Brizam, vocans eam Germ. *Brye* & *Blicken* / *S. Petera forn* / *Frumentum Sancti Petri*, & *Ein horn*, Monococcon: suspicatur autem Gallicè, *Blé local* ou *Frument local*, id est, Frumentum locale Ruellio dici, Farrisque speciem esse, non verò zeæ, vt quidam putarint. Lat. de Frum. & in fol. subtili Frumenti monococci huius figuram exhibet [hanc & Lobel. habet in Obs. pag. 10. Ic. plant. p. 31. Brizæ, Monococci recentiorum & Dodonæi inscriptione.] ac addit *Tinefel*, ac *Einfelforn* à quibusdam etiam appellari. Suspiciaturque Frumentum rubrum siue locale Ruellii, *Frument rouge*, & *Frument local* esse zeam monococcon. At hic apertissimè falli Dodonæum docet Dalechampi in hunc modum: *Blé local* Gallis, triticum est, quasi Localare sic dictum, quoddam multis tunicis tanquam loculis involuatur. Id barbati Frumenti genus Farris speciem Ruellius esse vult In concauis, inquit, tractibus Galli serunt: & qui facile sentiunt rubiginem: nam, vt credunt, nec pruinas, nec æruginem extimescit. In perfatis & excelsis quamvis bene conualescat, satiationem tamen ibi damnant. Farris speciem esse negat Dodonæus in stirpium Historia, quoddam Farris spicas muticas esse putet. In frumenti Historia similitudinem quandam fortasse habere ait, cum Far-

se venticulo rutilo. Idem Zea genus esse negat in Historia stirpium. At in Frumentorum Historia scribit non temerè Scriptores nostri temporis ad Zeam referre, neque perperà *ζέα*, id est, simplicem Zeam Dioscoridis existimare. Ruellius *Brizam* quoque non longè dissidere credit ab ea fruge quæ Gallis *secale* vocatur, ex quo panis fit ater quidem, sed recens non insuavis, ab eaque *Bizi* panis in vulgus nostrum mansisse putatur extrita litera: *Bizum* enim panem nigrum vocamus.

Synonyma Casp. Bauhin. phyt. & pin. Zea 1. Briza dicta, vel Monococcus germanica: *Zeia* *ἀπλή*, quodd simplicis grani sit, Diosc. Spelta prima, Tragico. secunda Eid. descript. Zea Ang. Zea simplex, Matth. Lac. Cord. in Dioscor. Zea alteram genus, Fuch. Frumentum loculare, Ruell. Siligo, & Zea alterum genus, Tur. Briza, Dod. gal. Ad. Lugd. Monococcus Lob. Ger. Monocoon, frumentum barbatum, Far venticulum rubrum, Col. Zea Mnesitheci fortè, Dod. Spelta vulgò, Carl. Zea species prima, Cast. Zea monococcus, Tab. minor & monococcus Lugd. Si, vt frater antè scripsit, Tritici anyleu est spelta secunda Tragi, quomodo erit Zea simplex, siue *ἀπλή* Dioscoridis: Trago enim Amyleum Triticum, est spelta secunda, duæ sunt plantæ diuersæ.

C. Bauhin.
mor.

Locus &
Tempus

Nascitur apertis & montosis plerisque Germaniæ locis. Autumno cum reliquis frugibus feritur, ferius tamen ac subinde Septembri demum mense maturescit.

Ex Monococco panis confectus, ater est & hominibus ingratus.

OLYRA AC TYPHA.

C. A. P. V.

Olyra
Dio.

Aranea
Gallorum
Plin.

Aranea
ca.
dem cum
Olyra Plin.
Error quo
tenuum.

Mnesitheci
opinio re
probata.

Olyram Zea genus facit Dioscorides, sed aliquantò minus quam illam nutrire, & ex ipsa panes, crassioresque facinam, eodem modo fieri refert.

Plinius Arincam Galliarum propriam, & Italia copiosam esse dicit. Et rursus, Ex Arinca dulcissimus panis, ipsa spissior quam Far, & maior spica, eadem & ponderosior. Rarè modius grani non 16 libras implet. Exteritur in Græcia diffusius: ob id iumentis dari ab Homero dicta. Hæc enim est quam vocat Olyram, Arincam itaque eandem cum Olyra Plinius facit. Nec reperitur apud ipsum id quod quidam scribunt, Olyra Græcis, Latinis Plinio autore, Siligo. Quare isti Olyram cum Veterum Siligine confundunt, quæ autem fuerit Siligo, & quodd ea hodie ignota sit, concludit Cornar. Hodie tamen Siliginem putari, & appellari eam quæ Olyra est fatetur, sed nullo Veterum autore. Olyram itaque esse affirmat eâ, quæ vulgò hodie Siligo appellatur, quam Germani *Rosten* vocant, & quibusdâ locis forn per excellentiam, hoc quidem nexus argumento, quodd ex hac magna ex parte per omnem Germaniam vulgares panes fiant, vt & ex typha, quam deteriore alicquantò, Olyra speciem statuit. Sed quæ sit in his differentia, ex Galeni verbis, quæ inferius adscribenda, cognoscendum.

De Olyra ac Typha ex Theophrasti & Galeni præcipuè sententia, hunc ferè in modum distinxit Dodonæus. Olyram ac Typham Mnesitheus idè frumentum, utroque nomine appellatum existimauit, sed eius opinionem Galenus reprobatur, Dioscori ac Theophrasto accedens: qui Olyram ac Typha distinguunt. Theophrastus Olyram ac

Typham inter ea quæ maturè feruntur, ac Tritico similia sunt, enumerat: & Olyram quidem ait, Zea ac Bromo molliorem ac infusciorem, Typham verò omnium leuissimam: nam simplici culmo assurgit, & solo tenui contenta est: nec, vt Zea, pingue lætūque desiderat. Vtramque præterea scribit multiplici folliculo includi ac Typham vt Zeam in Triticum mutari solere, si pista feratur, idque non protinus, sed tertio anno. Plinius Olyram Latinis Arincam dici affirmat. Recentiores Typham, cognominant cetealem, ad differentiam nempe alterius Typhæ, quæ in paludibus nascitur, de qua suo loco. Typha semen, Galenus ait, corticem extrinsecus veluti Olyra ac Hordeum habet. Quod verò ad colorem naturalem attinet, in Hordeis quidem ac Olyris est albus, in Triticis verò subflauus: Typhæ autem vel Triticis sunt flauiores. Quin & harum corpus coactum est, ac densum, quod fortassis ad seminis paruitatem non nihil adfert momenti. Est enim id Tritico longè exilius, quamquam non desint, qui ipsum quoque in Tritici numero ponant: velintque id semen esse, cuius Homerûs meminit, cum Hectorem equos suos alloquentem facit his verbis:

Τὴν δὲ περὶ τὴν μὲν ἀνὰ τὴν ἰσθμὸν

Hoc est, Triticum enim vobis primum prædulce ferebam. Aiunt enim Typham paruum Triticum esse, eamque equos sine noxa mandere, verum autem Triticum non absque noxa. Nec absurdè certè Typham quis exile Triticum vocauerit, cum ei, & colore, & densitate, & caliditate sit absimilis. Vtrumque autem semen (inquit Galenus, qui Mnesitheum miratur, quodd quomodo Olyra à Typhis differant, ignoret.) Olyra videlicet ac Typha in Asia est frequens, & potissimum in regione, quæ est supra Pergamum, adeò vt rustici ipsi panibus ex iis factis semper vtantur, propterea quodd Triticum omne in oppida comportent. Olyrini sanè, si modò ex bona Olyra fiant, post Triticeos saltem sunt præstantissimi, secundi autè ab his sunt Typhini. Quod si Olyrini ex vitioso semine sunt facti, Typhini non erunt eis inferiores. Calidi verò panes ex laudatissima Typhafacti Olyrinis longè sunt præstantiores: assueti verò deteriores se ipsis euadunt. Cum enim masculorum sit tenax ac ductilis, densatur maiorem in modum: & maximè cum negligenter parati fuerint, adeò vt qui panem huiusmodi, post vnum aut duos dies, ac multò magis sequentes aliquot, comederit, putaturus sit lutum venticulo suo inesse. At calidus adhuc cum eis, ab ipsis etiâ vrbis expetitur, ipsūque cum caseo quodam mandant, quem vernaculo nomine *ἀνὰ τὴν ἰσθμὸν* appellant. Porro hanc quoque tenerum esse oportet, & ipsum panem calorem cibani adhuc retinere. Qui certè hunc in modum est paratus, non rustici modò, sed vrbis quoque hominibus in deliciis habetur. Qui verò trium, quatuorue dierum est vel ipsis rusticis manditur insuauis: præterea concoctū est difficilius, ac tardius per alium subducitur, quæ calido minime accidunt: qui tamen ab Hordeaceo, quod ad deiectionē attinet, multum relinquitur: non tamen in eo adeò, vt Miliaceus, est vituperandus. Quin etiam corpus admodum, dum calidus est, nutrit, vt penè Triticeo syncomisto par sit. Congeritur autem in panes Typhæ semen repurgatum, omnique vsui accommodatur: nam & ex aqua manditur, haud aliter ac vocatum à rusticis *ἀνὰ τὴν ἰσθμὸν*, hepemate, quod alii *ὀψαρον* nominant, iniecto: nonnunquam etiam cum sale citatur.

Cæterum

Et de Olyra, atque ei simili typha hæc tenus:
nuncius factitia sequuntur, quæ apud Veteres
in usu esse solebant, & sunt inter alia, Far & Tra-
gus.

*Imbue plebeias Clusinis pultribus ollas,
Vt satur in vacuis, dulcia musta bibas.*

DE TRAGO.

CAP. VII.


Mm 2

dentes, superiniiciunt & nuces pineas aqua prae-
maceratas, donec plurimum intumuerint: multò
tamen minus quàm Zea, Dioscorides ait, nu-
trit, eò quòd multum palearum habeat. Quare
etiam agere conficitur & aluum mollit.

SECALE

CAP. VIII.

Descriptio



te denticellis rigidiusculis armata est, interior te-
nuior, candidior, lauis. Vstilagini obnoxium est,
rarè formæ, fescuncià aut vncias duas longæ, tri-
quetra, colore foris ex spadiceo nigricante, intus
cinericeo, modò incuruæ, dunticè ferè corneæ, sa-
pore subdulci insuau.

Olyra Veterum.

Cordus in Diosc. ait quod si frumentum hoc,
non fuerit Olyra apud Veteres, se ignorare quid
sit.

Farrago.

Dodon. gall. refert quibusdam Farraginem di-
ci, non tamen veram esse, ut quæ nil aliud quàm
Hordeum sit, concludit. Duplicem autem statuit,
maiorē & minorem. In Hist. Frum. & Lat. in fol.
meminit Autumnalis & Aestiuæ, ac inter alia Bri-
zam esse putat, cum tamen pro Briza olim longè
aliam habuerit plantam. Verba eius hæc sunt:
Plinio Secale est, de quo lib. 18. cap. 16. sic scribit
Rarum dictum, esse aliquid cui proest negligentia,
id autem quod Secale & Farrago dicitur, occari
tantum desiderat. Secale Taurini sub Alpibus A-
siam vocant, deterrimum (sed verius aterrimum)
& tantum ad arcendam famem vile, secunda, sed
gracili stipula, nigritia triste, sed pondere præci-
puum, & tamen sic quoque ingratißimum ventri
est: nascitur qualicunque solo cum centesimo
grano, ipsumque pro laxamine est.

Secale.

Quæ Plinij verba frumentum Roße ac rog-
ge dictum, cum Secali conuenire satis common-
strant. Dicitur autem id, ut Plinius tradit, etiam
Farrago, verum non secus, quàm Far, Hordeum,
Arena, Triticumve, subinde Farragines nominan-
tur, quando videlicet iumentorum, pecudumque
pabulo cedunt.

Farrago siquidem, quam Græci *ῥοῖον* appel-
lant, generale nomen est, ad omnem viridem se-
getum herbam, quæ pabuli causa seratur. Seritur
ea, ex recrementis Farris prædensa, admixtâ ali-
quando & vicia: eadem in Africa fit, ex Hordeo:
Plinius. Atque inde Farrago quòd Far sit ferro

caelum, aut quòd primum in farracea segete feri
cæptum, Varrone auctore dicitur.

Ex Hordeo Farraginem facere docet Columel-
la: Farraginem ait, in restibili stercoreatissimo lo-
co, & altero sulco serere conuenit. Ea sit optima
cum Chanterini Hordei decem modis iugerum
obseritur, circa æquinoctium Autumnale, sed im-
pendentibus pluuiis, vt consita rigatque imbri-
bus, celeriter prodeat, & confirmetur ante hye-
mis violentiam. Nam fugoribus cum alta pabula
defecerint, ea bubus catenique pecudibus, opti-
mè defecta præbetur: & si depascere sæpius vo-
les, vsque in mensem Majum sufficit. Quod si e-
tiam semen ex ea voles percipere, à Calendis Mar-
tius pecora depellenda, & ab omni noxa defen-
denda est, ut sit idonea frugibus. Similis satio A-
lienæ, quæ Autumno fata, partim cæditur in for-
num, vel pabulum, dum adhuc viret: partim semi-
ni custoditur, iam & ex Tritico Farraginem fieri
Plinius quoque testatur. Et in Tritici, inquit, ge-
nere, pars aliqua pabuli est, quadrupedum causa
sati: vt Farrago. Absyrtus etiam *πυρρὴν γαῖαν*, id
est, Triticæ Farraginem, equalis maximè pro-
bat: ea si non addit, *ῥοῖον*, quam Eumelus iis re-
fert, post trimatum dari solitam. Hoc modo & Se-
cale Farraginis genus est, quando videlicet pecu-
dum iumentorumque per hyemem pabulum
efficitur. Recentiores Roggam Siliginem ferè
interpretantur: quia in te quantum hallucinen-
tur satis apertum est. Nam Siligo candidius ac le-
uius Triticum est, ac tritici, vt inquit Plinius, deli-
tia, ex qua laustissimus panis & pistrinarum opera
laudatissima fiunt, ac Secale nigrum est, & ex eo
panis ater, pauperum non lautiorum, mensis ac
cibus dicitur.

In non dissimilem errorem lapsi videntur, qui
Roße cum Olyra conuenire autumant. Olyra
siquidem candida est, ac vtriusque multis continet-
ur: Secale verò præter quod nigrum est, glumis
nullis implicatur. Ruellij conjectura plus veri-
similitudinis habet, qui Secale à Briza non longè
dissidere credi scribit, atque inde putari no-
men Brizæ panis in Gallia vulgus manasse. Panis
siquidem ex Secali fit grauis, firmus, concoctus
non facilis, qualem ex Briza fieri Galenus tradit,
& hunc migrum ex Secali panem, extrita licera *ῥοῖον*
brizæ Gylli nuncupant, sic vt ab inuicem non
dissidere existimari possint, nisi Secalis granum
nudum foret, Brizæ verò glumis implicatum, quod
hæc inter se differre manifestè ostendit.

Quod verò Brizæ semen glumis implicetur, ex
his videtur colligendum: tum videlicet, quòd
eam Typhæ perisimilem Galenus scribat, quæ
multiplici folliculo conditur: tum etiam quòd
membranosa substantiam panis ex ea factus ha-
beat, ex ipsorum nempe folliculorum admixtio-
ne, contra planè quàm Secalinus, qui Triticeo
syncomisto membranas ac furculos vel pauciores
vel non plures habere comperitur.

Secale autem vt medicamentum, Tritico in ca-
lesciendo ac digerendo potentius est. Panis ex
hoc aut fermentum, promptius ac citius absces-
sus maturant & rumpunt, quàm ex Tritico facta.
Farina confusanea, diuturniores capitis dolores
lenit, in lenteo capiti circumligata.

Potro Secale proximum inter frumenta à Tri-
tico Triticeisque seminibus locum habet. Panis
ex eo factus, lentoris atque obstruentis naturæ
non nihil obinet, difficulter concoquitur, ac ven-
triculo grauis est, præsertim si furfurum expers
fuerit. Nam confusaneus, qui simul omnia recipit
ac extota farina concinnatus est, si probè coctus
bene-

benè; fermentatus fuerit, minus lentus est, non admodum agèr conficitur, citòque descendit: nondum tamen Tritico syncomisto par, quo gravior & concocta difficilior etiamnum est. Alimentum autem corpori solidum, ac firmum præstat, nec mali succi, si ex bono frumento coctus fuerit, ex malo autem frumento & corrupto paratus, prænos & corruptos succos ingenerat, & diuturniores morbos procreat, veluti morbum, Germanis Scorbuck aut Scorbuck, dictum. Admiscetur huic non rarè Triticum, ut leuiorem graviorèque panem efficiat, qui Secalino puro minus grauis ac lentus est, & teneritudinem suam Triticeo diutius retinet.

Lobelius in Adu. Secale distinguit in vernum, & autumnale. Tragus in hybernium & æstiuum: asserit autem esse Olyram Theophrasti & Dioscoridis, Siliginem Veterum ac Secalen, nec non Triticum secundum Columellam. Fuchsius contra, eos magno in errore versari scribit, qui hoc Frumenti genus Siliginem esse existimant.

Secale C. Bauhinus, duplex aut, stationis tempore & magnitudine destinatum. Secale quidem Hybernium vel maius [quod primum in phyt. secundum autem in pin. est: dicitur Siligo, Brunf. Lon. Veterum & Secale Trag. Secale Muth. Dod. Gall. [quibusdam Farrago, non tamen est vera Farrago, quæ nil aliud est quàm Hordeum] Fuch. Lob. Tab. Ger. Secal. & Farrago Plinii, Dod. Tiphacerealis & Tiphæ Theophrasti, Portæ. Verum vel minus [quod 2. phyt. 3. pin.] est Siligo æstiuæ, Trag. Secale alterum, Lugd. Rogga siue fecale æstiuum, Dod.

Germani Roeken, & Roekenform: Belgæ Roghe vocant: Galli Seigle & Seigle: Itali Segala: Hisp. Centeno & Sentena.

Nascitur cum in Germania ac apud alias Nationes plurimas, præsertim Septentrioni subiectas, tum in Belgio omnibus ferè agris tam sterilibus quàm lætis, veluti in Brabantia campania, quæ hoc frumentum, licet arida ac sterilis, feliciter proignit. Qualicumque enim solo provenit, quantumvis rigenti, gracili, aut arido, fecundiore tamen ac lætiore melius præstantiusque. Seritur Autumno, quod & lætius, item & Vere: Aestiuum, altero gracilius, paucioribus culmis, spica breuiore ac tenuiore, granòque leuiore. In Palsautani Principis & Abb. Murbac. ditionib. obseruauit spicam Secalis inusitata magnitudinis, versuum multorum, granorùmque supra sortem vulgarem copioforum, è glumis spontè dehiscentibus, vel citra tritum, excidentium.

mine. An Plin. lib. 18. cap. 17. de hoc intelligendus, dum scribit: Inter vitia segetum & luxuria est, cum onerata fertilitate procumbunt: alii volunt Plinium intelligere id, quod Theophr. 8. hist. quædam, insanam foliorum luxuriam, vocauit.

Cæterum de Secalis matre hæc dixisse videtur Thalys. Reperitur in Hircinia Festuca tertie seu gramineæ nemoralis species media, radicibus geniculatis, minoribus, densa capillaceorum citrorum congerie præcinctis, foliis pluribus, angustis, palmo longioribus, parum pilosis, culmis cubitalibus & longioribus, interdum bicubitalibus, crassioribus, minoribus verò iam memorata speciei, paulò tamen tenuioribus quàm festuca nemoralis maioris, propè radicem bina ternave genicula habentibus, reliqua autem serie [qua vsque, in summum fastigium prorsus destituitur geniculis] iubatam spicam continentibus, oblongam, sed primæ speciei tenuiorem, rariorem, vtriusculis tamen eiusdem paulò maioribus constantem, necita splendentem, ut in illa. Spica vbi defloruerit, frumenti alicuius genus imitatur, utpote Secalen, vel aliud simile. Frequens est in montibus aridioribus passim, ac secus vias. Videtur verò hoc genus vitium esse Secalis. Ac, sicuti fœpissimè in Secale nostra accidit, ut arista quædam, postquam flores deciderunt, ac semina iam augmenta suscipere incipiunt, vitium aliquod in granis contrahant: fortè maior succi copia, quàm ad grani iustum alimentum opus est, attrahitur, ut ita necesse sit, corticem adhuc tenerum rumpi, & ita internam substantiam in maiorem molem augeri, ac à feruore Solis & ambiente in circumferentia sua affici. Tunc enim videmus quædam semina longius ex suis vtriusculis seu glumis protendi, ac in mediocrem etiam crassitiem exerescere, nigrumque colorem fortis contrahere, intus candida farina densioris materie constantia. In Thuringia vulgò vocatur vitii hoc genus mater Secalis, Roekenmutter. [Vtuntur etiam eo ad sistendum sanguinem.] Eodem, inquam, modo vitii id anno 75, in hac festuca Secalina obseruauit. Reperit enim in montibus quibusdam Stolbergæ huius plures spicas, non vnum eiusmodi vitiosum granum oblongum, nigrum, continentes, sed plura, eaque maxima ex parte in corniculi modum recurua. Verùm tempore florescentiæ ipsius anno illo copiosæ erant pluuie & postea succedebat calor Solis feruidior. Porro si quis singula velit ad amissim examinare, facillimè differentia maioris & minoris esset reperiri, solummodò discrimine in spica vel longiore vel breuiore constituto.

Locus & tempus.

Descriptio

Secalis ror.

SECALE LATIFOLIA C. BAVHINI.

Cylmis Secali primo siue latifolio [vt in pin. vocat] in prodromo descripto, exurgit candidantibus, rotundis, striatis, quibus spica palmum longa, crassa, aristis longissimis, & vt in vulgari tenuissimis denticulis exasperatis armata, infidet: folia habet cubitum longa, vnciam lata, & per marginem leuiter exasperata, grana non vidimus, spicam & folia ex horto Nobiliss. Contareni, Senatoris Veneti, habemus.

NACHANI GARCIAE.

CAP. IX.

Nachani Garciae sementis nigrae & minutæ, sapore secales, conficiendis panibus aptæ, etiam meminit is, teste Clusio, qui naufragium Natus Sancti Benedicti nomine, quæ paulò supra Promontorium Bonæ spei ad scopulos allusa est, descripsit, atque Sinapi similem esse, sed nigriorem, cuius farina in panes orbiculares subacta, vescuntur tota illa Aethiopiæ ora maritima, præsertim inter A.S. Christophori, & cum qui à S. Lucia nomen accepit.

Sinapi similis.

Synonyma

C. Bauh. pin. Secale 5. siue Secali affinis peregrina, Nachani Garciae, Secales peregrinum genus n. Lugd.

SECALE LVXURIANS C. BAVHINI

QV. 12.

Secale 4. siue luxurians [vt in pin. ait] est Clausii-Siliginis Lon. Secalis mater, Thal. tit. de gra. Tom. II.

VSTILAGO.

CAP. X.

Descriptio Egetum siue frugum, præsertim spicatarum, Smaximè Auenæ & Secales, Dodonæo Auenæ & Tritici vitium est. Vstilago [*rusticus*, Rubigo vertit Gaza apud Theoph. 8. hist. cap. 10.] vbi in spicam abieculum apparere solita; si pluuia madens incerti Solis sentiat feruidiores radios: culmo, foliis nequitiam degenerante, sed granis in fuscū fuliginosum puluisculum commutatis, qui vel solus



vel salua, liquorēve subactus, eiusmodi colore curam non. C. Bauh. pin. triplicem Vstilaginem nominat. i. Vstilago fecales. Vstilago, Trag. Dod. [cui Auenæ ac Tritici propriè morbus] Lon. Lob. Lugd. [cui præsertim Auenæ pestis est.] Vstilago fecalina, Tab. II. Vstilago hordei, Vstilago polytichi, & Vstilago hordei dytichi, Lob. icon. Vstilago hordeacea, Tab. III. Vstilago Auenæ: & Lob. ic. Vstilago Auenæa, Tab.

De Vstilagine, cernentia Theoph.



Plenilunio gignitur.

prodit. Rubigines frumentacea magis, quàm Leguminosa: & inter frumentacea hordeum magis, quàm Triticum sentit, & inter hordea aliud plūs, aliud minūs, sed præcipuè dixerim achilleis. Nec segetum situs, naturæque parum refert: tractus enim excelſi, perflatique, rubiginem nullam, aut minimam sentiunt. Concaui & flatibus nullis expositi contrà frequentissimam habent: gignitur hæc plenilunio. Libro autem causar. 3. cap. 27. sub æruginis [vt Gaza interpretatur] nomenclatione de eadem sic scribit: Semina quocumque ad fertilitatem idonea, & vitia quæ accidere solent, haud ignorare oportet. Locis enim cavis & à flatu silentibus segetes æruginē infestantur: aufugiunt hoc vitium quæ stant non erecto, sed paruo cacumine. Quamobrem spicam inclinari uile est, vt imbres decidunt, nec rores excipi possunt.

linet. Inclinantur magis quæ longæ sint: manent erectius latæ ac breues: quo fit, ut istæ æruginem sentiant. Iuuat & multò à foliis spicam distare, humorem enim in foliis magis concipitur. Iraque si propinqua sit, tangitur statim: si remota, non æquè inficitur. Quamobrem hordeum achilleis vocatum, æruginosum, tam nigrum quàm candidum est, spicam enim gerit erectam. Contrà genus, quod eteocritum vocamus, quia incuruatur, ab æruginē innoxium est. Segetes vento expositæ minūs æruginē infestantur, motus enim humorem discutit. Nam & cum post imbrem flatus secutus, & non deinde successerit, ærugo minūs conficit. Flatus enim humorem dencit, & Sol paululū immoratus nullam putredinem conficit, sed prius quàm quicquam ematcescat, humor totus assiccatur atque absorbitur: ærugo autem quædam putredo est, nec putridum esse quicquam potest sine alieno calore. Triticum plenilunio potissimū æruginē capit: ratio in calore est, quo etiam noctu Luna putrefacere potest. Infirmita, fragilioraque sunt omnia [vt simpliciter loquar] alba quàm nigra, tam in plantis, quàm in animalium genere. Igitur quod semina locis conuenienter eligi debeant, plenisque rationibus constat. Morbi autem [vt in summa dixerim] omnibus ob alimentis celique temperiem eueniunt: videlicet cum plūs, minūsve alimentū præbetur, aut ærimmodicè humidus, fuscus est, vel etiam cum non tempestiue humescit.

Cæleste frugum vinearumque malum, nullò minūs noxium rubigine dixit Plinius lib. 8. cap. 17. Frequentissimam autem hanc in rosido tractu, coruallibusque ac perflatum non habentibus: E diuerso carere eā ventosa & excelſa. Capite 28. hæc subdit. Plerique dixerunt rorem inustum Sole acri, frugibus rubiginis causam esse, & carbunculi vitibus. Quod ex parte falsum arbitror, omnemque vredinem frigore tantū constare Sole innoxio. Id manifestum fiet attendentibus. Nam primū omnium non hoc euenire, nisi noctibus & ante Solis ardorem, deprehenditur, totumque Lunari ratione constat: quoniam talis iniuria non fit nisi interlunio, plenæ Luna, hoc est prævalente: utroque enim habitu plena est, ut sæpius diximus. Sed interlunio omne lumen, quod à Sole accepit, calorem reget. Differentia utriusque habitus magna, sed manifesta. Namque interlunio æstate calidissima est, hyeme gelida. E diuerso in plenilunio æstate gelidas facit noctes, hyeme tepidas. Causa euidens, sed alia redditur à Fabiano, Gracisq; autoribus. Aestate enim interlunio necesse est cum Sole nobis proximo circulo currat, igne eius cominus recepto candens: eademque interlunio abiit hyeme, quando abscedit & Sol. Item plenilunio æstuo procul abeat aduersa Soli: hyeme autem ad nos per æstium circulum accedat. Ergo per se rosida quoties alget, infinitum quantum illo tempore cadentes pruinas congelat. Ante omnia autem duo genera esse cælestis iniuriæ meminisse deberimus. Vnum quod tempestates vocamus, in quibus grandines, procellæ, cæteræque similia intelliguntur, quæ cum acciderint [vis maior in frugibus & terræ fructibus diuina Vipiano dicitur. ff. de damno infecto. l. fluminum] vitium autem. Eidem calamitosa tempestas. ff. de loc. & cond. l. ex conducto, eod. tit. Causa exponit *rusticus*. Porro calamitosam grandinem à demonibus immitti scribit Theophr. cap. 9. lib. 5. causis.] vis maior appellatur. Hæc ab horridis sydenis exeunt, ut sæpius diximus, veluti Arcturo, Orione, Hoedis. Alia sunt.

sunt illa, quæ silente cælo serenisque noctibus sunt, nullo sentiente, nisi cum facta sunt. Publica hæc & magnæ differentię à prioribus, aliis rubiginem, aliis vredinem, aliis [Caniculam legit Turnebus cap. 23. lib. 24. Aduersar. eamque interpretatur syderationem & carbunculacionem, quæ facta afflantur, & ad sterilitatem castrantur, cum caniculainfana messes coquat, æstuosque impetu suo omnia torreat,] carbunculum appellancibus, omnibus verò sterilitatem. Et hæc Plinius, de quibus earumque causis fusiùs capite sequenti, 29. sc. scriptis, quæ hic subdere nimis tædiosum foret.

Cæterum nascitur Vstilago Aprili & Maio mensibus, cum cæli tempestas crebrè inconstans, aliàs nubiosa, aliàs serena, feruens fuerit, tunc enim spicæ humore madidæ, a Solis furore corumpuntur, ac quodam modo, vt aiunt, aduruntur.

HORDEVM VETERIBVS ET NEOTERICIS IN GENERE.

CAP. XI.

Dioscorides vnus duntaxat Hordei meminit: Dat Theophrastus lib. 8. hist. cap. 4. plures eius differentias & genera recenset. Hordeum, inquit, latiori folio quam Triticum conditur, nec tunicis integitur, sed nudum consistit: hoc enim omnium maximè caret tegumento. Quin etiam culmus breuior hordeo, quam Triticum est, & spica minus discreta à foliis emicat. Palea quoque infuauior, quæ ex hordeo, quam quæ ex Triticum, vt pote quæ minus fucci retineat, & durior sit. Ad hæc hordeum à Triticum differt, quod hordeum in versis spicatur, triticum nullo versu conditum est, sed æquale vndique constat. Genus totum ad genus tales ingerit differentias. Rursus eorum vtrumque in plura genera ipsis etiam fructibus, & spicis & reliquis formis atque etiam viribus affectionibusque discreta, diuidi sanè potest. Est enim in hordei genere aliud binis versibus, aliud ternis, quaternis, cumque plurimum lenis, est enim vel huiusmodi quoddam genus. Quod verò pluribus constituit versibus, hoc semper ferè spissius, positiusque arctius constat: Magnam & Indicum differentiam facit, quandoquidem ramis natum sit brachiari, vt proposui. Et spicæ verò aliis grandiores, rarioreque constant: aliis minores, frequentioresque, & aliis distantiores à foliis, aliis proximiores, vt achilleis cognomine. Et hordeorum ipsorum aliud rotundius, minusque: aliud oblongius, maiusque, atque in spica rarius. Item aliud candidum, aliud accedens ad purpuram, quod & farinam reddere copiosius creditur: & contra hyemem, & flatus, & in totum contra cæli mutationes candido validius esse videtur. Hæc genus Theophrastus. Hordeum autem ad purpuram accedens, in India Occidentali, femine ex Hispania delato, sæcundus & vberius nascitur, vt habetur in Hist. Ind. Occid. parte 9. cap. 31.

Columella lib. 2. cap. 9. Hordei duo genera tradit. Est, inquit, hordeum, quod rustici hexastium, quidam etiam Cantherinum appellant, quoniam & alia animalia, quæ ruri sunt, melius quam Triticum, & hominem salubritus, quam malum triticum pascit. Nec aliud in egenis rebus magis inopiam defendit. Seritur soluta siccaque terra, & vel præualida, vel exili, quia constat arua segetibus eius marcescere, propter quod pinguisimo

agro, cuius nimis viribus noceti non possit, aut macro, cui nihil aliud committitur. Altero sulco seminari debet post æquinoctium media ferè sementi, filato solo, si fragili maturius. Iugerum quinque modii occupabunt. Idque vbi paulum maturuerit, festinantius quam vllum aliud frumentum demetendum erit. Nam & fragili culmo, & nullà vestitum palea granum eius celeriter decedit, iisdemque de causis facilius teritur, quam cætera. Sed cum eius messem sustuleris, optimum est noualia pati anno cessare, si minus stercore saturare, & omne virus, quod adhuc inest terræ, propullare: alterum quoque genus ordei est, quod alii distichum, galathicum nonnulli vocant, pondens & candoris eximii, adeo vt tritico mistum egregia cibaria familiæ præbeat. Seritur quam pinguisimis, sed frigidis locis circa Martium menslem. Melius tamen respondet, si clementia hyemis permittit, cum seminatur circa Idus Ianuarias. Iugerum sex modios postulat.

Palladius Ordeum galathicum, quod graue & candidum ait, ferendum præcipit locis frigidis circa Martias Calendas. Cantherinum verò Octobri, macra & sicca terrâ, vel multum pingui.

Plinius lib. 8. cap. 7. 'Hordeum inter frugum genera recensens, frumentum constituit hybernium, vt quod circa Vergiliarum occasum (Noeumbri) satum terrâ per hyemem nutriatur. Multis raditur fibris, sine ramis: erumpit à primo satum die septimo. Ex eo autem alterum caput grani in radicem exit, alterum in herbam, quæ & prior floret. Radicem crassior pars grani fundit, tenuior florem, fructus spicis conuenitur, muniturque vallo aristarum quadruplici: genicula hordeo sunt octona, nec ante dictum geniculorum numerum conceptus est spicæ, qui vt spem sui fecit, quatuor aut quinque tardissimè diebus florescincipit, septemque tardissimè deflorescit. Hordeum vtrumque [distichon & polytichon: vel nudum quod *γυμνέον*, & glauia sua vestitum, intelligit Dalech.] & quicquid in stipula est, in cacumine vnum folium habet, & quidem scabrum, vt reliqua: cum defloruit, crassefcit, maturaturque cum plurimum diebus quadraginta: In Aegypto sexto à satum mense metitur, in Hellade septimo, in Peloponneso octauo. Hordeum maximè nudum: ei calamus humilior, quam Frumentum, arista verò mordacior. In area exteritur. Leuissimum ex frugibus hordeum: primum ex omnibus frumentis feritur. Indis satuum & syluestre, ex quo panis apud eos præcipuus. Spicæ quædam [Distichi hordei.] binos ordines habent: quædam [polystichi.] Cantherium Columella vocat, Dal.] plures vsque ad lenos. Grano ipsi aliquot differentie, longius, leuiusque, aut breuius, aut rotundius, candidius, nigrius, vel cui purpura est. Vltimo ad polentam, contra tempestates candido maxima infirmitas. Hordeum frugum omnium mollissimum est: feri non vult, nisi in sicca & soluta terra, ac nisi lata: ex omni frumento minimè calamitosum, quia tollitur antequam Triticum occupet rubigo. Hordeum sulculo [hordeum sulculo, legit Turnebus c. 24. lib. 1. Aduersar. quod non cibariis, vt Triticum, sed loculis feratur, & foris vendatur. Alii legunt, seculo, quia *φασέλιον*, id est, alendis pascendisque animalibus gratum. Columella cap. 9. lib. 2. hordeum altero sulco seminari tradit. Ex illo autore videtur hæc linea transcripta. Sarculo, interpretor, terra leuissimè mota, & tantum suspensa, vt sit farriendo.] feri dicunt, propterea celerrimè redit, fertilissimumque: quod in Hispaniâ Carthagine Aprili mense collectum

Granum
decidit.

Hordeum
alterum
Galathicum.

Sationis
tempus
Palladii.

Trinum
hybernium
Plinio.

Hordeum
distichon
polytichon.

Leuissimum
ex frugibus.

Differentia.

Mollissimum.

Minimè
calamitosum.

Fertilissimum.

est, hoc feritur eodem mense in Celtiberia: eodemque anno bis nascitur. Rapitur omne à prima statim maturitate festinantius quam cetera. Fragili enim stipula & tenuissima palea granum continetur. Hordeum festuca enecat (pergit c. 17.) quæ vocatur ægilops: Catonis sententia est, feri in nouali & in aruo, quod restibile possit fieri, & loco temperato. cap. 24. Virgilius inter Equinoctium Autumni & Brumam feri iubet. Serere in iugero temperati soli iustum est modios decem.

Cardanus refert in Atholia Scotiz regione Hordeum absque semine produci: in Cappadocia verò sine cortice.

Anistoteles de mirab. author est circa Scythiam & Medorum dictam Thraciz regionem, locum esse viginti ferè stadiorum spacio, qui Hordeum producat, quo homines vescantur: equi verò & boues abstineant: imò lues etiam & canes excrementa hominum, qui mazam aut panem ex Hordeo illo comederunt, auersentur, tanquam mortis periculo.

Ruellius ex rusticorum obseruatione Hordei duo genera memorat, hexastichum, quod quoddam cantherinum appellare refert, quod folliculo castratum enascatur: Gallos, qui hoc ferunt, mundum vocare ait Hordeum, quod spontè grarum glumâ concidat, cum in reliquo non nisi ægrè deglubatur. Alterum distichum statuit, quod Galaticum nonnullos nominare scribit, ponderis & candoris eximij, ad eò vt Trinco mistum egregia cibaria familiaræ præbeat. Alibi tamen Oryzam Hordeum galaticum ab aliquibus appellari tradit. Ad hoc genus reducendum putat trimestre quoddam Hordeum, quod gallicè *Securgeon* dici narrat, quòd rebus ad egestatem adductis, cum annonæ premit penuria, plebem alar & famis noxa vindicet. Errare autem eos addit, qui secundum hoc genus Oryzam esse interpretentur. Nominat & Eteocithon genus Hordei quod tutum à rubigine sit, quoniam incuruum nascatur. Ceterum, Hordeo plures senis spicarum versus Theophrastum secutus, falsò denegat. Cui porro spica folio perquam proxima est, amplitudinis & crassitudinis maioris, & ob id propensius obnoxium ærugini, hoc Achilleis à Theophrasto, & Achilleas ab Hippocrate cognominari contendit. Omnia autem eo capite confundit.

Genera duo
multa.
Matur.

Matur.

Dod. disse-
ventis forte
septem.

Dodon. Latinus in Hordei genere, quod pluribus verbis spicatur, *polystichon* appellat. Quod sex versuum *ἑξαπύλον*: Cantherinum hoc Columellæ ait, Aliud duorum versuum, *διπύλον*, Columellæ Galaticum, Germ. fuerit *gersten*. Quod magnum & plenum, spicamque gent erectam, Hippocratis, ærugini obnoxium: quod verò incuratur, *ἰνέουον*, ab ærugine minus infestatum. Meminit præter hæc, & hordei trimestris, *Securgeon* gallicè dicti: item & hordei Gallicæ mundi, *grano nudo* quod *καυαίριον* Galen. de alim. facult.

esse suspicatur.

Vniuersæ Europæ, & multo vti notissimum Lobelius, Lobelius in Adv. variare scribit magnitudine, colore, spica, gluma, versu, statione, proventu, & vtu. Nam, vt ait, culmis procerioribus è grano plenior, maiore, coloreque rubello prouenit. Sed insigniori differentia est in glabritie, nuditateve grani. Siquidem oritur hordeum, aut follicello pertinaci adhæso granum sepiente, aut leuiore gluma & exutu facili, cuiusmodi est illud genus quod nudum vocatur vulgò. Notissimum nostras quod à sementis occasione in Autumnale & Vernalium diuiditur. quippe illud pinguiori veruato, vel restibili mandant, eoque corpulentius maiusque stipula & spica euadit. Vernalium verò, vt minore perficitur spatio, sic minus granum minusque alens è graciliore tum stipula tum spica promit: proportionem quadam cum Siligine trimestri. Alimenti & medicatis cibis plurima commendatio: deglubitum maxima vi vernalium fertur hodie è Germania superiore in Belgicam, Angliamque Septentrionales plagas, omnino glumis nudatum quod mundatum vocant, Reliquæ Galliæ officinæ ligneo pistillo affusa feruida pauca, mortuarioque inditum, hordeum leniter tundendo tunica paleas exuunt, mundumque vocitant, ad pulnam, orbitiunculas, aliaque pulcillas, agris non parum accommodas faciendas. Est illud manu suauis, album, pellucidum, & transparent, minùque vtrumque quam viticum viscidum, minusque vel calidum, vel pingue. Eoque pleureticis & Hepaticis multò vtilius. Nam potionibus diurnis diuturnique temetis, cuiusmodi Galliæ quædam pars inferior aut Germania, Russia, Flandria, Anglia, Hybernia, Moscouia, Nortuegia, & Suecia potat, ceteraque gentes ad Septentrionem, non exiunt: sed triduum integris granis maceratur ad Nauticæ confectioem. Vt in *Apera*, *Zybo*, *Curmi* & cæteris temetis latius dicturi sumus.

In Aduersariorum altera parte Hordeum distinguit in distichon & polydistichon. Hoc iterum diuidit in Autumnale & Vernalium. Nominat præterea Hordeum spica mutica, Borealibus Britannis *Barly* simpliciter vocatum, quod nunquam vidit.

Casalp. de Hordei differentiis agens, nobis admodum obscurus apparet. Hordeum, inquit, semen est in medio crassum, & rotundum, vtriusque extremis in acutum desinentibus, cortice potius quam folliculo inclusum: adhæret enim semini, vt cum labore auellatur: ponuntur semina in spica nulla alia protegente membrana, idè nuda videntur vt Speltæ: & similiter in aristam desinunt, longam, & asperam, aliquando binis versibus, vt vnicum vtrinque semen ordine procedat: longissima spica, quod genus *Ordeolam* vulgò appellant: in montibus & locis frigidis, sciam breuiori grano, ac rotundiori, candido, quo pro Farre vtuntur. Ad hoc genus referri videtur de quo alibi ait, qui Zea vtuntur non habent Far per Zeam intelligit, quæ in Campania semen appellatur, ex qua fit alia. Alterum genus Hordei similem spicam fert paulò breuiorem, granis tenuibus, vtrinque alternatim ad latera inclinatis, vt in spelta, in montibus Lucensibus *Scandollam* vocant, ex qua panes faciunt reliquo Hordeo meliores: sed iumentis noxia est: nam alium turbat. Galenus fortè hæc genera Hordei inter Olyras recensuit. Dioscorides Tragum inter fruges (nam & alia est Tragos inter herbas medicas Scorpius cognominata) Chondro similem

sem figura tradit &c. Plinius Tragus externum esse semen ab Oriente inuectum Oryza simile. Hordei aliud genus est, crassius, in spica breviori, rotundiorique, quinis ordinibus, tardè quaternis, aliquando senis, quo maximè vtuntur ad iumentorum nutrimentum, & rustici ex eo panes faciunt: primum metitur inter fruges, magnum in penuria suo præcoci aduentu afferens adiumentum: huius quoddam genus est, cui cortex spontè abscedit, vnde *Hordeum mundum* vocant, quod facilius cōcoctionis est, & succulentius in Pusana conficienda. Plinius hordeum glabrum vocat in Bœotia & Aphrica. Et Galenus hordeum nudum in Cappadocia corticis expert. Theophrastus hordeum describit latiore folio quàm Triticum.

In India quoddam genus Hordei sylvestris est, ex quo Chondrum bonum faciunt. Dioscorides vnum tantum genus ponit, quod candidum purumque est.

C. Bauh. pin. Hordei quatuor species assignat, Polylichum, schybernum & vernum, Distichon, & Cauliticum. Nos septem eius differentias mox infra describemus.

Καὶνὸν Græcis, Lat. *Hordeum*, Hebræis *Scheorah*, Arab. *Xahær*, Germ. *Gersten*, Belg. *Geersten* Gall. *Orge*, Ital. *Orzo*, Hisp. *Cenada*, Anglis *Barly*, Bohem. *Geschmen*. *Καὶνὸν* potè ἀπὸ τοῦ δανεύειν, quodd eo reperto & in vsum recepto glandibus spiritis, à brutis homines distincti sunt. Artemidorus nobis auctor est Hordeum molestiam atque laborem significare: quia difficultè molatur, pinaturve, neque facillè in ventriculo concoquatur, à naturæque subigatur.

De hordei, eiusdem Pusanae, farinae, Polentae, Zythi, atque, Cummi, viribus, & vsu sequentia Dioscoridem prodidisse reperimus. Hordeum optimum est candidum & purum, sed minus quàm triticum alit: pusana tamen ob cremorem quem inter coquendum reddit, plus alimenti præbet, quàm polenta ex eodem hordeo facta. Est autem illa efficax contra acrimoniae atque arteriae asperitates & exulcerationes: ad quas itidem conuenit triticea pusana, quæ quidem & plus alit & potentius vias mouet. Iactis verò vbertatem præstat, si cum fœniculi semine decocta sorbeatur. Vrinam potè ciet hordeum, absterget, flatulentum est, stomacho aduerfatur, & oedemata concoquit ac maturat. At verò ipsius farina cum ficubus & aqua mulsa decocta, oedemata & inflammationes discutit: quin & duritias concoquit rum pice, resina & simo columbino. Cum melioto verò & papaueris calycibus, iis dolorem eripit qui ex latere dolent: aduersus intestinorum inflationes, cum lini semine, fœnogræco & ruta imponitur. Strumas cum pice liquida, cera, impubis pueri vrina, & oleo ad concoctionem perducit: & cum myrto, aut vino, aut pyris sylvestribus, aut rubo, aut malicorici alui profluuia sistit: podagricis in inflammationibus cum cydonio malo aut aceto prodest. Decorticata in aceto ma लगमति in modum, quod ex eadem hydrelæo subacta conficitur, & calens apposita, lepris medetur. Farinæ verò cremor ex aqua cum pice & oleo decoctus, puti mouendo accommodatus est. Ille idem ex aceto elicitur, si cum pice coquatur, contra fluxiones articulorum prodest. Ceterum hordeacea polenta cohibet aluum, inflammationēque mitigat. Ex hordeo Zythum paratur, quod quidem vias cit, tenes ac nervos tentat, sed meningas potissimum offendit: inflationem parit, vitiosumque succum creat, & elephantiasin inducit. Ipso verò maceratum ebur oblequiosum,

& operi tractabile redditur. Fit & ex hordeo potus, quem Cummi nominant, eoque sæpenuerò pro vino vtuntur, verum dolorem capitis infert, prauimque succum gignit, ac nervos lædit. Pantantur & similia potus genera ex Tritico quem admodum in Iberia Occidentali & Britannia.

Ceterum in Dioscoridis exemplaribus capite de hordeo ad finem de polenta pro ἀλφειον falsò legitur ἀλευρον. Et hoc vel ex Plinio patet, qui polysim de hordeo, eiusque farinae, & palarum vsu ac medicina sic differuit. Antiquissimum in cibis hordeum, sicut Atheniensium ritu Menandro autore apparet & gladiatorum [Athletarum, xistionum, Comædorum, nomine continentur gladiatores, arenarii, mirmillones, secutores, retiarii, pugiles, pancratiastæ, xyfici, pantomimi, palæstritæ. Nusquam potè legitur Athenis, vbi Menander vixit, atque adeò nec in Peloponneso tota, nec in Hallade gladiatorum spectacula edita fuisse: quamobrem legendum hic quidem diuinant, & pistorum. Chiffleus tamen legendum putat, Calgatorum, id est, gregariorum militum; quod illis, si quid peccassent, ignominia causa, pro Tritico daretur Hordeum. Festo hordearium æs, quod equiti Romano dabatur pro hordeo emendo, quo equum aleret. Fuerunt & gladiatores equites Galeno 3. secundum genera, Lipsio in Saturnalib. Andabatæ, quibus ex publico dabatur hordeum, quo nutrent equum, vnde fortassis dicti sunt Hordearii, quamvis Plinius de hominum cibatu videatur magis loqui, quàm iumentorum. Sed quid si legas, & Equitum cognomine, qui Hordearii vocabantur. Fuerunt enim Romæ equites gladiatoribus antiquiores. Dal.] cognomine, qui Hordearii, [nunc Studiōsōs, idiotæ sic appellare solent, C. Bauh.] vocabantur. Polentam quoque Græci non aliunde præferunt. Pluribus fit curiosam hordei præparandi rationem ex Pherecrate recitat, Eustathius his verbis, τὰς χειρὶς δὲ πύσσει, tundere, pinlere: πύσσειν, tortere: ἀποστρίπτειν, incerniculo cibrare, aut corbe: αὐτὴν, aqua rursus aspergere: ἀλέσαι, molere: μάζαι, manu subigere: ἀλεγεινὰν adendā apponere.] hæc modis Græc. Polenta ci persusum aqua hordeum siccant nocte vna, ac postero die frugunt, deinde molis frangunt. Sunt qui vehementius tostum rursus exigua aqua aspergant, siccantque prius, quàm molant. Alii verò virentibus spicis [nam ita melior polenta fit] decussum hordeum recens purgant j' à puluere, lapillis, & id genus reliquis sordibus. Madidumque in pila tundunt, atque in corbis elauunt, ac siccatum Sole rursus tundunt, & purgatam molant. Quocunque autem genere præparato, viciis hordei libris, ternas seminis lini, & coriandri felibras, salisque acetabulo, torrentes ante omnia miscent in mola. Qui diutius volunt feruare, cum polline ac fursuribus suis condunt nouis fictilibus Italia sine persusione tostum in subtilem formam molit, isdem additis, atque etiam milio. Panem ex hordeo Antiquis vsitatum vita damnauit, quadrupedumque tradidit reseribus. Pusana [πυσανὴν Athen. lib. 10. dictam vult ἀπὸ τοῦ πύσσειν & αὐτὴν, à tundendo & madefaciendo. De Pusana idem auctor hunc griphum recitat: καὶ δὲ ἀπλοῖν ἐργάσας χελὸν τίς, Hordei decorticati & rursi cremorem bibet.] inde vsus validissimus saluberrimisque, tantoperè probatur. Vnum laudibus eius volumen dicant Hippocrates, & clarissimis Medicinæ scientiæ. Pusanae bonitas præcipua Vticenſi. In Aegypto verò ea est, quæ fit ex hordeo cui sunt bini anguli [ex hordeo disticho, cui sunt bini ordines, vt mox loquetur, & versus.] In Bati-

Cummi

Plin. anis. quiss. in ci. bu.

Plinij lectio suspecta.

Hordearii. Gerstenfresser.

Polenta pluribus modis.

Panis.

Pissana delecta.

ca & Aethiæ genus, ex quo fiat, hordei, glabrum
nos hordei farina & ad medendum vtuntur. Mi-
rimque, in vlu iumentorum ignibus durato, ac
postea molli, offisque humana manu demissis
in aluum, maiores vires, torosque corporis fieri.
Palea ex optimis: stramentum verò nullum com-
paratur. Meliorem etiam Polentam fieri tradunt,
si non excocta maturitate tollatur. De ipsa ratio-
ne pisendi, Magonis proponitur sententia. Hor-
deum antè perfundi aqua multatubet, postea e-
ualli, deinde Sole siccatum pilo repeti. Huius sex-
tarios viginti spargi duobus sextariis aquæ. Pa-
leam calidam imponi ramicum incommodis ex-
perti iubent, quæque decocta est aqua foueri.

Hordeaceus panis Erulia aut Cicercula olim
fermentabatur. Farina ex Hordeo & cruda & de-
cocta collectiones impetusque [humorum flu-
entium impressiones & incursus] discutit, lenit
& concoquit. Decoquitur aliàs in multa aqua,
aut siccata. Ad iecinoris dolores eam cum
posca concoqui opus est, aut cum vino. Cum verò
inter coquendum discutiendumque cura est,
tunc in aceto melius aut in fæce aceti, aut in co-
toneis pyris decoctis. Ad multipedarum [Seo-
lopendarum] morsus cum melle, ad serpentium
in aceto, & contra suppurantia, ad extrahendas
suppurationes [Galenus lib. 2. ad Glauc. cataplas-
mate ex hordacea farina parato discuti posse tu-
mores suppuratos pollicetur, si exiguum pus est,
si cuti vicinum, si tenue] ex posca addita resina &
galla. Ad concoctiones verò & hucera veteta,
cum resina. Ad duritias cum fimo columbarum,
aut siccata, aut cinere. Ad neruorum inflam-
mationes aut intestinorum, vel laterum, vel viri-
lium dolores, cum papauere aut meliloto, &
quoties ab ossibus caro recedit. Ad strumas
cum pice & impubis pueri vrina. Cum oleo & œ-
nogreco contra tumores præcordiorum, vel in
febris cum melle vel adipe vetusto. Suppuratis
tribricea farina multò lenior [ad concoquendum
humore, & dolorem mitigandum aptior.] Ner-
uis cum hyoscyami succo illinitur: ex aceto &
melle lentigini.

De Polentæ generibus in frugum loco satis
diximus, locorum ratione [quoniam eo loco de
Hordeo tractaretur, & eodem loco etiam con-
ueniebat de iis quæ sunt ex hordeo sermonem
haberi.] A farina hordei distat eo quòd torretur,
ob id stomacho vtilis. Aluum sistit, impetusque
rubicundi tumoris. Et oculis illinitur, & capitis
dolori cum menta [melle aut aliqua re frigida, ex Co-
lumell.] aut alia refrigerante herba. Item pernio-
nibus & serpentium plagis item ambustis ex vi-
no. Inhibet quoque pustulas. Farina in pollinem
subacta, vim extrahendi humoris habet: idèd &
ctuore suffusus in fascias vsque sanguinem perdu-
cit, efficacius in sapas. Imponitur & pedum cal-
lo clausque. Nam cum oleo vetere ac pice deco-
cto polline, condylomata, & alia omnia sedis vi-
tia quàm maxime calido mirabilem in modum
curantur. Pulte corpus augetur. Farina, qua char-
tae glutinantur, sanguinem excreantibus datur
tepidam forbendam efficaciter. Hordeum optimum
quod candidissimum. Succus decocti in aqua cæ-
lesti digeritur in panibus quæ recedunt ab ossi-
bus, & eruptionibus pituitæ, muris araneis mor-
sibus. Idem asperso sale ac melle, candorem den-
tibus, & suauitatem oris facit. Eos qui pane hor-
deaceo vtuntur, morbo pedum tentari negant.
Nouemque grans si furticulum quis circumdu-
cat, singulariter, manu sinistra, & omnia in ignem

abiciat, confestim sanari aiunt

Hippocrates, multò plura de ptisana in libro
de ratione victus in morbis acutis, qui liber de
ptisana inscribitur, quàm ipse Plinius, à quo cita-
tur, prodidit, his verbis. Rectè omnibus frumen-
taceis eduleis præfertur in morbis acutis. Laudo
sanè eos qui ipsam prætulerunt. Nam lentor ip-
sius lenis est, & continuus, & incundus, & lubri-
cus: ea verò moderatè humida sitim admittit, &
facile eluitur, si sortè & hoc opus sit: & neque
adstrictionem habet, neque malam turbationem,
neque in ventre intumescit. Intumuit enim in
coctura, quàm maxime tumescere solet. Quicun-
que igitur ptisana in his morbis vtuntur, nulla
die vasa vacua fieri permittant, vitia dicam, sed
vtantur & intermittant, si non ob id medica-
menti, aut infusi per Clysterem vsum, intermitte-
re oporteat. Et qui bis quidem in die cibum cape-
re soliti sunt, eis bis danda est. Verùm sensim
progressu facto, si fieri poterit etiam his bis de-
tur, si sanè opus habere visum fuerit. Ptisanam
porò ex optimo Hordeo factam esse oportet, &
quàm optime coctam, & præstam, si non solo
succo vti velis. Nam vna cum reliqua ptisanæ
virtute, lubricus lentor facit vt Hordeum decor-
ticatum non lædat. Nusquam enim adhæret, ne-
que secundum thoracis reitudinem moram ha-
bet. Lubrica verò maxime est, promptissime sitim
eximit, facillime concoquitur: & debilissima est
optimè cocta, quibus omnibus opus est: Hæc Hip-
pocrates.

Quoquo modo Hordeum paraueris inquit lib.
1. Alim. Galenus, nunquam corpus calefacit, sed
variè pro modo preparationis humectat ac siccatur,
quandoquidem Polenta ex fixo Hordeo facta,
siccate perspicue cernitur, ptisana verò hume-
ctat præcipue quum vt decet, parata fuerit, hoc
est, cum in coctione quamplurimum intumuerit:
postea igne lento per multum otium in chylum,
siue cremorem fuerit redacta. Acetum ei tum
admiscetur, cum planè intumuerit. Cum verò
cocta exactè fuerit, sub edendi tempus salem
tenuem iniicere oportet. Oleum autem si intus
statim inieceris, coctioni nihil nocueris. Aliud
tamen nihil est miscendum, nisi velis anethi, aut
porri quippiam, idque intus statim immiscere.
Video autem ptisanam à coccis omnibus pessimè
præparari: In mortario namque crudam ip-
sam tundentes, non ad ignem coquentes dissol-
uunt. Sunt qui Amylum etiam iniiciunt, vt per
coctionem in cremorem copiosum videatur esse
redacta. Talis certè ptisana meritis maxime est
est flatuosa, & concoctu admodum difficilis. Quæ
verò in ptisana rectè præparanda prætermisi, ea
nunc adicere oportet. Crudam ptisanam ali-
quandiu in aqua præmaceratam, deinde in mor-
tario iniectam, manibus terere conuenit, aspe-
rum quidpiam manu tenentibus. Vsque ad au-
tem terenda, dum qui in superficie est cortex, sit
abiectus: is enim quo vestitur, ceu tenui tunica,
non totus inter pinfendum abicitur. Quapropter
& præmaceratur, & in mortario tunditur.
Quod si non quicquid est accersiderit, elixa
ptisana magis quidem deterget, nullam autem ra-
tionaliam noxam accipit. Pessima est ptisanæ præpa-
ratio, cum vbi coci crudam ipsam in mortario
cum aqua contuderint, deinde parum coxerint,
sapam iniiciunt. Quidam cum his mel quoque &
cuminum iniiciunt, cinnum quemdam verius
quàm ptisanam parantes. Verùm quæ rectè præ-
parata est, vtilitates quas memorat Hippocrates
tum ægrotis præstabit. Hæc Galenus de ptisana fa-
cultate tradidit.

Ptisana

Puissana autem à verbo Græco *πύσσειν* nomen accepit, quod tundere & decorticare significat. Hoc primum quidem generale nomen est frugum omnium decorticatarum, tufarumque, & cum duerlarum frugum generibus copulatum, alia atque alia puissana genera significat. At simpliciter, & sine adiectione posita, hordeum excorticatum, ob eius præstantiam tantum significat. Hæc autem, vt ex variis Galeni locis, quorum nonnullos ponemus, colligi potest, hoc modo fiebat: hordeum in aqua maceratum dum extumescat, in Sole siccatur: mox in pila ligneo pistillo tantisper tunditur, dum corticem exuat. Hoc in aqua lento igne coquitur, donec succulentum reddatur. Galenus, quod sciam, aquæ & hordei mensuram non exprimit. Oribasius vni parti hordei decem partes aquæ miscet. Paulus vni parti Puissana quindecim partes aquæ.

Eius paranda modum tradit Didymus in Geopon. Cassiani: hordeum maceratum tunditur, & in Sole siccatur, sicque reponitur: inspergitur deinde quod ex ipsa est tenuius, quoniam eam conseruat. Ea humidior sumpta maxime nutrit. Vni parti hordei decem partes aquæ iniiciuntur, & salstatu ipsi inspergitur. Fit etiam ex Tritico Puissana eodem modo.

Hodie Medici Hippocratis, Galenique Puissana non vntur, sed eius vice hordeum integrum suspensa mola decorticatum, quod *Hordeum mundum* vocant, tantisper in aqua decoquant, dum pulvis speciem referat: deinde tidunt, & tenui incerniculo percolant, saccharum addentes, & modo cum saccharo Amygdalarum dulcium cremorem, aut feminis Melopeponum, aut feminis Papaveris, modo aquam ex rosis stillatitiam pro variis scopis & varia morborum ratione. Nostro tempore, inquit Dodonaus, raro aut nunquam horum [quorum Galenus meminit, acetis scilicet, olei, Anethi, aut Porri.] aliquid additur, sed saccharum ferè, & aqua è Rosis albis stillatitia ei admiscetur, & lubinde Amygdala aliquot amara, vt palato gratior fiat: aut seminum Melonum vel Cucumeris nonnihil, præsertim quando impensius refrigerandum, aut somnus ei conciliandus est. Admiscetur ei & nonnunquam Amygdalarum dulcium *πυλά*, siue succus (Officina lac Amygdalinum vocant) præsertim cum aluum liquidiorem cohibere utile est.

Fit & hodie à Pharmacopœis potio, quam Puissanam *πύσσειν* vocant, Galli *Tisane*, cum nec Puissana sit, nec Puissana cremor, sed eius tantum tenuius decoctum, ipsius substantiæ parum, aut nihil retinens. Fit enim ex hordeo mundato, Glycyrrhiza, & visis passis. Qua ratione parata potio utilis est iis qui inflammatione pulmonis, partiumque respirationi seruientium, vel renum, vesicæque exulceratione laborant.

Porrò, eodem Galeno auctore, hordeum non eandem cum Tritico facultatem habet. Siquidem hoc palam calefacit, illud verò non modò non calefacit, sed quoquo modo ipso vtare, siue panes ex eo feceris, siue puissanam coxeris, siue polentam, vim quandam refrigerandi habere videtur. Dissidet præterea à Tritici natura succi specie, quem vtrumque ipsorum gignere consuevit. Siquidem Triticum crassum ac lentum, hordeum tenuem, & nonnihil detergentem succum in nobis creat. Panes omnes hordeacei Triticeis minus aunt, qui tamen ex præstantissimo hordeo conficiuntur, minus à Triticeis in eo superantur, qui verò ex laxo ac leui, panibus fursuraceis respondent. Panes quidem ex hordeo sic laxo citissime

per aluum subeunt, quod reliquis etiam manifestum est, si cum Triticeis eos contuleris. Sunt autem non modò Triticeis, verum etiam Olyrinis, & multò adhuc magis Typhinis friabiliore, nihil in se lentoris, vt illi, habentes. Ex quo perspicuum est, exiguum corpori præbere alimentum, & potissimum si facti ex peiore hordeo fuerint. Idem rursum: hordeum primi est ordinis in refrigerando & exsiccano: habet etiam paululum absterisionis.

Polentam verò (quam Græcè *ἀλεπτειν* proprie vocat, quamquam *ἀλεπτειν* etiam de omni alia præsertim rudiore farina improprè dicatur) ex recenti hordeo mediocriter fixo laudatissimam fieri scripsit, cuius si copia non sit, & ex alio ipsam confici. Cum autem polenta omnis rectè facta boni sit odoris, eam esse suauem olentissimam, quæ ex optimo ac recenti hordeo, & quod aristam non admodum siccam habeat, est confecta. Compluribus autem per sanitatem morem esse eam sapia & vino dulci multoque commixtis, non nunquam etiam foia aqua conspersam, ætate duabus, tribusve ante balneum horis bibere, dicereque sentire se hoc potu sit liberari: si autem cum vino austero fuerit pota, ventrem desiccare. Polenta Gentes quasdam pro pane vti, idque rusticos in Cypro facere, tamethi frumenti plurimum metant. Veteres militibus Polentam præbuisse. Romanos tamen milites ipsius imbecillitatem damnautes, eam non amplius nunc vti. Exiguum enim corpori alimentum dari, priuatis quidem, & omni exercitatione abstinensibus, satis multum: iis autem qui quoquo modo exercentur, minus quam satis est.

Ceterum, cum Polenta hordei fixi farina sit, vt ex Plinio & Galeno diximus, Aëtius non dissimilem huic rem descripsit, sed *Cubba* appellari ait, quod nomen à nullo alio usurpatum fuisse meminimus: Ex eorum, inquit, quæ tumores cohibent numero, est & id quod Byne appellatur. Est autem hordeum madefactum quod germinet, vna cum enatis ligulis tostum, si tritum pro cataplasmate imponatur. Hoc nomine Aëtius indicat hordeum ad Ceruisiam conficiendam præparatum, quod *Maltum* vulgò appellant, Germani *Malz*.

Ceruisia autem, ad cuius decoctionem illud conficitur, Germanis Byre, Gallis Biere dicta, parum à Byne distat. Laudatissimum sic Maltum mensis Martio & Aprili. Qualitate sicca præditum est, maiore quam in hordeo, frigida multò remissiore. Nam empyreuma quod illi ab assatione diutinaque coctione accedit, siccitatem eius auget, frigiditatem verò non solum minuit, sed & caliditatem quandam ei imprimit.

Quare Galenus cum scribit hordeum, quoquo modo quis eo vtatur, siue Puissanam coxerit, siue polentam fecerit, vim quandam refrigerantem retinere, id de Malto intelligere non potuit, quod partim ipsa germinatione, partim longiore tostione magis à natura sua recessit quam polenta, quæ vel ex crudo nondumque maturo hordeo, vel in aqua macerato tantum conficitur. Absterget præterea multum hordeo vehementius, tum quia farinæ minus, glumarum plùs habeat, tum ob empyreuma, quod absterisionem coniunctam habet. Ventris torminibus, aliisque similibus ex frigida causa doloribus Maltum subuenit, tostum feruēque in sacculo appositum. Polenta multò plùs hordeo desiccatur, inquit Galenus, aluum etiam cohibet auctore Dioscoride, & inflammationes mitigat. Tamen in vulgatis Diosco-

indis exemplaribus legimus, τὸ δὲ αὐτῷ ἀνεῖρη, &c. id est, farina ex his alium sinit, inflammationes mitigat, vt de farina hordei de qua multa prius dixerat, hæc etiam intelligantur. Sed exemplaria falsò ἀνεῖρη pro ἀνοῖτον habere contendit Cognatus, vt ex Plinio intelligere licet.

Galenus quoque scribit polentam multò magis quàm hordeum siccare. Sed quoniam ad τὸ ἀρρίπτει, id est, polentæ discrimen, ἀρρίπτει, & composita voce ἀρρίπτει dicta esse videtur, quid ea sit etiam hic explicandum. Polenta igitur hordei tosti farina est: ἀρρίπτει Galeno, & reliquis medicis Græcis, cruda hordeacea farina est: idèoque Plinius, Polentam à farina hordei distare, quia torretur, ἀρρίπτει cruda hordeacea farina est nulla alia re admixta. Id ex eo perspicuum fit, quod ubique in eius vsu res & liquores exprimuntur, quibus ea farina excipi, & cum quibus subigi, parari, & coqui debeat. Quare falsum est ἀρρίπτει semper significare crudam hordeaceam farinam aqua & oleo subactam, quod in ἐσθλατὶς libello Galeno falsò attributo legitur. Neque solùm cruda hordeacea farina per ἀρρίπτει significatur, sed etiam Triticea. Quapropter nonnunquam ei vocem adiciunt, quæ certam farinæ speciem indicat. Galenus κατὰ τὴν ἐσθλατὶς ἡ καὶ τὴν ἀρρίπτει. In cataplasmate verò vtere hordeacea cruda farina. Quin & sola hæc vox ἀρρίπτει Hordeaceam crudam farinam significat, vt paulò post, ἡ τὴν ἀρρίπτει δι' ἐσθλατὶς γινώσκου. Aut cruda Hordeacea farina cum Oxymelite apparta. Idem alibi ἡ τὴν ἀρρίπτει καὶ τὴν, ἡ πικρὴν ἐσθλατὶς ἀρρίπτει. Aut cruda Hordeacea farina, aut Triticea, in passo cocta. Neque solùm ἀρρίπτει de cruda Hordeacea farina, aut Triticea vsurpatur, sed vniuersè de omni cruda farina. Galenus καὶ ἀρρίπτει τὴν ἐσθλατὶς τὴν ἀρρίπτει ἀρρίπτει, ἡ δὲ ἀρρίπτει, ἡ τὴν ἀρρίπτει, ἡ καὶ μέγιστη ἐκ τούτων. Quin & omelysis ex cruda Hordeacea farina imponenda, aut ex farina seminis lini aut fœnigræci. Et hæc de Hordeo, eius farina, pristina & polenta ex Veteribus dicta sunt.

Maza.

Maza demùm ex polenta humido aliquo permixta & subacta conficitur. Et aliqua quidem, cum sola aqua subigitur; aliæ verò, aut cum vino aut cum oleo, aut cum melle aut cum aliquot horum permixtis. Cum aqua autem eam subigi, præter quod ex libro Hippocratis de dieta secundo satis euident fit, testis quoque est Xenophon sexto παρθίας Cyti, vbi hic concione conuocata, milites suos ad aquæ potione adhortatur, & à consuetis non admodum recessuros ostendit, ἡ δὲ ὅτι, ὅσοι, ἀποστρατεῖ, &c. id est, Etenim qui polenta victitat, Mazam aqua permixtam edit, & qui pane vititur, panem aqua subactum. Subigi verò Mazam, & cum vino, ex Hippocratis libro de intern. affect. apparet, vbi in hepatico morbo, cui suffocatio accedit, & similiter in coxendicæ dolore, eam quæ vino dulci subacta est non edendam consulit. Idem mazam oleo & melle quàm maximè subactam, in typho quodam eodem libro exhibendam præcipit. Hefychius verò μάζαν interpretatur, polentam aqua & oleo permixtam.

Et à principio, Athenæus ait, popularem cibum ex Alphitis, Mazam Veteres vocarunt, ipsamque præparare μάζαν dicebant, postea verò necessarium victum, ob intemperantiam varietate distinguentes, studioseque paulatim immutantes, nomen ipsum Maza in μαρτίαν commutauerunt, ita appellantes omnem cibum magnificum; μαρτίαν verò ipsos cibos præparare dixerunt. Atque inde fortasse, quæ ex Amygdalis & Sac-

charo placente conficiuntur, in officinis Masse-
panes, hac ætate adhuc nominantur.

Porro Maza, vt Galenus ait, panibus Hordeaceis ægrius concoquitur, magisque ventriculi flatu implet, in quo etiam si diutius manferit, turbationem excitat. Citius autem subducitur, si commixta citius fuerit ac subacta. Quid si mel quoque addatur, citius etiam ob id ventrem ad excretionem incitabit.

Zythum porro non simpliciter ex Hordeo præparatur, velut Diosc. ait, sed ex Hordeo torrefacto, ac eo modo præparato, quo ὕμνην præparari Aëtius docuit. Quapropter qui ζύθον ἀρρίπτει πύσιν exponunt, dum ex polenta potum Zythium esse dicunt, propinquius rem designant, quàm qui scribunt, ζύθον ἀρρίπτει ἀπὸ κριθῶν γινώσκου, quum neque vinum sit, sed potius quo vini loco quædam Gentes vtuntur: neque ex Hordeo simpliciter, sed torrefacto præparetur. Id demum crassum in modum molitur, & certa mensura in aqua coquitur, donec omnis ex illo vis in aquam exoluatur, in qua rursus ad certum tempus & modum, flores Lupuli, quem Plin. lupum salicarium dixisse videtur, incoquantur, atque ita Cereuisia in amplum vas per colum transfusa refrigerari, & per se feruere sinitur, donec facibus ad fundum demissis clara euadat: quo facto vasis picatis excipitur, alicubi etiam resinatis: & postquam rursus per se deferebit, bibitur. Quibusdam locis etiam triticum eodem modo paratum, ad hordeum certâ mensurâ addunt, & eodem modo coquant. Et talis Cereuisia ex tritici caliditate minùs frigida putanda est, quàm quæ ex hordeo solo conitit: quod nunquam secundum vllum præparationis modum calefacere, Galen. t. aliment. dicit, sed in Polenta siccari, in pûsana verò humectare. Proinde in libello de conitiuiis veterum Græcorum, & hoc tempore Germanorum, omnia Cereuisiarum genera in communi refrigerare dixi, inquit Cornarius, alia plùs, alia minùs, pro Hordei, ex cuius cum aqua parantur natura. Et addidi, hac de causa excogitatum esse, vt Triticum ad Hordeum in Cereuisiis parandis addatur, quod moderata Tritici caliditas, Hordei frigiditatem contemperet. Et ad eundem modum scripsi lib. i. de peste. Cereuisia etiam si omnis natura frigida sit plùs aut minùs, pro Tritici in aliquibus locis ad hordeum, ex quo cum aqua coquitur, admixtione: tamen & frigiditas, & flatuositas, & malitia ipsarum emendatur lupuli capitulorum ac florum in cocturam additione. Vnde contingit vt quantò minùs de lupulo habeant, tantò sint Cereuisiæ deteriores. Et hæc non tantùm rationem & experientiam, sed etiam Galenum sequutus scripsi. Hic enim lib. 6. simplic. pharmac. maximam in Zytho partem frigidam, & aquosam & acidam esse dicit, vt qui malos humores, & status gignat, velut ex putredine factus; quâquam Hordeo ipso Zythum actiorem esse affirmet, & in acrimonia aliquid calefaciens habere. Si cui tamen Cereuisiam calidam suapte natura esse, & in Hordeo qualitatem innatam permixtam esse, & Cereuisiam per accidens, non aliter ac vinum, refrigerare placet: huic ego suam sententiam iucundam esse sîno, & vt eâ affatim fruatur indulgeo: Nec pro mea tuenda amplius quid afferam, quàm sicut Galenus scripsit, hordeum nunquam secundùm vllum præparationis modum calefacere, sed in polenta siccari, in pûsana verò humectare: Ita etiam in Cereuisia, quæ ex quadam polentæ specie paratur, non ad caliditatem, sed ad siccitatem, mutationem fieri, & hæc tamen

tamen aqua fa ipsius maxima parte dilui ac temperari: nisi nimium aded tostum fuerit hordeum, vt inde & sapore, & odore contracto, bibentes Cereuisiam conuocari cogat, quod ipsos siccet ac torreat, velut non raro audire contingit. Nemo vero auditus est, qui ex Cereuisia potu calefcere se conquestus esset. Et hæc de communihodie parandæ Cereuisiæ modo intelligi volo: qui an quondam eiusmodi fuerit, merito ambigitur. Itaque sicut Galenus de aqua hordei, id est *mod. xxiij. videri* potu, ab Hippocrate præscripto dicit, manifestum esse hunc situm eximere, sed præstiterat, inquit, ab ipso dictum esse, quomodo parare hordeum oporteat, num simpliciter madefacere, aut, veluti hi qui nunc zythum ex ipso faciunt, aut alio quodam modo: ita profecto præstiterat etiam ipsam Galenum parandæ Cereuisiæ modum descripsisse, vt certius de ipsius temperamento iudicare possemus, sed velut omnibus notum præterisset illam videtur. Et dum ex putredine factum dicit, illud intelligendum nobis exhibet, quod Aëtius de Byne prodidit, quod sit hordeum madefactum, quod germen emiserit, quod *cymam* etiam vulgus nostrum appellare solet, & deinde vnâ cum enatis ligulis: ita autem cymas siue germina vocat: tostum est. Ergo itaque nullam Cereuisiam calidam esse sentio, sed aliam minus aliâ frigidam, velut dixi. Acrimoniam tamen in ipsis vt vitium, aliquid caloris habere, & hordei tosturam præsertim nimiam siccitatem inducere: quæ tamen aqua fa ipsius maxima velut dixi parte diluit. Quin & frigiditas Cereuisiæ, multo ipsius potu corrigitur, vt etiam ex potandi velut exercitio, Cereuisiæ potiores incalcescant, non quodd ab ipsa Cereuisiæ natura vllus calor ipsis accedat. Plin. lib. 22. in fin. vbi de frugum vsu medico egisset, ex iisdem, inquit, sunt & potus, zythum in Aegypto, Cælia & Ceria in Hispania, Cereuisia & plura genera in Gallia, aliisque prouinciis, quorum omnium spuma cutem foeminarum in facie nutrit. Nam quod ad potum ipsum attinet, præstat ad vini transire mentionem. Quibus verbis & Cereuisiæ potum in totum damnat, & natales illarum locos, & nomina in his diuersa indicat, quod ipsum etiam Dioscor. facit, qui etiam *Curmi* appellatum, & ex hordeo paratum potum proponit, cuius vsus vini loco sit. Et hic igitur potus non fuit alius quàm insignis aliqua eius temporis Cereuisiæ species, quæ sicut etiam hodie multæ, & caput, & neruus, & oculos læsit, & prauos humores genuit. Et tales potiones etiam ex Tritico fieri adhuc hodie in Hispania audimus, & in Anglia scimus, quæ magna ex parte è Tritico parantur, non multo lupulo adiecto, vnde etiam albidiores sunt, quàm quæ cum multo lupulo coctæ fuluiores euadunt. In inferiore porro Germania Cereuisiam non Byre vocant, vt in superiore & media, sed *Cont*: & simplici modo paratum, simpliciter *Cont* dicunt, duplicato verò, *dupel Cont*. Vnde non malè mihi diuinasse videtur Erasimus Roterod. cui lib. 1. Epigram. Græcorum sub titulo *αἰσῶν*, in epigrammate Palladæ, *αἰσῶν* pro duplici isto zytho patriæ suæ familiari accipiendum esse visum est: melius meo iudicio, quàm qui pro vocibus *αἰσῶν* & *αἰσῶν*, corrigendum arbitrantur *αἰσῶν* & *αἰσῶν*, & de zizipis fructibus accipiunt, quos iuiuas Officinæ vocant.

Porro quod Diosc. de zytho dixit, *αἰσῶν* & *αἰσῶν* & nos reddidimus, sed & ebur zytho maceratum tractabile euadit: hoc Plinius non de ebore, sed de animali ele-

phante intellexisse putatur; dum lib. 8. cap. 7. sine ait. Capti elephanti celerrimè migantur, siue, vt vulgata exemplaria habent, mitificantur ordei succo. Ego tamen ebur Cereuisiæ macerari ab his qui pectines, & denticalpia, atque alia instrumenta ex illo faciunt, cognoui. Nec de zytho aut Cereuisiâ dixit Plinius, sed de hordei succo, quæ alio modo ex illo parari potest, vt non ad hunc Dioscor. locum respiciens id dixerit, quem de ebore, non de elephante animali dicere, credo his qui per experientiam testantur, & Plutarcho, qui id confirmat in libello qui inscribitur, An malitia sufficiat ad infelicitatem. Quod verò elephantiâ sin inducere zythum Dioscor. dicit, id etiam in vino Syrice æpetit.

Maltum à Recentioribus nuncupatum, Dodonæo teste, ex hordeo quoque fit. Nam ipsum hordei granum est, primum donec intumuerit aqua maceratum, quod deinde germen emiserit, ac postmodum cum ipsis germinibus siue enatis ligulis resiccatur est. Resiccatur autem frequentissimè ignis calore, quem ad hoc constructus fornax per exigua spiramenta admittit: raro verò absque ignis subsidio, idque non nisi æstius mensibus vigente æstu, cum in tabulato, eminentiore loco perfato, tenuiter sparsum, sæpius per diem vertitur. Nostri *Mout*, Germani *Malz*, Recentiores *Maltum* voce à Germanis mutuata appellant. Aëtius Græcus Medicus, hordeum hoc modo præparatum *βύλυ* nominat. Ad Bera siue Cereuisiæ decoctionem conficitur, & laudatissimum quidem Martio & Aprili mensibus. Qualitatem habet siccam quidem hordei intensiorem, frigidam verò multò remissiorem, præsertim quod ignis calore tostum ac resiccatur est, nam *εὐμβόουα*, quod illi ab affatione diutinaque tostione inheret, siccitatem eius intendit, ac frigidam non solum remittit, sed & qualitatem quandam calidam ei imprimit. Quod verò æstius caloribus resiccatur, minus quidem calet, tamen & ipsum hordeo calidius vel sola germinatione redditum, quæ absque leui quidam putrefactione, ob alienam humiditatem, non succedit. Putrefactione autem caliditatem multis accedere, satis notum.

Galenus lib. de aliment. facult. hordeum ait; quoquomodo quis eo vtatur, siue pisanam coxerit, siue polentam fecerit, vim quandam refrigerantem retinere, verum id de Malto non videtur intelligendum, quod vel germinatione sola, deinde & tostione, si accesserit, magis à natura sua recessit, quàm Polenta, quæ vel ex crudo nondumque maturo hordeo, vel in aqua macerato tantum, vt diximus conficitur. Abstergit præterea & Maltum hordeo potentius, minus lentoris habet, cum quia farinæ minus, Siliquarum verò plûs habeat, quàm crudum hordeum: tum ab inherente illi nonnullo calore, partim à leui illa corruptione, partim ab empyreumate, qui absterfionem coniunctam habet. Ventris torminibus aliisque similibus ex frigida causa doloribus Maltum subuenit, tostum seruè siue in facculo appositum. Cataplasma ex Byne farina tumoribus hydropicorum vtiliter, Aëtio teste, imponitur.

De Bera siue Cereuisiâ.

Bera ex Malto, & Lupuli salictarii floribus, modo, proportionèque certis, aqua dulci permixtis, coquitur: & simplicissima quidem ac propriissima talis est. Proxima, quæ Triticum, Zeam, aliâve fruges, vnâ cum Malto hordeaceo admittit. Quæ verò præter fruges, herbas, semina, flores, arbor-

mata, aut alia huiusmodi caput implentia, ac ebrietati inuadentia, ut quibusdam in Aethiopia, perenniter habent, compositae quaedam Berae, siue Ceruisia sunt ac medicatae, ab hordeacea, Triticeae Berae & sapore & qualitate dissidentes.

Nemina. Nominant autem huiusmodi ex frugibus potum cum Germani omnes, tum Britanni reliquae Septentrioni subiacentes gentes, communi quidem ac patria voce, *Biere* siue *Bere*. Latina autem passim *Ceruissium*. Veteres verò ex hordeo potum variis nominibus appellarunt: & *ὀρνυ* quidem, *αὐλὸν*, id est Vinum hordeaceum, ex hordeo omnem compositum Graeci. Eundem Aristoteles, Athenaeo teste, *αὐλὸν* dixit: alii *ὀρνυ*: veluti Sophocles in Triptolemo, & Hecataeus in Eutopae periodo, ubi Praonas *ὀρνυ* ait bibere, ex hordeo, *αὐλὸν* verò ex Milho & Conyza. Hellanicus tamen non solum ex hordeo, sed & ex radicibus fieri *ὀρνυ* asserit: Bibunt, inquit, ex radicibus *ὀρνυ*, veluti Thraeces, ex hordeo, Aegyptii hordeaceam potionem, *ὀρνυ* siue *ζῆνυ* Theophrastus ait, appellant. Idem testatur Plinius lib. 22. Ex frugibus, inquit, potus, *Ζυθον* in Aegypto, *Κεῖα* & *Κεῖα* in Hispania, Ceruisia & plura genera in Gallia, aliisque Prouinciis. Quos lib. 14. nominibus quidem aliis, sed ratione eadem confici tradit. Diodorus Siculus, *Ζυθον* non in Aegypto solum, sed & in Galatia quoque fieri affirmat. Tanta est (inquit de Galatia scribens) aeris frigiditas, ut neque vinum ea regio, neque oleum, producat, quare coacti homines potum sibi ex hordeo componunt, quem appellant *Ζυθον*. Dioscorides vinum hordeacei potus genus *Ζυθον* alterum *Κυρῖον* nominat.

Phoucas Simeon Zethi ex posterioris aetatis Graecis, huiusmodi potionem Arabico nomine *Φουκας* vocat, alii *Φουκας*, siue *Φουκας*: Arabibus tamen, *Phoucas* non ex hordeo tantum potus est, sed etiam, veluti Rhafis scriptum reliquit, ex pane *Heneri*, hoc est, Similagineo, Mentha, ac Apio compositus: ac, ut Hali Abbas testatur: quaedam etiam *Phoucas* ex pigmentis, aut ex malorum puniceorum succo conficiunt. Haec autem omnia siue similia sint genera, diuersis appellata nominibus, siue proprietate aliqua discrepantia, cum Bera siue Ceruisia nostra in eo conuenire possunt, quod ex hordeo ac frugibus componantur, preparatio tamen modo, vel alia qualitate aliqua ab ea fortasse differant. Nam si *Ζυθον*, ut Galenus ait, lib. de facult. simpl. medicam. ex putredine proveniat, aut ex frugibus fiat aqua madefactis, donec resoluantur in liquorem vino similem, veluti Hermolaus Barbarus in Corollariis scribit: ac acre malique succi sit, renes & nervos tentet, quae à Dioscoride ac Galeno quoque ei attribuuntur, cum Bera siue Ceruisia nostra nequaquam conuenire potest. Nam Bera ex fruge non sic putrescente, multò minus ex ea in liquorem resoluta, sed ex hordeaceo Malto, ut diximus, coquitur, ab omni putredine asseruato. Est & Bera per se suavis, dulcis, ac boni omnino succi. Quae certè Beram à *Ζυθο*, cum conficiendi modo, tum facultate dissidere ostendunt. Sin autem *Ζυθον* non eo, quo Galenus, aut Hermolaus tradunt, conficitur modo, sed ex hordeo ac Tritico fiat leuiter tantum putrefactis, ac à natura sua commutatis, ut Theophrastus scribit, *Ζυθον* & Bera simillima sunt. Nam hordeum in Malthum transiens, leuiter quodammodo putrescit, & à natura sua recedit. Verùm tum Galenus, Dioscorides, & qui deinceps eorum sententiam ac doctrinam inseguuti sunt, minus rectè *Ζυθι* facultates cognov-

uisse videbuntur. Propter leuiter hanc etenim putrefactionem siue mutationem, hordeum, aut ex eo potus, mali succi statim fieri non potest, non minus quàm Polenta, quae ex non recente hordeo, sed ex maturo & sicco in aqua macerato conficitur. Siquidem & vnde leuiter quodammodo hordeum computrescit, humorèque alienum imbibit, veluti dum Malthum futurum est. Polentam tamen hanc ob causam, neque Gale-nus iple, neque Veterum quisquam, mali succi fore asseruit, sed contra omnem boni odoris, suauolentemque esse, sicuti & Malthum ritè confectum est. *Ζυθον* autem, siue *Ζῆνυ*, ex hordeo & Tritico confici leuiter putrefactis, Theophrastus lib. de caus. sexto, ubi de saporibus agit, his verbis tradidit. Nonnullos verò, ait, naturam commutantes, & leuiter putrefaciunt, in succos cogimus, ad bibendum idoneos, veluti qui vinum ex hordeo ac Tritico conficiunt, quod in Aegypto *Ζῆνυ* appellatur.

Ceterum ut ad temperiem Berae veniamus, pendet ea ex qualitatibus eorum, ex quibus componitur. At materies eius, ut diximus, sunt, aqua, Malthum hordeaceum, subinde Triticum aut zea, & Lupuli salutaris flores. Aqua quidem simplex cuiusmodi ad Bera decoctionem sumitur, frigida est & humida: Malthum enim exigua caliditate resiccatur & abstergit: Triticum ac zea temperatè calida siccatque sunt: Lupuli flores secundo ordine calefaciunt, resiccantque, caput tentant, vrinam mouent, abstergeri quoque, ac aperendi potentia praediti. Faciunt hi ad Bera cum saporem, tum diuturnitatem, fruges verò alimenti materiam subministrant.

Ex horum autem varia & inaequali mistura, diuersa Berarum genera, dissimilibus qualitatibus praedita, sunt. Tenuis quaedam, potentes aliae, rubicundae, siue nigrae haec, candidae illae, amarae pleraque, dulciores nonnullae. Quae frugum plurimum admiserunt, potentiores sunt: quae minus tenuiores: minimè tenuissimae. Ex hordeaceo Malto, diutius tosto, rubicundae, & praesertim si diuturnior decoctio accesserit: praecipua autem parte ex zea ac Tritico confectae candidae sunt, lenescentèque tenue & aquosum vinum substantiae tenuitate quodammodo referunt: amatores caputque citius tentantes, Lupuli flores copiosius incocti efficiunt, dulciores eorum parumonia: fruges enim ex se dulcedinem conferunt. Inter has tenuissima, frigida quidem est & humida, superante in ea aquae qualitate ac substantia, non tamen altius caliditatis experts. Potentiores caloris plus habent, cuius etiam vi atque potentia, in vasa conditae non secus ac mustum fluctuant ac effervescent, minus tamen quàm mediocre vinum calidum, à quo non solum temperamenti caliditate, sed & tenuitate substantiae superantur. Calefactio siquidem Berae clemens mitisque est, Alimento autem praestant illae quidem exiguum, aut nullum, haec verò copiosius, copiosissimum potentiores: omnes prohi succi, si ex bonis frugibus & bene decoctae fuerint: Crassiores circa praecordia aliquantisper haerent, tardèque descendunt: candidae, tenuiores & citius digeruntur: amarae abstersione alium leniunt: medix, medio se modo habent.

Compositae Berae, quae videlicet praeter fruges ac Lupulum, & alias quaedam herbas, vel flores, semina, fructus, aromata, siuiliave recipiunt, pro qualitate eorum quae admiscuntur, varias qualitates ac facultates obtinent, subinde etiam noxias. Recens Bera quae nondum subfedit, non secus ac mustum

mustum, vitia complura gignit: inflationem parit, alium conturbat, calculum procreat, ac vrinę sæpenumero stillilocium excitat: foris tamen admota, nervosarum partium dolores sopit, si dulci calenteque ea foueantur: præstat ad hoc rectissima, & cui nondum Lupulus incoctus est, ac inter omnes potentior. Acida nervos & renes tentat, venterculum conturbat, ac vitiosum in corpore succum gignit. *Acerum* quod ex Biera conficitur, vini aceto minis acce, minisque potens est, nec partium adeò tenuium. *Hactenus Dodonæus.*

De Biera siue Cerevisiæ diuersa compositione, Lobelius in Aduersariorum altera parte sequentibus verbis egit. Vniuersa Britannia ad hordei præparationem quam *Malthus* siue *Malt* vocant, solo ferè hordeo spicâ mutilâ vititur, idque poly-sticho ad Cerevisiâ Britannicâ suauissimâ & opimas præfert, quæ qualibet Septentrionalis bonitate longè superant. *Malthus* autem inibi paratur, hoc qui sequitur modo. Hordeum maceratur aqua biduo & tribus noctibus: deinde effusâ aquâ in horreum acernatur loco ventis minis peruiro, quoad germen perpullillisque radicum cirros & pullulationes (quæ hyeme tardius, vere & æstate biduo aut triduo,) emiserit. Mox prius quam incalescat sulcatim dispersum, sesquipalmari densitate, ter quaterve die & nocte subvertitur aperto aëre: quod octo vel nouem dies continuando perficitur. Tandem in tabulato peruiso, igne subdito vel aptato fornaci vimineo, texto calatho acuminato, & superstrato hordeo, igne lento è palea, cremis vel arido ligno admodum fornacis ostiolo, sesquipalmari intervallo ab imo interposito, exiccatur, quoad molis frangi queat, sicque extotum *Malthus* in fornacis capacitatem deicitur: quod ex qualibet hordei mensura ad quartam partem accrescit, & antiquum bonitate, in zycho componendo, nouum præcellit.

Biera siue Cerevisiæ, Nortmannis & Gallobelgis *Biere* & *Ceruiſe*, Anglo-Britannis, & Germanis, & Belgis *Bier* dicitur, compositio, recipit Malthi mollis leuiter contriti modios Britannicos octo, cui superfundæ aquæ fluuiialis limpidioris feruentis, in qua aliquot manipuli fursus Triticeï incocti fuerint, quantum satis implendo dolio Aureliano aut Aquitanico & semisse. Exactè mixta, infusa calidè persistent tres horas: deinde foraminulo palea aut duplicato fundo apto subterfluant. Id quod transmissum est [Belgis & Anglo-Brit. Wort vocatur] recoquitur semihoram, sesquihoram, vel aliquot horas, vt melius conseruetur, adiectis vnc. 12. florum Lupuli salictarii: mox longo latèque lacu, vel depressis labris vix pedem altis, perfrigerantur. Et huius decocti frige facti libris octo vel decem fermenti siue facis Biera vel Alz potentioris libra aut sesquilibra adduntur, exactè agitando, loco tepidiore permiscuntur, stragulis operiendo, sensimque reliquum liquorem, vt commodius fermentescant, affundendo. Quibus absolutis transcolantur: vasa adimplentur: demumque fermentatione absoluta, exactissimè occluduntur. Eidem Maltho nouam affundunt feruidam, transcolant, eoque Cerevisiam tenuem concinnant.

Variis è frugibus, Tritico, hordeo, zea, Avena fit Malthum, quod ratione conficiendi, Biera colores immutat. Triticeum & Polystichum, supra coctum & excoctum potissimum, rubicundam & subfuscâ Cerevisiam efficit. Hordeo disticho, Avena, zea, tritico, compmixtis quinis vel

senis libris farinæ fabaceæ, albida & limpida redditur. Malthi hordeacei partes duę aut tres, Avena & Tritici ana pars vna, sumuntur: farinæ fabarum quantum Tritici quarta pars, aquæ quantum satis, pro tenuitate, & efficacia Biera futura.

Cerevisiæ, à Cerere dictæ, siue *Biera* Teutonice & Anglo-Britannicæ omnium suauissimæ & saluberrimæ, calidioribus regionibus vtilissimæ & conuenientissimæ, parandi ratio exactissima & largissima, Anglo-Britanno vernaculo, à C.D.I. Coys Plantarum peritissimo accepta: recipit Aquæ fluuiialis [densiores, pinguiore, stagnantes aut puteales aquæ ex terrâ argillosæ venis manantes, limpidis putealibus scaturiginosique ad pinguiore concinnandas Cerevisiâ longè vulgi opinione, præferuntur. Fontanas tamen ex scatebris emicantes, & fluuias fluentes cum Lobelio eligeremus, sanitati tuendę, auctâ frugum dosi] Galones 40. feruescat, sine tamen ebullitione [In quibusdam regionibus ebulliunt aquam ante Malthi infusionem & macerationem, superaffusa Galoni mensurâ vnâ aut altera frigidâ, ne illic Malthum excoquatut aut supra modum conseruescat, excandescatve, crustulæque retorridas contrahat.] In parte eius tertia [Hæc observantur quoties Malthum retorrescit. Conuenientissima est alioqui feruidior aqua, Maltho minis arido, aut humidior.] infunde & macera [Experientia constat Malthum commodius immitti aquæ, quam aquam Maltho affundere. Lobel.] modum vnum optimi Malthi, molis vt ut triti, sine conseruescere per horam integram, in cupa aut paulò plüs: tempore hoc exacto, liquor Wort Britannicæ & Belgicę vocatus, percoleatur in vas commodum, foraminis cupæ fundi obice, vt mox dicetur, referato. Et inter colandum, feruescat alteram tertiam aquæ partem, modo supradictõ, & percolato liquore horæ spatio, affundatur. Si autem maiorem Cerevisiæ quantitatem parare velis, eamque potentiorē, primam colaturam feruescat, [affusa Maltho percolato secunda feruidâ aquâ] additis vnciis quatuor florum Lupi salictarii, per totum tempus iteratę infusionis secundæ Malthi, hoc est, horæ aut sesquihoræ spatio. Colantur deinde per setaceum & in lacu refrigerantur. Wort non excedat pedis altitudinem in lacu; æstate potissimum, hyeme superare licet, quo refrigerato æstiuo tempore, [hyeme tepidulo] sume huius colati Wort sufficientem bonam quantitatem in vas conueniens, prædictæ pedalis aut sesquipedalis altitudinis exceptam, cui lib. 8. aut vnc. 8. optimæ spumæ, siue fermenti Cerevisiæ, Britannicę Yeast, Belgicę Gyst, & Gallicę Gy, diluti & permixti in alio vase siue vrceo, triplici aut quadruplici mensura prædictæ colaturæ Wort: fermentescere finito, donec ebullitione & effluentia vrceum superet, effundaturque in vas colati; Wort vocati, liquoris. Post Spumarum fermenti in vrceo permixti effusione in prædictum colatum liquorem, in quo vrceus conditus est, ebullitione & fermentatione totum colamen spumis vndantibus operiens, affundè sensim, ne ebullitio interpellatur, reliquum colatum liquorem, & permisceantur. His peractis, sine iterum conseruescere, donec sublimè plüs satis efferantur spumæ [elevantur siquidem pedali sæpe mensurâ] & potus saporem similem colati liquoris acquirat, nullo tamen modo acrem, quia Cerevisia citius acorem saperet. Vasis demum impletis & post sublimationem oclusis, conseruetur Cerevisia. Dolare vas in quo Malthum infunditur, capacitatis sit Dolii Aureliani, plüs minüs, pro ratione quan-

Cerevisiæ
Teutonice.

vicaris *Biera futura*, duplici fundo donatum, vtroque maiusculo foramine petufo. Longior & validior fultis, stramine, aut feno tortili circumuallatus foramina permeat, sed imum fundi foramen arctius, obicis uicem supplens, referans & claudens, ad liquamentum (wort vocatum) percolandum, & in alia vasa traiciendum. Superior autem fundus fit multis foraminibus peruius. Vmineis cistis longioribus, cilicii loco, Malthi liquamen separant Belgæ. Si tenuem cupis Cereuisiam, (quæ vulgò æliuo tempore delectatur) vtrumque primum & vltimum commisce colatum liquorem siue liquamentum: feruefac addita s. q. florum Lupi salictarii, ex arbitrio: & omnia perage, vt dictum prius. Tertiam & vltimam aquæ feruentis partem superfundito Maltho, ad omnium tenuissimam Cereuisiam: maceretur per duas horas: & eadem vi prius præstat.

Cereuisia tenuis.

Cereuisia Martia.

Cereuisia Martia vegetans, maximèue alens: per hiurum, in annum & diutius perdurans, recipit Malthi recentis molis triti modios 12. Auenæ Modium semissem, pisorum aut Fabarum & Tritici tritorum, ana tantundem, Aquæ q. l. implendis tribus dolis Aquitanicis aut Burdegalsibus: duobus vegetante Cereuisia, & vno viribus tenuiore. Feruefac tertiam aquæ partem modo supradicto: infundantur donec aquæ pars secundæ tertia effuerit, & infusio sit parata. Tum primo Malthi liquamento percolato, & in aliud vas & refrigeratorio lacu traiecto, exactè simul percoctis sine defecatione ex lib. 4. Lupi Salictarii: optimèque tandem per semihoram depurando percoctis, & in refrigeratorio lacu traiectis, iterum affundatur Maltho secundus liquor siue Liquamen wort vocatum, quoad tertia altera pars aquæ effuerit, quod horæ aut circiter spatii perficitur. Hac ratione aquæ efficax erit illud secundum wort ac primum: Denique vltima aquæ tertia parte feruefacta, detracto liquore, affundatur Maltho tertiæ & vltimæ vice ad ignauioris Cereuisiæ præparationem. Martia efficacissima Cereuisia antè sex menses non est portionibus apta. Refrigerato primo liquamine wort/ permiscetur lib. duabus Spumæ Cereuisiæ, & vnc. 1. pul. Caryophyllorum: Exactissimaque fiat fermentatio citato modo.

Amplum ala.

Primæ nobilitatis Anglorum Ala suaui & vinei saporis portio, recipit liquamenti Malthi vernaculæ wort, libras ducentas, florum Lupi salictarii M. 2. quod Malthi dulcè & insipidum saporem exuant. Percoctis & transmissis sensim commisceantur [vt suprà monuimus] facis *Biera* vel *Ala* libras tres, & *Graut* Anglorum (Belgæ *Taerbiere* vocant) libras sex vel octo. *Graut* autem fit hoc qui sequitur modo: Fasina Malthi lib. 6. vel octo: aquæ feruefactæ lib. 12. vel 13. quæ agitata & probè sexies die remixta tementè camino, stragulis operto, & palea condito, nitido vase tamdiu macerantur, donec Serapii lentorem assequantur. Tunc igne, sedulo verlando ne vrantur, ad pulvis solidioris crassitiem percoquantur. Reconditur etiam hodie, per ebullitionem siue fermentationem adhuc spumans in lapideis phyalis, oris angustioris, subterino operculo exactissimè oclusis, & decussatim funiculo, ne exiliat, vt sæpè fit, arctissimè ligatis. Sapore admodum vinoso, gratissimoque, palatum & nares feriente: Non desunt qui Cereuisiam, eadem lege & ratione vini instar asseruant.

Ala Anglo-rum a prius tradita Sedetur.

Quantum ex prisca Plinio & Dioscoride coniecturam facimus de Zitho & Curtini poriones


Cereuisiis nostris proximas, nec dubiè designasse videntur: præsertim *Alam*, quæ vini vicem antiquitus supplebat Britannis: quorum ipse Dioscorides meminit, referens malum succum gignere & neuos tentare: quibus idem quod nobis, euenisse potuit, potissimum plebi & Anglo-Britannicæ rusticæ turbæ, cui adguze delectamenta potentiorum Alam è cauponariis expetenti, inexasurabilis quæstus gratia, illà ex Maltho luxurio aquæ vice macerato, imponitur, sic enim magis compositam & grano potiorum ementitur; caput ferit, lætamque opilionibus, colonis & naucleris stulticiam conciliat. Nec desunt nonnulli quam inexplēbiles nummorum vasti homines qui Biera pro Lupuli floribus camini fuliginem substituunt, aqua salia malthum macerantes, vt eo plūs sitiantur Biera, quod plūs sint potæ. Harum potionum & consimilium assiduo usu incommoda Dioscoridi memorata percipiuntur: quæ non possunt sine hepatis & viscerum summo dispendio assumi, Cerebis & neruis inde affectis & sanguine exusto, fit tuberculorum in facie & naso, vt elephantiorum, eruptio, inde apud Anglo-Britannos in hunc vsque diem locus protrito elogio, *Assuit sibi faciem & nasum rubrum, tuberosum commendatoris Ala*. Maxima igitur in Cereuisia varietas; pro ratione & quantitate frugum, mixtionis, compositionis, varias qualitates sortita. Germanis & Belgis Gentiana, Bacce Lauri Zeduarum, Gagghel/ Helenium, Lauendula, Saluia Hormini flores, Cuculus siue Cucubalus Indanus, [quem insanum seu furiosum Solanum faciunt] Chamæpytis, Coriandrum & consimilia unà cum Lupulo incoquantur.

Limpidior, vegetior, benè defecata Biera, cuius quidem faciendæ rationem docuimus, vt calidioribus innotescat regionibus, & penuriâ vini, eius vicem supplere possit, suaui & salubris est potio, alimentum bonum præbet, modò probè & ex optimis frugibus paretur & percoquatur. Tenuis autem quæ grani minus, plūs aquæ recipit, humectando refrigerat, minusque alit. Ac inde malum succum gignit: renes, neruos. & caput, tentat: tormina, inflationes intestinorum, quemadmodum & recentior epota, stillicidium vrinæ, crassum succum, calculum renum & vesicæ parit. Luteriana crassa, dum recens pessima. Additur Lupulus Biera: vel Ala duplici ratione: cum ob saporem & conseruationem, tum quia crassum succum Zithon procreare literis prodatur, cuius erratum & noxam emendaret, aperiendo abstingeret, per vrinas crassa pituitosæque excrementa venarum, renum, vesicæ, citra magnam calfactionem educeret: docemur enim à Mesuaro in Symplicio à succo Lupuli & Byzantino, aliisque Notericorum compositionibus Lupulum, non secus ac Fumariam, sanguinem purgare & defecare, eiusque ebullitiones compescere: iecoris intemperiem calidam, internolque fetuores, febresque biliosas & pituitosas arcere: Quem eundem effectum præstant turiones siue Alparagi vere erumpentes, cibo & acetariis. Floribus tamen, quia temperatè calidi, secus euenit, vt de coriandro monuimus Aduersariorum pagina 314. Quod caput feriant, è Cereuisia non reiciendi; neque illis causa rheumatismorum & articulorum defluxionum, vt nonnullis doctis Anglo-Britannis perplacet, attribuenda: sed potius ingluuici, crapulæ, mollitiei, blanditiis, & gulæ oblectamentis quibus sunt dediti, alenbere debent: quia Ala ipsa potentior, sine

eis aut

eis, aut Lupulo paucillo concinnata, non secus ac vinum, abditissimas permeat cerebri membranas, eademque infert incommoda. Lupuli flores non nocent qualitate, sed quantitate, quemadmodum vinum & optima quavis remota.

HORDEVM DISTICHVM.



B Reuiore culmo est Hordeum, quàm vel Triticum vel Secale, foliis latis, spica longis asperisque horret aristis, quæ singulæ è singulorum granorum capitibus exe-runtur; grana verò gluma tenui simplici clauduntur, quam nullâ tritura deponunt, nisi vel molarium confrictu, aut sacculis superioris, calidâ prius macerata, aut deni-

que pilâ. Cæterum quod hîc distichon nominamus, duos habet granorum versus, quibus tamen interiecta & aliorum rudimenta, sed quæ nihil sunt aliud quàm inuiles glumæ.

Germ. coll. & hort. *Hordeum*. Trago *Hordeum alterum* siue *exiguum*. Dod. gall. *Hordeum paruum* latin. *Hordeum distichum Galaticum* Columella. Ruell. *Hordei alterum* genus: ad hoc reducendum putat trimestre illud *Hordeum* Gallis *Secourge* dictum: erroris autem eos accusat, qui genus hoc *Orizem* asserunt.

Lobel. in Aduers. *Hordeum*, (nonnullis visum *Siligo*) *Vernum*. Obs. p. 15. *hordeum minus* Vere ferendum, Hyemis impatientissimum. Eid. Adu. altera parte, *hordeum distichon*, Gallobelgis *Pammelle*, Germ. *Hein gerst*, id est, minus hordeum, siue Britannis Borealibus *Common barley*: Martio, Aprili, & initio Maij duntaxat feritur, hyemis quippe & frigoris impatientissimum: vniuersa sui parte gracilius, cubitum & sesquicubitum raro superat.

C. Bauh. Phyt. & p. in *hordeum* 3, siue *distichon*: quoddam spicâ binos ordines habeat. Plin. *hordeum distichon* Galaticum Columella. *hordeum Cantherinum* Ruellio. *hordeum minus* Trag. *hordeum distichum*, Fuchf. Tur. Dod. in Diosc. Lob. Lugd. cui & æstiuum & trimestre minus. *hordeum* binis versus Matth. Cam. *hordei alterum* genus, Cæf. Kœst. Germ. *Sommer gersten* / *Winter gersten* / *Hein gersten*. B. Zoomer gerst. Gall. *petit orge* & *orge mondé*, orge à deux raves. Ital. orzo. H. Genalla. Angl. *Barly*.

HORDEVM POLYSTICHVM.

CAP. XIII.

Inconditi & multi sunt Polysticho seminum versus, quorum si quis ordo, ad Hexastichum accedunt.

Tom. II.

Trago germ. *hordeum alterum* siue polystichum: Lat. *Hordeum* siue maius, quatuor, sex & octo versus. Ruell. *hordeum* binos, ternos, quaternosque, item & quinos spicarum versus continens. Lobel. Obs. p. 15. *hordeum polystichum*, Autumno ferendum, Eid. p. 19. *Siligo Tragi*, *Olyra Dioscoridis*: In Aduers. *Olyra*, *Siligo Tragi*, seu *Far candidum*, *Olyra* quæ *Zea Herodoto*, *Triticum amyleum*, non *Siligo* vel *Secalium*, ut nonnulli putarunt. Existimo Lobelium nesciuisse quid scriberet, quia *Tragus* non eandem constituit plantam *Siliginem* & *Far candidum*, sed diuersas; nec etiam demonstrat quam plantam intelligat. Dod. Gall. *hordeum* quatuor vel pluribus versus. *Hordeum maius*: Lat. *hord. polystichon*. Tabern. *Hordeum* polystichum hybernum. Hoc hordeum bene repræsentatur effigie Lobelij in Icon. plant. p. 28. exhibita, sub inscriptione *hordei*.

C. Bauh. pin. *hordeum* 1. [ita etiam phyt.] siue polystichon hybernum. *Hordeum* Brunfels. Matthioli. Lac. Gef. hort. Lobel. Dodon. Lon. Cast. Cæf. Ger. *Hordeum maius* Tragi. *Hordeum polystichum*, Fuchf. Tur. Dod. Gall. [cui & *hordeum cantherinum*.] Lugd. Tab. *Hordeum primum* Ang. *Hordeum secundum* hyemale, Cord. in Dioscorid. *Polystichum* dicitur quia in multis versus spicatur: est enim differentia in spicarum forma, magnitudine & granorum numero: quoddam binos, quoddam ternos, quaternos, quinos, cùmque plurimum senos versus habet: sic aliud rotundius & minus, aliud oblongius & maius, aliud candidius, aliud nigrius.

Kœst. πολυστή, Germ. *Wintergersten* / *Grosse gersten*. Belg. *wintergersten* / Gallis, *grosse orge*, orge à plusieurs raves. Nomina linguarum

HORDEVM HEXASTICHVM
POLYCHRYM.

CAP. XIV.

B Reuior sed thorosior Hexasticho spica, senis granorum versus constans, inter quos & paleæ inuiles breui mollique aristâ donatæ intercurrent: at solidorum granorum gluma in valentulam, asperam, longamque aristam faciecit.

An Cordo in Diosc. *hordeum* siue tunica, *hordeum Italicum* & *Romanum*, *hord. hexastichum*, si glabrum suum, de quo in Hist. tractat, intelligit, cur vocat Hexastichum quod non magis siue tunica, quàm distichum erat appellandum.

Ruell. *hordeum hexastichum*, *Cantherinum* quorundam. Trago, *hordeum* cum sex ordinibus. Dod. Lat. *hordeum* sex versus, *ἑξαστήν*, *Cantherinum* Columella.

C. Bauh. pin. *hordeum* 2. (& phyt.) siue polystichum vernum. *Hordeum* senis versus, Matth. Cam. *hordeum* Septentrioni notissimum, πολυστήν, Lobel. Obs. *hordeum polystichum vernum* Lob. Icon. *hordeum polystichum æstiuum*, & *hordeum* trimestre polytichum Tabern.

HORDEVM DICTVM GERMANIS ORIZA.

CAP. XV.

Q Vanquam culmo, foliis, geniculis, cum hordeo vulgari conueniat, ex spica

N n 4



tamen euidens
cuiuslibet discrimen, est enim
lato-compressa
duobus versibus constans,
granorum hor-
deaceorum,
habitiorem,
paleaceo corti-
ce, grano ad-
herente clau-
sorum, quorum
singula in lon-
gam asperam-
que aristam de-
sinunt: inter
geminis hosce
versus duo alij
vtrinque, id est,
quater gemini
intercedunt, pa-

leacei, nullum granum continentes, mollicellis
& breuibz aristis donati.

Columella
Far candidum
Trago
reprob.

Zea genus
Dod.

Santal
Plin.
Aur. Faris
C. Lusit.
familis.

Fruentis
barbati ge-
nus
Dod. re-
darg.

Synonyma

Locus &
Tempus.

Hordei genus hoc, *Germanicam Oryzam* Tra-
gus appellauit, iudicauitque nihil aliud esse,
quam *Columellæ Far candidum*, *Tragum* fru-
mentaceum *Dioscoridis*. Habet autem lib. 2. cap.
2. figuram ineptam sub titulo candidi *Farris*.
Teutscher Reiss & *Line Korn*, quod nomen, vt &
ipsa figura, non videtur ad dictum caput per-
tinere. Cap. 22. vocabat *Farris genus* & *Vennicu-*
lum album.

Dodonæo hist. *Fruentum* & *Lat. in fol. consen-*
taneum videtur ad *Zeam* referre *Oryzam* Ger-
manicam à *Trago* nuncupatam. *Tragum* autem,
Farris speciem & *Tragum cerealem* existimantem,
reprehendit, vt qui veritatem assecutus non sit.
Tragum namque rem fictitiam asserit, ac subdit:
Olyra autem magis similis *Oryza* hæc *Germani-*
ca est, quæ à *Dioscoride Zea* generi adscribitur;
aut *Plinii Santalo*, *Farris Gallici* specie, nitidissi-
mi grani: illic *Branche*, ait *Plinius*, vocant: aut
certè *Farris Clusino*, quoddam fortè idem cum *Plinii*
Santalo est: vtrumque enim candidum, & *Clusi-*
num, à *Clusio* dici potuit: oppido *transpadanæ*
Italia, quæ aliàs *togata Gallia* nominatur. Si
quid repugnet, quominus hæc *Oryza*, vel *Clusi-*
num, vel *Olyra* sit, sola vtrique erit vernalis satio.
Nam *Olyra* & *Clusinum Far*, ex hybernis semen-
tibus sunt. Adeo certè, de plerisque frumentaceis,
definiri nihil potest: cum propter Veterum i-
pforum breuitatem, tum frumentorum appella-
tiones, aut diuersas, aut sæpenuerò, confusas
eandem rem aliis aliter subinde appellantis.
Ruellius Farris Gallici, siue *Fruentis Barbati* ge-
nus quoddam esse ait, cuius gramen candidius,
ac spica minoribus aristis circumuallatur, quam
Locularis, quod, inquit, *Clusinum* putatur: istud
autem an simile sit, vel idem cum *Oryza* Germa-
nica, expendendum est. Hæc *Dodonæus*, qui præter
sententiam *Tragi*, *Oryzam Germanicam Zea*
speciem facit: quamobrem cum planta ei inco-
gnita fuerit, eius de nomenclaturis opinionem
probare non possum.

C. Bauh. pin. Zea 5. (3. phyt. vbi est Zea genus,
Oryza dicta) siue Zeocryton, seu Oryza Germa-
nica: vt & Trago (cui & Tragum cereale & Far
gallicum, & fruentis barbati genus Ruellii vide-
tur. Olyra Aduerf. Far, Teutscher Reiss, Cast. Ty-
pha Theophrasti, Tab.


Semen habui primò *Sturgardia* nomine *Reiss-*

famen, quod satum in horto *Ill. E. C. Monbelgar-*
di descriptam produxit. *Oryza Germanica*, quæ
ex æstiuatum, siue trimestrium numero est, dicitur
apud *Mediomatricas* cum aliis trimestribus
seminibus lætissimis agris coli.

Tradunt *Oryzam Germanicam* in cibo vsur-
patam aluum emolliere, rursus *Oryzam* illam pe-
regrinam, aluum supprimere. *Vtilis* autem ger-
manica ad multa culinæ opera, laudaturque præ-
sertim ad pultes, ob albedinem: cibis admixta
ori grata est: cum lacte *Oryzæ* modo decocta, pro-
bè alit, teste *Dodonæo*.

HORDEVM NVDVM, SIVE Gymnocrithon.

CAP. XVI.



Hybridam
dicam Gym-
nocrithon, cu-
ius spica Hor-
deaceam imita-
tur, horrido a-
ristarum barbi-
tio: at verò grana
ruffescentia,
vtrinque acuta
vnâ facie sulcata
aduersæ partis
mucrone
germen longius-
culum ostentā-
tia, gluma simplici
obuoluta,
leui etiam digi-
torum attritu,
facilius quam
Triticæ, ex-
siliunt: si quis au-

tem versusum ordo obseruari possit, quaterni ii vi-
deri possunt: porro folium latum, multum, cala-
mos amplectitur.

Trago, qui tertiam *Speltæ* speciem asserit:
hexag. n. e. Halica, & *Far adorem* *Columellæ*
esse videtur, eiusdemque *Venucolum* rustilum,
quod *Germ. Bern* vocat. *Dodonæus* contra *Farris*
speciem esse negat, nec cum *Chondro* aut *A-*
lica, vt pote rebus tactitiis conuenire statuit. *Zeis*
autem annuerat, *Zeopyrum*que quoddam esse
pronunciat, grano nudo. Sulpicor ego *Dodo-*
næo minùs fuisse cognitum hoc *Hordeum nu-*
dum, quæ de eo scribit desumpta sunt ex
Ruellio & *Trago*: placet tamen figura quæ *Cor-*
do in hist. cap. de hordeo glabro apposta est cum
hac annotatione, *Dodonæus*, à quo hanc imagi-
nem mutuati sumus, *Zeopyron* vocat, & ex *Gale-*
nō Gymnocrithon, i. e. *Hordeum nudum*. Per-
pendendum autem an *Cordus* hoc etiam intel-
lexerit, per hordeum sine tunica. Si hoc intelli-
git, ceu antè quoque monuimus, non placet vo-
cari *Hexastichum*. *Cantherium* putari dicendum
Ruellius, quoddam folliculo castratum nascatur. *Hor-*
deum nudum vocant *Galli*.

Calpar. Bauhin. pin. Zea 4. siue Zeopyrum
(sic etiam in *Phyt.*) seu *Tritico-spetum*, quod
naturam habeat *Tris. Quas. x. t. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.*
vinebor Galeno: Hordeum alterum Anguil. Zeo-
pyron Dod. H. Lugd. & Tabern. Zeopyrum siue
Tritico-spetum, Hordeum nudum vulgò voca-
tum Lob. in Adu. p. 8. Obs. p. 18. Ic. plant. p. 30. Hor-
deum glabrum Cord. histor. hexastichon, hodie
hor-

hordeum sine tunica, Cord. in Diosc. Hordeum nudum Geln. hort. Ger. mundum, Cæs. Hordeum *γυμνὸν καὶ ὀνύχου*, Cam.

Satum Vere in horto Ill. E. C. Montbelgardi, semen maturuit fulio, & paulo citius quam in Oriza Germ.

Seritur plerisque Germaniæ locis ad pistrinarum & culinarum opera, in quibus hordei vltum præbet.

HORDEVM MVRINVM.

CAP. XVII.

Hordei fibrosis radiculis & foliis donatum, culmos erigit cubitales, multo tenuiores, spicas quoque breviores, aristis mollioribus armatas, glutinâ tenui, quæ nudum gramen tegit.

An de hoc Plinius lib. 22. cap. 25. Est herba phœnicea Græcis appellata, Latinis verò hordeum murinum. Hæc trita è vino pota præclatè menses ciat. Ex quibus apparet annotante Dalechampio, hæc aut prorsus diuersam esse à phœnice Dioscoridis, aut apud Plinium legendum menses cohibet. phœnix enim Dioscoridis in austero vino pota manentem vuluæ sanguinem sistit & alui profluuium.

Trago Germ. hordeum alcerum, das ander Grass. Verum hordei vitium: Lat. Lolium tertium. Tabern. hordeum spurium (& Gerardo) Aristida, Gerstenwalsch, Bastaert gersten. Lob. in Adu. p. 7. Obs. p. 8. l. c. p. 30. hordeum spontaneum spurium, vulgò *Sourion*. Turn. & Cæs. hord. murinum: Dodon. Lat. hordeum aut Triticum murinum, vulgò *Muyse* Corn. Anguill. holcus plinii, Aristida aliorum. n. Lugd. Gramen hordeaceum, holcus plinii, p. 427.

Geneux (ubi, vt & alibi, passim proueni:) quibusdam *Carcallon* nominatum fuit.

Graminis Loliaci tertium genus Tragi, quod hordei ipse vitium esse asserit, Thalium duplex facit: Maius bicubitali culmo in montibus, longiorque spica: Minus culmo & spica brevioribus, in collibus aridioribus, aliisque asperis locis, ac secus vias. hinc C. Bauh. phyt. Gramen 109. siue hordeaceum minus, Plinio *holcus* à trahendo dictum, eò quòd aristas à corpore educat: ob id *Aristidam* quidam vocant: Item, Gramen 110. siue hordeaceum maius. Eid. pin. Gramen hord. siue montanum, vel maius: Item Gramen hord. siue minus & vulgare.

HORDEVM VRENS NOVÆ HISPANIÆ.

CAP. XVIII.

Narrat Nic. Monardes ad se perlata esse cum aliquot aliis plantis ex Hispania noua, semina huius plantæ, quæ *Cenadilla*, id est, hordeolum, istic vocatur, à similitudine quam cum hordeo nostrate habet, in spica & vaginulis, quibus semen includitur, sed minus, & Lini semine neutiquam maius, verum longè aliis facultatibus præditum.

Orzada nouæ hispaniæ Monardi & Castori. *Cenadilla* Monardis Clus. hordeolum Monardis hist. Lugd. p. 1907. hordeum 4. siue causticum, propter similitudinem huc relatum Casp. Bauh. pin.



Aliis liqui- Vires

dem ab hordeo facultatibus præditum est. Etenim nūquam auditum est aliquam aliam plantam adeò vrente & caustica vi præditam: ita vt vbi cauterium necessarium est in gangrænis, & impuris, putridisque vlceribus, eisdem præbeat effectus, quos non modo sublimatum, sed etiam ignis præ-


Canterium

stare possit. Etenim vermes in vlceribus necati, putridaque vlcera expurgat, puluis eius sensim inspersus, maiore minore quantitate pro vlceris magnitudine, adhibitis præferuantibus quæ in huiusmodi remediis vsurpari solent. Itaque cum eius facultates infringere voluit, puluerem stillaticio liquore rosarum aut plantaginis excipiunt, liumque aut ellychnium eo intinctum vlceribus & gangrænis imponunt: deinde farcotica medicamenta adhibentur pro periti Chirurgi iudicio. Eadem ratione vsurpatur in animalium malignis vlceribus, quibus plerumque infestantur.

vlcera.

GRAMEN BVLBOSVM EX ALEPO.

CAP. XIX.



EX oliuari- Descriptio
bus, multis laceris, tunicis vestitis, bulbis pendent, fibræ robustæ culmi pedales crassiusculi, foliis insignes, angustis, palmariibus, scapo gerit spicâ hordeo murino similem, palmari minorem, glumis densis, longis, calamo appressis, sursum spectantibus, in breuem aristam singulis deminentibus.

C. Bauh. phyt. 22. Gramen bulbosum ex Alepo Syhonyma quod solum vidimus sicum inter plantas. Gramen 8. siue bulbosum ex Alepo, sicum apud Eretrem visum. Plin. Gramen nodosum à radicis forma: 5. siue bulbosum ex Alepo.

Gramen bulbosum Alepi habui à Valerando Doræo nostro.

AVENA ALBA ET NIGRA.

CAP. XX.

Descriptio



Haud ita facile & promptum ex radiculis fibrosis, culmis geniculatis, foliis gramineis discernimen; at in panicula euidetissimum, quo à reliquis frumētaceis sine negotio distinguas licet, quæ ruber instar tremulis staminibus explicata, glumis geminis laxioribus hiantibusque, gemina grana oblonga, alba,

nigra, suis item aliis glumis, corticibusque duris haud distulter cedentibus, nisi molendino inuoluta, quorum granum alterum habitus aristas habet laterales, grana suis durioribus glumis delecta villosa sunt.

GAZA BR.
SALIN.

Theophr. 8. hist. cap. 9. inter ea quæ Tritico & Hordeo similia ait, Auenam (*ἄβην*). Ridiculè hic omnia à Gaza translata.) recenset: sed radice numeroiore constare asserit, & multis dispergi culmis, ac veluti siluestre quoddam & immite semen multiplici tunica integri.

Diosc.

Dioscorides Auenam (*ἄβην*) tum calamo, tum foliis Tritico assimilari, sed geniculis ab eo distinguit. In cacumine verò dependentes veluti paruulas locustas bipedes gerit, in quibus semen continetur.

Plin.

Plinius lib. 18. cap. 10. Bromon inter externa recenset, ab Oriente inuenta, Oryza similia: alibi inter vitia segetis Auenæ græcæ (non silvestris, quam sterilem Virgilius vocat. Avena græcæ, Bromos: Avena cui semen cadit, Ægilops. Dal.) Auenam rursus vocat Frumenti vitium, & Hordeum in eam degenerare scribit, ut postea fusius dicitur. Caterum, Auenæ semen maximè nudū tradit, in quo aduersari videtur Theophrasto, inquit Cæsalpinus, qui Bromon multiplici tunica regi testatur, & alibi, inquit, Auenam maximè natura operuit, ubi græcè Crocos legitur, quam vocem Auenam vertit Theodorus, sed Bromos legendum est. Sed Plinius nudum vocauit: quoniam membranæ in maturitate dehiscences maximè nudum ostendunt semen, proprio tamen cortice instructum, ut Hordeum & Spelta. Galeus frequentissimum in Asia ait, & potissimum in Mysia. Tertium autem genus Ægilops vocatur, manifestè quidem à Theophrasto Auenam vertit Theodorus; siluestre quoddam & immite, quod magis in Hordeo nascitur, terram vehementer extenuat, & multiplici tum calamo, tum radice constat, folio piloso: cultus mediis erumpit: & solum frugale desiderat, & coli exposcit, sed deleri contumax: cum annis alternis nascatur: non enim simul provenit ex omnibus seminibus, sed partim anno primo, partim se-

cundo: semen continuum, & bifidum cernitur, ut eius vna pars prius nascatur, altera posterius anno sequente. Dioscorides autem aliam videretur describere Ægilops nomine.

Conuario Bromos est Avena sativa, & non sponte proveniens, neque ex Hordeo degenerante producta. De bromo, inquit, Plinius ita scribit, ut & ipsum inter vitia segetis ponat, & cum Ægilope confundat, & tamen eadem quæ Dioscorides de ipso prodat. Germani Bromum Auenam albam; Ægilopa, Auenam nigram & barbaram appellant.

Idem alibi, Ægilops herba est, quæ Latine Avena silu. dicitur, & eratica, & barbata, & nigra atque sativa, ea sc. quæ inter frumentum ut pote eius vitium sua sponte provenit, atque Hordeo in eam degenerante fit. Differt à Bromo, qui Avena frumenticia est, sativa, pura, & quam albâ Germani vocant. Quum porrò Diosc. l. 2. de Bromo egerit, falsò de eo in quibusdam græcis codicibus lib. 4. post Ægilopa repetitur, ideoque hic remouendus erit. Huc usque Cornatius. Ei autem notam fuisse Auenam nigram vix dum credimus. Sativa siquidem non est: sed æquè plena ac ipsa alba; eodem etiam modo colitur multis locis, nec deterior, interdum etiam melior, & grano maiore. Nobis præterea videtur cum temere nimis hoc loco Theophrastum erroris accusasse. Differt enim Ægilops Theophrasti ab Ægilope Dioscoridis, cui non conuenit Avena nigra. Sed à Cornatii sententia alienus quoque est Dodonæus, duas Bromos constituens, vnamque frumentaceam, alteram verò herbam faciens. Et differunt sanè etiam Dioscoridis descriptiones.

Tragus Auenam duplicem agnoscat, sativam sc. & siluestrem. Sed ita rem tractasse videtur, ut quænam ambæ sint, obscurè admodum dixerit, nec facile extricari sit. Theophrastus (inquit cap. de sativa) tria frumenti sylvestris genera recenset, Bromò scilicet, Auenam, Ægilopa, & Lolium. Dioscorides verò indifferenter hoc frumenti genus nunc Ægilopa, ut lib. 4. nunc Bromon nominat, videlicet lib. 2. ubi de Avena frumento peculiariter agit. Germani *habern* vocant, nonnulli alii, videlicet impostores illi mendici, qui ut felicius homines decipiant, propriam linguam confinxerunt, quam vocamus *Beiserwelsch*, hoc est Mendicorum Stadicorum italicum. *Spigling* ab acuto semine dixerunt. Serapioni *Dausir* dicitur, cap. 25. De sylvestri inter vitia frugum, ita differit: Lolii primum genus in quibusdam aridioribus pratis, & collibus, nec non stramineis domorum tectis, provenit culmo, stipula & spica, Auenæ haud multum ab simile, fructus expers, quare lepidè Plautus in Milite dixit.

Mirum est Lolio videretur etiam vili Tritico, qui senarius in proverbium tandem abiit, quo notantur lusciosi & cæcutientes, vide Erasmus in Chiliadibus. Hoc Lolii genus Plinius proculdubio intellexit, cum libro 18. cap. 17. scribit. Primum omnium frumenti vitium est Avena. Nam & nos Germani id vitii *habern* hoc est Auenam dicimus, sed non simpliciter, ad differentiam enim frumenti Auenæ appellamus *Gauchhabern* vel *Neußhabern*, hoc est, Cuculi, vel Murium Auenam. Hæc Virgilio *Sterilis* Avena nuncupatur, Dioscoridi *steris*.

Magna est autem inter doctos controversia, quidnam sit Avena, quid Bromos, quid denique Ægilops, de quibus ingentia volumina conscribunt.

C. Bauh. pin. Avena i. siue vulgaris ita quoque phyt.

Phyt.] seu alba : Avena Brunfelsi, Matth. Fuchf. Dodon. Turn. Amat. Lac. Lon. Aduerf. Car. Tab. Lug. Avena sativa & prima Trag. Avena vesca, Adul. Lobel. Obs. p. 19. le. p. 31. Ger. Avena frumentum, Cord. in Diof. Avena prima species, Ang. Avena mitior & sativa, Cels.

Avena, Græcis Ἀβύνα, & forsan à βρύνα quod cibū significat, & ἀβύνα & Diof. Ger. Habern/Boh. Canere. Gall. Avoine. Ital. Avena, Avena. Hisp. Avena & Avena. Anglis Vete/Esse & Baler.

Ceterum, Avena calamina, est tibia vnde rustici plerumque cantare consueverunt: Marti.

Dom tua multorum vincat Avena tibiam.

Virg. Ecl. 1.

Sylvestrem tenui musam meditaris Avena.

Avena item est, culmus & stipula: Virgil.

Seges vana (vacua) elusit Avena.

Adhæc est Avena herba segetes necans: Virgil. Ecl. 5. & Georg. 1.

Inselæ Lolium & steriles dominantur Avena.

Symmachus : Nec rubigo segetibus obsuit, nec Avena fruges necavit. Steriles tamen Avenas aut secundum situm Italia Virgilium dixisse vult Horatius Gram. quod in Thracia fructuosæ sint aut ad discretionem earum quæ feruntur.

Avena quoque terram extenuat : in hordeo nascitur : Triticum inimica est. Primum omnium frumenti vitium Avena est, inquit Plinius, & hordeum in eam (nisi quoniam hoc Theophr. sed c. 1. lib. 4. caus. Triticum & hordeum sola in Lolium degenerare scribit) degenerat : sicut ipsa frumenti sit instar quippe cum Germania populi ferant eam ; neque alia pulce (eam hodie quotidiano usu frequentissimum Germani vocant Barmuss) vivunt. Soli maxime calique humore hoc euenit vitium. Sequentem quædam habet imbecillitas seminis, cum diutius retentum est terrâ, prius quam erumpat. Eadem est ratio, si cariosum fuit cum ferretur. Prima aut statim eruptione agnoscitur : ex quo apparet in radice esse causam. Est & aliud ex vicino Avenæ vitium cum amplitudine inchoata granum, sed nondum maturâ, prius quam roboretur corpus, afflatu noxio casu & inane in spicæ uanescit quodam abortiuo.

Terram paucis annis exhaurire Avenam, scribit etiam Virg. Georg. 1.

Vrit enim Lini campam seges, vrit Avena.

Loca amat rigua. Vere satis, sub finem æstatis maturefcit.

Bromi semen vtile est ad cataplasmata, quemadmodum & hordeum, sed & pulcem ex ipso faciunt quæ alium sistit. Succus autem ex ipso, à tussie nitibus, commodè sorbetur, Dioscoride & Plinio autoribus. Bromus est cibus iumentorum [inquit Galen. 1. alim.] non hominum, nisi fortè in extrema fame, ex hoc semine panes facere cogantur. Extra famem verò ex aqua coctum editur cum vino dulci aut sapa aut vino mulso, similiter ut Typha. Caliditatis autem satis patriceps est similiter ut illa, etiam si non similiter durum sit ut illa. Quare etiam alimentum minus corpori exhibet. Et alioqui panis ex ipso factus insuavis est, non tamen ventrem supprimit, aut impellit, sed hac parte medium obtinet. Item 5. simpliciter : Bromus est quidem vnum ex frumentaceis [σπυρμα] legendum fortè pro σπυρμα] sed ut medicamentum similem hordeo vinum habet. Impositum enim siccat, & discutit moderatè & citra mordacitatem. Est etiam frigidior paulò temperamento & aliquid astrictiois habet, ut etiam alui fluxionibus prodest. Quod verò Plinius ait Germanos avenacæ pulcem edere verum hodièq; est : sed quod nō alia pulce vivunt saluum :

Nostri [Cornarij verba sunt] ex Bromo Avena farinam crassiorē instar Crimini faciunt, quam cum aqua coctam addito butyro edunt aut sorbent. Et ex farina tenui pulcem parant. In Saxonia magna farina illa, crassior & velut Crimmon apparatus, omnibus ferè obsoniis aspergitur, vna cum sale & simul coquitur. Prudens æconomus & ouorum recentium cupidus, Io. Collerus, mense Ianuario gallinis Avenam totam exhibuit, ut citius & frequentius oua parerent, quod experimento comprobauit.

AVENA NUDA.

CAP. XXI.



le Avena, p. 1. Ger. Fuchiana nuda placet. Avena nuda Lob. Lin. Aduerf. pag. 9. Icon. p. 32. Dodon. Tabern. Ger. & C. Bauh. qui terram facit.

Descriptio

Mius per tinaciter glumis hæret Avenæ nuda granum, haud dissimili argumēto sic appellata, atque hordeum nudum, non enim habet durum corticē, ut Avena vulgaris, sed plures glumas, tunicæ sive tenues, paleaceas, potior autem granum ipsam habitus est, & ex albo fuluolens, quodammodo simili-

Descriptio

ÆGILOPS QVIBUSDAM ARISTIS RECURVIS, SIVE AVENA PILOSA.

CAP. XXII.



tibus, partim virefcntibus, latioribus quàm in vulgari Avena, cui similia grana intus bina communiter, rariùs singularia, taluo ac penè ruffo colore prædita, pilis haufcentibus ac pulchrè, Byssi instar, lucentibus, oblecta, quæ ferè Avenæ grana longiora sunt. Secas quas aristæ exeunt gemellæ, longe, duarum aut trium vnciarum nuntantes atque incurvæ, uti crura

Folia sunt Avenæ foliis amula, spica verò, si quæ alia eius generis Cerealia; admodum speciosa, pedalis, rariùs tamen, glumis stipata. Hæ quippe alias binæ, alias ternæ, longis & trium vnciarum pediculis hærent, perquam elegantes, glumis utrinque munitæ oblongis, lucentibus, striatis, pallidè partim virefcntibus, latioribus quàm in vulgari Avena, cui similia grana intus bina communiter, rariùs singularia, taluo ac penè ruffo colore prædita, pilis haufcentibus ac pulchrè, Byssi instar, lucentibus, oblecta, quæ ferè Avenæ grana longiora sunt. Secas quas aristæ exeunt gemellæ, longe, duarum aut trium vnciarum nuntantes atque incurvæ, uti crura

HISTORIAE PLANTARVM.

locustarum sylvestrium, rigidiuscula. Spica Aenae spicam pulchrè æmularur: nam in eius modum ex granorum, vti conicere est, pondere, pedicellorumque subtilitate, ita pendula atque tremula hærent glumæ, vti nec pendulas nec surrectas quis simpliciter dicere queat.

C. Bauh. phyt. Gramen 106. siue Festuca sterilis tertia: Eid. pin. Gramen Festuca 13. siue Festuca utriculis lanugine flavescentibus, *Abydos* Diosc. Theophr. (vbi Gaza Auenam vertit) Gal. Orib. Aegin. Hordeum festuca, seu Aegilops, Plinio. Aegilops Bromoides Belgarum, Lob. Festuca, prior Dod. Aenae tertium genus sylu. Cæs. Aena sylu. seu nigra Thal. Aegilops Dodonæi, inter Aegilopem & Bromum media, Lugd. Aegilops sexta, Bromoides 2. Tabern.


Reperitur in Germaniæ ac Belgii agris. Sunt autem facultates incognitæ, et nondum exploratæ vires.

GRAMEN CVM LOCUSTIS

paruis candidis pilosis, semine auenaceo.

CAP. XXIII.

Descriptio



Inter nostras plantas siccas obseruamus gramen, nescimus ubi collegerimus, ei sesquicubitalis calamus, tenuis, geniculatus, foliis septis tenuibus palmaribus; spica summo culmo vnicæ sextantis, minimum diuisa, glumarum binarum paruarum complexu semen semper continet vnicum Auenaceum, minus ni-

rida lanugine obsitum, quali carduorum semina sunt prædita, radix obliqua geniculatim incedens.

Clusius sub inscriptione Graminis montani Auenæ femine, sic in pann. & hist. describit: Elegans mihi videtur alterum genus Graminis montani spicati, cubitalibus culmis constans, tenuibus, geniculatis, qui palmaribus angustisque foliis septis, summo fastigio desinunt in tenuem oblongamque & nutantem spicam, in lanuginosis glumis, grana nudæ Auenæ similima ferentem: radix tenuis est, multique oblongis fibris prædita, singulis annis antèrè serpès, vti Spartu & Iunci.

Clusii figura quam assumpimus minus placet.

Tabern. Ic. & hist. (vbi 18.) Gramen auenaceum. *Haber Graß.* Casp. Bauh. phyt. Gramen 40. siue montanum auenaceum lanuginosum. Eid. pin. Gramen auenaceum, siue montanum lanuginosum, Hordeum distichon Gerar. icon.

Nascitur secundum vias, in montanis vmbrosisque Pannoniæ, Austriæ, & Bohemiæ: semen autem Iulio mense maturum obseruabar Clusius.

GRAMEN LOCUSTIS RVBRIS.

CAP. XXIV.

Descriptio

Calamos habet cubitales & altiores, graciles, geniculatos, foliis multis palmaribus & ses-

quipalmaribus ferè glabris stiparosis, spica summo culmo sedens duarum triumue vnicarum longitudine: iubæ aliquatenus similes, glumæ rubentes Auenaceis similes, misticæ tamen breuiores, crassiores, læues, tremulis petiolis appenduntur: radices fibrosæ, à capite vno pendulæ, in obliquum aguntur.

C. Bauh. phyt. Gramen 41. siue auenaceum non lanuginosum, aliquid cum gramine montano spicato Clusii Pann. p. 17. similitudinis habens: Eid. pin. Gramen auenaceum 2. siue mont. auenaceum locustis rubris: 71. in prod.




Varia caule læui in montosis: in dumeris humidis foliis cauleque subasperis.

C. Bauh. qui mihi misit, scribit Iulio & Augusto reperiri in montanis vmbrosisque circa arcem Baden-vilam in Marchionatu & Rhipensium Basilienisum. Nos autem obseruauimus circa S. Hippolytum & S. Vrsan. in

rupibus, florens Maii principio.

GRAMEN AVENACEVM, RARIORE grano, nemorense, Danicum.



Sesquipedali & bipedali, gracili, nitido, lucido & tremulo culmo, superne brevior, rarioreque, Auenacea gluma ornato. Radix summo caespite, Graminis canini quadantem, sparsa; sed villis longioribus annexis: foliis superioris stylu rui auenacei Graminis descripti in Stirpium Illustrationibus notis, exilioribus, vti tota planta. Casp. Bauh. pin.

Gramen auenaceum 3. siue locustis rariis.

Fagineis siluis montosis, non procul à Cronenburgo, vuido solo collegit Lobelius.

ÆGILOPS VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. XXV.

Aegilops Dioscoridi herbula (*Hordeum*) est folia Tritico (σπῆρμα) similia habens, sed molliora

liore, & in summo capite suis inclusa folliculis [hæc omittit Corn.] semina duo aut tria, rubra, & quibus arista velut capilli exeunt. Sed quid impedit, inquit Marantha, Ægilopem quaternam vel etiam plura in summo capite habere semina: etiam si Dioscorides dicat bina, & ternaria illi infesse.

Hordeum enecat Festuca, ait Plinius, quæ vocatur Ægilops, quod poculorum ægilops sanet, folio Tritici.

Plinium Ægilopem Auenam græcam vocare, & Festucaginem à Gaza reddi, legimus apud Hermol. Coroll. 732. & Io. Agricola cui præterea Ægilops Diof. est Auenæ sterilis Virgilij.

In Ægilope [inquit Leonici. in Plinij errata apud Brunfels. to. no. 2.] nescio an magis accusandus sit Plinius, qui in rebus adeo vulgaris, quibus nomina Latina non decant, Græcis utendum censuerit: an potius quoniam de eisdem herbis græcâ appellatione monstratis illa affirmat, quæ sensus falsa esse deprehendit. Ex Theophrasti verbis, quorum inagna ex parte sententiam Plinius, de virtutibus frugum agens, exprimit studuit, facile ostenditur Pliniani erroris in Ægilope, origo. Postquam enim Theophrastus fecerat de Orobanchæ mentionem, quæ amplexu suo Eruan strangulat, subdit eandem esse Ægilopi, quam Auenam Gaza conacrit, interrimendi rationem, idem subiunxit Plinius, hordeum enecat Festuca quæ Ægilops vocatur. Cur autem Ægilopem potius quam Auenam eodem loco dixerit Plinius, eam rationem affero, quod cum Græci duo Auenæ genera facerent, Bromum sc. & Ægilopen, hoc verò discrimen nemo reddidisset in Italia, ob id Plin. lib. 8. cum Auenam inter vitia frumenti collocasset, paulo post de Festuca quæ vocatur Ægilops, edisserit: non quod nesciret Auenæ id esse quoddam genus, ut nonnullos cauillari inquit Brunfelsius, inescil. inuens &c. Plinium in meo libello non reprehendi quod nesciret Ægilopem esse quoddam Auenæ genus, sed ob id, quod eodem capite modo Græcâ, modo Latinâ voce in eodem Auenæ genere uti voluerit. Nam quod Plinius lib. 8. Auenam in se nati vitium & hordeum in eam degenerare, hoc idem Theophrastus lib. 6. de plantis & Galen. lib. 2. de alim. de Ægilope etiam testatur. Quod verò etiam paulo post Plinius ait de Ægilope hordeum necari, id ipsum Theophrastus lib. 5. de causis plant. licet alio modo quam Plinius Ægilopi tribuit. Alterum quoque fastigium Plinius, si non eodem capite: saltem libro, aliquando Bromon, aliquando Auenam nominavit &c. Cur Plinius Ægilopem circumligando se hordeum dixerit interrimere, non scirem reddere rationem cum nulla Auenæ species, quæ id faciat agnoscat, sicuti neque Lolii &c. Sed cur Plinius in his apertis erroribus tam operose defenditur abs te Brunfelsi vbi Plinius Ægilopis naturam pervertit &c.

Pro Plinio aduersus Leoniceum stat randalph. Colinarius, sed an Plinium sufficienter defendat, Lectoris liberum esto iudicium. Ægilopem, inquit, quæ sylu. Auenæ sit, quis vnquam vidit vel iuuenta vel homines vesci? Tum Auenæ Tritici & hordei vitium est: quod duodevigesimo volumine docet Plinius. Ægilops verò (ut eodem loco Plinius) hordei morbus est proprius non vitium, & hordeo innascitur, quod quinto quoque & vigesimo volumine refert (populo etiam teste) duo esse Auenæ genera. Frugiferum vnum: sterile autem &c. Dioscorides quoque de

Auena. Ægilopéque seorsum tractans, diuersas illas esse indicauit. Non Bromi quidem duas species, 2. volumine cum referat, secundum à Romanis Auenam vocari: tum 4. volumine Ægilopen quoque à Romanis Auenam dici affirmat &c. Ægilopis semina maiora (quam Auenæ) nigra &c. Si Dioscoridis & Plinii scriptis & rationibus, & rei ipsius euentia, diuersa esse monstratur, [Ægilops & Auenæ] quis Leoniceum non errasse defendit, qui Plinii doctrinam taxare non sit veritus &c. Lectorem erit examinare an Plinium sufficienter defendat randalphus.

Theophrastum non nusquam, ut lib. 5. caus. Ægilope pro inani Auenâ, & lib. 8. pro herba hordeum enecat, hic tamen corrupte Ægilopa legit: Plinium verò Festucam vocare, in eademque dictione vagari, nunc frugem, nunc herbam facientem, testatur Rob. Constant. in Lexico.

Ægilops herba est quæ Auenâ Latine dicitur, sed ea quæ sua sponte provenit, atque hordeo in eam degenerante sit. Virgil. steriles Auenas dixit. Differt Ægilops à Bromo, quod Bromos Auenæ frumentitia est, satius, pura, & quam nostri albam vocant. Ægilops autem ex hordeo degenerante, & inter frumentum sua sponte provenit, utpote eius vitium, & alias etiam nascitur, & Auenâ sylvestris, & erraticâ, & barbata, & nigra, & fatua à nostris appellatur. Confundit tamen Bromon cum Ægilope Theophrasti & ipsam in hoc sequutus Plin. Quam autem lib. 2. de Bromo egerit Diof. lib. 4. post Ægilopa falso suppositus in quibusdam Græcis Codicibus habetur, & à nobis remotus est, inquit Corarius. Nobis autem non videtur ita temerè erroris accusandus hoc loco Theophrastus. Is enim nostro iudicio diuersam tradit Ægilopa à Dioscorideâ, ut facile est colligere ex eius verbis lib. 9. cap. 9.

Ceterum quanam hodie sit stirps Ægilops, inter auctores non conuenit. Est enim gramen quoddam Matthiolo, quod Ægilopem existimat. Est Festuca prior Ægilopis species Dodonæi: nobis Ægilops quorundam aristis recurrit, huc Auenâ pilosa. Habet Tragus Lolium secundum, Ægilopem Galeni, quod Gramen grai Montbelgardicum inscribitur. Ægilops Narbonensis & calidarum regionum Lobelij. Gramen quoddam tremulum à nobis describetur, quod est Ægilops vera Plinij, Trago. Gramen nodosum suspicatur auctor Hist. Lugdunensis Ægilopa Panij. Hordeum murinum cognominat Ægilopa Schuuenck f. Triticum fecale an Ægilops, Bichanelli. Ægilops dicitur de Auenâ tam alba, quam nigra. Ægilops Bulbi genus Plinio lib. 19. cap. 5. Hoc cuiusmodi sit, nondum cerè reperire licuit. Ægilops Dioscoridis Brunfelsio in sua Exageth, est Consolida regalis, de qua lib. 25. Hist. n. Ægilopa Dioscoridis, quidam aurumant Aquilegium, describitur lib. 10. Sed decipiuntur. Est porro Ægilops ex Quercuum genere, quæ Cerrus cognominatur. Hist. Lugd. per Ægilopa intelligit forte Tagum sepium.

Argus. Græcè & Lat. Ægilops, Germ. Taubhaber/wild vnd wasserhaver haber, Gerstentarten, & Theod. Goh in Onom. Müßereite von der gersten/Onkrast in dem gersten. Gallis, une sorte d'auoine nulle auoine, ou auoieron, Auoine sale: Auoine sterile, Auoine sauvage: adhæc Rustici Gallis Auron, quasi auenago vel æguulacina Gallia Celtica, Coquile.

In Hordeo non nisi post annum à semine suo nascitur.

Herba cum farina imposita sanat Ægilopas, & duritias discutit: succus seruatur ad eadem.

Plin. 111.

Auenæ steriles.

Bromos differt ab Ægilope.

Theophr. & Plin. a randalph.

Diof. corrigatur.

Aequivoce Gramen Ægilops forte Matthiolo Ægilops quorundam aristis recurrit. huc Auenâ pilosa. Gramen nodosum. Hordeum murinum. Secale: Auenæ Bulbi genus.

Consolida regalis.

Aquilegia: Quercus Cerrus. An Fagus sepium.

Nomina Linguarum

Tempus

Vires.

farinæ ammixtus, ac siccatus, authore Dioscoride. Plinio, Aegilopas sanat herba eodem nomine, semine contrito cum farina permixto, impositoque, vel succo: exprimitur hæc è caule, foliisque prægnantibus, demptâ spica vt in trimestri, digeritur in pastillos. Aegilopi Galenus discutiendi vim attribuit, id quod ex gustu cognosci scribit: leniter enim quodammodo acris est, imò etiam ex eo, quòd induratas inflammationes & ægilopas sanat.

GRAMEN SIVE AVENA STERILIS.

CAP. XXVI.

Descriptio **Q**uemadmodum spontanea pleraque satis strigiosiora, ita & sue spontis Avena, satius & colmi crassitie & altitudine cedit, cæteroqui ei satis similis, iubâ glumis, mollicellis brevium aristarum fetis, verum semine aut nullo aut crasso, trigo. o.

Locus & Tempus. In pratis circa admirabilem fontem in Ducatu Wirtembergico Augusto mense florens.

ÆGILOPS BROMOIDES IVBA purpurascens.

CAP. XXVII

Descriptio **V**alidis sed fibrosis fundatur radicibus, las emittens plures, bicubitales, valentius, longis internodiis distinctas: folia Avenaceis longiora, ridicula, angusta, subhirsuta, potissimum quâ à culmis abscedunt; vagina siquidem culmum complexa glabra est, iuba purpurascens diuisa. Inter glumas longæ, graciles, avenaceis strigiosiores iuba emicant: quâ verò perioli glumis committuntur flauescens villus circumnascitur.

Locus In Gallia Narbonensi tam inter segetes, sed raro, quàm ad squalidas arthorum margines collegit Gener Cheleus.

LOLIVM QVINTVM TRAGO, Hordei granis, aristis non admodum multis.

CAP. XXVIII.

Lolii genus exiguis & oblongis Hordei granis, sed aristis non admodum multis, nec asperis armatum, Tragus Bromon Dioscoridis esse iudicavit, ac præterea eorum sententiam improbandam censuit, qui caput illud apud Dioscoridem ceu supposititium pronunciarunt atque dânarunt. Adductus, vt ait, autoritate Theophrasti, tria Lolii genera describentis. Sed quamam consequentiâ necessitas? Theophrastus tria describit Lolii genera, ergo hoc quintum est Bromos Dioscoridis.

Tragus bromosus.

C. Bauh. phyt. Gramen 140. siue *Festuca sterilis altera*: Eid. pin. Gramen *Festuca* 2. siue *Festuca avenacea sterilis humilis*. Bromos herba graminei generis Thalii.

PHOENIX VETERIBVS.

CAP. XXIX.

Phoenicis nomine hic non intelligimus arborem illam, de qua lib. 3. cap. de palma egimus.

sed herbam, de qua Dioscorides, hæc scripsit. Phoenicea herba [poinē] quam aliqui Rhun, alii Anchinopa vocant, folia quidem hordei, at breviora & angustiora: spicam verò Lolio similem, & ramos circa radicem senum digitorum, ac septenas octonasque spicas. In aruis tectisque recēs illitis nascitur. Vim hanc habet in austero vino pota, vt alui profluuium, erumpentemque ab vtero sanguinem, vinarumque largiorem fluxum sistat. Tradunt & nonnulli in puniceo vellere amuleti instar adalligatâ, sanguinem suppressere.

Est & herba Phoenicea appellata à Græcis, à nostris ordeum murinum. Hæc trita ex vino pota, præclare ciet menses. Ita Plinius lib. 21. cap. 25. An verò eadem hæc sit, quæ Diosc. Phoenix, illud maxime ambiguum facit, quod menses illam ciere dicit: quum Diosc. Phoenix sanguinem sistat & alui ac vrinæ fluxum cohibeat. Galenus de Phoenice herba siluit.

Paulus Phoenix, inquit, quam alii Rhun vocant herba est Lolio similis. Vim habet adstringentem. Pota in vino austero omnia fluida sistit. Phoenix esse videtur, quam Germani (inquit Corn. Taubenborn) appellant. Sicut enim Aeginetia est Auenæ, & sterilis Avena dicitur, Phoenix Taubenborn: ita phoenix Ordei est, & sterile Hordeum apparet. Et propterea ipsum Anchinops, aut potius Anchinopis vocatur.

Guilandinus de Papyro affirmat falli Hermolum, Ruellium Marcellum, & qui eos sequitur Mathiolum (Rydium adde, Lobelium Dodonæum, & alios) quòd omnes perhibeant Phoenicem, nullam Dioscoridis herbulam, dici à Plinio Phoeniceam, & Hordeum murinum, decepti nominum similitudine.

Cæterum, pro Phoenice herba, variæ à variis exhibentur plantæ. Est nobis Phoenix Lolio similis. Phoenicem Tragi suspicor Aegilopem Matthioli. Phoenix, Leo, Carduus ferox, quid?

PHOENIX LOLIO SIMILIS.

CAP. XXX.

VT est eorum genus ferè quæ segetis nomine veniunt, ita & hoc vinum capillatam fibris radiculam habet culmis coactioribus plurimum, sesquicubitum nonnunquam altis, perquam tenuibus rarisque geniculis donatum; folia Triticeis angustiora, palmum aut sesquipalmum longa: spica. Loliacea ex atro virelscens aut rubescens, glumis alternatim ex culmi fastigio ortis, subiecco foliolo, Iunipero simili, non mordaci: glomerati frumentacei albi.

Lolium. Trago das Viert Queckengras / Lolium exiguum, Dinkel / Epelgen / Dort / quibetiam D. Petree Korn, & Wilddinkel / Rer Wils L. rei, G. f. coll. it. p. Eid. ear. Ein freute der Gersten gleich. Zingen helmer. & Walder. en / Lobel. Taubenborn / Menßhorn / & Mângersten / Matth. germ. Belg. Musseforen: Gall. turay saunage: It. Loglio saluatico: Boh. Wyp. fa. fol.

Phoenix Matth. Turn. Lacun. Dod. (cui & Lolium murinum) Cast. Cord. Lon. Cas. Lugd. & Lob. Obs. p. 21. Ic. plant. p. 34. Hordeum murinum, Guil. Lob. Tab. Graminis Loliacei 4. genus Tragi, Tal. Lolium rubrum Ger. Gramen Loliaceum 3. siue angustiore folio & spica: poinē Diosc. oridi, à feminis colore phoeniceo, Herba phoenicea

siacea Græcorum, Hordeum murinum Romanorum Plinii, C. Bauh. pin.

Nascitur in aruis, secus vias, & in ædificiorum rectis: in Italia, & Gallia frequens, & vbiq; ferè obuia: reperitur etiam in Vbionum & Eburonum finibus. Eam proximè sequens Icon non male representat.

LOLIUM GRAMINEVM SPICATVM CAPVT TENTANS.

C A P. XXXI.



Stipulas habet cubitū vñ, duos, tres, & altas, striatas, paucis nodis articulatas, foliis amictas gramineis, in spicam ferè spithameam desinentes, figurà peculiari, liquidem alteratim ex culmi lateribus grana terna aut quaterna, & quina, in paruas aristas desinentia, rubentia, triticeis strigoliora,

glumis adhærentibus clausa, pedicellis breuibus connexa, pusillæ spicæ forma, exeunt,

Figura Lobelii in Obs. p. 22. ic. plant. p. 35. titulo Lolij & Tritici temulentii melius placet, quàm nostræ, quæ iam facta erat.

C. Bauh. pin. Gramen loliaceum 1. siue spicâ largiore. A. p. 2. Diosc. Arist. Theoph. Gal. Orib. Aegin. Act. Zinzibion Constant. Zinzania Arabum. Lolium & Aera, Plinio. Lolium Ruell. Matth. Ges. cat. Ama. Cordo in Diosc. Tur. Dod. Cæf. Cast. Lugd. Taber. Lolium & Triticum temulentum Advers. Lob. Lolium verum, Gesn. hort. Lolium album Ger. Frumentum satuum, Lon. Variat: communiter aristas habet, sed sine aristis quoque Bononiæ obseruatur. 2. Eidem Gramen loliaceum latifolium spicâ angustiore, quod sic describitur: Gramen loliaceum latifolium spicâ angustiore: Ex radice alba, arundinacea, fibrosa, culmi aliquot bicubitales exurgunt, foliis paucis, latiusculis, oblongis cincti, quorum summo spica angusta, uncias quatuor vel quinque longa, Phœnici vel hordeo marino similis. Babilæ circa Cliben, longioribus & brevioribus foliis varians reperitur.

Lolium autem esse æpau Græcorum, non est ambiguum, etiam si plinius diuersis locis, tanquam de diuersis agat. Ager potrò vocarunt græci, teste Lobelio, vt coniectura fert. Sed & adpota, quod est efferti & artolli, vel fursum rapi: rapitur quippe in cerebrum Lolii rapida nocua aura, atque dementiæ affinem tenebricosam vertiginem, temulentiamque efficit. Quo quidem maleficio vel infimæ plebeculæ notum, & inuisum plus satis est, præsertim Galloprovinciæ, Narbonæ, & passim in reliqua Gallia vbi Turayæ, quasi ebriosa vel inebrians vocatur. Quippe etiam in

Tom. II.

Nortmannia, Belgio & Anglia, non solum panimixta farina, sed multò magis Cerealibus potionibus, Ale & Byere addita, & feruefacta, torpore & temulento veterno cerebrum opprimit, & opacat, reliquaque membra torpida reddit. At fortis admotum, eiusdem ex axungia depositum cataplasma, eadem pellit incommoda, doloresque diuturnos artuum & pericranei soluit.

Spica similior nulli quàm Phœnici, vt scitè Dioscorides monet: eoque qui alterutram norit, ambas nouerit. Granum in dura tunica: stipula, radix, & reliqua Tritici, vel Secalis sunt: eoque ea in opinione, qui ex Theophrasto est Senensis, vt hæc Theophrasti pestis, rursus in Triticum redire solita sit: verum dixit, ita ineptum & physices imperitum se prædit, quum de Hippocrate Historiam, è Plinio exemplum sexus humani mutati, adducit. Quippe neque ad rem facit hic sexus mutatio, & in plantis sexuum distinctio non vera, sed metaphorica & figurata doctis merito censetur: igitur res vera, ratio improba. Nullus enim non nouit hic defecisse Lolium à Tritico, nec in fœminam abiisse, sed in vitium quoddam, aut aliam segetis speciem; calidius enim & siccus est Lolium reliquo quolibet frumento; improbum alendo, præsertim homini, Tritico autem planè contrarium natura. Hoc enim homini salubre, veterinarie autem nex plerumque. At Lolium hîc, vt neque alitibus gallinis nocet nihil, illi tamen plurimum, quare specificæ differentie sunt, non maris aut fœminæ, vt blaterabat Commentator. Quin etiam Lonicerus Germanus Botanicus minimè bonus.

Dicitur & Diosc. Græcè: Arab. Zizania & Sceylem: Germanis tualsch, cum in Hordeo nascitur: in Secale verò trespe/trabsendort, & tresdorp, Cordo. Vocatur & Fühwetzgen, hoc est, Triticum vaccinum, & Lûsch, corruptâ Lolii Latine voce. Belg. Solich. Gall. juraye, ou juraye, & luitale. Ital. Loglio. Hisp. joio & zezania.

Nascitur in aruis cum Tritico ac Hordeo, se- Locut: minibus ipsorum corruptis, ac in deterius, vt galenus ait, permutatis, & solo quidem præsertim vliginoso per cæli, mensibus potissimum hybernis, tempestatem humidam.

Lolium molitum vim habet emarginandi ac Vires: circumscribendi nomas, & putredines, & gangrenas, si cum raphanis & sale imponatur. Impetigines feras, & lepras cum sulphure vino & aceto curat. Cum stercore verò columbino, & Lini semine coctum in vino, strumas dissoluit, & quæ agrè maturantur, rumpit. Cum aqua mulla coctum ac impositum, coxendicum morbo laborantibus prodest, addita volenta, aut myrrha, aut croco, aut thure. Idem suffitum conceptus adiuuat, authore Dioscoride. Plinius lib. 18. cap. 17 Lolium, inquit, non minùs quàm Rubum, inter frugum morbos potius quàm inter ipsius terræ pestes numerauerim. Et paulò post. Aeræ granum minimum est in cortice aculeato. Quum est in pane, celerrimè vertigines facit. Aiuntque in Asia, & Græcia balnearores, quum velint turbam pellere, carbonibus id semen iniicere. Et lib. 22. cap. 25. Aerina fatina magis cæteris purgat vlcera vetera, & gangrenas. Cum Raphano & sale & aceto lichenas. Lepras cum sulphure viuo. Et capitis dolores cum adipe asserino imposita fronti. Strumas & panes concoquit cum fimo columbino & Lini semine decocta in vino. Et ibidem inferius. Quin & ipsæ frugum pestes in aliquo sunt vsu. Infelix dictum est à Virgilio Lolium: Hoc tamen molitum, & ex aceto coctum impositum.

q; sanat impetigines, celerius quò sapius mutatu est. Medetur & podagra, aliisque doloribus cum Oxymelite. Ratio hæc, Aceti sextario vno diluuntur mellis vncia duæ. Iustum est ita temperatis sextariis tribus, decoctæ farinæ Lolii addere vsque ad crassitudinē, calidumque ipsum imponi dolentibus membris. Eadem farina extrahit ossa fracta. Atque hæc est veteris codicis lectio.

Plinius mo-
tatur.
Dioscor. le-
gitur suspe-
cta.

Et sanè Plinius neque integrè, neque distinctè medicamenta à Diosc. præscripta expressit: quanquam etiam Dioscoridis lectio non satis probè sit distincta. Cornarius ita distingui ac coniungi debere censuit, velut hic reddidimus, maxime ea quæ postrema habentur, vt Iſchiadicis cum aqua mulla coctum, & adacta polenta, aut myrrha, aut thure impositum Lolium molitum prodesse velit: & deinde ipsum solum suffiti, & non cum aliquo ex his quæ præcedunt, quæ concoquendæ coxendicæ affectionis gratia, commodè in cataplasma Loliaceum ammiscentur. In præterea ad suffitus adhibentur. Desiccatur vt Galenus lib. 6. de simpl. medic. facult. & exalfacit efficaciter, vt propinquum sit acribus, magis quàm Iris: sed non est perinde vt illa subtilis essentia, verum multum ab hac deficit. Secundum hoc, ponat ipsum quispiam in principio tertii ordinis excoctacientium, secundi verò in fine excoctacientium: *Lolium*, autem frugibus, ex quibus Cereuisia coquitur, permixtum, ebrietatem citò excitantem eam reddit: idem potest panis copiosius additum. Nocet verò & oculis, caliginem insidens adferens: quod & Ouidius Fastorum lib. 1. scriptam reliquit:

Et caveant Lolus oculos viciantibus agri.
Atque hinc natum videtur prouerbiū: vt cæcizantes Lolio viderare dicantur.

GRAMEN GROS MONTBELGARD.

CAP. XXII.

Descript.

Calamis est cubitalibus, nodosis, in quibus folia graminea, summâ stipulâ spicæ complures in lubæ formam conspiciuntur, tenuibus, as-



peris pediculis appensæ, vnciam circiter longæ, binis versibus compositæ, granis nouenis, aut paucioribus, vix vquam pluribus, Secales paribus, formâ aliis, rubris, canaliculatis, duris, gluma bifori hirsuta in breuem aristam (quæ postremæ glumæ geminæ) desinente conclusis; radices multæ, capillares.

Festuca al-
tera Dod.

Dodonæus hanc plantam sic describit: Altera Festuca, quæ propriè Secalis vitium est, culmis foliisque Secale refert, culmos obtinet Tritico Hordeum tenuiores, in quo-

rum summo veluti effusæ pendente iubæ, Auenæ propemodum similitudine, sed breuiiores, arctiusque coniunctæ. Semina oblonga, sunt, longitudine grani Secalini, sed angustiora, tenuiora, leuioraque multò, quæ membranulis siue utriculis paruis continentur, è quibus cum in area teritur, concidunt.

Germani *Dort* & *Lülch* vocant: Brabantii *Drauid*: Latine Festucam alteram non malè quis dixerit. Nam inter ea quæ frugum similitudinem gerunt, illasque interim infestant, minimum ac leuissimum est granum: Festucis ea de causâ similitum.

Gramen hoc, quod Tragus lib. 2. cap. 25. pro Lolio germ. *Dort* dicto describit, nullo modo existimo fieri ex mutatione Hordei & Tritici: multò minùs idem esse cum planta, quam pingit pro *Dort* & Lolio. Hordeum, Triticum, & *Dort* Tragi annuæ sunt plantæ, non repentes: ac præterea spicis inter se multum dissident. In eo etiâ aberrasse videtur, quòd Aegilopa Galeni, sed non Dioscoridis, esse crediderit, sed potius *Aipa* eiusdem, & Zizaniæ Auicennæ.

Sed & Dodonæus (perhibente Gesn. hort.) Aegilopem fecit *Dort* germanicè dictam, eamque lib. 2. imag. pro Lolio pinxit: circa finem verò eiusdem libri, se emendans, Aegilopem nuncupauit & pestem Secalis esse dixit. Refert idem Gesner. Tragum hanc plantam tertio inter Lolia loco describere, qua in re non parum hallucinatur: nam secundo, ni fallor, loco traditur.

C. Bauh. pin. dicitur Gramen Festucæ i. siue Festucæ gramineæ glumis hirsutis: Lolium 2. Trag. at 1. iconè Aegilops & Festucæ, Dod. gall. Gesner. hort. Bromos, Lac. altera, Ger. Bromos sterilis altera, Lob. Obs. p. 21. Ic. plant. p. 33. & Hist. Lugdunensis Lolium Lon. Festuca altera Dodonæi Gramen murorum Dalech. Lugd. Festuca graminea, Tal. Phœnicis altera species, Eid. Simphonium, Bromos herba, Tabern. Variat spicis, quæ aliquando quasi in fasciculum comprehensæ, & Phœnix altera est Thalii: aliquando dispersis: sic aliquando glabris, aliquando hirsutis & propriè Secales vitium est.

Propriè Secalis vitium est: cum aliis enim frumentis, aut non rarissimè reperitur: succrescit, veluti & alia huius generis, per imbres frequentes: anni hyemisque constitutionem clementem ac tepidam.

GRAMEN SPICA HIRSVTA, ad Gramen du Gros accedens.

Svimus culmus spicâ insignis est duum triumve vnciarum Triticæ simili, magis diuulsa, glumis multiplicibus, hirsutis, aristis mollicellis, perbreuib; nec effatu dignis: folia per stipulam scilicet cubitalem angusta, villosa, candicantia. Radices crassæ, duræ, fibras crassiusculas habent appensas, perennes.

Nemauit inter Triticum præcipuè obseruauit & collegit Gener Cherlerus.

GRAMINI MYRALI DALECHAMPII simile, si non idem.

AD Gramen du gros Montbelgardensisbus dictum nonnihil accedit: à quo natalibus aliisque quibusdam notis differt: nascitur enim in parietinis, culmis multis cubitalibus & altioribus,



bus, foliis ad genicula non ita dissimilibus, sed hirsutis & fere canescentibus; iuba eundem habet cum gramine *du gro* positum, cuius partium textura itidem distichos, spicas breues imitata, aristis mollibus brevibus, glumas etiam molles, striatas, arman-
tibus, tantillū hirsutas, squammatim incumbētes, strigosiores, & semine crassas. Radix capillari-
bus fibris contex-


ta est. Nisi figuram paratam habuissēmus, meliorem exhiberemus.

Figura Hordei mutini Tabern. optimē conuenit nostro Gramini, sed cetera nomina, ut phoenicis & Lolii non item, existimo præter aurotis sententiam figuram plantæ quam non intelligat appositam. Præter Casparus attulit ex Italia nomine Cynopis Theophrasti & Canaria.

Genevæ observavi & in valle Griselbachiana ad thermas acidas: Patavii provenit, nec non Basilicæ & Montbelgardii.

ÆGILOPS MATTHIOLO FORTE.

CAP. XXXIII.



Folia graminea, angusta, hirsuta: culmi plures, cubitales, geniculati, tenuces, paniculam ferunt singuli multifariam diuersam, cuius portiuncula squammatim è pluribus glumis compactiles spicam parvam mentiuntur, locustis Auenæ non multum dissimiles, aliàs singulares, aristis do-

nata mollibus, longis.

Lobel. sic describit: Bromos, siue Auenæ sterilis, ab Auenis vefca, vfu quidem diuerso, sed genere & figura non diuersa: vtrique enim vt nomen sic facies, & natales eadem. Sed minore gracilioræque pedali stipula, apiculique stamineis delicatioribus, minime mordacibus, comosa effigie, semen feruē euanidum, in tunicis feruē vacuis.

C. Bauh. phyt. pag. 23. gramen 104. siue Festuca sterilis.

Tom. II.

Trago fortè Lolij i. genus est, quod Plinium lib. 18. cap. 17. per primum omnium frumentū vitium, Auenam intellexisse asserit: Virgilium verò per Auenam sterilem, & per phœnicem Dioscoridem. Vocat germ. *Gaichhabern* & *Maüßhabern*, hoc est, Cuculi vel murium Auenam.

An Matth. in prior. Comm. *Ægilops* siue *Festuca*, Ananienis ruri vulgò *squala*. Arabib. *Dausir*, *Dalsir*, *Dufana*, *Dauser*, siue *Dusser*: Ital. *Ægilops*. In post. comm. similem habet figuram sine descriptione pro *Ægilope* prima, olim vera existimata, vt ait, Italica nomina adimens. Videant ergo *Lectores*, qualiter se extricent ex Matthioli scriptis.

Tabern. icon. p. 114. & Hist. p. 666. *Ægilops* i. Auenæ fatua. *Cerfien* / *Tralch* *Gaichhabern*, habet *gras*, *αἰχμή*, *Festuca*, *Festucago*, *gaza*, *Bromos* sterilis, Virgilio Auenæ sterilis 1. Georg. Plinio *Hordeum festuca* 1. 18. cap. 17. Ital. *squallo* & *squala*. Galli, *Lauron* & *ayron*. Angl. *Dranch* & *wile orca*. Fland. & Brabant. *Dranch*. Spica *Hordeo* similiore, nisi minores essent, nec ita aspera, sed molliore.

Dodon. gall. *Cœqu* & *mā*, *Bromus* herba, & Auenæ herba. gall. *Aueron* aut *aueneron*. Eid. Hist. frum. & in fol. Lat. *Bromus* herba Auenæ & *Ægilopi* similis est, habituque ipso sylvestris quædam Auenæ, multiplicibus enim geniculatque culmis, foliisque eam refert, licet vtriusque tene-rioribus iuba rarior, aristas asperiores, longioresque habet: radice firmatur copiosa ac tenui. Nominant eam græci *βροχυν μάα*, id est, *Bromum* herbam, ad differentiam Auenæ, quæ græcis quoque *Cœqu* & *mā* aut *Cœqu* & dicitur.

Lobel. in Adu. notat falsò primam dici *Ægilopen* apud Matthiolum, & *Bromon* esse. In Obs. p. 10. figuram Dodonæi habet nomine *Bromi*, vocans p. 21. *Festucaginem gaze*, Italicorum *Vena vana*, id est, Auenam caissam, & *Orca*, *saluatico*, & demum *Ægilopen* alteram, non primam Matthioli.

C. Bauh. pin. gramen *Festucæ* 7. siue *Festuca Auenacea* sterilis clatior *Cœqu* & *Diosc.* aliis *Cœqu* & *mā* ad differentiam Auenæ. *Festucago gaze*. Lolii primum genus, Trag. def. *Ægilops* prima Matthioli. altera in comp. *Ægilops* Lac. vera cœsn. hort. *Bromos*, & Auenæ herba. Dod. gall. *Festuca* & Auenæ græca, Lon. Auenæ sterilis, Adu. Thal. *Bromos* sterilis Lob. icon. ger. *Bromos* herba, Dod. Luzd. Auenæ græca Cæf. *Ægilops* 1. & Auenæ fatua Tabern.

Herba natura sua in totum sylvestris, Aestate Maio mense secus vias in pratibus, agrorum marginibus & segetibus reperitur.

GRAMEN TENVIFOLIUM HIRSVTUM, BARBA ÆGILOPIS OLIM MATTHIOLO.

CAP. XXXIV.

Radices tenues albæ, è quibus enatōtūm culmorum pars ima nodosa, satis profundè in terram depacta, festucis siccis comata, vt in Nardo Indica: folia dodrantalia, angusta, hirsuta, potissimum quæ calamos ambiunt, angustiora multò quàm sint *Ægilopis* Matthioli: calami hirsuti, geniculis nigris distincti, iuba diuulsa, vt in *Ægilope* glumis crassioribus ex pediculis robustioribus, rubentibus, cum aristis multò brevioribus.

O o ;

An Dodon. Lat. in fol. Gramen pratense, sine descriptione.


Lob. & Pena aduers. p. 2. Gramen minus (sic in l. p. 1.) istud quidem quod fundit montanus, incultus, & aridior ager, vt pabulo gratus & vtilius velleri, sic multo delicatius, minus & semine efficacius est. Ex succincta hac Lobelii descriptione nondum intelligo quam plantam intelligat: suspicor figuram demonstrare à nobis descriptam, non tamen assero. Tabern. icon. Gramen minus, & Hist. vbi Gramen 4. Grass. Figura Tabern. videtur facta ad imitationem figuræ Lobel. vti Dodon. Scio fratrem Gramen minus Lobelii & Tabern. ad aliam plantam referre. Genear. prouenit, aliisque in locis obseruauimus.

Locus.

PANICVM VVLGARE, PVNICEVM,
& spica diuisa. CAP. XXXV.

Panicum vulgare.

Descriptio




Panicum puniceum.



composita, in quibus semen Panici vulgaris copiosius. glutinâ etiam non alia, sed aristis, quæ inter grana plurimè emicant purpurascens: fo-

lia arundinacea, frequentia, vaginis longis caulem involuunt, adeoque & inferior vagina superiorior excipit, tactu aspera. Est mihi quoddam

Panicum spica diuisa.



Panicum spica insigniter diuisa, cuius figuram nouam exhibemus, scitietiam Panici punicea, alias vti parata erant proponim' pro vulgari.

È frumentis quæ Hieme in herba sunt, verò tempore in culmum geniculatum & concuum fastigiat. Panicum, quod pro indiuiso [Constant. legit, tantum pro indiuiso: ex-

ponitur sine diuisione, in commune, communiter. Quo genere loquendi vltus est Caro cap. 137.] & paruis auibus expositum est. Indefensum quippe membranis continetur. Est verò à P. inculis dictum, cacumine languicè nutante, paulatim extenuato culmo penè in furculum, prædedit aceruatur granis cum longissima pedali obba. Diocles Medicus mel frugum appellauit. Hæc Plin. lib. 22. cap. 25. Dioscorides refert Panicum alios Melinen appellare, & frumentaceis seminibus, Milio simile. Et hæc est fortè occasio, cur Tragus inscribat Milium agrestè seu exiguum Klein oder wilder Hirs / quod alii Pannicum, Germ. feuch & Heidelfeuch appellant. Iudicauit porro & Typham, à paniculata iuba nominandâ.

Ruellium, Panicum in Italia Melicam vocari scribentem hallucinari refert Matthioli in prior. comm. vbi *ελυκος* à Græcis appellari ait, Arab. *Dodon*: Italis *Pannico*: Germ. *Pfenich* / *Heidel-Pfenich* / *pray* / *fuchschwang*, i. e. cauda vulpina: Hisp. *Panico*, & *Paniso* Gallis *Panico*. Meminit in post. comm. lat. cum mag. fig. Panici pedali longitudine panicula: tradit & aliud, mammosas ferè paniculas gerens, & semen racematim proferens copiosiore prouentu: addit colore paniculas variare: nam quasdam candicare, alias rufescere, plures flauescere. In It. asserit Panici genus quoddam semine luteo, & aliud albo: figuram ponit qualis nostra ad puniceum facta. Cæterum errandi occasionem præbuisse videtur Ruellio nominis Melicæ cum *ελυκος*, siue *ελυκος* vicinitas, quæ fecit vt Panicum & Sorghum inter se confuderit, & Melicæ descriptionem cum Panici miscuerit: *ελυκος* dictum videtur quasi Melicam quidpiam: *ελυκος* verò, forsan ab *ελυκος*, quod est inuoluo.

C. Bauh. pin. Panicum 1. siue Germanicum, siue *Panicula minore*: *Paniculum* Fusch. Tur. Dod. Cord. Gesn. hort. Lon. Lob. Obs. p. 24. l. c. p. 41. Cæf. Cam. Tab. Ger. Variat paniculis albis, flauis & purpureis: semen album, luteum, rufescens: Dioscorides frumentaceis, Gal. leguminibus iungit. Eid. *Panicum 2. siue Italicum*, siue paniculâ maiore. *Panicum* Marullo, Hermolao, Ruellio, Matthiolo, cui & *Domesticum*: Anguil. Cæf. Portæ. *Panicum* *suu-*

fatium, Lugdunensi. Panicum vulgare, Clus. Hist. Panicum aliud Indicum, panicula villosa, Lob. Ic. p. 41. Panic Indici spica Dodon. Panicum Indicum, Tab. 6er.

Plinius lib. 18. cap. 7. recenset Panicum inter frumenta aestiva, ea sc. quæ æstate ante Vergiliarum exortum feruntur. Cap. 26. Extremo ergo hoc tempore Panici satio est. Iustum est hoc feri maturato Hordeo, atque etiam in eodem aruo. Estque signum illius maturitatis, & horum sationis commune, lucentes vespere per arua Cicindela. Ita appellant rustici stellantes volatus, & ræci vocant verò lampyridas, incredibili benignitate naturæ. Cap. 17. Panicum in frigido & aquoso prius serendum, postea in calido agro. Pestem à Panico sturnorum passerumve agmina, abigunt herba, cuius nomen ignotum est, in quatuor angulis segetis defossa: mirum dictum, ut omnino nulla avis intrer. Cap. 10. Panicum aquis minime gaudet, cum in folia exit. Vescit id inter vites arborisque frugiferas feri, terram emacrarî hoc faru existimantes.

Panicum Dioscorides Milio simile dixit, eodemque modo in panes subigi: eisdem habere vus: pinus tamen & nutrire & adstringere. Panico gallia quædam, præcipue Aquitania vititur, inquit Plinius lib. 18. cap. 10. Sed & circumpadana Italia, addita faba, sine qua nihil conficiunt. Pontice Gentes nullum Panico præferunt cibum. Item lib. 22. cap. 25. Panicum effectus habet quos Milium. In vino potum prodest dysentericis. Similiter his quæ vaporanda sunt, excofactum imponitur. Siftit alium in lacte caprino decoctum, & bis die hauriunt: sic prodest & ad tormina. Colu n. Panicum pinsitum, & evolutum fursare, sed & Milium quoque, pultem, panis inopia, maxime cum lacte non fastidendam præbet. Galeni sententiam exi. de alim. ubi Milium minus alium cohibere dicit, quam Panicum, suo loco adscribemus. Cæterum ei contrariatur Dioscorides, quod & ego inquit Corn. ita se habere credo. Verum 6. simpl. phar. ita de Panico scribit, Panicum quod & Meline vocatur, ex leguminibus est simile Milio, & specie, & viribus parum ab eis, & siccandi vi prædicit. Siftit etiam ventris fluxiones, quemadmodum Milium. Si verò extrinsecus impolitum fuerit, siccet & frigescat. Quo loco *ἡ ἰσχυρὴ ὁρμή*, legitur, quod Diosc. dixit *ἡ ἰσχυρὴ ὁρμή*. Indiscriminari enim *ἡ ἰσχυρὴ ὁρμή*. Galenus etiam *ἡ ἰσχυρὴ ὁρμή* vocat, alioqui enim *ἡ ἰσχυρὴ ὁρμή* appellari dixit illa cerealium femina, ex quibus panis non fit. At verò quod Plin. dicit, Dioclem panicum mel frugum appellasse, non aliud est quam expositio vocis *μελίτης*, quæ melleum quid significatur.

Porrò, licet apud Hist. Lugdunensem legatur nullum hodie Panici nec officinis, nec panificio esse vsum, quòd, cum siccum admodum & macilentum sit semen, parum admodum præbeat alimentum, ideoque auiculis obiciatur. Clusius tamen perhibet magni per vniuersam germaniam, Vngariam, & Bohemiam Panici vsum esse: etenim in alimentum cadere ac pulres ex eius semine deglutato fieri non ingrati saporis.

emittens culmos eoque medulla alba farctos, foliis donatos ad singula genicula arundinaceis: iam verò cylindraceas spicas, non in summo tantum culmo gerit, ut nostrate Panicum, verum etiam è nodis & alis foliorum aliam spicarum sobolem parit, quæ ut longitudine cedunt nostrati, ita crassitie vincunt, pilosæ: In his semen stipatu denso Panici nostratis, subcæruleum, Milio par,



ab vna parte, quæ adharet secundum longitudinem striâ donatum, leue, gemellum ferè, ex pediculis vnciâ longioribus, pilosis, glumis inuolutum.

Clus. plant. Americ. nam. ta describit: Est præter Panicum vulgare genus aliud ex Peruviana provincia primum in Europam illatum: habet autem id culmos longè

crassiores, firmiores, altiores vulgari Panico, & planè harundinaceos, ut quos humanam altitudinem attingere, interdum etiam superare plerumque viderim, crebris geniculis & veluti articulis præditos, & lanugine obritos: folia harundinacea è singulis articulis prodeunt, longa, lata, dura. Melicæ foliis non valdè dissimilia: inter quæ prodeunt è geniculis alii veluti breviores culmi, similibus foliis obstri, desinentes in spicam digitalis longitudinis, nonnunquam breviorum, & duntaxat pollicarem, densè compactam, & æqualis propemodum vbique crassitudinis: femina oblongiusculis gracilibusque petiolis innixa proferentem, & capillaceis veluti glumis inclusa, quæ extimâ parte è glumis prominente, crassiora, magis rotunda, & quasi orbiculata sunt, lævia, subcærulei coloris, qui in calidioribus regionibus magis satur est, raro tamen vel in germania, vel in Belgica (in illis enim provinciis sæpe terræ mandavi eius femina ex Hispaniis accepta) ad plenam maturitatem proueniunt: radices eius fibrosæ sunt, validiores & maiores, quàm in vulgari Panico.

C. Bauh. pin. p. 27. Panicum 3. siue Indicum spica Synonyma obtusa cærulea. *Panicum cæruleum Indicum*, Adu. Lob. icon. Cam. Tabern. *Panicum Indicum* Dod. Ger. siue peregrinum, Lugd. *Panicum Americanum*, Clus. Hist. Pannicula est subcærulea, in calidioribus regionibus magis saturata. Panici nomine & Phalaridis Ethiopice accepimus huius plantæ semen.

Figura Panici Indici Dodon. de frum. & in fine Hist. Flor. ac in fol. Lat. satis comoda si semen pingeretur duplex ex vno pediculo: descriptio an quadret Panico hæreo.

PANICI AMERICANI SESQUIPEDALIS SPICA.

CAP. XXXVII.

Huius Panici Americani spicam crassam val. Descriptio dè firmam & bene compactam, non vbique

Qo 4

PANICVM COERVLEV M SIVE INDICVM.

CAP. XXXVI.

Organi altitudinem assequitur Panicum Indicum, similiter ex fibrosa valida radice multos

Tom. II.

tamen æqualem, sed paulatim & sensim extimā parte gracilescens, sesquipede longiorem, nec tamen integram ad me mittebat (inquit Clusius) Londino Iacob. Gareto anno 1592. à Nauclero quodam Anglo ex sua nauigatione reduce emptam, cuius semina, non multo maiora mihi visā, quàm illius Panici Americani, cuius modò meminī, cæteroque prorsus similia: nisi plura



simul iuncta, & hispidā glumā inclusa, breui pediculo inniteretur: illius stirpem nascentem videre non licuit, nam serere neglexi, quia vetustate nimis rescitatum existimabam, spicam tamen in lignea tabella Franciscofurti exprimebam curabam à perito artifice, vt hoc loco infererē, digna enim mihi videbatur, cuius aspectu alii etiam fruerentur. Proximè autem sequente anno scribebat

ad me N.V. Carolus de Tassis veredariorum Antuerpiæ Praefectus, ipsi natus sit plantam semine quod ab eodem Gareto acceperat, non valde dissimiles illis, quæ iam à multis in Belgicis hortis sunt conspectæ: nec dissimiles etiam spicas siue paniculas protulisse.

Cum hac spica eandem attulisse generum Cherlerum redeuntem ex Anglia 1605. existimamus, eamque à Iacobo Gareto peritiss. Pharmacopæo datam, minorem tamen præcedenti. Est autem tantum palmaris, quia nondum matura vt iudicamus, ea repræsentat aliquomodo plantaginis spicam aut Piper longum, vtrique parte gracilior: crassitudinis circiter calami ordinis, constat veluti squamis pulchrè ordine sursum tendentibus, scapus diducitur in plurima fractu mediocriter contumacia fila: Color pallens, obcurior, sapor nullus manifestus


Synonyma C. Bauh. pin. *Panicum* 4. siue *Indicum* spica longissima. *Panicum Americani* spica grandis vel sesquipedalis, Clus. Hist. *Panicum Aethiopicum ex Guinea*, Clus. hist. ap. ad lib. 5.

PHALARIS.

C A P. XXXVIII.

Descriptio Vulmo adolefcit sesquicubitali, Hordeaceo, quatuor aut quinque geniculis nodoso: foliis Hordeaceis, radice habitoire, vniciquo culmo, qui ex vna radice plures pronascuntur, spicæ singulæ insident, sesquiunciam aut vnciam longæ, turbinate, foliaceis glumis striatis squamatis scandularum ritu compactiles, è quarum sinu tremula flosculorum pallidulorum filamenta promuntur, iisdemque postea locellis semen reconditur lubrico nitore Milii, forma Lini, sed magnitudine suppar.

Diagn. Phalaris Diofcoridea caliculos emittit à tenuibus ac nullius vsus radicibus numero-



fos, bipalmes, geniculatos; culmis Zeæ similes, graciliores tamen ac sapore dulces, folia itidem Zeæ (*ἰχθυόειρα* ἢ *ἰχθυόειρα* τὰ *ῥυτίδια*, *ἰχθυόειρα* τὰ *ῥυτίδια*, *ἰχθυόειρα* τὰ *ῥυτίδια*, *ἰχθυόειρα* τὰ *ῥυτίδια*). Coclusa habentur in vet. cod. itæque apud Orbasium, at in vulg. exemplarib. desiderantur) semen verò Milii magnitudine, candidum & oblongum.

Phalaris thyrsus habet longum, tenuem, ceu calamum, in summo flore inclinatum: Semen simile Sefamæ. Ita Plinius lib. 27. cap. 12. non adeò consonè Diofcoridis, quanquam sanè de eadem herba dicere videatur.

Cornarius Phalaridem officinis ignotam dixit: & sub diuinatione Herbariorum positam, qui eam inter Milium & Hordeum nasci putent, nomine Germanis adhuc ignoto. Quidam tamen verum Milium Solis esse asserunt, quod Officinæ minus appellant.

Apud Tragum Phalaridis figuram aliqui posuit sub titulo Phalaridis Diofcoridis, & 7. *Quecken Grass*: interea Tragus hanc plantam non describit eo loco, nec eam intelligit.

Lonic. huius descriptionem exhibet sine descriptione.

Matth. in prior. comm. Phalarim eam suspicatur quæ in syluestrium frugum genere, à quibusdam recensetur, adeò vt non dehinc etiam, qui hanc appellant Syluestre Milium, semine Milii ferè magnitudine. In post. comm. vbi pictura, omittit Milii sylu. nomen quasi olim confuderit cum Phalaride.

Videtur Gefn. hort. Phalaridis speciem vnā syluestrem admittere, at alteram satiuam.

C. Bauh. pin. an *Melia altera* Theophrasti, Phalaris Diof. Trago icon. Phalaris Matth. Ang. Tur. Dod. Cord. Gefn. hort. [cui & *Canariense* semen.] Lon. Lobel. Casalp. Cast. Cam. Lugd. Tabern. Ger. Phalaris herba, Gefn. catal. *Milium alterum* Theophrasti Dalech. in Plin.

Peregrinum hoc semen Belgio est, auctore Dodonæo, insertum autem ex Hispania ac Fortunatis insulis. Seritur Vere: sub finem Aestatis maturefcit. Non modò è Canariis saccharinis & Hispaniis, sed etiam Narbonensi agro, via ad Magallonem prope segetes ad pontem, Phalaridem veram, eiusque enatum semen feliciter in Belgio & Anglia habuimus ait Lobelius: quò Institores Canariis philomenis plusquam saccharatas & mellisluas cantilenas modularibus alendis venum asportant feminis magnā vim. Nos variis in hortis colimus semine maturo Augusto.


Herbæ tula succus, Diofcoride dictatore, ex aqua aut vino expressus ad vesicæ cruciatus utilissimè bibitur. Semen quoque cochlearis mensura ex aqua potum, ad eadem est efficax. Plinio calculos frangit semen, potum ex vino vel aceto, velcum melle & aceto. Idem & vesicæ vitia sanant

sanat, Galenus Phalaridis herbæ & succum & semen, & folia pota ad vesicæ dolores opitulari, vel eius quæ tenuium partium quid & calidum habet, credi testatur. Alimento esse, & nonnullos panes pifendos curare, estareque ad calculum farsculumque vesicæ, perhibet etiam Lobelius.

PHALARIS MAIOR SEMINE NIGRO
C. BAVH.

Phalaris 2. siue maior semine nigro: *Cuneata*, Melitenium incolis: granum in Melita frequens, Canariis insulis familiare, Massilia notum, nigrum, oblongum, à Milio simile, quo Canariis passeris præcipue nutriunt: ex grano aliquando à Dalechamptio sato natum, referente C. Bauh. in pin.

PANICVM SYLVESTRE DICTVM, ET
DENS CANIS. I.
CAP. XXXI X.



Gramen sylvestre quibusdam dictum, radices habet tenues frequentissimas, eoque nomine euulsu difficiles: culmi plures palmares, atque etiam dodrantales, geniculis paucis articulati, oblique articulantur, oblique eriguntur, aut per terram repandi reclinantur: denudis actis radiculis attol-

luntur: singulis calamis, singulae insident spicæ Panici, minores, asperæ, versibus adhaerentes; per maturitatem rufescentes, brevibus pungentibus aristis oblectæ, inter quas semina parua Panico minora. Folia graminea, albicantia, hirsuta, aspera, partem culmi cum vagina amplectentia.

Fuchius, cuius icon hic assumpta displicet, vocabat Phalaridem Plinii; hanc quam Geneuæ nominant *Panicere*, quasi vacuum Panicum. Ego tamen non puto Phalaridem Plinii ad hoc Panicum referendum. Sed crediderim potius cum L. 18. c. 17. intelligere per Herbam albam Panicum similem, occupantem arua, pecori quoque mortiferam. An Ruell. lib. 2. cap. 18. Herba specie frumentum, folio Tritici & c. in aruis nascens. Frumentum ruri caudati frumenti nomine notum? An eid. lib. 3. cap. 32. Holostium, Denticulus canis Ruri, gramen molle Herbariorum nonnullorum?

Cordus in Diof. Ruellium reprehendit, ut qui sibi non constet, quod Holostium à callis, Denticulus canis appellari scribit: Quod idem rursus alibi gramen, alibi Coronopum, Dentem canis esse dicat. Sed an Cordus rite mentem Ruellij perceperit, dubito, & an animaduertit, nomen Dentis canis à callis aliquot plantis similibus tribui, ut huic & duabus sequentibus,

An Rhegino in exerc. Alopecuros, Panicum a-
greste, non Frumentum caudatum, Lat. Cauda
vulpina, Herba Tritico similis scholasticis? An
corth. Frumentum caudatum, aliis Alopecuron
aliorum?

An Cæsalp. Alopecuros vera si particulatim
floreret, Panicastrella vulgò vocata, Panicum syl-
vestre fortè dicendum?

An Trago Lolium 7. quod Phalarim Dioscori-
dis esse putat? An Thal. Phalaris silu. maior, spi-
cis asperis, lappaceis vestibus adhaerentibus.

Lonicero pro Phalaride Dioscoridis describitur, sed non depingitur. Figura enim quam pro Phalaride exhibet, est alterius plantæ.

Matth. in comm. cum mag. fig. habet descriptionem sub Panico sylvestri, quæ conuenit huic nostro Denti canino primo paniculæ simplici, non item figura, quæ Panici est paniculæ sparsæ, aut diuulsæ.


Lob. in Ic. plant. pag. 13. tom. 2. est Panici effigie gramen simplici spica. Tabern. Ic. & Hist. gramen panicum seu grass. H. Lugd. p. 412. Panicum sylu. aliud Dalechamptio, quæ fortasse fuerit Herba alba Plinii. Quidam tamen esse volunt eiusdem Scriptoris lib. 22. cap. 25. Miliariam herbam, quæ Milium necat, & trita, cornuque infusa podagras iumentorum sanare dicitur. Magis tamen placet eorum sententia Dalechamptio, qui Albam herbam esse putant.

C. Bauh. phyt. Gramen 94. siue Panicum sylvestre, *Synon. C. Bauh.*
simplici spica, vel Milium sylvestre, Lolium 6. Tragi. Eid. pin. Gramen panicum tertium siue spica simplici: in quibus. Lolium sextum, Miliaria herba Plinii, Tragi. Panici effigie gramen simplici spicæ, Lob. icon. Panicastrella, Cæsalp. Panicum sylvestre aliud. Dalech. Herba alba fortasse Plinii, Lugd. gramen panicum primum. Tab. Gramen cyperoides spicatam, cer. icon. Variat, aliquando enim spica oblonga; aliquando breui & rotunda.

Inuisa Olicoribus herba, annua quidem: oritur æstare: semen maturat Augusto: perit Autumno. Passim obscuratur. Has ei vires adscribit Tabern.

GRAMINIS GENVS QVIBVS DAM GALLIS
Dens caninus 2. siue Panicum sylu.
paniculæ diuulsæ.

CAP. XL.



Calamos 2. Descriptio
radice fibris compluribus crassiusculis constante, quæ locis humidis emitit duos tresve cubitos altitudine æquant: Folia Arundinacea in acutum mucronem desinunt, iubam explicat palmarem & leiqualmarem subrubentem, aut è rubore nigricantem, crebris spicis

compositam, denso granulorum Paniceorum, glumis mucronatis, subhirsutis, nunc muticis, nunc aristatis, idque interdum in eadem planta inclusorum, stipatu confertis, libero tamen costae dorso, ut in gramine Mannæ.

An Cordo in Diosc. Oryxæ species, germanis Schuader nuncupata, Sesamum non absque errore putatum.

An Anguill. Milium secundum, Milium siluestre Galeni, cuius meminit lib. 2. de antid. fortè Ischæmon Plinii?

An Trago Lolii sextum genus, Miliaria Plinii. Match. in com. cum mag. fig. titulo Panici silu. ponit figuram paniculæ sparsæ, quæ videtur exprimere plantam primùm prouenientem, & loco humidiori, carentem aristis: descriptio autem conuenit Panico silu. paniculæ simplici.

Multò aptius Ischæmonis historia Plinii quadrare visum est Clusio Milii genus hoc silu. & supinum, ut vocat, quàm Panico siluestri.

Dodon. frum. & in fol. lat. (vbi Panicum palustre à nonnullis vocari ait) figuram minùs bonam ostendit. Ad Graminis autem genus, siluestre hoc & spurium degenerque frumentum, cerealiū seminum vitium, Gramen mannæ alterum, referendum ipsi visum fuit.

C. Bauh. phyt. Gramen 92. siue panicum siluestre sine aristis: panicum sylu. Matthioli, &c. Item, Gramen 93. siue panicum silu. cum aristis, per omnia priori respondens, nisi quod spicæ vtriculæ in oblongâ aristam desinunt. Rursus, Gramen 95. siue panicum sylu. spica aspera: Lolium 7. Tragi: Panici effigie gramen aristis circumvallatum Lobel. icon. p. 14.

Panicum silu. de quo hic agimus spicâ singulari non obseruauimus. Quare tres species non facio. In eadem enim planta interdum obseruo spicarum vtriculos desinentes in aristam, alios eadem destitutos, ita vt lusus naturæ hac in re negari non queat. Euenire autem eum dicimus ratione foliæ, atque ætatis. Huc porrò Lolium 7. Tragi non refero. Si quidem spicæ longæ, asperæ atque lappacæ, vestibus adherentes sunt, quas in hoc Panico spica diuisa non obseruo. Sed impleret in pin. (vbi non ampliùs tres, sed duas solum species facit) Lolium 7. Tragi, & Panici effigie Gramen aristis circumvallatum Lobelii separar.

Gramen Panicum 1. siue spica diuisa, inquit, est Panicum silu. Matthioli: Lob. in Adu. p. 15. Cast. Cam. H. Lugd. Tab. & Gerardi: Panicum Herbariorum siluestre Lobelii. Obs. p. 25. (vbi perperam Lolium Cordo) Ic. plant. p. 42. tom. 2. Gramen alterum mannæ Dod. & Hist. Lugd. Milium silu. & supinum, Clus. hist. Panicastrella species Cæsalp. An Milium silu. Ischæmon, Anguill. spica subinde singularis, non rarò multiplex, eaque modò herbaei, modò attrubentis coloris est. Item Gramen panicum 2. siue spica aristis longis armata, Panici effigie Gramen aristis circumvallatum Lobelii, Ic. Plant. p. 14. Gramen Panicum Ger. secundum Tabern.

Nos nondum separamus ab inuicem, ob iam adductam rationem. Illud duntaxat monendum ænuimus, ex Lobelii figuris eam melius placere quæ exhibita est apud eum p. 14. quæ & à Mathiolo pingitur.

Passim prouenit, nonnunquam palustribus locis delectans: hortis odiosa & molesta herba. Frequens est [inquit Dodon.] iuxta agrorum ageres, in hortis & alibi: reperitur non modò in

Germania & Belgio, verùm & Italia, Gallia; ac aliis Europæ prouinciis.

GRAMINIS GENVS DENS CANINVS
tertius, siue Gramen primum, vel
Galli crus.

CAP. XXXXI.

Cylindros ex radice fibrosa plures promittuntur, quatuorue articulis nodosos, subinde etiam ramosos, subrubentes: folia Triculis breuiora, latiora, hirsuta, culmos longiusculi uagina inuolunt: in singulis insidet culmis palmum aut sesquipalmum longa, quatuor, quinque pluribus setis comata, quarum alteri parti secundum longitudinem è bifori gluma stoculis purpurascens adnati, aucta parte nuda sulcata, semen iisdem glumis concludunt panici graminis longius.



Ruellius lib. 1. cap. 62. Theophrasti, Plinii, Dioscoridis Coronopum ait, à Leoniceo primo vulgari nomenclatura declarata, & eum censere dici Capriolam, Sanguinariam: O-

litoros Gallos vocare Dentem canis: Hanc generibus Graminis Plinium assignasse nobis exprimentem eandem esse, quam Græci Coronopum & Romani Gramen vocarent aculeatum. Quod autem Leoniceo Capriola Coronopus Dioscoridis sit (cuius sententiæ quoque est Monardus) negat Matthioli in Diosc. lib. 2. cap. 123. Verum eos aberrare non putat, qui dicunt Sanguinellam siue Capriolam esse aculeatum gramen Plinii Dactylon vocatum. Neque usquam se legisse ait, expressisse Plinium (ut Ruellius testari videtur) Gramen hoc aculeatum, esse Coronopum. Graminis huius semen, germanos Simelbary, hoc est, celestem Mannam, Sclauso verò Cornicis pedem appellare. Et hinc factum esse, ut quasi certò crediderint, quod Leoniceus ab iis fortè seductus, putaret hac plantam Dioscoridis coronopum. Lib. 4. c. 28. vocat gramen aculeatum Plinii, Hætrulcorum Sanguinellam & Capriolam. In post. comm. cum mag. fig. distinguit lib. 4. Gramen Mannæ à Sanguinella tantum ratione: ait enim gramen Mannæ multis in germaniæ locis ferri. Ceterum, nec in spontaneo, nec in culto hoc gramine, crassam radicem, qualem Matth. pingit, obseruauit. Melius placet Camerarii figura in Epit. germ.

Aculeatum Plinii gramen esse negat Dodon. Lat. his verbis: Ad graminis genus referendum videtur & hoc Gramen Mannæ primum, siluestre, spurium, degenerque frumentum, cerealium seminum vitium, quod plerisque Italiæ & Germaniæ,

inania locis incultis sua sponte exit, reperitur & in Bohemia sylvestre, apud quos tamen & in agris feritur, veluti & in Goriciensi agro & Carinthia, ut Marthiolus refert, apud Belgas peregrinum, non nisi satum provenit. Germani *Sammelkraut*, id est, Culi rorem appellant, Marthiolus ea de causa Mannæ graminen Mylly sylvestre ac spiritum quoddam videtur genus. Creditur à Leoniceo ac Ruellio Capriola ac Sanguinaria dicta. Sunt qui velint Plinij graminen aculeatum esse, sed quia huius omnino brevis descriptio, affirmari nihil potest. Multum autem à veritate recedunt, qui Coronopum esse existimant. Coronopum siquidem, ut Dioscorides ait, per terram repit, & foliis est fissis: huius verò culmi erecti assurgunt, & folia harundinacea nequaquam in partes finduntur, quæ Mannæ graminen non esse Coronopum eviderenter ostendunt.

Clusius in eo hallucinari deprehenditur, quod Ischemon Plinij (ita nostra hanc præterea in stirpem in Hist. inscribit) quod Milij genus sylvestre & supinum facit, in humidis nascens, foliis aspera lanugine oblitis, Panicum sylvestre Marthioli esse, sibi imaginatur.

Lobel. in Adu. p. 3. sub gramine hirsuto nemorosus, huius meminit vocans in fine, graminen aliud Recentiorum, *Ischemon* Plinij. Sequenti pag. 4. vocat Ischemon vulgæ Crus Galli, Dactylon Plinij, & Aculeatum, sanguinariæ & Capriolæ foliorum, Frustra autem hic queritur an sit Scirpus Tragi. Marthiolus etiam, meo quidem iudicio, immerito reprehendit, quod vulgæ Mannæ graminem cum gramine Mannæ tandem asseruerit, cum potius congeneres, quam eadem sint.

Necdum sanè mihi constat, cur Tabern. graminen Mannæ, hoc est, Mannæ graminem, huiusmodi à suo Ischemo, siue gramine sanguinario primo separet. Vocat hoc germ. *Blutgras*, quod insigne sit aduersus hemorrhagiam sanguinis remedium. Illud in hist. duplex statuit, scilicet sativum & spontaneum. Veteres autem huius non memississe decernit: dici verò Neotericis graminen Mannæ celestis, graminen esculentum, graminen cereale, Capriolam, & Herbam Capriolam & Sanguinellam. Boh. *Rosa*, Vandalis & Sclauonibus pedem cornicis, hoc est, Crus fuscum, vocatur tamen & *hancenbein*, hoc est, Crus Galli.

Geln. cat. Coronopus, Capriola vulgò dicta. Eid. hort. graminis species, Sanguinaria Auicennæ: Item, graminen album seu hirsutum, Mannæ celestis Marthioli.

Ceterum ad hoc caput sub vno & eodem titulo referimus C. Bauhini in phyt. *Gramen* 86. 87. & 91. quia nondum intelleximus, an reuera differentes sint plantæ, vel an culturâ tantum varient. Horum I. vocatur in pin. *Gramen echinatum* & *aculeatum* 3, siue album capitulis aculeatis Italicum. *Gramen aculeatum* Marth. Cast. & H. Lugd. pag. 435. II. inscribitur graminen dactyloides siue Ischemon 4, siue graminen dactylon folio latiore, *Sanguinaria Conitis Neuenstra*, Tragi, *Canaria* Plinij, & galli crus Apulei, Anguill. epist. 12. Coronopus Leoniceo, Ischemon Geln. cat. Clus. hist. & Tabern. *Ischemon vulgare* Lob. in Adu. pag. 4. Obl. pag. 12. icon. plant. p. 24. & Gerardij, *Ischemon* Plinij, Clusij Hist. quoad iconem, *gramen Ischemon* Plinij, H. Lugd. siue Dactylon pag. 426. Variare hoc dicitur spicis, plerumque quinis & senis, raro quaternis, rarissime ternis. III. appellatur *gramen Dactyloides* siue Ischemum 8, siue graminen Dactylon esculentum, *gramen Mannæ* Marth. & Castoris, *gramen aculeatum*, *Sanguina-*

ria, *Capriola*, Leon. Ruell. Am. *Frumentum German. Schwander*, Orizæ species, Cord. in Dioscor. *gramen album* seu *hirsutum*, Geln. hort. *Manna celestis Germanis*, Eidem *gramen Mannæ esculentum*, Lobel. in Adu. Obl. pag. 13. Icon. plant. pag. 24. & Ger. *gramen Mannæ primum*, Dod. Tabern. *gramen aculeatum* 1. Plinij, Thal. *graminis genus*, quod in Germania feritur Celsalp. *gramen Mannæ prius* Matth. & prius Dod. Hist. Lugdun. pag. 414.

Annua est planta etiam hortis valde odiosa, Locus & Dens caninus sylvest. tertius, qui Iulio apparere tempus incipit. Ab hoc satius, quem priuatum graminen Mannæ vocant, non nisi culturâ differre videtur.

Cacumina pueri naribus inferunt, extrahunt. Vires & a. que ut sanguinem eliciant, & hinc ab effectu sus. Hetrusci vulgò *Sanguinellam* vocant: in cernitiæ le-cis feri ac coli audio [inquit Marth.] non minori cura, quam cætera frugum & leguminum genera, siquidem eius semine frequenter vescuntur in cibis, quod in iure carniū pinguium decoctum non minorem cum palato inerat gratiam quam Oryza: cui ego facile præposuerim: in pila autem ipsum tundi: re oportet, ut à suo resiliat putamine. Huius in acetariis hætenus nullus est usus, licet Gesner. in cat. hoc asserat. Nunc an tales & tantas vires obtineat, quantas perhibet Tabern. fides penes ipsum esto.

GRAMEN DIGITATVM HIRSVIVM.



PERENI radice & firma nititur, ex qua cul nos emittit cubitales & bicubitales, tenues, tubentibus geniculis nodulos, frequentius singulares, alias ramosos: folia tres quatuorve uncias longa, angusta, & raris, longis pilis hirsuta, subinde rubescentia, statim à radice partim, partim sed minora (excepta vagina) ex culmis oriuntur, panicula iubata, quatuor aut quinque spicis comata, graminis Mannæ similibus, minoribus purpurascens, molli lanugine villosis, ex glumarum mucrone arista molli ruffa prominente, flosculorum staminula saturatior purpurâ tinguntur.

Est hoc Tabern. *Ischemum secundum*: C. Bauh. phyt. *gramen* 89 siue *Dactyl. n. 3. spicis villosis*: Eid. pin. *gramen dactyloides* siue *Ischemon* 7, siue *Dactylon angustifolium spicis villosis*, tribus 6. 7. & 10. varians.

Basileæ frequens ad pomerium Albanum & Locus; alibi locis siccis & equalidis.

MILIVM.

CAP. XLII.

Descriptio



mis comprehensa, grana lubrico luore lucida, parua, colore sepius fuluo, vel aureo, rarius albo, rarissime striato, radices crebrae, fibrosae, validae, albicantes.

Synonyma
cum no-
minib
linguar.

Græcis, ut Dioscoridi, Galeno (qui secundum de antidot. Milii siluestris mentionem facit) & aliis *κίχκερος*, & non ut Straboni *κίχκερος* dicitur, à numerosissimis & minutis granis Ficuum, quæ *κίχκερος* vocantur: Hippocrati iuxta Galeni glossam *μικράνους* & non *μακράνους*, ut vult Herimolaus: Arab. *leuers*, *Gegners*, & *Glauers*, secundum verò Serapionem *Dichen*. Hebr. *Dochan*: Latinis ut Plinio, Brunfels. Trago. Marth. Fusch. Turn. Dod. Cordo in Diosc. Lac. Lon. Lob. Obs. p. 24. Ic. p. 29. Gesn. coll. Cast. & Tabern. *Milium*, à miliari summa sc. Felto, quasi millesimum granum ferat. *Milium vulgare* Lob. in adu. & Gesn. hort. *Milium commune* Anguillar. *Milium nostrum* H. Lugd. p. 409. *Milium aureum* & *album* Cam. *Milium* 7. huc semine luteo, vel albo C. Bauh. pin. *Milium* Dioscoridis, Theophr. & Plinii, Cæsalpino.

Nomina
linguar.
Milium v.
Angl. Myle: Boh. Proso.
Farina mi-
liacea.

Germ. *Birg*, & *Birg*: Belg. *hirs* & *Milse* Gall. *Mil* & *Miller*: It. *Miglio*: Hilp. *Milbe*, & *Mijo* Angl. Myle: Boh. Proso.

Varro Milij nomen ineptè à Græco deducit, melinen id vocari dicens: nam Diosc. & Galenus per Melinè Panicum intelligunt. Farinam miliaceam, seu fractum Milium sunt qui *Scrutum* vocari putent, in Horatij versu illo.

Vilia vendentem tunicato scruta popello.
Sunt tamen & alie scruti appellationes. Nostra autem stat sententia scruti nomine vetera & corrupta fermenta, pannos veteres, vestimenta quoquo modo deprauata, vasa dimidiata, supellectilemque tandem quamlibet præfractam, significari, id quod docet Lucilius apud Gellium, his verbis: *Quid ni? & scruta quidem ut vendat, scrutarium laudat.*

*Miliaria
aves.*

A Milio, *miliarias aves* dictas esse, quod ad hanc frugem turmatim se conferant, eaque vescentes agnuntur, placet Varroni. Porro quamvis Cenchridi aui nomen videatur Milium indidisse, eam tamen miliariam non esse certum est, cum cenchridem, ut refert Plinius, accipitrum generis

Græci faciant, quam Latini *Tinniculum* à voce & sono, vocant; Galli verò *Quercerelle*, vulgò bene cognitam, quod in altis urbium turribus nidificet.

Plinius lib. 18. cap. 17. docet quomodo Milium muniendum sit à vermibus & passeribus, dum ait: Reliqua femina [Milij & Panici, intelligimus] Cupressi foliis tuis si misceantur, non esse vermiculis obnoxia, nec si interlunio feratur. Multi ad Milij remedia, rubetam noctu aruo circumferri iubent, prius quam sarratur, defodique in medio inclutam vase fictili: ita ne passerem, nec vermem nocere, sed erudendam prius quam metatur, alioqui amarum fieri. Quin & aruo talpæ contacta femina vberiora esse. Democritus succo herbae, quæ appellatur aizoon, in tegulis nascens tabulifve, latine verò sedum aur digitellum, medicata feri iubet omnia femina. Vulgò verò, si dulcedo noceat, & vermes radicibus inhæreant, remedium est, amurca pura: ac sine fale spargere, deinde sarrare. Si in articulum seges ire coeperit, runcare, ne herba vincant. Pestem à Milio atque Panico sturnorum passerumue agmina scio abigi herba, cuius nomen ignotum est, in quatuor angulis segetis defossa: mirum dictu, ut omnino nulla avis intret. Mures abiguntur cinere mustela, vel felis diluto, & semine sparso, vel decoctarum aqua. Sed redolet virus animalium eorum etiam in pane. Ob id felle bubulo femina attingi vitilius putant. Rubigo quidem, maxima segetum pestis, lauri ramis in aruo defixis, trans in earum folia ex aruis. Luxuria segetum caligatur dente pecoris in herba duntaxat: & depastæ quidem velsæpius, nullam in spica iniuriarum sentiunt. Reconsarum etiam semel, omnino certum est, granum longius fieri, sed inane casumque, ac satum non nasci. Babylone tamen bis secant, tertio depascunt: alioquin folia tantum fierent. Sic quoque cum quinquagesimo fœnore melle reddidit exilitas soli: verum diligentioribus cum centissimo quinquagesimo. Neque est cura difficilis, quam diutissime aqua rigandi, ut præpinguis & densa vberitas diluatur. Limum autem non inuehant Tigridique, sicut in Ægypto Nilus. Nec terra ipsa herbas gignit. Vbertatis tamen tantæ sunt, ut sequente anno spopet restibilis fiat seges, impressis vestigio semibus: quæ tanta soli differentia admonet terræ genera in fruges describere.

Milium porro leuem, solutramque desiderat terram, nec in sabuloso solum sed & in arenoso quoque provenit, modò vel humido solo, vel riguo solo: nam siccum cretosumque reformidat, ut ait Columella. Ante ver commode feri non potest: quoniam reporis maximè lezzatur. Vltima tamen parte mensis Martij commodissime terre committitur. Plinius milium inter frumenti quoque genera verna connumerat, & eo Campaniam præcipue gaudere tradit. milium Theophrastus refert siccitate sua diuturnum esse: idem plus annos centum durare, si quò ventus & æer non petruent, condatur, auctor est Varro.

MILIVM SEMINE NIGRO
SPADICEOVE.

Semine Basileâ misso facile mihi provenit in Shorto E. C. Montbelgardi, in quo ex semine deciduo quotannis renouatur. Non est hoc illud milium nigrum olim Roman allatum ex India cuius Plinius lib. 18. cap. 7. meminit.

Milium

Milium 2. siue *semine nigro* C. Bauh. pin. est milij nigri species apud. Oribasium, Ang. *Milium semine nigro & latiore iuba* Lob. Obl. *Milij alterum genus è colore nigro deterius*, Cxf. *Milium uba subinde colora nigricantis*, Dod. *Milium nigrum* Taber. Cam. Ger.

Hoc quod in Argouia Bernatum frequenter scribitur, à vulgato differt foliis latioribus, caule non adeo alto, jubâ sparsâ & minore, semine aliquid maiore & rotundiore, & ad pulres conficiendas altero longè vtiliore.

Milio (cuius adhuc apud Nigritas in Aphrica magnus est vsus) nonnunquam in pane vtiuntur, vrgente frugum penuria, inquit Galenus, panis tamen ex eo exigui est alimentii, & refrigerans. Constat insuper præridum, & instar arenæ friabilem esse: nihil enim in se habet pinguitudinis, & lentoris. Iure ergo alium humidiorē exiccat. Agricola huius farina cocta, admisto adipis fullo, & oleo vescuntur. Panem etiam & pultem ex Milio fieri testatur Plinius, cum scribit. Milio Campania præcipue gaudet, pulsemque candidam ex eo facit. Fit & panis prædulcis. Sarmatarum quoque gentes hac maxime pulte aluntur: & cruda etiam farina equino lacte, vel sanguine & cruvis venis admixto. Hæc puls etiam germanis hodie in vsu est, cum lacte cocta butyro addito, & saccharo plerumque asperso. *Alibi Plinius*. Panis, inquit, multifarius & è Milio fit, è Panico rariùs. Sed nullum frumentum ponderosius est, aut quod coquendo magis crescat. 60. pondus panis è medio redeunt, modiusque puls ex tribus sextariis madidis. Panis ex Milio conficitur, inquit Columella, qui antequam refrigerat, sine fastidio absumi potest. Sed quamvis panis ex Milio nisi in magna reliqui frumenti penuria non fiat, ait Galenus, tamen is dum recens est, vt scribit Matthiolus, & à pistore rectè paratus, vt Veronæ fit, & ita calidus, vt è furno excipitur, deoratus, sua quadam suauitate placet, & à multis expectitur. Cum verò obduruit, planè ingratus est. Siluicola Tridentini sola pulte Miliaea quam vulgò *Polenta* vocant, aluntur, eam cum lacte edentes. Sed carbonarios opilionisque Tyrolenses quum percunctaretur Lobelius, num vera scripsisset Matthiolus, nimirum eos solo Miliaeco pane, vel *Polenta* lacte incocta vesci, eum ridebant. Milium, inquit Dioscorides, in panes coctum minus ceteris frugibus alit: sistit pulte sua alium: vrinam cit. Torretur Milium, feruensque in sacco ponitur, vt torminibus, reliquisque doloribus, si ægra pars foueatur, auxilio sit. Milium Galeno primo ordine refrigerat, exsiccat verò tertio exsolut, aut certe secundo intenso: habet etiam paululum tenuitatis. Ex hac tum consistentia, tum temperatura instat edulii comestum planè inter omnia frumentacea minimum conferit nutrimenti, sed & ventrem siccatur. Porro foris impositum in sacculis, idoneum est fomentum iis quæ citra morsum exsiccati postulant, & cataplasmatibus modo illitum exsiccat potest. At tamen admodum friabile est. Proinde difficile est eius in cataplasmatibus vsus. Idem alio in loco fomenta ex Milio in capitis dolore laudat, quòd, vt ait Hippocrates, leue ac lenè sit Milium. Sic enim ille scribit, fomentum siccum ex sale ac Milio torrefactis, ac lanceo marsupio exceptis accommodatissimum. Etenim leue ac lenè Milium est, quod Plinius leuissimum ac mollissimum esse dixit. Milio sistitur aluus, discutiantur tormina, in quem vsum torretur ante. Nervorum doloribus, & aliis feruens in sacco imponitur, neque a-

liud vtilius, quoniam leuissimum mollissimumque est, & caloris capacissimum. Itaque talis vsus eius est ad omnia quibus calor profuturus est, farina eius cum pice liquida serpentium, & millepedæ plagis imponitur. Hæc Plinius. Milium igitur ad flatus repellendos fomentum est optimum, præsertim si cum sale commixtum fuerit. Quin & præstantius redditur additis chama: neli floribus. Milium medicamenta & carnes, si in eius acervo sepeliantur, à carie & putredine diutius vindicat.

VVeck. in Antidot. spec. Syrupum ex Milio componit, quem Ambrosij cognominat, laudans eum in febribus, vt qui sudorem prouocet, & sitim extinguat. Recipit autem Milij exsiccicati quantitatem conuenientem, decoquit donec crepet: dein recipit vnc. v. vel circa, eius iusculi bullientis, & infundit vini albi odoriferi vnc. ij. & sic calidum dat patienti ac bene eum cooperit, & sic mitum in modum sudaturæ promittit. Sed mihi magis probatur sententia Montagnanæ consil. 193. de thermis, qui ait se expertum, Milium ex lacte intingente sudorem compellere. Dioscorides enim alium adstringere scribit, & Galenus ex eo panem frigidum esse. Matthias à Michou de Sarmatia Asiana refert Tartaros bibere Cereuisiam ex Milio confectam, vocareque *Buzam*, Rutenos verò *Braban*.

Luber coronidis loco memorabilem historiam à Milio peticam subnectere quam Th. Zuingerus in methodo similitudinum, ita recenset. Tartarorum princeps Amorabecus ad Lazarum Seruiq Delpotam missis Legatis, ad transitum in Vngariam petendum, mulum Milio onustum adiunxit, & coram Despota saccos exonerari voluit, vt innumerabiles Tartarorum copias esse significaret. Despota in tertium diem responso delato, Gallos interea, capos & gallinas fame exercitatas magno numero in effusum Milium emisit. Qui cum paruo temporis spatio totum absumpissent: ad Legatos conuersus, Renunciatè ergo Regi vestro, inquit, quantumvis innumera Milij grana ei adsint, tamen neque nobis edaces gallos defuturos. Cui quidem voci omen adfuit. Tartari enim facta irruptione, à Seruiis magnâ strage repressi fuere.

MILIVM LVCIDVM ARGENTEVm EX CAIRO.

C A P. XLIII.

Vulgari Milio magnitudine cedit, magisque Descriptio rotundum, in acutum umbilicum terminatur, tenui argenteo valdeque lucido cortice, & à medulla leui attacku separabili, Medulla Milii vulgaris, alba, insipida ferè, dentibus friabilis.


An hoc intelligit C. Bauh. in pin. per Milium 2. siue Sabæum: *Millo* frumentum in Guinea paruum. Milij forma, sed dulcius, ex quo panem & vinum consciunt in Regno Sabo: ad Clus. curas post.

Româ ab amico quodam acceptum attulit G. Locuzner H. Cherlerus nomine Milij ex Cairo.

SORGH1. C A P. XLIV.

Sorgh1 peregrino nomine dictum multos ex Descriptio fibrosis radicibus emittit culmos homine præ-

ceriores robustos, et alios, geniculatos, medulla alba, raros foliis stiparo, arundinaceis: fastigia culmorum in iubam effunduntur



Panicum
Trag.

Milium
Italicum
Nomina
linguar.

Ruellap.
us.

Melica
Ainath.

Milium
Indicum
Pum.

Sorgi
Fuchf.

Fuchf.
rat.
Milium
sa.

germ. Welsch hirtz, h.c. Milium Italicum, quodd ex Italia in Germaniam adactum sit, nominavit. Aliis tamen Sorgi famen appellatur, h.c. Sorgi fermen. Belg. Sorg facit: Gall. blé barbu, ou espece de Paniz, aut cum Italici Sorgi vel Sorgo: Hetruscis *Sagmina*: Infubrib. *Melica* & *Milegus*, scilicet Matthiolo, qui Ruellium, panicum in Italia Medicam appellari scribente, aperte hallucinari demonstrat. Sed Ruellio fortasse errandi occasione praeiuit nominis Melicæ & *Milium* siue *Melica* vicinitas, quæ fecit ut Panicum cum Sorgo, & huius descriptionem cum illius descriptione confuderit. Frugis est genus tam forma, quam proceritate arundinem referens, ad eam ut campi, in quibus ad maturitatem usque adoleuerit, arundinetæ repræsentare videantur. Eius tamen calamus, non, ut vulgare arundinum, inanis est, sed sacchariferarum arundinum modo, alba farctus medulla. Paniculæ, quas ad Cybelis pomorum magnitudinem suminis proferunt culmis, quædam cum maturitatem senserint, in nigro suffescent: quædam verò nigredinem in vniuersum contrahant, granis compluribus onustæ. Deperitur granum à rusticis, moliturque in farinam, & inde in agrestem cogitur panem: etsi in Hetruria potius ad Columbarum, gallinarumque feratur saginam, quam ad hominum alimentum. Hoc Plinio lib. 8 ca. 7. Milium est Indicum, quod tamen non animaduertit Ruellius aliqui maximus Plinii scætor. Plinius enim sic habet. Milium intra hos decem annos ex India in Italiam inuectum est, nigrum colore, amplum grano, arundineum culmo. Adolefcit ad pedes altitudine septem, prægrandibus culmis, lobas vocant, omnium frugum fertilissimum.

Fuchsius, qui peregrinum hoc genus Frumentis, Sorgi vocat, ait ignorari quo nomine Veteribus sit appellatum, nisi Farris genus sit, quod in Gallia rubrum & barbatum frumentum nuncupetur. Certe tamen nihil affirmat: nam Panicum etiam referre, quamvis magnitudo repugnet, admittit.

Dodon. gall. Panici speciem quidem esse suspicatur: aut Farris genus, contra Fuchsiū, negat. Et hinc ait in Hist. Lat. Frumen. & in fol. Melica siue Sorghum, Lusitanis *Milium Saburum* ap-

pellatur; nonnulli tamen Panicum peregrinum, aut Indicum cognominant, id ipsum videlicet ex Panici genere esse existimantes; quorum certe opinio probabilior est, quam eorum, qui illud inter Farris genera reponunt. Cum farre siquidem similitudinem nullam, cum Panico verò aliquam habere possit. Conuenire & cum eo Milio videtur, quod Neronis principatu ex India in Italiam inuectum est.

Videtur Cæsalpino Milium Indicum esse ex genere Calanagrostidis, id est, Graminis arundinaceæ. Nos eorum sententiam probamus, qui Milium Indicum Plinii esse concludunt.

C. Bauh. pin. *Milium* 4. siue arundinaceum subrotundo semine, *Sorgo* nomenatum: *Milium* quod ex India in Italiam inuectum nigrum colore, Plinio. *Panicum* Dioscoridis & Plinii, Trag. *Milium Indicum* Matth. Fusch. icon. (cui & Sarracenicum) Gesn. hort. Cord. Hist. Guilland. Lugd. Cast. def. *Milium Indicum* Plinii. Ang. Cam. *Milium aliud*, Amat. *Panicum Indicum*, Gesn. hort. & Cor. hist. *Sorgi* Fusch. Dod. gal. (cui Panici species videtur,) Lœna *Sorgi* & *panicum Indicum* Gesner. coll. *Sorghum* Gesn. hort. (cui & *Milium Cardami*) Tab. (cui & *Panicum locale*) Ger. *Sorgo melica* Italorum Lob. Obs. p. 24. Ic. p. 41. *Sorgo* Infubrum, Bellonio. *Melica* siue *Sorghum*, Dod. *Melica* fortè à Melinc: Sagina aliis à saginando, Calanagrostidis Dioscoridis ex hoc genere videtur, Cæf. variat feminis colore, quod aliis rufum, aliis plenius nigricat: habetur & album & luteum, quod. *Sorghum* fructu rubro & fructu albo, Fyft.

In horto Ill. E. C. sæpius provenit, verum semen non maturuit. Solum amat pingue & humidum. Gignitur in Italia, Hispania, & aliis calidioribus regionibus. Ex æstivis sementibus est: Autumno maturefcit.

Semen Panico sapore & temperamento simile est. Legitur à rusticis, molitur in farinam, cogiturque subinde in panes, sed friabiles, & parum alimenti subministrantes. Hetruria tamen potius ad columbarum gallinarumque saginam ferit, quam ad hominum alimentum. Ex huius Milij Indici culmorum medulla fit medicamentum ad strumas præstantissimum hoc modo. Ex decem culmorum huius internodiis extrahitur medulla, quæ cum sponsia noua integra, rubentique conburitur. Hæc in puluerem teruntur additis piperis nigri granis duodecim. Huic pulveri admiscetur triticæ farinæ uncia. Deinde omnia ovo recente excepta in placentam confortantur, quæ sub feruentibus cineribus coquitur. Et in sex partes diuiditur, quæ Luna decrefcente alternis diebus strumoso dormitum ituro edendæ præbentur, nullo addito potu. Idem altera & tertia Luna repetitur. Hoc medicamento multos curatos esse scripsit Matthioli. Idem auctor est flores qui ex rubris huius Milij Indici paniculis excutuntur drachmæ pondere ex rubro vino haustos rubra fecinarum profluvia sistere, quemadmodum albos flores ex paniculis albis exceptos albos vteri fluores cohibere. Idem dari vtiliter dysentericis, & aliis fluxionibus alui affectis. Idem quoque præstare granorum putamen, oui vitello probe decocto exceptum, & à ieiunis deuoratum.

SORGI ALBUM, MILIUM
Indicum, Dora. CAP. XLV.

Sorgi iam dicto simile hoc Milium Indicum Dora, foliis constans harundinaceis, præcitis & gc

& geniculatis culmis, effusaque iubâ, sed semen eius multo, maius, rotundius, & candidum, in glumis hirsutis contentum, differentiam manifestam constituit. Ab Arabibus, teste Bellonio, *Harman* appellatur. Apud Auiennam tam men c. 31. *Arman* non Melica; sed Zea est, si interpreti fides non est deroganda.



Huius particulatim meminisse Rhassem & Scorpionem, Arabicoque antiquo nomine *Drom* vocasse, testem habemus Ruvolfium studio-rum nostrorum socium, qui etiam *Gener. Sc-*

rapionis titulo nobis id communicauit.


Anticipia transiisse Coldenbergius pro *Mili* Americano & *Milio* Aethiopico: Florentia Ducis Hortulanus pro Sorgho albo Candia.

Marthiolo in post. com. It. dicitur *Miglio Indico* pro genere, hoc est, *Milium Indicum* nobilius. Dodon. Lat. *Milium cand.* C. Bauh. pin. *Milium* s. hoc arundinaceum plant. albug. s. *Sorgho* simile genum. *Harman* Arabum, Bellonio. *Drom*, Ruvolfio. *Milium Aethiopicum*, Porta. An *Milium* album in Regno Congo, quod *Milium* a *Coqui*, id est semen Congianum vocant, Hist. Ind. Oriental. part. pt. in. 1. c. 1.

Sorghi hoc album in Cilicia ac Epyro feri, & illic à se reperit scribit Bellonius: ibique panes ex ea coqui. Dodonaeus priori Sorghi sapore & temperamento simile constituit.

LACHRYMA IOBI MULTIS, SIVE MILIUM arundinaceum.

CAP. XLVI.



Tom. II.

Lachryma Iobi cultus donata est cubitum vnum aut alterum altis, geniculatis: folia autem habet Turcici Frumenti, cubito subinde longiora, vacias duas lata: quibus minora sunt illa quae in ramis nascuntur, ex quorum alis petioli emicant, quibus transadiguntur singulis grana, ut plurimum

singula, rarius bina, laeuioris politissimi, nitida, ante maturitatem hauescentia, matura ex candido rubescentia, duritie lapidea, Cicer aequantia, superiore parte turbinata, vnde exit inanium glumarum spica mutica. Pro duabus nostris Iconibus (quas iam sculptas enim) appositis; vellemus vnam esse solam melius depictam. *Tragus*

Lachryma Iobi Icon altera.



vocat Lithospermum maius, Grossen Steinsamen, aut Milium Solis maius, Grossen Nachschaff, iudicatque esse Lithospermum Plinij, quod lapilli eius magnitudine Ciceris, quos gerere dixit libr. 27. cap. 11. vulgari nostro Lithospermo, attribui non possunt.

Fuchium errat scribit Matthiolus, quod in lib. de comp. med. tradiderit platam

Fuch. error secundum Aret.

hanc arundinaceam esse Lithospermi genus: eamque opinionem confutat in Apologia, quam aduersus Amatum, quem secutum ait Fuchium, scripsit. Genuinum, inquit, Dioscoridis Lithospermum eam memorat esse plantam, quae globulos illos (lachrymas vocant) mittit, quibus vntur funiculo tractis ad numerandas preces. In quo manifeste peccat, quoniam Dioscoridi Lithospermum planta est foliis Oleae longioribus, latioribusque, ac mollioribus humi accubantibus ramulis rectis, tenuibus, firmis, crassitudine acuti iunci, lignosis, in quorum cacumine bifidi exortus caulicorum speciem exhibeant, foliis longis, interque paruum semen rotundum Erui parui (vt Oribasius & Serapio ex ipso Dioscoride transcribunt) magnitudine, nascunturque in asperis. Quae omnia in planta lachrymas illas ferente desiderantur. Siquidem haec folia profert harundinacea, quemadmodum & culinos per intervalla geniculatos, in quibus semen Orobo duplo grandius visitur, quae quantum cum Lithospermi notis habeant similitudinis, ipse videat. Adde etiam quod Lithospermum in editis, & asperis locis per se sponte nascitur. Lachryma vero vocata non nisi feta proueniat, erectis omnino calamis non humi repentibus, vt scribit Plinius. Haecenus Matthiolus, erroris accusans Fuchium, quod hanc plantam Lithospermi genus dixerit. Verum ipse potius reprehendus est, vt qui falsam figuram pro Lithospermo maiore exhibuerit. Certum est quidem Lachrymam Iobi, non conuenire descriptioni plantae à Dioscoride traditae. Sed Fuchius non dicit esse ipsum Lithospermum, sed Lithospermi solum genus, licet Amatus eius fuerit opinionis, qui *Lachryma* Graece vocauit, & Lat. Lithospermum, *Lachrymam*, *Lachrymam Mariæ*. Lachryma vulgo *Simientem*: Arab. *Call.*: Germ. *Marien trahen*: Clus. vocat Gall. *Larmes de nostre Dame*: Hisp. *Lagrymas de Moysen*.

Matth. rei darg.

Geliterus & Dodonæus videntur concedere esse Lithospermi speciem, si seminis duram substantiam respicias: aliàs toto genere à Dioscoridis Lithospermo differre perhibent.

Lithospermi Plinij Lobel.

Lobelius tamen in Adu. pro Lithospermo Pliniano deferibit, notatque Plinium, quod utrumque Lithospermum in vnam conflaret descriptionem. Eius verba sunt hæc: Plinij si quis exactius textum perpendat, & cum utroque comparet Lithospermo, facile animaduertet utrumque ab eodem designatum, sed (qui illi penè fatalis lapsus, ut de Chrysanthemo monuimus) in vnam descriptionem conflatum. Primum *Lithospermon*, id est, Iouis Triticum indicat Triticis, aut harundineis similem, aut congenerem: herba quinquuncialis, foliis Rutæ duplò maioribus, ramulis siccatis, crassitudine Iunci, quæ ex utriusque delineatione mixta sunt. Sed post addit lapillos magnitudine Ciceris, duritie lapidis, candore & rotunditate margaritarum, cauernas habent quæ pediculis hærent: quæ postrema prorsum Lachrymæ lobæ quadrant, nequiquam Dioscoridis Lithospermo. Quod licuit illi quamplurimis in agro Romano locis videre: haud sanè tam stupenda mirabilitate, si vulgò cognitum Milium Solis intellexisset: eoque dicit, sibi non hærentem, sed vulsam visam plantam in Italia crescere, puta hortis. In Creta optima, nimirum natiuo solo, quin tantus decor veluti candicantibus margaritis: cateraque inibi verba, nequiquam deformi & tristis Lithospermo congruunt, sed Lachrymæ lobæ longè hilarioris & iucundioris aspectu, quibus intus inest semen (ut idem dicit) & subus cauernulæ, nequiquam communi. Murit hic rapodus Senensis, & superius in Fuchsum inepit.

Synonyma

Casp. Bauh. pin. *Lithospermum* 1. siue *arundinaceum*, forte Dioic. & Plinij. An Coix Theophrasti, 1. hist. 6. *Lachryma Christi*, Trag. Geln. hort. *Lithospermum maius*, Trag. Geln. hort. cui & fruticosum. *Arundo Lithospermos*, Geln. hort. *Lithospermum primum*, Lacun. *Arundinaceum* Lugd. *Lachryma lobi*, Adu. Clus. hisp. & Hist. Dod. Lob. Obs. p. 26. Ic. p. 44. (ubi & *Lithospermum* & *Diospyros* Plinii) Cam. Calt. Eyst. *Lachryma vulgò*, Calt. Eidem *Lithospermum* 2. siue *maius*, Matth. Lac. Calt. Lugd. quid?

Loca

In hortis Italiæ ac subinde etiam Belgii feritur, peregrinum siquidem est, aliunde illatum. Galloprovinciæ & Narbonensiæ vireta præsertim Cænobiotum, nondum interitis bellis effluentibus euerfa, hanc plantam sedulò colere solita erant, seminis lapidei causa, ex hoc enim maturo, & in aqua feruenti intincto globulos precatorios, ut vocant parant. In horto E. C. satum multoties prouenit, sed semen nunquam maturuit.

Vires.

Est etiamnum, si expertus hæc scribit Lobelius, ad calculum renum, & vesicæ saburram, polline & decocto præsidium vulgatum.

ORIZA VETERIBVS.

CAP. XLVII.

Theophrastus 4. Hist. cap. 5. Orizam potissimum in India feri perhibet, Zeæ similem, pistamque tanquam Alicam, concoctu perfacilem reddi, aspectu Lolii similem: stareque magna parte temporis in aqua: effundere non spicam, sed veluti jubam modo Milij atque Panic.

Dioscoridi Oriza frumentorum species est, in palustribus & riguis, quæ mediocriter nutrit, & aluum sistit.

Indi apud Plinium lib. 15. cap. 7. ex Oriza oleum facere dicuntur. Idem lib. 18. cap. 7. ait, Italicè maximè quidem Oriza [Oriza quidem maximè ut Itali gaudent, subintelligit Indos Dalechampsius. Alius legit, Italia &c. Cæsalp.] gaudent, ex qua prisanam [Prisana Oryzæ ea est, quæ in omnibus locis venalis prostat, & Rû dicitur.] conficiunt, quam reliqui mortales ex Hordeo. Oryzæ quidem, folia carnosa, Porro similia, sed latiores: altitudo cubitalis, flos purpureus, radix gemmæ rotunditatis.

Aristobulus apud Strabonem tradit Orizam in aquis clausis [conclusam Dodon.] stare, factis areolis quibusdam, eamque esse altitudine cubitorum quatuor. Multi fructus, multarumque spicarum esse: circiter verò Pleiados occasum, emundari ut speltam. Nasci etiam in Bactriano agro, & Babylonio, & Susio, & in inferiore Syria. Megillus scribit eam, ante pluuia feri, confitione tamen & irrigatione indigere, & clausis aquis irrigari. Bosmorus (Hermol. in Diodoro Bosporon corruptis exemplaribus inuenias) quem Onesicritus ait in veneratione esse, minor est Tritico, & inter amnes nascitur, torretur autem cum in area excutitur, sed iurant ne prius cum ex area moueant, quam igni concoxerint, idcirco ne semen exportetur. Indi potum ex Oriza conficiunt, sicut ex Hordeo. Cibus magna ex parte Oriza forbilis est.

Galenus 8. simpl. med. Orizæ adstrictorium quidpiam adscribit, quare mediocriter ventrem sistere ait: Et hinc 2. de alim. hæc subdit: Semine Orizæ omnes in sistenda aluo videntur, ipsum eodem modo quo Alicam coquentes: difficilius tamen quam Alicam conficitur, & minus alit, & utique in edendi suauitate ab ea quam plurimam vincitur. Eadem est & Aëtii & Aeginetæ de Orizæ facultatibus sententia.

Actuarius lib. 2. de spiritus animalis nutritione cap. 5. auctor est Orizam edulium esse modicè calidum ac siccum, & alibile, & carnes obducens: temporis autem intervallo sumptam, nihil sanè corpori molestiæ afferre.

Simeoni Sethi *oriza* est prima distantia calida, sicca verò secunda: satis habet nutrimenti, sed difficilis est concoctionis. Alba ergo Oriza cum sit, modicè sistit aluum: rubra verò cum est, magis propter siccitatem adstringit: cum lacte verò apparatus, bonum habitum bonumque colorem affert, genitali femini adiecit.

Oriza nostra vulgaris, quæ præcipuè existimatur Theophrasti, Dioscoridis, Galeni, Aëtii, Pauli, Actuarii, & Simeonis Sethi, alba & rubens traditur, quæ quidem autoritate nescimus, nisi ex Sethi, qui fortè per rubram intelligit, cui torrendo rubedo accidit.

Oryza verò rotunda radice Plinii diuersa à nostrate Lobelio, qualis considerandum: ex eius verbis, quæ post adscribemus. Habetur quoque Dioscorideæ species, *Ethyades* Cordo & Ryffio dicta, quæ tradita est cap. de Gramine mannæ. Est & Oriza germanica Tragò quæ Hordei genus.

Per prisanam aliqui intelligunt Orizam, quæ vulgò cortice nuda, venalis habetur
C. Bauh.

ORYZA

CAP. XLVIII.



luti crispantur. Inter Oryzam, quæ adferunt, sunt quedam grana cute flaua scente testâ, pulchrè canaliculata.

Matth. sic describit herbam : Oryza folium proferit arundinaceum, carnosum, porraceo haud absimile; culmum cubitalem & sæpe maiorem, geniculatum. Tristeco crassiores, seniore neque, in cuius fastigio iuba oritur, siue spica in ramulos diuisa, in quibus semen utrinque impari exortu prouenit, corrice sublaui, rectum, asperum, veluti striato, cui figura, quod gluma excussa candidum est.

Loebel. in Adu. descriptioni Matthioli contrariatur: In arundine, quæ, heu uosa, sed rigidula spicatum alterno situ insunt grana, sublaui folliculo, acutis seu angulosis tritis in longitudine donata: quo cum sibi superne herentibus aristis mordacibus, exuta grana, candida, pellucida, dura & multo pulchius gratiora, atque candidiora quouis præstantissimo Tritico siligineo. Culm. hordeacei sesquicubitales & cubitales, radix Tritici: at folia potius Milij aut Hordei quam Porri (ni multum labat memoria) visa.

Hermol. qui testatur Oryzam Hordeum galaticum quosdam vocare, quia graue sit atque candidum, miscet quæ Theophrastus scripsit de Oriza cum Strabonis verbis.

Oryzam frumenti genus vulgus gallicum de tracta priore literâ *Rizum* appellare refert Ruellius, qui duo reperiri genera tradit, vnum grano candido, quo plurimum gallia vescitur, decocto cineribus calidis, non nisi peruncto pingui iure. Alterum grano rubente, quod Plinius cubitali demonstrat altitudine, &c.

Marcellus quoniam Oryzam notam omnibus dixit, idcirco eam describere inutile & inanis iactantia fore duxit. Nos Oryzam ipsi Marcello in mensam illatam per patinariam suppellestem, quam in agro nascentem vuido notam potius fuisse dixerimus, non enim, ut tradit ipse, inutile fuisse illam descriptam ab eodem, cum non ita passim eius notitia in exteris regiones, & procul ab Italia disunctas dimanarit, illicque innocuerit, ut falsè eam omnibus notam esse ipsemet persuasum sibi habuit, quare ipsi planta ex solo

Tom. II.

natali vliginosa petita fuisset describenda, cum alij sint qui duo vel tria Oryza genera statuunt, alij verò Hordeum cognomento galaticum esse velint.

Eundem olim Matthioli. verbatum censuram, quam Marcellus, cum dixit aded omnibus in cibis familiarem esse & frequentem, ut nulla prorsus explanatione in ea describenda sit opus. Sed eam nunc cum ignotam plantam describere non potuit, quod satis apparet ex priorum comment. iconè, quam in post. comm. mutauit: præterea ipsemet imperfectè eo modo quo diximus, plantam descripsit, quasi prouenientem non obseruauit.

Erronea est opinio Buchartij Roessl. Oryzam, Far candidum inueniatis. Sed & eandem sententiam minimè probandam ducimus; qui Typhen Plinij esse dicunt. Alij Olyram & Oryzam eandem esse crediderunt, sed falsè quoque.

Ineptè Brunfelsius Oryza descriptionem pro sua venditat, cum sit Plinij, quem allegare debebat.

Cum Oryza nostras ex India in alias terras transferatur, & multis Europæ locis seratur, cõtendit Cord. in Diosc. necesse sequi aliam quoque Oryza speciem inueniri, quæ etiam in Europæ fronte nascitur, quod sc. Diosc. simpliciter palustribus locis Orizam nasci dixerit, nec adiecerit peregrinæ alienius nomen. Nos contra argumentum Cordi nullum existimamus, nec necessarium. De eius Oryza spontanea scribimus sub titulo Graminis inanna & Dente canis.

Ryff. in Diosc. Oryza figmentum ponit, nunquam à se visa.

Dod. Lat. descriptionem Plinianam assumit radice gemmæ rotunditatis, quâlis tamen non apparet in iconè Dodonæ, nec aliorum.

De Oriza Plinij hæc Lob. in Adu. Ut Semen ex India primum fuit allatum, sic & indidem nomen ascitum videtur: Matthioli sequutus videtur eos, qui ex Plinio Orizam hodie ignotam, radice Gemmæ rotunditatis, flore purpureo, folijs carnosissimis portis similibus, & latioribus, altitudine cubitali, cum notrati vulgata Oriza inscitè confuderunt. Hæc ille, quem optassemus descripsisse femina illa munere accepta. Si duo Orizæ extant genera, Plinium ea non distinxisse clarum sit ex eius verbis, mentionem non facientibus duorum generum.

Orizam suo cortice spoliaram ad nos deferri putat Riolanus, quod in eius cortice venenatum quid sit. Seri procul ab vrbibus quod eius flos malè oleat. Eam calidam esse & siccam, medicrem habere vim adstringendi, idcirco in clysteribus dysentericorum parum torrefactam à Medicis vltipari: crassum succum gignere, venasque obstruentem si quis frequenter vtatur: ex ea cum lacte cocta, jejunijs tempore, parari Oryzatum. Sed mirari subit vndenam Riolanus habeat, quod de cortice Oryza venenato scriptum reliquit, si Strabonis locum à nobis adductum consuluerit, longè aliter sensisset: præterea mirus nos tenet, cur ob florem eius malè olentem procul ab vrbibus ferendam eam iudicauerit, si namque Theophr. Dioscoridem & Strabonem adiunxisset, fuisse ipe in locis ubi colitur, meliorem longè veriorèque ei rei causam subesse deprehendisset, neque enim hæcenus apud vllum Veterum Recetiorumque legisse nos meminimus quicquam vel de cortice venenato, vel etiam de flore olido.

Guiland. in theonè ridet præclaram illam O-

Matth.
notEuchar.
error.Brunfels.
ineptus.Argumen-
tum Cordi
nullum.Figmen-
tum Ryff.
ex Diosc.Riolan.
ineptus.Oryza
Matth.
fictitia.

ryzam, priori à Matthiolo volumine expressam, eique Holci apud Plinium nomen adscribit, dicens eam seq. edit. Fallopio monente, in melius esse matutam.

*Dimersitas
coloris.*

Lacuna ait Orizam optimè cognitam esse in Hispania, præcipuè Valentia. Gualth. Rydium pingere similem Butiræ pastoris; Martholan similem Hordeo: Illam si bene recordetur, non proferre spicam, sed paniculam veluti Milium. Quandoquidem autem ibi non proueniat, se perfectam figuram dare non posse.

*Item vrid-
cula Lami.*

Lonic. scribit prouenire solo limoso, ad altitudinem vlnæ, folia ei esse longa, florem rubrum vnde parua perca, in quibus inueniatur rubrum aut album Risum. Is ridiculam figuram proponit, qualem Rithus, & similem descriptionem plantæ non visæ, & sibi planè incognitæ.

*Porta no-
calur.*

Porta sibi imaginatur Hordeum distichum, siue Galaticum, Hordei genus alterum Columellæ & Palladii, Theophrastum & Dioscoridem Orizam vocare. Mirum autem eum non obseruare Hordeum Columellæ feri locis frigidis, non autem aquosis: quinimò non cõperimus Orizam locis frigidis prouenire, sed calidis: parum ei notam plantam, Orizam fuisse, id etiam indicat, quòd floris non meminerit.

Synonyma

Dicitur C. Bauh. pin. Oriza. siue Italica, ad differentiam Germanicæ, de qua inter Zeas. Oriza, Brunf. Marth., Ang. Tur. Cor. in Diosc. Lac. Dod. Lob. Lon. Casl. Cam. Tab. Oriza peregrina Trago. Hordeum Galaticum Columellæ, Hermolaus, Ruell. Amat. & Tab. censuere.

*Nomina
Linguar.*

Oriza Lami, Guæd. Theophrast. Oriza Diosc. Germ. Reiß, Belg. Rys. Gall. Rize in Ris. It. Ris. Phil. Arab. Arab. Oriza. Angl. Rice. Boh. Rýze. In India Orientali, si diarium nauticum vera recenlet, dicitur Ten Tunbara.

Locus.

Locus ex antiquis antè descriptis annectamus, quæ de his recentiores prodiderunt: Grapald. in Lex. scriptum reliquit apud Italos (Parmenses) nuper feri coceptam esse: [Seritur autem mense Martio] & aquis clausis irrigari. Itane feri coepit nuper Oryza, ut Grapaldus ait in Italia: quandoquidem Plinii tempore Italia ea maximè gaudebat, & Horatii. Rei rusticæ authores Latini (quod quidem meminim, inquit Bruyer. culturam Oryzæ minimè persecuti sunt, credo quòd eam parum familiarem, nec hominibus admodum vilem existimant. Etenim haud dubium est, eam ab externo orbe inuectam, Indicæque terræ populis cibum vulgarissimum & gratissimum esse. Hodie feritur quibusdam Italici locis. Quin & in Gallia nostra Lugdunensi tentauere quidam eam excolere, frustra tamen: nam & parum latè prouenit, & impensa maior, quàm ex eius prouentu utilitas sentiebatur. Vidi ipse plantas Lugdunensis Oryzæ: foliis carnosiss, Porro similibus, sed latioribus, altitudine cubitali, flore purpureo, radiceque gemmeæ rotunditatis. Sic enim Plinius Oryzæ plantam depinxit. Si Bruyerinus vidit Orizam Lugdunensem, cur non describit, sed ponit Plinii suspectam descriptionem. Hac ætate in Fortunatis Insulis & Hispania prouenit ut Dodon. testatur: vnde in Belgium, pista ac Pisanæ modo repurgata, adfertur. Apud nos (Porta loquitur) in Salernitano agro, & alibi maximo prouentu, patenti uida planitie, quam tamen curipis, & illicibus, & fluuiis ductis, quoties opus est rigamus, alioqui nullam, aut cassam segetem latura. Notissimum illud Asia & Europæ, sed vnius duntaxat generis milii (Lobelii verba sunt) visum in provincia Narbonensi & Hispania, sed

maximo prouentu in agri Mediolanensis depressis, & patenti planicie vdi agri, quem tamen curipis & illicibus à flumine è lacu Maior vocato ductis, crebrius quoties opus viderint, rigat: alioqui nullam aut cassam segetem laturum, ut mirum sit tam siccum & exuclum granum, tam palustrem & humentem optare fundum, bonum alimentum & lautum suggerere, etiamque valetudini prodesse posse. Huius messis serotina est circa æquinoctium autumnale, quippe maturefcit æstiuis solibus multis: eoque Septentrionalis, tamen humentes magis, respuit tractus, ut pote alsiolos &c. Vitis in Longobardicis & Hetruscis campis latissimis & virginosis, atque in Provincia Gallia. Camerario referente in aquosis locis aliquoties Norimbergæ prouenit. De huius cultura consule Augerium gallum.

Quæ Veteres prodiderunt de viribus vsuque Oryzæ, illa omnia reperient lectores, in antè adductis Antiquorum testimoniis. In cibis Oriza admodum est familiaris, concoctaque facilius euadit, & ori gravior, vbi ex lacte bubulo, aut amygdalarum cremore, aut carniū pingui iure decocta fuerit. Datur utiliter in cibis dysentericis cæliacis, & diarrhoea affectis, præsertim vbi prius torrefacta in lacte, in quo igniti calculi fuerint extincti, decoquatur. Sunt, qui Orizam quoque dicunt genitale augere semen, in bubulo lacte decoctam, additis saccharo & Cinnamonom. Oryzæ decoctum viliter dysentericis infunditur, ac etiam potandum datur. Farina bellè quidem Cataplasmatis admiscetur repellentibus: mammarum incipientes inflammationes arceat cum Rosæ, & Anthemide decocta, & illita: Hactenus Matthiolus; Certum est (subdit Bruyer.) Orientis populos, Indicæque potissimum Oryzam in panes cogere: exiisque nonnullos Triticum quidem ferere, sed cibo abdicare, panificiaque ex eo facta: quippe sentiunt ingratiissima ventri: & contumacissima coctioni, ad eò tenoris (ut inquit ille) afficere multum est. Sunt apud Indos insulae, quæ aliarum frugum expertes, Oryzam vberissime fundant: porus suos ex ea consueunt saccharo aromateque vario cõditos, quibus facilius occlusæ tentari capita aiunt, quàm vini vel potentioris haultu. Theophr. Oryzon appellauit peregrinum, initio semen, ex Indicæque delatum, simile Zeæ, aspectu Lolii, magna parte temporis residens in aquis Milii modo ac Panicis, effundens iubam &c. Hoc elegantiorum mensas subit variis paratum modis. Rura quoque nostra, nulla celebrant lacta conuiuia, quæ non ornentur Oryzæ cibaribus. Quibusdam prima mensa apponitur ex iure gallinaceo, aut iulculo alio pingui, & Croco addito ad commendandum [ut reor] colorem, & conciliandam saporis gratiam. Quippe aliqui gustatu insuauis sentitur: alii ex lacte parant, aut ex succo amygdalarum dulcium, & croco adiecto. Sed hæc parandi ratio præcipuè vsurpatur, quibus carnibus uesti cautum est, & secundis adhibetur mensis. Culinae saccharum quandoque simul coquunt: quandoque verò paropsidebus inpositam eo aspergunt. Vulgi perualit animos opinio, obestores heri ea frequenter vescetes. Quã obrem tum in aula, tum in præclaris vrbibus, scimus quasdam scæuinas graciliores, nulliusque (ut sic dixerim) succi, Oryzæ cibo frequentius vti. Quod ita demum existimant ratum, si solum ex lacte, & largiori saccharo assumant. Sed id esse falsissimum clarissimis medicorum sententiis constat. Quippe inter *ἀρβύρα*, ab omnibus refertur, hoc est, ea quæ leuiter alunt, & *ἀρβύρα*, id est,

et, quæ difficulter in ventre coëscuntur. Plurimum & optimum alimentum fufficit probè lacti incoctus saccharo & amygdalo nostratis Oryza pollen (inquit Lobel.) eoque sanguinem & semen atget, quod non dubius animi ille Senerius efferret si in Mauritania vel Hispania egisset, ubi etiam ex Oryza mæcerato lacte frumento, destillant liquorem, limpidum primum, deinde oleosum habent, nec parum suauem, nec minus exhilarantem spiritus & incubantem, quam ipsum (quo illi abstinent vel carent) vinum. Etiam eius pabulo mitè delectantur & dociles fiunt Aphri Elephantæ. Camer. in horto : Difficile non nihil coquitur, & rosta quidem adhuc magis, sed sic ventrem cohibet. In Hispania ex farina huius & gallinarum pectoribus elixis & incisis, cumque lacte & saccharo lento igne coctis, & ligneo instrumento validè subactis suauissimum cibum, quem album vocant, parare solent, esseque plurimum alimenti sed paulò crassioris. Solus obnoxio Erysipelati (Rosauff) præscribit Oryzam, quæ inquit sanguinem incrassat & minus efficit fluxilem.

Vini ex Oryza meminit Alianus : Diarium nauticum, & potus ex Oryza & melle cocti, & Aquæ ardentis ex Oryza destillatæ: Acosta etiam Oryzaæ aceti. Ad immodicam, inquit, euacuationem Canarini Caranibolas fructum vnum viridem edunt, vel Aceti Canarini haustum fumunt, (quod nihil aliud est quam aqua decoctionis Oryza vno aut altero die referuata donec acefcat, Canarinis aceti vires præbens, & medicum vsum præstans) & si profusum non cessat ægris caput frigida abluant.

ORYZA INDIE ORIENTALI PECULIARIS C. Bauh. quid?

CAP. XLIX.

Oryzam hanc secundam Casp. Bauh. pin. siue Oryza peculiare genus, Regina Patensis, Hollandis obtulit, ut habetur in Ind. Orient. par. 8. sed quid? Oryzam ex India originem traxisse, & per vniuersum ferè orbem disseminatam esse, in 6. part. Ind. Orient. scribitur. Hæc præcipua omnium India Orientalis locorum annona est, part. 3. Ind. Orient. cap. 39. Hinc Indis loco panis est, ex caplacentas parantibus, ex qua in China potum faciunt, quem in Peru *Acuam* vocant: in Iaponia vinum, quod Iauenses *Aracle* nominant: & in Pegu, Aquam extrahunt, quæ cum aqua vitæ certat: part. 7. Ind. Orient. cap. 36. Distingunt in Oryzam optimam, quam *Girasul*, & in vilioiorem, quam *Chambasul* Indi vocant. Linscot. part. 2. Ind. Orient. cap. 37. & par. 4. cap. 6. In summa, Oryza vsus, vniuersis propè nationibus, non minus quam frumentum familiaris est: ut de China, Iaponia, Philippinis, & maxima India Orientalis parte sileam, etiam per Africam & Ethiopiam vniuersam, Indiamque Occidentalem, cibis vñtatissimus est. Sic & Europæi, qui panes ex frumento habent, Oryza, obsonij vice, cum lacte aut aqua decoctâ vñtunt.

TRITICVM INDICVM.

CAP. L.

Nostro duntaxat Frumento assuetis oculis, rari spectaculi est quod Turcicum indignant Triticum, culmo digitali, quinque aut sex

Tom. II,

pedes alto, crebris articulis geniculato, rigido, medulla alba dulci facto: *filia arundinacea*, hirsuta, venosa, duas aut tres vñcias lata, culmi fastigium in *spica* plures iubatæ facessit, quarum singula seorsum considerata, Triticeis similes, muticæ sunt, ex quarum glumis *Flosculi* staminei emicant, colore granorum subsecutorum colorem varium prænunciantes, quæ in his tamen spicis nulla vñquam nascuntur, ut ad apparatus tantum, quasi *stigma* n, comparatæ videri possint: namque ex culmorum geniculis & foliorum sinu, multiplici inuolucrorum membranarum



stipatu obducti cylindri crassiores emicantur aucto aut decem versibus granorum constantes, quorum vñcuiq; mollis acuta, dodrantè longa adnata, sic ut ex omnibus cincinnus & vagina caput exierens, metaxan, quæ coramnas ostendunt, fessit, ex primæcedentibus autem aristis grana quo diximus

ordine digesta, Pisis facie proxima, mira colorum varietate ludunt, tota alba, purpurea cærulea, lutea, & quocunque denique modo horum mistio excogitari potest, quæ contracta contritæque in farinam abeunt candidissimam: radix subest Milij.

An Athen. dipnol. lib. 3. c. 15. hoc Triticum Indicum intellexit, cum dixit:

Nasitur Aomis T hebis simul apta farina:

Et Thas, multisque locis, sed grana videntur

Tuarum.

An *Auat* Leri in America sua, ubi scribit cap. 9. Mulieres Americane cum acuto ligno plantant duas species crassi Milij nempe albi & rubri vulgò in Gallia dicti *Bled Sarrazin*: syluest. hominibus, *Auat*, ex quo farinam parant quod existimo (licet in prima editione historiæ meæ aliter fenserim) idem est cum *Maiz* Indianorum in Peru quod describit Hist. & en. India lib. 1. cap. 215. Calcondiles in Bello Turcico lib. 3. c. 14. scribit in quibusdam India Orient. Milium ad quindecim cubitos altitudinis: An Eid. Milium præaltum *Auat* dictum?

An Thea. Amer. cap. 77. Milium crassum, Pisi instar magnum (hoc est, ut in Gallia antarc. interpretatur *Mil gros comme pois blanc & noir*) diuersorum colorum: culmis Sacchari modo, tres aut quatuor spicas, quarum vna perpetuò maior altera, ferentibus? An Nic. Nicol. Milij genus magnum, *Maish* Tripoli dictum.

Dodon. Gall. vocat *Milium Indicum* Plinii, & cum Fuch. *Eru mentum Turcicum* item cum Lonic. (cui etiam *Typha magna*) *Eru mentum Asiaticum*: Gall. *Blé de Turquie*, aut *Blé Sarrazin*. Belg. *Torckthoren* Dodon. Lat. ait ex Asia inuectum credi, atque inde Turcicum frumentum nominat: non tamen ex Asia, aut Oriente sed ab Occi-

P p 4

An *Auat* Leri?

An *Milium crassum* Thea.

Synon. *Typha magna*.

Frum. Indicum.

dente, & ex Fortunatis aliisque Americae vicinis insulis, ac ex ipsius Americae nonnullis prouincis aucta, solumque Asiae in fine Maris nuncupari, praesertim quod candidi sit grani. Idem refert Cordum Triticum, Baetrianum facere, sed ratione, aut occasione non proba.

March. in post. comm. It. ait malè vocari Frumentum Turcicum, sed quod secundum Indicum, quod allatum sit ex India Occidentali, & non ex Asia, aut Tartaria, fuchsi. crediderit. In Epit. cum addit. auct. vocatur *triticum Indicum*, Indorum *Mahiz* seu *Mutz*. It. *grano* siue *Formento Indico*. Boem. *Ch. den Zito*.

Matthiolum redarguit Lob. in Adu. dicens: Milium Indicum (ita in Obl. p. 24. Ic. p. 39.) Plinianum seu *MAIS* Occidentalium, Frumentum Turcicum, vulgò Flandris, Turcistorem: Frugum maxima & perquam speciosa hac nostro orbi inquilina, inde à Neronis principatu in Italiam inuecta, iaque nostra ætate magis oblectationi quam Panificio lata & culta, Turcicumque frumentum, tum vulgò tum doctissimo Fuchsi nuncupata est. Quem tamen perbonum doctorem, cum alias non semel, tum hic potissimum immerentem lapsus inculat Cômmentator Senensis: quod istud Milium perperam Triticum appellatur, utpote non ex Turcica allatum, sed ex Occidentalibus Indiis primum alportatū. Atque cum huius delineationem, proceritatem & fecunditatem scite Plinius adumbret, cuius æuo nulli Egiptiorum nota fuit aut peruia Occidua India, petperam illius tempore primum allatum fuisse cômmentatoris error, qui hia scitur: quare rectius naucleri qui ex Asia Turcica maiore, Indiis finitima adduxerunt Turcicum vocarunt.

Frum. Asiaticum.

Turcicum frumentū, quod Germani *Welsch Korn*, h. e. Italicum (ita enim omnia peregrina appellare solent) vocant, iure equidem Typham magnam dicendam putauit Tragus. Quia verò è scriptis Veterum nullum nominis huius testimonium adduci potest: idèd Triticum magnum, & Asiaticum frumentum vocauit, germ. *Turckisch Korn*.

Gess. Coll. stip. appellauit frumentum Turcicum Fuchsi. De hostis tamen Panicum rectius cognomento peregrinum vocari opinatur. Idem rursus, Triticum Indicum, & Baetrianum nominat: In cat. pl. Milium Indicum in Italiam Neronis principatu conuectum: *xiy xpo Indico Turckisch beydisch*, oder *Judisch Korn*: Milium Sarracenicum.

Trut. Baetrianum, Milium Indicum.

TRITICVM PERUVIANVM. album longum.

CAP. LI.

Descriptio **M**inimè vulgaris notitiæ est in tanta tamque fecunda Tritici Peruviani varietate, species hæc ita fecerenda, quod semen habeat vulgari duplo longius, compressum, & ea parte qua sinuatum nonnihil est, candidum.

De Frumento Indico absolutiorem C. Bauhini in pinace tractationem hic subditam, legere ut non graueris, amice lector, rogatus esto. Eti in Canaria frumenti varia genera habeantur: attamen potidum apud Latinos quod dicitur, est *triticum* *Mitris Indicum*, secundum *Mut*, & *Indicum* ipsorum est: *cerisium*, quod *Manigere* indigant: *quartum* est *Oryza*, quæ in Regno Cogianno *Mazza di Manpur*, id est, semen Lulitanicum,

Frumentum Indicum, forma C. Bauh.



at Malaicenses *Bras* appellant: & tres postiores species delineata in 6. parte historiz Indiz Orientalis figura 14. proponuntur.

I. Frumentum Indicum, seu Milium hæc spicas habet oblongas, ex granulis colore semen Cannabis æmulantibus, compositas, forma nonnihil oblongis, vtriculis siue folliculis aristis carentibus inclusis, instar Diplaci herbe, quod trium mensium spatio succrescit: dein abscinditur, in terram mentis spatio deponitur, ut Solis calore probe exiccetur & percoquatur: tandem spica à culinis rescantur, in fasciculos collectæ domum deportantur, stramine operiendis, vel muniendis ædificiis, destinato. Hoc Frumenti genus optimū est: quod fructum & communum, candidissimum apparet, ex quo facili labore panis pinistur, cum admodum molle sit, & attritu statim, massam conficiendis panibus aptam, præbeat. Et hoc Frumenti genus, semper habuerunt, etiam ante Lulit. moram adductum: Hist. Ind. Orient. part. 6. cap. 30. An semen quod Congiani *Lucum* vocant, Cannabis grana, nisi quod paulò sit maius, referens, quod mola manuarum, subactum & pistum panem præbet candidum, Triticum non inferiorem: Hist. Ind. orient. part. 1. lib. 2. cap. 1. An *Arundinis* genus granum ferens, nostro *Secali* aut Frumento simile, quod decoctum esui est aptum: Hist. Virgineæ Hist.

II. Frumentum Indicum grano Auellanæ magnitudine, folia habet angusta, & tenuia, sed in tantam altitudinem quemadmodum, tertium, non exurgit: ex ramis frumentum illud instar Nucum Auellanarum dependet, quod aristas habet cum Tritico siue *Mutz* contentientes, colore rubicundo: grana cute tenella inuoluta, putaminibus includuntur, & peculiaribus quasi loculis ad modum granorum in Malo punice, ab invicem distincta: seminatur in agris quemadmodum Frumentum verum, potissimum in Africa, & quidem in peculiari quodam loco, qui nomen etiam suum inde obtinuit: & Æthiopibus *Manigetta*, Batauis, *grain* dicitur: part. 6. Ind. Orient. cap. 38.

III. Frumentum Indicum *Mutz* dictum. An Triticum Baetrianum Plinii lib. 13. cap. 7. Frumentum Arabicum quod *Mutz* nominant, in Hist. Ital. Triticum Indicum siue *Mut*, quod Lulitani apud Nigritas primò seminarunt: in Hist. Ind. Orient. part. 6. cap. 31. *Pagatour*, Virgineæ indigenis. Auati fructus, ex quo Brasiliiani potum *Kauy* coquunt: Stad. part. 3. Amer. c. 17. Milium amplum, Triticum Sarracenicum, Barbaris *Anatis*, quod admodum Indorum *Mutz*, & Triticum Peruanum Lerio part. 2. Americ. capit. 8. Milium *Abraun*, id est, Siligo Turcica in Baly. part. 3. Ind. Orient. capit. 40. Frumentum Asiaticum: part. 7. Ind. Occident. Milium Brasiliianum part. 3. A.

3. *Améric.* Milium in florida, part. 6. Ind. Occid. Differtentia notanda, cum duo genera, ad sex vel septem pedes, tertium ad decem in Virginea excrefcant. Sic alterum crassius & rotundius, ut quod à Lucanis tollitur: alterum subtilius & aridius, quod *Moyochen* appellant. Granum hoc magni proventus est (Sis enim Martio & Junio ferunt: part. 6. Ind. Occid.) cum in Peru ex vno grano 600. gignantur: at in Virginea mille & quingenta, & interdum bina millia reddat. Siquidem spica vel vna, vel binæ, ternæ, vel quaternæ, & singulæ spicæ quinquies, sexies & septies centena grana in Virginea contineant: apud Americanos, singuli culmi tribus quatuorve spicis ornati adolefcunt, quarum singulæ, grana centum & amplius pendent. Sic grana alba, rubra, flaua, cærulea in Virginea sunt. Frugum omnium communissimum Indis Occidentalibus locis, in Peru, noua Hispania, Guatimala, Chile, & vniuersa terra firma, in Insulis verò non item: sic & in Indis Orientalibus aliquibus. Hoc Indi communiter cum primo commiscunt: & ex hoc solo panem *Arepas* nominatum, & potum *Chicha* (potus subacidulus *Cici* dictus: part. 9. Ind. Occid. addit.) Indis vocatum, ut fortissimum, quod in Peru *Sara* dicitur. An hæc herba quæ in Brasilia aliquando fenes virilia contegunt, cuius folia duorum digitorum latitudine, paulum incurua, in longitudinem excrefcencia, veluti calamus qui spicatum Milij siue Triteici Saracenicis contegit: Licio in Brasil. cap. 7. Flactenus ex Hist. Indica: subiciamus Recentiorum notitia. *Triticum frumentum*, Trag. (cui & Typha magna) Fuchf. *Frumentum Indicum*, Matth. Lon. *Milium Indicum Plinianum*, Ruell. Gesner. Adu. Lob. cui & *Mays* Occidentalia. *Milium Indicum*, Dodon. (cui & frumentum Asiaticum,) Turner. Lac. Gelh. car. *Frumenti oblonga species Turcica* dicta, Ang. *Triticum* Baërianum siue *Indicum*, Cord. Hist. Gesn. hort. *Frumentum Turcicum*, Dod. Gesn. hort. (cui & Panicum peregrinum rectius,) Tab. Ger. *Triticum Indicum* Fuchfj & Matth. Lugd. *Maizum*, Monardi. *Maiz*, *Triticum Indicum* potius quam frumentum Turcicum dicendum, cum non ex Asia, sed ex India primum sit allatum, Cam. *Maiz Indicum*, Panicum Indicum, Cæs. *Mays*, quod nulla specie cum Milio, quod Plinius ex India in Italiam importari scribit, conuenit, Ioseph. Acosta. Hist. Ind. lib. 4. cap. 16. Variat apud nos floris colore purpureo, rubeo, luteo, aliquando pro ratione fructus futuri: granorum in colore quatuor præcipue genera habetur enim granis rufescentibus, nigricantibus, crocantibus & subalbicantibus.

2. *Frumentum Ind. Mays* dictum altærum. Milium Indicum magnam aliud, Lobicon. Milium Indicum, Cast. *Frumentum Indicum*, Tab. *Frumentum Asiaticum*, Ger. Hoc cum spicarum colore variet, idcirco Tabern. spicas sedecim, Gerardus verò duodecim pingit, quæ colore sunt vel simplici vel mixto: simplici, albo, luteo, aureo, violaceo, spadiceo, nigro: mixtis coloribus, albo, spadiceo, & cæruleo: cæruleo, albo, nigro, partimque punctis spadiceis mixto: albo, violaceo, luteo cum punctis spadiceis: rubro & spadiceo: aureo & albo: cæruleo, luteo, albo, & punctis cæruleis aspersis: denique cæruleo, luteo, violaceo & albo.

V. *Frumentum Indicum Mays* dictum minus. Huius Tabern. meminit, quod prioris altitudinem tantum mediam attingat, cuius spicæ non ad culmorum latera, sed floribus succedant, colore albo, rubeo, spadiceo, luteo, atrorubente, & alio quando mixto.

Cæterum, Germaniam propemodum Arabiam felicem Tragus appellat, posteaquam non solum domesticis abundet stirpibus, sed etiam peregrinis, inter quas Triticum hoc frumentum connumerat, quod terram probe stercoreatam & pinguem expetit, frigoris & pruinarum impatientissimum: scribitur Martio aut Aprilis mense, nec nisi sub finem Augusti & initio Septembris ad maturitatem peruenit: primo autem exortu, non multo aliter quam Milium erumpit.

Quidnam hoc frumentum in Medicina posset, Virch. nondum satis constat. Quia autem dulcedinem & lentorem quendam grana gustu præ se ferunt, haud dubie idem cum Tritico habebit temperamentum. Cum porrò idem cum Tritico habere videatur temperamentum, eisdem etiam obtimeat facultates necesse est. Grana itaque teruntur in candidissimam farinam, quæ in panificia subinde cogitur. Panis tamen ille lentoris quidam & obtruncantis naturæ habet. Hinc est quod in Asia & Turcia illius nullum in cibo usum esse, nisi cum annonæ premit inopia, dicunt. Quidam ex farina pulvis parant, adhibito lacte, quod & reliquis frugibus familiare est. Cæterum foliorum recentium succum refrigerandi facultatem obtinere tradunt, hinc ad erysipelata vtilem admodum esse coniiciunt. In nutriendo, subdit Dodonæus, frumentum hoc, Triticeis omnibus, ipsoque non solum Secali, sed & hordeo longè cit inferius. Panis ex eo apparatus mediocriter quidem candidus est, absque fufuribus concinnatus, sed durus ac siccus, veluti biscotus, nihilque lentoris habens. Concoctæ eas ob causas difficilius, corporique nullum aut omnino exiguum alimentum præbens: tardè descendens, ac aluum constringens, veluti ex Milio, aut Panico factus.

DE GRAMINE SIVE AGRESTI VETERUM SENTENTIA & Neotericoz dubia.

CAP. LII.

Dicitur *ma*, herba à Theophrasto, quod omnium herbarum frequentissima sit. Hac tamen voce etiam quæcunque alia herba indicatur. Quare magis propria significatione ab aliis grecis *ἀγρος*, & *ἀγρί* *ἀγρον*, ab agris, quod in iis proueniat appellatum est. Gramen à Latinis à gradiendo, quod geniculatis ramulis mirifice serpat: vel à germinandi fecunditate, quod citò crebras multasque à se radices nouas spargat, agatque. Arab. ut Serapione cap. 119. *The l & Negil*: Auic. & Rhase *Thil* & *Tithagra*, ab aliis *Vagen*, *Negen*, *Negien*, *Kel*, *Negil*, *Nagien*, *Phegem*, *Teil* & *Teid. ken*. Egyptiis *Anpsi*: Afriis, *Itebal* & *Ebal*. Germ. *Graß*. Belg. *Grab*: Gall. *Gramen* & herbe: Ital. *Gramigna*, *gramigni* & *gramigne*: Hisp. *gramenba*, *grama*, & *grama yerna*, & olim *Asparia*. Cretenfisibus, *Agroßi*, Vallachis *Coriða* & *Cotia*: Hung. *Ponye*: Boh. *Paye* aueb *Trawa*. Veteribus Grecis etiam *ἀγρον*, aut ut Apuleius legit, *ἀγρον*, *ἀγρον*, *ἀγρον*, & *ἀγρον*, hoc est, Aigicon, Aigichum, Asphylium, Aissefium, Vniola, Amaxitis, & Hæmaticum.

Dioscorides quatuor Graminis genera facit, de quibus ait : Gramen [*ἄρπυρις*] viticulas per terram repentes, quæ à suis articulis radices spargunt dulces, internodiis distinctas: folia acuminata, dura, lata, ceu arundinis parua, quibus boues & iumenta pascuntur. Huius trita radix & imposita vulnera glutinat. Ipsi autem decoctum epotum, efficax est aduersus tormina, vrinae difficultatem ac vesicæ vlcera, & calculos frangit. Arundinaceum gramen priore maius est omni ex parte. Iumenta porro in pabulo sumptum necat, maximeque quod in Babylonis regione secus vias nascitur. Quod verò in Parnasso monte gignitur gramen, densius fruticat, foliis hederaceis, flore candido & odorato, semine paruo, non inutili: radicibus quinis sensus, digitali crassitudine, candidis, mollibus, dulcibus, ac robustis, Quarum succus si in vino cum pari melle ac myrrha dimidio, Piperisque ac thuris tertiis portionibus decoquatur, præstantissimum fiet ad oculos medicamentum. Id verò in ærea pixide reconditur. Radicum autem decoctum eadem quæ herba ipsa præstat. At semen vehementius vrinam impellit, vomitionisque & alui profluvia silit. Natum porro in Cilicia gramen, quod indigenæ Cinnam appellant, boues & iumenta (siquis) si eo virenti sæpe pascantur.

Plin. Gramen ipsam inter herbas vulgatissimum, geniculatus serpit inter nodos, crebroque ab his, & ex cacumine novas radices spargit. Folia eius in reliquo orbe in exilitatem fastigiantur: Parnasso tantum Hederacea specie, densius quæa vsquam fruticat, flore odorato, candidoque. Tumentis herba non alia gratior, siue viridis, siue in foeno siccata, quum detur aspersa aqua. Succum quoque eius in Parnasso excipi tradunt propter vbertatem. Dulcis hic est. In vicè eius in reliqua parte terrarum succedit decoctum, ad vulnera glutinanda: quod & ipsa herba trita præstat, tueturque ab inflammationibus plagas. Decocto adijcitur vinum & mel, ab aliquibus & thuris, & piperis, myrrhaque tertia portiones. Rursusque coquitur in æreo vase, ad dentium dolores, & epiphoras. Radix decocta in vino, torminibus ineditur, & vrinae difficultatibus, vesicæque vesicæ, & calculos frangit. Semen vehementius vrinam impellit, alui vomitionesque sistit. Ita vetus codex Plinii lib. 24. c. 19. Et sunt sane eadem quæ etiam Diosc. habet. Verum subiungit de aculeato gramine trium generum, quod Diosc. non habet. Et tandem addit, Camelos autem necare traditur in Babylonis regione, id quod iuxta vias nascitur. Hoc autem *καρὰ ἀνδρῶν* Diosc. vocat.

Galen. Galeno graminis radix moderatè frigida est & sicca, habet modicum quid quod mordet & renuū partii est. At herba in primo abscellu frigefacit, sed moderata est in humiditate & siccitate. Semen autem reliqui graminis debile est. Eius verò quod in Parnasso nascitur siccandi vim habet, tenuium partium est, & subadstringens.

Caput in Galeno de gramine duplicatum. *Ἀρπύριος* demque caput in Galeni exemplaribus duplicatum legi auctor est nobis Iul. Alexandrinus. Quare siue optatum esse suspicatus est primum, vel certè superuacaneum.

Agrostis quæ agrostis. Agrostis (Lob. & Pén. Aduersaria auspican- tur) quasi Agrestis diceretur planta nec facina aut ferenda, Græcis scitè nuncupata fuit: ut pote que ruri vbique spontè quouis anni cardine, coelo, solo & sidere luxuriet: eius namque perennis proventus, feracitatis restibilis, nec minus immente utilitatis, quantum toto orbe extat terrarum, vi-

rore ornat amœno, & veluti gradatim sese propagando amicit decore, vnde Latinis Gramen deflexum putatur. Triticeo generi, vt cognata, & similis, sic perinde varia & nobilitate proxima. Quin differentia magis conspicua è radice, spicata coma, folio & flore sunt ducentia: quas etiam cunctas partes & differentias (quia varias Tritici species amulantur, deque mutua inter se collatione facilius discernuntur & discuntur) aptius fore diximus nominibus & notis quamque suis, vel minimas quasque prosequi, quas natura pecori quidem vescendas, sed homini vni non modo vtendas, adeoque prius cognoscendas, peperisset. Nullum enim vel despiciatissimum illius operum, nostra, id est, mortalium Philosophantium, indignum cognitione & admiratione ducendum, summus Philosophus in libro De partibus animalium luenter docuit, cuiusque alumnus Theophrastus in Plantarum historiis.

GRAMEN NODOSVM.

CAP. LIII.



Cilmos habet duos aut tres cubitos altos, tenuis, ad quorum nodos folia oriuntur culmi ad alterum ferè nodum inuoluentia, quæ inde dilatata abscedunt, sefcuam ferè lata, palmum longa, glabra: panicula bipalmatis, glumis constat auenacis, aristata panicula mollicella donatis, è quibus flosculorum saturatè

purpurascenti tremula filamenta librantur, radices bulbis caenatis, tuberosis, creberrimis fibris longis capillatis ipse partium tubendo.

Dodonæus à crebris gemulis ac tuberosis radicibus nobis facopgras, id est, nodosum gramen appellat. Addit autem apparere ex Marcelli verbis, nodosum hoc Gramen apud Veteres pro gramine propriè dicto habitum fuisse.

Hist. Lugd. duas huius plantæ habet figuras. Primam quidem, quæ nullo modo placet, sub hoc titulo: *Coxæ Myconi*: hoc lepores magnoperè delectari, nos quoque eius radices effodere dicuntur. Quæ secundam *75. 321. 116.* Gladioli species videtur esse. Silymichur. Altera figura est sub inscriptione *Graminis nodosum*.

Lobel. in Hist. Belg. vocat *fnobelachtrich* ostendit *Chistochrydæ* græs. Tabern. inoder oder *fnefen* gras.

C. Benth. phyt. Gramen 97. sit e. n. d. f. m. auenacæ panicula: Eid. pin. Gramen n. d. f. m. 1. siue auenacæ panicula: an *Egiops* bulbi genus, Plin. lib. 19. cap. 5. Gramen vel auenæ syl. genus, Gæfner. coll. Gramen bulbi f. m. n. dosum, Adu. Lobel. Obs. p. 17. l. c. p. 25. Lugd. cui & Gramen nodosum, sub alia figura. Gramen tuberosum, siue nodosum, Cam. Gramen

men bulbosum Tabern. *Gramen caninum nodosum*. Ger. Agrostes alterum genus. Parauij vbi sponte provenit, quidam vocabant Bromon: Volmarius misit Stutgardia pro Gramine Dioscoridis.

Nascitur in fegetibus, secus agrorum margines, & in collibus inter alia Gramina. In saltibus Thuringiæ vbique se offert. Sed, auctore Lobelio, rarius aliquantò istud, minùsque plerisque Europæ regionibus vsu cognitum: Lemano. a. & Laufannæ finitimis aruis & fegetibus plurimum. Frequentissimum etiam Sabaudia & Angliæ.

Saporis amari & acerbi sunt radices, quare valentiùs obstructions expedire & vrinam ciere aiunt, quàm vulgare. Herba, inquit Marcellus, quæ gramen dicitur, nodorum 27. ex vino ad medias decocta & expressa atque colata, potiusq; strangurioso ex vini cyatho vno mixta data, ad eò potenter succurrit, vt vbi sine tormento vrinam facere cœperit, dari non oporteat: sed febricitantibus ex aqua sola dabitur. Ex quibus verbis apparet, nodosum istud gramen, apud Veteres pro gramine propriè dicto siue Agrosti habitum, & aduersus calculum & vesicæ morbos commendatum quoque fuisse. Recentior ætas nunc huius, modò illius indifferenter, pro graminis radicibus vtitur.

GRAMEN HIRSVTVM REPENS, SPICA SIMPLICI, MOLLI.

Importuna luxuriæ est radicem albertium, nitidarum, geniculatarum, sapore subdulci, quibus in immensum se propagat: folia longa, hirsuta, mollia, vaginâ longissima culmum nodosum, tenuem, cubitalem, obuoluunt, panicula mollis, contractior, palmum circiter longa, ex viridi purpurascens.

Hoc gramen abundat in vitibus Montbelgaridi: florens Iunio, & Iulio.

GRAMEN CANARIVM, LONGIVS, RADICATVM LATIORE panicula.



Huius graminis haud à vulgato gramine medicato dispar natura, quod eruitur ex amœnissimis glareosis sabbulosisque ambulacris, vicinisque locis iuxta nouum Medicum horum Nobiliss. Baronis E. duardis Zouchæ habitatoribus corpulentioribusque dulcioribus radicibus, latioribus

ribus sparsisque acerosis paniculis, cætera haud ab similia.

C. Bauh. pin. *gramen caninum* 3. siue *longius radicatam maius*: *gramen canarium longius radicatam latiore panicula maius*. Lobel. Adu. parte altera.

GRAMEN CANARIVM LATIORE PANICVLA MINVS.

Latior item paniculâ glareosis, obsoleto & Linculto agro hoc Canarium gramen minus quandoque occurrit, reptantibus, cirratis, geniculatis, prætenuibus radicibus, graminis Canarij vulgaris gustu non dissimilibus & efficacitate paribus: coloris ex fusco albidis: foliis verò sessiquinualibus, iuxta radicem pluribus, paruis & angustis: in spithamæis autem tenuibus cauliculis iuxta genicula tribus, rarò pluribus.

C. Bauh. pin. *gramen caninum* 4. siue *longius radicatam minus*: *gramen Canarium longius radicatam latiore panicula minus*, Lob. Aduers. parte altera.

GRAMEN REPENS OFFICINARVM

FORTE TRITICEÆ SPICÆ ALIQUATENUS SIMILE.

C. A. P. LIV.

Procerum est gramen, interdum tribus cubitis altius, situs è longâ vagina, glabris, interim tactu asperis. Spica in uno culmo interduorum versuum, cum Triticea nonnihil commune habens, sed omnibus modis strigatior cum aristis brevibus subrubens, semine oblongo, fusco. Radices pro graminum ratione crassiusculæ, longè reptantes, sapore dulci, prædite sunt. Hoc gramen repens Officinarum non admodum malè representare videtur Eicon quæ post cap. 58. traditur, sub titulo Graminis repentis cum panicula Graminis Mannæ.

Lobel. in Adu. dicitur *Gramen canarium Medicatum Officinarum*, Germanis, Graß, Angl. Quych grass, Ital. graminia, Gallic. dent de chien. In Obs. p. II. *gramen caninum medicatum*: In Ic. p. 20. *gramen canarium*.

In descript. Aduers. nihil video quod repugnet nostro graminum, nec etiam in figura: nisi quod spica non in totum respondet: nescio autem gentia pictoris, vel quòd planta sit diuersa, radix optime conuenit: illud tamen non placet quod scribunt Aduers. figuram esse apud Dodonæum, pag. 345. & Matthiolum pag. 999. Figura Lobelij similis est Dodonæi figuræ, si iubam haberet & non spicam: descriptio etiam in eò differt quòd Dodon. dicit suum gramen non spicam, sed iubam ferre. Lobelius autem in Aduers. ait spicam ferre: magna præterea differentia inter gramen Matthioli & Dodonæi ac Lobelij, Matthioli figura nec radice, nec spica similis: quinimò saltim existimo radicem, si vera fuisset, non mutasset in postremis commentariis.

Nos subiungimus nostro Gramini officinarum Dodonæi gramen, imitati Lobelium & fratrem C. Bauhinum: quamuis nostrâ non habeat iubam sed spicam vt Lobelij; contra sententiam Dodonæi vt iam dictum. Lectorum igitur erit considerare

Gramen
Dodonæi
huc resp.
rendum;

an nostrum Gramen, Lobelii & Dodonæi idem
fit, necne.

An Tragus lib. 2. cap. 15. hoc gramen intelligit,
cùm ait: Inter omnes fruges in humidioribus a-
gris, nec non cùm annus fuerit pluuioſus, Lo-
lium infelix dominatur, quod fanè nil aliud eſt,
quàm ſingulare vitium, & quaſi abortus omnium
frumentorum. Cùm namque in ſatione, & quan-
do in ſpicam ſe attollit, pluuiis continuis obrui-
tur, fieri non poteſt quin vel ſemen priuſus ſuſo-
cerur & putrilagine corrumpatur, aut in Lolium
ac vitium quoddam degeneret. Eſt verò huius-
modi vitii vel Lolii fructus nihil aliud, quàm
palea inanis. Quodque iam dixi animaduerti
poteſt in humidioribus hordeo conſitis agris, in
quibus frequenter Hordeum vel in Lolium tran-
ſit vel certè deorſum fertur tota ſeminis viſ, id
quod hinc accidere conſuevit, quia Hordei caput
alterum, & craſſius quidem in radicem exit, al-
terum verò in culmum. Iam cùm pluuiola fuerit
anni conſtitutio, inferior grani pars nimio hu-
more obruta ſcilicet luxuriat; attracta ad ſe
omni torius grani viſita, vt illa in radicem dun-
taxat ſe exerat, viciffim verò in totum ſpolietur
ſuperior. Atque hoc pacto radix ſe longè lateque
per terram diſſundit, & non ſolum ex ſemine nul-
lus fructus expectari poteſt, ſed & agri ipſi peſte
ea adeò corrumpuntur, vitianturque, ut niſi in-
duſtrius agricola ſubinde eiufmodi corruptelas
agrorum ſuſtulerit, culturaque diligenti emenda-
uerit, hinc inde ſe ſpargat, ac vindique culmis
ſuis in altum emerget. Ac licet & culmum &
ſpicam oſtendet, niſi tamen fructus ſubſe-
quitur, manetque nil niſi vacua, & inanis palea, quod
fanè haud immerito malè habet agricolas, quare
iure Virgilianus ille Mopſus hiſce verbis con-
queritur.

*Ipſa Paies agros, atque ipſe reliquit Apollo.
Grandia ſepe quibus mandauimus hordea ſulis.
Infelix Lolium, & ſteriles dominantur Auenæ.*

Haſtenus Tragus. Lectores autem conſiderent
annon Lolium 2. ſiue *Quacken* dictum, Agricolis
moſteſtum, non ſit idem cum noſtro gramine, &
an Tragus in ſua deſcriptione non cõtundat duas
plantas: an veriſſimè perenne illud gramen o-
dioſum agricolis poſſit generari ex annuis illis
ſtirpibus, Triticò & Hordeo, plantis etiam valdè
diſſerentibus ſuis ſpiciſ.

Figura Graminis Matthioli in priorib. comm.
quod primum Dioſcoridis ait, & paſſim in Ita-
lia frequens, mihi videtur falſa, quod radicem at-
tinet, quæ valdè craſſa pingitur: ſi tamen eſſet
vera, non videretur eius gramen reſpondere deſ-
criptioni Dioſc. qui ait *καυκάνα ἔχει, ὡς παρὰ τὴν ἑσπερίαν*
τὸν ἄνθρωπον ἔχει, ὡς παρὰ τὴν ἑσπερίαν, quæ verba
cùm forte non obſeruaflet primò Matthiolus vel
eius ſcriba: pictum gramen aliquod cum radice
craſſa: pœnituit tamen poſtea Matthiolum & mu-
tauit radicem, & repentem appinxit, quod ſatis
demonſtrat priorem falſam, niſi etiam ſecunda
ſit falſa: miror igitur apud Matthiolum in po-
ſtrema eius editione per Baſſæum, ſculptam de
nouo figuram, per ipſum Matthiolum reſectam,
& vt magis falſa redderetur, additam veluti iu-
bam, quam quidam ſuſpicantur eſſe Graminis
xerampelini, vel, vt nos vocamus, Gramen cum
ſpica molli rubente: præſtitifſet eius emenda-
tam, vel, corruptam poſtremam, curare ſculpen-
tam, aut, quod magis placuiſſet, cum annotatio

nè figuram Baſſæi iam ſculptam apponere. Ca-
merarius ad Hiſt. Matthioli Germanicam omni-
nò, diuerſam poſuit figuram Graminis, quod non
videtur poſſe conuenire cum icone Graminis
Matthioli, nec priore, nec ſecunda: de cæteris
neſcio: Matthioli poſtrema Graminis figura,
quod radicem attinet, noſtro gramine reſpondet,
an idem intellexit ignoro.

Tabernic. & hiſt. Gramen caninum ſeu cana-
rium 1. *Sundts graß* Eidem hiſtor. Gram-
men 5. Canaria Plinii, Herba cynagroſtis, Dens
canis, & Gramen medicatum, quia multis locis
utiliter in vſu à Medicis pro Gramine vſurpatur.
Tabern. habet figuram Lobelii: ſi ei notam, cur
hoc 5. non iungit primo, & ſecundum facit, ac
diſcrimen certum ponit, quo poſſit diſtingui à
primo.

C. Bauh. phyt. Gramen 1. ſiue *Officinarium*, Cana-
rium Lobel. Gramen Dodonæo: Eid. pin. Gramen
caninum. 1. ſiue *aruenſe*, ſiue Gramen Dioſc. Gramen
Ruell. Dod. Cord. in Dioſc. Caſt. Gramen Dioſco-
ridis, Gefn. hort. Gramen canarium medicatum,
Adu. Lob. Gramen caninum, Tab. Ger. Gramen vul-
gare, Lugd. Graminis ſorè Dioſc. ſpecies maior. Thal.
Caninum autem vocat ad imitationem Plinii,
cui Canaria, quaſi à canibus inuenta, quæ ſali-
dium deducunt, vomitum cum pituita reſicien-
tes: hinc Cynagroſtis aliis: & a foliorum primò
prodeuntium forma, quibuldam Dens canis di-
citur.

Paſſim ſpontè provenit: ſoreſt Julio & Augu-
ſto, in aruiſ & ſatis, non prætis, vt plurimum, fru-
gibusque haud parum incommodum: eoque ſe-
mentem facturi raltis Septembri, etiamque pri-
mo vere manibus runcandum præcipiunt Co-
loni.

Lobelio tota planta magis veſca creditur, dul-
cis & frumentacea vſibusque Medicis receptiſſi-
ma, præſertim radix, quæ reſerat viſcerum far-
ctus & renum, citra calefactionem, lumbricoſque
huius ſtillatitia interimit, nempe pabulo humo-
rum putridorum frau datos.

GRAMEN CANINVM VINEALE

Caſp. Bauhini.

CAP. LV.

RAdice eſt alba, tenui, repente, geniculis di-
ſtincta, ex quibus fibræ capillares in terram
deſiguntur: culmos habet tenues læues, genicu-
latoſ, in terram reclinatoſ: ex quorum geniculis
ſingulis, folium, duas, treſve vncias plerumque
longum, anguſtum, atro-virens prodiſ: culmo-
rum ſummo panicula brevis, parumque expanſa,
ex paruiſ glumis compoſita, inſidet. Apud nos in
vinearum viſis, ſolo aliquantulum duriore, circa
æſtatis initium reperitur, Gramen hoc caninum
2. in pin. ſiue vineale, primum in prod. deſcri-
ptum.

GRAMEN CAMERARIJ

repens.

RAdicem adipiſcitur longam tuberoſam, ſed
æqualem, articulis præcinctam & hinc inde
reſlexis, non tamen profundius radicatam, ſila-
mentis conſtatem pluribus. Suum protrudit hæc
abynoque articulo culmum continuè ſe inno-

An Lolium
ſecundum.
7. rago.

Tragus nota-
ſatur.

Matthioli
figura fal-
ſa.

& multiplicans.
Folia longa, acuminata, dura, arundinis instar parvæ lata. Culmus duarum ferè spithamarum altus, admodum angustus, & tenuis more staminis, tribus, quatuorve nonnunquam articulis præditus, spicam superiori parte profert patulam, quæ paruum continet semen. Folia cum radicibus saporem habent

rimum est, nonnunquam etiam rubeus, non infrequenter prodit, radicibus tenuioribus, cirrosis, coliculos emitrens recurvos, humi prostratos, tenues valde, teretes, geniculis frequentibus interceptos, ad quæ primum folia prodeunt palmaris longitudinis, stricta, deinde etiam inter hæc folia & ipsorum geniculos singulos densè prorumpit plurimorum, parvorum, oblongiusculorum ac strictissimorum foliorum cespes, ad quorum inferius tuber, quo ex geniculis prorumpunt ipsa, novi circi emergunt, qui denud in musco comprehedentes, novarum plantularum origines existunt.

C. Bauh. pin. *gramen caninum* 5. siue *supinum paniculatum folio varians* : *graminis* 1. Dioscor. species Thalij.


GRAMEN CANINVM SVPINVM PANICULATVM dulce C. Bauh.

EX radice oblonga, capillata & nigra: folia Descriptio
Epauca, lævia, viridia angusta, vnciarum trium vel quatuor longa, prodeunt: inter quæ calamus tenuis, internodiis distinctus, foliis paucis oblongis cinctus, parte inferiore supinus, mox palmum longus, erigitur, & paniculam tenuem, albam, glumis exiguis donatam, sustinet: agris Londinensibus vdis gaudet, vnde D. Lobelius, *graminis dulcis* nomine misit. *gramen* hoc *caninum* 6. in pin. siue *supinum paniculatum dulce*.

GRAMEN REPENS CVM PANICVLA
Graminis Mannæ.

CAP. LVIII

DVm generum folia & culmos profert. Descriptio
Primum enim lentis, longisque ad cubitum vnum aut alterum coliculis solidis, crebrè geniculatis, lævibus, caducis nascitur, qui ubi terram attigerint, statim per fibras è nodis dimissas, comprehendit, radicaturque: atque ex iisdem geniculis folia mutuo amplexu stipata surgunt, brevia, angusta, hirsuta: deinceps adultius culmos producit erectiores veluti superiorum ramos, pedales, tenuiores, foliis amictos longioribus, hirsutis, & rariotibus geniculis interceptos, quorum summitas in spicas finditur, quatuor, quinque, sex, spicis *graminis Mannæ* similes, sed minores, concinniores, imbricatas, non tamen circumcirca, perinde vt iam dicto *gramine*, cui pars spicæ interior nuda, hoc discrimine interim, quod ea pars *gramini Mannæ* sulcata sit, in hoc verò in costam elata, flosculos fert atrorubentes. Radice nititur geniculata, reptante, subdulci, alba.



Q.9



dulcem, cum adstrictione quadam & acredine.

Camer. ad Marth. Germ. & epit. ponit figuram nomine *graminis* & *Rechgras*.

Tabern. Hist. pag. 636. *gramen primum Quesetum gras* aut *Rechgras*, pag. 644. *gramen* Dioscor. Germ. *Kinde gras Queset* antiquum est germanicum vocabulum adhuc in vult Saxonibus & Septentrionalibus germanis, significans, *Kinde*, id est, Bouem. Potuisset Tabern. diligentius describere *gramen* suum, quandoquidem Dioscoridis primum facit, & iconem non dat. An sit idem cum eo, quod pingit Camerarius, considerandum.

GRAMEN PARVVM REPENS PVRPVREA SPICA.

CAP. LVI

GRamen canarium in cultis quærenti, occultum passim copiosè *gramen* istud, supinum, sparsis per terram culmis, radice sub terra huc illuc vagante, vulgaris *graminis canini* in modum: spica purpurâ splendent, diuulsa: folia *graminis* pratensis parvi. Radices fibrosæ. *gramen* hoc ouibus est *gramen* Lobel.

Lobel. in Ic. plant. & Belg. hist. pag. 21. *Gramen caninum supinum*, Belg. *Liggghende peyen-gras*. Tab. Ic. *gramen caninum supinum* 2. *Liggghende gras*. Eid. hist. *gramen* 6.

C. Bauh. in Phyt. *gramen* 2. siue *caninum supinum*: *graminis* primi Dioscor. species minima, Thalyo. Quod verò Thalyus hanc ipsam non intelligat, declarat C. Bauh. in pin. vocans, *gramen caninum* 7. siue *supinum minus*.

GRAMINIS PRIMI DIOSCORIDIS
species minima Thalij.

CAP. LVII

SE nunquam attollit, sed geniculatis ramulis
Suxta Dioscoridem serpit, ac ex internodiis suis, & ex iplo etiam cacumine creberrimè nouas radículas iuxta Plinium spargit, ac ex iis novarum plantularum exortus exhibet. Hæc passim in *Harcynia*, & etiam *Stolbergæ* in pratis vliginosis ex musco terrestri, qui candidus repluit.

Tom. II.

Ischemum
Plum, man-
le.

Gram. acu-
leatum Plin-
ius.

Gramen le-
gitimum.

Defcr. Clu-
si.

Synon:

Locus.

Sunt qui Ischemon Plinio lib. 25. cap. 8. nuncupatum esse putent: quorum sententiam probare non possum, inquit Clusius in Hist. Quod si verò ad Pliniani graminis vllum aliud genus referenda est hæc planta, aculeatum illud potius erit, cui, quod in acumine aculei sunt plurimum quini, Dactyli nomen inditum esse ait lib. 24. cap. ultimo. Nemo autem legitimi graminis (ita vocat in Hist. post.) iconem exhibuit, quod in magna Europæ parte, præsertim per Hispanias & Gallias crescit, cuius antequam stirpium in Hispaniis obseruatarum historiam euulgarem ob illius tum elegantiam, tum vsum, cognitu dignum erat, illius descriptionem & iconem do. Pedalibus assurgit culmis, rotundis, purpurascens, genicularis: è quibus angusta promitt folia, in acumen fastigiata, dura: ipsi culmi, siue calami, in quaternas aut quinas delinunt paniculas, mixti ex atro purpureoque coloris: radicibus firmatur longis, nodosis, geniculis interceptis, candicantibus, subdulcis cum quadam adstrictione saporis, quæ longè latèque serpentes, subinde plurimis locis germinant, nouisque culmos & folia proferunt.

Lobel. Obs. p. 12. Icon. Plant. p. 23. figuram Clusii habet, ac Gramen alterum inscribit. Anguill. epist. 12. & 14. Gramen toti Italie notum. H. Lugd. Gramen vulgare Dalechampi. C. Bauh. phyt. Gramen 38. siue Gramen Dactylon secundum folio arundinaceo. Idem in pin. Gramen Dactyloides siue Ischemum. 2. siue Gramen dactylon folio arundinaceo maius: aculeatum fortè Plinii: Gramen Ang. Clus. & Cels. & dicitur. Hoc variare scribit, & Gallicum foliis nonnihil villosis; Germanicum verò foliis esse glabris, & canaliculis minùs erectis tradit.

Hoc gramine nihil vulgariùs torà Hispanià & Gallia in aruis, vinetis, atque etiam in maritimis, in quibus multò lætiùs & vberius crescit: nam eius radices, interdum digiti crassitudinem æquantes eructe meminit Clusius.

In Horto E. C. cultum per plures annos mansit, tandem frigidioris soli impatiens periit.

GRAMEN CRVCIS SIVE Neiemchm salib.

C A P. LIX.

Descriptio



miles, perfectam crucem figurantes, quam æquæ

omnes vno modo formant: ex quo ipsum Ægyptii *Neiemelm* vocant, quasi dixerint, *Gramen crucis*: in quibus sunt semina minutissima, feminibus communis graminis similia.

Alpino descriptionis auctori dicitur *Neiemelm salib Ægyptiis*, C. Bauh. phyt. *Gramen* 90. siue *dactylon Ægyptiacum*: Eid. pin. *Gramen dactyloides* Itac. *Ischemum* 1.

Maximum vsum semina apud omnes habent ad eos scilicet, qui tum renum, tum vesicæ calculis laborant, atque ad frangendos lapides in vesica concretos. Quod genus morbi ibi est familiarissimum, & quasi endimium, ex causis aliis narratis. Mulieres radices decoctum rum ad pueros variolis, atque morbillis correptos maxime sequuntur, tum ad se ipsas, ubi capium intercepiat menstruas purgationes rursum euocare. Sunt aliqui qui pro secreto auxilio habent decoctum, ex seminibus modicè contusis paratum, ac adiuuanda exanthemata in febribus pestilentibus quas periculas nostri appellant. Ad vsum quoque vulnerum & vicerum non paruum, apud eos, tot herba, præcipuè radices habent vsum. A sunt radicem frigidam atque siccam esse, tenuissimamque partium, quamobrem non desunt multi qui ad mouendum sudorem eius decocto familiarissimè vtuntur.

GRAMEN SCOPARIVM. Ischemi Paniculis Gallicum.



Speciosius istud, Ischemum Gramini cognatum videtur in Adu. parte altera Lobelio; è cuius prælongis, præternibus rigidisque cubitalibus & longioribus radicibus circumcocinatur scopula illæ villigatissima nitentis comæ conciliatrices, frictionibus capitis accommodatissimæ & vltatissimæ.

Figura ei graminea, Ischemi vulgaris, gracilis culmus, rigidus, geniculatus, cubitalis; in quaternas, quinas, vt plurimum senas, & plures elegantissimas lucidas spicatas caudicellas Ischemi Gramini similes, fastigiatus. Foliis item non dissimilibus, gustu Graminis, dulcioribus. Copiosè prouenit in Gallia, sabulosis vicinis Castris Insulani locis vocati (vulgò *Chasteau de l'Isle*) prope Aureliam, collegit amicissimus vir Georgius le Seigneur, Pharmaceutices, & Rei herbariæ callentissimus, quo gramine me donauit Londini, Anno 1601. quique quotannis Angliam nouis & rarissimis ditat Plantis.

C. Bauh. pin. *Gramen dactyloides* siue *Ischemum* 6. siue *Gramen dactylum scoparium*: Gr. scop. *Ischemi paniculis Gallicum*, Lobel. Adu. parte 2.

GRA-

GRAMEN SYPINVM ACULEATVM

CAP. LX.



Brevis radica-
tur: ramos verò
terre apprimat
in orbem, mul-
tos, palmares &
sesquipalmares,
aliquando pe-
dales, aliquos
verò duntaxat
vnciales, rigido-
s: ad quorum
genicula, vtricu-
li instar, folium
striatum glu-
mas numerosas
conglomeratas,
squamarum
foliacearum cò-
plexu compre-
hensas claudit,

deinceps in mucronem rigidum & acutum, vnciale & breuiorem, recta in latus protensum definit, extremo verò cauli huius generis plura folia & vtriculi glumis grauidi, echinati aliquid ostentant.

Camer. ad Matth. hist. Germ. & Epit. *gramen aculeatum*, Italis *gramigna spinosa*. Græcis *ἄγριος κλάδος*. H. Lugd. *gramen aculeatum* Matthioli.

Gener Cherlerus attulit collectum ad vias Romanas, asperiores præsertim, sicciorisque: Matthiol. verò in Epitome ait provenire inter rudera, & in muris vetustate collapsis.

Viretque easdem habere, quibus pollet primum graminis genus.

GRAMEN PRATENSE VVLGARE

spica ferè arundinacea.

CAP. LXI.



Capillari-
bus fibris
totum occupat
cespitem, gla-
bris, viridibus,
tenellis foliis
amictas emit-
tens stipulas,
quarum summa
comantes larè
diffusa panicu-
læ mollicellæ
insignunt: pi-
lorum, arista-
rumque exper-
tes, accedentes
ramen quo-
dammodo ad
arundinem. In
hoc gramine
insignis varie-
tas ratione lo-

ci, & potissimum in magnitudine spicarum.

De hoc Lobel. in Adu. Est quàm quod notissimum *gramen pratense* dictum, vulgò notum, &

Tom. II.

Fœnum quando aruit vocatum, exilioribus radicum cirris seu pullis capillamentis & creberrimis cespitem summum sugens, humumque perreptans & tegens, densissimo & numerofo foliorum triticeorum stipatu: culmos pedem & cubitum altos surrigens, tenues, geniculatos, laeves, lanosa, sparsa, & magis harundinem vallatoriam imitante, spica fastigiatum.

C. Bauh. phyt. *gramen* 7. siue *vulgare*: Eid. pin. Synon. *gramen pratense paniculatum* 2. siue maius, latiore folio: ita Theophrasti, *gramen vulgò cenicum*, Trag. icon. *graminis genus* Dalech. in Diosc. *gramen pratense maius vulgatius*, Adu. *gramen pratense vulgatius* Lob. in Obl. pag. 9. & Hist. Lugd. *gramen pratense primum* Dod. *gramen* Lon. commune, Thal. *gramen alterum & vulgare*, Tabern. *gramen pratense*, Lob. in Ic. Ger. An per *Chulem* Garzias hoc *gramen* intellexerit? Clusius not. ad Garz.

Huius femine in horreis è spicis excusso & col- lecto vtuntur complures Medici ad obstructions viscerum, calculum, potu: ad motusque ad digestionem pertinacium tumorum, & flatuum, tamen Officinis vsu ignoto. Ast hoc non sine periculo, quia non facile separari potest, ab aliarum herbarum feminibus.

GRAMEN PRATENSE PANICVLATVM

maius angustiore folio, C. Bauhini.

CAP. LXII.

Ex radice capillacea, rufescente, folia capillacea, quadam breuia, quadam palmarum superantia, produnt: inter quæ culmi tenues, geniculati, cubitum superantes, vno alterove folio bteui cincti, in quorum summo panicula leuiter expansa, vncias quatuor longa, quæ ratione loci, strigosior vel latior.

Gramen hoc *pratense paniculatum* 3. siue maius angustiore folio C. Bauh. in pin. 10. in prod.

In pratis & dumetis ad ripam VViciæ fluminis Basilæ reperitur.

Huic simile ad eam prædictam inuenitur, potissimum radicum capillarum, vt ex caulium numero, paniculis, & in iis glumis longioribus varians.

Descriptio

Locus

Variat pa-
nicula ex
glumis
longioribus

GRAMEN AGRORV M LOB.

CAP. LXIII.



Agrorum
venti spica-
cam diximus,
quod spicam
habeat latam,
comosam, pan-
sam, & à ventis
communiter in
alterum agita-
tam latus. Foliis
alioquin & ra-
dice magnitudi-
ne ferè æquale
est segetum
gramini. Iuba
cæterum Milia-
cci graminis
Iubæ haud ab-
similis est. Hæc Lo-
belius. Quibus
addit Tab. Ra-
Qq 2

Descriptio

dicem habet paniam, villosam: folia longa, angusta, nec acuminata: culmum, quam cetera harundinacea, magis tenuem.

Synonyma Lobel. in hist. Belg. p. 5. & Plant. Ic. p. 3. *Agrorum venti spica*, & *Gramen agrorum*, latiore, arundinacea, comola panicula T. p. 5.

C. Bauh. phyt. *Gramen* 19. siue *segetum*, panicula arundinacea: Eid. pin. *Gramen paniculatum aruense* 4. siue *Gramen segetum*, panicula arundinacea. *Gramen lolium* 8. Tragi, Thal. *Gramen equinum*, forte Gelsneri, Cam. *Agrorum venti spica*, Lob. icon. *Gramen pratense* 3. Dod. *Gramen harundinaceum aruense*, Tab. *Gramen arundinaceum*, Ger. Variat panicula haufcente & spadicea. Don. lat. *Gramen pratense* tertium duntaxat vocat nec describit: An idem cum aliis, an ipsi non cognitum? Sed non diuersum ab aliis esse constat ex iam adductis. Ipsi verò non visum patet; si namque vidisset, utique descripsisset, nec contentus solo nomine fuisset.

Locus Inter agrorum segetes reperiuntur Lob. notat & Tabernamontanus.

GRAMEN MILIACEVM LOB.

CAP. LXIV.

Agrorum venti spica simile est admodum, C. alio & radice, sed panicula miliacea.

Synonyma Tabern. icon. & hist. p. 639. *Gramen miliaceum*, hirsutigras. Item p. 642. *Gramen* 13. in aruis campestribus siccis proueniens. Lob. in Ic. p. 1. & hist. Belg. p. 6. hirsutigras / Saetgras, Miliaceum graminis: hic & Gerardo. Dodon. Lat. *Gramen pratense* 4. sine descriptione. Camer. *Gramen perenne miliaceum*, in siluis non procul ab vrbe nostra ad montem S. Mauritii. C. Bauh. Phyt. *Gramen* 21. siue panicula miliacea: Eid. pin. *Gramen miliaceum* 1. siue *Gramen siluaticum* panicula miliacea sparsa.

GRAMEN MONTANVM.

panicula miliacea sparsa, C. Bauh.

Descriptio *EX* radice fibrosa, rufescente, folia pauca, angusta, vncias quatuor vel quinque longa, vna cum culmo tenuissimo cubitali, vno alteroue folio vestito, exurgunt, in cuius summo panicula sparsa, ex locustis minutissimis composita: in monte Crenztacenſi prouenit: hoc *Gramen miliaceum* 2. siue *Gramen montanum* panicula miliacea sparsa, in pin. 50. in prod.

GRAMEN ARVNDINACEVM

panicula miliacea C. Bauhini.


Descriptio *EX* radicibus fibrosis albis huic *Gramini* miliaceo 3. in pin. 51. in prod. siue arundinaceo panicula miliacea, vnus & alter culmus cubitalis exurgit, quem parte inferiore folia arundinacea vnciarum trium cingunt ad partem supernam duobus nodis distinctam, folia duo angustiora, longioraque vestiunt: in cuius summo panicula trium vnciarum, Milii paniculae similis: in agris Patavinis reperitur, & à *Gramine miliaceo* à Lobelio proposita, planè diuersum est.

GRAMEN CAPILLATVM.

Descriptio *P*lures ex fibrosis radiculis tollit culmos cubitales, bicubitales & altiores, aliàs ex viridi in

luteum pallentes, aliàs rubentes, geniculis interceptis, foliis glabris, palmariibus, aut dodrantalibus donatos, summum cacumen in iubam expli-

catur pedalem circiter, atque arundinaceam: paniculae ex interuallis radiatim disponuntur, nunc flauescetes, nunc viridates, saepe rubentes, in tenuium pediculorum staminulis, theculis pusillis ferè claudentes minutum, subfulvum, acere molli capillari & obtutum ferè eludente in extremo donatum.



Tabern. icon. Sy.

& hist. p. 638. *Gramen segetale* siue aruense paniculatum, Ackerstrauss groß Kornstraußgras: Et p. 642. *Gramen* 9. Lob. Ic. p. 2. *Segetum Gramen panicula speciosa*: Eid. in hist. Belg. p. 5. *Veldtgras* oft forengras mer schoone seer wytghespreyde arens wort: in Latin *Segetum Gramen panicula speciosa*, latiore: pulchrum est, panicula valde lata, nascitur in agris inter Hordeum & frumentum, tam in Anglia, quam Belgio: radix fibrosa, ex qua culmus nascitur sesquicubitalis, non sine foliis Miliaceis, cui innascitur lata speciosa panicula, eo ferè ordine quo scapus Plantaginis aquatica.

C. Bauh. Phyt. *Gramen* 18. siue *paniculatum segetum*: Eid. pin. *Gramen paniculatum aruense* 3. siue *Gramen segetum altissimum* panicula sparsa: An *Gramen* caule geniculato Thalii?

Geneuæ & in Ducatu Wirtembergico ad fontem Admirabilem inter Auenam mense Augusto & Iulio floret. Montbelgardi etiam abundat in agris.

GRAMEN TENVIFOLIVM

magis sparsa panicula.

CAP. LXVI.

Observatum mihi *Gramen* culmis, ferè iisdem cum sequenti, ac geniculis aliquot, foliis tamen paulò latioribus ac panicula diuersa, quæ magis sparsa, rubens: flosculi apicem modo, rubentes: radicibus terræ firmite, hærentibus, in quibus capillares albæ fibræ.

C. Bauh. Phyt. *Gramen* 34. siue foliolis iunceis primum. Eid. pin. *Gramen iunceum* 2. siue foliolis iunceis oblongis, radice alba. H. L.ugd. p. 425. *Gramen iunceum* Dalechampii.

Montbelgardi observatum super muros cum flore mense Iunio.

GRAMEN TENVIFOLIVM GLABRVM.

CAP. LXVIII.

Numerosos effert culmos, satis tamen tenues, & rubentibus geniculis aliquot distinctos, panicu-

Aculis singularibus Phœnicis seu Lolij rubri, sed crebrioribus, grandioribus, sparsis, inconditis, coloris herbacei: folia longa, tenuia, si vaginæ excipias, qua culmum involuunt, glabra, pedalia, & cubitalia, non rigida, fibræ capillares, nigricantes.

Casp. Bauh. pin. *Gramen iuncum* 2. siue foliolis iuncis breuibus maius radice nigra. Hoc in prod. pro 34. sic describitur: ex radice capillata, nigra, folia iunce, rarius duas tresve uncias superantia, prodeunt: inter quæ culmus tenuissimus, pedalis, læuis, cuius summo glumi minimi, quemadmodum in gramine exili duriore alternatim dispositi sunt: ad mœnia urbis nostræ legimus.

GRAMEN TENVE DVRIUSCVLM
& penè iuncum.

C. A. P. LXVIII.



IN fine historiarum nostræ balnei ad mirabilis descriptum quoddam gramen, quod vocauimus iuncum cinereum, in rupibus & mucis hærens ita firmiter radicibus tenuibus capillaribus, nigricantibus, ut vix euellere possemus, coherentibus simul multis plantis, foliorum marcidorum vesti-

gia demonstrant non annuam plantam: folia alioqui vegeta sunt, longitudinis quinque, vel sex unciarum, quedam etiam breuiora, conuolutio- nis ergo iunci instar teretia, nonnihil rigida, cinerei ferè coloris, restantibus Octobris hinc calamis, valde tenuibus dodrantalibus & pedalibus, cum vestigiis veluti paræ spicæ: idem, ut verum fatear, mihi videretur graminis illud genus, quod Montbelgardi prouenit, aut valde simile, cui folia virentia, tenuia, compressa, viridia, glabra, culmi plurimi repues, pedales vel cubitales læues, in quibus vnum geniculum, præter illud quod ad radicem, & foliolum ex longa vaginula: iubâ vncialis, spicæ ferè similis, virens vel nonnihil purpurascens, in qua quedam partes, ad phœnicem nonnihil accedunt, & in paruas aristas desinunt: in iis stostuli vel apices minimi albi: toti plantæ sapor subdulcis, in cæteris similis præcedenti, radice enim est nigra: & folia inferiora Autumno albescent, cineræve redduntur.

Lobel. in Ic. plant. pag. 7. & Hist. Lugd. p. 432. *gramen exile*: Lob. in Obs. pag. 9. *exile gramen durius*: Getar. & Tab. icon. & Hist. *gramen minus duriusculum* Klein Hart graß: Eid. hist. *gramen* 19. C. Bauh. phyt. *gramen* 35. siue *foliolis iuncis* alterum: Eid. pin. *gramen iuncum* 3. siue foliolis iuncis breuibus minus.

Primum nostrum gramen in monte Teckcia- Tom. II.

no Ducatus Wirtembergici copiosum erat mensis Octobris fine, destitutum penè omnibus spicis vel iubis: item in communibus rupium & supra muros & rudera arcis. Alterum Montbelgardi florebat Iunio, obseruatum supra muros etiam, ac ni fallor, secus vias aridioribus locis. Lobelius ait suum gramen exile oriri fibuletis & squallido aridiorèque agro Galliæ, Angliæ, Germaniæ, & Belgii.

GRAMEN EXILE DVRIUS NORTVE-
gicum aut Danicum, Scopario Gra-
mini cognatum.

C. A. P. LXX.



Saxorum Loc. Descriptio
Sinteruentis
leui terrâ ster-
tilis Petreæ
Nortuegiæ,
imisq; mar-
cidis, timosis
caudicibus
sylvarum Da-
niæ hoc gra-
men (Lobel. in
Aduers. altera
parte) viget,
densissimò
sparsoque ri-
gidorum iun-
ceorum, sel-
quincialis al-
titudinis re-
nuissimorum
foliorum sti-
patum: selqui:

palmaribus, numerosis, cirratis, geniculatis stamineis calamulis, quorum summa folia latiuscula, vaginula instar, spicatas, vnciales, paniculas claudunt aut amplectuntur. Iubata concinnatq; dodrantalis, radix, Buxei pallida coloris, totaque planta prolixior, uti graminis Scoparij, cuius cognata videtur.

C. Bauh. pin. *gramen iuncum* 5. siue foliolis iuncis radice iubata: *gramen exile durius* Nortuegicum aut Danicum Lobelij, Adu. parte altera.

GRAMEN NEMORALE AVENACEVM
alterum, ex fusco xerampelinum &
lucidum Danicum.

IN siluigeris Daniæ collibus & montibus (ex re- Loc. latione Lob. Adu. part. 2. pag. 465.) perelegans, exilique gramen oriundum foliolis creberrimis, rigidis, cirratisque, vncialis & binarum vnciarum altitudinis radicibus, Pedales & selqui-pedales, exiles, lucidi, & nitidi, aspectu iucundi culmi, ex fusco xerampelini, in quibus è longiusculis paniculis Avenacea semina.

C. Bauh. pin. *gramen auenaceum* 4. siue *capilla-* Synon. *rum minoribus glumis: gramen Anglo-Britannicum auenaceum, Danico nemorale simile*: Hoc nomine à D. Lobelio accepimus. *Gramen nemorale auenaceum alterum ex fusco xerampelinum & lucidum Danicum*, Eid. adu. part. 2. cuius etiam varietatem notat.

GRAMEN AVENACEVM
lanuginosum glumis rarioribus
C. Bauhini.

CAP. LXX.

Descript. **G**ramen hoc avenaceum 6. Cap. Bauhini in pin. 72. in prod. ex radice fibrosa, folia iuncta oblonga, & culmi plures, iuncti, cubitum superantes, paucis foliis donati, exurgunt: in quorum summo glumi rariores, albi, lanuginosi, & triculum continentes, quibus semen nigrum, splendens, inclusum est: locis asperis circa Monspelium provenit: diuersum est à Gramine Clusii.

GRAMEN GLVMOSVM
Dalechampii.

CAP. LXXI.

Descrip. **G**ramen glumosum Dalechampii Lugdun. p. 429. siue Gramen avenaceum - siue lanuginosum C. Bauh. pin. radice foliisque multis graminum generibus non est dissimile: sed hac peculiari nota discrepat, quod spicas densissimas glumarum grandium ordinibus stipatas edat, quam ob causam glumosum nominatum est.

Locus In agris latis nascitur.

GRAMEN RVBRVM MONSPEL.

Descriptio **Q**uantum quantum est, rubet, spicae, folia: atque haec quidem pilis minimis aciem oculi ferè fugientibus oblita sunt. Singuli calami multas gerunt spicas paruas oblongas, aristis longis, rubris, vt in Gramine Hordeaceo. A me Monspelii obseruatum fuit.

Locus.

GRAMEN ALIVD MONSPELIENSE.

Descriptio **A**liud Monspelii memini Gramen obseruari, quatuor aut quinque spicis in vno calamo donatum, sed crassum cum paruis aristis: folia pilosa sunt valde.

GRAMEN ALIVD GLABRVM
MONSPEL.

Descriptio **S**picas gerit multas in eodem calamo, admodum exiguas, molles, nec aristis vllis obuallatas, diluore rubore, quam Gramen rubrum Monspeliulanum, à quo differt quoque, quod folia non sunt pilosa.

GRAMEN MINIMVM
Monspeliense.

CAP. LXXII.

Descriptio **V**ix radicem fibræ, culmi paucis geniculis distincti, palmares & sesquipalmares, foliis stipati prætenuibus culmo altioribus: panicula in metam fastigiantur, singulares vnciam ferè exquant, squamæ pusillis glumis contextæ.

Quod descripsi Gramen pro minimo prouenit locis saxosis Monspelii: Gener. Chælerus at-

tulit nomine Graminis exilis durioris, obserua- tum propè Butlonetum iuxta Monspelium, vt & & alibi siccis & squalidis locis.

GRAMEN PANICVLA
multiplici, C. Bauhini.

CAP. LXXIII.

Gramen prætense paniculatum 7. siue Gramè panicula multiplici, vt autor in pin. vocat, siue Gramè n. in prod. ex radice multis citris villosis albicantibus composita, culmi plurimi, palmares, laeues, geniculati & recurui, foliis gramineis, oblongis, angustis, vestiti exurgunt, quibus panicula truncialis angusta variè diuisa, per maturitatem rigida & spadicea, infidet. Monspeliuli prouenit; maius & minus reperitur, & Gramen minus duriusculum vocatur.

GRAMEN CVM PANICVLA
mollis rubente.

CAP. LXXIV.



Confibratis capillaribus radiculis sub cespite foliorum ima prodeunt, tuniceis inuolucris compacta, inter quæ bulbuli oblongi capitulum efformant, quæ à radicibus statim multa pronascuntur, quadrantalibus & trientalibus, perangustis, mollis, glabra, in culmis pauciora,

minora, in singulis tamen geniculis singula. Culmus pedalis, minor interdum, subinde maior, tenuis, paniculam gerit vncialem & sesquicentialem, diuulsam, ex viridi purpurascens, glumis crebris, exilibus, in breues, interdum tortiles, aristas, molles & quasi sericeas desinentibus.

Lobel. Aduers. Gramen minimum in fabuletis squallidis & vinetis glareosis Norbonæ sepius visitur, omnium minimum: perpusillâ radice, capillacea, alba, calamulis etiam capillamentis similibus, eleganti purpura lucentibus, Gramini Ischamo vocato non diuersis, sed spica mollicella, sericea, speciosa. Icon plant. p. 2. Gramen minimum xerampelinum. Norbonense etiamque Belgicum. Si Lobelius, quod suspicor, eandem plantam nobiscum intelligit, figura non placet, mihi videtur Dalechampii apud H. Lugdunensem p. 427. sub Graminis bulbosi Dalechampij titulo proposita.

C. Bauh. plant. Gramen 14 siue paniculatum aruense, Aduers. minimum: Variat paniculâ quoad colorem, modò namque viset, modò rubet: Quare Ta-

se Tabern. l.c. pag. 206 & 207. duas proponit Icones albi & rubri nomine. Sed non videtur nobis Gramen panniculatum Tabern. respondere figuræ aut descriptioni minime Lobelij, potius album. Idem C. Bauh. in pin. gramen Matthioli esse censet, de quo cap. de gramine officinarum egimus. Gramen, inquit, paniculatum aruense. sue gramen aruense panicula crispæ, est gramen Matthioli, & H. Lugd. p. 421. gramen minimum xerampelinum Lob. & H. Lugd. p. 433. & gramen bulbosum Dalechampi, eiusdem H. Lugd. p. 427. Casp. Bauhinus hic separat Gramen paniculatum Tabern.

gramen panicula spica molli rubenre obseruauimus Monspelij in pratis: Genue supra muros: Basileæ citra telonium ad margines agrorum: Montbelgardi mense Iunio cum bulbulis supra muros.

GRAMEN PANNICVLATVM MINVS
album & rubrum.
CAP. LXXXV.



Gramini paniculato, minori, albo, radix est exilis villosa, ex multis ceu fibris perplexa: *folia* admodum angusta, parua, acuta, leuia: *culmi* parui, æquales, dodrantem medium non excedentes, licet in pingui solo radicem egerit. *Panicula* extensa, alba, nonnihil splendens.

Rubrum quidem iam dicto radicem, folia, culmum & paniculam quod attinet per omnia simile ferè, nisi quod in hoc culmi & panicula rubescunt.

Tabern. l.c. & hist. p. 639. & 640. *gramen paniculatum minus album & rubrum*, *Hein weiß vnder rot Straußgras*. *Gramen* 16. & 17. Qualia sint hæc gramina, nondum nobis perspectum.

Frater C. Bauh. in phyt. putat idem cum minimo Lobelij: verum nobis non videntur nec eius icones nec descriptiones (quæ nos exhibemus) respondere, potius albi.

C. Bauh. in pin. mutat sententiam vocatque graminem pratensem paniculatum 6. siue minus: gramen paniculatum minus Tabern. gra-

men minimum album & rubrum Gerardi: variareque perhibet panicula & culmis purpureis & albis.

Prouenit passim (album vt legimus apud Tabern. in hortis & vineis: Rubrum autem raro conspicitur, quod haud omni terrarum loco crescit. Obseruauimus nos (inquit Tabern.) primum in Burgundia non procul à Bisantio in vineis, & apud montem *Argue*, sicut etiam in superiori Alsatia inter *Bönigsberg* & ciuitatem imperialem *Obernchen* in solo arido cum aliis graminibus. Ast alias nullibi in Germania offendimus.

GRAMEN MINIMUM CAP. LXXXVI.

Capillorum instar tenues *radicula* cespitem *Descriptio*
mordicus obfidens *culmi* numerosi, plus minus viciales, e-



nus viciales, e-nodes, molles, tenuissimi in spicam desinunt alternis glumis graminis praten-sis obstitam: *foliola* stipulas à radice aliquou-sque comitan-tur, tenella, per-puilla.

Gener Cherle-rus attulit ex Gallia Narbo-nensi, & specia-tim se collegisse ait propè fon-tem illum ma-gnum Templi Dianæ propè Nemausium,

Locus:

nec alibi vspiam obseruasse.

GRAMEN MINIMUM DALECHAMPII,

CAP. LXXXVII.

Descriptio

Est veluti *Egleba* am-pliulcula, ro-tunda, radiculis plurimis breui-bus, candidis: *fo-lia* digito non longioribus, te-retibus, spica valde gracili, parua: *st. sculis* rubris, Februa-rio statim ad primam aëris temperiem ex-orientibus, sa-pore initio dul-ci, deinde ama-ro. Nascitur in aruis.



Hist. Lugd. p.

424. *gramen mi-*

minus Dalech. C. Bauh. phyt. *gramen* 16. & *gramen minimum instar gleba ampliulcula*. Eid. pin. gra-

Qg 4



gramen tremulum 6. siue minimum paniculis elegantissimis.

GRAMEN ANTHOXANTHON. spicatum.

CAP. LXXVIII.

Descriptio



inolles, oblongæ, compressæ, acuminatæ, muticæ, interdum totæ flauent, interdum bicolores, flauæ & viridantes, per confinia decurrente cœu nervulo


Synonyma H. Lugdun. p. 426. *Gramen Anthoxanthon Dalechampi*. C. Bauh. pin. *Gramen spicatum pratense* 3. siue spica flauescens.

Locus. Obseruati Genezæ & in valle Griesbachiana ad fontes acidos florens Maio, itemque circa S Hippolitum Burgundia.

GRAMEN VERSICOLOR.

CAP. LXXIX.

Descriptio



lore ad obiectum lucis variante placet, paruum semen longiusculum ad semen graminis Mannæ accedens, rufescens externe, interne albescens, in-

Folliis & radiculis capillaribus proximè ad Gramen pratense accedit: verum folia glabra; Culmi dodrantes: aliquando cubito altiores, tenues, frequentiusculè geniculati, spicam gerunt singuli vnicam vnius duarum-ue vnciarum, ex viridi flauescens, in metæ figuram, cuius glumæ singulares,

uolutum parvis glumis.

C. Bauh. pin. *Gramen auenaceum* 8. siue glumis Syn. vartis: 73. in prod. sic descriptum: ex radice crassa, membrana alba rugosa intercta, caules bini, terni, pedales, fragiles, laues exurgunt, quorum summo spicæ similis panicula vncialis, ex glumis variis coloris infidet: folia plura ad radicem angusta, palmaria, saturatè virentia: locis montosis circa Montbelgardum prouenit, vnde à Fratre p. m. accepimus.

Genezæ obseruauit in colle *la Baslie*, circa S. Hippolitum Burgundia, semine maturo Maii principio, transuli Montbelgardum in hortum, solet inter rupes prouenire loco soli expofito.

GRAMEN PANICVLA AVREA.


Tenuem surrigit dodrante maiorem culmum, per cuius fastigium conscendunt quinque aut sex auricolores paniculae splendide, semunciales, graciles, teretes, acerbis glumis contextæ: folia perangusta, vix culmo cedunt longitudine.

H. Lugd. p. 430. *Gramen aure*. m. Dalechampi C. Bauh. phyt. *Gramen* 20. & *Gramen panicula pendula aurea*. Eid. pin. *Gramen paniculatum aruense* 2. siue panicula pendula aurea.

Habui Argentina à D. Vldarico Chelio medico: hoc, vt testatur H. Lugd. in fruticibus & fqualidis locis prouenit.

GRAMEN LANATVM Dalechampi.

CAP. LXXX.



TOTVM mollicellum est, comen- toque obfita non tantum folia longiuscula, sed & calami, eorumque genicula: paniculæ mediocriter diuulsæ, spicam mentuntur, sefunculae, sepe palmarem & longiorè, colore iam purpurascens, iam cinericeo, alias coloris ex his mixti, vix vllis donatæ pilis, molles ta-

men non minus ac folia, glumis laxioribus, breuius, aritarum expertibus, plurimum striâ vnicâ obfcuriore donatis, florum apiculis luteis.

H. Lugd. p. 430. *Gramen lanatum* Dalech. sic dictum quod manibus contectantium blandiatur: C. Bauh. Phyt. *Gramen* 17. siue paniculatum molle: Eid. pin. *Gramen pratense paniculatum* 1. siue molle: *Gramen paniculatum molle* Lob. Adu. parte 2.

Genezæ, Basileæ, vt & in Gallia Narbonensi locis prouenit: loca. amat montium editorum & alporeo-

petorum, vda. & rigua prata.

GRAMEN SORGHII EFFIGIE
LOBELII.

Ad sesquipedalem surgit altitudinem, foliis parvis, latis. Radix fibrosa: semen & spica Sorgho similes. Nascitur in aruis.

Eobel. in Ic. p. 5. itemque hist. Belg. *Gramen Sorghi effigie*: Dodon. Lat. *Gramen pratense* 5. sine descriptione. Tabern. (apud quem in Icon. & Hist. p. 639. Icon à Lobelio proposita, est pro arbitrio immutata: nec enim vllam videtur habere cum Sorgho sua spica similitudinem) *gramen Sorghinum*: Eid. hist. *gramen* 12. siue *Sorghgrass*.

C. Bauh. phyt. p. 8. *gramen* 27. siue *Sorghi effigie*: Eid. pin. *gramen sorghinum* 1. siue *gramen Sorghi panicula erectum: gramen sorghinum*, Gerardi.

GRAMEN HARVNDINACEVM SORGHII
paniculâ sparsâ Casp. Bauhino.

CAPVT LXXXI.

Gramen hoc Sorghinum 2. in pin. 52. in prod. C. Bauhino, culmis est cauis magna ex parte reclinatis, ita vt capillaribus radicibus: errant agitantur, qui folia (quæ longiora & angustiora quam in priore) veluti per tubum transeunt, & in summo paniculam ferè palmarem sparsam, parvis vtriculis donatam, sustinent. Locus natalis memoria excidit.

GRAMEN ASPERYM.

CAP. LXXXII.



Gramen asperum culmo est bicubitale & altiore, geniculato, aspero, potissimum sub nodis & in fastigio: folia longa vagina culmi inuoluunt in acutum pungentemque mucronem desinentia, à quo deorsum si digitis stringas, aspera sentiuntur: panicula itidem aspera, rigida, & crassa, albicans vel rubens, sæpè mi-

nus sparsa: aliàs etiam magis cum parvis paniculis ex pediculis longis asperis, antrorsum duntaxat vergit, ex laxisculis ceu muscariis composita, flosculos luteos vibrantibus.

Hist. Lugd. p. 47. *gramen spicatum* Dalecham-
pij: C. Bauh. phyt. *gramen* 11. siue *gramen folio aspero*, nonnunquam articulat: Eid. pin. *gramen spicatum pratense* 5. siue *gramen spicatum folio aspero*: *gramen varians folio nonnunquam ar-*

ticulato, & floribus, qui Basileæ passim mense Iunio pallide lutei: in pratis verò montium frigidorum subrubri sunt.

GRAMEN PARVVM ECHINATVM.

CAP. LXXXIII.



Longis albis-
cantibus fi-
bris radica-
tus, culmis
pluriculis
donatum pal-
maribus, paulò
longioribus, du-
ris, rubentibus,
crebro nodo-
rum interceptu
distinctis, quos
folia ferè totos
obuoluunt, vix
vnciam ab iis
recedentia, hir-
tis per margines
pilis donata, a-
lioq; glabra:
spice viciales &
longiores, inter-
dum eam longi-
tudinem mini-

Descriptio

mè attingunt, denso glumarum pulchris denticulis muricatarum stipatu contextæ, semen echinuli meditullio continentium, pusillum, oblongum, rufum.

A C. Bauh. in prod. pro *gramine* 3. siue *canino* maritimo aspero sic describitur: radicem habet ex multis fibris oblongis, albis, capillaribus compositam, ex qua ramuli plures dodrantes, in terram primùm reflexi, prodeunt, calamis rotundis rufescentibus donati, quos folia quasi in fasciculo iuncta, breuia, dura, veluti in aculeum fastigiata, in circuitu leniter hirsuta, ferrè instar minutissimè exasperata, cingunt: spica folliculo primùm inclusa, angustæ, ceu ex lappulis elegantissimis, exiguis, asperis & echinatis compositæ. In littore Veneto, maritimis quoque circa Anconam, & Monspessulî reperitur mense Septembri. Lobelius Aduersationum parte altera in catalogo graminum, *gramen caninum medicatum marinum spica echinata* C. Bauhini (sed sine descriptione) vocat, quia hoc nomine in Phyt. nostro ante annos viginti quatuor breuissimè descripsimus. Hæc ille, qui pilos foliorum in sua icône exprimit. In phyt. vocat *gramen* 4. siue *caninum marinum spica echinata*: in pin. *gramen caninum* 10.

Gramen caninum marinum
C. Bauh.

Locus:

Icon Casp.
Bauh.

GRAMEN CANINVM MARITIMVM
spicatum C. Bauhini.

CAPVT LXXXIV.

Hvic *gramini canino* 2. (vt vocat in pin.) siue (vt in prod.) *gramini* 4. ex radicibus tenuibus, lignosis, leuissimè capillatis, viticelli plures repentes, rotundi, laues, pedales, cubito etiam longiores, frequenter geniculati, vnde ramuli plures, foliolis arundinaceis breuib; & angustis cincti, prodeunt, quorum superioribus spica

Descriptio

Locus. triuncialis, ex cinereo nigricans insidet.
Ad litus maris, non longè Montepelio Domi-
nus Saltzmanus legit & communicauit.

GRAMEN MVRORVM RADICE RE-
pente, C. Bauhini.
CAPVT LXXXV.

Descriptio Gramini huic canino 12. C. Bauh. in pin. 50. in
prod. ex radice nigricante repente & capilla-
cea, culmi plures, pedales, incurui, tenues, geni-
culati, foliis paucis, breuib; & angustis cincti,
prodeunt: quorum summitati panicula albicans,
sceliquincialis, ex minimis glumis contexta, insi-
det. Hoc in muris fossarum interiorum vrbis no-
træ prouenit.

Locus

GRAMEN PERPVSYLLVM
capitulo rotundo, spinoso Cherleri.
CAP. LXXXVI.

Descrip:




Paucis fibril-
lis radicator
summo cespice
hærentibus, folia
aliquot vncialia
& breuiora, ri-
gidula, pro plan-
tulæ modulo la-
tiuscula: Culmus
vnciam vnā
aut alteram al-
tus, durus, rigi-
dus, striatus, non
sine foliis, quo-
rum vnicuique
capitulum insi-
det glomeratum,
exalbidum, stellis
denticulatis ad-
modum rigidis
pungentibusque
muncatum.

Locus. Nemaufii ad molendinas in saxorum & rupe-
torum cauernis collegit Gener Cherlerus, nec
maius vllibi reperit, quam pictura exhibet, quæ
iplammet plantulæ magnitudinem repræsentat.

GRAMEN CAPITVLO LVCIDO
globoso Tabernæmontani.
CAP. LXXXVII.

Descript.



Synonyma

Gram. radi-
cula est te-
nuis fibrosa, fo-
lia Graminis
vulgaris simi-
lia: Culmos sur-
rigit læues, te-
nellos, spitha-
mam longos.
In quorū sum-
mitate insidet
spica pellucidæ
glomerosæ, ste-
llis albidis
densè stipatæ,
quos dehiscen-
tes minutu-
lum excipit se-
men, Tabern.
Tabern. Ic.

& hist. p. 639. *Gramen lucidum* Germ. *Festuca*
gras. Eid. Hist. *Gramen* 15. C. Bauh. Phyt. *Gramen*
42. & *Gramen capitulo glomoso*: Eid. pin. *Gramen*
nemorosum hirsutum 4. siue capitulo globoso. *Com-*
bretum Plinii, Ang. *Herba Luziola* vulgo, Cæf.
Gramen lucidum Tab. *Gramen palustre echinatum*
Ger. icon.

Locis prouenit incultis collibusque asperis &
siccis. Tabern.

GRAMEN HIRSVTVM
angustifolium maius C. Bauh.
CAP. LXXXVIII.

EX radice exigua fibrosa, rufescente, culmus
vnicus, cubito altior, vt plurimum læuis, exur-
git, in cuius summitate panicula alba, mollis, le-
uiter sparsa, ex multis laminulis composita, in
quarum qualibet femina minuta, subnigra & sub-
rotunda: foliis est paucis, angustis, palmaribus,
& villosis, aliquot culmum cingentibus: ipsi verò
paniculæ, vtrinque folium tenuissimum subiici-
tur, quorum alterum paniculam superat, alterum
non adæquat. Prouenit in nostris paludosis pra-
tis Michelfeldensibus: Gramen hoc 47. in prod.
siue Gramen nemorosum 5. siue angustifolium
maius.

GRAMEN PHALAROIDES
exile, supinum, humi sparsum, Da-
nicum Lobelii.
CAP. LXXXIX.

Videas [inquit Lobelius in Adu. par. 2.] prope
Cronenburgum arcem Regiam muni-
tissimam Schindæ Danorum, è regione equilis
horti Regii, fabuloso solo, ad latus maritimum
Gramen pusillum humile, humi sparsum, in-
numeris duarum triumue vnciarum culmis, to-
rulis spicatis effusè fastigiatis, exilibusque apicu-
is præditis. Foliolis vncialis longitudinis & la-
tiusculis, crassioribusque culmis pro plantulæ
magnitudine. Radix fusca, cirrosa. Tota albicat
herba fæniticia.

GRAMEN CRISTATVM.
CAP. LXXXX.



Graminis
genus i-
stud sceliqui-
cubitalibus al-
surgit calamis
perquam te-
nuibus, geni-
culatis, non si-
ne foliis, quæ
vaginæ instar
satis longo in-
teruallo, cul-
mum comple-
xa, palmum
longa, ab eo
recedunt, an-
gusta. Spica
quadrantal-
is aut paulò lon-
gior, duobus
veribus in v-
nam par-

nam patrem vergentibus, glumarum pallidarum, cristatarum, humbricatarumve, flocculorum fuscorum, luteorumve, tremulas fibrillas explicat, dorso spicae glumis viduo: Radices tenues & cristatae.

C. Bauh. phyt. *Gramen* 12, siue cristatum: Eid. pin. *Gramen cristatum & spicatum pratense* 1. siue cramen spica cristata laeve. *Gramen* varians florum colore, communiter ex pallido flavescente, aliquando puniceo. Hoc ante in prod. fecit *Gramen* 18. & sic descripsit: Radicum capillamentis plurimis oblongis albicantibus abundat, quae in vna veluti capitem coeuntia deorsum repunt: culmis est pluribus sesquicubitalibus, geniculis paucis donatis: foliis brevibus, congestis, & circa caulem paucis, vncias quatuor vel quinque longis: spicam habet tenuem oblongam, pallide virentem, quae Galli cristas plurimas, vel semen capitis gallinacei dictae plantae refert, cuius nomine cristatum in phyt. appellare placuit: quod nomen & D. Lobelius in Adu. parte altera probavit, *gramen cristatum* C. Bauhini nominans: provenit in prato infra patibulum, aliquando ad mœnia Basilienfis. Idem, sed spica elegantiore & densiore, in monte VVasserfall & Montipelluli observatissimas: simile ei ex Anglia D. Lobelius multis annis post misit.

De gramine cristato C. Bauhini hæc Lobel. in Aduers. par. 1. scribit: A cristatis palmaribus, dum curvantur, spicis, cristam callinaceam æmulantibus, hoc cristatum *gramen* scitè à clariss. C. Bauhino vocatur, Alopecuroideis graminibus in stirpium Illustrationibus nostris annectere libuit: quo nihil frequentius variis editis pratis Londinensis agri, iuxta Hackneum (alibique multis in locis transmarinis) vbi à rusticis, vti nonnulla gramina, floribus, pergulis, transfennis, topiariis, coronariisque operibus arte manûque factis, elegantissime inuicem annexis, concinuantis, æstivo tempore aulis & caminis ornandis aptum. Vernaculè etiam *Beur* vocatur.

GRAMEN SPICA CRISTATA SVBHIRTUM C. Bauhini.

CAP. XCI.

Gramen suum cristatum 2. siue spica cristata subhirtum, vt in pin. vocat, in prod. 19. fecit & sic delineavit: à priore differt, radicem capillamentis rufescentibus, culmis tenuioribus, parte inferiore leui lanugine aspersis & humilioribus: foliis longioribus: spica candicante, minus compacta, nec ita eleganter cristam exprimente: quod in dumeris circa Cliben copiose provenit.

GRAMEN GENICVLATVM, TABERN.

CAPVT XCII.

Radix ex pluribus fibris composita multos protrudit nodosos, seu articulatos culmos, in alios subinde diuisos: folia longa, angusta, acuminata, nervo per medium eleuato: spicam longam, tenuem, villosam, glumis albis constantem, in quibus semen paruum.

Dicitur Autori Icon. & H. *Gramen* 3, genicula-



GRAMEN SPICAM FOLIO AMPLECTENS.

CAPVT XCIII.

Fibris capillaribus numerosis radicatur, calaminis palmaribus & brevioribus, geniculatis, foliis teneris, glabris, quorum quod è summo oritur geniculo in vitem degenerat, sinu suo comprehendentem spicam semunciale: glumis maiusculis aristatis dense congestam, quod superest eius in mucronem foliaceum gramineum facessit.

H. Lugd. p. 425. *gramen pratense* Dalech. Casp. Bauh. phyt. *gramen* 10. siue *gramen pratense*, cuius spicam folium instar vesicæ amplectitur. Eid. pin. *gramen cristatum & spicatum pratense* 4. siue *gramen pratense* spica purpurea ex vtriculo prodeunte, vel *gramen* folio spicam amplexante.

Descriptio

GRAMEN TREMVLM.

CAPVT XCIV.



Non aded altè fibras suas demittit *gramen* hoc tremulum, culmum erigens tenuem, geniculatum, inanem ad sesquicubitum interdum, humiliorē sæpè. Folia magna sui parte culmum ceu vagina complectuntur, reliquam sursum breviorē rigidam: à summo culmo multi tenuissimæque rubetes pæoli glumas sustinent rubescentes, è squammulis pulchro ordine digestis compactiles, leuissimè attractu tremulos, minores quàm Tremuli maioris, forma conocide.

Descriptio

In nostra tabella, triplex proponimus Graminis tremuli genus. Nempè Gramen tremulum, minus, & maximum tremulum. Tremulum verò, & de quo nunc egimus, in medio tabellæ pingitur.

Synonyma C. Bauh. Phyt. *Gramen tremulum minus*: Eid. pin. *Gramen tremulum* 2. varians paniculæ colore viridi, & spadiceo. Lohium 10. & Aegilops Plinii, Trag. *Aegilops*, Gesn hort. Lon. *Graminis* 1. genus, Dalech. in Diosc. Ama. *Phalaris pratensis minor*, Adu. Lobel. icon. p. 44. *Amourettes tremblantes*, Clus. hist. *Phalaris pratensis* Ger. *Gramen polyanthos*, Lugd. p. 428. *Gramen leporinum & tremulum*, itemque, *Linum D. Mariae*, Tabern. *Gramen liliaceum* 10. Tragis, Thal.

Locus. Clus. Hist. post. de hoc ait: Graminis, seu vixidis Poæ, genus in omnibus quas vnquam lustrauit regionibus, prout, vt ceteræ herbæ, multis locis vestiens, cui similes paniculæ ferè, breuiores tamen, & ab exortu latiores è summis culmis dependent. Id Galli & Arthesii seu Atrebares mei populares *Amourettes* etiam appellant ob paniculatum elegantiam, sed vocem *tremblantes* adiciunt, ad alterius differentiam: quia, vel vnico, vel pluribus eius scapis manu recentis, omnes eius paniculæ perpetuò tremulæ sunt. Germani *Zyden* / *hasenörling* / *hasenbrot* / & quibsdam *Jungfrauen haar*: Belgæ *Elyenbrende* / & *Beuernelle*, vocant.

Genus passim in pratis mense Maio, nec non Basilicæ, & Montbelgardi quoque reperitur.

GRAMEN TREMVLM MINVS. CAP. LXXXV.

Descriptio EX radice rufescente & quaquauerfum repente culmos surgit pedales, plùs minùs graciles, vix vno vel altero distinctos articulis, iubas sustinentes paruas è folio vaginaceo, superna parte acuto, & iubam ipsam sæpè superante, media parte sui prominentes; quæ ex squammulis delicatulis, rotundis, pallidis, aut sublauescentibus & splendentibus, ex breuibz pedicellis pendulis, tremulis, sed in vnum tantum latus plurimum nutantibus, constant. Quibus notis singulis à maiori dicto tremulo facile distinguas licet. Folia cæterum inferna graminca, pallidè virentia, angusta, acuminata. Huius iconem in præcedenti tabella primo loco expressam damus.

Synonyma C. Bauh. Phyt. *Gramen* 39. siue tremulum minus, vulgò *Hasenbrot*. An Graminis Loliacei species parua apud Thaliū in sua Hærcynia: Eid. pin. *Gramen tremulum* 4. siue minus panicula parua.

Locus. In pratis montosis Basilienfisbus prouenit.

GRAMEN TREMVLM minus panicula magna. C. Bauh. CAP. LXXXVI.

Synon. Gramen tremulum 3. siue minus panicula magna aliquando in cacumine tres aut quatuor ramulos exiles fundit, semineque triangulum habet. Idem autem facit cum Phalaride parua Cæsalpini, & Gramine *Amourettes* altero Clusii cur. post.

GRAMEN TREMVLM MAXIMUM. CAP. LXXXVII.

Descriptio CVlmo est cubitali, gracili, inferiùs rubeate, paucis geniculis donato, foliis amicto raris,

breuibz, glabris 4. vel 5. vnciarū, stipulæ summe in pili instar tenues tremulosque finditur peciolos, quorum vnusquisque spiculam gerit semuncialem, paulò minùs latam, compressam, ex flavo rubentem, squammarum maiuscularum, nitidatum & splendentium, denique similia capitula habet cum Gramine premulo, (sex spiculas supputauit) mutuo incubitu imbricatam; pro radicibus fibras est fortitus. Gramen tremulum maximum exhibuimus, cum duobus prioribus, cui appictum capitulum maximam.

C. Bauh. Phyt. *Gramen* 38. siue tremulum maximum: Eid. pin. *Gramen tremulum* 1. siue maximum: an Phalaris altera, Cæf. *Gramen Amourettes* maiori paniculâ candicante, Clus. cur. post. Colore panicularum variat, est rufescentis, est albi coloris.

A multis annis habeo à Valerando: Cherlerus Loci gener etiam secus Romam passim ferè obseruasse se testatur, maximè verò in via quâ Româ Viterbum pergitur, vnde etiam attulit Frater Casp. qui aliquando misit, scribit se in monte *Rua* apud Monachos non longè Patauiō collegisse, & in montibus Euganeis prouenire.

GRAMEN AMORIS DICTVM.

CAP. LXXXVIII.

Fibræ numerosæ, satis crassæ in caput unum coeunt, è quo surgunt pedales culmi, graciles, læuibz vestiti foliis, per calamorum fastigia tremulis filis pendent paniculæ longæ pulcherrimæ, albicantes, vel ex atro purpureæ, vnciales circiter, culmi latitudine, compressæ, gemine versâ squammularum contextæ, arista omni piloque carentes: radices capillares.

Dodon. Lat. *Gramen pratense* sextum. Tabern. Syn. icon. & hist. p. 638. *Gramen paniculatum satiuum Heragrostis*, Liebigraß: Eid. pag. 642. *Gramen* 11. Clus. hisp. & Hist. *Gramen amourettes* ob panicularum elegantiam, rusticis gallicis appellatum, graminis genus elegantissimum. Lob. Obs. p. 11. ic. pl. p. 7. *Gramen paniculatum phalaroides*. G. rar. *Gramen paniculatum*. H. Lugd. *Gramen filiceum*, seu polyanthos secundum. C. Bauh. phyt. *Gramen* 36. Eid. pin. *Gramen tremulum* 5. siue paniculis elegantissimis, siue *spadiceis*, maius. Patauij erant qui Canariam Plinii volebant.

Monspeliij vidi totum album. Patauiō attulit Frater sicum nonnihil rubens nomine Zeæ filij. Cortusi. Inuenitur nonnullis Hispaniæ locis aridis & sabulosis. meminit etiam Clusius obseruare & colligere Parisiensi agro, non procul à traiectu Sequanæ, qui ferè ex aduerso monasterij vulgò dicti, *Les bons hommes*, secundum semitas frequentissimum. Narbonensi agro nonnusquam occurrit In gallobelgio, etiam frequens iuxta Auxiacum castrum, & vicinis locis passim, inquit Lobelius. Quamuis autem etiam in quibsdam germaniæ locis proueniat, vt in Allatia superiori, nihilominus tamen propter pulchritudinem plantarum in hortis etiam relinquatur.

GRAMEN PVLCHRVLM PARVVM. PANICVLA LATA COMPRESSA.

CAP. XCIX.

Plucelli huius graminis radices capillares sunt, colore ruffæ, palmura longæ, folia parua, vnciarum

ciam vnam, duras, tréſve longæ, tenuia, culmi triquetri, enodes, frequentes, palmares, & ſefquipedales, quorum extremis ſeſſiles, ſineque pediculis, vt plurimum (licet etiam interdum è medio productus pediculus brevis plures alias ſuſtinear paniculas) impolite panicula, umbel-



lam quodammodo metientes, ſpecioſæ, graminis *Amourettes* dicti, non ita diſſimiles, compreſſæ, ſemiciam circiter longæ, culmum latæ, binis verſibus ſquammatibus compactæ, colore ex viridi ruſſeſcente, nitido, ſemen minutum nigrum; paniculis ſubiectis ſunt terna folia graminea, quorum vnum

reliquis multò breuius ſemper conſpicitur.

Tragus germ. lib. 2. cap. 37. hoc gramen ſine deſcriptione pingit ſub nomine *Flein Riedgras*, Calamagrostis, idque ſecundo loco: capite verò 43. meminit eius inter luncos tertio loco, & vocat *Flein Rintzen*, hoc eſt, luncum exiguum, ac Graminis genus facit. Lat. commodè pingit p. 679. ſub titulo Calamagrostis alterius ſpeciei. Huius in contextu mentionem non facit: pagina verò 676. vocat luncum exiguum pratenſem, de quo ait: Tertium quoddam lunci admodum exigui genus in quibusdam humectis pratis inuenitur dodrantalis altitudinis, calamis ex vna ſtirpe ſupra viginti erumpentibus, lato, frequenti, & ſtipato in ſaſtiis ſemine dependente. De hoc genere cum ad Graminis genera pertinere videatur, plura ſupra cap. 33. Hæc ille, Nos eo capite nil inuenimus quod conueniat præter iconem.

C. Bauh. phyt. gramen 61. ſiue cyperoides minimum panicula ſubſtana: Calamagrostis 3. quoad iconem Tragi pag. 679. luncus exiguus pratenſis eiusdem p. 696. Eid. pin. gramen cyperoides 11. ſiue minus paniculâ ſparſâ ſubſtaneſcente. luncus exiguus pratenſis Trago. Calamagrostis 3. Tragi. con. H. Lugd. p. 1006. Carex minor Lon. gramen marinum ſpicatum minus, Carib. gramen cyperoides minimum paniculâ ſubſtana: Caſp. Bauhinii Lobelio Aduerſ. parte 2.

Abundat locis humidis circa Montbelgardum, vigens ſpicis Iulio & Auguſto. Ad Brytam Baſilienſium in paluſtribus & in Michelfeld.

GRAMEN PARVVM PVLCHRVN ALIUD PANNICULA COMPREſſA NIGRICANTE.


CAP. C.

Gramini paruo pulchro à Trago depicto, ſimilem habeo aliam plantam, diuerſam tamen: quippe maior paulò videretur, dodrantem interdum excedens, tota habitior, folia latiora longiora: culmi trianguli, craſſiores, ſimiliter e-

Tom. II.

nodes: panicula haud ſecus diſtichæ, ſquammatæ, vt numero ſerè ſuperiores, ita magnitudine inferiores, colore nigricante, folia paniculis ſubiectis eundem habent poſitum, eandemque inter ſe

proportionem, ſed maiora quàm alterius.



C. Bauh. phyt. gramen 62. ſiue cyperoides minimum panicula nigricante: Eid. pin. gramen cyperoides 12. ſiue minus paniculâ ſparſâ nigricante. gramen cyperoides minimum nigricante panicula, Lobel. ad. parte 1.

Iiſdem locis cum præcedenti prouenit.

Locus.

GRAMEN CVM CAUDA MVRIS MINVS.

CAP. CI.



Longa huic *Descriptio* *gradix*, obliqua, craſſiuſcula, ex qua fibræ tenues ſuſum in aliquot capita diuiditur, ex quibus folia multa vnciarum quatuor vel quinque, graminis pratenſis ſimilia: culmi aliquot palmares vel pedales, ſpica vnciarum trium vel quatuor, quales gramine cum cauda Muriſ maioris, ſed tenuiores, eodè modo quali ſquamina-

te, an hoc à maiore varietatè tantum propter ſolum, aſſerere non auſim.

Tabern. icon. pag. 217. hiſt. p. 655. gramen Typhinum 1. C. Bauh. pin. gramen typhoides 3. ſiue aſperum primum: gramen typhoides aſperum matius, fortè Thalij. gramen Typhinum 1. Tab. gramen typhinum matius, Ger.

Vnde habuerimus non occurrir, frater quidè C. Bauhinus dedit Baſileæ pro gramine typhino 1. Tabern. qui prouenire locis ſiccis & graminofis campis ſcripſit.

Synon.

Locus.

GRAMEN CVM CAUDA MVRIS FO-
lis hirsutis.

CAP. CII.

Culmi aliquot cubitum excedentes, interno-
diis circa imum nonnihil rubefcentes, denſis, *Descriptio*

Rx

raioribus, & ferè nullis superius, foliorum vaginâ multum inuolutis, quæ ubi à culmis recedunt breuia satis sunt, & angusta, hirsuta. *Spica* trium vaciarum, nitida, densissimis tenuibus glumis compacta, luteola ferè, singula glumæ planæ, angustæ, in acumen vnicum desinunt, tota autem spica nonnihil diuisa conspicitur. *radix* capillaris, alba, tenuis, ex capite crassiusculo, an repat non obseruamus Montpelij.

Gramen alopecuroides minus Lob.

Lob. Ic. Plant. p. 9. & hist. Belg. p. n. Gramen alopecuroides minus, (quod vt in descriptione eius refert) eiusdem ferè altitudinis est cum Gramine alopecuroides ipsius, sed culmis & spicâ tenerioribus, radice item & foliis inferioribus multò minoribus.

Gr. alopecurum 3. Tab. Tabern. notatur.

Tabern. Ic. & hist. pag. 641. Gramen alopecurum 3. fischschwanz gras. Eid. p. 641. Gramen 22. Illud hic monendum pictorem Tabernamontani Gramen hoc trifolium facere, ex malè scilicet consideratâ Lobelij figura. Descriptio etiam eius parum valet.

Gr. typhoides repens alterum C. Bauh.


C. Bauh. phyt. Gramen 50. siue typhoides repens alterum: Eid. pin. Gram. typhoides 6. siue culmo reclinato: Gramen alopecurum maius, Gerardi.

GRAMEN CVM PARVA

cauda muris, radice non nodosa, repens.

CAP. CIII.

Defc.



liolum: summitati spica incumbit parua, hispida, Lobelij Typhini Graminis figura, bicornibus squammulis densissimè facta.

Huic circa Bessfordiam reperto, simile, si non idem, obseruauit in Ducatu Wirtembergico: in quo an reperiatur radix bulbulis nodosa, & squammulæ bicornes, non animaduerti: in ceteris discrimen adhuc agnoscere non potui: utrumque repit.

An varietas, aut si...

Synonyma

Lob. Ic. Plant. p. 13. Gramen aquaticum spicatum. Tabern. Ic. & hist. p. 654. Gramen fluuiatile album reus fluit gras. Eid. hist. Gram. 28. C. Bauh. phyt. Gramen 24. siue aquaticum spicatum: Item, Gramen 93. siue, nodosum alterum spica parua à fratre Io. Bauhino communicatum. Eid. pin. Gramen spicatum aquaticum 2. siue geniculatum spicatum: Gramen fluuiatile spicatum Gerardi. Item, Gramen nodosum 3. siue spica parua: 6. in prod. de quo ait,

radice est, parua, nodosa, albicante, fibris paucis & breuibus donata, cui, cum alter nodulus oblongus infidet, qui in calamum cubito altiore, lauem, internodiis aliquot distinctu abir, folio ad quemlibet nodum vno angusto, vncias quatuor vel sex longo: in summitate spica vnica, vix vncialis, mollis, typhini graminis forma. In dumetis vdis circa Bessfordiam (vrbē, diei itinere Bafilea distant) prouenit, ubi D. Ioannes Bauhinus frater meus collegit & transmisit.

Quod nodosum est, in dumetis propè Bessfordiam, non longè à pago Daniutin nobis reperit Augusti cum suis spicis. At quod sine bulbis, in Ducatu Wirtembergico propè fontem Admirabilem Bollenfem obseruauimus ad ripam riuuli præterlabentis.

GRAMEN CVM CAUDA MVRIS

maioris longa, Maius.

CAP. CIV.



Gramen Typhinum 2. Tabern.



p. n. fisch dodde gras. Nimiùm breuis Lobelij descriptio est, vt ex qua certi quid colligi non possit: figuram si consideres, non malè exprimit

*R*adices tenues, culmi habet principium bulbillo oblongo simile, cubitales, altioreque interdum, folia aspera, vagina longiore, stipulam circumplexa: summum cacumen palmarem, sæpe etiam longiorum, spicam sustinet, teretem, caudæ magni Muris simile, mollem si sursum versus manu demulceas, asperam si contra, coloris cinerici, innumeris squammulis imbinas breues aristas desinens, dimidiatos solenas aut lateritias canaliculatas scandulas imitatis constantem.

Lobel. Icon. Plant. & Obs. p. 10. Gramen Typhinum gaudet fabuleis & maritimis natalibus. Radix pusilla, capillacea, caulis drantalibus & pedalis. In Belg.

Gr.

men de quo hic agimus, appingit enim bulbosa caulium principia: sola magnitudo dubium parit, verum ea sola non sufficit ad differentiam constituendam.

Hist. Lugd. p. 433. *gramen typhinum*. Tabern. Hist. & Icon. *gramen typhinum* 2. Kteschgras. Nescio aa Tabern. hoc gramen differat à Lobeliano, multa alioqui habet communia, & potissimum culmorum principia bulbosa & alia pleraque.

C. Bauh. phyt. *gramen* 44. siue typhoides maximum spica longissima, gramen multum conueniens cum gramine *typhoides* maiore & molli apud Thaliu in Hircynia. Item *gramen* 46. siue Typhoides asperum latifolium. Lobelio typhinum. Et *gramen* 47. siue typhoides asperum angustifolium Tabern. Typhoides 2.

Nos donec intellexerimus differentiam à Fratre manifestam inter tria dicta gramina ea ab inuicem non separabimus. In pin. non amplius tria, sed duo duntaxat statuit genera. *gramen typhoides* 1. siue maximum spica longissima: 25. in prod. Et *gramen typhoides* 4. siue asperum alterum. *gramen typhinum*, Lob. Lugd. *gramen pratense* 7. Dodon. *gramen typhinum* 2. Tabern. *gramen typhinum minus*, Ger. Porro Typhoides maximum in prod. sic describitur: ex radice parua, nodosa, cui fibrae exiguae & plurimae adnatae, culmus exurgit rectus, scilicet cubitalis, internodiis rarioribus distinctus, qui in spicam rectam, teretem, palmarem, virentem, in maturitate albicantem, tactu mollem, definit, vtriculis aristas oblongiusculas & copiosas exhibentibus. Inter fruteta circa Geppingam Ducatus VVirttembergici primum, dein non longe Basilea, in sepibus agrorum inter Michelfelden & Huningen, & in salicetis Michelfeldae legimus.

Incrementum maxime adipiscitur *gramen typhinum* 2. Tabern. in solo humido, arenoso, & graminoso, in silua dicta *Ostwald* iuxta viam, sed praecipue in pago *Erlenbach*, & aliis eiusdem naturae locis.

GRAMEN CVM CAUDA MVRIS purpurascens.

CAP. CV.

EX denso foliorum gramineorum glabrorum agmine aliquot emergunt culmi, quorum alij pedales, alij cubitales, aut sesquicubitales, interdum purpurei, foliis infernis latioribus vestiti, paucis atque exiguis articulis distincti: in summo spicam gerunt purpurascens, palmarem aut breuiorem, teretem, caudae muris forma, sed confuso glumarum steriliu ordine refertam, ex quibus breues & tenellae profiliunt aristae. Flosculi eius apices sunt linteo-



Tom. II.

li pallidi ex tenuissimis filamentis penduli. Radix mæta sunt fibrae.

Lobel. Ic. plant. pag. 9. *gramen alopecuroides minus alterum*. Eid. Hist. Belg. p. 10. *Anders vossens steren gras*, in campestribus & iuxta semitas, culmis bicubitalibus paucis foliis donatis. Tabern. Hist. & Ic. *fuchsichwanz gras*. *gramen alopecurinum* 2. C. Bauh. phyt. *gramen* 49. *gramen typhoides repens*, *gramen alopecuroides minus alterum*, Lob. At nostrum contra, quod exhibemus *gramen non est obseruatum repere*, sicut nec etiam Lobelius, at Tabernam. repens pingit. Eid. pin. *gramen typhoides* 5. siue spica angustiore, *gramen alopecurinum minus* Ger. Variat spica longiore & breuiore.

Circa Montbelgardum loco secco florens Locus & collectum Iunio: olim Gencuæ mense Aprilis vbi tempus. abundans obseruati ad vineas Nolodochij.

GRAMINI CAVDÆ MVRIS PURPVRA- scenti aliquatenus simile.

CAP. CVI.

OBliquè radicem agit crassam satis, tenuibus fibris donatam, veteri præteritorum foliorum cespite amictam, ex qua è terra statim plucula prodeunt folia graminea, vix triuncialia, raris pilis ad latera obliqua, striata, Culmi surgunt aliquot pedales, cubitales, aut etiam altiores, teretes, rigidiusculi, paucis internodiis versus ima potissimum donati: quorum singulos ex longo intervallo sejuncta amictunt foliola sesuncialia, aut ad summum duas uncias longa, infernis alioqui similia. Summitati inhaerent spica, quæ primulum prorumpentes caudæ muris purpurascens spicam aliquatenus æmulantur, tum figura, tum colore, præterquam quod aristis nullis sit septa. Mox diuisa & aperta elegantem glumarum purpurearum aut xerampellarum & pulchre splendentium thyrsu exhibet. Ex quibus flosculi vel potius apiculi vtrinque bifidi (dum nimirum floret) dependent, pulchelli, obscure purpurascens, tremuli. Glumæ cæterum cassæ, inutiles. Sapor graminis vulgaris.

Sicco gaudet cespite, arenosis item, squalidis & saxosis viarum marginibus, aruorūque oris incultis, Montbelgardi ad collis proximi quæ meridiem spectat, nobis primum obseruata, florens Iunio.

GRAMEN CVM CAUDA LEPORIS aspera, siue spica murina.

CAP. CVII.

Plurimos surgit calamos graciles, rigidulos, pedales aut sesquipedales, in quorum summitate spicae sunt breues, magnitudine & figura caudæ vulpinæ haud dissimiles, sed cristis asperis, vtrinque quoque muricatis, cum aristis longiusculis & leniter recuruis, & quæ ex breui reflexu in summitate culmi nutant: In quarum sinu glumæ latent parue inutiles. Folia medietris longitudinis rigidiuscula, glabra. Radix densa satis, numerosam hirsuturum fibratum prolem demittit.

C. Bauh. phyt. *gramen* 51. & *gramen alopecuroides* Synon.

Rr 2



Locus.

GRAMEN ALOPECVROIDI
accedens, & Phalaridis, spica longius-
cula, folio lanuginoso.

CAP. CVIII.

Descriptio **D** Vras & frequentes fatis ad infimo culmo
pendentes habet fibras, easque candicantes:
Culmus autem cubitalis, crassiusculus, propter
terram rubescens; foliis pro geniculorum nume-
ro obsepsus, palmo longioribus, Hordeaceorum
latitudine, totis molli canaque lanugine tectis;
spica singularis, vncialis, aut etiam sextantal, ar-
genteo nitore micans, turbinata, glumis acerosis
gracilibus mollibus, numerosis, denso stipatu
coacervatis constans.

Synon. Lob. ic. Plant. p. 8. & Hist. belg. p. 10. *Doffestee-
ren gras* / *gramen Alopecuroides*, sic dictum (ait i-
bid.) quod spica sit oblonga, forma itidem cau-
dæ vulpinæ. Calamo est bicubitali, articulis
& foliis paucis. Radicula ex miris fibris constat.
Tab. Hist. p. 640. & icon. *gramen Alopecurinum* 1.
fuchschwartz gras. Eid. Hist. p. 643. *gramen* 20.
C. Bauh. Phyt. *Gramen* 45. siue *typhoides molle*: Eid.
pin. *Gramen typhoides* 2. siue molle: *gramen alope-
curoides minus*, Gerardi. Frater Casp. attulit mi-
hi hoc gramin Monspelii collectum. Lobelio ve-
rò suum provenit in campestribus, & iuxta se-
mitas.

Locus.

ALOPECVROS ALTERA
maxima Anglicæ paludosa, siue
Gramen Alopecuroides
maximum.

Graminea paludosa maritima Alopecuroides
Descript. **G** Ramineo generi cognatam hanc paludo-
sam maximam Alopecuron statuit Lobel.
in Aduers. parte altera. Est autem in riguis
herbidis Comitatus Zont-hamptoniæ proximè
salinas & antiquas ædes Drayton vocatas, eis
mare, duobus miliaribus Anglicis à Portmou-
th ex aduerso vinctis Insulæ plurima. Culmus cubi-
talis, sesquicubitalis, bipedalis & quâdoque pro-
cerior geniculatus, & folia illi Graminis aut Tri-
tici, sed quinque vncialis sæpè speciosissima, ha-
bitior, sericea, spicata, caudataque panicula; Mof-
peliensium Pseudo-Schenanthi. Hanc quoque
vdis fossis lacuitribus Essexiensis comitatus, le-

Locus.

Descript.

git author, iuxta Thameſis amoenissima fluent,
sed paulo minorem.

GRAMEN ALOPECVROS
spica longa tomentosa candicante.



lis, radice fibrosa infirma.

Lobel. in Adu. Obs. p. 43. Icon. p. 83. *Marinus*
gramineus luncus foliis Schenanthi: in Hist. Belg.
p. 15. huic titulo præponuntur hæ voces, *Welsh*
Schönanthum / hoc est Pseudo Schenanthum.
H. Lugd. *Gramen tomentosum*: *aromatizans* Plin-
ii & Theophrasti. Tabern. ic. & Hist. *Gramen*
spartium secundum, daß ander *psirnen gras*.
Caspar. Bauhin. Phyt. *Gramen* 119. siue *Alopecuros*
spica longiore. Item *Gramen* 116. siue *spartium*
sextum. Eid. pin. *Gramen alopecuroides* 3. siue *Alo-
pecuros minor* spica longiore: *luncus marinus grami-
neus foliis schenanthi*, Adu. Lobel. icon. Lugdun.
Schenanthum adulterinum, Tab. Ger. Item: *Gram-
en tomentosum* 1. siue *spicatum*; *Gramen tomen-
sum*, *Alopecuros vera* Theophr. & Plinii, Lugd. *Gram-
en spartium* 2. & *Schenanthinum*, Tab. *luncus ma-
rinus* 3. *Gramen*, Ger. tit.

GRAMEN ALOPECVROS.
Spica brevis.
CAP. CIX.



C Vltimo est
bucubita-
li ferè gracili,
geniculato,
foliis grami-
neis, glabris,
ad tactum nõ
asperis, squa-
lida. Schæ-
nanthūs folia
quodammodo
imitanti-
bus, spica pal-
mari, molli-
cella tomen-
tosis candicā-
tibus cum ni-
tore velleris
holosericeis
glumis con-
gesta, emican-
tibus tremu-

H ERBA
mollissi-
ma aut brevis-
sima, ut pote
dum plus mi-
nus vnciarum
sed cōcinnior
propitis ad
vulpinam cau-
dam accedens,
coloris albi &
rari, glumis to-
mentosis vbi
apparentibus
propter tome-
ti densitatem.
aristis longius-
culis mollicel-
lis, circumcir-
ca radiatis
Culmus geni-
cul.

cularis, cubitalis, sesquicubitalis, foliis amictus gramineis, paruis, mollissimis pilis albis hirsutis: radix parua, alba, capillaris.

Plinius lib. 21. cap. 17. Alopecuro spicam tribuit mollem, & lanuginem densam, non dissimilem vulpium caudis: unde ei nomen fecit. Ast videtur Stelephuri loco Alopecurum accepisse, vti descriptio liquido docet, inquit Lobelius, qui in Adu. pag. 17. hanc plantam describit & pingit, vti etiam in hist. Belg. p. 56. & Ic. plant. p. 44. pro cauda vulpis Monspelienfium, Alopecuro Theophrasti.

C. Bauh. phyt. Gramen 120. siue Alopecuros spica breuiore: Eid. pin. *gramen alopecuroides* 2. siue spica longiore: Alopecuros summa spica, Tur. Cauda vulpina Monspel. Adu. Lob. Icon. *alopecurus maior*, Tabern. Variat magnitudine & spicarum longitudine, quæ in altera longior, in altera breuior & rotundior.

Circa Monspelium prouenientem obseruauit ad mare mense Maio. In Anglia Alopecuron prouenire negat Turnerus, alterens se in Germania solum & Italia vidisse. Notissimam, ait Lobel. frequentemque maritimis ad Magalonam, & Monspelio propinquo ioribus.

Iyefende Cruyde von Spaensch saede/ oft Canarien saede, quod sic describit Phalaroides quoque appellauimus gramen hoc, licet spica eius Phalaridi (Hispanico alias femini dicto) nona



per omnia respondere. Radice quoque est fibrosa, culmo cubitali vel sesquicubitali duobus tribusve foliis donato. Tabern. icon. p. 210. hist. pag. 642. figuram graminis phalaroidis des wilden Canarien gras sine descriptione ponit. C. Bauh. phyt. *gramen* 43. siue *phalaroides*: Eid. pin. *gramen phalarides* 1. siue *maius*, siue *Italicum*: *gramen a-*

lopecuroides minus Gerardi.

Pulchrum Gramen habuimus Argentinæ ex plantis Domini Agerij cum hac inscriptione, *gramen Onocord. n.* Lob. Teut. ed. p. 10. ait tam in campestribus, quam iuxta semitas reperiri, sicut gramen phalaroides.

GRAMEN ALOPECVROS ALTERA LOBELII.

CAPVT CX.

Aliud genus quoddam est caudæ vulpine Theophrasti, spicis tamen minoribus ac breuioribus, nec ita lanuginosis vt Monspelienfis: Culmos quoque multo surrigit altiores, bicubitales: Folia graminea, radix fibrosa, Lobel.

Lobel. hist. Belg. p. 58. & Plant. Icon. p. 45. *Alopecuros altera*. C. Bauh. pin. *Gramen alopecuroides* 1. siue spica rotundior: *λωπεκουρος*, Theoph. Ang. Cauda vulpina Monspelienfium speciosior, Alopecuros Dod. Lugd. Tabern. Cam. Ger. *Alopecurus altera*. Lob. icon. Cauda vulpina, Cxf. Variat: Creticum enim spica est maiore & ad tactum delicatior.

Græcè à Theophrasto dicitur *λωπεκουρος*, auctore Dodonæo. Lat. cauda vulpine: Germ. *fuchschwanz*. Belg. *Doffen steert*. Gall. *Queue de renard*.

Sesquimiliari Brugis distantibus campestribus iuxta Westrich copiose prouenire ait Lobelius. Dodonæi Alopecuros nascitur in aruis vnâ cum frugibus ætate, reperitur in pluribus Galliæ, præsertim Narbonensis agtis.

GRAMEN ALOPECVRO SIMILE GLABRUM cum pilis longiusculis in spica Onocordon mihi denominatum.

CAP. CXI.

Calamus cubito altior, internodijs longis distinctus, quem inoffensè susque deque contractes licet, quemadmodum & *solia*, quæ tamen non apparent cana lanugine obiecta: spica summo culmo sedit, Phalaridi æqualis, textura dissimili, breuibz & mollicellis pilosis glutinis compactis, ac aristis mollibus longiusculis, coloris cinericei.

Lobel. Ic. plant. pag. 8. & hist. Belg. pag. 10. *gramen phalaroides alterum*, das ander Græc. ghe- Tom. II.

GRAMEN PHALAROIDES MINVS SIVE Hispanicum C. Bauhini.

CAP. CXII.

Folius est oblongis, angustis, viridibus, quorum vnum vel alterum, culmos cubitales, tennes, rubi instar cingit: in culmorum summo spica Phalaridi similis, sed angustior, uncias tres longa, insidet, nec radicem, nec semen vidi: & nomine Phalaridi alterius Hispaniæ, D. Gilienius transmissit, idèoque gramen phalaroides 2. siue minus, seu Hispanicum denotauit, inquit Auctor in pin.

Synonyma

GRAMEN PHALAROIDES SPICA MOLLI, siue Germanicum, C. Bauhini.

CAP. CXIII.

Gramen phalaroides 3. siue spica molli, seu Germanicum C. Bauhini in pin. pro gramine 27. sic in prod. describitur: culmo est cubitali, prioris crassiore, vno alterove geniculo distincto: folio vno vel altero, eoque breui, culmum ambiente, cuius summo, spica biuncialis, prioris angustior, cinericei coloris, splendens & mollis insidet. Hoc Vlmenses, apud quos prouenit, a colore, Onocordon appellare intellexi.

Locus: Onocordon;

GRAMEN PHALARIDI SIMILE QVOD etiam aliquid commune habet cum Alopecuro.

CAP. CXIV.

Phalaridis haud adeo ab simile est quod culmum quoque surrigit satis longum, glau- R 2

brum. Ex cuius articulo folia culmum ferè tota ambientia prodeunt: mox carinata reddita velut è sinu promunt spicam squarrosam, vnciam vnam laram, duas longam, densiore squammarum stipatu, quàm in Phalaride, multò tamen molliore, quæ in acutiorem aristam desinunt. Quæ argenteo nitore fulgens, purpurâ dilutâ quoque decorata est. potissimum in suprema parte: Hæc autem desumpsumus ex planta sicca non integra, quam Gener. Cherlerus ex Gallia Narbonensi attulit.

Locus.

GRAMEN PLUMOSUM LOB. SPICA
candida & serici modo lucens.
CAP. CXV.

Descript.

GRamen plumosum foliis est duris, rigidis, & aridis, ad Schoenanthi folia non parum accedentibus, culmi similiter rigidi, sesqui cubitum, aut cubitos duos, alti, spicæ longæ densæ, ex purpureo rubentes, paleaceæ, per maturitatem candidæ, & serici iubar micantes, Lobel.

Lobel. Hist. Belg. p. 8. *Pluym-Kingraß*. Eid.

Synonyma



in Ic. Plant. p. 6. *Gramen tomentosum & acerosum*, Calamagrostis quorundam, & vulgus *Gramen plumosum*. C.B. Phyt. *Gramen* 32. siue *tomentosum Lobelii*: An Graminis arundinacei alia species Thallio? Eid. pin. *Gramen arundinaceum* 3. siue paniculâ molli spadicâ maius: *Gramen tomentosum Lob.* Ic. *graminis lotiacei* 8. alia species Thalii.

Locus.

Locis nascitur feticosis Sylvarum quarundam, Flandriæ & Angliæ, iumentis inutile.

GRAMEN ARUNDINACEVM,
ramosum, plumosum album. C. Bauh.
CAP. CXVI.

Descript.

Radice & foliis est arundinaceis, & in arundinis altitudinem excrefcit: caule anguloso, albo, paniculam arundinaceam, ramosam, palmarem, albam, mollem, splendenter, instar serici albi sustinet. Gramen hoc 44. C. Bauhini in prod. *Gramen arundinaceum* 5. siue ramosum, plumosum, in pin. non longè Monspelio, circa Perault & Magelonam reperitur.

Synonyma
Locus.

GRAMEN MONTANVM
panicula spadicea delicatior
C. Bauhini.
CAP. CXVII.


Descriptio

GRamen quod C. Bauh. in pin. vocat paniculatum montanum 1. siue *gramen montanum*

panicula spadicea delicatior, in prod. pro *Gramine* 12. sic describitur: Radice est alba, breui capillacea, culmis ternis, quaternis, geniculatis, pedibus, vno alteroq; folio cinctis, quæ etiam ad radicem breuia & pauca sunt in culmorum summo panicula triuncialis spadicæ coloris, ex locustis minimis composita. Hoc tamen variat magnitudine, cum & caule sesquicubitali & spica semipalmari inueniatur: prouenit locis saxosis, maius quidem in monte Crenzacho: minus verò in monte Wasserfall dicto.

GRAMEN STRIIS PICTVM.

CAP. CXVIII.



In hortos vt deduceretur fecit foliorum grata varietas, quæ Arundinaceis minora, rigore tamen non cedentia, striis albis & ex viridi glaucis alternatim virgata sunt paniculas summo culmo sustinet palmares, candidantes, acerosas, mediocriter diuulsas: pro radice fibris nititur.

Observatione sanè dignum, quod diligentissimus Botanicus & Phylitæ Arnoldus Gillenius Cassellensis asserit, nobisque in paucis graminis huiusce foliis Montbelgardi demonstrauit, colorem scilicet triplicem album viride & purpureum, siue potius incarnatum.

Lobel. Adu. & Ic. Plant. p. 4. *Gramen sulcatum & striatum album*. Camer. hort. *Gramen pictum* siue *striatum*, Mannæ vulgò dictum. Tabern. icon. & hist. p. 638. *Gramen sulcatum pictum*, Hispanicum, *Espanisch graß* / *welschgraß*: Eid. hist. p. 642. *Gramen* 10. C. Bauh. phyt. *Gramen* 26. siue *variegatum*: Eid. pin. *Gramen paniculatum montanum* 3. siue folio variegato: *Gramen sulcatum*, Adu. Lob. icon. *Gramen striatum*, Lon. Ger. *Gramen pictum* Cam. Tab. Variat in colore foliorum.

Basilæ mense Iunio vidi in horto D. Fel. Plattneri, qui vocabat Germ. *himel tauw* i. e. Cæli Mannæ: In hortis Montbelgardi & Clerenual vocant *des Equillettes*.

GRAMEN SYLVATICVM
paniculatum altissimum C. Bauh.

CAP. CXIX.

EX radice repente fibrosa, calami duorum triumve cubitorum exurgunt, qui paniculas paruas sustinent: foliis est latis, cyperi æmulis. Hoc in sylvis circa Montem Belgardum prouenit, ex quo rustici chlamydes pastorales, & torques equis aratra trahentibus, faciunt.

C. Bauh.

C. Bauh. prod. *gramen* 14. Eid. pin. *gramen paniculatum montanum* 4. siue *gramen syluaticum paniculatum altissimum*.

GRAMEN SPIGA QVADRATA AD SECALE accedens.

CAPVT CXX.

GRamen culmo bicubitali, infernâ parte nodorum articulatione distincto, supernâ nodi, glabro ceterum, & foliis graminis glabris duarum vel trium vnciarum, pro articulorum interuallis singulis vestito. Spicam sustinet, quadratam, aliquatenus fecalinam, compactam, cuius glumæ munitæ aristis breuibus haud panis, sed superioribus glumis appressis, & oppositis apparent lateribus. Radix fibrosa.

An hoc *gramen spica fecalina* C. Bauhini, de quo infra?

Ex siccis suis plantis obtulit nobis Thomas Platerus circa Basileam collectum.

GRAMEN LATIFOLIUM SPIGA TRITICEA latiore compacta, C. Bauhini.

CAP. CXXI.

Culmo est sesquicubitali, vno alterove geniculo distincto, foliis frumentaceis, pediculis, spica triticea, palmari, lata, glumis acutis carente: Basileæ ad agorum margines.

C. Bauh. prod. *gramen* 35. Eid. pin. *gramen spica triticea* 1. siue *gramen latifolium spica triticea latiore compacta: gramen varians latiore & angustiore folio*.

GRAMEN LATIFOLIUM SPIGA TRITICEA diuulsâ C. Bauhini.

Hoc à priore, spica potissimum differt, quæ in spicas distinctas & angustas diuulsâ est, & quæ sibi inuicem alternatim in culmo subsistent, quarum vtriculi breuissimis aristis armantur: in Italia ad agorum margines.

C. Bauh. prod. *gramen* 54. Eid. pin. *gramen spica triticea* 2. siue *gramen latifolium spica triticeâ diuulsâ*.

GRAMEN ANGVSTIFOLIUM SPIGA triticea compacta, C. Bauhini.

Hoc foliis est angustioribus, sesquipalmariibus, rigidis, acuminatis, & albicantibus: culmo læui, rotundo, striato, sesquicubitali: spicis palmariibus, compactis: vtriculis rigidis & acuminatis.

Basileæ, ad sepes locis aridioribus extra portam Blasianam.

Casp. Bauh. prod. *gramen* 55. Eid. pin. *gramen spica triticea* 3. siue *gramen angustifolium spica triticea compacta*.


GRAMEN ANGVSTIFOLIUM SPIGA Tritici muricæ simili, C. Bauhini.

CAP. CXXII.

Radicibus serpit oblongis, geniculatis, nodosis, candidis, quæ caules proferunt sesquipedales. Tom. II.

cubitales, rotundos, aliquot geniculis distinctos, spica oblongâ triticeâ, aristis carente, glumis paucis oblongis, similibus ei Tritico quod Fuchsio Triticum primum, aliis spica murica dicitur. *Folia obtinet arundinacea* [iuncea in prod. vbi pro *gramine* 56. describitur] dura, angusta, oblonga, in acumen fastigiata, quæ ab vna caulis parte sunt dispositæ, inquit author Casp. Bauh. in phyt. vbi vocat *gramen* 31. siue *arundinaceum*, spica triticea *weitzengras*, atque similitudinem quandam habere cum *gramine aquatico harundinaceo paniculato* Tabernamontani. Ego non video quid commune habeat figura illa Tabernamontani, quæ paniculatam iubam habet, cum Fuchsij Tritico, quod spicam gerit, neuiquam verò paniculam aut iubam: quod mihi Basileæ demonstrat, videtur potius spicam habere similem Lolio, quàm Tritico. Eid. pin. *gramen spica triticea* 4. siue *gramen angustifolium, spica Tritici muricæ simili: gramen frumentarium segetale, triticeum, siue Triticea spica*, C. Bauhini, Lob. Adv. par. 2. 56. in prod.

Notat Frater provenire locis arenosis in Klyben circa Basileam suum *gramen*, vnde verò habuerim meum non recordor.




GRAMEN SPIGA BRIZÆ MAIUS Casp. Bauhini.

CAPVT CXXIII.

Radicibus & culmis est frumentaceis, foliis angustis, spicis palmariibus, multiplicibus, vtriculis aristis breuibus armatis: flosculis, vt in Tritico, luteolis: tota planta ad viri altitudinem affurgit; & apud nos locis accliuibus ad Rhenum ripam, & ad montis Crenzacenensis ascensum provenit.

C. Bauh. prod. *gramen* 58. Eid. pin. *gramen spica Brizæ* 1. siue *maius*.



GRAMEN SPIGA BRIZÆ MINUS eiusdem.

Tota planta palma minor est, radice exili, fibrosa, foliolis ad radicem breuibus, mollibus, canescentibus, spica vnciali, quæ modò simplex, modò gemina & terna, vtriculis aristis armatis: in agris Monspelienfibus D. Saltzmanus legit.

C. Bauh. prod. *gramen* 59. Eid. pin. *gramen spica Brizæ* 2. siue *minus*.

GRAMEN PHOENICOIDES, FOLIIS conuolutis, iuncis ac pungentibus.

CAP. CXXIV.

Culmo altiore calamus tollit, internodiis longis geniculatum, foliis amictum sesquipalmariibus circiter, duris, rigidis, acutis, medio-criter latis, summo culmo spica infidet sesquipalmum longa, alternante glumarum muricarum squammatum compactarum positu, ad eum ferè modum quem in Phœnice animaduertimus, sed maiorum multò, colore ex viridi in flauum vergente: radicem apparet esse perennem, oblique actam, fibrosam, duram, albam, ita ex sicca planta: Hoc *gramen* vnde habuerim nescio, huc

An Oxy-
g. eff. ma-
ritima,
Dal?

valde simile quod iuncum vocauit olim colle-
ctum circa Montepelium, cui folia rigida, initio
lata, tandem veluti in iuncum teretem conuo-
luta, in mucronem desinentia, sæpe spicam supe-
rantia, culmus in eo etiam obseruatus vix cubi-
tum altus, desinens in breuem spicam, phoeni-
cem aliquo modo exprimentem: an hoc quoque
idem sit cum atrociter pungente quem describit
Dalechampsius asserere non ausim, licet partes
illius Graminis habeam: sed sine spicis, quas Da-
lechampsius non tradit: nec etiam in eo Grami-
ne pungente quod habemus, folia sunt ad singu-
los nodos gemina, sed alternatim disposita: ra-
dix fibris multis capillata: crassioribus enim est fi-
bris. Iconem exhiberemus nisi plantam siccam, vt
nonnullas alias ipsi communicatas, Frater reci-
nuisset.

Icon.

Hist. Lugdun. *Oxyragrostis maritima* Dalecham-
p. p. C. Bau. phyt. *Gramen* 36. siue *maritimum*: Eid.
pin. *Gramen arundinaceum* 8 siue *maritimum acutis-
simum*.

Locus.

In maritimis Narbonens. Gallie obseruauit
Gener Cherlerus, & ibidem etiam crescere Hist.
Lugdun. testatur. I. Gargillus *Gramen maritimum*
pungens vulgo Bent vocari ait & copiose in a-
renoso maris litoris nasci scribit, refertque eo
Anglos, conclauibus stratis: æstate quidem vi-
renti conciliare frigus: hieme siccatore calorem
fouere: vile precium in onus graue esse.

Vitis.

GRAMEN IUNCUM MARINUM foliis conuolutis cum longa spica, simi- le Gramini nodoso.

CAP. CXXV.

Descriptio **V**idi apud fratrem C. Bauh. *Gramen* quod-
dam maritimum foliis ita conuolutis vt ro-
tunda iuncæ existerem, ea penè cubitalia
sunt: ex radicibus duris prouenit crassiusculis
spica similis est Gramini nodoso.
Quænam hæc sit planta C. Bauh. in pin. ex tam
breui delineatione cognoscere admodum diffi-
cile est.

GRAMEN MARIE ODORATVM. CAPVT CXXVI.

Descriptio



Descriptio
C. Bauh.

XX

Hoc nomi-
ne ex Mô-
te regio Borru-
sæ ad se mis-
sum *Gramen*
impertiuit fra-
ter C. Bauhin.
fibris crassis ra-
dicatum: folia
plana quidem
suapte natura;
sed ita cœcen-
tibus margini-
bus conuoluta,
vt teretem iun-
cæm culmum
imitentur, rigi-
da, firma, pun-
gentia.

C. B. *Gramen*
suum n. in
phyt. & prod.

sic describit: Radicibus candidis geniculatis feri-
pit: culmo est bicubitali, geniculis paucis distin-
cto, foliis angustis, longissimis, paniculam supe-
rantibus, in acumen fastigiatis, suauem, odorem
spirantibus, cuius culmo panicula parua, leuiter-
que sparsa à pictore non rite expressa insidet: A
Regiomontanis *Gramen Mariæ* dicitur, quod in
fasciculos collectum: propter odoris fragran-
tiam, vestibus addiunt, vt D. Valsmarus, qui plan-
tam transiit perscripsit. Hæc ille, cuius ico-
nem exhibemus. In pin. vocat *Gramen panicu-
latum montanum* 2. & *Gramen paniculatum o-
doratum*.

GRAMEN REPENS MARINUM spica exigua.

CAP. CXXVII.



Genicula-
tum maritimum
alia folia pro-
fert spicam
alta, ex quibus
surgit culmus
paruus, spi-
cam exiguam
ferens grami-
nis exilis du-
rioris. Radix
longa, Grami-
nis geniculata
instat. Fre-
quentissimum
in maritimis
collibus, in
Walheren, Lo-
bel.

Lob. Icon.
Plat. p. 21. *Gramen*

geniculatum caninum maritimum. Tabern. iconi
& hist. p. 637. *Gramen caninum* 3. Eid. hist. p. 642.
Gramen 7. C. Bauh. phyt. *Gramen* 3. siue *caninum* su-
pinum maritimum. Eid. pin. *Gramen caninum* 8. siue
maritimum spicatum: *Gramen caninum maritimum*
Gerardi.

GRAMEN LONGIUS RADICATVM maritimum, vtriculos pro spica gerens.

CAP. CXXVIII.

Hoc nō aliter à præcedenti differt, foliis, mo-
do crescendi, & radice, quàm quod spica-
rum loco inter folia profert vtriculos squammo-
sos, Lobelius.

Tabern. icon & Hist. p. 641. *Gramen caninum*
4. & *Gramen* 8. C. Bauh. phyt. *Gramen* 4. siue *cani-
num supinum maritimum alterum*. Lobel. in Hist.
Belg. p. 22. *Andere cleyn duynen-lide gras*. Icon.
plant. p. 22. *Gramen caninum longius radicans ma-
ritimum alterum* Eid. pin. *Gramen caninum* 9. siue *ma-
ritimum spica foliacea*: *Gramen caninum maritimum*
alterum, Gerardi.


GRAMEN GEMMEVM SEV nodosum alterum. CAP. CXXIX.

Radices fert gemmæ rotunditatis, candidas
veluti Margaritas, quatuor aut quinque in-
uicem

uicem hærentes, ac si stilo essent transfixæ, fibrosis alis ex postremo excurrentibus: culmos fert cubitales: foliis Tritici, iubâ Milij, feminibus Auenæ binis pendentibus tenuioribus à breuioribus aristis, vt Oryza.

Hanc descriptionem author Cæsalpinus in genere Frumentorum recenset, sed semine inuiti, licet spicam ferat, vt Frumenta. *Perlaram* vulgò appellat herbam in montibus, & Oryzam syluestrem dicendam autumat.

C. Bauh. pin. *gr. amen nob. sum* 2. siue *gemmeum*. Propagatur radice graminis modo.

 GRAMEN SPICATVM ANGUSTIFOLIUM

montanum C. Bauhini.
CAP. CXXX.


GRamen hoc spicatum montanum 1. siue *gramen spicatum angustifolium* montanum in pin. *gramen* 20. in prod. à *gramine caryophyllato* præfensi differt foliis, quæ angustissima: cauliculis, qui in hoc tenuissimi, plures & longiores: & loco, cum hoc solum in montosis, Maio mensis florens, proueniat.

GRAMEN SYLVATICVM ANGUSTIFOLIUM spicâ albâ C. Bauhini.

CAP. CXXXI.

EX radice rufa, transversa, fibræ capillares descendunt, & folia plura capillacea, palmaria, etiam breuiora, rariùs longiora, exurgunt, vnâ cum culmis tenuissimis, ipsis foliis plerumque breuioribus, quibus spica vt plurimum simplex, candida, exiguis aristis donata, vnciam vix superans, insidet.

Gramen hoc spicatum montanum 2. in pin. siue *gramen sylvaticum angustifolium spica albâ: gramin* 21. in prod. in sylvis humidis Huningenfium.




GRAMEN CARYOPHYLLATVM NEMOROSUM spicâ multiplici, C. Bauhini.

CAP. CXXXII.

Radice est ex fibris capillaceis rufescentibus composita, ex qua, tanquam ex cespite, folia semipalmaria, etiam breuiora, Vetonice caryophyllatæ similia, prodeunt: inter quæ culmi quàm plurimi capillacei, nudi, folia aliquando superantes, spicas multas breuissimas & rufescentes sustinentes, exurgunt.

Gramen hoc 22. in prod. *gramen spicatum montanum* 3. siue *gramen caryophyllatum nemorosum* spica multiplici in vmbrosis & humidis ad Birsam & VViesam reperitur. Huic non multum dissimile, sed radice magis geniculata, in via Richana ad sepes ad sinistram reperitur.




GRAMEN CARYOPHYLLATVM MONTANUM spicâ variâ C. Bauhini.

CAP. CXXXIII.

Radicebus est paruis, fibrosis, oblongis, nigricantibus, ex quibus instar cespitis folia, ali-

quando palmum longa, angusta, vt in *gramine spicato caryophyllatæ* foliis, prodeunt: inter quæ culmi plures, tenues, foliis nudi, in summitate spicam modò diuisam, modò compactam sustinentes.

In Basileensi vrbi vicinis collibus reperitur *gramen hoc* 23. in prod. vel vt vocat in pin. *gramen spicatum montanum* 4. siue *gramen caryophyllatum montanum spicâ variâ*.



FESTVCA GRAMINEA GLVMIS VACVIS
C. Bauhini.

CAP. CXXXIV.

GRamini 64. C. Bauh. in prod. in pin. vtd *Gramini Festuca* 2. siue *Festucæ gramineæ glumis vacuis*, ex radicibus fibrosis simul iunctis, culmi aliquot geniculati, pedales, ad radicem lanugine pubescentes, foliis angustis, paucis, donati exurgunt, qui glumos plurimos, læues & vacuos, filamentis tenuissimis adpendentes, partim virides, partim spadiceos, aristis oblongis donatos, sustinent: hæc apud nos in tectis & muris crescit: & cum glumi longis filamentis appensi sint, faciliè à quouis vento agitari, tremunt, hinc Montpelienfibus *gramen tremulam* dicitur. Hæc aliquando, apud eosdem, glumis paucioribus & aristis longioribus & recuruis in agris reperitur, & *Festuca graminea* aristis incuruis nominari potest.

FESTVCA GRAMINEA EFFVSA IVBA eiusdem.

CAP. CXXXV.

GRamen hoc 65. C. Bauh. in prod. siue, vt in pin. vocat, *gramen festuca* 3. seu *Festuca graminea effusa iuba*, altius exurgit, caule viridi & rotundo, qui in iubam pedis longitudinis effunditur, cuius glumi angustiores & longiores, breuibz aristis cincti, pediculis capillaceis oblongis insident, qui per maturitatem albicant: inter segetes reperitur.

FESTVCA GRAMINEA NEMORALIS, latifolia mollis.

CAP. CXXXVI.

Constat ex calamis cubitalibus vt plurimum, sæpè bicubitalibus, hordeaceis, sed tenuioribus, geniculatis, & omninò similibus calamis festucæ nemoralis maioris. Folia ei inter omnes species sunt latiora, secundum longitudinem interstriata, & molli lanugine obuectita, cuius ratione tactui molliciem eiusmodi offerunt, qualis in Althææ foliis tangentium digitis obicitur. *Iubam* in oblonga profert spica, non ita elegantem, vt iam commemoratorum *Festucæ* eorum, coloris antequam flores exeret subrubentis, deinde ex flauo pallidioris, vtriculos etiam breuioribus pediculis appensos habentem, quantitate ea, quâ medij generis iam indicati esse diximus. *Semina* continet paruula, oblonga, splendens, & quasi Milij cuiusdam seminum rudimentum experientia.

Synonyma Thalia descriptionis. auctori, *Festucaginis speciei in montibus graminosis, Festuca 4. siue nemoralis latifolia*. C. Bauh. pin. *gram. Festuca 4. siue Festuca graminea, nemoralis, latifolia, mollis*.

FESTUCA IUNCEO FOLIO


Casp. Bauhin.

Synon: **Descriptio** **G**ramini 66. [vt in prod. C. Bauh. vocat] siue Gramini Festuca 5. seu iunceo folio (vt in pin.) ex radice parua fibrosa, alba, folia pauca, iuncea, semicubiti longae, vt & culmus rotundus cubitalis exurgit, qui in paniculam aenaceam, sed angustiore, albam, angustam, desinit, quae ex oblongo folliculo [a folio constituto] paniculam longe superante, prodiit: cuius glumi rati, aristis longissimis & argenteis donantur. In Vallesia ad paludem vrbis Seduni copiose prouenit, vnde D. Burserus nobis attulit.

Locus. An Festuca nemoralis 5. siue tenuifolia Thalia, de qua haec scribit: In nostris syluis Hircynicis non semel reperi, quam pro Festuca quinta habeo, ita vt dicatur Festuca tenuifolia. Omnia enim praeter iubam ceteris tenuiora habet. Radice constat plurimis exiguis ac tenuibus cirris praedita, ex qua straminei, tenues, teretesque ac flauentes, geniculati, & cubitales calami prodeunt, foliis strictioribus donati. Iubam etiam haec profert rariorem, in tenuissimis capillaceis, & multo longioribus, pediculis vtriculos exercenrem, quantitate vtriculorum Festuca graminea nemoralis, coloris fului, ac argenteo nitore micantem.

GRAMEN CALAMAGROSTIS LOBELII.

CAP. CXXXVII.

Descript.**Synon.**

tortium aequante: Spicata Panici aut Sorghi comosa lanugine.

Lob. Adu. *Calamagrostis*, vel *Harundinaceum Gramen*, forte *Babylonium*: Eid. Ic. Plant. p. 6. *Calamagrostis*: Item hist. Belg. p. 8. *Riedtgras*, & forte *Gras von Babylonien*. Hist. Lugd. p. 434. *Calamagrostis Lobelii*, vulgo *Leche*. Casp. Bauh. phyt. *gramen* 28. siue *arundinaceum aquaticum*: Eid. pin. *gramen arundinaceum* i. siue spica multiplici: *gramen arundinaceum* Dioscoridis: *Calamagrostis* Lob. & Hist. Lugd. cui & *grameu arundinaceum*: Tabern. *gramen arundinaceum* maius vt & Ger. Variar. ratione loci: nam quod in arenosis, spica ac est crassiore: quod in montosis, ac dumetis humidis, spica est tenuiore.

Casp. Bauhin. olim in phyt. *Gramen arundinaceum* maius Tabern. separauit a *Calamagrosti Lobelii*. Nos de *Gramine* Tabern. plura mox seorsim dicemus. Lobelii descriptio non videtur nobis respondere iconi, in qua spica siue iuba non apparet similis *Panico* & *Sorgho*: magna etiam differentia inter paniculam *Panici* & *Sorgho*: radix etiam non reptans pingitur.

Pratis vdis, sed strigosis, macilentis & sabulosis neglectis familiare hoc genus *Graminis*. Pabulo haud cedit, nisi multum esuriant, & penuria melioris admodum laborent veterina, nec eo greges vescuntur, quippe quibus non modò ingratissimum, [& Saur, seu acidum, Rura vernaculè dicunt] verum etiam maciem, sitim & tabern conciliare creditur, linguam & oesophagum vulnerare & ardere, sanguinem in ventriculo elicere, vnde tumefactio & inflammatio & mors plerumque subsequatur. Quod si Babylone fuit natum vbi id maleficium adferre proditur, fictius & rigidius, grex verò imbecillior & alio duriore, minus mirum illius esu iumenta illic eunctum iri. Sic enim videas interdum iumentorum labra & fauces cruore manantia & sauciata, quae cum reliquo stramine per fonssecia, huius aut consimilia harundinea folia citant. Medix itaque inter *Harundinem* & *Gramen* est naturae.

GRAMEN HARVNDINACEVM

maius, Tabern.

CAP. CXXXVIII.



Radicem capillarem, humi serpenterem: folia ex utroque latere obiectum vehementer secantia, *Harundini* similes quoque cauos articulatos calamos, vna cum spicis, nisi quod minores sunt. Placita admodum vulgaris notitia.

Tabern. ic. Syn. & hist. *gramen harundinaceum maius*, groß

Riedtgras. C. Bauh. phyt. *gramen* 29. siue *arundinaceum alterum*. In pin. non amplius separata a *Calamagrosti Lobelii*. Mihi ambe descriptiones conuenire videntur, quamuis figurae sint diuersae: verum Lobelii icon, vt praecedenti capimouimus, non respondet descriptioni.

Litora, paludes, prataque rigua quaerit.

GRAMEN HARVNDINACEVM MINVS
cum spica.

Gerardi.

Prouenit in locis humidis & paludosis, vt
precedens, quamuis non ita copiosè.

Radix &
harundo
nodosa priori
repondent: fo-
lia verò sunt &
laticiora, & lon-
giora: spica plu-
res magisque
parula.


Tabern. ic. &
hist. *gramen ha-
rundinaceum mi-
nus*, *flenn riedtz
gras*. C. Bauh.
phyt. *gramen* 30.
siue *arundina-
ceum spicatum*:
Eid. pin. *gramen
arundinaceum* 2.
siue *spicatum*:
*gramen harundi-
naceum minus*,

GRAMEN MAIVS AQVATICVM

LOBELII.

CAP. CXXXIX.

Inter gramina vulgaris notitiæ est istud, co-
piosiusque reperitur ad aquas & riuos, in Gal-



lia, Anglia,
Germania, Ita-
lia, & Belgio,
potissimum ve-
rò in Batavia, v-
bi etiam secat-
ur, optimo pa-
bulo vaccarum,
folia habet pol-
licem lata, tes-
quicubitum, aut
cubitos duos lo-
ga: culmus qua-
tuor aut quin-
que pedum al-
titudine est, pa-
nicula miliacea:
radix fibrosa.

Lobel histor.
Belg. p. 6. *groot
water gras met
brede hirs aren.*

Eid. lc. p. 4. *gramen aquaticum maius* Tabern. lc. &
hist. *gramen harundinaceum paniculatum*, *wasser
riedtz gras*. C. Bauh. phyt. *gramen* 22. siue *pani-
cularum aquaticum*: Eid. pin. *gram. panic. aquaticum*
4. siue *Gr. aquat. paniculat. latifolium*: Lolii no-
men genus, Tragi: *gram. maius aquaticum*, Lobeli:
graminis arundinacei alia species, Thalii: *gramen
harundinaceum paniculatum*, Tab. & Gerardi.

GRAMEN AQVATICVM HARVNDINA-
ceum paniculatum, Tabern.

CAP. CXL.

Radice agit tranfuerfam, repentem, multis
fibris donatam: calamos craffos, nodosos,

maiores quàm *gramen harundinaceum*, sed mi-
nores, quàm *Harundo*: folia graminis harundi-
naceo familia, sed maiora & longiora: panicu-
lam haud dissimilem.

C. Bauh. pin. *gramen paniculatum aquaticum* 1. Synon.
siue palustre paniculatum altissimum: *gramen a-
quat. harundin. paniculatum*, Tabern. *gramen ma-
ius aquat. cer.*

In riuulis & paludibus stagnantibusq; occur-
rit.

Locus

GRAMEN HARVNDINACEVM ENODE.

CAP. CXLI.

Inter folia bicubitalia, semunciâ angustiora, ri-
gida, ex radice fibris validis crassisque funda-
ta, culmus surgit teres, homine procerior, cauius,
enodis, nudus, crassiusculus, firmus: in fastigio
summo paniculae palmo longiores, in tenues
spicas desinentes, rubentes, à se inuicem longè
interdum distitas.

Tragus hoc *gramen* ad caput de scirpo reuo-
cat, Scirpique primum genus facit, dicens eum
proverbio apud Plautum occasionem dedisse, *No-
dum in scirpo quaris*. Hoc autem in homines plus
æquo anxios & curiosos torquetur, qui illic scilicet
serupulum mouent, vbi nihil est dubitandum.
Cæterum Germanicè *Hingenheimer* vocat, su-
spicaturque eos à veritate non multum erratu-
ros, qui *wald Bohr*, hoc est, Arundinem sylue-
stem appellant. Græcè *αβραχον δαρυον* dicendum
putat. Arbitratur & Syringiam Plinij, Ab aliis ta-
men *Oxyſchænos* dicitur, vt in annotatione
marginali legitur.

C. Bauh. pin. *gramen arundinaceum* 6. siue *enode
maius montanum*: Scirpi 1. genus, Tragi: *Iuncus syl-
uestris*, Lonic. quoad iconem: *Iuncus lychnanthem-
nos maior*, Thalii: *gramen harundinaceum monta-
nam*, Tabern.

Copiosè prouenit prope pagum Colombier sa-
nourenx, & in syluis inter Lure & Laumont: Item
in monte prope Krentzach & Leurach, ac in
monte Saleuz, in dumetis & humidis. Scirpus
Tragi in altissimis, asperis & humectis syluis,
nec non sub Iuniperorum fruticibus apud Me-
diomatrices nascitur. Iunio mense coles emittit,
qui Augusto haccescere incipiunt, ac firmi planè
& rugoli euadunt. Qua de caula à rusticis mulier-
culis leguntur, quibus calcos recentes & præhu-
midos in aère siccandos imponunt. Sed & ex iis
nassa piscatorum conficiuntur.

Arundo

sila.

Syringia

Plinij.

Oxyſchæ-

nos

Synon.

Locus &

tempus

vltus;

GRAMEN HARVNDINACEVM ENO-
de minus.

Trago Scirpi genus alterum multò tenuius,
breuius, & magis exiguum, Germanis *ſchme-*
len vocatum.

Thal. Iunci lychnanthemi species media; iun-
cus *λυχνανθεος* tenuis maior dicenda, stylos
continens multò tenuiores, teretesque, sed non
ita perpendiculari rectitudine, se sustollentes,
palmo longiores, breuiora & vix vncialem spadi-
cei fermè coloris spicam exhibentes. Est Broc-
cenbergo familiaris.

Caſp. Bauh. pin. *gramen harundinaceum* 7. siue
enode minus syluaticum.

Ex minore hoc Tragi Scirpo nonnulli pilcos,

Scirp. 2.

Trago.

Iunc. lychnanthem.

medius.

Thal.

Gr. arund.

enode mi-

nus silu.

C. Bauh.

Vltus.

quibus Æstate adversus Solis radios & calorem vtuntur, conficere solent.

GRAMEN PALVSTRE LOBELIO.

CAP. CXLII.

Descriptio R Adicem habet exilem, fibrosam, folia graminea producenem: inter quæ exit culmus gracilis, pedalis, spicam Cyperi gerens; iisdem nascitur locis cum Cyperoides, auctore Lobelio, qui in hist. Belg. p. 13. inscribit *Zegge* vel *warer-rie gras*: in l. c. Plant. p. 11. *Gramen palustre maius*. Figura quidem non videtur respondere descriptioni.

Synop. C. Bauh. phyt. *gramen* 58. siue *Cyperoides spica* melle: Eid. pin. *gramen cyperoides spicatum* 4. siue *Gram. cyperoid. angustifol. spicis longis erectis*.

ARVNDINES EX VETERIBVS.

CAP. CXLI.

*Arundinũ
differentia:
Theoph.*

*Theoph.
emendatur*

*Vallatoriam
Textilis.*

*Tibialis.
Error.*

*Vs copiosior
meliorque
gignatur.*

*Armentaria.
Bombycia.*

Theophrastus hist. lib. 4. cap. 12. Harundinum differentias constituit, ex ipsarum corpore solido, cauo; ex breuitate, proceritate, crassitudine, gracilitate; foliorum multitudine, paucitate; natalibus siccis, aquaticis; denique ex ipsarum vsu. Verum duo summa genera, τὸ ἐνὶ ὕδατι, & τὸ ἐνὶ ἄρῳ, h. e. tibialem & alteram facit. Harundinis, inquit, duo genera tradunt, Tibialem & reliquam: quippe vnum genus reliquæ deprehendit, sed inter se inuicem simile firmitate, crassitate, tenuitate, exilitateque differre. [hæc Dalech. emendariis sic legi posse putat: sed inter se inuicem differre crassitudine & tenuitate, robore & debilitate.) Crassam & validam, Vallatoriam vocant: alteram autem Textilem: Nasci textilem super insulas fluitantes; Vallatoriam in comithybus. Comythes autem vocant vbi aceruata Harundo, implexaque mutuo radicum raptu sit: quod fit locis stagnorum, vbi tellus pinguis lætaque est. Nonnunquam etiam vbi tibialis, Vallatoriam gigni, longiorem quidem, quam reliqua vallatoria, sed vermicibus rodendam. Huius differentias eis tradunt. Tibialium quandam nono anno provenire nonnulli volunt. Hunc quoque ordinem generandi statuunt: quod error est. In totum enim aucto lacu nascitur. Sed quoniam id superiori tempore anno nono potissimum euenire videretur, ortum quoque Harundinis talem esse credere, euentum fortuitum pro ordine certo capientes. Gignitur verò copiosior, meliorque cum post imbres frequentes biennio, minimum aqua permansit: quod maxime posteriori tempore factum meminere, cum infaustum illud Cheroniæ accidit, quippe, hoc antè annis pluribus lacus altitudinem extendisse, pñt, vbi vehemens pestis inuasit, impletum quidem affirmant: sed cum inundatio non permansisset, sed Hyeme decreuisset, sic & Harundinem provenisse. Fertur enim, videturque aucta altitudine lacus, durantiq; inundatione crassâgi Harundinem, & fieri crassatam quidem Armentariam: Bombicam verò, cum non aqua permanserit. Generationem itaque talem tradidere. Distare autem à reliquis Harundinibus præstantia quadam nutritionis naturalis confirmant: quippe plenior, carnosior, in totumque facie hæminæ lasciuioris spectari: etenim folium am-

plius, candidiusque habere, & minus lanuginis quam cæteræ: quasdam etiam omnino nihil habere, quas & nomine Spadonum appellant: Hinc paria optima fieri quidam asserunt, sed pauca tamen in opere bene succedere: cædi tempestiuè solitas, usque ad Antigenedem, cum adhuc simplicius tibiæ vterentur sub Arcturo, mense Septembri: quippe sic casas plerisque quidem post annis viles esse incipere, multa que interim exercitatione sonandi indigere, sed ora linguarum comprimi, quod erat illis theatrorum moribus vilis: sed postquam varietas, fictioque accessit, casura mutata est. Cadunt enim nostra ætate, mense Maio, & Iunio, quasi paulò antè Solstitium, vel sub ipso Solstitio: & fieri viles in trimatu referunt, & breui exercitatione egere &c. Hæc armentaria cadente temporâ tradunt. *Preparatio vero, & confectio hunc in modum fieri solet:* Cum collegerint Hyeme sub diuo exponunt suis vestitæ tunici: Vere autem dispoliam, attrituque expurgatam, Soli expandunt: Æstate post hæc concilam in internodia, rursum sub diuo, ad tempus quoddam exponunt, relicto internodiis superiori geniculo. His *longitudo* palmo nunquam minor. Nascitur plurima inter Cephusum, & Melaniam. Pelacania locus hic nominatur. Huius quædam partes Chytri vocant, lacus altitudines sunt, quibus Harundinem laudatissimam provenire affirmant. Sed omnium optima nasci creditur circa Oxæam, Campen vocitaram. Est etiam alius locus Aquilonius, Oxææ Campæ Boedrias nomine, quo etiam ipso nobilem Arundinem nasci asseuerant. In totumque vbi crassum, lætum, sæcolumque solum sit: Cephususque se permisceat, acque etiam altitudo lacus amplectur, Arundinem optimam oriri. Nam circa Campen & Boedrias, hæc omnia comperiuntur. Quod autem Cephusus vim magnam ad faciendam Arundinem laudabilem fortiaur, argumento capiunt, quod eo loco, ad quem Melas, qui vocatur, insluit: quamquam locus profundus, solumque crassum, atque sæcolum est, tamen omnino nulla, aut vitiosa exurgit. Generationem Arundinis, tibialis, naturam, confectioem, quibusque differentias à reliquis differ, satis dixisse arbitramur. Genera non hæc solum, sed plura etiam Harundinis etiam intelliguntur, quædam enim densa, tam carne, quam geniculis: quadam rata paucisque geniculis: & alia caua, tota, quam *Fistulariam* quidam appellant (nihil enim ferè ligni, carnisque habet) alia solida, & tota penè intus repleta. Item alia proceræ, excellenti, crassaque: & alia gracilis, foliosaque: alia paucis foliis omnino: multæ quidem differentiar pro natura, vsuque intelliguntur, singulæ namque ad singula viles. Nominibus aliis appellant, sed *Canna* communissima quodammodo est, quam & fruteticam maxime omnium referunt, & apud flumina lacusque potissimum nasci: plurimum tamen in quoque genere distare inter se aquaticas, & sicco nascentes perhibetur. *Sagittaria* quoque, quam Ceticam quidam appellant, sui generis est, nodis paucis, geniculata, carnosior omnibus, maximeque flexum recipiens, atque omnino obsequens, quod libeat flecti calcata. Magnas & folia differentias reddidit, quemadmodum diximus, non multitudine, magnitudineque tantum, sed etiam colore, quippe quæ *laconica* cognominatur, versicolor est. Item positu ipso, atque annexo: Genus autem quoddam Harundinis vel terrenum emigrat, quod non erigit caulem, sed super terram spargitur Graminis

minis modo, atque ita se ampliatur: mascula solidata est, femina inanis: quippe hoc marem à femina distinguunt. Quædam magnitudine præstantes, atque robustæ, ut vicem hastarum præbeant. Hæ circa Acecium amnem oriuntur. Omnis autem Harundo viriæ est, atque adusta melius refurgit: itémque stirpe crassa, numero-saque est, ob id mori pericax. Radix ipsa geniculata, quemadmodum in gramini: verum non omnes simili modo informantur. Arundo autem geniculata est & corticem habet nervosum in macilentumque, radicem geniculatam: perpetuo virget: à gelu enim torpere minime potest, vulneraque facile coit. *Et hæc passim ex versine Gaze.*

Quinque Harundinum (*ἡρυνδίνων*) genera, veluti notitia prodidit Dioscorides: In haru n genere quædam Nastos, id est, plena solidave appellatur: ex qua sagitte factitari solent: altera femina, ex qua tibiis ligule conficiuntur. Alia syringias, hoc est, fistulosa, multa carne præditæ, (*ἡ συριγγία*) geniculis densior, ad librorum scriptiorem accommodata. Alia denique crassior & concava, circa amnes nascens, quæ etiam donax, & à quibusdam Cypria vocatur. Est & alia phragmites, quasi sepiementis idonea, gracilior, candidians, (*ἡ ἀπιδανία* aliter λευκός, ἀπιδανία τὸ λευκόν) vulgo nota. Cuius radix contrita, ac tum per se, tum cum bulbis imposita spicula, aculeosque corpore extrahit. Ex aceto verò, luxata, dolorisque lumborum demulcet. Virentia porro folia rufa & imposita tum erysipelatis, tum aliis inflammationibus medentur. Cortex vltus & ex aceto illitus apoplecias emendat. Ceterum panicule flos, si aures intraverit exurit. Eadem quoque præstare valet quæ Cypria Harundo dicitur.

Plinius, qui ex Theophrasto nonnulla mutuavit, lib. 16. cap. 36. multo plures differentias agnoscit. Inter eas, inquit, quæ frigidis gaudent, & aquaticos fructes dixisse conveniat. Principatum in his tenebunt Harundines, belli pacisque (belli, adiacula: pacis ad scribendum) experientis necessitate, atque etiam deliciis (ad tibiarium usum) grate. Tegulo earum domus suas Septentrionales populi operiunt (ob id panniculæ rectoriam vocat Plautus in Milite: Cuius tu legiones distulisti spiritus Quasi ventris filia, aut panniculæ rectoriam, Turner. Plaut. in rudente.

Quin tu in paludem is, exigisque Harundines, Qui peragamus villam, dum sudum est?] durantque ævis recta alta. Et in reliquo verò Otbe cameras leuissimè suspendunt (ex iis cameræ fornicisque pergularum quam leuissimi & minime onerosi sunt) Chartisque feruunt calami, Egyptij maxime, cognatione quadam papyri. Probatores tamen Gnidij & qui in Asia circa Anaticum lacum nascuntur. Nostratibus fungosior subest natura, cartilagine bibula, quæ cauo corpore intus, superne tenui inarescit ligno: fistulis, præacuta semper acie, geniculata. Ceterò gracilitas nodis distincta, leui fastigio tenuatur in cacumina, crassiore panniculæ coma: neque hæc superuacua. Aut enim pro pluma strata cauponarum replet: aut ubi limosiore callo induit, sicut in Belgis, confusa, & interiecta nauium commissuris ferruminat textus (tabularum compages) glutino tenacior, rimisque explendis fidelior pice. Calamis Orientis populi bella faciunt. Calamis spicula addunt irreuocabili hamo noxia. Mortem accelerant pinna addita calamis.

Tourj. II.

Ficque & ex ipso telum aliud fracto in vulnerebus. His armis Solem ipsum obumbrant. Propter hoc maxime serenos dies optant: odere ventos & imbres, qui inter illos pacem esse cogunt. Ac si quis Æthiopus, Ægyptum, Arabas, Indos, Scythas, Bactros, Sarmatarum tot gentes, & Orientis, omniæque Parthorum regna diligentius computet, æqua ferè pars hominum in toto mundo calamis superata degit. Præcipuus hic usus in Creta bellatores suos præcipitavit. Sed in hoc quoque, ut cæteris in rebus vicit Italia: quando nullus sagittis aptior calamus (Harundo sagittaria ea vocatur) quam in Rheno Bononiæ amne, cui plurima inest medulla, pondusque (finiendo acri opportunum, volucre: contra status quoque pericax libra. Quippe non eadem gratia Belgicis. Hæc & Creticis commendationibus: quinquam præferantur Indi, quorum alia quibusdam videtur natura, quando & hastarum vicem præbent additis cupidibus. Harundini quidem Indicæ arborea amplitudo: quales vulgò in templis videmus. Differre (de Harundine Epigio, non de Indica id Theophr. qui masculam solidam esse, feminam verò inanem, etiam scribit) mares ac feminas in his quoque Indi tradunt. Spissius mari corpus, feminæ capacious. Nauigiorumque etiam vicem præstant (si credimus) singula internodia. Circa Acefimen Theophrast. cap. 12. lib. 4. de Calamo tantum id scribit, qui hactenus vicem præstat amnem maxime nascuntur. Harundo omnis ex vna stirpe numerosa. Atque etiam recisa forandius relurgit. Radix naturæ viuax, geniculata & ipsa. Folia Indicis tantum breuia. Omnibus verò à nodo orsa, complexu tennes per ambitum inducunt tunicas: atque à medio internodio cum plurimum deinunt vestire, procumbuntque. Latere Harundini calamoque in rotunditatem bina, super nodos alterno semper inguine, ut alterum ad dextra fiat, alterum superiore geniculo ad læua per vices. Inde exeunt aliquando rami, qui sunt calami tennes. Plura autem genera. Alia spissior densiorque geniculis, breuibz internodiis. Alia rarior maioribus; tenuiorque & ipsa. Calamus verò alius totus concavus (Falsum esse id apertissime ostendit Hist. Theophr. de Orchomenio calamo. Plinius hæc mirè perturbat. Lego. Calamus verò alius Orchomenius totus concavus &c. Quem verò Auleticon &c.) quem Syringiam (Syring. Theophr. Ita porro vocant, non quòd utilis sit fistulis, quemadmodum Plinius exposuit, sed quòd fistulosus & inanis sit) vocant, vilissimus fistulis, quoniam nihil est ei cartilaginis atque carnis. Orchomenius est continuo foramine peruius, quem Auleticon vocant. Hic tibiis (Tibias à Barbaris inuentas fuisse tradunt, idèoque in describendis mulicis instrumentis, quibus perstrepebat furiosa Bachantium cohors, rectè Catullum dixisse:

Barbaræque horribili stridebat tibia cantu, Apud Hom. Troiani de suis rebus prosperis læti, sese ut oblectent, pernoctantes in campo tibias inflant. Olympiad. à Phrygibus inuentas fuisse tradit, vsuque in certamine Marsum tibia, Apollinem verò cithara, Victoriæ cap. 10. 30.) virior, fistulis ille. Est alius crassiore ligno, & tenui foramine. Hunc totum fungosa replet medulla. Alius breuior, alius procerior, exilior, crassiorque. Fruticosissimus qui vocatur donax, non nisi in aquaticis natus: quoniam & hæc differentia est, multum prælata Harundine quæ in siccis proueniat. Suum genus sagittario calamo,

Harundo sagittaria,

Harundo Indica arboræa,

Mas & femina,

Harundinis delinens,

Densior Rarior, Plinis laus.

Syringias,

Orchomenius, seu Auleticus,

Crassior ligno, Alia differt, Donax fruticosus & non aquatilis,

Sf

ut diximus, sed Cretico longissimis internodiis obsequenti quod libeat flecti calesfacto. Differentia à foliis.

Arundo elegia. Est & obliqua Harundo, non in excelatatem nascens, sed iuxta terram fruticis modo se spargens, suavisissima in teneritate animalibus. Vocatur à quibusdam elegia. Est & in Italia nascens adarca (calamachne ea quoque dicitur cap. 10. lib. 32. vide cap. 22. lib. 20. Adarces enim est subsalsus concretionis, humidis & palustribus locis, sicco celo, spissescens, Arundinis & herbis inhaerescens: molli Alcyonio profus similis, valde spongiosa, &c. Ex hac Dioscoridis Historia apparet Plinium Adarces naturam non intellexisse, quoniam nec Harundini peculiaris est, nec è cortice comæ nascitur.) nomine palustris & cortice (Harundinibus atque herbis inhaerens. Diosc. Ineptè Plinius Adarces, quæ Salisago est, inter Harundinarum genera commemorat, vide cap. 22. lib. 20. & cap. 10. lib. 32.) tantum sub ipsa comma, viliissima dentibus, quoniam vis eadem est quæ Sinapi. De Orchomeni lacus Harundinetis accuratius dici cogit admiratio antiqua. Characium [Phragmitem ipse vocat cap. 10. lib. 32.] vocabant crassiorē, firmioremque, ploriam (plocimon Theophr.) verò subtiliorem, hanc in insulis fluitantibus natam, illam in ripis expatiantis lacus, Tertia Harundo (In sequentibus multa Plinius ex Theophrasto male transcripsit. Apud Theophr. locus est cap. 12. lib. 4.) est tibialis calami, quem auleticon dicebant. Nono hic anno (Nono anno nasci putabant, quoniam eo temporis intervallo lacus augebatur, sed magno errore, Theophr.) nascebatur. Nam & Lacus incrementa hoc temporis spatio servabat, [prodigiosum id esse Theophrastus non ait, sed contigisse circa tempus eius infausti prælii] si quando amplitudinem biennio extendisset [si post imbres frequentes aqua biennio copiosa permanisset Theophr.] quod notatum apud Cheroniam, infausto Atheniensium prælio, & apud Lebadiam sæpe notatur influente Cephisso. Cum igitur anno permansit inundatio: proficiunt in aucupatoriam quoque amplitudinem: vocabantur Zeugitæ [Zeugitin aucupatoriam male Plinius exponit: Zeugim enim dicebant eam, quæ crassitie & longitudine ad compingenda duarum tibiæ paria & coniugia, ut Zeugim, idonea & apta foret, ut Apuleius, quæ ob strigofam maciem tibiæ dignum sonum non ederet, sed bombum tantum. Apuleius 4. Asini nuptiales tibiæ vocat Zygiæ, quasi iugales, sicut lunonem Zygiæ, iugam siue iugalem vocant cui vincula iugalia cura, ut inquit Poeta. Idem 1. 6. Harundinem musicæ nutriculum appellat, lepidè qui dem, sed affectatè] Contra bombyciæ maturius reciproco graciles, fœminarum latiore folio atque candidiore modica lanugine, aut omnino nulla, spadonum nomine insignibus [insignes Dal.] Hinc erant armamenta [Tibiæ fiebant, quibus canerent. Armamentum licenter Plinius instrumentum vocat: quod Gazam impulit, ut apud Theophrastum parum aptè Zeugitæ verteret Armamentariam:] ad inclusos cantus [Inclusos cantus dici volunt, qui in theatris aut templis muro circumseptis, vel etiam in privatis ædibus personarent, non autem in aperto ederentur, veluti tubis & cornibus. Al-

lus putat scriptum fuisse Includos pro Inclutos, unde factum sit Includos. Ennius de Cochle.

Hic datus est occasus Horatius inculcu salcu. apud Festum.]

Non silendo & reliquo curæ miraculo, ut venia sit, argento iam potius cani. Cædi solebant tempestivè vique ad Antigenem tibicinem, cum adhuc simplici musica (Tibia Theophrast.) viceretur, sub Arcturo: sic preparatæ aliquot post annos viles esse incipiebant. Tunc quoque multa domandæ exercitatione, & canere tibiæ ipsæ docendæ, complimentibus se ligulis (conveniunt ore linguarum. Theophrastus) quod erat illis theatrorum moribus vilius: (In Theophrast. est quod ad vsum exercitationemque canendi vilius fuit.) Postquam varietas accessit, & cantus quoque luxuria cædi ante solstitia, capræ, & fieri viles in trimatu, apertioribus earum ligulis ad flectendos sonos: quæ inde sunt & hodie. Sed tum ex sua quâque tantum maridine congruere persuasum erat: & eam, quæ radicem antecellerat lævæ tibiæ convenire: quæ cacumen dextræ: immensum quantum prælati, quas ipse Cephissus abluisse. Aucupatoria Harundo à Panthormo laudatissima, piscatoria, Abaricana. [Hæc sunt viginti duo genera: quibus si addas Ægyptium, Gnidium, Anaiticum, Italicum, Belgicum, Creticum, Indicum, supra memorata viginti novem comperies, quos se recitasse ait cap. 11. lib. 24.] ex Africa. Harundinis Italiæ vñs ad vineas (ad earum pedamenta & iuga. Vide varr. cap. 8. lib. 1.) maximè. Caro feri eam iubet in humidis agris, bipalio subacto prius solo, oculis dispositis intervallo ternorum pedum. Simul & corradam, unde asparagi fiant: concordare enim amicitia. Harundinis igitur genera viginti novem [39. CH.] demonstravimus (pergit Plinius lib. 24. cap. 11.) non aliter evidentior illa natura, quam continuis nostris voluminibus tractamus liquidem Harundinis radix contrita & imposita, Filicis stirpem corpore extrahit: item Harundinem Filicis radix. Et quoniam plura genera fecimus, illa quæ in India Syriæ nascitur odorum vnguentorumque causa, vñnam movet cum Gramine aut Apij femine decocta. Ciet menstrua admoda. Medetur convulsis duobus obolis pota, iocinori, renibus, hydropi, tussi, etiam suffitu, magisque cum resina. Furfuribus huculcerumque manantibus cum myrrha decocta. Excipitur & succus eius, sitque elaterio similis. Efficacissima autem in omni Harundine, quæ proxima radici. Efficacia & genicula. Harundo Cypria, quæ domax vocatur, corticis cinerè alopecias emendat: item putrescentia vlcera. Foliis eius ad extrahendos aculeos vñntur. Efficaciùs & contra ignes sacros collectionesque omnes. Vulgaris Arundo extractoriam vim habet & recens tusa, non in radice tantum. Multum enim & ipsam Arundinem valere tradunt. Medetur & luxatis, & spinæ doloribus radix in aceto illita. Eadem recens trita in vino pota, Venerem concitat. Arundinum lanugo illita auribus, obrundit aurium. L. 12. cap. 10. de Harundinibus hæc subdit. Inter aquantilia dici debet & Calamochnus (Pericalamitis Galeno, & limnestris calamachne. Vide cap. 36. lib. 16. cap. 22. lib. 20.) Latine adarca appellata. Nascitur circa Harundines tenues & spuma aque dulcis ac marinæ vbi se miscet. Vim habet causticam: idè acopis additur contra persfrictionum vitia. Tollit & mulierum lentiginem in facie. Et calami simul dici debent. Phragmitis

mitis (ad sepes faciendas utilis ob crassitiem & firmitatem. Eum esse voluit, quem ex Theophr. loco proxime citato appellauit *χαρὰν*.) radix recens tufa luxatis medetur, & spinæ doloribus ex aceto illita. Cyprij verò, qui & donax vocatur, cortex alopecij medetur vltus, & vlcibus veteratis, folia extrahendis quæ infixæ sunt corpori, & igni sacro: paniculæ flos, si aures intrauerit, exurdat.

Cæterum conuenit hoc in loco obiter monere quòd nomine Calami iam sæpius nominati, differens habeatur autorum significatio, attestantibus id vericulis subsequentibus.

Virgil. Egl. 3.

Aur hic ad veteres Phagos cum Daphnidis arcum
Fregisti & calamos.

Aristob.

Volgoni curti gli altri à quella banda
Ond'era vscito il calamo homicida.

Marr.

Dat charis habiles calamos Memphisica tellus.
Texantur reliqua recta palude ribi.

Idem:

Balbula decipitur calamis, & veribus ales.

Hoc enim in loco Cechinus intelligit per calamum primo loco Cannam siue Harundinem scriptoriam: secundo loco piscatoriam: Accipitur & pro fistula:

Virgil.

Tu calamos inflare leues:

Propria tamen *το χαλῶν* significatione Arundo siue Harundo, planta communiter ad amnes nascens intelligitur. Græcis autem *χαλῶν* *το χαλῶν ἀνθός* *αὖς*, ut vult Etymologus, dicitur. Arab. *Casab*, & *Hafab*: radix *Ofal* *alchafab*. Germ. *Kohr*, *deefriede*. Belg. *Kier*: Gall. *Rosier*: Ital. *Canna à far sieppe*: Hiisp. *Cannas*. Angl. *Reede*: Boh. *Trest*.

ne feminis spe abripitur; gluinis videlicet cassis contenta.

Matth. in Diosc. Arundinis Cypriæ titulo olim posuit figuram quæ minus placebat eâ, quam in com. cum mag. fig. Lat. & Ital. nomine Arundinis palustris ac etiam (perperam tamen) pro Calamo aromatico exhibet.

H. Lugd. p. 100. Arundo vallatoria Dodonæi: Item Arundo palustris Matthioli. Dux vnus stirpis figuræ.

Geln. de coll. stirp. Arund.: Eid. hort. Arundo alia: Turn. Hort. Luf. & Lob. Adu. Arundo vallatoria: Lon. Arundo aut Calamus: Matth. & Tab. Arundo palustris. C. Bauh. pin. Arundo odorata 1. & Arundo vulgaris siue *χαλῶν*, Dioscor. *χαλῶν* *χαρὰν*. Theophr. Lob. Obs. Arundo vallatoria. Phragmites Diosc. Ruell. Corn. & Dod. Lat. *harundo* *phragmitis*. Amato, *harundo vallaris*: *harundo vallatoria*, Dod. Gall. Thal. & Gerardo: *harundinis* 5. genus, Trago. Calamus siue *harundo vulgaris*, Cordo in Dioscor. Calamus siue *harundo gracilis*, Cæl. Calamus Arundo vallatoria siue Phragmites Lob. Ic. plant. pag. 51. Canna secunda, quæ samina Diosc. Anguill. epil. 4. dicitur etiam Canna *sepiaria*, *χαλῶν* *χαλῶν*; Calamus vallaris, *harundo sepiaria*, *harundo* aut *calamus characias*. Theophr. & *canna vallatoria*.

In maritimis & locis palustribus passim obseruauit gener Cherlerus, sed speciatim inter Balerucanas thermas & lacum maritimum, ex fossis vdis & irriguis excerpit. Nascitur in aquis residibus, veluti in vrbium fossis, & circa Aluminum laxiorum ripas: Lubæ sub fine Aestatis ex-
Locus:

Cæterum quod ad facultates attinet, Calami Phragmitis, inquit Galenus, radicem cum bulbis, aculeos, & stipites ex alto extrahere quidam scripsere, ceu trahendi quædam vis ei inesset, nos tamen eius rei periculum non fecimus, verum, quantum gustu liceat conicere, abstergentem facultatem possidet non paucam, minimeque acrem. Quinetiam folia ipsa abstergentis sunt facultatis: cortex verò eius combustus admodum tenuium partium, & digerentis facultatis efficitur, adiunctum habens absterforium quiddam, ut excisicet & excalfaciat tertio quodammodo ordine, plus tamen desiccet quàm excalfaciat. Vitandus est eius flos, quem *αὐτὸν* vocant: nam si in aures incidat, adeò tenaciter adharrens efficitur, at auelli non possit, auditumque vitiat: quamobrem sæpius exurdat. Reliquas vires ex Dioscoride, Plinioque lege atre. Nobis (teste Trago) ad varia nostrâ Arundine vti licet. Sunt enim qui tecta sua hinc conlarciant, ut interim textores præteream qui nonnulla pro filis glomerandis instrumenta ex illis conficiunt. Cortex vltus, ut videre est apud Tabern. maturat & repurgat, sicut & folia, quæ admodum sunt frigida & sicca. Radix in aqua aut vino decocta & e-
Tempus:

pora mentes & vrinam ciet, arque stranguriâ inmedebitur. Hoc verò decocto li caput laueris, furfures emendabis. Aestate verò huiusce foliis conclauia consperguntur, in quibus ægri decumbunt, qui febris ardentibus laborant, quò aer corrigatur, frigidiorque reddatur, atque patientes refocillentur. Recentia porro contusa & imposita erysipelati commodant, tumoresque scroci discutunt. Radix in subtilissimum puluerem trita, fistulis & vlcibus inspersa prodest. Sed & aceto vini in vnguentum commixta, enit
Vires & vltus.

ex Galeno
Radix.

Folia
Cortex ad-
bulbus.

Flos st-
tandus.

Arundo
germ.
Eius & flos

Cortex &
flos.

Radix mē-
ses & vrin-
nam ciet.

Febris.
Erysipelas
Fistula.


Barba dicitur
flos.

Barba dicitur
flos.

ARVND VVLGARIS PALVSTRIS.

C A P. C XLIV.

Vlgaris Arundo oblique geniculatam agit radicem, nouos subinde furculos, oculosque continuo auctu protrudens, ex quibus culmi surgunt hominis altitudinem æquant, aut altero tantò maiores, minimo digito tenuiores, geniculati, inanes: ex quorum nodis singulis ferè, culmum inuoluentia folia exeunt, rigida, & aspera nonnihil, vncias duas lata circiter, cubito longiora, venosa, scapus summum in comam mollem purpurascèrem iubam, tandem villosiorè mol-



liorèmq; coloris cinericei redditam, nutabundam effunditur, quæ ventis ludibrium debens fi-

Tor. II.

S f


Papyrus.

Hæmorrhæ-
gia.Varius
Vestigia.Sudorem
mouet mo-
dula.
Succus ff-
suris la-
biorum sa-
nat.
Panis ex
radice.
Salem pra-
bent.

vij. sem. Eruc. drach. v. sem. Vrticæ drach. iij. Pul-
ueriscentur subiti modo & iulic. q. ol. Laurin. F.
vng. quo pars calua illinatur. Radices minutim
incisæ, & vel solæ, vel cum capis contusæ, ac in-
staur emplastri administratæ, sagittas, aculeos,
spinas, & clauos extrahunt. Sola etiam contusa
cum melle in emplastrum redacta, si imponatur,
spicula quæuis & globulos extrahit. Contra ve-
neratos ictus, ne sc. cordi venenum incommo-
det. 2℥. Rad. Harund. vnc. ij. Rad. Aristoloch.
3℥. Sem. sinap. 3 semis, Capar. tost. num. ij. Ster-
cor. columb. vnc. ij. Omnia simul cum melle in
Emplastrum rediguntur, & bis in die imponun-
tur. Cinis corticum naribus inditus hæmorrhæ-
giam sistit: cum aceto vero aut adipe Leonum,
aut utroque simul com. nixtus, illitu alopeciam
fanat. Radix in oleo communi incocta si per-
eoletur aliquoties in die & parum auribus instil-
letur, dolorem eorundem sedabis. Contra vario-
rum relicta vestigia 2℥. Succ. expressi rad. Ha-
rund. seui asin. & mellis an. part. æqual. vel q. s. f.
vngt. quo maculæ illinantur. Recentis Harundi-
nis medullam contundito, eadēque sinciput
& pedes illinito, tēque lectui committito, opti-
mēque contegito, quō potenter sudorem prouo-
cet. Succus Harundinis fissuras labiorum & lin-
guæ fanat, si cum melle permisceatur: & sæpius
illinatur. Harundinum radicibus, ex autoritate
Aduers. rufis, arefactis & in fatinam molitis et-
iamnum hodie nonnullæ gentes panem non in-
suauem conficiunt. Quin etiam graminco est
sapore etiam nostratis Arundinis radix. Umbri-
nopria salis naturalis ex Arundinibus vltione sa-
lem conficiebant, quo loco naturalis utebantur.

ARVND. MAXIMA ET HORTENSIS.
CAP. CXLV.

Descript.



Svarios vsus
colitur Hor-
tensis dicta
Arundo, mul-
to maxima, ha-
stam lon-
gissimam æ-
quans, cala-
mis pollice
crassioribus,
validis, cauis,
crebrè geni-
culatis, hauef-
centibus: co-
mosa iuba &
folia vallato-
riam imitan-
tur, maiora.
Radix longè
latèque sub
terra vagatur,

ruberosa, cuius teneri turiones cum grata dulce-
dine escitari possunt.

In hortis colitur. Ego propter latitudinem fo-
liorum aliquando Papyrus esse suspicabar: nunc
verò cum Anguill. Donacem statuo.

Donax.

Arundo
vallatoria
Matth.

Matth. sibi persuadet esse Arundinem vallato-
riam. Fiant, inquit, ligulæ tibiarum ex commu-
ni hac arundine Dioscoridi vallatoria nuncupa-
ta, quā nostri in viridariis, ac hortis in topiariis
extruendis vtuntur ac palos vitibus aptissimos
efficiunt. Quod autem vallatoria sit hæc nostra

communis mihi aliquando dubitandi præbuit
ansam Dioscorides: quippe qui dicat, eam esse
gracilem, cum tamen communis nostra sit cra-
ssior. Verum cum postea inuenerim Theophras-
tum crassiorē vel vallatoriam nominare, facile
sum ad credendum inductus Dioscor. hunc locū
esse deprauiatum. Hæc ille, qui in com. cum mag-
icon. Lat. & It. habet iconem nomine Arundinis
domesticæ, quam pro suo more posuit pro ca-
lamo aromatico, olim posuerat aliam iconem
pro calamo aromatico, qualem etiam posuerat
pro Arundine, quæ Arundinem palustrem expri-
mere videbatur, hinc apparet quantæ fides habenda
Matthiolo in plantis peregrinis ac etiam vulgari-
bus, is sæpius ad descripiendos plantas pingendas su-
tauit.

Tabern. Hist. & Icon. Arundo domestica, Græ-
cè Δρύαξ & ἄρδυσ κυπριας, Arundo Cypria, ha-
rundo domestica, hispanica, Canna hispanica,
Hispanischriedl, Hispanischrohr & Zamrohr:
Item calamus aromaticus. Tabern. habet ico-
nem Matthioli n. similem, & postea Matthioli
imitatus ponit iconem non differentem pro ca-
lamo aromatico, ex quo apparet quantæ etiam fides
adhibenda sit Tab. dicenti se vidisse verum calami
aromaticum: verum hoc non notum apud Ta-
bern. & alios qui pro suis venditare solent, quæ
non sunt, & miscere ac confundere plantas si-
mulatæque se vidisse quæ non viderunt.

Gerard. harundo Cypria, Cypresse cane. Et Ge-
ralibi, calamus Aromaticus. Gerardus sequitur
figmentum Matth. & Tabern. & pro calamo aro-
matico proponit plantam quam posuerat pro
harundine Cypria.

Casp. Bauhin. pin. Arundo inodora 2. siue Arundo
sariua, quæ Δρύαξ Diosc. & Theoph. Arundo Mat-
thioli. Lac. Cast. Amnica Ruell. Arundo dome-
stica, Matth. Lugd. Tab. Arundo Cypria, Dod.
gall. Amat. Ger. Canna quartasqua Donax,
Ang. Arundo magna, Gefn. hort. Italica maior,
Cana. Arundo donax siue cypria, Dodon. Arundo
donax sariua, Lob. Adu. Obl. p. 28. Ic. p. 51. Cal-
amus siue Harundo crassa, Cæf.

Ex vsta huius radice Arabum spodium para-
tur, tamen si vt non necessarium, ita non magno in-
commodo. Ex hac Romæ fiunt & Colus mulie-
rum, & vinearum radice: in Gallia sepes.

ARVND. PAPYRVS QVIBVS DAM,
folio latissimo denticulato.
CAP. CXLVI.



Papyri no-
mine, fra-
gmentum ru-
dis nec dum
elaborati fo-
lii, quale ad-
seruo, descri-
ptū exhibeo:
latitudo est
quatuor un-
ciarum, lon-
gicudo quan-
ta fuerit, non
queam certò
affirmare:
crassities triū
quatuordec
foliorum chartæ
nostræ: textu-
ra fungosa pe-
dicu-

diculorum Nymphaez, fistulis similiter directis, membrana vtrinque striata, mediocriter levis, coercitis, folii margines obiter denticulati, nihilque fecius medium pereurrentem exemplilem collant denticuli quidam armant.

Arundinis huius peregrinae & pulcherrimae portionem dedit Pharmacopoeus Patavinus ad aquilam, cui congener videbatur Arundini maxima.

ARVND ANGLICA FOLIIS IN SVMMI- tate dissectis C. Bauhini.

CAP. CXLVII.

A Rundo inodora 3. (vt vocat Autor in pin.) vel (vt in prod.) Arundo 2. siue Anglica foliis in summitate dissectis: foliis est cubitalibus, duarum, triumve vnciarum latis, neruis aliquot, per folii longitudinem excurrentibus & eleuatis: foliis in summo in duos, tres, & quatuor apices diuisis: hanc D. Gargillus ex Anglia misit.

ARVNDO SCRIPTORIA.

CAPVT CXLVIII.

I llustris D. Carolus Rym. ab Eckenbeken, nobilis Gandauensis, vir doctus, ex legatione ad Solimannum magnum, Cesaris Maximiliani nomine reuersus, inter alia multa peregrina Constantinopoli relata, calamos aliquot mihi (Lobel.) communicauit Arundinis scriptoriae, cuius etiamnum hodierna die ad scribendam visus est Constantinopoli & in Graecia. Crassiores hi calami non sunt anserinis aut olinis pennis, praeduri, coloris rutili, extrinsecus obscurioris, laeuore polito veluti splendentes, intus albi, in assulas fistulas, vbi rumpuntur: internodia dodrantalia aut pedalia, articulis adnascuntur albae ligulae, Lob.

Lob. plant. icon. p. 52. *Fistula vel Syringa* & *Arundo scriptoria*. Eid. pin. hist. Belg. p. 71. *Riet om te schriuen*. Anguill. epist. 4. *Canna* 3. *Calamus scriptorius an Syringa*? Tabern. icon. *canna fistularis*, *Schreiber ried* / *Schreibrohr*. Hist. *arundo scriptoria*, *arundo* 6. *Συγγία* aut *χλαμος συγγίας*, *Arundo fistularis*, *canna scriptoria*. Gerard. *Arundo scriptoria* *Türcke* weitten *Reede*.

C. Bauh. pin. *arundo inodora* 4. siue *arundo scriptoria atro-rubens*: *χλαμος συγγίας* Dioscor. *συγγία* Theophr. *syringias fistularis arundo* 3. Dod. gall. *Arundo fistularis* Amati.

ARVNDINIS SCRIPTORIAE INDICAE GENUS SPADICEO COLORE.

CAP. CXLIX.

I ndicæ Arundinis nomine, calamos concauos Iasseruo, scriptoriae affines, vt qui in eum vltim pulchre aptari possunt, quemadmodum in periculo facto me docuit experientia: internodia dodrantalia: crassitudo quæ vallatoris nostrati: color foris spadiceus siue rufus, intercursa tibus subinde maculis albicantibus, politi laeuoris, intus albicant: parietes quam in Phragmite crassiores, assulosè franguntur.

ARVNDO NASTOS SIVE FARCTA crassa & maior.

CAP. CL.



L Ob. Adu. Ic. p. 52. & Hist. Belg. p. 71. *Arundo Nastos* vel *farcta*, *Toxicos* Theophrasto. Tabern. icon. & Hist. *Nastos* 3. *ψελοτροπ*. Eid. & *Arundo* 5. C. Bauhin. pin. *Arundo inodora* 5. siue *arundo farcta maxima* *aitorubens*, qua Principes pro *scipionibus* *ψελοτροπ* *χλαμος συγγίας*, Dioscoridi, *χλαμος συγγίας*, Theophrasto, *Canna Indica*, aliis quibus *Papyrus*, *Matth. Ital.* *Canna* prima species Diosc. Ang. *arundo Indica* & *seprimas* Dod. gall. *arundo Indica*, cum teres sit, *Papyrus* Antiquorum non rectè statuitur, Guiland. *Iuncus*, *Pappi Aegyptia* genus, Amati. *Nastos*, vel *farcta*, Lob. icon. *tertia*, Tabern. *Nastos Clusii*, Ger.

ARVNDO NASTOS SEV FARCTA TOXICA figurata.

CAPVT CLI.



H Anc vi. *Descriptio*. *Arundo* nobis contigit apud Cl. Dom. Platerum, cuius etiam frusto palmari liberali nos donauit manu. Sesquipedalis est bacillus vtrinque sectus, vt nequitquam integrum esse facile fuerit animaduertere, enodis, crassitudine vitis furculi mediocriter, ferratis impressionibus eleganter

donatus, quæ ferræ eminentiores reliqua parte, saturatioris, ac ferè spadicei, leues, superficie tenuis lucentes. Reliqua pars pallidior est. Tota quoque zonulis nigris denso ordine politis cincta est. Lignosa alioqui eius est substantia ac intus circa medullalia secundum longitudinem porosa. Odorem nullum in sicco & euanido frusto deprehendimus.

De Arundine Nasto Lobel. hæc scribit: Scimus Antuerpiæ & alibi mercatores quodam, qui pro

Arundina
bei Lob.

Sf 3

scipione vtuntur Arundine quadam pulcherri-
ma, crebris geniculis distincta, admodum farcta,
lignosa, dura, recta, leui, micante, rufa, colore
spadiceo & obscuriore secundum longitudinem
variegata, discurrentibus hinc inde lincis crispis,
dentibus, cunctisque figurantibus, aspectu pulcherri-
mo. Et hanc & præcedentem, pulchritudinis, ra-
ritatis, leuitatis, commoditatisque ergo argento
consecrantur circumdare. Crassissima aequat
Arundinem quæ Donax nuncupatur. Vtramque
nobis communicauit, nostri rerumque exoticarum
& stirpium studiosissimus Iohannes Douue, alias
Vogellanck, cuius Antuerpiensis.

Synon:

Lobel. Icon. pag. 53. & Hist. Belg. p. 72. *Indias*
misch Riet / Nafst. siue farcta altera Toxicæ, cre-
bris geniculis cincta, quæ etiam pro scipione &
iaculis vtuntur. Tabern. Icon. *Arundo farcta. Can-*
na siue calamus sagittalis, *Indiamisib* gesult
Kohe / pfeilrohr. Hist. pag. 703. *Arundo farcta*
seu *Nastos*. 1. Arundo 3. Diosc. *ῥάκος, ῥάκος ῥά-*
κος: Theophr. *ῥάκος ῥάκος* *Calamus farctus, Ha-*
rundo farcta, calamus toxicus, Harundo toxica, si-
ue enodis, *Canna farcta*, siue sagittalis. Calp. B.
pin. *Arundo inodora* 6. siue Arundo farcta geni-
culata siue sagittalis: *Nastos* & *Arundo prima*, Dod.
gall. *Nastos* huc farcta altera toxicæ, Lob. icon.
Arundo farcta seu *Nastos*. Tabern. Calamus sa-
gittalis Ger. In Bali Insula, gestant Cannas sa-
gittuomas, ex quibus teretes exilissimæ sagitru-
læ ex Arundine fabricatas, an ex prædicta a-
rundine, in apice verò intoxicatas, cillant: in
in hist. Ind. Orient. part. 1. c. 39.

An *Canna*
sagittu-
ma Insula
Bali

An *Ha-*
rundo veris-
simè?

An *Harun-*
do diuina-
torum Inci-
torum,
regis Tar-
tarorum
Chinchis

An Harundines verticillares, quibus, referen-
te Chr. Columb. nauig. cap. 94. in cognatio-
nibus ædium Canibalarum pro trabibus vtantur,
mira arte textis complicatisque.

An hanc Arundinem intelligit M. Paulus Ve-
ner. l. 1. de regn. Or. cap. 53. Chinchis Tartarorum
Rex (cùm castra posuisset in planitie quadam
magna *Tanduc* nomine, proficiscens hostili ani-
mo contra regem Vncham) præcepit Incantato-
ribus & Astrologis suis, vt illi indicarent qualem
euentum prælium futurum esset habiturum:
Tunc Astrologi sciendentes Arundinem per lon-
gum in duas partes, posuerunt diuisiones ipsas
in terram, vnâque vocauerunt Chinchis & alte-
ram Vncham, dixeruntque regi. Interim quo nos
inuocationes legerimus Deorum, nutu ipsorum
fiet, vt hæ duæ partes Arundinis ad inuicem
pugnent. Et cuius pars super alteram ascenderit,
ille Rex victoriam in prælio obtinebit. Multi-
tudo itaque ad spectaculum illud concurren-
te, cœperunt Astrologi marmurare precatio-
nes suas & legere incantationes, & mox commo-
tæ sunt partes Arundinis contra se pugnantes,
donec tandem pars Chinchis ascenderet super
partem Vncham. Quo viso, Tartari de futura
certiores facti victoriam, confortati sunt. Tertia
igitur die prælium commissum est, & multis v-
trinque cadentibus, victoria tandem penes Chin-
chin remansit. Sicque factum est, vt Tartari re-
gnum Vncham penitus subiugarint.

An *Harun-*
do quindecim
passuum.

An eadem cap. 65. Arundo quindecim passus
in longitudine habens, & in spissitudine tres
palmos; ex qua fiunt columnæ, tabulæ, & com-
pagines, itémque imbricamenta. De hac Ha-
rundine idem lib. 2. cap. 36. hac scribere videtur.
Nascuntur in regione Tebeth maximæ Harun-
dines, quæ habent in longitudine passus quindecim:
crassitudo verò in gyro tribus mensuratur
palmis. Porro inter duos viciniore nodos di-
stantia est trium palmorum. Itaque quando via-

tores noctu volunt quiescere, accipiunt fasces
magnos de illis Arundinibus, & in vnâ ponunt
congeriem, subiectoque igne succendunt: quæ
igne correptæ incipiunt crepitare, tantisque in
eis excitatur stridor, & fragor, vt eminus ad ali-
quot miliaria audiri possit, quem terribilem so-
nitum animalia cùm audiunt, obstupescunt, fun-
giuntque tamdiu, donec crepitus ab auribus eo-
rum euanescat, illisque sic elusis mercatores &
viatores tuti pertrāscent prouinciam illam. Por-
rò equi & alia iumenta, quibus mercatores pro
itinere vtuntur, hoc audito strepitu plurimum
inhorrescunt, & multa in fugam conuersa domi-
nis suis elapsa sunt: sed prudentiores viatores
pedes eorum compedibus ligantes, vi secum ea
retinent, ne territa aufugiant.

An tandem c. 59. de eadem hæc repetit: in flu-
mine quodam magno ciuitatis Singui canabeis
funibus non vtuntur in nauigiis, nisi pro malo &
velo, sed pilorchas seu chordas faciunt de Arun-
dinibus magnis, quibus naues quandoque per
flumen trahuntur. Scindunt autem Arundines
illas magnas quæ quindecim in longitudine con-
tinent passus, & scissuras colligantes, & contor-
quentes, funes longissimos faciunt, vt quidam
longitudinem contineant trecentorum passuum.
Et sunt pilorchæ illæ fortiores funibus cana-
beis. Cæterum, remis & malo naui harundi-
næ vtuntur circa Calecut. Harundo arcus & te-
liloco succedit militibus vrbis Indiæ Tarnafari.
In Insula Zaylon lanceæ, acensis gladiique vi-
cem supplet Harundo. An de prædicta Arun-
dine sunt jam dicta intelligenda?

ARVND NASTOS SEV FARCTA, siue Toxicæ, gracilis & plicatilis.

CAP. CLII.



Antonius
Ache-
le (autor est
Lob. Belg.)
Cayro Aegy-
pti reuicisus,
inter alia ra-
ra, pulchram
attulit Arun-
dinem, graci-
lem, plicati-
lem, quæ ad-
necta diceba-
tur ex Orien-
tali India, per
Adem & ma-
re rubrum, Si-
donem [Belg.
Ziden] prop-
ter Mecham,
& tandem
Cayruin &

Alexandriam Aegypti. Recta est, lauis, splen-
dida, coloris lutei, lignosa, dura, farcta, haud se-
cus ac illa quæ pro scipione est, crassitudine ca-
lami aromatici, aut Arundinis scriptoria: geni-
cula duodenis, terdenis & quaterdenis pollici-
bus inuicem distant. Superficies squammata ser-
pentium dorsum emulatur: nec odorem, nec sa-
porem habet vllum: non magis quàm farcta
quæ pro scipione vsurpatur: cuius vtriusque nec
radicem, nec folia vidimus.

Lob.

Lob. Icon. plant. p. 55. *Nastos plicatilis*: Eid. Hist. Belg. p. 72. *Nastos* seu *farcta* siue *toxica*, *gracilis* & *plicatilis*, Anguill. epist. 4. *Canna* (siue *Arundinis*) *species tradita à Diofco.* ex Syria allata *gracilis* & *solida*, & hæc *Nastos dicta.* Tab. icon. *Nastos* siue *Arundo farcta* 2. *Indianisch gefülte rohr* *Rohr gefüle mit maref.* Eid. hist. *Nastos* 2. siue *Arundo* 4.

C. Bauh. pin. siue *arundo inodora* 7. siue *Arundo farcta* *flava* *Zurfs* & *lunigae* Theophrasto. *arundo femina* & *secunda*, Dod. gall. *Nastos* seu *farcta*, siue *toxica* *gracilis* & *plicatilis*, Lob. icon. *Nastos secunda*, Tab. *arundo farcta*, & c.

ARVND HVMILIS, RARA, AC inusitata.

CAP. CLIII.

QUæ hoc loco depicta est *Arundo*, Calamus est humi sparsus, graminis modo, quod de *Arundine* epigeio prodidit Theoph. cortice saluo contentus, lineis squammarum cingentibus distinctus, cauliculos alios multos utrinque producens densa congerie stipatos, simili cortice, similiterque squamoso virgatos, qui rursus & alios gignunt, prominentium veluti nodorum aut oculorum modo exertos, plures superiore parte quæ terram non attingit, pauciores inferiore quæ terræ inseritur, aspectu pulcherrima, densissimâ illâ tenuium cauliculorum furculorumque congerie, cum cætera *Arundines* folia tantum hinc inde mittant, nullos autem præterea vel furculos vel calamos: folium nostræ *Arundini* simile à nodis exoritur, sed numerosius magisque multiplex, & plures complexu inuolucrorum per ambitum tunicas inducit. Hæc *Arundo* pumila in faccis magnis Costo arabico & Zinzibere plenius aliquando reperta, veluti rara ac inusitata, hæc doctis & rei herbariæ studiosis spectanda proponitur, inquit Author Hist. Lugd. qui *Arundinem* epigeion p. 1000. inscripsit.

Gesm. hort. dicitur *Arundo humilis*: Item *Copia elegia Ollingeri*. Suspiciatur autem *Copia* vocabulum esse corruptum, ac pro eo legendum *Canna*, idest, *Arundo*. De hac Plinius lib. 16. cap. 36. per obliquam *Arundinem*, non in excellentem nascentem, sed iuxta terram fruticis modo se spargentem, suauissimam in teneritate animalibus, à quibusdam *Elegiam* dictam, locutum fuisse arbitrat. Non interim negat posse Chamæcalamum appellari.

C. Bauh. pin. *Arundo inodora* 8. siue *Arundo repens*: Cæf. *Arundo* 3. in maritimis.

ARVND INDICA VERSICOLOR.

CAP. CLIV.

CAnna de Bengala Lusitanis: in Regno Bengala crescunt *Arundines* versicolores, medullâ plenæ, crassitudine *Arundinibus* Hispanis similes, paulo tamen tenuiores: virides adhuc lentæ insciscuntur, ad stanni modum, aut instar *Salicis*, foris punctis versicoloribus notatæ sunt, haud secus ac si arte ita pictæ forent. Vrantur iis in Lusitania mulieres ventræ pro scipionibus, quibus gressus titubantes sustinent, quarum varia genera apud Doct. Paludanum videre est: in hist.

TOM. II.

Ind. Orient. part. 2. c. 28.

C. Bauh. pin. *arundo Indica* 3. siue versicolor.

Arundo Ind. Versicolor C. Bauh.

ARVND INDICA VERSICOLOR flexilis.

CAPVT CLV.

Rota vocant in Bengala, aliud genus eiusdem *Arundinis*, quod *gracilius* & *fuccinctius* est, *gala*. viminis ad modum flexilis, ex quo *Calathi* & alia multa pulcherrima conficiuntur: ex Hist. Ind. Orient. part. 2. c. 18.

Arundo Indica Versicolor C. Bauh.

C. Bauh. pin. *arundo Indica* 4. siue versicolor flexilis.

ARVND INDICA PVNICEA MOLLIS.

CAPVT CLVI.

ARuno, vel *Scirpi* potius genus punice, coloris & mollis, quam parumper contortam, arcui pro nervo adaptant: nascitur in Regno Congiano, & in regno Bengala ad Gangen fluvium, Hist. Ind. Orient. part. 1. cap. 5.

Arundo punicea mollis C. Bauh.

C. Bauh. pin. *arundo Indica* 5. siue punicea mollis.

ARVND INDICA VOLVBILIS.

CAP. CLVII.

ARuno Indica in insula Sumatra, variè se circa arbores vinciens, centrum, ducentarum, imò trecentarum, & plurium *Orgyrum* longitudine, ita ut vix eius origo finisve deprehendi possit, circulis vasariis conficiendis, valde accommoda: ad Clusij curas postea.

Arundo Ind. Volubilis C. Bauh.

C. Bauh. pin. *arundo Indica* 6. siue volubilis.

ARVND INDICA FLVITANS.

CAP. CLVIII.

TRombas siue *Arundineta* fluctuantia in Bali insula: in Hist. Or. Ind. part. 3. cap. 2. & 40. & part. 4. fig. 10. pinguntur. *Arundines* longæ seu *Algæ* in salo fluctuant, par. 1. Ind. Orient.

ARVND INDICA LATIFOLIA.

CAP. CLIX.

Hex primùm vnus, deinde plures stolones *Descripti* ex eadem radice prodeunt, cubiti vnus, interdum duorum aut trium altitudine, digiti crassitudine, geniculatæ *Arundinis* modo, quos circa genicula ambiunt folia multa, ampla, transuersis hlis nervosa, foliorum *Musæ* arboris specie, sed tenuia, herbaceo virore pallescentia, & in extremo acuminata, quæ cum primùm erumpunt characeorum corniculorum modo conuoluta conspiciuntur, & gustata herbaceum quandam saporem referant primùm, qui paulo post nonnihil acrimoniæ admixtum habet. In summo caule sunt flores, gladioli floribus formâ similes, coloris

re phœniceo pulcherrimè nitentes, capitulo cui-
dam hirsuto inhaerentes, quod cum flore non-
dum aperto cancri seu locustæ marinæ chelam
quadantenus repræsentat, floribus dilapsis aut
marcidis, capitula ista augentur, hincque trian-
gula, & veluti spinosa, fructus ricini modo, in
quibus semen per maturitatem fuscum & atrum,
rotundum: radix nodosa, crassioribus fibris stipa-
ta, ex cuius nodis aliis adnascantibus radices a-
liæ procurantur, matri similes, inquit author
Hist. Lugdunen. duas effigies proponens. Est
autem *Arundo*, seu *Canna indica* nominata, quo-
nam ex America primum delata fuit, & eius sto-
lones Cannarum seu Arundinum ritu genicula-
ti sunt, à nonnullis quia eius flos nondum aper-
tus cancri chelas colore & forma refert, flos can-
cri, ab Hispanis & Lusitanis *Cuentas*, à numeran-
do, quòd ex istius fructu, ut ex tenellis & deci-
duis malis Arantii, spherulæ precatoriae fiant, ab
aliis *cannacorus*, ambigüe inter Cannas & Aco-
rum natura.

Synonyma Casp. Bauhin. pin. *Arundo indica* 9. siue *latifolia*:
Canna indica, Geln. hort. Clus. Hils. [cui & flos
cancri nonnullis] Cam. Casp. *rubra* Eysk. *A-*
rundo indica florida, Adu. Lob. & *Canacorus* quo-
rundam. *Papyrus*, Cast. *gladiolus indicus*,
Cam. ad Marti. *Arundo* seu *Canna Indica*, Lugd.
Arundo indica latifolia siue *florida*, Tab. *Harun-*
do florida, Ger.

Locus. In Lusitaniæ monasteriis quibusdam frequen-
tem vidit Clusius etiam media hyeme flo-
rentem. Hodie multis aliis in locis feritur & co-
litur à rei herbariæ studiosis in fictilibus, aut li-
gneis dolis, ut Soli meridiano facilius exponan-
tur: quoniam calore & apricatu valde gaudet,
alsiosque planta boreæ flatu & frigore maxime
læditur. Huius folia esse putant, quibus massas
gummi elemi obvolutas videmus in Seplassis.

ARVND INDICA LATIFOLIA, FLO- re luteo punctato.

CAP. CLX.

Descr. EX radice nigricante, nodosa, & fibris cras-
sioribus donata, aliisque nodis adnascantib.,
caules plures sesquicubiales, crassi, Arundinis
instar nodosi, prodeunt, circa quos folia pallide
virentia, expansa, lata, in acumen delineantia, ner-
uosa & tenuia: quæ cum primum ante caulium
exortum nascuntur corniculorum chattaceorum
modo conuoluta existunt. Cauli, flores gladioli
floribus forma similes, coloris lutei, punctis as-
persis variegati, capitello hirsuto inhaerent,
quod flore delapso augetur, subasperum fit, & se-
men nigrum subrotundum continet. Hac ut o-
mnibus suis partibus, ita & semine minor est
quàm ea quæ florem minui coloris habet.

Synon. C. Bauh. prod. *Arundo* 3. Eid. pin. *Arundo indica*
10. siue *Arundo indica latifolia* flore luteo pun-
ctato: *Canna indica* lutea rubris maculis puncta-
ta, vel flore croceo guttato, Eysk.

Locus Hanc in horto habet C. Bauhinus, in olla co-
lit, hyberno tempore in cellam repo-
nit, quæ primo vere plures cau-
les, antiquis relictis pro-
fert, & Iulio mense
floret.

* *

GRAMEN LONGISSIMVM,

CAP. CLXI.

DVorum, trièrue cubitorum altitudinem nõ
nunquam superat, foliis & caulibus tenuibus,
triangularibus pluribus, ex radice crassiuscula
perenni, nigricante, fibrosa, paniculæ parvæ, vix
vinciales, in aliquot veluti parvas spicas diuisæ:
flosculi ex apicibus luteolis: sapor nullus in-
lignis.

C. Bauhin. Phyt. *Gramen* 15. siue longissimum à
fratre Io. Bauhino ostensum. Non inuenio hu-
ius in pin. Casp. Bauhinum meminisse, nisi sit
eius *Gramen paniculatum montanum* 4. siue
Gramen sylvaticum paniculatum altissimum, pro
Gramine 14. in prod. descriptum, de quo alibi.

In montibus circa Genciam cubitum exce-
dit: Montbelgardi in sylvis duos & tres cubitos, Lo.
In Surtgouia repen in dumeto cum parvis pan-
niculis brevibus florens Aprili. Montbelgardi
videntur hoc *Gramine* rustici ad equorum tor-
ques, quibus aratra trahunt. Efficiuntur etiam
ex eo chlamydes pastorales, quibus opiliones ad-
uersus pluuiam vtuntur.

GRAMEN AQUATICVM CVM LON-
gissima panicula,

CAP. CLXII.



CALAMI
Crassiuscu-
li bicubiales,
fibrarum è ge-
neculis demissis
radicantur, som-
itu amicti la-
tiusculis, do-
dantalibus, &
lôgiorib. vagi-
na longa cala-
mæ complexi-
s, à medio ve-
rò, summo te-
nus gracilescut
culmi, panicu-
lam cubita-
lem, & mino-
res numerolas
proferentes,
quarum singu-
lares vnciam
aut sesquicubitali
æquant, graciles, alterno glumarum situ con-
textæ.

Gramen anatum Trago, germ. *Entengraß*. Syn.
Gramen fluviatile 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 179

GRAMEN MARITIMUM FLUITANS
cornutum, C. Bauhini.

CAP. CLXIII.

Gramini huic 17. in prod. vel vt in pin. vocat, Gramini spicato aquatico 3. siue maritimo fluitanti cornuto, ex radice exili capillata, culmus tenuissimus, geniculatus, cubito longior producit: ex quolibet geniculo, folia iuncea, communiter bina, culmum basiflata, instar vesicæ, ambientia, in latus sparguntur; indeque cauliculus vnus aut alter educitur, & tandem in capitulum membranaceum finit, quod in foliola bina, terna, rarius quaterna, angustissima, in latus reflexa, & cornuta desinit. Tota planta stagnis Monspeliensibus mari finitimis innatat, & Gramen hoc spicatum aquaticum 3. in pin. 17. in prod.

GRAMEN AQUATICUM GENICULATUM
Tabern. digitatum, atro-purpureum.

CAP. CLXIV.



Radice est fibrosa, ex qua pluresculi nascuntur teretes, geniculati, sesquipedales circiter calami, folius ad articulos gramineis breuius, latis, acuminatis, amicti: in calamorum fastigiis spica nascuntur longæ, tenues, digitalis licheni spicis similes, breuiiores, atropurpureæ Tabern.

Tabern. icon. & Hist. itémque Gerard. Gramen

aquaticum geniculatum, wasser Knoden gras / Hydragrostis.

C. Bauh. phyt. pag. 3. Gramen 25. gramen aquaticum geniculatum. Eid. pin. gramen dactyloides 7. siue Gramen dactylon aquaticum.

Passim in lacustribus & palustribus nascitur.

GRAMINIS DENTIS CANINI SPICA DI-
uulsa tenuior nigra species.

CAP. CLXV.

Gramine Dentis canis primo & secundo, folia & geniculatos calamos habet subtiliores ac tenuiores: panicas licheni non dissimiles, colore nigras: semen externa facie nigrum quidem, sed cortice detracto intus album.

Lobel. Hist. Belg. pag. 15. de derde soorte van panick gras. Tabern. icon. & Hist. gramen panicum. Item Ic. plant. pag. 14. panicæ effigie gramen tertium. Gramen panicum 3. Tabern. idem effigiem Lobeliano satis indicat icon, suspicor ab eo




gerardi.


GRAMEN FLORIDUM.

CAP. CLXVI.

Foliis ad summum vsque vestitus est culmus, Descriptio
eum aliquotque inuoluentibus, à quo ubi recesserint, duàm vnciarum longitudine sunt, in gracile acumen desinentia, læuia & glabra: panicula pulchra summam ornat stipulam, fescuncialis, muscariis amœnis contexta, Holcalorum radiatis complurculis foliolis constans, emittentibus è medio apiculis.

GRAMEN EQUINUM MOLLE, SEMINE
ferè Hordei, magnum.

Cramen equinum siue Hippagrostis Gelsæri, Kossgras circa Tigurum vulgò. Gramen albicans, lanuginosum, molle, duos cubitos cum dimidio attingens: semine lato, latis magno, vt Hordei ferè. Refert ille in pratis nasci, sed parè. Habet hoc Camer. ex horto Nobiliss. viri D. Georgij Retelsij, ubi spontè inter cetera gramina proueniebat. Synon.

GRAMEN ALPINUM RABINUM DI-
ctum, foliis carnosiss, non apparen-
tibus nervis.

CAP. CLXVII.

Gramen alpinum quoddam Rabinum cognominant Lactarij, id est; præcipuum, foliis breuib, carnosiss (non apparentibus nervis), circa radicem radiatis in orbem pluribus Gelsæreni nonndum vidit: Pecori eius pabulo lactis copiam plurimum augeri aiunt, referentè Gelsæro de hort.

De hoc Lob. in Ad. hæc scribit: Gramen Rabinum vel Rauisium montanum, foliis Veronice Caryophyllatæ. Saginæ & lactis vbertati omnium latudatissimum: Montium atcolæ opiliones Sabaudi & Heluetij Rabis vel Rabinam, quasi præstantius & præcipuum, dicunt: foliis autem est crassioribus, carnosioribus, breuib, montosis, vdis Angliæ & Heluetiæ familiare. Lobelius

Gramen
alpinum
Rabinum
Gelsæ.

Gramen
Rabinum
Gel Rauisium
montanum, Lob.

non se explicat in Obseru. In isonibus proponit figuram cum hac inscriptione. Gramen spicatum foliis Veronicæ Caryophyllatæ. An autem Rabinum intelligat nescio; Tabern. & frater C. Bauh. ab eo separant.

Synonyma
reliqua.

Tabern. Hist. p. 641. *Gramen Rabinum Rabis nengras* & pag. 463. *Gramen* 24. *Rabis gras* Gesnero. Nobis dedit Guill. Turnerus, ei autem missum erat ex Heluetia, nec unquam licuit vixens videre ad picturam, folia alioqui sunt *Gramini caryophyllo* valde similia, nisi essent maiora & longiora. Item pag. 645. *Gramen Rauisum* & *Rabinum* dictum quia opilionibus magistrale *Gramen*, id est, nobilius & melius inter alia pro cibo & impinguatione pecudum.

Casp. Bauhin. Phyt. *Gramen* 54 & *Gramen Alpinum præcypum*. Gesnero *Rabinum*. Eid. pin. *Gramen spicatum montanum* 8. siue *Caryophyllatum alpinum*.

GRAMEN MONTANVM SPICATVM flore herbaceo, caule enodi.

CAP. CLXVIII.

Descrip.



Gramen montanum spicatum Clusio, multis capitibus ex radice digitalis crassitudinis, bifida interdum & trifida, multisq; tenuibus fibris supremâ parte hirsutâ, prodeuntibus constans, quorum singula proferunt sena aut plura oblonga crassa & nonnihil carinata folia, *Caryophyllæ* illius, quod vulgò *Gramen marinum* maius cognominant foliis valde similia, in infimâ sede sese inuicem amplectentia, gustu amaritunculo & acritunculo, ex horum medio dodrantalis nonnunquam & pedalis exit cauliculus, firmus, lævis, nudus & enodis, qui summo fastigio, multos flosculos, spicæ instar, congestos, herbaceoque colore præditos, profert.

Synonyma Tabern. icon. *Gramen siluaticum* 2. *Waldergras* / provenit in pratis montis Herciniæ sylvæ supra Denmersberg.

Casp. Bauhin. Phyt. *Gramen* 69. siue *spicatum sertum* & *montanum*: Eid. pin. *Gramen auenaceum* 1. siue *Gramen montanum auenaceum spicatum*: *Gramen marinum spicatum alterum*, Gerard.

Locus.

Inueniri inquit Clusius in montanis quibusdam pratis, duobus supra Badenses thermas, miliaribus. Similem autem in Flandriæ maritimis frequenter legere meminisse, quod vulgus, ni memoria labitur, Suden appellaret.

GRAMEN HIRSVTVM ANGUSTIFOLIUM maius, C. Bauhini.

CAP. CLXIX.

EX radice exigua fibrosa, rufescente, culmus ævnicus, cubito altior, ut plurimum lævis, exurgit, in cuius summicitate panicula alba, mollis, leuiter sparsa, ex multis laminulis composita, in quarum qualibet *semina* minuta, subnigra & subrotunda: *foliis* est paucis, angustis, palmaribus & villosis, aliquot culmum cingentibus: ipsi verò paniculæ, utrinq; folium tenuissimum subicitur, quorum alterum panniculam superat, alterum non aequat. Prouenit in paludosis pratis Michelsfeldensibus.

Gramen hoc 47. in prod. siue *Gramen nemorosum hirsutum* 5. siue *angustifolium maius*. *Gramen* 79. (inquit in Phyt.) multum habet similitudinis cum icone *Graminis nemorosi Dalechampii*: plus verò cum eiusdem *Gramine Leucanthemo*, & tamen diuersum utrumquo habeo.

GRAMINI LVZVLÆ AFFINE flore albo.

CAP. CLXX.



Pærennis vitæ *Graminis*, foliis et ad *Graminis* *Luzulæ* siue nemorosi folia accedentibus, consimiliter pilosis: at culmi maiores, cubitales: florum manifestum discrimen, ii siquidem in summo fastigio albi sunt, festucacei, cum in altero non in festucas, sed in capitula desinunt, seu paruos calyces semina claudentes, eosque nigricantes, cum huius festucæ albescant. *Luzulæ* modo quosdam habet pilos, qui etiam facile decidunt, à nostro pictore in sicca planta non obseruati.

H. Lugd. 426. *Gramen Leucanthemon Dalechampii*. Figura non placet, quia desunt pili. Casp. Bauh. phyt. *Gramen* 70. *Gramen hirsutum paniculis albis Aeschimon Plinii Guilandino*. Eid. pin. *Gramen nemorosum hirsutum* 6. siue *angustifolium minus paniculis albis*.

Gramen hoc prouenit Geneuæ in nemoribus, ut in colle la *Bastie* florens Maio & Iunio.

GRAMEN LUCIDVM NEMO- rentæ, siue Luzulæ.

CAP. CLXXI.

Gramen lucidum, radice nititur magna, fibrosa, geniculata, ruffa, sapore cum leui dulcedine

cedine adfringenti, culmo cum flore dodrantali, folio vno aut altero amplectente donato: spicæ ternæ, quaternæ, aut quinæ breues, ex quibus vna scissilis, reliquæ pediculis semuncialibus & vncialibus appendæ: flores singuli foliolis sex radiatis spadicis, totidemque staminibus luteis, umbilicoque vicente, flamen nigrum proferente, constantes, quibus capitula succedunt triquetra, semina terna minuta continentia. Folia quadrantalit aut palmata rigidiuscula, acuta, surrecta, extrorsum striata, glabra, et in lateribus longa, cana, teneraque lanugine in folium etiam totum usque incurrente obrita: ista lanugo vel pili qui facile decidunt tacti, colligunt rorem qui splendet noctu irradiantibus stellis vel Luna, ita ut sit admirationi videntibus: herbam perquirentes, decedente rore inuenire non possunt.

Gramen hirsutum nemorosum Lob. icon. pag. 16. & Hist. Belg. itemque Ger. *Gramen sylvestricum* 4. siue *pilosum* Faber. ic. & hist. *Combrætrum* Plin. & *Herba Luzula heterura*, Anguill. epist.

An Gels. hort. *Cypripella Cordi*? Holostium quidam docti, sed imbecillâ coniecturâ, augurantur, longè verius, Lobelij iudicio, coniecturæ: si Ischæmon Plinianum dixissent.

C. Bauh. phyt. *gramen* 77. Eid. pin. *gramen nemorosum hirsutum* 1. siue *latifolium minus*. Item *gramen nemorosum hirsutum* 2. siue *latifolium minus*, magnitudine potissimum differens: datur & huius maius & minus.

Lugduni provenit au bois de la belle Allemande. Basileæ Frater observavit in pratis Munchenstæin. Genevæ incipit florere mense Martio.

GRAMEN LVZVLÆ MEDIVM.

CAP. CLXXXII.



Radice donatum fibrosa, pro plantæ portione factis crassa, minus autem profundè radicatum: calamo recto, geniculato, scissicubitali, in summitate cum amine Luzulæ maximo latam producente lunci paniculam, in vaginis longioribus, quam latioribus, semen continentem album; acutum: Foliorum manifesta discrepantia: ea siquidem quæ ad articulos exeunt, angusta: quæ verò circa radicem, quæ terrâ emergit, conspiciuntur, semunciam lata sunt, sed acuminata ambo, pedemque longa.

Collegimus florens Maij principio in valle fontium acidorum fontium, vidimusque inter fratris C. Bauhini plantas siccas.

GRAMEN LVZVLÆ MAXIMVM.

CAP. CLXXXIII.

Infrequentius est Luzulæ gramine parvo, radice firmatum, crassa, obliqua, nigra, nume-



Griesbachiana ad fontes acidos.

GRAMEN LVZVLÆ MINVS.

CAP. CLXXXIV.

Frequentius est hoc Luzulæ gramine maximo, foliis tenuioribus sursum eleuatis, angustis, mucronatis, pilis & setacea lanugine aliquantulum hirsitis Calamus exilis admodum, duobus, ditatus articulis, ex quibus folia duo vncias duas longa emergunt, vnum quidem in calami medietate, alterum verò in supermitate ubi coma in tres, aut quatuor (cei capitula) diuiditur partes, Cypero



longo inodoro sylvestri pares. Radice ex libris fibris & capillamentis barbarâ provenit.

Prædictum gramen plurimum accedere videtur ad gramen exile hirsutum Cyperoides Lob. An idem tamen asserere non audent.

Collegimus mensis Maij principio florens in valle fontium acidorum dicta Griesbach.

GRAMEN EXILE HIRSVTVM, CYPEROIDES Lob.

CAP. CLXXXV.

Minus est Gramine aquatico echinato cyperoides, alioqui culmis & foliis, hirsutis tamen, ac sapore simile estat flores breuiiores sunt, confertiores, compactioresque; luncorum modo, coloris ferrugineis: radices item iam dicto non absumiles.

rosis fibris capillata: folia vnciam ferè latitudine aquant, longitudine cubitali, pilis longis, mollicellus per margines donata: culmus procerus laram spargit lunci paniculam, in capitulis parvis, latioribus quam longioribus semen continentem nigrum angulosum.

Locus

Hoc observauimus cum flore in monte & silua obscura

Descriptio

Locus & Temp

Descriptio

S. 858.



Cum hoc Gramine in multis conuenit Gramen nostrum Luzule minus, quod an idem sit, affirmare adhuc nobis non licet.

Lobel. descriptionis auctori in Hist. Belg. pag. 16. & Plant. icon. p. 15. *Gramen exile hirsutum cyperoides*. Tabern. hist. & icon. *Gramen cyperinum pilosum*. C. Bauh.

Phyt. Gramē. 71. siue *hirsutum cyperi panicula*: Eid. pin. *Gramen nemorosum hirsutum* 3. siue capitulis Pyllyi. *Cyperella Cordi* & *Pseudocyperi* species pumila, Gefn. hort. *Gramen exile hirsutum cyperoides*, Lob. icon. *Gramen cyperinum pilosum*, Tab. *Gramen nemorum Dalechampij* Lugd. *Gramen exile hirsutum*, Ger. Variat foliis laticribus & angustioribus.

Locus.

Inuenit Lobel. locis sabulosis, eisdemque habet natales, cum Gramine aquatico echinato cyperoides. Tabern. prouenire ait locis humidis, arenosis, herbosis in Ostwaldi secundum vias & potissimum propè pagum Erlenbach.

GRAMEN NIGRO-LVTEVM VERNVM

CAP. CLXXXVI.

Descriptio



mari & minori: *folia* culmo longiora, *Cyper*i foliis similia, angustiora: radice nritur lignosa, satis crassa, repante, circa quam quæ terra emergit, densum quasi capillitium conspicitur ex foliis veteribus marcescentibus, & in fibras tenuissimas facessentibus: Hoc sanè Gramen videtur mihi non parum variare ratione loci vbi prouenit, quale descriptimus siccitissimis prouenit

in pratis, non nimium humidis maius crescit, & idem fortè cum Gramine cyperoides.

Effigies Lob. Ic. Plant. pag. 10. sub titulo *Graminis spicati folijs Veronica*, *Caryophyllata*, exhibita, non malè conuenit cum Gramine nostro nigro luteo, quod insigniter variat, verum si ponit eam figuram pro *Gramine Rabin*o, quod in Adu. dicit esse folijs *Veronica* *caryophyllata*, diuersum erit à nostro Gramine: quibus notum erit erit Gramen Rabinum iudicent. Tabern. & Frater Casp. Bauhin. separant à Rabin.

Tabern. Icon. & Hist. *Gramen caryophyllum*, *Waglini grafi*. Eid. Hist. *Gramen* 23. Figura apud Tabern. eadem cum Lobeliana: si (quod perhibet Tabern.) verum est, suum Gramen esse culmo rotundo, laui, sine foliis, non erit nostrum. Sed potuit descriptio parari ex icone Lobelii, in qua nec anguli, nec folia in culmo apparent.

Casp. Bauhin. Phyt. *Gramen* 52. Eid. pin. *Gramen cristatum* & *spicatum pratense* 6. siue Gramen *caryophyllata* foliis, spica diuisa. *Gramen spicatum folijs Veronica*, Lob. icon. *Graminis loliacei obtusi* 4. species Thal. *Gramen nigrum*, Lugd. *Gramen caryophyllum* Tab.

Reperitur maius in pratis humidis, minus in siccis.

Geneux floret Martio: Montbelgardi etiam Aprili.

GRAMEN FOLIIS CARYOPHYLLÆI
floris, angustifolium, C. Bauhini.

Hoc à priori differt [putat à Gramine *Caryophyllæ* eius latifolio quod 52. Gramen est] foliorum angustia, dein & cauliculis, qui in hoc & tenuiores & longiores quàm in priori sunt.

C. Bauh. Phyt. *Gramen* 53. & Gramen foliis *Caryophyllata* (malim *Caryophyllæ* floris dicere) angustifolium.

In montosis Muræ locis Maio florens obseruauit frater Casparus.

GRAMEN CYPEROIDES CVM
panniculis nigris.

CAP. CLXXXVII.



Enicula dunt, & prorsum radices crassiusculæ *Cyper*i longi radicibus nimiris, à quibus pendunt fibræ crassiusculæ: *folia* selenicubitalia & cubitalia, carinata, *Cyper*i paria, caulis triquetrus, duobus cubitis non raro altior, enodis, catroqui nudus, pcc

per fastigia foliis aliquot ipsius cacumen haud paulum separantibus donatur: à quorum sinu panicula vel spica quaedam emicant, duam triumve unctarum, ex obscura purpura nigricans, triquetris loculis congestis semen eiusdem figura, durum, nigrum comprehensens: supremæ verò spicae, velut summam perfectionem, nondum affectæ, è squamis spadiceis striatis atque glumis inanibus mollibus contextuntur. In hac planta mihi videtur non parum ludere pro ratione loci, nec certum sum an gramen nostrum nigroluteū in hanc degeneret loco humidior: Hoc enim ut illud reliquias veterum foliorum multas habet, sunt ambo perennes plantæ.

C. Bauh. phyt. gramen 55. siue spicatum folio triangulo: *gramen vulgè cognitum Tragi: gramen triangulum*, H. Lugd. p. 1004. Item, *gramen 56.* siue spicatum latifolium caule triangulo. *gramen cyperoides* Lob. Obs. p. 10. Ic. p. 11. Nullum intercedit inter hæc gramina discernenda, ideoque non separanda, vel ipso C. Bauh. as subscibente. *Gramen cyperoides 1.* (inquit in pin.) siue gramen cyperoides latifolium spica rufa, seu caule triangulo, est graminis 4. genus Tragi, gramen cyperoides Lob. Cam. Tabern. Ger. & H. Lugd. p. 433. cui & gramen triangulum, p. 1004. & Car. rex II. p. 1007.

Ceterum, figura, cui apud H. Lugd. titulus est gramen triangulum fuit Dalechampij, ita denominantis plantam. Porro, ubi Tabern. obseruat Cyperoidis graminis caulem rotundum, nescio: nisi fortè in figura Lobelij ita pingatur, quod in multis plantis cuenit: nec ita facile in omnibus iconibus plantarum anguli exprimi possunt, nescio quia in re gramen Tabern. Typhinum ab hoc differat.

Tiguri videmus florens Maio, Gesnerus vocabat Cyperum adulterium: maximum obseruimus in A. Jorensi iuxta flumen radicebus crassissimis reptantibus, tale quid pinxit Hist. Lugd. habuit in Angliam à Dalecampio. Montbelgardi abundat.

GRAMEN CYPEROIDES LATIFOLIUM spica spadiceo-viridi maius C. Bauh.

CAP. CLXXVIII.

Gramen hoc 40. C. Bauh. in prod. *Gramen verò Cyperoides 2.* in pin. radice est oblonga, multiplici, rufa, mixte capillata, caulibus triangulis, cubito minoribus: *foliis* Arundinaceis, pedalis, & quàm in vulgari angustioribus: spicis ternis, quaternis, rarius quinis, alternatim succedentibus, angustis, trium, quatuorve vnciarum longis, coloris spadiceo-viridis, quarum primæ semper folium oblongum angustissimum subieciunt.

Hoc in humidis ad Sellam novam Montpessulani primum vidimus: dein ex Lusatia à D. Franco graminis *Sprauvaldensis* nomine accepimus.

GRAMEN CYTEROIDES ANGUSTIFOLIUM, spica spadiceo viridi, minus, eiusdem.

CAP. CLXXXI.

Et hoc auctori in prod. *gramen 41.* in pin. *gramen cyperoides 3.* in phyt. *gramen 57.* siue cyper-

roides angustifolium, differens à Cyperoides Lobelij potissimum foliorum forma, quæ in hoc duplè angustiora, acutiora & longiora.

Ceterum, radice est brevior, lig. ioriore, parum fibrosa, & rufa: caule triangulo, pedali, *foliis* angustis, duris, sempalmaribus, in acutiem desinentibus: *spicæ* aliquot angustissimis, oblongis, spadiceo viridibus, alternatim dispositis, & pediculis longis capillaceis insidentibus, quod Aprilis mense circa Birsam reperitur. Aliquando tamen altius exurgit.

GRAMEN CYPEROIDES ANGUSTIFOLIUM, spicis longis erectis.

C. Bauh. pin. *Gramen cyperoides 4.* siue angustifolium, spicis longis erectis: gramen palustre maius, Lob. icon. quid?

GRAMEN CYPEROIDES VULGATIVS aquaticum.

CAP. CLXXX.



Gramen Cyperoides vulgatus aquaticum tres, quatuor, nonnunquam plures profert radices, longas, nigras, vnciam crassas, Cyperolongo similes: *Folia* etiã similia, quæ non solum è radice, verum è culmi quoque nodis excrescunt. *Caule* laminis vero triangulari, cubitali: Flores dense spicatos, quos sublequantur spicæ quan-

doque simul quinque ferrugine clare, Tabern. Synon.

Gerard. & Lob. Icon. p. 20. *gramen cyperoides aquaticum*, vulgatus, Tabern. icon. & H. *gramen cyperum minus*, Groë. Exposit. p. 145: Loh. Hist. *gramen cyperum 6.* C. Bauh. pin. *gramen cyperoides 7.* siue panicula sparsa maius: Variat panicula in altera compactiore & brevior, in altera magis expansa & longior.

Vbiq; in aquolis, palustribus, & stagnantibus Locis reperitur.

GRAMEN TYPHINUM 3, TABERN. SPICA multiplici nigra, accedens ad Gramen cyperoides.

CAP. CLXXXI.

Radice firmatum, obliqua, nodosa, vnciam & plus crassa, fibris exilibus ceu capillis ornata pluribus, à quibus *folia* prodeunt trina, longa, culmos amplectentia genicularos, minoribus foliolis præditos: ad quorum exortus supra me-

Synonyma



Gramen nemorosum paniculis

GRAMEN NEMOROSVM PANICVLIS
albis, capillaceo folio, C. Bauh.

CAP. CLXXXII.

Synonyma
Descriptio

Cespitis instar Gramen hoc (45. in prod. Nemorosum glabrum i. in pin.) existit, quod ex radicibus capillaceis, folia copiosa, viridia, pilis tenuissimis sumilia, pedem longa, emittit: inter quæ culmi tenues geniculati, cubitales, aliquando sesquicubitales, penè nudi in paniculam rariorem, albicantem, palmo minorem, ex glumis paruis aristis donatis compositam, abeunt: in Querceto non longè Michelsfeldâ copiosè provenit.

Locus.

GRAMEN CYPERINVM NEMOROSVM.

CAP. CLXXXIII.

Descriptio



Gramen cyperinum nemorosum

Synonyma

Tabern. icon. & Hist. Gramen cyperinum nemorosum vnde Cyperus gras. Eid. Hist. Gramen cyperinum. Calp. Bauhin. pin. Gramen nemorosum

diam pennæ longitudinem spica surgunt longæ, asperæ, atque nigre. Sapor acidus, adstringens.

Tabern. icon. & Hist. Gramen Typhini, lischgras.

C. Bauhin. phyt. Gramen 48. Eid. pin. Gramen typhoides 7. siue spica multiplici: Calamagrostis prima Tragi descript. Cyperus typhinus Ger. Amans vitorum pratorum.

sum glabrum 2. siue Gramen nemorosum spica subnigra, recurva: Gram. cyper. nemorosum Tab. & Gerardi.

Hinc inde in sylvis, vli ginosis locis, herbaceis, & arenosis inuenitur præsertim autem in dem Osvalde & linden felscher gemard.

GRAMINIS CYPEROIDIS GENVS, PSEUDOCYPERUS Lobelio spicis vel panniculis pendentibus ex longis pediculis.

CAP. CLXXXIV.



nigra in sicca planta latiores, in quibus longiusculi pili.

Lobel. Hist. Belg. p. 109. & Icon. Plant. pag. 76. Pseudocyperus wälsche wilde Galigaen.

Calp. Bauhin. Phyt. Gramen 63. siue Pseudocyperus primus & secundus: Eid. pin. Gramen cyperoides 5. siue spica pendula brevior: Pseudocyperus Geln. hort. Lob. icon. Dod. Pseudocyperus & Thal. Gramen aquaticum, Lugd. Maius & minus habetur.

Cæterum & Pseudocyperi, seu Cyperi sylvestris, altero genere hoc scribit Thalius. Pseudocyperum & Pseudocyperus nomino, quod quidem, quoad folia & radicem [quæ huic quoque nigricans est, crassa, & frequenter capillaceis fibris oblecta] priori simile est, sed capitulis seminiferis differt, quæ licet ut prius, in summo caulis ex nodoso tuberculo emittit in singularibus pediculis oblongis contenta, ea tamen pauciora, rariora, ac flauiscentia sunt, & squammata. Estque hoc rursus duplicis discriminis: Pseudocyperus enim & Pseudocyperus maior, multis in locis reperitur, foliorum magnitudine ac latitudine, caulis item proceritate & paniceis summius. Minor verò radice constat parua, spadicæ, fibrata, folia continens Milio breviora, digitalem longitudinem raro excedentia: cauliculum emittens, dodrantalem, interdum paulò longiorem, tenuem, paucis minoribus ac tenuioribus foliis ornatum, in cuius summo ex tuberculo nodoso, pauci, & tenues breues, pediculi emergunt, capitula parua, pauciora raræque & squammata, spadicæ coloris exhibentem.

GRAMEN

GRAMEN CYPEROIDES SPICA PENDV-
la longiore & angustiore, C. Bauh.

CAP. CLXXXV.

Caulis est cubitali, anguloso, striato, foliis oblongis, angustis, basi oblonga, caulem instat tubi vestientibus, ex quo veluti tubo, spica singulae, vncias quatuor vel sex longa, angustae, prodeunt & propendunt, ipsum vero folium cuilibet spicae subiectum oblongum est.

Hoc gramen 42. C. Bauh. in prod. seu, vt in pin. vocatur, *gramen cyperoides* 6. siue spica pendula longiore & angustiore, locis humidis circa thermas Apponenles, Patauinorum crescit.

GRAMEN CYPEROIDES PALVSTRE
triquetrum, spica integra.

CAP. CLXXXVI.



Triquetrum Cyperi tollit caulem cubitalem & sesquicubitali, cuius fastigium ornat spicae, Panici quodammodo similis, rariore textura, sesquicubitalis & sextantalibus, in loculis triangularibus nigricantibus, aut ex viridi rufescentibus *femina* continens Milio ferè æquale, compressius. Radices fibrosae, perplexae, ex deciduorum foliorum fibris comolae: *f. l. a.* mediocriter lata, caulem ferè longitudine aequans.

Lobel. Hist. Belg. p. 20. & 29 water wilde Galgaengras. *gramen cyperoides palustre*: sic & in Ic. p. 19. & Gerardo. Tabern. icon. & Hist. *gramen cyperinum palustre*, wasser cyperograss.

C. Bauh. phyt. *gramen* 59. siue cyperoides palustre: Eid. pin. *gramen cyperoides* 8. siue palustre maius spica compacta: *gramen iuncum triquetrum*, Thal.

Locis aquosis obseruau: Geneuz.

GRAMEN CYPEROIDES SPICIS MINORIBUS, minus compactis, C. Bauh.

CAP. CLXXXVII.

Ex radice fibrosa, lignosa tamen, folia prodeunt angusta, graminea, palmum longa, inter quae caulis sesquicubitalis, triquetrus, subasper, & magna ex parte nudus exurgit: in cuius summo spica parua, diuisa, & quasi aculeata consistit, quae femina oblonga, subnigra, in aculeatum cuspidem desinentia continet. Huius tres differentias notauimus: 1. est latioribus & lon-

Tom. II.

gioribus foliis, spicis maioribus, & ad triulum molendinarium vrbis nostrae trans Rhenum reperitur. 2. à priori rarioribus & minoribus spicis differt, & in via Riechana ad sepes crescit. 3. foliis est angustioribus, breuioribus, spicis inter duas priores mediis, quod Patauij locis humidis anno 1578. collegimus, & cum D. Guilandino ostendissemus, Ichnæmon Plinij censuit, quod non probamus: idem sed per omnia minus anno 1579. Monspeffuli in humidis inuenimus, quod *gramen cyperoides* nominabant. Et haec sunt, quae de suo Gramine (vt in prod. vocat) 41. vel (vt in pin.) de Gramine cyperoide 9. siue spicis minoribus, minusque compactis, author prædidit.

GRAMEN PARVVM SYLVATICVM, PANICULIS forma pedum autum.

CAPVT CLXXXVIII.

Numerosas, sed & prolizas habet fibras, te- Description
nues: folia multa, nonnihil aspera, culmum ferè æquantia, qui dodrantalis, enodis, paniculas in summo gerit rufas, partim culmo appressas, partim digitatim ab eo recedentes.

Geneuz obseruau in sylvis. Idem reperi prope Machon in Burgundiorum montibus, florens Maij principio.

GRAMEN CYPEROIDES EX MONTE
Ballon, spica diuisa.

CAP. CLXXXIX.



Folia sabin- Description
de dodrantalia, & breuiora, prutenis graminis in morem angusta: caulis triangularis, nullo utriculo donatus, cubitalis & sesquicubitalis, paniculam diuisam gerit in summo fastigio, Cyperi minus speciosi, corrugato folio subiecto, radicem fibre graciles, contortae.

Lobel. Belg. Synon:
Hist. pag. 19. &

20. Heyne waterwilde Galgaengras, *gramen cyperoides paruum aquaticum*. sic & Leon. plant. 19. & Gerardo: Tabern. Hist. & Icon. Heyn wasser cypergrass *gramen cyperinum palustre minus*.

C. Bauh. phyt. *gramen* 60. siue cyperoides palustre alterum. Eid. pin. *gramen cyperoides* 10. siue palustre maius spica diuisa.

Gramen cyperoides obseruau in monte Bal. Locus non inter Gerarmegni & Locharingiam cum suis spicis mense Augusto.

GRAMEN PALVSTRE ECHINATVM.
CAPVT CLXXX.

Gramini palustri cyperoidi affine, cui tamen Description
magnitudine cedit: summo cauli spicae ad-

T t 2

HISTORIAE PLANTARVM.

nascuntur paucula, semunciam longe, viridantes, triangularibus loculis minoribus, semen triquetrum quoque continentibus, muricate, quibus supereminet summum occupans fastigium, imperfecta spica rufescentes, longior fere duplo, vix sextam crassitudinis partem aequans, mollis, meris squamulis contexta. Radices prorsum agit, nigricantes.

Synonyma

Hist. Lugd. pag. 1003. Gramen aculeatum. Lobel. Hist. Belg. pag. 16. watergras met steefende arenegras. Eid. Ic. Plant. pag. 15. Gramen palustre echinatum. Casp. Bauh.

Varietas.



aculeatum italicum vel maius.

Geneux & Montbelgardi in paludosis occurrunt.

GRAMEN MARINVM CYPEROIDES.

CAP. CLXXXI.

Descri.



cuius basi apposita tria folia caput superantia, porracea, albescentia, dura, palmaria: nullo vel sapore vel odore excellit.

Synon:

Lob. in Adu. Iuncus Cyperoides maritimus, & Gramen maritimum cyperoides: Eid. plant. Icon. p. 37. Iuncus maritimus: sic & Tabern. Iuncus maritimus altus. Pena. Hist. Lugd. pag. 1396. sine icone: Eid. p. 1391. Gramen maritimum Dalech. amp. C. Bauh. pin. Gramen cyperoides 14. sine maritimum.

In littoribus & arenosis Narbonæ & Gallo-L. provinciae prouenit.

CYPERVS IN GENERE.

CAP. CLXXXII.

Cyperus (male Gaza apud Theoph. Gladiolum conuertit) in lacu Orchomenio prouenit & vt reliqua radice numerosa adhæret, nam illa deorsum versus potissimum vertitur, viretq. intendit, qua de caula vix hæc interit, & omnino genus eius vniuersum diuturnus est. Radix plurimum in æqualitate à cæteris distat, quod pars quadam crassa, carnosaque sit, quædam gracilis atque lignosa. Quin & germinatione generationeque refert: nascitur enim de ramaceo illo radix altera tenuis, iuxta latus: deinde caro rursus in eo conglobatur, ex qua sese caulis promit, qui æqualitatem quandam peculiarem sortitur, in quo possum germen est. In profundum quoque radices eodem modo demittit, quamobrem omnium maximè mori contumax, cuellique difficilis est. Ei inter frutices, vt cæteris similibus palustribus harundinacea ex plantæ geniculis folia prodeunt. At verò odoris contraria ferè natura in loco est. Nam quamuis odoratus & siccus suapte natura sit, tamén viridis aut nihil olet, aut non æquè: sed eius etià vigor intelligi debet. Sapor autem, aut odor, hæc propter caulæ cognationem inferre placuit, aut suauitas, qua eueniat ratione lege Theophr. de caus. lib. 6. c. 16:

Cypero, quem alii Erythraeum vocant, Dioscorides folia tribuit Porro similia, longiora tamen & graciliora, caulem cubitalem, aut etiam maiorem, angulosum, lusco odorato rotundo similem: in cuius vertice folia parua exoriantur & semen: radices autem subsunt, quarum & vixus est, oblongæ velut Oliuæ, inter se coherentes, aut etiam, rotundæ, nigra, odoratæ, anaræ. Nascitur in locis cultis & cænosis. Optima est radix quæ grauissima est, & densa ac plena, ægrè fragilis, aspera, odorata, cum aliqua acrimonia. Talis autem est Cilicia & Syriaca, & ab insulis Cycladibus petita.

Bulborum generi quidam [auctor Plinio lib. 21. cap. 17.] adnumerant & Cyperi, h. e. Gladioli radicem. Doleis ea est, & quæ decocta panem etiam gratiorem faciat, ponderosiorémque simul subacta. Non dissimilis est & quæ Thesion vocatur gustu aspera. Cæteræ eiusdem generis folio differunt. Mago & Gladiolum alterum, quem Cyperon vocant, & ipsum palustrem, Iulio mense toto secari iubet & radicem, tertioque die Sole siccat donce candidus fiat. Quotidie autem ante Solem occidentem in lectum referri, quoniam palustrib. defectis nocturni rores noceant. Quidam (subdit Plin. cap. 18.) etiamnum vnum genus faciunt, Iunci trianguli, Cyperon vocant. Multi verò non dissocant à Cypero vicinitate nominis. Nos distinguimus vtrumque. Cyperus est Gladiolus, vt diximus, radice bulbosa, laudatissimus in insulis Creta, dein Naxo, & postea in Phænice. Cretico candor odorque vicinus Narodo, Naxio acrior, Phænicio exiguum spirans, nullus Aegyptio: nam & ibi nascitur. Discutit durities corporum. Iam enim remedia dicemus, quoniam & florum odorumque generi est magnus vsus in medicina. Quod ad Cyperon attinet, Apollodorum quidem sequar, qui negabat bibendum;

benda n: quanguam professus efficacissimū esse: aduersus calculos, eos fouet. Fœminis quidem abortus facere non dubitat. Mirū quæ tradit, Barbaros sūfita n hais herbe excipies ore lienes confu nere: & non egredi do nibis, nisi ab hoc sūfita. Vegetiores enim finiorē quæ sic etiam fieri. Inter triginum & alarum vitius, perfrictionibus cum oleo illitum non dubiè mederi. Cyperos luncus est, q ualiter dixim is, angulosus, iuxta terram candidus, caca nine niger, pinguisque. Folia imā porraceis exiliora, in caca nine minuta, inter quæ est semen. Radix Oliæ nigra si nilis, quum, cū n oblonga est, Cyperida vocant, in igit in medicina vsus. Lius Cypero prima A n noniaco, secunda Rhodio, tertia Turcio, nouissi n Agyptia, quod & confundit intellectum, quoniam & Cyperos ibi nascitur. Sed Cyperos durissimā, vixque spirans. Ceteris odor & ipsis Nardu n imitans. Et & per se Indica herba, quæ Cyperis vocatur, Zingiberis effigie: commendata Croci vim reddit. Idem lib. 17. cap. 13. de germinatione arborum dicit, occyssi nam omnium Cyperum & Pseudo-cyperum inter frutices esse, cū nque protinus florete, semē nque proferre. Et hi sunt loci, quibus de Cypero egisse constat, & cum eo gladiolum confundisse.

Et hæc fortè occasio est, quod vagum & commune multis nomen sit Gladiolus. Nonnulli (inquit Hermol.) distinctionis gratia Cyperon pro luncō triangulari, siue quadrato nominant. Non defunt qui Pseudo-Cyperum vocent Gladiolum, de quo Plinius inter occyssi mas plantas. Qu idra- rum autem & angularis ad differentiam rotundi Iunci (quem Schænon Græci vocant, cognominatus intelligitur. Penultimam Cyperi quandoque diphthongo longam, quandoque vocali breuiem Græci scribunt. Dicitur hæc & neutro genere Cyperam à Paulo. Habetur & Cyperus Indica, quam Plinius Cyperin appellat, etiamsi quibusdam exemplaribus Cypera legatur. Non possum non mirari quamobrem Laur. Valla Cyperum in Herodoto Siler conuerterit.

Cyperum Gallia officinæ nominant: ast rura, referente Ruellio *Soucheti* nomine norunt, quod Iunio mense radicitus erunt, digeruntque stipites in manuales fasciculos, quos prius insolatos aceti imbre perspergunt, siccatoque frustatim tundunt, vt odoris grana vestes interpositis commendent. Sunt qui censent Cyperum hunc, quæ Gladiolum in Theophrasto Theodorus vertit à Dioscoridis Cypero dissidere. Verū nusquam à priori finitione posita superius inuenitur desciscere, imò Dioscoridis placita firmare. Siquidem eius radix magna inæqualitate notatur, quod pars quædam crassa carnosaque, quædam gracilis atque lignosa sit. Nonne vides radicis tenuitatem furculosam protinus in oliuaria tubercula verticillari? Radices in altum duci, euelli, morique contumaces quis non videt? Quod si reliqua quæ sparsim à Theophrasto traduntur, prosequi libeat, inuenies huic nostro Cypero suffragari. Nam palustrem esse idem affirmat author, caule enodi, folio harundinaceo, tam terrenis quàm aquosis, vliginosique prodeuntem: radice partim tenui, partim carpolā, neruosaque, quæ vnguentis expectatur, quæ non de Xiphio, id est, Gladiolo possunt audiri, cū merito debeat vnguentis abdicari, vt pote virus olens, vnde spathulæ fetidæ nomen ei dederunt officinæ: namque suā odoris grauitate lautiorum vnguentorum gratiam aboleret. Vides ergo horum dicta auctorum in

Tom. II.

eandem herbam referri. Plinius alteri iudicio subscribit, sed fore suspicor eum dotes Cypericam Gladiolo confundisse, vagi nque iis & cōmuni nō nomenclaturā imposuisse. Cū n Theophrastus per α diphthongā n *αυπερον* scripserit, cū n ad nos venit, aliqui e, aliqui i, ex vna retinuerunt, Græci quandoque diphthongo, q uandoque vocali breuiem, penultimū scripserunt. Cyperum tamen Theophrasti, à Cypero Dioscoridis nullo discrimine separari docuimus. Gale- nus & Paulus in simpliciū n censu vnus tantū meminerunt, non alioquin omissari, si aliqua di- uersitate leuaretur. Nec Plinio (qui in gladiolo Apollodorum, in Cypero Dioscoridem, aliōque Græcos sequitur) gladiolus à Cypero differt odore. Quare cū n mihi Græci omnes altipellantur, longe tutius faciet vnū genus facere, neque discernere aut distinguere in gladiolum, qui Cyperus dicitur, & Cyperum. De angulis Cyperi, grauis inter Autores discordia. Cel- sus quadrangulum suū vocauit, Plinius Triangularem, Dioscor. angulosum, qui item videtur diremisse, & vtriusque historiam confirmasse. Est nō a longè dissimilis radix, quæ vocatur o ficinis recentioribusque Medicis galanga, odore Cyperam quadantenus imitante: vnde multi herbarum coniectores Cyperum Babylo- niam cogitauerunt: Et hæc Ruellius de Cypero est sententia.

Fuchsius depingit & describit Cyperum longum, sicuti Tragus, qui dicit hæc nomina *αυπερος*, *αυπερις*, & *αυπερις* diuersarum plantarum appellationes quidem esse: & tamen indifferenter à plerisque cypero longō attribui, qui à Dioscoride Aspalathum quoque & Erysiceptrum cognominatur, licet & hæc appellationes ad alias quoque pertineant plantas. Hæc Tragus, qui quomodo dicat Aspalathum vocari cyperum nondum video, id non dicit Dioscorides.

Sed his omisis videamus quid dicat Cordus, Plinius, ait, inter cyperum & cypium differentiam facit, sed magno errore. Reuera enim nihil differunt: quare siue cyperum siue cypium pronuncies, aut alicubi scriptum reperis, eadem erit planta. Est autem cyperus luncus odoratus, angulosus, triangularis siue, à quibusdam etiam quadratus appellatus, sed malè admodum, non enim quadrangularis illi est, sed triangularis caulis. Eius autem duæ species: alter longas habet radices, is Græcis vocatur Cyperis, in pharmacopoliis verò cyperus Romanus siue longus: alter rotundas habet & sibi inuicem coherentes radículas, quem pharmacopolæ cyperum rotundum appellant: Græci autem simpliciter: Germani vtrūque vocant *wilden Galgan*. h. e. siluestrem Galangam. Parcius affertur ad nos longus cyperus. Hæc Cordus. Syluius & Matthiolus, sicut & alii, ajunt reperiri quadrangulum, quod Cordo contrarium est.

Matthiolus, qui Cyperum longum depingit, hæc notatu digna habet. Tametsi vnū tantū cyperi genus memoriæ prodiderit Dioscorides, cuius radices inter se coherentes oblongas referunt Oleas, aut omnino rotundæ sunt: visitur tamen cyperus in pluribus Italia locis qui radicibus constat longis. Et nascitur hoc cyperi genus laudatissimum propè Timauī fontes, circumstantibus palustribus locis in Iaspidiæ finibus, Galangæ vocatæ persimile, non tantū facie, sed etiam odore: commendatur etiam mihi

Plin. nō

Gal. Cyperus
Paulo
cui CyperusCyperus
Gladiolus
nullus.Galanga
dicitur à
multis Cyper.
BabyloniamFuchf. &
Trag.Trag. re-
dargaturCordus.
Plinius
eror.Cyperus
quadratus
nullus.Contrā
Cordum

Matth.

Cyperus duo
genera
contra Diosc.Lacus
cundis.

odore is, qui in Hetruria prouenit, radicibus ferè Filipendulæ æmulis, sed non ob id illi fuerit preferendus quem Syria mittit: quandoquidem hic longè odoratior est, & subamarus, &c. Reperitur cyperus quandoque etiam quadrangulari caule, vnde non mirum, si quadratum luncum cum vocauerit Celsus lib. 3, cap. 21. Optimus deferitur ad nos ex Syria & Alexandria Aegypti in cuius defectu Italicum supponunt Officinæ.

Cyperus quadrangularis.
Delectus.

Amato Cyperi tres species.

Inter alia species.

Luncus quadrangularis imitator.
Aratus Celsi.

Auellanada.

Locus.

Luncus triangularis Plinii.

Cyperus germanicus radices.

Cyperus Dioscoridis.
Romana cella.

Consultius mea sententia esset [Amati verba sunt] si in præsentia cyperi tres species potius describerentur, quàm duæ tantum, quum reipsa conspecta, ita esse comperiamus: nã altera species luncus est, folia Porri in parte decliniori habens, longiora tamen & exiliora, in cuius cacumine minuta sunt, inter quæ semen exoritur: cui caulis cubitalis & maior inest, qui plerumque quadrangularis conspicitur, nam radices rotundæ, nonnunquam oblongis oliuis sunt similes, nigrae, suauiter olentes, & gustu aliquantulum amaricantes: hanc verò Celsus, verus Hippocratis imitator, quadratum luncum appellauit, cuius in aquis & palustribus plerumque nascentis radices, medico vsui seruantur: quibus vniuersa Hispania abundat, nec opus habet Syriacis, quas suâ voce præcipue Salmanticenses Auellanada vocant: nec enim in Italia, præsertim Longobardia desunt, sed myropolæ parum curiosi communioribus radicibus earum loco vtiuntur, iis autem radicibus affinis cum voce, tum figura, alia radix, quam vniuersa Lusitania iuxta ac Hispania luncus auellanada vocant. Secunda autem species cyperi, vbique in aquis comperitur foliis à prima non dissimilibus, caule tamen triangulari, cuius radices oblongæ, &c. Hanc Plinius triangularem appellauit luncum, cuius radices, Hispaniæ & totius Italiæ mulierculæ, aceto paratas, pro odorameto ac suauis fusu recondunt. Nec communiores officinæ alias præter has radices, pro vero cypero monstrant, habentque, quum tamen illæ primæ, oliuis similes, à Dioscoride vt præcipue commendentur. Hanc verò secundam speciem nominari cupimus, cui veluti & primæ Dioscorides caulem, non quidè triangularem, aut quadratum inesse dixit, sed angulosum potius, vt nos cautos redderet, quod cyperus & triangularis & quadratus reperitur. Item quod melius esset, triangulari illo, radices oliuis similes habente vti: quanquam & altero, pro uero dexterrimè vti possumus, prout hoc tempore myropolæ continuo factitant. cyperi species, quam Dioscorides secundam facit, ex India ad nos vsque fertur. Huc vsque Amarus.

In seplasiis radices cyperi cognominæ longi ostendunt, ex qua autem planta collectæ sint, mihi (inquit Cronenburg.) incognitum habetur, quandoquidem nemo hactenus eam aperuerit. Indubitatum tamen est, omnes selapharios illis radicibus vti. Sed dum hanc rem diligentius inquiri, & has radices per omnes qualitates examino, animus inclinat, vt ipsius cyperi germanas radices esse credam, ac prorsum eas, quas in Italia Matthioli & Amarus nasci memorie prodiderunt.

Monachi gloriantur se collegisse verissimi Cyperi Dioscoridis radices in Romano solo, ac etiam intus Romam. Eas quidem non excedere Oleum figuram & magnitudinem, & esse conuexas ad inuicem, folio mediante, sicut radices herbæ Filipendulæ. Nullam denique notam à Dioscoride positam deesse eis. Plantam etiam similiter conuenire descriptioni Dioscoridis, ex-

cepto quiddam respectu alterius plantæ, sc. Cyperi vniuersalis, hæc minor sit. Rarè equidem luncum triquetrum supra binum palmum erigi. Supradictæ autem cyperi vniuersalis plantam multoties vltra nonum palmum protendi. Huius igitur dicte paræ plantæ cyperi radicibus vtendum esse, cõtra communem vulgarem vsum. Et indubiè tenendum, hunc esse verum cyperum Dioscoridis: nec obstat quod in Italia sit parua planta, cum & Dioscorides dicat caulem eius cubitalem esse aut maiorem. Verum propterea non volunt asserere illum magnum seu vulgarem non esse cyperum. Quia licet ab ipso Dioscoride & aliis authoribus non præcisè scribatur, habet tamen [excepta radice] omnes alias notas cypero attributas. Nec magnitudo eius facit aliquid: vt non sit cyperus. Fatentur enim ipsi esse cyperi speciem: sed à veritate formæ radicem ipsorum; alterum rotundum, alterum verò cyperum longum, appellandum concludunt: In vnum autem medicum rotundum magis commendant.

Anguillara, aliter ac alii, videtur existimare cyperum Theophrasti à Diosc. differre, cum ait: cyperus cum ille qui descriptus est à Theophrasto, tum ille Dioscoridis, notissimus est in Italia. Vterque est in horto publico Patavino. Hæc Anguillara.

Dodonæus duarum specierum meminit nempe longi & rotundi. Quod ad rotundum attinet, nescio de quo loquatur, radicem non exactè describit.

Antidor. Florentinum meminit trium his verbis: Duorum generum in Italia reperitur: Vnum exiguum, cui radices Oleæ similes: Alterum maius, cuius radices inæquales & contortæ. Hodie quæ ex Oriente adferuntur melior est nostrate. Hæc Collegium Florentinum.

Cyperum (inquit Corn.) quem Celsus iuncum quadratum appellat, & Plinius triangularem, Diosc. simpliciter angularem dicit, & simile gignit, id est iuncum rotundo ac odorato à Celfo dicto. Nec cyperus alius à cypero est, velut Plin. ex Theophrasto putauit, qui tamen eandem quæ Dioscorides descriptionem habet. Nec Galenus, nec Aetius, nec Paulus amplius quàm vnum cyperum agnoscunt: cyperis tamen priuatiim radix cyperi dicitur. At cyperi species in India nascens Zingiberi similis, ea esse creditur, quæ tamen hodie Zingiberis radicibus ammixta reperitur, dum ex India illæ afferuntur, & per Italiam ferè, itemque in nostris Officinis Curcuma appellatur. Reperitur etiam inter Zingiberis radices allata, radix fulua, geniculata, ponderosa, acri admodum sapore, quæ Officinis Galanga appellatur minor: nam maiorem diximus esse Acorum: & hanc cyperi aliquam speciem esse Herbarii sagaciores conieciunt, & Babylonicum cyperum appellant. Hæcille.

De Cypero cuiusque speciebus, hæc Casp. Bauhin. in pin. nomen aut nomen, à radice effigie, quæ pyxidulam aut vasculum pusillum imitatur, nomen accepisse videtur. Genera duo Dioscorides lib. 1. recensuit: alterum radice rotundâ, quod Officinam cyperum vel alterum Zingiberis effigie, quod in Officinis Curcuma dicitur.

Cyperus alius amarus, alius dulcis est: amarus, vel odoratus, vel inodorus: vterque vel rotundus, vel longus: dulcis verò vel angustifolius, vel latifolius est.

Klimes aut klimes & klonon: Græcis: Latini cyperus dicitur, Officinæ Latium nomen retinent. Iuxta Diosc. spuria numeratur: Romani

ni vocant *Iunci radicem*, alij *Iuncum*. Germ. *wilden galgaer*, & *wollichende eckere Bingen*, hoc est sylvestrem galangam & iuncum odoratum angulosum (à caule nimirum) nominant. Gall. *Souche*, fortè à radice quam Galli *Souche* vocant cuius vis & usus est præcipuus. Arab. *Saber adè*, Hisp. *Iuncia de olor*, & *Iuncia asellanada*, vt ait Matth. Amatus tamen dicit Salmanticens Pharmacopolas *Anellanada* vocare, & *iunca anellanada*.

Cyperi vetera genera nota nostro seculo sunt tria, præter Indicum, quæ cognita fuere Matthiolo, Collegio Florentino & mihi, Quorum 1. Iungus, Secundus quem rotundum nigrum Italicum vocamus, qui Dioscoridis videtur. Tertius est rotundus Syriacus magnus.

Cyperi autem non. nunc aliquot donantur plantæ, in primis cyperi genera, de quibus hoc capite agitur, cuius radices oblongas dicit Plinius vocari cyperida. Secundò cyperus Plinio quæ est xyphron & gladiolus de qua suo loco. Tertio est cyperus in India Dioscor. de qua cap. de cypero Indico, apud Plinium cyperis dicitur cap. 18. lib. 21. Officinis *Terra merita*. Quarto cyperi nomine donatur Galanga, sunt enim aliqui qui cyperum Babylonicum cognominant, vt Ruellius & Syluius. Quintò est Pseudo-cyperus Plinio, qui an sit ex numero præcedentium vel planta diuersa difficile est diiudicare.

CYPERVS PANICVLA SPARSA SPECIOSA.

CAP. CLXXXIII.

RAdices importuno reptatu luxuriant, circa Monspelium: longæ, mox in Oliuares portiones extuberantes, atque ita continuatæ vt in

Filipendula, odore grato, colore fusco: Culmi triquetri, bicubitales, striati, quos à radice statim comitantur folia multa longa, pediculi palmares, & dodrantales, aut etiam vix vinctiles, paniculae plurimæ, diuise. Habent Scapulae cyperum longam, quæ nec ipsa nodis destituitur, sed qui minores sunt quàm Syriacæ, maiores quàm

Creticæ, nec ita rotundi, sapore & odore suauis aromatico cum amaritudine. Hanc cum Monspeliana eandem autumno. Si figura non fuisset sculpsit meliorem curassimus parandam.

Histor. Lugd. figuram titulo cyperi nostratis longi odoratoris posuit ex Lobelio: & præterea aliam pag. 991. à Matthiolo simpliciter nomine cyperi: vna meo iudicio sufficeret imago: nec duæ diuersæ plantæ exprimentur.

C. Bauh. pin. *Cyperus longus odoratus* 1. siue cyperus odoratus longâ radice: & *Cyperus officinarum* 2. cyperus radice gracili & sarculosa Theophr.

Tom. II.

Cyperida, Plinio. *Cyperus*, Matth. (qui & longum & rotundum vulgarem vna figura exprimit, vt & Lugd.) Ang. Fuchf. Tur. Lac. Geln. cat. (cui & Iuncus angulosus) Cast. *Cyperus Romanus* siue *longus*, Cord. in Diosc. *Cyperus longus* (odorator, interponitur in Ic. plant. pag. 75.) Lob. Ad. Eid. Obl. p. 40. & Hist. Lugd. *Cyperus longus*, Cord. Geln. hort. Dodon. Camer. Tab. Ger. *Cyperus secunda species*, Amat. *Cyperus primus* & maior, Cxf. *Galanga sive longa*, Germanis.

Græci nomen aut nomen: Ger. *wild Galgant*. Nomina hoc eo, galangam sylvestrem, & *wollichende eckere Bingen*, id est, Iuncum odoratum angulosum, vocant: Belgæ *wilde Galgaen*, Galli *Souche*. Quin & galang un Velcurienlem, quodd ibi multum proueniat, Corn. appellat.

Cyperus noster longus, de quo loquitur etiam Loëus: Fuchsius, nascitur in locis cultis & palustribus. In Germania non nisi cultus in hortis prouenit. Minuta folia in cacumine cum semine Iunio & Iulio mense producit. Dodonæus in Flandria tantum in hortis reperit. Sed licet asserant nonnulli cyperum in tractu Rheni gigni, Tragus tamen nulquam, quàm in hortis latum prouenire vidit. Matthiolo cyperi radicibus longis genus laudatissimum nascitur propè Tinaui fontes. Commendatur etiamnunc odore is, qui in Hetruria prouenit, radicibus ferè Filipendulæ æmulis: sed non ob id illi fuerit præferendus, quem Syria mittit. Longi habitioris, odoratoris Europæi frequentior multo prouentus & usus Septentrionalibus regionibus, vt Germaniæ, Belgio; Angliæ & Galliæ quàm Meridionalibus transmarinis: Lobelio & Pena testibus. Nos etiam cyperum quem descripsimus odoratum circa Monspelium variis in locis obseruauimus, vt iuxta urbem ad riuium non longè à portu S. Gille ad sinistram càmque cum flore mense Iunio, Obseruauimus etiam in hortis quibudam vt Tiguri Gelsneri, Paterniaci Io. Textoris Medici, Patavij, Gencuræ.

CYPERVS PANICVLA CRASSIORE MINUS SPARSA.

CAP. CLXXXIV.



Culmum Descriptio
 Collicit triangulari ad cubiti & sesquicubiti altitudinem, quæ stipant folia graminæ, striata, carinata, acuto dorso gibba: in culmi summitate folia duo aut tria breuiora angustiora, oriuntur, quorum sinu panicula se explicat fusca, strobilis pallentibus: radix è pluribus oliuaribus glandibus constat, colore foris fusco, intus albo, sub-

T r 4

HISTORIÆ PLANTARVM

stantia dura dulci: hinc adnata complura fila-
menta, glandiūque inter se connexus per fila-
menta fit, culmum crassitudine æquantia: virens
odore destituitur.

Synonyma

Lob. Obs. pag. 93. & Ic. pag. 75. Plant. Icon. Cy-
perus rotundus vel luncus angulosus: luncus qua-
dratus. luncus angulosus & triangularis Celli &
Plinii. Qui non describit nec dicit cuius cyperi
sit figura, in odori vel odori, vel ubi viderit. Do-
donæus de purg. nomine cyperi rotundi, vt etiā
in folio figuram ponit: quæ videtur respondere
cypero hic à nobis descripto.

Casp. Bauhin. pin. cyperus rotundus odoratus 3.
siue vulgaris. cyperus, Trago. Lob. Obs. cui &
luncus quadrat. Celli. luncus angulosus & triangu-
laris, Plinio. Cyperi prima species, Ama. Cype-
rus rotundus, Cord. in Dioscor. Gesn. hort. Dod.
Lob. Ic. Lon. Tab. Ger. cyperus alter radice o-
liuari, Cat.

Locus &
Tempus.

Montbelgardi suo nimio repleto molesta, flo-
rens Iunio & Iulio. Turnerus attulit nobis ali-
quando cyperum collectum Heidelbergæ, cum
pulchris nodosis radicibus, quem suspicamur
eundem cum eo quem descriptimus.

CYPERVS SYRIACA ET

Cretica, rotundæ.

C A P. CLXXXV.


Descrip:

Cyperus quam pro Syriaca accepimus Lug-
duni, delatam à Valerando Dourez ex Ita-
lia ad Theriacam, plerumque torosa, solida, far-
cta, exterius ruffa, transuerfis liris seu Zonulis
cincta, interius ex ruffa in album vergens, sapo-
re vegeto, etiam post annos triginta, acris & suba-
maro, Zedoariæ simili, sed ignauiore: turbinata,
vel globosa, crassis filamentis adhæsisse apparet.

Pro Cretica mihi data Lugduni cyperus quæ
Venetiis: Valerando Dourez missa, radix Oli-
uæ minoris,

rugosa, foris
nigra au ful-
ca, odorata a-
romatica &
amara.

Synonyma



Hos Cype-
ros referimus
ad Theophra-
sti, quorum
meminit lib.
4. cap. 11. & 1.
1. cap. 8. & lib.
9. cap. 7. & 16.
Item caul. lib.
6. cap. 16. & 17.
Plinius vocat
cyperum ge-
nus lunci tri-
guli, radice
Oliuæ nigre,
& cum oblon-
ga est, vocat
cyperida. Diosc. ὀλίαν & ὀλιδαντιον quorun-
dam. Cyperus præfertur à Matthioli. quem Sy-
ria & post Alexandria Aegypti mittit: quando-
quidem longè odoratior & subamarus, in huius
autem defectu Italicum supponunt officinæ.

Non adèò multi sunt anni, à quo quidam hor-
um Italiae rariorem, rotundum vocatum, alcant,

Lobeliūque copiam duorum generum rotundè



vocati ex Syriæ
emporis Ven-
etias aduchi
videbat, scil.
Dioscoridis
maiores hūc
& minorem
rotundum.

Cyperus al-
terum genus
Cæsalpini exi-
le, palmi al-
titudine, nu-
merosis est ra-
diculis, Oliuæ
figura, media
quadam fibra,
tanquam filo,
cōnexis, mul-
tū odoratis:
similes radi-
ces afferuntur
inter externa,
longè crassio-
res, exterius rubentes. Nostrium cyperum (vi-
delicet longum maiorem & minorem rotundum
de quo hic) aliqua ex parte à Dioscorideo dif-
ferre patet, licet viribus fortè non sit inferior.
Theophrast. cyperum vocat quem Theodoros
Gladiolum vertit. Plinius Cyperum differre
putauit à cypero; quem Gladiolum esse inquit:
vnde Theodori error.

Cyperus Hisp. luncus de olor, & luncus auellana-
da, Lusit. luncus de cheiro, Albasor, Longobard.
Tricola dictus Amato, est caule plerumque qua-
drangulari, radicibus rotundis, nonnunquam ob-
longis, oliuis similibus, nigris, Cornelio.

Antidot. Florent. cyperi in Italia genus exiguum,
cui radices Oleæ similes.

Lac. cyperis Oliuis similis Romæ vulgaris:
Item cyperus odoratior ex Syria & Alexandria.

Alpin. Aegypt. cyperus rotundus, Aegyptiis
Hedueg vocatus, cui radices sunt nigre, rotun-
dæ, magnæ Oliuæ crassitudine, multæque vni
radicis capillamento appensæ simul coheren-
tes.

Hist. Lugd. pag. 991. cyperus peregrinus, siue
Syriacus rotundus maior & minor.

Casp. Bauhin. pin. Cyperus rotundus odoratus 1.
siue rotundus Orient. maior. Cyperus rotundus Hed-
ueg Aegyptiis, Alpino. cyperus Dioscor. maior ro-
tundus Adu. cyperus rotundus Orient. maior vel
Babylonicus Rauv. cyperus maior Syriacus, Cam.
in Matthioli. cypero rotundo similis Cæli. cyperus
rotundus odoratus 2. siue cyperus rotundus Orient.
talis minor. cyperus rotundus minor Adu. cype-
rus minor creticus, Cam. & Matthioli. Orientalis
cortice est fusco: Creticus verò nigro.

In lacunosis palustribus, & cultis enascitur, vt
in Cilicia, Syria & Cycladibus, autore Diosc.

cyperi minoris radicem duplo minorem esse ait
Lob. Syriaca, quæ non modò è Syriæ montosis
humantibus, sed etiam Illyriæ & Apuliæ consi-
milibus natalibus ubi sponte prouenit, in Italiā
fertur emiturque magni. Cyperus rotundus
niger in Nilo flumine atque in pluribus Aegypti
lacubus vel locis palustribus copiosissimus est, re-
ste Alpino. Cyperi Syriaci radicem elegantem in
naturalium nostro thesauro adseruamus ab Illu-
stri Medico Patauino Hercule Saxonia missam,

qua

qui idem pro singulari sua humanitate & munificentia pluribus aliis exoticis Cherlerum donauit.

De huius viribus hæc Dioscorides: Vis ipsi est calefactoria, & aperiendi, urinam ciendi. Calculosis & hydropicis potu auxiliatur, itémque à scorpione ictis. Est ad vteri perfrictiones, & fomentis adhibita prodest, menses ducens. Facit etiã ad oris vlcera & depascendo prosperentia arida trita. Miscetur & malagmatis calefactoriis. Narratur & alia species Cyperi in India. Cyperi radices maximè vsui sunt exsiccantes pariter & exiccantes absque mordacitate, autore Galeno. Hæque vlcibus, quæ præ nimia humiditate cicatricem difficulter admittunt mirificè profunt: habent enim quiddam etiã adstringens: quapropter vlcibus oris conueniunt. Quin & incidendi vim quampiam illis inesse testificandum, quia & calculo vexatis congruunt, & urinam menselque prouocant. Cypero vis in Medicina Psilothi, vt refert Plinius, illinitur pterygii, vlcibusque genitalium, & quæ in humore sunt omnibus, sicut oris vlcibus. Radix aduersus serpentium ictus, & Scorpionum præsertim, remedio est, vulvas aperit pota. Largiori tanta vis, vt expellat eas. Urinam ciens, & calculos, ob id vtilissima hydropicis. Illinitur & vlcibus quæ serpunt, sed his præcipuè quæ in stomacho sunt, ex vino vel aceto illita. Apud Ægyptios maximos ad medicinam vsus habent radices. Sunt verò odorata, atque acuti saporis. Hæ calefaciunt, exsiccant sine mordacitate, incidunt, attenuant, orag; venarum aperiunt. Sed præcipuè ad vlcera oris: & pudendorum sananda familiarissimum ipsarum tum puluis, tum combustarum cinis, est remedium: ex ipsis paratum decoctum, vel puluis, stomachum, cerebrum, pulmones, vterum, nervos, articulos, aliquibus diebus sumptum, plurimum calfacit, siccant, roboratque naturalem calorem: ex quo omnibus morbis à cerebri tum frigida, humidaque temperie, tum frigidorum humorum distillatione concitatis, hæc efficacissimum sunt auxilium: non minùsque stomachi cruditatibus, humiditatibus, flatibus, anhelitibusque difficultati, orthopnææ, tussi, nec non hysteris omnibus, mulieribus ex frigido, humidoque vtero effectis, aliisque morbis, ab iisdem vteri causis obortis, & articulorum doloribus. Familiare satis remedium ad suppressos menses eas esse ibi expertum est. Decocto ac puluere ad frangendum tum in genibus tum vesica lapidem, ac ad ciendam urinam frequentissimè illi vtuntur, quod etiã non minùs in omnibus chronicis febribus ac aliis diuturnis morbis frequentant.

CYPERVS AQUATICVS SEPTENTRIONALIS Lobelio.

CAP. CLXXXVI.

Scrobibus item & riuis ad Scaldæ amœnissima fluente pone Nouam Antuerpiam urbem iisdem foliis & iubara panicula prouenit. Radices nonnullas, sed paucas, teretes, oliuareas, oblongiores instar Filipedulæ emittens glandulosas, gustu adstringentes, nulla odoris gratia. Lobel.

Lobel. Obs. pag. 40. l. c. p. 72. *Cyperus aquaticus septentrionalis*. *Cyperus aquaticus* Lobelii. Ca-



CYPERVS ROTVNDVS LITTOREVS inodorus.

CAP. CLXXXVII.



trus, in quo racemosa iuba congesta. Gustu subadstringit, radix frigida & sicca odoris & saporis expers. Lobelius.

Lob. Obs. pag. 40. l. c. plant. 77. *Cyperus rotundus littoreus inodorus*. Hist. Lugd. *Cyperus rotundus inodorus* Lobelii. Cæsalp. *Pseudocyperus*, cuius herbam Nocum in Hetruria vocant. C. Bauh. pin. *Cyperus rotundus inodorus* 2. siue. Anglicus.

CYPERVS LONGVS INODORVS SYLV. Lobelio.

CAP. CLXXXVIII.

Notratis Cyperi altera species minor inodora, semper neglecta, quam Theophrastius in

mer. hort. *Cyperus rotundus nigra inodora radices habens*. Cæsp. Bauhin. pin. *Cyperus rotundus inodorus*, 3. siue Germanicus.

Locus

IN Angliæ borealis & Belgij fluminum littoreis lene fluentiumque riuulorum, & maris alluionibus, Cyperi genus non inelegans, radicem longè latèrque sparsa sobole multis & bicubitalibus implexarum filamentis cypero rotundo parium oritur. Folia angulosa, caulis cubitalis & sesquicubitalis, nitidus, triquet-

Synon.

Locus &
Tempus.

Heliactra mifecbant suis quintis effentis.

Lob. Adu. cyperus longus inodorus. Eid. Icon. pag. 76. cyperus longus inodorus sylu. Catp. Bauhin. pin. cyperus longus in. d. - rus 4. siue Germanicus.

Cyperus adukterinus Gesn. in aquosis Genevæ circa Arues, florens mente Maio.

CYPERVS LONGVS INODORVS
syluaticus, vel montanus C. Bauh.

CAP. CXC.

Descriptio **R**adices habet oblongas geniculatas, rufescentes, folia plura, palmaria viridia, angusta, subaspera, ad principium membrana rufescente simul vestita: caulem haecenus nullum obseruimus: In syluosis montosis humidis, ut in monte nostro Mutero prouenit.

Synonyma Hic cyperus longus inodorus 5. Catp. Bauhin. in pin.

CYPERVS GRAMINEVS.

CAP. CXCI.

Descript.



Triquetrum cubitalis altitudinis caulem ferrugineum, folia comitatur, eius modico tenuis ferè complexa, ubi à caule recesserant, eius cacumine superantia, carinata, duplo Gramineis latiora, alioqui non ita dissimilia: summo caulis fatigio Miliaecæ in latum diffunduntur

panicula, granis confertis iunci grauidæ, quorū extortū folia subiciuntur, inferioribus, nisi minora essent, similia. Radix fibrosa.

Synon.

Lobel. in Adu. & Icon. Plant. pag. 79. cyperi gramineæ siue miliaecæ titulo ponit iconem, quæ non placet.

Hist. Lugd. duas dedit imagines, quasi distinctas plantæ. Iuncus latus pag. 988. & cy-

perus Gramineus, seu miliaecus Penz. p. 993.

Catp. Bauhin. pin. Gramen cyperoides 13. siue miliaecum: Pseudo-cyperus madagascariensis, Thalii.

Genevæ, Batilæ & Montebellardi frequenter & copiosè Maio mensis florentem obseruauit.

MALINATHALLE THEOPHR. ET
Anthalion Plinio.

Inter edules radices quas Aegyptus fert Malinathalles à Theophrasto, communerantur: ait enim lib. 4. cap. 10. Locis autem arenosis, haud procul à fluuiis distantibus, nascitur in terra, quod Malinathalle (μαλινάθλλη, Malinathalle Gaz.) appellatur, figurâ rotundum, magnitud. verò Mespili [μίσπλου, siue nucleo, siue cortice: folia ut cyperus, κνίσις, Gladioli Gaz.] mitit.

Has easdem planè notas suo Anthalio Plinius lib. 21. cap. 15. tribuit, dicens: Anthalion longius à flumine nascitur Mespili magnitudine, & rotunditate, siue nucleo, siue cortice, folio cyperi.

Mihi autem Trasi [de qua mox agemus] conuenire videretur cum Malinathalle, quod idem mecum sentiunt Cæsalp. Fab. Columna & Clusius. Contrarium verò tenet Bellonius, qui Malinathallen existimat esse Melanthalam siue Malinsana, cuius opinio nec mihi, nec Dodonæo, nec Clusio probatur. Nos de Malis insanis agemus 1. 34.

Dodonæus ait Malum quod vocant Aethiopicum cum Malinathala non conuenire. Idem sentit & Hist. Lugdunens. & meritis ut iudicauimus 1. 34.

HABALZELIN SIVE GRANVM
Alzelin Veteribus.

CAP. CXCI.

Habelzelin granum est pingue [inquit Serap. cap. 37.] Ciceris magnitudine, citrinum exterius, & album exterius, & habet bonum saporē & defertur ex terris Barbariæ. Auicennæ granum Alzelin est boni saporis, & oritur in partibus Herfur.

Habalzelin potest esse Trasi existimant Bellonensis, Matthiolus, Montanus, Gesnerus, Alexander Bened. Lobel. & Pena, Rauvolffius, Fumanellusque. Negant Guiland. & de Trasi paulo post agemus.

Matthiol. scribit Guiland. Aethiopicum Piper cum Grano Zelin confundere: Gesnerus verò Guilandinum Croni vel Piper Nigrorum cum Alzelin commiscere: vide Hist. n. g. l. 5.

T R A S I.

CAP. CXCI.

Non simul depositis in terra vuida radicū bulbis mihi enatū est Trasi, foliis quidem luxurians cyperinis, acuto dorso triquetris, minoribus, nec adeo stringenti infestis: verū nec caulem quem triquetrum aiunt, nec paniculas quas Cyperinis proximas asserunt, produxit: bulbuli verò cyperi modo circularibus Zonulis præcincti, paruum æquant Adellam candida dulci



dulci, compa-
cta, vesca carne,
ex radicum fi-
bris penduli.

An verò *Tra-
si*, Theophrasti
sit *ziziphos*, si-
cut & Antha-
lium Plinij
(quod ego qui-
dem tenco) Le-
ctoribus exami-
nandum relin-
quo. Meam opi-
nionem à Cae-
salpino confir-
matam inuenio,
& postea etiam
à Clusio. Bel-
lun. huius me-
minit in sine A-

tu. de nominibus Arabicis vocans eam *Al-
zelen* vel *Allezen*, Venetorum *Dulcighini*, & alio
nomine Arabico *Hal Alzizi*. Iul. Scaliger huius
mentionem fecit, dum ait *ziziphos* falsò putarunt
esse eam, quam terrestrem *Ziziphum* vocat vul-
gus. Námque in nostro agro ea sunt *Chamaezi-
zipha*.

Cord. in Obs. flua, Herbarum radice Nucis a-
uellanae figura & quantitate (ita enim vocat
Trafi) suspicatus fuit, esse xyphion Theophrasti,
aut Ornithogalon, aut *Moly* siue *Myle*, cum tamen
nec vili plantarum à Veteribus denominatarum
respondeat.

Matthiol. in Epist. ad Fallop. Oloconitis Hip-
pocr. non est *Trafi*, quod Veneti *Dulcighinum*:
perperam Guilandinus contendit contra Bellu-
nensem Granum *Zelinum* apud Serapionem non
esse *Trafi*: *Aethiopicum* Piper cum grano *Zelinum*
confundit, perperamque Bellunensem impugnat:
Facultates grani *Zelinum* Auicennae respondent
Dulcighino. Idem in Dioscor. *Trafi* saporis dulce-
dine castaneis proximè accedentes, sunt radícula
figura ac forma persimiles sericinis Erucis, quæ
seruienti balneo elixæ contrahuntur, dum serica
stamina inde mulieres conglomerant. Folia far-
ragini similia, cuius radicibus *Trafi* coherent:
Has verò satis repræsentare videntur radices il-
læ, quas Doronicos vulgus Officinatum nomi-
nat. Et in Epit. *Trafi* ita Veronensibus appella-
ti, Venetis *Dolzolini*: folia in cacumine mucro-
nata, cyperi modo, quem quidem planta tota
plurimum imitatur. Caules enim edit cubitales
& angulosos, in quorum cacumine folia exiliora
in stellæ modum radiantur, inter quæ flores spe-
ctantur spicati subfuluëscētesq;. Radices habet
numerosas, è quibus globuli dependent bulbosi,
oblongi, subrubelcentes, Fabarum magnitudine,
etiam grandiores, alba dulcique intus medulla,
scabro putamine. Matthiolus olim Iconem po-
nebat in qua nulli caules nec flores, ea figura
est minùs artificiosa, potiss. quoad radices: in e-
pitome postea & aliis commentariis mutata est
icon & descriptio, additæque sunt caules & de-
scriptio non ex autopfia, sed fortè ex icone aut
descriptione missa per Calzolarium, quam bene
relinquimus iudicio Ioh. Pome Pharm. Veronen-
sis.

Amatus in Diosc. cyperò affinem ait, & in v-
niuersa Lusitania ac Hispania *Iunca auellana* vo-
cari refert, significantius tamen Iuncum Auella-
nam.

Parum absuit quin *manu* *Manu* meditaretur Guil-
landinus *Mamiras* apud Paulum, & *Holoconitum*
apud Hippocr. non modò diuersorum genitum
plantas denotare, verum etiam vtramque vocem
ab Itatorum *Dulcichinis* (quæ Veronenses *Trafi*
& *Trafi* vocant, Genuenses *Ziziphos* terrestres,
Hispani Iuncum *Auellanam*, Arabes *Habbas* &
discrepare. Est idem autor *Dulcichina* *Bonborghis* &
dici non posse. Nihil tamen ob stare contendit
quominus *Dulcichinum Mamiras* dici possit. Ri-
det autem Bellunensem, qui *Dulcichinum* ab A-
uicenna granum *Alzelin* vocari asserit. Tandem
asserit *Holoconitum Hippocr.* non dissidere à *Dul-
cichino*.

Dulcichinis siue *Trafi* minoris in Africa vbi
vocantur *habalzelin* vocatis, & ab aliquibus in
Italia Iuncus *Auellana*, quem Amatus Venetiis
vendi scribit ex *Aethiopia* aduectum, Græcè
Schænocaryon nomen inuenerit Gesn. hort. Idem
hæc ait ad Guiland. inter Epist. Matth. *Dulci-
chinum Oloconitum Hippocratis* negabas: nunc
verò coniugas: dubitavi ego possit ne idem *Bul-
bocastan* non dici, nunc verò tecum sentio non
esse: asserit à te veram *Tralliani* lectionem
assentior. Tu *Dulcichinum Mamiram* esse affir-
nas, ego nego. Item Bellunenensis granum *alze-
lei* & c. Alex. Benedictus idem sentit, tu contra-
dius. Ego *Dulcichinum* granum *alzelin* esse
sentiam, Croni vel Piper Nigrorum cum grano
Alzelin contra Serapionis sententiam confundis:
Oloconitis Hippocr. non est *Dulcichinum*.

An Leri cap. 13. *Trafi* intelligit cum ait: Syl-
uestribus America: est genus fructus quem vo-
cant *Manubi*, in terra proueniens Tuberum mo-
do & filamentis coherens, nucleus non maior
fatiuis *Auellanis*, eiusdem saporis, cinerei colo-
ris, cortice non duriore quàm *Pulorum*: an fo-
lia & semen proferat, licet sepius comederim,
non obseruavi: nec recorder. In margine *Manubi*
species *Auellanae* (nossete gall.) proueniens in
terra. Multum similitudinis habet hæc radix cum
Trafi: an eadem affirmare non audeo.

Bellonij Obs. lib. 2. cap. 25. *Dulcegenum* Itatorum,
siue *Dolcegenum*, in Hispania Valentino agro *In-
cia abellana* vocata, cum *Malinathala* Theo-
phrast. & Plinij, multis noris conuenire videtur
Clusio.

De *Dulcichino* (vt vocat de purg. & Histon.
Lat. in fol.) hæc scribit Dodonæus. *Dulcichi-
num* cyperum rotundum refert. Folia etenim
eius arundinacea, oblonga, dorso eminentes,
triangula, cyperidis similia, caulis angulosus &
iuba similiter respondent, omnia tamen bre-
uiora ac minora, à tenuibus radicum fibris, A-
uellanis ferè conformes, sed tamen aliquantò ob-
longiores, dependent globuli, veluti exigui bul-
buli, specie articulati, colore exterius rufes-
cente, interiore verò carne candidi, sapore gra-
to, dulcique & castaneis proximò. Stirpem ipsam
nostra ætas *Dulcichinum*, & radículas *Trafos* siue
Tragos appellat, aut *Trafcos*. Cyperi species est, sed
dulcis, Theophrasto, vt fati appareret, non inco-
gnita. Libro siquidem de causis septimo. Cype-
ri radices inter dulces atque edules refert.
Cyperi, inquit, radix dulcis, vt eorum
quæ in fluminibus & paludibus proueniunt.
Quod procul dubio, non de alio, quàm de isto,
accipi potest: aliorum siquidem cyperorum ra-
dices amaricant & minimè edules sunt. Non de-
sunt tamen, qui *Trafos* istos Arabum Medicorū
Habalzelin siue Granum *Zelin* esse constanter
existimant, quod tamen veritati parum consen-

Cis. contra
Guiland.

raneum. Nam Alzelin ab auctoribus Arabibus inter fructus siue Grana connumeratur, nequaquam autem inter radicales. Serapio quidem sic habet. Habelzelin granum est pingue, Ciceris magnitudine, citrinum exterius, & album interius. & habet bonum saporem, & defertur ex terris Barbarie. Idem alternat Aucenna cap. 30. Ex quibus, quod inter hæc discrimen sit, palam fit. *Hus usque Dodonæus.* Dodonæus cudit suam desc. ad iconem Matthioli, ex eodem asserens, quod non vidit: duas icones habet, vnam sine caulibus, quæ placet: alteram cum caulibus & floribus ex Matth. minus artificiosam: cyperum esse dulcem Theophrasti asserere nondum possumus, nec etiam negare esse Habelzelin: non satisfacit nobis argumentum eius.

Lobel. in Adu. vocat Trasi Recentiorum, Afrorum *Hab-al Zeln*, & Trasi Veronenium [vt etiam Obs. pag. 4. & 41. itémque Ic. pag. 87.] statuens, cyperis congeneres, indeque cognomine cyperos, dicens.

Cæsalpinus refert aliquos agri Veronenfis *Zizolas* terrestres vocare, cyperi genus hoc vulgo *Trasi* vocatum, quo Doronici radices adulterant.

Inter edules radices quas Aegyptus fert *Mali-ot-balles* à Theophrasto connumerantur. Ex tuius textu Plinius mutuatus pro *μαλινόδακτυς*, Anthelm. in t. ant. quæ: quod græcè *αλινόδακτυς* scriberetur, ex *αλίν*, & *δακτυς*, vel *δακτύς* compositum, quod est regermino, parum distans à verbo *αλύνω*: in, quod ex *αλύνω* aduerbium, & *αλινόδακτυς* constat, est, significatque valde regermino, quod etymon proprium est huius plantæ, quæ radice vnica sata se propagat, innumeraque producit, auctore Columna.

Nos assumpsimus iconem Columnæ, cui flores, quos negat Pena ferre, dicens potius esse cyperi cum Trasi prouenientis Veronæ. Clusius exhibet iconem sine caule & flore, quæ nobis placet.

Trasi nostrum vel esculentum cyperum Dulcicinum à Guilandino vocatum, collocat Pena inter plantas, quæ nec caulem, nec florem, vt nec semen etiam producant.

Synonyma

Casp. Bauhin. apud Matthiolum putauit esse cyperum radicibus dulcibus Theophrasti, quam sententiam videtur retractare in pin. dicēs: *cyperus esculentus* i. i. i. *cyperus rotundus esculentus angustifolius georgensis*, Gesn. hort. *Trasi* Matthioli. *Casf.* *Casf.* Lugd. Frag. *Herba radice magnitudine Auellanae*. Cord. Obs. *Iuncus Auellanae*, Ama. *Trasi Veronenium*, Adu. Lob. *Dulcicinum* Gesn. hort. Guil. Dod. *holconitis hippocr.* Fabric. *Cyperus daltis* Theophr. Cam. Tab. *Cyperus esculentus*, Ger. *Malinathalla* (quasi valde regerminans) Theophrasti Aegyptiorum, & *Anthelmium* Plinii Dalechamp. in Plin. *Casf.* *Column.* *Margarita Aegyptia*, auctore libri Aristotelis de plantis, Dalechamp. in Plin. *Trasi folis cyperi*, Clus. in Garz. *habas z-poua*, *habel as-fis* Tripolitæ anis: siue *Græmen alzelin Arabum*, Rauvolf. Plantam hanc nec caulem, nec florem, nec semen producere, sed sola radicem propagatione conseruari, Gesnerus lib. de hort. & Pena in suo Baldo affirmant. Contra Matthioli. Dodonæus, Lob. Columna cum flore pingunt, & Cæsalpinus, caules, folia & semen cyperi, & Fragotus flores spicatos aliquantum flauos, tribuit.

propria Veronenfis est, nullibi eam in tota Europa, præterquam apud nos spon-

dem ad meridiem auctore Pena. In Aegypto colit radicem quam Itali *Dolcegunum* nuncupant, testatur Bellonius. Clus. frequentem reperit in agro Valentino in Hispania. Rauvolfius scribit Tripolitæ venalem in officinis proponi ex Aegypto delatam. Planta germinat Vere & Aestate. In fluminis Athesis lericur sabulosus, vt tradit Alexander Benedictus. Autumno bulbuli leguntur, Vere feruntur in plures multiplicandi.

Trasi cremore pectoris & laterum vitia expurgantur, quo fit vt tussientibus opem non modicam præsent, tunduntur enim, maceranturque carni iure, deinde per linteolum exprimitur cremor, quem etiam venericis portionibus miscent Recentiorum nonnulli: Sunt, vt experientia compertum esse, & ex dulcedine conici posse, scribit Matthiolus in calfacientium & humectantium genere, sed status quodammodo gi-gnunt. Excalfaciunt quidem & humectant ordine primo, leniunt, leuigant, emolliunt, Veronenfes pro bellariis vescuntur. Capiti non mediocriter conducunt.

TRASI MINORES.

C A P. CXCV.

DE herba tota certi nihil adferre possum, at radices rotundiores minoresque quam Trasi vulgaris Veronenfium, mediocrius Pisi magnitudine, foris rugosæ, nigriores, intus albae, dulces, sapore eodem cum Veronenfium Thrafi.

An Gesn. hort. *Dulcissimi & Trasi* minores in Africa vbi Habelzelin.

Anno 1539. accepi Trasi minores, missas à Carolo Paludano sub titulo *fructus ex capo grati esus* & postea anno 1598. ab eodem cum inscriptione *Trasi* Indici.

CACERAS TRASIVM MODO NASCENS, folia Iridis luteæ.

C A P. CXCV.

Inuenitur in India *radix* Trasii modo ipsis terræ visceribus nascens, quæ deinde per siccitates *cauliculum* emittit dodrantalem, folia simul implicata, videntia, Iridi luteæ aquaticæ siue Gladioli similia. Debilitate per siccitates terra exilit Tuborum modo, deinde siccata castanearum saporem refert, non siccata autem ingrati saporis est: *Caceras* illi vocant, vt Gar. Arom. l. 2. c. 23. prodidit.

Casp. Bauhin. pin. *cyperus esculentus* 2. siue *cyperus rotundus esculentus latifolius*. *Caceras*, Garzæ addit Clus. in notis, *quæ ad dicitur* a Theophr. *Caceras* in Goa, Frag.

PAPYRVS NILOTICA.

C A P. CXCVI.

Cum nobis incognita hæc sit, nec vnquam visita, placuit in ea pertractanda eum ordinem obseruare, quo ab ipsis auctoribus est manifestata. Non corticis igitur, siue libri, cui inscriberetur, vt quidam putarunt est Nilotica, siue Aegyptia Papyrus, sed plantæ magnitudinis speciei admodum cyperi similis, effigie, natalibus, etiamque nomenclatura Aegyptia, qua in regione secus

Autorum
discrepantia.

6. 1. 4.

hæcque



fluens in Nili palustribus, adolefcit, nec è profundo emergit, sed tantum è vadosis frutescit, non procul à ripis, vt etiam diuina pagina narrat Mosen diuinæ spei & elegantie delicatulum puellum à matre inuita eiec- tum propè Nili ripam inter Papyros, vnde diuinitus iussu filia Pharaonis eductus, indèq; *Moses* vocatus,

quasi *aquis ereprus*, fuit. Niloticam Papyrum, vnde & qualem describunt Theophrastus & Plinius aduèctam, hortique Pisani totius oræ Thyrrænæ, longè amœnissimi & ruris stirpibus ditissimi in- quilinam factam vidi & florentem legi beneuo- lentia Professoris in Academia Pisana Andree Actuariæ Cisalpini, quo etiam hortante nonnul- los stolothes Papyri & aliarum rariorum planta- rum gænero misimus: quorum oblectatus pere- grina elegantia, vt erat incomparabilis mode- stia & eruditionis, non ita multo pòst literis gra- tulabundis hæc significauit. Rarum spectaculum sui mihi præbuerunt stirpes duæ munera tua ra- rarissima, quarum illam Papyrum Niloticam vocas, altera, mihi tecum ignota est: sed nec il- lam nouissem, nisi tu monuisses esse Papyrum Niloticam è Pisano horto lectam. Plinio videtur gemina Ægyptia & Babylonia, ex qua præpara- tur acu chartæ diuine in prætenues, sed quàm tenuissimas phyliras. Tua verò an sic possit pa- rari nescio: Plinianæ premuntur prelis plagu- læ & seceruntur scapo nunquam plures quàm viciena. Plurima quæ ibi habet Plinius non asse- quor, nec cum Theophrasto conferre vacat, sed peruelim scire cuiusmodi tuæ sint folia, & an non cyperus sit, ac cum nostrum opus in lucem exi- bit curem depingendas, ac tibi acceptas feram.

Neutiquam mirum doctiss. Gænero visam esse cyperum, cum illi sit congener & simillima: ve- rum elegantior multò est, lunceo harundinaceo- rum triquetro caule, medulla farcto tomentacea, quæ tula glutinisque in speciem subacta duceba- tur in bacreas Papyraceas, quæ maturò sibi ap- pressa folia crassiora conflabant scribendo apta, quemadmodum etiamnum fit ex laciniis linei panni confusi & in candidum gluten redacti. Medulla verò utebantur ex præcepto Antiquo- rum, quemadmodum hodie Chirurgi Itali lina- mentis & turundis ex medulla Sambucina aut spongiæ paratis, quò suis potis melius saniem imbibant, suauque qualitate desiccando fistulas latiores faciant, quod faciliari solum meminit Dioscorides. Stipitum numerosorum proceritas, lauis, nitida, sursecta sensim septenimve inter- dum cubitorum, quibus, nuppiam nisi ad imum folia insunt cyperi aut Sparganii repanda: radi- ces autem arundinaceæ, fibrosæ, quas in Ægypto erutas afferebant, non illic ortas, propterea quia semine caret, tametsi floribus est perquam spe- ciosis & luculentam in ambitu caesariem effigian-

tibus: numerosis, gracilibus thyrsulis denso & æquabili comarum stipatu, & apicibus promi- nentibus, Ferula in modum collectis, non vt cyperi sparsis, quos circa ortum ambiunt radia- tim, sita folia, multò minora illis, quæ sunt ad i- mum, vt in cypero. Idcirco verisimile sit hanc veram Theophrasti esse, & Papyri descriptio- nem apud Plinium geminam esse, sed mutilam, æque duabus diuersi generis Papyris confusam, nempe ex Ægyptia hac & ex Babylonia, cuius et- iam alij Scriptores, meminerunt. Nam vt no- men & res indicat, Theophrasti Papyrus non al- lia est, quàm Dioscoridis, quæ notissima omni- bus fuit, ex qua præparabantur chartæ, & vri- lissima Medicis ad ora fistularum diducenda, nempe medulla, vt superius ostendimus, etiamq; è luncea medulla hodie fieri scimus, nam ipsam chartam non esse, sed medullam, indicio est, quòd Dioscorides dicit cinerem crematæ Papyri, præ- stantioris esse quàm è charta, & ipsos stipites neutiquam inseri finibus aut fistulis solitos, sed medullam, propter commodam quæ recentè Dio- scorides. *Id. op.* aut vsum tuum finium, cum chartæ obsecutus Plinius tradit, cum dicit, texun- tur omnes tabulæ madente Nili aqua, quod de fu- nibus quis forè interpreteretur. Et max: turbidus liquor vim glutinis præbet, cum primò supina ta- bula schædæ illinitur longitudine Papyri, quæ potuit esse segmentis, vtrinque à parietibus: tran- uersa postea cratè peragitur, premuntur deinde prelis & siccanetur Sole plagiæ, atque in arte iunguntur, quæ medullæ gluten in chartas duci solitum innuere videntur. At vbi in Euphrate circa Babyloniæ nasci scribit, non eandem vi- detur describere, sed eundem vsum habere char- tas, quæ etiam acui prætenues, sed quàm la- tissimas, phyliras præparantur. Quare & huius so- lia admodum lata, quibus metæ saccharatæ ad- feruntur patitur inuicem ex Austrinis trans Æ- quatorem Insulis vocari possunt Papyraceæ, quemadmodum olim etiam folia Palmæ & alia- rum arborum, quibus poterat quippiam commo- dè scribi, nomen non esse genuinam certum est. Quapropter consultius est, vbi defuerit hæc no- stra Papyrus, cinerem parare ex cyperi vulgaris, aut lunci magni aquatici medulla vtendum ad de pascencium vlcèrum rabiem feram compe- scendam.

Papyrus, quam *herd* Ægyptij vocant, Alpino est planta fluminis Nili, pinis aut pluribus cau- libus rectissimis supra aquam septemve cubitis allurgens. Caulumque in fastigiis scapus innumeris capillamentis, longis, rectisque con- textus, cernitur. Foliis quoque constat multis, rectis, ensiformibus, typhæ aliquatenus simili- bus, triangularibus, ac mollibus. Chyrurgi folio- rum medulla vtuntur, ad vlcèrum ora dilatanda. Ex scapique combusto cinere, recentia vlcera curant, quæ etiam maligna augeri (si sæpe as- persatur) non sinit. Ex scapis recentibus aquam distillant, ad oculorum suffusiones, caligines, ac obscuritates maxime proficuum.

Casp. Bauh. pin. Papyrus 2. Biblios vel Syriacæ, sive *Synop.*
Siciliana. Sarr. Theophrasto. Biblios secun-
do, Eustachio, Papyri altera species,
quæ Papyrus in Sicilia, Guiland.
Papyrus, Cæf. Nilotica, in
Adu. & Ic. p. 79. Tab.
Ger. Papyrus Ægyptia,
Pena, Hittor.
Lugdun.

GRAMEN SPICATVM CVM PERI-
carpiis parvis rotundis.

CAP. CXCVII.

Descriptio



Seracis est
folij Phalangii
similibus. Cul-
mus verò spi-
thameæ lon-
gitudinis, spica
gerit instar
Plantaginis.
Lob.

Lob. Teur.
& Ic. Plant. p.
16. Zecghe &
rentgras, Gra-
men marimum
spicatum: Clus.
Paan. Gramini
montano spica-
to simile in ma-
ritimis Flan-
dria frequens,
vulgò Euden

appellatum. Tab. icon. & Hist. Gramen aquati-
cum spicatum, & Gharbe wasser gras / Hydragros-
tis. C. Bauh. Phyt. Gramen 68. & Gramen spica-
tum alterum marimum. Eid. pin. Gramen iun-
ceum & spicatum 17. Sive Gramen spicatum alterum.

Locus.

Copiosè in Zelandia nasci ait Lob. in rivulo-
rum ripis locisque aqua irrigatis: Vidimus apud
fratrem Casparum mullum Norimbergæ.

GRAMEN TRIGLOCHIN.

Descriptio



Gramen
triglo-
chin ex capi-
te pendulis fi-
brosis com-
plicatis radici-
bus nititur:
culmos tollens
nudos, enodos
iuccos, cubita-
les & sesqui-
cubitales, in-
terdum locis
squalidis pal-
mares ferè:
spicam à me-
dio gerunt
summo te-
nus: longà se-
rie florum
turbinati, for-
mā ferè capi-

tulorum Pyrolæ, delapsis primulùm floribus, nō
item magnitudine: quos excipit series mucro-
natorum fructuum, qui acumine cōtinui, inferiùs
spectante, in triplicem barbulam alati, instar tri-
dentis sagittæque, diffiliunt. Folia ab radice orta
culmos comitantur palmaria & dodrantalia,
perangusta, plana.

Synonymi

Lobel, Belg. Ander zee of zee landesch ghes

arent gras. Ic. Pl. Gramen marimum spicatum: m. ale-
rum. Tabern. icon. & Hist. Bingengras 4. Gra-
men iunceum 4. & iunceum spicatum gedhyre.
Bießgras. Camer. hort. Gramen marimum spica-
tum alterum Lobelii. Maius cuius pictura est
apud eundem, ad lacus salios nascitur circa Ha-
lam Saxonie. Minus verò in pratis lationibus
& humectis circa Lipsiam, quod inter Calama-
grostis species Tragus depinxit.

Casp. Bauhin. phyt. Gramen 67. Eid. pin. Gra-
men iunceum spicatum 16. seu Trigloch: Cala-
magrostis 2. Trago, icon Calamagrostis 4. Hist.
Lugd. Carex minus, Lon. Gramen mixtum ex iun-
co & Gramine, Thal. Gramen marimum spicatum,
Ger. Gramen trigloch Dalechamp. Lugd. Gra-
men iunceum 4. vel Spicatum, Tab.

Hist. Lugd. iconem habet meliorem, quoad
fructum, quam Lobelius, at flores Tragus rectius
exprimit, vt & Tabernamontanus.

Inuenitur inter Spiram & Heidelbergam, in
pratis locisque aliis humidis.

HYACINTHI PARVI FACIE

Gramen trigloch.

CAP. CXCVIII.



Oblongum
habet co-
marumq; bul-
bū, Allii Alpi-
ni in morem
simplicem a-
liās, aliās mul-
tiplicem, à cu-
ius imo demis-
sis fibris radi-
catur, folia te-
nuissima, gla-
bra, palmaria,
interdum ma-
iora, tria, aut
quinque, sta-
tim à radice
oriuntur: cau-
liculus, durius-
cul. teres, gra-
cilis, nudus,
enodis, inter
folia surgit,

palmaris & sesquipalmaris: longam gerens spi-
cam florum luteorum, [nisi fallit in sicca plā-
ta color] exiguorum, è quorum medio proten-
ditur stylus longiusculus, ita vt cum eo flos refe-
rat rudimentum capituli Pyrolæ delapsis flori-
bus: hinc stylus ille satis longo nixus pediculo
triquetrus apparet, inque tria spicula superiùs
coherentia, subius dehiscit, quo modo in Gra-
mine trilobco seu triglochine est obseruari.

In squalidis quibusdam locis maritimis Nar-
bonensis Gallie, & supra Admirabilem illum
Gari fluvii Pontem trigeminum, eruit Gener
H. Cherlerus Iunio.

GRAMEN IUNCEVM MARINVM

dense stipatum.

CAP. CXCI.

Radice & foliis est Graminis marini spicati
Zelandici similibus, duris & rigidis. Cuius
culmi



quaticum minus.

C. Bauh. phyt. *gramen* 72. siue *Iuncum tertium*: Eid. pin. *gramen iunceum spicatum* 11. siue *gramen iunceum foliis & spica iunci minus*: *gramen iunceum maritimum* Gerard.

Ad litus Middelburgicum reperiri refert Lobelius in Cambræ heymæ heyden & in superiori comitatu Farseneleborg.

GRAMEN IUNCEVM EX MONTE

Baldo.

CAP. CC.

Iuncum culmum amittunt folia pauca, dura; cæteroqui nudum, enodem, dodrantalem, glomeratum è glumis candidis capitulum summo cacumine gestantem, cui ad basim subiecta bina foliola acuta, adærsa, alterum altero longius, parum tamen semunciam superans. Hac ex sicca: sic autem describit Frater in prod. Radice est parua, fibrosa, circa quam folia bina, ternæ semipalmaria: culmus iuncea, levis, enodis, & nudus, pedem superans: cuius summo capitulum instar Phalaridis squamosum in apicem deflexum, ex albo leuiter rufescens, insidet, cui utrinque foliolum rigidum subiacitur, quorum longius, vnciam superans, deorsum vergit, alterum quod triplo breuius, recta effertur.

C. Bauh. phyt. *gramen* 75. siue *iuncum montanum*, graminum maritimo Dalechampi in multis conueniens, vtpote caule & capite: Eid. in prod. *gramen* 36. In pin. *gramen iunceum* 12. siue *montanum capite squamoso*. Prouenit in montis Baldi summitatibus.

GRAMEN IUNCEVM MARINVM CAPITULO squamoso C. Bauhini.

CAP. CCI.

Gramini huic 37. in prod. vel, vt in pin. vocat, graminum iunceum 13. siue minimo capitulo squamoso, capillares sunt radice: folia pauca, capillacea, vnciarum fere duarum: inter quæ culmi vnciarum quatuor vel quinque exurgunt, in quarum fere summo capitulum vnicum minutissimum squamosum rufescens, cui culmi apex supereminet.

Tom. II.

mi spicas gerunt iunci aquatici. Alioqui maritimo gramine haud melius est aut vtilius.

Lob. Hist. B. p. 17. Teutsch dick Grasfen/ Teutsch dick bieß Grasfen. Et Icon. pl. pag. 17. *Gramen iunceum maritimum dense stipatum*. Tab. Hist. *gramen iunceum* 1. *Binggras* 5. Et Icon. *gramen iunceum* 4.

In aquis circa Altorffium Nöricorum, vnde D. Doldius misit: & Francofurti ad Oderam provenit.

GRAMEN IUNCEVM MINIMVM ALTERUM eiusdem.

CAP. CCII.

Gramen hoc 38. in prod. in pin. verd. *gramen* Synon. *iunceum* 14. siue minimum alterum, à prioribus differt potissimum capitulis, quæ & summo cauliculo insident, & squamosa non sunt: in fossis Patauinis, aqua defluxa, reperitur.

GRAMEN IUNCEVM MINIMVM MARITIMUM C. Bauhini.

CAP. CCIII.

Tota planta dodrantem non superat, cespiti similis, ex cuius singulis radiculis, singuli cauliculi exurgunt, foliolis capillaceis paucis cincti, qui exiguis verticulis donantur, *gramen* Synon. hoc 39. in prod. in pin. *gramen iunceum* 15. siue minimum maritimum in Zelandiæ maritimis, ad oppidum Goue, D. Gillenius collegit & transmisit.

GRAMEN SYLVATICVM PARVVM tenuifolium, rigidiusculum.

CAP. CCIV.



Radice pro-
tuberat ab
vno principio
multiplici [auctore Tabern.]
fibrosa: foliis
angustis, vulgato
gramini similibus, sed
plus firmatis,
solidis, denso
ordine stipatis.
Culmi procedunt
ex his plures,
tenuis, rotundi,
ac duntaxat, spichamei.
Spicæ in horum
sublimitate molles,
capillares, subinfescentes.

Tabern. Hist. & Icon. *Gramen sylvaticum primum*: *Gramen nemorosum*. Germ. *waldgras*. Buchs od. Bofchgras. Ital. *Gramen sylvaticum*. Angl. *weddegras*. Belg. *Bofchgras*. Ger. *Gramen sylvaticum*.

Casp. Bauhin. Phyt. *Gramen* 28. siue *nemorosum* primum: Eid. pin. *Gramen nemorosum glabrum* 3. siue *Gramen nemorosum spica rufescente molli*.

In humido vliginoso & arenoso colo colligitur. Loëus.

GRAMEN SYLVATICVM III. TABERN.

paruum, tenuifolium, cum spica aculeata.

CAP. CCV.

Radix ab vna origine multiplex, exigua, filamentis referta: folia angusta, in acumen ab-

Vu 1



Synonyma

pin. *Gramen nemorosum glabrum* 4. siue *Gramen nemorosum* spicis parvis asperis. Variat hoc latiore folio in dumetis & angustiore in pratis. Locum cum precedenti eundem adamat.

Locus.

HOLOSTEVM MATTHIOLI IVNCVEM.

CAP. CCVII.

Descriptio



vascula pusillum semen rufum pellucidum claudencia. radices sublim capillacea.

Si Lob. in Ic. Plant. p. 18. per Holostium Matth. eandem intelligit, quam Matthiolus plantam, melius placet Lobellii figura. Matth. suam plantam non describit.

Synonyma

Matthiolus mutata prioris sententia in post. comm. editione Holostium exhibuit pictum, nulla adiecta aut figura, aut virium declaratione, inquit H. Lugd. p. 10.

Gramen *Spartum* *juncea* videtur Thalia ea plantam, quam Lobellius Holostium Matthioli insinuat.

Tabern. icon. & Hist. *Gramen* *busnium*, *Broterius* *rengas* *Cera*, *Peddegras*, *Hand*, & *Brab*, *Cos*, *degras*, *Gall*, *Herbe* *aux*, *cap*, *aux*, *Crapaud*, *ne*, *Eid*, *Hut*, *Gramen* *juncea* 6. *Ger*, *Gramen* *juncea*.

cuncta palmum medium fere longa: ex his oriuntur calami nonem aut octo tenues, apylli, aequales sperhami. Horum summitates occupant spicae paruae, aculeatae.

Tabern. Hist. & Icon. *Gramen* *fluuatium*, siue *nemorosum*, *waldgras* 1. *Ger*, *Gramen* *fluuatium* *minus*. *Calp*, *Bauhin*, *Phyt*, *Gramen* 21. siue *nemorosum* *alterum*. *Eid*.

Calp, *Bauhin*, *Phyt*, *Gramen* 84. siue *Spartum* *juncea* 1. *Eid*, *pin*, *Gramen* *nemorosum* *glabrum* 5. siue *Gram*, *nemorosum* *caliculis* *paleaceis* : duplex *repens* & *erectum*.

Patim pratis mucosis, aliisque putridis ac humentibus locis provenit.

GRAMEN HOLOSTEVM ALPINVM minimum C. Bauhini.

Ota plantarum vncias tres non superat: foliis capillaceis, vncialibus: cuius culmis capitula paleacea insident, copiose in Helueria in S. Bernardi monte minore provenit. *Gramen* hoc in pin. *nemorosum* *glabrum* 6. siue *Gramen* *holostium* *alpinum* *minimum*, 46. in prod.

GRAMEN SPARTVM PLINII, SIVE Sportularum Ficuum.

CAPVT CCVII.



Spartum *Latino*rum & *Plinii* (inquit *Clus*) à *Sparto* *Græcorum* frutice differens, herba est graminea, folia proferens, numerosa, tenuia, fæca, viridique, cubitalis longitudinis ex eadem radice procedunt, quæ, dum noælla sunt, latiuscula conspiciuntur, & interiore parte canescentia, succellu vero temporis contrahuntur & conuoluuntur, funeque iuncta, dura, flexibilia tamen, & marginibus ita coniunctis, ut vix ripa appareat, nisi diligenter obliuiscer. Inter hæc vni exstant ipsi funi, parua longiores, qui Vere & Aestate paruum arundinaceam paniculam ferunt, simili propensum cum illa ratione florēt: deinde oblongum semen, ut nonnulla Graminis generatraducunt, maturi fibrosi, perennib; se quib; multo simul & aditum plantæ, cortigues, sunt, modo, ut interdum vna planta, siue multarum simul congestarum plantarum culmus, duorum pedum spatium, vel etiam illo amplius in ambitu occupet.

Fuit hoc *Spartum* post *Theophrastum* *Græcis* notum, *Pinus* *Juncea*, *cap*, *aditum* in quo quæscum proponit, num *Genista*, *Græcorum* *Spartum* sit, de quo *Plinius* dicit, *Narium* *Sparta* *dissoluta*, *Cos* *bruciter* *respondet*, *ceterum* esse, nondum eo tempore *Africanum* vel *Hispanum* *Spartum* in usu fuisse, ut credendum sit, *Genistam* *Græcorum* *Spartum* esse, nostram vero *Spartum* illis ignotum esse, nec de eo vllam posteritati reliquille memoriam.

Hermol, *coroll*, 771. *Spartum* *alterum* in *Hispania* & *Africa* *funibus* *natum*, *Lenca* siue *Lygia* dictum ab *Athenis*. *Amato* *Spartum* aliud à *Genista*. *Dodon*, *frum*, *Spartum* *herba* à *Plinio*

lib. 19. cap. 2. descripta. Lac. Spartum vulgare, deferens a Genista. Clus. Spartum herba 1.

Lob. in Aduers. *Spartum* vulgò *Elpha Hispanica Iunca*, vulgi *Funispartion*, an *Linospartion* Antiquorum: Eid. Obs. p. 45. Ic. plant. pag. 88. *Spartum Plinii*, Clus.

C. Bauh. phyt. *gramen*, siue *gramen spartum* 1. Eid. pin. *gramen spartum* 1. siue panicula comosa: *Spartum Plinii* Clus. Lob. & H. Lugd. *Spartum herba*, Dod. *Spartum Plinii* 1. Tab. & Ger. *Iuncus Ibericus* siue *Hispanicus*, Dalech. in Plinium: *diversus* Theophrasti.

In Batica regione Hispania parte, præcipue regno Morisensi nasci tradit Amatus: veluti in Algarbia apud Lusitanos, Aphrica contermina. Frequens nascitur, auctore Clusio, collibus arenosis inter Vaëna & Alcalá-Real, atque aliis Baticæ locis: sed omnium abundantissimè ab initio Granatensis regni, siue Baticæ limitibus, usque ad Murgiam urbem, vulgò *Murgia dicta*, ut non sine causa totus ille tractus Veteribus appellatus sit *Spartarius campus*, quo etiam noua Carthago, vulgò *Carthigena*, urbs maritima continetur: hæc etiam à nonnullis Spartaria cognominata est, ob Sparti (ut credibile est) eo agro nascentis abundantiam. Nascitur & Valentino regno, atque illud quidem superiore longè vberius & lætius.

Porro, Sparti vsus, inquit Plinius, multa post secula cæptus est: nec ante Pænorum arma, quæ primùm Hispaniæ intulerunt. Herba est hæc (Iuncus Ibericus, siue Hispanicus, *ἰὺνκός ἰβηρικός*, ad nexus tantum utilis Dal.) spontè nascens, & quæ non queat feri, Iuncusque propriè aridi soli, vni terræ dato vitio. Namque id malum telluris est, nec aliud ibi feri aut nasci potest. In Africa exiguum & inutile gignitur. Carthaginensis Hispaniæ ceterioris portio, nec hinc tota, sed quatenus parit, montes quoque Sparto operit. Hinc strata rusticis eorum, hinc ignes, facèsque, hinc calcamina, & pastorum vestis, animalibus noxium præterquam cacumini tenebre. Ad reliquos vsus laboriosè euellitur, creatis curibus, manibusque rectis manicis, conuolutum ossis ligneisve conamentis. Nunc iam in hyeme vix. Facillimè tamen ab Idibus Maiis in Iunias: hoc maturitatis tempus: Vulum fascibus in aceruo animatum (adunatum) biduo, tertio resolutum, spargitur in Sole, siccaturque, & rursus in fascibus redit sub tecta. Postea maceratur aqua, marina optimè, sed & dulci si marina desit. Siccaturque Sole iterum rigatur, si repente vergeat desiderium, persusum calida in solio, ac siccatur stans compendium opere fatetur. Hoc autem tunditur ut fiat vile, præcipue in aquis marisque inuictum. In sicco præferunt & canabi funes. At spartum aliter etiam demersum, veluti natalium sitim pensans. Est quidem eius natura interpolis, rursusque quam libet vetustum nouo miscetur. Verumtamen amplectetur animo, qui vult miraculum æstimare, quanto sit in vsu omnibus terris nauium armamentis, machinis ædificationum, aliisque desiderijs vitæ. Ad hos omnes vsus quæ sufficiant, minus xxx. m. pass. in latitudinem à litore Carthaginis nouæ, minusque in longitudinem esse reperitur, longius vehi impendia perhibent. Hæc ille natur. hist. lib. 19. c. 2. Virgæ (inquit Amatus) huic ad summum cubitales sunt, solidæ, ad frangendum difficiles, vinculorum vsui præcipue, ex quibus cordæ, funes, Cameli & nauium ornamenta parantur: nec minùs in ipsa Algar-Tom. II.

bia & Batica regione, ex isto Sparto, infinitus sportularum & corbium calathicorum numerus, pro deferendis fribus, & passis, aliisque mercibus ad vniuersam Germaniam, Prussiam, & Boheimiam, Galliam & Scythicam sunt, hodie verò Spartum hamato ligno conuolutum eradicatur, veluti quoque Plinii tempore, ossis, ligneisve conamentis euellatur. Spartum eodem in vsu nunc est apud Hispanos, referente etiam Clusio, quo fuit Plinii tempore. Nam ex crudo & exsiccatò tapetes seu aulæ, storiæ, corbes, rudentes, aliosque funes conficiunt: corbes etiam illi in quibus fides, & vne passæ aduehuntur, ex Sparto contexti sunt. Sed ex illo aqua, instar lini, macerato, deinde siccato & tuso, calcamenti genus, quod ipsi *alpergates* appellant, paratur, funes etiam & alia subtiliora opera. Præfertur autem id quod Valentino regno crescit,

GRAMEN SPARTVM 2. CLVSIO.

CAP. CCVII.



Spartum herba alterum Descriptio Clusij nascitur Murciano regno, humidioribus præsertim locis, superiore tenerius, cuius valde rarus est vsus, ut quod storiis aut humilimodi operibus conficiendis minime sit idoneus, plurimus autem eius vsus in eâ regione, ad lineos saccos, quos lectis sustentant, impleudos, ut nos stramine uti

solemus, quoniam molliore, tenuioreque sit iunco, quam primum: paniculam fert breuem, & pericarpio quodam, siue membranaceo folliculo inclusam: uti Narcissorum & similium ferè flores.

Lobel. Hist. Belg. p. 122. & Obs. p. 45. *Spartum alterum Clusij*. Eid. plant. icon. p. 88. *Spartum Plinii & Clusij alterum*.

C. Bauh. pin. *gramen spartum* 2. siue panicula breui folliculo inclus. : *Spartum alterum Plinii*, Lo-Synod. bel. Hist. Lugd. Tab. & Ger. Sparti herba alia species, Dodon.

Nascitur eodem quo superius illud ad multa vile, modo: paulò tamen maturius flores producit. Locus. & tempus.

SPARTVM SPICATVM, PVNGENS

Oceanicum.

CAP. CCIX.

Spartum herba 3. siue Oceanicum aut maritimum Clusij, nonnullis, Gallia, Fladriæ quæ Descriptio locis & aggeribus illis sabulosis, Oceano obiectis inuenitur, *Halm*, ab incolis, præsertim Fladris vocatur: quod, priori Hispanico non valde dissimile est, sed multo maius & rigidius, cruribus eorum, quibus per eos aggeres sine ocreis iter est, permolestum: pungunt enim & cutim penetrant eius folia. Crescit eodem modo quo superiora, magis tamen latè serpit Graminis modo: *Spicam* autem fert Secalis panem instar: eius vsus, V 3



vt latis suis cespitibus & valde confertis, atque obliq. spargentibus sese radicibus, arenam firmiorem reddat, & colligeret in aggerib., ne tam facile marinis vndis & fluctibus cluatur, & facilius resistent tē pestatibus, qui in Oceano crebra.

Ex Plinii l. 9 cap. 2. ac lib. 24. c. 9. ostendi potest Genista & Spartium diuerfas esse plā-

tas, quāquam obscurē vtramq; herbam discernat, ac dubia prorsus fide tradat: tamen priori loco per luncos aculeatos, siue virgas, longas, siue foliis, eas omnino intelligere videtur, quas Holandi Oceani magni accola, ob vrgentem quānosūmque maris impetum, atque inundationem, arenosis montibus inferunt, ne validiori arena vento promptē defluat aut dissipetur. Plinius montes his operiri, in citerioris Carthaginiensis Hispania portione, scripsit. In Holandia Belm vocant, quasi Galeam. Hanc omnino pinxisse Dioscoridem lib. 4. cap. 139. arbitratur Clonemburgus. Sed quo modo ad Diosc. Spartum referri possit non ostendit.

Cronem-
burg.
Spartium
Holandica

Synonyma

Casp. Bauhin. Phyt. *gramen* 11. Eid. *pip. gramen spar-teum* 3. siue *spicatum*, folijs mucronatis longioribus, vel *spica scalinā*. *Spartum teretium*, Clus. Hist. Lugd. *Spartum herba 4. maritimum*, Clus. Hist. *Spartum n. s. v. s.*, Lob. Obl. p. 45. l. c. 89. Hist. Belg. pag. 123. *Spartum 2. & Plinianum* 3. Tabern. *Spartum Anglicanum*, Ger.

GRAMEN PENNATVM, ALIIS Spartum.

CAP. CCX.

Descript.

Praetenua ē rad. capillatis germinant folia dodrantalia: Alia superius teretia, inferius plana: inter quae surgentes culmi in cristam selquipalmarem lanugine mollicca, vtrinque plumata, contortamque, desinentes. *Spartum herba* quintam, siue Austriacum pennatum, non in locis aurā marinā afflatis (autore Clus. Pannon. & Hist. post.) natum, sed procul à mari, procul ab arenosis illis aggeribus, spontē etiam crescens. Habet verō id *salsa* pedalis longitudinis, gracilia, viridia, numerosa, plana initio: sed quorum limbi tandem coeunt, lunci modo laeua, teretiaque sunt, Sparti Hispanici foliorum instar, quibus nō multum abūmilia sunt, sed minora & graciliora: inter ea culmi exeunt graciles, foliorum fastigiū non superantes, qui *spicam* ferunt aliis dissimilem, sed tribus aut quatuor oblongiusculis granis, longa contortaque cauda insignitis duntaxat opulstantem, quae in dodrantalem, imò pe-



dalem, interdum velut penulam, tenuioribus alarum auis illius *Mammocoriae* siue paradisi vulgo nuncupatae, pennulis termē respōdentem, delinquit: radix subest ē multis capillamentis gramineisque fibris composita, Hispanici Sparti radicis instar.

C. Bauhin. Phyt. *gramen* 118. siue *spar-teum* 8. vel *pennatum*: Eid.

pin. *gramen spar-teum* 11. siue *pennatum*: *Spartum austriacum*, Clus. Pann. *gramen* 9. vel *iuncum* Dod. *gramen pinnatum* Dalechamp. Lugd. Variat iuba colore: est flauo, & etiam candido.

In aridissimis rumulis, apricis, lapidosisque provenit. Abundē hoc genus, ut testatur Clusius, nascitur in monte Badensis thermis imminenti, totaque illā catenā montium qui inde ad Danubium vsque procurrunt, praeterea ad sylulam *Lachn* aliisque apertis & Gramineis locis Austriae & Vngariae: sed omnium vberissime in Vianno illo Neapoli Austriae vbi contiguo, in quo vberitis laetiusque provenit. Semen maturum Iunio, vel laetissimo auro flauo excutitur, atque cum sua pennula paululū volans, vbi decidit, statim per Gramen irrepit & terrā se condit.

GRAMEN SPARTEVM VARIEGATVM, Casp. Bauhini.

CAP. CCXII.

Gramen 33. In prod. *gramen spar-teum* 12. siue *variegatum* folijs est quatuor vel quinque vnciarum, rotundis, variegatis, quorum alternatim pars vna vires, altera rubet: quod primo Vere in Franckenhusii montibus copiose reperiri, D. Iungermannus anno 1602. scripsit, & colorem cultura mutare monuit: Spartique nominē, solum folia, misit.

SPARTVM MARITIMVM SIVE Oceanicum latifolium.

CAP. CCXIII.

In sabulosis collibus Walcherā & Hollandiae, inquit Lobelius, reperitur Spartum. Vnum spica, radice, magnitudine, semine aceroso, ad Spartum tertium Clusii proximē accedit. Discrimen in folijs est *folijs*, quae pulchra Frumaceis & Graminis striati sulcati folijs latiora, coloris glauci.

De hoc scribit Clus. Spartum herba 4. Bataicum siue Oceanicum 2. à tertio maritimo siue Oceanico

Oceanico primo, minimè differt tota plantæ forma, radicisque sub arena condendi, læque spargendi licentiâ: eius tamen spicæ breuiores videntur & Phalaridis potius quàm Secales paniculas imitari, id Baonius, quibus valdè familiare iisdemque visibus feruit quibus Oceanicum primum, etiam *Halm* dicitur.

Icon apud Clusium, quæ eadem cum Lobeliana, monstrat magnam differentiam à priore Oceanico, in quo folia angusta pinguntur: verum responder descriptioni Lobelij. Eid. dicitur in H. Belg. p. 133. & Icon. plant. p. 89. *Spartum nostras alterum*.

C. Bauh. phyt. *gramen* 114. siue *Spartum* 4. Eid. pin. *gramen sparteum* 5. siue *spicatum latifolium*: *Spartum* 6. vel *Plinianum* 4. Tabern.

GRAMEN AEGYLOPS, BROMOIDES

Tabern. longissimis arstis.

CAP. CCXIII



Radice est multiplici (vt auctor est Tabern. fibrosa, ex qua numerosum emergit agmen foliorum paruum angustorum iuncorum. Inter quæ terni vel quaterni assurgunt culmi tenuis cubicales aut scilicet cubicales, qui in summitate spicas gerunt glumis aenacis similes, sed aristis acutis

& longis, quæ ex membrano folio, vel utriculo spicam infernâ parte complectente, profiliunt, & in vnum tantum vergunt latus. Glumæ verò seminum sunt vacuæ. Decidentibus verò aristis & ipsa sicca cum glumis suis in iubam è tonilibus cirrhis contextam, instarque lini panfam dehiscit, tandem vaneſcit tota.

Tabern. hist. *Aegylps* 4. *Bromoides* 1. habet wach. Icon. *Aegylps Bromoides* (sic etiam Gerardo) Wadelwach.

C. Bauh. phyt. *Gramen* 107. siue *Festuca longis arstis*. Eid. pin. *gramen Festuca* 19. siue *Festuca longis arstis glumis vacuis spadice coloris*.

Arenosis gaudet locis & ficioribus pratensibus: potissimum verò in viis inter Vornatiam & Frankental Palatinatus ciuitatem obuium esse testatur Tabernamontanus.

SPARTVM PARVVM LOBELIO.

CAP. CCXIV.

D Vras crassæque fibræ demittit: culmi numero plures, ina parte foliorum circumiectorum voluminibus crassescunt, alioqui filii instar tenues, enodes, dodrantes, quos à medio ad Tom. II.

summum vsque conscendunt, altera duntaxat



parte erumpentes, eodémque vergentes, glumæ duræ, tenues, longiusculæ: folia vbi stipulam non amplius inuoluunt, admodum tenuia, & ferè rotunda, trium, quatuorve vnciarum longitudine: acceptimus apud D. Vldaricum Chelium, Medicum Argentinensem ex plantis Agerianis ficiis.

Lobel. Hist.

Synon:

Belg. p. 124. & 1c. plant. pag. 90.

Klein *Spartum vanderfenslandens*. *Spartum nostras paruum*. Tabern. *Spartum* 7. vel *Plinianum* 5.

Casp. Bauh. phyt. *gramen* 117. siue *gramen sparteum* 7. Eid. pin. *gramen sparteum* 6. siue *iuncifolium*.

GRAMEN SPARTEVM PRIMVM TABERNAMONTANI.

CAP. CCXV.

Gramen sparteum primum (inquit Tabern.) **Descriptio**
Radice nititur fibrosa, longa: folia rigida, tenuia, pedalia, nervo medio percurrente: culmi cubitales & altiores, teretes, laues, foliis multis amicti: spica digitali longitudine, interdum longiores, colore fulco obicuriore.

Tabern. Hist. *gramen sparteum primum pprime* Synon:
Aen. gras das erst. Icon. *iuncifolium*.

C. Bauh. phyt. *gramen* 118. siue *sparteum* 5. Eid. pin. *gramen sparteum* 4. siue *spicatum foliis mucronatis breuioribus*, *Spartum Anglicum* 2. Ger. tit.

Vberi prouentu, Tabern. annotante, nascitur in squalidis locis inter Herzogenbusch in fabuletis, variisque aliis Brabantiae locis. **Locus**

GRAMEN SPARTEVM BASILENSE CAPILLACO folio, C. Bauh.

CAP. CCXVI.

Ex radice fibrosa, culmi plures exurgunt, qui statim in folia capilli instar angustissima, in acumen molle fastigiata, palmatim sepe, pedemve altiora, absumuntur: nec paniculam, nec spicam obseruauimus. Tota planta insigniter viret, & ex multis plantis simul iunctis celsè constituitur in paludibus Michelfeldæ prouenit *gramen*, hoc *Spartum* 7. siue *Basileense*, folio capillaceo, vt auctor in pin. vocat, vel, vt in prod. *gramen* 29.

GRAMEN SPARTEVM MINVS, VEL HOLANDICVM, C. Bauh.

CAP. CCXVII.

Gramen hoc 30. vt in prod. vocat, vel, vt in pin. *Gramen sparteum* 8. siue minus, vel

Vu 4

Holanicum pro radice fibras tenuissimas albas habet: folia copiosa, capillacea, pallida, triū quatuorue vnciarum, inter quæ culmi tenuissimi, palme altiores, vno, alteroue internodio donati, & penè nudi offeruntur, qui paniculam pallidam diuissam sustinent: & communiter plures cespites constituunt. Nomine sparti Holandici ex sylua Hagana D. Weckerlinus misit.

GRAMEN SPARTEVM MONSPELLI-
cum folio capillaceo minimum,
ciusdem.

CAP. CCXIX.

Synon.

Descriptio

Radicem habet Gramen Sparteum 9. siue Mō-
speliacum capillaceo folio minimum [vt ab
autore in pin. vocatur] pro 3. in prod. descriptum,
ex fibris albis, oblongis, capillacis compositam,
falsa capillacea, vncialia: culmus tenuissimos, nu-
dos, trium quatuorue vnciarum: paniculas par-
uas ex loculis minimis compositas & per ma-
turitatem rufescentes: quod Monspelluli in a-
gris æstiuo tempore reperitur.

GRAMEN SPARTEVM SETAS EQVINAS
referens Casp. Bauh.

CAP. CCXIX.

Synonyma

Descriptio

Hoc [quod in prod. 32. est: in pin. verò Gra-
men spartum 106.] album est, & ex radice
alba, setarum instar, folia cubitos quatuor lon-
ga producit, quæ forma & tenuitate, & robore
caudam equinam eiusque setas referunt: ex qui-
bus fauæ insula inchoe tapetia texunt. Cuius for-
tè mentio fit in C. Clusii curis poster. sub Herba,
Sparto Hispanico non absimili. Sic ex Insula Vir-
ginica, arboris cuiusdam cortex candidissimus,
in pili tenuitate diuissis adfertur, è quo incolæ pā-
nos texunt: hunc corticem à D. Gillenio, Gramē
verò à D. Saltzmanno accepimus.

GNAPHALIVM TRAGI, SIVE IVCVS
Bombycinus.

CAP. CCXX.

Descriptio



Gnaphaliū
Tragi.
Linum
pratense.

Implexis fi-
bris radica-
tur, iūcos tol-
lens rectos
enodes, folio-
sos, in quorū
summitate è
bifori vagina,
longis lentis-
que pediculis
appenduntur
paniculae to-
mentose, can-
dida bombyci
opera & mol-
litie prastan-
tes.

A Trago in-
scribitur Gna-
phalion, &
Mattēstache/
h. e. Linum

pratense, & Wissen wollen, id, est, Lana pratē-
sis cognominatur, statuiturque Iuncei Graminis
genus. Eiusdem cum Trago opinionis est Cor-
narius.

Tabern. icon. & Hist. *gramen tomentosum*, *Linum pratense*, *Linagrostrū*, *Eriofchenus*, *Linoschenus*
Angl. Waterlecke & Medowse wouffe. Fland. &
Brab. Syde Diefse volckdiefse / Quispelbiefse /
Mattēstachē vnder wattenbiefse. Germ. flachē
senggras. Errant qui Dioscoridis Gnaphalium
faciunt.

Geln. de stirp. coll. vocat simpliciter *Mattē-
stachē*: In catal. pl. appellari censet Alopecuron,
& Frumentum caudatum à quibusdam, quæ opi-
nio nobis non placet.

An Plinius lib. 19. cap. 1. de hoc ait: Aegyptiū
quartum Lini genus Orchomenium appellant.
Fit è palustris veluti Arundine duntaxat (Fit è
palustris arundinis foliis, vel duntaxat Dalech.)
panicula eius.

Casp. Bauhin. Phyt. *gramen 122. siue tomentosum*.
Eid. pin. *gramen tomentosum 2. siue gramen pra-
tense tomentosum panicula sparsa. gnaphalium*
Diosc. Trag. *Typha* Diosc. Ang. *Iuncus bom-
bycinus*, Adu. Lob. icon. pag. 87. Obl. pag. 44.
gramen eriophorum, Dod. *Linum pratense*, Geln.
coll. Icon. *Gnaphalion Tragi*, Hist. Lugd. pag.
116. *Pseud. linum*, Cast. icon. *gramen iuncum*
lanigerum Thal. *gramen tomentosum*, & *Linagro-
strū* Tab. *gramen tomentarium*, Ger. Nonnunquam
contractis pediculis tanquam pappus confici-
tur.

Genearū provenit in vliginosis pratis quā intur
Cologn, cum suo tomento Maio. In valle Grief-
bachiana vbi fontes acidi, abundat. C. Bauhin.
observauit Basilicæ propè Michelfeld. Pleritque
humidis & desertis Brabantia & Germaniæ lo-
cis, huiusmodi Gramen reperitur: præsertim
Iunio ac Iulio mensibus, quando ex ipsis iuncibus
stylis lana candicans dependet.

Vi pollet adstringente & condensante, quare
in vino nonnulli decoquunt, propināntque alui
profluvio, ac colica ab eadem causā exorta labo-
rantibus, vires vltiores & facultates nos la-
tent, Tab.

IVCVS ALPINVS CVM CAUDA
leporina.

CAP. CCXXI.



Crebros
ex paruis
radicibus sur-
rigit culmos
dodrantales,
interdum cu-
bitales, stri-
atos, foliis pro-
pter terram
stipatos, quæ
& ipsos cul-
mos aliquo-
tis inuol-
unt, alioquē
Iunca folia
in stylum exe-
unt acutum,
pauloque su-
pra radicem
rufescentia,
sæpe in fibras
como-

et omnes fatiscunt: ceterum singuli culmi in terbitatam caudam, canescentibus tomentosis squamis, compactilem, fastigiantur, molliti holotericum prouocantem: radiatur denique fibris aliquam multis, fragilibus.

Casp. Bauh. phyt. *Iuncus* 10. siue *Schoenolaguros*, missus à Fratre Io. Bauhino nomine Iunci alpini cum cauda leporina: Eid. in prod. *Iuncus* 7. siue *capitulo lanuginoso*: Item pin. *Iuncus capitulo lanuginoso* 3. siue *Schoenolaguros*, à capitulo haud multum leporum caudæ dissimili.

Prouenit in monte cundo Ribesæve ex fonte acido S. Petri Maijo, eodémque mense in procelloso monte, itinere Griesbachiano, Dornstet. urbem Ducatus VVirtemb. versus.

IUNCUS ALPINUS BOMBYCINUS.


CAP. CCXXII.

QVI C. Bauhino in prod. *Iuncus* 8. in pin. verò *Iuncus capitulo lanuginoso* 2. siue *alpinus bombycinus* est, et ex radice aliorum Iuncorum simili, *falsa* iunca exurgunt, inter quæ *culmi* plures tenuissimi, palmo minores, qui capitulum paruum, lanugine alba ornatum, sustinent.

In montibus Morauie loco dicto Reßel, Di. Fleissler eruit, & communicauit.

SCHOENANTHOS AVE IUNCUS odoratus.

CAP. CCXXIII.



Inter Schoenanthi vulgaris plantas reperitur quedam festuca, multæ simul iunctæ, Gramini similes, in quibus interdum ab vna radice oriuntur multæ veluti spicæ, cespiteo modo longitudinis palmi, coloris ferè & forma foliorum Tritici circa inferiora, color enim est ex luteo pallidus, vt plurimum, vel quasi cinereus, interdum tamen

etiam rubent: rubent etiam superiores partes foliorum, quæ vbi graciles sunt circumuolutæ ab ipsa statim radice: *falsa* sæpius inter se circumuoluuntur & efficiunt veluti caulem. *Caules* habet multos ab vna radice, circa quos conuoluuntur folia in inferioribus, nodis (longè ab inuicem distantibus) distinctos. A nodis exoriuntur etiam folia, quæ caulem amplectuntur. *Caules* autem similes sunt culmis Tritici Auenæ, graminis &c. qua ratione verò dicuntur *adæquo*, à Dioscoride, intus non sunt concaui vt prædictorum, sed medulla fungosa farcti simili medullæ Iunci vulgaris: *steres* ex purpureo canescentes, papposa lanugine obfita, habent aliquid com

mune cum Arundinis floribus, ac quodammodo similes feminibus Nerij. *Radices* multæ sunt satis longæ, duræ, denudatæ, vt plurimum, à cortice, quodammodo similes Cirris Hellebori, vel Valerianæ. Interdum adfunt radices paulò crassiores, densæ, gemiculatæ, gustu valentiores reliquis, ex quibus tum cirri oriuntur, tum ipsæ veluti spicæ quæ videntur veluti per terram repisse. Vbi recens est hæc planta, qualem ego vidi, manibus confricata iucundi est odoris, & saporis non ingrati, licet videatur aliqua adesse amaritudo cum acrimonia, luculenter linguam mordicante, quæ tamen solet eliciacior esse in quibusdam foliis remissis, gramineis, valdè tenuibus, & carinatis.

Clusius apud Garciam sic describit: Natæ sunt nobis anno 1568. aliquot Iunci odorati plantæ, è semine, ex Italia missæ. Est verò Iuncus plura multis culmis assurgens, tenerioribus foliis quam Gramen, seu *ma* (quam pulcherrimè refert) linguam mordicantibus iucunda & aromatica quadam acrimonia, quæ trita gratum quidem spirant odorem, sed in quo rosæ odor non eluceat: nam manducata potius Rosæ, præsertim Saccharo condita, odorem æmulari videntur. Nullum prætulit florem, quod scripsit prouenerit: imò primis frigoribus perit, ita vt annua planta censenda sit. Radix est numerosa & capillaris, non nodosa, vt ait Serapio, gustu feruido & aromatico. Eius *iconem* ad vitium expressam inferere hic hauduit.

Iunci duplex genus est (vt vult Diosc.) Vnus vocatur Iuncus leuiss: alter Iuncus acutus, qui in summo acumen habet. Duplex autem & huius species est: Alter enim sterilis est: alter semen habet rotundum, nigrum: Et huius calami crassiores sunt, carnosioresque. Est & tertium genus, multò carnosius & asperius, quam illa duo, quod vocatur holoschænos, hoc est, Iuncus totus. Habet & hic semen in cacumine, simile præcedenti. Ceterum Æthiopius (alijs *de æthi*) Iuncus tonniferum semen habet.

Plinius lib. 2. cap. 3. de Iuncis agens. Tria, inquit, genera eius: acuti sterilitate, quem *ma* rem & Oxy Græci vocant: reliqua tamen, ferentis semen nigrum, quem Melancranin vocant. Crassior hic & fruticosior. Magisque etiam iamnum tertius, qui vocatur holoschænos. Ex his melancranis sine alijs generibus nascitur. Oxy autem & holoschænos eodem cespite. Vitillissimus ad vitilla holoschænos, quia mollis & carnosus est. Fert fructum eorum coherentium modo. Nascitur autem is, quem marem appellauimus, ex semetipso, cacumine in terram defixo. Melancranis autem, suo semine. Alioqui omnium radices omnibus annis intermoriuntur. Hæc Plin. de libro 4. Hist. pl. Theophrasti transtulit. Sed mox de suo addit. Vfus ad nassas marinas, vitillium nexus, elegantium Lucernarum lumina, præcipua medullas, amplitudine, iuxta maritimas alpes tanta, vt incisio ventre impleat penè vnciarum latitudinem: in Ægypto verò cribrorum longitudinem, non aliad vitilliorum. At verò hic locus haud dubie corruptus est. Deest enim vnciarum numerus. Quæ verò puranda est cribrorum longitudo? Quamquam autem inquit Cornar. doctissimus quisque ita hætenus legerit, & locum hunc citauerit: tamen ego sic lectionem restituendam indicō, vt legatur amplitudine iuxta maritimas alpes tanta, vt in ciso ventre impleant denum vnciarum latitudinem: in Ægypto verò cybionum

Clus. test.

Iunci dor:
plea Diosc.Iunci gener:
ra tria,
Plin.Plinii locu:
corruptus.

longitudinem, non aliis vtiliorem. Denum vnicium, id est, pollicum latitudinem implere dixit. Sunt enim æque duodecim pollices in pede Romano, sicut in libra duodecim unciae, velut lib. 5. cap. 9. comm. medic. declaravi. Et profectò proclive fuit penè vocem, per denum substituire. Deinde cybiorum longitudinem implere ait, eamque longitudinem non esse aliis, quam cybiis videlicet, vtiliorem, nimirum ut ipsi excipiantur ac colligantur. Cybium autem appellari concisam pelamidè Plinius testatur. Et hic facile fuit à cybiori voce, ad criborum vocè delabi. Vetus noīter codex cimbiōrum scriptum habet vnde ad hanc coniecturam devenimus, quam cuiusque iudicio expositam, sequendam aut reprobantiam relinquimus. *Perrosūbiungit Plinius* hinc vsum Iunci medicum, Iunci radix, inquit, in tribus heminis aquæ decocta ad tertias, tussi medetur. Semen tostum & in aqua potum, sistit alium, & faminarum menses, capitisque dolores facit. Et hæc consonè cum Diosc. nisi quod in aqua potum, pro *perrosūbiungit* dixit. Est autem *perrosūbiungit* vinum aqua dilutum: deinde rursus menses reddit *perrosūbiungit* suo more, velut iam sæpè dixi. Verum quod hinc sequitur penitens alienum est à Diosc. sententia. At qui vocatur rursus holoschœnos, eius folia quæ proxima sunt radici, commandantur aduersus araneorum morsus. In vulgatis codicibus vox folia deest, & Dioscor. ea non commandantur sed imponi iult. Et tandem subdit Plin. Inuenio etiamnum vinum Iunci genus, quod Euripiceū vocant. Huius semine somnum allici sed modum seruandum, ne sapor fiat. At hic Euripices vocis lectio doctis semper suspecta fuit. Vetus codex Trepiceū habet, non minùs incerta lectione, Dioscoridis codices partim *heremidis* habent, partim *adromidis*. Hos sequitur iudicium doctis deferro.

Galenus, Iuncus lauis alter, inquit, *heremidis* alter *heremidis* nominatur. Et gracilior quidem ac durior est oxyechœnos, crassior autem & laxior holoschœnos. Semen holoschœni somniferum est. At oxyechœni duo sunt species, altera sterilis, cuius vñs ad medicinam nullus est: altera semen fert, & ipsum somniferum, sed minùs quam holoschœni semen. Inducit tamen hoc etià capitis dolorem. Amborum verò semina si cum vino bibantur, fluxiones ventris resicant, & fluxum rubrum cohibent. Ex quibus clarum euadit temperamentum ipsorum esse compositum ex terrea substantia leniter frigida, & aquosa: leniter calida, ut inferna siccare possint: & vapores ad caput remittere leniter frigidos, quibus somnum inducunt.

Celsus & Latiniore Iuncum odoratum rotundum vocant, ad differentiam angulatis, quem iidem quadratum appellant, Græcè *heremidis* appellatur per excellentiam, quum aliàs omnes Iunci species hoc nomine veniant. Hippocrates *heremidis* *heremidis*, id est Iuncum odoris iucundi, & benè olentem, ac odoratum, in lib. morb. mulier. vocat, h. e. Aromaticum Iuncum, ut Galenus exponit in glossis. In Officiis hodie radices rarò habentur. Quæ verò reperiuntur Festuæ siue culmi, Squinanthi nomine appellantur corrupto illo ex *heremidis* *heremidis*. Nostri *Wolrichende* bingen vocant, Camelheru / host est Fanum camelorum, velut etiam Galli pascum camelorum. Et profectò Festuæ illæ Officinarum præ-rasæ apparent ex superna parte, quod ipsi à Camelis contigisse verisimile est. Appellant etiam Græci *heremidis* *heremidis*, quod in vnguenta recipiatur.

In Mazcate & Calaiate Arabiae prouinciis, ab incolis *Sachbar* vocatur: à nonnullis verò *hachule*, id est, herba litoria, aut lotionibus idonea: tamen non negem [inquit Garcias] aliis etiam nominibus apud Arabes insigniri. Nā Auicenna lib. 11. cap. 591. cum *Adhar*: Serapio c. 19. *adhar* appellant: quos sequuntur omnes Arabici & Persici Medici hic agentes: florem verò vocant *Foca*. Nam quod Syluaticus cap. 12. *adhar* & adhecarum vocari scribit, corrupta sunt vocabula. Persis, qui ad iam dictas, vique Prouincias pertingunt, *Alsf*, quod herbam significat, vocatur, quo nomine per excellentiam appellari potest. Apud Indos peculiare nomen non est sortitus, sed herba *Mazcatensis* appellatur. Sunt qui *paleam de Mecha* nuncupent. Nec desunt qui *Pasum camelorum* vocent, nec immeritò, sed tamen Cameli non sunt isti adeò frequentes, ut hoc Gramè cum floribus omnino depascere possint. Sed sunt ibidem multi Asini, Muli, Equi, quos Arabicos vocamus, boues Capræ, & oues, quæ nullum aliud pabulum norunt quam hanc herbam, siue Gramen. Desertur quidem in Indiam in vsum Medicum vsurpandis. Maximà tamen copià per fasciculos colligatum in nauibus adsumunt equarii mercatores seu mango-nes, ut equis subterant, ne stercoretis & vni-
pædore offendantur. Nam simul atque maduc-rit, recentem subterunt, & madidum in mare abiiciunt. Sed & nautæ fasciculos aliquot secum aduhere solent, quos deinde in Italia vendunt. Memini in Insula *Diu* vili emisse multos Iunci fasciculos, quos in Lusitaniam cum aliis aromati-
bus mitterem: nullum tamen florem videre contigit. Sed nec aliquo in pretio ab incolis habetur, cum Gens sit rudis & syluestris. Nullus est huius vsus apud istius regionis incolæ: sed non duntaxat, & Medici Arabes & Persæ, eo vitmur. Ipsi indigenæ eo se & sua iumenta lauant. Nunc
ad *Auic. res*, qui eius meminerunt venimus. Dioscorides lib. 1. cap. 16. laudatissimè ex Nabathæa, proximum Arabicum, quem aliqui Babylonium vocant, pessimum ex Africa adferri scribit. Floris culmorum, radicisque esse usum. Eligendum eū qui manibus confriatus Rosæ odorem emittit. Scio in iis quas suprà enumeravi prouinciis, quæ Arabia nomine comprehenduntur, prouenire. An verò in Nabathæa gignatur (quæ à Nabatoch Ismaelis nepote denominata, prouincia est Arabiae Iudææ contermina) diligenter perco-
tatus sum à Medicis, qui in Hierusalem, Galilæa, aliisque vicinis prouinciis versati erant: Sed illi responderunt, eum, quo istic vterentur, ex Cairo aduehi. Interrogati verò an in Cairo nasceretur, an autem ex Mazcate adferretur, ignorare se dixerunt, quoniam medicamenta interdum ignota manerent ob indigenarum negligentiam. Quæ cum audirem, inquirere non volui num Babylo-
ne nasceretur, tamen id fieri posse purem. Cum *Africæ* verò Dioscorides Africanum improbet, non oportet nos admodum sollicitos esse in eo inuestigando, præsertim cum non adscripserit quâ Africa regione proueniat. De floribus autem, cum meam, tum reliquorum Medicorum negligentiam agnosco qui non iubeamus eum aduehi. Nostri etenim culpa factum est, ut eius vñs deficeret. In medicamentis odoratis, Dioscoridem incertis comparationibus plerumque uti video, quemadmodum & in hoc Iuncu. Nam tritus iucundum quidem spirat odorem, sed Rosæ haudquaquam. Iuncus odoratus, Cornelio Celfo Iuncus rotundus vocatur, & ad Iunci vulgaris, & cyperi, siue Iunci

Iunci
radix.

Euripice
Plinius.

Iuncus odoratus
vulgaris
Celfo.

luncus triangularis differentiam : sed minime in eam altitudinem excrefcit, quā luncus. Auicenna lib. 1. cap. 591. duos eius genera constituit, Alcerum enim Arabicum vocat, qui est odoratus. Alterum in *Agiari* natum, per quod vocabulum Damascum intelligit. Sed quod Dioscoridis testimonio, luncum fructum proferre nigrum probet, manifestus error est, cum Dioscorides nūquam fructus meminerit. Serapio lib. simpl. cap. 49. ex autoritate Bonif. scribit luncum habere radicem *Chulem* similem, latiore tamen, & minoribus modis cinctam, multos calamulos prædidos proferentem, qui fructum proferant similem floribus Arundinis, graciliorem tamen & minorem: simulque & in vno cespice multas plantas nasci. Huius radix adeo similis est *Chulem*, ut sub eo nomine à nonnullis appelletur, quemadmodum initio dixi. Matthæus Siluaticus cap. 12. decem annis conservari asserit. Credo in siccis & mediterraneis regionibus multo tempore conservari posse, cum humiditate non abundet. Sed in huius Provinciae maritimis, paucis annis in sua odoris fragrantia conservari potest. Quod ad Brasauli & Monachos in Mesuen com. attinet, doctè illorum argumenta refellit Matthiolus, Com. in Diosc. lib. 1. cap. 16. quare superuacuum esse iudico quidquam his addere. Satis tamen Monachorum in Mes. dist. 1. cap. 47. oscitantiam mirari non possum, qui calangam lunci odorati radicem esse contendunt, cum calanga in Sina nascatur, quæ bis mille ferè leucis ab Arabia abest, & plurimum ab luncis odorato differat tum foliis, tum radice: nec nisi lata proveniat calanga, quemadmodum & Calamus: luncus verò spontè nascatur, nec secatur. *Hactenus Garcias.*

Tempestivum nunc est, ut ad alios Auctores qui de luncis scripserunt, deveniamus.

Anguillara sibi persuadet Squinanthum non esse luncum odoratum: quia in Squinantho, non repertur caulis qui similis sit cauli Cyperi, ut videtur voluisse Diosc. Deinde quod radices quæ exhibentur non sint similes radicibus Valerianæ. Præterea quod in vñ medico olim flos, caulis, & radix lunci odorati recipiebatur: nostri autem vñs tantum sit foliorum: res quæ non videbatur silenda fuisse Dioscoridi: ac etiam quod odor & sapor qui in lunci odorati caule & radice sentiuntur, in Squinanthi iisdem partibus non item. Cum in libris Arabum legimus (Monachorum in Mes. verba sunt) florem Squinanthi, non possumus per Squinanthum intelligere florem Schœni, sed plantam eius, intelligunt enim per Squinanthum absolute plantam ipsius Schœni. Schœnum autem non sunt illæ palææ, quibus vbique in Officiis vtuntur: quia descriptio Dioscor. de Schœno odorato non convenit illis, ut quilibet videre potest: non enim habet radices notabiles ad Medicinæ vñm, sed quasi capillaceas parvas, & nullius roboris vel momenti, nec mordicant linguam ipsæ palææ, & quamvis sint æqualiter odoratæ, non tamen spirant rosæ odorem: & quod maius est, videmus quod non producant luncum, sed calamus nodosum, sicut & calamus hordei aut frumenti: quoniam vñ plurimum exportantur cum parte ipsius calami. Vnde nonnulli re & existimant ipsum Squinanthum vñalem esse plantam calami aromatici. Reuera Squinanthum non habemus. Sed multorum quidem non spernendum est opinio, quod hæc radix quia communiter pro Galanga vtimur, sit radix ipsius veri Squinanthi. Etiam à nonnullis qui fatentur se vidisse vivam plantam istius Galangæ vñalis,

habuimus quod ad vñquem correspondet Diosc. descriptioni de luncis rotundo, odorato. Galanga autem, quæ (ut supra diximus) Græcis incognita fuit, & à nobis quoque minime cognoscitur, alia planta est, & apud Arabes solummodo perquirenda. Vnde tam pro floribus quam pro ipso Schœno, (quibus caremus) quam etiam pro ipsa radice posuimus, uti ubi oportet hac vñali Galanga. Possumus quoque uti hoc vulgari Squinantho, quod esse plantam calami aro. nati, opinantur plures, quoniam, ut in Dioscoride & cæteris fide dignis authoribus videri potest, virtutes & proprietates calami aromatici & lunci odorati, nihil, aut satis parum, inter se differunt: ex quo bene potest alterum pro altero compensari. *Hactenus Monachi.*

Cord. in Dioscor. hæc de Schœnantho scribit. *Cord.* Contuli aliquoties de Schœnantho cum mercatoribus, nonnullisque aliis grandæis & magnis viris, qui visendæ terræ sanctæ gratia in Orientem hinc proficiscebantur. Ij retulerunt, negociatores ex Syria Alexandriam ducere Camelorum greges, quos *Caravanæ* vocant, impositas merces ferentes, cum autem in solitudines proveniant inter Syriam & Egyptum ad Arabiam sitas, neque pabuli, neque aquæ copiam inveniunt, nasci tamen secus vias vbique aridæ velut stipulas, easque numerosas, densas, & supatas ex imo radicum cespice, admodum odoratas, quas obiter inter eundem aut alias quiescentes depascant Cameli, eamque ob causam se pabulum hoc famelico & famelico appellare. Referebant etiam illos folere cali pabulo Camelos onerare, ne in sterilibus deficerent iumenta: quod verò supersit Alexandria & Alcani vili admodum vendere. *hac Cordus.*

His sequentia opponit Matthiolus: Flos ad nos non importatur, quod tamen mirum non est, cum etiam Galeni tempore non haberetur. Proinde, inquit lib. 1. de Antid. luncum odoratum ex Arabia allatum &c. Quæ Galeni (si licet nobis dicere quod sentimus) potius ridenda quam probanda videntur. Arduum quippe fuerit credere, tam ingentem esse numerum Camelorum, qui locustarum modo in vñuersum Schœni flores depascantur, ut nulla penitus supersit planta, cui flos non deuoretur. Referunt quidam nasci odoratum luncum etiam in Apulia, quin & in Campania provenit, ut Brasaulus inquit Plinij auctoritate. Sed vereor ne hallucinentur, quod nec inde flores adferantur, nec palææ: neque etiam id Plinius asseveranter asserat. Is, quo Sepalsarij passim vtuntur, non affertur aliunde, quam ex Alexandria. Cæterum non parva quidem diligentia, dum emitur est adhibenda: quandoquidem non desunt impostores, qui ad merces augendas, Schœnum palcatum, & herbarum quibuldam festucis adulterent. Præterea videndum est, ne vetustate exoleuerit. Quod Dioscoridem oscitantem legerint, cum dicunt Schœnum luncum proferre num cala num, facile patet, quandoquidem contrarium scribit Dioscorides, ubi Schœni vñm reddit his verbis *χολος ὁ τῆς ἀνδρείας ἡ βλάστησις*. Præterea quod communis vñs Schœnos acrimoniam non habeat, pariter falsum est, palam est, Monachos vel nunquam Schœnum degustasse, vel si degustarunt, illum adeo vetustate exoleverunt fuisse. Quod autem nostri Schœni radices tenues sint, nihil ad historiam refert: siue enim tenues sint, siue crassæ, eas non describit Dioscorides, Schœni flores ex Alexandria vñæ cum integra planta allatos ego

in manibus habui, qui digitis attriti Rosarum odorem emittebant. Quamobrem non temere contra Monachorum sententiam affirmandum putauerim communis usus Schœnum, legitimū & probatissimum esse. Et in post. comm. Lat. & Ital. com. mag. fig. Fuchium errasse crediderim, qui scripserit sua in methodo, Schœnanthi stipites nullam acrimoniam mansu relinquere: in quo errore cum secutus est Anguillarius.

Putamus nos rotundum odoratum Iuncum, qui non fuerit exoletus, nunquam degustasse Anguillarium, ut nec Fuchium. Nec prætereundum erat quod aliquando monuit Rondeletius præceptor meus, figuram Schœni odorati Matthioli fictam, potiss. quoad flores, quod manifestè mihi quondam apparuit visis Veronæ apud insignem Pharm. Bellicorum summitatibus Schœni odorati in quibus erant veluti flocci: Lugduni copiosum habebat Valerandus Dourez pro Theriaca.

Monachos quoque refutat Amatus, dicens: Schœnos siue odoratus iuncus, in Africa & Alia præcipuè nascitur, quanquam & in Campania & Apulia reperiri, viribus saltem impotentioribus, audio: quem Latiniore rotundum Iuncum odoratum appellant, ut diuersi ab illo odorato anguloso Iunco faciāt, quem hodie Officinæ sub eodem ferè nomine habent, Schœnanthum appellant. Verbum iunci, florem significat, nam Schœnos Græcè iuncus est, Anchos verò flos, unde Schœnanthum, quasi iuncus flos: quanquam hodie, veluti Galeni tempore, flos ad nos non affertur, unde ille libro de Antidotis primo, ita inquit, præterea Iuncum rotundum Arabicum immitti præcipit, qui à vulgo, haud scio quomodo, Iunci rotundi flos dicitur, quum tamen nos non adeò floris copiam habeamus, tota enim aduehitur herba subinde ex parte superiori à camelis erosa: nā libentissimè eam depascuntur, & copiosissimā in Arabiæ viis crescentem habent, hac ille. Hodie quoque ex Oriente ad nos absque flore portatur, cuius folia, caulis & radix in Officinis habentur quæ utinam pura essent, quum à multis adulteretur, illis varia immiscensibus, vel recētia saltem & non vetera portarentur, quum Galeno autore, facile Schœnos veterescat, quod ex odoris amissione deprehenditur. Nonnulli tamē opinati sunt, ut Monachi, qui nuper Mesues antidotarium enarrarent, quod hodiernum Schœnanthum officinis vulgare, Dioscoridis Iuncus iste odoratus rotundus non sit, quum in eo acutus ille desideratus sapor, linguam mordicans non percipiatur, nec quantulumque odoratum sit, nec manibus confricatum Rosæ odorem spiret. Item quod Schœnanthum hoc, non Iuncum aliquem ex se mittit, sed potius calamum, similem illi quem Triticum aut Hordeum facit, unde inter se multum differre, pro fitino gloriantur: sed re vera eorum gloria in infamiā vertetur, quum in duplici errore comprehendatur, primò Dioscoridis textum non intelligentes, quum Dioscorides Schœnum, id est odoratū Iuncum, non Iuncum aliquem ex se loco caulis mittere, sed potius harundinem, aut calamum tradat ut in sua legitur lingua, quæ ita habet, *χρῆται δὲ τῷ ἀνθρώπῳ, ὡς τῷ ἄρῳ ἀπὸ τοῦ, ὡς τῷ ἐλάτῳ*, id est, floris calami, & radicis usus est. Ex quibus verbis satis percipitur, quam malè Monachi isti Dioscoridem intellexerunt, quum Schœnon, nōn Iuncum, sed calamum ex se caulis vice mittat: Secundo hallucinantur Fratres ij, quia experientie contradicunt, affirmantes Officinatum Schœnā-

thum in gustu linguam non vellicare: quum re vera recens eam valentissimè mordicer, unde credendum est, Schœnanthum ab illis gustatum, verus omninò esse, à quo non solum odor, sed & sapor facillè, ut ex Galeno didicimus, euascescit. Sed quod Rosæ odorem referat, qui illius flores viderunt, similem odorem habere attestantur, ut minimè ambigendum sit, quod Officinatum Schœnanthum, Iuncus odoratus Dioscoridis sit, cuiusque vires inuestigat Galenus l. 4. simpl.

Fuch. de comp. med. ait iunci odorati flore qui Actuario & aliis recentioribus Græcis *γὰρ* appellatur, maxime vrendum esse. Hodie tamen florem ad nos minimè deferri, sed culmos duntaxat eiusdem, superiore tamen parte à Cameliis erosis: Germ. Camelbeu / i.e. Fœnum camelorum, nominariū od. i. vero Squinanthum. Esse præterea perhibet qui culmos illos legitimos esse negent, quòd sc. linguam non mordicet, nec Rosæ odorem spirent. His alios opponit, qui Schœnanthum recēs & linguam valdè mordicare, & Rosæ odorem referre testentur. Nec miraturus verus & odorem & saporem amittere.

Anguillara & Monachi, ut ex hæcenus dictis patet, præcedentium [Cord. Syluii, Cronemburgi, Dodonæi, nec non Cornarii, ac Amati, & aliorum, qui vulgare Iuncum odoratum recipiunt,] opinioni resistunt, negantque nostrum Schœnanthum, esse verum & Antiquorum, quorum argumenta sic refellimus.

Primum Anguillare respondeo, me non animaduertere, Dioscoridem velle caulem Schœni similem esse Cypero, ut ipse ait: nec etiam igne-rio vocari Iuncum angulosum, ut dicit Dodonæus.

Secundò, Dioscorides cum comparat Valerianam siue Phu Schœno, non totam radicem, sed partes, videlicet *ἐπιζῶα* intelligere.

Tertiò, quod ad argumentum desumptum à viribus & usu, quod aut nostri Schœnanthi usum esse tantum foliorum, dupliciter respondeo. Primum fortè eos vsos adhuc virentibus, & fieri posse, ut efficacior hinc sit recēs, quam verustior, qualem ut plurimum habemus. Apparet enim fibras rectas fuisse cortice, & tantum remanere lignosas partes, ast in cortice fortè vis non parua est. Secundò laudantur radices à Dioscor. & Galeno ab adstrictione, in quibusdam affectibus, quæ adstrictio gustanti apparet, maxime in crassioribus radicibus proximis caulibus & foliis. Flores laudantur à caliditate, idè recipiuntur in antidotos, ut Theriaca, iis tamen carem sicuti & culmis integris. Pro iis vimur summitatibus foliorum, & meritis, cum omnia in iis comperiamus, quæ requirit Dioscorides, & Galenus licet fortè imbecillius.

Quartò dicit, se non sentire, neque saporem neque odorem in caule & radicibus: ad hoc respondeo idem quod iam de radicibus. Præterea cum obscuriores sint vires fortè in culmo & radicibus minùs ei apparuerunt. Addiderim me nusquam legisse efficaciores esse vires in radicibus & culmis quam foliis, nisi in radicib. ut dictū, ratione

Monachorum error.

tionē, adstrictionis. Hāc eādē rationē respon-
deo Monachis, qui reiciunt nostrum Schēnan-
thum, quod radices nōa mordicent linguam.
Credo equidem eas non sensisse, cum nec in foliis
perceperint, in quibus is manifestē cum Matthio-
lus, tum ego deprehendimus, nec non & Ama-
tus. Præterea non celebratur acrimonia in ra-
dice.

Sexto est quod respondeam Monachis dicenti-
bus Schēnanthum luncum non producere, sed
calamum nodosum. Calamum ferre fateor, lunc-
um requiri à Dioscoride non reperio: interea
quo modo luncus sit similis postea ostendam in
descriptione.

Septimò non morabor refutando opinionem
Monachorum Squinanthum vulgare non esse
Calamum aromaticum, ut ipsi volunt; cum ra-
tionibus præcedentibus euerit eorum argu-
menta, & consentiam cum iis, qui credunt, nos
verum Schēnanthum habere.

Octavo, refutanda esset eorum opinio, quā ex-
stimant Galangam esse luncum odoratum. Ver-
um hoc factum suo loco capite de Acoto.

Nonò miror Matthiolum ridere Galeni ratio-
nes, cumque non meliores adferre, imò hac in
parte nullas.

Decimò, illud considerandum relinquo an me-
ritò Matthiolum reprehendat Fuchium, nusquam
enim legi eum scribere, quæ dicit Matthiolum.
Recitat quidem loco supra adscripto, opinionem
quorundam, qui dicunt culmos non mordicare,
non autem suam. Quinimò in fine hoc vetustari
attribuit Fuchius.

De luncis hæc notatu digna scripsit in suis pin-
t. Calpar. Bauhinus. *luncus* à iungendo, Græcis *σύν-
θεσις*, à loris & funibus dicitur. Dioscorides in o-
doratum & inodoratum diuissimè videtur. Nam
lib. 1. de luncis odoratis, quem simpliciter *σύνθεσις*
per excellentiam nominauit, egit. At lib. 4. de ino-
dorato tractauit: hunc duplicem fecit, vnum læ-
uem, alterum acutum: hunc sterilem, & alterum
femine nigro & crassiore calamo, & tertium *σύνθεσις*
prioribus carnosiorē. Sic Theoph. 4. hist.
3. tria sunt genera *σύνθεσις* & *ἀνάρτος*, acutus & steri-
lis, qui *μακρὰν* & *σύνθεσις* frugifer, quem *μακρὰν*
atriterum vocitat: tertius *σύνθεσις* dicitur de
odorato 9. hist. 7. egit. Plinius lib. 21. cap. 18. quin-
que fecit, 1. *Μαρίσκον* appellatum, 2. *Μαρίσκον*, O-
xyphœnum, & huius tria genera: acutum, steri-
lem, quem marem & oxym: alterum semen fe-
rentē, quem Melancranthū vocant, & fructuosior:
magis tertius, qui Holoschœnos nominatur.
Quare luncus alius est odoratus, inodorus alter,
vel alius locis aridis, alius aquosis provenit: hic,
vel in aquis dulcibus, vel maritimis. Rursum v-
triusque generis alij *ἀνάρτος* & *ἀνάρτος*, in mucro-
nem pungentem desinunt, alij in fastigium obtu-
sius: & sic alius *ἀνάρτος*, lævis: alius *σύνθεσις*, asper:
alius fastigio acutiore, alius obtusiore. luncus læ-
vis & in fastigio acutus, alius est Oxyphœnos,
alius Holoschœnos. Oxyphœnos alter *μακρὰν*
nullo semine fecundus: alter *μακρὰν*
μακρὰν, nigrum semen ferens: sic ad fecundum cla-
uatus: petrosus verò ad lapides referendus est.

Cæterum, luncus de quo præfenti capite nobis
sermo est, vocatur *σύνθεσις* & *σύνθεσις*, & *σύνθεσις*, &
σύνθεσις. Hipp. *σύνθεσις* ἀνάρτος & *σύνθεσις*, Græcis
posterionibus. *σύνθεσις* Diosc. & Galeno. *luncus o-
doratus*, Plinio, Hermol. Ruell. Matth. Turn.
Lac. Lobin Adu. & Obf. p. 42. Ic. plant. pag. 82.
Clus. in Garc. & H. Lugd. p. 188. *luncus rotundus*
Celsio. *luncus rotundus odoratus*, Marcell. Amat.

to, & Corn. *luncus* & *luncus* seu *aromaticus*.
C. Bauh. phyt. in pin. *Schœnus* & *luncus* odoratus
teres ac rotundus, Cordo; *Schœnanthum* Mesuero.
Lon. (cui & Cyperus rotundus.) Tabern. (&
luncus aromaticus) Cam. (& *luncus floridus* seu
aromaticus) Acolthe. *Squinanthum* Varroni, An-
guill. Guil. & Officinis, quibus *luncus*, & *luncus*, lunci
flos. Adhar & Adhar, Arabib. *Sachbar*. Arabia
incolis. *Palea de Meina*, & *Pastum camelorum*, vul-
gò, & Germ. *Camelstra*, hoc est, Camelorum stra-
men, *Camelshew*, *Fenum camelorum*, mollrie-
fende *Bingen*, luncum bene olentem; & *Can-
disch hew*, *Fenum Candia*. Gall. *Pasture de Cha-
meaux*. Ital. *Squinanth*. Hisp. *Paya de meya*.
Belg. & Angl. *Squinanthum*. Boh. *City wona*
ne.

Exner, alius in Lybia nascitur, alius in Arabia, Locus
alius in Nabathæa. Adfertur & ex Ægypto. In
Campania & Apulia quoque reperitur. Reponi-
tur ut alia: quotannis mutatur; quamvis etiam
decennium seruari possit.

Vim porò esse floris, & culmorum, & radi-
cis, hinc Dioscorides docuit; Vim habet vrinam
ciendi, menses ducendi, status dissoluendi; gra-
uar caput & moderatè adstringit: habet insuper
vim aterendi, concoquendi, & aperienti: Flos
igitur ipsius in potu commodus est ad sanguinis
eductiones, & ad dolores stomachi, pulmonis,
hepatis, renū: miscetur etiam antidotis. Radix
adstringit: quapropter etiam naufragandis sto-
machis exhibetur: hydropicis item & conuulsis,
cum æquali Piperis pondere ad aliquot dies. De-
coctum verò ipsius inflammationibus circa vte-
rum commodum est ad infesum. Galeno Schini-
anthos modicè calefacit, modicèque etiam ad-
stringit, nec planè à reuivatis natura alienus est.
Quocirca his de causis vrinam mouere, menses
que ciere perhibet, siue in fomentationem;
siue in potionem adhibitum; prodesse & ieo-
coris, & stomachi, ac ventris phlegmo-
nis. Magis eo adstringit radix. Quod verò
flore vocant calidius est. Porò in omnibus
suis partibus, in aliis magis, in aliis minùs, gu-
stantibus apparet adstrictio: proinde medicinis,
quæ hemoproicis, siue sanguinem reicientibus
exhibentur, commiscetur. Ex Nabathæa lauda-
tissimus, vel Plinio testē, proximus Babylo-
nius, pessimus ex Africa & sine odore. Est autem
rotundus, vinosè morbidity ad linguam. Sin-
cerus in confricando odorem rosæ emittit, ru-
bentibus fragmentis. Discutit inflationes, ob id
stomacho villis, bilēque & sanguinem reii-
cientibus. Singultus sedat, ructus mouet, vri-
nam ciet, velicè medetur. Ad muliebres vsus de-
coquitur. Opisthoracis cum resina arida impo-
nuntur. hæc Plinius.

Vires & vi-
sus.

IVNCI GENVS EVRIPICE.

CAP. CCXXIII.

Aliud etiamnum Iunci genus ex versorie Descrip-
tione Hermolai traditur à Dioscoride, quod Eur-
ipicen *εὐριπίαν* pro qua voce Cornarij à nobis
recedens *admentum* legit, vide antè.) vocant: cuius
semine somni alliciuntur: sed modus in eo ser-
uandus, ne sapor fiat.

Non desunt autem qui Euripicen Tropicen ap-
pellent, inter Recentiores: quorum plerique eru-
ditionis suæ periculum faciunt; multisque parti-
bus rei latinæ offiunt.

Plinii verba de Euripice, legenda c. præcedenti.

IVNCVS PANICVLA ARVNDINACEA.

CAP. CCXXV.

Descriptio



Caulis siue styli huic ex vno cespice crebri, cubitales, aut altiores, teretes, firmi, propter terram rubentes, dein obscure virentes, striati, palmaribus foliorum rudimentis circa imū obuoluti medulla rarissima & prope modum membranacea, mucrone mitiore, sed plerūque longo &

tenui, infra quem panicula iubata effunditur, ad Arundinaceam accedens, sed ei mollitie cedens, semen ferens tenue & fuluum, oblongis, in tria foliola dehiscenibus conceptaculis clausum: radix crassa, multis, crassis, intus albis, fibris donatur: cuius oculi primum erumpentes, squamis lucidis nigris compactiles conspiciuntur.

Synon.

Trago *Juncus vulgaris alter*, siue tenuior, cineracei coloris: *Junci tertium genus*: *Holostichum Plinij*: *Virgilij Juncus mollis & limosus*.

Dod. gall. *Juncus secundus*: Et sic lat. in fol. & de frum. sed ibidem primo loco pingitur: Dicitur & *Juncus laevis*, siue *χρῆστα*.

Lobelius in Obs. pag. 43. in Ic. verò pag. 43. figuram habet Dodonæi sub inscriptione *Junci laevis vulgaris panicula sparsa*. Sed ea non responder descriptioni Aduersariorum.

Casp. Bauhin. phyt. *Juncus 1. siue acutus panicula sparsa*: Eid. pin. *Juncus laevis 4. siue panicula sparsa maior*: *Juncus oxyphonus*, Anguill. *Juncus laevis* [siue lenis] Cordo in Diosc. Dod. Hist. Lugd. pag. 985. *Juncus laevis vulgaris* Lob. in Adu. & Thalia.

Locus:

Geneæ & Montbelgardi hic *Juncus* à nobis obseruatus.

IVNCVS MATTHIOLI.

CAP. CCXXVI.

Descriptio

Iuncus Matthioli Maximo ut omnibus numeris minor, ita facilius, medullam habet compactiorem, albam, oleique in lampadibus bibulam, & ellychnii seu funiculi candelarii sebo immerfus, detracto magna ex parte cortice laui, Solèque aut fumo sicciore redditus, vicem supplet: flores à lateribus citra summitatem erumpentes, rufescentes in orbem glomerantur.

An Lob. in Adu. *Juncus laevis vulgaris*?

An Trago *Junci vulgaris* genus alterum carnosius?

Synonyma

An Dod. lat. hunc describit pro *Juncus* primo:

Casp. Bauhin. phyt. *Juncus 2. siue acutus alter panicula non sparsa*: Eid. pin. *Juncus laevis 7. siue*



IVNCVS PVNGENS, SEV IVNCVS acutus capitulis Sorghi.

CAP. CCXXVII.



qui hic rufus, æmulantibus: infra mucronem autem culmorum pungentem tribus quatuorve pollicibus exiliunt: *storum* seminaque glomerata capitula, quorum exortui subiectum est *folium* indidè erumpens, ex latiore principio vaginam imitata in acumen desinens.

Casp. Bauhin. in pin. *Juncus acutus 1. siue capitulis Sorghi*: *Juncus 2. siue acutus* Anguill. Cordi in Dioscor. & Calloris: *Juncus acutus* acumine Gelin. cat. *Juncus maritimus 1. Lob. Adu. Juncus rotundus alter*, Casalpini, quid? *Juncus* in maritimis nascente locis, acuto & ad vulnus insigendum infesto acumine prædito, *Oxyphonus* vocato, nos carcere dixit Cordus.

Casp. Bauhin. ad hunc solum *Juncum* referri posse putat *Viam palustrem*, & inusitatum *Cariensis* genus, cuius folia peracuta, crura & pedes sauciantia traduntur par. 6. Ind. Occid. exp. in Floridam.

IVNCVS

panicula non sparsa: *Juncus* Matth. Lac. & Cast. *Juncus laevis siue Oxyphonus vulgaris*, Hist. Lugd. p. 984. *Juncus laevis glomerato flore* Lob. Ic. p. 84. *Juncus palustris minor* Tab. An *Juncus rotundus 1. Casalpini*.

IVNCVS ACVTVS MARITIMVS CAULE
triangulo, C. Bauhini.

Radice est serpente, fibrosa, à qua aliæ radice-
culæ, prioribus exsiccatæ, nascuntur: hinc
caules, quos ad radicem breuia folia cingunt, pe-
dales, trianguli exurgunt, & in extremitatem
pungentem desinunt, infra quam è latere *stocus*
racemosus, rufescens exit.

*Iuncus hic acutus maritimus caule triangulo, C. Bauh. in prod. 3. acutus, in pin. in littore Vene-
to, & à Perault via, quâ Montepelio ad mare itur,
provenit: & ad Danubium Lintzj legitur, referen-
te Bursero. An Iuncus exiguus maritimus, Cels?*

IVNCVS FOLIACEVS.

CAP. CCXXVIII.



Foliaceus
Iuncus ob-
liqua radice, fi-
bras albas de-
mittente, re-
spat: culm. ha-
bet bicubitales
& altiores, Iunco panicu-
la arundinacea
mihi dicto satis
similes, verum
non adeo circa
imium ruben-
tes, nec ita den-
sos crebrosque,
medullâ rarâ
præditos: quos
duo triæ ali-
quosque ob-
uoluunt seu va-
gina conclusos

folia, postmodum in stylos iuncos teretes abe-
untia, è lateris fissura panicula prodeunt spatia
magnæ (quarum capitula singularia parua) qui-
bus parum altior reliqua styli portio, aliàs etiam
breuior.

Nostra icon minùs dextrè facta, malè exprimit
folia obuoluentia.

A Dod. gall. videtur pingi pro primo Iunco, &
describi pro tertio, sicut etiam in hist. frum. & Lat.
in fol. vbi dicitur Iuncus acutus & Oxyphœnus:
& Germ. Strop biesen: Belg. Ysren biesen.

Dodonæi figuram habet Lobel. in Obs. pag. 43.
secundo loco cum aliâ, quibus titulus communis,
sc. Iuncus lævis vulgaris: Adu. p. 43. & 44.
An verò descriptio Aduersariorum huic conue-
niat, iudicent doctiores.

An Tabern. icon. & hist. *gramen iuncum* 2. siue
gramen iuncum aquaticum maius, *Groß vasser
seer bingen gras*: Fland. & Brabant. *Groot
water biegras*: Angl. *Great water rushe-
grass*.

Casp. Bauh. pin. *Iuncus acutus* 4. siue *panicula
sparsa*: Iuncus 3. Dod. gall. *acutus* Dod. & Casto-
ri, *Iuncus acutus vulgaris*, Lob. icon. pag. 85. *Iun-
cus Oxyphœnus* Dodonæi, Hist. Lugdun. pag.
985.

Tom. II.

IVNCVS FOLIACEVS CAPSVLIS TRIAN-
gulis.

CAP. CCXXIX.

Magnitudine non parum variat, aliàs palma-
ribus, aliàs plùs quàm cubitalibus culmis, Descriptio



nodosis, com-
pressis aliquan-
tùm, fungosis,
ramosis, striatis:
folia & à radice
statim, & ad ge-
nicula culmos
aliquosque am-
plectentia, gra-
minea, acuta:
fuculis è culmo
diuiso exactis, &
ad diuaticatio-
nem radicem in-
sidunt capsellæ
quinque, sex,
plures, paucio-
resque, simul iun-
ctæ, triquetra,
oblonga, mucro-
nata, ex rufo ni-
gricantes, nitidæ,
semina clauden-

tes perpusilla ruffa. Sed & culmulis aliàs perbre-
uibus, oblongis aliàs, spicæ quædam velut ex-
crementitiæ, & ex foliaceo quodam genere
squammata, rubentisque insident, vdis præfer-
tim & apricis hoc crebrò euenit locis, vt circa
Montebelgardum & Basileam in palustribus Mi-
chelsfeldensibus: radix qualis Iuncis, fibris admo-
dum capillata, iisque longis, & iuxta terræ faciem
coëuntibus, serpit, adeoque si culmi terram atti-
gerint, ex articulis fibras demittunt terram de-
nuò comprehendentes.

Lob. Ic. plan. pag. 12. *gramen aquaticum alterum*.
H. Lugd. p. 1001. *Arund. minima*. Tabern. icon. &
hist. *gramen aquaticum*, *Hydragr. fist.*, *Wassergras*.

C. Bauh. phyt. *gramen* 66. siue *iuncum semina
triangulare*: Eid. pin. *gramen iuncum* 9. siue *folio
articulato aquaticum*: *gramen iuncum polycarpon*
Thalii: Habetur maius & minus: in maiore, post
scenescium, caulis nouus palmaris excrefcit, cui
non ampliùs capitula corymbacea insident, sed
vtriculi viciales paleacei in capillamenta fissi,
modò virides, modò purpurascens: ratiissimè
cum corymbis vtriculi reperiuntur. Hæc C. Bauh.
Nos huc *gramen polystachion Thali* reuocan-
dum censemus.

Locis humidis copiosum obseruauimus Ge-
neue & Montebelgardi, florentem Iulio, & cum
capsulis Augusto.

IVNCVS TRIFIDVS.

CAP. CCXXX.

Ex longiusculis fibrosis radiculis scirpi pro-
ducuntur dodrantales, valdè tenues, quo-
rum singuli per extréma in tres stylos palmates,
acutos finduntur, interque hos ad exortum se-
dentia semina pauca, ex ruffo fusca.

Pro Iunco 3, siue acuminè reflexo trifido, sic à
C. Bauh. in prod. describitur: Ex radice nigra, gea

Xx 2

Synonyma



Locus.

In monte Fracto Lucernatum, in Pyrenæis & montibus Moraviæ provenit.

JUNCUS MAXIMUS HOLOSCHOENOS.
CAP. CCXXXII.

Desce.



brevioribus & ferè nullis : semen in squammas delitescit triquetrum.

Synonyma

Tragus licet Juncu maiorem palustrem, germ. groß weyer Bingen vocet, tamen Harundinis potiùs genus, quàm Junci existimat, indeque piscatoriâ Abaritanam dicendam affirmat. Videtur alibi etiam Juncum, Plinio Mariscum dictum, appellare. Ego autem non video quomodo ad Arundinem referri possit.

Locus.

C. Bauhin. phyt. Juncus 5. Eid. pin. Juncus levis 2. Juncus maximus, siue Scirpus maior, Mariscus Plinii : Juncus palustris maior, Tragi & Tabern. Juncus grandis, Holoschoenus Gesn. cat. & Dod. (cui & Juncus 4. magnus in hist. gall. in lat. Juncus 1.) Scirpus, Junci 1. species, Lac. Juncus 3. holoschoenus Anguill. & Cast. Juncus & Scirpus, Lon. Juncus aquat. maximus, Lobel. Adu. & Ic. pag. 85; itèrque Gerardo. Juncus levis aquaticus maximus, Thallio : Juncus rotundus 3. Carl. Inn-

niculatâ & fibrosa, iunci plures, tenues, palmum superantes, exurgunt, qui in summo in tres, rariùs quatuor, stylos, tenuissimos, trium, quatuorve vnciarum, diuiduntur, in quorundam summitatibus, post Junci divisionem, panicula parua locata sunt. In pin. est Juncus acuminè reflexo, seu minor, vel trifidus.

cus levis Gericon. Holoschoenus, H. Lugd. p. 987. Montpelii in lacubus: Bafileæ & Montbelgar-di in Urbis fossis provenit. Gaudet enim locis humidioribus, aquas crebrò aut semper habetibus.

JUNCUS PARVUS CVM PERI-
carpiis rotundis.

CAP. CCXXXII.



Palmares sæpè, aliquando cubito nequaquam minores profert culmos iuncos, foliis circa unum multis gramineis statim è radice obliqua, iucea, fibrata exortis, donatos, quorum scapus in umbellam inconditam Filipendulae modo explicatur, cuius capitula singularia, polita, rotunda, folliculis nigri-

cantibus, semen obuolutum gestant, tandemque in tres exiles carinas dehiscunt.

Gramen iuncum maritimum, Lob. ic. pag. 18. sic & Ger. Gramen iuncum 3. Tabern. Gramen iuncum 10. siue foliis & spica lani. Casp. Bauhin. pin. Eid. phyt. Gramen 69. siue iuncum alterum. In pratis & riguis observatur.

JUNCUS HUMILIS.

CAP. CCXXXIII.

Folia, stylisve profert fescunciales tres quatuorve, teretes, ex radice fibrosa, & pro plantule modulo, crassiuscula vix enim vnciam superat.

Gesnerus, cum Tiguri prope lacum [Barensee] Felinum collegit Maio mense, vocabat Juncum humilem inutilem & Chamæschœnum.

Casp. Bauhin. in prod. est Juncus tertius : Eid. in pin. Juncus laevis 9. siue Juncellus inuicilis. Huc referendum ait Juncellum omnium minimum Lobelii in Adu.

JUNCUS EXIGVVS MONTANVS, MV-
crone carens, Casp. Bauhini.

CAP. CCXXXIV.

Radice est pusilla, nigra, capillacea, canaliculo quatuor vel quinque vnciarum, cuius summo capitulum paruum, ex fusco purpurascens, quadrifidum, in exiguum rigidiusculum filamentum ambiens, infidet : folia ad cauliculi principium tria, iunceae, vnciam longa.

Juncum 2. C. Bauhini in prod. siue eiusdem Juncum laevis 8. in pin. D. Burkerus in Taurero Ra-

stadien

Radientis collegit. Suspiciatur autem Casp. Bauh. hunc eundem esse cum *Iuncus lychnanthem* tenui, plures ex radice fibrōsa emittente iuncea stylos, breues, digitales, spica perpusillā, spadicea, quae in apice exornatos, Thalij, quae nūquam quā in Broccenbergo collegit.

IVNCVS FOLIATVS MINIMVS.

CAP. CCXXXV.



Iuncus minimus vnciales & fescunciales emittit culmos, plures ex cespite ortos, enodes, paniculam singulos gerentes exiguum, glomeratam, seminum giuninis rubescentibus triangulum occultantem, cui bina apposita foliacea cornicula, alterum surrectum, alterum secundum culmos deorsum vergens; folia è radicibus

fibrōsis capillaribus angusta, vncialem longitudinem circiter adepta.

Nemauso atulit Gener Cherlerus.

IVNCVS MINIMVS FONTIS ADMIRABILIS.

CAP. CCXXXVI.

Segretē de cespite vno tollit magnam, foliorum & culmorum, quae prae tenuitate stamina imitantur, latè virentia, glabra, altitudine plus minus palmari: culmi autem nudi enodifque, circa fastigium (quod acutum) paniculam Iuncorum more ex latere emittunt, aliquando vnam, aliquando geminam, ex viridi fuscare, squammatam, exiguum, lenticula magnitudine, aut paulò maiorem, turbinatam.

Ianētur loco humido cum Holostio Matthioli prope *Eichelberg*, non longè à Fonte admirabili.

IVNCVS PARVVS MONTANVS GYM PARVISCAPITVLIS LUTEIS.

CAP. CCXXXVII.

Longissimis fibris Iuncus hic montanus infusissimus (6. in prod. *Iuncus capitulis Equisetis* Descriptis alter, in pin.) prodit, qui in plures Iuncellos duarum triumve vnciarum subdiuiditur, quorum aliqui erecti, aliqui reflexi, capitulum minimum sustinent, & Iuncellis singulis foliolum tenue capillo ceu adponitur.

Tom. II.



IVNCVS CAPITVLIS LONGIS, SIVE CLAVATUS.

CAP. CCXXXVIII.



Serpente nitor radice, multis fibris capillata: culmi striati, nō asperi, teretes, enodes, ac sine foliis, cubitum ferè aquant, fungosi, circa iunum rubentes, quorum summitas non in stylum exit acutum, sed in spicam clauatam, rufescentibus squammis imbricatam.

Lob. Obs. p.

44. Ic. plan t. p.

86. Iuncus aqua-

ricus minor capitulis Equiseti. Hist. Lugd. pag. 986.

Iuncus clauatus Dalechampi, siue (in contextu)

Iuncus alius secundus. C. Bauh. phyt. Iuncus 7. Eid. Synon.

pin. Iuncus capitulis Equiseti siue maior, varians

serpis latioribus & triplo angustioribus.

Genevæ in aquosis circa Arve, alibi que in cœ-

nosis & stagnantibus aquis nascitur: floret Maio

& Iunio mensibus.

Locus

IVNCELLVS CAPITVLIS EQVISETI MINOR & FLUITANS, C. Bauhini.

Ex radiculis capillaceis Iuncus recurvus tenuissimus (6. in prod. *Iuncus capitulis Equisetis* Descriptis alter, in pin.) prodit, qui in plures Iuncellos duarum triumve vnciarum subdiuiditur, quorum aliqui erecti, aliqui reflexi, capitulum minimum sustinent, & Iuncellis singulis foliolum tenue capillo ceu adponitur.

In aquosis Angliæ fluitat, authore Gillenio.

Locus

X x 3

Perennis plan-
ta est, ut appa-
ret ex reliquis
veterum folio-
rum. Nardo
Celtica simili-
bus.

Observavi in Locus
monte, cundo
Ribelsave ex
Fonte acido S.
Petri in valle
Griesbachiana,
locis humidis
principio Maij
tem.
flore.

IVNCVS LAEVS, SEV SCIRPVS INDI-
cus Casp. Bauhini.

CASP. CCXXXIX.

Iuncus laevis (ἰλίσχον) seu Scirpus Indicus,
Casp. Bauhini in pin. Iuncus Indicus porosus,
Clus. cur. post. nobis notus est. Ex hoc autem
Iunco parari in Guinea tapetia, par. 2. Ind. Oriët.
cap. 4. fortè prodidit Linchotanus. Fortè & ex
hoc, sportulas, storeas, stragula, & pileos in Gui-
nea puella conficiunt, vt legitur par. 6. Ind. Oriët.
cap. 7. & apud Bantanos, pilei luforia, par. 5. Ind.
Or. fig. 11.

IVNCVS SYLVATICVS, TA-
berniamont.

CASP. CCXL.

Descrip: **R**adicebus nititur pluribus, digitali crassitudi-
ne, profundè in terram sparsis, æqualibus,
Iunci palustris, multis fibris capillaribus: ab his ex-
oritur filiorum loco, oculi, ex latiore princi-
pio vaginam imitatis, in acumen desinentes: culmi
sunt crassi, minores tamen Iunci palustris cul-
mis, iuncus albâ, molli, rarâque medullâ refertis: flo-
res in horum summitatibus glomerati, ex rubro
nigricantes.

Synonyma C. Bauhin. pin. Iuncus laevis 3, siue Scirpus medius:
Iuncus sylvaricus Tabern. ic. & hist. Iuncus quin-
tus. Iuncus aquaticus maximus, Ger. icon.

Locus: In sylvis locis aquosis inuenitur.

IVNCI GENVS MEDVLLA PRORSVS
niuea Hist. Lugd.

CASP. CCXLI.

Descrip: **H**oc Iunci genus Iunco Matthioli proximû
est, paulò breuius & crassius, ex quo medul-
lam prorsus niueam extrahunt: tum ad lucerna-
rum lumina, tum ad candelabra, aliâque id ge-
nus confingenda, quòd facillè in spiras duci, at-
que in se flecti & complicari possit.

Casp. Bauh. pin. Iuncus laevis 5, seu Iunci laevis
aliud genus, H. Lugd. sine iconè, p. 985.

In stagnantibus & palustribus aquis nascitur.

IVNCVS ACVMINE REFLEXO
maior.

CASP. CCXLII.

Descriptio **R**adices capitate profert, Capis & Gethyis si-
miles, non omninò rotundas, sed quâ parte
aliæ aliis adherent & incumbunt, leuiter com-
pressas, cortice nigro obductas, quæ infernè & ad
latera radículas emittunt, in vnum cespitem, si-
cuti in asparagis, coaceruatas. Inde prodeunt
scapi, seu scirpi multi, sesquicubitales, nigra tuni-
ca prope radices coniecti, qui infra cacumen pe-
dis ferè spatio extumescunt veluti clauam con-
cipiunt, deinde pariunt ouo quid simile. Id porro
hians petiolo multos mittit, in quorum vertice

membranosa & rotunda vascula, oblique adne-
xa, in quinque veluti radios fissa, fructum conti-
nent angulosum, nigrum, cuspidatum, minutissi-
mis seminibus & luteis plenum, saporis aquei &
subausteri.

Hæc diligentissimè Theophrastus expressit, vo-
cans Iuncum hunc oxyrhenon, fœminam, non
μελαγχρωσίδι, vt in vulgatis eius exemplaribus
corruptè legitur, sed μελαγχρωσίδα: Gaza attri-
tum vertit, alii haud feliciter Attricipitem, inquit
H. Lugd. p. 985. vbi Iunci Melanctranidis titulo
pingitur.

Casp. Bauhin. pin. dicitur Iuncus acumine reflexo
1, siue maior: Iuncus laevis, Gefn. cat. & Tabern.
Dubitatur autem an sit Iuncus lychnanthemos
tenuis maior Thalii: nos hunc ad aliam plan-
tam referimus.

Nascitur in aquosis & pinguibus locis, sed pu-
ra & præterfluente aqua ferè madentibus.

IVNCVS ACVMINE REFLEXO ALTER,
Casp. Bauhini.


CASP. CCXLIII.

Caulis est sesquicubitali, rotundo, læui, aphyl-
lo: panicula umbellæ simili, atrop splendens,
pediculo carente, filamentis cæuleis, vt in
Aphyllonte, donata: quam caulis duarum, tri-
umve vnciarum, acutus, sed mollis, parumque
reflexus superat.

In Prouincia Galliæ provenit Iuncus, qui
Casp. Bauhin. in prod. quartus est: in pin. verò
Iuncus acumine reflexo secundus.

IVNCVS FLORIDVS.

CASP. CCXLIV.



Floribus in-
signis Iun-
cus, nudos cau-
les, rectos, alte-
ram aut tertiu
cubitali, mini-
mi ferè digi-
tali crassitud.
erigit, quorum
fastigiû ex folli-
culo membra-
neo emergentè
amplam tusti-
net umbellam,
inequaliter di-
gestâ: florum ex
albo purpuraf-
centium, (can-
didorû, Trag.)
fluminibus lu-
teis medium
occupantibus,

quibus succedentia capitula semina parua conti-
nent: radicem habet iuncicam, crassiusculam, si-
bratam à qua folia compluscula, caule non mē-
nora, germinant, carinata, cyperi similia, qua-
drantem vncie lata, vel latiora.

Eum sic descripsisse videtur Cordus in hist.
Gladiolus palustris, folia ab vna radice erigit
multa, Iridi similia, angustiora tamen, triquetra,
& superius in mucronem desinentia, è quorum
medio caulis duam, triumve cubitorum altitu-
dine

line erumpit, insigni leuore & equalitate prædurus, in cuius summo flores multi, longis pediculis, ex vbo principio nascuntur, in purpura candidi, tribus foliis constantes, sub quorum interualis alia tria (sed illis minora) sunt: stamina in se flores habent numero plerumque nouem, crotæo in fummitate puluisculo manus atrectantium inficientia. Habent singuli flores in medio capitulam, semini ferendo aptum & sex partibus diuisum, quibus sunt singuli in summo repandi apices: omnibus huius capituli angulis singulæ adhærent guttæ, admodum parvæ, crystalli modo translucidæ, sapore & substantia mellis. Radices habet duas, quarum gracilior & nigrior descendit: crassior verò superius ferè in superficie terræ transuersa fertur: utrique propagines aliquot, & multæ fibræ adnascuntur: habent radices saporem dulcem & glutinosum: nascitur autem pinguis, limosis & humentibus locis, quò fluuiorum inundationes peruenire possunt.

Sunt qui Gladiolum hunc Cordi, Theophrasto dictum, esse suspicantur: sed Theophr. Cyperum intelligit.

Ad Gramen harundinaceum, & Caricem acutam Virgilij referendum Tragus iudicat, ideoque graminis tertium genus, & Calamagrostin alteram vocat: eius autem figura non placet.

Lob. in Adu. Obs. p. 44. l. c. p. 86. dicitur *Iuncus cyperoides floridus paludosus*. Dod. gall. *amappon* & *Egidion*, hoc est, Sparganium & Iris sylvestris, ac etiam Scirpus quorundam.

C. Bauh. phyc. *Iuncus* 8. siue *floridus*: Eid. pin. *Iuncus floridus* 1. siue maior: Calamagrostis 2. Tragi: *Iuncus floridus* Martb. & Cast. Gladiolus palustris Cordi hist. gladiolus aquaticus Dod. Lat. Sparganium, gall. Carex alterum, Lon. *Iuncus cyperoides paludosus*, Eyt. *Iuncus cyperinus floridus*, Tabern. *Buromus* The. ph. Cæsalp. *Iuncus floridus* Martb. hist. H. Lugd. pag. 989. Eid. pag. 1006. Calamagrostis prima.

Monspessuli in maritimis & lacustribus palus, inter Iuncos præsertim obseruatur. Sic & in Italiæ ferè totius lacustribus, & vdis pratis maritimisque, iunctetis potissimum. A Maio ad Augustum vsque floret.

IUNCVS FLORIDVS MINOR. C. BAVH.

Radice est candida, geniculata, fibris plurimis adhærentibus: caule palmari: foliis ternis, iuncis, oblongis, acutis, duobus caulem superantibus, cuius summo, singulis pediculis, qui quini sunt alternatim sibi succedentes, flores (quos non vidit author), insident, quos fructus gemini rotundi, Orobi Cretici magnitudinè, sequuntur.

In palustribus Heluetiæ circa cænobiū Eremitanorum, & in monte Fracto ad lacum Pilati Lucernatum D. Burserus obseruauit Iuncum hunc, quem in prod. C. Bauhinus *nonum* fecit, & in pin. *Iuncum floridum secundum* siue *minorem* vocauit.

CALAMVS AROMATICVS IN GENERE.

CAP. CCXLVI.

Theophrasti de Calamo aromatico duplex occurrit locus. Ait enim lib. 9. hist. cap. 7.

Tom. II.

quòd Calamus trans Libanum montem, inter ipsum Libanum, & alium quendam montem paruum valle minima exeat. Non, vt quidam dixerent, inter Libanum atque ante Libanum, inter quos campus amplissimus & pulcherrimus est, Aulos appellatus. Quà verò proueniat, lacum in amplum spatium, iuxtaque cum palustribus siccatis, istum assurgere. Occupare locum plusquam triginta stadia. Viridem nequaquam esse videri, sed siccum: forma verò nihil ab aliis (*Plin. lib. 12. cap. 22.*) differre. Locum ingredienti protinus odorem spirare, non tamen longius, vt quidam referant. In Arabia autem spirationem a gri odoratifissimam esse inter omnes. Et huius rei causam reddit 6. cauf. 22. dicens argumento hoc esse, quòd tractibus æstuosis, meliora odoratorum genera proueniant, quòd melius ibi concoquatur, & siccata oleant, viridia autem nihil, vt Calamus & Iuncus.

Quæ ex Dioscoride & Galeno hic adducere possemus, vbi de viribus agemus, adscribemus.

Calamus (inquit Plinius lib. 12. cap. 22.) odoratus in Arabia nascens (Plutarchus libro, Quod bruta ratione vtuntur, id quoque prodidit, sed errore manifesto, Guiland.) communis Indis atque Syriæ est: in qua vincit omnes (annis, M.) A nostro mari centum quinquaginta stadiis, inter Libanum montem, aliumque ignobilem, non (vt quidam existimauere) Antilibanum, in conualle modica iuxta lacum, cuius palustria æstate siccantur, tricenis ab eo stadiis Calamus odoratus gignitur. Nihil autem à ceteris sui generis differt aspectu: sed præstantior odore, statim è longinquo (alienâ fide Theophrastus, ex quo Plinius hæc ad verbum transcripsit, narrauit, quod minime verum esse Guilandinus testatur, qui eam regionem peragrauit. Idem scripsit & Vitruuius) inuitat, mollior tactu, meliorque qui minus fragilis, & qui assulosè potius quam Raphani modo frangitur. Inest histulæ araneum, quod vocant florem. Præstantior est, cui numerosius. Reliqua probatio vt fuluus sit. Niger aliis damnatur, (nec legendum, Reliqua probatio, vt niger sit. Damnatur aliubi.) Melior, quò breuior, & crassior, lentiusque in frangendo. (malim legi mandendo.) Calamo pretium in libras xi. iunco xv. Traduntque Iuncum odoratum & in Campania inueniri. Idem lib. 24. cap. 11. Et quoniam plura genera Harundinis fecimus, illa quæ in India, Syriæque nascitur, odorum, vnguentorumque causa, &c. Lege caput de Harundine, vbi vires traduntur.

Calamus aromaticus siue odoratus duplex est: alter Syriacus, ad ripas lacus Genesaretici, quem alij mare Galilææ, alij mare Tiberiadis vocant, nascens, à vulgati nihil dissimilis præterquam quòd, post quadragesimum diem siccatus, nonnihil flagrat: alter Indicus, descriptus à Dioscoride olim, nuper à Garcia ab Orta, diuersissimus à Syriaco. Dionysius de situ orbis *ἰνδικοῦ* vocat, à colore, non vt Eustathius putat, quòd eius atrix India Erythræo contermina mari sit. Dioscorides *ῥῖπ* esse tradit. Apud Vegetium lib. 4. de re veterinaria, Absyrtus in confectiōe pulueris quadrigarij Calamum Syriacum & aromaticum, id est, Indicum, memorat. Et hæc Calami genera plurimum inter se discrepantia; Plinius ignoratèr miscuit ac confudit, teste Guilandino.

Quæ Paulus, Aetius, Plutarchus, Celsus, & Dionysius de calamo prodiderunt, à Theophrasti:

Yx 4

Diosc. Plin. & Galeni placitis re ipsa nihil differunt. Quare his neglectis ad Neoter. devenimus.

Hermol.

Legi (inquit Hermol.) & in Meotide odoratum nasci Calamum radice subalbida, & sine fistulis, plena intus & amara, specie Acori, de quo & falsi quidam sunt, Acorum eum putantes. Quanto autem amarior, tanto & calidior est Indico. Virumque tamen genus Acorum odore superat. Teredinibus ut Acorum incessitur: omninoque vicarium pro Acoto est. Ab Ionia & Ponto, & Herculis columnis protulque apud omnes, qui mediterranea colunt Aphrice, ut si eadem non sunt planè, maxima tamen germanitate videntur, ut auctores plerique trahunt.

Non est radicis Mart.

Aromaticus porro & calamsi Dodonæo gall. si Trago: si Clusio, præsertim verò si Marthiolo in apol. in Amatum credimus, non radix est, sed Calamus pretiosissimus, at qui hætenus ad nos non fuit apportatus. Nam [inquit hic] quod Plinius ait efficacissimam in omni Harundine cā esse partem, quæ radici proxima, quis non videt de Harundine, non de radicibus intellexisse Plinium: examines enim partes in vniuerso calamo, radicibus proximis ceteris præstare dicit, quod facile prudens animaduertet Lector. Nec enim aliam ob causam Plinius maiori vi pollere eas calami partes, quæ prope radices habentur, quam quod eadem ubi crassiores, vegetiores, robustioresque in omni Harundinum genere reperiantur, quam in ceteris earundem locis: quo fit ut etiam calami ipsius genicula efficaciora pariter ipse existimauerit Plinius. Quippe & genicula robustiora sunt, & crassiora. Quam ob causam calamum illum prætulit Dioscorides, qui densè fuerit geniculatus. Quod verò Calamum, non radices describat Dioscorides, aperte quidem constat, cum ait. Calamus odoratus in India nascitur, melior est fulvus, densè geniculatus, & qui assulosè frangitur, plena araneorum fistula. *Hæc ille.* Quæ tamen perperam Lusitanus intelligit. Quippe calamus in primis Harundinem designat, non radicem. Præterea proprium Harundinis est pluribus constare geniculis, & assulosè frangi. Deinde fistula, in qua quoddam araneæ telæ simile concluditur, calamo tantum debetur, non radici, quæ solida, dura, lignosa & ubique occlusa spectatur in omni Harundinum genere. Adhæc fulvus color calamo sanè debetur, non radici. Quippe quoddam radix in Harundine perpetuò albicer. Ad id autem quoddam proprium sit radicis (ut Amatus contendit) ut ipsa geniculata dicatur, calamus verò potius nodis cinctus. Dioscorides ipse respondet. Quandoquidem is non modò quarundam plantarum radices geniculatas facit, sed etiam caules, & calamos nonnullarum stirpium reddidit geniculatos, ut facile quis certior fieri poterit, qui eius codicem legerit in Hydripipere, in altera Cyclamino, in Gentiana, in Panace asclepio, in Gramine, &c. Constat præterea Calami odorati, quo passim Sepplasia videntur, radices ex Lithuania, & Tartaria finibus, quin etiam ex Ponto, ubi passim ferè proueniunt, ad nos conuehi. Quod maximo cuique argumento esse potest, eos cum Amato prorsus hallucinari, qui eas ipsas radices Calami odorati esse contendunt, quod nullus exter auctor qui scripserit odoratum calamum alibi prouenire, quam in India & Syria. *Et hæc sunt Marthioli in Amatum argumenta*, quibus docere conatur calamum odoratum communis vsus, legitimum, genuinumque esse Acorum: quin concludit calamum odoratum harundinem esse non radicem.

Iam dictis adsupplatur Aloisius Mundella in Braslausolum, & hunc in modum argumentatur. Siccalamus aromaticus, qui in officinis pro calamo & habetur & venditur calamus odoratus est. Dioscoridis: statumendum utique est calami descriptionem, vel calami ipsius esse, vel radicis, vel vtriusque apud Dioscoridem. Quod autem vtriusque non sit, colligitur, quia Auctor non exprimit, quæ caulis aut radicis sint propria. Non radicis: primùm, quoniam illius mentionem non facit. Deinde, quia radix, quam pro calamo venditant, non videtur ruffa: acrisque insuper & amara est, velut Acorus. Postremò in assulas non dissiliit, h. e. per longitudinem assulas paruas, dum frangitur, non relinquit. His quoque addit: Non constat quomodo fistulæ aranearum plenæ existant in hac radice, quemadmodum in ea, quæ est calami Dioscoridis, quas araneæ secundum Plinium florem cognominat. Quod si ergo calami est descriptio apud Dioscoridem, huic nostro vulgari quæ est radix conuenire non potest. Quare dubitat ne hic officinarum calamus, magis ad acori radicem accedat, quod Marnardus, Cordus & alii quoque suspicantur, & Marthiolus omninò genuinum esse Acorum credit, & olim Io. Rodericus Amatus Lusitanus: sub nomine enim Io. Roderici Lusitani superioribus annis commentarios in Dioscoridem in lucem euulgauit. affirmabat. Nunc verò firmiter contrarium asseruerat.

At uerò cum huius rei diuersa penitus sint aliorum placita. Argumenta quoque pro negatiua parte faciunt, paucis rescribimus, affirmatiuamque rationibus comprobabimus.

Marthiolo itaque dicenti, quod calamus aromaticus, non radix, sed calamus Dioscoridi sit, primùm respondemus, calamum aromaticum simpliciter, per se, & absolutè dictum, nec radicem, nec harundinem, nec tale quiddam esse, sed in hac, tanquam totum in suas partes, diuidi: Et hac ratione æquè radicem, ac calamum, aut tertium quid esse posse. Quod manifestè eius descriptio comprobat, quæ partim ad calamum pertinet, partim ad radicem, ut patebit. Quod ad nos non fuerit apportatus. Audit Amatum veriora resstantem: calamum ex India Lusitani nostri singulis annis deferunt per mare rubrum in Cairum & Alexandriam deferentes. Venetias portant, calamis similem, unde nomen accepit. *Licet adhuc Plinius efficacissimam in omni harundine eam partem esse dixerit, quæ proxima radici sit, non idèò denegauit radici ipsi excellentiam, sed Arundinis tantum superiorem partem non ita efficacem asserit.* Præterea Theophrastus & Plinius alibi ipsam calami radicem desiderant, & eam ceteris partibus anteferunt. *Nam suo se gladio ingulat Mundella.* Vtriusque (calami & radicis simul) descriptio non est, inquit ille: quia auctor non exprimit, quæ caulis, aut radicis sunt propria. Pulchrè ratiocinatur si diis placet. Quæ consequentia: Non exprimit propria, ergo vtriusque non potest esse. Si non expressisset etiam contrarium affirmauit. Quod enim dicit optimum esse, qui fulvus est, ad radicem referendum est: Sicut & illud Plinii, subalbidus, in commanducando viscosus, subacris, adstringens, ad radicem pertinet, velut ipsum experimentum docet. Quod verò frequentibus geniculis præditum ait, & assulosè in multa segmenta diffringi, & fistulam araneis plenam habere ad calamum. Non radicis (pergit Mundella) quoniam ipse mentionem non fecit Diosc.

Dioſc. Quæ eſt rationis huius neceſſitas? Non me-
minit radicis, ergo deſcriptio eius non eſt. Dic
quæſo Mundellæ, Quid aliis in locis deſcribit
Dioſcorides, ubi nec plântæ foliorum nec radi-
cis, aut aliarum ipſius partium memin-
it, Dic, quid deſcribit capite de Coſto? Reclamat tandem ipſa
experientia verbis, quæ opponit, Radix non vi-
deretur ruſſa, non diſſilit: Non conſtitit Mundellæ,
quomodo ſiſtula arancærum plenæ exiſtant. Re-
clamat, inquam, ipſa Amari experientia; dum
ſcribit, Venetias portant, Calamis ſimilem, al-
bum & ſubruſum, crebris geniculis, in aſſulas
diſſilientem, ſiſtuloſum, araneo albo plenum.
Sed iam probatum eſt deſcriptionem non tantum
Calami, verum & radicis eſſe. *Utrum* ſi Calamus
aromaticus Officinarum Acorus genuinus eſt, vt
Matthiolus & alij quidam affirmant, fruſtra hi
omnes entia multiplicant, ſeparantque à ſe inui-
cem quod vnum eſt. Diuerſis ſiquidem capitibus,
de Acoro & Calamo tanquam de diuerſis tradunt.

Hoc tempore penitus ignotum ſcribitur,
quod Calamus aromaticus, cuius Veteres memi-
nerunt, Officinarum communis Calamus non
ſit, ſed radix, neque præſcriptis notis inſignita, vt
ex Manardo, lib. 6. Epit. lib. 8. Epit. i. cuius rati-
ones mutuaturus Matth. eſt aliorum armis mu-
niatur, feroci admodum aſpectu, ea in Braſa-
uolum tela contorquet, vt ſibi ipſi Vulcanus videatur:
magno enim errore Braſauiolum duci, ſatis
calam eſſe ſupponit: quod tam facile ſibi perſua-
ſerit, legitimum odoratum Calamum, illam eſſe
radicem, quæ temerè omnibus in ſeplafis il-
lius vicem explet, cuius opera ſi interiiſſent,
quis non miſellum hunc Braſauiolum cachinnis
irritaret? hem quis non admiraretur tot contra-
dictiones? tot lapſus? tantam inſcitiam? tot gra-
tia crimina? quæ tamquam ab aſtuto hoc homine,
eius ſententias peruerſe, corruptis verbis, di-
minutis clauſulis, ei falſo adſcribuntur: vt per
Iouem lapideum iurare cogat, (inquit Apollo) me
ſuis lineis depictum Matthiolum, vobis planè in-
dicaturum: ita enim ſcribit Braſauiolus, decimus
agitur annus, quod Venetias verus Calamus aro-
maticus aſſertur, qui Calamus eſt, & non ra-
dix, ac communis aromaticus Calamus, qui paſ-
ſim venditur, radix eſt, & non Calamus, id verò
de quo in præſentia loquar, Calamus eſt, & non
radix, qui folia habet circumcirca in aliquibus
Calamis, quæ noſtrorum Calamorum folijs aſſi-
milantur, & niſi putaviſſem Galangam eſſe Aco-
rum, non potuiſſem non arbitrari vulgarem Cala-
mum aromaticum eſſe Acorum, & fortè radix
hec, quæ Calamus aromaticus vocatur, eſt odorati
Calami radix: Calamus autem verus odora-
tus, in Officina Campanæ, Venetiis vendebatur.
En igitur Studioſi quibus verbis petros inſectetur:
quàm fideli ſermone candidiſſimos laceret:
quàm tumultuoſis rixis, ſe vbiq; moleſtiſſi-
mum, ac inſeſtiſſimum exhibeat: hæ ſunt argutię
quibus prægrandem confarcinavit librum, ſolo
ſepore illos laccens, ſuiſque obruens calum-
nias, non aliam ob cauſam, niſi vt doctiſſimis
aduerti videretur, & quocunque modo in eos
argumenti effunderet, hac importunitate excru-
ciaret, tantum ſibi arrogans, vt quæ non dixe-
runt, dixiſſe velit, quæ enim in eius ſententiam
pedibus non eunt, tergiuerſatur, ſi quis nodus
incipit, ſtatim tranſiit, velut angue conſpecto,
aut ſaltem lippis oculis intuetur: eſt clariffimo
ſuorum ſcriptorum teſtimonio ſaniffimi ingeni;

videatur, vt quum minime compertum habet di-
xiſſe Dioſc. & Galenum Calamo aromatico ali-
quid in eſſe amaritudinis: quod vel Ruellij ver-
ſionem quam ſe imitari pollicetur, in ſui operis
initio, paulò ſegnus perlegerit, vel in cam, ſi
quid perperam ex Græco tranſlatum, vt ſui mo-
ris eſt, aliquid iniicere tenebatur; quod cum ali-
quanta acrimonia amarum Calamum tranſtule-
rit: id quod Secobienſis Lacuna, Græcis, Lati-
niſque literis erudiſſimis, qui Ruellium fide-
lius reſtituit, corrupta loca reſarci nauit, aucta im-
mipit, mutata ad priſtinum candorem reduxit,
malè huic tributum amorem ad annotauit, eſt
Marcellus quod ad amaritudinem pertinebat,
ſe reliquiſſe aſſerat, quia in meliorib; illa vox
non legatur. Manardus etiam lib. 4. Epit. 2. pro-
bans Calamum non eſſe Canellam, inter alias
differentias enumerat, quod in ea canella non ſit
amaror, innuere calamo amaritudinem in eſſe, vt
hinc Fuchſij ſententiam improbare non poſſit,
atque an communis illa radix, calami odorati
propria ſit, quæ amariſſima, necne, nullum eſt
in hoc euidens argumentum, quod etſi Harundi-
nis trunculum, cucurini annexum non defe-
rant: folia Iridis ſimilia; harundinacea, quadari-
tenus præ ſe ferunt, ſicca potiſſimum, an verò
Acorus ſit; eo in capite diſcutiendum relinqui-
mus: hic tamen præterire non poſſumus Amati
autoritatem, ne dicam ambitionem, aut inſo-
lentiam, qua calamum aromaticum Officinarum
Dioſc. legitimum, ſuis notis repræſentare non
ambigit, potiùs, vt credimus, ſomniando, quàm
ſenſum libertate, tam abſurda proferendo: nec
Matthiolum contraria aſſerentem, hoc eſt, cala-
mum aromaticum harundinem, ſue calamum,
non radicem eſſe debere, deceptum aſſerere ve-
retur: quod licet Theophræſt. ac Plinius in cala-
mo odorato calamum, & non radicem, laudare
videantur, alibi tamen radices cæteris partibus
anteferunt, idque ex Plinio manifeſte percipi;
lib. 24. cap. 11. quum odorati calami facultates e-
numerans, inquit: Efficaciſſima autem in omni
harundine, quæ proxima radici, efficacia & ge-
nicula, ex quibus in omni Calamo radicem effi-
caciorem eſſe partem contendit: id quod ſi Pli-
nius intellexerit, vel ipſi pedagoguli diiudicent:
Quis enim etiamnum mediocriſ ingeni; ita ar-
guerit? Plinius proximas in Harundine radici
partes alijs præfert: ergo radix efficacior eſt
pars? Quiſnam etiam ex pallioretus Mediceis,
qui ſtultiſſimum hoc arguendi genus non exclu-
dat: qui in re vulgaſſima illum excutite non de-
prehendat, qui inquam dum ſitum ſedare cupit,
ſitum alteram crefcere non videat, vt quantò
plus biberint, tantò magis ſitiant Parthi: quum
ſcilicet huiusmodi radix, quæ in multa ſegmen-
ta nunquam aſſuſe frangitur, non ſiſtula ara-
neo velo ſimile quicquam occludente, quæ qui-
dem Harundini debentur, non radici, ſi ſaltem
Calami aromatici radix: cuius nulla eſt ab Ama-
to probatio: tot autem oculati teſtes ex Manar-
do, ac Matthiolo contrarium aſſerentes, tot
ab his rationes, quas hic ruſum inuolare, ope-
re pretium non eſt, vt quum Braſauiolum huic ſue
opinionis aſſentire teſtatur, ſecus quàm ipſe di-
xerit, vt ſupra: quum Dioſc. calamum odoratum,
non radicem, ſed Calamum eſſe debere, ſcri-
ptis mandauerit, quumque calamos equieſis, gra-
minis, ac aliorum geniculatos reddiderit Dioſc.
non eſt quod radici proprium eſſe geniculatum,
Calami autem nodis cinctum aſſerere, debeat;

Fuchſij lib.
rela.Amati
ſurpis et.
ror.

quam autem calamum aromaticum esse officinarum Schenanthum arbitratur Calopodini, qui in Meliū scripsit, nec illorum spernit opinionem, qui radicem calami aromatici vice acceptam, legitimam calami radicem statuant, quam magno impliciter errore, non animaduertunt. Siquidē Schēnāthi Officinarum radices tradūt capillorū modo, tenues, huius verō adulterini calami radices crasse sūt, & effatu dignæ: propterea Schenanthi radices esse non possunt, & per cōsequens: si Schenanthum vulgare calamus est aromaticus, hæ radices non erunt calami odorati radices: quumque in affusis non dissiliat Schēnanthum id, non fluuium sit, non in mandendo lentum, melius discant, ne rudere potius, quam erudire videantur: veri tamen calami loco, radicē hoc nomine vitatam substituit malo, etiam si Acorus sit, quæ multas calami qualitates obtinet, quæ Sphagnum, latius muscus arboreus, Oriānarum vīna: & in Auiē, cap. de musco, pro quo Thaleb reposuit Bellunēsis, muscum fluuialem, aqueum, terreum, petrosū, maritimum completat, & cap. de Vīna arboreum vīdetur distinguere, aperta separatorum nominum & capicum confusione. Galē. verō ac Paulus in suis succedaneis, pro calamo sphagnum cum Mathiolo supponit: hæc enim in alienam mensem irruiſse creduntur, doctorum omnium iudicio, quoddā plura his ignota inferant, aut facultatibus dissimilia fuggeant, ut Myrtum pro Cardamomo, &c. quorum est sylvā: muscus verō arboreus, hypnos etiam vocat^r, hoc est villosa illa canicis arborem caudicibus adhaerens, multiplex est: vt suo ostenditur loco.

De hisce latis, vel retrahamus: vocatur græcè *καλαμὸς ἀρωματικός*, *καλὸς ὁσμωδὸς* h. e. latus Calamus aromaticus, odoratus & unguentarius. Arab. vt Serap. *Hafab* derive: *Alfabarino*, *Alterir*. Bellunensi *Alderire*, *Aldarira*, & *Chafab darire*: item *Cararis* & *Caralim*. Germ. *podriczende* murgriede; *wollrichende* Rühr. It. & Hisp. *Calamo aromatico*.

Præter calamum aromaticum quorundam Indicum & verum, sunt & aliæ plantæ, quibus calami aromatici nomen attribuitur.

Calamum odoratum Matthioli pingit, & ex eo Lacuna. Lonic. Acofta, Durantes, Hift. Lugd. Tabern. & Gerardus, Calamum aromaticum nominantes, qui nihil aliud eft quàm figmentum, nihil differens ab Arundine hortenfisve fatiua.

Malè in officinis calami aromatici nomine
Acorum, de quo suo loco, venale prostat.

Cassia benzerire Bellonius cum vulgo Pharmacopolarum Constantinopolitanorum calathum aromaticum esse opinatur, sed *Qualcebeni* quidē & *Matthioli* iudicio, absurdissimē. Sunt enim calami lapidei: non verò cuiusdam plantæ.

Schoenantos quibusdam idem est cum calama aromatico. Quare Colleg. Florent. huius loco Schoenanthon supponit. Idem & Borgar.

Opinio Marcelli dicentis calamum aromati-
cum esse Canellam, merito tanquam erronea
damnatur ab Acoſta.

Notat idem Acoſta quodā calamum aroma-
ticum cum Galanga confundere. Et ſanè conſtat
Venetoſ pharmacopœoſ, Theriacam paraturoſ,
calamo Galangam ſubſtituere.

Antidotarium Romanum calami odorati veri
loco Angelicæ radices, sed in minori quantitate
commendat.


Calami aromatici nomine Argentoratenses hortulanæ venditare solent Phu/maius & nobile:vi-
de Tragum.

Plura de calami aromatici substitutis dicta ante, ubi Apollinis verba adscripsimus.

De calami aromatici viribus hæc Dioscorides scripsit : nascitur in India. Est autem optimus, qui fulvus (κίρρος. Act. κίρρος). est, & frequentibus geniculis præditus, & qui assulosè in multa segmenta distinguitur, fistula araneis plenâ (ἀράχνης). Plenum habens araneorum fistulas, Sarrac. Malè araneorum : oportet enim vertere telà araneæ, aut re simili telà araneæ, Pafinas Salodianas, [subalbis] (σάληνους. legendum σαληνούς Paf. Salod.) In commendandum verò viscosus (λίγχνος. leg. κίλχνος Paf. Salod.) adstringens, subacris (πικρὸς Orib. amarus, Ruell.) Potus vinam mouere potest. Vnde cum Gramineis, aut Apii semine decoctus & potus hydropicis, nephriticis, vrinæ stillicidiis, & ruptis conuenit. Ducit etiam menses & apollitus & potus. Tullus quoque sanat fistulas per seipsum, & cum resina terebinthina, si fumus per fistulam ere attrahatur. Deoquitur [ἀρίστη. Paf. ἀρίστη] etiam ad infellus mulieres, & ad uteri collationes (vet. caret verbis, & ἐμμηνορρῳαται.) Milcetur & malagatis, & in futuris, iucundi odoris gratia. Calamus odoratus, *autore Galieno*, leuculam quandam adstrictionem ac minimam acrimoniam possidet : magna ex parte est sentia eius terrena est & ærea, in caliditatis frigiditateque coniugatione temperata. Quomobrem moderate vinam mouet, & facultatibus quæ icori stomachoque imponuntur, misceri potest : tum in fomenta quoque veteri, quæ phlegmones gratia, aut irritandis menibus altumtur, vtiliter admiscetur. Ponatur itaque habeaturque secundi ordinis eorum quæ exalefaciunt. Inest quoque ei quædam partium tenuitas, velut aliis omnibus odoratis siue aromatibus. Ceterum illorum complexibus tenuium partium plurimum, calamo verò non multum adest.

CALAMVS AROMATICVS VERVS
quibusdam.

C A P. CCXLVII.



Calamum aromaticum creditum à triginta iam anni asseruo, vegeto amaroze, cum lentore quodam præditum, cretæ, crassitudine pennæ cygnæ, internodiis longiusculis articulatè, rutilanti & spædiceo foris colore, aliàs buxeo, subtus candicante, intrinsecus substantia fugosa rarâq; texture præfæctum: adgenicula singula, culami ex aduersè

merso sui pronascuntur, vt calamo primario magnitudine cedentes, ita colore & compositione saporeque conuenientes.

Similem calamum accepi anno 1598. ab infanti viro Io. Luzzio Ill. E. V. Viri. pharmacopaeo. Alium sic describit gener Cherlerus, Calami aromatici veri fuculus, qui ad C. Bauhinum Argentinâ missus bicubitalis erat, Betulae instar ramulosus, in cuius altera biuaticatione folium, vel potius folij fragmentum, nullo pediculo, sed principio angustiore haeret, vnciale, tribus nervis insignibus donatum, facie folij Indi, aut potius Plantaginis quinque-nerviae, vnciae quadrantem latum.

Pingimus in nostra tabella calamum vnum cum radice ex Clusij Garcia: secundum & tertium, cui rami ex sicca planta.

An Cordo in Dioc. Calamus aromaticus verus, aliquoties in pharmacopoliis inter Squinanthi stipulas & spicam Indicum introitus.

An Qalceeb. luncus odoratus Matthioli, mira acrimonia linguam gustantis mordicans, nihilque tamen, praeter amarois plurimum, inter gustandum derelinquens.

Lobel. in hist. Belg. pag. 74. in icon. Plant. pag. 54. sub titulo Calami odorati Libani, & calami aromatici ex Alepo missi, wölschender Rietes figuram habet, quae eiusdem plantae, cum ea quam descripsimus, videtur.

De calamo suo odorato Libani in Obs. p. 29. haec scribit. Memini me vidisse Veneris ad Angelij symboli Calamum aromaticum, quem Alepi Syriae Sequinus Martinellus doctus & industrius pharmacopaeus, forte delatum ex lacu inter Libanum & illum ignobilem montem Plinio memoratum miserat. Arundo erat geniculata, nitida, crassitudine patuum digitorum aequans: color fulvus, nil labat memoria, saturior, odoratus, parum lentus, in mandendo, subacris & amarus. Iacobus Vtenhouius generosus Gandavensis, stirpium & artis Medicæ peritissimus, calami aromatici doctus, cannulas araneum telis plenas, fulvas, geniculatas, digiti minimi crassitudine, gustu planè aromatico, amaricante, Schenanthis praestantior, nactus est inter Schenanthi festucas, quas Masiliam aduectas ex lacu Plinio memorato assercbant. Multo maiores habuit praclarus vir Augerius D. de Bousbeke Flander Insularius, Caesarea maiestatis Constantinopoli Legatus, stirpium exoticarum peritissimus.

Voluit nonnulli Calamum officinarum esse Acorum Veterum: Ego autem (inquit Garcias) nullius opinioni addictus, liberè dicam, quod sentio. Calamus aromaticus quo officinae in Lusitania vtruntur (aromaticum voco, non odoratum, vt plerique alij, quandoquidem aroma odorcin non significat, sed quod vulgò *droguam* vocant, neque etiam calamum odoratum scio, sed luncum duntaxat) idem est cum eo, qui in India magno est in vsu cum viris, tum mulieribus & iumentis. Vocatur is in Guzarate *Vaz*: in Decan, *Bache*: in Malabar, *Vazabur*: in Malayo, *Diringuo*: in Persia, *Heger*: in Cuncam, quæ est regio maritima, *Vaticam*: Arabibus *Cassab* & *Aldirra*. Serapio lib. simpl. cap. 205. cum vocat *Assab* & *Dirirbe*, sed corrupto vocabulo: omnes enim Arabes Medici cum Auicenna lib. ii. cap. 157. & 207. *Cassab* & *Dirirbe* appellant. Idem autem sonat *Cassab*, quod Calamus, & *Aldirra* ex aromatibus: nam *Dirirbe* idem quod nobis aroma est. Quoniam verò Malayo incolæ eius vsum ab Arabibus qui ex Coraone erant, didicerunt, idcirco

corrupto nomine *Diringuo* vocant. Ceterum non est odoratus, nisi è terra auulsus: quantòque vitentior est, tantò mihi validioris, tetriciorisque odoris videtur, tamen aliud sentiat Ruellius. Porro quoniam Hippocrates & Galeas i. simpl. Indicium hunc calamum vnguentarium appellant. Plutarchus verò calamum Arabicum, & Cornelius Cellus calamum Alexandrinum: videtur etiam extra Indiam nasci. Ego, vt veritatem elicerem, sciscitatus sum à multis Coraone incolis & Arabibus, si apud eos nasceretur calamus: item an esset eis cognitus, eoque vterentur. Negarunt omnes apud se inueniri, nisi ab Indis aduectam mercimonij gratia, probèque sibi cognitum, vapore cuius plurimus apud eos esset vilius. Non filluntur tamen, qui Arabicum vocant, nam ex India in Arabiam deferunt, & inde in alias regiones: neque qui Alexandrinum appellant, quoniam hinc Alexandriam, deinde Barut & Tripolim Syriae deferunt. Quod autem Manardus lib. 3. epist. 1. dicit in Pannonia se vidisse adè recentem, vt non longè petitus videretur, fieri potest vt fallatur: aut, si videretur, fortè in sporta, aut fictili vidit. Sed illud certissimum est, hinc auehi Calamum in eas regiones. Is verò, quo vtimur, radix non est, puilla etenim est radix: sed ipsius calami cum aliquantula interdum radicis parte fragmentum. Hallucinatur ergo qui nihil nisi radicem esse scribunt, confirmandæ suæ sententiæ causâ, quâ contendunt hunc calamum Acorum esse. Neque quod in Calamo est spongiosum & flauescens colore, aliqua in resimile est araneum telis, vt falsò putarunt Auicenna lib. ii. cap. 157. & Serapio simpl. cap. 205. quos Græcis & Latinis hæc melius nosse oportebat. Denique quod calamus Acorum non sit, nec etiam Galanga, satis ex Auicenna & Serapione probari potest, qui tria distincta capita de Calamo, Acoro & Galanga scribunt. Præterea qui Calamum describunt, aut cum in India nasci, quod verum est: nec enim in alia regione nascitur, Acorum verò non nisi in Europa nasci tradunt. Adhæc Calamus pallet, acris, calidus & siccus est in secundo ordine: Acorum, albet, amarum, calidumque & siccum est ordine tertio: Galanga autem vtroque calidior & odorator. Demum calamus & Acorum cerebri & nervorum morbis conueniunt. Galanga verò ventriculum roborat, flatus discutit, & oris halitum commendat. Galanga item & Calamus medicamenta sunt in hac regione ab initio cognita, & in Occidentem vehi solita. *Hæc usque Garcias.*

Sed quàm eruditè notat Clusius, dicens: Notandum officinarum calamus longè alius est ab Acoro, quem hic satis obscurè describit Garcias, quippe cuius Calamus legitimus videatur à Veteribus descriptus. Noster verò nihil nisi radix est, cum aliquantula interdum foliorum particula. Cui cum omnes notæ à Veteribus descriptæ pulcherrimè conueniant: Manardi & aliorum sententiam improbare non possum, qui Acorum legitimum esse volunt. Eo & Germani, & Itali, & Galli vtruntur, aliūque calamum non norunt. Solebat enim Antuerpiam Vlyssipone aduehi calami genus vsuali nostro simillimum, sed tetrico doris & saporis horridi: quæ nota illis communis erat cum calamo Garcie descripto: solam tamen hanc ob causam in vsu apud nos esse desuit, licet omnes aromatarij multò efficacius eo, quo nunc vtimur, fuisse assint. Ceterum, cum tertio recudenda esset Garcie historia, innotuit legitimus Calamus aromaticus, quem Paludanus,

Contr. Ruellius

Calam. Sym. gumentarium Hipp. & Gal. Cal. Arabi. cunctius. Alexandrin. no Celsi.

In Arabia non inueniuntur.

Manardus.

Radix non est.

Auicenna & Serapio. m. 2. lapide.

Acorum non est nec etiam Galanga.

Garcias & Clusio not.

ex Syria & Aegypto redux communicauit, qui exactissime ad Dioscoridis descriptionem quadare videtur. Umbellifera verò potius planta, quam harundinacea meo iudicio celsenda est: etenim rectè habet caule, multis nodis, seu geniculis cinctus, leuè alioqui, intrus coccu, & membranulà, vti Harundines, præditum, qui assulosè frangitur, èstque satis odoratus, gratique saporis, amari tamen, & nonnullius adstrictionis particeps: folia (vt ex vestigijs colligere licet) bina ex aduerso singulis geniculis sita caulem amplecti videtur: radix summo capite nonnihil extuberat, deinde in fibras desinit. Vicesimo quinto porrò anno postquam nobis communicasset calamus illum Paludanus, mittebat ad me Lugduno Allobrogū Ant. Colinus pharmacopœus, similis calami fragmenta, significas se eo vsum in Theriacæ compositione: ea autem, licet simili profus formâ essent cum illo, quod à Paludano accipiebam, magis tamen amari saporis deprehendebam, nec vilius adstrictionis prædita, quod forsitan alterius ætati adscribendum. Et hæc Clusius in Garciam. Ego quoque Garciam non notum fuisse calamus aromaticum vulgarem suspicor: qualis Vlyssiponensis calamus fuerit nondum mihi constat: umbellifera planta cur potius dicatur quam harundinacea, nescio, quum notæ adscriptæ à Clusio melius cum harundinacea planta conueniant, quam cum umbellifera.

Clus. hab.
lucinat. 10.

ed. Costa m.

C. Bauhin.
mor.

Acosta dum reprehendit Ruellium, Manarum & Monachos, non animaduertit calamus aromaticum vulgarem Europæ peritque dictum (quem multi Acorum putant) longè diuersum à calamo aromatico Indico, quem Garcias describit, in quo malè etiam Acosta Garciam imitatus est.

C. Bauh. phyc. Arundo 1. siue odorata: Calamus odoratus Libani Lob. Ic. Plant. pag. 54. Calamus à Paludano Patavij exhibitus: An calamus odoratus Matthioli? Sed quid quæso commune habere potest figmentum Matthioli, cum Calamo odorato Paludani? Matth. in lat. comm. editis anno 1559. sub inscriptione calami aromatici figuram habet quæ est pars figuræ pro Arundine posita, & per consequens falsam & non factam ad vitium calami aromaticum Paludani, vel similem. In comm. lat. cum mag. fig. editis anno 1583. & Ital. editis 1568. nouam habet figuram magis artificiosam, quæ etiam pars sive Arundinis. Tabern. vel eius typographus Bassæus Matthioli postremum figmentum assumpsit, quæ est portio Arundinis quam domesticam cognominat. Prudenter & doctè Camer. in hist. germ. & Epit. Matthiol. pro calamo aromatico, à Paludano delatū calamus figurâ exhibuit: sicut etiam Clusius apud Garciam, & nos cum Clusio quem à Valerâdo Dourez accepimus: Est autem hic calamus omnino diuersus à Matthioli imaginatio: Paludani verò calamus fuisse Libani, vix putò demonstrari posse, licet in ea opinione perseueret C. Bauhinus in pin. vbi inter calamus aromaticum Indicum, & Calamus aromaticum Syriacum, & calamus aromaticum Matthioli, quæ ficitum suspicatur, ita distinguit: Arundo odorata 1. siue Calamus aromaticus, siue χαλαρός & χαλαρός, Hipp. & Galeni χαλαρός & χαλαρός, Theophrast. χαλαρός & ἀρμακτός, Dioscor. Orib. Acgin. & Aetii: χαλαρός & χαλαρός, Dionysii de situ Orbis: Calamus Arabicus Plutarchi: Cal. Alexandrinus, Celsi: Cal. odoratus, Plinii, Hermol. & Ruellii: Cal. aromatises, Manardi: Cal. aromaticus Cordi in Dioscor. Fuchii: Guil. Garz.

Synonyma
Calamus
arom.
Indicus.

Lob. Obs. Clus. ad Garz. Acost. Cels. & in 4. part. Ind. Orient. fig. 19. & Diringo Malays, & Deringo par. 3. Ind. Or. 39. Diringo 4. part. Ind. Or. fig. 20.

Arundinis odoratæ 2. seu Calami aromatici Syriaci caulem seu potius caulis partem anno 1579. à D. Paludano ex Aegypto reduces Patavii accepimus. Verum cum totam plantam à D. Dioscorio habeamus, breuem eius descriptionem scilicet ab alijs non proponatur adicere habet. Ex radicibus inutiles, trium, quatuorue vnciarum lōga, summi capite nonnihil extuberante, & in paucas fibras desinente, caulis, [modò vnus, modò plures] ferè bicubitalis, rectus, rotundus, læuis, fragilis, multis geniculis distinctus, exurgit, qui intus cauus, spongiosus & membranulà, (quasi tela alba subrensa) vti Harundines, præditus, qui assulosè frangitur, & in plures ramos diuiditur, hiique in tenuissimos subdividuntur, ad modum Ligultri Aegyptiaci Alpini, vel Lenticili Peruvianij, siue Molle Clusii: qui flores paruos, foliaceos, plurimos, singulis tenuissimis pedicellis insidentes, sustinent, ex quorum medio apex styli instans prodit. Folia pauca, semper bina, ex aduerso ad singula genicula sita, caulem amplectuntur, vnciam lata, seliqui vnciam longa, nervis aliquot per longum excurrentibus. Caulis sapore est aromatico, valde amaro, quo in Theriaca pro calamo vrimur.

Scribit, teste Garciam, per vniuersam Indiam plurimum verò in Guzarate & Balaguate. Hic etiam Goæ (vbi multus eius est vsum) in hortis factus prouenit, sed per paucos. Conuehitur ad maritimam, quoniam qui isthic nascitur non sufficit. Qui ex Balaguate adfertur, ad Occidentem mittitur. Calamus aromaticus, autore Linschoten, crescit etiam in Sunda Insula Iauæ regionis Indiarum Orientalis. Magna copia Chineses emunt vnde in Chinam portant.

Familiaris eius vsum [ita enim Garcias scriptum reliquit] est mulieribus in veteri affectibus, & nervorum doloribus. Sed maxime experitur hieme à mulomedicis: consilium enim, additis Allijs, Ammi (quod est Cuminum rusticum) salis momento, butyro & Saccharo, iumentis aduersus frigora manè exhibent, vocantque id medicamentum Arata.

CALAMVS AROMATICVS CECIINI Martini.

CAP. CCXLVIII.

Non inuenit Cecinus Martinellus, apud Dioscor. nec Galenum calamus aromaticum fuisse Veteribus Cannam (siue Arundinem) licet Neotrici id cerbò existiment, decepti Plinii opinione, qui dicit calamus, & Iuncum odoratum, non distere ab alijs calamis & Iuncis: addunt id indicare nomen calami nihil aliud significare quam Cannam: suo autem iudicio calamus Latinis diuersimodè potest intelligi: Dicebatur de tenui Canna [siue Arundine] ex qua Veteres sagittas faciebant, qualis erat mos Orientalium licet non sit Canna (id est Arundo caua) de qua Virg. eclog. 3. & vario vocabulo Aristus dicitur etiam calamus de Canna cum qua scribebant Antiqui: calami etiam dicebantur Canella (siue Arundines) palustrium aquarum, quibus tegebantur tecta domuncularum rusticorum, de quibus duobus Martial. in suis distichis: Metaphoricè

pro stylo scriptorio sumpsit Virg. Eclog. 1.

Scribere quæ vellem Calamo permisit agresti

Pro Calamo concavo ad fistulas qui dicitur Sy-

riacus.

Eclog. 2.

Pan primus Calamos cera coniungere plures

Instituit.

Sub nomine Calami comprehenditur virga cui alligatur filum ad piscandam, & virgulæ quæ visco illinuntur pro captura auium.

Interdum Calami dicuntur de parvis Cannis frumentis, quæ Sepie vulgò dicuntur.

Sumitur etiam pro omni re conuoluta instar Cannæ: communiter dicuntur Calami arborum & vitis.

Canna quoque Zucchari vocatur Canna cum tamen non sit, sed ei similis.

Paulus etiam calamum odoratum vocat corticem. Alius bonus author ait Calamum aromaticum esse crassum corticem cauum, cum enim colligitur extrahitur lignum: unde desumpsit nomen. Cech. Martinellus mio xio ait calamum vocari, quæ ita geniculata prosterit, ut hic Calamus, quod prolixè prosequitur, & apud ipsum videre est.

Calamus præsentatus per Cechinum Martinellum Aromaticum habetur pro vero & legitimo calamo aromatico, ac in confectionibus Theriacæ ac Michridatiæ ceterisque medicamentis adhibeatur, & remoueantur succedanea. Sed libellus contra Cechinum incerti authoris oblatas pharmacopœis Mantuanis contrarium omnino sentit. Non inicitur, inquit, xio xii. Græcè, aut calamus Latine, aut calamo Tofcanè, nullus erit ita stultus qui aliud intelligat quam Cannam, ita etiam Virgilius & Ariostus nihil aliud intellexerunt &c. & quomodo potest esse canna quæ non sit canna &c.

Folia binos cubitos æquant, angustiora tamen. Donacis (sive Arundinis latius), scabra, & secundum longitudinem striata, numerosa: Stulones harundinibus ceteris concolores complectentia. Comofo flore & quadantenus Sorghi. Radix ad Cannæ radicem accedit, sed dulcior, succulentior, minutiq; lignosa: unde germinula erumpunt farionij opportuna.

Zacharior, genus Mellis (uilit) concreti in India & Felici Arabia in Arundinibus (77) xii. xii. xii. inueniri prodit Dioscorides: Salis modo coactum, dentibus. ut sal fragile.

Galen. 7. simpl. Sacchar appellat, & ex India ac felici Arabia afferri quoque scribit, & in arundinibus concretere. Essè autem & ipsum Mellis genus, & minùs quidem dulce, quàm nostrum.

Archigenes ait, Sal Indum esse, colore & consistentia salis communis, gustu Mellis, magnitudinis Lentis, xii. xii. aut ad summum Fabæ, xii. xii.

Saccharon & Plinius Arabiam ferre dicit, sed laudarius Indiam. Essè autem Mel (Mel Arundinum Indicarium vocat Theophr. Arist. & Strabo.) in Arundinibus collectum, gummiu modo candidum, dentibus fragile, amplissimè Nucis Abelianæ magnitudine, ad medicinæ tantum usum.

Inueniantur (inquit Seneca) in India Cannæ, quarum humor pinguis, dulcissime in mel abfit. Quoniam verò non apis pensum mel hoc est, sed plantæ excrementum, liquet inde etiam Antiquis notum fuisse Saccharum.

Cetera, quæ de Saccharo Veteres scriptis mandauere, inter vires comperientur.

Hermolaus ex Neoteriis perhibet Saccharum ex Alexandria Ægypti & Cypro adferri commendatissimum: Saccharum Græcos vocare Sacchar.

Manardus astruit nouam opinionem; aliud scilicet esse antiquorum Medicorum Saccharum, ab eo quod nunc voce pardm (ut fieri solèt) mittatà, Zucharam vocatur.

Cornarius, qui Saccharum idem cum Zucharam esse credit, notasse perhibet Veteres, à Diosc. & Plinij seculo, Saccharon, sed conerectum quidem; nec ex Cannis expressum veluti hodie adferatur magna ex parte, in pyramides siue metas, octo plus minus librarum coactum.

Manardus & eum sequutus Fuchsius hunc in modum in Matthiolo refutantur. Non desunt inter recentiores Medicos, qui disputent, an Saccharum, quod sub mellis genere scripserunt Veteres, præsertim Dioscorides, & Galeus, in India, & felici Arabia nasci, idem cum nostrate Saccharo dici possit. Et quamvis plerique repellantur, qui dubio procul existiment, ac pro certo affirmant, communis usus Saccharum, & quod ab Antiquis describitur, vnum & idem esse, quod ex eadem proueniant plantæ, tamen Manardus Ferrariensis, & Leonardus Luchius ipsum secutus, maximam inter ea ponunt differentiam, omnino opinantes in alio Arundinum genere concreuisse Antiquorum Saccharum, de quo inter Mellis genera scripserunt Dioscorides, & Galenus: concretereque ad hanc diem usque ex coelestis rore, quemadmodum & id, quod mannam vocamus: non autem in iis arundinibus, è quibus in aqua decoctis huiusce ætatis Saccharum in Madera, Sicilia, Creta, Rhodo & Cypro insulis, ac etiam in Ægypto exprimitur. Quæ in eos viros alioqui doctissimos, planè hallucinatos, crediderim, quod nullo, ut puto, authorum probatorum testimonio ducti sibi persuaserint, Mannæ in modum ex rore concretere Antiquorum Sac-

Saccharum
Diosc. generis
Mellis.

Sacchar
Galen.

Sal Indum.

Delectus
Plinio.
Mel arundinum
Indicarium,
Theophr.

Canna
mellia.

Locus iuxta
Hermolaum.


Saccharum
Antiquorum
dixerunt à
nostrate,
Manardo.
Saccharum
nostrum
Veteribus
notum,
Corn.

Sacchari
consideratio
ex
Matth.

Manardus
& Fuchsius
opinio reprobata.

ARVND SACCHARINA, ET SACCHARUM.

CAPUT CCLIX.



Quæstio agitatur, notumne fuerit Antiquis Saccharum, cuius lautitias tum vitilis, in culinis, in Pharmacopœorum Officinis, est, potè in secunda & aduersa valetudine, in quavis ætate, sorte, regione, nunquam satis celebrari potuit.

Medius igitur inter milia ceas, atque Arundinaceas

plantas videtur Saccharatus Calamus. Septenum octonumve pedum Calamos, possere crassiores densis geniculis, fungosa, perquam dulci, succulentique & albidâ medullâ obfarcitos promit-

charum solis ardore super Harūdinum folia tam in India, quam in felici Arabia. Quippe quod ausquam repererim scripsisse Dioscoridem, Galenum, nec Veterum, vel Recentiorum quenguam, concretum Saccharum in Arundinum foliis, ex rore Solis feruore concreto, siue potius exiccato, quemadmodum in quibusdam arborum frondibus manna per se concretum. Quo fit, ut mihi refellenda videatur eorum sententia. Nam si verum illud esset, ut ipsi imaginantur, non modo, non est credendum, sed ne cogitandum quidem, Dioscoridem, qui diligentissime simplicium medic. historias, literis, memoriaeque mandauit, silentio praeteriisse tam pulchrum & admirabile, scitūque dignum naturae opus in Saccharo conficiendo. Nec minus id reticuisse Galenus naturae operum maximus indagator, quemadmodum nec reticuit lib. 3. de alim. facult. aërei mellis historiam quod nos mannam vocamus, quodque sua aetate in monte Libano, aliisque locis super arborum frondes reperitum scribit. Quamobrem magis veritati consonum videtur, ut dicamus, nil aliud Veteribus Saccharum extitisse, quam nostras Sacchari Arundinum lachryma, seu liquor, qui nimia succi copia apertio in latere calamo perinde ac gummi, exterius concreuerit. Huic nostrae opinioni subscribit Plinius, ex cuius verbis facile cognosci potest, quod non ex rore, ut Mannae euenit, coalesceret Antiquorum Saccharum super arundinum folia, sed quod fractis calamis carū internodiis cohereret collachymas, è quibus vulgare nostrum conficitur. Quandoquidem, hoc modo resina, guminaeque omnes scisso sui arboris cortice emanant. Alia praeterea huc accedit ratio, quae (ut quidem arbitror) Manardi ac Fuchsi sententiae prorsus aduersatur. Nam quemadmodum in Apulia, & Calabria manna à Sole tacta, dum arborum inhaeret foliis, pauco temporis intervallo in auram euascescit. [ut libro primo diximus in mannæ mentione] eade sanè ratione id Saccharo euenisset, si ex rore (ut ipsi contendunt) concreueret. Siquidem à Sole tactum, rarefactumque facile desiliisset in auram, nec gummiū modo concreuisset. Eoque magis quod nusquam legerim in Diosc. nec Galeno Saccharum è foliis Arundinum colligi, sed in ipsis calamis concretum reperi. Quod etiam testatur Strabo l. 15. Geographiae, ubi aperte scribit, in India Arundinem mel sine apibus gignere: non autem quod ex rore in arundine fiat, ut quidam peritæ, ignarusque Medicus mecum contendere, atque etiam, ut suam mordicus teneret opinionem, Strabonis codicem corrumpere non est veritus. Praeterea cum memoriarum prodiderint Dioscorides, Galenus, & Plinius, Antiquorum Saccharum durum esse, Salis modo coactum, album, dentibus fragile, ex his coniectare licet, è rore Saccharum nequaquam fieri. Quippe quoniam manna, quae eodem modo è rore concretum, sal minime refert, nec dentibus fragilis deprehenditur, sed potius mandentibus remax, & Cere modo lætescens. Quare crediderim Antiquis Saccharum fuisse tenuiorem, ac praetantiorē, cui illius partem in arundinū Sacchariferarum medulla, quae per internodiorum fissuras exiens Solis calore concreuerat, ut & Saccharum nostrum calore ignis arte concretum, & addensatur. Quod cum accuratissime perpēdissent homines, liquorisque praetantiam agnouissent, a natura edocti hoc arte se facturos existimarunt. Neque id incasum attentasse videntur: quandoquidem Sacchari integros calamos assumentes, minutum que

Antiquorum
Saccharum

Antiqui
Saccharum
in arundine

incidentes, ignis calore tamdiu decoxerunt, donec vniuersus liquor, absumpta igni aqua, dia efferefcens in Saccharum Salis modo in vasis fundo coëcreuerit. Verum edi Sacchari arte facti nihil meminerint Dioscorides, & Galenus: non desunt tamen qui dicant, hoc etiam ante eos factum esse, Solini auctoritate freti, qui in India palustribus arundinem ita crassam progigni ait, ut fissis internodiis lembi vice vestiret nauigantes, è cuius radicibus dulcem etiam exprimitur humorem ad mellis suauitatem. At qui liquorē hunc, qui ex harum Cannarum radicibus elicitur, Saccharum nostri vsus fuisse existimant, procul dubio falluntur, quod Indi non modo ex decoctis Cannarum, sed aliarum quoque arborum radicibus sibi potus parent, cum illius cœli, & Soli clementia, frequentissimè sint plantarum radices quae mellea dulcedine imbuuntur, ut Strabo testis est loco nuper citato, ubi sic inquit, Nullus annus in India inuenitur vtroque tempore sine pluuia. Quapropter contingit annum feracem esse, cum semper terra sit fecunda: fructus autem arboreos multos gigni, arborumque radices, praesertim magnarum Arundinum, & natura, & decoctione dulces esse, aqua à Solibus tepescata, tam caelesti, quam fluuiali. Adde quod ea, quae apud alios & fructuum & succorum maturitas dicitur, apud illos concoctio est: quae tantum ad dulcedinem operatur, quantum ea, quae per ignem fit. Sententia nostrae Lucanus quoque suffragatur illud explicans, hoc carmine.

Quaeque bibunt cœtera dulces ab arundine succos.

Quin etiam Marcus Varro, qui eodem serè tempore claruit, his tribus Verbis attestatur, dum inquit:

Indica non magna nimis arbore crescit Arundo.

Illius & lentius premitur radicibus humor,
Dulcia cui nequeant succo contendere mella.

Ex iis palam est, hos omnes de factitulis Indorum portionibus, quae iis vini loco sunt, fuisse locutos: non autem quod ex illis Cannarum radicibus Saccharum aliquod pararetur. Quandoquidem & nos è Glycyrrhizae radicibus, quin & è decoctis, prescisque filiquis, sicut & alii è dactylis, dulces eliciamus succos ad variū vsu potationes: quemadmodum & Occidentales Indi è pluribus dulcibus arborum fructibus suos sibi parant potus. Sed non ob id dicendum hos liquores, quod mellis dulcedinem praestent, esse mel, neque Saccharum. Nec mirum sanè si Indicæ Arundines radicibus dulcissimum praebant succum, non modo illarū magnæ: sed etiam quæ ibi nascuntur, nostris fortasse non multo grandiores: cum etiā nostrates recentes mansæ, quadatēque ori dulces sentiantur. Quod autem minores Arundines in India radicibus dulces praebant potus, superioribus carminibus explicauit abundè Marcus Varro: cui non magna nimis est arbor. In hoc tamen à Solino dissentit: cui arundines, quarum meminit, validissimæ sunt proceritatis. Hinc ergo eorum sententia explodenda videtur, qui credunt ex illarum magnarum arundinum radicibus, Saccharum nostrum similem factitulis Indos, quod non quidem Saccharum, sed dulcis inde potus vini loco sibi conficiant. Sed ut suam opinionem auctoritatibus fulciret Manardus Ferrariensis, vtque lucidius comprobaret Antiquorum saccharum, perinde ac mannam, ex rore fieri lib. 9. epist. 5. Auicennam etiam admittit, quem tamen alias vbiq; reticet, ac reproba-

bit, afferens; quod cum ipse huius fuerit sententia, ultimo capite lib. 2. Antiquorum Saccharum mannani vocauit. Quod manifestè declarat Zuccharum *alhasfer* apud Auicennam huiusce arboris esse mannani, vel gummi, non autem Græcorum Saccharum in calamis concretum. Illud insuper nostram comprobatur sententiam, quod eodem loco addidit Auicenna, sic inquit. Et in Zuccharo quidem *alhasfer* est cum abstersione pauca stipticitas, & amaritudo. Siquidem austeritatis & amaritudinis, quæ in Antiquorum Saccharo fuerint, nusquam meminere Dioscorides, & Galenus: nec item quod confertur id pulmioni, & aquæ intercuti, & paulo infra voluit Auicenna. Qui etsi dixerit deinde Zuccharum hoc oculorum morbis, pariterque renum, & vesicæ vitii auxiliari: non tamen ob hoc dici potest, Zuccharum *alhasfer* esse Antiquorum Saccharum. Sed rectè quidem contra Manardi sententiam, Auicennæ testimonio (cùm & ipse hoc in loco Auicennæ autoritate nitatur) probari potest, quod Antiquorum Saccharum gummi modo collachrymans in arundinibus concreuerit, non autem ex rore. Quippe quod is de Zuccharo agens doco nuper citato, ibique Antiquorum Saccharum recensens, inquit: Assumptum sicut gummi ab harundine abstergit oculum. Quibus palam fit, Antiquorum Saccharum, perinde ac gummi, ab interiori medulla exterius emanasse, ibique postmodum Solis ardoribus concreuisse. Verum enimvero quod *Alhasfer* apud Arabes sui generis arbor sit, & ab harundine maximè differat; & quod eius Zuccharum, quamvis ab Auicenna manna dicatur, quod fortasse granulis concreuerit mannae similibus, ex rore haudquaquam fiat, sed gummi modo ab arbore destillet, manifestè ostendit Serapio cap. de Saccharo his verbis. *Alhasfer* habet lata folia, & habet Zuccharum quod egreditur ab oculis ramorum suorum, & à locis foliorum eius, & colligit de eo homines rem conuenientem, & in Zuccharo eius est amaritudo, & egrediuntur ab hac planta mala quadam, sicut testiculi camelorum, è quibus liquor quidam emanat adurens, stipticæque facultatis, ad cauteria peridoneus. Et lignum quidem *Alhasfer* est leue, crassum, rectum, pulchrumque, & idèd assimilauerunt canilenarij in canilinis suis brachia, & crura dominarum ligno eius: hæc Serapio. Ex quibus facillè & Manardum, & Fuchium, viros alioqui doctissimos, hac in re hallucinatos putauerim. Cæterum Fuchius, vt probaret Antiquorum Saccharum è rosco cæli succo in calamis concrefcere, vtque illud à nostrate diuersum ostenderet, dicit, quod cum nostri vsus Saccharum perinde ac mel, calidum reperiatur, sitimque facillè concitet, Antiquorum Saccharum esse non potest, eò quod Galenus suæ ætatis Saccharum id efficere non prodiderit. Cuius tamen sententia (pæc sua dixerim) experimento minimè respondet: à quo non discedit Galenus lib. 7. simpl. medic. ex cuius verbis clarum est, quod cum Saccharum melle minùs sit dulce, minùs etiam calidum sit necesse est. Eaque propter asserit Galenus, Saccharum non perinde ac mel, sitim excitare: non tamen quod nulla ab eo sitis exciteretur, vti Fuchius interpretari videtur. Quin etiam idem Galenus lib. 8. cap. 4. meth. med. Saccharum inter ea connumerat, quæ febricitantibus exhiberi possunt. His igitur rationibus, & auctoritatibus adductus sum, vt certò crediderim Antiquorum Saccharum ab iisdem arundinibus emanare, à quibus vulgare nostrum exprimitur:

Tom. II.

sed hanc tantum inter se differentiam esse, quod à natura factum sit nostrate factitio longè tenuius. Ideoque Auicenna: Zuccharum (inquit) *tabarzed* frigidius est & subtilius. Hoc laudibus extolit Paulus, & post ipsum Auicenna Archigenis auctoritate: *Indu* ipsum appellans, ad linguæ leuitatem, ariditatemque in acutissimis febribus. Sed conos hac ætate, caremus, quod amplius non afferatur: quanquam ego non ita pridem à viris fide dignis accepi, qui *Domus Thoma* *inf* *trinitatem*que M. geram lustrarunt, adhuc iis in locis Saccharum inueniri in arundinibus saccharitis concretum illi non dissimile quod arte fit, & candi iam cogominatur: postquam ab illis spontè emanari gummi modo. Quod autem adferri defecit, non aliud in causâ esse existimamus, quàm quod hodie paucum ad nodam proueniat. Siquidem Dioscoridis, & Galeni tempore, quo ad nos copiosum conuehebatur, cum adhuc non innotuisset exprimendi ratio, necesse quidem erat, vt arundines Sacchari liquore prægnantes, cum annis compluribus adoleuissent, & falcem nunquam expertæ essent, per se liquorem exuderent, veluti innumeris arboribus gummi, & resinæ emanant. Proinde non mirum, si eius à natura facti Antiquis fuerit vbertas. Sed postquam lueri dulcedo, fulgentisque auri sitis docuit homines artem modumque, quo Saccharum concisus, decoctis, pressisque arundinibus copiosius elicerent, factum est, vt Indi quotannis vniuersos inciderint calamos, ac iterum quotannis fuerint. Hinc igitur euenit, vt nullis remanentibus, quæ Saccharo plurimum annorum ætate turgent, natura impedita sit operatio, deperditumque hac de causâ sit Antiquorum Saccharum. Cuius vice eo Recentiores vtuntur, quod Officinæ candidum cognominant, arte factum, pellucidum, Salis fossitij modo, dentibusque fragile, vt Antiquorum Saccharum vndequeque referat. Competit perinde ac illud, scabietici linguæ, pectorisque asperitibus. Verùm ad hæc id præstantius est, quod in fistilibus, vbi violaceum lulapium asseruatur, ætate concreuit: eò quod violarum diluti facultate humectet, lenitque magis.

Iobel in Ic. plant. pag. 49. inscribit Arundinem Saccharinam Indicâ, ac de eius Saccharo in Aduers. hæc scribit: Non Indico Saccharo hodie prima laus, tamen ex India primum in ceteriorum Asiam, Rhodum, Cyprum, aliisque non paucis loca transfusi sunt. Nam hodie Canarium & Maderense longè omnibus suauitate & candore excellit: quippe tamen quod Genuam ac Massiliam ex India, Alexandria, & aliis Africæ emporiis, Liburnicis Venetiis asportant, sapientius decoctum, candore marmoreo Canarium prouocari multò tamen suauitate & dulcedine gratissima superatur. Dum enim lixiuio illo acriore, quasi sapone ex calce paratò, faculentioris, nigriorisque pinguedinis sordes eluuntur & absterguntur, vber dulcedinis gratioris perit, atque nescio quid rancidæ acrimonie inurit: vnde bilis gignitur, & sanguis vitrit, caput grauatur. Quod quilibet nosse potest ex elu vsuque *Thomæ, r. br.* vocati, *Sacchari*, ex cognomine Insula, sub ipso fermè æquatore sit. Antuerpiam enim & Londinum Angliæ, vbi defacare solent quidam industrij artifices, si gustes adhuc impurum & rubrum, multò suauius & dulcius reperias, quàm excoctum, lixiuatiq; & cortinas expertum. Et quia, quâ purius reddant industriâ, celant Pharmacopæorum plebem: lubitum est hic monere. In Cortinam scilicet atheniensem, Sacchari Thomæ, vel alterius quantum volunt, immittunt. Lixiuji fortis sola ex cal-

Zuccharum
tabarzed.

Sal Ind.

Arundo
Saccharinâ
Indica
Lob.

ce viua parati, iustum modum, & quod ebullitioni despumationique suffecturum sit, affundunt: tum agitatione, scopulisque spumas tumidas multorum albuminum ouorum sensim affundunt, vicissim despumando, & rursus instillando, donec situlam plenam mellea & fordidiore pinguedine, despumando exemerint. Tunc probè limpidam & solum factum syrupum, lixiuio nondum absumpto, transmittunt per cilicium, colum, vel stamen, quò inibi fesculas, quisquiliasque relinquant. Tum feruet denuò, donec expirarit in vaporem lixiuio. Quod si (vt ferè sit) feruens Saccharum impetu, artifice inuito, labrum effusione, & ebullitione superet, non aquam, nam sic [vt illi loquuntur] decoqueretur, & crudefceret: sed butyri momentum illic addunt, atque actutim residunt vindantes spumæ. Iam è Syrupo ad duritiem excocto Saccharo, infundibula, figlinæ vasa, (Veneri ænea) quibus subius in angustiore loco inest foraminulū, prius fontanā imbuita, Saccharo adhuc calente opplēt, eodem obrurato foraminulo: recluduntque promo, cella, aut Hypocausto sicciore, tepidiore: cūque induruerit, Metæ ordine disposite latiore basim inducunt, luto ex figlina fuscâ aut pulla terra & aqua calida subacto dilutorio, ac loricam latara duorum, triumue digitorum. Quæ crusta vbi partim loci, partim Sacchari tepore siccò & bibaci aruerit, demitur, noua apponitur: bis terue repetunt: sed singula in mutatione fusi mucronem in foraminulum mittunt, vt facilius effluat crassamentum pinguius, & fordidius, quod Syrupum vulgò vocant, Gallis *Melasse*: quâ quidem improbiore pharmacarii, suos stercoreos Syrupos condunt. Postremò bis aut tertio ex Metis erutum fontana liquefaciunt: rursumque in Metas infuso, referant subius foramen, supernèque lutum addunt, cuiusmodi diximus. Notum fuit Saccharum Antiquis etiam Diosc. & Galeno antiquiori Theophr. huiusque præceptore philosopho. Paulus recēset inter Sales. Primò è Græcis Actuarius, Medicatos succos Saccharo exceptisse, nomēq. Iosacchari, Rhodofacchari commentus fuisse putatur. Varro & Strabo etiam ex radicibus succum promi suauissimum trahunt.

Tabern. vocat Arundinem saccharinam, & Calamum saccharinum, germ. *Zuckerrohr* / & *Zuckerried*. De Saccharo autem eiusque speciebus hæc tradit: Veteres utebantur tantum Saccharo spontè effluente, erat eis ignota parandi ratio per decoctionem. Inter Græcos Medicos qui docuere cōdire cum Saccharo loco Mellis est Actuarius, deinde Nicolaus Alexandrinus. Arundo Saccharina dicitur etiam Harundo & Canna. Succus dicitur *Σάκχαρον*, Arriano *Μέλις ἁρδάνης*, Paulo Aegin. *ἄλς ἰνδύς* Mellis genus: Galeno, Paulo, Aphrodisæo lib. 2. probl. cap. 74. & Straboni, Serap. lib. simpl. cap. 50. *Zuchar*, aliis Arabibus *Suchar*, *Zazar*, *Sudar* & *Sutter*, Pōlonicè *Guseer*. Nostro tempore sunt nobis 7. Sacchari genera. Primum genus ad nos adfertur ex Lusitania ex insula Madera aut Medera: dicitur Saccharum Maderiense: hoc cæteris omnibus præstantius & preferendum in vñ Medico.

Saccharum
2. Maderiense.

Sacch. 2.
Canariense.

Sacch. 3.
Valentinum.

Saccharum 1. Canarium, aut Canariense, quod defertur ex insulis Canariis: bonitate secundū obtinet locum. Saccharum 2. Finum, Refinarum & Valentinum dicitur, quia Valentie Hispaniæ repurgatum. Practicis & pharmacopæis hodiernis Saccharum *Tabarseth* quod nomen competit Maderiensi Saccharo, Arabes enim per *Tabarseth*

intelligunt optimum Saccharum. Saccharum Valentinum arte fit ex Maderiensi & Canarino, itaque repurgatur, vt acquirit similitudinem Martoris albi aut Alabastris, & ob suam pulchritudinem existimatur præcedentibus duobus præstantius: verum cū per lixiuio ita præparatum sit, meritò ab vñ medico reiciendum, per lixiuio. n. acquirit acrimoniam, aliquomodo amittit dulcedinem, acquirit aliam naturam & proprietatem, sitim excitat & valde exsiccat: caueant Pharmacopæi ab huius Sacchari vñ in præparandis Tabellis quæ dicuntur Manus Christi & aliis, ac etiam in aliis medicamentis. Ex hoc Saccharo parant paruas Metas pyramydæ, quas inuoluunt papyro cærulea. Quum vulgò sit persusum melius Saccharum inuolui charta cærulea: mercatores Saccharum vilissimum Thomassinum lixiuio dealbant & repurgant & candidius reddūt, verum semper molle remanet, nec ritè induratur: & quò candidius est eò plus habet Amili, quo adulterant hoc Saccharum dum repurgant, & parant pyramydes libram ponderantes.

Saccharum 4. defertur ex insula Maltha, Saccharum est durum vt Canarium, sed magis cinereum, tertium bonitate locum obtinet, præferendum Valentino, eius vñ in cibo, vocatur Saccharum Malthanum, Melissum aut Melitæum & cibale. Germ. *Malis Zucker* aut *Sprußzucker*.

Saccharum 5. ex insula S. Thomæ, est omnium vilissimum, molle est & rufum, dulcius tamen Valentino & salubrius: vocatur Saccharum Thomassinum, Thymum, practicus & pharmacopæis rubrum, Arabibus *Zucharum Sadimenum*. Germ. *Thomaszucker*.

Saccharum 6. Miscellaneum dicitur, Germ. *Sarinzucker*, *Cassanzucker* / compositum est ex fragmentis omnium generum Sacchari, tam albi, quàm rufi: defertur in dolis & capsis ad nundinas, eius vñ ad Syrupos & cibos.

Saccharum 7. est liquidum instar Mellis aut Syrupi, defertur ex insulis vbi Saccharum coquitur & in metas reducit: fit ex spuma Sacchari dum coquitur, semper manet liquidum, adfertur in dolis, satis vili venditur, ad multa vtile esset loco Mellis, quia viliore pretio venditur, quàm Mel, si non timenda esset impostura: dicitur *Remel*, *Mel Saccharinum*, aut *Saccharum*: Gall. *Melasse*, Belg. *Syrup* / Germ. *Zuckerhonig runde Syrup*. Multi volunt vulgare Saccharum non esse Dioscor. & Galeni inter quos Manardus & alii qui eum secuti: verum qui diligenter considerabit Antiquorum scripta, compertiet Antiquorum & nostrum Saccharum esse ex eadem plâta, nempe ex depicta Arundine, & præparatione tantum differre: Duo autem genera fuerunt Antiquis nota, primum de quo Diosc. Plinius & Galenus: quod erumpit vñ Solis ob copiam succi, quo vñ sunt Veteres tantum in medicina, quod non adfertur amplius, sed eius loco substituit Saccharum Candidum, quod arte præparatum ex Arundinibus iisdem ex quibus Veteres collegerunt suum Saccharum. Aliud Saccharum Veterum, quod parâtes, ex recentibus radicibus Arundinis Saccharæ exprimebât, ac vtebâtur eo modo quo vñtur Melle, inde dictum *Mel Canne*, quod ex Aegypto, Rhodo, Cypro, Creta & Sicilia olim afferebatur, quanquam non esset in medico vñ ante Actuarii tempora, nihilominus Galeno non fuit incognitum, meminit enim lib. 4. simpl. Arundinum dulcium quæ in Aegypto proueniunt: quomodo fuisset Galeno incognitum Saccharum liquidum

liquidum, quandoquidem vulgare fuit diu ante
Galenī tempora , vt apparet ex Marco Varrone,
qui eius meminit, is vixit tempore Cæsaris, ante
Aduentum Christi , Statius meminit et radicibus
Sacchari arundinacei: Lucanus Poeta meminit etiam
Sacchari mollis. Strabo meminit vtriusque. Scri-
bit etiam Solinus de succo expresso ex radicibus
Arundinis.

Arundinis saccharinæ hæc sunt Synonyma nota. Dicitur C.Bauh.in pin. *Arundo Indica*. vel *Saccharifera* = *Arundo*. vel *saccharata*, Dod.gard. *Harundo ex qua Saccharum*, Cord. in hist. *Arund. saccharata* Dalech. in Diosc. *Sacchari Cannæ*, Gefinhort. *Arundo Saccharina indica*, Adu. Lob. Icon. H.Lugd. *Canna*, mellea, Cæf. *Arundo* & *Calamus Saccharinus*, Tab. *Calamus Indicus*, par. 6. Ind. Or. c. 19. *Calamus Indicus Saccharites*, & *canna Saccharina*, in hist. Ind. Orient. par. 4. 5. & 6. cap. 38. & Hist. Occid. Ind. par. 3. 4. 8. & 9. De Sacchari differentiis & conficiendi modo, in nostris in Matthioli notis, & lib. de comp. medic. eginus: Vide & Munsteri Cofinograph. l. 2. c. 91.

Loca in quibus Saccharum provenit præter supra allegata, hæc passim annotantur: Insula Madera, quæ Oceano Atlantico immatæ est regione Mauritaniz: Insula Hispaniola: Insula S. Mariæ, Terra sancta, Vrbs felicis Arabia Zibich, Sumatra, Brasilia, & Regnum Concha. Ex Arundinibus in aqua decoctis huius ætatis Saccharum in Sicilia, Creta, Rhodo & Cypro Insulis, ac etiam in Ægypto exprimi refert Marthiolus. Arundo Saccharina in nostris regionibus, (inquit Tabern.) raro præter frigus perfecti florem, eam Arundinem primò vidi Francofurti in horto Pharm. Adami Kechen qui per aliquot annos eam aluit, fed tandem aspersiore hyme ci petiit: ex eius radicibus & medulla excoquit Saccharum in India, Arabia, Ægypto, Canarinis insulis, in Insula Madera, Maltha, Cypro, Sicilia & S. Thomæ. Lobel. Orbi Europæ iam multis ad Mediterraneum Oceanumque tractibus inquilina: vt Hispanicis, Lusitanis atque æmœnisinsis Olibæ in Galloprovincia viretis, non procul & ex Adverso Stæchadibus insulis, quem virentem inibi & alibi habuimus, & in Belgio meminimus. Pangunt talæz inar radici abscissæ, atque bellè primò proficiunt in Gallia & Belgio, sed hymeis sæuicia eneeantur, humentis solis, sed tepidioris æris & auræ alumnæ ac amalia.

De viribus & vſu Sacchari ita Dioſcorides, Saccharum alioſt idoneum, & ſtomacho vtile, ſi aqua dilutum bibatur: vexatè vero veſicæ reſiſtibusque auxilium: quin & illitum ea diſcurit, quo pupillis tenebras offundunt Saccharum Indicum & ex Arabia felici conſectum Galenus minùs ſuo dulce ſtatuit, ſed ſimiles ei vires attribuit, quod ad abſtergendum, deſiccandum, & digerendum pertinet. Quatenus verò nec inimicum ventriculo eſt, nec ſitum adferens, ætenuſ ab illo ſtultitia diſſerte ſcribit lib. 7. ſimpl. medic. Alt. 8. meth. med. cap. 4. Saccharum inter ea connumerat, quæ febricitibus exhiberi poſſunt. Saccharum (teſte Tabern.) temperatæ eiſt naturæ, calidum & humidum in primo ordine, primariò quidem *Maderienſe, Canarium, & Meliſum,* & ad Mel quum proximè accedit. Similiter & *Finum*, quod non ita dulce, igneum & acrem, ex lixiſſio calciſ, quo præparatur, aſſumit qualitatē, quā *T. meum* etiam ſuperc, iſdeoque ſitum cauſat ingentem, ita vt ad internos vſus inutile reddatur, quamvis vſus Medicorum (quoniam præ cæteris candidiſſimum ſit) magno errore

contrarium teneat, optimūque esse diiudicat. Quapropter eligat semper vel Maderiense, vel Canariense. Saccharo cibi austeri & acidi corriguntur; saluti nimium attemperantur; crassi, attenuantur; ingrati verò suauiores redduntur. Emendantur, vix paucis multa complectar, Saccharo omnia, quæ in medium excessisse in culina. Quid nāque aciat, acut & acrimonia præcellit acutum.

Attamen nihilominus hoc vitæ eius infrigitur. Nec Pharmacopœia sine hoc suo (vt vellent & continûd deberent) officio satisfacere queunt. Nunc enim Electuaria, Symplos, Iulepos, potiones, vina, confectus, condita, luccos, ac omnis generis confectiones, tabulas, panes Martios, & cætera, Saccharum ingredientur. Nunc quantum requirit omne genus animalium, volucres cœli, pisces maris, & pœcora & reptilia terræ, & hî quæ alia excoigari possunt, quæ ex Saccharo quotidie efforantur, ac variis coloribus depinguntur. Nunc quantum femina & fructus, Pinci nucleî, amygdalæ, auellanæ, pistacea, Citreum, Cinnamomum, Coriandrum, Anisum, Feniculum & similia, quæ eodem obducuntur. Quæ quidem vt plurimum luxui, nocturnis potationibus, inimpetibus concubiuus magis abdicantur, quàm salutariibus medicinis. Sed quid proficit, experientur Magnates, qui grauilissimè morbus subito nonnunquam corripitur, symptomatibus periculosisse ipsi continûd vexantur, humilalæque sapissimè moris ipsa extinguntur. De quibus qui in acie & prælis potatorum versantur, multo certius, quàm ij, qui in vimbraculis, & extra scilphi lactum (ita dicere liceat) vitam degunt, testimonium reddere sciunt. Spontaneæ igitur lachrymæ sunt, quibus nobismet ipsis ventriculum, Heparque afficimus, ipsulumque adeo totius corporis temperamentum subuertimus, vitamque ipsam ante perperimus, quàm constantem ætatem attigimus. Hac ergo ratione media hæc à Deo Bohorum omnium autore ad vitam conservandam concessa, non media ad vitam, sed media ad mortem, efficiuntur.

Saccharum Madericēse moderatē in cibo & potu usurpatum, purificat sanguinem, spiritus recreat, membra corroborat. Per se quoque, aut in modo dicto, assumptum, ad vitia thoracis & pulmonum vrile. Proficuum arteriæ asperæ contra raucēdem. Comodum quoque internis apostematibus, lateris &c. thoracis vlcēibus; Tussim sedat, ventrem emollit, præsertim verò infantum. Doloribus thoracis medetur. Biliofi & Gerici, extra medicinam eurent Saccharum, id enim facile in bilem mutatur. Adhæc obest omni vitio quod à bile originem suam trahit. Infantes si plūs de Saccharo ingerant, lumbicis non raro in ijs gignunt. His itaque non nisi vrgente necessitate, aut saltem minus administretur. Non assentiendum ijs, qui existimant Sacchrum intestinorum obstructionem parere, quandoquidem aspergit & mundificat. Salutare admodum est renum; vrinariorum meatuum, & vesicæ affectibus. Non tantam, vt mel, sitim excitat. Dentibus valdè nocuum. Non enim nigros duntaxat reddit, sed & putreficere, vacillare, atque excidere facit. Quare sibi consulunt ijs, qui assumptum Saccharo, os aquâ frigidâ cluunt. Ex frigida quoque haustum, raucam emendat vocem, à calore ortam. Contra tussim siccam, sitim & asperitatem sanant. r. Sacch. vnc. j. Aqu. frigid. menfur. ij. Decoq. ad consumpt. tertie partis. De hoc decocto bibere quantum lubet. Si præstantius deside-

deras. Adde drach. ij. Liquiritiæ minutim incise: vnc. f. Vuar. Corynth. Bull. mod. dicto, percolenturque, seruetur ad vsum. Saccharum hoc lacti recenti ad lulepi consistentiam incoctum proficit iis, quibus vitriolum aut alumen fuit propinatum. Noxam enim eorum corrigit, quæ post se relicta intestinum omne læderent. De hoc bibet quando voler. Medicina hæc, non vulgaris est antidotus contra tussim etiam infantum, si ad sitis vsq; extinctionem ipsis de hac haurire concedatur. Nunc in puluerem redactum & cum vnc. iij. Ol. Amygd. recent. express. commixtum ebibitum Colicam sedat. Oleo verò Rosar. aut Butyro rec. mistum & eorum sanant omnes internos affectus ab assumpto alumine, Vitriolo, Cantharidibus, eiusdemque generis acris & erosius rebus exortos. Aduerlus capitis, cerebri, thoracis & ventriculi dolorem à frigore profectum. ꝛ. Sacch. Maderiensis vnc. viij. Rad. Ireos vnc. f. Zingib. drach. ij. Galang. Maioran. Calam. arom. ana. drach. f. Nucis Molch. Cubeb. Cardamom. Cinnā. el. Menth. cslp. Caryophyll. ana. drach. f. Piper. long. scrup. i. scotum in puluerem subtilem redigatur. Cætera simul conterantur quàm diligentissimè, traicianturque per cribrum angustissimum, ac misceantur. Fiat Tragea, seruetur in scatula ad vsum. Huius Trageæ manè ieiuno stomacho cochlear vnum pane in vino prius generoso madefacto, exceptum, ac commanum, calefacit refrigeratum caput, cerebrum, thoracem, pulmonem, ac ventriculum, corroborat memoriam, & cor atque principaliora membra, sensus adauger. Pectoris angustia medetur, & tussis frigida. Anhelitum commendat, hilaritatem inducit, appetentiam excitat, concoctionem iuuat, absunt humiditates, status dissipat, neruoso generi conducit, renibus prodest, obstructions hepatis & lienis referat, naturalem colorem inducit. Saccharum Maderiense subtilissimo modo puluerisatum oculis inspersum obcuritatem visus depellit, eosque lucidos reddit. In frustula parua fractum, carbonibus impositum, fumisque naribus exceptus, capitis lissit cathartos, emendatque Coryzam. Contra linguæ ranulam ꝛ. Sacchar. fini, Aluminis, viridis æris ana. vnc. f. f. pulu. subtiliss. quem cum melle in linimentum rediges, quo sæpius illines ranulam etiam inueteratam. Ut dentes conferues, Saccharum hoc puluerisat, cum melle commisce, & eò sæpius dentes frica, quo facto aqua frigida os collue.

Sacch. Cand.
Barium.

Ad Vinum
clarum
reddendum.

Saccharum Canarium cum æquali portione salis vsti puluerizatum, & cum oleo communi decoctum, eoque mentum instar saponis lotum barbam producit longam. Idem in puluerem redactum, vlcera sanat, bis in die inspersum. Vinum turbidum sequenti ratione clarum reddes. Accipe pro quolibet dolio Sacchari & Aluminis vnc. viij. hæc diligentissimè simul puluerisat, & in vino clarificando dissolue, eidemque infunde, bacillòque foraminulento illud agita: hinc vas ad 14. dies occlude, posteaque in aliud transfunde, & vinum clarum cognosces. Euaporatum verò ita corrige: ꝛ. Sacchari pulueriz. lb. f. Rasura cornu cerui vnc. iiii. Quæ miscendo impones in linteum sacculum. Posthæc vino superinfunde mensuram vnā lactis recenter mulsi, agitando strenuè vinum baculo iam dicto. Quibus ita peractis sacculum indito, vāsque fortiter obturato. Præstans in vindemiis sic effice. ꝛ. Sacchari iam sæpius dicti vnc. xvi. Polypodii, Macis, ana. vnc. i. Quæ contunde grosso modo, misce ac in succu-

lo include, vinòque cum elaboratum est ad 14. dies iniice, vas verò diligenter occlude.

Aqua Saccharea in multis morbis vicem potus ordinarii supplens. ꝛ. Sacchari vnc. viii. Aq. frigid. lb. vii. co. igne lento, ad consumptionem medietatis, percoletur, serueturque ad vsum. Aqua hæc pro sitis vehementia ebibita, medetur Catarrhis, raucedini, tussi, Orthopnææ, Pleuritidi, affectibus calidis pulmonum, æstuanti ventriculo, & eiusdem generis imbecillitatibus. Prodest insuper febre Ephemera laborantibus. Si infantes quoque laborent, nutrices non alio, quàm de hoc decocto bibant, quod illis admodum salutare. *Alia in Cathartico.* ꝛ. Huius decocti lb. iiii. Succ. Granator. acid. vnc. iiii. Vfus eius vt primæ. Tertia cum Cinnamomo, pro iis quibus interdictum est vinum. ꝛ. Sacchari vnc. iij. Cinamom. drach. ij. Aq. fontis lb. viij. Imponantur simul in cantharum linteo obturatum, suspendantur in aquæ calentis balneo, permittanturque ad ad minimum duabus horis coqui. Demum amoue cantharum donec ex se refrigeretur, tandem decoct. percoletur, serueturque ad vsum. *Alia* pestilentialis quæ non solum itim sedat, sed ipsi veneno resistit, facultatèque vitalem rescit. ꝛ. Sacch. unc. vi. Succ. granat. acid. Cydon. ana. vnc. viij. Aq. font. lb. viij. Ponantur vnā in vas lapideum in balneo aq. calentis per vnum diem horis, coletur ad vsum. *Quinta* ex pluribus composita aduersum dyspnæā, angustiam pectoris & obstructionem pulmonum. ꝛ. Sacch. vnc. v. Vuar. Corynth. bene lot. vnc. f. f. Sem. fenic. vnc. f. Papau. alb. vnc. j. Sūmic. Hillop. Saluæ, Viol. mart. ana. M. i. Capill. Ven. p. j. luit. rub. & nig. ana. n.º. xii. Dactyl. mund. Ficus ana. n.º. iij. Liquirit. rals. Sē. Anisi, Cinā. an. vnc. ij. Rad. Helē. 3. f. Incidend. incidatur vasiq; cum Sacch. indantur, affundantur aquæ duæ vel tres mensuræ, vas quoque iptū obturetur, ac balneo aq. calentis imponatur ad horas 4. post vbi frige factum fuerit, coletur serueturque ad vsum. Hoc quoque in loco vinum illud Saccharatum nobis recludendum venit, quod ꝛ. vini optimi vel Cretici lb. iij. Sacchari albiissimi lb. ij. Coquantur ad lentum ignem more Syrupi, serua & vtere cum duabus partibus aquæ vel aliter, vt vñs postulat. Semibus, frigidis & debilibus conuenit, & quibus humor natiuus, & calor naturalis imminuitur: nutrit enim & sanguinem generat, & replet partes principales spiritibus. Syrupus saccharatus & eodem modo paratur, & iisdem viribus pellet.

SACCHARVM CANDVM.

CAP. CCL.

Sacchari candi duplex genus in Officinis habemus. Prius & præstantius candidum est, forma & facie salis gemmæ aut Crystalli splendicans, nec vti Saccharum vulgare ita facile dissolubile sub lingua. Aterum obscure rufum est, obiter splendens & velut per scintillas, prædicto fragilius, quippe cui duritiæ haud parum cedat, dulcore alioqui non inferior. Sed Saccharum Candi inter reliqua omnia præstat, cuius perfectionem talem docet Tabern. Maderiensis Sacchari purissimi libræ viginti plus minus in minutissima frusta confringuntur, postea teruntur, & in Caccabum aut aliud simile vas commodum inunittuntur, superfusaque aqua fonta-

ana quantum ad dissolutionem sufficiat carbonibus accensis superponitur ad dissolutionem & ebullitionem, quam celeritè fieri necesse est. Etenim si diutius bulliat, flavescit. Quocirca quò parcius aqua affunditur, eò melius & candidius Saccharum efficitur. Saccharo itaque sic dissoluto, ebullito & in Syrupi consistentiam cocto: ad manum habere oportet arca instar, vas fictile oblongum, quadratum, coctum, interna parte vitreatum, ab ima parte interna summa versus suffulturis prominentibus binum digitorum distantia donatum, ita ut propter has veluti scalas angustiore fundo patentiore sit ore. His suffulturis siue scalis sic ordine dispositis bacilli tenues quadrati, duorum itidem digitorum distantia à se invicem ordinantur atque disponuntur, incipiendo ab imo & progrediendo ad summa vsque. Mox Saccharum adhuc bulliens, huic vasi infunditur ut repleatur: Quo facto obtegatur, & prope fornacem collocatur ad decimam sextam aut vigesimam vsque diem. Vase tum detecto, maior Sacchari pars Crystalli instar candidata, elegantè bacillis adherescere conspicitur. Quod restat Syrupi, nec dum condensati, lentè & cautè effunditur in Cacabum, ut denuò bulliat. Sed post hanc ebullitionem modicè refrigeratum Saccharum, denuò dictis bacillis, quibus iam Sacchari Candi magna pars hæret superfunditur, & in decimam diem vti priùs stare permittitur. Quibus peractis omne Saccharum, candidum & clarum factum, baculis adhærescens deprehenditur. Sed ex nullo alio ligno dicti bacculi parari debent, quàm ex abietino, pinastirino, aut tedinò. His enim dictis lignis facilius adhærescit Saccharum quàm reliquis, quod experientia faciliè constat: Conditæ namque Saccharo radices aut fructus si doliolo ex abietino, aut aliquo ex prædictis ligno parato, immittantur. Syrupus faciliè adhæret vasis, condensatur, atque candescit, quod in aliis vasis haud ita temerè obseruaueris. Veneti *Saccharum Candi* ex repurgato Saccharo parant: & candore quidem atque claritate præcellit. Verùm quia istud Saccharum cum lixiuio decoqui ac depurari (ut illi putant) solet: fieri nequit, quin istud Saccharum acrem, adurentem & feruidam quandam qualitatem acquirat, atque ob id haud absque damno in internis affectibus præscribi queat. Satius itaque fuerit, si ex laudatissimo Maderiano Saccharo paretur: quippe quod candore & pulchritudine priori neutiquam cedit, dulcore verò haud parum superat.

A Venetis auctore Lobel. sic paratur *Saccharum Candi*. Primæ notæ Sacchari accipiunt vicinas, tricenarve libras, pauca aquila fontana, ut liquefcat, faciunt: & ne multum in multa aqua bulliat (nam flavesceret) & quia parum aquæ inest illico in crassum syrupum abit. Tunc arundinaceos bacillos, aut ridas pusillas, quas prius cancellarum, decussatumque ad ollæ imum, & latera aptarint, mergit Saccharo, Syrupove calæte, & vas paulò superius, quàm medio tenuis opplente, multum inuolucrum bombace densa, vas cella, aut Officina calefacta reponunt super aslere, semimense aut vigintri pòst diebus aperiant os, & nondum concretum syrupum prius effundunt, tepente affusa calida, ad syrupi elucendam pinguedinem. Quà denuò & illico affusa, reponunt quouis calidiore, aut quouis alio loco: effractoque eodem die aut biduo vase, pellucidi candoris crystallinas bacillis aggestas habent glebas, multò durissimas, quas citius vires, quàm liquefacies igni, nisi liquore addito.

Tonn. II.

Nostate Candum etiàmque vulgatum Saccharum abstergit, oculisque prodest. Sacchari Veterum vice Recentiores vtuntur (inquit Marth.) quod officinæ *Candidum* cognominant, quod pellucidum Salis fossitij modo, dentibusque fragile, competit, veluti Antiquorum, scabritiei lingue, pectorisque asperitatibus. Verùm ad hæc id præstantius est, quod in fictilibus, vbi violaceum Iulapium asseruatur æstate concreuit.

Saccharum Candum, arte præparatū quo vtimur pro Veterum Saccharo, ignotum fuit (puta ita Tabern.) Veteribus & Recentioribus Græcis Medicis, ac nullus eorum meminit præter Nicolaum Myrepsum, qui nominat *καθαρὸν*, alij legunt *καθῆρτον*, Lat. dicitur Saccharum Candum, Candium, Canditum, Crystallinum. Hieronimo Montuo *zaccharum* & *Saccharum lucidum*: Hermolao *Saccharum Cantium*, Germ. *Candiszucker* / *candi Eiszucker*, & *crystallinzucker*: duplex est, vnum pulchrum clarum lucidum instar crystalli, quod præparatur ex Maderiano aut canarino Saccharo: aliud rubrum, rufumve quod ex Thomassino Saccharo paratur.

Sacch. Violaceum.

Pro Veteri Saccharo & suratur.

Nomina

SACCHARVM CANDVM violaceum.

CAP. CCLII.

Purpureum violaceum æquè pellucidum, sed pulcherrimum, nec minus vile, folis Venetis, dum illic ageremus, notum, sic paratur. Sumto, exempli grætia, Sacchari finissimi lib. 6. liquefcat & bulliant quàm fieri potest paucissima aqua, donec ad tabellarum electuarij crassitatem deducatur. Tunc affusis vnciis 24. expressiois coactæ compendiosæ, & recens eductæ ex frigida & violis confusis: aut potius violacea stillaricia (ne vires colorve deleatur) recrudescat, seu (ut illi loquuntur) decoquatur, ut recedat ad Syrupi superioris simplicis Candi crassitiem. Festucis, olla, & eodem loco & modo paretur elegantissimum Violaceum. Dum Saccharo percocto miscetur Violarum dilutum, vel expressio purpurea, qualem diximus, addendo aliquot guttas succi Limonum, viuidiore colore & limpidiore diaphano placebit. Denique vtilissimum simul atque fragratius, curabimus parandum, additis drachmis duabus Iridis candidissimæ lacinia inuolutæ, quæ amica societate, solita est Violæ fragrantiam & gratiam, tum addere, tum excitare, nec parum sic Arteriacis commodi adferre. Sic decet nitidum Pharmacopœum parare, nec perpetuò, quasi missellus foret seruitor, Seraphico Vercelleni radiato Apollini auscultare, qui imperat vas condendum & obruendum sterquilinio, ut fermentando & putrefaciendo (fortè & ipse persuasus à Theophrastinis stercoreis Philosophis suas imbibat penitus fragrantias & vapores, stercoreosque adsiccat spiritus.

Blauwer Canditzucker (vocat ita Tabern.) *weyl canditzucker*. Saccharum Candum corruieum seu violaceum: paretur hoc modo: Accipe Sacch. finis. lib. 8. Aq. violac. mart. quantum ad dissolutionem necesse fuerit ut fiat Syr. coq. lenitur ad perfectionem, ut tabule fieri possint. Dein affunde succi violac. absque pediculis & cū aq. violar. destillata expressi lib. 3. Iterum coq. ad consistentiam idoneam. Effunde in vas vitratum terreum, ad præsens institutum cum bacillis paratum eo modo, quo iam dictum procedendo,

Præparatio

si verò pellucidum magis & coloratum violaceū parare libeat, Succo violarum adduntur aliquot guttæ succi Limonum aut Malorum Granatorum.

Vires

Saccharum hoc tussi medetur, sicut & thoracis atque pulmonum affectibus, à calore exortis.

SACCHARVM PENIDIUM.

CAP. CCLII.

Descriptio

FAcitium & Penidium est, quod ex Melisso fit, commune verò ex Thomæo, optimum verò ex Miscellaneo. Accipitur igitur Sacch. Miscellanei ad lb. iij. aut quinque, Aq. fortan. q. f. coq. leuiore flamma: parata autem habere oportet albumina ouorum quinque optimè prius agitata, de quibus penicillo quouis saccharum cadens aspergitur, permittiturque aliquamdiu coqui, donec sordes ouorum albumini adhaereant. His ita peractis Saccharum ab igne remouendū, à quo, vbi bullire cessauit, fæces cochleari tollendæ. Hinc iterum coquendum, rursusque albumine aspergendum, atque fæces demendæ, quod eousque reiterandum donec à spuma & omni impuritate liberum reddatur. Posthæc coletur, iterumque lento igne, attamen per gradus æquales, coquatur, vsque dum ampullas grossas producere incipiat, quibus apparentibus fusum aut bacillum teretem, & æqualem in aqua frigida madefactum ad vnciam profundè in calens Saccharum mittito, cūque, vnà quod ei adhæsit, cum Saccharo in frigida refrigerato. Quod tum demum perfectè coctum est si induratum faciliè detrahitur, nec masticatum dentibus agglutinatur: aut quādo eius portiuncula aliqua digitis extremis duobus distracta, in tenuissima quasi fila abit, quæ per pensa digito, tanquam vitrum distiliunt. Inde amotum ab igne, ampullisque sidentibus, super marmor, butyro, oleo amygdalarum, aut oliuarum inunctum effunditur, & manibus vel inunctis, vel amyli polline aspersis, ne adhæreat comprehensum, ex alto paulatim comprimendo, & fricando hinc inde demittitur aliquoties: tandem, vbi paulum refrigit, ferramento vnicopariet i infixo obuoluitur, idque tantisper, dū bene lentum & candidum efficiatur. Quò autem diutius trahitur, eò candidius redditur. Tandem attractum famulis distribuitur, vt distrahendo torquendoque formetur modo consueto. Formatum reponatur loco calido.

Nomin

Medici Græci Sacchari huius nom meminerūt. Nostis autem dicitur, *saccharum penidium*, *Zaccharum penidium*, & in plurali numero *Penidia*, *Penidia*, & *Penidia*. Andree Bellunenſi *Alfenid*, & Matthæo Syluatico *Alferud*. Germ. *Zuckerpenid* / *penid* / & *Penidzucker* / ac etiam *gerreherer Zucker*.

Vires

Mediocriter calefacit, emollit & humectat. In cibo & potu, aut alio quolibet modo vsurpatum, asperitati, tussi, & rauedini medetur, tumores emollit. Saccharum penidium puluerisatum & in cibis assumptum his conducit, qui ex diuturno morbo macie confecti sunt, vt etiam phthisis & hectica febre laborantibus, si vnc. iij. aut quinque Sacchari cum mensura vna lactis asinini rectenter mulsi sumant. Quibus pulmones laborant sine febre, iis continuò prodest Saccharum hoc cum lacte ebibitum. Paratur etiam ex hoc Eleuatium pro variolis malè affectis collo, arteria

aspera, & pulmonibus. *z. Sacch. penid.* in polinē redact. vnc. j. Mucilag. sem. coton. Gummi Arab. puluer. ana vnc. f. Misc. cum Syrup. lub. q. f. Subinde sumant ægri etiam infantes de hoc El. medium cochlear. *z. Saccharum penidium puluerisatum* cum butyro recent. f. El. pro iis qui ex Alumine, Vitriolo, aut aliis acerbis & erosius asumptis offenduntur. Saccharum penidium in lacte recēti dissolue, eoque in Angina ad tumores emolliendos loco gargarismi vtiot. Fit quoque aqua Sacchari penidi decocta, hoc modo. *z. Sacch. penid. vnc. v. Ap. font. l. viij.* Decoq. igne lento ad consumpt. medietatis: coletur, serueturque ad vsu. Inferuit autem ariditati arteriæ asperæ, rauedine emendat, sitim exinguit, tussim sedat promouet scretum, ventrem emollit, phthisicis vtilis.

Habetur tandem & Diapenidium sine speciebus calidis apud Nicolaum, quod *z. penidiorum* vnc. ij. drach. f. Pinearum Amygdal. dulce. Sem. Papaueris albi ana drach. iij. scrup. j. Cinnamomi, Caryophyllorum, Zingiberis, Succ. Glycyrrhizæ, Tragacanthæ, Gummi Arabici, Amyli, Sc. Cucurbitæ, Sem. Citrulli, sem. Cucumeris, Sem. Melonis ana drach. j. f. Caphuræ G. vij. Sacchari albi quantum sufficit. Fiar electuarium. Valet aduersus omnem thoracis noxam, tussim, vocis iacturam: tabidis denique & purulenta excreantibus succurrit.

SACCHARVM CANDVM ROSACEVM.

CAP. CCLIII.

EX Saccharo Maderiensī, aquā Rosarum destillata, & succo rosarum Zucharinarum expresso paratur, eadem omnino ratione, quā Saccharum Candum violaceum, pulchrè rubens & pellucidum, maxime quidem si nonnihil succi Limonum aut Mali Citrei Saccharo superaddatur. Sedat sitim, confortat ventriculum relaxatum, & hepar supercalefactum, & cor, resilit putredini, pestilentiæ & ventositati: Tabern.

SACCHARVM CANDVM

Cinnamominum.

CAP. CCLIV.

Eodem penitus modo fit [inquit Tabern.] quo Saccharum Candum, nisi quod aquæ communis loco, cinnamomea destillata recipiatur ad dissoluendum Saccharum, & præterea olci Cinnamomi parum immisceatur. In affectibus frigidis thoracis & ventriculi commendatur, ac cor roborat & ventriculum.

SACCHARVM ALHEISAR.

CAP. CCLV.

Zeccharum alhusar, vt videre est apud Auic. est Manna cadens super Alhusar, similibus grumis Salis: parum, autem abstergit, austerum est & amarum: confert pulmōi & aquæ intercui, Oculorum morbis, pariterque renum & vesicæ vitis auxiliatur. Assumptum vt gummi ab Arundine abstergit oculum. Sed Alhusar, quemadmodum apud Serapionem legimus: habet

habet folia lata, Saccharum verò prodit ex oculis ramorum iuxta folia, quod colligitur, amarumque est: Huic plantæ sunt Mala quædam, veluti testiculi Camclorum, è quibus liquor manat adurens, austeraque facultatis ad cauteria peridoneus: lignum eius est leue, crassum, rectum, pulchrumque, & ideo assimilauerunt Cantilenari, in cantilenis, brachia & crura dominarum ligno eius.



Manardus vt comprobaret Antiquorum Saccharum perinde ac Mannam ex rore fieri, Auitennam admittit, teste Matth. At nos qui huic opinioni minime adstipulamur dicimus Alhusar siue Alhasser (vt Belindensis castigauit) nullo pacto Arabica lingua, Arundinem significare, sed aliam Egypti & Arabiæ arborem. Quòd Alhasser apud Arabes sui generis arbor sit, & ab Arundine maxime differat, & quòd eius Saccharum, quamuis ab Auitenna Manna dicatur, quòd fortasse granulis concreuerat Manne similibus, ex rore haudquaquam sed gummiu modo ab arbore distillet, manifestè ostendit Serapio.

TYPHA PALVSTRIS MAIOR.

CAP. CCLVI.

Palustris Typha maior, altitudine procerum hominem æquat, vel etiam superat, caule sæpe singulari, est vbi pluribus, rectis, rigidis, reteribus, læuibus, longis geniculis articulatis: folia cubitos aliquot longa, vnciam lata, accipiti acie stringentem vulnerant, crassiuscula substantia spongiosa, longissima vagina caulem inuoluentia, sapore subdulci, quorum alia statim à radice oriuntur, alia è caulium geniculis: Cæterum caulibus fastigium tomento in cylindri formam rufescente in pappos tandem abeunte. obvoluitur, morionis clauam imitatus, mucrone palinari aut longiore præpiliatus. Radix obliquo actu serpit, nouo sobolis pullulari se propagans, ex albo rufescens extrinsecus, intus verò niuei candoris veluti ex funiculis multis compacta, à qua frequentes dependent fibræ concolores, saporemque fatuus est. Oculi verò ex radice primulum emergentes, subdulces, tenerique caules.

Diximus inter Frumentacea de Typha, cuius Theophrastus variis in locis meminit. Hic autem de Typha fermonem habemus, quam primum. Historiæ 8. ex palustribus & in stagnis nascentibus, enodera & planam esse scribit: quamque 4. hist. 2. in lacu Orchomenio nascentes collocat, sine folio, radice haud numerosa. Huius Typhæ & Diosc. recordatur, cui florum effigies turbinata, quasi typhonis sese gy-



rantis turbinè, aut gigantibus staturam minacè signaret, nomen disse videtur.

Hanc Typham & Plinius (Cornario nobis attestante.) C. tamen Bauhinus cum lib. 16. cap. 36. inter aquaticos Calamos de hac Plinium egisse scribit) & Galenus, & Paulus, & Aetius in Simplicis præterierunt: credo equidem de grecis, quòd multa alia haberent, quæ eum vsum præstarent, quem Dioscor. de Typhæ flore prodidit.

Nominà linguarum

Nota est hodie Typha per omnes ferè paludes & stagna occurrens, Germ. Bolben simpliciter vocant, id est, clauas, à similitudine videlicet ad ipsas, alii Mosfelben à natali loco appellant. Alii Rorichelben, ab ipsa formâ alii Warrenbolben, hoc est, clauam stulti, alii Liebschospen, Belg. Lieschdoden & donsen. Gall. Masse de vives & simpliciter Masses appellant, & apposité quidem, inquit Ruellius: Gallie rura Masses dicunt, quòd sceptrâ regum Massæ vulgò dictas, perpolitus caulis lanosa floccorum densitate summum fastigiatum emulatur. Hetruscis Matthiolo auctore Marza sorde dicitur, quòd eius lanugo, si in aures decidat, surditatem afferat: Hisp. Be.r.d, seu Inco Amac. rodaro: Angl. cattis rayle & recde male.

Tragus Typham aquaticam inscribit, ac Plinius lib. 16. cap. 36. inter aquaticos Calamos huius Typhæ mentionem fecisse suspicatur; cum hunc in modum scribit: Cæterò gracilitas nodis distincta: leui fastigio tenuatur in cacumina, crassiore paniculæ coma, neque hac superuacua. Aut enim pro pluma strata cauponarum replet: aut vbi limosiore callo induruit, sicut in Belgis, conrufa & interiecta nauium commissuris ferruminat textus, glutino tenacior, rimisque explendis fidelior pice. Ad hoc autem credendum induxerunt Tragum vietores Germani, qui doliorum commissuris fideliter & tenaciter coniungendis Typhæ folia adhibent, maxime eius quæ in caulem haud dum exiit, Vocant porro ea folia

Calamus aquaticus Plinio.



liesen & Knospen. Plantam ipsam sunt qui spatulam fetidam nominatam velint, sed qua recte ipsi viderint.

A Dodon. Gall. & Lar. Typha palustris titulo describitur & depingitur, ibidemque inter cetera hac de Typha leguntur: à Dioscoride *νῆαν* appellatur: Recentiores ad differentiā alterius Typha, quæ inter fruges est, palustrem & lacustrem cognominant: appellant etiam iudem *Cestrum marionis*, nec non Typham aquaticam. Theophrastus Typha meminit absque folio, quæ huic nostræ parum similitis. Plus certe similitudinis Typha nostra cum *οἰον* Theophrasti habet, eo videlicet, qui in lacubus nascitur. Ouidius hanc stirpem Scirpum nominare videtur; ex ea etenim flores scirpeas *mattas* nominat, ut Fallopius.

Cestrum marionis.

Phleum Theophrasti.

An Dodon. Gall. & Lar. Typha species.

At dominus discedite, ait, palustrisque morantes sustulit, in plantro scirpea matta fuit. Nunc quæ sit Dod. Gallici Papyri species *Roseau à faire nattes*, dubius hæreo: nisi forte intelligat Typham palustrem, prius quam caulem producat. Non tamen id feret sine errore, si ex vna stirpe duas faceret. De sua Papyri specie hæc scribit. Hæc Papyri species folia habet longiora rigida, & quasi triangularia, plena intus medulla spongiola. Radix est dura, crassa, alba, pluribus fibris donata, & aliquot juncturis lateralibus conspicua, à quibus oriuntur flores alij, & aliz plantæ. Quam radices desiccantur facile incenduntur & claram flammam reddunt. Gladioli hæc species crescit secundum torrentes, fluuios, accessus & recessus aquarum. Videtur ea Papyri species, quam Strabo *Cibulum* appellat, qui grandis est Gladiolus, habens folia satis larga, radice n. satis magnam, brachij vnius magnitudine; reperiturque in Aegypto ad Nilum, ex quo antehac fiebat charta scriptoria, qualiter hodie fieri solet ex linteis dilaceratis. Assimilatur temperamento & facultatibus Papyro, unde desiccatur sine acrimonia: præcipue cineres eius, qui profunt contra vlcera erodentia, præsertim oris, inspersi. Folia aperiunt fistulas & plagas angustas. Eadem sicca apta sunt ad mattas siue flores contextendas. Hanc Papyri speciem Dodon. in post. suis de plant. lib. II. non præterit, animaduertens fortè: Typha imperfecta primūque à terra erumpente illudum fuisse. Eadem pingitur ab H.L.p. 989. pro lunco aspero Dod.

Nec. Typha Diof. Adu. Typha a loco denotata.

Anguill. non admittit hanc pro Typha Dioscoridis: nullis autem rationibus suam stabilitatem pronuntiat.

Typham vocauit Gesn. de coll. stirp. à loco natali palustri qui Græcè *νῆαν* dicitur per iora, & sic Typham herbam etiam scribi existimauit, nisi forte differentiæ gratia à Typha, Tritici genere per y scriberetur.

Synonyma

Dicitur Typha siue palustris maior C. Bauh. Typha aquatica, Trag. Lugd. Typha, March. Fuch. Ama. Lac. Tur. Cord. in Diosc. Lon. Lob. Cast. Tab. Ger. Typha palustris, Ruell. Cæli. Aquatica Papyri species, Dod. gall. vluu, Ang. luncus asper Dodon. gall. Hist. Lugd.

Locus.

Typham obseruauit Monspelij, Geneuæ, & Montbelgardi in fossis, in Allatia in lacubus. Locis palustribus, inquit Dodon. in stagnantibus aquis, & juxta laxorum fluuiorum ripas exit. Iulio & Augusto paniculæ vigent, flosculorum spicula iam arida ac decidente. Restant subinde paniculæ ad alterius anni ætatem, atque tunc non raro pediculi in ipsa panicularum lanugine nati reperiuntur: quod admiratione haud caret. Cum

enim caulis tunc omnino sit aridus, & lanugo adeo sicca vt vento abripiatur, animalcula hæc, iuscemodi sub lanugine ista gigni ac viuere posse mirum est.

Typha [*νῆαν*] herbæ flos suillo adipe elato [Ruell. Græcè *νῆαν*] excepto ambultis medetur. Ex his Dioscoridis verbis colligit Tragus Typham moderatum quoddam temperamentum esse sortitam. Petrus Hispanus dicit quod radix herbæ Cesti cum foliis sæpe data in potu & emplastrata curat rupturam, Valefc. de Taranta. vsum foliorum supra exposuimus.

TYPHA PALVTRIS MEDIA.

CAP. CCLVII.

Peculiare hoc genus Typha, veluti medium, obseruabat Clusius, copiose nascens palustri quadam fossa apud Tyburn Sacellum; primo ab vrbe Londinensi miliari; erat foliis multò angustioribus quàm Typha vulgaris folia & graciliore claua, maiore tamen quàm minima illa à Pena Lobeliôque expressa. Aliôqui à maiore non differt pullo illo tomento in clauam compacto & florum oblonga spica, tenui flauo polline respersa, supra clauam enascente. Florebat Iunio.

Typha media, Clus. pann. & Hist. Typha 2. siue palustris claua gracili, Calp. Bauh. pin.

TYPHA MINOR.

CAP. CCLVIII.



Typha minor maior similis, & radice obliqua geniculatim incedente folia promit graminea, longa, angusta, & inter hæc caulem seculicubiti aut duorum cubitorum altitudine, inueniuntur, rigidum, enodum, cuius summus scapus geminas lustrinet tomenti fusci extrinsecus, intus albi, clauas cylindraceas

modica inter se distantes intercapidine, multò & breuiores & strigosiores quàm Typha maioris.

Typha minor Lob. Adu. & Ic. Plant. pag. 81. & Hist. Lugd. Typha minor, siue Typhula, Tab. Typha minima, Clus. pannon. Typha 3. siue palustris minor, C. Bauhin. pin.

In agro Geneuensi, quæ confluunt Rhodanus & Arue exit, vbi ego & Lob. collegimus.

SPARGANIVM QVIBVS DAM.

CAP. CCLIX.

Numerosis fibris capillaria radice nictur, folia tum à radice exorta, tum à caule, Typhinis similia, carinata, striata, acuta, elatiori dorso stringentis manum infesto vulnere scindentia, gustu nonnihil dulci: caulis cubitalis & altior, teres, tortuosus, inæquali ramorum diuicatione brachiatu: flores



tuberculis ramorum, nullo pediculo, adnascuntur, aspergillum iniicari, radiatis in orbem staminulis albidis apiculos fuscis sustentibus constantes, nullo relicto fructu seminæ caducis, alibi enim nascuntur, pilulæ echinatae Plutani, ex conulis singulis singulos acinos continentibus

glomerata.

Plantam hanc à Germanis Riedgras appellatam Tragus Sparganium à Dioscoridis esse iudicat. Eius figura nobis non placet: pulchriorem habet Matthioli. qui & ipse in priorib. comm. Sparganium Diosc. & Galeni constituerat in post. tamen comm. Ital. reuocat in dubium an sit Sparganium, aut iniquis, ut vult in Aduers. Lobelius, qui Commentatorem istum fuisse scribit tria illi intellectione licere, sic habentis, folia ad terram inclinata magis, vel procumbentia. Ceterum in Obs. p. 41. & Icon. p. 30. picturam habet sub titulo Sparganii & Butomi Theophrasti.

Cord. in Diosc. Sparganium vocat Germ. *degenfraus*, dicitque alibi Gladiolum à Veteribus etiam vocari.

Dodon. gall. Butomum inscribit: Lat. Platanariam seu Boutomum. Platanariam quidem à fructuum cum Platanis pilulis similitudine nuncupat. Non desunt qui Calamagrostin Dioscoridis esse velint, sed male.

Sparganii Diosc. apud Matthiolum bonam figuram esse testatur Anguillara: verum quantum ab eius descriptione ablit, vel solus pilularum situs ostendit, quæ non *ἐν τῷ ἀκρῷ τῆς κορυφῆς*, sive in summo caulis modò, sed & multò infra eius fastigium & alibi quoque exoriuntur. Plus similitudinis Platanaria cum *Corbula* habet, cuius Theophr. lib. 8. & 4. De stirp. Hist. sapius meminit, quòdque ait locis palustribus exire, foliis multis angularibus, Harundini ac Cyperi similibus: caule, qui æqualitatem peculiarem sortitus sit, & fractu nigro, Sidæ magnitudine proximo. Huius Butomi mentionem facit Democrit. Geoponic. Cassij Dioscoridi lib. 2. ubi ait folia ipsum habere Cyperi, grata boum pabulo: vnde nomen, Ruellio auctore, accepit. In Græco exemplari habetur: *φύλλα ὅμοια Cyperi*, sed pro *ἀντίστοιχα*, restituendum *ἀντιόμοια*.

Pro Sparganio hanc plantam admittere videtur quoque C. Bauh. qui in pin. hæc scribit: *Σπαργάνιον ἀπὸ τῆς ἀμαρυγίας, fasciis, quòd foliis eius latis & vitulum modo lentis pro fasciis nutrices videntur: cuius Diosc. lib. 4. meminit: ὁμοίον Theophr. 4. hist. 8. cui mas & femina, & hæc sterilis. Dicitur hæc stirps Sparganium 1. sive ramosum. Sparganium, Trag. Matth. Ang. Tur. Cord. in Diosc. Ges. cat. Lac. Cæf. Cast. Cam. Tab. (cui & Gladiolus palustris) Ger. Eyf. Butomus Theophr. Ang. Butomum, Ruell. Dod. gall. Ges. cat. Platanaria, Dod. Thal. Sparganium & Butomus Theophr. Lob. Carex, Lon. Phleus femina, Lugd. Calamagrostis secunda, Eidem.*

Locis palustribus, perennes aquas habentibus exit, ac iuxta rivulorum quorundamque fluuiorum margines. Pilulas Augusto mense profert.

SPARGANIVM ALTERVM.

CAP. CCLX.

Sparganium alterum, non tantum pediculis *Descriptio* Shærentes pilulas fert, sed & caulis alius earum rotam circumpositas transadigit, quibus mollities initium barbularum contrectabilior muricatis Sparganii primi echinis: à quibus & illud dispescit quòd in orbem acti flores glomerati, subsequentibus capitulis æquales, tremulas staminum luteorum fibras vibrant: eo, in summo scapo ordine ut verticillorum series appareat.



Sparganium alterum (sic etiam vocat Cæf. H. Lugd. & Tabern.) per Lobelium in Obs. p. 41. & Icon. p. 30. exhibitum, plus similitudinis habere quam superiorem, cum Sparganio credidit Dodonæus, qui Platanariam alteram inscribit. Casp. Bauh. in phyt. & pin. dicitur Sparganium non ram. sive: Sparganium latifolium Gerardi.

Florens, nueni mensis Iulij 11. in stagno inter St. Colinum & Bulgum Castellum Sanguine.

Locus & tempus.

SPARGANIVM MINIVM C. BAVH.

Sparganium III. sive minimum, ut author vocat in pin. ab eo in Prodr. sic descriptum reperitur: plantula est vnciarum quatuor, nam radícula ex fibellis oblongis componitur, vnde cauliculus vnciarum duarum effertur, & in capitulum exiguum subrotundum, cui aliud minus insidet, herbacei coloris & formæ, quemadmodum in Sparganio maiore, desinit: circa quem folia vtrinque quaterna, vel quina, angusta, cauliculum superant.

Plantulam hanc D. Furcrus anno 1617. transmisit, his ascriptis: Sparganium minimum & sc.

, Northrup, L. and J. H. C. Cæno-
m. pates iij. m. e. p. m. tatem exic-

maris est, rara, ex locustis albicantibus, aristis ob-
longis armatis, compolita.

Hæc in dumetis humidis circa montem Cren-
tacenſem prouenit: at in vdis Michelfeldenſi-
bus, aliùs exurgit.

ET RELIATA HUIUS LIBRI OBSERVETUR SERIES,

His quæ cum finem constituunt locus esse
debit p. 3. Gramen pratense panicu-
latum minus ang. flore folio

Casp. Eaub. si que post
caput 52.

GRAMEN PRATENSE MINVS.

CAR. CCLIX.

Oramen
Finnus,
Lob.
Locus.

Gramen hoc minus (vt vocat Lob. in Adj. & lc. p. 1.) quod montanus vel decliuus, incultus, exsiccus & aridior ager, vt pabulo gratus & vtilius velleri, sic multo dedicatius, & semine efficacius est.

Gramen
4 vel mi-
nus. Tab.
Descript.

Taberna, qui in hist. Gramen a. facit, & icon. Gramen minus vocat, sic describit. Medium est genus inter primum (Gramen repens Camerarii intelligo) & secundum (Gramen cum spica aliquatenus arundinacea) *radicibus* parvis, albis, multis fibris donatis: *culmis* nodosis, spithameis, aut paullo longioribus, quatuor aut quinque; *stipulis* longis, angustis, quorum mediū nervus percutitur; trique acuta, in acumen definentia: *bis* quasi ex festuicis componitur pluribus, *spicis* semper oppositis.

Est *Gramen pratense* 2. Dodon. lat. *Gramen pra-*
tense minus Gerardo: *Gramen pratense panicula-*
rum 5. siue medium, Casp. Bauhin. pin. latiore &
angustiore folio.

Paricla.

An fortè Gramen tenuifolium hirsutum?

GRAMEN AQUATICVM HARVNDINA-
ceum paniculatum, Tabern.

CAP. CCLX.

Descrip:

Radicem tranſuerſum agit fibroſam: calamos
 erallos, nodolos, Gramine arundinaceo
 maiores, æt ipſa Harundine paluſtri minores:
 ſeſta ſimilia harundinaceæ Gramini, ſed maiora
 & longiora: paniculum harundinaceum. Author
 in ſua hiſt. facit *Gramen aquaticum* 4. cognomi-
 nante quoque etiam in Ic. *Gramen aquaticum harundi-
 naceum paniculatum*. Gerat: *Gramen minus aque-
 ricum*. C.B. pin. *Gramen paniculatum aquaticum*.
 ſive *Gramen paniculatum altiffimum*.

Synonyma

Idem fuscipamus cum Gramine maiore aqua-
tico Lobellii. Nec ab hoc separandum putamus
Gramen harundinaceum paniculatum eiusdem
Tab. de quo infra.

GRAMEN PALVSTRE PANICVLATVM
minus, C. Bauhini.

CAP. CCLXI.

Synon.
Descriptio

Gramen paniculatum aquaticum. i. [vt au-
tor in pin. vocat,] siue, vt in prod. Gramen
16. ex radice crassa fibris albicantibus durioribus
donata, calamo rotundo, striato, cubitum supe-
rante exurgit, quoniam *folia* pallide virentia, lati-
cula, pedalia, subaspera inuestiunt: *panicula* pal-

GRAMEN PALVSTRE PANICVLA
speciosa, Casp. Bauhini.

CAP. CCLXII.

HOc Gramen palustre paniculâ speciosa ; quod in prod. 15. est, in pin. verò Gramen paniculatum aquaticum secundum, ad bicubitalē altitudinem exurgit, *calamo* satis crasso: *foliis* est paucis, pedibus, *lariu*culis, per marginem asperiu

culis, quorum aliqua *tubuli* instar, calamum mediâ ex parte ambiunt: *paniculâ* est iubata, sesquipedalim, ex elegantissimis, parvis & subrotundis laminellis composita.

In humidis circa Patauium author collegit: & in Hassiæ stagnis reperiri intellexit.

GAMEN HARVNDINACEVM PANI-
culatum, Tabern.

CAP. CCLXIII.

R Adicibus, nodosisque calamis Gramini harundinaceo maiori comparavit auctor: *folia* autem sunt latiora, maiora & longiora: panicula quoque multiplicior & latior.

Dicitur *Gramen* *arundinaceum paniculatum*, etiam Gerardo. *Gramen* maius aquaticum Lob. Icon. Plant. p. 4. Capf. Bauhin. pin. *Gramen paniculatum aquaticum* 4. siue *larifolium*: *Graminis arundinacei alia species* Thelio: *Lotii* nonnisi genus, Trago. Idem & nos esse concludimus cum *Gramine* maiori aquatico Lobelii.

In humidis & paludosis non raro occurrit.

GAMEN CARIOPHYLLATA FOLIIS
spica squamata.

CAP. CCLXIV.

C Bauhin. pin. dicitur Gramen spicatum praetense. h. iuc Caryophyllar. foliis spicisquamata: Graminis loliae octauai alia perpusilla species Thalii, cuius tota plantula palmare longitudinem non excedit, *radicibus* parvis, fibratis, nigricantibus, *foliis* oblongimiculis, striatis, recuruis ac imbricatis: *coliculis* tenui, in sua summitate breuem, squamatamque *spicam* continens.

Huius figuram Gramini nigro luteo iunxit
Lobelius in Ic. Plant. p. 10. sub titulo Graminis
spicati foliis Caryophyllatæ.

Nascitur locis aridioribus & apricis.

GRAMEN TYPHOIDES MOLLE.

САР. CCLXV.

Radice nritur exigua, fibrosa: *caulis* cubita-
lem & maiorem adipiscitur longitudinem,
hodifue distinguitur: *folia* sunt pauca, eadem-
que angusta & acuminata: *spica* longa glumis

ita dense stipata, vt caudam vulpinam præ se ferant.

Dicitur Tabern. descriptionis auctori, *gramen alopecurinum* 1. Lob. in ic. p. 8. *gramen alopecuroides*: Germ. *gramen alopecuroides minus*: Casp. Bauh. pin. *gramen cyphoides* 2. siue molle.

Dubitamus an sit *gramen Alopecuro* accedens, & Phalaridi spica longiuscula, folio lanuginoso.

Secus semitas passim occurrit.

GRAMEN ECHINATVM DALECHAMPII.

CAP. CCLXVI.

Radicibus multis nictitur, gracilibus, candicans, tubisq; cauliculis, ex vno cespite multis huc illuc diffusis: folio arundinaceo, minore: capitulis in summo caule oblongis, tactu sic asperis, vt echinati videantur: semine minutulo, glutinâ obvoluto. Sapor totius plantæ ex fatuo subdulcis. Nasitur ad ripas Arares.

An *gramen* cauda leporis aspera: C. Bauh. pin. *gramen alopecuroides sextum*, spica aspera: *gramen echinatum Dalechampi*, H. Lugd. p. 432.

GRAMEN TOMENTOSVM ALPINVM minus, C. Bauh.

CAP. CCLXVII.

Ex radice parua, inutili, *calamus* raro dodrantem superans, foliis duobus, tribusve vestitus exurgit, cuius summitati pappus insidet.

Gramen 28. in prod. *gramen tomentosum* 3. siue *alpinum* & minus, C. Bauh. in pin.

Prouenit in Heluetia, in D. Bernhardi monte minore ad lacum: in Rhætia Burserus collegit.

GRAMEN PALVSTRE IVNCEVM RACEMOSUM semine, C. Bauh.

CAP. CCLXVIII.

Foliis est paucis iuncis, culmo cubitali, ex cuius summitate, inter bina foliola, veluti racemus paruus propendit. Est *gramen* 35. in prod. In pin. autem *gramen iuncum* 7.

In aquis circa Francofurtum ad Oderam D. Fleischerus collegit, & anno 1605. auctori communicauit.

GRAMEN IVNCEVM AQUATICVM maius, Tabern.

CAP. CCLXIX.

Radicem habet incuruam, minimi digiti crassitudine, hinc inde in imo multis fibris repentem: iunci sunt tenues & angusti; tesquipedem alti, quatuor, aut quinque, longis, gramineis, ex nodis prodeuntibus, foliolis conspicui: flores nigro-lutei, iunci communis. In paludosis occurrit.

Auctori in hist. est *gramen iuncum secundum*: Eid. ic. *gramen iuncum aquaticum maius*, groß wasser, binzen gras, *gramen iuncum aquaticum*, Gerard. *gramen* 74. C. Bauh. phyt. siue *gramen iuncum* 5. & maius. Eid. pin. *gramen iuncum* 7. siue polykation.

Tam. II.

An fortè *iuncus foliaceus*.

GRAMEN IVNCEVM SYLVATICVM. Tabern.

CAP. CCLXX.

Radix magna, fibrosa: iunci siue culmi complures, pedales, nodis distincti, intus rarâ medullâ repleti, extrâ colore ex nigro viridantes: è nodis siue geniculis prodeunt exigua, ex nigro viridia, graminea foliola: iunci in summitatibus ceu in ramulos abeunt, producentes flosculos æruginosos, siue spadiceos.

Dicitur auctori in hist. *gramen iuncum* 1. Eid. ic. *gramen iuncum sylvaticum*, waldbinzen gras. C. Bauh. phyt. *gramen* 73. siue *iuncum* 4. Eid. pin. *gramen iuncum* 8. siue folio articulo: *gramen iuncum* 1. vel *sylvaticum nemorosum*, Tabern. *gramen iuncum sylvaticum*, Ger.

An *iuncus foliaceus* capsulis triangulari, & idem cum eiusdem *gramine* triangulari?

Nasitur in humidis, arenosis, vmbrosisque locis, ac in siluis secus vias, locis graminosis.

GRAMINIS LOLIACEI OCTAVI III. SPECIES, Thelio.

CAP. CCLXXI.

Minor (secundâ speciem) est, breuioribusque ac tenerioribus coliculis: foliis breuioribus ac strictioribus, spicis item paniculatis, spadiceis, breuioribus ac tenuioribus: Cûmque secunda species per totum caulem à radice vique in cacumen ex geniculis emittat suas paniculas: hæc cauliculo constat in inferioribus partibus enodis, in summitate tantum paucula genicula habente, ex quibus paniculae binæ, tres, vel quatuor ad summum prodeunt. Panicula autem postquam defloruerunt, decidunt, ac eas subsequuntur squamata capitula includentia semen nigrum, paruum, acuminato cuspidem præmunitum.

C. Bauhino pin. *gramen arundinaceum* 4. siue *panicula mollis spadicea minus*: *graminis loliacei octavi tertia species*, Thelio.

Gramen loliaceum octavi

GRAMEN ECHINATO CAPITVLO, C. Bauh.

CAP. CCLXXII.

Gramen echinatum 1. siue spica rotundâ c. Synon. Echinata, vel *gramen echinato capitulo*: *gramen echinatum tribuloides*, Columellæ, C. Bauh. in pin. nobis nondum visum.

Gramen echinatum

GRAMEN SPICA PLANA ECHINATA, C. Bauh.

CAP. CCLXXIII.

Planula palmaris est: radícula ex fibellis albis composita, ex qua foliola capillacea, pauca, vnciam longa, & festuca tenuissima, prodeunt: spicam habet vncialem, planam, quæ ex vtriculis minutissimis aristas acutas emittit: ex Hispania D. Albinus attulit *gramen* hoc spica plana echinata, siue *gramen* 49. in prod. *gramen echinatum* 2. in pin.

Z. 2.

GRAMEN LOLIACEVM MINVS,
spicâ simplici. Casp. Bauhini.

CAP. CCLXXIV.

Descriptio **E**X radice capillacea, *cauliculi* plures, rotundi, duri, duarum vnciarum, & etiam semipalmares, *foliis* paucis, angustis, & brevibus cincti, exurgunt, quibus spica duarum vnciarum, angusta, Lolio similis, infidet: in agris Monspelien-sibus frequens est hoc Gramen, quod in prod. est 6. in pin. verò Gramen loliaceum 4.

GRAMEN LOLIACEVM MINVS MVLTIP-
lici spica, C. Bauh.

CAP. CCLXXV.

Descriptio **H**oc maiori ex parte repit, & *caliculis* est multis, vnciarum quatuor, *foliis* paucis, & *spica* multiplici: cuius vtriusque *semen* paruum, oblongiusculum includitur. Et hoc, est in in prod. **Synonyma** Gramen 26. in pin Gramen loliaceum 5. Monspe-
lii prouenit.

GRAMEN LOLIACEVM SVPINVM
Lobelii, Casp. Bauh.

CAP. CCLXXVI.

Synon.



Deser.

Gramen lo-
liaceum 6.
siue supinum C.
Bauhini in pin.
à Lobelio in al-
tera Aduers.
parte, Gramen
phalaroides exi-
le supinum humi
sparsum Danicū
nominatur, &
sic describitur:
Gramen pusillū,
humile, humiq;
sparsum, innu-
meris duarum
triūm vnciarū
culmis, torulis
spicatis effusē
fastigiatis, exili-
bōsque apiculis
præditis: *Foliolū*

vncialis longitudinis & latiusculis, crassioribū-
que culmis pro plantulæ magnitudine. *Radix*
fusca, cirrosa: Tota albicat herba per sæni-
fecium.

Synon.

Videtur propè Cronenburgum arcem regiam
Selandiæ Danorum, è regione equi-
lis & horti Regii, sabuloso
solo ad latus maritimum
pone rusticos
lares.
* *
* *

GRAMEN MARITIMVM PANICVLA
loliaceâ, C. Bauh.

CAP. CCLXXVII.

EX radicibus capillaceis, *cauliculi* plures, rotū-
di, recurui, altitudine impares, palmo infe-
riores, geniculati, *foliis* paucis, angustis, oblongis
cincti, exurgunt, *paniculam* loliaceam, trium qua-
tuorue vnciarum, sed ramosam, sustinentes: lo-
cis maritimis circa Monspelium, vnde D. Saltz-
mannus attulit, hoc Gramen, quod in prod. 62.
est, in pin. Gramen loliaceum 7. siue maritimum
paniculâ loliacea.

FESTVCA IVNCEO FOLIO SPICA
geminâ, C. Bauh.

CAP. CCLXXXVIII.

Hæc, quæ est in prod. Gramen festucæ 6. *cul-*
mus est sesquicubitali, rotundo, geniculari,
& ramoso, cuius summitati *spica*, vix vnciam
longæ, molles, rufescentes, aristis oblongis ar-
mate, Ilchæmo Gramini villosa similes, insident
& semper duæ simul, vni oblongo pediculo in-
sidentes, iunguntur: *folia* habet iuncea, longa,
inor dinatè disposita.

FESTVCA SEXTA, THALII.

CAP. CCLXXXIX.

Passim in agris prouenit Harcynicis, *foliū* bre-
uioribus *cauliculis* tenuibus, itriatis, in cuius
summo racematim dependent, palmi longitudi-
ne, in tenuissimis & vix visu perceptilibus pedi-
culis, parui quidam membranacei & paleacei vo-
triculi, quorum exteriores membranulæ rubent,
quibus dehiscens candidulus *stas* emicat.
C. Bauhin. pin. Gramen festucæ 9. siue Festuca gra-
minæ aruensis minor.

FESTVCA PRATENSIS LANVGI-
nosa, Casp. Bauhin.

CAP. CCLXXX.

EX radice capillacea, rufescente, *folia* multa,
angusta, pedalia vnâ cum *culmis* tenuibus,
bipedalibus, loliaceis, molli & paucâ lanugine
[culmi potissimum] aspersis, exurgunt: *spica*
est oblonga, angusta, ex glumis oblongis, aristis
donatis composita, & quasi in *paniculam* paruum
expansa.

Basileæ passim in pratis Gramen hoc, quod
autor in prod. 68. constituit, in
pin. Gramen fe-
stucæ 10.
* *
* *

FESTUCA DVMETORVM, EIVSDEM.

CAP. CCLXXXI.

Gramini 69. (vt in prod. author vocat) vel (vt in pin.) Gramini festuca 11. siue dumetorum, ex radice capillacea, nigricante, *culmi* plures, geniculis distincti, paucissimi pilis aspersis, duorum, triumve cubitorum, *foliis* oblongis, angustis cincti, exurgunt, in quorum summo *spica* oblonga, locustis raris, oblongis, cauli proximis, & aristis armatis constans.

Iulio mense in dumetis circa Bitum haud duntaxat, verum etiam in vepribus, locis siccioribus, prouenit.

FESTUCA DVMETORVM FOLIIS ANGV,
stiliis, pilosis, C. Bauhini.

CAP. CCLXXXII.

Gramini huic 70. in prod. Gramini festuca 12. in pin. *radix* est albicans, ex durioribus fibris composita: ex qua *calami* aliquot tenues, vno alterove geniculo distincti, & penè nudi, exurgunt: *folia* sunt breuia, angustissima: læui, mollique lanugine hirsuta: calamorum summitatibus eluti panicula, ex *spicis* pluribus composita, quarum quælibet capillaceo pediculo insidet, multis glumis aristatis & candicantibus constans: prouenit in dumetis circa Cliben.

Descriptio

FINIS LIBRI DECIMIOCTAVI.





HISTORIAE

VNIVERSALIS

PLANTARVM

LIBER DECIMVS NONVS.

DE HERBIS BVLBOSIS ET HIS AFFINIBVS.



FRUMENTORVM quibus opes Cereris constant, affiniūque ipsis Graminum, ac his rursus affinium Tuncorum & Harundinum natura indicata propemodum est: ita connexu rebus, vt immensa herbaria natura silua, horreorum diuitia, palustrium, maritimorum, pratorūque, accipitum morsu perquirendi subtilitas simul diceretur. Succedant nunc Bulbosae plantae, caulium simplicitate, florumque figura à dictis haud ita alienae. Ac in hac quidem specie differentiāque varietate in immensum propemodum luxurians cernitur natura. Inuexit & hominum cura nouas, omnique priore auro nostro huic Orbi incognitas ac iniussu florum diuitias, Hyacinthos, Bulbocodia, Narcissos, Tulipanos, Coronas Imperiales, & eiusmodi tripudiantis naturae specimina. Non fuerat sanè hoc decus in maiorum nostrorum hortis. Crescit profectò cum historia ipsa admiratio naturae diuitiarum: quātoque copia maior dicenda restat, tanto magis mirari Dei Opt. Max. in creando potentiam, in largiendo & propagando benignitatem subit. Nec dubie superata hoc modo posset videri etiam rerum naturae ipsius munificentia, si humani operis esset inuentio. Nunc verò Dei ipsius Protoplastū fuisse eam apparet, ac certè diuinam, etiam cū homo artus mangonio eam variare nouit, nullo industria miraculo maiore, si verum fateri volumus: sique verum quod in Magia naturalis insolentibus illis commentationibus gloriantur. Offentemus ergo & hoc naturae munus, & singula, more nostro, graphice depingamus.

CAEPE SIVE CEPA RVBRA ET ALBA, ROTVNDAC LONGA.

CAP. I.



BVLBORVM, quantum vici-
piam est in naturae
dicatione, notissima
Capa est, cuius ra-
dix acetrima, oculo-
los mordicando
lachrymas elicit,
ex tunicarum in-
volucris contexta,
modò rubra [po-
tissimum tunicae
exterioris,] modò
alba, interdum or-
bicularis, aliàs bul-
bo longo, pendulis
ab imo fibris al-
bis. Folia pedalia,
fistulosa, parum a-
crimonia videntur
radici cedere, si re-
centia fuerint:

sustinens florum caput pugni magnitudine, semen an-
gulosum atrum.

Iam olim Theophrasti & Dioscor. auro, magnam
Caparum varietatem, è locis, colore, magnitudine,
acrimonia, teneritudine, variòque mangonio peti-
ta fuisse constat. Ita namque Theophrast. scriptum
reliquit. Ceparum [non quicquam, non quicquam vt Hist.
Lugd.] genera plura, vt quae à locis nomina acce-
père, Gardia, Gnidia, Samothraciae: item Setani-
ca, & Fissiles, & Aiscaloniae. Ex his Setanicae mi-
nimae, sed large, dulces: Fissiles verò & Aiscaloni-
tum cultu, tum naturā inter se differunt: fissilem ete-
nim hyme suā cum comā inertem relinquunt, Ve-
re externa folia detrahunt, & reliqua colunt: detra-
ctis his foliis, altero germinant, simulque inferius
finditur: vnde fissiles appellatae sunt. Quidam vel
omnibus detrahenda folia censent, vt vim suā imo
contineant, neque effulse seminecant. Aiscaloniarū
peculiaris quaedam natura notata est: etenim solae
fissiles, & quasi steriles ab radice consistunt, nec eā
parte crescere, ac proficere possunt: quamobrem
non eas deponunt: sed semine serunt: cū deinde
germinatum sit, transferunt. Perficiuntur adeò ce-
leriter, vt cum ceteris, aut etiam prius euelli pos-
sint. Plus temporis dimissa in terra, putrescunt.

Caput fla-
rum.
Semen.

Theophr.
A loco.
Setanica.
Aiscalonia.
Aculu
natura.
Fissile.

Aiscalonia.

caulis nudus, rectus, duorum, triūve cubitorum
altitudine circa medium in ventrem vtrinqe tur-
binatum turgescit, glomeratum in summo fastigio

HISTORIÆ PLANTARVM

caulem edunt, seménque tantummodo
tūm exinaniuntur atque inarescunt.
Harum igitur talis natura est. Nunc explicatā A-
fcaloniaum naturā, alias Ceparum differentias
Theophrastus sequitur. *caulem edunt, seménque tantummodo*
exinaniuntur atque inarescunt. (Sic legit Gaza, non *exinaniuntur*, ut ha-
bent vulgata exemplaria. Plinius legit, *ex inaniuntur*) *ut*
exinaniuntur atque inarescunt. Differunt & colore non-
nullæ: etenim apud Ilium cæteræ quidem candi-
dis similes constant, sed colore candidæ admo-
dum proueniunt, Sardoniasque similiter ferè af-
ficiant. Cretensium peculiaris maximè natura
notatur, sed Afcaloniis quodammodo proxima,
ni forè vel eadem dici debeat: est enim in Creta
genus quoddam, quod semine quidem satum in
radice crassatur, depositum verò in caulem se-
ménque totum funditur: sine capite, saporque
dulce est: id enim quasi è contrariis habet:
perit: omnes namque depositæ melius, celeriusque
perficiuntur. Omnes post ærcturum pronuntiant,
tepido adhuc solo, ut depositas imbres occupent.
Seruntur & toto capite & circumciso, sed ger-
minationes haud similes fieri soleat: parte namque
inferiore Cepa nascuntur, superiore herba tan-
tūm erumpit: sectæ in rectum germinare omni-
nō nequeunt. Gethyum dictum sine capite est, &
quasi longi ceruicæ consistens, ob id germinatio
rota in fronde: sapiusque recidunt, ut Porrum,
qua de causa semine scribit id nec deponitur. Ce-
pas hinc ferè differentias discernere licet.

Ex his plurima mutuatus est Plinius, de iis sic
scribens: Cæpe genera apud Græcos Sardia, (Sar-
di Ch. Samothracia, Alidenæ, Setania, Schista,
Afcalonia ab oppido Iudææ nominata. Omnibus
etiam odor lachrymosus, & præcipuè Cypriis,
maximè Gnidii. Omnibus corpus totum pingue-
tudinis earum cartilagine. E cunctis Setania
minima, excepta Tusculana, sed dulcis. Schi-
sta autem & Afcalonia condiuntur. Schistam
hieme cum coma sua relinquunt, vere folia de-
trahunt, & alia subnascentur iisdem diuisuris: vn-
de & nomen. Hoc exemplo reliquis quoque ge-
neribus detrahi jubet, ut in capita crescant po-
tius, quàm in semina. Afcaloniæ propria
natura. Etenim velut steriles sunt ab radice, &
ob id semine feri illas, non deponi, iussere Græci.
Præterea scribit circa ver, cum germinant,
[germinant, CH. germinauerint. TH.] trans-
ferri ita crassescere, & tunc propter ætatem
temporis pensitatione. Festinandum autem in
his est, quoniam maturæ celeriter putrescunt.
Si deponantur, [caulem mittunt, CH. neque le-
gitur, & in M.] & caulem emittunt & [semen-
tant vel.] semine ipsæ evanescent. Est colo-
rum differentia [amillo CH.] Samo enim & Sar-
dibus candidissimæ proueniunt. Sunt in honore
& Creticæ, de quibus dubitant, an eadem sint,
quæ Afcaloniæ: quoniam [satæ radices agunt,
CH.] satis capita crassescunt: depositis, [caulis
& semine] caules & semina. Distant sapore tantum
dulci. Apud nos duo prima genera. Vnum con-
dimentariæ, quàm illi Gethyon, nostri Pallaca-
nam vocant. Scribitur mensibus, Martio, Aprili,
Maio. Alterum capitata, quæ ab æquinoctio
Autumni, vel à Fauonio. Genera eius austerita-
tis ordine, Africana, Gallica, [Tusculana, Af-
calonia, Amitem. CH.] Tusculana, Amitem-
nina. Optima autem, quæ rotundissima. Item ru-
sa acrior, quàm candida: sicca, quàm viridis: &
cruda, quàm cocta: sicca, quàm condita. Serit
Amitemnina frigidis & humidis locis, & sola Al-
li modo capite, reliquæ semine. Proximæque æ-

state nullum semen emittunt, sed caput tantum,
quod inarescit (increfcit, ut mox, cum increuit,
&c. Dal.) Sequenti autem anno permutata ratio-
ne semen gignitur, caput ipsum corrumpitur. Er-
go omnibus annis separatim semen Cæpe causa
scribitur, separatim cæpe feminis. Seruantur autem
optimè in paleis. Gethyum penè sine capite est:
ceruicis tantum longæ, & idè totum in fronde:
sapiusque refecatur, ut Porrum. Idè & illud se-
runt, non deponunt. Cæterò Cepas res folio solo
feri iubens, extirpatis radicibus herbarum in iu-
gera denas libras. Intermisceri Satireiam, quo-
niam melius proueniat. Runcari præterea & fati-
riri, si non sapius, quater. Afcaloniam mense Fe-
bruuario serunt nostri. Semen Ceparum nigresce-
re incipiens, antequam marcescat (inarescant,
CH.) metunt.

Quales verò differentias Dioscorides agnoue-
rit, ex in frà de viribus dicendis mox patebit.

Cæterum Plutarchus lib. de Isid. & Osir. scri-
bit Capam Ægyptios Pelusiotas auerfari, quod
lachrymas eliciendo, Festos dies celebrantibus,
molesta sit, & excitata siti incommoda iis, qui re-
ligionis causa potu ciboque abstinent. Præterea
quia Luna decrefcente vigeat & augefcatur, singu-
lisque diebus flores promat, minutà verò depo-
nat, & ad eiusdem vices redeat. Bias à rege A-
lyatte accersitus, regià fortunà spretâ, illum iussit
seruare in Isidis, totis viribus, Rhod. c. 4. Lucil. lib. 3.
Sat.

Elephile Cæpe simul, lachrymosaque ordine cælle
Sic enim Festus vocat interiores Ceparum tuni-
cas. Aui & Atauis, inquit Varro, nostri cum Allium
& Cæpe verba eorum olerent, tamen optimè ani-
mati erant. Tunicatum Cæpe Persius elegan-
ter vocat Satyr. 4.

--- tunicatum cum sale mordens Cæpe
Lucil. lib. 6.

--- lippus edendis
Acrobis astidus fuit Cæpis lacrimosus.

In Priapeis
Acresque Cepas, Alliumque fibracum.

Existimat Tragus Cepas Afcalonias Theo-
phrastus esse Cepas nostras magnas, Filifiles autem
& steriles, paruas illas esse, quæ plantentur & se-
men non proferant, coquisque in multo vsu sint.
Gethyum tandem esse Cepas longas, mulieribus
germanis didas *tiarr*, quia magis in herbarum
quàm bulbum excrefcant. Sed mirum cur Tra-
gus statim sequenti capite aliam tradat cepam
sterilem siue fililem.

Cordus vnam deditur speciem nomine cæpe-
ouatæ, Cromnios ab Arist. dictam, quod oculo-
rum tunicam pupillæque mordaci vapore lani-
cinando, connuere contrahique cogat, lacrymas
eliciendo: vnde Latinis Cepa lachrymosa. Cepæ
verò à capitis magnitudine.

A Celsalp. cepa colore rubro, aut candido, figu-
ra aliis testili, quæ oblonga describitur.

Matthiol. in Dioscor. cepam pingit, & aliquot
species recenset.

Sunt & cepollæ ab Antiquis appellatæ; Cæpis
quidem maiores, quas vulgus nostrum (inquit
Carol. Steph.) appellat *des cignonniers*: Quæ pau-
lò sunt maiores ferè sine capite, ceruicis tantum
longæ, & à Græcis tantum Gethy nomen acce-
perunt, puto à nostris appellatæ *des Ciboules*:
Marfca simplex quæ ab Hiermolao describitur,
vniò, à rusticis appellata, eam puto quam nostri
appellauerunt *originon*. Cepa olim, inquit Turne-
rus, Latinis dicebatur *vnio*, quod vnica planta
ex vnica nascatur radice.

Dodon. Gall. & Lat. in fol. Figuram habet Lobellii & sub titulo *Ceparotunda* describit.

Aduerf. Lob. & Penz tradunt aliquot species *Cepa*.

Nos vnicam tantum proponimus iconem ex nostris emptitis, quæ exprimit tantum *Cepam* rotundam, eamque semenem seménque proferentem maturam.

Sapius observauimus magnas, latas & sessiles: rubras, vt vocant, ac etiam albas: Ex cultura autem & soli ratione exitimamus potissimum pedere, quod quedam *Cepæ* mancant parue & rotundiores, quæ frequentiores sunt, potissimum rubræ, alba etiam *Cepæ* solent esse ratiore, quibus adhuc infrequentiores sunt longe alba in Almatia à nobis visæ: per longas siue sublongas *Cepas* non intelligimus eas, quas Tragus longas vocat *Cepas*, & Theophrasti Gethyum, nepe quas mulieres Germ. vocant *Warr*, id est stultas, quia magis in herbam quam bulbum excrecant, est enim pulchrum genus particulare oblongarum.

Cepa & *Cepe* in neutro genere Latinis & officinis, Græcis *κεφαλή* dicitur, quod nōn parum teste Athenæo, quod odoris grauitate nictare nos faciat. Al. *Zwibel* & *Zibel*, nonnullique Böllen dicuntur, & *Zippelen*. B. *Yuin*. G. *Yignm*, *siboula* Fuchf. It. *Cippolla*. Hisp. *Cebolla*, *Ceba* & *Cebola*. Arab. *Basil* & *Bassal*. Angl. *O-nyon*. Boh. *Cybul*. Hung. *Hagyma*.

Cepas obseruauit Patauii in hortis magnas, Watvillæ albas longas, vt & alias latas magnas rubras, quas & Montbelgardi ex Nemauiano semine habui. Caterum vbique in Italia, Gallia, Germania, Anglia, Vascōnia prouenit, maxime hortorum cultoribus. Terram autem desiderat solutam, pinguem, vehementer subactā, irriguam, stercoreatam. Scitur Martio aut Aprilis in Italia, verum etiam Ianuario, ac Februario, Palladio autem, vel etiam Nouembri, vt per vniuersam Tusciam, teste Crescentio, & sit super ipsarum seminarium velut perularium, de aliquibus straminibus cooperitur.

Sola quidem in areis subinde feminatur, quandoque verò cum aliis herbis, veluti Lactuca. Palladius cum Satureia feri probat, quoniā melius vt Plin. ait proueniat. Plantatur. a. in areis per vnū semellem, vel Spirituam ab iniunctis separatam, & in area quatuor acies poni debent. Quas verò vis ante maturitatem comedere, plantabis in areis vbi sunt cucurbitæ, cucumeres, citrulli vel melones. Et cum hæ creuerint sæpe colliguntur, vbi etiam si dimittantur, ad maturitatem proueniunt, licet non sint ita grossæ, sicut hæ, quæ in areis solæ plantantur.

Cum plantari debent rescinduntur radices vsque ad grossitudinem vnus, vel mediū digiti iuxta *Cepam*, & per vnū digitum tantum sub terra merguntur. Hæc enim planta facili adeo comprehendit, vt si solummodo ponatur, vel cadat super terram, vel ad partes longinquas portetur, etiam discooperta, in terra quali arida, dum tamen optimè puluerizata, plantetur, summa facilitate nascatur & augetur. Sæpe circumfodi desiderant, & ab herbis quibuslibet liberari, quod si terra eodem anno stercoreata non fuerit, debet plantationis tempore stercoreari, vt optimè conualescat. Collectis autem *Cepis* maturis, quod patet cum se sustinere non possunt & amplius non augentur: meliores earum plantantur mense Augusto, vt anno sequenti semen faciant: deteriores verò plantantur vt in quadagesima viri-

des habeantur, mediores verò seruantur, quæ si in augmento Lunæ euulsi fuerint claro vel sicco tempore existente, melius seruantur in loco obscuro & sicco.

Floret Iulio potissimum mense, deinceps semen profert, quod non ante legendum, quam cum nigrum colorem præ se fert. Is enim color maturitatis est index. Earum semina durant per annum tantum. Sed in matris suspensa per triennium seruantur illæsa. Bulbi verò Verè plantandi sunt, à quibus semen separatur, quod Augusto mense ad perfectionem venit. Nouellæ autem *Cepæ* exactis mensibus colligi ac reponi postulant. Quod si diutius *Cepam* inueterari (inueterare CH.) libeat, aqua salta tepida capita intingenda (vnguenda CH.) sunt. Ita diuturniora fiunt, melioraque vsui, sed in statu sterilia. Alii contenti sunt (fumo. Ver.) primò super prunas suspensisse, abundèque ita profici arbitrantur ne germinet. Quod facere *Cepam* extra terram quoque certum est, & cauliculo acto euanescente. His aduersantur Nuces leniuntque earum saporem.

Cepæ (τ κεφαλή) caput purgatum, ex qua tritum in lineum ligatū, autore Hipp. subdito, si vterus pituita laboret. Quo in loco *κεφαλή* rectè legit Cornarius vt vult Forfius *κεφαλή* vitiosè Aldina exemplaria: Caluū istud omisit: Valicana impressio, τ κεφαλή habet vitiosè quoque. Nobis autem placet legi *κεφαλή* licet præcedentibus lineis bis Cyclamini meminerit. Pergit Hipp. m. m. Ad pueri aluum soluendum, si aduictior fuerit, *Ceparum* interiores partes ex melle tritas indito. Ad quem locum pro τ κεφαλή, τ κεφαλή cum Corn legit: facilius idem apud Tragum *Cepam* oculis prodesse cōtra omnes Medicos. *Cepa* longa acrior est Dioscoridi quàm rotunda: item staua quàm candida, & sicca quàm viridis, & cruda quàm cocta, aut sale condita. Omnes tamen mordent, flatus gignūt, appetentiam inuitant, sitim mouent, ac extenuant, fastidium pariunt & expurgant, aluo vitiles sunt: ex detractis purgamentis in oleum coniecta, hæmorrhoidas reliquosque excretionum exitus referant, subdita pto balanis. Succus cum melle illitus, oculorum heberudinibus, argemis, nubeculis & incipientibus suffusionibus auxiliatur, angina eodè perunguntur, suppressos menses pellit, caput purgat naribus infusus: canis moribus cum aceto, ruta, & melle illinitur: cum aceto autem perunctas in sole vitilignes sanat, & cum pari spodio, scabras lippitudines sedat: varos cum sale reprimat: contra calceamentorum, attritus cum gallinaceo adipe vitilis est: citæ aluo prodest in auribus sonitum ac grauitatem emendat: ad purulentas aures & eliciendam earundem aquam valer: alopecias earum succo perficiantur, qui celerius quàm halcyonium pilos euocat: largiore cibo *Cepa* capitis dolores ciet, coctaque vehementius urinam pellit: eos lethargicos efficit, qui valetudinibus aduersis, eā etiam cocta, plus aquo vescantur: elixa & cum vuis passis & Ficu illita, tubercula concoquit, & celeritè rumpit. Galenus ex quarto censet esse ordine exaltacientium, est essentia eius potius crassarum sit partium: vnde etiam hæmorrhoidas aperit, tum apposita, tum cum aceto inuncta, alphas abstergit, tum alopecias attrita pilos alcyonio citius restituit. Porro si succum eius exprimas, quod reliquum est, admodum terree substantiæ est, eiusque calidæ: at succus aqueæ acréæque caliditatis. Hic igitur iis qui susti-

Semina quando geruntur. Ontario. Affertur.

Vires & Vitis. Viterum. Hippoc. illustratur.

Adaluum soluendum. Hippoc. not. Vires & Diof.

Hæmorrhoida. Oculorum morbis. Angina. Menses. Canis morbis. Vitilignes. Lippitudo. Calceamentorum attritus.

Aurium dolor. Alopecia. Ceparum nota.

Temperat. Galeu. Hæmorrhoida. Alpi. Alopecia.

fusi sunt, aut aciem oculorum obtusum præ crassitudine humorum obtinent, nuncius prodest: atque ex huius temperatura tota Cæpa statuosa est manducata.

Vlcera oris.

Canis morfus.

Epiphora Vlcera genitalium, Oculi.

Aqua.

Dolor dentium.

Plaga, Dysenteria, Lumborum dolor.

Hydrops Angina.

Cancer.

Diosc. explicat.

De insectis.

De aëre.

Olfactu ipso (inquit Plinius) & delachrymatione, caligini medentur, magis verò succi inunctione: somnum etiam facere traduntur, & vlcera oris sanare, commanducata cum pane. Et canis morfus virides ex aceto illitæ, aut sicca cum melle & vino, ita vt post diem tertium solvantur. Sic & attrita sanant. Ita verus Codex, sed vulgati, trix falsò pro attrita habent. Coctam in cinere & epiphoris multi imposuere cum farina hordeacea, & genitalium vlcerebus. Succo & cicatrice osuorum, & albugines & argema inungere: & serpentinum morfus, & omnia huleera (vulnera ch.) cum melle. Item auricularum cum lacte mulierum: & in iisdem sonitum ac gravitatem emendantes, cum adipe asinerino, aut cum melle stillare (intillare Dal.) & ex aqua bibendum dedere repente obmutescitibus. In dolore quoque ad dentes collucendos instillare, & plagis bestiarum omnium, præsertim scorpionum Alopecias fricere & ploras tuls capis. Coctas dysentericis vescendas dedere & contra lumborum dolores, purgamenta quoque earum cremata in cinerem illinentes ex aceto serpentinum moribus, ipsasque multiplex ex aceto. Reliqua inter medicos mira diuersitas. Proximi inutilia (inutiles Ver.) esse præcordiis & concretionibus, inflationemque & sitim facere dixerunt. Atlepiadis schola, ad colorem quoque validum (viuidum, Ver. pallidum Aliud.) profici hoc cibo. Et si ieiuni quotidie edant, firmitatem valetudinis custodiri, stomacho virilia esse, spiritus agitatione, ventrem molire, hemorrhoidas pellere subditas pro balanis: succum cum succo fœniculi contra incipientes hydropiles mirè proficere. Item contra anginas, cum Ruta & melle. Excitari eisdem lithargicos. Varro, quæ sale, & aceto pista est arefactaque vermiculis non infestari, autor est.

Cæterum, ab omnibus in cibo abstinendum, maxime si cui biliosior sit natura: quum solis his qui pituitosum, aut crudum, & crassum ac viscosum humorem collegerunt, cuiusmodi edulia conueniunt. Porro quod Diosc. dixit, *ex ipsa opifera delectantur*, id est, Cepas appetentiam cibi excitare: & mox eadem *amara* esse, id est nauscam parere: ita intelligendum est, vt prius de moderato, postorius de nimio ipsarum vñ accipiamus. Sunt autem duplices *amara*, alteri nauscabundi, alteri anxij, & nullam decubitus formam facile ferentes, admodum perniciosè affecti.

Cæpa (inquit Porta) purpureo flore esu atrabilem auget, albiflora pituitam medicamentum purgat, umbellifera ad capillos facit testes, ostendunt ad Venetem valere, caule est cauo, ad tracheam, & fluxus: sobolescit ad fecunditatem: tumida est, ad tumores: alba dulcis, rubra acris, calida, & humida. Sed hæc qui voluit expeririatur.

Qui operas exercent, manè cepam crudam cum sale & pane theriacæ loco esitare solent aduersus aërem infectum, persuadentes sibi, eo dituros à pestifera huc fore, qui hoc remedio vñ fuerint, nec illos spes fallit, siquidem experientia constat aduersus intemperiem aëris vt nihil vulgaris, ita neque efficacius quicquam hac theriacæ reperi: ar qui laboribus ac ciuili nodi cibo minus assueti fuerint, nihil illo iuuantur, sed la-

duntur potius, vt qui infaniam, dolores capitis, caliginem oculorum, mentis alienationem, asturbationem, nec non lethargicum morbum gignat. Cæpæ continuò vsurpatæ in cibo alium emolliunt, vrinam cient, pelluntque. Anicula nostræ crudam cepam conscindunt, ac in aquam fontanam iniiciunt, perque noctem in ea macerant, postea eam aquam pueris & infantibus potandam exhibent ad eiciendos ventris lumbricos, sanè haud infelici successu. Continuo cæpæ vñ genitale semen augetur, ad eam verò rem vel maxime semen facit. Cæpa magna excavata, theriaca deinde repleta & recta, ac postea in calidissimo cinere assata, demum detractis exterioribus tunicis fusa, ac cataplasmaris ritu imposita, pestes ac venenosa vlcera reliquaque collectiones malas & duritias efficacissimè emollit ac aperit. Cæpa vt vult Holerius coquit, trahit, discutit, aperit. Querit Langius, propter quod adustiones calido sedantur & subsistant & calidum impediatur vesicæ effluere? Anne imbecille à robustiori corrumpitur & marcescit? Et verum id esse comperi, inquit Langius cum loco adusto philuræ cæpæ sub cineribus coctæ tepidæ applicantur, aut succus cæpæ expressus linteolis expressus adhibetur, impediri ne vesicæ effluere possint. Ambrosius Paræus ad ambusta, modò ne epidermide pars sit spoliata vel vlcerata, mirè commendat cæpas crudas cortice liberatas, & cum momento salis subito applicatas, empyreum enim extrahere, vesiculas prohibere. Hoc remedij genus contra calumnias fusè tum rationibus, tum experientiâ defendit lib. 12. c. 18. suæ Chirurgiæ, id quod etiam confirmat Fernelius methodi lib. 6. cap. 26. scribens: cæpas cum sale contusas parti impositas ambusta miraculo sanare. Scribit præterea Paræus se vidisse nobilem excipientem supra manus liquefcentem inflammatum lardum illitis prius manibus caparum succo.

Io. de monte in exper. Sume, inquit, cæpas quinque vel sex, conscinde optime, coque in sartagine cum butyro addito sale, cum voles te in lectum componere, comede omnes calidas, manè eundem cibum assume, id fac per quatuor dies & noctes, in hydrope mira videbis.

Verum ad calculum remedium à Domino Caertischin duce militari in Iula, communicatum Domino Lazaro à Schuendi: Ollam nouam accipe, reple capis rubris concisis, affunde aquam, coque: super ollam sedens calidum vaporem recipe per horam manè & vespere.

Marantha meminit nonnullos, Dioscoridem sæpius reprehendentes, quod cepam scripserit capitis dolorem inducere, quia hanc, quandoque comederint, & tamen caput non doluerit. Sed sciunt Dioscoridem velle cepam hunc effectum edere, largius & frequentius cibo vsurpatam. Ad Alopeciam post foras inunctiones præscribit Fernelius vt manè & vespere caput confricetur capis contusis, dum prorsus rubescat, & mox melle oblinatur vice cataplasmaris.

Ad vermes puerorum trium annorum exhibet M. Rolandus in potu decoctionem caparum. Item alibi pueri 8. annorum laboranti vermium, ventris tumore & dolore, febre & ictero.

Felice Platero scribente, tempore pestis ad præcautionem caparum succus variis modis exhibetur. Calor ignis in aspectum producit literas scriptas succo cæpæ prius delitescentes.

Ad tollendos factores anhelitus, proueniens à cibis quibusdā Thomas Morus cæpas commendat:

scilicet


*Sedile ne terras Porrum tibi spiret odores,
Protinus à Porro fac mihi Cēpe opres.*

An porro Cēpæ status excitent, & an in febrī pe-
sillentiali laudentur in cibis ad præseruationem,
legantur lo. Matthæi verba posita capite de Al-
lio.

Sed hīc quæri solet, cur Cēpæ lachrymas cē-
cant? Respondet Cardanus de varietate rerum,
non ob actimoniā, quia nec Allium, nec Piper,
cūm sint ætiora. Oleum illitum cit lachrymas,
non nisi quia lentum sit, at Cēpa quia ægris, oculo-
los ferit: quia lenta, humorem educit. Quid i-
gitur lentor facit (nam hoc de Cēpis à Rhodigi-
no scribitur) vt lachrymas cieat? Quia oculus
multos habet spiritus, vnde ex eo multa perpe-
tuo fit resolutio, quæ cūm impeditur, aut nimis
propere prouenit, aut cogitur, lachryma prodit:
impeditur à lentis, cogitur à frigore, propere exit
vel ob gaudium, vel ob dolorem, vel ob æstum
cerebri: atque his omnibus causis oculi lachry-
mantur.

Cēpas tandem comedere inter dormiendum,
si Artemidorus credimus, non est bonum, mani-
bus verò has gestare non est malum. Ipsis tan-
tūm ægris significant hæc radices duplicia: Si
quis enim ægrotus somniet, se multūm Cēparū
absumere, grauitérque decumbere, is saluus eua-
dit, à suoque morbo liberatur. Sin autem parū
edat, mortem ipsi affore præfigit. Qui enim mo-
riuntur parūm plorant. Mœsti verò non ita con-
festim doloris sui obliuiscuntur, ideoque ipsis se-
pius flere contingit, longioréque tempore. Hu-
ius autem rei ratio naturalis cūm nulla sit, eius
dignitatem inter Græculas vanitates merito re-
ponimus.

CEPA ASCALONICA, SIVE FISSILIS.



Plures si-
mul coniū-
ctos bulbos,
Porraceis me-
diocribus sup-
pares, oblon-
gos, fibrosos
habet, sapore
Cēpæ vulgaris:
filia exeunt fi-
stulosa, teretia,
glabra, eodem
sapore prædita.

Hanc Tra-
gus pingit &
describit, ni fal-
lor, dicens: Cē-
pa in Alsatia,
leuchel & Es-
leuchen appel-
lata est ea, quæ
Apicio Cēpilla

uocata fuit, Theophrast. verò sterilis vel fissilis.
Gesner. horti. Cēpa fissilis, fissilis vel Ascalonia
quorundam.

Escalotas autem Gallicas, Antiquorum Asca-
lonitides siue Palestinas Cēpas arbitrantur Ad-
uers. quas Francigenæ Apperitz vocitant. Bul-
bus forè est Serapius, quem Theophrast. & Pli-
nius Cēpæ genus quoddam testantur. Lob. Obs.
scribit Cēpam Ascalonitidem vocari Angl. Sca-
lyon. Icon. pl. Ascalonitides Antiquorum. Prom-
ptum est colligere ex Theoph. Turnero, quam il-
le vocat Cēpam fissilem, & Græci Crommyon

ischiton, eam esse quam Angli vocant Holste /
Germ. Sere aut Siere / in Frisia Suerley, quod
idem ex Plinio confirmari potest lib. 19. cap. 6.
Nam Cēpæ eis Holstefæ appellatæ eius sunt na-
tutæ, vt si vna seorsim pangatur, breui ex eadem
radice multæ propagentur, sine sato: sique ex
racemasim coherenribus (ad 12.) radicibus vnâ
Autumno detractant depangas solam, ea sequen-
ti anno duodecim tibi pariet, si latum sit solum.
Quare cūm planta hæc hyemem in terra perfe-
rat, satius esset Angl. winter onyon cepam hy-
bernā quam Holste nominare. Distinguit etiā
manifestè Plinius Ascaloniam & Fissilem. Ex cu-
ius verbis colligimus, vnum ceperam genus ra-
dice fecundum esse: sed cūm nec cepa vulgaris,
nec Ascalonia, radicibus propagetur, neque alia
vlla species, præter Holste, sequitur hanc esse
ceparam fissilem.

Cēpam fissilem siue Ascalonicam transtuli in
Hortum E. C. collectam Bedfordiæ in horto N.
viri piæ memoriæ Ioh. Vldarici à Stadione, & ex
Tremoyne, ex horto N. viri Michaëlis à Franck-
mont, quos audiui vocātes S. Jacobi Zimblin.
Lugduni & Geneuæ habui cēpas quas quidem
vocant ch. l. tes, multæ simul iunguntur paruas
longæ, folia fistulosa vt in cēpis capitatis. Cēpæ
Ascalonitides Hyemem Geringe in horto Ill. E.
C. perferiebant.

Cēpa Asca-
lonica ad,
tura.

Cēpa hy-
bernā.

Locus,

PORRVM. CAP. II.



CÆPIS

Descriptio

Cēporro

Porra prop-
ter affinita-
tem coniun-
gi desidevant:
adolefcentiū
enim adhuc
Porrum folijs
luxuriat se-
muncia cir-
citer latis, al-
ternatim po-
sitis, inferior
te superius
ceu vaginā a-
liquoulique
complecten-
te: adultis i-
dem positus,
sed longitu-
do cubitalis,
latitudo sex-
tantalis, for-
ma tatinata,
color . . . ferè
glaucus, sa-
por Cēpace-
us. Vbi cau-
lescit, scapum
digitalem &
crassiorē ad
tres quatu-
orue cubitos
surigit, soli-
dum, succu-
lentum, glo-
meratos in
pilam, quam
vtraque ma-
nu vix com-
plectaris, flo-
rescunt

Folia.

Color.

Scapus.

Floris.

Semen.
Radix.
Icones.
An Scro-
doprassum
Diosc. Tra-
gop.

ex crassiore tritici farina decoquit, oleoque infu-
sculos sustinentem, suo vnumquemque pediculo
innixum, ex albedo purpurascentem, apicibus sa-
turneore tinctis purpura. *Semen* triangulum, atrum,
Cepæ: *radix* bulbosa, tunicis albis compactilis,
fibrata, sapore mitiore, quam Cepæ.

Porri icones duæ sunt ex nostris emptitiis. Huius iconem ponit Tragus, ni plurimum fallimur lib.2. cap. 68. pro Scorodrapallo Diofcoridis. Descriptionem autem ponit cap. 70. Notandum tamen prope radicem huius Bulbum Scorodrapalli Tragi, apictos nucleos, qui sūt alii. Scimus aliis sentire Gesnerum, & ad aliam plantam referre. Nec tamen propterea dimouemus à nostra opinione, quia Tragus nullibi meminuit porri: descriptio, etiam Tragi optimè respondet nostro Porro, quæ est cap. 7. ubi hæc in verba prorumpit: Mediomaticis mulcicula in hortis Allii genus quoddam plantare consueverat, quod radice, foliis, & caule per omnia vulgare Allium æmulatur, nisi quod radix huius nequamque vel illius multiplici nucleis coangiturat. Quæ, quæ aut lachrymas eccitiat, non tamen tam feruens & acris est saporis atque Allium, quin potius ad Cepam, quod ad odorem attinet, accedere videtur. Quod verò facilius à vulgari Allio Scorodrapalon discerni queat, norandum est hoc latiora folia, & grandiores caules fundere, deinde quotannis nigro prægnare femine, quod in cæcumine fitulosi caulis profert, non aliter atque Cepa. Radix, nec non herba huius plantæ Allio respondent, sed odor ac semen Cepam representant, quare illi natura inest promiscua, Allii inquam & Cæpæ, quod nomine à Diofcoride *αρωματικός πορρον*, hoc est, Alioporum [si ita liceat dicere] vocatur, Germani *Zberz Knoblauch* dicunt: pollet & *Groschlach*, hoc est, Porrum grande, dici. Ego sane hoc Allii genus id esse exitimo, quod Veteres *Υλπιον*, *Gallicum*, *Cyprium*, *Briticum*, *Antiforodon*, *Aphroscedon*, & *Panicum* vocauerunt.

Natura.
Allioporrea.
Allium Vi-
picum, Gal-
licum, Cy-
prum, Bi-
ticum, Au-
tiscorodon.
Aphroscoro-
don. & Pu-
escum.

Porrigen-
ta Turner.
Porrum.
Capitum.
Sectium.
Ampelo-
drassum.

Dioſc. duorum generum meminit, duobus diuerſis cap. Plinius tria facit. Theophr. vnius meminit, quod nec *αἰνῖα*, nec *αἰνῖα* *αἰνῖα* *αἰνῖα*. Quare apud Theophr tria quoque ſunt genera. 1. *πῆθος* *πῆθος* *πῆθος*, vel Porrum capitatum, Angl. *Leſe* ſimpliciter. Germ. *lauß*, de quo in præſentia. 2. Porrum ſectiatum, Græc. *πῆθος* *πῆθος*, vt quidam volunt, Angl. *freuſde leſe*, quod genus non niſi in Anglia vidit Turn. de quo mox. 3. *αἰνῖα* *αἰνῖα*, Porrum vineale Germ. *Wildlauß*. Vnde Anglicè dicitur poſſet *Wild leſe*. Cuiusmodi nuncquam vidit Turn. copioſius & pulchrius quàm cica Wormaciam. Quod frequenter reſecatur & attondetur, Porrum ſectiatum ſive ſectile Columellæ ac Palladio nominatur: Sed quod non reſecatur Porrum capitatum eſt: Græcis *πῆθος* *πῆθος*. Illud autem Diphiſus apud Athenam vocat *αἰνῖα* *αἰνῖα*: à nonnullis verò & *αἰνῖα* *αἰνῖα* dicit. Gethyum autem Plinius Capæ ſpeciem facit, & Theophr. frequenter veluti Porri attonderi tradit. De Porro capitato ita cecinit Martialis Poëta:

Gyllylls
Dyphala.

Portigene-
za Carn.

Mistis præcipuos nemoralis Aricia Porros;
In niueo virides stipite cerne comas.

Porri duo genera sunt hodie omnibus vbi que ferè cognita. Sectium vnum, & alterum capitatum. Vocat autem capitatum quod in caput increscat Cornarius.

Marth. pingit, ac dicit Porros Hortorum cultores nefcire capiratos efficere Capatum inſtar, quamvis ii apud Veteres in frequentiffimo uſu fuerint, quòd longis qui propriè ſectiui appellantur, ſapidioreſ ſint : De hiſ autem tanquam præ-

stantioribus, scripſiſſe Dioſc. non tamen quid-
ſectius genere diſſerant, æ quibus mangonio capi-
tati ſunt: ac Porrum Capitatum & Sectium
genere non diſſerre, ſed mangonio: capitatum
autem & Sectium, ſive longo, ſubſtrati, reguli
in tranſplantatione, reſectis prius foliis, annotat.
Eum autem mirari ſubit, cur mangonium adſcri-
bat, ſiquidem hortorum cultores, vt ipſe faceret,
capitatos efficere neſciant: fruſtra docet, quod
ſecti nequit. Quid ſi Marth. ſibi conſcius dili-
gentioribus ſe natura indagatoribus inuiſoſe
negavit?

Ἰερόν & πρώτον κεφάλαιον, *Porrum*, & *Porrum capi-*
tum & *Palladio* masculino genere, *Porrus* dicitur,
 Arab. *Quraz*, seu *Kuraz*, Germ. *lauch*, Belg. *parays-*
loof, Gall. *Pourreau* vel *pourros*, Ital. *Porro* capi-
 o, *Pras*, Hisp. *Puerro*, Angl. *leek*, Boh. *Por*, &
 Woselch. Hung. *par* *Saxonia*.

Montisculi maxima habent, vt & Patauii, Por-
ra: Geneuæ & alibi copiose ferunt, ad hybernum
vsum: Montbelgardii, vbi frequens eius vsus
ferunt, transplantant, & reponunt hyme eden-
dum. Florer & Iulio, Decætero, Porri sustinent
ferè omnem ætrem, & terram desiderant medio-
criter solum, vt optime proficiant, & pinguem.

& Hercoratam. Scruntur autem in locis calidis & temperatis | mense Decembri & Januario : Fe-
buario & Martio in temperatis & frigidis
cū terra fuerit ad æqualitatem redacta. Hæc
autem ratio fit aut sola , aut in aliis herbis

mixtim, in terra optimè culta & desuper lätamine cooperta. Hęc semina sunt spissa spargendo, deinde euelluntur Porri grassiores; primò nec aufertur aliquid de ipsarum radicibus, cum sulcis plantantur, sed quando cum palis debent planta-

per asulo exhibet. Ego nolim prescribere Porrum in prædicto affectu, nec etiam ad fluentem sanguinem, siue ex vtero, siue ex naribus. Idem si purgatione opus habere videatur, Porrum (quodammodo) incoquere iubet, quo in loco Fœsius notat in sine lib. 2. *de purgatione*. Porri succum addi. Adhuc si vteros expurgare animus est: Porri & Cardamomi semen conterit ex vino & lacte cocto maceratum, ac imo ventri illinit. Linimentum componit aliud ex Lascris drachmæ vnius quantitate & succi Porri. At si purperea in grumos concreverint, & dolor in infimo ventre oboritur, Porra ceria exhibet. In porione ad fluore muliebrem Porri *[apud Galienum]* Caluus succum ex vino albo aqua temperato, propinat. Quod etiam fluentem ex naribus sanguinem sedare dicit: quod si adhuc fluxus feratur ex vino Porri succum exhibet. Si vterus vsque ad vesicam doleat, semen ex aqua tritum bibendum præcipit.

Porrum capitatum, inquit Diosc. flatuosum est, & mali succi, grævia somnia facit, vinam ciet, alio commodum est, attenuat, visus hebetudine inducit, menses detrahit, vesicam viceratam & renes lædit. Coctum autem cum prîsana, & in cibo acceptum, quæ in thorace hærent, educit. At compositum in aqua marina & aceto coctum, ad infessus commodum est, in vteri conclusione & duritia. Edulcatur & magis flatu exors euadit, duabus in aqua cocturis, & in frigida aqua maceratum. Semen *[i. g. ymnos]* eius actus est, & vim quandam adstringentem habet. Vnde succus ipsius sanguinem iustit cum aceto, & maxime cum quod si naribus fertur, manna aut thure addito, *[i. e. sc. qui frigida sunt natura, Cresc.]* Veneri ita stimulat, & ad omnia in thorace vitia cum melle pro eleganter vsurpatur. Facit & ad tabe in cibo acceptum. Sed & arteriam purgat. Verum si assidue edatur, visum obscurat, & stomacho incommodum est. Succus cum melle potus, aduersus venenatarum bestiarum morsus opitulatur. Sed & ipsum Porrum impositum prodest. Auxiliatur etiam aurium dolori & sonitui, succus cum aceto & thure & lacte aut rosaceo in stillatus. Tollit varos folia cum rhoë obsoniorum imposita, & epinictidas sanat, crustasque cum sale imposita emarginant. Cæterum feminis drachmæ due, cum æquali baccarum myrti pondere potæ, veteres sanguinis è thorace eductiones cohibent.

Meminit Maranth. nonnullos Dioscoridem sapidi repræhendere quod Porri semen in cibis visus obscuritatem inducere scripserit, quia hoc quandoque comederint, & tamen visus hebes factus non sit. Sed non animaduertunt boni viri Diosc. velle hunc effectum produci largiori & frequenti cibo elatum.

Plinio autore, Porro capitato maior est ad eadem effectus quam sectiuo: Sanguinem autem reicientibus succus eius particulatim cum galla, aut thuris farina, vel acacia datur. Hippocrates & sine alia mixtura dari iubet, vuluæque coctas aperiti putat: fecunditatem etiam feminarum hoc cibo augeri. Contritum ex melle vlcera purgat. Tussim & destillationes thoracis, pulmonis & arteriæ vitia sanat, datum in sobrietate prîsana, vel crudum præter capita, sine pane, ita vt alternis diebus sumatur, vel si purulenta excrecentur. Sic & voci, vel Veneri, somnæque multum confert. Capita bis aqua mutata cocta, aluum sistant, & inflationes veteres. Hæc Plinius in veteri codice legit, & ita vulgares Macri libellus citat. Vulgata tamen Plinii exemplaria caule pro galla falso habent.

Galen. 2. de aliment. vbi de cepis, allid, ac Porro agit, harum plantarum radices, inquit, edunt sepe homines, sed caulem raro, itemque folia, quæ multum acrem vim similem habent. Calefaciunt autem corpus, & crassos in ipso humores attenuant, & viscosos leuant. Bis tamen aut ter cocta, acrimoniam deponunt, attenuant tamen adhuc, & paucissimum alimentum corpori præbent. Sed ad pleniorum Porri doctrinam scire conuenit, quod Porrus calidus & liccus est in tertio gradu, secundum cibum illaudabilis est, nocet enim stomacho, faciens inflationem ac ventositatem, & cum sui acumine nervos eius r. ordet, habet etiam proprietatem faciendi fumum nigrum melancholici generatiuum, qui ad caput saliens visui tenebrositatem facit, atque somnia terribilia & formidolosa inducit, vnde caueant ab ipso cholericis, maniæ, & oppilationem in capite habentes. Sed diligentes eos comedere accipiant post eos lactucas, & Portulacas, Endiuas, & similia, vt eorum calor temperetur ab istis, aut elixentur, deinde bis aut ter lauentur, & esui postea dentur.

Bapt. Codronchiæ de vitii vocis ex auctoritate Arist. lib. 11. prob. 39. maxime laudat vnâ cum Plinio & Dioscor. Porrum, eò quod voci splendorem adferat & arteriam purget, vitari tamen debet assiduus vel multus illius vsus, qui visus obscuritatem efficit, stomacho aduersatur, multaque alia incommoda facit, ea propter nisi robustis admodum, decoctumque cum melle vel in prîsana, erit exhibendum.

Apoll. tribuit ei temperamentum frigidum ac venenatam naturam, ac dicit à nemine edendum, nihilominus tamen commendat in febris. Sed vtrumque præter omnem rationem. Nonnulli accipiunt (vt Holeriana schola probat) Porros nouem aut decem recentes, medios transigunt filo, folia extrema amputant, vt odorem inspirer, circūdant collo obuæis foliis naribus, & deorsum versis capitibus. Malim vti qualitate manifesta operantibus, quam hoc in quo qualitates repugnant, in Porro enim insignis caliditas & acrimonia extenuans, sine vlla astringitione: odor etiam caput grauius, videntur potius ad mouendum sanguinem, quam ad reprimendum facere.

Tradit Alb. Magnus dici in libris Hermetis, quando proiciatur semen Porri super Acetum, reddere accositatem eius. Crescentius contra vt acetum mutetur in vinum in cum semen Porri committit.

Diligenter notandum est Ambrosiū Paracum vti cauliculo Porri inuncto oleo ad deturbandam spinam aut ossiculum hærens in faucibus, vt videre est lib. 17. de operat. chirur. c. 24.

Remedium optimum ad lumbricos, credit Timot. Ross. Si folia Porri applicentur regioni vetriculi, æger interea sedeat in lacte tepido vel aqua mellita.

PORRVM SECTIVVM ET SCHOENO- prafon quibuldam.

Conferunt in fasciculos plures nascuntur huius plantula, implexu mutuo cohærentibus bulbis albis, odoris Capacei, quo etiam prædita sunt iuncæ folia fistulosa, Cepæ adolescentis: sesquipalmum aut dodrantem etiam alta, flores ex vtriculo albedo umbellatim prodeunt, quorum singuli foliis constant sensu acuminatis,

Temper:
Calens.

Nona
Stomacho
nocet
Nervis im-
mica.
Videtur ha-
beret
Quibus com-
mendum à
Porris
Corrigenti-
tia.

Acetum in-
nat

Apoll. r. g.
prehendit
itur.

Exploditur,
quorundam
opinio.

Acetum r. g.
sistit.

Spinæ

Lumbrici

Delectipis

Odor,
Folia

Floris



Memina
& Synon.
Cepae min.
ma.

compu.

Porrum se-
ctile
Curat se-
ra, tenu.

Si. Porrum
enr. dictu.

Cerhyllit.
Cepa
Cerhyum.

Ascalonit
Palesina.

Bucos.

colore dilute purpureo, itia saturatio- re medium foli- u n percur- rente; flamina albida apici- bus. Flori con- coloribus.

Porrum se- ctium Tragi, minimum est Cepae genus. Quod verò il- li in magnitu- dine decit, hoc numero refar- cit. Siquidem vna planta du- centis non- nunquam co- pacis Cepu- lis constat, ita tamen ut à se mutuo diuelli, & sin- gulari purgiant plures conuictum plantari pos- sint, & feliciori quidem successu plures namque coniuncta, terraeque inserta, hyemis frigora fa- cile ferunt. Ear apperente Februario rotunda, fistulosa, & viridia proferunt foliola, minimis luncis similia, eademque copiosa & frequentia, quae Maio mense aducentante, capitularis, & pur- pureis floribus instar Cepae satuae in cacumine emicant. Sunt qui Porrum sectile esse existimant, quorum iudicio ipse subscribit. Serapio Porrum curat, vocat, Hebraei quidam Kerefu appellare videntur. Porrum sectuum, Graecis πορρὸν το- κισμῶν nostris [inquit Cornarius] Schnitlauch & bistlauch appellatum, eo quod coma frondens adhuc ad terram vsque refecari solet, & in ciba- ria ac obsonia addi. Nouit & hoc Martialis Poeta qui de eo sic ait in Aeneis:

Fila Tarentina grauius redolentia Porri
Edisti quoties, sicula clausa dabo.

Schœnoprasum Dodonaei gall. destituitur no- mine Græco & Latino. Porrum sectium (quod à Dodonæo Schœnoprasum ficto nomine, & in- ferioribus Germanicis Biesloof, aliis brislauch vocatur) Gesner. horti Ceryllidem appellauit, quam Nicandri scholiastes Ceparum genus esse dicit. Carolus Steph. Ruellium secutus Ge- thyon Theophrasti interpretatur Porretam vul- gò à Gallis dictam & Ciuetam, qua Portaginem & Capulam hoc est Porrum sectium à Germa- nis vulgò dictum designant, idque in agro: Idem in horto: Bulbi genus, inquit, vulgus nostrum v- cat des Porrettes, vel Oignonettes.

Auerf. Schoenoprasum, Germ. binzenlauch nominant, non Brislauch: quam perperam Com- mentatur Theophr. Ascalonitidem siue Palesti- nam dicit.

Lobel. Obs. & Icon. pl. Schœnoprasum, Asca- lonica Matthioli.

Lonic. Porrum sectium, Porrum Tarentinum.

Pars maxima Herbariorum Germaniae, docet nostrum Cyue (Turneri verba sunt) seu Germa- norum Schnitlauch esse Porrum Sectium, lon- gè tamen falluntur: siquidem illorum Schnit- lauch Gethium est, inter Cepas à Plinio recens- situm, non igitur Porri genus est. Vt enim om- nia Ceparum genera fistulosa habent folia: ita Porri genera folio sunt plano carinato.

Porrum sectium non nisi vbique obuium.

Porrum Sectium, ait Plinius lib. 20. c. 6. pro-

fluita sanguinis sistit in nauib, & affito eo a- turatis, vel gallæ misto, aut mente: Item ex a- bortu profluuii, potu succo cum lacte mulierum. Tussi etiam veteri ac pectoris & pulmonis vitis medetur. Illitis foliis lanantur & ambusta, & epi- nyctides: ita vocatur huleus, huleus aciem habe- tans & in ang. Alii. Certè in M. hæc verba, quæ & syce, desunt.] quæ & syce, in angulo oculi, per- petuo humore manans. Quidam eo nomine ap- pellant pustulas liuentes ac noctibus inquietan- tes. Et alia hulecera cum melle trito. Vel bestia- rum morsus ex aceto: item serpentium. Aurium verò vitia cum felle caprino, vel pari mensura mulsi: stridores cum lacte mulieris, capitis dolo- res si in nare fundatur: dormiturius in aurem duobus succi cohlearibus, vno mellis. Succus & ad serpentium scorpionumque ictus (potus. CH.) bibitur cum mero, & ad lumborum dolores cum vini hemina potus. Sanguinem verò excreanti- bus & phthisicis, destillationibus lōgis, vel succus, vel ex ipso cibus prodest. Item morbo regio, vel hydropicis. Et ad renum dolores, cum pitana succo acetabuli mensura, Idem modus cum melle vuluas purgat. Estur verò & contra fungorum ve- nena: imponitur & vulneribus. Venerem stimu- lat: sicim sedat, ebrietates ducit. Sed oculorum aciem hebetare traditur: inflationem quoque fa- cere, quæ tamen stomacho non noceat, ventrem- que [mollire uoluit. Diof.] mollire: Voc i splen- dorem affert. Eius frequens vsus est verno tem- pore in cibus, ut acetariis & iusculis, eo modo quo iuniores Cepa: hinc Tragus ait, in nostris regionibus, id est, Germania, Porri sectiui verno tempore diu alia Culinarie herbe adolefunt, ad placetas quas Pfannenfuchen appellat, vruntur. Gustu Capa refert, sed remissiore sapore præditi, Nos tanè tum propter saporem tū propter formā foliorū fistulolorum, potius ad Cepae genus refe- rendum censemus. Tragus 743. Porrum sectile ad intinctus, qui cibus adiunguntur, modum vtile est, si cum aceto folia eius tusa temperentur. Et Capas, porra, & alia pauperum esse fercula, ac se mutuo consequi, trito fertur diuerbio. Assiduus eius & nimius usus capitis dolores excitat, sto- macho, renibus, & vesicæ non satis conuenit. Por- rum sectile aluum emollit, exulcerationibus pul- monis cum melle prodest, vitia thoracis educit, semenque genitale calefacit, & auget. Hinc Ba- ptista Fiera ita cecinit.

Tabida cui cura pulmonis membra & anhelum
Pestis, cum Porri torrida coena vocat.
Cura mihi est stomachus, placidissima somnia,
dentes,

Bis licet elixum non tamen illud edam. &c.

Porrum Sectile ad omnis generis ulcera & apo- stemata adhiberi potest sicut Cepa.

ALLIUM VVLGARE ET SATIIVM.

CAP. III.

EX Cepaceorum delineatione nonnullas Allii notas rectè mutuariamus; scilicet ergo proce- rus, enodis, concauis, glemaratim congestis in magna capita flores sustinet Cepaceos, rupto foli- culo apparentes, post modum & nucleos paruos quib' possit propagari. Verum folia, non ut Cepis fistulosa, sed graminea: bulbus denique non sim- plex, sed numerosis nucleis sub vna comuni tan- dem membrana collectis constat, sapore peracti, vnde fibre cauidè dependent.

De

De Aliis ,
quæ Cepæci
etiā generis
sunt, Theophr.
lib. 7. hæc tra-
didit : Dīfferūt
Allia quodd al-
terum in sero-
tinum, alterum
præcox : est e-
nim genus
quoddā , quod
sexaginta die-
bus perficitur.
Differunt &
magnitudine
& paruitate.
Magnitudine
excellit maxi-
mè quodd Cy-
prium voca-
tur , quod non
decoquunt, sed
ad intrita, quæ
Myrtora appel-
lantur, vritur,
& cūm teritur
in molem ad
mirandam fla-
tu intumescit.
Præterea qua-
dam ex spicis
non coagimen-
tantur. Dulce-
dinis autem, o-
doris, & crassi-
tudinis Allio-
rum, quemad-
modum & cæ-
terorum fato-
rum , causa sūt
natura loci &
cultus.

Ex quibus
hæc sumpsit
Plinius lib. 19
cap. 6. Allium
ad multa, ruris
præcipuè , me-
dicamēta pro-
desse creditur.
Tenuissimis &
quæ separan-
tur in vniuer-
sum velatur
membranis ,
mox pluribus
coagmentatur
nucleis, & his
separatim ve-
stiporis. Asperi-
faporis, & quò
plures nu-
clei fuere, hoc
est asperius.

Tædium huic
Generum differentia in tempore. Præcox matu-
rescit 60. diebus, tum magnitudine. Et mox. Vl-
picum quoque in hoc genere Græci appellauere
Allium Cyprium, alii Ophioscorodon, præcipuè

Africæ celebratum inter pulmentaria ruris, græ-
dus alio. Tritum in oleo & aceto, mirum quan-
tūm increfcit spuma. Ex his itaque intelligi-
mus, quod Theophr. Cyprium appellari ait Al-
lium magnum; quod Latini Vlpicum dixerunt,
& Dioscor. Ophioscorodon. Deinde quædam
Allii genera nucleos non habere negat, quod sp-
lum genus Diosc. in Aegypto nasci dixit.

Duo itaque sunt Allii genera, satium & syl-
uestre. Hoc Colum. lib. 11. cap. 1. ἀφροσκόρον vo-
cat, fortassis à spuma, quā increfcit, vt Plinius ait,
aut, vt Theophrast. ἐμπυματόν ται. Idem Columella
non Cyprium, sed Punicum Allium appellat, vt
ἐμπύματον appellatio facta videri possit. Verba
eius hæc sunt. Vlpicum quod quidam Allium
Punicum vocant, Græci autem ἀφροσκόρον ap-
pellant, longè maioris est incrementi, quàm Al-
lium.

Galenus Allium quarto abscessu siccare & cæ-
lesfacere dicit. Ophioscorodon autem syluestre
Allium satium validius esse, quemadmodum e-
riam alia syluestria. In Plinio tamen loco supra
citato, vulgari codices antiscorodon habent, pro
Ophioscorodon: & Dioscor. etiam Elaphoscoro-
don vocari ait: vt variae appellationes vnius rei,
pro occasione factæ videantur.

Ceterum nunc autore Dioscoride Allium
partim satium est & hortense, & hoc in Aegy-
pto vnius capitis est, quemadmodum Porrum,
dulce, ad purpureum colorem vergens, paruum;
reliquum verò magnum est, multorum capitum,
album. Vocant autem acinos in ipso, aglichtas,
id est, nucleos. Est & aliud syluestre Ophioscoro-
don vocatum, id est, Allium anguinum siue Vi-
perinum, & Elaphoscorodon.

Cordus in hist. dicit duo genera Allii, vnum
vocat Allium satium multitudine, alterum, Al-
lium alterum satium amphi-carpon, & postea
cap. 78. tradit Allium simplex, indiuiduum v-
trumque.

Allium etiam si vulgò omnibus notum sit,
tamen affabre, Cornar. recte, depingitur à Plinio
lib. 19. c. 6.

Quas παζας & ἀγλιδας Dioscor. dixit, Theo-
phrast. ζέλγας appellauit, Plinius nucleos, Colu-
mella spicas. Græci item ὀνυχας & σκελιδας ap-
pellant. Allium quod Græci Scorodora, vulgus
nostrum [ait C. Steph.] des aulx. Ceterum caput
Alii Antiqui (inquit Galenus) οὐκ ἔστι nomina-
bant vulgus nostrum teste d'aulx: Allii autem co-
mas cum capite solo Molyzam appellat.

Camer. apud Matthiolum de Allio scribit, sed
in eadem tabella ponit figuram Allii & Ophio-
scorodi. Debuisset itaque Camerarius indicaf-
se, quam figuram pro Allio posuerit.

Quod σκόρον Græci, Latini passim Allium hor-
tense, domesticum siue satium vocant, Arabes
Chaum, Chaivin & Thum. Germ. Knoblauch vel
Knobloch, Belg. Loock. Galli ail & aulx, It. A-
glis & Aio, Hsp. ayos, Angl. Garlyce/ Boh. Wsz
fuccg, Hung. Fok Hagyma.

Allium obseruatur vbique Gentium ferè: Lug-
duni verò maximum folio simili omninò Porto,
vt vix odore discerni possit. Allium non facile
seritur, Nam si ex semine hoc plantare necesse
esset, non solum tardiùs, sed etiam admodum exi-
guum proueniret, ita quidein (Theophrast. teste)
tertio demum anno perfectum redderetur. Assi-
rit autem Didymus, si Luna sub terris posita fe-
ratur, & rursus altero à satum mense, antequam
nouis nucleis conglomeretur bulbus, sub terris
luna latente vellatur, odoris fœditate carere &
Aaa

Aphrosco-
radon


Ophioscoro-
don

Aegyptium

Agilita.
Ophioscoro-
don.
Elaphoscoro-
radon.

Synonyma

Locus, tem-
pus, satio,
Infitio,
Magonia,
delectum,
repositio,
adferuatio



dulcescere, ubi verò ad iustam maturitatem peruenierit, & perfectionem adeptum fuerit, ac quò plures in eo spicas coaluerint, hoc asperius & acrius sentiri. Sed vt historiam Allii abfoluamus, cum iam maturitatem suam consecutum est, id quod plerumque circa Festum D. Iacobi fieri consuevit, Allium euellit, ac vnà cum Cepicia sua fronde in locis fumo peruiis suspensum, ad insequetem vsque annum conseruatur. Satiuum igitur Allium primo Vere, quo ciconiæ ad nos redire solent, in terram mediocriter cultam, aut naturâ suâ aliquin bonam, nec nimis fortem, aut lentam deponitur. Fiunt autem tum nucleorum eius aut spicarum diuortia, singulæque tum spica liratum depanguntur, interuacante digitum longa mensura. Hæ verò spicæ intra paucos dies erumpunt. Cæterum, optimè plantatur in terra maximè alba, fossata & subacta, sine stercore, licet in alia terra etiam stercoreata proueniat. Sarculanda sunt frequenter, (vt Crescent. inquit, vt melius eorum capita crescant, si benè capitata facere volueris, ubi cæperint eorum stipites prodire, proculca, ita quòd succus reuertatur ad ea. Colliguntur cum eorum stipites se ampliùs sustinere non possunt, in lunæ defectu & claro aëre. In paleis condita, vel fimo suspensa durabunt.

Ad faciei maculas, ephelidas dictas, Allii cortex, inquit Hisp. in uterum subditur, & postridie (postero die) spectatur, num odor ad os proueniat, quod si sic, concipiet; sin minùs, minime. Idem ait m. m. Cum mulier peperit, neque secundus est liberata, ea dare præstitit ex quibus puerperii purgamenta potissimum expurgantur, Allia cocta aut assa ex vino & oleo, cum paruis polypis & Cepioliis. In vapore & foru vterino, in ollam Allia sicca iniicienda, eaque minutim magis fracta, quàm quæ contusa sunt, & aqua quæ tribus digitis excedat vt macerentur affundenda, vitulique marini adeps infundendus &c. In coena autem & in cibo, maza panis & Allia cruda & assata, & cocta, concedenda. Si uteri ad coxendicem decurrant, menses cum crassi sint, non eant, dolor ad iunum ventrem permeet, & ad lateris inamitatem, morsumque percipiat: cum sic habuerit, copiosa & dalida lauanda, eique Allia plurima, comedenda, danda. Scabies extenuatur, trito Allio defricto, eodemque remedio, autore Columella, curatur rabiosi canis morsus.

*Optus cura-
am.
Elaphosco-
redon.*

Vim acrem obtinet Allium vt contendit Diofcor. excalfacit, mordet, flatus pellit, aluum turbat, stomachum exiccat, sitim gignit; inflationemque facit, summam corporis cutem exulcerat, & oculorum aciem esu heberat. Eadem præstat estitatum Ophiocorodon, quod & Elaphocorodon, quasi Ceruinum Allium, nuncupatur. Sed & latas quoque tineas, in cibo pellit Allium, vrinæque detrahitis: morsus à vipera & hæmorrhoo maximè, si quid aliud, confert, dummodò continuò post vinum superbibatur, aut ipsum è vino teratur ac in portione sumatur. Quin & eodem vsus, & contra canis rabiosi morsus vtiliter imponitur. In cibo verò sumptum contra mutationes aquarum proficit, [fauces expediendo, easdemque asperas leniendo] voci splendorem affert, veterem tussim crudum coctumue in cibo lenit. Potum autem cum organi decocto, pediculos ac lendes enecat. Combustum ac melle subactum illitumque, oculorum fugillationibus medetur, & Alopecis cum nardino unguento. Cum sale verò & oleo sanat papularum eruptiones. Vitiliginem quoque, lichenas, lentiginis, ulcera capitis manantia, furfures ac

lepras cum melle eximit. At cum thure & rada decoctum ac in ore decursum, dentium dolorem imminuit. Cum ficulneis foliis & cumino, contra muris aranei morsus imponitur. Comæ decoctum foeminarum decessionibus additum menses secundasque partus extrahit. In eundè quoque vsum suffumigatur. Cæterum facti ex eo & oliua nigra intritum, quod mittoton vocant, esu vrinâ cit, ora venarum patefacit, ac hydropicis quoque est vtile.

Cæterum, vires Allii largiùs aliquatò, Plinius exponit quàm Dioscorides, dum inquit, Allio magis vtilitates contra aquarum & locorum mutationes. Serpentes abigit & Scorpiones odore: atque vt aliqui tradidere ex bestiarum omnium ictibus medetur potu, vel cibo, vel illitu: priuatim cõtra hæmorrhoidas prodest, cum vino redditum vomitu. Ac ne contra ateneorum murium venenatum morsum valere miremur, Aconitum, quod alio nomine pardalianthes vocatur, debellat: Item Hyoscyamum; canum morsus, [inquit M.] in quæ vulnera cum melle imponitur. Ad serpentium quidem ictus potum cum [radiculis bulbo subantexis. Alii vestibus, id est membranis corticibus] restibus suis efficacissimè ex oleo illinitur: attrititque corporum partibus [vel si vesica intumuerit M.] vel si in vesicas intumuerint. Quin & suffitu [hæc eadem ex Plinio tradit Ruellius quem non nominat] eo [secundas & partus. Ver. secundas à partu. Aliud lego, secundos partus, vt infra cap. II.] secundas partus euocari existimauit Hippocrates: cinere eorum cum oleo, capitis vulcera manantia sanitati restituent. Suspicios coctum, aliqui crudum [id tritum dedere M.] id dedere. Diocles hydropicis cum centauro, aut inter duas ficos exceptum: vel fico portione dupla addita fico duplici ad euacuandam aluumquod efficacius præstat, viride cum Coriandro in mero potum. Suspicios aliqui & tritum in lacte dederunt. Praxagoras & contra morbum regium vino miscuit: & contra ileum in oleo & pulre, sic illinens strumis quoque. Antiqui & infanientibus crudum dabant. Diocles phreneticis elixum. Contra anginas tritum imponi, & [gargarizare CH.] gargarizare prodest, dentium dolorem tribus capitibus in aceto tritis [minuit CH.] imminuit, vel si decocti aqua colluantur, addaturque ipsum in caua dentium. Auribus etiam instillatur succus cum adipe asnerino: phthiriasis & [porriginis Vet. & CH.] pruriginis potum, item cum aceto & nitro compescit: distillationes cum lacte coctum, vel tritum [permistumque Vet.] permistumue caseo, molli: quo genere & raucitatem extenuat: Vel phthisim in fabæ sorbitione. In totum autem coctum vtilius [est crudo, elixumque tosto: sic & uoci confert:] Tæniæ alii:] Tineas & reliqua animalia intercanorum pellit, in aceto mulso coctum. Tensino in pulre medetur: Temporum doloribus illitum elixum, & pustulis coctum cum melle deinde tritum: Tussi cum adipe vetusto decoctum, vel cum lacte: Aut si sanguis etiam excreetur, [vel pura CH.] vel purulenta, sub pruna coctum & cum mellis pari modo sumptum: conuulsis ruptis cum sale & oleo. Nam cum adipe tumores [ne in abscessum, vel gangrænâ, transeant, Alii Cancerosos alii pestilentes, aut venenatos alii:] suspectos sanat. Extrahit fistulis vitia cum sulphure & resina etiam [Harundinum infusæ assulas, nam ex harundine sagittæ fiebant:] Harundines cum pice, lepras, lichenas, lentiginis exulcerat, sanaturque cum origano, vel cinis eius ex oleo & garo illitus. Sic & sacros ignes.

Sug-

Sugillata aut liuentia ad colorem reducit, com-
buitum ex melle. Credunt & comitalem mor-
bum, [sanari M. & CH.] sanare, si quis eo in
cibo vratur ac porione. Quartanas quoque ex-
cutere potum caput vnum eam Lacerpitii obolo
in vino auctero. Tussim & alio modo ac pecto-
rum suppurationes quantalibet sanat (facte
CH.) fracta incoctum faba, atque ita in (cibos
CH.) cibo sumptum, donec sanitatem restituat.
Facit & somnos, atque in totum rubicundiora
corpora. Venerem quoque stimulat cum Corian-
dro viridi tritum, potumque è mero. Virta eius
sunt, quod oculos habet, inflammationes facit,
stomachum lædit, copiosius sumptum (Galeno c.
vlt. lib. 12. merhodi, Allium sitim prorsus nullam
facit.) sitim gignit, Cetero contra pituitam, &
gallinis & gallinaceis prodest mistum farre in
cibo. Inuenta vrinam reddere, atque non tor-
queri tradunt (sicco trito M.) si trito nauia ran-
gatur. Apud Plinium porro per hæmorrhoidas,
non sedis affectionem accipere oportet, sed ser-
pentis genus, in quo mas, hæmorrhuis : fœmina
verò hæmorrhoidis vocatur, velut Aëtius 13. c. 23.

Maximè omnium in colica affectione apud
Anr. Mariam Allium est in vfu coctum.

Sed hic de alio perdifficilis oritur quæstio.
Allium enim (inquit Iohan. Matth.) status ge-
nerare docent Hippocr. com. 4. de victus rat. ac
tex. 90. nec non epid. 1. 8. text. 33. Plin. lib. 20. c.
6. Ruell. lib. 2. cap. 85. Diosc. verò, Galen. & Aët-
ius contra status præstantissimum esse remediū
lireis prodiderunt. Hippocr. Plinii & Ruellii
sententiam confirmat quod Capas Ægin. & O-
ribasius ad generationem flatuum & vomitionem
conferre docent: atque hic etiam facit quod cō-
muniter experimur post comestionem Caparum
& alliorum frequentissimorum excitatis flatibus
ructus fieri. Verum cum clariss. sit Galeni do-
ctrina lib. 3. de sympt. causis cap. 2. status fieri à
sucis pituitosis vel cibis deficientem calorem
habentibus : Allium autem & Cepa, nec defici-
entem calorem habeant, sed manifestè excedentem.
nec pituitosum humorem gignant, sed cum qui
tota natura pituitoso humori repugnet, sequetur
absurdum esse Hippocr. Plin. & Ruellii sententiā.
Galenus vt Hippocratis auctoritatem in hac cō-
trouersia tueretur, in com. de vict. acu. inquit li-
brum istum non esse genuinum Hippocr. Idem
de textu qui habetur 6. Epid. responderi potest.
Sciendum autem Allium & cepæ per se & ex sua
natura status minimè quidem gignere, eò quod
acria sunt & calida, ex accidenti tamen, quan-
do in corpus crudo phlegmate refertum ingerit-
ur, eo ipso dum phlegmata attenuare & resolu-
ere nituntur, status quoque exsuscitare: quos si-
cut accidentaliter exsuscitant, sic per se etiam
suæque natura innati caloris beneficio dissipant
& consumunt. Idem in Discursu de febris Pe-
stilentiali pag. 24. Ad præseruationem profunt
Allia, cepæ, Sinapi, Raphanus marinus, quæ
non alimenti sed condimenti loco vtiliter vlur-
pantur. Mira igitur quorundam curiositas, qui
famosa hæc rusticorum antidota ignoranti po-
pulo suspecta reddunt, & prorsus vitanda esse cō-
sulunt : sed ex quo fundamento hoc ipsis liceat,
ipsi viderint. Sæpe quidem scio, immodico &
frequente rerum acrimia vfu sanguinem incalc-
scere multumque biliosum humoris generari: pe-
stilentibus verò febres inde oriri, firmiori pro-
batione indiget. Nonnulli cum viderent capas cū
Theriaca sub prunis affatas & tumoribus pesti-
lentibus impositas, venena attrahere, suspicati

Tom. II.

sunt easdem capas intra corpus assumptas omnē
externam malignitatem ad interna viscera per-
trahere. Verum Gal. lib. 3. Temper. cap. 3. hæc
somnia satis refutat: non enim quæ foris impo-
sita attrahunt vel exulcerant, illa etiam intus
assumpta idem præstant: acrimonia siquidem
coctione & variis ventriculi humiditatibus per-
mixta plurimum remittit: vnde Matthiolus etiam
ipsum caparum succum expressum, peste laborā-
tibus propinare minimè veretur. Sic Roscellus
præstans Medicus eundem succum ex capis pres-
sum pro arcano pestis remedio exhibet, reliquā
verò caparum pulpam tumoribus pestiferis im-
ponit. Accedit quod Solion antiquus auctor
memoriæ prodidit, caparum vsum sitim valem-
tudinem conseruare. Nec Horatius Alliorum
vsum suspectum reddere potest, quando inquit:

Parentis olim si quis impia manu

Senile guttur fregerit.

Edat cicutis Allium nocentius :

O dura messorum ista!

Quia hoc veneni sedit in præcordiis?

Apparet enim Horatium Poëtarum more lu-
dere, ac id cui fortè affuetus non fuit, iocosè re-
prehendere. Constat alioqui Allii vsum contra
venena in Vngaria & Italia potissimum ætius
tempore, quando messoribus & agricolis vene-
nata reptilia nocere possunt, vltatissimum esse:
Vnde Virgilius

*Nunc virides etiam occultant spineta lacer-
tas*

Thesylis & rapido fessis, messoribus æstu

*Allia, Serpulumque herbas contundit o-
lentes.*

Eiusdem conditionis sunt, Sinapi, Raphanus
marinus & similia. Si enim naturam illorum per-
pendamus, omnia hæc superfluas corporis humi-
ditates consumere & venenis potentissimè resi-
stere ualebunt. Hinc non sine graui causa Sinapi
in compositionem Electuarii, quod Ouum au-
reum vocat tanquam principalis pars ingreditur.
Nec immoderatum horum omnium vsum cui-
quam consulere velim, sed quantum condimen-
ti ratio permittit. Dignum & illud notatu,
quod Iac. Rueff. prodit. Si matrix per puden-
da prodeat, experimentum valdè vtile. Allium
contusum in aqua ita dissolue vt nihil spiritudi-
nis reliquum sit, eā aquā prominens matrix la-
uetur. Quod Forestus l. 9. Obseru. 19. notat, Mer-
curatori cuidam Delfensi de hydrope periclitanti
cum crurum inflatione. Allium comestum ma-
ximè profuit: quo solo aliquando in Gallia hy-
dropicum curauit, cui egregiè profuit cum ad ca-
chexiam & hydropem inclinatus vidèretur.

Sed nihil æquè ex omni parte beatum. Nam
vt Tragus perhibet, unum est in Allio detestan-
dum, nimirum fœtidus ille ac fortissimus odor,
quo cerebro officit, caliginem oculorum facit,
iram comouet, sitim excitat, somnūque indu-
cit: quæ omnia in gallo gallinaceo videre est, qui
Allium deuorauerit. Ceterum mirum alicui vi-
debitur qua ratione fœrentem anhelitum à cepa
prouenientem teter Allii odor emendare queat,
id quod Thomas Morus in suis Epigram. atte-
statur.

Denuo fœtorem si vis depellere Cepæ,

Hoc facile efficiunt Allia mansa tibi.

Spiritus at si post etiam grauis Allia restat,

Aut nihil aut tantum tollere merda potest.

Sed posterius hoc pentametrum veritate carere
Tragus hîc testatur. Si quis postquam Allium,
estitauit, non possit odoris terti fœditatem suf-

Aaa 2

ferre, his folia rutæ recentia supermanducet, quâ ratione odor ille foetidus, maiore ex parte delcbitur. Quare merito os illotum, Thomæ Moris, sic emendabimus.

Spiritus ac si post etiam grauis Allia restat, aut nihil aut tantum tollere rutæ potest.

Dydymus quoque edentibus halitus radium asfrit aboleri, si crudam fabam supermanducarint. Verum ad emolliendam odoris tetrici foeditatem, Betæ radicem in prunis tostam superedisse satis est. Eo siquidem remedio virus extingui Menander è Græcis pollicetur.

Sunt qui pulmentariis Allium adhibeant, nec non armis asfandis nucleos eius infigant. Sed quicquid id est, Apicianum est inuentum. Mulierculæ, quæ in fontes lac suspendere ætate solent, ut dulce maneat, ollarum superiores partes circumcirca succo Allij inungere debent; hac enim ratione à serpentum iniuria asserunt qui alioquin lac admodum expetunt, ita quidem ut in ollas ipsas non raro incident. Quod si per somnum, ut fit aliquando, serpens corpus alicuius intrauerit, huic non facile succurri potest nisi continuo Allij usu, hoc enim remedio serpens eijcitur, teste Erasmo. Allium singulare morborum in pecoribus remedium, quibus non tantum fultu, sed & in cibo Allium adhiberi debet, teste Columella lib. 6. cap. 4.

Arnoldus de Villa noua ad dolorem capitis à pituita scribit: Allium tritum, & calfactum supra regulam, parti dolenti appositum dolorem tollit, ac ad Hemierianam Allium elixum, & in oleo frixum, cum pauco pulegio, & puluere Piperis applicatum loco dolenti, mirabiliter prodest. Distinguetur, inquit Herc. Saxonia, de lue vener. benigna lues venerea à maligna hoc experimento: quæ malignior fuerit ex assumpto Allio vel Capis post triduum duplicatur, benignior verò eodem est statu, præterquam quòd habenda semper est ratio personæ, & præteritorum. Ioh. Bockelius de peste inquit, tempore pestis Hungari non habent certius remedium quam Allium, exsiccat enim corpora humana, & putredinem impedit.

Allium, inquit F. Platerus de febribus, in hydro-melite decoctum & ad vncias duas vel paullo plus exhibitum, potenter sudores & vrinas elicit in peste laborantibus. Idem, ut ait Turnerus, ex lacte coctum, & tritum, mistumque cum caseo receti, sistit catarrhos, sicque prodest ad raucedinem. Tres nuclei in aceto triti, dentibus dolentibus impositi conferunt. Allium domesticum claram reddere vocem, eò quòd guttura purget, memorie prodidit Dioscorides, inquit B. Condronchius, sed quoniam habet certum quid virosi, & mali succi: præsertim si crudum estetur, iure optimo elixum conferre scripsit Plinius: elixatione enim tollitur illa grauitas: animaduertent tamen qui temperamentum habent calidum, & catarrhis obnoxii sunt, ut eo parcissimè vtantur, quia nocet capiti, oculis, ac renibus. Allii tamen tutior est vsus quam Porri, præsertim naturis frigidis & humidis, si elixum, & cum sapa conditum comedatur.

Iac. du Veloux de venatione, ut Caniculæ ad Venerem stimulentur exhibet Allia additis aliis quibusdam. Magnetem allio perunctum ferrum negligere vulgò creditur. Sed Guilhelm. Gilbert. de Magnete lib. 1. figmentum ait & mendacium esse Magnetem non attrahere ferrum, si Allio Magnes illitus fuerit, aut si Adamas propè fuerit: sed Marthiolum Allii & Adamantis renouare fa-

bulam. Allium prægnantibus inimicum esse statuit. Quidam Hispani liquorem ex Allio expressum, ad expellendum venenum quod à sagittis infectis infligi solet, exhibent. Contra viperas, rabidos canes, & venenosas aquarum mutationes Allium valet.

Si gallinæ galli Allium, ut videre est apud Ringelbergium prius comederint, ferocissimi fore dicuntur ad pugnam: atque alios omnes superaturi. Idè & viatores eo veltuntur, quòd animosum reddat hominem. Datur & equis eandem ob causam ferocioris animi.


DE AMPELOPRASSO

Diosc. de Ampelopraso tractans, stomacho, inquit, incommodum magis est, quam Porrum. Sed plus calefacit, & magis vrinam ciere. Menfes item ducit. Et eius usus his qui à venetis bestiis icti sunt, commodus est.

Plinius lib. 24. cap. 15. ait Ampeloprason in vinctis nasci, folijs Porri, ructu graue. Contra serpentium ictus esse efficacem. Vrnam & menfes ciere. Eruptiones sanguinis per genitale inhibere potum impositumque. Dari & à partu mulieribus, & contra canis morsum. Ampeloprason dictum est, quasi Porrum vinearum. Galenus syluestre Porrum dici posse ait, & à Porris tantum differre, quantum etiam in aliis omnibus eiusdem generis siluestria ab hortensibus differunt. Nam & acrius est Porro & siccus, & propterea etiam stomacho magis incommodum. Sicut agria omnia reliqua domesticis. Sed & crassos (ut Lobel. Ob. inquit) & lentos humores potentiùs incidit, valentiusque infarctæ organa obstructione liberat: atque hac quoque ratione vrinas sæpè prouocat, vbi à crassis & lentis retinetur humoribus. Ad eò verò est calidum, ut, illitum cataphasmatis modo, exulceret. Dictum est autem antè, ea quæ eum in modum sunt calida, extremi esse ordinis.

Cordo, Ampeloprason, vineale Porrum, sicut & Lonicero, cui præterea Porrum siluestre, Allium caninum, & Porrum virgineum dicitur: Germ. Wildlauch & hunderlauch/Hisp. Puero saluage.

SCORODOPRASSVM DICTVM.



Allio hic scorodoprassum subdemonstramus, cuius caulis tres quatuorue cubitos altus, infima parte digitalis, paulatim in uniceam renuitem desinit, folijs amictus Porraceis, longis & latis, superiore tantè parte nudus, ferè in summo caput membranaceo inuolucro re-

ctum,

sum, ut Cēpa, sub quo, florum glomer purpurascit, staminibus emicantibus luteis, magnitudine pugillari: *strophili* Clusio Cepaceis humiles, sex ex albidis foliolis constans: quibus succedunt trigona capitula, in quibus nigrum semen Cēpae femini par eidem Clusio: bulbos ei infestis, parua Cēpa aequalis, multis albis tunicis constans, fibratus, florum glomeri suppar, & spicis multis, allii ritu coherentibus, odore & sapore remissione, Clusio gravi odore, mediocriter inter Allium & Porrum: Veritate in alios maiores bulbos se se diuidens, adnatis etiam extrinsecus bulbillis, triangularibus ferē, tunicā durā inuolutis, feminis vicem suppleturis: semen adhuc nullum vidimus

Sicut autem nomen Allii & Porri Scorodoprasum refertur, ita etiam, Cornario recte, qualitates & vires utriusque possidet. Officina hinc Alliumporrum vocant: Germ. verò *Uberlauch* quali iterum porrum dicas. Ast quam Plantam per Alliumporrum intelligat Cornarius consideratione certò dignum. Clus. in Pann. & hist. post. Scorodoprasum primum. Lob. obs. & icon. pl. pag. 157. Item Camer. apud Matthioli. Germ. Scorodoprasum, Germanice *Äser oder Äserknoblauch*. Gall. *Ail porreau*. Ital. *Aglio porro*. Hisp. *Hajo porruo*. C. Bauh. phyt. *Allium tertium* huius Spharicicum.

An *Tabern.* icon. & hist. Porrum Syriacum, *Syrischerlauch* / qui sola coarctus iconē non demonstrat quam plantam intelligat. Compil. *Tabern.* sequitur Gerard. qui iconem eius habet plantaque Alpinam facit, quod non placet. Vocatur tamen Scorodoprasum, Angl. *Great mountain garlic*.

Scorodoprasum nascitur Dioscoridi, velut magnum Porrum. Clusio Iunio & Iulio floret, qui Viennae obseruauit, cui pauci bulbi Bizantio alati sunt, postquam Viennam venisset. Vnicus autem quem n. seruauerat, mirum in modum se propagauit, ut successu temporis multis elargiri poterit. Et quidem Iunii initio suum caput contorquet: Iulio autem erigit, eodemque mense, bulbos ad maturitatem perducit, qui si terrae credantur, sui generis plantas procreant. Ego Montbelg. copiosum habeo in horto Ill. E. C.

Allii & Porri qualitates particeps. Vnde etiam mixtas vires habet, & facit quaecunque & Allii & Porrum, remissè tamen. Olerum modo auctore Dioscor. in cibi usum venit, & velut Porrum coquitur ac edulcatur. Galen. & in sapore, & in odore mixtam Allii & Porri qualitatem Scorodoprasum ait habere: & eodem modo etiam in facultate. Ita quoque Paulus, sicut & Dioscor. suum Scorodoprasum apud Turcas esse in delictis, Clusio aliquando referebat Illustr. Augerius de Boufbeckue.



tiò purpurascens, postea exalbidi, & inter hos *strophili*: tota planta grauem Allii odorem spirat.

De hoc Clus. in Pann. & hist. post. scribit, vocans Scorodoprasum alterum. Sunt, inquit, qui *strophili* appellant quia, caput cum suprema caulibus parte seipensis rotat ita contorquet.

C. Bauh. phyt. Moly tertium siue Serpentinum Lobel. Allium 2. siue Satiuum 2. amphicarpon Cordi. Allium 6. siue capite ex multis bulbis confilato & contorto, Scorodoprasum 2. Clusii. Sed nunquid entia multiplicat Fr. C. B. qui tres diuersas plantas statuit?

An Cordo in hist. pl. Allii satui alterum genus quod Amphicarpon appellat.

Dodon. in fol. figuram Clusii habet nomine Ampelopras: cap. tamen 12. meminit *duquidpon* Cordi, nec tamen idem cum Ampelopraso facit.

An Lob. Obs. & Icon. pl. pag. 65. Moly serpentinum vocatum.

Camer. in hist. Math. in tabella Allii figuras habet duas notatas numero 3. & 6. quas refero ad nostrum Allii genus Ophioscorodon dictum quibusdam. Idem in horto Allium Creticum vocat siue Serpentinum, Scorodoprasum in Pannonicis Clusii. Hortus Lus. Allium Creticum serpentinum Scorodoprasum Clusio, Moly serpentinum Angl. rum. H. Welsch Knoblauch / schlangen knoblauch.

Iunii initio suum caput contorquet, Iulio verò erigit, eodemque mense bulbos ad maturitatem perducit, qui terrae crediti, sui generis plantas procreant. Est à nobis plantatum in horto Ill. E. C. Montbelg. multos bulbos habens, ex cuius bulbis decidentibus nouae oriuntur plantae quotannis. Basileae coluit in horto suo Cl. D. D. Iacobus Zuingerus.

prema porro caulibus parua, viridis, lauis, in gyrum vnum aut alterum spiratum serpentinum morere, intorquetur, donec tandem caput erigat, vagina albicans, corniculata, extra volumina protensa, longa & scrostrata, qua dehiscente bulbuli apparent, congesti, initio purpurascens, postea exalbidi, & inter hos strophili: tota planta grauem Allii odorem spirat.

C. B. not.

Allium Creticum Moly serpentinum.

Tempus.

Locus.

ALLII GENVS, OPHIOSCORODON dictum quibusdam.

Allii genus, Porro & Scorodopraso simile, cuius bulbum multis nucleis constans, fibrisque numerosis exalbidis capillatum, sessili parte circumuehiunt tunica Cepaceae binae aut ternae: ex albo purpurascens: *caulis* singularis, minimi digiti crassitudine, sesquicubitalis, aut bicubitalis: *folius* ut plurimum quinque Porraceis, carinatis donatur: quae postquam caulem aliquousque inuoluerunt, ab eo abscedentia reflexa terram spectant, medio, auctore Clusio, inter Porrum & Allium odore: sum. Tom. II.

ALLIUM SIVE MOLY MONTANVM latifolium.

Multa, inquit Clus. Pann. & hist. post. etiam in Vngariae, Austriae, Stiriae, Moraviaeque montibus Moly sine Allii sunt genera, foliis, floribus, vel capitibus inter se discrepantia: quorum maximam partem ab aliis haecenus minime obseruatam fuisse existimo. Primum, *caulem* habet duorum cubitorum altitudine excrecentem, quem, ad medium usque, ambiunt folia, mult.

A a a 3



radix bulbosa, crassa, ex multis nucleis constans, numerosis albis fibris prædita est: sed & bulbi rudî radici inherent, is ferè pares qui in capite nascuntur, quique, terrâ excepti, plantas sui generis producant. Toti stirpi Allii grauis odor inest. Iulio & Iulio flores & bulbos tert. Hort. Lusit. Allium filu. alterum latifolium Breiter blerterich Wilder knoblauch.

ALLIVM BICORNE, PROLIFERV, flore intus albescente, cum stria purpurascente externè.

Descriptio **D**iffidet huius *radix* ab allii radice, non tantum odore minùs viroso, sed & quòd non è spicis constata, verum simplex Cepacearum tunicarum involucri duntaxat consistit, sublonga, candida, Nuti Moschata: par, pendulis fibris tenuibus donata, superacris: *caulem* producit cubitalem, bicubitalem & ampliorem, firmum, terebrem, nonnihil striatum, quem involuunt, ceu vaginâ pedem aut cubitum longâ, *folia*, quæ vbi à caule abscedunt pedalia, vel etiam cubitalia, Cepaceis similia, fistulosa: striata, sed strigiosiora multò & compressa, in terram reflexa. Cæterum caulis in folliculos duos definit in corniculatum mucronem desinentes, palinm circiter longos, globum claudentes cauli continuum, Auellana: rotundâ parem, & multis bulbillis rubentibus congestum, inter quos frequentes excurrunt pediculi, vnciam vnâ aut alteram longi, quibus insident *stiosculi* senis foliis contexti, externè viridibus, intus albicantibus, purpurascente lineâ striatis, apicibus medium occupantibus superueniunt capitula sexangula.

Iconem habet Clus. Pannonic. & post. hist. sub titulo *Allii* siue *Moly montani* (id nos Allium bicorne purpurascens proliferum vocamus) *tertia*, ea nobis placet, vt etiam respondere videtur descriptioni.

Tragus hoc Allium pingit tertio loco, titulo, *Allium caninum alterum*, hunde knoblauch der ander. Sed ita obscurè hanc tradit historiam vt nihil certi affirmare ausim, an hoc Allium descripserit, lectores perpendant quæ scribit cap. 71.

Obscurus est & Fuchsius, figuram eandem cum Trago habet, nec describit, dicitque *Allium*

silvestre alterum, Germ. feld knoblauch.

Marthiol. quoque huius picturam habet, sed nec is in contextu demonstrat quâ plantâ intelligat. An eadem l. 2. c. 144. quamvis ibidem figuram Porri habeat, Agreste Porrum, *quædam* *agreste*, quasi vineale Porrum, quod in Hetruria *Porrandulo* vocatur. Galenus, inquit is, minùs fortasse rectè lib. 6. simpl. tribuit Ampeloprasii quod Scorodopraso competere videtur, cum inquit, Si inter Allium & Porrum medium quiddam concipias, facultatem Ampeloprasii inuenieris. Latinis *Porrum agreste*, *Ampeloprasium*. Mauritanis *Nabari*. Italis *Parro saluatico*: Germ. Wildlauch, Hisp. *Ajos* & *Pneros de la vinhas*. Gall. *Porreau de chien*. Tertio epist. ad Guill. Nusquam scripsit, inquit, Moly esse plantam Italiæ incognitam, hallucinatur cum credit Allium caninum Tragi esse Moly, non conuenit cum descriptione Diosc. *quod* *perperam* interpretatur apud Hippocratem. *Moly*, falsò asserit Galenum Allium interpretari. Cui Gesnerus ad eundem Guilandinum inter epistolas Math. ad stipulat, dicens: Allium caninum Tragi, Dioscor. esse Moly in præsentia non concesserim. An Guill. epist. ad Gesn. inter Epist. Math. de hoc egit, cum scripsit: Gal. lib. qui obsoleta Hippocratis vocabula planiora facit *quod* Hipp. vocare ait, quæ cæteris Moly dicitur. Quod Diosc. Moly nominat, Hisp. *quod* *nuncupat*. Moly Diosc. ignorat esse Italiæ plantam dicit Matthiolus. Moly inquit Galen. eodem loco, Allium est simplex caput habens & non diuisum in spicas. Quem locum si Matthiolus legisset nunquam in Moly & suam & reliquorum ignorantiam accusasset. Nihil Allio isto sylvestri esse potest notius. Nascitur locis campestribus passim. Flores candidi à Trago allium caninum dicantur, & æquo quoque sub nomine secundo loco post Allium sylvestre depingitur. Mihi sanè, si dicam quod res est, si obscura est Tragi delineatio, Guilandini adhuc obscurior, quia nondum vidi Allium quale describit flore albo.

Car. Steph. describit & vocat *Scorodoprasium*, *Allium Porraceum* & *porrum*, qualiter Officinæ vocant. Nouimus autem aliter sentire Gesnerum de hortis.

Dodon. describit & Iconem Tragi & Fuchsii habet, dicens: *quod* *quod*. Lat. *Allium silvestre*, Gall. *All sauvage*. Germ. Wilder knoblauch. Belg. wilder loof.

Aduer. quæ *Allium silvestre renuissimum*. Germ. wilder knoblauch, Angl. wilder Garlic vocant, describunt obiter, ac annotant in margine à Fuchio exhibitum lib. Icon. p. 129. Lobel. Obs. & l. c. Pl. p. 155. vbi pingitur & describitur Ampeloprasion *quod* *quod*, siue Porrum silvestre. Germ. wildlauch. Angl. wild garlic: Hisp. *Pnerro saluatico*. Ital. *Porrandillo*. Sed in figura Lobelii, si nostrum Allium depingit, requiruntur flores & duo folia sub floribus.

Genevæ passim: Montbelgardi in horto meo flores, & paruos bulbos habet Iulio, vbi spontè provenit omnia minora, vt videre licet à la Roche de Bauans, vt vocant,



ad Dubium itinerè versus
L'Isle, & à la chaux
nostris vitibus.

ALLIVM SYLV. BICORNE
flore viridi.

F Rater Casp. Bauh. inter suas plantas siccas attulit nobis Allii sylvestris genus, Allio nostro bicorni radice & foliis simile, regetur in radice, cuius bulbum plantauimus in Horto Ill. E. C. in quo prouenit: comam non proferebat cœruleam sed viridem, copiosiores etiam flores, nec bulbuli ad flores: Nomina hæc erant adscripta. Gerb. Theophrast. Pallacana Plin. : Guiland. Allium vrsinum vulgè Cortufo. Aliàs vidi, sed non obseruavi locum.

Considerandum an respondeat huic Allio, illud quod à Clusio in Panno. & post. hist. exhibetur pro Allii montani quarti speciei. siue Moly montano obsoletiore flore, de quo ille scribit: Allii montani quarti alia inuenitur species pari ferè a latitud. excrefcens, similibusque propè foliis prædita, cuius coma inter la-

xas, membranaceasque, & longum mucronem habentes tunicas latè sese explicat, floribus coloris valdè obsoleti plena: radix superiori similis, nucleos etiam in lateribus præfert. An Plant. icon. p. 158. Allium rubentibus nucleis:



Prouenit inter fruteta etiam Basilicæ.

An plant. icon. p. 156. Ampeloprasum proliferum.

Hoc genus Allii inter siccas plantas attulit nobis Frater C. Bauh. collectum Venetiis à Lio nomine Allii anguini, quod quâuis dudum esset repositum & exsiccatum, ex bulbis tamen quos ademi Horto Il. E. C. Montbelgardi regetimnabat, ferè bacque flores Iulio & Augusto.

ALLIVM SYLVESTRE MONSPESSVLANUM
album. Ioh. Bauh. n.

M onspessulæ spontis siue Allium mihi repertum, caulem habet bicubitalem etiam minorem, album, cauum, festucaceum ferè, cuius fastigium in Cepacum caput, sed minus, glomeratur, floribus singulis ad Allii vrsini flores accedentibus, maioribus quàm alterius vllius Allii sylvestris, tactu siccissimis, pediculis æqualiter longis hærentibus, albis, quos fœna componunt folia apices luteos circumstantia, non prodeunt, quod obseruauimus, ex longis vaginulis, sed breuius obuoluntur tunicis pr utquam erumpant: folia magna ex parte caulem complexa, cubitalia ferè, angusta, graminea. Bulbus siue est paruus, oblongus, albidissimis pelliculis infectus, cui annexæ non tantum capillares fibræ, verum & nuclei parui adnascuntur, odore viroso Allii.

Descriptio

Florens repertum Aprili in monte non longè à Villeneuve quâ itur Frontignanum vno milliari à Monspelio: Non viso Moly Diofc. id suspicabamur. Cæsalp. Allium vrsinum alterum.

ALLIVM SYLV. BICORNE PVR-
pureum proliferum.

T enui sed duro, tereti, glabro & singulari est caule, cubitum alto, in quo folia tria quatuorue sesquipalmaria & dodrantalia, admodum angusta, crassiuscula: scapo summo insidet capitulum è bulbillis viridantibus glomeratum, è quorum commissuris emicant trenfili pediculi numerosi, sextantem circiter longi, puniceantes, flores cœcolores sustinentes, sed dilutiores, è senis foliis, quorum medium stria saturatior, peccurrit, compositi, è medio proflidentibus staminibus purpurascens, radices bulbaceæ plures simul coherent, oblongæ, albæ, fibratæ, sapore Porri.

Idem existimamus à Clusio Panno. & h. post. traditum pro Allio siue Moly montano 1. de quo ait: Cubitali assurgit caule, læui, rotundo, viridi, in quo terna plarumque folia, superioris folio angustiora, & veluti graminea: summus caulis caput sustinet duabus laxis membranaceis tunicis longiore mucrone præditi obuolutum, quibus sese aperientibus, multi exigui bulbi simul congesti apparent, inter quos flores sex, purpurascens foliolis constantes, & oblongis pediculis inherentes dependent: rotundam, albam, longis candicantibusque fibris capillatam radicem non habet.

ALLIVM FLORE LVTEO
siue pallido.

Descriptio

C auli cubitali tereti insidet umbella dehiscens folliculo membranaceo sese explicans, florum luteorum, pediculis vncialibus longioribus insidentibus, senis foliis, toridemque staminibus & stylo tenui longiusculè constantium. Semen maturat nigrum trique-

trum: *folia* angusta, pedem longa. *Radix* bulbosa, fibrata, nucleos quoque parit, vnde propagatur, odore Allii.

De hoc Allio censemus Clus. Pann. & hist. post. hæc scribere: cum ait, Allii montani quarti speciei prima, ternæ iunceæ folia, caulem cubitalem, rotundum, &c.

C. Bauh. Phyt. *Allium* 12. siue *montanum* flore pallido odore.

Allium pulchrum coma lutea dono accepi Argentinæ ex plantis siccis D. Agerii. Vidi etiam pulchrè florens apud D. Fridericum Meier Argentinæ mensis Iulii 8. 1595. Clus. Suam Moly montanum flore pallido odorato circa Pofonium & locis Niclasburg vicinis in Moravia Iulio florentem obicitauit.

MOLY LVTEVM BOTANICORVM latifolium allii odore.

Descriptio



noribus tamen, vno exortu è *pediculis*, quampluribus in spithamæo cauliculo, binis *foliis* latiusculis, Tulipæ Bonemensis siue Apenninæ vocatæ similibus prædito: vno latiore, altero vt plurimum angustiore. *Radice* verò parâ, sed breviori. Hoc anno 1604. nobis floruit Londini in horto Nobiliss. V. D. Baronis Zouche, & Franqueuille. Tota planta allii fragrat odorem, eoque Moly propior quàm Ornithogalo luteo; Ornithogali autem lutei nomenclaturâ quò carius distrahatur, à Rhizotomis perperam donatur.

Ornithogalum luteum
Moly montanum
latifolium
flauo flore.

Hoc quoque descripsit Clus. Exot. part. 2. Append. 2. Cuius quidem descriptionem ideò apponere placuit, vt studiosis rei herbariæ, hæc exoticæ raritatis planta eò facilius innotesceret. Moly igitur montanum, inquit ipse, latifolium, flauo flore, nunquam antè mihi conspectum mittebat anno 1601. Ioachim Vener. Ioanni Hugelando, in cuius horto insequente anno flores protulit. Illius iconem, & historiam, quia à nullo alio hætenus, quod sciam, tradita, hic adponere libuit. Habeat verò illud bina duntaxat folia, infimâ sparte sese mutuò amplectentia, decem aut plures vncias longa, vnam lata, surrecta, firma, supinâ parte nonnihil catinata, Porracei coloris, at odoris Allium referentis; inter quæ assurgebat caulis enodis & saris gracilis, firmus tamen, virescens, pedem altus, aut paulò amplior, sustinens summo fastigio prodeuntes ex

membranacæo folliculo bifariam diuiso triginta aut plures flores vncialibus vel longioribus pediculis, iisque firmis, subnixos, senis foliis stellæ in modum expâsis constantes, foris pallefcentes, interiore parte prorsus flauos; occupante vmbilicæ triangulari capitulo sex flauis staminibus cincto, quorum apices etiam flauis: qui mense Iunio explicabantur, succedebant trigona capitula semen nigrum inarquale continentia: radix erat bulbosa, gemina, vt Orchidibus radicem quodam modo æmularetur. Subsequente anno aliquot similes plantas ab ipso Venerio etiam accipiebam, & illas quidem vel singulâ, vel geminâ bulbo præditas, quarum ternæ aut quaternæ germinarunt, & florem tulerunt anno 1603. aliquæ quidè vno duntaxat folio præditæ, aliæ autem binis, vno ampliore alterum angustius amplectente, inter quæ prodiat caulis enodis, flores è folliculo membranacæo emergentis sustinens. Similes etiam bulbos eodem anno, cum plerisque aliis Plantis in Pyrenæis montibus erutis, venales adferebant in hanc Prouinciâ Rhizotomi quidam Galli.

ALLIUM QVODDAM SILVESTRE flore purpureo.

A Vellanæ magnitudine radix, multos nucleos membranis inuolutos complectitur, ptyridas imitatos: *folia* longa, gramineæ tenuitatis, *caulis* sesquicubitalis, iunceus: cuius summo capitulum insidet parui Mespili ferè magnitudine, *strobili* purpureis glomeratum.

ALLIUM SPHÆROCEPHALVM purpureum Sylvestre.



Allii Sphaerocephali bulbos è multis contextus est nucleis albis, tunica alba inuolutis, fibratis odore Allii graui præditis: *folia* tria quatuorue, palmu longa, interdum minora pro natalium ratione, vigente flore marcida, *caulem* fistulosa vagina, completuntur, qui cubitalis aut sesquicubitalis, colore & forma iunceus, teres, solidus, firmus, in summo fastigio sphaeram gerit, ouo columbino parem, maioremque, purpuream, floribus constantem glomeratis paruis, sex foliolis constantibus cum staminibus concoloribus, in pediculis breuib.

Nostre icones fuerunt emptæ, Clusii melius placet, quam ponit sub titulo allii seu Moly montani, qui de eo scribens: Altitudine, inquit, cubitali assurgit, caule nudo, viridi, paucis foliis viridibus obito, cuius fastigio insidet caput orbiculare initid è multis floribus breui petiolo præditi



tis congestum, qui sex foliola, nunquam sese prius explicata, habent, sex in medio staminibus & stylo, elegantis purpurei coloris: radix bulbosa, alba, nucleos interdum tenui membrana rector, & proximè caulè lateribus adnatos habens, sessili parte multas albicantes fibras. Eius odor, Allii instat caput ferit. In Vngaria circa Potolanum duntaxat obseruatur, quum Pannonicarum stirpium historiam publici iuris faciebam, ad vinetorum in collibus Danubio imminuentibus sitorum margines, Maio & Iunio florib. onustum. Postquam verò Viennâ discessi, & Francofurtum ad Mœnū perueni, aliquot stirpes inter segetes agris illi ubi vicinis inuentas, in meum hortulum transtuli propter florum elegantiam Anno 1599. Tercio autem post anno, binos eius bulbos Neapoli accipiebam à Ferdinando Imperato, qui flores duntaxat promulerunt Lugduni apud Batauos, ubi demum quale genus Moly montani esset agnouit: paulò tamen præcocius florere mihi visum est illo, quod in Vngariâ, quod Francofurti obseruabam: nam & illud Lugdunum adferebam. Item Exor. par. 2. Append. 2. Aliud Moly montani genus ab isto non valde diuersum mittebat Venerius Burdegala, quod flores protulit in meo horto mense Iunio, sed in honesti Lopez horto multò seriùs, extremo duntaxat Septembri: paucioribus tamen floribus præditum esse videbatur, quàm vel Pannonicum, vel Neapolitanum, vel Francofurtense, iisque minùs etiam elegantibus.

Car. Steph. de re hortensî describens dicit, Allium sylvestre, *Aulx saumages*: Græcis *Ophioscodon*, quasi serpentis Allium.

An Cordo in Dioscor. Ampeloprason. Germ. *wilderlauch*. An verò *σικκωδὸν* Gesner. apud Cordum in hist. qui Tragi figuram habens, dicit: Tragus Caninum vulgò cognominari ait, & Allium sylvestre *Wilderlauch* / Ampeloprason esse conicit: *wilderlauch*.

Σικκωδὸν, sylvestris Allii genus. Germ. *feldlauch*, siue *wilderlauch*, qua hætenus herba cuiusq; semine pro scordio vsi sunt Pharmacopola, & adhuc magno errore vtuntur.

Tragus lib. 2. cap. 69. hoc pingit sub titulo: Allium caninum, sed id cap. 17. describit ac dicit: Plin. lib. 19. cap. 6. Allium sylvestre Vrsinum vocauit, id verò quod in aruis spontè nascitur Allium, Quod in vineis nascitur *σικκωδὸν* Dioscoridi vocatur. Apud Paulum Aeginetam Porum agreste Germ. *wilderlauch* nuncupatur. Ego, vt verum fatear, non ritè intelligo Tragum: vereor ne non separet Allium nostrum bicornè ab Allio Sphærocephalo, iudicent Lectores.

Fuchf. icon. & hist. eandem figuram habet cum Trago, ac scribit vocatque Allium sylvestre

primum *σικκωδὸν*, anguinum Allium, *wilderlauch*.

Matthioli in Dioscor. describit & figuram habet non multum dissimilem à Tragi vel Fuchfij figura, dicitque, in errore versantur Arabes & eos secuti, quòd pro Scordio Allium sylvestre, quod Græci *σικκωδὸν* vocant in pastillos theriacos addiderint, & in illius locum suffecerint.

Brassauolus falli deprehenditur libro suo de simplicium. Examine Romæ prius excuso, ubi sylvestre Allium ampeloprason, siue Scorodoprason appellari scribit: primum quod existimari Allium sylvestre Scorodoprasum vel Ampeloprasum esse. Deinde quòd crediderit Ampeloprasum & Scoroprasum vnam & eandem plantam esse.

Dodon. etiam huius figuram ex Trago vel Fuchfio habet quam non ritè describit, ac Allium sylvestre paruum vocat.

An Plant. icon. Allium sylvestre tenuifolium Teut. 195?

An Aduerf. Scorodoprason siue Allioporum, cuius descriptio manca & imperfecta.

Clus. in Pann. Allium seu Moly montanum purpureum elegantissimo flore.

Cordi descriptio conuenit cum planta picta & descripta à Clusio, licet videatur aliam intelligere Gesneras.


An Casp. Bauh. Allium 5. siue sphaericum minus, quod Ophioscorodi minoris nomine collegimus: An ab aliquo descriptum sit dubitamus.

Allium Sphærocephalum purpureum, pulcherrimum visu est, ubi floret. Florens reperimus iuxta castrum Bessfordianum mense Iulio, in eodem circa Montbelgarda in planicie *Bechem* versus *Audincurt*, in segetibus, vnde transtulimus in Hortum E.C. & olim, ni multum fallimur, Montspeli. Genecæ in vineis & segetibus: Frater C. Bauh. reperit in segetibus Baileæ. Allium in aruis spontè nascens in summo proceri caulis purpureos flores ostentat, colore & forma conspicuos, ac membrana ambiens spicas rubescit.

Corpus (vt Porta rattocinatur) in meliorem colorem mutat sanguinem emaculando.

Locus & tempus.

ALLIUM SPHÆROCEPHALUM bifolium italicum.



Vix sesquipedalis altitudinem adæquat. Radicula nititur obliqua, fibrata, alba, nullo tunnicarum foris conspicuo vestigio prædita. Coliculus rigidus & pro plantæ proportionem sic satis crassus, teresque surgit, atrouirès, binis foliis crassis & canaliculatis vestitus. In summo flores

Descriptio


gerit in glomunt congestos, eleganti purpura conspicuos, ex quibus staminula quaedam muscosa profluunt. Sapor Allii haud dissimilis. Parum adest, quin ipsam plantae magnitudinem & proportionem figura exprimat. Culturâ mutarum magnitudine obseruauimus.

Româ bulbillos aliquot ad nos importauit Cherlerus noster. Floret toto Maio in horto Ducis. Montbelg. quem colimus. Ingruente tandem aestu farscit donec planè euanciscat.

ALLII GENVS FORTE

Scorodoprasson alterum Lobelio.

Descriptio




Allii petraei. Vnde habuerimus hanc plantam non recordamur.

De hoc fortè Lobel. obs. Gracilioribus nucleis bulbis stipatur, membranis inuolutis atro flaventibus: flos & folia Allii exiliora: odor & sapor Scorodoprassii. Hoc in meis Italicis peregrinationibus in sportulas conieceram.

An Lobel. Scorodoprassum alterum. C. Baub. Phyt. Allium 4. siue Sphaericeum. 2.

ALLIUM PETRAEVM VMBELLIFERVM.

Descriptio



ralescente, quorum singula ex senis foliis componuntur, totidè apiculis saturationibus interdū pal-

lentibus, triquetrum in medio positū Consulū circumstantibus. Radix bulbosa, porracea, alba, tuberculis adnascētibz nouam bulborū sobolem profert, fibris longiusculis capillata: ac veluti repens, multum se multiplicat, plurimum affinitatis habet cum Allio nostro pratensi vmbellifero, de quo pōt.

Icon nostra quam sculptam cipimus demonstrat strigosas plantas loco sicciori erutas: hanc verò pingere existimamus Clusium Pann. & hinc in horto fortè cultam aut loco minùs strigoso collectā de qua sic scribit: Alii odore, tuberosa radice Allii siue Moly Narcissinis foliis 2. cui quina aut sena folia primi (siue nobis sequentis) foliis non minùs lata, sed breuiora, nonnihil sese contorquentia, viridia & splendētia, inter quæ pedale caule promit, superiore graciliorem, sed non minùs firmum, & striatum, qui in summo & ex membranea tunica promit multos flosculos in orbiculare ferè caput simul congestos, prioribus similes, sed elegantiore purpura nitentes: capitulis & semine superiori respondet: similiter & adnatis in circuitu non infelicis priore sese propagat. Illius etiam genū inuenitur longioribus & angustioribus foliis neque adeo conuolutis, cauliculis paulò infirmioribus, in reliquis factis conueniunt.

Allium Petraeum Gesnerus aliquando nobis denominauit cū perigrinaret cum eo in Rhætia Scorod. Petraeum. Inueniebamus tunc Burnii florentem Iunio, ab eo tempore vidimus Basileæ in horto D. Felicis Plateri, & in monte Paser Helueticorum, Frat. C. Baub. attulit Patauii nomine Ophioscorodi minoris. In horto Ill. E. C. vbi plantatum florebat Iulio, prouenit autem ex semine ab Ill. Landgrauio Guillelmo misso nomine Bulbi vomitori, folio anguloso. Hoc nobis præterea visum in Ducatus Wirtemb. vrbe in horto egregiū Pharm. Io. Lutz.

Gesn. horti. Porrum Petraeum in saxis circa Badam nascitur, nisi Allio potius cognatum sit. Hoc Allii montanum Petroscedon dixeris. Clus. in Pann. p. 222. Allium siue Moly Narcissinis foliis 2. Item Moly Narcissinum minus. An Camer. horto, Allium saxatile, Bulbus vomitori, Moly foliis Narcissi.

ALLIUM VMBELLIFERVM PRATENSE.



VDis pratensis. Generis ultra nomen Arue oriundum Allium vmbelliferum nobis dictum, radice nititur Porri sublonga, fibrata, alba, sed quæ ex bulbo radicem obliquam fibratam Valerianæ hortenensis radici aliquatenus similem producat, odore Allii: folia primū penè triangula, paulatim

Setina compressiora euadunt, cubito longiora, cauli aequalia, qui nudus, angulosus, in caput albicans oblongum desinens, eo dehiscente umbellam explicat alii vrsini umbellę similem, *flosculus* sex foliis apicibique compositis colore purpurascens: flores mensis Iunii principio.

Frater C. Battulic nobis nomine alii Plinii ex horto publico Patauino. Ei magna similitudo cum alio umbellifero Petro. Considerandum an fortę tantum eius variatio sit, ratione loci vel an idem cum alio siue Moly Narcissini foliis de quo Clus. Pann. & hist. post.


An Lobel. Obs. Moly foliis Narcissi, & Icon. pl. pag. 161. de quo ait: Alterum proceritate, & caule non ab simile: sed floribus caruleis, & foliis compressis, Narcissi similibus, & ferę paribus, oblongis, & albis radicis bulbis Porraceis simul implexis & coherentibus magno capitulorum stipatu: Allium odore preferentibus, cuius aliquot bulbos adhuc habemus munere Raphaëlis de Coxia, summę humanitatis & stirpiū magni admiratoris, qui non modō exoticarum stirpiū haud pœnitendum numerum, sed & eadem affabrę arguta manu, summęque artificio pictas, ut si quis alius apud Belgas, nobis dedit. Tabern. hist. Porrum *filu.* 2. & Icon. Porrum *filu.* 1. m. id. brislandy. Compil. Tabern. non describit: sed tantum ait Porrum *filu.* duplex: vñ foliis acutis: contrarium tamen est in eius figuris: quod enim acutis foliis est, latioribus est: erant multę diuersę notę si intelligit easdem quas nos intelligimus. Vna notabilis à flore umbellifero. Nōs existimamus ei incognitas illas plantas.

Gerard. Angl. Allium sylvestre *Crome Garz* hęc Allia syluestria *exi. odu. d. g. ex. Diof. 3. q. 10. l. ex. d. or.* Anguinum & Ceruinum Allium. Icon apud Gerardum est Tabern. Considerent Lectores an descriptio & nomina conueniant Iconi propositę, & an progenit planta quę per iconę demonstrata in plantis Mantelę dicta, & in *3. flington* prope Londinum.

Clus. Nascitur cum præcedenti in Leytenberg supra Manderstorf vbi tepidę sunt aquę quatum vñ multi valetudinem curant [præsertim calculo obnoxii,] & aliis montibus Vrbi Viennę vicinis.

ALLIUM SYLVESTRE PERPVSYLLVM iuncifolium moschatum.

ARidis, auctore Lobel. Ad. par. 2. Nitrobrigitum agri Monspelio vicinis collibus hic exiguus bulbus, conuictor & alumnus parili bulbo Hyacintho Autumnali. *Cauliculo* palmari, recto, rigidiusculo, exili: è cuius summo sex circiter erumpunt propagines, è quibus *flosculi* veluti in umbellam positi prodeunt, quinis aut senis foliolis constantes: paruis, angustis & oblongis, Ornithogali floribus similibus, acuminatis, lineis fuscis in medio per lōgitudinem interstinctis, Asphodeli albi instar: coloris albi obscurioris, staminibique in medio, Moschi planę odorem suauissimum spirantibus, præditis: quibus succedunt *capitula* rotunda in quibus tria vel quatuor triquetra, oblonga, nigraque *semina* continentur. Bulbi subunt parui, albi, oblongiusculi, Allii *sylu.* similes, ingrati que odoris. *Folia* emittit Iuncea, exiliora, tenuissima:



ALLIUM AFFINIS PSEUDOORCHIS
Monophylos.


Non incommodę forsitan, inquit Clusius hist. post. Pseudorchis appellari possit elegans plantula, quam ex Italia rediens obseruabat Anno 1593. eruditus vir Guliel. de Mera Barauus Medicus, & mihi Francofurti communicabat, paulō antę meum ex eā vrbe discessum. Habet verō illa vñicum *folium*, ex membranaceo quodam inuolucro prodiens, semuncialis latitudinis, duarum vñciarum aut amplioris longitudinis, multis venis secundum longitudinem excurrentibus, & medio neruo præditum, valdeque tenue, dum reliccatum est: ex eodem inuolucro prodit & *cauliculus* semipedalis, aut minor, gracilis, à medio ad summum fastigium, *flosculus* quibusdam onustus, quorum forma mihi ignota, quia siccam plantam duntaxat videre contigit, in qua inhærebant adhuc *flosculorum* petioli, & bina aut terna capitella, instar Capitulorum Orchididis: *radix* bulbosa est, aliquot membranaceis inuolucris recta, præter Orchidum naturam, sub quā multę tenues fibrę exeunt, ut in Allii generibus, cum quibus affinitatem quandam habere videretur, radicis ratione, cui plerumque adhuc inhæret superioris anni exsucca, & cauliculum retinens. Cū porro mediā quandam naturam habeat hęc planta, & peculiare caput non videretur requirere, Orchidibus subiiciendam esse existimaui. Per me tamen semper licebit aliis, quo velint loco reponere, & nomen illi imponere.

Descriptio

ALLIUM VRSINVM BIFOLIUM vernū syluaticum.

Allium Vrsinum *radice* oblonga Porri est, tenuiore, longis & frequētibz fibris, capillata, membrana mediocris crassitudinis inuoluta, Alliam redolente: à cuius imo statim exoriantur bina aut trina *filia* odore vehementi Allii, & gustu feruido, læto virore splendētia, striata, tenera, sesquipalmm longa, in acumen desinentia, duas vñcias lata, pediculo dodranali virente, qui post in membranā tenuem, lucidā striatamque faciens floris alteriusve vicini folii pediculum ad radicis vsque fibras vaginæ inq.

Descriptio



dum radiatis, quos constituunt folia sena oblonga mucronata, intra quæ stamina totidem alba, filulæque concolor, ex umbilico tribus tuberculis virentibus compacti. Solet autem cum florum tum foliorum pediculis simul omnes membrana eximia tenuitate pellucida, alba, striataque obuestire, quæ expansis floribus marcida decidit. Semen succedit trigeminum, rotundum.

Synon.

Est hoc *Allium Vrsinum* Cordo in Diosc. *Sylvestre Allium Ophioscorodon* appellatum. Germ. *Rampfen*, siue *Rampfen* & *Rampferen* / *Vrsinum* Plinio Eidem in hist. *Allium sylvestricum*: Germ. *waldknoblauch* / *Gerinsel*, hoc Tragus *Ophioscorodon* Dioscoridis esse putat: Aliqui *ursinum* cognominant, Figurâ Tragi appositâ. Brunf. figuram habet sub nomine *Allii sylvestris*, dicitque: Dioscorides meminit *Allii sylu.* Plinius *ursinum* vocat, pro quo exhibemus Helueticis [quod quidem Io. Agricola testatur] dictum *Rampferen* nominatur apud quosdam eorum *Allium agre-*

ste. Cæsalp. de pl. *Allium ursinum* vocatur, de quo Plinius, loquens, inquit: est & sylvestre, quod *Vrsinum* cognominant, odore molli, capite prætenui, foliis grandibus.

Harchio & Trago Germ. *waldknoblauch*. Otho Brunfels ait vocari *Rampferen* hoc est *Gerinsel* vocatur & *Schlangen knoblauch*: *Allium Colubrinum*, *Anguinum*, *Scorodoprasum* Diosc. lib. 2. c. 141. potest etiam esse *Aphroscorodon* Columellæ lib. 3. cap. 3. Serap. *Scordium*. In hist. lat. *Allium sylvestre waldknoblauch*.

Fuchl. *Allium sylvestre terrium*, quod *Vrsinum* cognominant: Germ. *waldknoblauch*. Item in icon. *Allium ursinum*, Angl. *Rammes* vel *Rampsepeti*. Matth. in post. Ital. comment. *Aglio orsino*, qui depingit: An Anguill. *Scorodoprasum* Bononiensibus *Aglio auentino* & *Vulpico*. Lonic. *waldknoblauch* / *Rampferen* / *Rampfen* / *Gerinsel*, *Ophioscorodon*, *Allium Colubrinum*, *Anguinum*, *Vrsinum*.

Ophioscorodon
Lonic.

Gesner. de col. stirp. *Allium ursinum*, de hortis, *Allium sylvestre bisolium*, *Allium Vrsinum*, hodie nonnullis hoc est *Arctoscorodon*. Dod. hist. Gall. *Allium 3.* *Allium Vrsinum* Neotericis: Gall. *Ail d'ours*. Belg. *Borsloef*. Videtur Diosc. *Scorodoprasum*, vel ut quidam putant *ampeloprasum*. Aduert. Lob. & Pen. sicut & Gerardo *Allium ur-*

sium: Abselin siue *Moly Hippocraticum*, Angl. *Rampfen*. Postea tamen quæcant, an sit *Allium Vrsinum*, Hippocr. *Moly*, cuiusmodi Galenus interpretatus videtur, haud certum est. Lobel. Obl. *Allium Vrsinum*. Germ. *Beerhunds knoblauch*. Ital. *Aglio de gli orsi*. Icon plant. pag. 158. *Allium Vrsinum latifolium*. Clus. histor. polt. Cum Victorialis longæ foliis magnam similitudinem habet *Allii Vrsini* folia, licet molliora & teneriora. Frequentissimum autem id est in omnibus Pannoniæ & Austriæ siluis, coniunctim plerumque nascens cum *Lilio conuallium*, siue *Oenanthe*, Austriacis, ut ante dixi *weisser baldrian* / *Vngar. Zent Georgi veraga*, hoc est, S. Georgii flos, dicta & *Gerings wyrag* à nonnullis, quod significat vnionis florem. C. Bauh. Phyt. *Allium 17.* siue *Vrsinum*. Sunt qui Diosc. *Scorodopr.* aut eius *ampeloprasum*, aut *Ophiosc.* sed male, censeant. Camer. apud Mat. Germ. & in horto, *Allium ursinum*, *Arctoscorodon* sylvestre flore albo. Quibusdam *Carnicum Porrum*.

Vidi Bononiæ in horto Cæsaris Odonis, ut & Patavii Martio mense in horto D. Bernardini Trevisani, Ferrariæ in horto S. Dominici à l'Angeli. Genevæ prorumpere incipiebant folia in horto meo in fine Martii; in principio Aprilis à *la Bastie* incipiebat florere. Basilicæ etiam observavi, & frater Casparus in *Munchstein* iuxta aquas: Inveni circa *Meseuani* & in itinere versus Cleremant & non longe à ponte Montbelgardensi *Vauiaucourt* ad sinistram in colle, vnde trāsuli in Hortum E. C. Laeti inditum, referente Brunfelsio, ipsum coagulare dicunt.

ALLIUM ALPINUM



Allo Alpino est obliqua nonnihil in longum bulbum desinens, multasque fibras perplexas emittens, involuitur multiplici cortice variis fibris transversim coarctibus, & quodammodo reticulato: singulis annis, auctore Clusio feliciter aliis bulbis circa ipsam adnatis se propagat, fibris adeo implicatis,

ut difficile sit bulbos coniunctim natos & coherentes seungere, huic emergit caulis cubitum altus, crassitudine minimi digiti, propter terram rubescens, enodis, lævis, superius viridis, striatus, fungosus, cui insident glomeratim congesti flores. Ceparum floribus similes, vnciam longioribus pediculis hærentes, candidi, è senis foliis singulis costantes, totidemque apicibus & stilo: quibus triquetra succedunt capitula, in quibus semina rotunda, pulla: folia duo aut tria vagina sua caulem complectuntur, formâ foliorum *Allii Vrsini*, nervosa,

uosa, sublonga, & lata, acuminata, sed maiora, rigidiora: Géciana maioris foliis penè similia vt non malè cenfer Clusius: Nostra icon quam iam sculptam eminus exprimit.

Lobel. & Pena Adu. Obs. & Icon. pl. 159. *Allium latifolium maculosum* siue *Serpentinum*. *Ophioscarodon*. Wirsung. Sigwurz: *Radix victorialis*. Clus. Pann. & hist. post. Copiosè nasci tradit in Durrenstein duobus supra Gainingam milliariibus, vbi montanis pastoribus. *Kaulauch* dicitur, quibus magno est in vsu, aduersus corrupti aëris, & nebularum exhalationes. Inueniri & in montibus, qui Bohemiam à Silesia determinant, vbi à Germanis *Sigwurz* appellatur, quia qui effodiendis metallis operam dant, magnas certâque illius vires, se experiri prædicant, ad sese muniendum aduersus impurorum spirituum insultus, à quibus frequenter impetuntur: vnde etiam *Victorialis* nomen ab effectu indium contendunt. Matthiol. *Allium angustum* vocatur. Iosias Simlerus *Allium alpinum* nuncupat, *Sigwurz* & *Sibenamforn* ab inuolucrorum, quibus tanquam reticulo radix inuoluitur, multitudine. Vulgus Herbariorum *Victorialis longa* aut maioris cognomen dedit vt à gladiolo discernant, cuius radicem ob corticis quo integitur, cum superiore similitudinem, *Victorialem* rotundam & parum appellat. Gesnerus, passim: *Allium Alpinum radice reticulata*, vulgò *Sigwurz* *Victoria radix*, superstitione quadam. *Victorialis longa*. Camer. in horto *Allium Alpinum: Victorialis mas & semina*. Mari folia multò sunt latiora, semina verò angustiora. Apud Matthiol. Germ. *Allium angustum, Victorialis longa*. C. Bauhin. Phyt. *Allium* 18. siue *Serpentinum foliis oblongis*, ea Lobel. suæ figuræ vt & Matthiol. non depingit: melior ergo Camer. & Lugd. Item *Allium* 19. siue *Serpentinum foliis rotundioribus*, siue *Alpinum mas* Camer. à nemine adhuc pictum. Pingit Porta *Allium Alpinum*, nomine alii angustini: considerandum autem an maculatus caulis, & an idem cum *Ophioscarodo*. Tabern. *Allium Alpinum, Victorialis mas*. Gerard. *Allium Alpinum latifolium* seu *Victorialis Brode leand montaine Garlich*.

Allium Alpinum collectum in horto veteris amici mei insignis Medici & professoris in Academia Argentinenf. D. Melchioris Sebitzii plarui Montbelgardi in horto Ill. E. C. vbi floret & semen fert. Geneuæ habebam in horto, aliarum ex montibus, folia protendebar in fine Martii. Basileæ vidi in horto D. Doct. Fælicis. D. Fridericus Meyer dedit mihi semina nomine *Victorialis longa* cum effem Argentina 1594. Heidelbergæ vidi in horto D. Sprengeri, audio non longè prouenire spontè.

Perhibetur teste Wirsung, radicè *Victorialis* collo perpetuò appensam arcere contractionem. Et, si Porta fides habenda, crematum vitiliginis, lentiginis, & sugillationibus valet. Galenus satiuo validius esse dixit, serpentes abigit odore, bestiarum omnium ictibus medetur: præcipuè hæmorrhoidibus. *Allium alpinum*, ait D. Balth. Hamelius pharm. se expertu sedare conuulsionis speciem, dictâ *frampff*: se porò intellexisse sedare dentium dolores.

MOLY VETERIBVS.

Moly, inquit Dioscor. *folia habet graminis similia*, sed quæ latiora ad terram sunt: *flores violæ albe similes*, lactei coloris, minores tamen, & cum violæ purpureæ floribus comparandos: *caulem album* longitudine quatuor cubitorum, in cuius cacumine est *alli speciem* referens quiddam: *Radix parua* est, bulbosa. Hæc valdè commoda est ad vteri apertiones, trita cum irino vnguento, & in pello apposita. Hæc descriptio, inquit Cornar. videtur esse veri illius Homerici *Moleos*, quod Mercurius Vlyssi contra Circes veneficia dedit: de quo ita Odyss. 10. poëta cecinit.

Sic factus diuulsam è terra porrigit herbam.

Mercurius, simul & naturam me docet huius.

Radix magna huic, sed lacti sors concolor

exit:

Moly vocant superi.

De hoc Plinius lib. 25. cap. 4. ita scribit. Clarissima herbarum est homero teste, quam à Diis vocantur *Moly*, & inuentionem eius Mercurio assignat, contraque summa veneficia demonstrat. Nasci eam hodie circa Pheneum, & in Cylleue Arcadiæ tradunt, specie illa Homericæ, radice rotunda, nigraque, magnitudine Cephæ, folio scillæ. Effodi autem difficulter. Græci autores florem eius luteum pinxere, quum Homerus candidum scripserit. Inueni è peritis herbarum Medicis, qui & in Italia nasci eam diceret, afferrique à Campaniæ vidi, aliquot diebus effosam inter difficiles saxæas, radicis triginta pedes longæ, ac ne sic quidem solidæ, sed abruptæ.

Plinius hæc partim ex Theophrasto [lib. 9. c. 19. inquit Tragus,] transcripsit, Cuius verba hæc sunt, Gaza interprete: *Moly* apud Pheneum existit, atque apud Cylleuem esse (quemadmodum Homerus dixit) affirmant: radice rotunda non absumili Cephæ, folio Scillæ. Vsum eius contra veneficia summum, non tamen effodi difficulter, vt ait Homer. Hæc Theophrast. Plinius tamen Homerum sequutus, eam difficulter effodi tradit. Nasci quoque Poëa, Homerum sectans, ait,

Pactifer huic florem dederat Cyllenius album,

Moly vocant superi nigra radice retentum.

At contra hos omnes Galenus *Moly* hoc non habet, sed Mylen appellat, & Dioscor. idem citans sic ait, Myle radix quæ bulbo paruo similis est, constringendi vim habet. Quare cum loliacea farina appositam ipsam vterum apertum sanare dicit Dioscorides. Hæc Galeni verba nullum alium Diosc. locum citant, quàm præsentem, quo de *Moly* agit. Nam & ipse radicem paruam bulbosam ei attribuit, & vim constringendi apertum vterum assignat, dum ait, *αὐτὴ σφίγγει τὴν ἀπὸ τοῦ ὑτέρος ἀναστυλαίνουσαν*. Non enim accipiendum est commodam esse ad aperiendos vteros, videlicet conclusos, velut à multis intellectum est, sed aduersus uteros apertos, vt scilicet constringatur ac concludantur. Est enim *συμπαγὴν ψυχρὰς ἀναστυλαίνουσαν*, vt Galeni verba clare habent. Atque ad hanc rem haud scio an non magis idonea sit farina loliacea, quam Galenus illi ammiscendam esse dicit, quàm vnguentum irinum, cum quo tritam illam Dioscor. in pello apponere iubet. Certè lolium in tertio ordine calefacit ac siccit, vt ad hiantem & apertum vterum non ineptum esse possit. Irinum autem vnguentum contrà mollit, & vteri conclusionibus conducit, & hæmorrhoides aperit, velut lib. 1.

c. 53. Diosc. docuit. Et tamen etiam sic idoneū videtur, vt radix cū ipso teratur, & in pello subdatur. Mihi itaque videtur omnino fieri potuisse, vt alterum pro altero, vel apud Diosc. vel apud Galenum, à Librario agnatum sit, & ob similitudinem suppositum. Sed cur Moly in Mylen Galenus mutarit, nulla mihi ratio succurrit: nisi & hic Librarii error putandus est. In hac autem diffinitione, facilius etiam ferendum est nobis Moly hoc in totum ignotum esse. Ad quem modum Clusius Hisp. ait: Moly quod Plinius in Italia nasci scribit mihi incognitum nec quenquam audire vel scribere memini, quise vidisse diceret.

Cæterum μάλη από τῆς μαλάνης ab amolien-
dis morbis, C. Bauh. dictum contendit.

MOLY DIOSCORIDIS PARVVM quibuldam.

Descriptio



aut Auellanae magnitudine, nigricantibus membranis involuta, intus candida, succulenta, calidiuscula & subingrato odore.


Synon.

Locus &
tempus.

Camer. apud Matth. *Moly*, cuius Matthiolus meminit. C. Bauh. Phyt. *Moly secundum* siue *minus*. Matth. in post. comment. Ital. *Moly* à Cortuso missum, vero ac legitimo. Diosc. *Moly*, similima planta: quod Gal. l. simpl. 7. *Myle* dicit. Hist. Lugdun. *Moly* Matthioli, idem prorsus opinatur, quod Clusius vidit Gadibus. Nascens hoc *Moly*, & initio Februarii flores proferens Gadibus, cā veteris urbis parte quæ in mare protenditur, eruebam, teste Clusio, non procul à sacello locum occupante, in quo Hercules templum fuisse ferunt *Moly* quod Dioscoridis dicitur vidimus Patrauii apud Iacobum Anton. Cortusium Nobilem Patavinum, & in horto publico Patavino: odorem habentia Allii: prorumpentia Ianuario & Februario: ab eo etiam semina accepimus: Visum etiam à nobis florens mense Aprilis Bononiæ in horto Nobilis d. Gonzadini. Semina accepi Sturgardiæ ex horto Ill. C. V. Viri. ferenda Montbelg.

MOLY MINVS FLORE orbiculato maiore.

Moly Dioscoridis antè dicto valde simile illud, inquit Clus. hist. post. *Moly minus*,



sed angustiora *folia* assurgebat: *radix* erat rotunda, candicans, nucis ponticæ magnitudine, albicantibus fibris prædita. Vnde habuisset ignorabat, sed semine peregrè accepto sibi natam eam plantam augurabatur.

MOLY THEOPHR. MAGNVM



summitate, quasi ex umbella, gerit stellatos, albos, ex longiusculis pediculis, quos excipiunt capitula triquetra *semen* continentia nigrū, Ceparum semini simile. Addit Clusius iuxta caulem inter folia alius plerumque exit cauliculus planus & foliaceus, seu verius folium summo veluti Allii nucleum gerens, initio candicantem, deinde pallefcentem, qui, terra exceptus, germinat, & eiusdem generis plantam profert.



Anguill. vt existimat, *Moly* Theophr. & non Diosc. Adu. Lob. & Pen. An hic flos dicatur *Moly* liliflorum Homericum fortè? Obf. & Ic. Pl. *Moly* liliflorum bulbum in lilio gerens Theophr. & Homericum fortè. Videant lectores & pendant an flos ritè describatur. Differt à Diosc. *Moly* quod Theophr. lib. 9. cap. 15. & post eum Plinius lib. 25. cap. 4. ex Homero descriperunt. *Moly* Hom.

quod Moerkerca Flag. Desdrorum in cultissimo suo horto alebat de Dranoutre, Moerkerken, &c. *Caulis* eius palmatis, vitidis, denos aut plures sustinet flores 6. niueis foliolis, non mucronatis, ut superioris, sed orbiculatis & maioribus constantibus, semis in medio staminulis, inter bina porracea quodammodo,

Hometicum, cuius Theophrast. & post eum Plinius meminere: radicem negat (teste Clusio) Theophr. difficulter effodi vt Homerus tradit. C.B. Phyt. Moly. siue *Maium*. Hoc Theophrast. est Moly fortè & Plinii radice rotunda. Sunt qui velint Scillæ genus esse quod Pancratiū Diosc.

Moly quod Theophrasti quibusdam dicitur, primò succum vidimus apud Cort. Nob. Patauinum, postea virens in eiusdem horto & siccā plantam quis videns Allii magnum genus dixisset.] obseruauimus ferè florens menſe Aprilis Bononiæ in horto Nobil. di Gonzadinis & S. Saluatoris al burgo di S. Catharina, praterea in horto publico Patauino. Bosileæ quoque in horto D. Felicis Plateri Florentem Maio. A Sprengero accepi Heidelbergæ semen Moly maximi quod Montbelg. factum in horto Ill. E. C. Alitur hoc apud nos (inquit Clusius) in hortis ab herbariæ rei studiosis, & Maio menſe floret.

MOLY INDICVM SIVE CAUCAFON.



MOLY Theoph. foliis & reliqua formā simile, nunquā flores apud me, neque apud multos alios protulit: sed eorum loco caulis pedalis, ferè planus, adeò infirmus, vt, nisi aliquo fulciatur adminiculo, attrolli non possit, summo fastigio conglomeratum caput fert, multis veluti Allii spicis mespili vulgaris magnitudine constans, initio viridibus, deinde pallescentibus, quæ etiam in terra non repositæ, germinant, telluri tamen commissæ, in maiores bulbos adoleſcunt, foliisque & caules (non tamè singulis annis,) producunt: radix, vt alterius, cepacea, rotunda, alba, multis tunicis ami-

ta, quarum externa fusca, vetustate sese separans, & in alios bulbos pangens. Aiunt apud nos (inquit Clus. Hist. & hist. post. herbariæ rei studiosi aliud quoque Moly genus, quod Indicum

Tom. II.

vocant (alii barbaro nomine *Caucasum*), quoniā ex India primū in Hispanias perlatum esse ferunt, & inde ad Italos transiisse, ab illis certè Belgæ acceperunt. Lob. Obs. *Caucasum*, Moly Indicum vocatum quod nos Luteriæ vidisse neminus in horto Castellani, summo caule bulbulos sphærico pericarpio membranaceo inclusos gerebat: qui depacti faciliè propagantur. Folia bulbos & reliqua, cum Moly Liliflore siue Theophrasti similia. Suspiciamus nos Lobelio non benè notum Moly Indicum, id quod verisimile apparebit consideranti eius descriptionem & iconem quam hic proponimus primo loco, si quis conferat cum descriptionibus & iconibus Clusii & Imperati cuius iconem proponimus addito folio ex icone Clusii. Casp. Bauh. Phyt. Moly 4. siue Indicum. Ferd. Imper. Moly Indici & Caucasum nomine demonstratā planta, species est bulbi, cui parui bulbuli sunt pro flore & semine, singuli singulos habentes folliculos.

Crescit Constantinopoli, Vietnamque adferri vidit, (dum istic viuēbat) Clusius, Zumbul Arabi bulbis permixtum: & inde fortitan, etiam in Italiam: a D. tamen viro Ferd. Luper. intelligebat, Neapolitano regno spontè nasci.

BVLBVS ESCULENTVS VETERIBVS

HVC vsque prosequuti sumus culinariorum bulborum historiam, græciœ nam quippe, Caparum, Porrorum, & Alliorum, quibus succedunt bulbi suauem gratū nque odorem spirantes, qui & ipsi esculenti & non-esculenti.

Theophrast. lib. 7. cap. 13. autore, Bulborum plura esse genera manifestat. Magnitudine siquidem, colore, figura, & sapore differunt. Alicubi enim adeò dulces nascuntur, vt per se sine condimento alio edantur, quales in Taurica Cherroneſo. Et paulò inferius. Quam & bulbosa plura, nec iis [lanigeris herbis] pauciora notare licet: Leucoion (Violam albam, Gaza) Bulbium, Pytion [Opitionem Gaza] Coicen [videtur legendum non *videtur* vt Gaza] & Silyrinchium quodammodo, quæ quidem redigi ad bulborum genus desiderant, quod radice orbiculentur. Nam colore quidem penitus discrepant, cædent enim, nec squamis constant. Quæ sic reddidit Plinius: Bulborum genera differunt colore, magnitudine, suauitate: quippe quum quidam erudi mandantur, vt in Cherroneſo Taurica. Et paulò post: Genera Græci hæc fecerunt, bulbinem, sitanion, pyton, acrocotion, argilopa, Silyrinchium. In hoc mirum, imas eius radices crescere hyeme: verno autem quum apparuit Viola, minui ac contrahi. Tum deinde bulbum pinguescere, inquit Cornar. & Theophrast. Apparet locos esse corruptos. Nec idem, nec eodem modo dicunt. Idem tamen Plinius eodem loco Catonem Megaricos bulbos maxime celebrare ait. Post illos in Taurica Cherroneſo naros ipse probat. Post hos, inquit, in Africa nati maxime laudantur, mox Apuli.

Sed hic obseruandum est, duo Bulbos propriè appellari, Esculentum scilicet & Vomitorium, Verum generaliter omnes Olerum radices, quæ similitudinem ad bulbos habent, bulbos appellari. Sic Cels. lib. 2. cap. 18. Ex oleribus valentiora Rapa Napique & omnes bulbi, in quibus Cepam quoque & Allium numero.

Quoad Bulbum satium, etſi ab annis 28. ma-

Bbb 2

gno labore perquisierint, Turnerus in Anglia, Germania, & Italia nusquam tamen inuenit, neque ex Recentioribus aliquem legit, qui vidisse se dicat, excepto Amato Lusitano, cui tamen reuera ignotus fuit perinde ac mihi vel Matthiolo. Cepam paruum, Hetruscis *Cipolla maligia*, Romæ verò Alcaloniam dictam Bulbi esculenti speciem esse volunt quidam: Sed Amati, Lacuna, & Matthioli iudicio falluntur: Eorumque error manifestè deprehenditur ex Theophrasto qui Alcalonium fuisseque Cepe inter Ceparum genera libro 8. cap. 4. de plantarum historia recensuit, non autem inter Bulbos, de quibus speciatim disseruit lib. 7. cap. 13.

Amarus.

Sunt etiam qui Hyacinthum comosum in Bulborum esculentorum classe ponant, sed eorum sententiam probare non possum. Huius vires Diosc. in hunc modum prosequitur, Bulbus esculentus (*Scilla bulbifera*) quem edimus omnibus notus, stomacho commodus, itemque aluo, fuluus, & qui à Libya affertur. Verum amarus, & Scilla similis, stomacho commodior & concoctionem adiuvat. Omnes autem bulbi acres sunt, & calefaciunt, & ad Venerem concitant. Quare Martialis Poeta in Xenii;

*Scilla
mili.
Acer.*

Quum sit amarus coniunx, & sine tibi mortua membra,

Nil aliud bulbis quam satur esse potes.

Exasperant linguam & Tonsillas, multum nutriunt, carnes gignunt, inflationes faciunt. Idem impositi faciunt ad luxata, contusa, spicula infixa, & ad articulorum dolores, gangrænasque ac podagras, cum melle & per se. Item ad hydropticorum tumores, & canum morsus, similiter cum melle & Piper trito impositi. Cohibent etiam sudores, & stomachi dolores sedant, & furfures ac vlcera capitis manantia, cum nitro assato detergunt. Purgant & sugillata & varos, per se & cum oui vitello: & lentigines cum melle aut aceto. Contusas aures & contusos vngues cum polenta sanant. Auferunt etiam ficus, in calido cinere assati, & cum mænaram capitibus vltis. Vlti verò & cum Alcionio permixti ac in Sole illiti, maculas Solares & cicatrices nigras depurgant. Si verò cum aceto cocti edantur, ad rupta faciunt. Ceterum copiosum ipsorum esum vitare oportet, eo quod in tuos ledant. I hinc Ouidius.

Damnus an Libycis bulbus tibi missus ab oris.

An veniat Megaris, noxius omnis erit.

*Galen. Bul-
bi tempera-
mentum.*

Marcellus Medicus empiricus. Veretrum inquit cap. 12. id est bulbus, quod est genus Cepe, in aceto decoquitur, idque acetum ore continetur, ut mobilitas dentium sistatur. Ceterò ut Diosc. reiectanca perhibent. Cum polenta & adipe suillo coctus, appositus, tumores & tubercula compendio suppurat & rumpit. Bulbum cibarium velut omnibus notum, non descripsit Diosc. inquit Corn. fuluum esse, & à Libya affertur: dixisse contentus, & alterum amarum esse, & Scilla similem. Nec Galenus sexto Simpl. phar. aliud dixit, quàm bulbum qui editur, frigidiorum esse & crassiorum, & viscosum humorem gignere. Nā & ægrè concoquitur, inquit, & flatuosus est, ac venerem stimulat. Impositus autem, eo quod amaritudinis & adstringendi facultatis particeps est, adstringit & glutinat, & nimium siccatur. Idem 2. de aliment. Editur, inquit, bulborum radix absque foliis, in vere aliquando etiam asparagus. Habet autem in seipso amaram & austeram vim manifestam. Quare etiam stomachum exolutum quodammodo excitat ad appetentiam. Nec aduertatur his qui ex thorace & pulmone

expuitione opus habent, etiam si naturam corporis crassiorum & viscosiorum habeant. Verum amaritudo resistit crassitudini; ut cuius natura est secare viscosa ac crassa. Vires bulborum diligenter præscribit Plin. lib. 20. cap. 10. Ceterum bulbi ex aceto & sulphure vulneribus in facie medentur. Per se verò tritici nemorum contractioni, & ex vino porrigini: cum melle canum moribus. Erassitrato placet cum pice. Sanguinem idem eos sistere tradit illitos cum melle. Alij si è naribus fluat, coriandrum & farinam adijciunt. Theodorus & lichenas ex aceto bulbis curat, & erumpentia in capite cum vino austero aut ouo. Et bulbos epiphoris idem illinit, & sic hippitudini medetur. Equè vitia quæ sunt in facie, eorum rubentes maximè, in Sole illiti, cum melle & nitro emendant: lentiginem cum vino, aut cucumi cocto. Vulneribus quoque mixte profunt per se, aut (ut Damion) ex mulso, si quinto die soluantur. Idem & auricular fractas curat, & testium pituitas. In articulorum doloribus miscunt farinam. In vino cocti illiti ventri, diuturni præcordiorum emolliunt. Dysentericis in vino ex aqua cælesti temperato dantur. Ad conuulsam intus, cum silphio pilulis fabæ magnitudine. Ad sudorem rufi illinuntur. Nervis viles: ideo & paralyticis dantur. Luxata in pedibus, qui sunt rufi ex his, citissimè sanant cum melle & sale. Venerem maximè Megarici stimulant. Hortenses partum cum sapa aut passo sumpti. Sylvestres interaneorum plagas & vitia cum silphio pilulis deuoratis sedant, & fatiuorum semen contra phalangia bibitur in vino. Ipsi ex aceto illinuntur contra serpentium ictus. Semen Antiqui bibendum insanientibus dabant. Diocles oculos hebetari ab iis putat. Elixos affis minus viles esse adiciit, & difficile concoqui, ex vi vniuersalique naturæ.

BVLBVS VOMITORIVS Veteribus.

AT qui ab effectu, Vomitorius Bulbus vocatur, folia habet, inquit Diosc. multò lentiora quàm Esculentus. Radicem autem similem, cortice nigro. Qualis autè herba vomitoria sit Bulbus hodie non cuius nori ait cum Cordo Turnerus: nonnulli verò eundem censent cum radice Narcissi de quo Dioscorid. lib. 4. cap. 155.

Radix si edatur per se, & si decoctum ipsius bibatur, vesicæ affectiones sanat, & vomitum mouet, inquit idem Dioscorides.

Nec miremur cum Marantha Bulbum vomitorium in cibo sumptum vesicæ malis mederi: namque id quod Græci est *ἀντιέμελον* ab *ἀντί* & *έμελον* Ruellius vertit, ea radix mansa: cum potius esset sic vertendum, Hæc per se comedatur, vel, ut Marcellus, quæ in cibo sumpta: eadem confusio est in Scandice, in Ornithogalo & multis aliis, quæ mandari ait Ruellius: cum potius edi vel in cibo sumi dicendū esset. Verum cum familiare quodammodo sit Plinio, ut hoc verbo mandari vtatur pro eo quod est edere, ut in Bulbo vomitorio cuius radicem mandari ait 1. 19. c. 5. voluit Ruellius magis esse cum Plinio confusum quàm per se ipse distinctum. Galenus de hoc testatur, ipsum multò calidiorem esse esculento.

* * * *

HYACINTHI HISTORIA EX VETERVM
Sententia.

HYacinthus ait Diof. *folia* habet bulbo similia: *caulem* palmi altitudine, laeum, & paruo digito tenuiorem, viridem: cui iacumbit coma incurua purpureo, flore plena: radicem etiam ipsam bulbo similem.

Plin. lib. 22. cap. 11. Verno flores prout citò aut seriùs proueniunt, recensens, etiam Hyacinthi meminit. Post hanc Gladiol^o comitatus hyacinthis inquit. Et mox, Hyacinthus maximè durat. Et hæc ex Theoph. lib. 6. Hist. stirp. transcripsit (inquit Cornar.) Sed paulò post de sito addit. Hyacinthum comitatur fabula duplex, luctum præferens eius, quem Apollo dilexerat: aut ex Aiaceis cruore editi ita discurrentibus venis, vt Græcorum literarum figura, *ω*, legatur inscripta. Hanc autem duplicem fabulam Ouidius Poëta in vnam contraxit, & *ω*, literarum figuram non Aiaceis referre dicit, sed apollonis luctum. Sed atrescente Corn Hyacinthum plantam, Ouidius non aliam esse censet, quàm eam quæ à nostris Braune lilien appellatur, id est, lilium purpurei. Et sanè tota Hyacinthi descriptio in Diof. neque in foliis, neque in caule, neque flore, neque radice, ab illo purpureo appellato Lilio ab horret. Itaque etiam Virgilio suaue rubens Hyacinthus dicitur, & mollis ab eodem appellatur, Nouit idem etiam, & in quæstionem proponit, literarum in Hyacintho figuras, dum in Palæmone sic ait.

*Dic quibus in terris inscripti nomina regum
Nascantur flores.*

Et de hoc Hyacintho Plin. l. 22. cap. 26. sic tradit: Hyacinthus in Gallia eximie prouenit. Hoc tibi pro cocco hyssinum tingitur. Radix est bulbacea, mangonicis venalitiis pulchrè nota.

Quum autem Hyacinthum etiam *Vacinium* appellari, in suppol. apud Diof. cor. legatur: & aliquibus Vaciui vox, ex Hyacintho facta esse videatur, id quod Plinius de Vaciniis lib. 16. cap. 18. tradit, planè ad Hyacinthum pertinet, & locum illum, quem iam citauimus de Hyacinthi in Gallia tinctura, exponit, quapropter huc transferimus: Vacinia, inquit, Italix in aucupis fata prouenit. Gallix verò etiam purpurea tingendi causa, ad seruorum vestes. Vult enim Plinius Vacinia quæstus gratiæ feri in Italia. Sic enim ego hunc locum accipio, etiam Plinius non aperte Vacinium esse Hyacinthum dixit. Esse autem Hyacinthi syluestrem & satiuum, Theophrast. testatur his verbis: *ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ ἐν τοῖς πεδίοις καὶ ἐν τοῖς ἀγροῖς καὶ ἐν τοῖς κήποις*. Quin & Verg. dum ait,

Et nigra Violæ sunt, & Vacinia nigra.

Et alibi,

Alba Ligustra cadunt, Vacinia nigra leguntur.

Et rursus,


Mollia luteola pingit Vacinia caltha.

Non de aliis Vaciniis loquitur, quàm de iis quæ & Hyacinthorum nomine veniunt. Nigra autem dixit purpurea, sicut Violæ purpureæ, appellantur nigrae. Atque sic modò hyacinthi appellatione vitur, modò Vaciniorum, pro eadem plāta. Sicut quoque Plinius eundem vsum ad tingendum, modò Vaciniis, modò hyacintho adscripsit, diuersis appellationibus in eadem re usus, tamen tota hyacinthi descriptio in Diof. purpureo huic Lilio velut dixi, respondeat: tamè scio alios aliud hyacinthi genus agnoscere, quod nostri *Mergblumen*/ id est, Martios flores vocant. Tom. II.

cant, in multa genera distinctos. His itaque nō repugno, sed quæ ego, produxi simul expendenda citra contentione propono.

Constat igitur ex Cornario, Hyacinthū Diof., Theoph. Plinii, Ouidii, Vergilii & Galeni Braune lilien Lilium purpureum esse.

Radix cum vino albo pueris imposita, autore Vires Diof. impuberes seruare creditur. Siste autē aluum, & vrinam ducit pora. Opitulatur quoque commorū à phalagio. At semen maiore adstringendi prædictum, & ipsū in theriaca medicamenta aduersus venenatas bestias commodum est. Morbum regium quoque depurgat cum vino porum. Galen. simpl. hyacinthi radix bulbi speciem præferens, ordinis primi est in siccando, secundi in frigefaciendo iam completi; aut etiam tertii initio. Proinde diutissime impuberes pueros asservare creditur imposita cum vino. Semen leniter extergit & adstringit. Quare etiam in morbo regio datur cum vino, siccans iam tertio ordine, sed in caliditatis & frigiditatis medio consistens. Radix ex Plinio in vino dulci illita, pubertatem coërcet, & non patitur erumpere. Tormentibus & araneorum moribus resistit. Vrinam impellit. Contra serpentes & scorpiones, morbumque regium, semen eius cum Abrotono datur. Et hæc partim etiam Diof. habet.

HYACINTHVS VERNVS BOTRYOIDES
minor, cæruleus, angustioribus
foliis, odoratus.

BVLBVS Descriptio

Bhuic qualis Hyacintho stellati vulgato, oblongus, fibris multis capillatus, tunicis compactus, sapore viscido & amaro: *folia* tenera, nouena, densa, lancea, carinata, striata, viridia, propter terræ purpurascētia, *caule* palmo nonnūquam longiora: *caulis* v-nus, interdum duo, dodran-

tales, teretes, laues, propterque terram, vt folia, rubescentes, per reliquum herbaceo colore præditi, excepto scapo saturo cæruleo tincto, qui flores sustinet ex breuibz pediculis in racemum duas uncias longum congestos, odoratos, in vrceoli modum concauos, deorsum nutantes, purpureo violaceos, oris albidis, crenatis: quorum qui extrinsecus botrum claudunt longè minores, dilutior purpurâ infecti, nullâ tamen albedine oras picti, non ita mutant: sed vel surrecti, vel rectâ foras protensi coma explicata subiectos flores inumbrant. Serius hic floret quàm Botryodes, qui mox sequitur.

De hoc & similibus scribit Clusius Pann. & post. hist. Spontè plerisque Pannoniæ locis & copiosè nascitur Hyacinthus ille Hispaniis & Gallix Narbonensî vulgaris & passim obuius in a-

grorum marginibus & secundum vias, quem ego a floribus racemi in modum extremo caule congestis *Erryodism* cognomino, nonnulli comosum minorem appellare malunt: nec desunt qui Bulbinem Plinii esse putent: Herm. hunda fnoz blauch/id est, caninum Allium: Belgæ à racemi instar congesta florum spica draynetens appellant. Eius duo inveniuntur genera vnum crassioribus, longioribusque foliis, florum etiam, racemo longiore, deniore, & odoratior; alterum minora omnia habet, & magis vulgare est. Istorum duorum generum flores saturum admodum colorem habent, & quasi nigrum. Est verò & tertium genus brevioribus, latioribus, firmioribusque foliis quæ humi diffundi non solent, nec flexuosa sunt ut superiorum, sed surrecta: huius flores licet superioribus formâ similes, longè tamen aspectu hilariores, dilutioris purpure, atque in caruleum tendentis colore præditi sunt. Id genus Viennæ, aut vicinis locis spontè non nascitur, sed ex Tyrolensi comitatu delatum esse fertur. Similes porro omnino plantæ non modò Viennæ, sed etiam antè in Belgicâ è semine Hyacinthi botryoidis, lacteo atque è niuco purpurascence flore (binæ eius enim inveniuntur differentie) natæ sunt: & inter illas etiam quæ ramosam tulerunt florum Vuam, hoc est, quæ Vuæ in modum plures congestos habuerunt racemulos, alios aliis minores & graciliores: quibus similes plantas semine albi a me communicati natus habuit plures quàm quadragenas Ill. Balthasar de Bathyan in Zolonocho sub Martii finem florentes, Anno 1585.

A Dodon. hist. lat. de fl. & in fol. dicitur *Hyacinthus racemosus* & inter Neotericos. i. folia quasi rotunda: flores colore caruleo, alias diluto, alias saturato: subinde candido, aut ex albedo dilutè admodum purpurascences: Hyacinthum Botryoidem nonnulli cognominant. Ex esculentorum bulborum genere aliquo esse videtur. &c. Verùm hoc notandum, Dodon. non distinguere Hyacinthum odoratū ab inodoro, sicut à Fuschio exhibito, de candido & albedo postea agemus.

Lobel. & pen. Adu. *Hyacinthus comosus minor*, Quidam Bulbinum Plinii veriorum autumâr: vulgus Provincialium *Barrilitz* vocat, quasi lagenu-las: foliis iuncea. Addit in obs. dici quoque *Bulbum esulentum*, *Hyacinthum silu. Cordi*. *Hyacinthum exiguum Tragi*. *Hyacinthum Botryoidem Herbariorum*. Item Ic. Pl. p. 107. *Hyacinthum Botryoidem vulgarem*. Et pag. 108. *Hyacinthum caruleum amœnum*. Nos Hyacinthum siluestrem Cordi non dixerimus, sicuti Gesnerus, ut & Dod. aliter sentiunt. Nec etiam cum Lobel. sentimus, hunc Hyacinthum eundem esse cum Hyacintho exiguo Tragi.

Tabern. icon. p. 625. tres Hyacinthos tradit, quorum primus depingitur nomine Hyacinthi carulei minoris flem blaw *Merzen blumen*, Alter p. 628. titulo Hyacinthi botryoidis incarnati leibfarb *trauben hyacinth*: Tertius his verbis, *Hyacinthus botryoides caruleus maior Groß veyel braun trauben hyacinth*. Item forte fortuna potest ut his Tabernæ figuris aliqua conveniat Hyacintho Botryoidi inodoro, id tamen asserere non ausim, peritiores de istis iudicent, siquidem Compiler non describit nec distinguit.

Gerard. cæcus, cæci ducis Tabernæ tres figuras ponit: Quarum prima *Hyacinthus Botryoides caruleus Blaw Grape flower*. Altera *Hyacinthus Botryoides caruleus maior, Cerat Grape flower*. Tertia *Hyacinthus botryoides caruleus amœnus*,

Et sic coloured Grape flower.

Camer. horto *Hyacinthus botryoides odoratus Pruni odorem referens maior*.

C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus 22. racemosus maior caruleus Botryoides Clusii, Caruleus amœnus Lobelio*. Item *Hyacinthus 24. siue racemosus minor angustifolius primus Trago*. *Bulbine*. Gesnero. *Hyacinth. vulgi* Lob. quibusdam *Bulbus coronarius* Theophr. 6. histor. pl. Variat floris colore caruleo diluto, saturato, candido, exalbido, dilutè purpurascence seu incarnato. Camer. & frater C. Bauh. hac in re longius à nobis recedunt, & à verò declinant. Sunt enim occasiones cur Tragi Hyacinthum & Bulbinem Gesneri huc nò referendū censemus, sed ad Hyacinthum inodorum. Si Hyacinthus de quo hic agitur, solo colore ita variat cur non demonstrant: Scimus Dodonæum scribentem de hoc Hyacintho meminisse diuersorum colorum, verum in comprehendit alias species quæ sub aliis titulis traduntur.

Plurisque Italiæ, Germ. Galliæ, ac etiam Hispaniæ locis (experientia Dodon. ad stipulante) hic Bulbus exit: reperitur & in Belgio in atrebatum ac Martinorum finibus, in syluis ac nemoribus: Folia eius qui ex Hispania in Belgiū allatus est, ante hyemem exeunt, Germanici verò ac Belgici non ante ver: flores Martio vigent aut Aprilii. Hyacinthum botryoidem minorem caruleum foliis angustis & longioribus habeo in horto E. C. Montbelg. à me plantatum, qui tardius floret sequenti & diutius, ac ita se multiplicat ut tandem molestus sit: non differt meo iudicio ab eo qui Monspelij passim provenit, florètque. Lugduni in agris spontaneum vidi florèttem Maio ac etiam Patauij, & in montibus Appenninis siue Bononiensibus, nec non Basileæ in hortis. Repertus etiam ad Castellum Sponeck Illust. E. VV. iuxta Rhenum, vnde in prædictum delatus hortum.

HYACINTHVS BOTRYOIDES, vernus: minor, latifolius, caruleus, inodorus.



Planta est
scilicet
maris, radice
bulbosa, fibro-
sa; sapore ut
piceæ amar-
ro & lero: folia
propter lina-
aut terna
striata, carina-
taque interdū
& potiss. pri-
mo proveniēs
non multum
latiora, quàm
iam dicti, sed
multò breviora,
sæpe potiss.
culca & vbi a-
doleuit latio-
ra, qualia figu-
ra nostra Fu-

chiana demonstrat, nec caulis altitudinem attingentia: caulis singularis, tenuis, scilicet palmarum altus: flores sustinet racematum congestos ut super-

Lobel. nota-
tur.

ior,

rior, sed non ut illa, odoratos, rariore, breuiore, minores, magisque ventriosos, oris similiter arenatis coloratissime.

An Cordo Obs. *Hyacinthus minor globosus*, concauis, purpureis, deorsum nutantibus, & gibbosam comam constituentibus floribus in caule dodrantali breuiore: foliis porro multo minoribus, radice bulbosa: floret post Veris initium. Nascitur copiosiss. in Alpium Suevicarum planis pratis, in Hassia & Wederauia.

Trag. germ. lib. 2. cap. 71. vocatur. Ein and Knoblauch / *Hyacinthus vernalis*, Klein hunde Knoblauch / Klein hyacinth. Et cap. 79. Klein frülenggen hyacinth / Et hist. lav. *Allii genus aliud, agro V. maritimo valde familiare* &c. qui ad Rhenum habitant hunde zwibel vocant. Et *Hyacinthus vernus exiguus: anni odore destitutus: simine nigro.*

Fuchsius hist. *Hyacinthus cæruleus maior* femina, Groß blae merzen blum weible: qui nō describit nec distinguit exacte hunc *Hyacinthū* ab aliis.

Dodon. Gal. Bulbi esculenti genus minus, *Pecit bulbe de cardin*, fecit, figuramque Fuchsi exhibuit; qualis nostra. In postremis verbō scriptis hunc non videtur distinguere à præcedenti, vti dictum.

Gesner. horti *Bulbine* flore cæruleo.

Clus. in Pann. & post. hist. *Hyacinthus borcyoides*, tertius breuioribus latioribusque foliis & firmioribus, quæ humi diffundi non solent, sed erecta sunt: flores aspectu elegantes, dilutioris purpureæ, atque in cæruleum tendente colore præditi sunt. Id genus ex Tyrolensi comitatu delatum esse fertur.

Camer. horti *Hyacinthus botryoides* alter minor inodorus, cæruleo, incarnato & albo flore. Sic ne? Camerariōne vnum? *Hyacinthus albus & cæruleus*. Nos quidem cæruleum ab albo separamus, de quo postea.

C. Bauhin. phyt. *Hyacinthus 23. siue racemosus minor latifolius cæruleus* femina Fuchsi. Item *Hyacinthus 25. siue racemosus latifolius* floribus dilute purpureæ, *Botryoides* tertius Clusio, incarnatus Tabern. Nos quoque Clusii & Fuchsi eundem *Hyacinthum* facimus.

Hyacinthus minimus vernus Botryoides cæruleus. Montb. provenit sponte, transfusi in hort. C. W. citius floret præcedenti, folia etiam non reuinet tam diu. Geneuæ idem fortè in segetibus ultra pontem *Arue* floret Aprilis. Ludit hic *Hyacinthus* foliis quæ interdum latiora, potiss. vbi adultiora & culta: folio lato ex hortis Basil. misit Fr. C. Bauhinus.

HYACINTHVS BOTRYOIDES ALBUS.

Hyacinthus Botryoides albus ex bulbo mediocriter magno & fibroso, albo, tunicis compacto, gultu nonnihil viscido, subacri, tandem & subamaro, folia profert quaternaria palmaria aut paulo maiora, latiuscula, carinata, herbaceo colore virentia, in quorum medio statim à radice surgit, Cauliculus palmari raro maior, teres, lauis, ex viridi luteolus, florem sustinens, nonnihil odoratum, in racemi morem congestum, ex flosculis multis rotundis, candidis, formâ flori Ericæ, terram spectantibus, leuiter deductis oris in sex labella extrorsum reflexa diuisis, ex brevissimis albis pediculis: in medio fena flami-

nula exalbida, breuia, cum stilo viridi, vix in conspectum venientia.

Clus. in Pann. & hist. *Hyacinthus borcyoides* lacteo flore, à superioribus flori formâ non differt, sunt. n. concaui & tumetes, nulla tamen, vel per quam exigua odoris gratiâ commendabiles. Is etiam in duas species distingui potest. Vna enim lacteum omnino florem habet, caulem exalbida, foliaque dilutius virentia, & quasi pallidiflora: tota etiam planta tenerior, nec nisi primo vere, folia protrudit. Alterius flos niueo quidem colore præditus est, sed cui perfusa videatur tenuis quædam & dilutissima purpura, qualis in flos albis nondum planè expanitis, præsertim circa vngues: hæc vetustate & marcescente flore



interior redditur: caulis è viridi purpureo, folia viridiora sūt, & infima parte quodammodo purpureascentia.

Omnium femina in triangulis quibuldam vaticulis continentur, rotunda, nigra, exigua: omni vni etiam radix plurimos exiguos nucleos in ambitu generare solet, nulla tamen

abundantiùs quàm duorum priorum. Florent vè plurimum Aprilis, interdum etiam Maio, si Verum tempus ob præcedentis hiemis asperitatem ferius incipiat. Lactei prior species olim nobis communicata à C. V. Alphonsio Pontio, memini in Baldo monte erutam à Studiosis quibusdam ex Italia reducibus Viennam adferri: Altera ab amplissimo V. Cortuso Dipsadi albi nomine in Belgicam missa.

An Cordo obs. *Hyacinthus minor candidus*, minori purpureo similis, maior paulò nascitur in Hassia & Wederauia, sed parcius quàm purpureus.

Lobel. Obs. pag. 55. *Dipsadi candidus floribus varietas gemina*. Dodon. in folio, *Hyacinthus Neoror.* flore subinde candido aut exalbido dilute admodum purpureascentis, Italicorum plerique Dipsadi appellant. An Camer. horti. *Hyacinthus Botryoides minor inodorus flore albo*. Tabern. icon. & hist. *Hyacinthus Botryoides albus lacteus*. Weistrauben hyacinth. Casp. Bauh. Phyt. *Hyacinthus 26. siue racemosus albus tertius*, vel lacteus vel minus dilutissima purpura perfusa, vel ex cæruleo virens. Gerard. hist. *Hyacinthus botryoides lacteus white Grape flower*. Figuram habet Tabern. ac præterea alium habet *Hyacinthum*, de quo sub maximo botryoides.

Habeo in horto H. E. C. missum Sturgardiae per Clarissimum virum Dominum Schwarz horti medici præfectum.

HYACINTHVS AUTVMNALIS
minimus, & maior.

Descriptio



tum florere incipiunt, reponit. Verum quidem est hanc plantam, florere incipere antequam folia emergant : sed alio loco Tiphys inter æstiuos flores meminit : quæ nota huic non conuenit.


Dodon. de flor. *Hyacinthus quintus, qui serotinus est.* *Hyacinthus autumnalis.* In fol. p. 219. *Hyacinthus autumnalis minor, & p. 218.* *Hyacinthus autumnalis maior.* Gesner. horti ex sententia Coldembergii. *Hyacinthus autumnalis.* Lobel. & Penz. Adu. & Ic. pl. p. 102. *Hyacinthus autumnalis minimus sed pulchellus.* Et C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus. 6. siue autumnalis maior Clusii.* Item *Hyacinthus 7. siue autumnalis minor.* Gerard. Angl. *Hyacinthus autumnalis minor.* Gerard. winter hyacinth. Item *Hyacinthus autumnalis maior, Gerard. winter hyacinth.*

Primum in hortulo duntaxat aluit Clusius, sponte natum non vidit maturius minore florentem, interdum uel sub Iulii finem, vel Augusti initio. Alterum ante 40. annos in vicinis Monspelio colliculis florentem sub initium Septembris eruebat : deinde Madritanâ Parisiorum siluâ eâ parte quâ ad Bononiensæ cœnobium uergit, areno-

Folia vix
pollices

quinque excedant, tenuissimâ, tria quatuorue, ex albicante bulbo exorta, caulis palmo breuior, tenuis, flores à medio ad summum parui, carulei, quos excipiunt conceptacula, parua, talis est Monspelientis, quem cum maiore fusius describit Clusius Hisp. & post. histor. his verbis : *Hyacinthum Autumnalem appellabamus, quia non nisi Autumno florebat. Quidâ Bulbinem Plinii esse existimabant : sed Bulbines apud ipsum lib. 20. Nat. histor. c. 9. descriptio planè refragatur, cui porrœca folia & rubicundum bulbū tribuit. Alii Theophr. non esse æstiuant, quod lib. 7. c. 12. inter eas quæ ante foliorum, & caulis exor-*

fo solo & salebroso : postremò Salmanticæ proximis colliculis ad flumen Thormim sitis, lapidofo admodum solo. E Verouensi Agro missus fuit Lobelio : plurimus postea etiam Lutetiæ Parisiorum, Narbonæ ad Aquas Marianas, & ad Cellam nouam Monspelii visus nobis glareosis, asperis, Autumno inuente, non Vere. Maior in pensilibus Belgii hortis alitur. Florentem circa Aurumnū vidimus in sylua propè Monspelium. Tiphym Theophrasti Dalech. nobis visum Sturgardiz.

HYACINTHVS MAXIMVS
Botryoides, comâ cœrulea.

EX cepaceo bulbo folia aliquot interdum scapo longiora, & plusquam semunciam lata, cælia, per terrâ sparguntur : inter quæ surgit caulis singularis, duas spithamas longus, nondum exiccatis floribus in pyramidalem thyrsū defuens, qui ubi expansi fuerint, longius inuicem abiunguntur,

colore obsoleto, concaui, ab angustiore basi quâ pedicello semunciali appenditur, sensim dilatati, vix tantillum hiantes oris in sex obscure partitiis, ut difficultè conspici possint latentes apiculi cinerei : fastigium autem thyrsi in comosam iubam cœruleo purpuream, longis pediculis concoloribus explicatur : odore nullo eccellente, plerumque flores abundant puluere fuliginoso. Amara est hæc planta.

De hoc Hyacintho scribit Clusius. Hyacinthi primi Matthioli, siue comosi maioris à quibusdam cognominati, qui in multis Orbis Christiani prouinciis sponte nascitur, duo in Pannoniis genera obseruabam. Alterum præcox latiore folio, crassiore comâ, ineleganti tamen, maioreque bulbo. Alterum magis serotinum angustiore folio, tenuiore comâ, laxiore verò & elegantiore : huius flores comæ proximi, ex cœruleo purpurascunt, eiusdemque cum coma sunt coloris, quæ nota in priore desideratur : bulbis etiam minor. Præcox Maio, hoc Iunio, floret. Semine autem ex Hispaniis anno 1575. Hyacinthi Orientalis Hispanici nomine missi cuius tamen duo esse genera statim deprehendi, nam magnitudo dispar erat [Viennæ Austriæ bulbacea plantæ mihi natæ sunt, quæ tandem duo Hyacinthi comosi maioris genera pepererunt, à vulgaribus nec florum comâ, nec foliis differentia, nisi quod alterius folia latiora & Muscari foliis proxima inuente Vere duntaxat emergere solebant, alterius angustiora longioraque, etiam antè hiemem : minutius semen Hyacinthi comosi maioris æmulum erat, alterum crassius Mus-

Muscari semini perquam simile, quæ adeo causa fuit, vt separatim fererem. Illud autem peculiare in nonnullis, vt præmaturi flores excussi, nigrum siue fuliginosum pollinem spargant vtilagini ferè similem.

Hyacintho sylvestri Cordi addita est figura Tragi, cum his verbis Gesneri: idem est ni fallor aut planè cognatus hyacinthus maior Tragi & Fuchsi, cuius iconem addimus quanquam cæruleis floribus, cum Cordus suos purpureos tribuat. In alia annotatione est scriptum verus est hyacinthus Medicorum. Nascitur Schenberge bey hersteth: vbi Braumlinde appellant. A Cordo in Dioscor. hyacinthus, quem medici intelligunt. German. Bräuling vocatur. Ibidem quidem annotauit Helueticis vt quidem aiunt, nescio quibus Colofe.

Tragus Germ. lib. 7. cap. 70. Groß hyacinth. Et cap. 79. die vierden / Bauaris Sew zwibel: Idè in hist. lat. Hyacinthus maior Bauaris Sew zwibel, hoc est, cepa siliia.

Fuchsi. hyacinthus cæruleus maximus. Et icon. hyacinthus cæruleus mas maior Großblauw Nergensblumen mennis. Denegato vadimonio præceptorum nostrum vltro dimittimus, vt qui indistinctè de Hyacinthis scripserit, nec certè demonstrat, quis verus sit Antiquorum hyacinthus, hinc, vel stellarum maximus Matthioli. passim, hyacinthus uetustis Cipollæ Canina.

Dodon. Pancratium interpretatur herbam quam Fuchsius exhibuit pro Hyacinthi genere, quod Gesn. audit Monspessuli Ophiocorodon existimari à doctis, & vulgò Allium Caninum nominari. Lacun. Pancratium & Silla minor. Dodon. Gall. Cypripedium. Bulbus esculentus, Germ. hunds knoblauch. Belg. hunds loof. Gall. Hyacinthus comosus spurius, siue tertius Neoritoricorum. Anguill. vt existimat Bulbi esculenti sunt hodiè pisti, pro hyacintho. Clus. hist. post. vulgarem vtrumque (Hyacinthum comosum maiorem) Vngari appellant Bygio hágyrna, serpente cepam. Belgæ Brabant, Quispel, hoc est, Aspergillum, propter comam aspergilli instar expansam, Hispani Ajo de ciguenas, hoc est, Alliū Ciconiarum. Non defunt qui Pericarpum bulbū Plinii esse censent, cuius duas species esse dicit lib. Nat. Hist. 25. cap. 10. cortice rubro alteram, nigro papaueri similem: sed ex tam mutila descriptione, quis sententiam comòdè ferre queat? Illud autem verè dicere potest Cluius, nullum vnquam bulbum se gustasse, qui maiorem ad vomendum vim ipsi fecerit hoc Hyacintho maiore qui in esculentorum bulborum classem ponitur. Lobel. & Pena Adu. Hyacinthus comosus Dioscor.

Tabern. icon. & hist. hyacinthus maior, Großser hyacinth oder mergen blumen. hyacinthus purpureus magnus peregrinus, Großer purpura braut fremde hyacinth. Compilator uarietate rerum obrutus nudam proponit figuram cuius hyacinthi nescio pro peregrino.

I. Gerard. hyacinthus comosus, faire haire Jacint. hyacinthus comosus albus, wire haried Jacint. Gerardus quoque more suo quæcunque mutans binas figuras Tabern. habet: sed colorem alium tribuit: ac præterea ponit ex eodem Tabern. aliam figuram pro Hyacintho albo de quo pòst, lector ista diligentius scrutetur & lucem adferat.

Camer. horti. hyacinthus comosus maior siue serotinus, & minor siue præcox. Crescit in arvis passim in Italia. Anguill. Bulbū propriè esse dictum

volebat, & in Græcia adhuc vocari Cithor. Ital. Cepam Boninam.

C. Bauh. hyacinthus racemosus maior. An Bulbine Plinii lib. 20. cap. 9. & lib. 19. cap. 5. Huius, inquit, genera duo. primum procerius latiore folio, crassâ comâ, maiore bulbo pingit Lobel. Obs. p. 55. alterum angustiore folio, comâ tenuiore, minore bulbo pingit idem Lobel. icon. p. 106. C. Bauh. vt patet hyacinthos duos racemosos tradit ex Lobel. cui tamen prior figura in Obs. nò placuit, quia in illa non nutabat coma, ideoque aliam corauit parandam & in iconibus priorem omisit, referuat postremâ, si duo existimasset genera vtramque vt existimo retinuisset. C. Bauh. apud Matth. hyacinthus, hyacin. sylu. Cordo.

Lobel. Italia, Narbonæ, reliquæ etiam Gallie tepidiori abundè in sativis & viarum marginibus provenit. In agris Monspessuli & Genue in fegetibus & pratis, ac inter Ferrariam & Bononiam. Bononiæ in horto Nobilis di Gonzadinis in stramaior florens Aprilis. Item spontè in montibus Apenninis siue Bononiensibus è regione portæ S. Mamma. In cacumine montis Vende præpè Balneum Aponense inuentum in fine Februarii: vidi etiam Patavii in horto Nobilis à Pasqualigò. Basileæ in horto D. Doctoris Fælicis Plateri, Repertum cum flore mense Iunio inter Chemilli & Vesutium in Burgundia, euulli & plantam Montbelgardi in horto Ill. E. C.

C. B. m. 64


Locus & Tempus

HYACINTHVS ORIENTALIS QVIBVSdam constantinopolitanus.

Hyacinthus quem Orientalem, nonnulli Constantinopolitanum, appellant, radice est bulbosa magna, gustu viscido dulci, cui subsunt fibræ longæ, teretes, mediocriter crassæ: A qua exurgit caulis singularis, dodrantalis, lavis, teres, sulcis nudus, ad inum diluto vitore pallefcès, supernè fuscus, micans: à cuius raedio ferè ad summum seapum prodeunt semuncialibus pediculis ex viridi subnigris, deorsum nutantibus appendi flores: tres, 4. & 5. ad vndecim aut duode-

cim & plures, odore suavi, hilari, cæruleo, aut mixto, aut rariùs albo, omninò spectando colore, vnciales, teretes, concaui, campanularū quodammodò æmuli, in sex lacinas profundiusculas diuisi, staminula luteo puluete conspersa, breuiâ, penitus recondita continent: folia tria, quinque, sex à bulbo statim exorta, colicolum ad summum vs-

Hyacinthus Orientalis flore maiore.




Hyacinth. minor Polyanthes.*Hyacinth. Orientalis Polyanthes foliis.**Hyacinth. Orientalis albus.*

superabat, sed folia firmiora erant, caulis e-
gram inter illa prodiens maior, crassior vi-

que fatigium
nonnunquam
comitantur,
alias citrà de-
stinunt, latius-
cula, carinata,
inferne herba-
ceo colore,
propius cacu-
men saturati-
us virentia.
Succedit capi-
tulum tricoc-
con ceu Lathy-
ridis siue Cata-
putia maioris.
Vnum genus
fert flores ma-
iores, colore c-
tiam à minore
variante, pur-
pureo quidem
aliud minores,
verumq; modò
plures modò
pauciores :
quod minores,
idipsum quo-
que plures ferè
fert, licet etià
interdum duos
aut tres.

Quandoqui-
dem autè *Clu-
sus* horà Hy-
acinthorum di-
scrimina dili-
genter obser-
uauit, lubet to-
tam historiam
ex eo ponere.
Præter Hy-
acinthum Ori-
entalem inquit,
qui omnibus
satis notus est,
cuiusque flo-
rem coloris in-
tensione vel
remissione ad-
modum varia-
re deprehendi,
(nā totus quali
caruleus; vel
subincræceus,
vel dilutiùs
purpurascens
& hilaris, aut
saturatè pur-
pureus & ad-
violæ nigrae fe-
rè colorem ac-
cedès inueni-
tur) in meo
hortulo ale-
bam, cuius
bulbus reli-
quorum ma-
gnitudinem
non admodum
superabat, sed folia firmiora erant, caulis e-
gram inter illa prodiens maior, crassior vi-

cenos aut plures flores proferens, aliis quidem
similes: sed ex cineraceo quodammodò purpureo

Hyacinth. Orient. purpurâ rubens.

scentes, om-
nesque in vñu
latius propen-
dentes, reli-
quis non mi-
nus odoratosi
femen in trian-
gulis capitibus
minus altero.
Huius femine
nata mihi est
planta *polian-
thes*, cuius cau-
lis cubitalis,
crassus, firmus,
anno 1585, de-
cem & septem
flores habuit,
non eisdem
cum matre co-
loris, sed pur-
pureos flori-
diores, & sub
lis binos ra-
mulos, quorū
singuli quinis floribus erant onusti: sequente ta-
men anno nudum tulit caulem pauciorēque flo-
res, cū longè plures expectassem, quandoqui-
dem primo factū tam fuisset fertilis. Verūm dili-
gentissimus & eruditionis non contemnendū la-
cobus Plateau mihi scripsit, Hyacinthum alere se
valde amplis foliis, magno, crasso, firmoque cau-
le, multis floribus prædito, colorem non addidit,
sed iconem mihi Hyacinthi polyanthi maioris
nomine insignitā: qualem hic exprimi curauimus.
Habeo quidem vnam stirpem valde lato folio
& saturatiùs virecente præditam, cuius caulis etiam
crassus, firmusque, sed in ferendis floribus par-
cior, vt pote qui plures denis non det, eosque
non ad latum vnum spectantes & conuersos, sed
omni latere æqualiter quasi sparsos, saturatiùs
purpurascens, capita enim saturatiùs virentia,
quasi purpureæ insperfo colore. Ceterū,
quod silentio minime premendum duxi, Gene-
roso Wolfgango Christophoro ab Entzellorff,
femine à me communicato natus est Hyacinthi
bulbus, qui Aprilis mense anni 1582, florere cepit,
& sequentibus annis similes primis flores profer-
re non desistit. Eius folia aliis similia sunt, paulò ta-
men dilutiùs virentia, inter quæ caulis emergis
satis firmus, senos, septenos aut plures (habui
enim duodenos & quatuordecim) interdum flores
proferens crassiusculos, interiore parte omnino
niueos, foris etiam albos, sed quorum externa
tria folia ad *χρῶμα* colorem quodammodo ac-
cedunt, non minùs tamē odoratos quàm supe-
riores Hyacinthos: his succedunt trigona capita
dilutiùs virentia, semen etiam nigrum continen-
tia: radix satis crassa, candicans, multis fibris do-
nata. Anno porro 1587, Bizantio accepit Gene-
rosus D. Vngnadin magni muneris loco, & pro
hyacinthis niueo flore, quatuor exiguos bulbos
à reliquis discretos, quorum duo candicantes e-
rant, alii dilutè purpurei & coloris admodum flo-
ridi: vtriusque generis vnum mihi dedit: purpu-
reum vtrique subsequens hiems corripuit, tamē
mei magnam curam habuerim, alter paucos de-
dit flores eosque omnino niueos, altero minores,
vt etiam tota planta multò tenerior & infirmior
est. Diuerfus autem ab vtroque qui pro albo

Hyacintho haecenus est habitus, cuiusque vnicā
serpem à C.V. Alphonso Pantio missam alebat
in pensilibus hortis Il. Jo. de Brancion, cum Viē-
nā euocatus sum ex Belgica: cuius postea plures
bulbos Viennā illi misit, nam itic satis frequens
erat, cum valde sit liberalis in sobole generanda.
Sunt verò illius flores antequam explicentur, al-
bi, sed aperti oras tantum albas habent, reliqua
parte quasi carni coloris, cum tamen senescere
incipiunt, ferè toti niuci fiunt. Turcæ omnes
hyacinthos haecenus acceptos *Zambul* appella-
tione miserunt, additā voce Indi, cum Indicum,
vel alia quapiam, cum locum vnde acceperint,
indicare volunt. Florent omnes Aprili.

Huius itaque hyacinthi variz sunt species,
quarum *υπαι* hyacinthum Orientalem flore
maiore vocare solemus, quæ modo plures, mo-
do pauciores habet flores purpureos, cæruleos-
que. Huius iconem desumpimus ex Camer. Epit.
Alterius autem siue hyacinthi minoris Polyæthes
ex Placon. pag. 105. Tertius id est, hyacinthi O-
rientalis Polyanthos foliis, Figura est ex Clus.
Hist. post. pag. 175. Quartum est hyacinthi O-
rient. albi, quæ exstat in Icon. Pl. pag. 31. *Quin-
ta* denique est hyacinthi Orientalis purpureo
rubei, quem depinxerunt Ic. pl. pag. 104. An-
guill. hyacinthus Theophrasti & Dioscoridis,
Turcis *Zembecuder*. Aliud hyacinthi genus quod
Orientale appellare placuit misit [Math. in Dio-
scor. cum magn. figuris] Cortusius, quod sibi mis-
sam ex Orientalibus regionibus facebatur, quod
hyacinthus Orientalis frembder hyacinth cogn-
ominatur. In Epit. cum Camer. Icon. Figura
sanè quæ ponuntur à Camer. demonstrant hya-
cinthum maiore & minore flore: sed secunda
non respondet figuræ Matthioli, quæ nihil aliud
meo iudicio quam Ornithogalum inaius album,
vt suo dicitur loco, exprimit.

Dodon. de fl. hyacinthus quem Italia & Bel-
gium Orientalem nominat, folia habet pinguio-
ra & latiora, caules crassiores, flores potentiores
maioresque, ac citius prodeuntes. Item in fol.
horum vnus maior, plures profert flores: alter
minor pauciores. Figura, quas proponit Dodon.
non displicent quamvis minus exactè distinguat
plantas.

Lob. & Penæ Adu. hyacinthi Orientalis Græ-
ci varietas quam Indi *Zumbel* vocant, caulem
habet Serpentinæ modo maculosum, & tortilia
folia.

Tabern. ic. & h. hyacinthus Orientalis *caruleus*,
blauer frömbd hyacinth. Item: hyacinthus
Orientalis maior Polyanthos: Gesulter frömbd
hyacinth.

Halepi cum esset Rauvvolf. obseruauit prin-
cipio Februarii aliquot hyacinthi species, potif-
simum Orientalis quem vocant *Zumbel*.

Camer. hort. hyacinthus Constantinopolitanus
Diosc. hyacinthus Orientalis, albo cæruleo flore,
icemque purpureo. Turci vocant *Zembul*. Item
hyacinthus Arabicus à D. Aicholsio communicatus.
Zumbul Arabibus. Nos Arabicum quoque
hoc capite ponimus, quia nondum nobis constat
quantum differat à cæteris, & quia teste Rau-
vvolfio cæteri hyacinthi Orientales ita dicun-
tur. Lob. etiam vt antè demonstratum vt memi-
nit etiam *Zumbel*, an idem cum hoc nescimus.

I. Gerard. hyacinthus Orientalis *caruleus* the
blew Oriental Jacint. Item hyacinthus Orient.
Polyanthos Double Orientale Jacint.

C. Bauhin. Phyt. hyacinthus II. siue Caule ser-
pentinæ instar maculoso, Matthiolo Orientalis

alter, Lobel. Orientalis Græcus. Et hyac. 12. siue
Orientalis purpureus Lobel. purpure rubens.
hyacinthus 13. siue Orientalis albus I. Orientalis
albus. Et hyacinthus 15. siue Orientalis maximus.
Math. hyacinthus Orientalis Lob. Orient. maior
Polyanthos. Tandem hyacinthus 17. siue hyacin-
thus Arabicus Cam. Nostro iudicio si quid suspi-
candum ex nuda Matthioli figura, suspicor Mat-
thiolo hyacinthum Orient. alterum potius cum
maiore Lobelii conuenire quam primum, & pri-
mum Matthioli potius quadrare cum Lobelii
Orientali Græciæ.

Idem C. Bauhin. apud Matth. hyacinthus Orien-
talis, hyacinthus caule Serpentinæ. hyacinthus
Orientalis alter Math. siue maximus [sed figuræ
transpositæ erant, figuræque mutila. Matthioli
figura hyacinthi Orientalis non demonstrat plā-
tam, cuius figuram ex Tabern. ponit: mihi Mat-
thioli hyacinthus ille est Ornithogalum maius
album, vt iam dictum, foliola quæ appingit ad
singulos pediculos longiusculos, & aliam diffe-
rentiam manifestam demonstrant ab hyacintho
Orientali maximo, nec figura Matthioli inuul-
is est, vt quis existimet, si sumatur pro Ornithoga-
lo dicto.

Orientalem siue Constantinopolitanum hya-
cinthum cum essemus in Italia vocabant *Zembel*.
vidimus Veronæ in orto Nobilis di Mu-
scardo. Ferrariæ in orto Principis mense Ma-
io nobis ostendit ipse Anguillara iam deflore-
scemtem, & in quo capitula incipiebant prodi-
re. Bononiæ in orto Nob. Alpassel. Patinæ in
orto Nob. Antonii Lalatæ, mense Aprili deflo-
ruerat. nunc etiam vidimus in orto Priuli &
Pasqualigo Patavii. Genæ in aliquot hortis vt
in nostro etiam mense Februario flores incipie-
bat protrudere & folia. Montbelgardi Genæ
allatum prorupit Ianuario in orto nostro: trā-
stulimus in hortum Il. E. C. Wirtemb. accepimus
etiam à D. Landgrauio flore albo. Basileæ apud
Doctorem Felicem: Nunc in orto Ill. E. C. ali-
quot species habeo maiorem purpureum cæru-
leum & album.

Locus &
tempus

HYACINTHVS BRVMALIS ALBVS.



Louanio
ad nos
(inquit Lob.)
primum mis-
sum hoc hya-
cinthi Orien-
talis venustif-
simum & ra-
rum genus à
D. prof. Regio
D. Cornelio
Gemma, ico-
ne & oratio-
ne scitè ex-
pressum &
descriptum.
Eius bulbos
Insulis ad me
postea misit
amicus singu-
laris Ioannes
Baillet, Mer-
cator Insula-

Descriptio

nus, C. Gemmæ rarum hoc prorsus videtur at-
que exoticum hyacinthi genus: nam etli folio-

tum formâ & florum cum aliis plerisque conueniat, id tamen sibi vendicat singulare, quod statim sub Solis hibernum tropion sub terris erumpat, caulem quoque protrudens interdum per medias niues. *Flores* venustissimum laxat circa principia Ianuarii, vt apud me iam ter quaterue floruerit à fine Decembris vsque ad medium ferè Mensis Martii, non sine maxima pariter admiratione & aspectantium voluptate. Non gaudet humidis locis, sed ab humore prius quam frigiditate corrumpitur: ideoque & in terra fidelius asseruatur: semen tamen aut bulbi germen hæcenus ab eadem planta impetrare non potui, quod florum illa nimis præcipitata protrusio facit. Sunt illi *folia* non vt cæteris laxa & mollia, sed succulenta, spissa, ac ferè semper erecta, vt in generibus Aizoi. Nera in his nulli conspicui: sed striz solummodo rectæ ac veluti tenues fibræ. Durant autem virore constante vsque ad finem Iulii mēsis, ac multò diutius quàm cæteris vsu venit. *Flos* læui caule, nonnihil circa fastigia ad pediculos singulos excauata, propendet candidus, nonnihil tamen sub inicia, & circa supremas oras quiddam subcæreuleum præseferens, quo quidem euanescente sensim Februuario mense totus fit lacteus, odore fragrantissimus, in ea specie deinceps mense plus integro perleuerans. *Radix* bulbosa, intus candida, foris rufâ, circa foliorum exortus maculas quoddam, quales in Serpentariæ maioris caule spectantur, effundit, interius purpura nigra. Verum id maxime sub Veris auspicia, & cum terræ rursus mandatâ caulem emeritum gerit.

Lobel. append. & Icon. Pl. *Hyacinthus brumalis*, *Orientalis albus*. C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus* 14. hunc *Orientalis albus alter*.

HYACINTHVS MINIMVS serotinus flosculis Hyacinthi Orientalis.

Descriptio

HYacinthus Lobel. Ad. par. 2. minimus serotinus elegans, facie Orientalis Hyacinthi, sequepalmares & spithameos tenuissimos cauliculos edit, tribus flosculis è gracilibus petiolis, ex cæreuleo dilutis, senis cæreuleis venis striatis, hyacinthi Orientalis similibus, sed longè gracilioribus, minoribusque, sex partitis oris sub finem Maij præditos. *Foliola* angusta, sparta, spithamum longa, hyacinthi Autumnalis maioris quadrantenus. Paruulus item *bulbus*, albidus. Alique in flosculis à D. de Franqueuille ex Gallia delatus, & acceptus ab honestissima matrona vxore D. D. L'Acoust, tanto florum amore capta, vt sibi meritò Flore nomen vendicaret.

HYACINTHVS ODORATISSIMVS dictus Tibcadi & Muscari.

Descriptio

HYacinthus Tibcadi dictus bulbo admodum magno, albicante, multis tunicis perexto nititur, gustu amaro, cui appositæ fibræ paucae quidè, sed crassæ & longæ, quæ Clusio perennes, nec singulis annis marcescunt & pereunt, vt hyacinthorum, Narcissorum, Tuliparum, Liliorum, & multarum aliarum bulbacearum stirpium fibræ: *folia* quinque aut sex dodrantalia & longiora, latitudine ferè vnciali, sex striis per longum discurrentibus, crassiusculis, carinata, satis crassa

& succulenta: *caulis* singularis, teres, satis crassus, nudus, admodum infirmus pro sua



crassitudine: hunc à medio ferè ad summum racematim cohercentes ambiunt *flores* botryoides, quorum colores sic tradit Clusius: Initidè interdu purpurascētes aut virides, deinde ex purpura virescentes, aut ex viriditate albicantes, nonnquam subcæreulei, aliquando nigricantes in initid, siue saturatè purpurascētes, de-

inde pallidi vel flauescētes, vel ab initio pallidi, postea flauis, postremò vbi tabescere incipiunt nigricantes aut pulli, iique mucrone quàm in aliis crassiore aut obtusiore interdum, qui marcescere incipientes, gratissimum moschi ferè aut aromaticum odorem referunt, licet qui flauo colore est, grauius quidpiam & Narcissinum quodammodò spiret: intelligo & niueo flore, atque etiam egregiè rubente inueniri. Flores sequuntur capitula prægrandia triquetra, & veluti pinnata, in quibus semen nigrum rotundum. Clusius ait se obseruasse interdum hanc stirpem caulem in binos ramos diuidere, quorum singuli multis floribus onusti fuerint.

Matth. in Comment. Ital. & Lat. cum magnis fig. *Bulbus vomitorius*.

Dodon. de floribus, *Hyacinthus alter* quidam *spurius*, Matthioli pro Bulbo vomitorio depingere viderur, nullis interim notis eum describens, nullis testimoniis aut rationibus sententiam suam astruens. In fol. *Hyacinthus spurius Recentiorum alter*. Dodonæo penè euenit quod reprehendit in Matthioli, descriptio ita icinua, vt difficile sit agnoscere de quo hyacintho tradat nisi in post. histor. lat. fig. appoluisse.

Lob. obl. *Dipcadi Chalcedonicum & Italicum*. *Bulbus vomitorius* Matthioli. Item Icon. pl. 109. *Dipcadi Chalcedonicum & Muscari Clusii*. Tabern. icon. & histor. *Hyacinthus botryoides Chalcedonicus muscatus*, frembden raaben hyacinth. Gerard. *Muscari Clusii*, Ein Colored grasflover. C. Bauh. phyt. *Hyacinthus* 27. siue *racemosus Muscatus*, *Bulbus vomitorius* Matth.

Clusius: E vicinis Constantinopoli hortis ultra Bosphorum in Asia sitis primum nostræ Europæ communicata est hæc planta. hyacinthi species odoratissima Nobili viro D. Antonio Cortusio *Tibcadi* Arabibus dicta. In principio Martii florebat Patauii in orto prædicti. Montbelgardi in orto E. C. per Fratrem C.

Bauh. missum ex Italia, & per Landgrauium habuimus copiosum.



HYA-

HYACINTHVS ODORATISS. TIBCADI
luteus.

Clufius nullam particularem ponit Muscari flauo flore descriptionem, licet iconem habeat.

In Exot. part. 2. Append. 2. annotat quæ sequuntur: In illis plantis Muscari quæ flauum proferunt florem, discrimen quoddam obseruabam.

Nam ex quæ pallidas ab initio proferunt florum gemmas ante hyemem plerumque germinare solent, & præciores producant flores, quàm illæ, quarum gemmæ ab initio nigricant, aut saturius purpurascunt. Ex illis autem semine natis mihi esse plantas memini, quarum flores colore non referebant ma-



tris flores, sed alium quendam peculiarem nanciscabantur, ex viridi scilicet flauescentem: matris tamen florum odorem retinebant.

Tabern. Icon. & hist. hyacinthus botryoides Chalcidonicus luteus, fctm bder gel trauben hyacynth. C. Bauhin. Phyt. hyacinthus 28. siue racemosus muscatus luteus. I. Gerard. Muscari flauum Dellsio muscod grape flower/ Lobel. ic. Pl. pag. 109. Dipsadi flauum siue Muscari Constantinopolitanum siue Chalcidonicum Teut. 145.

Vidi Studgardie in horto Ill. C. Wirtemb.

HYACINTHI TIBCADI LVTEI VARIE-
tas siue Muscari lutei præcox.


Mediocastri Mattiacorum (inquit Lob. Adu. part. 2.) in stirpium exoticarum ditissimò viridario D. Cornelius Corne alebat, Martio flores laxans, initio subcæruleos: Aprilis verò aureos. Folia minimè sparsa aut procumbentia, vti alterius flauo Muscari sed Tibcadi floris cærulei modo erecta. Cætera eadem.

HYACINTHVS STELLATVS BIFOLIVSET
trifolius vernus duxetorum, flore
cæruleo & albo.

Ex radice bulbosa, oblonga, fibrosa, alba, gustanti viciâ & subdulci, exit coliculus iun-
ceus, fragilis, palmaris & pedalis, fuscus, radicem versus exalbidus, duobus foliis, interdum tribus, longiusculis, carinatis, à bulbo statim exor-
ris, stipatus, qui in pediculis pro florum numero plures paucioresve ad duodecim nonnunquam, nunc breuiores, nunc longiores, teretes diuari-
catur, licet aliquando ipse coliculi scapus flos-
culum singularem gerere reperiat: flores pul-

Tom. 11.

chri, cærulei, rariùs albi, stellati, sex foliolis di-
stinctis, angustis, mucronatis, confertis, in quo-



rum media
staminula sex
dilute cæru-
leo sustinent
capitella sa-
turatiùs tin-
cta, pistillum
turgidulum
mucronatum
concolorem
circumstaria:
at si flos al-
bus, tum sta-
minula quo-
que alba api-
cibus luteis
prædita pistil-
lum albu am-
biunt: succe-
dit capitulû,
in quo semen
Trago autore
fuluum, Milio
simile. Clusio
in triangulis
vasculis non
atrum, vt cæ-
tera hyacin-
thorum gene-
ra, sed fuscum
duntaxat &
ueluti fuligi-
ne infectum.
Icones quas
proponimus
sunt ex Fuch-
sianis quas e-
mimus, flores
in iis non be-
nè picti.

hyacinthus
vulgaris Clu-
sii, qui à flori-
bus radiatim
expansis, & in

stellæ formam decussatis, stellati cognomē apud
rei herbariæ studiosos inuenit, is videlicet qui
cæruleo est flore ia quo varietatem etiam ob-
seruabat aliis floribus magis saturis & ad viola-
ceum quasi tendentibus, aliis ad carneum co-
lorem proximè accedentibus. habet autem ip-
sa planta vel terna folia, vel plurimum bina, ut
etiam illi bulbi quos Neapoli Francofurtum ad
Clusium mittebat Ferdinand. Imper. Qui albo
est flore, spontè nascentem nusquam videre ipsi
contigit, sed binos aut ternos eius bulbos Fran-
cofurti accipiebat munere D. Philippi Stephani
Sprengeri Pharm. Palatinalis Heidelbergæ: aliū
deinde exalbido & veluti cineraceo subcæruleo-
ue flore præditum, Lugduno Batauorum missum
à N.V. Ioanne ab Hogelande. Superioribus au-
tem generibus maturius floret, & in triangulis
vasculis semen fert, non atrum, vt cætera genera,
sed fuscum & tanquam fuligine infectum
cui non valdè dissimile: etiam est illius semen,
qui albos proferit flores. Viennenses porro Ma-
trone cum qui cæruleum habet florem, Blaw
baldrian appellant, quasi cæruleum Lilium cō-
uallium: nam Oenanthen vulgò Lilium conual-
lium dictam, ipsæ baldrian nuncupant: Belgæ à
Ccc

Tempus

Nomen

Oenanthe
Lilium con-

uallium.

*Narcissus
stellatus
flavescens
N. fl. aureus.*

stellato flore *Sterrefens* vocant. Sed & Hyacintham stellatam vulgari aliqui forma nautem reperiri audit, quorum alter flores proferat, suavitius rubentes & quam carnosos alter, flavos illos autem videre nondum ipse contigit.

Icon Clusiana sub titulo *Hyacinthi stellati* albo flore apud Lobel. obs. p. 33. Et icon. Plant. p. 99. est sub titulo *Hyacinthi Germ. Lili-flori* siue Floris Martii stellati, *Narcissi cærulei* Bockii: fane placet icon pro cæruleo & albo, quia quod animaduverterimus non differunt nisi colore. Brüssel. T. 1. Rhaph. 33. & 4. p. 150. *Narcissus Martius.*

An Cordo herba *Narcissi*; caule dodrantali, flore est in lateralibus pediculis cædido, stellato, aut cruciformi, odorato: radice bulbosa, Norderbergem hortu Ollingeri.

Non vult litigare Tragus an hi bulbi, vel *Narcissi cærulei* & albi, blo *hornung blumen* blo *mergen blumen* sint referendi ad Bulbos vomitorios aut *Narcissos* vel *Hyacinthos*. Figuram vnicam habet Tragus quæ minus placet.

Fusch. hist. *Hyacinthus cæruleus minor*. *Hyacinthus albicans* seu *foemina*. Item icon. *Hyacinthus cæruleus minor* mas, *flinblaw mergen blum mennele*. *Hyacinthus cæruleus minor* foemina, *flinblaw mergen blum weible*. *Hyacinthus niueus weis mergen blum*.

Gesner. horti. *Bulbus quidam sylv. Hyacinthi species*, vt multi putant. In cat. plant. *Vaccinium*, *Hyacinthus*, *jaenb*, *Blaw mergen blumen*. Item *Hyacinthus*, Latinis (vt quidam volunt) *Vaccinium*, *Blaw hornung blumen* / *Ein hyacinthen geschlechte*.

Lobel. & Penz. Adu. *Hyacinthus Germ. Liliflorus*, Angl. Our ladicke flour. Doctiss. quidam cum Fuschio Poëtico *Hyacinthum* diuinabant. Sed eius effigiatuta congruentius multo *Dioscoridis* *Hyacintho* quam Poëtico foret, flores cærulei purpurei. Item obs. *Hyacinthus Liliflorus stellatus*, *flor martius stellatus Germ. Hyacinthus bifolius* *Theophrasti*, Belg. *Sterrefens*. Et icon. Plant. p. 99. *Hyac. Germ. stellatus, Narcissus cæruleus* Bockii. Aduerf. part. 2. *Hyacinthus Germanicus stellatus*.

Can. horri. *Hyacinthus stellatus flore albo* & *propreo*. I. Gerard. *Hyacinthus stellatus* Fusch. *Starrte Jacinth. Narcissus cæruleus* Bockii.

C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus* 1. *cæruleus* siue *trifolius*. *Hyacinth* 2. siue *primus albus* *Narcissus candidus* Trago. *Hyacinthus Germ. stellatus albicans serotinus* Lobel. Et *Hyacinthus* 3. siue *cæruleus* alter *bifolius* Tab. icon. minor: *Dodon. Satyrium* 2. Dubito an Tragi planta eadem sit cum *Lobeliana*, quia Tragi soler cum alio florere & flores habere albos, qui sex foliolis constant, *Lobelij* verò *serotina* flore albicante pingitur cum foliolis 5. tantum. Nullam præterea video occasionem separandi *Satyrii* secundi *Dodon.* ab *Hyacintho stellato* primo, ipsemet *Dodon.* in potremis non separat.

Locus. & tempus.

Norbonæ montosis arduis, *Geneux* aut *Heluetiæ* & *Germaniæ* in campestribus & iuxta sepes, *Lobelio*, nascitur, flore cæruleo, purpureo. *Hyacinthus* *Camer. stellatus* flore albo & cæruleo, frequens in Duc. *Vviremb.* creber, vt *Fuchsius* quoque meminit & *Cordus* *Tubingæ* in siluulis inuenitur. Nascitur in nemoribus: atque hinc est quod *Galli* apud quos, *Plinii* testimonio, eximie provenit, vt *Ruellius* autor est, nemoralem & agrestem *Cepam* nominent. Et eius certè magna est copia Verno tempore in nemoribus haud procul à vico *Luschnato* iuxta *Tubingam* sito, vt vel etiam ex natali satis constet


floribus hos quos pictos exhibet *Fuchsius* esse *genunos* *Hyacinthos*. Vere provenit mensibus *novembris* *Februario* & *Martio* *Theoph.* l. 6. hist. 6. hinc *Martius* *flor dictus*, cum itaque tempus etiam conveniat nemo est qui deinceps veros esse *Hyacinthos* dubitare merito possit.

E loco & tempore *Fuch.* asserit non dubitandum de suis pictis *Hyacinthis*, verum non demonstrat, qui sint ex iis, qui in Ducatu *Vviremb.* vel in *Gallia* proveniant, hinc apparet firmatas argumenti.

Cronemb. *Satyrium* verum colligitur in tractibus fabulosis & arboribus confitis ex quibus nos olim frequenter esuimus, ac maxime circa *Herlen* eximium *Holandia* oppidum.

Hyacinthus stellatus vegenus modò *bifolius* modò *trifolius* à me observatus inter *Balneum Aponense* & *Arqua* & in monte *Venda*, & *Paravii* in hortu *Nob.* *Pasqualigo* florens in fine *Februarii*; *Monspeli* allatus ex montibus circa *Gangem* mense *Aprili* cum foliis latis, radice bulbosa, & floribus cæruleis multis ab invicem diuaticatis cum pediculis satis longis: *Geneux* copiose in colle circa *Castellum la Bassie* florens *Martio* mense, è regione *Champé* ultra fluvium *Arue* in syluosis locis mense *Februario* folia protrudens, & circa finem *Februarii* florere incipiens, ac ibidem non solum colore cæruleo, sed etiam pulcherrimo niueo: nec video differentiam quam coloris: inveni etiam *Montbelgardi* ac habeo plantatum in hortu *Il. E. C.* qui passim provenit, vt in colle eundo *Vauiaucourt* & in nemoribus versus *Arbouans*.

HYACINTHVS STELLARIS Albicans Serotinus.



Scribit Lobel. in Append. *Hyacinthus stellaris albicans serotinus*. Serius floret & folia exiliora habet, floris aspectu iucundus albicans. In Belgium delatus è *Biscaya* montibus, & munere missus à Mutone. Item icon. Pl. p. 100. *Hyac. Germ. stellatus albicans*, Tent. 136. Item Aduerf. part. 2. *Hyacintho Germ. stellaris* congener *Hyacinthus serotinus albicans* è *Cantabria* montibus delatus, cuius agnities icon. p. 100. exprimitur. Septenis floribus & pluribus aspectu iucundissimis in hortis *D. I. Someri* & *D. Iacobi Knibii*: albis floribus variare memini & luxuriare cum *hyacintho stellati* *Bizantino* à *Clusio* descripto radice foris nigra, flore præcoci. Item *Hyacinthus stellaris albicans* *Botanicorum* effig. icon. p. 100. A stellæ instar radiatis floribus ab herbarum cultoribus sedulis vocatur *stellaris* aut *stellatus* *Hyacinthus*, floribus albis amœnissimis septenis & pluribus in hortu

horta *Someri* variat. Lobel. videtur mihi obscurus : Curia postea. Animad. bis mentionem facit Hyacinthi stellaris, hyacinthi albicantis; cur bis repetit descriptionem hyacinthi stellæ cum albis floribus, suum albicantem pingit cum floribus quinque, vnus autem flos pingitur quinquefolius, an veraciter nescimus, stellares dicti solent esse sex foliis.

C. Bauh. Phyt. existimauit eundem cum Tragi Narcisso candido, quod nobis non videtur, non tamen negamus eum quem describit in Adu. postremis floribus albis eundem esse cum Tragi Narcisso vt antè dictum.

HYACINTHVS STELLARIS VERNVS paruulus, flore ex cæruleo cinereo.

Persimilis
autore Lob.
Adu. part. 2. par-
uulus Hyacin-
thus stellaris
Vernus, etiam-
que stellatis
Hyacinthis con-
ger pumilio,
nouus indictus
hyacinthus, Ló-
dini hoc mense
Aprili 1605, in a-
menissimo &
exoticarum stir-
pium ditissimo
hort. C. V. D. 10.
Coys, cuius sæ-
pe meminimus,
flores laxauit ter-
nos aut quater-
nos, stellatos, ex



cæruleo cinereos, senis foliolis, totidemque stam-
inulis & apiculis cæruleis obscuris conflatos:
pistillo in medio cum vmbone aut apice ex cine-
reo cæruleo. Vix palmaris plantula est, *solum* an-
gustis, vt cærulei ameni floris paruuli Hyacin-
thi Botryoidis surrectis, minoris tamen gra-
cilioribusque, quaternis aut quinis, è quorum
medio *cauliculus* prodit. Radix parua, alba, oblon-
ga, parum fibrata, quâ vt & plerisque aliis nouis
Plantis ex Galliis delatis Georgius le Seigneur
Britanniam ditauit.

HYACINTHVS STELLARIS MAIOR.

HYacinthus stellaris maior, autore Lobel.
Adu. par. 2. omni sui parte duplè maior hya-
cinto stellari Germanico. Mattiacis Mediobur-
gensibus botanicis Belgis innotuit opera D. I.
Someri, quem in hort. Magni Ducis hetruriae na-
ctus est. Flores intrensis purpuræ: Radicis bul-
bus albet.

HYACINTHVS STELLATVS æstiuus minor.

Quamprimùm è terra, inquit Clus. prodit
hæc planta septena aut octona à radice pro-
mit *folia* angusta, plana, viridia, & quodammodo
splendentia, circiter septem vncias longa, quæ
sefe humi diffundunt, & in orbem spargunt, at-

Tom. II.

que veluti contorquent: inter quæ assurgit
cauliculus teres, breuis, binatum vnciarum
longitudinem non excedens, summo fastigio se-
nos aut septenos *stufculus* alternatim ferens, velu-
ti spicam congestos, iis formâ & colore penè si-
miles, quos profert hyacinthus stellaris æstiuus,
cuius paullo antè meminimus, sed longè minores: his
succedebant triangula etiam *capitella* extremo
mucronata, nigrum *semen* continentia: radix erat
bulbosa, ferè orbicularis, crasse Auellanae hispa-
nica magnitudinem æquans, candida sed fulcâ
membrana recta, è cuius infimâ sede numerosæ
exiliebant fibræ, magnâ ex parte valdè renes,
iis tamen admixtæ septenæ aut octauæ paullo
crassiores. Florebat Maio mense cum maiore.
Vnicam huius generis plantam, eamque *abavray*
accipiebam anno Christi 1603, à Nicolao le Quill
siue Quelt Gallo rhizotomo cum bulbo vnifolio,
& aliis quibusdam à Lusitania, vt asserbat, pe-
titis.

HYACINTHVS RARVS.



Radice ni-
tur hya-
cintus nobis
rarus dictus,
bulbosa, ma-
gna, fibris do-
nata, alba, ali-
cubi purpura-
scente, sapore
subdulci, visci-
do, & nauleo-
so: *folia* à ra-
dice quina aut
quaterna, per
terram sparsa,
vnciam lata,
Hyacin. stella-
ti siue dume-
torum latiora
[à quo differt,
licet affinis]
sunt longitudi-
ne cubitali, ca-

Descriptio

rinata, striata & splendentia: *cauliculus* tenuis vi-
nus vel duo, interdum quaterni, cubitum alti,
alii palmum, sesquipalmum, & palmos duos ló-
gi, purpurantes, nitentes, angulosi, si res sustinent
in summo fastigio, quaternos, quinos, senosque, à
lateribus ex foliis sex compositos, sublongis, acu-
minatis, cæruleis, vel potiùs violaceis, vngue
albicante, decurrente per longitudinem linea sa-
turatiore viola tincta, ita à se inuicem ad pedi-
culum vsque distantibus, vt radiatam stellam æ-
mulentur: medium occupat *capitulum* rotundum
canaliculatum, Pisi parui magnitudine, album,
loculamenti *seminum* rudimentum, quod ordine
circumstant *stamina* rigidula, sena, violacea, circa
inum albicantia, è medio autem capitulo stilus
violaceus emicat: pediculi, inferiorum quidem
florum plùs quàm duas vncias longi, purpuran-
tes, splendidi, surrecti, superiorum verò vix cul-
mum latum longi, mediorum medio modo se ha-
bent.

Hoc Hyacinthi pulchrum genus attulit nobis *Lacus*
Frater Casp. Bauhinus ex Italia, collectum Pa-
tauui in orto Treuisani: ex bulbis à nobis satis
in orto Ill. nostri Principis, flos emicuit Aprili
mense. Frater nobis retulit D. Cortusum no-
minare hyacinthum nondum descriptum cum


Ccc 2

hoc bulbo magnam affinitatem habere videtur hyacinthus Stellatus Byzantinus Clusii: cui an utriusque bulbosæ plantæ nota fuerit differentia statuito.

HYACINTHVS STELLATVS

Byzantinus.

Descriptio



H yacinto nostro raro, in multis correspondente tradit Clusius hist. post. nomine hyacinthi stellati Byzantini; de quo ille ait, quater-na aut quina sunt folia humi fusa, longa, carinata, dilute virentia, hyacinthinis adeo similia, ut ante quam florem conspicerem, hyacinthum esse crederem: inter hæc emerit di-

gitalis ferè longitudinis, gracilis, & infirmus cauliculus: priore anno ternos sustinens flores, altero quaternos aut quinos, sex foliis constantes, diluti cærulei coloris, inodorus, qui solis radiis illustrati instar florum hyacinthi stellati vulgaris sese explicarunt, & exalbida sex staminula ostenderunt, quorum apices purpurei, stilo in medio eorum assurgente: successerunt triangula capitula, qualia in vulgari, sed inania, ut semen observare nequiverim: radix bulbosa est, non magna, nigro cortice recta, & fibris subris prædita. Hunc Bulbum Byzantio acceptum cum aliis stirpibus Francofurtum ad me mittebat anno 1590. Generos. Domina Vngnadin nomine adscripto *susam guile*, quâ appellatione initio Lilium Susianum insignitum, deinde, Iris illa bulbosa præcox, quam Matthiolus pro Hemodactylo Constantinopolitano exhibuit, Dodonæus pro Iride tuberosa. Flores mihi protulit Aprili cum aliis hyacinthis.

tempus.

Lobel. Ad. part. 2. p. 485. *hyacinthus stellaris Byzantinus à Clusio descriptus*. Videtur idem p. 486. eundem tradere his verbis: *hyacinthus stellaris Byzantinus tenuifolius præcox: effig. rar. pl. p. 184. Affinis stellari hyacinto Germanico, foliolis & effigie: sed minore vnciam longo, paruum digitum crasso bulbo: flores itidem stellatos, obsoletè cæruleos tenui superiore caule fusos, Martio & Aprili laxar in hortis cultioribus Botanici. Dubium nobis est de quo hyacinto stellari Byzantino scribat Lobelius: ille hyacinthus stellaris Byzantinus cuius meminit Clusius in post. hist. p. 184. non est tenuifolius: nec Clus. ait ei tenuia folia.*

HYACINTHVS STELLATVS

Bizantinus alter elegantiss. serotinus, bullatus.

Descriptio

H ic præcoci deflorescente Hyacinto stellato longè elegantior, nitidus, stellatus, cæruleis,

amœnis, secundum sesquipalmes, spithameos, lucidos, planos, rubentes cauliculos, floribus prodit stellati Germanici Hyacinthi latioribus foliis: tamine in pericarpis rotundo, albo, lucido, Synapi albi ferè. Radix Leucoio bulboso par, intus alba, foris rubens, quæ nucleis adnatis propagatur. Hic Constantinopoli delatus quinquennio floruit in Londinensi agro in horto exoticarum Scitpium



ditissimo Nobiliss. Baronis D. Eduardi Zouche, Cambriæ magni Præsidis, vnde quidam alii postea habuerunt. Lob. Ad. part. 2.

HYACINTHVS STELLATVS

multiflorus cineracei coloris.



ci ferè: inter quæ prodit cauliculus palmaris, virenos, tricenos aut plures interdum flores, spicæ vel Vux instar, congestos ferens, seu foliolis constants, medium occupante vmbone siue capitulo, ex sex staminibus, non secus ac in Hyacinto, qui stellati cognomen vulgò obtinuit, sed longè dilutioris, & veluti ex cæruleo cineracei: floribus succedunt capitula trigona semen continentia: radix bulbosa est, candida, instar radices Hyacinthi Belgici. Florer cum vulgari, hoc est, sub extremum Martium, vel etiam April: paullo tamen secius vulgari &c. in Exot.

Hyacinthus stellatus Bizantinus vel exoticus Someni inquit Lob. Ad. par. 2. lata depressa spicâ fasti-

fastigiatus, hyac. stellatus Cineracei coloris apud Clusium. Effig. Rario. Plant. pag. 184. Iam septenis & pluribus annis elapsis altera Stellati hyacinthi exotici noua species nobis Medioburgi innotuit operâ eiusdem Domini de Somer, qui primus bulbum eius in Belgium attulit. Facie totâ, sparsis foliis, & cauliculo Spithamæo quadantenus hyacinthum Belgicum vel Britannicum æmulatur: sed umbellæ instar initio stipitem stellati subcærulei pallidi flores, Plantaginis rosæ modo in latam expressam aut aliquantulum depressam spicam, & tandem in longam fastigiati. Apud Britannos hortensis hodie, & bulbo propagatur operâ D. de Francque ville in orto Medico Nobiliss. Baronis Eduardi Zouch magni Præsidis Cambriæ siue Walliæ.

HYACINTHVS STELLATVS ÆSTIVS.



Hoc hyacinthi genus ait Clus. Exot. part. 2. Append. 2.] suis floribus onustum, primum Maio mense anni à nato Christo 1606. conspiciebam in cultis. in orto perurbani & ornati Viri Lopez cuius Leydani, quod è Luitania allatum esse asserbar: deinde illo ipso anno videbam

etiam in hortis Ioannis ab Hogelande, & Christiani Porreti. Quum autem neque eius iconem, neque historiam quispiam hæcenus (quod equidem sciam) exhibuerit, operæ pretium me facturum arbitrabar, si in hoc appendice proponerem.

Erat autem hæc planta quaternis, senis aut pluribus foliis prædita, viridibus, carinatis, palmum longis, satis angustis, humique quasi in orbem stratis, alioqui satis firmis, instar foliorum hyacinthi illius stellati qui cineraceos flores profert, superiore capite descripti, inter quæ assurgebat palmaris cauliculus satis firmus, sustinens oblongis petiolis inter appendiculas purpureascentes prodeuntibus, denos aut duodenos strobilos ex cæruleo purpureascentes, nullius aut certe perexigui odoris, sex foliis constantes, umbilicum occupante umbone, siue capituli rudimento nutronato, cincto sex staminibus ex albo purpureascentibus, quorum apices cærulei: fiebant tandem ea capitula triangula & mucronata, qualia ferè in Hyacintho Belgico siue Anglico: quæ maturitate dehiscuntia, semen continere deprehendebantur rotundum, nigrum, splendens, hyacinthi Belgici siue Anglici semini prorsus simile: radix erat bulbosa, penè orbicularis & candicans, infimâ siue sessile parte in ambitu frequentibus & tenuibus albis fibris in latera se se spargentibus donata, & interdum vnâ etiam

Tom. II.


crassiore digito penè longâ, atque in profundum se mergente, ut aliquoties in aliis etiam hyacinthorum generibus obseruare memini.

HYACINTHVS BIFOLIVS THEOPHRASTI.



Lob. H. Belg. Descriptio Blauer Meybloomfens. Et Icon. Pl. pag. 100. hyacinthus bifolius Theophr. Tent. 137. C. B. Phyt. hyacinthus A. siue bifolius Theophr. Lobel.

HYACINTHVS COMOSVS BYZANTINUS candicans cum staminibus purpureis.



Quæternaria, inquit Descriptio Clusius, quina aut sena interdum habet folia, humi ut plurimum fusca & expansa, nonnunquam procumbentia duntaxat, oblonga, hyacinthi primi Marth. foliis valde similia, latiore tamen mucrone prædita, & in lateribus veluti renui lanugine oblecta, præsertim infimâ partem, circa eorum

exortum, ingrati gustus & nauseam faciliè excitaturi: ex horum medio pedalis, nonnunquam maior, nascitur caulis, teres & rotundus, nudus, intus fungosus, foris viridis lævisque, quem à medio ad summum sexageni plerumque, aut plures ambiunt flores oblongiuculi, oris in sex laciniolas diuisis, sex staminibus purpureis intus præditi, inodori, initio candicantes, deinde cum marcescere incipiunt, fusci & inelegantis coloris: pediculi quibus flores nituntur, initio breuissimi sunt, deinde paulatim marcescentibus floribus excrecentes, quatuor vnciarum aut amplius

Ccc 3

rem longitudinem adquirent, sic ut totus caulis suis floribus ita expansis onustus, aspergillum nō minus referre videatur, quā Hippuris quoddam genus: caulis suprema pars cum florum pediculis purpurascit: incipit florere ab imis: trigona deinde capitula fert, exigua, pro plantae amplitudine, in quibus paucum semen, interdum in singulis capitulis vnicum dūtaxat, rotundum, nigra, Hyacinthi comosi maioris semine minus continetur, interdum nullum, nam ut plurimum capitula inania sunt, nec arbitrat ut inquam Clusius plura collegisse ex vniqa, quā habebat, plantā, ternis feminibus, aut [quando plurima] quinis aut senis: radix rotunda, bulbosa, multis candidibus tunicis constat, exteriore subfusca, & basi multis fibris fulta.

Nomina

Quo nomine à Turcis insigniatur, me later: nam Muscan bulbis semper permixtus fuit: ego propter comæ & florum quandam cum comolo maiore Hyacintho similitudinem, *comosum Byzantinum* cognominavi. C. Bauh. Phyt. *hyacinthus* 21. siue *racemosus albus alter*. *hyac. comosus* Clus. in Pann. & hist. post.

Natales.

Circa annū 1578. primum allatus est Constantinopoli cum aliis varii generis bulbis Mag. V. Paulo à Trauthon Cæsareæ aulae Mariscallo & à secretiore Consilio, in cuius suburbano paucos bulbos videbat Maii initio florentes anno M.D. XX. Ex eodem tempore nullos missos meminit Clusius, præter vnum aut alterum, duntaxat semel atque iterum: quia forsitan non expetitur, cum nullā floris elegantia sit præditus.

HYACINTHVS COMOSVS ALBVS cum cæruleis staminibus.

Descriptio



h. hist. l. 2. c. 28. Hyacintho comoso Byzantino non admodū dissimilem & in Belgicā, & Viennā aluit Clus. nullā aut perpulillā comā præditū, cuius flores obsoleioris coloris albicantis, Byzantini floribus satis accedunt, pediculi tamē flores sustinentes, in longitudinē non excrescunt, semē & radix satis conueniunt. Vulgare eius nomen, *Hyacinthus comosus albo flore*. Nisi Clusius eandem iconem cum Lobelio haberet, dubitarem an Lobelii & Clusii descriptiones eiusdem essent

plantæ.

Camer. horti *Hyacinthus comosus leucanthemos*, & semine Italico [Norimbergæ] natus. C. Bauh. Phyt. *Hyacinthus* 20. siue *racemosus albus* 1. Lobel. *comosus albus*. *Narcissus montanus albus caruleis staminibus*. *Narcissus montani iuncifolii minimi* genus alterum Lob. obs. in appendice sine icone. Lobel. non vocat in append. plantam, cui tribuit cærulea stamina Narcissi montani iuncifolii minimi genus alterum, nec est sine icone: Adest enim icon sub titulo Hyacinthi comosi albi: bis igitur eandem tradit C. Bauh. plantam diuersis locis.

In Italia agentibus inuenta est Hyacinthi species in monte Gilbi, bulbosa planta foliis prædita Hyacinthi dumerorum quaternis, palmā longioribus: inter quæ caulis surgebat dodrantalis, summo cacumine flores multos gerens, quo modo à Lobelio pingitur Hyacinthus comosus albus, radix bulbosa alba. Similis etiam ex Italia per Fratrem C. Bauh. ex Italia innominata delata. Eandem non asserimus.

HYACINTHVS AFFINIS PLANTA.

An Bulbus Eriophorus Peruanus.



Crasculus caulis, cuius scapus magna profert pediculorum quadrantalium, circa exortū viridiū, superiūs purpureorum numerū: quorum vnusquisque florem fert maiusculum purpureū, floribus Hyacinthi nostri rari similem, quinque foliis longiusculis constantem, apicibus mediū obtinentibus. Succedūt tandē seminū conceptacula, rotunda, crassiuscula, in stilum definentia: porro singulorū pediculorum exortui ligulae adnascuntur ut in Ornithogallo, longæ, albicantes & pellucentes.

Pulcherrima hæc plāta Lugduni demonstrata fuit sicca, per Baronem quandam Germanum redouit.

redierunt ex Hispania ex qua curauimus depingendam. Sunt ab eo tempore quo primum cursui depingendam plantam modo descriptam, circiter 40. anni, quum anno 1608. Hyacinthi Peruvianum nomine donata planta de qua mox, à qua non ausimus hanc diuersam aut eandem pronuntiare: Considerandum etiam quantum nostra hæc planta à Clusii Bulbo Eriophoro Peruano in cuius icone ligule pediculis apparent [quas ipse Clusius appendiculas vocat] differat.

Sic autem Bulbum Eriophorum Peruanum describit Clus. lib. 2. cap. 23. Elegantiſſ. Eriophori genus ab eruditiss. Viro D. Simone de Tovar Medico hispalense anno 1596. accipiebam nunquam antè mihi conspectum quod iam descripto adiungendum putauim. Multa id ex radice promittit folia, surrecta initio, deinde in terram sese inclinantia, densa, carinata, instar foliorum hyacinthi, viridia, splendentiaque, quæ minutim contracta, tenuissima stamina præbent, haud secus ac primum genus. Inter hæc folia sesquipedalis nascitur caulis, teres interdum & gracilis, firmus tamen, nudus, virescens, qui summo fastigio plurimos fundit flores, initio quasi in spicam congestos, deinde ab infimo sese explicare incipientes, & in latitudinem expandentes, qui sex foliolis stellatis decussatis consistere deprehenduntur, coloris purpurei, circa umbilicum autè cærulei, vt & prominens umbo, atque, senua quæ illum ambiunt staminula lata, flauis seu pallidis apicibus prædita, singula florum folia per longitudinem secante venâ ex atro purpureâ, odo valdè tenuis & exilis: oblongis verò gracilibusque innituntur flores pediculis ex viridi purpureiscentibus, quorum singuli ex appendicularum candidarum & membranaearum sinu prodeunt: floribus successerunt trigona mucronatæque capitula, semen continentia rotundum, nigrum, semini hyacinthi Anglici seu Belgici par: bulbos eius crassus, longiusculus & quodammodo pyramidalis, ex albo flauescens (cuius squamæ, perinde ac in priore, molli lanugine plene) infima sede multis crassiusculis fibris prædita: floruit extremo Maio insequente. Cæterum cum diligenter hanc stirpem considerat Clusius, & cū hyacinthi stellati Peruanici iconem confert, plurimis notis conuenire compertit, & illà ipsâ iconem hanc stirpem, aut illi parem, expressam esse, penè sibi persuaderet: illud solum interest quod iconi folia non carinata, sed medio neruo protuberante, & subleuata adpicta sunt, tum radix nimis obtuso mucrone. Hanc ob causam Lectori optionem relinquit, vt quo loco volet, iconem adapret. *Eriophorum* Laniferi nomen huic bulbo inditum, ob tomenti copiam, quod lanæ modo in stamina diduci possit.

gis cærulea vel purpurea: intus apices cærulei sex, in quibus minima capitula lutea, & in medio stili cæruleus, cui subest rudimentum siue capitulum femininum, Floris sapor non manifestus, nisi fortè nonnihil acris & viscosus. An hic hyacinthus diuersus sit ab hyacinthi affini planta nondum asserere possumus, magna certè similitudine. Quicquid tamen sit pictura Hyacinthi Stellati Peruanici Lobelii Aduers. alt. part. benè cõ-



uenit & nobis placet, ex qua duos flosculos tantum accepimus, vnum apertum & alium clauum. Hyacinthi stellati Peruanici, ex Peruanico Orbe exemplar ad Clusium misit Nob. vir Carolus de Tassis, quod lata, crassa (vt ex icone animaduertere licuit) habuit folia, Hyacinthi Orientalis,

seu potius Eriophori bulbi, foliis similia, humi, magnâ ex parte, sparsa, & viridia, inter quæ prodiit nudus caulis, virescens, summo fastigio multis floribus, spicæ in modum simul congestis, onustus, qui ab imo sese primùm explicare incipit, instar Scillæ, Ornithogali & similibus: pediculi oblongi, ex atro virescentes, ex gracilium & exiguum foliorum alis orti flores sustinent, sex foliis stellæ instar expansis constantes, purpurei foris coloris, intus ex purpurâ cærulei, umbone, quemadmodum in vulgari, floris umbilicis, cum sex staminibus illum ambientibus, occupante. Fuerit ne aliquo odore præditus is flos, aut in semen abiit, nondum intellexi: radix bulbosa, crassaque instar radicis Hyacinthi Orientalis, fusco colore prædita foris, & multis crassiusculis fibris ab ima sede prodeuntibus firmata. Icon quæ proponitur à Clusio, antè ab eo etiam posita fuit pro Eriophoro Bulbo Peruanico.


HYACINTHVS ANGLICVS SIVE BELG.

Hic folia quatuor, & plura, caule longiora, repanda, caulis è bulbo vnicus, dodrantalis exurgit, colore & crassitie Hyacinthi Orientalis: flores odorati, cærulei seu violacei, penduli, octo aut nouem, non eodem tempore se pandentes, non nigri, vt in Orientali, quanquam tales obiter intuenti videri possent, sed ex squammatim incumbenibus & subeunibus sex foliis, oris multum reflexis, quibus adnatæ sunt fibræ luteæ ad albedinem tendentes, compositi: in quorum medio stili tenuis, triquetra, cæruleus, pediculo ferè vnciali, cui apposita ligula violacea pediculo longior, ad medium vsque florem pertingens. Semen atrum, reliquorum hyacinthorum instar.

Descriptio.

HYACINTHVS PERUVIANVS.

Sturgardiz in orto Iunii principio floruit hyacinthus Peruvianus dictus speciosus admodum flore, folia supra terram ferè sparsa, digirum circiter lata, penè glauca, vncias quatuor, vel palmum longa, sapore viscido. Caulis palmo non multò maior, rotundus, crassus, firmus: flores à medio caule innumeri prodibant, eum alternatim ambientes, ex pediculis oriundi, trium ferè unciarum, cærulei vel purpureiscentes, qui constant ex sex foliolis, sublongis, in acutum de-



xi, colore vt plurimum cærulei, subinde albican-
tes, aut candidi siue niuei, aliquando etiam Vio-
læ nigre dilutam purpuram referentes: semen in
siliquis triangularibus paruum, rotundum. Ra-
dix bulbosa, candida, perennis, lento succo, vti &
tota herba, plena.

Dodon. Gall. Hyacinthus, *lacithe*, quibusdam
Belg. *Blau & Ney*, bloomfena. Clus. Pan. p. 191.
Hyacinthus Belgicus siue non scriptus Dodon. Et
hist. post. *hyacinthum non scriptum* Dodon. non
modò circa Machliniam & Bruxellas non pos-
tremas Belgicæ vides in pratis quibusdam & sil-
uulis nascentem conspexi: sed in Gallicæ parte,
Belgicæ vicinæ, vulgò Picardia dicta in siluulis
erui dum Lutetiam proficiscerer: nusquam tamè
abundantiùs, quàm in pratis herbis & locis
Londino vicinis, & etiam longius ab ea vrbe dis-
sitis, vbi eruerè memini qui cubitali constarent
caule, & tricenos haberent flores, modò inten-
sius purpurascens, modò dilutiùs, aliquando
etiam omninò niueos (quales etiam apud Bru-
xellas nasci solebant) vel mediâ ex parte pur-
pureos, alterâ candicantes: sed carnei coloris e-
tiam inueniri, non modò ad me perscripsit hone-
stus vir & diligens Pharm. Iacobus Garctus iu-
nior Belga, verùm etiam binos eius bulbos pos-
tea misit, quorum alter corruptus, alter elegan-
tè carnei coloris florem tulit an. 1591. deinde mi-
rum in modum prolihus auctus est. Iconem à
Dodon. & Lobel. propositam, Clusius ponit sub
titulo hyacinthi hispanici de quo mox.

Lobel. & Pen. Adu. *hyacinthus Angl. Belg.* *hyacinthus Bruxellensis*. Magna huic cum Fuchiano
affinitas, sed conspicua florum discrepantia. Se-
men in folliculo herbaceo atrum, Nigellæ, vel
Cæpæ. Obs. *hyacinthus Anglicus & Belg.* Icon.
Plp. 103. *hyacinthus Belgicus candidus*. Adu. 48.
Teut. 104. Camer. hort. *hyacinthus Belgicus*. Tab.
icon. & hist. *hyacinthus Anglicus* weisser *Engli-
scher hyacinth*. C. Bauhin. Phyt. pag. 47. *hyacin-
thus* 8. siue oblongo flore cæruleo, Lob. Angl. &
Belg. subinde albicans aut candidus: aliquando
Violæ nigre colore. Item *hyacinthus* 9. siue ob-
longo flore albo, Lob. Belgicus candidus, An
autem *hyac. Belg.* candidus differat à candido An-
glico dubio, facillè mihi persuaserim eandem
plantam, variantem tantùm colore & effigie.

I. Gerard. hist. Angl. lib. 4. cap. 70. *hyacinthus
Anglicus*, Blew *Englisch hærebel*. Item *hya-*

cintus Anglicus albus, *Withe Englisch hærebel*.
Figura albi Hyacinthi ex Tabern. omninò displi-
cet.

Hyacinthi Anglici nomine Tossanus Carolus
Pharm. misit bulbū qui plātatus in horto Il. prin-
cipis Montbelgardi floruit eodem anno. I. Gar-
gillus misit mihi ex Anglia flores siccos cum his
inscriptionibus, *hyacinthus Anglicus incarnato
flore indicus vt reor.* 2. *hyacinthus Anglicus
niueus.* 3. *hyacinthus Anglicus cæruleus*. In Bel-
gio in aruis & iuxta agrorum margines, fructibus
aut arboribus confitos: & præcipuè quidem pro-
pè Mechliniam urbem vbi copiosus nascitur, flo-
ret Aprilis & Maio mense, Dod. Nusquam ter-
rarum graminoli saltus & prata vberiori sciant
copia, quàm in Anglia: Lobelius.

HYACINTHVS HISPANICVS.

HYACINTHO, inquit Clusius hist. post. non scri-
pto valde abhūmilis non est hyacinthus hi-
spanicus, *solia* tamen profert non adeò splen-
dentia, nec humi strata, sed potiùs surrecta, bre-
uiorem *caulem*, flores dilutiùs purpurascens, &
ad cæruleum colorem quodammodò tendentes,
quorum odor etiam magis obscurus: *semen, ra-
dix*, ferè conueniunt.

Floret eodem tempore cum Dodonæi non
scripto, nempe sub Aprilis finem & Maio. Hunc
in hispanicâ meâ peregrinatione non obseruaui,
sed paucos antè annos à Belgicâ missum accepi à
Generolo Dn. du Longatre, hyacinthi hispanici
in odori nomine. Vnde porro ille habuerit, mihi
incompertum.

HYACINTHVS STELLARIS CINEREVS.

HYACINTHUS Stellaris cinereus acceptus à N.
le Quelt, Rhizotomo Lutetiano, mihi nò-
dum floruit: prouenit prope Fonteyn Galliciæ.
Quam plantam intelligat Lobel. Adu. altera par-
te perpendendum: antè vnum tradidit *hyacin-
thum stellatum* Cineracei coloris apud Clu-
sium in post. hist. quantum autem is differat non
demonstrat, quanquam suspicemur, consideratâ
descriptione Lobelii hyacinthi totius albi siue
Campanillæ, hunc hyacinthum pertinere ad *hya-
cinthos Belgicos*.

HYACINTHVS TOTVS ALBUS:

Campanilla.

HYACINTHUS totus albus Campanilla: Con-
gener fortè aut idem cum superiore (ci-
nereo) qui flores summo caule vno versu
aut ordine vti Gladioli profert. Radix alba,
hyacinthi stellaris. Oritur iuxta D. Oue Lusitania:
Gallis *S. Vual*: nobis nondum floruit. Lo-
bel. Adu. part. 2.

HYACINTHVS FLORE RVBRO

HYACINTHUS quidem est flore rubro elegans,
in Lusitania propè Cogny, flores siccatos
vidit Lob. Adu. par. 2. operâ Nicolai le
Quelt Botanici.

HYACIN.

HYACINTHVS OBSELTIOR

Hispan. Anglico similis.

HYacinthus obsoleti coloris hispanicus ferotinus Clusii Pân. & hist. post. quina aut sena habet filia, oblonga, carinata, succi plena, coloris ex cineraceo virescentis, Muscari foliorum æmula ferè, angustiora tamen, flexibilia, orbiculato ferè mucrone, candidâ venâ interiore parte per longitudinem excurrente, ingrati saporis: prodiit caulis à medio foliorum, pedalis longitudinis, vel etiam amplior, gracilis, firmus tamen, nudus, duodenos, interdum etiam vici-nos, flores per intervalla ferens, deorsum spectâtes, hyacintho Anglico non multum absimiles,



senis foliis cōstantes, quorū externa valdè re-flexa sunt, in-teriora non a-deb, sed veluti tubulum quēdam imitāta: color in his valdè obsole-tus, vt qui ex purpureo, pal-lido & vires-cente permix-tus videatur, o-dor nullus: se-men fert in triangulis ca-pitulis, planū, nigrum, carti-laginōsū, circi-natā ferè ro-

tundicatis, scillā semini parē par: Radix globo-ta & rotunda, multis candicantibus tunicis con-stat, & numerosis fibris sessili parte prædita est. Spontè nascitur quibusdam Hispaniæ locis, vnde primū in Belgicam delatus, nonnullis ami-cis floruit, à quibus semine communicato, natā mihi sunt plantæ Viennæ, quæ aliquot annis nul-lum semen tulerunt, anno verò 1582. & sequenti-bus abundè, quinimò semina 1583. nata, atque si-mul ac maturuissent circa matrem sata, illo ipso anno germinarunt Septembri, & quadam ex il-lis plantæ biennio post flores dederunt, deinde capitula suum semen continentia. Serò germinat, & folia in Autumnum seruat. Iunio autem cū Liliis floret, flores etiam, semine ex eodem capi-re excepto naturam stirpium variare solere ob-seruabam, vt alii alius obsoletiores conspiceren-tur, quidam etiam virentes. Cū in Belgicam amicis primū mitteret hunc bulbū Franciscus Hollebeque, Regis Hispaniæ Simplificista & hortulanus in Aranieoz, nomen adscriptum e-rat Hyacinthi flore coloris cineracei & terrei. Et sine dubio inter hyacinthi genera recensē-dus est.


Meminit huius Lobel. Adu. par. 2. his verbis: *Hyacinthus obsoletior Hispanicus semine compresso Pæ-eratii Monspelici, &c.* C. Bauhin. Phyt. *Hyacin-thus* 10. siue ex flore purpureo pallido & virescē-te mixtus. Camer. horti, *Hyacinthus Hispani-cus obsoletior flore.*

HYACINTHVS MINOR HISPANICVS

angustifolius caruleus & albus.

Accipiebam, inquit Clus. Exot. part. 2. Ap-pend. 2. anno 1501. ab Eruditiſſ. viro Ioach. Venerio Burdigalā perpusillos hyacinthi bul-bos, quorum nonnullos caruleum florem gesta-re scribebat, alios candidum, cōsque in Hispania legisse, priores quidem apud Pontem de Suert, posteriores in monte *Seoue de S. Tourains*. Duorū autem, qui, de tribus quos conseruauī, florem tulerunt videlicet illius qui caruleum illum habet, & alterius qui album, icōnes in vna tabella ex-primendas curabam, quæ hīc adponeretur.

Is porro qui anno inſequente florem profe-



rebat: ex ra-dice bulbosa oliuæ pusillæ magnitudine, fulcā mem-brana tecta, & multis fi-bris donata, quina aut se-na promebat folia, longa, angusta, striata, & supinā parte carina-ta, viridia, hu-mi plerumq; sparsa, infer-nā parte quæ telluri proxi-ma, nonnihil purpurascen-tia, nec val-dè abſimilia

foliis hyacinthi botryocidis: inter quæ exilic-bat gracilis cauliculus dodrantalis longitudinis, obsolete purpurascens, leuis, summo fastigio sus-tinens senos aut septenos flosculos, concauos, in sex paruas lacinias per oras diuisos instar flo-rum hyacinthi Orientalis, sed longè minores, inodoros, subcaruleo, & tandem caruleo colore præditos, sex subflauī coloris staminulis ex vim-bilico prodeuntibus, in quorum medio exiguus stilus: his succedebant trigona cap'tula, mucro-nata, semen continentia. Reliquorum verò duo-rum qui altero post iam descriptum anno florue-runt, vnus florem illi cuius modò historiam de-di prorsus similem habuit: alter verò totum ni-ueum, formā quidem à superiore non differen-tem: sed ipsius plantæ folia paulò angustiora mi-hi videbantur, cauliculus etiam dilutiùs virēre.

Florebat vterque Maio mense, semen maturum præbuit Iulio: quod in vtroque genere prorsus simile fuit, rotundum videlicet, nigrum & splen-dens. Cæterum illo ipso anno Nicolaus le Quele Parisiensis rhizotomus, varios bulbos in Hispa-nia & Lusitania (vt ipse asserēbat) erutos huc venales adferēbat, inter quæ istius etiam hyacin-thi aliquot, quos vel album florem vel rubrum gestare aiebat: & sanè cum albi, tum rubri flores suis cauliculis adhuc inhærentes inter pagellas repositos mihi ostendebat, quos formā non dif-ferre à modò dictis obseruabam: cum autem qui dilute suauiterque rubeat, venas quasdam saturatiores obtinere deprehendebam per trium foliorum externorum longitudinem excurrentes.

Descriptus

Hyacinthi minoris Hispanici

Hyacinthi minoris Hispanici

Caruleo colore.

Albo flore

HYACINTHVS MINOR

Hispanicus obsoleto flore.

Mittebat (inquit Clusius Exot. part. 2. in append. 2. [Venerius anno 1602. Hyacinthi cuiusdam bulbos in Cantabris erutos, quorum flores albo cineraceo & ex albicante virescentes esse scribebat: illorum vnus insequente anno flores dedit, huius obsoleti floribus prorsus forma & colore similes, sed meâ opinione paullo minores (quia forsitan bulbi nimium afflicti fuerant) folia etiam similia & valde longa, quæ ad mensẽ vſque Nouembrem ferè viridia permanserunt. Decembri autem subsequente quatuor alios ab ipso accipiebam, quorum flores obsoletos scribebat: si Deus vitam produxerit, & hiems bulbos non corrumpet, obseruare poterimus an eiusdem sint generis. Sed etiam cum superioribus illis quorum vnum florem protulisse dicebam, alios quinos bulbos mittebat, quorum scheda quâ inuoluti, inscriptionem habebat, *Hyacinthus minimus serotinus caruleo flore*: ex his terni folia produxerunt, Hyacinthi minoris hispanici iam descripti foliis non dissimilia, sed florem nullum: Decembri etiam insequente alios ab eo accipiebam simili nomine inscriptos: proxima autem ætas nos certiores faciet [si viuimus) an eiusdem sint generis.

HYACINTHVS INDICVS

Tuberosa radice.

Descriptio



Planta rara, cuius primam cognitionem accepit fert Clus. hist. post. Bernardo Paludano: cuius caulem ab illo accipiebat bipedalem aut ampliorem, firmum, concauum, enodem, quem tamen per intervalla ambiebant octo, aut nouem folia incondito ordine disposita, & ipsum mediâ ex parte amplectentia, vt nodorum quandam speciem præberent, circa inum longiora & latiora, supernâ parte breuiora, omnia tamen catinata, dilutius virentia, satis dura, & si quis vel in minimas partes confringeret, veluti tenuissima stamina, instar foliorum Eriophori vulgaris diuulforum, ostenduntia: summus caulis desinebat in duodenos aut plures flores (quorum vnus dantaxat apertus, reliqui adhuc clausi) confertim & in spicâ quodammodo formam nascentes, vnciam longos, summâ parte in sex laciniâs aliquantulum reflexas diuissos, florum hyacinthi Asiatici instar, sed longe crassiores & magis succulentos, non minus forsitan, quàm Mali Citrii flores, sex staminibus è medio prodeuntibus [quorum apices pallidi] & illis breuiore stilo: odoratusque sit, an odoris ex-

pers, Clusium lateret, quia satis afflictum videretur, & mediâ ex parte contractum accipiebat: qualem autem radicem haberet, non erat adscriptum. Nulla porro fuerat Paludano hæc planta cui in inscriptione, *Bulbus indicus florem album præferens, floris hyacinthi Orientalis emulum*: Clusius propter tenuissima illa, instar telæ aranearum stamina, quæ cauli inhaerentia folia, vel minutim contrafacta reddebant, Eriophori genus aliquod arbitrabatur, tamen si & caulis foliis ornatus, & florum forma refragarentur, nec radix ipsi conspecta esset.

De hoc ita Lobel. Ad. par. 2. p. 488. *Hyacinthus indicus tuberosus Clusii*: Peregrinum verò rarum & eximium hyacinthi genus ab Ill. Comite Arbergio & C. viro Paludano floribus albis missum, descripsit Clusius foliis longis &c.

HYACINTHVS MAVRITANICVS.

Ex eâ Mauritanie parte in qua Feza & Marocæo vrbes sitæ, initio anni 1599. cum aliis bulbaceis plâtis adferebatur hyacinthi genus exoticum, hyacintho obsoleto hispanico serotino valde dissimile, cum foliis, tum floribus: omnia tamen in hoc paullo maiora. Nam huius folia hyacinthinis, aut Ornithogali Arabici legitimi foliis satis respondebant: & inter illa prodest caulis pedalis longitudinis aut amplior, crassior quàm in hispanico, firmus, impenitè viridis, virenos, interdum etiam plures flores sustinens sex foliis constantes, quorum externa tria nonnihil explicantur, interna quodammodo coeunt, & tibi cuiusdam formam, exprimunt, extremitate tamen aliquantulum reflexâ, veluti in hispanico iam dicto, coloris autem magis obsoleti & fusci: de semine nihil pronuciare possum, quia nullum tulit: radix bulbacea, alba, hispanici radici non dissimilis, paullo tamen maior, & ad Ornithogali Arabici legitimi radicem valde accedens. Flores dabit Maio insequente: plantas verò omnes corrumpere cum multis aliis singularibus, asperissima quæ subsequebatur hiems. Hunc cum aliis bulbis, è Mauritania acceptum, Wilhelmus Parduyn & Io. Somer ciues Medioburgenses in Walachria amicis, teste Clusio & Lobelio Ad. part. 2. communicabant.

HYACINTHVS LATIFOLIVS

Dalechampii.



HYacinthus ex Dalechamplio latifolius, qui in monte Aureo Aruerni spore crescit: radice corticosa, Lilio similis: foliis sex aut octo, nigricantibus, crassis, latis, Lili ferè: floribus purpureis elegantibus, particula primâ sese expandentibus: semine in capitulis rotundis

andis herbaceis, Hist. Lugd.

C. Bauhin. Phyt. hyacinthus 18. siue latifolius Dalech. Hunc semel tantum vidimus Patavii in orto Clariss. Medici Bechar. Triuefani flore albo. In figura Dal. radix non videtur correspondere descriptioni eius, vtram aliquis nobis ex Arternia bulbos mittat.

HYACINTHVS LILIOFOLIVS stellatus.



E Biscayæ Montibus inquit Lobel. Moutono itidem asportatus & ab eo mihi liberalissime communicatus hic admodum rarus & perelegans hyacinthus, quem appositè Liliaceum quis dixerit. Radice enim ac bulbo lilii est, sed minore & oblongiore, flauescente : vt Lilii cruenti,


siue Martagonis. Folia Lilio candido simillima : fœna aut septena, inter quæ medius exilit nudus sine foliis spithameus caulis in cuius summo flores hyacinthi stellaris caruleo purpurei.

Hyacinthum stellarum Lilii folio cum sequente descriptione Viennam ad Clusium mittebat Tornaco Io. Moutonus. Attulit, inquit, qui Pseudo-Narcissos iuncifolios communicabat, ex iisdem iugis erutum bulbum, Liliaceo satis similem, sed oblongiorem, flauescens coloris, vt Martagonis quorundam, siue Lilii sylvestris & montani purpurei radix : fœna autem vel plura fert folia, Lilii albi [ante quàm in caulem abeat] foliis similia, è quorum medio caulis exilis pede breuior, multos flores in summo sustinens, hyacinthi stellati vulgò nuncupati floribus, omnino pares, sex foliis constantes intenses caruleis, siue violaceis, eminente ex umbilico quodam veluti umbone, cuius causâ hyacinthi stellatum *νεσποφυλλον* appellat : flori succedunt triagula capitula, in quibus semen. Mittebat etiam ille anno 1586. eius bulbum ex aliquot pallefcens squamis imbricatum dispositis constantem. Sed cum toto bimestri in itinere hæsisset, atque omnino flaccidus ad me peruenisset, terræ commissum subsequens hyems corruptit. Alterum deinde bulbum ab eo accipiebam, & aliquot post annos vnum etiam à Iacobo Plateau : sed omnes mihi corrupti. Eius porro iconem à Moutono etiam acceptam in app. ad suam Strip. hist. exhibet Lobelius noster. Sed anno 1595. eius bulbum à N.V. Ioan. Boissor accipiebam, qui insequente anno mihi flores dedit. Similes bulbos ad ipsum (Exor. par. 2.) Append. 2. mittebat Burdigalâ anno à Christi natiuitate 1600. & cum insequente Ioachim Venerius, quos partim in Pyrenæis, partim in monte Gallia Aquitanica, cui nomen hoc, eruisse scribebat, vbi à pastorebus *Sarabus* appellaretur, qui etiam assererent, ani-

malibus eam plantam depascentibus caput incurvum, deinde morte in subsequi addebat etiam illis vnicum, quem valde rarum inuentum significabat, niueos flores proferentem, atque in morte *Puiole* in Hispania legisse scribebat. Omnes quidem, præter vnum aut alterum, biennio post germinarunt, sed nullum florem tulerunt : tertio demum anno vnus caruleum florem dedit : eius verò florem qui niueus esse debet, nondum videre contigit. Humenibus locis eas plantas gaudere scribebat. Eidem Clusio & aliis aliquot bulbi qui flores caruleos gerunt, plures flores, vel longiorem florum comam protulerunt, quàm præcedente anno : qui tamen pro eo missus, cuius flores essent albi, nulli florem tulit quàm illo ipso anno. In ogelandio planta vna, Porreto planta vna, honesto planta vna, Clusio etiam vnica quam habebat planta : nam quam Venerius anno præcedente ipsi mittebat, hiems corruptit.

Lobel. in append. & Ic. Pl. pag. 101. *hyacinthus stellaris Liliifolius floridus* siue *Liriophyllus*. Tabern. icon. & hist. *hyacinthus Liliaceus* siue *Liliifolius* & *hyac. 7. hyacinth.* C. Bauhin. Phyt. *hyacinthus 5. siue folius & radice Lilii*. Mihi videtur *hyacinthus Lobelii* magnam habere affinitatem cum nostro *hyacintho* raro. I. Gerard. *hyacin. stellatus Liliifolius, siue Jacinth. hyacinthus bifolius Theophrasti*.

HYACINTHVS TRIPOLITANVS.



Foliis est longis tenuissimis, Phalangio nostro similibus, caulis fatis magnus, in cuius summitate quatuor flores speciosi, colore & magnitudine similes foliis tribus erectis in parua Iride carulea : radices formâ, & colore Tulipis similes : florebat Aprili Tripoli vbi obseruauit, Rauvvolf.

Camer. in Epir. Matthioli : item ad eius hist. G. *hyacinthus Tripolitanus* quem accepi à Domino Rauvvolfio. Rauvv. itin. *hyacinthi species* incolis Tripolitanis *Ayur*. C. Bauh. Phyt. apud Matth. *hyacinthus 16. siue Tripolitanus*.

HYACINTHVS EX THRACIA.

HYacinthum florem, qualem Diosc. describit, in hortis nostris habemus, quæ ex Thracia Venetias tulimus. Folia habet bulbi protinus à radice, caulem dodrantalem, leuem, tenuioremque minimo digito, coloris herbacei, comam procumbentem, incuruam, plenam florum olentia iucundissima, coloris carulei aliquantulum ad purpuram inclinatis, primo aspectu grati, deinde euanescentis antequam satiet, semine nigro,

Coriandri magnitudine, radice bulbosâ purpuranteque: floret initio Veris cum viola purpurea. Verum quia possit aliquis cauillari, dicens hunc quem descripsimus florem non esse Hyacinthum, cum Diosc. Hyacinthi florem non colorem cæruleum sed purpureum habere descripserit, qui nec de odore quicquid meminere dicimus Diosc. per purpureum violaceum intelligere, quippe cum & violam illam quam Ic. prophyrion Græci vocant, cuius colorem violaceum siue Ianthinum vocari diximus, vñ cum Plinio coloris purpurei esse descripserit: nam & Plinius Hyacinthi colorem violaceum dilutum vocauit: Fran. Massar. in 9. Plinii cap. 41.

LEUCOIVM BVLBOSVM

Hexaphyllon cum vnico flore,
rarius bino.

Descriptio



crassiore, virente, nutat & deorsum spectat, exigui Cymbali modo, maior quam Triphyllon ex foliis sæpius sex, interdum septem, & octo, cætera candidis, mucrone acutiusculo, extrinsecus macula virente punctato, intrò leuiter reflexo: in medio apices lutei sex modicè inter se distantes stylum intimum candidum ambiunt, odor ei non gratus qui Fuchsis violarum purpurarum prorsus refert, Clusio Oxyancantha vulgò credita odorem referens. Saccedit flori capitulum vt in Narcissis siue membranaceum capitulum, Pyri modo, vt ait Clusius, turbinatum, semen ex candido flauescens, oblongiusculum durum.

Duas proponimus icones ex nostris emptiis quarum vna plantam demonstrat cum flore: incipit: altera cum semine profert, vti olim à Fuchsis exhibitæ fuerunt.

De Leucoio suo ita scripsit Theophr. lib. 6. c. 7. Leucoium (viola alba, Gaza) inter vernos flores primum se ostendit, vbi cælum clementius statim fuerit, etiam hyeme nondum exacta. Vbi vero immitius, postea.

An de hoc Plutarchus in lib. de amore fraterno:

Inter Echnopodas velut asperam & Omonin
Nascuntur passim milia Leucoia.

Mihi quidem videtur potius referendum hoc distichum ad Leucoium bulbosum quam ad Leucoia alia propter locum natiuitatis.

Brunf. sub Narcissi titulo non solum Leucoium hoc pingit, verum etiam Bulbocodium ac nomina vtriusque plantæ cum nominibus Narcissi confundit.

Trag. hist. Germ. & Lat. weißhornungs blumen. Bergen blumen. Orho vult Narcissum. Parum refert si nominent Narcissum aut Ligustrum, weißmerz violen. Quod autem quidam asserunt florere vere & Autumno falsum est. Nobis vera est iuncifolius aut syluestre Lilium Diosc. lib. 3. 120. eidem hemerocatalactum, Crinanthemon, Porphyrantes, Bulbus vomitorius, Bulbus agrestis: Etli Leucoium Theophr. quod quidem Anemone Limoniam interpretantur, constanter credimus.

Gesner. de coll. stirp. Leucoium bulbosum, weißhornung blumen. Item in cat. pl. Viola alba Theophrast.

Fuchf. hist. Leucoium Theophr. diuersum à Diosc. Leucoio, quod plærque docti non animaduertunt, Lat. Viola alba. In edit. Lugd. Fuchsi addita hæc annot. Massario in lib. 9. Plinio deprehensum est. Et icon. Viola alba Theophr.

Viola alba Belgis, weisse Spödel blumen / soomer Sortefens & weisse Zudloosen. Idem de fl. Leucoium bulbosum, exaphillon, Matthiolo Narcissi species.

Matth. in post. com. Ital. Narcissus 7. qui non describit.

Aduers. Lob. & Penx. Leuonarcissiflorion præterse vernum, viola alba Theophr. vel Moly Rondeletio: An Plinio Lilionarcissus. & Icon. Pl. 19. Leuonarcissiflorion paucioribus foliis.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 1. siue bulbosum vulgare.

Clus. pann. & hist. post. Leucoium bulbosum præ. x. maius, Rhizotomis mulierculis Meßweyl, quasi palustris viola in Germ. weißhornungs blumen / id est, candidus Februarii flos.

Thal. Hac. Leucoium bulbosum Theophr. seu Narcissus albus. & blangen blumen.

Hist. Lugd. Theophr. lib. hist. c. 7. inter vernos flores 70. leucoion, & lib. 7. hist. c. 13. bulbosis annumerat Leucoium bulbosum, Fuchf. violam albam appellat, non ab re. Germ. Weißhornungs blumen / Lugd. Campanes blanches.

Prima florum (teste Fuchsis), Tubinga hieme etiam nondum exacta, Februarii nimirum mense & die diuo Valentino sacro, vbi cælum clementius fuerit, apparet in April, vbi appropinquare iam cæperit Maius, euanescebat, inter initia Martii ad

tut ad perfectionem venit. Semen in Aprili ostendit in capitulis. Provenit in vmbrosis sylvis & locis, qualis est non procul à Tubinga pauld supra & infra monasterium Bebenhausen vocatū, vbi copiosissime nascitur. Plantatur nunc etiam passim in hortis. Dodon. Mense Maio pereunt caules & folia: sola radix perdurat vt Narcissi. Prodit maturē admodum, statimque inter bina folia florem ostendit vix liquefactis niuibz: Maio mense semen maturefcit & folia marcescunt. In sylva quadam [Pannoniæ] non procul Zolonock Ill. Di. de Bathyan oppido vdis locis solummodò obseruabat Clusius, crefcit etiā plerisque Germaniæ locis. Copiosè provenit in monte Bar Com. Momb. in dumeris, vnde transtuli in hortum Ill. E. C. habent etiam alii in hortis: copiosum inueni fflorens Mensis Martii principio inter Audincourt & Mandeure, olim dictum Epamanduodurum in itinere versus Dampierre, ex transplantatione interdum flores fert cum oëtonis foliolis, vel cum duobus floribus ex vno caule. Anno 1598. floruit Montbelgardi, fine Decembris in vno caule. Patauī obseruauī fflorens Februario in hortis nobilium, D. Cortusii & Pasqualigo: Ferratię in cænobio S. Dominici à l'Angeli. Bononiæ in horto S. Saluatoris Al burgo di S. Catharina: Lugduni, Basileæ, Geneuæ, in hortis, cum effem Monipeli, reperi propè turrim de Late plantam cum pericarpis duobus, nō multum dissimilibz à pericarpis Narcissi vnum florem habentis, sed maioribus multò, in quo femina rotunda nigra, magna, huius Leucoii fuisse suspicor, ac in catal. horti Bēbi inuenio, Viola alba Fuchsi Verna latte di Gallina.

Hoc Leucoium, ut annotauimus in descriptione, bulbum habet sapore viscido, acrimoniam vix notabili: Scribente Fuchso folia ferè qualitatē omnis expertia, radix autem dulcis & glutinosa eff, vt hoc nomine adstringat & exiccet, ut reliqui bulbi, digerētē leuiter, & cum hoc adstringentem facultatem, sicut reliquos bulbos habere ex iis quæ commemorauimus satis constat, tamen nunc nullus, quod sciam, eius stirpis vsus est.

LEUCOIVM BVLBOSVM MINVS
Triphyllon.

Totum minus Leucoio præcedenti hexaphyllo, ex radice bulbosa parua, multis tumicis albis constans, externa nōnihil nigricante, & fessili parte, multis fibris appensis: donata gustu est lento, amaro, subacti: exurgit coliculus singularis, angulosus, vaginā albā ad mediam vsque longitudinem inclusus, tenuis, concavus, nudus, dodrantalis aut pauld maior, quem ferè ad summum vsque comitantur folia bina, porracea, glauca ferè, nec ita lucida vt Leucoii Exaphylli, vel, vt ait Clusius, colore æruginoso & quodammodò cineraceo: extremum caulis tenet flos pediculo longo nutante, vaginulā aliquousque incluso, vnicus, paruus, foliolis tribus, penitus lateis, nonnihil obtusis, aliis interioribus, dupld longioribus, latioribusque constans, intra quæ alia tria, alternante situ, breuiora angustiora, rigidiora, læui cæsurā, in summo, in quo extrinsecus, corculi ex diluto virore, parē luteolo, effigiatura, intrinsecus discolorantibus, per folioli longitudinem, alternatim striis albis, & viridantibus. Totius floris medium obtinent apices lutei, rigidiusculi, sex, stilisq; exilis, candidus,

Tom. II.

interioribus floris foliolis, dimidio breuioribus.



Clusio odor nullus aut perquam exiguus: florem sequitur capitulum vt Narcissus, Oliuæ virentis [inquit Clusius] formam parē exprimens, in quo semen cādidius altero præcedenti: flos noctu se contrahit, cū Sole explicatur, etiam extra terram in hypocausto, & vt dicit Clusius, radiis Solaribus illu-

stratus, aut sudo celo explicatur.

Theophrast. de Hist. pl. l. 7. cap. 13. Inter bulbosas Leucoium, vel, vt vertit Gaza, Violam albam recenset. C. Bauhin. Phyt. Leucoium bulbosum 7. siue minus. Clusius Pann. & Hist. post. Leucoium bulbosum præcox minus, Rhizotomis mulierculis weysse veyl & Schneetropfe/hoc est, alba Viola, & Niueæ gutta, ab insigni videlicet sandore appellatur. Matthiol. Narcissus. 1. Et in post. com. Ital. Narcissus sextus, à quo non describitur, sed figura tantum ponitur. Dodon. de flor. describit & depingit, ac vocat Leucoium bulbosum triphyllon. Aduers. Lobel. & Penæ hunc tradunt sub Leucocassolito præcensi. Nonnullis Narcissus herbaceus Plinii putatur. Obs. & Ic. Pl. pag. 119. Leucocassoliton minimum. nist. Lugd. quæ figuram habet ex Matthiol. vocat Leucoium bulbosum primum. Camer. hort. Leucoium bulbosum triphyllum vulgò ad Narcissum referunt.

Prodit maturē admodum cum præcedenti, vix liquefactis niuibz quas nonnunquam etiam penetrat: Non modò in Viennensi & Leytano saltibus, sed etiam plerisque Pannoniæ pratis: vmbra tamen (teste Clusio) magis delectari videtur. Florens vidi nunc in fine Februarii passim in montibus Euganeis, vt inter Thermas Aponenses & Arquæ, &c. Item Patauī in horto Magnifici Laurentii Priuli. Hoc habemus Mōtbelgardi in hort. Ill. E. C. vbi plantauimus, floret Aprili ac citius quàm Leucoium Bulbosum hexaphyllum, obseruauimus etiam florens in hortulo nostro Ianuario & Februario sub ipsis niuibz, & anno 1597. fine Decembris.

Locus & tempus

LEUCOIVM BVLBOSVM PRÆCOX
Byzantinum.

Leucoium [autore Clusio in post. hist.] bulbosum præcox Byzantinum Leucoio minori ferè simile est, ineuntēque Martio bina folia promit illi similia, sed latiora, ærugini etiā coloris, floris gemmam vt in illo completentia: crassiusculus caulis tandem succrescens, vnicum florem vanigulā inclusum sustinet, formā superiori similem, dupld ferè minorem, tribus externis foliis alarum modo expansis, prorsus niueis, interioribus verò breuibz, bifidulis, vt in superiori.

D d d

re, simul coeuntibus, & veluti tubulum quempiam efformantibus, foris plerumque circa vngues virentibus, reliqua parte albis, oras tamen secundum crenas virides maculae inficiunt, interius verò aut magna ex parte viridia sunt,



aut octo radiis ab imis vnguibz secundum longitudinem ductis prædita: prioris fragrantiam utcumque æmularur hic flos, & suavius quidpiam spirare mihi videtur: radix secundo maior.

C. Bauhin. phyt. *Leucoium* 8. siue *bulbosum* minoris altera species. Lob. Adu. part. 2. *Leuco-Narcissus* Lyrion, siue *terrium bulbosum* *Leucoium præcox* Clusii.

Locus

Byzantio Viennam inferri coepit, Narcissi bulbis permixtum post annum 1592. Sed & simile præcurrebat Clus. Doct. Imperator Neapoli sub Autumnum anni 1592. è monte Virgineo erutum.

LEUCOIVM BVLBOSVM

Polyanthemum tardius florens, floribus minoribus.

Descriptio



Leucoium hoc vt reliquis eiusdem generis serius, ita tota mole maius, radice crassa, longè maiore, bulbosâ, quæ multis succulentis tunicis ac etiam fibris constat, sapore amaro: caulem tollit vnum aut alterum pedalem, cubitalem, & sesquicubitalem, fistulosum, crassum, viridem, qui ne planè rotundus sit impedimento est, vtrinque vel altero tantum latere elata costa acuta: folia Narcissina, virentia, caulem tanquam vagina inferiore parte complectentia, multa, Clusio quinque aut sex, carinata, semungiam aut vnciam lata, mucrone obtuso, quorum alia pari cum caule altitudine assurgunt, alia infra subsistunt in singulorum caulium cacumine ad geniculum è vagina oblonga prodeunt flores, Leucoii bulbosi hexaphylli uni-

les, paullò minores, numerosi, quini, seni, aut duodeni, tinctinabuli modo penduli, sex æqualibus & nigris foliis constantes, quorum extimam partem virides maculae inficiunt, cenis intus flammibus flauis, medioque lacteo stilo, apice viridi insignito, odorati: pediculis aliquando palmaribus, aliquando vix vncialibus, præsertim antequam flos expandatur; hique non simul sese explicantes, sed aliis expansis & ferè marcidis, alii primum è vagina pullulantes prodire occipiunt. Floribus succedunt magna & trigona angulis obtusis capita, Pyri in modum ferè turbinata (quæ facillè à limacibus apud nos acroduntur priusquam semen maturecere possit) apud nos Montbelgardi: Semen nigrum, Orobaceum, inquit Clusius, Lilia sphodeli flauo flore semini non absimile continentia.

Dodon. de flor. *Leucoium bulbosum Polyanthemum mon.* Aduers. Lob. & Pena meminerunt sub *Leuconarisso*. Obs. & icon. pl. pag. 118. *Leuconarisso*, luron *pratense*; & p. 65. *Leuconarisso*, *pratense vernum*, num *viola alba* Theophr. vel *Moly Rondeletio multiflorum*. Hist. Lugd. Dodonæo *Leucoium bulbosum terrum Polyanthemum*, quibusdam videtur esse *Narcissus* 2. Martioli. C. Bauh. Phyt. *Leucoium bulbosum* 6. siue *maius*. Sunt qui *Acrocorion* Plinii lib. 19. c. 5. qui nil nisi nomen habet, esse velint. Clus. Pann. *Leucoium maius ferotinum bulbosum*. Camer. hor. *Leucoium bulbosum Polyanthemum* vulgò ad *Narcissum* referunt.

Seriùs superioribus Leucoiis duobus plerumque germinare solet, atque Maio demum mense flores proferre. Vno duntaxat inter annis Pannoniæ loco hoc genus obseruabat Clusius, virginosis pratis supra Waraldinum anno 1579. Meminit & illi simile planè duodeviginti priùs annis exuere in pratis Lateræ vicinis cum Monspelij vineret. Sed & eius genus quibusdam pratis ad Danubium sitis infra Viennam Austriæ nascitur, cuius folia quidem similia, sed pallidiora, non adèd mucronata, & veluti bifido mucrone prædita: flores item maculis ex viridi magis pallentibus infecti. Alitur hoc etiam in Germaniis & Belgicis hortis. *Leucoium bulbosum polyanthemum* habemus in horto Illustriss. E. C. Montb. nobis missum per Nobilem virum D. à Belle fontaine ex Bizantio vbi videramus in eius cultissimo horto: olim etiam visâ fuerat hæc planta Florentiæ in horto Nicolai Ferratiensis. Accipimus quoque in Masiunster ex horto nobilis Viduæ ab Ambringue, floret Aprilis & Maio post alios duos præcedentes.

LEUCOIVM TRIPHYLLON

flore cæruleo Someri.

Lobel. Adu. part. 2. *Viola albam* Theophrasti, à D. Fuchio & Botanicis vocatam, siue *Leucoion* flore cæruleo amœnissimum, in Albania, iuxta Fritillariam albam, purpureo-phæocellulatum Constantinopoli rediens eruit prædictus D. I. Somerus, huius studii iucondi apud Mattiacos corypheus.

LEVCOIVM BVLBOSVM AVTVMNALE
minutū tenuifolium.

Cauliculo
est palmū
alto gracili, v-
nicū, interdū
alterū & ter-
tium ferens
florem omni-
nō lacteum,
pendulum, sex
foliis constā-
tem, & tintin-
nabuli modo
formatū, ino-
dorum, ingra-
rique gustus,
in quo pallida
stamina: flore
iam aperto,
demum pro-
deit quaterna
aut quina, ca-
pillaria viri-
diāque folia:

(Lob. atrouirentia) radix bulbosa [Lob. oblon-
ga, alba,] satis crassa, pro plantæ exilitate, è multis
glutinosis tunicis compacta & amara, quæ can-
dicante membrā integitur.

Clus. Hist. & post. Hist. *Leucoium bulbosum mi-
nus Autumnale tenuifolium sue quintum.* Lob. ic.
pl. pag. 120. *Leuconarcissolicon minimum Autumna-
le:* Aliam iconem habet in Aduers. part. 2.
Aicens: A foliorum quadam similitudine & exi-
litate Leucoii Autumnalis genus istud ab Egr. vi-
ro D. Theodorico Clutio in Lugdunensi Batavio-
rum Academia horri Medici primo instructore
cultum, hyacinthi Autumnalis peregrinum &
elegans genus creditum fuit: cuius delineationē
Petro Clutio fratri suo debemus. C. Bauh. *Leu-
coium 9. sue bulbosum Autumnale.*

Extremā Beticā, quā Lusitaniā contermina
est, non procul Badaioz, quam nonnulli Pacem
Augustam esse existimant, ad flumen Anam sita,
nascitur, vbi sub finem Octobris & Novembris
initio, cum suo flore crucebat Clusius, Vlyssipo-
nem proficiens, vnde in Belgicam cum paruo
filio serotino Narcisso amicis mittebat: qui diu
in pensilibus suis hortis vtrūque aluerunt, nul-
lum tamen, quod sciat, florem videre potuerunt,
& an hæcenus bulbos conferuarint ignorat.

LEVCOIO BVLBOSO FORTE AFFINIS
Bulbus flore intus luteo foris
purpureo:

Bulbus ex Hispania Clusio Pann. missus per
Regis hortulanum flore Campanulæ albæ
satis magno, terram spectante, colore
intus luteo foris purpu-
reo. C. B. Phyt. *Leu-
coium bulbo-
sum 3.*
* *

Tom. II.

LEVCOIO BVLBOSO FORTE AFFINIS
Bulbus quidam.

Bulbus Clusio missus ex Hispania per Hortu-
lanum Regis, quatuor aut quinque flores
gestans, in modum Campanulæ albæ efformatos.
C. B. Phyt. 84. *Leucoium bulbosum 2.*

BVLBOCODIVM VVLGATIVS.



Descriptio

Bulbocodii
radix bul-
bosa, vt Leu-
coii bulbosi
Theophr. vul-
gō dicti, mi-
nor, ex multis
tunicis com-
pacta, tacta &
gustu vitida
cū aliqua dul-
cedine acrimo-
niam tandem
aliquam relin-
quens, cui sub-
sunt multæ ca-
pillares fibræ,
nonnunquam
vnicæ, aliàs
plures vbi se
propagat: fi-
lia *Leucoio*

prædicto simi-
lia, longa, caulem ad summum fastigium comi-
tantia, angustiora, breuiora, colore diuerso. Allii
ferè, non tamen ex viridi lucentia vt illius, striata,
costis duabus aversa parte prædita, terna, qua-
terna, quina, unicæ vnā cum caule statim à radi-
ce exorta, aliquotque innoluta. *Caulis* palmaris
& dodrantalis, compressus, striatus, fistulosus,
cui insidet flos singularis, deorsum nutans, duas
vincias longus, sex pallidis & stellatim decussa-
tis foliis constans, magno, longo, flauoque & fim-
briato calice Campanulæ ferè figurâ protuberans,
aureus, splens, hembra comata & lacinia, in
cuius medio apices sex lutei circa pistillum con-
colorem intorquentur, & lacinia est minimo o-
dore, non, vt aliqui volunt, nullo, quia parte ge-
niculo intermedio cauli flos adnascitur, mem-
branula exalbida florem, antequam explicet, in-
uoluit: pauloque infra floris medium sex folia
pallidula, micantia, mediocriter lata, mucronata,
ex ipso floris codio, rectâ foras se pandunt. Suc-
cedunt pericarpia rotunda, in quibus semen Ca-
mer. nigrum, in principio latiusculum, temporis
progressu rotundius. Iag. Garg. Binos flores in
eodem caule obseruant Basilic.

Brühl. Tom. 1. Rhap. 20. ponit figuram sub
Narcisso, nec vllam particularem aliam eius
mentionem facit. Tragus Germ. *Gelhornügs
blumen.* Ortho Bruntel. inter Narcissos recen-
set. Matthioli. Narcissi nomine ponit commo-
dam figuram. Lugduni, quod nos recordamur,
vocat *Campanes launes.* Montbelgardi, *Cubere.*
Dodon. Gall. *Coquelourde.* Gall. & Germ. *geel
hornungs blumen.* Lat. quibusdam *Narcissus lu-
teus & Pseudonarcissus.* Item hist. flor. Et in fol.
Narcissus luteus sylvestris. Belg. *Geel Spoeten
blumen.* Gesner. de col. stirp. de hort. & in car.
pl. *Codaminum.*

Codami-
num.

Ddd 2

Aduer. Lob. & Pen. Totus luteus Narcissus montanus Theoph. Icon. Pl. p. 141. & Obl. Narcissus totus luteus montanus Theoph. Pseudonarcissus Clus. & Dodon. luteus sylv. Adu. p. 51. Bulbi codion Theoph. Cordiaminum, vt vertit Gaza, nisp. Campanilla.

Flora aurea.

Clus. nisp. *Pseudonarcissus Belgicus*. Idem post. hist. *Pseudo narcissus vulgaris*: Sunt qui putent Theophr. l. 6. c. 7. *Gallos ad idem esse*, cuius meminit Plinius lib. 21. cap. 11. inter flores qui maturè exumpunt: ac quod bis florere ait Vere & Autumnus: *Austriacæ matronæ gelb beedel*, id est, flavum calicem & gelb *Mergblumen* / hoc est, flavam violam Martiam appellant: Galli nonnulli *Coquelourdes*, alii *Porriou*, à *Porraceis* videlicet foliis. Reperitur huius genus magis præcox, alioqui non valde diuersum à iam memorato, cuius flos non pallidus, sed aureus instar maioris hispanici. hunc verò colorem interdum mutare obseruavi, hoc est calicem illum medium non minùs pallidum habere, quàm sint sex illa externa folia ipsum ambientia.

Calice pallido.

Tabernacon. & hist. *Pseudo Narcissus luteus Josephs stahlen Geel hornungs blumen*. Camer. apud Matth. Germ. *Narcissus 4. luteus, Josephs stah*: interdum fert duos & tres flores, vt in hortico meo (Norimbergæ.) Item in Epitom. Matth. *Narcissus totus luteus*. C. Bauh. *Narcissus 14. siue luteus, calice prelongo primus*. Quibudam censetur *Gallos ad idem* Theoph. vbi Gaza vertit Codiaminum secutus proculdubio Plinium lib. 21. c. 11. Communiter cuiuslibet cauli flos vnicus infidet, aliquando verò & duo.

Locus & tempus.

Mulherculæ, vt Trag. scribit, a hanc plantam in hortis sui serunt, propterea quòd inter Vernos prima floreant. Reperitur non paucis Belgii locis circa margines agrorù & Veruactorum, humido præsertim solo & in syluis locisque arboribus confitis, & similibus quoque cum in Germania, tum in hispania, transfertur etiam in hortos. Profert teste Dodonæo, sua folia, caules, & flores mense Februario & floret interdum sub niue. Semen maturum mense Martio, ita vt postea non amplius videatur. Tanta abundantia in pratis Londino satis vicinis, crescere certum est, vt in celebri illo vico, vulgò Ceapside nuncupato, Martio mense rusticæ mulieres maximà copiâ flores venales proponant, & omnes tabernæ eo flore exornatæ conspiciantur. Crescit & aliis Angliæ, & plerisque Germaniæ locis: memini & olim (inquit Clusius) cum Lo- uenii humanioribus literis operam darem, ad siluulæ illius, Cœnobio vulgò Perick dicto vicinæ, margines legere spontè natum. Nobis verò Môtbelgardii abundat Bulbocodium, vt in monte Bar, vnde transfuli in hortum Ill. E. C. Obseruavi Genetæ florens Martio, & in môt Thuiri mèse Iunio: Lugduni Februario: Parauii variis in hortis & aliis Martio. Montbelgardii Februario & Martio: floret interdum sub niue, semen maturat Martio, herba perit Aprili & Maio, manentibus bulbis in terra occultatis vsque ad sequentem annum. Abundat in colle prope *Dampierre* arcem ad Dobim: anno 1597. florebat copiosè Aprili.

Temperamentum & Virtus.

Calida & sicca est herba *Pseudonarcissi*, temperamento eodem ferè cum *Nargisso*: certa experientia inuentum est (si Dodon. non fallitur) duas drachmas huius radices adhuc recentis, in vino aut aqua cocta cum pauco semine Anisi aut Foeniculi & parua portione Gingiberis exhibitæ, purgare pituitam lentam & viscidam per inferiora. Itaque hæc radix vilis ad omnes morbos ex-

pituita viscida natos. Non dissidet à *Diosc.* *Narcisso* facie vel viribus. *Xyridis* modo purgare asserunt *Aduer.* radices decoctum, ac rusticam plebem vomitiones cum eo moliri certum est.


BVLBOCODIVM HISPANICVM



ESe (teste Lob. Obl.) *Narcisso montano* Theophrasti facie non dissimili, sed latioribus foliis, maioribusque, omnino luteis. Alit eum Ioh. Baillet Insulanus & Mutonus. Plant. icon. p. 121. *Narcissus totus luteus montanus Theophr. Hist. Pseudonarcissi* genus inuenitur à Clusio nonnullis veteris Castellæ pra-

ris, & locis montanis humidis Anglico quidè simile, sed foliis longè maioribus, magisque virentibus longiore caule, paulò minore flore, eoque prorsus flauo, & quasi aureo, videlicet tam externis foliis quàm calice: radix huius crassior est quàm in superioribus. Dodon. lat. in fol. *Narcissi sylv. alia item*, qui non facit duas species. C. Bauh. Phyt. *Narcissus 15. siue luteus calyce prelongo alter*. An Camer. in epit. Matth. inuenitur *Narcissus 3. in montibus prorsus luteus serius florens*.

BVLBOCODIVM FLORE PLENO.



Narcissi è multiplici foetura varietas, Belgicis amicorum hortis visum digna, cateroquin omnia prorsus eadè. Tarnati primum [vt Lob. Obl. testatur] reperit in horto cuiusdam pauperis. *Narcissus luteus multiplici flore*, Eidem.

Hic calice pleno, inquit Adu. part. 2. variat, sim- briatis oris, rugosis & complicatis foliis compa-

to; etiamque tantò copiâ cornu exuberante & dehiscente, vt florem totum adimpleat, multiplicati Narcissi lutei, speciemque referat: inter-

mixtus tamen pallidioribus nonnullis foliis, & quandoque ex luteo herbaceis: inferioribus senis floris, radiatis aut stellatis foliis concoloribus, remanentibusque pariter aliis sui generis quandoque, in singularibus spithamæis cauliculis simplicibus floribus. Cartera cuncta vulgari luteo Narcisso haud abfimilia.



Clus. Hisp. *Pseudonarcissus multiplex*, qui apud Belgas in hortis alitur, Belgico per omnia simile cum foliis, tum bulbo, sed flos calice caret, & eius loco innumera habet folia externis sex similia, colore pallido. Item hist. post. *Pseudonarcissus pleno flore*. An Camer. hort. *Narcissus ex*

luteo pallidus flore pleno, nullo intus calyce? Dodon. in fol. *Narcissus fylva multiplex*, qui medio calice caret. C. Bauh. Phyt. *Narcissus 22*, siue flore luteo multiplici calyce carente. Taber. icon. & hist. *Pseudonarcissus luteus Polyanthos*, Gesule Josephus Stäblein.

In Viridario quodam rustico præfectura Wilhelmsburg Sarum Episcopatus, iuxta tugurium Veturæ pauperculæ D. Ioan. Gerard. fortè fortunà hoc elegans Narcissi genus offendit. Martio cōgeneres pleni floris Narcisso luteos flores laxari iucundos.

BVLBOCODII PLENO FLORE SPECIOSUM genus Venerii.



esse arbitror, in tabella eius iconem exprimendam curabam.

Quācumq; porro ex pictura quam ad me mittebat obseruare poteram, crescebat hæc planta

Tom. II.

Pseudonarcissi vulgaris modo, quatuor oblonga viridia folia ex bulbosa radice producens, inter quæ prodibat calicis lauis, modis, viridis, pedem altus, summo fastigio membranaceum folliculū sustinens, è quo emergebat flos foliis pallidis, geminā serie dispositis, prædictis, prominente ex eius umbilico calice siue tubo oblongo, cras habente nonnihil reflexas, easque crispas & incisas; aurci prorsus coloris, veluti *Pseudonarcissi* maioris Hispanici tubus, attamen non simplici, vt ille, sed triplici, hoc est continente alterum tubum qui tertium comprehendebat: radix erat bulbosa, ex multis tunicis constans, quarum externa subfusca, multis fibris extimā sede prædita. Si vnicam duntaxat plantam reperisset, nihil nouum videretur, quia natura interdum sic in floribus ludere solet: sed quum aliquot similes obseruauit, peculiare quoddam genus esse credendum est. Scribebat etiam vnam *Pseudonarcissi* vulgaris plantam binos flores in eodem caule gerentem obseruasse, quæ alioqui vnicum soluminodò proferre soleat.

BVLBOCODII SIVE NARCISSI FLORIS lutei multiplicis varietas.

Londini dilutiorē maiorēque flore uariat, & in foliorum floris extremitatibus angustiores, in horto D. J. de Francque ville. Radix Aliū modo nucleis propagatur. Foliis est quāu superiorum paulo latioribus & tantillū recuruatis. Adu. part. 2. Lob.

NARCISSVS CYPRIVS LVTEVS polyanthes flore pleno.



Debetur hoc admodum elegans Narcissi exoticum genus egregio viro Londinensi, D. Leetæ negotiatori Constantino-politano: qui eius bulbos cū pluribus aliis è Cypro Insula delatos, amicis suis comunicauit, & hoc mense Decēb. 1604. filia pedalia, imā sede vnicam lata, su-

Descriptio

perrē angustiora, & floris vno caule foliis altiore plures, luteos, multiplicēque laxauit in horto præfati D. de Francque ville, è bulbo Narcissi crassiflore, coloris Caltanæ inuolucro recto.

Hanc Narcissum esse, ex natura quorundam exoticorum bulborum, valde suspicor, quibus à natura insitum est, vt non nisi anno primo à quo in Septentrionales regiones algidiores deuecti sunt, foli & calicis natui succo adhuc prægnantes, flores laxent. Huius enim Cyprii Narcissi folia Autumno germinare inceperunt D.

Ddd 3

Lectre, D. Coys & aliis quorum sæpè mentionem fecimus, [inquit Lobel. Ad. 2.] sed nusquam floruit bruma aut Vere elapso, in prædicto horto de Franqueville mediâ admodum mansueta hyeme, ubi flores illico leuissimâ sæva superueniente aura marcescunt. Huius familiae est Narcissus Polyanthos Byzantinus, & Lilium Alexandrinum Italicum, nec non alia Planta.

C. Bauh. *Narcissus* 16. siue luteus exilis. Pseudo: narcissi genus admodum exile Clusii. *Narcissus* 21. siue montanus coronatus.

BVLBOCODIVM MINVS.


Descriptio

Pseudo-narcissus minor Clusii.



Hispanicus & forma & flavo colore persimilem, insidentem digitali, tenui, viridi cauliculo inter folia emergenti: flori succedit trigonum, obtusis tamen angulis, & ferè rotundum capitellum, in quo semen inæquale nigrum, satis magnum pro planta proportionè: radix bulbosa, exigua, foris nigricans. Missus mihi hic fuit primum à Io. Moutono, Narcissi minimi montani lasifolii nomine; deinde à Generoso Dn. de Longatre pro Pseudonarcisso minimo Hispanico flavo. Clus. hist. post.


BVLBOCODIVM MINIMUM coronatum.



Plant. icon. p. 122. *Narcissus minimus coronatus*. T. 122. Lobel. hist. Belg. Klein ge-eroende Berg Narcisse. Lat. *Narcissus montanus minimus coronatus*. Moutonus nobis min.

An Clusius Pann. Pseudo: Narcissi genus admodum exile ex Hispania missum per Regis Hispania Borruanum. An

BVLBOCODIVM TENVIFOLIUM, flore luteo.



Nascitur, inquit Clusius, quibusdam Lusitanie, Bætarieque collibus Pseudonarcissi genus cui folia non lata ut superioribus, sed valde angusta, siue potius iacea, caulis tenuis, nudus, palmum altus, cuius extremitati insidet flos è vaginula emergens, qui sex foliis herbido pallefc-

tibus & expanfis constat, quorum medium calix flavus, calathi instar oblongus, ovis prædictis non sinuosis & fimbriatis, ut superiorum, sed æqualibus: radix exiguo Narcisso similis, intus candida, foris, nigricans. Hist. & hist. post. *Narcissus unceus foliis primus*. Sed Clusius icorem non habet pro tenuifolio primo, idè nos ex Lobelio ponimus qui fortè idem cum eo de quo Lobel. in append. *Narcissus montanus unceifolius minimus flore luteo*, palmaris longitudinis, tenuibus foliis unceis, multò exilioribus, interdum erectis, interdum ad terram reflexis: inter quæ cauliculus palmaris exeritur, in cuius summo extenui, instar cæterorum Narcissorum, consimili membrana, flos singularis, vulgato Narcisso montano similis, & penè par, aspectu suavisimo & hilariore: cui siquæ Narcissi succedit. Radicis bulbos quantus nuci ponticæ nucleus. Huius peregrini floris primus me monuit C. V. Alvarus Nonnius Medicus Antuerpianus eruditissimus. Postea eius bulbo me donavit M. D. Maria de Brimeur, è cuius vrceis florentem plantam delineari curavimus. Paucis post diebus eiusdem icorem Tornaco ad me milit noster Moutonus, sed erectis foliis ab hac duntaxat variam.

Narcissus unceifolius minimus alter flore luteo Lob. *Narcissus* 17. siue montanus luteus minimus: C. Bauh. phyt.

Florebat Ianuario, cum Vlyssipone hispalim Clusius proficisceretur, ubi incolæ Campanilla, hoc est, Campanulam vocabant.

BVLBOCODIVM TENVIFOLIUM aliud flore luteo fimbriato.

[In sigulinis [ut scribit Lobel. in append.] adferatur & colitur è Biscaia montibus in Belgium delatus bulbus à quodam à Gallicia redeuntè: Narcissus montanus luncifolius minimus alter flore luteo fimbriato reddendus pag. Obl. 63. Rugolis



gosis plicis, fimbriatisq; floribus habuit Muttonus, alioqui non differt à superiore. Narcissus montanus iuncifolius minimus, alter flore luteo fimbriato Muttoni, Lob. in append. T. 155. C. Bauhin. Phyt. Narcissus 13. siue montanus luteus fimbriato flore.

Clus. hist. post. cap. 17. i-

conem habet qualem Lobel. sub hoc titulo *Pseudonarcissus iuncifolius*. 2. flavo flore: ac addit. Alter *Pseudonarcissus* Iuncea foliis tenuiora paulo, licet surrecta, habuit folia, florem flauum, hoc est, calicem per oras leuiter & tenuiter fimbriatum, & sex illa foliola calycem ambientia, ex herbido pallescentia, in capitulo flori succedente nigram rotundiusculum semen etiam tulit: radix puilla, foris nigricans, bulbacea, tenuibus fibris à sede prodeuntibus firmata.

NARCISSVS FOLIIS FLORIS ALBIS oblongo calice luteo.

Mittebat [inquit Clus. Exot. par. 2. in append. altera] ad me anno 1601. Erud. vir Ioach. Venerius Burdigala, inter plerasque plantas quatuor Narcissi bulbos, quos duorum generum esse, & vnicū florem gestare scribebat, è singulis videlicet generibus binos. Illorum vnus insequente Aprili florem tulit. Quum verò similem antè videre nō meminerim, illius iconem in tabella exprimentam curabam quam Lectoris oculis proponere, atque eius historiam adiciebam. Habebat porro is Narcissus terna, oblonga, & satis angusta, carinataque folia, cæsi quodammodo ex viridi coloris: inter quæ prodibat caulis pedalis longitudinis, aut amplior, levis, enodis, satis gracilis, firmus tamen, summo fastigio folliculum membranaceū sustinens, è quo emergebat vnicus flos longiusculus, summā parte in fœna folia alba & in mucronem desinentia diuisus: cuius umbilicum occupabat calix flauus, semunciam longus, oris aliquantulum incisus & quodammodo fimbriatis, habens in medio stilum pallescentem, eiusdem cum calice longitudinis, cinctum sex staminibus flauis veluti farinā conspersis, eorum præsertim apicibus. Semen obseruare nequini, quia florem carpebam, vt à pictore commodius exprimi posset: valde autem suauis erat odoris. & Muscari floris odorem penè referentis: radix bulbacea, oblongiuscula, digitalis crassitudinis, alba, è multis tunicis constabat, quarum exterior subfusca, aliquot crassioribus fibris albis infimā sede donata. Alter ab eodem Venerio missus florem dabat etiam Aprili altero post superiore anno, illi profus similem: calicis tamen eius oræ magis erant croceæ. Vnum etiam non valde dissimilem videbam apud Honeft. virum Christianū Porretum, qui à Venerio acceperat: illius tamen

fœna folia ex albo pallescebant, aut *αχρῆλαι* erant, calix verò multò latior, & oras planè croceas habens. Iac. etiam Plateau similem habuisse eodem anno florentem intelligebam: illum autem à rhizotomis quibusdam Gallis redemerat cum aliis bulbis è Pyrenæis montibus erutis.

Narcissum album montanum, calyce magno luteo Botanico Lutetiano N. Quelt debet Lobel. Adu. par. 2. qui eius bulbos, vncias duas longos: & vnā, plus minus, crassitudine æquantes, in Pyrenæorum montium Souton iuxta *Baniers de Lufon* monte vocato eruit, nec dum illi floruerat.

*Narcissus
album montanum.*

PSEVDONARCISSVS ALBO flore Clusii.

Inter Narcissos reponendam esse inquit Clus. Exot. par. 2. App. 2. eam plantam quæ *Pseudonarcissi* appellationem vulgò obtinuit, nullum esse opinor mediocriter in re herbaria veratum qui dubitet: Multæ autem sunt eius differentia &c. verum enimverò nouum quoddam genus repertum est quod valde rarum censeo, cuiusque binos bulbos anno 1604. ab Eruditiss. Venerio accipiebam: Horum alter florem mihi protulit insequente Aprili quemadmodum etiam aliis. Sed & eodem anno mense Decembri Rhizotomus quidam Gallus similes plantas adferebat: valde elegans hæc planta, terna è radice bulbosa oblongiore, nigroque cortice iue membranā tecta (à cuius sede frequentes tenuisque oriebant ut candidæ fibræ) proferebat folia, dodrantem vel paulò amplius longa, Narcissi angustioribus foliis valde similia, supinā parte carinata, inter quæ nudus prodibat caulis faris exilis, non crassius, dodrantem altus, summo fastigio membranaceum folliculum gerens, è quo propendebat flos totus albus, *Pseudonarcisso* vulgatiore, quem Germani *Gelbe hornüß* blumen. Belg. verò *Gele Tulloosen* appellant, formā quidem similis, paulò tamen minor, sescunciam longus, sex foliis tubum amplectentibus



similiter constans: tubo autè paulò angustiore, & oras nonnihil fimbriatas habente, in quo sex alba stamina flauescente apice prædita, & medius stilus longior: nullum vero peculiarem odorem in eo flore obseruabam, qui aperiebatur Aprili, deinde Iunio semè proferebat in triangulari capite siue thecā, orbiculatæ, nigrae & splendens, quale Narcissi iuncifolii albo flore reflexo, sed maius.

BVLBOCODIO FORTE AFFINIS BVL-
bus flore luteo.

BVLbus ex Hispania Clusio Pann. missus per Regis hortulanum flore luteo superiore parte aperto. C. Bauh. Leucoium bulbosum 4. Nec plura habent.

BVLBOCODIO FORTE AFFINIS BVL-
bus alius flore luteo.

BVLbus Clusii Pann. alius flore luteo humili, cui semen simile Hemerocallidi Valentinae. Casp. Bauhin. Leucoium bulbosum 5. Nec plura adiiciunt.

NARCISSVS IUNCIFOLIVS OMNINO
albus calyce longo.

Scribit Clusius Hisp. & in post. hist. se intellexisse ab Hispanis Narcissi quoddam genus in

Descriptio




Hispania inueniri quod omnino iuncis etiam sit foliis, sed florem candidum producat, eaque ob causam *Iunquillos blancos* ab incolis appellari. Anno 1596. inquit preterea, à D. Simone de Tourat paucos bulbos nomine insignitos accipiebam: sed addo exiles, ut post multos duntaxat annos

illorum flores sine sperandi, imò illos ipsos nullo modo auctos anni 1600. asperum gelu, quod Februario mense valde apud Belgas laeuit, profusus corruptus. Et Pann. Narcissus iuncifolius flore albo ex Hispania missus per hortulanum Regis.

Item Exot. par. 2. App. 2. Narcissi genera duo anno 1605. apud amicos flores protulerunt, nunquam antea mihi conspecta. Primus Narcissus iuncifolius albo flore reflexo, è radice bulbosa Nucis ponticae magnitudine, candida, fusca, membrana obducta, cuius sedem plurimae tenues albae fibrae occupabant, quaternae aut quinae exiliebant folia, dodrantem longa, angusta & parè iuncea, aliquantulum striata, & supinà parte nonnihil carinata, viridia, inter quae prodibat dodrantalis caulis viridis, laevis, non valde crassus, summo fastigio sustinens in membranaceo inuolucro, binos, ternos, interdum quaternos oblongos flores, niuei quidem candoris, sed odoris expertes, deorsum propendentes, sex longiusculis in satis angustis foliis praeditos, sursum reflexis, florum cyclaminis instar, è quorum umbilico prominebat calix semunciam longus, vel etiam longior, inaequalibus oris, continens tria staminula alba, quorum apices flauescerent, & tenuem longum stilum extremas calicis oras multum superantem: succedebant triangulares siliqua sine theca, exiguo, orbiculato, nigroque & splendente semine plena. Florebat autem Aprili. Istud Narcissi genus redimebant

biennio ante à rhizotomo quodam Gallo cui nomen N. le Quelz siue Quilt, elegantes & raras plantas in has Prouincias quotannis adferre solito, quas per suos in Pyrenaeis & etiam in Hispaniis conquirere iubet. Inter eos autem qui redemerunt, nonnulli huius Narcissi plantas habuerunt paulò latioribus foliis praeditas, quarum flores etiam oblongiores erant. Alterius Narcissi iuncifolii vnicam plantam habuit Christianus Porretus Pharmacop. Leydenfis, à Petro Gassano siue Plantino missam, cuius multò longiora erant folia, quam praecedentis, & viridia: caulis etiam longior, summo fastigio sustinens binos aut ternos flores diuersae tamen à superiore formae: nam Narcissi iuncifolii minoris floribus valde similes erant: horum tamen color albus, tam ipsius calicis quam sex foliorum ipsum ambientium. Florebat etiam Aprili: radix erat non valde magna, longiuscula, membranà eam cingente profusè fusca. Accipiebat etiam ab eodem alios bulbos simili nomine insignitos, crassiores tamen, quorum folia eius foliis quos Nicolaus adferrebat valde similia erant: sed florem nondum tulerunt. Ceterum anno superiore nobis mittebat non solum Venerius, verum etiam Nicolaus adferrebat plantas Narcissi iuncifolii albo flore nomine donatas: eae autem quum florem nondum protulerint, nihil de eius forma vel colore pronunciare possum: nam bina duntaxat habuerunt hoc anno folia cum eae plantae quas nactus sum, tum quas alii redemerunt, & illa quidem angusta, supinaque parte aliquantulum plana, valde longa, non tamen surrecta, imò potius humi quodammodo procumbentia: illorum item color, meae opinionem non vnus. Nam plantarum quas Venerius mittebat, magis viridis videbatur: earum quas Nicolaus adferrebat magis ad caesium tendens, penè ut foliorum Pseudonarcissi. Si quam porro dabunt florum differentiam, proximus aut eum subsequens annus (si viuimus) certiores efficiet.

C. Bauh. Phyt. Narcissus 25. siue Iuncifolius flore albo. Iuncifolium Narcissum totis albis floribus ad Lob. Adv. part. 2. misit C. V. D. Kirch Belleual, horti Medici praefectus in Monspelienfi schola.

BVLBOCODIVM MINIMVM
tenuifolium album.

PSEUDO narcissus iuncis foliis tertius, Clusii in post. Hist. quaternae aut quinae folia habuit tenuissima, & capillaria, viridia, humi procumbentia & sparsa, inter quae cauliculus emerit infirmus, palmaris, tenuis, nudus, vnicum in summo florem è membranaceo foli-

iculo prodeuntem luteinens, tenellum, candidum omnino, & calicis oris fimbriatis: huius *semen* non obruauit, *radix* superiori similis. Omnes verò has elegantulas plantulas ipsi abstulit asperima illa anni 1586. hiems.

Narcissus omnium minimus montanus albus Lob. in append. T. 156. C.B. Phyt. *Narcissus* 20. *fi- montanus albus minimus.*

NARCISSVS IUNCIFOLIVS ALBVS
calyce magno D.Cot. Corderi tor-
tilibus foliis.



Narcissus iuncifol. inquit Lobel. Adu. pag. 2. albus tortilibus foliis floris donato, calyce magno & longo nutante, prominulo pistillo tenui, qui anno 1604. floruit Medio-Castri Walachiae apud D.C. Corderi, cuius floris iconem Londinum ad me misit. Idè esse reor cum Narcisso Iun-

tifolio omnino albo, calyce amplo, prope Betam Gallaciae oriundo, empto à Nic. le Quele Rhizotomo Parisiensi, Anno 1603.

NARCISSVS IN GENERE.

HYacinthis congener est Narcissus, qui (Theophrast. lib. 6. cap. 6. teste) etiam Lirion cognominatur. Alii siquidem hoc, alii illo nomine appellant, *Folium* ad terram Asphodeli folio simile habet, sed multò latius, vel ut Liliū: *caulem* sine foliis herbaceum: & in summo *florem*: & in pellicula quadam velut in vase, *semen* admodum magnum, colore nigrum, figurà oblongum. Hoc excidens spontè germinat: sed & qui colligunt id figunt: & radicem quoque plantant quam habet carnosam, rotundam, magnam. Sed in Narcissi descriptione Dioscorid. et Theophrast. scribens: Narcissum aliqui, & ipsum velut Liliū, Lirion vocauerunt. Folia habet Porro similia, sed tenuiora, & multò minora ac angustiora: caulem cauum, line foliis, altitudine palmum excedentem: in quo flos est albus, intus croceus, in aliquibus purpureus. Radix est sicut alba, rotunda, bulbi specie, semen velut in pellicula, nigrum, oblongum. Nec vlla diuersitas (ait Cornar.) in folio est, quod Theoph. Asphodeli: Dioscorid. verò Porri folio simile dixit. Nam & Dioscor. Asphodelo, Porri folium attribuit. Sunt & purpurea (autore Plinio lib. 21. c. 5.) Lilia, aliquando gemino caule, & carnosiore tantum radice, maiorisque bulbi, sed vnus: Narcissum vocant: huius alterum genus flore candido, calyce purpureo. Differentia à Liliis est &

hac, quòd Narcissus folia in radice sunt. Tercio generi ceterà eadem, calix herbaceus. Ita Plinius Lilia à Narcissis distinguunt. Sed clariùs deinceps de Narcissis cap. 19. agit. Narcissi duo genera, inquit, in vsum Medici recipiunt. Vnū purpureo flore, & alterum herbaceum. De purpureo eo Narcisso Virg. in Buc.

Pro mollis viola, pro purpureo Narcisso

Carduus & spinis spargit Paliurus acutis.

Ouidius etiam ad adolescentem Narcissum, floris Narcissi ortum referens, hunc affabre depingit, ita canens:

Nusquam corpus erat, croceum pro corpore florem

Inueniunt folia medium cingentibus albis.

Virgil. purpureum Narcissum[ut putat Hadrian. Spick. Itag lib. 1. cap. 31.] nominat, non quòd vndique sit purpureus: sed quia medium floris (quod calicem Plinius appellare videtur) purpureum cernatur. Plinius vnum genus Narcissi purpureo flore recenset, alterum herbaceo: quod tamen si de floris colore intelligat[inquit iam dictus Spick.] falsum est. Non enim flori color herbaceus, sed albus: in medio uerò aut croceus, aut purpureus, aut albus totus. Herbaceum caulem Narcissū adscribit Theophrast. pro *montanus*. Videtur Plinius legisse *montanus* & sic ad florem non ad caulem herbaceum retulisse. Ex his omnibus colligitur Narcissum esse ex genere florum, qui à Cornario Zeytosen / & herbisiblum / appellantur. Sunt enim multæ & coloribus diuersæ species.

Narcissus multis.

Narce.

Corona Deorum.

Ceterum, quòd Plinius ait, à narce Narcissum, non à fabuloso puero dictum, testatur hoc Plut. in Sympos. qui quasi neruos hebetantem, & torpidas facientem grauitates, refert. Quapropter & Sophocles magnorum subterraneorum Deorum coronamentum eum vocat, quòd scilicet defuncti, & morte torpidi, torpida flore meritiò coronantur. Appellatur autem etiam, Apuleio teste *adonis*, *heros*, *autogenes*. *Adonis* quidem Narcissus propriè montanus est, eò quòd ab aquis remotus proueniat. *heros* quoniam nomen ab effectu habet: Diolcor, siquidem auctore Narcissus etiam vomitum concitat.

Græci huiusmodi flores *Napizars*, Latini similiter *Narcissus* appellant. Germ. *Narcissen* rōsz lin. Belg. *Narcissen* Spaensche *Jencten* / Galli peculiare nomen non habent, possent tamen, autore Clusio *Narcisses* nominare. Hisp. *Narciso* vocant. Omnem porro Narcissum præter eum, quem peculiari nomine, *Denebshim* (Narcissum mediopurpureum) Clusius appellari dicit, Turcæ propriè appellant *Serin cade*, hoc est, Regium calicem, quòd flauum illud in medio flore, calicis formam quodammodo referat: qui verò mittunt vtiis bulbos varto corruptoque nomine, ut plurimam inscribunt, nunc *Zerem cada*, modò *Zerem cade*, interdum etiam inceptiore *Zarenchita*, addita voce *bianco*, vel *giallo*, cum colorem album vel flauum designare volunt. At qui pleno est flore, plerumque *Zerem cada catanier* appellantur, additis istis vocibus *bianco* & *giatto*, pro coloris florum, quos mittere se putabant, varietate: tamen si sepius nobis impositum deprehenderimus: nam multos simpliciter flore hoc nomine accepimus, contra nonnunquam pleno flore præditos, hac simplici *Zerem cada* inscripione. Interdum etiam tam plenus, quàm qui amplo simplici est flore, præsertim crasso prædicti bulbo, Penachio nomine missi, *Gül caxamer lala* (qua appellatione & Anemone pleno flo-

re, & alias quasdam Stirpes accepimus, quæ voces Rosæ plenæ florem significant. Sappissimè etiam eiusdem generis bulbis diuersa nomina adscripta fuisse comperimus: ut schedis additis minime fidendum sit, sed cuius coloris florem sint habituri Narcissi bulbi, ipsa auctoritas nos docere & certos reddere debeat.

Nascitur, autore Diosc. optimus in montanis locis [probatissimus in Lyciæ montibus, Plin.] odoratus: reliquus Porrum refert, & herbaceum odorem remittit. Ast contra nasci odoratum etiam in pratis refert Theocritus Eidylio 20. ubi Europam cum suis prata ingressam, bene spirantem Narcissum capillis, canit his versibus:

Florida sed postquam venere in prata puella,

Hic illa, hæc alius se floribus oblectabant:

Narcissa illa quidem bene olente, atque illa
Narcincho.

Vires &
vires

Narcissus Theophr. serotinus valde est. Nam post Auturum floret, & circa Aequinoctium (Autumni Plin.) Ita quidem Theophr. quod postremum etiam reddidit Plinius, & omnibus generibus adscripsit. Narcissi omnes serotini.

Narcissi radix (autore Diosc.) siue estur, siue bibitur, vomitus mouet: prodest ambustis ab igne cum melle trita: præciosos quoque nervos agglutinat imposita: luxatis item malleolis, diuturnisque articulorum doloribus trita cum melle, & imposita subuenit: expurgat ephelin & alphum cum vrtice semine & acetos: at cum Eruo & melle vlcera sordes expurgat, & abscessus qui ægre maturantur rumpit: educit & aculeos infixos cum Lolii farina & melle. Et in vñ quidem Medico tradendo Plinius non multum à Diosc. euariuit. Narcissus herbaceus vomitorius est, ac ideo stomacho inutilis: alius quoque soluens, nervis inimicus, caput grauans. Vtriusque porro radix mulsei saporis est. Ambustis prodest cum exiguo melle. Sic & vulneribus & luxatis. Panis verò cum melle & auenæ [arinez ver. lolii scilicet] farina. Sic & infusa corpori extrahit. In polenta tritus (trita Dod.) oleoque, contusus medetur & lapide percussus. Purgat vulnera permixtus farinæ. Nigras vitilignes emaculat. Ex hoc flore fit Narcissinum oleum (vnguentum Diosc.) ad emolliendas duritias, calcificanda quæ alferunt. Auribus est vtilissimus, sed capitis dolores facit. Cæterum Narcissi radix, ut Galenus ait, ut que adeò exiccandi facultate pollet, ut & maxima vulnera glutinet, vel ad incisiones vsque, quæ circa tendones accidunt: habet verò quiddam absterforium & attractorium. Narcissi cuiuscunque generis radicem præmansam vomitum citare Cluius sæpè numero expertus est.

NARCISSVS MEDIO PURPUREVS.


Descriptio

Radix ei bulbosa & fibrosa, sapore amari-
cante: folia à radice statim exoriantur caulem tanquam vagina aliquotque involuentia, latitudine semunciali, pari cum caule longitudine: caulis singularis, sesquicubitalis, compressus nonnihil, vtrinque acutus, fistulosus; in cuius fastigio stas vnica amoenus, suauis olens, candidus, nutans, pediculo per articulum cauli iuncto, vaginâ membranâ obnoluto, cuius ceruix in triquetram saturatè virentem floris quasi basin desinit: hinc canaliculata fistula explatatur, cui sena illa floris candidi folia coherent subrotunda, quorum tria aculeum mollicillum proferunt, rotundam alteram in eo destituantur: florem me-

dium obtinet corona fimbriata, ora rubenti, infra quam circulus exalbido, aliusque huic subiectus luteus: sena in fistuloso canali itamina lutea, tria

modicè elata, reliqua tantillâ apices proferentia. Figitur nostra ex empiriis non placet.

Narcissum suum medio purpureum Dodon. sic describit: Folia habet virentia oblonga, porro foliis similis: caulem angulosum, absque foliis, dodrantem aut pede altiore, & in summo florem membrana erumpentem,



ut plurimum vnicum, subinde geminum, mediocriter amplum, odoratum, ex sex candidis foliolis congestum, in quorum medio brevis calix est circinatæ rotunditatis, purpurei per oras coloris, intra quem itamina breuia, cum apicibus subluteolis: capicula inde angulosa: semen in his nigrum: radix bulbosa, quæ nucleos ex se demittens, in multos faciliè bulbos multiplicatur. Reperuntur autem huius generis tres, forma, colore, aut odore nequaquam, sed florenti tempore, differentes: magnitudine etiam nonnihil, sed parum, dissidentes. Maiores medii: præcoces & seriùs prodeuntes, minores sunt. Narcissus Dodon. gall. 2. flore singulari, in cuius medio circulus coloris pallidi aut herbacei cum fimbria rubra. Eiusdem hist. fl. & in fol. Narcissus medio purpureus, cui flos candidus, in cuius medio brevis calyx purpurei per oras coloris. Narcissus Diosc. Theocrito, Plut. Sophoc. Apuleio, & Plinio. Narcissus purpurei floris, cuius etiam Virg. in Bucol. Aegloga 5. & Theophr. 1. 7. meminit.

Trag. Narcissus Veterum, qui descriptioni Diosc. & Serap. pulchrè respondet: flores niui in quorum medio teres luteus ac eleuatus apparet circulus, Lunâ quadam flammæ coloris circumdatus: Diosc. dicit nonnullos vocare Narcissum Anhydron, alios Autogenes, alios Bulbon emeticon, alios Lirion, Romani Bulbum morbitarium, vel [ut alia legunt exemplaria] Vomitorium vocant.

Narcissus ille qui Trag. verus: Gesnero verò potius Anemone Limonia videtur, quibusdam Liliis Diuæ Mariæ dicitur. Lob. & Pen. Adu. Narcissus medio purpureus Dod. Vulgatissimum Poëticus, cuius croceum florem videre est, foliis medium cingentibus albis, ut scitè canit Metamorph. etque idem Dioscor. Narcissus. Flores candore micantes lacteo, corolla medium occupante fimbriatâ ex croceo purpurascente. Obs. Narcissus Poeticus mediocroceus & (vox, & super flaua est) medio purpureus Dodon. Hils. Lirio blanco & Cebolina Adu. p. 50.

Clus. Hils. Narcissus medio purpureus Dioscor. qui nonnullis Narbonensis Gallie pratis spontè pronenit. Idem Pann. & hist. post. Narcissum qui medium calycem exiguum & planum, fimbriaque

brâque rubente insignitum habet vnicum dun-
taxat ferè semper, aut rarò binos flores, eodem
caule ferentem, Turcè vocant *Deue bohini* vel *bo-
ini*, id est, Cameli siue caput nuncupant, quoniâ
floris collum longius quàm cæteri Narcissi pro-
tensum habet.

Cur Frater separet Tragi & Lobelii Narcissum
à Dodon. nondum animaduertere possum, nisi ea
distinguens particula, Et postea, in Obl. occasio-
nem ei præbuerit, verum superfluum esse satis ap-
paret ex Lob. hist. Belgica & Plantini iconibus.

Narcissus verus non ita pridem vilis Trago
fuit, primum namque è Burgundia in Germania
degenit, dein verò Biponti in horto quodam
plantatus: Flores initiis Maii mensis emicant.
Narbonensis, (tradente Lobel.) Gallòque pro-
uincia præta ornat Februario & Martio. Hortis
Belg. Germ. & Anglicis inquilinus. Exeunt qui
medio purpurei sunt [inquit Dodon.] plerisque
Galliæ locis, & apud Heduos ac Sequanos in Pra-
tis. In Belgio prioris generis præcoces Narcissi
florent Aprili. Circa Monspelium spontè Pro-
uenit in pratis quibusdam. Idem passim in Ger-
mania habetur in hortis: Basileæ habetur flo-
rens Maio in hortis. In horto patris mei vidi cū
foliolis sex ac etiam decem in vno flore. Gene-
uæ florens in fine Aprilis. In Italia spontè pro-
uenientem vidi. In Sabaudia spontè nascentem
& Maio florentem inueni prope pagum *Cormon*
non longè à S. Mauritio. Mantuæ in hortis.
Ferrariæ in horto Principis ostendente Alois.
Anguil. Montbelg. est mihi in horto Ill. E. C.
Narcissus mediopurpureus maior, qui interdum
fert duos flores ex vno pediculo.

NARCISSVS MEDIOPVRPVREVS
magno flore: folio latiore.

Meminat Clus. hist. post. Narcissi lat. septimi,
quem sic describit: Latoria reliquis *folia*,
aruginei ferè pallescentis coloris, inter quæ satis
prodit *caulis*, nudus vt reliquis Narcissis, paulò
infrimior, foris striatus, intus concauus, summa
parte sustinens magnum, laxum, membranaceum
folliculum, quo desiccante exit vnicus, vt pluri-
mum, *flos* magnus, odoratus, sex albis foliis me-
dium calicem pallidum cingentibus constans,
cuius fimbria ex pallido purpurascit: flori suc-
cedit satis crassum triangulare *caput*, nigrum *se-
men* continens: *radix* crassior superiore & cum
maiore illo, quem in Anglia spontè nasci dixi,
comparanda, etiam soboles reliquarum Narcis-
sinarum, instar, satis feliciter procreans.

E Styria allatum Dn. de Heusenstein dicebat:
serius etiam reliquis floret, nempe Maio mense.
Id genus deinde satis frequens obseruabam Frä-
corthianis in hortis.

NARCISSVS MEDIOPVRPVREVS
minor.

Spontè provenientem circa Blaumontium ar-
them Il. CÆL. Wirt. obseruauimus Narcissum,
qui etiam in eius horto Montbelgardi & aliis a-
bundat flore omnibus partibus minore quàm
precedentis, foliolis eius angustioribus & acu-
tioribus, tardius etiam florens. Clusio in Pann.
pag. 276. ni fallor *Narcissus serotinus montanus*: & in
post. hist. *Narcissus latifolius* 6. cui quaterina aut

quina Martio mense erumpunt *folia*, oblonga,
angusta, inter ea deinde *caulis* nudus, rotundus,
intus fungosus, in cuius summo, è tenui membra-
nâ prodit, vnicus nonnunquam & alter, *flos*, sex



niueis foliis
stellæ modo
decussatis cō-
stans, paruum
calicem pal-
lidum cingen-
tibus, cuius o-
ræ rubella fim-
bria exorna-
tæ, sex in eo
inæqualibus
staminibus fla-
uescentibus:
flori suauiter
odorato suc-
cedunt *capita*,
la, triangula,
crassiuscula,
in quibus ni-
grum inæqua-
le *semen*: *radix*
vt cæteris bul-
bacea, multis
candicantibus
tunicis con-

stans, extima, quæ reliquas ambit, fusca, è cuius
fessili parte plurimæ subiuscæ fibræ dependent.

Dodon. Gal. Duæ species Narcissi planè simi-
les Mediopurpureo, foliis, caulibus, semine & ra-
dice, nisi minores essent, & vna alterâ citius flo-
reret, & altera tardius. Item Hist. Lat. præcoces
& serius prodeuntes minores sunt. Plant. icon.
p. 113. *Narcissus minor serotinus mediocrocus* T. 150.

Lobelius duas habet figuras sub eodem titulo,
minor non placet, in Adu. posita fuerat pro Li-
lionarcissifolureo, verum apud Plantinum ad-
eius figura vnus è floribus. C. Bauhin. Phyt.
Narcissus 5. siue *medvolutum minor*, quem Frater
videtur separare à Dodon. serius florente. Ta-
bern. icon. *Narcissus serotinus albus*, *weiß spat*
Narcissen rôslin. In hist. Narcissus 16.

Prouenit magno [inquit Clusius hist. post.]
miliari supra Gamingâ Charchuf. Monast. D. Vir-
gini ad Thronum nuncupatæ, sacrum, pratis qui-
busdam altissimo lacui vicinis ad prædium *zer-
hoff* dictum, in quo, curantibus Carthusiæ mode-
ratoribus, perhumaniter & luculenter excepti
semper fuimus, dum in summa *Herren-alben*
& *Surrenstein* iuga tenderemus, aut ex iis iu-
gis Gamingam rediremus. Quo isthic tempore
floreat, mihi non constat: Sed illæ Viennam per-
latæ, Maio mense in meo hortulo floruerunt: ve-
rissimile est autem natali loco serius florere. Me-
mini & illi ferè similes in Euganeis montibus in-
uentos ac à Studiosis ex Italia reducibus Viennam
ad me perlatis.

*Narcissus medio purpureus minor prolifer
& mensuosus.*

In horto Bollenfi apud fontem & Balneum ad-
mirabile, admodum proliferum obseruauimus
Narcissum stellatum cum minori corolla, rubè-
re, montrosisque suos exerente in hoc florum
genere lusus. Inter alios verò in vno caule, qua-
tuor flores gestabat, eisdemque omnes foliorum
numero differentes, vnus quidem vulgaris &
sexifolius. Alter verò nouem, tribus nimirum

proliferis: at tertius decem, vno hunc excedens constabant. Quartus duplicem corollam, & præter duodecim in ambitum sed temerè disposita folia, gemina adhuc, cornuum instar sursum è medio ferè floris prodeuntia, quæ duras illas corollas separant, habebat, erat cæteris elegantior. Caulis non rotundus, sed latus ferè vnciam, densus aliquatenus, planus, & longus vt reliquorum, eum demum in quatuor diuidunt partes nodi illi, qui, vt in vulgaribus, paulò infra seminis repositorium vel capitulum adstant, arida protecti cuticula.

*Narcissus parvus stellaris albus medio
suauè rubente vertice.*

Exoticus parvus Narcissus nouus stellaris albus medio suauè rubente vertice nondum Lob. Adu. p. 2. floruit, acceptus à N. de Quelt Botanico Lutetiano cum aliis Lusitanicis Narcissinis bulbis.

NARCISSVS MEDIOPVRPVRVS
flore pleno.

Descriptio



Narcissus plenus quintus (Clusii in poster. hist.) è genere Narcissi medio purpurei latifolii sexti qui ex laxo, membranaceo folliculo exit, proditque nouo Vere cum illo, foliis, aliisque rebus omnino similis, solum discrimen in flore est, qui sex quidem maioribus foliis latè expansis

constat, vt ille, sed in calice illo rubra fimbria ornato, alia sex folia paulò minora continet, singula peculiarem fimbriatum caliculum habentia, è quorum medio, aliquot alia minuscule folia itaminibus permixta prodeunt: suauis admodum est odor, ad Muscari quodammodò accedens. Singulares vt plurimum sustinet caulis flores, interdum etiam binos, vt qui simplici foliorum texturà constantem florem fert.

Locus, & tempus. Floruit mihi Maio mense anni 1590. præcedente Autumno à Io. Boissoto Bruxellis missus. Eodem tempore pro plenò etiam Narcisso accepti ab honesto viro Io. Mermanno Colonia bulbum, qui quidem sequente vere prodiit & in summo caule vaginulam tulit: sed illa exarscens floris spem præcidit. At annus 91. planè similem superiori esse declarauit. Quo etiam anno mihi communicauit N. V. Philippus de Siruy, præfectus vrbi Montibus Hannoniæ, Narcissi bulbum, qui sequente anno florem tulit illis similem, sed viginti, & pluribus foliis constantem, intercursante illa fimbriato calyce, vt iam dicto. At qui Ill. Com. de Aremborg floruit anno 1589. quatuor & sexagena folia habuisse scribebat ad me idem Boissot, & vniti bulbi, quem ab eodem

Comite impetrauerat, prolem superiore Augusto, cum aliis aliquot raris bulbaceis stirpibus ad me mittebat: verùm tabellario, cui pyxidula, quæ inclusi erant, tradita erat Coloniam ferenda, in prædones incidente, cum illi adiunctis periret magno meo dolore.

Dodon. lat. in fol. & de fl. *Narcissus purpureus floribus multiplicibus.* C. Bauh. Phyt. Habetur Patraui in horto Bembyano multiflorus polyanthes medio purpureus.

NARCISSVS FLORE SINGVLARI
albo pleno.



Narcissus plenus sextus albo flore, autore Clusii post. videtur habere folia paulò angustiora (quàm quintus de quo proximè scriptum) alioqui non dissimilia, his floris specimen Vienna mihi dedit, sed vitium fecit, Francofurti toto biennio folia duntaxat nouo vere dedit: an id accidat propter

fœcunditatem, proles enim singulis annis satis liberaliter subministrat, ignoro: at qui bulbum cum hac icone mittebat hon. vir Iacobus Plateau, mihi significabat vnicum summo caule ferre florem sub Maii mensis finem, totum niueum & multiplici foliorum texturà constantem: huius radix minor est quarto genere.

NARCISSVS MEDIOCROCEVS
tenuifolius.



Narcissus mediocrocei nomine à Lob. Adu. part. 2. pingitur planta singulari flore de qua tradit: In Londinensi sub vrmano hortulo honestissimi viri henrici Casabri egregii, florum & fructuum rariorum studiosissimi, Anno 1602. hunc inditum Narcissum in Belgio nactus, obseruauit, palmaribus & quinque vncialibus tenuibus, Hyacinthi Autumnalis foliis, viridibus: Bulbo cæ-

teroque

teroque caule dodrantali & flore præcoci medicoræ, Narcisso non dissimili, minore tamen.

NARCISSVS MVLTOS FERENS FLORES medioluteus Narbonensis.

Radice donatus est bulbosa satis ampla, nigricantibus aliquot tunicis septa, fibrisque multis capillata, intus omnino alba & si præcidatur, lentum quandam succum, ut reliqui bulbi exstillante, amara, unde *fl.* producantur Leucoii bulbosi Exaphylli vel Porti foliis ferè similia. Clusio virentia, longa: inter quæ emergit *caulis* vnus, aliàs duo aut tres, caui, striati, nudi, vigentibus floribus, dodrantales, iisdem in semine abeuntibus plusquam cubitales, in cacumine ex membranco inuolucro, *flores*, ex longis collis & pediculis triangularibus, promunt nouem, decem, vel duodecim, interdum duos duntaxat: Monpelii locis humidis [sed qui magnitudine paucitatem condensent, nisi fortè alia species] pulchros, odoratos, quos constituunt folia sex, alba, Clusio

interdum *caulis* vnus, coronâ luteâ medullium vnde apices erumpunt ambientem. *Semen* nigrum, obsecum, rugosum, angulosum, saporis amari, in pericarpis minoribus quam Narcissi medio purpurei, Cardamomi minoris vulgò dicti, folliculis non multum absimilibus.

Lobel. &

Pen. Ada. & Obs. *Narcissus Medioluteus* Dodon. floribus senis, denis, duodenisque, minùs candidis & circinnato verticis calyculo in luteum lan-guescente. Galloprovincia, vbi gramini detrimèto, *Donas* flores quos corollis innectunt, vocitat. Plant. icon. pag. 114. *Narcissus* medioluteus *Donas* Narbonensium. C. Bauhin. Phyt. *Narcissus* 7. siue Medioluteus tertius comofo flore. Tabern. icon. *Narcissus* medioluteus 2. *Narcissen* rôsslein. Et hist. *Narcissus* 7. qui nullam ponit descr. Dodon. hist. flor. & in fol. ait: *Narcissus* medioluteus alter siue tertius, foliis non modò quàm primus (siue mediopurpureus,) verùm etiam quàm Alphodelus latioribus longioribusque: floribus in singulis caulis quatuor aut pluribus candidis, minoribus, medio eorum luteo, calyce eminentiore, multò tamen quàm Narcissi lutei silu. breuiore: radix similis est & bulbosa.

De hoc scripsit Theophrast. lib. 6. cui latius, quàm Alphodeli tribuit folium. Scribit autem Narcissi florem esse luteum, siue melini coloris, quod de medio floris calyce accipiendum esse, Ouidii testimonio iam ostendimus. Florem etenim ait Croceum, albis tamen foliis cinctum. Exemplaria Theophrast. præc omnia *melina* & *hesperia* habent, quod Hermel. & Marcello occasio-

Tom. II.

nem dedit, ut Narcissi florem nigrum esse existi-mauerint, Sed pro *melina* reponendum est *hesperia*. Est autem Melinus color, idem qui ochrea, siue luteus. Putatur autem & hic Narcissus se-rotinus à Theophrasto haberi, & Autumno demùm florere, propterea quòd in his quæ extant exem-plaribus, huius descriptionem mox subsequen-tur hæc verba: post Acturum productio floris est, & circa æquinoctium. Verùm ad Narcissi historiam hæc non faciunt: inter Narcissi siquidem descriptionem & verba ista, defectus ac hiatus est.

Nascitur (inquit Clusius) plerisque Hispaniæ, quæ Mediterraneo mari obiecta est, locis, & om-nibus ferè circa Mompelium pratis. Memini non procul Villâ nouâ oppidulo Magalonæ vicino, bulbum eruere, cuius summus caulis decem & sex flores sustineret, ut meritis *maruadis* appel-lari potuerit. Illum in C. V. Guillelmi Ronde-letii, apud quem viuebam, horto, terra commisi. Floræ in calidioribus regionibus mense Februa-rio, eruere memini etiam quasdam plantas Ianuario in pratis Boutoneto suburbano vicinis [ut interdum inter eiusdem generis stirpes alia aliis maturius germinat,] Apud Belgas verò non nisi Martio aut Aprili. Floret mense Februario, Martio & Aprili: semina durant ad Maium. Ge-neuæ florentem vidi in hortis in fine Aprilis. Parauit in horto publico cum multis floribus simplicibus, ut etiam floribus multiplicatis.

NARCISSVS PLVRES FERENS FLORES maiores præcocior medioluteus.

Narcisso (Clus. Hist. & post. hist.) medio luteo (multos ferenti flores) similis inueni-tur, paulò tamen præcocior, latioribusque foliis & amplioribus floribus, cui plerumque bini, ter-ni, quaterni, aut ad summum seni supremo cau-li inident. Adfertur Constantinopoli cum plerisque aliis, & in fictilibus ut plurimum colitur, vbi floret Aprili, interdum etiam Martio, si Veris temperies paulò calidior fuerit, maior odo-ris fragrantia in hoc nares ferire videtur quàm in superiori: Narcisso latifolio Byzantino medioluteo 2. Hic Narcissus conuenit cum Narcisso medio luteo Narbonensi quem diximus pauciores ferre flores, sed maiores. Huius [By-zantini] generis aliquot bulbos, Narcisso dopio nomine, mittebat ad me (inquit Clus. post. hist.) anno 1590. Ill. Heros & Vinc. Pinellus, quos flores perluturos sperabam, sed subsequente Ve-reme mea spe frustratum deprehendi. Nā elegantes quidem flores habui, sed simplici sex foliorū serie constantes, superiore ampliores, omnino niueos, præter medium calicem flauum, odoris frangratissimi, septenos & plures summo caule simul nascentes: folia carinata, nec minùs lata habuit, quàm qui plenum fert florem, & crassio-rem. Monitus autem quos miserat bulbos simpli-cem florem tulisse, aliis me impertit minùs cras-sis, quorum flores, pleni fuerunt, paulò tamen, minores Narcisso præcoco pleno flore.

Lobel. Obs. *Narcissi mediolutei species*, quam Narcissum præcocem faciūt Herbarii peritiores Belgæ cum Clusio latioribus floribus & foliis. Casp. Bauhin. Phyt.


Narcissus 4. siue *Me-dioluteus* maior.

Ecc



NARCISSVS ALBIDVS MEDIOLVTEVS
cum aliquot floribus.

Descriptio



ceriores, & in singulis flores 2. aut 4. prioribus similes: sed medio calyce luteo: semen & radicem bulbosam similia. C. Bauh. Phyt. Narcissus 6. siue medioluteus alter. Tabern. icon. Narcissus medioluteus. Narciſſen rôſlein. Et hist. Narcissus. 6. Tabern. mutauit figuram Lobelii non indicans quare non describit, ea quæ à nobis ponitur est ex iconibz, quas iam sculptas emimus. An Clusio Narcissus præcox simplici flore: foliis florum *ex herb. Narciſſi*, de quo antè, de Narcisso flore medio luteo Narbonensi.

NARCISSVS MEDIOCROCEVS
serotinus cum aliquot floribus.

Descriptio

Plant. icon. Narcissus mediocroceus serotinus polyanthos. Lob. Belg. Gheheime winterparde bloeynde Narcisse met veel bloemen. Foliorum turado & magnitudo eadem cum magni Narcissi lutei Hispanici, sed obscurius virentia: Maio profert flores. 2.3. vel quatuor pulchros,



magnos ex vno pediculo, qui cōstat plerumque foliis 6. & interdum 7.8. & 9. vt videantur flores pleni. Considerandum an hic Lobelii sit ille qui à nobis traditur sub. Narcisso medioluteo cū duobus aut tribus foliis & quem in horto habemus de quo paulò post.

An Dodon. in fol. Alius

Narcissus tertius, est foliis non modò quàm primus (qui medio purpureus,) verum etiam quàm Asphodelus, latioribus, longioribusque, floribus in singulis caulibus quatuor aut pluribus candidis, minoribus, medio eorum luteo, calyce eminentiore, multò tamen quàm Narcissi lutei silu. breuiore: radix similis est & bulbosa.

De hoc ita Clus. hist. post. Nascuntur Narcissi quibus latiora folia & flores simplici foliorum textura constantes, in Belgicis & plerisque Germaniæ hortis: de quibus consulendæ Cl. virorum Dodon. & Lob. obser. Illud autem dicendum putauit, Maiorem illum amplis foliis, & in eodem caule binos vt plurimum, interdum ternos & quaternos flores magnos sustinentem, sex foliis albis constantes, & pallidum calicem cingentes odoratos, [etiam qui & duodenis foliis constant,] in Anglia spontè nasci, à viris fide dignis intellexisse.

An Matth. G. & Lat. cum magn. fig. Narcissus 1. Et Ital. Narcissus 8. Figuram non artificiosam ponit Matth. sine descriptione, more consueti. Casp. Bauh. Narcissus 3. siue medioluteus pluribus floribus Matth. Lat. & ic. 4. Narcissus 1. Tabern. icon. Narciſſen rôſlein Narcissus 9. Matth. Et hist. Narcissus 12. Matth. 9.

Hic Narcissus fortè est qui prouenit in nostro Ill. E. C. horto Montbelg. cui interdum flores iunguntur cum pediculis suis, duo vt videantur pleni.

NARCISSVS MEDIOLVTEVS
Pisanus plures flores ferens.

Plant. icon. p. 15. Narcissus medioluteus Pisanus ex Italia delatus. Hæc icon Lobelii est posita à Clusio post. pro Narcisso latifolio flore prorsus albo secundo, de quo postea ex Clusio agemus. Lobel. hist. Belg. Narciſſen de middel geel von Pisse ghebredt, Narcissus medioluteus Pisanus ex Italia delatus: Herbarii Belgæ cum nostro Clusio faciunt speciem præcedentis Narcissi (nèpè mediolutei) *Dumalis* dicti: latiora habet folia, & flores multos valde pulchros, cum corolla lutea in medio, paulò minores quàm in luteo, & color viuacior, nullas Pisanas, quidam hucunt Constantinopoli delatum.

Dodon.

Dodon. de fl. & in fol. videtur huius descriptionem tradere nomine Narcissi mediolurei 2. siue Narcissi 3. si saltem ibi bene legitur floribus minoribus. C. Bauhin. Phyt. Narcissus 8. siue mediolureus. 4.



NARCISSVS EGYPTIVS.

Narcissus (autote Lobelio Adu. par. 2. d'Argiers ab aliis Aegyptius nuncupatus, erutus ab eodem N. le Quelc in Lusitania, prope D. V. de, bulbo Narcissi mediolurei Narbonensis pari & simili, sed externis involacris nigrioribus. Flores, caulis, folia, Narcisso Pitano similia, sed flores variant, quemadmodum Vere clappo annotauimus Londini in horto Nobil. Baronis Zouche, aliis minoribus, rotundioribus, & veluti decurtatis: aliis vero vna pluribus & longioribus.

NARCISSVS CVM PLVRIBVS FLORIBVS
plenis corolla lutea.

Latioribus (inquit Clusius) foliis quam primus simplex [nobis Narbonensis dictus] & quodammodo carinatis, ternis aut quaternis, caulis striatus, nudus, intus concavus, vt in superiori- bus, pedali altitudine assurgit, qui è membranaceo folliculo summo cauli insidente, ter-

nos, quaternos aut plures (nam meminigi in horto meo Viennæ florere qui septenos habuerit) flores promittit, senis albis, amplisque foliis, vt prioris simplicis tertium genus, constantes, quibus pro calyce sex alba alia folia sunt, minora tamen & flauo calicis fragmentis sic intersecta & dissuta, vt nulla calicis forma appareat, sed veluti apophysis flaua ad singula interiora folia adnata videatur: odoratissimus est ille flos, & grauedine quadam caput tentas: nullum semen in hoc genere obseruavi: radix interdum crassissima, multis spadicis tunicis septa, & frequentibus fibris donata.


Tqm. 44.

Clus. Hist. Narcissus flore multiplici, & hist. post. Narcissus plenus flore. Hunc Lobel. Obs. describit his verbis. Narcissus albus Polyanthus. Chalcedonicus elegantior, hilarior & rarior. An Narcissus 8. Matthiol. non descriptus: in deliciis habetur: floribus multiplicibus & foliis aspectu iucundis, niueis, peramentis: corona media lutea orbatis: cuius vicem multiplex florum fertura supplet, quodam tamen lutei specimine permisto inter foliola dispersè adseruato. Plant. icon. Narcissus albus polyanthus, siue Chalcedonicus elegantior, & rarior multiplex. Dodon. hist. fl. & in fol. inquit. Sunt & Narcissi multiplicibus floribus, cum primi (mediopurpurei) tum alterius generis (mediolurei) foliis & bulbis haud dissimiles. Eandem figuram habet cum Clusio & Lobelio, nostra figura non placet, est ex iis quas iam sculptas emimus.

Narcissus exoticus siue Constantinop. plenis floribus fragrantiss. qui primo suo anno ex Italia allatus (inquit Camer. hort.) floruit (Norimberge) sed postea iidem bulbi nunquam, quamuis viceret, & multa prole quotannis auferentur, florem præbuerunt. Turci vocant Gül cammer lalle. Et apud Matthiol. Germ. Narcissus 2. flore pleno, qui facile perit. Item in Epit. Narcissus 2. non differt à priori neque facie, neque viribus, quos admodum speciosos proponit, candidos quoque, sed quorum medium habet foliola. Miror ita similem facere Camerarium Narcissum plenum Matthiol. cum Narcisso mediopurpureo, à quo non solum florum plenitudine differt, sed etiam florum numero, cui neque potius sit ex genere mediolurei, de monstrante ipsiusmet figura ex Matthiol. Idem hor. Zirimcada Camer. floribus albis ex Constantinopoli.

Casp. Bauhin. Phyt. Narcissus 13. siue albus flore multiplici. Matth. in Dioscor. cum mag. fig. Lat. lib. 4. Narcissus 2. Item Narcissus 8. In Ital. cap. 162. Narciss. Item Narciss. 2. In hist. Germ. lib. 4. c. 141. Narcissus rôslein 2. siue odoratus Narcissus. Tabern. icon. pag. 601. & hist. p. 2. Geasult Narcissus rôslein, Narcissus 1. Polyanthus Matthiol. Item icon. p. 604. & hist. p. 302. Narcissus 3. Matthiol. 10. (Matth. 2.)

Bizantio singulis annis Clusio Viennam mittebatur.

NARCISSVS AMPLO FLORE, CO-
rona aurea plena.

Describitur à Clusio hist. post. Narcissus pleno flore secundus, qui folia, bulbum, caulem priori [pleno] aded similia habet, vt neuter ab altero discerni queat, foli flores distincte faciunt, qui etiam è vagina summo cauli insidente, emergunt terni aut quaterni, priori Ecce 2

magnitudine æquales, senisque foliis albis constantes, amplum aurei coloris calicem cingentes, adeò multipliciter, mirumque in modum implicatum, vt Leucoii flauì polyphyllam florem faturiorem quodammodò æmuletur: odor perinde suauis ac in priore.

Clus. duntaxat in horto Generosæ Dominæ Vnguinæ conspexit anno 1588. præcedente anno Byzantio illi missum.

NARCISSVS MINORE FLORE corona tota lutea.

Descriptio



Narcissum quandam pleno flore, sic describit Clusius hist. post. Folia & reliqua omnia superioribus (duobus plenis) ferè similia habet, paulò minor: flores in hoc etiam minores, ex albis foliis constantes, medium calycem flauū & plenum habet, emicantibus è medio oblongiusculis angustis

foliolis stellatim quasi decussatis, albi quidem coloris, sed cui & viridis foris, & pallidus interiore parte permixti sunt, odor ferè qualis in priore, sed nescio quid magis aromaticum spirans, mediis inter Narcissi & muscari odorem.

Clus. Pann. *Narcissus pleno flore*, *Narcissus multiplex* siue multiplex. 2. In hist. post. *Narcissus pleno flore tertius*. Plant. ic. p. 15. *Narcissus albus alter*, media fimbriata lutea multiplex corolla. T. 152. C. Bauh. Phyt. *Narcissus 9*. siue albus corona multiplici lutea.

Descriptio

Habui [inquit Clusius] munere Philib. de Bruxellis Cæs. dapiferi, cum perlisque aliis bulbis sub anni 1575. initium, eodem quidem anno & sequentibus folia produxit, at nullum florem: toto anno 1579. latuit, vt periisse existima-uerim. Anno subsequente Martio denuò prodijt, & Aprilis ternos flores, quales modò descripsi tulit: & proximo subsequente anno plures dum in Anglia peregrinaret, referentibus domesticis. Florent etiam superiores Aprilis. At huic antè hiemem folia emergere non solent, sed nouo Vere duntaxat, eo videlicet anno quo florem dabit. Nam si ante hiemem illi prodeunt [rarissimè id fit] proximo anno non florebit. Sæpe etiam in reliquis præcocius Narcissis qui Constantino- poli mittantur vel pleno flore vel albo medio luteo, accidit vt sterilitatis indicium sit si folia ante hiemem emerferint.

Narcissus Constantin. quem Ziden sari vocant. *Narcissus Constantinopolitanus* quem Ziden sari vocant ab amico ex illis locis [Camer. horti] transmissus bulbo anguloso, tunica tenui, nigra, vestito. C. B. Phyt. *Narcissus 12*. siue bulbo anguloso,

NARCISSVS CVM PLVRIBVS floribus totus albus maior.

Narcissus latifolius Clus. totus albus prior (Narcisso medio luteo Nardbonensi) formâ non dissimilis: folia habet terna aut quaterna, viridiora paulò iam dicto, longiora & angustiora è quorum medio exilit caulis latiusculus, angulosus tamen & concavus, cui insident seni, septeni, interdum deni flores prioribus similes, sed oblongiores paulò, & omninò niuci, quorum vi-



delicet calyx ille medi [qui priore flauus] etiam albus est, odor prioris similis, vt etiam radix.

Clus. Hisp. *Narcissus totus albus prior*. & hist. post. *Narcissus lat. simplici flore prioris albo*. Hisp. *Licio blanco* & *Cebollinas*, quibuldam etiam *Narciss*, de *Seuilla*, id est *Hispalenis* *Narcissus*, quod à me primum pos-

tea aliis inde sit missus. Hæc planta ex illorū numero est quas stirpium Historiæ Lugduni expressit: auctor Dodon. tribuit & ab eo me sumpsisse scribit. Ego verò non modò hanc, sed plurimas alias Dodonæum à me habuisse assero.

Lob. obs. *Narcissi medij lutei varietas*, *Narcissus totus albus*. Hisp. *lunquillos blancos*: Belgicis hortis inquilinus factus opera Clusii. Plant. icon. *Narcissus totus albus*. Dodon. hist. fl. & in f. *Narcissus totus albus* siue quartus antedictis formâ similis, sed per totum florem & medio quoque candidus. C. Bauh. Phyt. *Narcissus 10*. siue totus albus maior. An Camer. horti: *Narcissus albus maior*. Tabern. icon. *Narcissus albus weis* *Narcissen roßlein*. Et hist. *Narcissus 5*. *albus*. Item icon. *Narcissus muscus serotinus*, *weisspat* *Narcissen roßlein*. Frustrâ nonnihil figuram optauit neglecta descriptione. Hinc quis sit 2 loco positus nescio, cum eius tantum meminerit titulo tenus.

Illius nec capita neque semina obseruare potuit Clusius, nam Ianuario extremo nascentem pingui solo nonnullis Lusitanie & Bæticæ locis & viginosis, multaque aqua stagnantibus, eum florentem obseruabat: 1565. tum etiam Februarii initio in summa Calpe creuebat duntaxat. Eius aliquid bulbi in Belgicam missi nondum flores tulerant octennio post.

NARCISSVS FOLIIS CANDICANTIBVS cum pluribus floribus totus albus minor.

Narcissus totus albus alter, sup. priore minor, firmioribus magisque candicantibus foliis, qualia ferè sunt in Narcisso marino qui Narbonensibus

nensis Scilla siue Pancratium dicebatur, caule breuiore, & binos, ternos aut quaternos duntaxat flores proferente. Ex Hispania (inquit Clusius) post meum reditum missus, reliquis Narcissis serius, hoc est, Maio, Bruxellæ in quibusdam hortis floruit.

Clus. Hisp. Narcissus totus albus alter, Hisp. *in quibusdam albos*. In post. hist. Narcissus latifolius niueus alter. Lobel. Obs. Narcissi mediolurei varietas, Narcissus totus albus paucioribus floribus & folio albedo, rigidoque, Belgicis hortis inquilinus factus operâ Clusii. C. Bauh. Phyt. Narcissus totus albus minor paucioribus floribus. An Camer. hort. Narcissus albus minor? In Clusii iconē, plures duplō appinguntur flores, quā tradat hunc Narcissum ferre, nempe octo. Huius icon est posita inter Icones Plantini pro Narcisso mediolureo Pisano ex Italia delato Teut. hist. Lobel. de quā hic antè.

Narcissus niueus latifolius Byzantinus.

Narcissus latifolius niueus tertius Byzantio, Clusio Hist. post. allatus 1587, sequenti anno *folia* dedit primo generi similia: *caulem* inter folia emergentem, pedalem, qui ternos & quaternos flores dedit eiusdem cum superiore magnitudinis, niuei proflus coloris, id est, calice etiam niueo, è quibus emergebant sena staminina, terna aliis longiora, flaua. Alius præterea ad eō illi in omnibus similis, vt vix quispiam discernere potuisset, nisi differentiam fecissent flores illo minores, & frequentiores in summo caule nascentes, odorem & fragrantiam lasmini referētes: huius *semen* in trigonis capitibus conelutū, nigrum, inæquale: vtriusque *radix* minor paullo priore, & nigris tunicis septa, *Zerincada catamer bianco* nomine missa fuit, vt & quinquennio antè: Floruit Maio mense.

Narcissus latifolius flore prorsus flauo.

Narcisso latifolio flauo flore, siue quarto Byzantio *Zerincada catamer sari* nomine, Clusio allato, *folia* sunt proximè descriptio similia, *stos* in illo variat, nam vel totus flauus est, vel omnino pallet, præter calicem qui in hoc planè aureus est: *semen* in trigonis capitibus Narcissinum, inæquale, nigrum: *radix* tunicis spadicei coloris tecta. Icon à Clusio apposita eadem est quæ apud Lobelium in Obs. Teut. siue Belgicis pag. 171. & Ic6. Plantini p. 114. ponitur pro Narcisso albo medio luteo.

Narcissus pallido flore medio aureus.

Tradit Clus. post. Hist. Narcissum pallidum flore medio aureum siue quintum sibi missum 1596. Hispali per D. Simonem Touar Hispalensem Medicum: cuius *bulbus* latis crassus erat extremo cortice, spadiceo colore præditus, qui Ianuario sequente, quaterna protulit *folia*, lata, & quodamodò catinata, vt præcedētū aliquot, viridia, cubitalis longitudinis, inter quæ prodiit cubitalis aut altior, deinde duorum cubitorum altitudinem superans *caulis* (quam in reliquis Narcissorum generibus obseruare non memini) viridis, striatus, intus cauus, summo fastigio sustinēs membranaceum quoddam inuolucrum, è quo exibat suis periolis innitentes flores, quini, seni, septeni, aut plures, senis foliis, instar aliorū Narcissorum simplici foliorum texturā constantium


Tom. II.

præditi, coloris flauis, nonnihil quidem pallefcens, floridi tamen, quorum medius calix aureus, flauis valdè odoris. An porro prolificum *semen* daturus sit, adhuc ignarus sum, quandoquidem eo florente eius historiam concinnabam Martii initio, vt is annus valdè præcox fuit, nullā, aut perquam exiguā præcedente hieme, quæ demum extremo Martio valdè aspera fuit, & multas stirpes corripit. Non multum dissimilis erat, qui anno 1586. mihi floruit à Io. Boissor præcedente Autumno acceptus, quem Ferrariā allatum scribebat. Misit & alium cuius florem ex pallido virefcere aiebat, calicemquē angustum flauum habere sed vtrumque bulbum corruptis hiems illa rigida subsequens.

Narcissus totus luteus foliis angustis Thracicus. Iam inuenitur (teste Clus. Hisp.) & alius ex Thracia primū delatus *folia* siquidem Narcisso toto albo similibus & angustis, sed flore omnino Descripio aut luteo aut pallido, odoratissimo: *semine* Narcissino simili, *radice* plerumque minore tunicis coloris spadicei tecta. Sed qui pallidus est, colliculum medium planè aureum vti medio luteus, radicem quæ crassam, & folia non minus lata, habet. C. Bauhin. Phyt. Narcissus 27. siue totus luteus.

NARCISVS IVNCIFOLIVS

flore luteo.



Cybalis
huic cau- Descriptio

lis, foliis nudus, tenuis, in cuius cacumine desinente vtriculo membranaceo, flores emicant, in meo quidē horto bini, aliis plures, pediculis sexantibus, Narcissi vulgaris floribus similes, at minores è senis foliis radiatis totis luteis compositi quos etiam colore præditus est non tantum tubulus oblongus, sed & mediū florem cingēs corona. Caulē comitantur *folia* pauca angusta, tenuitate & virore iuncea. Radicem habet bulbosam fibratam.

Lubet hic subnectere Clusii similitū Narcissorum descriptiones: Bina aut terna sūt oblongi
Ecc 3

ga folia, angulosa, carnosa & pæne rotunda, iuncis viridioribus & medullosis, læuore coloreque quodammodo similia, nec minus flexibilia, inter quæ medius exilit caulis, rotundus, cauus, nullis ornatus foliis, in cuius summo, ex tenui quodam membranaceo inuolucro, flores terni, quaterni, aut quini prodeunt oblongi [gemelli interdum] forma Narcissifinis similes, odoratiore eo qui medio purpure^s est, flauo omnino, hoc est cā interiorē calice quā ambientibus cum foliis, quæ vel mucronata, vel mucrone nonnihil orbiculato conspiciuntur: his succedunt triangula capita obtusis angulis, vt reliquorum Narcissiorum, nigro & anguloso semine plena; minore tamen quā aliorum: radix etiam minor, candida, nigricantibus membranarum recta. Istius genus inuenitur minus, gracilioribusque foliis, cauliculis ē medio prodeuntibus pusillis, vnicum plerūque aut alterum florem duntaxat sustinentibus, flauum & odoratum vt alterius, sed foliis constantem firmiteribus & magis orbiculatis. Narcissus iuncifolius alter. A similitudine quæ eius folia cum iuncis habent *Tonquillos* vocant, nos Narcissum iuncifolium luteum dicere possumus ad differentiam alterius qui ex Thracia latiore folio defertur. Et hist. post Narcissus 10. seu angustifolius 2. & iuncifolius primus & 2. minor.

Dodon. Bulbum vomitorium esse contendit: quo autem argumento ipse & reliqui qui eius vestigia sequuntur, id probare possint libenter intelligerem? Lobel. & Pena Adu. *Narcissus luteus Aphricanus*, an Bulbus vomitorium? Item Obl. p. 62. *Narcissus luteus iuncifolius præcox*. An bulbus vomitorium? Ibidem *Narcissus iuncifolius serotinus paucioribus foliis & floribus duntaxat diuerses*. Et p. 462. append. *Narcissus iuncifolius flore rotunda circinatis roseo reddenda*. Obl. p. 62. In horto C. D. Mariz de Dorimon & D. Aluati Nonnii alitur Narcissi iuncifolii genus serotino Narcisso per omnia simile: sed flos rotundior est & latior. Sed & Hist. Belg. p. 157. *Narcisse non der frisen*. Narcissus iuncifolius præcox. Adhuc Gele spade *Narcisse met biese bladers*. Narcissus iuncifolius. Rustum p. 158. *Tonquilles met ronde bris de bloemen op de vyffe van enckel Rooskens*. lat. iuncifolius flore rotunda circinatis roseo. Et Alder mæste Spanisd. *Tonquille*, Narcissus Hispanicus iuncifolius quem &c.

Plant. icon. p. 117. Narcissus iuncifolius serotinus Lob. 62. T. 158. Et p. 124. Narcissus luteus Aphricanus præcox, an Bulbus vomitorium? Camer. horti. Narcissus iuncifolius maior & minor odoratissimo flore, vterque hyemis actioris impatiens. Dodon. in fol. Narcissus iuncifolius maior & minor vterque Belgis hortensis est. Diosc. est *Scilla quadrata* siue bulbus vomitorium. Tabern. icon. & hist. *Narcissen Roßlein*. Narcissus. 8. iuncifolius. 5. Et Narcissus 9. iuncifolius 2. Item *Großgeel Narcissen roßlein*. Narcissus 10. roseo luteus maior. Et tandem *klein geel Narcissen roßlein*. Narcissus 11. roseoluteus minor.

Tab. vel eius Cōpilator de iuncifoliis Narcissis duobus primis obiter ex Clusio pauca proponit, de duobus cum roseo flore nihil: figuras duas mutat nonnihil, sed meliores non reddit, tantum vt persuadeat ignatis ad viuas plantas paratas figuras: Cur duos roseo-luteos tradat non video: nec scio vnde desumpserit figuras cum nihil iuncis demonstret in foliis, nec in floribus accedat iuncifolio roseo Lobelii, cui flores duo ex vno pedicelo, non soli ac etiam multum diffe-

rentes: planè hoc loco Matthiolum cum suis figmentis imitatur, nec satis mirari possum aliam quem extare qui velit stirpium peritus esse, & eius natiis & figmentis patrocinari, ac ita veritatem fucum facere.

C. Bauh. phyt. Narcissus 23. siue iuncifolius maior, Clusio prior, Lobelio Aphricanus. Narcissus 24. siue iuncifolius luteus minor, Lob. serotinus. Alterum diceremus (inquit C. Bauh.) apud Clusium nisi diceret hunc multo pluribus esse foliis monente etiam Lobel. obl. p. 62. Item Narcissus iuncifolius flore rotundo, Lobelio roseo, huius maior & minor datur species, quarum Tabern. duas icones proponit nomine Narcissi roseolutei maioris & minoris. *Narcissus C. Bauh.* Sed dic quæso Tabern. vbi vidisti tales duas plantas, phantasticæ sunt icones imaginatarum plantarum, dignæ quæ iungantur multis Matthioli figuris.

Prior spontè nascitur in montanis pratis non procul Toletō, & circa Guadalupe. Posteriorem vliginosis inter Hispalim & Gades locis cum ipso flore eruebat Clus. Ianuario mense, at in Belgicis hortis neuter nisi Aprilis flores, vel etiam Maio, licet interdum denudè paulò ante brumam si mitior sit aeris constitutio. Ex Bona, & Argetia (Chartaginisque finitimis locis Aphricæ affertur: Non procul præterea Agathensis sinu affirmant inueniri, etiamque ex Hispanicis nuper in Belgium & Franciam delatos audimus. Narcissus iuncifolius prior flore luteo, mihi in horto Ill. mei Princip. ex bulbis Stuckardiae missis, florens Aprilis, hiemem apud nos facile profert.

NARCISSVS IUNCIFOLIVS flauus amplo calyce.



Narcisso 9. seu angustifolio 1. Clusii in post. hist. bina aut terna sunt folia, pedalis aut maioris longitudo, crassa & succulenta, instar foliorum Narcissi præcedentis tertii minoris, sed angustiora, & quodammodo media inter illa, sequentis iuncifolii maioris folia, carinata tamen & viridi colore prædita proximè ad iuncifolii Narcissi foliorum viriditatem accedente. prodit inter folia *caulis* gracilis, instar eius qui subsequitur firmus, pedalis longitudinis, qui summo fastigio ex membranaceo folliculo, binos aut ternos flores promittit valde elegantes, maiores & laxiores quàm reliquorum Narcissorum iunco folio, sex præditos foliis flauis, quorum mediū occupat, *calix* maior quàm in vlla Narcissorum genere, semunciam namque longus, & per oras veluti sinuosus, paulò saturioris lutei coloris, continens breuia *sex flamina* flaua, apicibus aureis prædita, & stilum flauum extrinsecus erexit.

Bulbus vomitorium
negamus
era Dodon.

crassiores: odoratis est is flos, perinde atque Narcissi iuncifolii flores. radicem habet Narcissi sequentis bulbo aequalem.

An Camer. hort. Narcissus luteus Polyanthos, id est, plures vno caule flores gerens fœtali asseruandus, brumæ seuitur impatiens. Lob. Adu. par. 2. iuncifolius Narcissus amplo calice flore luteo siue primus Clusii, è montibus D. Iacobo Gallæciæ vicinis à Nic. le Quele ad nos deuectus. Iuncifolium Narcissum magno calyce luteo ad me misit, C. V. D. D. Kirch. Belleual. horti medici primus instructor in alma Monsp. schola.

Clusio semum conspectus est hic Narcissus anno 1595. Aprilis mense suis floribus onustus apud Theod. Clutium Acad. horti præfectum Lugduni Batavorum, quo anno bulbi ipsi communicati, cum ab illo, tum à Cornelio van Hille Ecclef. Rotterodamensi.

Narcissus iuncifolius minor flore pallido.

A Venerio accipiebam [inquit Clusius Hist. post. par. 2.] Narcissi iuncifolii alterius bulbos, qui minor ad aliorum differentiam vocari poterit. Producebat is Narcissus, ex bulbo aliorum Narcissorum, iunco folio bulbis formâ non dissimili, valdè tamen pusillo, quinque aut sex *solia* angusta quidem illa & iuncea, aliquantulum tamen planiora, dodrantem aut pedem longa, nihil procumbentia, viridia: inter quæ prodibat vnus aut alter *cauliculus*, gracilis, nudus, viridis, pedalis longitudinis, summo fastigio gestans folliculum membranaceum instar aliorum Narcissorum, è quo exiliebatur vnus aut alter *flos* longo pediculo innixus, formâ iuncifolii vulgaris floribus similis, sed paulullò minor, sex foliis pallidioribus constans, cum medio *calyce* flauo, maiore aliquantulum & magis parente, quam in vulgaris Narcissi iuncifolii flore, è cuius umbilico pallidula breuiusque *staminula* emergebant, medio stylo prominente: odoratus quidem est flos: pusillò tamen grauior est eius odor quam vulgaris iuncifolii. Florebat Aprilis. Spontè nasci in illa Gallia parte scribebat, quæ vulgò *Rouergue* nuncupatur. Congener cum Narcissis iuncifoliis Hispanicis videtur Lobel. Adu. 2. Iuncifolius Narcissus erutus è Gallia præfectura *Rouergue* vernaculè vocatur, & missus Burdegalo à D. Iacobo le Venier, qui nullos tractus Pyrenæorum montium vicinarumque regionum singulis annis sedulo non percultrari.

Narcissus vernus præcocior flauo flore.

Nos iungimus Narcisso latifolio Indico alium propter similitudinem iconâ (qui potuisset etiam poni post Colchicum flore luteo quorundam,) quæ Clus. in Exot. pingit & vocat Narcissum vernum præcociorem flauo colore, ac sic describit: Narcissi genus reperitur ineunte Vere flores producens, prorsus nouum, in his præsertim regionibus: mihi cetè ante annum à Christi natiuitate 1600. videre non cõtingerat: propterea eius historiam & iconem dignam iudicabam quæ in hac append. adpõneretur. Producebat autem ille Narcissus quaterna aut quina *solia* aliorum Narcissorum instar: plana, digitum pænè lata, surrecta, viridia, Narcissi medio lutei foliorum æmula, inter quæ prodibat *caulis* ferè dodrantalis, planus, non valdè firmus, levis & enodis, sustinens summo fastigio membranaceum *folliculum*, reliquorum Narcissorum modo, è quo emergebat vn-

cus flos coloris flauo, Narcissi Autumnalis maioris flauo flore præditi formâ non valdè dissimilis, sex etiam foliis constans, sexunciam longis, semunciam latis, macronatis, quorum terna interiora paulullò longiora erant externis, totidem ex umbilico prodeuntibus staminibus candicantibus in flauum apicem desinentibus, atque illorum quidem tribus breuioribus quam cætera, cû medio stylo omnib. staminibus longiore: radicem habebat crassam, rotundam, è multis turcicis cõstantem [quarum internæ albæ, externæ verò ex spadiceo nigricantes] & infimâ sede multis fibris præditam.



Præcox erat hic Narcissus; nam quum eius bulbum ab ill. viro Ioanne Vincentio Pinello missum Patavio sub initiũ Nouembris anni à Christi natiuitate 1600. accepissem, illic in fictili terræ committebâ, vt à cæli inclementia per hiemem facilius præseruare possem: atque insequen-

te Februario florem producebat, & illum quidâ nullâ odoris gratiâ præditum: quod an acciderit, quia liberum aërem non habuerit ignoro: nâ diligentius obseruare non licuit, propter subsequenti anni hiemem asperiozem, quæ plantam prorsus corrumpebat: tum quia aliam similem postea narcisci non potuerim, taructi summam diligentiam non semel adhibuerim.

Narcissus flore caruleo.

Narcissus flore caruleo ex Hispania Clus. Pann. per Regis hortulanum missus. C. Bauh. Phyt. Narcissus 38. siue flore caruleo Clus. Lobel. & Pena Adu. Narcissus purpureo caruleus: Quibus asserébant non postremæ fidei amici se nactos toris floribus purpureis Narcissos prope Lanum fluuium, non procul Monspelio, quos tamen diu, sæpèque inibi & aliis adiectis pratensis frustra venati sunt, ac studiosos simplicium & præceptores suos, vt indicarent, rogarunt. Monuit quidem Malachias Bernardus Med. Doctor Lobeliũ Adu. par. 2. se in horto D. Quintini Narcissum hunc solo flore caruleo à Mediocræo diuersum collegisse.

NARCISSVS INDICVS LATIFOL. rubro flore.

Elegantis Narcissi (inquit Clusius hist. post.) Descriptio (qui inter eos qui latiora habent folia 8. erit) flos cum aliquot foliis mihi mittebatur à D. viro Bernardo Paludano qui Indicum cognominabatur: ego eius historiam pro meo modulo ita cõcinabam: Sena vel plura habet is Narcissus se-



Tempus

lia ferè in Narcissi Autumnalis minoris (de quo cap. 16. huius libri) flore conspiciuntur, non flum tamen, ut illa, verum rubri saturi & splendens coloris, instar floris Arupdinis Indicae vulgò appellatae, cui non valdè ab similis est, è quorum medio prodibant sex *stamina* eiusdem pænè coloris, oblonga (quibus insidebant apices fusi coloris quia forsitan ex attritu corrupti) & medius stilus, sub quo rudimentum triangularis capitis, quod haud dubiè *semen* dedisset, forè etiam maturum, nisi ipse florem præcidisset, ut mihi conspiciendum præberet: *radicem*, Paludano referente, habet bulbaceam, Cæpis vulgaribus rubentibus prorsus similem. Vnicam autem eius plantam habebat, ipsi missam ab Eruditis viro D. Simone de Touar Hisp. medico, quæ florem dabat Iunio 1594. alterum expectabat sequente mense quoniam præcedente anno eadem planta bis illi florem prorulisset mensibus Iunio & Quintili. At anno insequente, ex Indice Touarici horti, & Epistolis quas ipse Touar ab me deinde scribebat cognoscebam Narcissum Indicum Iacobæum ab ipso nuncupatum.

Narcissus Indicus, Iacobæus mihi indigitatus, ut scribit in epistola Cal. Iunii 1596. ad me data ex Occidentali Indiâ [vbi Azcal Xochilt, quod est Bulbus flore rubro, vocatur] nobis delatus: nulli rei herbariæ Scriptori hæcenus, quod sciam, notus, cuius radix bulbosa, Cæpæ rotundæ similima, verum supernè tunica pulla: folia primum emittit crassa, oblonga, Narcissi marini, tibi Hemerocallis Valentina dicti, æmula: secundum folia verò, atque ad eò, ex latere, pedalis & longior etiam emicat caulis, plerumque vnos, aliquando verò & alter, nonnunquam pariter, [quamquam hoc rarò] interdum successivè, dilutè rubens, compresso tamen stilo, cauus, & interius subalbidus, qui in membraneam desinit vaginulam saturatè rubentem, & ad extremum acuminatam fistulamque, è qua flos vnicus erumpit, oblongus, pediculo nixus viridiore, qui deorsum inflexus & veluti procumbens (ut in Leucio bulbo vel Lilio rubro, tamen non æquè nutans), sex munitur foliis eleganti minui colore rubentibus, tribus superioribus: totidem inferioribus: quorum quod è superioribus mediū est, fuscè minus eminere: reliqua duo ad latera à medio reflectuntur: inferiora autem deorsum curuatur, cunctis, ita coccinatis, ut ensis etiam rubri, qui ab ordinis S. Jacobi Equitibus in veste gestatur, for-

ma valdè referat, unde Iacobæi cognomen ipsi à me inditū. Sunt porò in hoc elegantissimo flore stamina septem àmilitè rubra: quorum mediū aliquantò longius in triangularem apicem desinit: cætera sex apices transuersi finiunt, interius fusi, superficie verò luteo pulvisculo obducti: cuncta autè, ad mediā ferè eorum longitudinem, mediū ex inferioribus folium ambit: idem etiam à reliquis duobus inferioribus cõplexum: argue vbi hæc deorsum flectuntur, stamina ipsa sursum eleuantur. Illo ipso porò anno floris cum suo caule & foliorum iconem ad me mittebat Ill. C. Aremergius, quam ad viuum depingi curauerat, ex planta quæ illi florem protulerat, à D. Touare eodem anno accepta: deinde sequente Februario bulbi suis coloribus expressi iconem, quæ crassus est, tunica exteriore fusca tectus, fibrisque infima sede, nonnihil prominente, frequentibus, crassis plerisque & in alias tenuiores diuisis, & aliis minoribus præditus.

Lob. Adu. par. 2. *Narcissus Indicus rubro flore Clusii*, & *Narcissus Iacobæus D. de Tour.* à Civito Bernardo Paludano acceptus Mediocrastri Walacrie vnicum florem laxavit D. Ioanni Somero. Sed cum exactior, latèque elegantissimi ac amoenissimi floris extensi icon Luteria ex Christiani. Regis Henrici Bourbonni rarissimis plantarum exemplaribus delineata, enataque in horto D. I. Robini, allata mihi sit, huc inferendam operæpretium duxi.

PANCRACTIVM VETERIBVS

Pancratium (*πανκράτιον*) à vincendis & profligandis morbis omnes denominasse videntur.

Scillam, sunt (ut ait Dioscor.) qui appellant. Pancratium [ut idem describit] radix est, bulbo magno similis, subfulva [*ὀκράτιον*] aut subpurpurea [*ὀκράτιον*] amari ac feruidi saporis. Folia habet Lilio similia, sed longiora. Vim eandem quam Scilla habet. Preparatur & eodem modo, & exhibetur, faciens ad eandem affectiones. Minor tamen huius facultas est quam Scilla. Vnde succus ex radice huius expressus, & ad Erui farinam ammixtus, & in pastillos efformatus, cum aqua mulsa, & splenicis & hydropicis vitiliter exhibetur. Hæc Diosc.

Plinius eadem ferè dicit l. 27. c. 12. his verbis: Pancration aliqui Scillam pusillam appellare malunt, foliis albi Lili longioribus, crassioribusque, radice bulbi magni, colore rubro. Alum foluit, succo cum farina Erui sumpto. Vlcera purgat. Hydropicis splenicisque cum melle datur. Alii decoquunt eam, donec aqua dulcis fiat. Eaque effusa radicem terentes digerunt in pastillos Sole siccatos.

Dodon. in fol. Plinium reprehendit, dicens: In Plinii verbis, & contradictio quadam apparet & à Diosc. sententia diuersa: Si enim radices magni bulbi, quare Scilla pusilla appellatur: Folia Lili albi crassiora Plinius, angustiora habet Diosc. Atque vel hinc Plinii exemplaria plerique locis corrupta esse apparet: proinde & quæ de vtraque Scilla scribuntur posse vitata esse.

Cord. in Dioscor. Scillæ speciem facit. Pancratium, (inquit) minor Scilla est, quæ hodie rarò ad medicinæ vsum affertur: quantitate & viribus maiori inferior.

CiBauh.

Casp. Bauhin. apud Matthioli. videtur securius eandem dicere cum Narcisso tertio Constant. Matthioli, & Narcisso marino Dodonæi: quis ex dictis verbis id potest asserere?

Scillam vulgarem omnem ruffam multi Pancratii volunt, quidam tantum inter eas minores bulbos. Videtur Casp. Bauhin. ab hac Scilla vulgari separare Pancratium Clusii, quod non placeat. Dicitur Pancratium quibusdam [nobis Pancratium Monspessulanum] nonnullis etiam Pancratium Lacunæ, & Hyacinthus cæruleus maximus Fuchii, de quo Dalechamp. aliquando annotavit esse verum bulbum. Pancratium ex Dioscor. vim eandem quam Scilla habet. Preparatur & eodem modo, & exhibetur ad easdem affectiones. Mitior tamen huius facultas est quam Scillæ. Vnde succus ex radice huius expressus & ad Erui farinam amixtus, & in pastillos efformatus, cum aqua multæ splenicis & hydropicis exhibetur. Aluum soluit [vt Plinius tradit] Succo cum farina Erui sumpto: vlcera purgat. Hydropicis splenicisque cum melle datur. Alii decoquunt eam donec aqua dulcis fiat. Eaque effusa, radicem terentes digerunt in pastillos Sole siccatos, & postea vtuntur ad capitis vlcera, & cetera quæ repurganda sunt, ita ad tussim quantum tribus digitis apprehenderint, in vino dantes, & ad lateris dolores aut peripneumonici Eclegmate. Propter Ischiada in vino bibendum & propter tormina mensisque ciendos. Radix [inquit Gal. simpl.] Pancratii Scillæ similem gustu refert: quare eam quidem pro Scilla, si ea non adsit, vtuntur: efficit omnia in genere quidem similiter, sed longè imbecillius.

PANCRA TIUM MONSPESSVLANVM,
multis Scilla alba Parua.

Pancratium Monspelianum, radice nititur bulbosa, minore quam Scillæ vulgaris ruffæ, Lobelio Obseruat. cum maxima est, quanta maximi Lilii aut Arancii vel Limonii, oblonga, fibris donata, cortice Cepæ obrecta pullo, intus candido, tunicis vestita Cepaceis, pellucidis, leuiter striatis, aliquot detractis candidissimis, etiã in medutillio satis crassis, minùs tamen quam Scillæ dictæ, albis, viscidis, amaris sine acrimonia: folia septena vel octona, porraceis similia, cubitalia, pollicem circiter lata, coloris glauci, in obtusum mucronem desinentia: Inter hæc caulibus attollitur, parum foliis longior, crassitie Alphodeli, tenerior, nudus, enodis, qui è fastigijs folliculo membranaceo flores ternos, quaternos ac etiam plures profert, magnos, foliorum ferè formæ viciatres vel quatuor longos, albos, apicibus luteis stipatos, quibus succedunt pericarpia aliquot maxima, plena femine nigro, magno, lato, compresso: cui cum Aristolochiæ Clematidis vulgaris femine aliquid simile.

Monspeli olim vocabant Pancratium, & bulbum marinum: Lugdunenses & Geneuenses Pharmacop. plures vocabant bulbos hos Scillas, & pro eis vsurpabant: nescimus quâ ignorantia & negligentia aut auaritia, cum possent veras habere Scillas, tum albas, tum ruffas. Scillæ à Dioscor. & Theophrast. descriptæ non respondent, nec florendi modo, nec acrimonia: Cum Pancratio etiam non conueniunt, nec foliis, quæ non sunt Lilii, nec colore, nec acrimonia, siue feruore.

Sunt qui suspicantur Scillam esse Epimenidiã Theophrast. & Plin. Gcnerus putabat Scillam

albam, Anguill. esse Epimenidiã, de ea autem c. de Scilla.

Quandoquidem autem Clusius describit plantam nostrã prout obseruauit in Hisp. colore à nostro variante, lubet eius descriptionem hic subijcere. Hemerocallidi Valentini quæ inter Narcissi genera referenda, quina aut sena sunt folia,



oblonga, lata, Narcissinis similia, sed planiora, firmioraq; subcineracei quodammodo coloris: caulis inter ea assurgit, in cubitali interdum altitudine, & Leucosi bulbosi (Leucosi bulbosi ferotini maioris r.) crassitudine, firmior, nudus & sine foliis, qui caci mine promit membranaecum inuolutum, & eo

dehiscente quinos aut senos, interdum plures, flores Pseudonarcisso vulgari similes, Lilii odorem spirantes, albos omnino: præter externorum sex foliorum neruum & extremos mucrones, qui viridi colore nonnihil aspersi conspiciuntur: è medio oblongo protuberante calyce per oras laciniato exeunt candida sex oblonga stamina, suis apicibus flauis ornato, & medio longo stilo, vt Lilio albo ferè: marcidis & defluentibus floribus subsunt triangularia capita in crassitudinem successu temporis extubercantia, quibus semen cõtinetur nigrum, magnum, compressum, fungosum: radix bulbacea, magna, alba, oblongior, lento humore plena, nigricante cortice obducta, quæ interdum adnatis Narcissorum modo se propagat. Caulis etiam & folia concisa, aut infracta, lentum humorem exstillant.

Bulbus litoralis Theophrast. quod Monspeli Pancratium interpretantur, Et Pharmacop. vulgò pro Scilla mindre habent, alii Hemerocallidem esse putarunt, decepti, testimonio Gefn. de hort. nomencl. Lilii marini, quæ apud Dioscor. Hemerocallidi attribuitur. An eadem Pancratium quod aliqui pro Scilla substituunt? An apud eundem Pancratium verum Woielli & Scilla minor.

Hemerocallis Hispanica, meo tempore [inquit Clus. Hisp.] Rondel. Scilla vocabatur, & ex ea trochiscos, qui theoricã ingrediuntur, Mõpeliani pharmac. parabat. Postea Pancratium flore Lilii vocari cepit. Quæ in Valentino litore nascitur Ioh. Placæ Hemerocallis nuncupabatur, qui subluteos & pallefcientes flores ferè asseuerabat: Hispani Amores suos vocant. Itali quidam Gliglio marino, capit etiam Constantinopoli adferri, Con Zambac nomine, inter varij generis Narcissos. Idem sequenti capite ait: Hemerocallis Valentini Scilla Epimenidia esse non potest, vt quidam volunt, quandoquidem eius Epimenidia cibus grata sit: Valentina verò He-

Hemerocallis Valentini quæ inter Narcissi genera referenda, quina aut sena sunt folia,

Bulbus litoralis, Hemerocallis non est.

Scilla minor.

Scilla Rondel.

Pancratium flore Lilii, Hemerocallis flore subluteo.

Con Zambac, Non Scilla Epimenidia.

therocallis, siue Pancratium flore Liliū Mompelianum, præfens sit venenum. Et hist. post. Itali quidam *giglio marino* apud quos rubro aut purpureo flore inueniri, præsertim Ostiensis portu ipsi aliquando relatum est: ipsi certe alterius coloris flores videre non contigit quam albi, quandoquidem non nisi in maris litore sponte nascitur, Narcissum marinum, commodè appellari posse arbitrat̃ur.

Pancratium Dalech. quod Hist. Lugd. curauit depingendum & describit: foliis est *zebra*. (Lilii albi, vt Plinius vertit) longioribus & crassioribus, caule pedali & nonnunquam procenore, anguloso, summo fastigio in quinque foliola candelantia, virgata, acuminata, scilicet explicante, è quorum medio angulosæ breues, & veluti compressæ siliquæ pediculis subnixæ, ex quorum vertice flos albus emicat, oblongus, infernè arcuatus, supernè latus ambitu supremo, in radios velut cuspidatim diuiso, pallidis apicibus multis, stagnibusq; inter extantibus flore delapso semè in siliquis adolescit & maturescens grandescit: floret mense Iunio. Ex his perspicuè est Pancratium Scillanò esse, sed speciem, flore potissimè ab ea distantem: Pancratium istud Mompel. Clusius Hemerocallidem Valentiam vocat. Negligenter sanè Dalech. icon & descriptio facta ad plantam siccam, ideoque minus placet: nec ea planta folia habet Lili albi.

Bulbum (inquit Dodon. in fol.) ad Pseudonarcissi genus pertinere apparentem, placet aliis esse Pancratium, & quidem marinum. Pancratii autem bulbus vt Dioscor. refert, *ὁμοειδὲς ἢ ὁμομορφεύς* id est, subbruffus aut subpurpureus est: istius verbò albidus.

Matth. quantum ex icone colligere licet inter Narcissos numerat & Constantinopolitanam cognominat, & præstat inter Narcissos retineri, & marinum dici, quam vel Scillam vel Pancratium temerè aliternare. Alit nos Narcissum Matth. ad aliam plantam referimus de qua mox. Narcissum hunc marinum teste Cæsalp. quidam Hemerocallen putant, quia id Lilium marinum à Diosc. vocetur, siue Elium vt Theodorus vocat in Theophrast. alia tamen ostendit pro legitima Hemerocalli.

Ad cunctos morbos affectus, [vt Lobel. & Penz. Adu. tradunt profigandis promittit auxilium, bene ominata nomenclatura Pancratii quæ tamen Scillæ species, maritimusque bulbus est. Radices omnes Pancratio (Narbonensi) albæ non rubræ, quod accidit regionis situ, & superum aspectu. Lob. Obs. Iconem Clusii habet, ac dicit, Pancratii marini è floris colore varietas: Adu. p. 57. Hemerocallis Valentina Clusii. Narcissus Constantinop. Matth. non descriptus. Ital. *giglio marino*. hisp. *Amor nys* & *Squilla menor*. Prorsum Pancratio Mompelienfi idem; sed huic flores luteolos hispanica littora dant: qui etiam interdum purpurei, & quandoque puniceos produunt. *Azulesnas de las Indias* Pancratio Mompeliaco similis est semine & bulbo: Num eadem sit asserere non ausim, vt cuius flores nondum apparuerint in hortis pensilibus lo. Mironi Neruiensis pharmacop. exit folio Narcissi. Icon pl. p. 168. Pancratium marinum, Hemerocallis Valentina Clusii. Item 169. Pancratium floribus rubris, cuius icon est apud Clusium pro Hemerocallide Valentina.

Bellon. dicit Bulbum littoralem Theophr. esse Pharmacopolarum Gallorum Squillam aut Scil-

lam; Verùm an de hac loquatur nescio, cum aliter existimet Dodon. Videant Lectores.

C. Bauh. phyt. *Scilla 3. minor*, Narcissus Constant. vel 3. Matth. *que ex gigno* Theophr. 6. hist. 1. Vbi Elium vertit Gaza & Lilium marinum. Variat floris colore, apud Momp. flore est albo, & alias subluteo, & pallescente: apud Italos rubro & purpureo, quandoque puniceo. Quare Tabern. huius tres figuras proponit. Idem apud Matth. Narcissus 3. Constantinop. Matthiolo in maioribus figuris, Tabern. Narcissus 8. Matth. in compend. exprimit Scillam minorem, quam vocat Narcissum marinum Dodon. fol. Cæsalp. Hemerocallis. Gesner. hort. Hemerocallis Valentina. Clus. hist. hisp. Lob. Cam. Pancratium verum Gesner. hort. Pancratium Cordi in Diosc. Nobis autem videtur vt postea dicemus, Narcissum Matth. potius respondere Lilionarcisso Hemerocalli facie Clusii: nec placet C. Bauh. opinio, dum dicit esse Hemerocallen Theophr. cui suffrutex est, qui non numeratur inter plantarum bulbos. Nec etiam est Hemerocallis Dioscor. quia non habet folia & caulem Lili. Cæsalp. non recipit pro Hemerocalle Theophr. Gesn. eam opinionem refutat, dicit præterea Pancratium quomodo asseri possit non videmus. In Epit. Matth. quam habemus impressam 1571. pro Narcisso 8. nihil est simile cum Valentina Clusii, sed quædam icon, quæ potius Tulipam malè effectam demonstrare videtur.

Plurimum toto litore illo ab aquis Marianis ad vsque Norbonæ vrbis maritimæ sepius videntur & eruerunt, sabulo arido, vndis alluro, mersum sesquipalmum altè. In maritimis circa Valentiam Hispaniæ frequens, vt toto illo maritimo tractu infra Mompeliū, vbi Maio mense florentem, Iulioque & Augusto semen maturum ferentem, magna difficultate eruebat Clusius, tam altè arena maris fluctibus aggesta mersa erat. Allata est etiam Viennam aliquoties dum istic viuerebat, Constantinopoli, addita inscriptione, Albos ac odoratos flores proferre, medio inter Augustum & Septembrem tempore: & certè his florem dederunt, recens allati bulbi Gen. viro Volsig. Christ. ab Enkestorff Austr. sed illæ ipsæ plantæ, nullum postea florem amplius tulerunt, quemadmodum nec cæ omnes, quas è Gallia, Hispania, & Italia, sepius in Belgium delatas, vel semine natas aliquot annis aluit. Itaque hanc plantam, vt & alias quasdam, in illarum classem reuocit, quæ mutato natali solo nunquam, aut rarissime florere solent, cum videlicet concepto iam in ipso bulbo, flore eruantur, & transferuntur. Cæterum ex semine nobis creuit, verum nullos flores produxit. Mompelii quoque ad maris ripam abundare obseruauimus, & quidem florentem Autumno, vbi Pancratium & bulbos hos Scillam vocabant.

Littoris incolæ piscatores & prædones, raptu interdum victantes, rati hanc esse Cæpe, vorantes ex sale & pane, quamuis famelici, tamen [teste Lobelio] naueabant. Facultate igitur Picodonarcisso luteo [Bulbocodio] affinis Dodon. videtur: nam & gustatus tantummodò bulbus naueam excitat, vt iam Lobel. auctor fuit. Magis venenatam qualitatem eis Cl. Vir. Rondel. attribuit, qui referre solebat exemplum de duobus piscatoribus, quorum alter cultum, Hemerocallidis concisus succo intrinectum, fodali quem oderat, cibo sumpturo appositi, ille bonæ fidei, nec insidias metuens, carnes propolitas secat,

Venenum.

Rubro & purpureo flore. Narcissus marinus

Non Pancratium Hist. Lugd. notatur.

Pseudo-narcissi.

Non Pancratium.

Hemerocallis.

Flores luteos & purpurei.

Narcissi folio.

Bulbus littoralis.

secat, usque velicitur, abstinentie alio, qui se fame premi negabat, post paucos dies, miserè sublatus fuit: arguit hoc vnicum Plinii testimonium Hemerocallidem Valentiam Epinenidiam Scillam esse non posse, quia edulis sit.

PANCRAII MONSPELIANI VEL

Hemerocallidis Valentinae facie
Lilionarcissus, vel Narcissus
3. Matthioli.



Lilionarcissus Hemerocallidis facie (inquit Clusius hist. post.) quanquam cum Hemerocallide Valentina, magnam admodum habeat, eodem tamen cap. non completendum, sed peculiare illi tribuendum, diximus: notas enim qualitas habet ab Hemerocallide alienas.

Semine ex

Italia missa nata est Io. Bidart, Canonico Insulano. Iacob. Plateau scribat similes plantam ipsi natam semine Florentia missa Martagonis rarili. appellatione. Eius *bulbus* Muscari crassitudinem aequat, vel etiam superat, pauloque longior est, multis involutus tunicis, quarum extrema fusca, sequens subrufta, tertia candidior: Eius *radices* seu fibrae, graciliores & frequentiores, quam in Muscari: sub Aprilis demum finem (nullos bulbos memini adeo tardè emergentes) senu aut plura producit *folia*, duplò ferè latiora quam Muscari, sed illis breviora, & sub extremum Augustum marcescentia, simili planè ratione, quam Hemerocallis Valentina, cuius folia Augusto emergunt, deinde tota viridia hyeme permanent. Ex eodem bulbo bini interdum prodeunt *caules* ferentes singuli, circiter Iunium mensem, foliulo inclusos sex aut 8. flores, paruo Lilio non dissimiles, mediū occupante paruo calyce albo, in multas lacinias per oras secto, odorato, in quo sex alba stamina, flavis apicibus praedita, & medijs stilis albus; *semen* in thecis nigrum, minus, & magis rotundum Hemerocallidis semine. Iacobus Plateau Liliū Narcissum Orientalem appellaret, sed meo iudicio permittit. Illius porro iconem ex ea quam ipse Plateau mittebat expressam hic subieciimus. De hoc scripsit etiam Exor. part. 2. append. 2. his verbis, Narcissus montanus siue marinus alter, qui Matthiol. 3. An Orientalis dici queat valde dubito, tamen fieri possit, ut in Oriente etiam nascatur: quotquot tamen illius bulbi in hanc regionem vel etiam in Galliam perlati, non ex Oriente aduecti, sed in Europa spontè nascentes reperi fuerunt. Nam ante biennium plurimos eius bulbos ex Illyrico adferebat Ioh. van Ophem Bruxellensis, quos ipse eruerat. Hoc verò anno 1603. scribat

ad me Bononia Frater Greg. de Reggio. Ordinis Capucinorum sese ab eodem van Ophem litteras accepisse Florentiae exaratas, quibus significabat Corticam & Sardiniam insulas se perlustrasse, atque elegantissimas plantas reperisse, inter quas hunc Narcissum in altissimis Sardiniae montibus nascentem, ac in vno eodemque caule quinque & triginta flores gerentem. Dictamnam praeterea Creticum odoratissimum, minoribus & candidioribus foliis praeditum, & multa elegantissima Crocigenera, & illa quidem locis etiam maritimis: quā sanè ratione hic Narcissus vel montanus, vel marinus nuncupari posset.

Matthiol. Lat. cum magn. fig. & in It. iconem sine vlla descriptione & annotatione à quo accepit iconem habet tertio loco sub titulo Narcissi Constantinopolitani, qui nobis videtur melius quadrare cum Lilio narcissillo Clusii modò dicto quam cum Pancratio Monspeliano.

An 1608. Sturgardiae vidimus in horto Ill. nostri Principis ducis Wirtemb. bulbosam plantam quam Narcissum Matthioli tertium vocant, qui ab annis plurimis est in horto peregrinarum herbarum, qui hyeme regitur & cum hypocaulis calefit. Eius *dinum* vocant: mense Iulio folia magna ei erant multò latiora quam in Pancratio Monspeliano, magis ad Scillae folia accedentia, colore etiam non glaucescente, aderant etiam in summitate caulis capita plura semen continentia nondum maturum. Hanc eandem plantam eodem nomine donatam per Hortulanum vidi Caroloburgi in Il. March. Georgii Friderici Baderis horto abundanti plurimis plantis.

Hist. Lugd. Narcissus 3. Constantinop. Matthiol. Scillarum aut bulbosum littoralium species videtur qualis in Gallia Narbonensi. Tabern. icon. Narcissus Constantinopolitanus, Narcessen röslein von Constantinopel.

Casp. Bauhin. ex Tabern. posuit in suo aucto Matth. iconem pro 3. Narcisso Constantinopolitano, idem existimans, cum Lobelii Pancratio. Nos non possumus C. Bauh. assentiri securè assentiri in suis Animad. in h. Lug. Narcissum Const. C. B. nor. Math. esse Pancratium Dalechampi.

PANCRAIIVM INDICVM AVT NARCISSVS CLUSII INDICVS MAXIMVS AUTUMNALIS quorundam, non amarus, albus.



Radice est [inquit Lob. Adu. par. 2.] stipitatum longā, brachialis crassitudinis, multis Cepaceis subalbids tunicis squamosa, extimisque cuticulis ex rusto subfuscis, aut Castaneae diluti coloris: sessili parte maiore mediocrem pugum equate: numerosis carnosis habitioribus


HISTORIAE PLANTARVM

scilla, Pancratii aut Scillæ instar, quasi trunco aut nodo collectis & appensis fultâ. Opinabatur Lob. Pancratii aut Scillæ speciem, sed neutiquâ, sapor amarus refragatur. Septembri & Octobri octonis aut denis stellatis floribus Colchici albi Anglici paribus, sed longioribus, sublucis, ex albo luridis, senis, longioribus, staminibus albis præditis, latoribus è membraneis tunicis, Moly Dioscorid. modo pendulis, breuioribus, sine caule penuria fortè alimentis inhaerentibus. Inter plures vnicus *bulbus* ipsi floruit: sed quia diu naui terrâ destituti, foliis vidui erant: tamen rudimenta conspicua in minore bulbo retusa apparuerunt, Pancratii Monspelici similia, duas vncias lata, breuiora tamen, fortè nondum prorsus enata aut perfectam longitudinem assecuta. Omnes hi bulbi hyemis fauoris iniuriâ Anno salutis 1600. Londini, Antuerpiæ & alibi amicis communicati perire, quos ipsi dederat amicus singularis D. Ioannes Locius Germanus apud Londinenses Chirurgus egregius, à naucleris recludibus ex Alta Hispaniola Occidua Indiz Teborum *Capo* siue portu vocata.

PANCRATIVM ALTERVM Vernum Indicum.

Descriptio

Pancratium Indicum alterum Vernum, siue Narcissus Indicus alter, facie Pancratii Monspelici. Lilio narcissus Hemerocallidis facie clusii aut congener. Narcissus aslozianda hæc Pancratii Monspelici facie bulbacca Indica planta, cuius bulbo me (inquit Lobel. Adu. par. 2.) donauit C. V. D. Ich. Hullenius Consil. Ord. & Societatis Praefectorum rei maritimæ Zelandiæ Belgarum, in cuius horto quotannis floruit & floret, è duplici caule dodrantali & pedali, quatuordecim floribus liliaceis, candidis vno ab eodem, vti prædicti Pancratii, exortu producentibus quatuordecim: altero verò duodecim, senis foliolis longis albis conflatis, internè tantillum subflauentibus & calyce medio laciniatis, totidemque staminibus longis, medioque stilo præditis. Mihi hoc Londini in horto Nobiliss. Baronis Ed. Zouche & D. Iacobi Gareto Myropolæ, rei herbariæ studiofissimo, senos



aut septenos tantum laxauit, cui caulis ex bulbi latere prodiit. *Foliorum* & *bulbi* fuscii similitudo & parilitas, quodammodo Pancratii Monspelici. Annis elapsis floris fuscii Caryophyllo aromatico concoloris varium alebat Medio-caltzi Zelandorum in horto Michaelis de Lannoy affinis meus. Varias aliorum colorum

differentias reperi audio.

SCILLA VETERIBVS.

Inter eas radices, [authore Theophrasto] quæ *Ra-*
pl tunicas multiplices corticisq[ue] habent, Bul-
bi bi, atque etiam Cæpe, à Theoph. l. i. c. 10. & Scil-
la la, huiusq[ue] similes reponuntur. Semper enim his
aliquid circa eximi potest: quæ quidem omnia,
duplex quodammodo genus radicis habere, vi-
dentur. Nonnullis hoc idem de omnibus capi-
tatis & inferiore capitis parte radices mittenti-
bus placet: Edules autem sunt non solum Bul-
bi, & his similia, sed etiam radix Scillæ (*σκήλη* -
anc) non tamen omnis quidem, sed vocatæ *σκήλη*
anc quæ ab usu nomen accepit: hæc angustiore
est folio & leuiore quam cætera. Floret per par-
tes, vt Asphodelus. Incipit primò ab inferiori-
bus. Omnia igitur capitata (*καπαλιάρη*) radi-
ce, viuiacia maiorem in modum sunt [*φιδόζων*]
maximè verò Scilla: vt pote quæ suspensa viuere
possit, & quidem plurimum temporis permaneat.
Potest autem reposita seruari, vt Malum grana-
tum detracto pediculo. Traditur & ante portas
sata remedio esse contra veneficiorum noxam.
Omnia hæc confertim crescunt. Admirandum
inter omnia quod in Scylla & Narcisso euenit.
Cæterorum enim tam recens sarorum quàm re-
germinantium, suo tempore folium primò oritur:
deinde posterius caulis. In his autem caulis primò.
Florum autem prouentus ternos ostendit
(*τρίαινα δὲ καὶ ἀνθός τριῖς*) quorum primus,
tempus arandi primum ostendere videtur. Se-
cundus medium, tertius postremum. Quot enim
fuerint isti, totidem & arandi tempora ferè oc-
currunt. Sed cum ita senecrit, tum foliorum ex-
ortus, multis postea diebus ineptit &c. Cæterò
Ficus si in Scylla (*Σκύλη*) vocè vitur Theophras-
tus quæ nunc Lenticum nunc Scillam signifi-
cat: malè autem Gaza hoc in loco Lenticum
vertit, vt annotat Gesnerus.) plantetur, ocyus
crescit, minusque à veribus infestatur. Summa-
tim, omne quod in Scylla plantatur, melius
germinat & nutritur celeriusque augetur.
Habet enim quandam caliditatem & humidita-
tem, & sic velut initio quædam.

De Scilla & Pancratio hæc doctissimè scribit
vir summa doctrina præditus Dalech. Pancra-
tium, inquit, quod & aliqui Scillam vocant, vt
Plinius legisse videtur & rectius, quod non sim-
plicitè Scillam vocant, verum *σκήλη* *anc* Scil-
lam pusillam, nascitur vbiuis in litore maris,
radice bulbi magni amplitudine, cortice subrufo
vestita, infimè capillata, Cæpæ modo: foliis
siue Lili albi, vt Plinius vertit, longioribus, &
quod præter Dioscoridis literam Plinius addit,
crassioribus: caule pedali, & nonnumquam pro-
ceriore, anguloso: summo fastigio in quinque so-
liola candicantia, virgata, acuminata, se expli-
cante, è quorum medio, angulose & breues & ve-
luti compressæ eriguntur siliquæ, pediculis sub-
nixæ, floret Iunio. Ex illarum vertice flos albus
emicat, oblongus, infernè arctus, supernè latus,
ambitu supremo in radios velut cuspidatim diui-
so: pallidis apicibus multis staminibusque intus
extantibus. Flore delapso in siliquis semen ado-
lescit, & maturescens grandescit. At quoniam
affinis est Scyllis Pancratii natura, Scyllamque
Plinius c. 17. lib. 21. rer florere scripsit: Theophr-
uero c. 21. lib. 7. huius. *ἐκ τῆς ἀνθού*, vt Plinius:
sed

sed nonnulli tamen ad hunc, præter rem non fuerit
lectorem obiter admonere falli multos, qui ex
his Plinii Theophrastique locis, tribus annis di-
uersis temporibus, exempli gratia, Autumno, Ve-
re, Aestate, Scyllas florem edere putant. Id por-
tò quomodo fiat ut cognoscamus, habendum sic
est, inter bulbosas omnes plantas Scyllam & Af-
phodelum quàm diutissimè florere, ob alimen-
ti copiam & vbertatem, quod Theoph. censet c.
ii. lib. 4. cauli. & *ἡ ἰσχυρὸς ἀνθήσκει ποιεῖν non δύσκει*,
ut in exemplaribus nostris legitur, particulatim
florere, & ab ima parte caulis primùm incipere:
Augusti ergo principio Scyllæ caulem assurgere,
quod pluries obseruavi, cubitalem, aut etiam
proceriorem, densissimo florum stipatu conce-
ptum: imos flores primòs produci, ac interim dū
aperiti vigent, medios turgescere, supremos glif-
cere tantummodò, quæ *μεσὴν ἀνθὸς ὄν*, primus
ad floriscendum conatus. Exactis aliquot die-
bus flores qui primi reclusi fuerant, labi, mediòs-
que sese promere, supremis tantùm intumescen-
tibus, quæ est secunda *ἀνθὸς*: postremò defluen-
tibus mediis, supremos se explicare: quæ *ἀνθὸς*
tertia est: hoc floriscendi ter repetito impetu,
terram quoque ter subigi oportere denuntiari,
priusquàm fruges serantur. Flaccido verò & con-
torto caule folia nasci circa Ianuarii vel finem,
vel medium, quæ æstatis post squaloribus exa-
rescant. De Lentisco Virg. prodidit post Aratum
quod de Scylla Theoph. his verbis:

*Iam verò semper viridis, semperque granata
Lentiscus, triplici solita grandescere sæcu:
Ter fruges findens tria tempora monstrat
arandi.*

Quomodo autem Theophr. & Plinii corrupti de
de Scilla loci restituendi sint docet Idem Dale-
champius.


Hac de re hæc Robertus Constantinus in suo
Lexico: *Σκύλα* inquit, (ut scribendum distin-
ctionis causa,) vel *σχίλα* etiam, est herba bulbò-
sa, Scilla siue Squilla Varroni, *σκήλα*, vel eius
bulbus, aut Scillæ species minor, τὸ μικρότερον
etiam à Diosc. *Σκύλον* exponit gal. in glossis Hip-
pocratis *εὐ μένον τὸ δαυμάδες εὐτόν, ἀλλὰ ἡ εὐδὸς τὴν
σκήλας, εὐ μὲν ὅσα ἡ τῆς σκήλας τὸ β. λ. β. Plutarch.*
Scillæ etiam in Pericle, ipsū ait, ob capitis instar
Scillæ immensæ & oblongi formam, *σκηλοειδὲς*
appellatum esse, quasi dicas Scillæ capionem:
Libri. cap. 12. *ἡ σκήλας* loquens Theophrast.
ποιεῖται, inquit, *δὲ τὰς ἀνθὸς ἡστέρας ἢ τὴν ἀνθὸν
τὴν δὲ καὶ σκηλαίναν τὸν ἀνθὸν ἄρτον, ἢ δὲ δυνάτα,*
τὸν μέσον, ἢ δὲ τὴν τὸν ἔχοντα &c. Ex quibus Plinius
lib. 12. cap. 17. de Scilla dixit. Eadem ter floret, tria
tempora fationum ostendens &c. Quod autem
ipsa floreat ter, id intellige de floribus triplici ni-
xu: floret enim particulatim, id est *μεσέως* siue
ἡ ἰσχυρὸς: ut idem Philosophus dixit: In Scil-
la quod intus tenerum ac molle quasque adeps,
σκληρὸν σκήλας dicitur, *ἡ σκήλας*, *ἡ σκήλας μέσον*.
Varro Scillæ medium vocat. In eodem signifi-
catu *μέσον* in Lactuca vsurpauit Plutarch. 4. Syno-
posi. Hæc Constant. qui plurius rem prosequitur
ut apud ipsū videre est.

De Scillæ æquiuocationibus & substitutis sci-
endum: Quod Scillam rubram vulgarem, quam
quidam nolunt Scillam esse, sed Pancratium, qui-
dam pro substituto recipiunt. Quod insuper
in dubium vocetur an fortè Scilla alba sit eadem
cum rubra, differens colore tantùm, an aliis fo-
liorum figura etiam differens. Quod autore
Clusio dicatur Ornithogalum maius quod quidā
Scillam Epimenidiam vocant. Quod, Plinio teste,

cum Epimenidia Scilla edulis sit, Hemerocallis
Valentina illa esse non possit, certissimo argumē-
to est exemplum de duobus piscatoribus Ron-
delerii. Quod tandem pro Scilla, autore An-
guillara, varii bulbi supponuntur.

SCILLA RVFFA MAGNA VVLGARIS.

Bulbum habet Scilla magnum Pomo. Adami, Descriptio
vel Citrio maiori sapē parem, multis crassis
fibris donatum, è laminis tuniceis, rubentibus,
viscidis contextum, sub bulbo multa fibra, è quo
folia emergunt, impenfè virentia, cubitum lon-
ga, palmum ferè lata, succulenta, crassiuscula cū



multa visci-
ditate amara:
inter quæ sur-
git caulis Af-
phodeli flori-
bus insignis;
serie longa
dispositis, &
successivè sese
aperientibus,
candidis, Or-
nithogali
spicari flores
æmulantibus:
Fuch. caulis
ut in croco
prius proliit,
tum ex costis
in luteo can-
didus, qui
cū senuerit
folia demum
multis post
diebus emi-
cant lata, nullo
nixa pediculo,
cepitia quadam
specie, & plerūque
ex iis in terram
deflexa: Mat-
thiolo amara est
Scilla & acris,
folia Lili qua-
lia.

Dodon. Gall. Hodierno tempore duæ reperi-
untur Squillæ, vna foliis angustis, quæ vera Scilla,
altera latis, quæ vulgò vtuntur pro Scilla. Primæ
& veræ Scillæ bulbi sunt valde magni & crassi,
candidiores bulbis Scillæ vulgaris. Folia longa
& angusta sunt, colore cineritio, vulgari Squillæ
sunt etiam magni & crassi bulbi colore magis
ruffo, cortices spissiores quàm in priore, folia ma-
gna & lata, Liliorum foliis similia. Flores parui
& lutei, secundum summitatem caulis, succedit
deinde semen. Squilla deferretur ex Hispania ad
vsum medicum, quidam plantant in hortis (Bel-
gicis.) Prima species Cæpæ genus peregrinum
dicitur: Serap. Cæpe mutis. Secunda species po-
tiss. vsurpatur in Omic. pro Squilla, quamvis non
sit vera: sed Græcorum Pancratium, cui pares
vires quæ Scillæ, vnde sine errore potest sumi
pro Scilla. Bellonio existimatur Bulbus litto-
ralis Theophrast. cum quo magna similitudo.
Pancratium Dioscor. & bulbus Theophrast. vna
& eadem planta videntur. Scilla calida secun-
do gradu & sicca tertio.

Dodon. eandem iconem quam nos ex Fuchso
habet, titulo Scillæ communis & Pancratii: is in
postrema historia icones duas, quales Clusius
habet, proponit: Nobis autem videntur Dodo-
næus suas descriptiones non ad plantas fecisse fi-
bi obiectas, sed ex Antiquis & Neotericis com-
posuisse: considerent igitur lectores Dodon. duas
descriptiones & quæ paulò post dicentur.

Scilla dua

Scilla cā-
didior.Scilla Gul-
laris.Locus.
Cæpe mu-
tis.Squilla of-
fic. est Pan-
cratium.
Bulbus lit-
toralis
Theophr.
Temperā.
Icon Do-
don.

Cur Cepæ
marina di-
cta.

Cepaceo generi [vt rectè notant Lob. & Pena in Aduerf.] tantoperè est compar Scilla: vt mul-
ti eam *Marinam Cepam* vocent. Quia autem in-
ter hanc & marinum testaceum pilcem à tunicea
squamarum compactili serie Squillam voca-
tum, tanta similitudo intercessit, hæc putatur sic
dicta. Potuit etiã à fabuleis maricimis Sole tor-
ridis, cuiusmodi sunt in Hispania & propè aride
Lusitanie tesqua maritima. Huius duas diffe-
rentias colore dumtaxat inter Hispanicas tam
multas animaduertere est, quarum extimæ tuni-
cæ vni rubent, vt Cæpis oblongis, alteri al bent,
magnitudine pares. Vtrius maxima Pomû Assy-
rium nun superat: è tam multis autè millib⁹, quæ
quotannis tum Venetias tñ Antuerpiã dechun-
tur, nullam meminimus maiorem, eã quæ lata &
perbellè adulta fuit Monspelii in horto Iacob.
Farges Pharmacopœi. Vniuersa namque folii
catina, vel dorsum, palium ferinè lata, pedem
alta, crassitudo minor quàm Aloes, crebra è
bulbo pullulant squammatum compacta, caulis
sesquicubitalis, gracilis, flosculos Fragariæ
gerit similes sed minores, in spicam postremò
deficiens.

Matth. re-
prehendit
cur

Neutiquam mirum Matthiolum, post alios Neo-
tericos nuperos, sententiam de Scilla mutasse,
cum neutiquam vîsam sibi genuinam sed tantum
verbis depictam, fateatur. Quin etiam si verum
Pancratium vidisset, numquam pro illo speciem
Scillæ, subdidisset. Et foliorum gracilitas, à qua
se deceptum conqueritur, sanè non aliam spe-
ciem constituit Scillæ: sed tantum contingit ha-
bitiora & maiora adolere folia, mutatione
cauliculi & catinæ.

Lobel. Obs. & Ic. pl. Scillæ rubentibus radicis
tunicis, folio Aloes carinato. Figuram habet ex
ex Clusio, ac dicit Pancratium verum Cluii.

Pancratium.

Clus. in post. hist. de hac Scilla scribit. Pancra-
tio [Hisp. dicto eodem nomine quo Scilla, *Cebol-
la*] amplitudo maior est [quàm Scillæ,] extimæ
tunicæ rubent, foliaque ampliora, longiora, magis
carinata & quodammodò sarrecta. Abundè cres-
cit in Hispaniæ mediterraneis: bulbos erui, flo-
rentem autem aut semen ferentem nunquam
conspexi. Fabiano autem Itgæ vt ad me scribat
in penulibus hortis non modò caulem protu-
lit, sed etiam plurimos flores spicæ instar in co-
nascentes, sex foliis nascentes Scillæ (quantum
ex pictura, quam epistolæ coniunxerat colligere
hæbebat) horum æmulos. *Neve d'uni* Scilla Græ-
cis, Pancratium Latinis dicitur, hispanici eodem
quo Scillam [albam] nomine donant, *Cebolla al-*

Scilla Offic.
genera.

barrana. Scilla, inquit Matthiolum, quam vul-
gus officinarum Squillam vocitat omnibus vul-
garis notitia est atque vtilissima, medicamentis
expetita, vtpote sine qua legitima Theriaca con-
fici non possit. Pancratium, quod aliquibus pu-
silla Scilla vocatur, quoniam hodie in medica-
mentorum vsum non recipitur, idè Medicis &
Sepalsariis neglectum est. Vnde etiam pauci for-
tassis sunt qui vel ipsum nouerint vel animadu-
erterint: cum tamen variis in Italia locis gigna-
tur, præsertim in Apuleia, vbi magnus est Scil-
larum prouentus. Verum etsi id in officinis non
habetur, nihil tamen iactura in medicina fieri
puto, quòd eius vicem maior Scilla valentiùs e-
tiam præstet. Scilicet duo notantur genera, vnum
album alterum verò nigrum. Hinc nonnulli vt
Ruellius inquit, album mas, nigrum autem fem-
minam faciunt: quanquam magis rationi con-
sentaneum videatur vt contrarium existimari &

Scilla duo
genera.
Ruellius
notatur.
Matthiolum
repreh.

esse debeat. Matthiolum decebat demonstra-
re qua in re differat Pancratium Italicum à Scyl-
læ: ille in postremis com. non amplius eius me-
minit nec locorum vbi prouenit Scilla Officina-
rum: quare id fecerit ignoramus fortè quia de
re non perspecta scripserat: censuram etiam in
Ruellium omisit, & meritò, nisi Plinium etiam
velit taxare ex quo Ruellius assumpsit.

Quandoquidem autem Matthiolum in post.
comment. nullam facit mentionem Scillæ albæ,
verisimile nunquam ab eo vîsam, nec etiam flo-
res Scillæ vulgaris quos pinxit cum quatuor fo-
liolis. Scillam porro vocari tradit in Epit. ab
Arab. *haspel*, *hanfel*, *aschil* siue *Alachis*. Bulbo niti
ingenti subrubro, radicibus infernà sede nume-
rosis squammis crassis, lento succo pregnantibus
acri & amaro, folia mittere Aloes similia, cau-
lem sesquicubitalem, læuem, & flores in summi-
tate subpurpureos. Idem ait in hist. Germ. Scilla
multas habet squammas subrubentes parum, sed,
multò maiores & crassiores fert ex vtriusque
caulis latere pulchros flores flauescences (*weiß
gelbe*) vbi flores exciderunt pluribus diebus
post ex bulbo prodeunt lata crassa folia sine pe-
diculo, vt in albis Liliis: Copiosè prouenit in A-
puleia & Sicilia. Matthiolum in Epitome & in
hist. Germ. non sibi constat, dum vno loco scribit
flores subpurpureos, alio autem flauescences.

Quàm benè etiam Casp. Bauhinus in suo au-
cto Matthiolo post Scillam hispanicam scripse-
rit, flores in summitate esse subpurpureos, iudicet
alii: nos albos in vulgari Scilla vidimus prout
annotauimus à quadraginta annis.

Cur porro Scillam ex Græcia & Italia in His-
paniam remittat Matthiolum mirari faris Guill.
nequit, vbertimo eius in Græcia & Apuleia pro-
uentu, nomine ritque veteri in limine ianuar
eam suspendendi, adhuc vsque tēpora propaga-
to. Scillam esse decernit Guil. ex Galeni sen-
tentia, cui radices sint candidæ: Pancratium cui
ruffæ; Dioscor. autoritate. Ille Matth. si Scil-
lam terræ suæ hærentem conspexisset, ternos
eam flores fundere haud negasset. Quod cur ex
Theophrast. adnotauerit, nec Narcissum ter flo-
rere, quod ibidem traditur, obseruauerit, magni
est apud Guill. momenti. Agnoscit sanè, cum hoc
in loco, tum in aliis non patcis, ingenium ipsius
vafum & versipelle.

Amatus quoque similem Censuram contra
Ruellium cum Matth. habet, dicens, Pancratium
facit Scillam minorem & illam quidem nigram.
Ruelliū arguit eum contra naturæ ordinem nigræ
ferè minimam facere cum sit Masculus appellan-
da. Verum animaduertit Amatus Ruellium Plini-
um imitatum.

Scillam siue Squillam pingit & Lacuna: Scribit-
que vocari in Castilla *Cebollam Albarranam*. I-
bidem dicitur Arabibus *Haspel* vel *Alaschil*. Cat.
Ceba marina. Portugalesibus *Cebola Albarrana*.
Gall. *Oignon marin*, *Charpentaire*: Scilla: flos al-
bicat & ad flauum inclinat. Si stirpium diligens
indagator fuisset, tradidisset nobis discrimina
Scillarum in sua Hispania prouenientium, ille
ponit iconem Hyacinthi maioris pro Pancratio
nullà addidit descriptione.

Lonicerus qui Scillam, Cepam marinam, &
officinarum Squillam vocat, propriam addit fi-
guram, & descriptionem, atque caulem & flores
prouenire ante folia.

Scilla nostra (inquit Gesner.) vulgaris, siue Pā-
cratium sit, siue alia species Scillæ, rectè & vtili-
ter in Theriacam additur: & vires omnes, quas
Vet.

Vereres Scillæ attritæ prætar, vt plurimis experimentis constat. Quamuis autem solitum Lili eam habere aliqui obiciunt, non Aloes, quod Dioscor. requirit: non ideo tamé à Scillarum genere excludi, & tãquam venenosa reici debet. Matthiolus eam damnat quasi mitiorem iusto & parum efficacem. Anguillara cõtrario nomine quasi nimium vehementem & venenosam. Ego tanquam bonam & conuenientem Antidoto approbo. Debet enim ad Antidotos quæ in eodem genere efficaciora sunt, deligi potius quàm lenissima. Esto vehementior quàm Scilla alba, edulisque (Scillæ nomine adhuc in quibuldam Græciæ insulis nota, vbi Scillam nostram Cepulam caninam vocitant, vt Anguillara docet,) at eo medicatio esto. Esto venenosa si in cibis, præsertim sapiens & copiosus, sumatur: non tamen venenosa erit si præparetur quo debet modo, & aliis multis miscetur: sed iam venenorum & morborum multorum alexipharmacum fiet. Alba verò & edulis si sic præparata antidoto misceretur, omnem vinum medicamentum exeret. Esto Pancratium, vt vult Anguillara, nõ ideo tamen venenosa erit in antidoto, nec reicienda: cum Vereres Græci Medici, Pancratium ad eum simile fecerint Scillæ, vt ab aliis simpliciter quoque Scillam, ab aliis Scillam minorem appellatum, & eisdem omnino viribus pollere, mitioribus tamen, scripserint, quod si venenosius esset quàm Scilla, minus profectò non dici deberet. Et vt veneno eam non carere concedamus, non tamen ab antidotis excludenda est. Certe Plinius quoque vinum Veneni Scillæ tribuere videtur, cum scribit lib. 20. cap. 9. Oxymelitis scilliticæ tantum vinum esse, vt animæ extinctæ speciem momento aliquo præbeat, id quod nos etiam à vino scillitico factum obseruauimus in muliere, quæ eo poto in veri strangulatione, aut perisimilem ei affectum ad breuissimum tempus incidit. Arabes etiam de Scilla venenata, loci natalis præsertim ratione, loquuntur. Authores cum albam Scillam eligi iubent, præcipue ad acetum Scilliticum, hoc ipso ostendunt, aliquam etiam esse ruffam Scillam, quæ quoniam multò acrior & vehementior est, præparari debet, vt minore periculo sumatur assando, torrendo vel elixando, alba verò cum innocenter sit, præparari aliter non indiget quàm vt in taleolas secta ficeretur in vmbra pro aceto vinòque medicatis ex ea parandis, ad theriacam verò Scillam albam deligere nemo iubet. Iam quod ad magnitudinem attinet Scilla vulgaris nostra duplex videtur maior & minor: quod si aliter quàm ætate differt: minorem Pancratium dixerim, maiorem verò Schinum, quo nomine Vereres (Hippocrat. Aristophanes Theophrast.) Scillæ speciem nominarunt: etsi Gaza malè Lentiscum verterit: vt & Cicero ex Arato: nisi forsitan & ipse Aratus homonymia nominis deceptus, transcriptum ab aliis Schini nomen, pro Lentisco arbore &c. Hispanicè certè Scillā, quæ ceteris acriorem esse aiunt & maiorem, folio Aloes, simpliciter Scillā dicerem: eaque si ad manum foret præparata ad Antidotos uteretur. Ego ex homine docto & fide digno cognoui, toxicum etiam apud Hispanos ex Scilla parari, sicuti ex Elleboro: quod magnum ipsius vehementiæ argumentum est. At Scilla edulis alba quam in Creta & Cephalonia adhuc escitari Anguillara tradit, non simpliciter Scilla, vt ipse putat, sed Epimenidia Theophrasti vocari debet. Diuidit autem Plinius quoque Scillam in genus medicatum & cibarium. Quod si vt dixi, Scilla nostra

vulgaris minor, Pancratium est: & à maiori specie differt: vulgaris maior, quæ cum ruffa, tum albicans (vt audio) adfertur, quæ colorum discrimina haud scio, an in minori quoque reperiantur non temerè Schinus vocabitur: Gale-nus quidem dubitat an Schinus Hippocrati idè, quod Scilla sit, vel aliqua eius species: sed ex Theophrasto à Scilla differre, eique cognatum esse liquidò apparet. Plutarchus Periclem Schinoccephalum agnominatum tradit, ab oblonga & acuminata capitis figura: additque Schinum pro Scilla accipi. Hæc de Scylla generibus habui à me diligentius obseruata: ex quibus etiam constat [ornatissimè Calceolarij paratam à te nuper theriacam antidotum, è vulgaribus Scillis trochiscos non temerè recepisse. Scilla Theophraster floret in anno & tria arandi tempora significat: & Arato similiter, etsi is de melle loquatur. Sed Aratus primò Schinum ter fructum producere ait: deinde etiam Scillam ter florere. Et quoniam is primùm ab Illicis simul & Schini fructibus, prognostica quædam tempestatum signa exponit, de duabus arboribus sentire videtur, Illice & Lentisco: cum Schinum verisimilius sit, illud quicunque hoc ante eum scripsit, à quo ipse nimirum est mutuatus, pro Scillæ specie accepisse: sicut & Theophrast. alibi accepit. Lentiscus quidem an ter floreat alicubi, non constat mihi: non sit autem mihi verisimile. Scillam ter florere minimè dubito: non ubique tamen, sed in Græciæ & notis Theophrasto locis. *Scilla ter floret.* igitur per iora in prima, scæmenino genere, Lentiscum significat, & antiquioribus eorum aliquando speciem Scillæ: *Scilla ter* verò per oi diptongum masculino genere, Iuncum.

Vocat Tragus cum Iacobo Manlio Cepam muris *Meiszwibel*, alioqui dicitur Cepa marina, *Meerzwibel*. *Squilla* in officin. Quæ *Scilla*, Græcis dicitur, etiam apud Latinos nomen suum retinuit, Fuchf. Corn. & Cordo testibus, quam Varronis exemplo nunc omnibus officinis *Squilla* vocetur. Nostri *Meerzwibel* hoc est, Cepam marinam vocant, alii *Meiszwibel*, id est, Cepam murinam.

Bellon. lib. 1. Obs. cap. 18. ait: In Cretæ maritimis littoribus proueniunt copiosè radices, quæ Theophrasto littorales bulbi dicuntur, & ab Aromataris, Gall. venduntur pro Squillis aut Scillis. Quo in loco quamuis Dodon. existimet Bulbos littorales Bellonii eosdem esse cum Scilla vulgari, nihilominus dubitamus: quid si Scilla sit Anguillaræ & fortè Pancratium Montpelianum vt suspicamur?

Camer. in Epitom. Matthiol. nouam figuram addit, in qua flores habent tantum quatuor foliola, an benè iudicent qui viderunt aut vident Scillam vulgarem florentem.

C. Bauhin. Phyt. Scilla 2. maior radice rubra: Pancratium Clusii: Scilla rubentibus radicis tunicis. Lobel. Obs. pag. 76. & icon. pag. 152. Florem huius nemo pinxit, Plinio à proligandis morbis omnibus dictum videtur. Si nullus florem pinxit necesse est iconem Fuchsi, Tragi, Dod. Matth. & aliorum esse falsam, quæ exhibetæ fuere ante Clusianam.

Idem apud Matth. tres Scillas tradit, de quarum prima dicit: *Scilla maior radice alba* Casp. Bauh. Brunfelsio. *Scilla seu Cepa muris* Trago, Matthiolo. Fuchf. Cordo in Dioscor. Gesner. hort. Hist. Lugd. *Scilla communis*, Dod. Gal. *Scilla maior* Castori. De secunda scribit: Scilla Hispanica, radice est alba. Nos de paulò post ægemus. De tertia verò sua Scilla ait: *Scilla maior*,

radice rubra C. Bauh. Hæc radice est maior: *Pancratium* Clus. hisp. Dod. Lugd. Tabern. *Scilla rubentibus radicibus* sumis, foli. *Aloes carinato*. Non inuenimus quemquam ex iam nominatis Scillam eradere maiorem radice alba, quinimò ii tradunt vulgarem officinarum, quæ ruffa non alba: non igitur tres facimus Scillas cum C. Bauhino, nec Clusii Pancratium separamus à vulgari Scilla de qua supra nominati.

C. Bauh.

Nomina
LuguanumLocus &
Tempus.

Delectus:

Vius.

Scilla, Offic. *Squilla*. German. *Meerzwibel* *Meuß zwibel* Belg. &c. *Hyenyn*. Gall. *Scapo-le*, *Squille*, *Charpentaire*, *Oignon marin*. Hisp. *Cebamarrina*, *Bebela Albarran*. Boh. *Eybula* & *Hiesfa*.

Spontè nascuntur copiosissime in Balearibus Ebulocia insulis ac per Hispanias. In Sicilia & Apulia copiose, maxime apud mare. Scilla ter floret, tria tempora stationum ostendens: Non solum Veneriis vidimus Scillas multas rubras magnas, verum etiam Lugduni, ubi tamen meo tempore apud Pharmacopœos rarus erat vilius, quemadmodum & Genue ubi Scillarum loco alios vsurpant bulbos. Bulbi Scillæ in Offic. non sati qui constant corticibus, crassis, tuffis, ac viscidis, folia produnt. Basileæ pharmacopœos videntes obseruavi. Parauit vidi in horto publico Lugduno mihi missa quæ æstate latitans, tandem Autumno folia produxit Montbelgardis: sed non diu perdurauit frigore interempta, in horto E.C.

Eligenda bene magna & alba, vt docent tum Democrates tum Diosc. Secundum Galenum & Mesuem melior est quæ alteri connexa eruitur [sola enim & singularis, et venenosa] sapore dulci, acris, amaro, laminis splendentibus, ex agro libero: Aticennas eligit inter humidam grauem & non magnam, mediæ magnitudinis & plenam. Foelius etiam expetit fœminam candidissimam, iuxta magnitudinis, non admodum enormem, bene habitam & nutritam, neque putridam, neque gelu flaccidam, sed recentem ex terra sumptam, cum eius caules exactè auerint, seu quando triticum metunt, quæ tum potissimum viget: Idque iuxta regulam Dioscoridis generalem, quæ ait, radices & succos ipsarum & cortices, auferre oportet quum herbæ folia amittere incipiunt. Colleg. flor. expetit collectam initio Iulii. Daru potio Scillæ à drachmis quinque ad drachmas duodecim: Oxymeri autem scillites ab aur. sex ad uncias tres: Trochisci autem à drachmis duabus drachmas quatuor.

SCILLÆ MAGNÆ ALBÆ.

Candidæ autem Scillæ, siue albæ magnæ, multæ, missæ fuerunt Antuerpiâ per D. Pharm. Coldemburgium Val. Dourez, differentes à Lugdunensibus paruis, siue Pancratio Montpellulano, quas adhibuimus in consicienda Theriaca Lugduni & Genue. Discrimen autem à vulgari rubra, in iis non potuimus animaduertere, præterquam in colore: magnitudo eadem, squammæ crassæ & latæ, ex quibus apparebat folia, æquè lata esse, atque rubris. Ea in re multum differentes ab eorum bulbis, quibus vtebantur pro Scillis, an idem sit sapor non annotauimus: non placet igitur duplex descriptio quam ante posuimus Scillæ albidæ traditæ à Dod. Existimamus eum scripsisse ex alienis, non iuxta plantas à se visas.

Is hist. in fol. pro ea assumit iconem Scillæ

Hispanicæ, hæc de ea scribens: Scillæ historiati plerique dederunt, sed quia nemo hactenus legitimam eius iconem exhibuit, facere non potui quin meis Obseruationibus infererem, cum eam & primum emergentem, & florentem, semineque onustam, plerisque Hispaniæ & Lusitanie locis eruerim. Est verò Scillæ *caulis* pletumque cubitalis aut maior, rectus, nudus, abique foliis, plurimis candidis & stellatis floribus ornatus, Aphodeli minoribus, ornithogali maioribus (quod quidam, Scillam Epimenidiam putant) explicari incipiunt, quemadmodum Aphodeli & quarundam aliarum bulbacearum stirpium flores: his succedunt triangula capitula, compressis angulis, & velut inania, in quibus tamen nigrum, planum, palaceum semen: quinque, sex aut plura demum emergunt folia liliacea, lata, viridia admodum, densa, siue carnosæ, humi expansa: nonnihil carinata: radice crassa est, multis tunicis albis lento quodam humore plenis prædita, multisque crassiusculis fibris capillata. Copiose nascitur supra Olyssipponem, & plerisque aliis Lusitanie & Hispanie locis. Floret Augusto & Septembri maturefcit: folia maturo iam semine, & exarido caule, emergunt Nouembri & Decembri. Cur Dodon. & Clusius Scillam albam, verius Scillam censeant, quam ruffam, non possumus adhuc intelligere. Constat siquidem Veteribus Scillam fuisse duorum colorum: Albæ meminerunt inter Veteres Diosc. Plinius & Democrates in descript. Theriac. apud Galenum.

C. Bauh. Phyt. *Scilla* 1. maior radice alba. *Scilla* Matth. 1.2. c. 168. & icon p. 44. *Scilla* siue *Cepa marina* Lobel. icon. p. 73. & Clus. Hist. 1.2. c. 16. Sed legimus & nos Matth. & quidem plures editiones, quas inde fesso studio euoluimus, nullam tamen inuenimus iconem similem iconi apud Lob. & Clusium exhibitæ, nec etiam descriptionem, icon eadem est valde differens à Clusiana & Lobeliana, quæ licet non vndique placeat, placet tamen melius quàm nostra Fuchsiana.

Idem apud Matth. *Scilla* maior radice alba C.B. *Squilla* Brunfel. Trag. Matth. Fuch. &c. de quibus antè. Itè *Scilla* secundæ Hispanica. Clus. Hist. Castori. Lugd. *Scilla* Lonic. Cel. *Scilla* siue *Cepa marina* Lob. *Scilla*. Dod. fol. Cur à C.B. tradantur hic duæ Scillæ albæ nescimus, prior enim est rubra vulgaris: etiam 2. Hispanica Scilla. Nec placet quod dicit Scillam suam secundam Hispanicam Clusii à Lonicero tradi, vbi nam id factum non nobis constat.

Scribit Matth. Scillam Hispanicam veram acrimoniam ac virium præstantia communes nostras Scillas longè vincere, non demonstrans cuius coloris, & quâ in re differat à vulgari ruffa, quæ ei Pancratium, præterquam acrimoniam.

Amatus Scillæ meminit, ubi quid velit non demonstrat: ex sequenti tamen capite apparet eum per Scillam, intelligere hanc albam: quam ipse fœminam putat, Ruellium reprehendens quod masculum appelleret, in eo imitatur Matth. Verum non animaduertit Amatus Ruellium Plinium esse imitatum.

Lobel. Obs. p. 75. *Scilla* siue *Cepa marina* Hispanica. Adv. 57. Hisp. *Cebolla Albarrana* & *Cepa marina*. Hæc ille, qui figuram Clusij habet. Ic. Pl. p. 151. *Scilla* Hispanica.

Anguill. Scillæ Candie siue Cretæ & Cephalonie meminit, eamque veram & legitimam existimat, & ait Nicandrum & Diosc. ac Oribasium laudare albam Scillam indicantes quo candidior

orem ed inius acrem. Ego interea apud Dioscoron non inuenio candidam minus acrem; nec propterea laudatam a quoquam: considerandum igitur an hæc Anguilla Scilla diuersa sit ab Hispanica, alba, & an fortè Epimenidia Theophrasti & Plinii, & quantum differat à prædicta Scilla & in quibus: item an diuersa à Pancratio Monspeliaco.

Si duri fuerint veteri, ne concipiant, post adhibitu fœm Scillæ [*ῥίζα σκίλλης*] radicem longitudine sex digitorum, duorum crassitudine laxâ conuolutam, Hippoc. subdit, tamdiuque apponit, quoad os vteri molle & latum sit. Aut ipsam Scillâ sine radice tritam eodemque modo laxâ conuolutam apponit. Quibus modis, & vterum, si pituita laboret, purgat, aperit, & aquâ ducit.

De Scillæ viribus ita Dioscor. Scilla vim habet acrem & feruentem. Assata verò multum sui visum exhibet. Farina (*σύν*): quidam vertunt pistorio opere) subacta, aut luteo oblinitur, & in clibanum mittitur, aut prunis obruitur, donec circumfusa farina satis fuerit assata. Quâ ablata, si non flaccida facta est, altera farina aut luteo oblito, eadem faciemus. Quæ enim non sic assata est, interaneis maximè noxia exhibetur. Assatur etiam in olla operculo recta, & in clibanum immissa. Sumitur ex ea quod maximè medium est, externis circumcirca ademptis. Coquitur item incisa, ita vt prima aqua diffundatur, & alia affundatur, donec aqua non amara aut acris fiat. Sed & concisa filo transmissa siccat in umbra, ita vt frusta non se mutuo contingant. concisa itaque ad oleum & vinum & acetum scilicet utitur. Ad rimas pedum interna crude scillæ pars cum oleo seruata, aut cum resina liquata, imponitur. Commotis autem à vipera in cataplasmate cum aceto cocta. Ex assata verò contritis salis tostis partibus octo, ad vnam scillæ partem additis, exhibemus cochlearium vnũ, aut duo ieiunis, ad alium molliendam. Addimus & in potiones, & compositiones aromaticas: (*ἀρωματισμένη*, quidam legunt *ἀρωματίζε*) & in quibus vrinam mouere volumus, & in hydropicis, stomachicis quibus cibi innant, & in morbo regio, torminibus, diuturna tussi, anhelosis, sanguinem reicientibus, [*ἀναρροια*] Ruellius ore reicientibus: satis autem est pondus trium obolorum cum melle delinctum, coquitur etiam cum melle, & editur ad eadem concoctionem maximè adiutans. Ducit autem strigmentosa. Cocta verò ad eadem facit, similiter accepta. Vitanda est eius exhibitio, in his quibus exulceratio quedam intrinsecus est. Assata eadem ad verrucas penfiles, & perionies illita facit. Semen eius tritum carica aut melle exceptum, & in cibo acceptum, alium mollit. Est etiam auxiliare contra veneficia medicamentum, tota præ foribus suspensa.

De iisdem Plinius [inquit Hist. Lugd.] confusè tractauit his verbis: Prodest & gingiuis, & dentibus, vel per se commanducata. Tincas & reliqua ventris animalia pellit ex aceto, & melle sumpta. Linguae quoque recens subiecta, præstat ne hydropici sitim sentiant. Coquitur plurimis modis: in olla que coniciatur in clibanum aut furnum, uel adipe aut luteo illita, aut frustatim in patinis. Et cruda siccat, deinde conscinditur, coquiturque in aceto, tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoque purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Vfus sic coctæ ad hydropicos. Ad vrinam ciendam tribus o-

bolis cum melle & aceto potæ. Item ad spleneticos & stomachicos, si non sentiant vlcus, quibus innatet cibus. Ad tormina, regiones morbos, tussim veterem cum suspirio. Discutit & folliculis strumas quadrinis diebus soluta, furfures capitis, & vlcera manantia illita ex oleo cocta. Coquitur & in melle cibi gratia, maximè vt coctionem facias. Sic & interiora purgat. Rimas pedum sanat in oleo cocta, mista resina. Semen eius lumborum dolori ex melle imponitur. Hæc Plin. m. In quibus Marcellus, Vergilius & Corn. erroris eum insinuant, quod dixerit adipe aut luteo illita, pro eo quod est apud Dioscor. *σύν ὃ ἡ σκίλλα κενεῖται ἀστέρι*, id est, farina aqua subacta, quam *pastam* vocamus, aut luteo oblinitur: *σύν* enim & *σύν* hic non apicem, nec multis aliis locis apud medicos significat, sed *pastam* aut fermentum. Docet itaque Dioscor. & quomodo assata sit, & quomodo coquenda, & quomodo cruda concisa assiccanda, omnia clarè & euidenter [inquit Cornarius.] Verùm ea confusè tradidit Plinius lib. 20. cap. 9. Coquitur, inquit pluribus modis in olla, quæ coniciatur in clibanum aut furnum, uel adipe aut luteo illita aut frustatim in patinis. Et cruda siccat, deinde conscinditur, coquiturque in aceto, tum serpentium ictibus imponitur. Tosta quoque purgatur, & medium eius iterum in aqua coquitur. Quod itaque tostū purgari dicit, & medium eius iterum in aqua coqui: hoc Dioscor. non vult, sed de assata siue tosta purgata, medium in usum assumi. Totam verò scillam item incisam coqui, permutata aqua donec amaritudo aut acrimonia in ipsa non percipiatur. Ibidem tradit Plin. vim quoque ac vsum medicum Scillæ: & habet id etiam quod Dioscor. ad finem dixit, esse auxiliare contra veneficia medicamentum totam præ foribus suspensam, his verbis: Pythagoras Scillam in limine quoque ianue suspensam malorum medicamentorum introitum pellere dicit: quanquam idem quoque de Asphodelo lib. 21. cap. 17. prodiderit, velut emb. 154. Corn. meminit vbi etiam Theophrast. locum adduxit.

Quæ verò de aceto ex scilla parando exacuèdoque idem Plinius dicit, infra expendemus. Verùm hic addemus, *ἀστέρι* à Dioscor. & reliquis medicis Græcis dici, qui sanguinem ex infernis partibus sursum educunt, & per os reiciunt. Cæterum Dioscoridis modus præparandi scillam (ait Lobel. Obs. ignauia & incertia Pharmacariorum exoleuit. De scilla sic differit Galen. lib. simpl. Admodum incidentem facultatem obtinet, non tamen admodum calidam. Sed secundum hoc quispiam secundi ordinis censetur exalfaciendum. Præstat autem aut assam aut elixam fumere: sic enim virium eius vehementia exoluitur. Pauli testimonio scilla calefacit & siccatur ordine secundo: Mesue autem calida tertio & sicca propè secundum. Dodon. autem tertio. Sed Matthioli sententiâ, vique adeo calida est & sicca, vt exulcerare possit.

Hoc autem annotandum cum Sylui, Vereres excepto Mesue, non meminisse, neque cultri ex ligno Pini vel Cupressi, ad diuidendam Scillâ, nec acus lignæ, nec de medio eius abiiciendo, vt Neoterici faciunt. Quinimò Gal. ad Pisonē de Theriac. iubet fumere partes interiores Scillæ. De ratione extrahendi succi legatur Sylu. lib. 2. Pharmacopœiæ.

Si Scilla reponatur inter fructus arcet eorū putredinē. Aut minutim incisam & in vase vitreo melle pleno, per totam æstatem Soli expositam,

Plinius non

Temper;
Galen.

deinde collatam, præsentaneum esse remedium epilepticis.

Pancratium ad eod. rusticis Hispanis exosum. ut Clusium eius bulbos eruentem admoneret ne degustaret, præsentaneum enim esse venenum: Illi tamen aqua dum illa assatur extillante scabiem vitiliter illini & curari asserebant.

MEL SCILLITICVM.

Mel Scilliticum.

Quidam ætatis nostræ (verba sunt Marth.) Medici in cerebri, & neruorum frigidis affectibus Scillam crudam ab inuolutis repurgatam minutim secant, & cum melle plurimo in vas vitreum coniciunt, insolantque per æstatem, ardente præsertim Sirio; demum percolato melle trantur ad comitiales, & alias cerebri ægritudines, à frigiditate excitatas. Sed alia longè diuersa fuit Galeni ad hos vsus Scillæ parandæ ratio. Quippe qui concissam Scillam nunquam melle committam exposuit insolendam, sed vrab ea succum Sole colliquatam in diebus canicularibus extimeret in fictile, vel vitreum, vas, in quo plurimum mel fuisset, dissectam Scillam immittere: deinde tantisper insolabat, donec Solaribus radiis ipsa liqueceret. Ex quo palam fit, quod plerique à Galeni instituto prorsus aberrant, ut qui Scilliticum mel conficiant Scillæ liquoris vice.

Oxymel Scilliticum.

Tractaremus hic de Oxymellite Scillitico nisi maior esset història, præterea iam incipit magis compositas vires nancisci, de eo Plin. l. 3. c. 2. Mesues lib. 3. de Antid. cum com. Sylui: vt & alii.

Vinum.

Vinum quoque ex Scilla fit hoc modo, concissam velut dixi Scillam in Sole siccato, deinde ex ipsa contusa, & angusto cribro excussa, minam vnā linteo raro illigato, & in multū boni ac recentis sextarii viginti mittito, & per menses tres macerari finito. Postea vinum in aliud vas transfusum, diligenter coopertum reponito. Postest & humida Scilla in vsum assumi, Rapi modo concisa, & pondere duplicato. Debet autem per dies quadraginta insolari, & valde inueterari. Sed etiam hoc modo prædictum paratur vinum. Scillæ dissectæ & purgatæ tres minas in Italicam metretam multū demittito, & senos menses in vase obstructo macerari finito: post id tempus defæcatum & excolatum vinum reponito. Commodum est ad cruditates, & ciborum corruptiones, & eos qui hos reuomunt. Item quibus crassi in ventre aut stomacho hærent, lienosis, malo halitu præditis, hydropicis, morbo regio laborantibus, in difficultate vrinæ, tormina lentientibus, inflatis, resolutis, rigoribus diuturnis, vertiginosis, conuulsis. Ducit etiam menses, & neruos maxime lædit. Melius est quod vetustius est. Vitare tamen eius vsum oportet, tum in febribus, tum in his qui intus ulcus habent. Hæc Diosc. Hic subscribenda quæ Gal. tradit de vino Scillitico lib. 3. de paratu facilibus. Vinum fieri à Scillæ radice Plinius ita simpliciter lib. 14. c. 16. dicit. Sed quomodo fiat, & quem vsum de se exhibeat, neque eo loco, neque alibi vsquam, quod sanè ego (inquit Cornar.) sciam, tradit. Columella vero libri 12. c. 33. & vsum, & parandi modum sic tradit. Vinum Scillites ad concoquendum, & ad corpus reficiendum, itemque ad veterem tussim, & ad stomachum, hoc modo condire oportet. Primum ante dies quadraginta, quàm vinum voles vindemiare, Scillam legittimè, eamque secato quàm tenuissimè, sicut ra-

phani radicem, talcolaque festas suspende in vmbra, assiccentur. Deinde cum aridæ erunt, in multū aminæ sextarios 48. Scillæ aridæ adde pondo libram, eamque inesse patere diebus triginta. Postea eximito, & defæcatum vinum in amphoras binas adicieto. Alii scribunt in multū sextarios 48. Scillæ aridæ pondo libram & quadrantem adici oportere, quod & ipsum non improbo. Alii hoc ipsum Scillæ pondus, quod supra dixi, in multū duas vrnas adiciunt, & per 40. dies inesse patiuntur. Hæc quantùm consona sint his quæ Diosc. prodidit, conferentibus diiudicare facile est. In vulgaris tamen exemplaribus Columellæ, ad finem legitur, in aceti duas vrnas adiciunt. Pro aceti autem voce, legendam esse vocem multū non dubium est. Sequitur enim aceti Scillitici præparatio mox c. 34. sequenti. Hic autem de vino Scillite parando agit.

Acetum Scilliticum hoc modo Dioscor. præparatur. Scillæ albæ purgatæ, concisæ, & filo tractatæ, ut frustra mutuo se non contingant, & in vmbra ad dies quadraginta siccata, minam vnā accipito, & in aceti boni sextarios 12. mittito, & in Sole ad dies sexaginta macerari finito, vase diligenter operto. Postea exemptam ac expressam Scillam ipsam quidem abiicito, acetum verò excolatum vasis excipito, ac reponito. Quidam minam Scillæ vnā, ad aceti sextarios quinque ammiscunt. Alii mox purgatam citra resiccationem, eodem pondere iniiciunt, & per menses sex sinuat. Et tale maiorem secandi vim acquirit. Idoneum est si colluatur, ad gingiuas humore flaccidas, constringens ac firmans ipsas, itemque dentes mobiles. Putredines quoque & grauolentias oris satis emendat. Idem ab sorptum guttur firmat, & callosum facit, & sonum validum ac clarum efficit. Allumitur etiam ad stomachicos, ægè concoquentes, comitiales, vertiginosos, melancholicos, & fatuos. Insuperque ad veri strangulationes, & coxendicum affectiones: Refocillat & valde debiles, & corpus sanum ac benè coloratum facit. Vsum quoque acuit, & ad auditus grauitatem (vide postea Cornarii verba) intillari potest. Erin summa ad omnia efficax est, exceptis internis exulcerationibus, capitis doloribus, & neruorum affectionibus. Datur quotidie sorbendum ieiunis, ab initio modicum, paulatim augendo vsque ad cyathum. Quidam tamen cyathos duos, aut etiam ampliùs exhibent.

Acetum Scillinum inquit Plinius l. 23. c. 2. inueteratum magis probatur, prodestque super ea quæ diximus, aculentibus cibis: guttarum enim discutit pœnam eam: & his qui ieiuni vomunt. Callum enim faucium facit, ac stomachi, odorem oris tollit, gingiuas adstringit, dentes firmat, colorem meliorem præstat. Tarditatem quoque autium gargarizatione purgat, & transitum auditus aperit. Oculorum aciem obiter exacuit. Comitibus, melancholicis, vertiginosis, vularum strangulationibus, percussis aut præcipitatis, & ob id sanguine conglobato, neruis infirmis, renum vitiiis perquam vile. Cauendum exulceratis. Hæc Plin. post aceti tractationem, de aceto Scillino (inquit Cornar.) subiicit. Erin reliquis quidem à Diosc. non dissentit, sed quod neruis infirmis perquam vile esse dicit, in hoc & Dioscor. & sibi ipsi contradicit. Diosc. enim dum ad omnia efficax esse ait, internas exulcerationes, capitis dolores, & neruorum affectiones excipit.

Ipsæ

Ipsæ verò Plinius paulò antea de aceto agens, Vesicæ & nervorum infirmitatibus ipsum nocere dicit. In hoc itaque dissensio est, haud scio quâ occasione inducta.

Eius verò parandi hunc tradit modum. Scilla quæ candidissima fuerit, inquit, vtilissima erit. Huic aridis tunicis direptis, quod reliquum è vivo est confusum suspenditur lino modicis intervalis. Postea arida frusta in cadum aceti, quamasperimi pendentia immerguntur, ita ne illa parte vas contingant. Hoc fit antè solstitium diebus 48. gypsa deinde oblitus cadus ponitur sub tegulis, totius diei Solem accipientibus. Post eam numerum dierum tollitur vas, Scilla eximitur, acetum transfunditur. Hoc clariorem oculorum aciem facit. Salutare est stomachi, laterumque doloribus parum sumptum binis diebus. Sed tanta vis est, ut auditus haustum extingatur animæ momento aliquo speciem præbeat.

Aqua ex aceto Scillitico distillata est gravior & efficacior [Oxymelico] vomitu etiam valenter purgat humores in ventriculo crassos lentos, putres, dando ad sesquiciam, cum mellis aut Sacchari rubri vnciis tribus.

De Aqua Scillæ ita differit Matthioli. Squillæ recentes detracto cortice exteriore, cultro incise vasi infernè foraminulento, & suprà operculo lutoque munito imponuntur. Huius ollæ fundus immittitur in alteram ollam subiectam in scobe terræ, & luto commissura circumdatur. Tum ignis excitatur circa superiorem ollam per noctem unam, horas decem aut amplius, Sic aqua defluit in ollam inferiorem, quæ cum farina vel pane mixta, gustata mures citò necat: citiusque si lithargyri paucum miscueris. Scilla in aqua macerata & à muribus pora eos interficit. De trochiscis scillæ Androm. ad Theriacam hæc leguntur.

Inde capillatam Scillam cum cortice sumptam,

Pulve linas, medio constituasque fisco.

Ac cineris rutuli cumulos superingere donec reddatur Scilla mollis igne capiti.

Signa dabit, seruet postus cum discutis ignes:

Excute, & ut laues dempsere exuvias,

Tres Scillæ partes, Erui compone duabus

Pissillisque creper concava pila dim.

Ac minimis tandem confusa premantur in orbis

Quos procul à radiis mirior umbrat egat.

De pastillo scillitico & de præparatione Scillæ ad pastillum potest legi Fuchsi. de comp. med. lib. 2.

Hic autem ponemus rationem consiciendorum pastillorum Scylliticorum ex Galeno, quæ eadem est cum Andromachi præparatione: Verba autem Galeni hæc sunt l. i. de Antid. cap. 9. Principio Scillam succulentam de terra euellens, cuius folia penitus iam & scapus aruerint. Huic deinde cortice detracto duriorum particulam induces ex tritico nouo, quantumque fieri potest exquisito confectam, ipse postea multo calidiorque cineri subiectam non prius extrahes, quoadusque circumposita pulicula crusta planè fiat. Quod si ubi hæc agis furus aliquis addit, vna cum pane Scillam illuc inferre potes, inde cum obducta plus iam exaruit, ipsam extrahes, & conteres. Satis assam verò Scillam intelliges, si festucam immixtam admiseris, Scilla namque cum bene cocta est, furculos faciliè excipit. Vbi verò scillam diligenter attriueris, candidam Erui farinam admisce: nam quæ candida non est, amara super radum esse conficitur. Cognitum autem vncui-

que existimo prius oportere tenui cribro farinam excutere, ac præterea diligenter eam leuigare. Scilla verò sesqui pondere farinam superet opus est. Dico autem sesqui pondere, ut si duas farinæ sumas scillæ tres accipias. Quam rem cum & Andromachus iunior asserat, nescio quâ ratione ductus velit Erui farinæ drach. octoginta esse, scillæ verò centum viginti, cum satis sit dicere, scillam erui sesqui pondere superet. Postremò verò simulatque rotulas tenues ex hac mistura conformaueris, in cella, sicuti paulò antè dicebamus, ad meridiem vergente repones, quas tamen non in solis radiis collocabis. Verum sicut de pastillis Viperæ dictum est, ita in his quoque cetera perage: Hac Galenus.

De Scilla venenata & remediis.

In Scyllarum genere quædam suapte natura venenosa prouenit, quæ sua malefica vi, etsi quam parçè deuoretur, illicò tamen hominem torquet, quemadmodum Fungi, qui in lethali genere habentur. Venenosa igitur scilla [ut Mesues tradidit] sola, nec alteri annexa, prouenit, locisque oboritur fœdis, ac graueolentibus, ut apud Thermas. Quapropter de hac differens Auic. inter venenatas plantas fen. 7. 4. volum. sic inquit: scillæ malæ vsus ventriculum exulcerat, & intestina, ipsasque Mesaraicas venas, aliisque meatus, qui è ventriculo in iecur permeant: Quo fit ut in viscibus oriantur punctiones, acutique cruciatus, & inde dysenteria. Quibus incommodis succurritur lactis potu, in quo ferrum, quod Græci stomoma, nos verò chalybem appellamus, pluries relictum fuerit, deuoratisque ouorum vitellis, in aceto decoctis. Quinetiam iis fixa cibaria conferunt, pingua carniū iura, recens, etudumque butyrum, & extrema iuuenum quadrupedum membra, aliisque permulta.

BVLBVS ERIOPHORVS.



Sunt huic multa, ob- Descriptio
longa filia,
Hyacinthinis
ferè similia,
minus carno-
sa, & succule-
ta, duriora
tamen, viri-
dia, mucro-
nata, sapore
ingrato, qui-
bus minutif-
simè etiam
contractis;
tenuia quædã
sila instar ce-
læ arancarum
diduci pos-
sunt. Ex ho-
rum medio
caulis exit cu-

bitalis aut amplior, rectus, scillinè caulis emul-
lus, læuis, nudus, virefcens, superiore verò par-
te ad cæruleum colorem tendens: in summo ve-
luti oblongam ac densam fert spicam in denos
vel plures versus, antequam explicetur, distin-
ctam, primùm viridem, sed paulatim (dum sese
explicat in flores) cæruleum colorem contrahet:
tem: flores tenis foliis stelatum expansis con-
stant, triangulo vmbone in mediò protuberante,

Hyacinthi autumnalis. Floribus promodū similes, inodori, colore cum suis pediculis caruleo & internis staminibus, quorum apices initio purpurei sunt, & ubi sese explicarunt, veluti pallefcente quadam farina asperii. Incipit florere ab initio, vti Scilla solet, & reliqui magna ex parte bulbi, qui flores racemi aut spica in modum confertos habent. Semen etiam obseruare volumus: sed flores admodum caduci, statim marcescere ceperunt, & relictis in caule tantum pediculis deciderunt. Radix crassa & bulbosa est, ex plurimis tunicis contexta, alba, tomentosa, & veluti aranearum telis obrita, multos circa latera natos bulbos habens, & crassis oblongisque fibris nitens.

Hæc est Clusii descriptio quam integram ex eo ponimus: potuissimus quidem describere, vt qui diu coluimus & obseruauerimus veluti filia aranearum, quum franguntur folia, sed nobis flores non protulit. Liberum per nos esto cuiuslibet iudicium asserendi an planta quæ exhibetur sit Bulbus Eriophorus Theoph. scribentis lib. 7. Hist. pl. c. 13. constare Bulborum plura esse genera, sed maximam, peculiaremque præcipue differentiam lanigerarum herbarum. Esse enim tale quoddam genus, in littoribus nascens, cuius inter summum corticem, eamque partem, quæ edulis est, lana sit, ex qua mappalia, vestesque quædam conficiantur. Sed huius bulbi, Theoph. neque regionem in qua id fiat, neque quicquam diligentius, præterquam Eriophoron id appellari, in exemplaribus, quæ quidem Plinius inuenierit, tradit.

Bulbus potro hic Mulcari maioris nomine Constantinopoli Clusio allatus fuit. *ipocoru Laniferi* nomen ipsi indidit, ob tomenti copiam, quod lanæ modo in stamina deduci potest.

Dodon. in fol. depingit, sub titulo *Bulbi Eriophori Vienna nati*. Lobel. Obs. figuram Clusii habet, ac dicit eum veram Bulbi Eriophori Theoph. effigiem exhibuisse. I. Gerar. *Bulbus Eriophorus wolli Jacint.* *Bulbus bombycinus commentarius.* falsè dem bassè Jacint. C. Bauh. Phyt. *Bulbus Eriophorus* Theoph. id est, *laniferus*.

Bulbum Eriophorum primum vidi anno 1578. allatum ex S. Lupo Burgundie, Plantatus in horto H. E. C. Montbelgardi, quum latuisset ætate & existimarem putrefactum, Autumno produxit folia: tandem multiplicatus, verum multis annis florem non produxit, qui sanè mihi nondum visus: D. Martinus Chmielecius Prof. Basil. Basilee in horto suo colit, ac in hortum H. C. Wirt. plantandum dedit 1599 quum petuisset mihi. Constantinopoli rediens attulit Philibertus de Bruxella, qui nonnullos Clusio dedit, quorum partim ipse, partim C. V. Ioann. Aicholtzius Medicus & professor Viennensis aliquot terræ concedidit. Clusio omnes perierunt, ille verò duos conferuauit, quorum alter etiam floruit non sine ingentiorum lætitiâ. Generoso D. Longatre Iunio anni 1583. flores dedit.

Flores mihi proferebat insequente Aprili, quia videlicet, in scitili per hyemem adseruata: altera minor, quam horto credebam, & totius hyemis inclementiam in illo bellè perseferebat, dumtaxat Maio, quemadmodum & illa prior, quæ etiam in horto reposita, altero anno florebat. Cæterum hanc plantam cum Narcissi speciebus quarum icones Matth. exhibuit suis in Diosc. com. historiam verò non dedit, diligenter conferens, non absimilem reperio eius Narcisso 4. qualis saltem

saltem extat in Comin. anno 1570. Venetiis editis. Matth. Lat. & Ital. cum mag. fig. Narcissus 4. qui figuram habet cum solo titulo: non demonstrans vnde acceperit iconem.

ORNITHOGALVM CÆRVLEVM pallens, & ornithogalum Hispanicum minus.



Ornithogallis qualibet sui parte valde cognatum [teste Lob. obs.] & affine, sed flos caeruleus, Hyacintho Autumnali penè par & similis. Ex Turnarèsi vrbe primum Drancioni munere missum. Idè cum hoc fortè fuerit Ornithogalum Hispanicum minus seu sextu, quod saithore Clusio hist. post. [ex paruo orbiculati albi] cante bulbo sena aut septena, nouo vere profert folia Ornithogalo vulgari ferè similia, sed paulò angustiora, nulla vena cæcicante per longitudinem secta, & quorum medio prodit singularis cauliculus, interdum & alter, palmaris, teres, sustinens senos, septenos, aut plures *stipulos*, alternatim quidem nascentes, sed quasi vmbellam quandam efformantes, ad eò æquali sunt altitudine, non secus atque in vulgari & Arabico, senis foliolis ex albo subcaeruleo umbilicum occupantibus: nulla adhuc capitula vel semen obseruare Clus. potuit: totà coma breui à floribus marcescente. Communicebat Clusio Generol. D. de Longatre *Hyacinthi stellaris serotini albo flore* inscriptione, qui ex Hispania missum dicebat. Floret Aprili.

BVLBVS MONOPHYLLOS FLORE albo, an Boagyn Theoph.



Valdè rara est hæc planta (autore Clusio Exot. cuius certè flos ipsi ante annum 1605. non cõspectus. Eam autem redemerat cū aliis biennio antè à Gallo rhizotomo Nicolo le Quil, Lutetia Parisiorum commorante, qui in Lusitania erutam asserbat. Vnico autem

Laniferus.

Locus & icon pus.

autē ē terra prodibat foliis tenti primum & prorsus iuncto, quā tandem pedale adq̄ iurebat longitudo: duabus autem supra terram vicibus paulo maiorem adquirebat latitudinem, & canaliculatus fiebat, extremā tamen parte manente iunctā: ubi verō latiore adquire incipiebat latitudinem, ex eius medio exliebat triuncialis longitudinis *cauliculus*, tenuis, laevis, dilutius virens, in cuius fastigio alternatim siti erant tres flores non valde magni [vt ex icōne obseruari potest, in qua voluit florum magnitudinem expressā] qui sex foliis cādidissimis erāt præditi, non multū ab similes floribus Graminis Parnassi Herbariorum, siue Hepaticæ albæ Cordi, sed nullo caliculo, vt illi, inclusi: ē quorum medio prodibant sex alba *stamina* flauis *apicibus* prædita, & vmbilicum occupabat *capitellum* triangulare, sumo fastigio sustinens exilem *stilum* album, staminum longitudinem non excedentem. Oloratus autem erat iste flos, & spinæ appendicis florum odorem emulabatur. Eius *bulbus* orbicularis erat formæ, nec Auellanae nucis magnitudinem excedebat, fuscā membranā tectus, sedeq̄ illis multis tenuibus candidis fibris obfita. Bina folia, totidemq̄ cauliculos habuit, vt in tabella ad plantæ normam expressa videre licet: flores autem aperiebantur medio Iunio: quale *semen* prolatura fuisset, nihil pronuciare possum, quandoquidem plantam ē terra eximere coactus fui, vt pictori exprimendam traderet: & tamen si bulbus postea terræ denuō fuerit commissus, caulis tamen cum flore breui emarcuit.

Quo nomine appellare debeat hanc plantam dubitat, nisi quis fortē *Bulbus* esse censcat, cuius Theophrast. lib. 7. Hist. Plant. cap. 13. meminit: sed quū eam non describat, & dumtaxat responat inter plantas quæ bulbosa radice constāt, difficile est certi quidpiam statuere. Siue autem *Bulbus*, siue *Bulbō* *μονοκύλλος* quis appellare malit, per Clusium semper licebit.

BVLBUS SYLVESTRIS FVCHSII FLORE luteo, siue Ornithogalum luteum.



VERIS minus Ornithogalum luteum *radice* est bulbosa, Ornithogali albi bulbum æquante, alba, præternubus filamentis fibrata, gustu viscoso & subdulci non amaro, & astringente, vt anotat Fuchf. & Dodon. ē radice statim *folium* emergit porraceū, semunciam ferē latum,

dodrantalibus circiter longitudinis, in terram caducum, coloris glauci, in teretem mucronem desinens, glabrum, superius laeue, inferius costis plantagineis donatum, modō vnum, modō duo

aut tria, plura interdum folia sunt, pinguiuscula, angusta, triquetra: comitatur ipsa ē bulbo quoque ortus *caulis* singularis, angulosus, foliis breuior, subrubens, cætera nudus, alioqui sciscitā ferē infra summum cacumen folio præditum vnico aut altero sextantali, vel palmari, nonnūquam glabro, aliās subhirsuto, oris paulū intrō flexis, vt carinam imitetur: ē cuius sinu reliquus *caulis* pergens, aliās indiuisus, *storem* gerit vnum, aliās subdividitur pluresq̄ ad nouem vsq̄ flores sustinet, vnicuique diuisioni folio appposito. Flores singuli ex longiuculis pediculis Ornithogalo similibus, tenis constant foliis oblongis, foris viridantibus, hirsutis oris luteis, intus penitus flauis, medium occupantibus totidem *staminibus* cum *apicibus* luteis: medietellum obidet, etiam nondum delapso flore subnascens *capitulum* triquetrum, *seminis* conceptaculum, cuius ex vmbilico *stilus* exit in apicem luteum desinēs, Suspicamur à Cordo in sua historia Sisyntichii dici, cuius radices sunt foris interdum luteæ, intus verō candidæ, dulces, & Hordeum Pilumque aqua maceratum sapore imitantes.

Trag. *Bulbus agrestis*, *Cepa stellata* genus, Nonnullorum Germanorum *Zieferzwibel* / *feldzwibel* / & *mildzwibel* / hoc est, teste Clusio, *Cepa sylvestris*. Quia verō nos de ea nihil apud Veteres Herbarios legimus, vocabimus interea Bulbum agrestem Fuchf. cui similiter bulbus silu. dicitur, ac qui describit & depingit, adaptans sibi Discor. Plinii & Galeni verba.

Apud Amatum Lugduni impressum posita icon huius bulbi, cuius mentionem non facit, quod animaduertam. Gesner. hort. *Bulbus bifolius* / *scutis luteis*. Nondum certē cognitum (Dodon. Gall.) quomodo hic bulbus Veteribus dictus sit, quidam Bulbinam putant: aliis est *Bulbus luteus* id est, bulbus esculentus: ille nobis nominatur *Bulbus sylvestris*. Belg. *Velt ayen*. Gall. *Oignon saunage*: hac Dodon. qui depingit & describit.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. pag. 149. *Ornithogalum luteum* Adn. pag. 56. Germ. *Geelfeldzwibel* & *Zieferzwibel* / *Bulbus sylvestris* Fuchf. & Trag. *Sisyntichion Cordi*. *Bulbus esculentus* Lacuna. *Ornithogalum* 8. Clusii *hist. pos.* Vngari *Tikara* vocant, quod quidam *modicus* Perdicium Theophr. esse censent, qui foritan lib. 7. cap. 3. scribit plures illi radices esse quā folia: adiecit tamen crassas habere radices, quæ sanē nota huic non conuenit.

Casp. Bauhin. Phyt. *Ornithogalum* m. 5. siue *luteum*, *Bulbus* quibusdam, aliis *Bulbus esculentus*, aliis *vomitorius*, nonnullis *Perdicium* Theophr. hist. 8. quibusdam *Bulbus marialis*.

Histor. Lugd. pag. 1502. *Bulbus sylvestris* Fuchf. & Dodon. Sunt qui Bulbinam vocent, alii *Cochlear* id est *quor*, id est Bulbum esculentum, nominant, quorum sententia peritis Herbariis haud placet. Ruellio, *Bulbus silu.* non desunt qui *Bulbum vomitorius* esse credant. Item Ornithogalum luteum Lob. siue bulbus silu. Dodon. Insignis ignorantia Compilatoris hist. qui duas habet figuras & historias vnus plantæ diuersis locis.

Tabern. icon & hist. *Ornithogalum luteum* siue *Geelfeldzwibel*. Melius nobis placet figura quā exhibemus, quæ iam ex Fuchfio parata erat quā noua Tabern.

Gerard. *Cepa agraria* Star wilde of Berplez hem. *Bulbine*.

Basileæ provenit circa Wild & Gundeldins gen: Fr. Casp. Bauhinus collectum in Rhætia

Sisyntichion

Cepa Stellata
Sylvestris

Perdicium

Hist. Lugd.
Comp. nat.

Cepa agraria
Bulbine
Locus & tempus


circa Curiam attulit: mensis Martii fine deflorescentem obseruauit in horto Io. Heitzman pharm. Bas. circa Lugdunum florentem Februario & Aprili, Montbelgardi etiam prouenit mihi in horto Il. E. C. munere prædicti Pharm. florens Martio. Clus. In Alpium pratis ubi siluæ defluere incipiunt. Lob. Non ita frequens Italia, Norbonæque calidioribus visitur. In Aruernis & ad Lugdunum pomeria. Sisyrinchion primo Vere folia emittit, nec proximo, sed altero anno, caules floresque producit. Nascitur arenosis, iisque aliquantulum humentibus aruis. Qui verò in pingui planoque solo, sub arboribus nascitur (inquit Cornar.) quò fluuiorum inundationes perueniunt, maior quidem est, sapore & viribus ignauior, Vbiq; ad agrorum & siluarum carduarum margines in Germania frequens, sed etiam apud Vngaros circa sepes & agrorum margines natum vidit Clusius.

Trago siluestris hæc Cæpa in cibo non vsurpatur. At in Medicina non contemnendi est vsus. Siquidem radix [vt idem Trag. testatur] in calido cinere torrefacta, ac cum melle tusa, inque linteo imposita, vlcera depascunt, & manantia sanandi, durosque tumores emolliendi vim habet. C. Bauh. Bulbum maialem contulum, infantibus lactantibus conuulsione laborantibus in lacte exhibent. Hist. Lugd. Dictum autem est, *Pedicularium*, quòd perdecies ad id se volunt terramque suffodiant. Non desunt qui vomitorium bulbum esse credant, quòd vsu compertum sit radicis decoctum vomitiones eiecit, & aluum valenter ducere, non dissentiens Diosc. delineatione, scribentis, Bulbum vomitorium folia habere lori modo, latiora quàm Bulbus esculentus: radicem similem bulbo, cortice nigro. Quæ si per se edatur, vel decoctum eius bibatur, vesicæ malis medetur & vomitiones mouet.

ORNITHOGALVM PALLIDO FLORE.

Descriptio

Est hoc Clusio. Hist. poster. Ornithogalum 7. non valde absimile Bulbo silu. Fuchii, maiori tamen folio constat, cauleque crassiore, licet infirmo: inique aut terni, quos sustinet *st. res*, maiores, minus flauis, sed ex herbaceo, quodammodo pallidi. Obseruabat in Striacarum & Austriacarum Alpiu pratis, ubi siluæ defluere solent.



An Tabern. icon. ornithogalum maius Erdnussfeldt zwibel. Icon Tabern. videtur respondere Ornithogalo Clusii modo dicto, verum incepte ponitur pro vero Ornithogalo, cuius eo capite tradit descriptione. Gerard. Ornithogalum luteum, yelloe

star of Bethlehem.

Ornithogalum minus è Pyrenæis.

Binos à Venerio exiguos bulbos in Pyrenæis erutos accipiebat Clusius hist. post. in append. de Hyacinthi stellati albicanribus floribus appellatione insignitos, quorum flores, quum anno 1600. conspiceret, non Hyacinthi, sed Ornithogali parui esse deprehendebat: etenim & similitudine, & flores non dissimiles Ornithogali minoris sexto loco descripti (Ornith. cærulei palentis) c. 3. l. 2. plant. Hist. foliis & floribus habuerunt: in eo duntaxat differre ipsi videbatur, quòd istius flores paulò maiores apparent, sex etiam foliis constantes, vt illius, quorum singula neruo foris, seu vena subcærulea secundum longitudinem per medium essent distincta, & sex staminulorum apices, in hoc furui, qui in illo violacei. Florebat Maio.

ORNITHOGALVM LVTEVM minus.

Vnto prodit foliolo, duas aut tres vncias longo, angusto, exalbidi coloris & acidi gustus: iuxta quod tenuis vncialis cauliculus, vnum aut alterum foliolum sustinens, è quorum medio bi-



ni aut terni exiliu florenti stellati, intus flauis, foris ex viridi purpurescentes, sex radiolis & totidem staminibus intus præditi: iis succedunt pusilla triangulara capitula, semina: rufis, exili & inequali plena, radice alba, rotunda, cineraceo putamine obducta, exigui Pisi magnitudine. Sed & hoc cultura ali-

quantulum maius euadit.

Clus. Pann. Ornithogalum Panmonicum luteum est. Et hist. Ornithogalum 6. siue luteum minus. Lob. Obs. Ornithogali species multò minor foliis longè exilioribus & angustioribus: in vridatis nostris prouenit.

Aprico magis delectari videtur, abundantiusque crescit in apertis Meridiei oppositis.


Ornithogalum flauum cum staminibus rubris.

Ornithogalum flauum Alcmarianum, circa Alcmariam Holandiæ urbem repertum, mihi non conspectum, inquit Clusius hist. post. sed N. V. lo. ab Hogelande de eo me monuit. Binis duntaxat id præditum est foliis, angustis, longis. Hyacinthi botryodis vulgaris cæruleo flore foliis valde similibus: cauliculo inter illa prodeunt insident flores flauis, duplò maiores, staminibus in medio rubentibus: ejus bulbo à radice aded vulgari

vulgari iam dicto similis, ut si miscantur utriusque bulbi dignosci non possint. Pro Nono haberi poterit.

ASPHODELVS MAIOR FLORE ALBO,
ramosus & non ramosus.

Complures circumquaque ex vno radice capitae Paeoniae modo propagantur radice, o-
liarib. ruberibus intercepta, gustu Montpelii, ut
verum fateamur, dulcibus, nullaque nobis lin-
guam acrimonia vellicantibus: *folia* carinata:
Lobelia Cyperi, Oenanthes, aut Porri familia, tri-
quetra, viridantia, cubitum fere longitudine æ-
quant, statim exorta: inter quæ surgit *caulis* sin-
gularis, rotundus, laevis, duos aut tres cubitos al-
tus, robustus, à cuius medio ad summum usque
fastigium numerosi conspiciuntur flores stellati,
Ornithogali maiores, foliis albis striâ rubrâ no-
tatis conitantes, apicibus luteis: quibus decidè-
ribus capitula succedunt Cerasis paria, semen
continentia copiosum, triquetrum, futeum.



albi, foris uerò nervo purpurascente singula fo-
lia secundum longitudinem quasi distinguente,
[ut Ornithogali hos virefcente lineâ distinctus
est,] totidem quot foliola staminibus medium

occupantibus: *semen* durum, lignosum, rugosum,
atrum, & figura triquetra, capitulo orbiculari fe-
rè, sed tribus eminentioribus costis prædito, &
ex viridi purpurascente continetur, quod illo per
maturitatem dehiscente, cadit: flores per partes
ut verè dicit Theophrast. & incipit ab imis. *Ra-
dices* ab vno capite numerosè exeunt, oblongæ, æ-
xiguis nasis similes, sed inferiore sede crassiores,
arque in fibras desinentes, succi plenæ, candicæ-
tes, ingrati & acris gustus. Istius radices vide-
re memini dum Olyssipone Hispalim proficisce-
ret, aratro erutas, quæ ducentos aut plures ab
eodem capite pendentes, eoque crassos admodum,
napos habereant, ut quinquaginta aut amplius li-
bras totam plantam pendisse putem. Itaque nihil
mirum, si Plinius octoginta simul aceruatis sa-
pè bulbis referat. Alter huic omnino similis,
exceptis caule, qui vnicus est, neque furculosus,
& flore qui omnino albus: illius etiam radix nõ
adeò numerosa.

Placet in tota Asphodelorum varietate prius-
quam ad certas species descendamus veterem de
iisdem doctrinam more nostro proponere. Infit
autem Theophrast. lib. 7. Hist. stirp. *ἡ δὲ ἀσφὸδελ-
ος ὁμαλὴ, ἢ περὶ τῆς ἐν τῇ ἑσπέρῃ, ἢ ἐν τῇ ἀσπέρῃ.*
Id est, Asphodelus longum & angustum, & ali-
quantulum viscosum folium habet. Et paulò in-
ferius: Caulem verò habet Asphodelus maxi-
mus omnium. Anthericus enim maximus est.
Et paulò post: Est etiam multi seminis Aspho-
delus, & semen ipsius lignosum est, forma trian-
gulari, figura nigrum. Gignitur hoc in rotun-
do quodam, quod sub flore est, excidens ætate
vbi id dehiscit. Arescit particulatim, quemad-
modum etiam in Scilla contingit, & primum ab
inferioribus partibus. At in antherico nascitur
vermis, qui in aliud animal volatile floridum
transmutatur. Deinde cum anthericus exarue-
rit, ipso eroso euolat. Videtur autem hoc pe-
culiare habere inter reliqua Leui caule prædica,
quod cum angustus sit, propagines supernè ha-
bet.

Asphodeli mentionem teste Plin. & Homerus
fecit. Radix eius nasis modicis similis est, ne-
que alia numerosior, octoginta simul aceruatis
sæpè bulbis.

Theophrast. ut ferè Græci, principisque Pytha-
goras, caulem eius cubitalem, & sæpè duum cu-
bitorum, foliis Porri sylvestris, anthericum vo-
caueret, radicem verò, id est bulbos, Asphodelon.
Nostrum illud Albucum vocant, & Asphodelum
hastulam regiam, caulis acinofi: ac duo genera
faciunt, albucum est scapus cubitalis, amplius, par-
uus, læuis.

Galenus secundo De alim. radicem Asphodeli
Scillæ radici similem esse dicit, & magnitudine,
& figura, & amaritudine: quæ tamen si velut
lupini præparetur, plurimum amaritudinis de-
ponit, & hoc modo Scillæ præstat.

Sed de hoc ita disscribit Dioscor. Asphodelus
[quem alii in eius spuris Anthericum, Roma-
ni Albucum vocant,] planta plurimis nota est, folia
habens Porro magno similia, caulem læuem, qui
in summo florem habet Anthericum appellatum.
Radices subsunt oblongæ, rotundæ, glandibus si-
miles, sapore acres, & facultate calfacientes,
Dioscor. plurimis notam esse plantam Asphode-
lum dicit: & hodie plurimis nota est, qui ipsam
in Italia viderunt, vbi plurima etiam in hor-
torum cultu nascitur.

Verum in Germania pauci (inquit Cornar.)
aut nulli veram Asphodelum noverunt. Nam ea

Folium.

*Anthericum
Semen*

*Scilla ma-
ior flores.*

*Porri filio-
folia*

*Radix
Gal. Scilla
similis.*

radix quam officinis Aphodilum corruptè vocant, bulbosa quidem est, sed ex breui ac humili herba colligitur, quum Aphodelus caulem maximum habeat, vt inde Haftula regia [quod Sylu. inquit] nomen inuenerit. Itaque vt res ignota, nullum apud nostros Aphodelus habet, si tamen vera Aphodelus est, quæ Aphodilus Officinis dicitur, velut à multis affirmatur, nostri ipsam Goldmurg vocant.

Verum Aphodelum primum [vt interpres Kihnerus apud Trag. monet] monstrauit is Herbarius, qui Latinus ex offic. Egenolphi in lucem prodit. Vidit aliquando Marth. eius aliquam radicem bulbis vltra centum radici coherentibus. Idem in hist. Germ. Aphodelus albus siue mas: olim non describebat: in Ital. cum magn. fig. describit quidem, sed colorem floris non annotat.

Albucum, seu veram Aphodelum semel duntaxat in Anglia vidit Turnerus. Nam quod vulgus illic appellat Affodil, vel Daffodil, species est Narcissi. Sæpius vidit in Italia, & nonnullis hortis Antuerpiæ. Idem verò etiam in Anglia in horto suo colit.

Aphodili duas species tradit Anguill. vnam in seopulis maritimis & arenosis locis nascentem, caule furculoso. Alteram caule simplici: vtramque autem speciem notissimam.

Maran. inquit Diosc. describit Aphodili vñ genus: nos tria alia reperimus: flore & radicibus valdè similia, licet folia multò minora habeant.

Gesner. horti Aphodelus Albus, Aphodelus maior & propriè Diosc. ridis.

Dodon. Gall. hist. Aphodelus mas, cuius flos Græcis dicitur *Ἀφρόδις*, & secundum Plinium Latine *Albucum*. Ait porò in hist. lat. flor. & in fol. & ex eo hist. Lugd. Aphodili albi, flores esse colore candidos, aut ex valdè diluto rubro modicè purpurascetes, radices cum amaritudine leni, sapore astringente.

Meminit huius Aphodili Hesiodus in operibus & diebus, vbi stultos ait ignorare, quàm magnum bonum sit in Malua & Aphodilo. Nam huius præcipuè Aphodili radices edules sunt. Galenus tamen non de hoc Aphodilo, sed de bulboso eum scripsisse opinatur: eius tamen si bulbos non nisi pluribus elixationibus esculentos reddi ipsemet testetur: quales non est verisimile Hesiodum commendasse, qui cibum aliquem paratu facilem insinuassee videtur.

Plinius Aphodelum [inquit Clus.] aliquibus Heroion appellari tradit, & Dionysio marè & feminam esse. Hispani priorem *Gamonas* vocant.

Lob. Obs. Aphodelus maior albus: Aduers. p. 45. Hisp. *Gamonas* & *Gamonites*. Aphodelus maior albus. Aphodelus flore suaue rubente. Item Tom. 2. Aphodelus ramifolius.

Tab. nat.

Tabern. hist. & icon. *weiß Affodilwurz*, Aphodelus 3. albus. Item *Rote Affodillen*, Aphodelus 6. rubens, cuius folia punctis notata.

Gerard. Aphodelus ramifolius, vñ *weiß Affodil*. Aphodelus ramifolius, *Brauched Affodil*. Aphodelus flore rubente. *Rod Affodil*. Duæ priores icones apud Tabern. sub titulis transpositæ sunt.

C. Bauh. Phyt. Aphodelus 1. siue albus ramifolius mas, Clusio maior, Lobelio ramifolius. Aphodelus 2. siue albus alter, Marth. Aphodelus, Lob. albus maior. Aphodelus 3. siue autumnalis. Cam. autumnalis siue maior. Dodon. flore incarnato,

Lob. suaue rubente. Aphodelus 4. siue flore purpurascente foliis maculis aspersis. Idem apud Marth. aphodelus non ramifolius, haftula regia Matth.

Græcis *ἀφρόδις* sc. Lat. *Aphodelus*, & *haftula regia*, quòd dum floret prorsus sceptri regii effigiem referat, & *Albucum*, siue *Albucus* vocatur, Officinis corrupta voce *Afrodilus*, Arab. *Cheunecheunte*, *Birrach*, *Abg*, seu *Axeras*. Germ. *Goldwurz*, *weiß Affodilblum*, *Brab. Affodillen*, *Gall. Hache royale*, ou *Afphodel*. It. *Afphodelo*, *Amphodila*. An. *Affodil*, *daffodil*.

Floret in melle autore Dioscor. inter spuria. Oportet autem album Aphodelum secare circa æquinoctium vernum, antequam semen augetur. Arida Narbonæ litora Aphodili communis feracissima sunt, vt scribit Lobel. nec minùs montes à mari distiti. Sponte sua nascitur vterque, teste Clusio editoribus, saxosilque Lusitanæ, Hispaniæ, galliæ quòq; Aquitanicæ & Narbonensis, locis. Apud Belgas non nisi satus prouenit, vt neque in Germania. Floret vterque illic Martio & Aprili: in hortis Maio, & etiam Iunio. Prouenit ad vnum miliare à Monspelio, quà itur Frontignan in colle saxoso, vidi præterea inter Aquas mortuas & Arelaten copiosissimè, in silua quæ dicitur *la Vignede*. In Italia in hortis colunt. Cortulius in suo & in horto Parauino. Bononiæ florentem Aprili in horto Nobilis di Gozandinis, vidi. Genue in horto D. Coladonis Iurifconsulti, satus in meo horto primum sequenti anno produxit folium vnicum, rectum, triangulum. Montbelgardi habemus in horto ill. E. C. Wirt. delatum Monspelio, vbi hyemem ferre non potest nisi reponatur: Nos curauimus etiam Sturgardiam in hortum ill. E. C. deferendum. Basilæ habuimus in horto Parenatis Bauhini Medici, vbi etiam alii plures. Florentiæ obseruauimus in hortis, & Parmæ florentes. Aprili in horto Nobilis Antonii Lalaz.


Aphodili radices (ex Diosc. autoritate) potæ, vrinam & menses mouent. Sanant etiam lateris dolores, & tusses, conuulsas, ruptaque drachmæ pondere ex vino potæ. Facit & ad vomitum magis idoneos radix tali magnitudine in cibo accepta. Datur & commolis à serpentibus vtiliter trium drachmarum pondere. Integere autem oportet morsus, & radice, & floribus cum vino. Sordida item & depascens vlcera, & mamma-rum & testium inflammationes cum polenta. Ad succus radicis addito vino veteri dulci, & myrrha, & croco, ita vt hæc simul coquantur, illinendis oculis commodum sit medicamentum. Ad aures item purulentas idem succus per se in oppositam aurem infusus, dentium dolores mitigat. Cæterum vltæ radicis cinis alopecias replet. Oleum verò in excarnatis radicibus ad ignem coctum, exulceratis perionibus, & ambustis illitum prodest. Et aurium dolori opitulatur, si in aurem infundatur. Vitiliginem quoque album cum linteo in Sole præfixtam, radix illita erit. At verò semen & flores excellens remedium sunt in vino poti, aduersus scorpiões & scolopendras. Sed & per alium infernè erumpunt. Es inter spuria dicitur radicem potam, appetentiam Veneris inhibere. Sed & Cratæam radicem eadem dicere, & quod radix drachmæ pondere pota cum vino, podagrat dolores curat. Cæterum, inquit Theophr. multa ad alimentum vitia exhibet. Nam & anthericus leuiter ad ignem tostus, in cibi vsum venit, & semen torrefactum.

Om-

Omnium verò maximè radix cum fœu rufa.

ASPHODELVS BVLBOSVS DODON.

ſive Ornithogalum ſpicatum
flore virente.



Similis Ornithogalo monspeliensi spicato, pugnium implet huius bulbosus, albus, subdulcis, à quo ex eunt præparanda folia porracea, carinata, humi ferè fusa sapore vici- do: inter quæ surgit rectus caulis, vnicus, lævis, nudus, teres, duobus cubitis altior, potissimum culta, in quo dodrantalis spica florum Asphodeli & Ornithogali spicati, ex longis pediculis folliculo aliquousque involutis, colore herbaceo, vel ex luteo pallido, odore grato, ex senis foliis stellatis constantium, in quorum medio recta surrecta fibra latiuscula, foliis numero pares, albi- res, in mucro- nem acutissi- mum desinen- tes, apices su-

stinèt ex luteo albidis, capitulum ambientes tri- quetrum, oblongum, Pericarpium tria interstitia habet plena semine Ornithogali albi spicati, ita simili vt distinguere non possumus, paruum est nigrum, angulosum, sapore leguminoso, vel po- tius rugosum, Staphidis agriæ modo solidum, in- tus candidum, sapore quali leguminoso: semine maturo se aperit in tres partes.

Icon nostra quæ ex emptitiis est, in quibusdâ placet potiss. in spicato flore: altera quæ per in- curiam depicta ex Plantini iconibus in eo dispi- cet, quod pro nostra descripta planta, minus spi- cata sit.

Ornithogali maioris nomine meminit Clu- sius Pann. & Hist. post. quod sic describit: Omniũ (Ornithogalorum) maximum, porracea habet folia sena aut plura, caulem inter ea emergentẽ cubitalem aut ampliorem, rectum, nudum, firmũ, magnam florum spicam gerentem, qui explicati senis foliis constare conspiciuntur ex albo vire- scens, & foris herbaceis omnino: his succe-

To n. 11.

dunt, trigona capita, nigrum, magnũque semen continentia: radix satis crassa, bulbosa, multis tunicis candicantibus constans.

Dodon. cum Hist. Lugd. (bulbosum forte potius dixerit Gesn. horti,) bulbosum Galeni flore pal- lido [de quo lib. de Alim. facult. & simpl. med.] appellat, cum tamen nihil commune habeat cum Asphodelis excepto caule cum florum disposi- tione. Lobel. Obs. Asph. delus Hyacinthinus forte Galen.

C. Bauhin. Phyt. pag. 57. Asphodelus 7. sive bul- bosus. Camer. apud Matthioli. Germ. Asphode- lus Galeni bulbosus bulbo & floribus albis, quẽ aliqui sub Ornithogalo recentent. Suspicatur Camer. apud Matthioli, non novisse discrimen Asphodeli bulbosi ab Ornithogalo, flore albo Monspeliensi.

Dodon. apud Belgas non nisi horrensis. Floret Maio, & Iunio mente, aut serius paulo. Clusi- facis frequentem observabat inter segetes agro- rum (Pannonia) Nemethvyyvar Ill. Bathiani vicinorum Maio florentem. Ego verò Genue- passim & copiose à la Bassie, & in colle iuxta Af- ue fluviũ, è regione Champé, florens Maio mẽ- se. Montbelgardi in Horto E. C. plantatus per- durat.

Radix Asphodeli (inquit apud Dodon. Gal. de Virg alim. facult. 2.) & magnitudine, & figura, & ama- rore Scillæ radici quodammodo est similis: si ta- men vt Lupini parceret, maximam partem sui a- maroris deponit: inq; eo à Scilla discrepat, Nam Scillæ qualitas difficillimè cluitur. Hætiõdus cer- tè Asphodelum laudat cum sit ait: Nec quanta in Malua & Albuco sint bona, norunt. Equidem novi quosdam rusticos, qui grassante fame, vix tandem copuluribus elixationibus, ac maceratio- nibus in aqua dulci, esculentam ipsam reddide- runt. Porro hæc quoque radix, quemadmodum & Dracontii, facultatem habet senuandi atque aperiendi. Proinde quidam pro summo remedio ipsius Asparagum ictero laborantibus exhibent. Vltæ autem cinis calidior, & exsiccatior, subti- liorque, ac digerere potentior efficitur: ac pro- inde & Alopecias sanat.

ORNITHOGALVM VETERIBVS.

Quoniam verò minus constat qualem Orni- thogalum Veteres descriperint, rectè nos facturos existimamus, si seorsim de hoc ex Ve- terum placitis pertractemus. Autore igitur Dioscor. *ἡ ὀρνιθογάλη, καυτερίτις* est tener, candicã, tenuis, sesquipedalis, tribus aut quatuor in ca- cumine mollibus agnatis, à quibus prodeunt flo- res herbacei, qui cum hiantes se pandant lactei visuntur, inter quos dissectum, cachryos modo, capitulum emicat.

Vires ex Dioscor. posuimus sub Ornithogalo vulgari, vbi Camer. addit radicem dulcem & suauem.

Quod *ἡ ὀρνιθογάλη* Dioscoridis dixit, Plinius semipedalem habet, forte ex describentis errore, inquit Cornarius.

Ornithogalon itaque novit etiam Plinius, sed Ornithogalen vocat. Theophr. & Galenus, & æmuli eius Aëtius ac Paulus, Ornithogalon non nouerunt. Nec nos ex Dioscoridis descriptione satis colligere possumus, quæ sit hodie ea her- ba.

Cætèrum quod Dioscor. dixit, inter ipsos flo- res prodire capitellum velut cachry incisum: id

Ggg

Cachry

Canchry.

Ornithogalum
a. aquino. a.Cornario
& Ruellii
lappus.

ambiguum est, an de Cachry, quod velut in a-
uellana nuce iulus, in multis arboribus nascitur,
sit accipiendum, de quo agit Theoph. lib. 3. hist.
plant. de Cachry rorismarini specie, quod Græ-
ci insecto γ. scribunt ραρχυ: sicut illud sine γ
ρ. xcu. Et ad Cachry quidem nos magis ducit
errorum minor id est, incilum: ad Cachry verò,
quod addit vnā cum pane id affari, velut Me-
lanthium. Hac itaque ex αὐτοψία pendent iudi-
canda.

Ornithogalum nos existimamus verius esse
vulgare Matthiolo incognitum, licet in Italia
copiose proveniat, pro quo nescimus quam plā-
tam aut figmentum exhibuit sua icone: nostrum
duplex est. Cornar. authore Ornithogalon est
ea radix quam Germ. Erdnus & Foffel Forn ap-
pellant, quam alii Apion volunt: hic sanē non
paruus est lapsus Cornarii ac etiam Ruellii ean-
dem nostro iudicio plantam intelligentis.

ORNITHOGALVM SPICATVM albo flore Monspess.

Descriptio



Hic radix
bulbosa
vnica est, ma-
gna, cepam i-
mitata, Clusio
candidior
quā prece-
dentis, flore
virenti, & lon-
gior interdum
in amplā ma-
gnitudinem
extuberans: fo-
lia cubitum
longa, polli-
cem lata, & ex-
tremo mucro-
ne acuminato:
caulis quan-
tū hactenus
obseruare est
datum; lingu-

laris, robustus, cubito longior, ac etiam bicubi-
talis, teres, firmus, Clusio viridior præcedenti
flore virente, à medio ferè ad summum fasti-
gium, compluribus ornatur sensim sese aperien-
tibus floribus, tam denso agmine circa fastigium
stipatis, vt spicam emittantur, quorum singula-
res tam prope ad Ornithogali albi minoris
flores accedunt, vt pro iis fallant decerpti, intus
albi, foris herbacei, apicibus in medio luteis,
interius vero dum explicati sunt lactei omnino
candoris: semen in triangulis capitibus alteri si-
mile, sed paulò maius & oblongius, nigrum, tu-
gosum inæquale, vt in Staphide agria, sed paruum
admodum.

Matth. ner.

Matth. in Dioscoridem cum magn. fig. & Ital.
Hyacinthus Orientalis alter. Cuius solam ponit fi-
guram cum titulo, foliola ad radices pediculi, fa-
ciunt differentiam ab Hyacinthis.

Clus. Pann. p. 188. Ornithogalum maius Mōs-
pelianum. Et p. 191. Ornithogalum maius Mompeliano simile, è semine, Moly nomine à Rasso
ipsi Lutetia misso, natum. Camer. Epit. Matth.
Ornithogalum alterum maius. Et hist. Matth.
Germ. Ornithogalum Narbonense, quod etiam

dicatur Asphodelus bulbosus & apposuit figurā
ex Gesnerianis ad meam plantam. Aduers. in
titulo Asphodelus Hyacinthinus fortè Galeni:
Ornithogalum spicatum quorundam. Monspe-
liensis nonnullorum Pancretium. Aliorum As-
phodelus Galeni, & in margine, Asphodelus
fœmina Dodonæi. Ic. pl. p. 94. & Obs. pag. 47.
Ornithogalum spicatum Monsp. flore lacteo.
Ornithogalum intus forisque ex albo flauescit,
neque candere lacteo vt ornithogali renidet,
neque auersa parte herbidas. Radix verò minor,
oblongior, Ornithogali spicati. Item p. 48. Or-
nithogalum spicatum minus, siue altera species,
omni sui parte longè minor, Belgica vireta cul-
tiora alunt, cuiusmodi Liera D. fo. Riffii, & D. Ma-
ria de Brimon vxoris D. Conradi Schetz. Benè
fuisse Lob. si annotasset olim se idem existima-
se cum Asphodelo fœmina:

C. Bauh. Phyt. Ornithogalum. i. siue maius spi-
catum, & huius species longè minor Lobel. quæ
ab Ornithogalo magno spicato, tantū magni-
tudine distare videtur, at verò cum Ornithogalo
magno maius Diosc. conuenire. An Epimenidum,
Theophr. l. 7. hist. c. 11. de quo Plin. l. 19. c. 5. Epime-
nidii nomine. Idem apud Matth. Ornithogala-
lum maius spicatum, folia modò angustiora, mo-
dò latiora, in hist. Lugd. duabus figuris ostendit.
Sunt qui Diosc. Ornithogalum censeant.

Hist. Lugd. Ornithogal. Narbonense Dod. Or-
nithogalo Narbonensi simile & magnitudine
tantum distare videtur, quod à Mycono habui-
mus. Ornithogalum magnum Myconi.

Inter segetes Mompeliano agro & per Hispa-
nias Viennæ etiam Clusio natum semine à Ras-
sio Lutetia misso Moly appellatione: Maio flo-
ret. Abundat Italia & propè Monspelium pro-
uenit inter segetes. Florens mense Aprili. Mihi
delatum existimo ex Italia per fr. C. Bauh. nomi-
ne Asphodeli minoris albi Cortusi. Est nobis
Montbelgardi in horto. Ill. E. C. Wirt. vbi repo-
situm hieme floret quotannis.

Ornithogalum maximum floribus
prorsus nigris.

Tamet si scripserim (inquit Clus. Hist. poster.)
Ornithogalum illud quod Dodonæus Asphode-
lum Galeni, omnium maximum esse, nunc tamen
sententiam muto. Nam postea aliud genus mihi
conspicuum est illo longè maius: cuius historiam
in hac append. lectori proponendam censeui.
Multa id incunte vere ab radice producit folia,
longa, dilutius virentia, latioraque, quā Nar-
bonense & Byzantinum, inter quæ prodit sequisi-
cubitalis, & amplior interdum caulis, crassus, vi-
ridis, læuis, magnam, longamque florum spicam
getens, vt centenos, aut plures in eadem spica
numerare meminerim, sex foliis constantes, ni-
uei prorsus candoris, & nullo neruo viridi, vt
aliorum flores, insignitos, qui interdum explican-
tur, sexque stamina breuia & latiuscula, alba, fla-
uis apicibus prædita, capitulumque trigonum cin-
gentia, & umbilicum occupantia ostendunt, no-
ctu verò contrahuntur, aliorum instar: floribus
excussis, succedunt trigona capita: semen ro-
tundum, nigrum continentia. radix bulbosa, cras-
sa, candida, è lata sede multas fibras emittens.

Floret cum aliis maioribus Maio, interdum et-
riam Iunio, pro anni præcocioris aut magis se-
rotini ratione. Eum bulbum accipiebam ornitho-
gali Arabici Liliæ Alexandrini appellatione insi-
gnitum:


gnitum : quemadmodum etiam Byzantinum eadem appellatione non semel ex Italia ad missum.

Ornithogalum Byzantinum Clusio.



Ornithogalum maius Byzantinum (auctore Clusio) paulo humilius Ornithogalo spicato albo Monsp. dilutius etiam caule & foliis, quod cepit Byzantio deferri aliis bulbis permixto nullo addito nomine: noster pictor minus bene expressit eam iconem.

ORNITHOGALON CRETICVM ET Pannonicum albo flore.



Ornithogalum Creticum rariorum stirpium exoticarumque, haud postrema, liberalitate eximii Medici Cretensis Honorii Belli ad Fratris, indeque ad nostras prouenit manus. Bulbo est nucis Auellanae maiore, cuius lateribus noua proles ipsa genitore

minor adnata erat: sapore tantillum amaricante: fibris tenuibus, uti in Cepis donato. Ex quo cantis prodibat pedalis in cacumine flores gerens vulgaris Ornithogali maioris, sed paucos, in spicam morem digestos, sex foliis constantes, extrinsecus virentibus, internis albis: in quorum sinu veluti glomulus staminibus cinctus. Semen paruum nigrum rugosum, ac velut araneosis punctulis eleganter impressum, rotundum, nisi quod una parte modice exacutum sit, durum intus, candidum: sapore subdulci.

Simile si non idem est Pannonicum Clusii Ornithogalon flore albo, quod describit: addens, Illud peculiare habet haec planta, ut natali loco, ubi sponte nascitur magna ex parte, cum floribus onusta est, sine foliis conspiciatur, aut saltem iam ferè euanidis & flaccidis. At in hortis culta diutius plerumque folia retinere solet, & in ma-

Tom. II.

iorem amplitudinem excresecat, spicam aut vicinum aut plurius florum nonnunquam proferens. Anno 1603. sub Kal. Decembres accipiebam Burdigala paucos Ornithogali bulbos, quos in Pyrenaeis montibus erutos esse adscriptum erat: cuius autem generis sint, proximus annus [si viuimus] nos docebit: quantum verò ex bulbi forma conicere poteram, non videbantur dissimiles Ornithogali Pannonici flore albo iam descripti bulbis, quales etiam in aliis prouinciis nasci verisimile est.

Clus. Pann. Ornithogalum 2. siue Pannonicum minus flore albo. Polst. hist. lib. 2. cap. 23. Ornithogalum quartum. Tabern. icon & hist. Ornithogalum Pannonicum, siue 2. Dngersich Erdnuss aut feldzwibel. Casp. Bauhin. Phyt. Ornithogalum 4. siue album minus alterum. An Camer. Ornithogalum serotinum, folio magis caesio & minus pingui. Gerard. Angl. lib. 1. cap. 33. Ornithogalum Pann. Star Hungarie.

Largissime prouenire obseruauit Clus. apertò Locù illo & latè patente campo secundum siluulam pagi Lachn imminentem, & inficciotibus pratis secundum Danubium, in monte Badenibus thermis imminente, totaque illa montium serie, inde vsque ad Calenberg excurrente, & Hamburgense monte apertis & gramineis locis. Bulbum & semina missa à D. Bello ex Cydonia Cretensi terræ commisit in horto Montbelg. quem auspicijs Ill. D. Wirtemb. colimus.

LILIVM ALEXANDRINVM SIVE ORNITHOGALUM magnam Syriacum.



Svinmo *cat-* Descriptio
le florem
gerit magnum,
Narcissi me-
diocrocci pa-
rem, quinque
radiatis filis,
in obtusum
mucronem de-
finientibus, ca-
didis rotis, co-
stantem, cuius
medium occupa-
t caputulum
magnum. peri-
carpii rudimen-
tum, circumstantibus
acuminatis li-
gulis plusculis.
Inter Lilio-
Narcissos [ait
Lobel. Obs.] &

Ornithogala media est haec ventusta planta: radice quippe Ornithogali: folia oblonga Narcissi prodeunt, imum caulem glabrum singularem, pedalem & cubitalem ambientia, in summo alis diuisum, quibus lilacei, lactei candoris, calycis instar, senis foliolis radiati flores, lunci aquatici, Alii vrsini longè maiores, Tulipae minores, obtusi, è quorum fundo glomerulus pullus protuberat. Semen pericardio tereti Ornithogali clauditur. Stamina luteola glomeratum fundum pulchrum ambientia.

Id fusè describit Clusius haec addens: Ex Italia missus bulbus Lilii Alexandrini nomine: Constantinopoli verò semper *Zimbal arabi*, quod

Ggg 2

Hyacinthum Arabicum sonat. Sed quoniam ad Ornithogali genera potius referendus videtur, quam ad Hyacinthos, Ornithogali Arabici nomen indidit: licet Matthiolus Narcissus a nomine Viennenses marronz *weiss Jacinthe* hoc est, candidum Hyacinthum appellant.

Taximbo del padre nostro.

Narcissus Matth.

Nunc Italos hanc plant. *Jacintho del padre nostro* appellare intelligo [inquit Idem Clus. Exor. par. 2. Append. 2.] ob capitulum, siue orbiculum in medio flore conspicuum, ut opinor. Nonnulli autem (Lob. Obs. Tab. icon. & hist. cum Hist. Lugdun. Narcissus, cum quibus nulla n. affinitate n. habet, à Matthiolo adnumerari censent, & ab eo Narcissum quartum appellari: sed falluntur. In eorum numero me aliquando fuisse ingenue profiteor, sed istam opinionem nunc reuoco: nam alia est planta ab hac diuersa quam pro Narcisso quarto Matthiolus proponit: ea tamen etiam inter Ornithogali genera referenda.

Ornithogalum maius Dod.

Ornithogalum minus.

Dulipa. Hyacinth.

Locus & tempus

Lobel. Obs. & Ic. Pl. p. 105. Lilio narcissus polyanthos, Liliū Alexandrinum Neoteri corum. Ornithogalum maius Dodon. C. Bauh. Phyt. Ornithogalum 7. siue maximum. Camer. in hist. Germ. Matth. Narcissus 5. Matth. Dod. Ornithogalon maius non facile ferens solum nostrum frigidum. Item c. 32. l. 4. Ornithogalum Arabicum aut maius Dodonzi, ex quo Matth. Narcissum facit. Et Horti, Liliū Alexandrinum inter Liliom narcissos & Ornithogala medium, flos suauem odorem præbet.

An Cæsalp. Dulipan & Hyacinthus albus de quo dicit: Cattle est cubitali, crasso: coma in cacumine, veluti umbella: floribus candidis, latifoliis: vasculis nigris: Bulbum fert grandiorum, quam prædicta genera, cortice nigro: folia quoque maiora, sed humili modo prælonga, & firata, hanc putauerim Bulbum vomitorium esse.

Belgis primum communicata hæc planta fuit, misit ex Italia eius radices Ill. Ioh. de Brácion, à C. V. Alphonso Pantio, & amplissimo Ia. Ant. Cortuso, deinde etiam Constantinopoli cum aliis raris stirpibus accepta. Semel istic florentem vidit Clusius Maio, Viennæ autem persepè. Mira autem est huius bulbi natura: nam plerumque repperit est uix vlla folia promere, nisi singulis annis exemplum aliquantè tempore adseruetur, deinde Autumno terræ denuò concredat, tum enim demum germinare solet etiam antè brumam: nullus autem florere ipsi conspectus est, nisi recens Constantinopoli allatus. Nam ex illorum est numero, qui nisi istic eruti iam conceptum in vtero florem habeant, in frigidiores prouincias translati, nullum dent. Præterea cum frigoris valde impatiens sit, neque Viennæ hyemem in horto ferre potuit: sed in fictilibus reponendus, vbi bulbis circa matrem adnatis feliciter se propagare solet.

Tollanus Carolus Burgundicus Phatim. misit bulbulos Lillii Alexandrini, quos plantauit in Montbelg. horto Il. E. C. Dominus à *Belle fontaine* misit mihi Vesuntio anno 1594. bulbos ex Italia, qui non flore albo.

ORNITHOGALVM VVLGARE ET verius maius & minus.

Descriptio **R**adix bulbosa candida quæ multos bulbulos adhaerentes habet, veluti racematim cōpactos,



fibrosos, se plurimum multiplicantes, gustu amaricante, lenta spumosaque mucagine multos caros os repletentes: folia promittit angusta, tenuia, longae, etiam ad cubitum ipsi caulem multum superantia, catinata, per medium eorum lactea discurrente linea in eorum strata, mollia, & inter hæc

caulem dodrantalem, & sesquipedalem tenerum, teretem & nudum, qui circa fastigium pediculus emittit, quorum vnique subiectum foliolum oblongum, anembraneum, acutum, flores sustinentes: foliis senis compositos, oblongis, lacteo intus candore, foris non nisi per oras, medio herbido: intra quæ stamina latiuscula, sena, candida, apicibus luteis: in medio capitulum calnatum hexagonon stylum & summo profert albidum, ex quo vasculum continens, inquit Camerarius, *semina* compressa nigri coloris. Ornithogalum Diosc. & Plinii (quorum descriptiones antè posuimus) affirmaremus, si crudum mandu obferuaremus.

Ornithogalum Matth. quod aded inter segetes frequens oritur, si Maiomense in agris requiratur perpenlis prius notis illi à Diosc. attributis, facile ab omnibus inueniatur. Hist. Germ. Ednusse. Lat. cum fig. & Ital. Ornithogalum. Item Ornithogallum secundum. Si Matthiolo notum, cur non describit? cur contentus apponere figuram non exprimentem verum Ornithogalum. Mirum in post. com. retinere priorem falsam ac etiam secundam falsam addere nomine Ornithogali secundi, nullum declarans discrimen: vel hinc solum satis apparet Matthioli imaginaria in stirpibus peritia, celebri encomio, ac tamen à stirpiū ignatis decantata.

Lonicerus quoque assumpsit iconem Matthioli reiciendam, ut & qui illi patrocinatur.

Dodon Gall. vocat Ornithogalum, Belg. Velt *Zygenyn*. lib. autem de floribus c. 23. vocat, Bulbum Leucantheum. Ibidem ei dicitur *apricum* Diosc. legitimum, & à Plinio Ornithogale.

Lob. & Pena Adu. Obs. & Ic. Pl. p. 148. *apricum*, Ornithogalum candidum vulgare. Belg. wit *Veld* daynyn. Gal. *Churles*, & *oignon blanc champestre*, nisp. *Leche Gallina*.

Clus. Pann. Ornithogalon vulgare flore albo. Hist. post. Ornithogalum quintum, vulgare omnibus certè, quas pera grauerint, regionibus, obuium in agris.

Hist. Lugd. ex Matthiolo, duas Ornithogali plantas exhibet, quod duo esse eius generis existimet. Quorum vtrumque cum caule foliosum sit, & differat ab eo quod Dod. depingit, quodque legitimum Diosc. Ornithogalon esse censet. Ornithogalum. 1. & 2. Matth. Ornithogalum Dod. seu bulbus Leucantheum.

Tab.

Tabern. icon. & hist. Bulbus Solsequius *Wesf. selz. wibel. Compil.* Tabern. iconem Ornithogali [quæ non placet] cap. de Scilla sub modo dicto ticulo exhibet, quæ erat ponenda folio sequenti pro suo Ornithogalo primo maiore, ubi alterius plantæ, nempe Ornithogali flore pallido, icon malè posita: Ibidem etiam considerandum an benè dicat Ornithogali flori albo folia non nihil aspera.

Gerard. Ornithogalum luteum Star of Bethlehem.

C. Bauh. Phyt. Ornithogalum. 2. Ornithogalum 1. Matth. an diuersum à sequenti cogitandū. Item Ornithogalon. 3. siue album minus, Matthioli. 2. Lob. Ornithogalon. Item apud Matth. Ornithogalum 1. Ornithogalum 2. siue album minus.

Copiosè prouenit in pratibus circa Dresdam ad Albim fluuium, ubi vere reperit Camerarius. Clus. Frequens est ultra Drauum & Warasdinum in agris, & nusquam non Clusio conspectum ubi fuit. Abundat in Italia propè Patavium & iuxta Villenouam: florēt Martio. Hanc apud Gesnerum vidi florentem mense Maio. Circa Lugdunum copiosè prouenit. Inter Mulinam & Saseul Castellum & oppidum in Italia spontè. Basileæ vidi mense Februario pulchrè prorumpens in horto D. D. Felicis, vnde Montbelgardū transulū virens mense Decembri. In horto E. C. VV. ita se bulbis multiplicat, vt odiosum sit. In horto Nicolai Ferraricensis Aprilī mense florens obseruauī.

Coquitur à Diosc. cū pane, vt Melanthium. Radix bulbosa, cruda & cocta manditur. Camer. citans Diosc. addit: Est enim dulcis & suauis: ubi hoc inuenierit nescimus, in nostro Ornithogalo nullam dulcedinem aut suauitatem experimur, imò nobis amaricat.

Ornithogalo Vulgari simile latiore folio.

Ornithogalum hoc attulit mihi Hortulanus Ill. Cels. Virr. Ioh. Manaut iunior, quod mihi primò visum Montbelgardī, florens anno 1610. Aprilis principio, vulgatore nondum florīs, nec caulis rudimentum demonstrante. Huius caulis erat brevis, flores exteriùs virides, interiùs albi: folia latiora duplò, lineâ albicante destituta. Ornithogalum hoc vulgare aliud, teste Clusio, aiebat Viennæ in cultissimo suo horto, Generosa D. de Heusenstein, latioribus foliis, crassiore caule, amplioribus floribus, paulò maiore bulbo, ex Tyrolensi comitatu allatum: alioqui cum quinto (vulgari) conueniens. Quale etiam Neapoli ad Cluuium mittebat doct. Vir. Ferd. Imperator.

ORNITHOGALVM NEAPOLITANVM.

NOuum Ornithogali genus rectè mihi antè incognitum [inquit Clus. Exot. par. 2. App. 2.] Neapoli ad me mittebat an. 1600. Doct. Ill. Ferdin. Imperator, & illud quidem non elegas pro Arabico, quod ab ipso petieram. Proferbat anni infrequentis primò Vere terna aut quaterna folia carinata, longa, Hyacinthinis non valdè dissimilia, verum angustiora, viridia: inter quæ prodibat caulis satis firmus, dodrantem altus, laevis, viridis, sustinens superna parte quinos, vel etiam plures interdum flores, in anteriorem partem propendentes, tamen alternis in singulis caulibus lateribus nascentes: cuiusdam membranulæ sinu, internâ parte candidis, externâ autem ex cineraceo virentibus, orâque albas

Tom. II.

habentibus: floribus umbilicis occupabat alter strobilus sex etiam foliis minoribus præditus, quæ extremâ parte quodammodo coibant, & veluti tubulum formabant, in quo apparebant sex alba staminula flauescens, apicibus donata, & medi-



thogali Arabici radix, minus tamen ampla sedē, sed multis candidis fibris in habitu præculta.

ASPHODELVS MINOR FOLIO fistuloso.

IN Asphodelorum classē & hanc quoque connumerant speciem minorem, quæ ex fibrosis phalangii (cui tota planta satis similis) radicibus mediocriter crassis, non nodosis tamen, folia promit, multa, angusta, rotunda fere, tres aut quatuor uncias longa: inter quæ caulis surgit teres, in ramos aliquot fissus. Flores Asphodeli minores, sicuti & capitula.

Ante 40. annos descriptissimam plantam repertâ mense Maio in Prouincia per studiorum socium Leonhard. Rauuolf. Augustanum Medicū cum essemus Montspelti. Huius autem semen nō fallimur nobis missum est ex Italia per Fr. C. Bauhinum quod satum Montbelgardī produxit plantam eodem anno, radicibus etiam fibrosis, foliis tantæ magnitudinis vt cubito essent longiora, striata, fistulosa, in acumen deficientia: è foliorum medio caules plures surgebant teretes, ramosi: A medio caulium ad summum vsque flores expandebantur senis foliolis constantes, colore lacteo linea ferragi-



nea vnumquodque folium secundum longitudinem percurrente, staminibus in medio lacteis, apices ferrugineos sustentibus: vascula suboriuntur triquetra ferè: semen nigrum triangulum claudens: florebat Montbelgardi Septembri: reconditus interdum proferebat hyemem, & eodem anno maturefcebant semina.

Fistulosum Asphodelum videramus ante Tiguri, in horto D. Gesneri, florentem Maio, cum capitulis se demonstrantibus. Nobis etiam visa planta in oppido *L'isse* in horto pater. D. Friderici Cappler nobilis summi amici nostri: obseruauimus etiam Stutgardie in horto Ill. C. W. florentem Maio.

Clusium nostrum Asphodelum fistulosum sic tradere arbitramur: Asphodelus tertius, ut foliis, caule, & floribus satis similis est superioribus, ita radicibus omnino differt, quæ non glandulosæ, sed fibrosæ, crassæque & numerosæ, ex vno capite nascuntur: folia Asphodeli, minora, multo angustiora, lentiora, diluciorisque sunt coloris, & quorum in medio sex aut plures eadem radice assurgunt caules cubitales, ramosi, quos sine ordine nascentes stipant flores, superioribus similes, sed minores, medium folium purpurascens venâ per longitudinem secante: floribus succedunt triangula capitula, initio viridia, deinde exalbida, in quibus semen rugosum, altero minus.

Dod. hist. fl. & lat. in fol. Pseudo asphodelus quidam non abs re videtur, aut minor Asphodelus. Gesner. horti ex sententia Coldemburgi, Asphodelus annuus, & Asphodeli species altera radice breviori. Anne eadem in append. Asphodelus tertius minor, Asphodelus maritimus quorundam? Tota Gesneri descriptio optime conuenit nostro Asphodelo minori folio, fistuloso, nisi diceret foliis esse non cavis. Advers. Phalangium Cretæ Salonenfis. Lob. Obs. & Ic. Pl. p. 43. sicut & Hist. Lugd. Asphodelus minor Clusii & Dodonæi. Clus. Hisp. & Hist. Asphodelus minor & tertius radice fibrosa, Valentini *Gammillosid* est, paruum Asphodelum, Granatenses *Cebolla de culebra*, hoc est, Cepam Colubrinam appellant. Parauina schola Asphodelum fistulosum, quoddam concava folia habeat forsitan. Tab. icon. & hist. Phalangium Narbonense & *Edispinnen* fraut Gerard. Phalangium Cretæ, Candy *Spidermort*. C. Clusio Asphodelus minor. Pro hoc Phalangio non bene ponitur icon, quia Tabern. posita est pro Asphodelo luteo palustri, & ab ipso meto Gerardo iterum l. 3. c. 64. pro Asphodelo Lancastrie: non bene etiam interpretari videtur Cretam Salonensem Lobelii per vocabulum *Candy*. C. Bauh. Phyt. Phalangium sive minus foliis fistulosis.

Gerardi er-
ror.

Locus. &
tempus.

Toto Valentino regno, nullus ferè est alius Asphodelus: nascitur & Qadibus ad ipsum pontem de Suazo cognominatum, quo insula contineri coniungitur, & plerisque Granatensis regni locis: olim etiam campo illo lapidoso supra Arelatem, Massiliam proficiscens locus semitas colligere meminit Clusius, semine ex Hispaniis à se delato: amicis natus est in Belgica, sed cum frigoris sit impatiens, peribat hieme, eam ob causam annuum cesebant, donec ipso monitore quæ magnas illius plantas hieme virentes in Hispania viderat] Ill. Io. de Brancion vnam ex iis quæ postea semine nata, fistili inditam conseruaret, quæ deinde aliquot subsequentibus annis florens, maturum semen præbuit, quod etiam terre

credidit provenire. An porro alicuius in re mendica sit facultatis à nemine hæcenus intellexit.

ASPHODELVS MINIMVS ALBVS



Nouum Asphodeli genus, inquit Clusius in Hist. appèd. & à nemine descriptum, semine natum sibi esse scribebat Iacobus Plateau. Minor est tertio iam descripto, & ab eo plurimum differt: nam glandulosas radices habet instar Secundi generis, licet minores, & quarum capite

prodeunt quina aut sena folia, valde angusta, & longiuscula, inter quæ assurgit *cauliculus* rotundus, dodrantem aut pedem altus, singularis, nec vllis ramis præditus, in quo spicæ in modum nascuntur multi flores albi, sex foliis constantes, quorum singula internè & externè, verè quadam secundum longitudinem sunt notata, perinè ac Tertii præcedentis flores.

Iulii initio flores proferre incipere scribebat, quàm reliqua genera suos abiecerit, propterea quæ magis illis serotinum censendum: hieme folia amittere, & noua denuò acquirere circa Aprilis initium.

ASPHODELVS LVTEVS.



Quamquam Asphodeli lutei meminisse non comperiuntur Veteres, tamè in Asphodelorum censum cooprandum hunc esse multa docent, radices ab vno capite multæ nata, sed longè tenuiores quàm Asphodeli albi maioris, colore luteo præditæ, ex portecis per transversam

fibris se propagantes: *caulis* Asphodeli albi modo sesquicubitalis, singularis, à medio ad summum floribus ornatus Asphodeli, sed luteis: quos excipiunt pericarpia rotunda semen continentia: *fistula* porro

poro & longitudine folia Asphodeli iam dicti vinctur, ita isdem latitudine cedit, colore glauco prædita.

De hoc fortè Lobel. adu. Asphodelus luteus minor, nusquam litoreis isdem visitur, tamen hortis Batauinis & Gallie familiaris luteus hic Antiquis indictus, generèque diuersus, est enim radicibus prolixioribus, nec ita bulbosis, sed Corudæ modo, minas tuberosis, leniusque turbinatis, è quibus Cyperi folia complura exeunt, exilia, saturo virore. Caulis rectus floribus crebris luteis, alterius similibus, fastigio tenui stipatus: semen triangulum pericardii continetur primi modo.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. pag. 91. Asphodelus luteus minor. Adu. pag. 45. Iphyon Theophrast. Anguill. & Eriambat Arabum quorundam. Considerandum an figura possit conuenire nostro Asphodelo minor luteo.

Math. Ital. cum magn. fig. dicit Vnam Asphodeli speciem proferre illorem luteam: sed non distinguit radicibus & foliis ab altero.

Camer. apud Matth. Ger. & Epit. Gelb. Asphodel. murg. Asphodelus luteus siue formina Plinii.

Quid autem sit Iphyon Theophrast. certò asfirmare non potest Anguill. Asphodelus flore luteo pro eo potest demonstrari. Quod etiam Asphodelus luteus Recentioribus à D. onyio formina dictus sit testatur Dodon. hist. fl. & in fol. Gesner. hort. Asphodelus luteus. Præterea Asphodelus alius radice lutea. Hort. Lusit. Asphodelus luteis floribus.

Tabern. icon. Asphodelus luteus: & hist. luteus s. Item ic. Asphodelus luteus minor, & Hist. Asphod. 4. Compiler Tabern. non desitibit nec demonstrat qua in re ab albo vel à quarto minore luteo differat: præterea appingit malè radices, quales albo. Icon autem Tabern. Asphodeli lutei minoris eadem est cum iconè à Lobelio exhibitæ.

Gerard. sequitur Tabern. cuius iconem habet sub titulo Asphodeli lutei Gelb. Asphod. verum cap. 64. Iconem Tabern. minoris habet sub hoc titulo Asphodelus luteus minor Theophrast. spe. cre. & post Xiphium Lat. Asphodelus luteus siue Dionysius, Hastula regia. An Gerardus nò insipiat, quòd diuerso capite iconem Asphodeli Tabern. minoris ponat, iudicent periti: cur etiam Xyphii nomen ei tribuit?

Casp. Bauh. Phyt. & apud Matthioli. Asphodelus s. siue luteus & flore & radice. Hastula regia Trago. Nos Hastulam regiam apud Tragum non inuenimus. Hist. Lugd. duas habet figuras, vnam quidem Asphodeli lutei Dodon. Alteram verò Asphodeli lutei minoris Lobelii.

Asphodelum luteam Tiguri primò vidi apud Gesnerum, deinde Basilea in duobus hortis, Florentem Maio: fructu tangentem mense Iunio. Patavii in horto D. Corradi & horto Patavino. Ferrarie in horto Cænobii S. Dominici à l'Angelis. Bononiæ in horto Nobilis di Gonzadini. Aprilis ferè florens. Montbelgardi transfusi in hortum E. C. ex meo hortulo: Argentinæ etiam attuli ex horto Di. Friderici Meyer. Sturgardie vidimus in horto Ill. E. C. florens Aprilis anno 1610. Lobel. Hortis Batauinis & Gallie familiaris.

ASPHODELVS MINOR RADICE LVTEA.

Asphodeli species peregrina radice lutea Gesner. Item in Append. Asphodelus alius me-

die magnitudinis, radice lutea.

Anno 1594. Sturgardia accepi mus semen mis-
sum per Hortulanum Ducis Florentie cum hac
inscriptione. Asphodelus luteus minor Cretensis:
semen valde angulosum & acutum, multò maius

quàm ea se-
mina, de qui-
bus mentio
facta sub As-
phodelo fistu-
loso: viden-
dum erit an
conueniat cù
planta Gesne-
ri: prouenit
mihi, sed vni-
cum tantum
produxit fo-
liolum mense
Iunio, cum
fuisset satum
in horto E. C.
Montbelgard
mense Aprilis.



ASPHODELVS LVTEVS ACORIFOLIVS palustris Anglicus Lobel.



Folia pro-
mit pul- Descriptio
chrè virentia,
aliquantulum
striata, Iridis
aut Gladioli
similia, sed an-
gusta, & do-
drante bre-
uiora: caulem
rectum, pedale,
Autherico satis simi-
lem: flores à
senis foliolis,
exiguus stami-
nibus in me-
dio, colore lu-
teo pallentes,
Asphodeli lu-
tei æmuli, sed
minores: se-

men perexiguum in oblongis acuminatis vasculis
radix longa, geniculata, non abique fibris serpit
graminis modo. Hec ex Dodonæo.

Dodon. itaque lat. in fol. Asphodelum hunc
palustrem quemdam vocat, Asphodelo sc. luteo
caule, florèque similem. Huic refragatur auto-
psia Clus. Hist. post. scribentis: Pseudo-Aspho-
delum primum potius dixeris, quàm Asphodelum
flauo flore palustrem: nihil enim Asphodelo si-
mile habet præter flores, licet Dodon. caulem e-
tiam similem faciat, qui tamen non est nudus, sed
multis foliolis siue vaginulis illum amplectenti-
bus donatus.

Hic Pseudo-Asphodelus maior appellari posset,
ad differentiam subsequentis.

Huius iconem exhibet Gerard. angl. lib. 3. c.
64. nomine Lancæsthir Asphod. II / Lancæ-
stria Asphodeli: Quæ postea ab eodem Hist. suæ

lib. 1. c. 33. male reponitur ex Tabern. pro Phalangio Cretæ.

Scorid. Lobel. Adn. Asphodelus acorifolius palustris, luteus, Angliæ, Flandriæque, vel potius Asphodelus palustris, & Pseudo asphodelus luteus: *Barb. stard yellow Asphodul.* Obs. & Pl. icon. p. 92. Asphodelus minimus luteus, Acorifolius palustris, Asphodelus luteus palustris Dodon. in agro Lancastræ Angliæ. Scribit autem Lobel. Adn. par. 2. Rhizotomos, quosdam Tabern. Asphodelum luteum palustrem, Bataurum, & Brugensium, confundere cum Lancastrænsi Asphodelo luteo de quo pōt: verum si liceat verum dicere ipsemet id facit, in Adn. Obs. & Ic. Pl. vbi iconem sub dictis titulis ponit à nobis hic positam ac eandem cum Dodonæi icone.

Lobel. var.

Tab. icon & hist. Asphodelus luteus palustris. 7. Geel wasser Asfodil wurz.


C. B. mor. C. Bauh. Phyt. Asphodelus 6. siue palustris, Gesnerio tertius. In quo ad sinistram defleat C. B. A. palustri siquidem longè diuersus Gesneri, qui nobis est Asphodelus minor folio fistuloso. Dodon. nasci tradit in humidis quibusdam ac palustribus Flandriæ ericetis: æstiuis mensibus florens. Clusius eruebat aliquando in palustribus illis ericetis Maldeghemo vicinis, secundo à Brugarum vrbe Flandriæ celeberrima miliari, mense Maio.

Vfus.

Floribus liguio mactatis puellæ crinem flauum inficiunt Lob.

PSEVDDO ASPHODELVS QVIBVS DAM.

Descriptio



Caulis do-
dratalis,
aut etiam cu-
bitalis, iun-
ceus, vno aut
altero folio
gramineo do-
natus, spicam
gerens *florum*
paruorum, se-
nis foliolis
constantium,
ex luteo viri-
dium, quos se-
quuntur *capitula*
trigona,
angulosa, mi-
tillimo ruffo
semine *farcta*:
folia circa i-
mum cau-
lem ex fibrosa

radice numerosa, graminea, rigidula, glabra, duarum vnciarum, aut maiori longitudine, acuminata. Clusio est Pseudo Asphodeli genus alterum, quod sic describit. Numerosa sunt illi folia, sese mutuo amplectentia, vt in superiore, & Iride, angusta, breuia, viridia, dura, amariusculi, & calidi saporis: è quorum medio *cauliculus* gracilis egreditur, pedalis interdum, aut maior, aliquot nonnunquam foliolis inhaerentibus, spicam Hosculeorum ferens, sex foliolis constantium, alterius instar, sed minorum, pallescentis ex herbaeo coloris, & odoris expertum: quibus succedunt trigona capitella, interdum tetragona, & pentagona, minutissimum ruffum semen continentia: radix vix corpus habet, sed tenuibus aliquot fibris duntaxat constat. Pseudo-asphodeli

minoris siue pumilionis folio Iridis nomen indidi ad prioris differentiam.

Lobel. Adn. par. 2. Asphodelus minimus Nortuegicus luteus, palustris, Scotticus & Lancastrænsis. Anglo Britannæ mulieres apud quas frequens nascitur, à tingendis capillis, (*wayden haire*. i. Virginum Veneris capillum vocitarunt: *Ca-* pillus enim Veneris Anglis, *wayden haire* dicitur. Non videtur diuersum à secundo Pseudo-Asphodelo Clusii, sed variare paruitate & magnitudine ratione natalis folii. Aliquot mensibus clapsis Nortuegico luteo Asphodelo parem & similem ex Scoria huc Londinium ad me misit Iac. Gargillus Botanicus insignis. Acque Rhizotomi quidam, florum infitores, & vernacula lingua transcriptores, mira Metamorphosi literarum & linguarum inficiâ, alienarum lucubrationum interceptores, & perfrictâ frontis depulatores, falluntur, ac Tabern. cum suis affectis, & Typographo suo, qui caute nostris scriptis & iconibus tanquam suis abusi sunt, dum Lancastrænses Britannicum palustrem Asphodelum luteum, cum Batauo aut Flandrico Asphodelo palustri Dodonæi, vt alia pleraque adumbrant & confundunt. Si liceat nobis liberè dicere quod sentimus, confusio si quid apud Tabern. in hac planta est, auctor videtur esse ipsemet Lobelius, qui olim non distinxit, vt paulò antè dictum.

C. Bauh. Phyt. Holostrium glabrum viride.

In *Snealpen* (inquit Clus.) *Neuberg*, atque aliis pratis montanis, & gramineis collibus, Iulio florens & Iulio semen proferens Pseudo-Asphodelum Clusii mihi misit insignis Pharmac. Tossanus Carolus anno 1590. Mense Iulio, cum suis capitulis trigonis quem plantaui Montbelgardi in orto Ill. E. Principis: Eandem plantam habeo inter herbas siccas è Gallia allatas puto ex montibus Sabaudia. In collibus quibusdam circa Auenionem & Nemausum Narbonensis Gallia, iisque vmbrosis & velut pratensibus obseruaui idem.

PHALANGIVM CAP. IV.

Veterum *φάλαγγιον*, quæ herba dici mereatur, cum hodie assertu arduum valdè sit, nemo (vti quidem speramus) inficias ibit, si de hoc, quæ ipsi quondam scriptis mandarunt, sine vllis tamen verborum ambagibus, præmittamus.

φάλαγγιον igitur [inquit Diosc. lib. 3. c. 12.] alii *φάλαγγιτις* [Phalangitis, alii & hanc (*λευκάνθη* var., *Leucacantham*) dicunt. Ramuli sunt ei duo, aut plures, inter se distantes (*διεσπῆται*) in diuersa tendentes Plin. [*διχόρτοι*.] Flores albisimiles Lilio, multas incisuras habentes: semen crassum (Ruell. latum. *March. græca Exemplaria*) non *πλατὺ*, sed *πυρρὸν* nigrum, velut lentis dimidium, multò tamen gracilius. Radicula parua, tenuis, & dum è terra extrahitur pallida, vel sub-lutea (*χλωρὴ*) vt vertit Dalech. & non viridem aut herbacei coloris, vt Plin. & eum sequuntur Ruellius. Postea autem, cum herba scindatur & contrahitur, albescens, quam notam à Diosc. traditam Ruellius omisit. Nascitur in locis terræ editioris. Huius folia, & semen, & flos si cum vino bibantur, ictis Scorpionæ, & Phalangio auxiliantur. Dissoluunt etiam tormina. Finit Diosc.

Plinius lib. 27. c. 12. de Phalangio planè eadem

habet: Phalangitis à quibusdam Phalangion vocatur, ab alijs Leucanthemon, vel, vt in quibusdam exemplaribus inuenio, Leucacantha. Ramuli sunt ei nunquam pauciores duobus, in diuersa tendentes: flos candidus, Lilio rubro similis: semine nigro, lato, ad lenticular dimidia figuram, multò tenuiore: radice tenui, herbacei coloris. Huius folio, vel flore, vel semine auxiliantur contra Scorpionum Phalangiorumque & Serpenti-um ictus. Item contra tormina.

Galenus Phalangitin ita nominatam esse dicit, quòd commortis à Phalangio opituletur. Effe autem tenuium partium & siccantis facultatis. Vnde etiam tormina sentientibus auxiliari videatur.

Nomine autem Phalangii & Phalangitis plures sese offerunt species. Quippe *Phalangium primum* siue *ramosum*. *Phalangium non ramosum*. *Phalangium flore Lili*. *Phalangium de Asphodelo minore fistulosum*. *Phalangium Tragi*, Lob. & Penx. Ad. p. 13.

PHALANGIVM QVIBVSDAM PARVO flore, ramosum.



E radice fibris perenni crassiusculis, candidis, subaulicibus, glutinosis, castis, surgit singularis, tenuis, lauis, reses, sesquicubitalis, cuius scapus in ramulos aliquot faciens, flores sustinet frequentes stellatos, è senis foliis compositos, emaculato candore Lili còspicuos,

quibus, pericarpia globosa succedunt, Lini capitulis aequalia, per maturitatem in tres partes dehiscencia, semine vt vult Dodon. nigro, veluti Melanthii, non perinde tamen anguloso, referta: folia graminea, porraceis tenuiora, angustiora, carinata. pede aliquando longiora, ac etiam cubitalia, statim à radice exorta in terram repanda parum attolluntur. Non nostra est ex iis, quas sculptas emimus.

Aduers. Lobel. & Penx. Phalangium, an Moly Plinii? Non rectè Dodon. Moly vocat. Nomine enim Phalangii donatur multò sanè aptius quàm Moly, seu Dioscor. seu Plinii, vt nonnulli voluerunt. Lobel. Obs. & Ic. Pl. pag. 47. Phalangium ramosum. Dodon. lat. in fol. Phalangium ramosum, qui quondam in histor. Gall. pingebat pro Moly Plinii, addens à Belgis in hortis excoli ac Iulio florere.

Phalangium [vt Cæsalp. placet] Asphodelus parvus dici potest: nam in totum Asphodelo simile: multò angustioribus folijs breuioribusque, cauliculis fermè cubitalibus, modò simplicibus, modò ramosis: floribus latioribus, candidioribus & magis patulis: nascitur in asperis. Cæsalpini videtur duo Phalangia simul tradere,


quorum vtrum fortè est quòd vocamus pulchrius non ramosum. Quomodo etiam in totum Asphodelo simile, si folia angustiora, breuioraque? Phalangium ramosum.

Tabern. icon. Phalangium ramosum *Tabern.* Dod. not. spinnetraut quibusdam Moly Plinianum, sed ineptè.

Lugduni in collibus accliuibus ad Rhodanum, Eridanoque flumini collibus vicinis: varijs Londini & Belgii hortis colitur. Fortè quòd colitur diuersum est à præcedenti Lobelii & idem cum sequenti. In accliuibus collibus nonnullis apud Gallos & alibi gignitur haud procul à fluminibus ac ripis aquarum decurrentium. Iunio ac subinde Iulio vigent flores, Augusto semina perficiuntur. Prouenit Phalangium ramosum Tab. in collibus & montibus Astatiæ, & in montibus iuxta Rhenum, quidam in hortis colunt. Basilea in monte Mouters, vt annotauit frater Calp. Bauhinus, Burmii Rhætorum, Tiguri Iunio & Iulio florens: in collibus circa Geneuam florens Maio, & Iunio & Iulio: Montbelgardi in planitie ad Dubim inter Arboisians & Audincourt, & in monte la Chaux vbi vites, cum flore Iunio & Iulio, & cum semine maturo Augusto: transfusi in Hortum E. C. Argentina videtur florens mense Iulio in orto Di. Frederici Medici, qui asserbat se habere duas species huius Phalangii ramosi.

Camer. Laudatur aduersus multos morbos & affectus, ac contra omne venenum non solùm Scorpionum & araneorum venenatarum, vt Dioscor. & Gal. de suo Phalangio scribunt, quòd asserere non potest, quia non expertus Cameracius.

PHALANGIVM PVLCHRIVS non ramosum.



Descriptio

Phalangium quòd pulchrius dicimus, respectu præcedentis, non sequentis, quòd flore Lili dicitur, solius est præcedenti penè similibus, latioribus paulò: caule eodem, sed non ramoso: loricibus paulò maioribus albis, multis, specie repræsentantibus, & multò pluribus quàm demon-

strat icon Lobelii in obs. & icon. Plantini: succedunt capsula sublonga in quibus semina rotunda.

Phalangium hoc [teste Lob. Obs.] voluptatis ergo in hortis Belgicis Italicis & Anglicis colitur. Priori Phalangio ei omnia similia præterquam summus pedalis cauliculus, quem sine ramulis in pediculis lacteis stellati flores & semina in pericarpis antedicto similia sed maiora

ambiant Phalangium non ramosum Aduers. p. 18. Ital. Phalangio.

Item Icon. p. 48. Phalangium non ramosum, Liliago Cordi. Non sine nota Lobel. in hoc à nobis recedit: nos enim Liliagine Cordi ab hoc Phalangio separamus.

Dod. in fol. Phalangium non ramosum. Thal. in Hart. fortè Liliago altera minor. Camer. apud Matt. G. Phalangium maiori flore de quo ante. In horto, Phalangium minus. Tabern. icon. & hist. Phalangium non ramosum Erdspinnen fraut. An hist. Lugd. p. 1495. planta quam Myconus ex Hispaniis misit, quam Lilium Polyrhizon nominavit: Lilium quidem, quod florum figura, colore, dulci & glutinoso sapore Lilium albu referat: polyrhizon à radicum copia: rectè, an secus, id peritis Herbariis æstimandum relinquitur.

C. Bauh. Phyt. Phalangium 2. maius alterum: Lilium polyrhizon Myconi. Considerandum an Myconi Lilium prædictum, quod etiam pingit Hist. Lugd. sit Phalangium pulchrius non ramosum. C. Bauhinus separat à suo Phalangio quarto sue non ramoso, nos autem dubitamus an diuersum sit id ramosum, quod ei etiam dicitur Liliago Cordi, quæ nobis videtur Phalangium Liliæ flore: de quibus paulò post. Gerard. Phalangium non ramosum, Umbrauched Spider moort. C. Bau. Phalangium 4. non ramosum. Notum iudicium hac de re, lectores videant inter ea, quæ mox sequenti titulo dicemus.

Copiosum vidi simile, quod flore minore est quam sequeris. Sturgardie in horto Ducis florens Maio: transiit Montbelg. in hortum E. C. hist. Lugd. pag. 1497. Lilium polyrhizon Myconi nascitur in Hispaniæ montibus, sed terrenis humidisque locis, quandoque iuxta fluuenta.

adhuc ascriptum est; quam adhuc habebamus anno 1606. Genuæ cum essim obseruauimus in Allobrogum monte vinofo Thuri florens Iulio: Fuit mihi etiam Genuam delatum, & cultum in horto meo.

Liliago Cordi statim à radice folia profert Hyacintho similia, angustiora tamen: è quorum medio caulis assurgit cubitalis, aut aliquando maior, tenuis, teresque superius, vno atque altero intervallo singula habens folia, prædictis multò minora: in summo caule & adnatis flores producit sex, oblongis vncialibusque foliolis constantes, è mediis floribus, luteis apicibus, itamina prominent, in summa Lilio, vel potius Asphodelo vero similes flores sunt, multò tamen minores, nec ita resupinatis partibus repandi. Radicibus nititur multis, culmi crassitudine, lentis, pinguibus, glutinosis, perennibus, ab vno capite, vt etiam in Asphodelo in diuersas partes distrahitis, longitudine dodrantis. Saporem habet glutinosum & nauseosum aliquantulum. Nascitur editis apricisque locis iuxta rara & parua arbuta.

Gesner. vt ante dictum pro Liliagine Cordi ramosum exhibet Phalangium, nobis autem videtur Liliago potius conuenire Phalangio flore Liliæ de quo hic agimus. Idem horti [vt ante monuimus] hoc vocat Phalangium floribus maioribus proveniens in Sabaudia & Rhætia: de collect. stirpium p. 91. Phalangitis maior montana. Iconem ni fallimur proponit Marth. pro Phalangio, nulla addita descriptione, solum ait in montibus provenire: ea icon non est arrisiosa, sed malè exprimens plantam quam intelligimus.

Camer. in Epit. Matth. omiſſa Matth. iconem pro Phalangio ponit iconem Phalangii ramosioris de quo ante.

Tabern. hist. Phalangium 4. Phalangium Marth. qui non descripsit, licet diligenter perquisuerimus, neminem audiuimus vidisse, dubitamus an vquam fuerit in rerum natura, existimamus nunquam visum Matthiolo.

Lobel. & Pena Adu. Phalangium Matthiolo, pictum quidem non autem descriptum ipsis, nec multis doctioribus visum, fortè nec Marth.

Icon Dalechampi videtur non malè exprimere Phalangium Liliæ flore: an autem id intelligat considerandum. Præterea perquirendum, vbi Pena & Lobelius representarint. Habet hist. Lugd. Iconem Matthioli.

Liliago Cordi (quod Thal. Hart. scribit) aliquibus pro Phalangio habita cum potius quantum ad extremam faciem, aliquam sylu. Asphodeli speciem referat: licet radice bulbosa non constet. Eius radices hodiè plurimis locis copiosè erunt, ac hinc inde pro veri Ruscii radicibus venduntur, vnde multa Pharmacopolia non sine insigni errore easdem pro Rusco reuendunt, cum tamen vtriusque radicem sapor vniuersi non sit. hoc Medicos quosdam animaduertere oportebat: nec adeò temerè imperitis Herbariis & Pharmacopoeis plensque fidere.

Nascitur verò planta hæc copiosè circa Gerodum, item inter Wernigerodam & Elbingerodam. Eius duæ species sunt, Altera maior, folio longiore pauloque latiore, capitulo magis triquetro, in quo semina continentur etiam paulò maiora: Altera minor cui omnes partes sunt minores, stricioraque folia. Nos existimamus

C. Bauh.

Locus & tempus

PHALANGIUM FLORE LILII.

Descriptio



Radix: è multis fibris albis longis Phalangii & Ellebori radicibus similibus Liliorū modo gustu glutinosa: folia Phalangii: caulis cubitalis ac etiam minor, rotundus, læuis, non ramosus, in cuius summitate prodire cernuntur ex breuibus pediculis flores magni duo, tresue vel

quatuor, paruis Liliis similes, eodem etiam odore grati, albi, vncias duas ferè longi, seminum capita sublonga.

Hanc reperi florentem Iunio an. 1561. in peregrinatione mea cū Gesn. in pratib. mōtis Septimi, Burmii propè Kafest: tunc denominauī Liliū vel Phalangii speciem, vt ad meam plantam siccam,

zatis priorem Liliaginem Thalii esse nostrum Phalangium flore Lili: alteram minorem referimus ad Phalangium non ramosum: iudicet alii, qui venient in Harcinia Saxonica.

Casp. Bauhin. Phyt. Phalangium r. siue magno flore, Matthioli & Dalechampii cuius figura melior. Phalangium 4. siue non ramosum, Cordo Liliago. Lobel. etiam Phalangium non ramosum. Duæ huius species altera maior, folio longiore, paulo latiore, capitulo triquetro, semine paulo maiore: altera minor, cui omnia minora & folia strictiora: Huius radices sæpe pro Rusci veri radicibus, magno errore diuidentur. Idem apud Matthioli. Phalangium primum, & Phalangium non ramosum: aliud magno, aliud paruo flore.

co iconem habet Cartaini, qui postea traditur.

Cord. Barbarus, Ruellius, Marcellus, & verus interpretis & Plinius culpa librariorum cap. de Croco, legendo *Dulcis* pro *Sulcis*, mortarium interpretantur male, cum Thuium arborem intelligat. Cordo in historia, qui nomine Croci describit, Gesnerus figuram addit ex Tragi lib. 2. cap. 77.

Casp. Bauhin. Phyt. Crocus primus siue sariuus.

Tragus qui depingit & describit, vocari ait Hebræis *Kark*, teste Elia Leuita: Arabibus verò teste Serapione *Sahasaran*. *Κρόκος* Dioscor. inter triecitanea à quibuldam *κρόκος*, *κρόκος* & *κρόκος* *κρόκος*. *Crocus* & *Croctum* Lat. Germ. *Safran*. Belg. *Saffraen*, Gall. *safran*. It. *Zaffarano*, Hisp. *azafran*, *safran*, *Azafran*. Angl. *Safran*.

Synonyma
lugar.

CROCUS.

CAP. 10 V.

Crocum
vbiuis or-
be terrarum
notissimum
[sarium in-
telligit] at mul-
ta sanè mundi
parte, quod
natalem con-
cernit verè ex-
alè, accedunt.

Constat hic
bulbo dulci, A-
uellanæ ma-
gnitudine,
multis fibris
capillato: fi-
lia quinque
aut octo, pal-
mum aut etià
dodrangentem
longa, admo-
dum angusta,
striata: *caulis*
inter hæc ori-
tur brevis, *flo-
rem* sustinens
vnicum, Chol-
chici flori si-
milem, ex fo-
liis cæruleis
constantem, in
quorum me-
dio sunt sta-
mina aliquot
flammei rubo-
ris, valdè o-
dorata.

Icones duas
quas hic poni-
mus iam scul-
ptas emimus.
Bulbosi gene-
ris itaq; Cro-
cus est tam sa-
-

Crocus nunc in plerisque Germaniæ locis
plantari cepit, adeò feliciter, ut teste Michael.
Neand. vniuersis Exotico non cedat. Nos, qui-
dem Crocum colimus in horro E.C. copiosè al-
latum per Cinem *laques à salin* Milhusia, ei in-
festi sunt mures. Montpelii florentem reperi in
cacamine montis *Esperon* plantatum mense Octo-
bri: circa Avinionem propè Castellum Papæ vi-
di agros eo consitos. Basileæ habent in hortis,
Lugduni etiam & Patau. Ferrariæ in mona-
sterio S. Dominici à *l'angelis*. Genevæ copiosè
passim in hortis colitur ac hyeme folia reseruat,
radix eius bulbosa dulcis est. Hodie non solum
regiones ad meridiem, Africa, Cyrene, Silicia,
Gallia, sed etiam ad Septentrionem sitæ Anglia,
& Hibernia laudatissimum ferunt, quo Belgium,
Germania, aliq; vicini cibos condiunt, ac medi-
camentis miscunt. Matthioli Crocum ex Aquila
Vestinorum vrbe primum sibi locum vendi-
care in Italia scribit, eo tamen præstantiorem es-
se qui ex Vienna Austriæ metropoli deferretur.
Agellos integros Closterneburgii, ac Croncu-
burgii, nonnullisque aliis in locis circa Viennam
Austriæ Croco lasciuientes Ioannes Schvab
magna cum admiratione frequenter intuits est.
Crocum, inquit Theophr., ram montanum (quod
inodorum est) quàm satium, Autumno florere
incipiunt: statim enim primis imbribus florent.



Locus &
tempus.

Et rursum: serò floret, seròque germinat, aut præ-
maturè, vtro scilicet modo tempus acceperis:
Floret quippe Vergiliarum occasu, paucisque die-
bus, confectum Vere cum folia quoque expellit,
quinimò priùs: gaudet calcari, & melius ita eua-
dit, radice attrita pede deorsum versus, idè iuxta
semitas, fontèque pulcherrimum exit: satus ra-
dice fieri assolet. Hoc siccatum ad certum vsque
temporis spacium reconditum, ac in ueritatem a-
crem spirat odorem. Vnà enim & quantum hu-
moris aquosi est, exhalatur, & alimenti cessat ac-
cessio.

Tempus

Cultura.

Hæc passim Theophrast. quæ Plin. lib. 21. cap. 6.
serè expressit, dicens: Crocum siluestre opti-
mum: serere in Italia minime expedit ad scu-
pula vsque singula areis decoquentibus. Seritur
radicis bulbo. Sarium latius, maiusque & niti-
dus, sed multò leuius degenerans. Sed nec vbi-
que fecundum, etiam Cyrenis, vbi semper flo-
res laudatissimi. Prima nobilitas Cilicio, & ibi
in Coryco monte: dein Lycio, monte Olympo
mox Centuripino Sicilia. Aliqui verò Phlegæo
(Aegæo, Turner.) secundum locum dedere.
Adulteratur nihil æquè. Probatio synceri, si im-
posita manu crepat, (crepita. CHERLER.)
veluti fragile. Humidum enim, quod euenit



zarius, quàm sylvestris. De hoc Theophras-
tus atque ex eo Plinius hæc prodidit. Cro-
cum naturà herbaceum modo prædictorum erū-
pit, sed folio angusto serè, namque in capilla-
menti modum extenuatur. Radix multa, carno-
sa, & in totum viuax. Theod. Dorst. pro Cro-

adulteratione, cedit [silet. Turn.] Altera probatio: si manu prolata ad ora, leuiter faciem oculisque mordeat. Et per se genus satui blandissimum vulgò, cum sit [quod sit. Dal.] medio candidum, dialleucon vocant. Contra Cyrenaeo vitium, quod omni croco nigrius est, & celerrime marcescit. Optimū ubique quod pinguisimum, & breuibus capillis, brevis capilli. CH. ipellimum verò, quod situm redolet. Mutianus autor est, in Lycia anno septimo aut octauo transferri in locum subactum, atque ita degenerans renouari. Vfus eius in coronis nusquam. Herba enim est folio angusto penam capillamenti modum. Sed vino mirè congruit, præcipue dulci, tritum & theatra replenda. Floret Vergiliarum occasu paucis diebus, folioque florem expellit: Viret bruma & colligitur. Siccatur vmbra, melius etiā hyberna. Carnosa & illi radix, viuaciorque quam cæteris. Gaudet calcari, & atteri, percundoque melius prouenit [atteri pede quò melius M. atteri pedè percundoque melius. Ver.] Idè iuxta semitas ac fontes lætissimum.

Mirum igitur alicui videri posset [inquit Petr. Victorius] quod tradunt Veteres de cultu croci: cum ætas nostrò longè alia ratione seruat. Quod Veteres de croci natura cultū, tradunt, magnopere discrepat à consuetudine nostri temporis: curaque, quam nunc in eo tuendo rustici homines adhibent: illi namque, si fidem habemus iis, qui de agri consuetudine scripserunt, loca ubi lererent eligebant pressa vestigiis hominum: asbittabanturque quantò magis solum tereretur, tantò melius prouenire: nunc verò nihil tam inimicū putat, quàm pedibus terram eam calcari: summoque studio inde, & belluas & homines arcent. Plinius quoque id rostrat est, locum verrens Theophrasti è 6. lib. de iis, quæ oriuntur è terra: inquit enim, Gaudet calcari & atteri pede: percundoque melius prouenit, idè iuxta semitas lætissimum. Græci autem scriptoris verba hæc sunt. Quibus diligenter animaduertis ratio etiam, quæ Plinius in vertendis sententiis Græcorum utebatur, intelligitur. *quasi dicitur participium vni, necesse est ut participium sit, ut patet in hoc loco, quod enim Theoph. inquit lætior fieri, si conculcetur radix terra obruta, ipse reddidit, rem augens, vel potius ludere in hoc volens: percundoque melius prouenit: hoc enim prorsus incredibile est, fierique non potest: quod enim perit, perditur, nedum melius fiat. Vnde Theodorus, qui reliqua verbis Plinii expressit in hoc rectè eum secutus non est: sed ait, Et melius ita euadit: radice attrita pede inferius. Præterea etiam illic in tæte negat, iuxta fontes vertit quia solum propè fontes solidum ac durum: pedibus namque haurientium aquam animique causa illic degentium, calcatur ac premitur. *negat* verò loca vocantur, quæ pedibus saltantium pulantur, atque ita indureseunt: hoc autem videtur Lucretius intellexisse cum inquit.*

Principio pars terræ nonnulla perissa.

S. libum osidui: multa pulsata pedum vi, & quæ sequuntur.

Crocus (vt legitur apud Cresc.) duplex est scilicet sylvestris, qui seritur sicut aliæ herbæ & est modicæ utilitatis: Item est bonus crocus domesticus, qui non seritur, quia semina non producit, sed cepulæ eius colliguntur mense Aprili vel Maio, & dimituntur octo diebus in acervo vt maturentur, & tunc mundantur & siccantur in lo-

co calido non tamen ad Solem, ne coquantur, cum sint maturæ, quod cognoscitur, quia tunc folia eorum sunt sicca, & seruantur vsque ad mensem Augusti, & tunc vel ante aut post vnâ separatâ ab alia in areis pastinatis plantentur cum radicibus, quas habent, per vnâ spandam distantes quatuor digitis submergantur in sulcis, vel duobus vel tribus annis dimittantur, & quolibet anno mense Aprili si fuerint tunc folia sicca, & mense Maio, Iunio, Iulio, si herba nascitur, in areis inmittantur, superando terram per totam superficiem per duos digitos deorsum, vt non tangantur Cepæ. Et si plantantur circa finem Augusti, aut mense Septembri, raditur terra, vt area ab omni humiditate seu viriditate mundetur, deinde nascentibus floribus colligantur, & crocus siccus siccetur ad lentum ignem, & aliquo loco clauso feruetur: & elapsis duobus vel tribus annis totus euellatur mense Aprili, & iterum plantetur, vt dixi. Terram desiderat cretosam vel mediocrem, & potest etiam quamoprimè plantari, ubi fuerint Cepæ, ubi sunt euellat. Et est sciendum quod crocus non multum læditur vmbra, sed plurimum læditur à muribus, & talpis quæ sub terra corrodunt cepas eius, plantatur igitur Crocus viui radicibus, iuxta Constantini agriculturam, quum florem abiecerit. Florem autem prius remittit quàm folium. Flos colligitur ubi bonum colorem indeptus fuerit, cupidibus ex medio flore extractis, & ad triduum aut quadratum perfidgeratis ac siccatis, deinde summa eius pars purgatur, & album quidem admittitur. Componitur in vasis quantum fieri potest obrutur. Diophanes in vmbra Crocum perfidgerandum ac assiccandum esse tradit.

Dioscoride eligitur optimus in medico vsu, Coryceus, recens & boni coloris, qui parum de candido in circulum habet, & longus est, integer, non fractus, cui nihil deest, plenus, dum diluitur manus tingens, non cariem aut situm redolens, sed in odore imitans, & acris. Qui enim talis non est, aut verustus est, aut maderatus. Secundum locum obtinet qui extra Corycum ad Lyciam nascitur, & qui Lyciaco Olympo. Deinde qui ex Aegibus Aetoliæ vrbē affertur. At Cyrenæicus, & Centuripinus omnium in Sicilia nascentium debilissimus est viribus: quum omnia eius genera sint oleracea. Atramem ob succi abundantiam, & coloris præstantiam, qui in Italia Thymiam tingunt, hoc vntur: Et propterea magno venditur. Verum ad medicamentâ præscriptus commodus est. A dulteratur autem Crocomagmaris cõfusi ammixtione, aut sapâ subactâ contrita simul ad ponderis grauitatem addendam argenti spuma, aut plumbagine. Indicat autem hæc res pulvis inhaerens, tum sapæ odor. Opera verò & inentas ex Thymæ ligna, croco centuripino tinctas fuisse, mihi [inquit Cornar.] verisimile sit. Quamquam mirum sit Plinium eius rei nullam fecisse mentionem. Tamen verò lignum per se adè crispum, croco tinctum insuper fuisse ambigi possit, tamen coloris flauo inducendi gratia fieri potuit, vt croco tingeretur. Hoc enim probabilius est, quàm quod ad mortaria tingenda Croco in Italia vsi fuerint, quod volunt hi qui hoc loco *diuiaz* vocem, pro *diuiaz* legunt, At verò qui Plinium vident dicere, Crocum tritum & ad theatra replenda hi iam pro *diuiaz* legendum esse *diuiaz* contendunt, & Dioscoridem, idem quod Plinium dixisse, nimirum

Plin. not.

Cultura.

rū per theatra replenda, *in deo dicitur* intelligentes. Ego verò velut dixi *deus* lego, & de thymino ligno accipio. Ceterum Sepaliarii Crocum perpetuò subterraneis, ac per hoc humectis locis feruant, quò ponderosius fiat, maiusque lucum inde sibi comparant. Crocus, quem & fapor & odor commendat, quique concoctione iuat, non Medicis solum Officinis, sed etiam culinis ad obsonia colore iucundo tingenda plurimum expetitur.

Crocus aut. Dioscor. vim habet concoquendi, molliendi, leniter adstringentē, vrinam ciendi, & colorem bonum induci: & crapulam arcer, si cum passio bibatur. Fluxum etiam oculorum sistit illitus cum lacte muliebri. Miscetur etiam vtiliter potionibus ad internas affectiones. In pestes quoque & cataplasmata ad vterum, & ad sedē additur. Sed & Venerem stimulat, & inflammationes ignis sacri illitus mitigat, & in compositiones auriculares commodus est. Tradunt porro ipsū etiam occidendi vim habere, si cum aqua pondere trium drachmarum bibatur. Quò verò faciliē conteri possit, in calido fictili ad Solem siccare (confer. *Bas. cod. Hippocr. Dal.* quia tū odorem retinet Corn. in emb.) ipsū oportet, & celeriter versare, sed & radix ipsius cum passio pota vrinam mouet.

Hæc & alia quædam prodidit Plinius. Discutit inflammationes omnes quidem, sed oculorū maximē ex ovo illitus. Vulturum quoque strangularis, stomachi exulcerationes, pectoris & renum, icterotis, pulmonum, vesicarūque peculiariter inflammationi earum vehementer vtile: item tussi & pleuriticis. Tollit & pruritus, vrinā ciēt. Qui Crocum prius biberint, crapulam non sentiunt. Ebrietati eo resistunt. Coronæ quoque ex eo mulcent ebrietatem. Somnum facit. Caput leniter mouet. Venerem stimulat. Flos eius igni sacro illinitur cum creta Cimolia. Ipsū plurimū medicaminibus miscetur.

Crocus, inquit Galenus, paulū quid adstringens habet, quod terreum frigidūque est: sed superat in eo calfaciens & qualitas, & facultas, ut tota eius essentia secundi sit ordinis exalfaciētium, & primi exficcantium. Quare concoquendi vim quandam obrinet, adiuuante scilicet in hoc paucula illa adstrictione: quippe quibus medicamentis, cum non admodum exalfaciant, paucula adeſt adſtrictio, ea parem facultatem habent essentis emplasticis vocatis, quas cum iunctas esse caliditatem non vehementi contigit, *namque*, hoc est, concoquentes esse ostendimus.

Scribit Auicenna Crocum Cephalalgiam excitare, & capiti nocere. Id quod non exiguo, sed nimio vſu efficere potest. Vigiliis enim copiosius inducit, quæ modum excedentes capiti & sensibus obſunt. Moderatus autem Croci vſus cerebro prodest, sensus vegetiores reddit, somnū & torporem excutit, lætitiā gignit, corroborat cor. Thoracis crudos humores ad cōcoctionem perducit, pulmones aperit, & ab obstructione liberat: & ad hæc tam efficax est remedium, ut subinde phthysicis in ſumo vitæ discrimine, & per modum animam agentibus, spiritum reducat, & vitam aliquot dies proroget: scrupuli dimidii, aut ad ſummū integri pōdo, cum passio, aut vino dulci propinatus. Quo etiam modo grauissimas subito inruentes dyspnæas circa febrem statim & momento temporis tollere experimēto compertum est. Laudatur ad hepatis & fellis

obstructiones, & ad regium morbum. Croci stamina trita carpis, aut sub mammis admota, illitæ, vires suas Cordi cerebrōque illud transmittunt, quasque vertiginem tenebriſcolam inuehunt, aciem oculorum præstringunt, aut hebeant.

Scribit Serapio ex auctoritate Rhazis Croci drachmarum duarum pondere partum accelerare, maximēque inebriare, si cum vino miscatur: ac tantā lætitiā parere, ut ex nimia lætitiā infaniam gignat. Quod experimento confirmat Amatus Lusit. afferens se mercatorem viſiſſe, qui cum in ollam in qua carnes coquebantur, multum Croci inieciſſet, post earum eſum, in tam profusum vſum erupit, ut parum abſuerit quin risu nimio & cachinno ē vita exceſſerit.

Ex Serapio

His addenda Symeonis Sethi auctoritas. Crocus stomacho bonus est, inquit, ciborūque cōcoctionem efficit. Obstructiones tollit. Piruitosa & lethargica vitia iuat. Discutiendi quoque vim obrinet, vſceribus vtilis est, & ad spiritus difficultatem conducit. Si quibſillo mediocriter vſatur, bonum colorem habebit: ſin verò ultra modum, pallorem contrahet, & capitis dolorem, cibique inappetentiam faciet. Cum opio & lacte & roſacea pedum doloribus impositus vbi dolent, ſummopere prodeſt, ſuperpoſitis Betæ foliis. Cum porro Dioscor. Crocum ad inflammationes valere aſſerit: conſiderandum Crocum concoctionem & exalfacientem vim habere, & non niſi tranſacto inflammationis initio commodē adhiberi.

Ex S. Sethi

Hic adeo est thoracis [inquit Camer. horti] affectibus amicus, ut ſint qui ad ʒs. atque etiam vnum, cum dimidio molci grano, & vino optimo calido propinando, aſthmaticos curauerint. Ad reſpirationem ex nimio frigore prohibitam, eodem modo plurimum conducit. Huius extractū ritē præparatum in minima copia datum per os, difficilem partum promouet, corroborando imprimis vires grauidæ & fetus.

Causa

Crocus (ut confirmat Tragus) cordi conducit, ideoque quibusvis eius affectionibus auxiliatur, sanguinem purgat, veneno aduersatur: quāobrem haud immerito aduersus pestem vſurpatur. Quidam Crocum in occluſa Qui reſta cum Theriaca & Sinapi, aliſque ſpeciebus igne coquant, & ex illis deum hoc pacto toſtis electuarium conſciunt, quod ad internam faciat pestem, venenūque, per ſudorem exigat. Crocus in cibo aut potionibus vſurpatus, vrinam cit, & morbum regium, ac menſes mulierum educit, trahitque. Hæc radix Croci cum vino Apiano, aut alio quouis dulci efficacius præſtat. Crocus paralyticis membris ac induratis neruis apprimē confert: quare Oxyroceum emplaſtrum ex Croco conſicitur, ad emolliendam dūritiem neruorum accommodatiſſimum.

Infantibus, ſcribit Matth. perpetuò eiulantibus, neque ſurgere queuntibus, arenulæque meientibus, pauxillum datur Croci cum lacte. Si verò iidem ſe offēderint, nihil præſtatius quā ſi Croci integri nōnihil tamdiu in aceto inſudatur quoad eius colorem cōtraxerit, idque acetum bibatur. Si quis apoplexia correptus fuerit, aut lethargo & aphonia, Crocus cum aceto acerrimo & Caſtorio miſcetur, in quo intincta pluma naribus indatur ex graui enim ſtupore excitat. Ex floribus nondum decerptis ſtaminibus, exſtillatur aqua, quæ duabus à cœna horis aſſumpta, ſomnum conciliat (Camerarius ad eum locum an-

notat, esse qui è floribus, post adempta semina, eliciant eam aquam, cuius summa dosis sit $\frac{1}{2}$ iiii.) Crocus cum lixiuo & oleo oliuarum mistus, calidè appositus, cõfert in tumoribus vbi meruit gangrena: ad quam singulare remedium est emplastrum ex Lupinis in lixiuo & vino albo coctis, addito tandem Croco. Stamina omnem mitigant calidum tumorem, cum oui albumine, & vitello imposita. Sertum ex Croci floribus capiti circumpositum, somnum inducit. Calida podagra dolores immodicos lenit Crocus cum lacte, oleo rosato & pauco Apio simul mixtis. Auic. cephalalgiam facere scribit, & capiti nocere: id quod non exiguo, ait Dodonæus, sed nimio suo vñ efficere potest. Vigiliis siquidem copiosior inducit, quàm modum excedentes capiti & sensibus obsunt: moderatus autem Croci vñus cerebrum prodest, sensus vegetiores reddit, somnum & torporem excutit, lætitiã gignit: corroborat quoque Crocus cor, thoracis crudos humores ad concoctionem perducit, pulmones aperit, & ab obstructione expellit, & ad hæc tam efficax remedium, vñ ubinã phthisicis in summo vitæ dictamine, & propemodum animam agentibus, spiritus reducat, & vitam ad aliquot dies proroget, scriptuli dimidii, aut ad summum integri pondo, cum Pisto aut vino Pramnio, vel alio dulci, exhibitus: quo modo etiam datus, grauissimas subito irruentes, citrà febrim, dyspnoeas, statim & momento temporis tollere, non semel à nobis compertum est. Laudatur ad hepatis & fellis obstructions, nec non ad regium morbum atque hinc bonum colorem Crocum efficere Diosc. scribit: additur eodem autore ad omnes quæ interaneorum causa temperantur portiones: sed nostra ætate ad eas potissimum, quæ menses, fetus, & secundas educunt, oculos ab ecchymatis & exanthematis cum lacte, aut Foeniculi, Rosarumque liquore præseruat illitus, & humorum in eos fluxiones reprimat.

Aduersaria. Affirmat Aduersaria, Croci stamina trita carpis aut sub manibus admota, illitæque, vires suas cordi cerebroque illicò transmittere, quasque vertiginem tenebrosam inuohere, aciem oculorum perstringere aut hebetare.

Gesnerii. Crocum. Croci parum iusculis in melancholica passione miscet Gesn. Dicamus vrgente negotio quædam vt ex præscripto Diosc. ad Crocinũ vnguentũ præparandum spissatis antea oleum, velut de Susino dictum est, eo pondere & mensura: & acceptis olei ad Susinum spissati libris tribus & dimidia, immittito Croci drachmas octo, & sæpè per diem commoueto, ita vt hoc assidue facias ad quintam vsque diem. Sexta verò oleum de Croco purè defundito, & ad eundem Crocum olei mensuram vnã affundito, & ad triduum commoueto. Deinde ad defusum myrrhæ contusæ & cribatæ drachmas quadraginta ammisceto, & in mortario commodè moueto, & sic repõnito. Quidam oleo ad Cyprinum aromatis imbuto, etiam ad Crocinum vtuntur. Optimum ex ipso est quod abundè Crocum spirat, quod sanè ad vñum medicum expetitur. Secundum locum obtinet quod myrrham redolet. Vim habet calefaciendi & somnum inducendi. Vnde sæpè phreniticis conuenit, si ex eo irrigentur, aut ipsum olfaciant, aut etiam naribus illinant. Gignit item pus, & vlcera purgat. Facit etiam ad vteri duritias, & conclusiones, ad vlcera in ipso maligna, cum cera & medulla, & duplo oleo. Concoquit enim & mollit, & humectat, & mitigat. Fa-

cit & ad glaucomata oculorum, si cum aqua sublinatur. Proportionem verò cum ipso habet, & id quod Butyrium appellatur, & Onychinum, & Styracinum, vt quæ nominibus solùm differant, verum præparandi modo & viribus similia sunt. In Crocino (inquit Cornar.) nihil est quod aliquem morari possit, si nostram translationem cum Græcis diligenter conferat. Quod dixi secundũ locum obtinet id quod myrrham redolet, id est quod *myrrhæ rapuq̃tionem*, in Græcis legitur: quod similitudinem significat, sed non aliam quàm odoris, vt ego puto: quum antea optimum spirare Crocum dixerit. Nam si quis Myrrham referre dicat, obscurum relinquit quã in re similitudo illa posita sit. Et potest etiam hæc locutio inter eas referri, quas Galenus improprias in Dioscoride deprehendit. Paulus alium Crocini parandi modum habet, sed exemplaria Græca eo loco & corrupta sunt, & transposita. Nos autem in nostra Pauli translatione omnia in iustum locum restituimus, & in Dolabellis nostris in eundem omnium rationem reddidimus. Quod porro ad finem dicit, cum Crocino eandem vim & præparandi modum habere Butyrium & Onychinum & Styracinum: de Butyrino quidem facile creditur est, itemque de Styracino: & ex appellationibus etiã aliquo modo constat: & de Styracino quoque infra Diosc. in Styrace repetit: sed de Onychino ambiguum penitus est, &c.

Diosc. similiter, Crocomagna facit ex Crocino vnguento aromatis expressis & efformatis. Est autem bonum id quod odoratum est, moderate myrrham redolens, graue, nigrum, non lignosum, dum diluitur croci colorem abundè referens, læue, subamarum, & quod dentes ac linguam vehementer tingit, colore ad multas horas durante. Tale verò est quod à Syria affertur. Vim habet extergendi ea quæ pupillis tenebras offundunt, vrinam ciendi, molliendi, concoquendi, calefaciendi. Croci viribus aliquo modo respondet, plurimã enim de ipso parte obtinet. Crocomagna Diosc. ex Crocini vnguenti aromatis ex rimit [ait idem Cornar.] & in massis siue pastillis efformat. Alia verò est Crocomagmatis præparatio, quam Damocritus versibus conscriptam, Galen. lib. 2. Antid. recenset: & Aërius lib. 2. c. 196. & 6. cap. 50. habet, constans ex Croci drachmis centum, myrrhæ Tragodyticæ, rosarum siccarum, anyli, gummi, lingulorum drachmis quinquaginta, teruntur hæc cum vino, & efformantur in pastillos, qui in vmbra siccati in vñum veniunt, & ad capitis dolorem temporibus illinuntur. Et in aliorum quoque Pharmacorũ præparationes miscetur. Galenus quoque lib. 2. c. 1. *in vñum* in capitis ex febris dolore: Illinenda est frons, inquit, ex cyphi in frigidioribus, ex Crocomagmate in calidioribus. Hippocrates Crocomagma etiam *ἐκκράση* appellat in libro De sterilibus.

CROCVS VERNVS LATIFOLIVS ALBO

Flore interdum purpurascens venis vario.

Alius flore purpureo minore.

IN post. Hist. Clusius sub titulo Croci verni latifolii albo flore hanc tradit descriptionem. Latifolii Croci prima species, terna & quaterna interdum habet folia latiuscula & breuia, duabus albis venis per eorum longitudinem subtus excurrentibus prædita, inter quæ prodit è membrana flos breui pediculo nitens, sex foliis constans

flans albis, imâ parte cum pediculo purpurascē-
tibus, & in medietate stamina, cum breui trifido
stilo continens: radix bulbosa, candida, tenui
cortice amicta, fibrisque candicantibus in-
fimâ sede prædita. Nulla inter reliquas Croci
vernæ species, hac magis fecunda in edenda fo-
bole. Eius verò flos interdum variat: nam ter-
na illa exteriora folia, nonnunquam purpurascē-
tibus venis sunt aspersa, interdum foli foliorum

mucrones pur-
purascunt, ali-
quando etiam
purpureus ra-
dius omnia
folia secundū
longitudinem
media secat.

Crocum au-
tem vernum
latitobū purp.
flore minore
sic describit.
Similibus est
foliis latifolio
albo, paulò ta-
men angustio-
ribus, inter fo-
lia promens è
membranaceo
inuolucro, e-
iusdem ma-
gnitudinis flo-
rem breui pe-
diculo innite-
tem, sex foliis
constantem
violaceæ ad
cæruleum ten-
dentis purpu-
ræ colore, vn-
guibus & sū-
mo pediculo
saturatione
purpura nitē-
tibus: radix al-
teri similis, &
in edenda fo-
bole satis fo-
cunda inter-
dam. Nonnū-
quam, sed val-
de raro, fert
vtræque hæc
rotundū exal-
bidum semen
in triangulo
capitulo.

Primæ, secundæ, & quartæ (de quo paulò post)
specierum meminit Iol. Simlerus in Helvetiæ
descriptione, atque itic in montanis inueniri,
colore purpureo candido, & vtroque mixto: *Sue-*
triff vulgò vocari, & à Iuræ montis incolis (apud
quos in supremo iugo etiam nascuntur) *Leffrati*:
addit radicem suisbus esse gratam.

Audio & in Baldo monte agri Veronensis pro-
venire. Nonnulli primum genus Crocum vernū
ob foliorum & floris cum legitimo Croco simi-
litudinem vocant: Græcè *κροκός* dicitur dici pos-
set: alii Crocum montanum appellare malunt,
(aliud tamen montanum Crocum postea dabi-
mus) Turcæ *Zafran* vocant Crocum, & voces
addunt *ak, mor, sari*, quum album, violaceum, fla-

uum colorem exprimere volunt.

Croci silu. verni tria obseruauit genera Dale-
champ. *Primum* minimum radice bulbosa, exi-
gua, rotunda, multiplici cortice vestita, infernè
Cepæ modo fibrata: cauliculo dodrantali duo-
bus latiusculis foliis obuoluto, vsque ad floris
exortum ferè ascendentibus, quatuor insuper,
aut quinque foliis ex lateribus vtrinque enatis,
oblongis, angustis, linea candida quæ media in-
tersecat, diuisis: flore Croci hortensis, paruo, su-
pernè purpureo, infernè flauescente, extantibus
in medio staminibus crocèis. *Secundum* priori
in multis simile est, in quibusdam diuersum: nē-
pe quoddam radice sic ampliore, ac densius fibrata:
caule proceriore, grandiore, crassiusculo: flore
maiore & latiore. *Tertium* radice est gemina,
Gladioli modo, latiore, integriore, minisque la-
cero cortice obducta, parum fibrata: foliis qua-
tuor, aut quinque, longissimis, sed angustissimis,
linea media candidissima distinctis: caule foliis
vacuo, recto: flore media sui parte purpura ni-
tente, suprâ & infrâ candido, interdum prorsus
albo. Crocus siluestris in plerisque Galliæ locis,
sed in Allobrogibus potissimum nascitur, præ-
sertim primus & tertius in niuosis montibus, ter-
ra nigra & pingui. Liguatâ niue, & sub finem
Maii florem & folia statim promunt. Hanc ob
causam opinatur Clusii appellandum Crocum
Vernum, quoddam flore sit Croci, Verèque floreat.
Tres quoque figuras habet Dalechampius, & de-
scriptiones, nos priorem & tertiam accipimus,
secunda minus placet, quare ex nostris siccis v-
nam cum latioribus foliis.

Crocum sanè montanum silu. obseruauit Bur-
mii Rhetorum cum flore ac etiam semine Iunio. Locus;
Genevæ etiam cum essem reperi Iulii principio
in monte Thuyri, verum iam defloruerat & ade-
rat semen: transfuleram in hortum, nos autem il-
lud describere negleximus, purpureum colorem
in siccis animaduertimus:

Croci mei vbi primum erumpunt cum flore,
quidam extra terram, vix per quatuor vncias ex-
tant, vnciarum ferè duarum inter folia herbacea
qui interdum ea superant, in flore sex folia &
apices lutei, quos non animaduerti extra florem
eminere vt demonstrat figura Dalechampii, flos
desinit in capitulum ex breui & vnciarum duarū
aut trium pediculo tenui, in quo semina: folia
herbacea tantum terna, angusta, Croci: quæ su-
perant florem, & potissimum vbi incipit euane-
scere, & tandem ita excresecunt vt palmum exce-
dant, & latiora euadant multò quàm in hortensi-
si. Pictor noster perperam pinxit quatuor folia
pro tribus: membranæ aliquot tenues latæ am-
biunt simul pediculum floris & foliorum prin-
cipia, quæ exprimuntur in figura Dalechampii:
membrana etiam alia tunica amplectitur cau-
liculum floris, ad cuius initium vsque, nec pe-
diculus ita nudus est, vt pingit noster pictor, qui
per negligentiam eam omittit: radices plerū-
que duplices, vt in Gladiolo, tunicis reticulatis
teguntur, subsunt deinde capillares radiculæ.
Cur Frater Phyt. separat Clusii vernum maiorem
tertium à Lobelii Violaceo toto nondum ani-
maduertere possum.

Gesner. hort. Crocus silu. flore candido pul-
chro proficiente sub finem Februarii.

An Camet. hort. Crocus vernus purpureus.
Et apud Matthioli. Germ. Reperiuntur aliquot
species Croci silu. potiss. in altis montibus, flori-
bus albis purpurascētibz aut cæruleis [blaw]
vt plurimum Vere floret, in Iura monte dicun-

C. B. n. s.

tur *Leffrat*, in aliis mōtibz Helueticis *butreiff*.

Sæpius misatur Clusius se, nec in Austriacis, nec in Styriacis, neque etiam in Pannonicis mōtibz, vllum Croci verno tempore florentis genus inuenisse, tamen si diligenter perlustrarit, quum Helueticæ Alpes, illis etiam frigidiores, aliquot eius genera sponte alant.

Vires &
Vfus.

Croci siluest. montani flore albo radice foris duntaxat quidam vrendum censent, tam Clusio, quàm Lobel. testibus, intus non perinde: illius pubi vrinas elicit crebras atque crassas, tumores Hydropicorum discutit, spicula euellit. Isto agresti facilius abigeret è suis interulis pediculos Gēs Hibernica, nam virosior est, & penetrantior. Verum vulgatioꝝ præterquamquod Hibernis miseris tam importunos hospites, quietis & famis hostes abigit, etiam colorem floridum, vegetumque calorem, vigorem, & animorum ferocitatem artubus & alit & augeat, illuuique fordidæ vestes colore commendat, militiæ idcirco non parum conducibilis.

CROCVS VERNVS LATIFOLIVS
perpetuus flore maiore.

Perelegans Clusio in post. hist. Croci verno tempore florentis Tertia species latifolia purpur. flore maiore, quam ei mittebat Doctiss. vir Ferdinandus Imperator. Eius verò iam marcidis, & dudum terrâ eruti bulbum vnicum accipiebat, qui sequente Vere folia quidem protulit, sed nulum florem. Lugduni porò Batauorum, cum aliis Croci verni latifolii speciebus *florem* dedit, illis formâ similem, hoc est, sex foliis constantem, quorum externa tria paullo longiora, interna tria breviora amplectuntur, multò tamen ampliora quàm in secunda specie, licet illis colore nec valde disparia. nec inuicundi odoris, tria *stamina* continentem alba, magnis flauis *apicibus* prædita, & inter illa *stylum* paullo longiorem, extimâ parte in tres quasi tubulos laxiores diuisum, aurei coloris: cum flore, è membranaceo, instar reliquorū, inuolucro prodeunte, exeunt terna, aut quaterna *folia*, proximè descripti foliis nō dissimilia, paullo tamen longiora: *radix* bulbosa: superiore maior, & ad Quintæ speciei radicis amplitudinē accedens.

CROCVS VERNVS ALBVS, CÆRVLEIS
oris in latere folii, Lobelio: & Crocus
vernus latif. albo versicolore
flore primus Clusio.

Descriptio

LOb. Obs. & Ic. Pl. Crocus vernus albus 1. cærvleis oris sparsis in latere folii: ex Italia D. Bracionus accepit. Hist. Lugd. figuram habet sub Croco serotino Lobelii. C. B. Phyt. Crocus 6. siue Alpinus vernalis triphyllus, Lobelii albus. 2. Croci verni latifolii albi, versicolore flore primi *folia* Croci satui & legitimi folia satis referunt, nisi breviora essent: inter quæ bini aut terni prodeunt *flores*, primæ & secundæ speciei floribus maiores, sex foliis mucronatis constantes, quorum terna exteriora (quæ pallida sunt foris) tribus radiis ex atro purpura centibus, ab infima basi ad extremum folium ductis striata, internè alba sunt, vt & tota interna tria folia, *stamina* que in medutullo habent Croco montano similia, sed magis pallentem *stylum*: liberaliùs hæc *femen* præbet in triangulis capitibus, rotundum, ex ru-



fo candicans: *radix* superioribus similis, foris membranâ fuscâ obductâ, fibris infima sed donata, & intus alba.

Clusium intelligere eundem Crocum cum Lobelio asserere non audemus: eandem iconem habet, quæ à nobis in nostra tabella notata est I. de altera iconem notata II. agemus pau-

lò pōt, sub Croco verno latifolio albo versicolore secundo simplici.

CROCVS VERNVS LATIFOLIVS
albo versicolore flore 2. simplici & duplici.



QVarro Croco (inquit Clusius) verno latifolio albo flore similem, sed per omnia minorem, antè multos annos in Belgicam nobis mittebat C. V. Alphonfus Pantius, Ducis Ferrar. Med. cuius *florem* interdum oëonis & denis foliis præditum habui. Iac. Plateau

etiam duodenis, illiusque iconem ad me mittebat, peculiare genus esse existimans: sed infequente anno simplicem sex foliorum florem tulit.

Clusius habet in post. hist. Iconem Lob. ex Plantini iconibus p. 139. quæ in tabella præcedenti, nobis paulò antè posita sub Croco verno albo & notatur II. Clus. præterea aliam iconem habet, cui titulus Crocus vernus latif. duplici flore.

An Lobel. Obs. Crocus silv. albus duplex maior & minor. Flores illis albis, purpureis, violaceis lineis striati, quos ex Italia præclarus vir Bracionus accepit. Pagina verò sequenti & Ic. Pl. p. 139. Crocus silv. 5 purpureus, obsoletus, pullis lineis striatus, quem D. Bracion Alfonso Pantii Ferr. munere alit, supra figuram, Crocus vernus serotinus 1. flore purpureo rubente, violaceis lineis striatus.

Hist. Lugd. Crocus serotinus Lobelii. C. Bauh. Phyt.

Phyt. Crocus 3. siue Alpinus Vernalis purpureo violaceus L. Lobel. Vernus ferotinus 7. reperitur flore purpureo, aureo & vario. An Camer. horri Crocus vernus flore vario?

CROCUS VERNUS PURPUREUS
striis virgato flore.



Folia ex radice bulbosa statim promit, aliquot nonnihil repanda distantia & longiora, culmo angustiora, rigida; *semina* in cacumen desinentia, sulco candicante aduersa parte exarata, marginibus viridantibus. Sulco aduersa parte respondet porca elatior nitidi vitoris,

à qua deuxa


caniculata latera colore ferè sunt glayco: inter hæc emergūt, mox à radice *pediculi* palmares & latiores, teneri, infirmi, maiore parte cādidī, candidā membrācā vaginā diuoluti, superiore parte albis purpureisq; striis distincti: *singuli flores* vnum sustinentes fragrantis odoris, nudum, stipulū antequam explicetur acuminatē, foliis constātem lenis, vncialibus, acuminatis, quorum extrema tria complexu suo, reliqua in occulto flore occultant, colore intus alicante, foris striis purpureis, pallide flauescētib; & albis pulcherrimè virgata: tria verò reliqua, coloris intus forisq; sunt dilutioris violacei, excepto vngue saturatæ violæ externa parte conspicuo: medium obsident tres fibræ pulvisculo flauo respersæ, auicula linguam imitatæ, *stamina* ambientes totidem saturati crocei coloris.

In horto Ill. E. C. Montbelg. licuit in huius foliis lusum obseruare: siquidem extrema illa striata floris folia, vna aut alterā profunda cāsurā per margines dissecta animaduertimus: prouenerat autem ex bulbis à Genero Cherlero Romā delatis, florebat circa finem Februarii & principium Martii.

De hoc fortè Clus. post. hist. Ioach. Iungermanus C. V. Ioach. Camer. ex sorore nepos mihi scribebat in herbatōne, quam Comite Iosepho de Casa buona Sereniss. Ducis Flor. simpliciſta vt vocant ad Tirrheni maris littora instituerat, tres Croci verni differentias inuenisse. Ex iis elegantiorē, vel albicantes, vel purpurascētes flores proferre, quorum exteriora terna folia crassiores quādam venas purpurā saturā infectas haberent, quæ mirum flori decorem adderent. Reliquas duas maiores esse, Croco satiuo non inferiores, & vtriq; florem purpureum: sed in vna Colchici floris instar diluūm, in altera à Croci legitimi flore parum diuersum. Addebat, Iosephum admonuisse, aliud elegantissimum genus galci in iisdem pratis circa Liburni portum,

Tom. II.

CROCUS VERNUS LATIF. PURPUREUS
vericolore flore.



Crocus verni quinta species Clus. Hist. post. siue Crocus vernus latifol. purpureo vericolore flore, quem Alphonsus Patris mittebat, florem iā marcidum adhuc retinentem, & semen in triangulo capite maturum, ex quo mihi nata plantæ, quæ tertio anno flores proferre ceperunt: sunt verò ii superioribus ampliores, ad tertiam speciei florum magnitudinem proximè accedentes, sex etiam foliis præditi, quorum externa tria foris ex candido, quodammodò purpurascunt, & saturati sunt, quasque atræ purpuræ, tribus vel etiam quinque lineis ab infima parte sursum ascendētib; insignita sunt, internè purpurascunt, interiora verò tria, vel dilutioris, vel saturatioris purpurei sunt coloris, circa vngues tamen, similib; vt exteriora, radiis insignita: *semen* in triangulis capitibus subfuscum: *folia* superioribus speciebus longiora & latiora, Tertia foliis non valde abimilia, duabus etiam albis lineis subtus distincta: *radix* paulò amplior: huius florem etiam octonis foliis interdum luxuriantem habui quatuor videlicet internis, totidem externis.

In icone Clusii non apparent lineæ sursum ascendentes.


CROCI VERNI TRES SPECIES, FLAVA
aurea & pallida.

Crocus verni Mæsiaci latifolii flore flauo, ad quintæ speciei folia valdè accedentia, longiora tamen & circa exortum latiora, binis candidis venis secundum medium neruum per longitudinem excurrentibus, vt in reliquis Croci speciebus, quæ emergere incipientia, *florem* simul ostendunt, sex foliis, dum explicatus est, constantem, exterioribus mucronatis, internis paululum orbiculatis, flauiculis, vtrunque odoratum, tria longiuscula latiusculaque *stamina* dilutius flauescētia, intus continentem, & longiorem stylum summo fastigio in tria stamina diuisum, satiu Croci staminibus penè concolorem: cui succedit, vt in superiore Croci verni specie, membranaceum triangulare *capitulum*, rotundo rufosq; *semine* plenum: *radix* cum superioris radice conuenit, vel etiam maior est,

H h h 3

solida, aliquot candicantibus fibris, sessili parte donata, & aliquot tunicis obvoluta: binos plerumque, ternos aut quaternos, vel etiam plures profert flores: nulla enim Croci verni species hac liberalior in producendis floribus.

Croci verni latif. aureo flore.



que: Stylus alteri similis, summa parte interdum in quatuor staminula diuisus, alterius Stylo concolor: florebat mihi anno 1584. & sequentibus duobus, paullo maturius flauo, & multos etiam dabat flores.

Croci tandem verni latif. pallido flore tertia species folia non minus lata habet, floresque sex foliis magis mucronatis constantes, coloris omnino pallidi, viridibus venulis exteriorum foliorum vngues foris distinguuntibus, cætera notæ conueniunt.

Omnes has flauī differentias corrumpēbat rigida illa biemis anni 1586. & plures quā sexagenos bulbos iuniores earum semine natos, præter tres aut quatuor qui flauī genus cōseruauerunt.

Crocus vernus latifol. flauo vario flore, Constantinopolitanus siue 7. Clusii, dubitat Lobel. Adu. par. 2. an sit Crocus sil. vernus versicolor, aureo rutilo panno concolor, quem Galli *drap dor* vocant: de quo paulo post.

C. Bauh. Phyt. Crocus 12. siue vernalis flauus. Item 13. siue Vernalis pallidus. Camer. hort. Crocus vernus aureo flore.

Tempus

Florent autem omnes, inquit Clusius, Croci montani differentia in eunte Vere, alii alii maturius, Martio, & Aprilis initio: nulla autem diutius (ob numerum florum subinde nascentium) quæ flauum fert florem, quæ omnium etiam liberalissimè semen præbet: ea primùm Germania innotuit post annum 1579. Stephani van Haufen Norimbergensis diligentia, qui Constantinopoli rediens, in Serua siue Moesia superiore sub Belgrado florentem eruit Martio mense: postea & alii antè à me admoniti videntur istinc Viennam redeuntē, in Thracia, non modò flauo flore, sed etiam albo & subcæruleo: sed non eruerunt: Flauæ autem variæ pauci bulbi allati anno 1597. Octobri mense, iique admodò maridi & exsucci, vt verno tempore erutos appareat: nam & flores & folia adhuc retinebant, empirique fuerant in foro Constantino-

poli. Vnus aut alter eorum quos redemeram, & terræ commiseram, prodierunt sequente Vere, vnicū duntaxat folium proferētes, & anno demū 1590. & sequentibus, flores quos descripsi mihi tulerunt Francofurti ad Moenum, & Lugduni apud Batavos.

CROCI VERNI LATIF. FLAUI vario flore 1. & 2. species, vtraque flore simplici & duplici.



Crocus vernus latifolius flauo flore, siue Septima species, Clusii. Histor. poster. quinque aut sex habet folia, tenuia, in- instar ferè legitimi Croci, infima parte ex purpura nigricantia, & quorum medio vnum aut alterum florē promit aurei ferè coloris, legitimi Croci odorem non nihil referentem, sex etiam foliis constantem: vt reliqua Croci genera, quorum exteriora tria paullo angustiora, & magis mucronata, tribus crassiusculis radiis ex atro purpurascens ab imo ad summum, secundum folii longitudinem excurrentibus, & multas interdum venas in latera spargentibus, insignita, terna interiora latiora sunt, & vngues habent foris etiam ex atro purpurascens, pediculus qui florem sustinet, totidem purpurei coloris saturi radiis notandum, quot sunt in flore folia: vmbilicum occupant tria flaua stamina, inter quæ stylus eminet extremâ parte trifidus, aurei coloris: floribus succedunt crassiuscula trigona capita, admodò saturo purpureo colore infecta, vt atra videantur & splendentia, quæ maturitate hifcentia, semen continere conspiciuntur superiori æquale, & magis rufum: radix bulbacea, vt in superioribus, sed præter illorum morem multiplici reticulatoque cortice obducta, & multis tenuibus fibris sessili parte, per reticulati corticis maculas

eulis & excreantibus, prædita, raro adnatos bulbos profertens.

Itius alia est species, quæ nec radice, nec foliis, neque flore differt, exceptis radiis, quia deo latè se se spargunt, vt præter oras, totum externorum trium foliorum dorsum inficiant, ac pediculus etiam florem sustinens, totus ex purpureis radiis insignitis, deinde sexagona capitula interdum etiam gemellos flores vni pediculo inhaerentes, quibus etiam gemella capita, vtraque semine plena.

Lobel. Ad. par. 2. Crocus vernus latifolius flauo vario flore, siue 2. Constantinopolitanus Clusii. Pleræque ferè Croci sylu. varietates Anglobritanniæ & Belgio inquilinæ.

Crocus vernus flore luteo, coronâ Phœnicæâ.

Crocus vernus flore luteo, coronâ Phœnicæâ auctore Lobel. Ad. Penes D. Somerum quotannis Aprilis florêt, delato & eruto bulbo ex horto magni Ducis Hetruriæ.

Crocus luteus & aurei varietates.

Eius (inquit Lobel. Ad. par. 2.) tres differentias alunt Ioannes de Franque ville senior & iunior, mercatores Cameracenses huius ameni studii cultores egregii. Vnum quippe flore flauo siue fuluo, nitido: radice aliis non dissimili. Alterum rariorem multo, præcoccissimum, flore saturo colore fulgente, [An crocus Vernus latifolius Clusii flauo vario colore Constantini.] aurei splendoris foris elegantissimis violaceis nigris lineis striato, auro texto Serico panno amulo, vnde [crocus aureo panno concolor] croci concoloris aureo panno nomen. Goud laken vulgò Brabantorum, & Drap d'or Gallorum. Staminibus intus luteolis: foliis tenuibus erectis: Bulbo subrus aliquantulum fibrato, reticulo obiecto instar nucis Myrticæ inuoluti, Macis vocati. Hoc alui Hacknei sigulino vase. Tertium flore pallido ab aliis diuersum: cæteris vt vt fatis respondentibus.

Varietas. Crocus vernus aureo flore Clusii, variat flore intensè, magisque luteo aut rutilo & aperto. Sed tota planta minor, alioqui omnino ferè similis.

CROCUS VERNVS ANGVSTIFOLIVS floribus cæruleis siue violaceis interdum candidis, Hispanicus.

Crocus verni angustifolii species prior (inquit Clusius hist. post.) terna, quaterna aut plura habet filia, longa, viridia, Crocinis longè angustiora gracilioraque, rotunda & capillaria ferè, inter quæ prodeunt bini aut terni cauliculi, vnciales vt plurimum, angulosi, sustinentes flores sex foliis constantes, vt reliquæ species, imâ parte flauescens, intus nonnihil candida, cæterâ ad cæruleum tendentibus, siue violaceis (inueniuntur & toti candidi odoratos, quibus insunt staminula: his succedunt folliculi, siue capitella trigona, exile semen fuluescens continencia: radix exigua Auellanae magnitudine, duro spadicæque cortice siue putamine tecta, insus alba, firma, subatringente gustu.

Clus. Hist. & Hist. post. A ppeffatur hic bulbus à nonnullis crocus vernus, quod flore dit croci. Verèque floreat: folia tamen croci non sunt, sed rotunda & capillaria planè. Nomen vulgare Lusitanis Galerix vicinis apud quos etiam nasci quidam illius regionis incolæ asserbant, Nozelas pequennas, id est, Auellanae parua.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. pag. 141. crocus filu. maior Hispanicus, flore patulo, vulgò Nozilicha minor & Nozellas. Nucula à radice forma, quam etiâ gustu refert. Crocus vernus minor primus Clusii. Hist. Lugd. crocus vernus minor. 1.

C. Bauh. Phyt. crocus 14. siue vernalis minor. 1. Frequens inuenitur à Clusio Gadibus Prior, atque inter Afundum (vulgò Medina Sidonia) & Calpen, locis salcibrosi & aprici. Floret cum sequentibus Ianuario & Februario.

Angustifolii croci verni nullas facultates cuiusquam exploratas intellexit Clusius.


Crocus Vernus minor alter flore minore ex albo purpureo.

Crocus verni angustifolii species altera, foliis & Descriptio radicis externo cortice illi omnino similem in Beturia collibus Lusitanix sinibus obseruabat Clus. hist. post. paulò minore flore, ex albo purpureascente, vixque è terra prominente, atque vnum bulbum eruebat florem habentem è foliolis octo compositum, quatuor externis paulò maioribus: radix erat gemina, candida, vna super alteram insidens, quarum superior firma, dulcis & edulis erat, inferior flaccida.

Crocus vernus minor alter Clus. Hist. incolis Cebollina [parua Cepa] dicitur, quo ferè nomine solent Hispani minores omnes bulbos nuncupare. Lobel. obs. crocus vernus 2. Clusii Hist. Cebollina. parua Cepa. C. Bauhin. Phyt. crocus 11. crocus alpinus gemina radice.

Obseruauit hunc Clusius in Beturia collibus Lusitanix conterminis, florentem Ianuario.

CROCUS VERNVS ANGVSTIFOLIVS tertius Clusio flore multò minore cæruleo.



formâ similis: paulò tamen maior est, semen etiam crassiusculum;

TERTIA
croci verni angustifolii species Clusio vberioribus & crassioribus est foliis, illisque interdum surrectis: floris duarum præcedentium flore longè minor, totulque cæruleus, tribus exterioribus foliis exceptis, quæ foris virefcēte colore nonnihil aspersa sunt: huius radix prior

Crocus vernus minor tertius Clus. Hisp. Iconem aliam ponit Clusius in post. hist. cum titulo Croci verni angustifolii violaceo flore, quam autem pro tertio profuerat in Hisp. plantarum hist. in post. ponitur pro Croco tenuifolio, licet eius descriptio non respondeat.

Lobel. Obs. *Crocus vernus* Hisp. 3. minor Clusio. Et Plant. icon. p. 142. *Crocus sylu.* Hispanicus vulgò Nozilicha maior, *Crocus vernus* 1. Clusii. Hist. Lugd. *Crocus vernus minor* 3. Clusio. C.B. Phyt. *Crocus* 14. siue vernalis minor. 1.

Locus.

Hunc Gadibus duntaxat iuxta priorem inuenit Clus. eodem tempore florentem.

CROCUS MONTANVS AVTVMNALIS.

Descriptio



Crocum montanum primum, inquit Clus. Hisp. & histor. post. flore est satui Croci, sed dilutior & minore, tribus intus croceis *staminibus*, & stilo luteo summâ parte in aliquot staminula diuiso: *folia* illi quaterna Crocinis similia, breuiora tamè, inferiore parte, lineâ quandam can-

dicantem secundum longitudinem, exteriori verò, binos tanquam canaliculos seu sulcos vtrinque secundum neruum excurrentes habentia. *radix* minor quàm in satiuo, candida, plena, & veluti internodiis distincta, quia [quod omnibus aliis Crocis generibus, gladiolis & Sisyrinchio etiam accidit] plantâ florente, superior radicis pars augetur, inferior autem flaccescit & minuitur, utraque tamen denso quodam cortice è multis villis contexto inuoluta & testâ, tenuibusque fibris per corticem se exercentibus, sessili parte donata: subdulcis porro illa est initio, deinde ingrati saporis.

Hunc Theoph. lib. 6. c. 7. *κρόκος ὁ περὶον* appellat, Latini *Crocum montanum* & silvestre. Lusitani *Pie de burro* (pedem asinum) vocabant. Quam verò de causa nescit Clusius. An adu. par. 2. Autumnalis *Crocus* silu. sine foliis vt Colchicum vulgare flores laxat. Item Obs. *Crocus montanus* Autumnalis Lusit. & Hisp. etiamque nostris, vulgò *Pied de burro*. Plant. ic. p. 138. *Crocus montanus* Autumnalis. Hist. Lugd. *Crocus montanus* Clusii. C.B. Phyt. *Crocus* 3. siue Alpinus autumnalis. Camer. hort. *crocus montanus* Theoph.

Locus & tempus

Nascitur in nonnullis Lusitaniæ rupibus, præsertim iis quæ non procul à mari absunt, vbi Nouembri obseruabat Clusius & cum suo flore creuebat, anno 1564. & amicis in Belgium mittebat. Illic etiam Septembri floruit, Viennæ Austriæ & Francofurti ad Moenum, Octobri, interdum maturius: Maio tulit crassâ, angulosâ ca-

pita, semine plena, quale Croci verni latifolii Quattæ spiciei semen est. Belgis, teste Lobel. hortensis & inquilinus factus, è maritimis Lusitanic collibus delatus.

Crocus angustifolius 4. flore purpurei saturati coloris.

Croci verni angustifolii quattuor ad Clusium mittebat diligentiss. vir Iosephus de Casa bona aliquot bulbos, quorum nonnulli sequentibus annis verno tempore florem tulerunt. Erant verò illis terna aut quaterna iuncea *folia*, prior angustifolio hispanico modo descripto similia, inter quæ vncialis, tenuis *cauliculus* prodibat, membranaceum *folliculum* sustinens, ex quo *stipulus* emerit sex foliolis constans purpurei satui coloris, quibus *vugues* albis venis distincti, & *stipulus* ex umbilico prodians: fugax admodum fuit hic flos, vt pote qui vnico duntaxat die apertus manserit, *radix* Hispanici angustifolii radici par, multis tunicis, siue corticibus duris testâ.

Apud Clusium est icon, nescimus an pro hoc quarto posita an pro tertio: In iconibus Plant. p. 141. posita fuit cum priore Clusii angustifolio sub titulo Croci silvestris minoris flore patulo.

Crocus montanus secundus flore purpureo foliis orbiculato mucrone.

Croci montani alterum genus. Clus. Hist. post. fere simile primo, *florem* sine *foliis* promittit Septembri, vnciali aut longiore pediculo innitentem, satis odoratum, sex aequalibus foliis orbiculato mucrone præditis, & saturatioris purpurei coloris prænèque violacei, constantem, tribus ex umbilico prodeuntibus flauis *staminibus*, & stilo extremum mucronem multitudine, crassiusculumque habente: nullum adhuc semen mihi obseruare licuit: nec qui bulbum mittebat, villam eius mentionem in epistola faciebat: *radix* prioris radicis valde similis, cortice è multis villis contexto inuoluta, oblongos interdum nucleos satis procul à matre spargens. Hoc [Alterum] Croci silvestris appellatione mittebat Nobilis, idemque Doctiss. vir, Iohannes Boissot, vetere amicitia Clusio communibus, Francofurtum anno 1591.

CROCUS MONTANVS TERTIVS.



Croci montani tertii Clusio Histor. post. *flos* inodorus etiâ est, vel tenuis admodum & euanidi odoris, senis, vt reliqua Croci genera, *foliis*, quorum interiora terna paulò breuiora sunt, omnia autem orbiculato mucrone, albicantis initio coloris, sed in quo deinde temporis succellu,

successu, dilutus quidpiam cæruleum perfusum videatur: *stamina* ex umbilico prodeunt terna, flava, & in medio *stilis*, sive penicillus, in tria vel plura *staminula* diuisus, flauis etiam coloris: flaccescente vel iam marcido flore, quina, sena, raro plura emergunt in ambitu *folia* ex tenui membrana, qua florem initio obuoluerat, Croci verni latifolii foliis penè similia, hoc est, paulò latiora quàm satius, albâ lineâ singula folia per longitudinem supinâ parte distinguente, & pronâ binis: *semen* hactenus nullum obseruauit Clusius licet multis annis aluerit: *radix* digitalis, vel etiam pollicaris est crassitudinis, orbiculata ferè, alba, solida, tunica spadicea coloris obducta, multis albis fibris sub ea nascentibus prædita, quæ florum satis ferax est: nam & ternos, & quaternos, interdum etiam quinos profert flores.

Misum est hoc tertium Croci genus Byzantio anno 1587. Octobri mensis *Zafran maby*, hoc est, Croci cærulei nomine, quod tamen, prorsus cæruleo non esse flore, idem mensis declarauit: nâ octiduo postquam terræ commisit flores proferre cepit.

CROCVS SYLV. BYZANTINVS SEROTINVS candidus tantillam subcæruleus.

Debetur auctore Lobel. Adu. par. 2. Perelegans Croci sylu. autumnalis serotinum genus D. Ioâni Parkinson Londinensi Pharmacopolæ egregio, & Rei Herbariæ amantissimo, qui eius bulbos Byzantio delatos sedulis doctioribus amicis Herbarum cultoribus

Britanniæ ingenuè impertitus est: vt Domino Ioan. Nafsmith Botanico primario, & Chirurgo Regio præstantissimo, generoso item viro D. I. Coys harum peritissimo, & D. I. de Franqueville.

Vniuersa planta quinas & senas vncias altitudine aequat. In palmari delicatior *cauliculus*, vaginula prædita, flores laxat candidos, aliquantillum dilutâ cærulâ vmbra mixtos, ampliusculos, Colchici paulò minores, senis foliis constatos: tribus *staminibus* luteis inferioribus, Croci verni sylu. similibus, totidémque ternis sese exerentibus exilioribus concoloribus *staminulis* aut *stilis*. Floruit in hortis prædictorum quorundam Botanicorum per mensem Nouembrem in sextu aut octauum Decembris, vnâ cum foliis dilutioris viriditatis (obscure virent Croci sylu. montani folia) sparsis, ternum vnciarum, lineis albis medio exaratis, quæ paulatim marcescente flore ad palmarem altitudinem & vncias quatuor excresecunt. *Radix* adulta Nucem Myrsiticam aequat, etiamque superat, rotundior tamen Gladioli similis, intus alba, cortice obducta subfusco. Ac-

cedere videtur ad Crocum montanum tertium Clusii.

Crocus vernus capillari folio.

Mittebat Venerius Clusio Histor. post. Croci verno tempore florentis genus *capillari folio*, quod Burdegalensi agro locis desertis nasci scribebat, & duorum generum inueniri, vnum purpureascente folio: alterum quod rarius, albo. Et certè illius quod cæruleum habet florem aliquos ipsi bulbos semel atque iterum misit. At illius quod albo est flore, ne vnum quidem bulbum ab ipso impetrare potuit: in alios licet magis liberalis fuerit: certus enim est *eps*, qui illud habebat ab ipso accepisse. Id autem exiguum *radicem* habebat, bulbosam, duro spadiceo cortice testâ, instat illius quod in Hispania obseruabat ad Anam flumen, vel eius, quod Casabonus ei mittebat: quâ insequente anno bina aut terna prodibant quasi capillaria folia, viridia, surrecta, inter quæ *pediculus* verius quàm *cauliculus* vncialis longitudinis aut paulò maior, ab vnâ parte planus, sustinens semuncialis magnitudinis *florem* sex foliolis constantè, quorum terna exteriora paulò longiora erant, & purpurei coloris, tribus venis saturatioribus secundum longitudinem exterius distinctâ, tria interna breuiora & dilutior colore prædita, omnia autem internè dilutè purpureascebant, & *ungues* habebant pallidos, ternis venis distinctos, prodeuntibus ex umbilico tribus *staminibus* breuibus, longo apice flauo præditis, & medio stylo extremâ parte diuiso.

Florem proferebat initio Mai, qui Sole splendente aperiebatur, sub noctem autem claudabatur, & paucos dies durabat, nullius, aut pene nullius odoris.

Tempus

Crocus montanum Pyrenæum Autumnale.

Anno 1602. à Gallo quodam *peritissimo*, qui multas plantas in Pyrenæis montibus erutas adferrebat, aliquot redimebam (inquit Clus. Exot. par. 2. Append. 2.) inter quas binos aut ternos Croci bulbos: horum vnus insequente anno Septembri florem ferebat, Primi Croci montani flore ampliore, colorisque saturatioris & quodammodo medi inter illum & alterum in mea Plantarum historia descriptum, cuius medius stylus multifidus summâ parte perinde ac illius, magis tamen diluti coloris, & prorsus flauis: huius item folia marcescente flore, non statim prodibant vt in primo. An porro alii istius generis sint futuri dies nos docebit, si non peribunt.

Croco sylu. similis Bulbus.

Bulbus montanus ignotus similis Croco siluestri missus ex Hispania Clus. Pann. pag. 194. C. Bauh. Phyt. Crocus 16. sive Croco siluestri similis.

Croci Zizania.

Croci Zizania, bulbus quidam nuper cum Croco è Vallesia missus, superficies Croci, magnis interuallis later & redit. Gesner.

EPHEMERON NON LETHALE

Veteribus.

CAP. VI.

Ephemerum [*εφμερος*] quod alii Agrestem Irin [*ειρηνη*], alid. cod. velut Liliun,] appellat

Descriptio

lant caulem, foliaque habet Lili, sed hæc tenuiora: flores candidos, amaros: semen molle: radicem vnam digitali crassitudine, longam, adstringentem. Nascitur in sylvis & opacis.

Plin. more suo paucis immutatis ita legit. Ephemerum folia habet Lili, sed minora, caulem patem, florem cæruleum, [album Diosc.] semen superuacuum, radicem digitali crassitudine.

Ephemerum
æquinoctia-
tionem.
Colchicum
vulgare.

Cæterum Ephemerum à quibusdam pro Colchico vulgari habetur. A quibus recedit Lobelius qui Ephemerum non lethale suspicatur esse Hermodactylos officinarum. Diuersum quoque Ephemerum non lethale est, quod depinxit Matthiol. ab indigenis *Gigle Marro*, hoc est, Lilium stultum nominatum. Fuchsius plantam vulgò Lilium conuallium nuncupatam Ephemerum non lethale esse contendit. Ephemerum non lethale radicem dentium doloribus remedio esse scribit Diosc. si decocto eius colluatur; Folia verò in vino cocta illitaque, ædemata tuberculaque discutere, quæ quidem humidi nihilum contraxerint. Sed hic Fuchs. *puris* (puris) pro *humidi* [humidi] ex Galeno legendum censet. Galeni verba hæc sunt: Ephemerum non illud lethale ac deleterium, quod & Colchicum nominant, sed alterum quod & Irin agrestem cognominant, radicem habet adstringentem, & boni, suauisque odoris. Ex quibus palam fit, facultatis, temperaturæque esse mixtæ, nempe repellentis, & halitu [non halitu, vt per incuriam Typographi in Hist. Lugd. legitur,] euaporantis. Testificantur opera, quæ particulatim edit. Siquidem non inefficaciter radix eius in dentium doloribus colluitur. Tum phymatum augmento & statui folia conueniunt. Oportet autem ea in vino decocta, prius quam pus moucas illinire. Liquer igitur ex his Galeni verbis pro *æquinoctia* esse legendum. Variat tamen ab hac lectione & Plinius, scribens lib. 25. c. 13. Ephemerum habet radicem dentibus præcipuam, concisam, in acetoque decoctam, vt tepido colluatur. Et ipsa etiã radix mobiles sistit. Causis & exesit imprimatur, [imponitur,] Vet. Et seq. lib. 26. cap. 12. Folia Ephemerum tuberibus atque tumoribus illinuntur, quo eritandum (& tantum CH.) discuti possunt.

COLCHICVM VETERIBVS.

CAPVT VII.

DE Colchico Theophrastum ex professo quædam literis consignasse non ita constati: Licet non desint, qui Narcissum esse Plinii & Virgilii purpureum affirmant, apud Theophr. Autumno florentem, post Arcturum circa Æquinoctium. Verba Theoph. de Hist. pl. lib. 6. c. 6. hæc sunt: *Nærkissos* aut *λίανον* (sunt enim qui hoc, & qui illo nomine appellent) folium Asphodelo simile habet, sed multò latius & Lili, [*καθάρτης ἢ κενωρία* quasi Liliaceum Marc.] modo caulem nudum quidem foliis, veruntamen herbaceum, cui flos in summo, semen, velut in vasculo, membrana quadam clausum, grande, nigrum (*μύρανα* legendum, *μύρανα*, Dod. Ita etiam Clus.) figura oblongum: hoc decidens, sua sponte germinat: verum tamen id colligentes etiam in terra depangunt. Serunt & radicem, quam rotundã, carnosam & grandem habent. Serotinus flos est, post Arcturum enim & circa Æquinoctium floret. *hæc Theoph.* Quæ an Colchico Ephemerum

respondeant, quilibet verba iam in medium prolata diligentius examinans, absque negotio facile iudicabit.

Cæterum Diosc. *λίανον*, aliis etiam *εφίμωρον* nonnullisque *καλὸν ἄγρον* dici autor est. Lat. Colchici, Ephemerum, & Bulbum agrestem, & stragulatorium. Colchicum autem, vt ille describit, sub finem Autumni florem edit Croci candicantem: deinceps verò folia bulbi, sed pinguiora: caulem dodrantalem cum rufo semine: radicem cortice præditam è nigro fuluescens: quæ quidem delibrata candida, tenera, succi plena, atque etiam gustanti dulcis reperitur. habet verò bulbus eius mediam rimam fissuram, è qua flos erumpit. Plurimum in Messenia & apud Colchos enascitur. Et licet dicat Diosc. Colchicon radicem habere cum delibratur candidam, nostram tamen cum Marantha obseruauimus temporis diuturnitate rufescere: nec minùs cum eam dulcem esse dicit, nostræ partes sunt scire, hunc saporem non nisi per Autumnum retinere: nam cum folia verno tempore profert amarissima est, quamobrem à nonnullis pro Colchico habita non est.

Plinius, Galenus, Ægineta, atque Aëtius huius meminerunt, quamuis non descripserint, appellantes Colchicum hoc Ephemerum venenatum, lethale, deleterium.

Qua de re sequentibus agit Serapio: *Serapi*, [id est Hermodactylus Diosc.] Est herba quæ flore scit in fine Autumni & eius flos albus, similis in figura sua flori croci, deinde emittit folia similia foliis bulbi, in quibus est humiditas adhærens manui, & habet stipitem longitudine vnus palmi porrectum, cuius color est albus, declinans ad nigredinem, & habet radicem, cuius cortex est niger, ad rubedinem declinans. Sed quando auferitur cortex, apparet radix interius alba, mollis, dulcis saporis, & plena humiditate. Est autem radix ipsa rotunda, similis Cepæ bulbi, & habet radicem ista in medio sui scissuram, ex qua egreditur stipes, supra quem est flos. Nascitur multum hæc herba in loco qui dicitur Karin, & terris quæ dicuntur Gnagna, hæc herba si comedatur occidit strangulando, sicut occidunt Fungi. Conferunt autem illi qui ipsam comederit omnia quæ conferunt illi qui comedit Fungos malos, est autem summum remedium ei lac bouinum, non egent namque alio adiutorio qui eam sumpserunt, &c. *Hæc Serapio*, qui Galenum citat vires enumerans [quas recensens sub Hermodactyli titulo] verum nihil tale apud eum inuenimus; citat etiam Paulum, sed ex verbis Pauli certò asserere non possumus, de qua planta loquatur.

Colchici nomine enarratæ plantæ ordine sequuntur. *Nærkissus Persicus* à quibusdam Colchicus dictus, de quo agimus post Colchicum luteum. Videtur porro Clusio Colchicum Syriacum Alexandrinum quorundam, *Tulipe genus Apenninum* de quo paulo post agemus. Scribit Hist. Lugd. *Melagridem* Dodonzi nonnihil accedere ad figuram Colchici Orientalis Matthioli de quo lib. 30.

COLCHICVM.

Non multis communis florendi modus efficit vt Colchicum prius semina ferre quam florem vulgus sibi persuadeat: sed quemadmodum Crocus, ita Colchicum Autumno florem promittit.

foliis nudo & albido, tenuisque pediculo purpurei
carneive coloris in tenera filia oblonga diuifum,



floribus in
medio cro-
ceis: Vere fo-
lia producit
tria aut qua-
tuor Liliacea,
sed longiora,
latioraque, in
terque ubi in-
diuerfa abire
incipiunt, con-
ceptacula oriū-
tur seminum
oblonga, Lili
capitulis quo-
dammodo si-
milis, è duobus
tribusve locu-
lis composita,
marcida &
nigricante
membrana
obuoluta, in

quibus semina ad Raphani accedentia, petiolis
breuibus ad mediam lineam vniuscuiusque lo-
culis adhaerescētia. Radix subest rufescens foris,
intus alba, bulbacea, altera parte compressa: in-
stat Castanea.

Diligentem descriptionem Cordi lubet hic
adscribere quam habet hist. lib. 2. cap. 152. Colchi-
ci inquit (quod hodie Hekmodactylum vocant)
tres sunt species. Primum enim cum siccatum
fuerit, foris nigrum, intusque fuscum in candido
colorem habet. Alterum in flauo subrubentem,
tertium verò candidum. Ex his nigrum, paulò
ante Autumnale æquinoctium florere incipit, v-
que quod superueniens gelu sub ipsius proinis su-
perbientes flores opprimat. Colchicum itaque
Autumno edit quincunciale, nonnunquam etiā
dodrantale, gracile, glabrum, candicans
atque egregie teneritudinis caulem, in cuius su-
mitate flos Lilio non dissimilis, sed minime re-
pandis & reflexis deorsum foliis, sex vt plu-
rimum foliis longitudine sesquiunciam aut bessel-
æquantibus, latitudine verò vnciā paulò angus-
tioribus, utrinque acuminatis, glabris, nitidis,
pinguibus, in attritu glutinosi, primùm clausi &
conuoluti, postea se explicantibus, constans, co-
lore in subrubente purpura albicans, in medio
luteo colore stamina, numero ipsa floris folia
non excedentia continens: qui postquam vnum
atque alterum diem durauerint, flaccescunt, de-
inde paulò post sequentis Veris initium folia pro-
fert longitudine dodrantali, latitudine verò vnci-
æ aut sesquiuncie, acuminata, crassa, Liliaceis
forma & substantiæ lentore similia, sed longio-
ra, sub terra cœuntia, & teretem, teneram candi-
cantemque pediculum constituentia: in quorum
medio prope terram vtriculus exuberat acumi-
natus, triquetrus, longitudine ad sesquiunciam
plurimque accedens, latitudine verò vnciam
ad plurimam æquans: rotundo, miliò; maiori, pri-
mum candido, ætate deinde post solstitium ma-
turefcente, ad rufum in nigro colorem transeunte
semine plenus: quo sparsa folia flaccescunt.
Inueniuntur nonnunquam duo aut tres vtri-
culi simul coniuncti & ab vna radice prodeuntes,
cum eadem radix totidem flores produxerit, sed
vnus tantum ex his magnitudine præstat, alii ve-
luti abortiuū sunt. Radice nititur longitudine

sesquiunciali, modicè in plenum compressa, lati-
tudine vnciam plerumque quarta eius parte ex-
cedente, superius turbinata, inferius autem lati-
uscula parte veluti in paruum vnguem desinen-
te, & candidas fibras in terram demittente, &
paruis bulbis circa latera enatis se propagante:
foris multis in ruffo nigris tunicis vestita: ex
quorum numero eius ætatem cognoscere potes:
singulis enim annis singulas perinduit tunicas,
quibus detractis reliqua radices pars carnosā,
totaque candida, & lacteo succo plena est, ea-
dem ab vna parte rimam veluti habet, per quam
floris coliculus transiit, hunc enim non è supe-
riori & acuminata parte maioris radices Autu-
mno promittit, sed ab inferiori flaccescentis vngui,
& latiore, contra reliquorum bulbosorum mo-
rem. Ea verò radix à cuius mucrone flos & folia
emittuntur, sulco caret, vique in Autumnum, do-
nec subnascens paruula alia emissio flore priorē
fulcet. Hinc est quòd radices, quibus Vere & æ-
statis principio folia insident, canaliculatum istū
sulcum non habeant. Folia cum exaruerint, ve-
stigium quoddam turbini impressum relinquunt.
Eadem radix quæ priore anno germinauit, se-
quenti anno flaccescit, Autumno succedit alia
admodum parua, inferius adnascens, à cuius su-
periori parte Autumno flos prodit: nam hic mi-
nimè à maiore exit, minor hæc radix vna cum
flore adolescit, in Vere autem & æstate sequen-
ti simul cum semine ad instam magnitudinē per-
uenit, quo tempore prior omnino perit. Siccata
radix tam foris quàm intus fusca sit. Sapore
radix habet dulcem simulque amarum, tenuem,
saluam prouocantem, & aliquantulum nausēo-
sum. Odorem verò omnes herbe huius partes,
grauem & nausēabundum spirant. Nascitur in
pratris tam planis quàm montanis solo pingui,
plurimūque in Wirtembergia. Suecia, ubi Au-
tumno omnium ferè montium decliua, campi &
prata his floribus albicant. Colchicum subru-
bens (quod à colore radices siccata ita cogno-
minatur) nigro in omnibus notis & proprietati-
bus assimilatur, præterquàm quòd siccata eius
radix, quamuis excoctata, rubescat. Sapore
quoque & odorem nigro similem habet, nasci-
tūque eiusdem naturæ natalibus: rarissimè ta-
men iuxta se simul nascuntur.

Olim quamplurimi cum magno multorum
vitæ periculo abusi sunt Colchico pro Hermoda-
ctylis, illud exhibentes, cuius rei testes est Her-
mol. in Dioscor. dicens. Colchicum haberi mo-
dò passim prædicant: Hermodactylum Recen-
centiores pro Ephemero accipiunt. Colchicum
copiosè in Colchide nascitur. Estque in illis re-
gionibus venenata herba.

Quod verò apud nos [pergit Cord.] provenit,
amarius est, quo sapore veneni aliqua pars di-
luitur, nec tamen innoxium redditur. Homines
enim quos eo pugnauerimus, facillima incurrit
accidentia. Colchicon ait alibi, Bulbus agrestis
aut flos Autumnalis, non est Hermodactylus, li-
cet id Serapio velit. Quidam vt Brunfelsius Nar-
cissum esse crediderunt. Sed reuerà Narcissus
plurimum ab hac differt. Colchicum aliqui etiam
Ephemerum appellarunt. Nobis autem illud
consideratione dignum, an nostrate Colchicum
minus sit venenatum quàm quod in Colcho pro-
uenit, vt vult Cordus, cuius argumentum non sa-
tisfacit.

Nec placet Ruellium non distinguere Hermo-
dactylos vulgares à vulgari Colchico, dum scri-
bit: Officinæ Hermodactylon vocant, è quo-

Colchicum
Wirtembergia

Hermoda-
ctyl.
Ephemerum

Narcissus

Ephemerum

Cordus
not.

Ruellius

Catapotia ad podagras tantoperè commendantur. Habet & in medicina suos vsus, quorundam venenis pro remediis abutendo, quorum medicina maioris mali periculum adfert. Hermodactylos quibus Catapotia tantoperè commendantur ab Aetio & Paulo, Ephemerum non esse satis mihi constat, etsi Recentiores, pro Ephemerò vsurpent, cum Paulus separatim tantquam diuersorum mentionem fecerit, tradens Hermodactyli radicem alui decoctionem moliri, priuatim in articulariis doloribus, in defluxione decoctum eius dari, verum stomacho aduersari.

Pauli &
Aetii Her-
mod non
sunt Ephe-
meron
Canineae.
Euch. Roslin
not.

Euch. Roslin in Herbar. sub nominibus Canineae Gallorum weissen zeytlosen / Zbigera-
weck, Colchici, Ephemer, Hermodactyli [quod Colchicum dicitur] hermodactel wurg / Spinnblumen, confundit multas plantas, ac Colchico malè salubres facultates tribuit.

Neoterici duo hermodactyli genera statuunt (inquit Tagaultius) vnum radice oblonga, alterum rotunda. Qui radice est oblonga Ephemerum est Diosc. Galeni, Pauli & Aetii. Qui verò radice gerit rotundam, eorundem haud dubie Colchicon est, è quo Catapotia tantoperè ad podagras & arthritim commendata Officinæ conficiunt. Verum enimverò cum hoc Græcis omnibus Scriptoribus, atque ipsi etiam Plinio delibutorum ac præstanteum venenum sit, non admodum certè tutus est eiusmodi pilularum vsus: nisi fortè dicamus nostrum hunc Hermodactylum non adeò venenosum esse vti illud Colchicum est Ephemerum, id est, quod in Colcho insula nascitur, Verum cum Hermodactyli quibus passim hodie vtuntur Officinæ in conficiendis huiusmodi Catapotis, hæ nequaquam radices sunt [innocue enim, præsertim veteres gustari possunt] quas Veteres & Paulus Aegin. in articularibus morbis tantoperè commendarunt: securius sanè fuerit ab eis in totum abstinere. Quòd autem Hermodactylus de quo scribit Paulus lib. 7. res alia sit ab Ephemerò & Colchico, eo argumento conuincitur, quòd dicat Hermodactyli radicem, & per se, & ipsius decoctum peculiariter & priuatim articularum doloribus in ipsis fluxionibus plurimum valere. Diuersa tamen capita de Colchico & Ephemerò iam conscripserat, quibus nullam vim sanandi arthriticos tribuit. Sed neque Diosc. neque Galen. neque Plinius, neque Aetius in Colchico aut Ephemerò, verbum de articularum morbis loquuntur. Proinde res alia Pauli Hermodactylus ab Ephemerò & Colchico esse videtur. Porro tamen si Ephemerum apud antiquos Græcos nomen sit generis significans idem quod apud Arabes Surugem, apud Recentiores hermodactylus, dictamque sit [vt putauit Theoph.] quoniam intra diem iugulet: præcipuo tamen nomine & peculiariter ad Ephemerum dicitur, quod veneno caret, innocensque est, & remedii ratione vimque salutiferam habet, ceterum abest vt lethiferum sit, aut exitiosum. Colchicum verò per Anronomiam, id est, Excellentiam loci in quo nascitur, & ob fasiosa Medæ veneficæ mulieris ex Colcho, de venenoso solum Ephemerò dictum est. Maleficum hoc Ephemerum, Colchicum dictum, exitu Autumni in pratis florem edidit subcandidum sive albicantem: posterius, id est, ab eo tempore, folia bulbi pinguiora caulem palmeum vel semipedalem, rufum semen, radicem rotundam, foris è nigra rufescentem,

Colchicum
ex dictum.

quæ delibrata disquamataue intus albicat, tene-
raque ac mollis spectatur, lacteo madet succo, ar-
que gustata [vt auctor est Diosc.] dulcis inueni-
tur. Bulbo medio rimula dehiscit, quæ flos erum-
pit. Quæ notæ omnes ad amulsum Officina-
rum Hermodactylo conueniunt.

Quidam superites adhuc hodiè Medicus Fer-
rariensis, adferit se Colchicon gustasse, ac in eo
Castaneæ saporem inuenisse, sed paulò post stri-
cturam quandam circa asperam arteriam præ-
sensisse, ac si manu stringeretur: mox vaccinum
lac bibisse, & nihil incommodi sensisse. Rura ho-
diè apud nos plantam hanc Canecam appellant,
quod canes deuorata necet. Officinæ Hermo-
dactylon vocant.

Ceterum cum dicit Mesue de rotundo Her-
modactylo tanquam de meliore se sermonem
habiturum id sanè intelligendum est. Nempe
Hermodactylum rotundum, qui Colchicon est
Ephemerum, meliorem ac perfectiorem esse quod
ad ea ad quæ valet pertinet, vt puta ad articula-
rios dolores. Sed iam recitata verba Tagaultii
tam distincta sunt, vt magis distingui velint.
Quicumque enim considerabit radices hermo-
dactylorum & conferet cum Colchici radicibus
nostratibus exsiccatas, insigne descimen perspi-
ciet, quicquid dicat Tagaultius de notis quæ
conueniunt.

De Colchico quidem nihil prodit Galenus
[inquit Cornar.] Nec Plin. Colchici memin-
it, nisi lib. 2. c. 9. Officinæ Colchicon vocant Her-
modactylon, sequentes in hoc Serapionem Ara-
bem, qui totam Colchici apud Diosc. descrip-
tionem Hermodactylo attribuit. Verum Paulus
Hermodactyli radicem proponens, non addit
Colchicum vocari. Et quamuis Colchici seor-
sum non faciat mentionem, tamen de Ephemerò
agens, nò de veneno loqui se dicit, sed de eo quod
Iris agrestis vocatur. Per venenum autem ni-
hil aliud ipsum intelligere quàm Colchicum, ex
Galeno clarum sit ex quo Paulus transcripsit.
Non debuisset autem præterire, neque eo loco
quo de Hermodactylo agit, Colchici appella-
tionem, si Hermodactylus Colchicum esset: neque
lib. 5. cap. 48. vbi de Colchico verno agit, hermo-
dactyli appellationem, si Colchicum hermo-
dactylus esset. Quare diuersas res esse hinc colli-
gitur. Sed & idem Paulus lib. 7. cap. 5. podagri-
cam ex Hermodactylo compositionem recen-
sens: & mox eandem purgatoriam addens, Col-
chici appellationis nullam mentionem facit, li-
benter alias exponere solitus, si quæ sunt ob-
scurores appellationes. Nostri Zeytlosen vocant.
Quidam etiam Herbsibblumen. hæc Cornar.
Qui sui oblitus l. 4. c. 140. Collegit Narcissum esse
ex genere florum, qui à nostris Zeytlosen &
Herbsibblumen appellantur.

Errat & Tragus qui putat esse Moly Home-
ri, quando scribit: Sunt qui putent Narcissum
esse Theoph. lib. 6. cap. 6. & Virgilii lib. 4. Georg.
inter quos est Philippus Melanchthon in Syntaxi
sua. Huic sententiæ subscribo quod ad florem
attinet. At radix nec non folia huius plantæ,
nobis à Dioscoride sub Colchico, Ephemerò, sive
Bulbo agrestis comprehenduntur. Serapioni cap.
194. Surugem. Hermodactylum, Liliū sylvestre, &
Achimeron, quod meo iudicio Ephemerum legi
debebat. Serapio Hermodactylum venenum esse
clamat, vti & Mesue, &c. Rursum cum Serapione,
Mesue & Paulo Aegin. ingemino, ac constanter
affirmo Colchicon quod Arabes, & Officinæ
Her-

Hermodactylum dicunt venenum, nunquam inter sumendum. Mefue Hermodactylum Homeri Moly Germanis Pfaffenhoden & Naechblumē Narcissus Poëtarum fabulis celebratus. Potest fieri ut Dioscor. duobus in locis separatim hanc plantam explicarit sub Colchico radicem & folia, sub Narcisso florem. Hæc Tragus.

Cæterum, attestante Turnero, prudenter monet Matthioli. non amplius Colchici radicibus pro Hermodactylis esse utendum quem errorem Serapio ac Maurisani medici non animaduertentes vel negligentes Dioscoridis monita ac contra Galeni, Pauli, Nicandri & Plinii mentem perperam inuenerunt.

Castor. Dur. pag. 147. Colchicum, Bulbus agrestis pag. 142. falso Hermodactylus Pharmacop. in pilulis ad Arthritidem, pro eo non ponant Colchici radices. Item pag. 169. Iris sylvestris καλχιδος tunc Ephemerum Arab. Zuringem. Miramur cur Castor eiusdem plantæ duo faciat capita & duas ponat figuras: videant etiam lectiores an postremo loco non confundat cum Colchico, Ephemerum lethale.

Fallop. de purg. Hermodactyli radix, Arabibus est radix Ephemeræ Colchici. Hæc ille qui non putat venenatum ut postea ostenderetur. Non probo eum non distinguere vulgatum Colchicum, quod venenatum, ab officinarum Hermodactylis.

Clus. Hist. Colchicum vulgare Salmaticensis, *Quita merendaris*, quibuldam etiam *Villucita*.

In hist. pl. Lugd. non bene ponitur Icon Colchici vulgaris sub titulo Colchici Orientalis Matthioli, demendum igitur vocabulum Orientale, nec placet quod illa statuit Colchici seu Ephemeræ radicem medicamentis iammixtam non esse perniciosam.

Colchicum, autore Thelio, passim in pratis. Reperitur locis Septentrionalibus, prope Herburgum, flore etiam candido.

Tabernaicon. Colchicum masculinum, *Zeitlosen männlein*. In Hist. Colchicum 8. Item Colchicum femininum *Zeitlosen weiblein*. In Hist. Colchicum 9. Non demonstrat qua in re differant, nec etiam figuræ multum sunt dissimiles.

Græcis καλχιδών [Colchicum] ἡ ἐφαιμερος Diosc. (Ephemerum) & καλχιδος ἀγρος quibuldam, Bulbus agrestis. Germ. *Herbstblumen Zeitlosen* quibuldam *wissen wild saffran blumen* / *Maerchjuren* / & *Bundeshoden* / canis testiculi. Belg. *zeitlosen*. G. *Mort au Chien*, *Tue Chien*, Montb. *Des Violaires*. It. *Colchico*, *Zaffrano Saluatico*. Angl. *wild Safran*. Boh. *Ocun*. Hung. *Bofordyun* / quo nomine alias etiam stirpes insigniunt.

Nudus iste flos quem Colchicon, seu ut Officina (secundum Tragum) vocant, Hermodactylus, Autumni tempore fundit, hiemis aduentantis nos admonet. Quanquam verò exitu Autumni plerumque appareat: tamen non raro quoque circa Festum D. Iacobi primum in detonsis pratis, ac eo inde tempore usque ad finem Septembris mensis spectatur. Folia autem post flores generantur, qui primo statim Vere e terrâ erumpunt. Semen in æstate Iunio potissimum mense producit: Nascitur passim in omnibus pratis Germaniæ. Prata humida (ut notat Gesner) nusquam non abundant, Autumno florem Croci prodit nudum, & nullis omnino foliis. Colchicum Clusii omnibus Germaniæ & Vngariæ pratis obuium. Colchicum sine Ephemerone lethale.

Tora. II.

le, Basileæ passim in pratis florens Septembri & Octobri, Montspeli etiam provenit. Genevæ folia protrudit mense Aprili in pratis, Lugduni abundat in monte Roßberg prope Masinunster vidi florens Octobri. Montbelgardi passim floret Septembri, & Octobri etiam in Horto Ill. E. C. mense Februario: in pratis prope Montbelgardum vidi aliquot plantas florentes.

Radix in cibo accepta, tradente Dioscor. necat per strangulationem, similiter ut Fungi. Descripsimus ipsam, ut ne quis fallatur & pro Bulbo edat. Præter opinionem enim imperitos illi cit, ob suauitatem. Auxiliantur his qui ederunt, eadē quæ his qui Fungos supserunt. Lac item bubulum potâ. Quare si hoc addit, nullo alio opus est auxilio. Et rursus inter Alexipharm. Qui Ephemerum acceperunt, quod aliqui Colchicum, aut Bulbum sylvestrem appellauerunt, eos pruritibus per totum corpus concomitatur, velut à Scilla aut Vetrica excitatus. Internæ partes mortuum percipiunt, & stomachus cum multa grauitate exasuat. Inualecente verò affectione, per alium ferunt cruenta ramentis ammixtis. His auxilium ferendum est, velut his qui Salamandram hauserunt, & per vomitum, & per infusa per Clysterem. Antequam verò inualescat Venenum dandum est ipsis Quercus foliorum, aut glandium, aut Malicorii, aut Serpylli decoctum cum lacte bibendum: Aut Polygoni succus, aut Virgultorum Vitis, aut Rubi, aut Ferule teneræ medulla, aut baccarum Myrti succus cum vino. Sed & ipsæ Myrti, baccæ, tula, tritæ, & in aqua maceratæ, auxiliantur, si cremor ipsarum accipiantur. Facit similiter & Castanearum quæ Sardinæ glandes appellantur, pellicula mediâ, cruda cum aliquo ex relatis succis accepta. Originum item cum lixiuio potum. Exactè verò auxilium sentiunt, qui lac Aluminum aut bubulam calidam bibunt, & in ore tenent, ut hi quibus huius copia est, alio nullo auxilio opus habeant. Hæc Diosc. Eadem Paulus Aegin. de verbo ad verbum lib. 5. cap. 47. Calidum & liccum nonnulli Colchicum in secundo ordine, seu à medio recessu statuunt. Quanquam radix & flos huius plantæ ad abigendos & enecandos pediculos satis conferant, tamen vltis eorum præsertim si intro sumantur annuente Trago, minimè tutus existit, ut quæ plus detrimenti quàm veritatis allatura sint. Admonendi ergo mihi hoc loco sunt ii quorum interest pilulas pro podagricis præscribere & conficere, ne suis confectio.ibus Colchicon, seu Hermodactylum adhibere vident, quod hæcenus magno cum errore commissum fuit. Cæterum articulario morbo & podagra laborantibus vtilem esse radicem Colchici Arabes scripsere, quod & nos aliqua ex parte expertissimus, Verum tamen, cum foris fecus imponitur. Ferunt, legitur apud Hist. Lugd. Turcas Colchici floribus, uti cum inebriari volunt: eos enim vino macerant, quo epoto adeo stupidi redduntur, ut in egestatim abeant. Ad verrucas an accipit N. L. Ducis Wirtemb. Medicus Colchicum [zeitlosen] iudic, superligat, excidunt. Ad extripandos verò pediculos, latus pudendorum contundit radices Colchici, coquit eum aqua & locum affectum eâ abluat.

Vires, venenum & remedia.

Auxilia
Lac.

Ephemeræ
Colchicum
Bulbus
Iris.

Signa
as
sumpti Col
chici
Remedia.

Castanea
Sardinia
na glandis
pellicula.

Colchici flori
res mēbr.
ant.

COLCHICVM ALBVM CVM PURPV. rascentibus Lineis.

Colchici picti radix, ut & aliorum bulbosâ foris in fusco nigricans, intus alba est, & ex

Descriptio

illa parte (quod à nemine monitum est (vnde
florum caules erumpunt, in conum desinens, ad
quem in imo bulbi fibræ barbæ instar dependent:



Ex eo bulbo
caules nudi,
molles, splen-
dentes, candi-
di, striati, bini
vel terni pro-
deunt: in quo-
rum summo
totidem flores
(reliquis Col-
chicis figura
similes) can-
didi, purpura-
scentibus li-
neis, & macu-
lis eleganter
persperiti: ho-
rum quilibet
foliola sex ha-
bet ad quo-
rum singulo-
rum princi-
pium, singula

adnata stamina, vt in Tulipis, croceo puluere as-
peritis. Semen sequente anno in vesicariis trian-
gularibus Valulis fert fuscum, subrotundum, &
ex parte angulosum. Iunio mense maturum.
Iuuenimus in Heluetia in conuallibus ad radi-
cem montis Wasserfal & in hortum transuili-
mus Mense Septembri anno 1598.

Colchico vulgari similes bulbi.

Paucos colchici bulbos, vulgaribus bulbis valde
similes Neapoli Francofurtum ad me (ait Clus.
hist. post.) mittebat Ferdinandus Imper. qui mi-
hi Lugduni Batauorum demum flores dederunt,
vulgaris floribus non dissimiles, hoc est, vel dilutè
vel saturatè purpureos. Ex illis tamen, binos ha-
bui bulbos, quorum singuli quaternos aut qui-
nos flores protulerunt anno 1598. & cum infe-
quente, non adeò altè assurgentes vt in vulgari,
sed breuiiores, quorumque folia luci opposita
retellatim distincta apparebant, perinde
ac in dilutiore Fritillariz flore: semen etiam
abundè præbet id genus, sed in minoribus
breuioribusque capitibus quàm vulgare.
Francofurti ex Italia accipiebam semen vulgari
Colchici semini par cum suo laxo capitulo, her-
modactyli Syriaci appellatione, quod terræ cre-
ditum necdum germinauerat quum inde disce-
derem.

*Colchicum
di capitis.*

*Hermoda-
ctylus Sy-
riacus.*

COLCHICVM BIFLORVM.

Nouum & ratum Colchici genus est cuius
cognitionem acceptam fert Clusius Doctiss.
viro Moyssi Quadrato qui monebat Verno tem-
pore sibi obseruatum in montano quodam pra-
to, non procul Heydelberg, vbitum domicilium
habebat: edoctum tamen antè, similem inueni-
ri plantam, ex Epit. de Plant. C.V. Iohanni Cam-
erarii inclitræ Reipub. Noribergem. primatui
Medici. Io. Mulerus Pharm. Francofurtensis et-
iam asserbat, sibi adolescenti conspectum in
pratib. haliæ Sucuorum vicinis nouo Vere florens.
Perinde autem crallo id constat bulbi ac vul-
gare Colchicum, ex cuius infimâ parte vltis emer-
git quatuor uncias longus, ex membranaceo

inuolucro florem promens oblongo pediculo ni-
tentem, vulgaris flori formâ æqualem, sex foliis
constantem, sed minorem, quorum terna exter-
na maiuscula,




interna autè
tria angustio-
ra & breuior-
a, saturatius
paulò purpu-
rascentia esse
videbatur: nec
folia, nec se-
men (si quod
tulit) obser-
uare licuit
Clusio per
morbum.

Loebel. Ani-
mad. part. 2.
Colchicū bi-
florum vulga-
ri simile, sa-
turiore flore
Clusii & Ca-
merarii. Con-
siderandum

an hoc Colchicum biflorum non sit idem cum
Camerarii verno, licet aliam iconem proponat
Clusius.

COLCHICVM VERNVM CLVSII.



Quadrage-
simo pri-
mo capite l.2.
mæ Rario-
rum plant. his-
toriz, inquit
Clus. Exor. p.2.
Appèd. 2. Col-
chici verno
tempore flo-
rem proferen-
tis mentio-
nem faciebâ,
quod tandem
biflorum esse
existimasse:
quia nouo Ve-
re cum suo
flore acceptū,
deinde Autu-
mno cum aliis
colchici gene-

ribus florem conspexissem. Quum autem non ni-
si Autumno flores gestare possea obseruarem, istâ
appellatione illi conuenire non sum arbitratu-
s, sed præter naturam insolito tempore primum il-
lum florem tulisse censiebam, vt in aliis plantis
interdum contingere videmus.

Verum tamen peculiare Colchici genus repe-
riri, quod nouo duntaxat Vere, cum Croci verni
& dentis Canini generibus, non autem alio tem-
pore flores gerat, Doctiss. vir Io. Vernicius
anno à Christi natiuitate 1601. Iulio mense ad me
scribebat, & sex eius bulbos mittebat, quos illo
ipso anno è monte Sorou in hispania eruerat. Ho-
rii quatuor insequente Vere apud me flores tuler-
unt: vnus florentis, atque alterius cū suo capite
trigono semen continente iconem in subiecta
tabella

tabella exprimendam curabam. Non porro Verre cum Dente canino, Crocoque verno, vt dicebam, hoc Colchici genus prodire, & vnum aut alterum florem vna cum foliis producere solet, primis quidem diebus, antequam sese explicare & pandere incipiat, coloris albi, sed qui paullo post in purpureum dilutiorem mutetur, breui pediculo subnixum, sex foliis constantem, minoribus & angustioribus quam in vulgaris flore, & Croci verno albo flori formâ valde similem, singulis foliis ex infima sede album stamen profertibus, cuius apex flauus: exteriorum trium foliorum stamina interiorum staminibus sūt breuiora: & medio floris vmbilico oblongiutculus exilit stylus, staminum longitudo superans, albus, in tres partes summo diuisus. Nascebatur verò flos ille interterna folia carinata sese mutuo completentia, Colchici vulgaris foliis longè angustiora, montani tamè Hils. foliis paulò latiora: flori succedebat triângul. membranaceû capitulû haud magnum, semen continens rotundum, subrotundum: radix Colchici vulgaris radici siue bulbo, formâ quidem similis erat, & fusca pelle obducta, sed longè minor, multas candidas fibras ex infima sede protuberante spargens. Plures similes bulbos anno insequente cum aliquot aliis elegantibus plantis ad me mittebat idem Venerius atque ad Hogelandium & Porretum: sed meos cum iis qui prius missi, & plurimis aliis leuissimis plantis subsequens hiems corrumperebat: vt plustquam Cannensem cladem meus hortulus illa hieme acceperit, tamen etiam non vulgarem duabus præcedentibus passus esset.

COLCHICVM VERNVM CAMERARIJ.



Colchicum Verre florens, cuius floré mense Aprili nonnunquam inuenit Camer. in Epit. Matthiol. prodeuntem ex foliis breuiusculis, ternis, herbaceis, quibus antequam emergat inuoluitur. Flos ipse obsoleto colore purpurascit, quam qui Autumnoprodit, apices

paruos luteos habet, & totus etiam minor strigosiorque apparet.

Gesner. annotauit apud Camer. horti, Colchicum subobscurè flore præ altero & minore crescere circa Tigurum in Heluetia Aprilis initio, cum alia omnia in Autumno florent.

Considerandum, an Colchicum vernum non sit idem cum colchico bifloro Clusii, vel eius verno, quamuis Icones differant.

Colchicum Polyanthes siue multiflorum purpureum.

Nihil à vulgatissimo Colchico differre videtur, præterquam florum abundantia: denos enim, duodenos, & plures purpureos dilutiores Septembri profert flores, quemadmodum Colchicu

Tom. II.

Pannonicum polyanthes candidos eodem tempore. In Cameracensi deuexo agro, miliari paruo ab vrbe, in villa Nierui vocata, quo loco D. I. Frâqueville collegit. Perperam Pseudobotanici nuperi nugivenduli Colchicum purpureum Austriacum dixere, Lobel. Adu. par. 2.

COLCHICVM POLYANTHES CANDIDUM eleganti rubore varium.

In deliciis est (inquit Lobel. Adu. par. 2.) perlelegans Colchici genus in Belgio, etiamque Londini in horto plantarum exoticarum ditissimo D. I. de Frâqueville, ob floris amenitatem quunque vtr plurimum foliis latiusculis præditi, nonnullis candidis omnino, aliis verò rubore diluto prorsus tinctis, aliis candore & rubore hilari secundum folii longitudinem dimidiatim distinctis, aliis denique medio lineis albis striatis. Quos flores edidit congestos, quorum vnus quatuor tantum foliis constabat, quam aliorum latioribus: totidem item staminibus luteis præditus: at ceteri omnes quibus donati fuere. Folia latiora vere erumpunt, cubitalis longitudo, altiorisque, haecenus neque semen, neque folliculos, iâ octauo anno edidit. Bulbus Colchico Pannonico albo maior.



COLCHICVM POLYANTHES ALBVM.



Se deserti-
bit Clus. Descriptio
Pann. & Hist.
post. Colchi-
cum, mias-
des albo flore.
Multorum flo-
rum est, quod
in quibusdam
pratis Viennæ
Austriæ vicini-
is, nec procul à Danu-
bio sitis, inter
vulgaris plan-
tas nascens
ante multos
annos obser-
uabam, vt in
hortulâ trans-
ferrem, deinde
in pratis
arce Staren.
lii 2

berg Magnif. Da. de Meufenstein vicinis, magna copia inuentum est. Septenos enim, denos, aut duodenos, vel etiam plures interdum promit flores lactei candoris, eleganti spectaculo: huius etiam folia, vulgaris Colchici foliis æqualia, sed dilutius virentia, inuente duntaxat Vere exeunt: copiosum fert semen subrufum in laxis triangularibus capitibus: radix, vulgari bulbo maior, ad Secundi tamen, siue insequentis, amplitudinem non accedens. Istic & pauci bulbi reperti, quorum flores eleganter rubebant.

Col. hircum rubro flore.

Camer. epit. Matth. Colchicon polyanthon flores albos proferens. Item horti, Colchicum Pannonicum polyanthum flore albo: quamuis in Germania quoque interdum flore albo reperitur, sed non ita referto in vna planca. Plant. ic. p. 144. Colchicum candidum Pannonicum polyanthon Clusii. Teut. 127.

Locus & tempus

Colchicum simile Anglico flore albo, Aurumno pratis quibusdam Viennæ Pannoniæ vicinis, non procul à Danubio cruit Clus. Hist. radicibus magnis, quæ nonnquam senos aut octonos flores simul protulissent.

Tabern. icon. Colchicum Polyanthos: & Hist. par. 2. p. 311. Colchicum 4. Item p. 620. Colchicum album Pannonicum Vngeris & zeilosen. Hist. Colchicum 7. Ponendæ erant eius duæ icones sub vno titulo & in eadem pagina, vna enim monstrat florem sine foliis, altera folia cum fructu sine floribus: nec numero distinguendæ erant.

Tabern. not.

Hunc Bulbum charissimus F.C. Bauhinus misit Basileâ, vegetum admodum mense Augusto ann. 1608. qui terræ commissus, floruit in horto E.C.W. Montbelgardi Septembri.

COLCHICVM CANDIDO flore Anglicum.

Descriptio



alioqui pratensis vulgaris sunt: ea tamen foris fulca, intus candida. Londini hortis mense radices Hyemem ferunt, Vere emergunt, non secus ac in collibus & montosis prope Bristoliam &c. Aduers. Lob. Obs. & Ic. Pl. p. 143. Colchicum candido flore Anglicum. An Moly Homericum radice nocua.

Moly Homericum. Lobel. not.

Considerandum an Lob. verè dicat Colchicum Anglicum candidum, nusquam memoratum, & an differat à Cordi candido, de quo multis annis

antè scripsit in sua hist. his verbis: Colchicum album floribus, foliis, semine, & radice Colchico nigro & subrubenti simile est, qualitate tantum ab illis differt: siquidem radix etiam cum succata fuerit foris albicat, quamquam interdum flauescat cum inueterascit, intus verò candidissima, tenera, in tundendo mitis, mollis & tractabilis existit, quæ tusa farinam triticæam aspectu refert Saporem habet dulcem & valdè suauem, nulla amaritudine mixtum, spontè in Germania nascentem nondum vidi, sed cultam tantum, & è longinquis allatam lucis.

Verisimile est (inquit Dodon. purg. hist. & in fol.) albidum huius peregrini Colchici radices esse, quæ in Officinis Hermodactyli nomine videntur: qui non propriè Colchicum dicitur. Monendi lectores ne considerato solo colore floris Colchici sibi temerè persuadant vel non venenatum, vel eundem cum Hermodactylo officinarum: Anguillara & Lobel. volunt Hermodactylos officin. alterius differentis plantæ esse radices, nempe Colchici Illyrici.

Clus. Colchicum Polyanthemum Pann. affine, siue Anglicum albo flore.

Tabern. icon. & Hist. Colchicum album Anglicum. Item Colchicum album Germanicum. Duas icones habet Tabern. verum non demonstrat quæ in re differant plantæ.

Thalio in Hircyn. Colchicum flore candido quod propè Ilfenburgum reperitur. An Camer. hort. Colchicum flore albo, quod in Germania interdum inuenitur? Histor. Lugd. Lobelii Colchicum flore candido Anglicum.

Colchici albi nomine missum Heidelbergâ semen paruum, magnitudine ferè simile Papaueris Corniculati, non omnino rotundum, penè cinereum: sed Montbelgardi in Horto Ill. E.C. An idem fuerit cum præcedenti dubii hæremus.

Colchicum pratense Salmaticum.

Colchicum pratense Salmaticum vulgari minus Salmaticensi agro obseruabat Clusius in altioribus pratis, dilutiore flore, atque in nonnullis plantis, lactei omnino candoris, inuente Vere folia duntaxat proferens. Hist. Lugd. Colchicum vulgari minus, flore omnino lacteo Clusii in pratis Salmaticis.

COLCHICVM PLENO FLORE



giè expressam addidit.

Flos vulgari colore perti-

Elegans est genus, quod apud Belgas inuenitur, cuius quidem cognitionem acceptam fero (inquit Clusius) Ill. Comiti Arembergio. Is Autumno 1595 bulbum ad me mittebat, vt florem conspiceret possem: sed cum nulum protulisset insequentem Nouembri iconem egregiè expressam addidit. Flos vulgari colore perti-

perisimilis est, sed pluribus foliis constans, nempe vicenis aut pluribus, valde confertis, quorum sex externa reliquis maiora, vulgaris tamen foliis angustiora, inter quæ *stamina*, vt in vulgari, flauis apicibus prædita. Ex alimentis copia plenum florem tulisse existimabam initio, quemadmodum natura interdum ludere solet in aliis floribus qui deinde ad ingenium redeunt: sed ipse Comes affirmabat, tum etiam Io. Boissot, singulis annis plenos flores id Colchici genus proferre, eosque plures, maiores, & maiore foliorum numero constantes quò bulbus maior & vetustior est.

Originem ex Germania ducere aiunt, & primum in Belgium allatum à Rhizotomo, cuius nomen Nicolaus, qui frequenter è Belgio in Germaniam à Nobilibus quibusdam marronis ablegaretur. Huius autem Colchici plenos flores anno 1599. obseruabam esse versicolores & folia habere coloribus similibus distincta, quibus Colchici versicoloris alterius flores distincti sunt, hoc est, ex albo & dilutius purpurascente mixtos. Colchicum pleno flore Antuerpiâ Londinum (Lobel. Adu. par. 2.) misit Clariss. vir D. Aluarus Nunnius summus Philos. & Med. parum à vulgari Colchico, nec nisi concoloris floris multiplicabili incremento diffidet. Surreptus fuit eius bulbus cum aliis plantis Nobiliss. Baronis Zouche.

COLCHICVM BYZANTINVM latifolium Polyanthes.

Colchicum Byzantinum *πικρία ανθε* nouo Vere germinat, ternâq, aut quaterna producit folia amplissima, Elebori albi foliis nec formâ, nec magnitudine valde ab similia, nec illis minus neruosa, magis tamen viridia, & sese mutuo amplectentia: Autumno cum vulgari numeros fert flores, vt vicenos aliquando ob-

seruare meminerim [ait Clusius Hist. post.] ex eodem bulbo prodeuntes, vulgaris quidem floribus forma & colore propè similes sed ampliores, crassioreque pediculo subnixos, foris dilutius, internè saturatius purpurascetes, & tanquâ venis quibusdam per folia sparsis notatos. In quibus *stamina* vt in vulgari: latis copiosum *semen* fert interdum in triangulis laxis breuib; capitulis siue folliculis, triplo crassius vulgari: eius *radix* crassissima, pugnum æquans vel etiam amplior.

Constantinopoli singulares eius bulbi bis sūt allati dum Viennæ vivebam: Gen. D. de Heusenstein, à qua prolem accipiebam.

Tom. II.

Colchicum Lusitanicum purpurei cum albo mixti coloris.

Cum Byzantini flore quandam affinitatem, autore Clusio, habere videtur flos eius Colchici, quod Theod. Clurius è Lusitania acceperat: nam sex etiam foliis constat, purpurei cum albo mixti coloris: & velut tessellatim [vt in Fritillariæ flore] dispositi, floridioris tamen: umbilicam etiam occupant sex alba *stamina*, flauis apicibus prædita, & medius *stilus* in staminula diuisus, purpurascens supremâ parte coloris: odor aut nullus, aut valde obscurus. Floret cum reliquis Colchicis.

Descriptio.

Colchicum Lusitanicum serotinum flore albedo cum tantillo rubore.

Bulbum adnatum sibi annexum habet, inquit Lobel. Obs. flos albidus, nitidus, tantillo summis foliis rubore confusus: alioqui perisimilis effigie & magnitudine vulgato nostro Colchico, quale Licra Brabantorum floruit Septembri & Octobri in amenissimo horto Mariæ de Brimeu.

Colchicum latifolium Boissot.

Quantum genus à Boissoto accipiebam (pergit Clus. Hist. post.) crasso etiam Bulbo, quod terræ commissum non modò non floruit, sed prorsus periit. Scribebat autem eius florem purpurei coloris esse, qui procul aspicientibus vulgari par appareret, at diligentius obseruantibus, coloris ex albo & purpureo distincti videbatur, satis ad Fritillariæ colorem accedens: folia item habere ampla, ad terram inclinata. Postea tamen, conspecto Colchici Byzantini, cuius bulbam ad ipsum mittebam, flore, diuulsum à meo latifolio, suum Colchicum esse monebat. Forsitan verò idem genus erit, cum Lusitanico Clurii.

COLCHICVM ΠΙΚΡΙΑΝΘΕΣ sue versicolore flore.



Colchicum *πικρία ανθε* siue tertium genus [inquit Clus. H. post.] habeo munere Generosi Dn. de Heulsteijn, quæ in cultissimo suo horto suburbano ad Viennam urbem, binos aut ternos alebat, quos vix de adquisiisset, ignorante se affirmabat. Non minus est crasso id bulbo, quàm Primû, vel etiâ crassiore: Octo-

bri, paullo seriùs quàm superiora, binos, ternos, aut quaternos, producit flores, vulgari breuiore, & breui pediculo innixos, vt vix supra tellurem attollantur, quorum interiora tria folia ex pur-


purâ quodâmodò rubent, aut Hispanici montani floribus concoloria sunt, vt plurimum, exteriora autem tria vel omnino lactei candoris sunt, vel internè mediâ ex parte purpurea, aut crassioribus purpureis venis radiatim distincta, vel purpureis maculis aspersa, omnia verò mucrone magis orbiculato & obtuso quàm in vulgari: huius folia in eunte Vere germinantia, ex viridi purpurascunt, deinde explicata saturius virent vulgari foliis. Semel duntaxat eius semen legere memini, prioris semine minus.

Colchicum montanum alterum.

Aliud (inquit Clusius) Colchici versicolore flore genus accipiebam ab honesto viro Theodor. Coornhart anno 1599. quod *bulbo*, & *foliis*, cum vulgari profus conueniebat, & perinde altè affurgebat, flores proferens vulgari floribus formâ quidem similes, sed diuerso colore, ex albo videlicet & purpurascens vario, dissimili tamen à præcedente, quia in hoc colore magis permixti, & purpurascens dilutior: binos vel ternos tulit flores, quibus successerunt longa, crassa, & trigona *capita*, vulgari capitibus npr dissimilia *semen* etiam simile continentia. Florebat cum vulgari, paulò maturius præcedente.

COLCHICVM MONTANVM flore purpureo.

Descriptio



sto, sex longis, angustis, & ex purpura rubentibus foliis, totidem medio *staminibus* constans: hunc statim (præter aliorum Colchici generum morem) folia subsequuntur, & totam deinde hiemem perdurant, vsque in Mensem Maium, vel etiam Iunium: *radix* bulbosa, non magna, multis ex rufo nigricantibus tunicis amicta, intus alba, solida, & cum quadam adstrictione dulcis, longiusculâ sede, quali in ceteris generibus, & adnatis in lateribus se propagans. Et sic descripsit Clusius, qui passim tum in Hispania, tum in Hispania, postea Colchicum montanum Hispanicum, siue quintum *λεπτόενδον*, aut tenuifolium, Salmaticensibus Merenderas vocatum, appellat.

Colchicum minus semine prægnans. Item

Colchicum minus florens, Colchicum montanum Clusii: Cuius minorem speciem, olim latissimis pratensibus pascuis ad montis Lupi Norbontensis radices, ad diuersorium publicum, via qua Gangen vrbeulam itur, collegimus [inquit Lobel. obs.] Septembri *sterculus* itellatus croceus, aut Colchici vulgaris purpureo-ceruleus erumpit, sed minor. Idem esse audio cum Colchico montano Clusii nostri, quod olim seuerat in horto Cl. D. Brancionis pro Erythronæo, foliis croceis, angustioribus, in cauliculo vix palmum æquante, & interdum etiam maiore. Semen subrotundum, Colchici vulgaris, in filiqua triquetra. Icon. pl. p. 145. Colchicum minus semine prægnans Lobel. 70. Teut. 178. Item Colchicum minus florens siue Colchicum Clusii Teut. 178. Obseruandum apud Plantinum in hoc Colchico titulum, transpositum, figuræ autem sunt ex Clusio.


Hist. Lugd. Colchicum montanum Clusii, & Colchicum montanum minus Clusii.

Tabern. icon. p. 621. Colchicum montanum Clusii & Hist. Colchicum 10. *Bergzeitlosen*. Item p. 622. Colchicum minus *Hein zeitlosen*: & Hist. Colchicum. II. Inepre Compilator ex vna planta duas facit.

An Camer. hort. Colchicum paruum Hispanicum.

Collibus Salmanticæ vicinis, solo valdè lapidoso primùm eruebam, inquit Clusius, cum suo caule, dodrantali, firmo, & triangulari capite, in quo semen ex rubro nigrescens, siue fuscum, læue, exiguum, subrotundum Maio mense, anno 1564. Apud Belgas, apud quos, semine quod natali loco collegeram, natum est, nullum adhuc semen dedisse intelligo. Viennæ autem Austria, quoties ex meis stirpibus semen collegi, capite inclusam vix terrâ interdum emergente, & inter folia iam languida latente, aliquando digitali & palmari cauliculo innitente, vti etiam Francofurti ad Moenum, & Lugduni Bataurorum.

COLCHICVM MONTANVM minus versicolore flore.



Colchicum montanum minus versicolore flore (vt ait Clus. post. hist.) Hispanicum non multum est ab simile, quod Jac. Planteau in suo horto Tornacensi alere ad me scribebat, tum foliis, tum bulbo: flores autem differre, quorum omnia quidem folia longa & angusta etiam essent, interiora verò tota alba, exteriora media ex parte viridia, altera carnei quodâmodo coloris.

COL.

COLCHICVM MINIMVM TENVIFOLIUM Gallæcum

Nouum Colchici punili genus (inquit Lob. Adu. par. 2.) salinus in horto operâ le Quelz rhizotomi Luteriani ex Hispaniæ regionû Gallæcia delatum, foliis Croci montani minoribus; humi sparsis, binis, ternis, quaternis aut quinis, carinatis; vncias binas, aut sesquiunciam longis (mibi folia duo solum dedit.) Radice Colchici, Auellanz parua nucleum æquante; flore vnâ cum foliis prodeunte, seris constante foliis angustioribus, purpurantibus: totidemque flami-

nulis, & apiculis luteis præditis, è breui pediculo parum è terra emergente. Floruit nobis Anno 1401. Hoc etiam alitur in hortis Londinensibus, exoticis plantis ditissimis D. Coys, & D. I. Natlinit Botanici Regii primarii & Chirurgi.



HERMODACTYLI VETERIBVS.

CAP. VIII.

Quod magno & pernicioso errore Serapio Colchicum & Hermodactylum confuderit, describens hunc iisdem planè verbis, quibus Dioscor. Colchicum, confirmat Paulus Aegin. l. 7. de Ephemero & Hermodactyli scorum, tanquam de diuersis tractans, ac quidem de Hermodactylo. Hermodactyli radix (inquit) & per se, & ipsius decoctum vim habet purgandi: priuatim etiam arthriticis nunc quum humores desluunt exhibetur: verum stomacho nimis quam aduersatur. Quidam verò in ipsis exacerbationibus, in omnibus arthriticis purgatione ex Hermodactylo vtuntur, verum attendendum est, quia stomacho incommodus est Hermodactylus & anxios ac ciborum inappetentes facit. In folis igitur his qui negotiis quæ differri non possunt vrgentur, ipso vtendum est, Compendio enim & post duos vt plurimum dies sedat fluxionem, vt quis ad consuetas functiones obundas transire possit. Noui autem quendam qui non ipsam Hermodactyli substantiam exhibet, neque aliquod medicamentum ex ipso compositum, sed herbâ ipsam coquit, cum aliquo ex consuetis pharmacis, velut Aniso, aur Apio, & decoctum bibendû præbet. Et mirum est quomodo per Ventrem euacuati à fluxione liberantur. Oportet autem præterea quodd stomacho incommodus est, velut dixi, postea stomacho gratis, & corroborantibus, vni moderata caliditate, oculum ventris corri-

gere. Caterum Alexander purgationem ex Colchicorum, meliorem esse dicit eâ quæ fit ex Hermodactylo, vt quæ eandem euacuationem & dolotis sedationem efficiat cum hoc, nec stomacho incommoda sit. Hæc Pauli.

Actuarius lib. 5. Meth. Med. cap. 6. de antidot. compositionem habet, quam vocat ex Hermodactylo, podagricis & arthriticis, vt quæ succos crudos ex alto detrahit, proficuum: Recipitq; hermodactyli, Galangæ, Pyrethri, Zingiberis, Zaduæ, Anisi, Gentianæ, Aristolochiæ, singulorum quadrantem, mellis sufficiens modum.

Inter alias quamplurimas compositiones purgantes, quas hic enumerare & longum & tediosum foret, Nicolaus Myrepsus in aurea Alexandrina recipit Hermodactylum rubrum & album. Quæ quidem compositio non instituitur ad purgationem.

De hermodactylo hæc Mesues lib. 2. cap. 9. de purg. hermodactylus est radix herbæ cuiusdam montanæ: & ea vel digitum longa, vel rotunda, ac eadem præstantior, si multum est alba, intus & foris, magna, medioeriter dura: alter Scillæ aut Raphano proxima, si creuit, si Vere lecta est, & menses deinde sex siccata est. Rubra autem & nigra mala est, & quæ in loco pingui & humido prouenit, quodd inde humor eius inflans, & excrementosus ei largior insit. Rara verò, laxa, & leuis est imbecillior. Calidus est ac siccus ordinis secundi initio, cum humiditate tamen excrementosa, flatulenta, nausæabunda, quâ ventriculo nocet, præsertim quando in eum ex parvis aliis excrementa confluunt, Pituitam crassam præsertim à iuncturis trahit, ob id podagræ, & aliis arthritidis differentiis confert, non sumptus modo, sed etiam Cataplasmate admotus, præsertim cum vitellis ouorum, & farina hordei, vel mica panis. Impinguat, sperma auget, vlcibus confert, quia terget sordem eorum, & carnem in his putrem consumit. Cuminum, Zingiber, Piper longum, Libysticum, Mentastrium, Mastiche, mista, hermodactylum prohibent, ne suo humore excrementoso, & flatulento lædant ventriculum, neue flatus crassos & nausæabundos, in eo excitet, aut multa in ipso excrementa colligat. Si verò hermodactylus cum paucis Zingibere, & succo Raphani, vel cum Scilla asata, aut Scillæ succo & Zingibere, & spica in trochiscos fingatur, purgat celerius & plenius (per se enim tardè & imbecilliter vacuat.) Myrobalani quoque roborando stomachum hermodactylos citò deturbat, & humorum in ventriculum affluxum prohibent. Datur ab aureo vno ad aureos duos: annos tres seruat.

Caterum hermodactylus radice oblonga, Neotericorum est Tagauicio Ephemerum Dioscor. Galeni & Pauli, vt indicatur sub titulo Colchici vulgaris. De hoc autem quod à multis dicitur & censetur hermodactylus sub suo titulo.

Existimat quoque Dodonæus hermodactylos Officin. esse Colchicum flore albo Cordi. Anguill. contrâ & Lobelio hermodactyli officin. sunt radices Colchici Illyrici luteo siue flauo flore.

Brun. tenet hermodactylum Narcissum esse Germ. Hornungoblam.

hermodactylus Mesur quibusdam est Pseudohermodylus, qui aliis Satyrium Erythronium censetur.

hermodactylus (inquit Tragus) mihi dicebatur Cyclamini parua species, sed falsò.

hermodactylo tandem non venenato con-

Gorompei.

melior.

Hermod.
rubr &
albus Nf
col.

Herba m.

tana.

Longa &

rotunda.

Alba pra-

stantior.

Scilla aut

Raphano

similis

Rubra &

nigra m.

la

Corrosiui

Purgatio

Dosis

Hermoda.

ctyli æ.

quocu-

tiones &

substitu-

tiones

Ephemerum

Pterib.

Colchicum

Sulcare.

Colchicum

flore albo.

Colchicum

Illyricum

flauo flore.

Lencotus

bulbosum

Theoph.

Satyrium

Erythroni

quorundâ.

Cyclamen.

tris bulbo-

sa.

ner Lobelio, videtur Iris bulbosa latifolia hispanica Clusii.

zest. tuberosa.

Math. suum Hermodactylum habet de quo cap. de Iride tuberosa, qui non placet Lobel. & Dodonæo, nec nobis.

Palma Christi sine Orchis palmata.

Hermodactyli albi & rubri [Lob. Adu.] Nicolai, Actuarii & aliorum, non Cathartici, sed Cordi, Venerique amici: an sint Behen album & rubrum eadem? Vocem Hermodactyli æquiuocam fuisse, & Ephemero Diosc. comparari potuisse, non modò caput Pentaphylli indicat [ut cuius radix Hermodactylus sit vocata, non tam similitudine, quàm superstitione & incantatoria expiatione,] sed etiam quæ extant apud Actuarium & Nicolaum celebres admodum compositiones arguunt. Quippe Aurca Alexandrina illa & Diamoschum Hermodactylo rubro & albo non carent, misceturque aliis apud Arabes compositionibus cordialibus, &c.

Hermodactyli unde dicti.

Hermodactylum ad verbum interpretantur Mercurii digitum (interpretas autem est Tagault.) quòd digitorum forsitan imaginem quandam exhibeat, quo nomine etiam Pentaphyllon Dioscorides appellauit. Vnde factum est, ut plures Pentaphyllon, Hermodactylon, esse arbitrarètur, Verùm Pentaphylli radix tantum à nostris hermodactylis vocatis differt, quantum lux distat à tenebris.

Fuchs. vir sua ætate celeberrimus in Nic. Myr. In auream Alexandrinam Hermodactyli rubri & albi &c. Per hermodactylos hoc loco & aliàs etiam Nicolaus intelligit radices, quas Officinæ hodie vocant Behen album & rubeam, Quod etiam facit Actuarius. Idem in antid. Elser putat per hermodactylum intelligi Been. Et lib. 1. c. 8. Actuarius certè, ut ex compositione Antidoti Diamoschi Sole Meridiano clariùs conspicitur, & Nicolaus Myrepsus multis in locis Behenum album & purpureum, nominant hermodactylum candidum & purpureum, forsitan quòd digitorum quandam imaginem radix illa exhibeat. In antidot. Actuarii & Moscho nullam mentionem hermodactyli inuenio, ut dixit Fuchsius, habet enim Antidotum propriam ex hermodactylo, in qua non videtur loqui de Been, cum dicat eam antidotum ex alto detrahère. Idem Fuchsius de com. med. 1. l. c. 94. hermodactylus Mesue radice digitali, est Behen.

Fuchs. not.

Been.

Quæ autem radix nobis hodie [inquit Matthiol.] Hermodactylus dici possit, difficile quidem fuerit discernere, quòd ex probatis rei herbariæ Scriptoribus hæcenus neminem inuenirim, qui notis vllis eius tradiderit historiam. Verùm tamen si ex vocabuli etymo coniciere licet, nil aliud significare videtur hermodactylus, quàm digitum hermetis. Vnde factum est, ut aliquando cogitauerim, an illa bulbacea radix, quæ manus humanæ formam refert, quamque vulgò Christi palmam appellant, ad hermodactylum accedere posset quòdque sumpta non modò vomitiones, sed & aluum cieat, ut testis est Nicolaus Florentinus, qui hac radice, pluribus factis vomitionibus, Biliotum quandam quaternarium curauit. hæc in medium proferre libuit, non quòd ita esse certò asserere auserim, sed ut rei herbariæ studiosis res hæc melius æstimanda proponeretur.

Been. Tormentilla. Palmata.

Gesner. epist. 1. 2. ad Occonem. Pro Been albo & rubro, si tormentillam ponitis, cur non relinquitis, quod ex maritimis tractibus adfertur Been rubri nomine? id enim à tormentilla colore, &

dore, saporè & nihil differt: à pallinacæ autè radice, quam been albo substituitis, toto genere differt tum forma, tum viribus. Ego pharmacopolis nostris ut vel radices, vel flores albos & rubros, Saccharo præsertim conditos, pro Been substituant consulo. Verum quidem utrunque facillè haberetur è Syria: est enim quod Allabe Barbariæ vocat Auicenna. Quæ radix, inquit Bellunenensis, similis est Rhaphano paruo, oblongo, aliqui hermodactylorum speciem quædam esse dicunt, & appellati apud Arabes etiam Buzzeiden. Sic ille. Actuarius etiam pro Been, modò hermodactylum album & rubrum: modò hehlenium album & rubrum scribit.

Diosc. [inquit Tragus] nullius meminit in scriptis suis hermodactyli, præterquam in Pentaphyllo, quod alias Tormentillam vocant.

Syluius in antid. pro Hermodactylo in doloribus iuncturarum substituit folia Anchusæ & dimidium Bdellii. Quod idem Placot. facit.

Notat Castor Dur. quod in pilulis aduersus arthritidem pro Hermodactylis, Pharmacopœi non ponunt Colchici radices, sed pro succedaneo videntur Centaurio minore.

Radix Hermodactyli habet virtutem laxatiuam, & similiter aqua in qua bulliuit, datur autem propriè in doloribus iuncturarum, in tempore fluxus humorum ad eas, verùm ipse est malus stomacho. Confert dolori Podagræ, & est laudabilis finis operationis eius, verùm nimis vñs eius facit putrificari musculos. Confert tamen iuncturis multum. Surgen albus augmentum efficit in spermate. Albus est bonus podagræ, sed rubeus occidit, & non est frigidus nimis, ita quod narcotizet, quia si hoc esset, non esset laxatiuus. Hermodactylus est calidus in primo gradu. Rubeus occidit, & albus confert podagræ, & desiccet vlcerà antiqua, & abstergit ea, & est frigidus & siccus in secundo. Si Hermodactylus esset calidus, mordicaret vlcerà. Hermodactylus est calidus, multæ caliditatis. Est calidus & siccus in principio secundi gradus, & habet proprietatem sedandi dolorem iuncturarum & Podagræ, & confert variolis, & melior ex eo est ille qui est interior & exterior albus, & quando frangitur, est contractio eius facilis, & non dura. Niger verò & rubeus sunt ambo interficientes. Errauerunt autem qui putauerunt quod ipse sit Lagia agrestis quæ defertur ab Africa, nam illa Lagia impinguat mulieres, quando bibunt eam, & humectat corpora sicca, & augmentum efficit in carne, & facit rubere faciem colore bono, quando datur in potu cum Sannich, est calida, caliditate forti, & commouet sanguinem, & acuit eum multum, & fortassis inducet potanti se dolores calidos, adustiuos, & infert nocumentum magnum, & ægri tudines sunt Erisipelam in capite & facie, & in membris aliis corporis. Hæc dicunt apud Serapionem varii, qui etiam de Hermodactyli temperamento & facultatibus contraria videntur statuere.

COLCHICVM MINVS MALIGNVM, sive Hermodactylus Officinarum.

Officinarum Hermodactyli, radices referunt nostri Colchici, sed quantumuis inueteratè extento sunt cortice minimè que rugoso, fusco, compressa Castanæ figura, in turbinem fastigiatæ: imò parte fibrarum vestigiis apparentibus, unde

vnde ad quoniam per longum insculptus cer-

nitur canali-
culus. Substā-
tia solida in
qua nullum
vel vestigium
fibræ vilius
apparer, faci-
le in pollinem
teritur, sub-
dulcem, em-
plastica pulci-
cula linguam
emollientem.

Ruellius
existimans
hermodactylo-
rum Officina-
rum esse Col-
chicum, vene-
num putat ef-
se : vti ante
dictum.

Tagautius
quoque Differentiam ostendens inter vulgares
hermodactylos & Colchicum vulgare securius
ait in totum ab eis abstinere, ac asserit non esse
Pauli hermodactylum : eius sententia in præce-
dentibus posita est.

Hermodactyli duo fastigia facit Mesue apud
Syluium, vnum radice digitali longitudine, quod
Ephemerum esse videtur Dioscor. Galeni & Pau-
li, radice oblonga. Alterum radice rotunda, & ea
foris vel nigra | quod Colchicum est Ephemerū
& deleterium, prædictis autorib' passim frequēs,
flore Croci per Autumnum erumpente) vel ru-
bente, vel alba, vt intus, quam eligit solam, si
crassa sit ac modicè dura, & ex loco edito lecta:
calida, sicca initio secundo gradus, stomacho ad-
uersissima est. Pileitiam crassam à iuncturis præ-
sertim extrahit, ob id podagræ, & ipsi arthritidi
prodest, per se, vel decocto sumpta, aut etiam
admota cum farina hordei, vitellis ouorum, mi-
ca panis. Hac omnino est, quam Paulus hermo-
dactylum vocat & ab vtroque Ephemero se pa-
rat, Veteribus indicta radix, vti & quæ rubens
Mesue dicitur. An verò quæ in officinis ostendit-
ur, horum sit Hermodactylus vel Colchicū,
discernere non est difficile his qui legunt, aut in-
tegras habent radices, nam delibratæ ad nos cō-
uehantur. Canis tamen largam eius vim per me-
depassus innoxie, & multorum turò hac radice
purgatorum experientia quotidiana facit, vt credam,
vel hermodactylum hunc esse Mesue, &
Neotericorum Veteribus indictum, vel saltem
non esse Colchicum. Aëuarium miror inter
purgantia simplicia hunc non descriptis, cum
toties eius meminerit in compositis medicamen-
tis, *hermodactylum λευκόν & ἄλινον*, alicubi appellans.
Serapio hermodactyli nomine principio Dio-
scoridis Colchicum repræsentat, deinde etiam
Ephemerum. De omni hoc genere Musa in exa-
mine simpliciu, & Tagautius suis in Mesue sim-
plicia annotationibus doctis pariter ac luculen-
tius accuratius scribunt. hermodactylus Mes-
ue probatur radice rotunda. Quæ in Officinis
est affirmatur mihi ab his qui legerunt frequen-
ter in Gallia Narbonensi & Prouincia, esse folio
nigro portacæ, flore per Autumnum Croci, sine
Croco tamen, foris nigra radice: quæ res decla-
rat esse Colchicum, innoxium tamen, aut saltem

innocentius experimur: fortè quia siccatum est,
nisi recens nobis vsurpatur.

Tragus hermodactylos officinarum reci-
pit pro hermodactylis Serapionis & Mesue
verum quod ait ipsos cum Paulo venenum dice-
re, putat idem esse cum Colchico, & iis abstinen-
dum in internis, forinsecus eis vrendum, vt fece-
runt Arabes.

Fuchsio quoque teste, hermodactyli Mesue, duo
facit genera: Vnum radice digitali longitudine,
quod non est nisi Behen, & minime Ephemerū,
non lethale, vt nonnulli existimant. Alterum
radice rotunda: quod idem, in duo particur
genera. Vnus enim habet radicem albam, crassā,
ac modicè duram, atque is est, qui in hodiernum
diem nomen Hermodactyli in officinis Medico-
rum retinet. Ac à Paulo quoque Hermodactylus
appellatur. Hic alii decoctionem molitur, pi-
tuitamque crassam ab articulis præsertim extra-
hit. Ceterum is, Paulo auctore, stomacho nimis
quàm aduersatur. Proinde aliqua quæ eius ma-
litiā corrigant ac vehementiam coercerant, illi
miscenda erunt: Vt sunt Cinnamomum, Masti-
che, Zingiber, aut Piper longum: Datur cum
Oxymelle Scillitico, aut melle rosaceo, pòdere
drachmæ vnius aut plus aut minus, pro sumen-
tis viribus. Alterum genus hermodactyli rotun-
dis, foris nigram aut rubentem radicem obtinet.
Atque is est, qui Croci flores per Autumnum
passim in pratis ostentat, & vulgò hermodacty-
lus nuncupatur. Græcis vetustioribus Colchicon
dicitur: is intra corpus ut pore venenatus, turò
haud fuitur.

Hermodactylus non minore copiâ reperitur
apud Monachos in Mesi. In montanis, inquit, præ-
tis, & aliis locis grossi, & pulchri sunt, quod si
nesciuissemus eos esse malignos, aliquando co-
medissemus ipsos. Quoniā vt Dioscor. refert] re-
centes magnam voluptatem affrunt aspicien-
tibus, & præcipuè incautis de illorum malignita-
te, eò maxime quòd dulces gustatu sentiuntur.
Sed nescimus delicare eos sicut Orientales fa-
ciunt. Pluribus enim modis tentantes experiri
ipsorum desiccationem, namquam effectum de-
siderii nostri consequuti sumus. Etenim multos
de hoc interrogauimus à quibus varios accepi-
mus modos. Verum tamen semper omni modo
efficiuntur duci vt lapides, rugosi, & vti Carbo-
nes nigri, forsan quia alio solo & celo nascuntur.
Colchicon Græcè idem est quod Hermodacty-
lus. Latine etiam Bulbus agrestis dicitur. Au-
thorem noster in proprio capitulo duo gene-
ra facit. Vnum quod est longum, vt digitus, a-
liud rotundum. Rotundum quippe est Colchi-
con. Pro longo autem putamus intellexisse E-
phemerum, de quo Dioscorides separatim capi-
tulum fecit. In quo dixit Ephemerum habere
radicem &c. Non obstante quòd dicat Colchi-
con etiam ab aliquibus Ephemerum, vocitari. Si-
militer Serapio in vno suo capitulo de hermo-
dactylis, duo cap. Diosc. constrinxit. Scilicet c.

de Colchico & capitulu de Ephemero, vbi per E-
phemerum Barbarè Achimeron legitur. De ro-
tundo autem, quod est Colchicum, Author no-
ster similiter, vt Serapio, posuit tres differentias,
scilicet, quod hermodactylorum alius est albus,
& alius rubens, & alius niger. Et quod albus
est eligendus, rubens verò & niger sunt mali.
hermodactyli quidem aromatici & herbarii
noti sunt. Sciendum tamen quod recentes non
sunt administrandi. Teste ipso filio Mesue, qui

Behen.
Non Ephemerum.

Hermodactylus officinarum.

Hermodactylus.

Hermodactylus albus officinarum.
Colchicum.
Hermodactylus vulgus.
Colchicon.

Locus

Hermodactylus officinarum.

Hermodactylus longus.

Serapio duo tangit caput.

Hermodactylus aromaticus.

Error in-
scriptis A-
uicenn.

Hermoda-
ctylus 2 spe-
cies Dodonaei.

Scrapio re-
p. ch. indi-
tur.

Reuocanda
Hermoda-
ctyl. Vulg.

Cruciatu-
hurgus no-
satur.

sic ait. Et meliores sunt, in quibus iam praeterit
medius annus, post bonam eorum exsiccationem.
Auienna autem dicit, quod est radix
plantae habentis Rosas albas & citrinas: in quibus
rebus manifestatur vel ipsius, vel interpretis
eius mala intelligentia, scilicet quod pro flore
Croci albicante (vt in Diosc. legitur), intellexit
flore Croceum, scilicet Citrinum, & album.
Vnde dixit: Rosas albas & Citrinas.

Secunda species Hermodactyli Dodon. gall.
quae inuenitur in officinis vocatur à Paulo Aegina-
eta, Mesue, Serapione, & à quibusdam aliis an-
tiquis medicis Graecè *ἡρμόδακτυλος*, Lat. *hermo-*
dactylus, ac hoc nomine in Officinis cognoscitur.
Is autem quo in medicamentorum compositionibus
vitur (ait idem Dodon. hist. purg. & in fol.) ab isto
differs est. Bulbus nempe huic magnitudine &
formâ satis respondens, verum resuscitatus, &
albidus permanens, nequitiam rugosus, modicè
durus, tûdique facilis, cuius puluis candidus est.
Valerius Cordus Colchicum quoddam reperi-
ri scribit superioribus simile, sed flore candido.
Nondum ego ausim asserere cum Dodon. Colchicum
album Cordi idem cum Hermodactylo Officinarum.
Cordus non separat figurâ, sed colore albo à vulgari
Colchico; Colchicum autem Illyricum cuius radices
volunt esse Hermodactylos Anguill. & Lobel. differunt
colore luteo & figura.

Dilucidum est Cronemb. de comp. med. duo Ephemeri
genera ab Hermodactylo Pauli discreta existere,
& quàm imperitè Scrapio dum vni-
co velut pallio insectiam suam tegit, de triplici
planta prodiderit. Iam si sincero iudicio, & ad
amissum, vt dici solet, Dioscoridis atque aliorum
Graecorum Colchicum spectemus, conferamusque
vulgari Officinarum Hermodactylo, procul dubio
eamdem omninò radicem comperiemus. Quapropter
haud iniuria esset, ab consuetudine medica eliminanda.
Et si quispiam imperitè arrogans mihi quotidianam
eius securitatem obiiciat, illi respondeo, vel eò
mitiorem nostris hominibus videri, quòd in Colchico
solo non exeratur: Sed in vniuersum innoxiam
esse, nemo sapiens pronunciat. Ego nulli autor
ero, vt temerè periculum subeat. Cronemburg,
nullam facit differentiam inter Colchicum vulgare
& Hermodactylos Officinarum, licet manifestum sit
discrimen.

Marth. vt antè ostendimus cap. de Colchico,
existimat Colchicum idem cum Hermodactylo
Officinarum; erroris accusat Serapionem, Fuch-
sium, & Monachos: denique reuocat omninò
Hermodactylos officinarum vt venenatos.

An Anguill. de hoc loquitur dicens: Colchicum
in Graecia & circa Sclauoniâ differt ab Italico,
radices portantur in Italiam & venduntur pro
Hermodactylo. Nostri [hist. Lugd.] Colchici
radices etiam pro Hermodactylo à quibusdam
vsurpentur, sciendum tamen ab Officinarum
Hermodactylo plurimum differre. si enim pere-
grini sunt, non perniciosi, vt multis seculis plu-
rimum vsus edocuit. Tabern. Hermodactylus
Officinarum Hermodactylus. Gabr. Fallopius tract.
de simpl. medic. purg. c. 3. tit. de Hermodactylo.
Hermodactylus est duplex, vnus est radix oblon-
ga digiti similitudine, & est Hermodactylus
Pauli. Hermod. verò Mesue est rotundus, & est
Ephemerum Colchicum Dioscor. & iste est in vsu
in officinis: & quamuis in Colcho sit venenum,
tamen in hac regione non est venenum. Vnus

ipsum praecipue est conficiendas pilulas de
Hermodactylo: pro decoctione autem, & pro infu-
sione raro est in vsu. At empirici probant vsu
Hermodactylorum, quia in morbo Gallico exhi-
bent puluerem ipsorum, & vinum etiam quod-
dam ex ipsis. Sed docti viri non exhibent sub-
stantiam Hermodactylorum, nisi & ipsi vntur
aliquando medicamentis empiricorum: ac cre-
bro exhibent pilulas de Hermodactylo. Dosis
Hermodactylorum ait Mesue, est à drachma vna
vsque ad duas. Sed Fallopius non vtitur Her-
modactylo in substantia: nec vidit vnquam
vllum doctum virum ipsis vrentem. Nullo
modo assentiri possumus Fallopio nullam fa-
cienti differentiam inter Hermodactylos Offici-
narum peregrinos & Colchicum nostrarum re-
gionum: quod non solum in Colchide venenum,
verum etiam apud nos, à quo caueant omnes,
quicquid dicat Fallopius: non sumus etiam vsi
Hermodactylo Officinarum, quum non desint
nobis certiora medicamenta.

COLCHICVM ILLYRICVM SIVE

Græcum non venenatum flore luteo,

Venetis munere Alberti Martinelli Alepo
Syriae euulsa à fratre Cequino habui [in-
quit Lobel. Obser.] Colchici Anguillaræ plan-
tas, pronis palmaribus septenis, denis, & duode-
nis foliis Colchici, striatis, mucronatis, reflexis,
in angustum fastigiatis, imbricatis, & lateratim
stipatis, è quibus in pusillo pediculo, flores ex-
crescunt lutei, pallentes, terni vel quaterni, Col-
chici parui minores, staminibus item concolo-
ribus: *siliqua* non dissimilis. *Radix* foris Cepæ
concretio-
ne: intus eua-
nida & vieta;
quia in cau-
lem, folia, flo-
res, fructus,
& semen vis
tota eruperat.



venenatum Anguillaræ [Lobel. Hist. Lugd.] Ta-
bern. icon. & Gerard. Colchicum Illyricum
Grecisch wisen zeitosen / Griechische Medow
Saffran.

Colchicum quod prouenit in Graecia & par-
tibus Sclauoniæ circa Sebenium Anguillaræ, non
illud est quod in multis locis Italiae inuenitur,
producit enim folia angusta, similia bulbo, reflexa
in terram radices euelluntur, ac in Italiae vene-
nales feruntur pro Hermodactylo. Proferit in
Autumno flores similes floribus Croci, sed mul-
to minores, tres aut quatuor in summitate cau-
lis,

lie dodrantalis. Colchicum Illyricum Anguilla-
re nunquam Clusio confectum.

COLCHICVM FLORE LVTEO
quorundaip.

Subest bulbos oblongus, mediocriter magnus,
unde fibrae aliorum more dependent, sapore
præditus amaro: filia è radice statim exoritur,
accedentia ad Leucoium bulbosum, carina-
ta, aerouirentia, & splendida, in mucronem ob-
tusum modicè deficientia, crassa, vnciam plùs mi-
nus lata, non totum dodrantem longa: inter hæc
caulis surgit palmo breuior, compressus, in cuius
fastigio, hiantè folliculo membranoso, flos appa-
ret totus luteus, Colchici florum forma, sex
foliis, totidemque staminibus & stylo lugeis con-
stans.

Hunc bulbum sic descripsit Clusius: Narcissus



Autumnalis
maior. Persi-
co. Narcisso
valde affinis
est. Narc. Autu-
nalis, tametsi
neutro flore
Narcissum æ-
muletur, sed
foliis foliis &
radice. Qui-
na autem &
fena habet foli-
a, oblonga,
pollicem lata,
præ viriditate
ferè nigrican-
tia, splendē-
tia, humi ple-
rumque spar-
sa, inter quæ
breuis exit
cauliculus vi-

ridis, rotundus, vix supra terram se attollens, cui
insidet flos superiori formâ similis, sed breuior,
flauo omnino coloris, ex membranaceo folliculo
emergens, cuius exteriora tria folia interioribus
maiora sunt, eaque velut amplectuntur, omnia
autem mucrone sunt magis orbiculato, quàm
Persici folia: sex stamina suis apicibus ornata, &
stilus è floris vmbilico emergunt: radix crassa est,
rotunda, intus candida, foris vt Narcissus nigri-
cans, nuius alia species inuenitur angustioribus
foliis, in reliquis cum illo conueniens.

Dodon. hist. Lat. Narcissus autumnalis maior,
& Narcissus Marcelli dicitur. Lobel. Obs. Col-
chicum luteum, an Ephemericum non venenato
Dioscor. congener: Narcissus Autumnalis Mar-
celli Vitgilii. Mutono flore luteo pallente. Li-
rium alterum Theoph. Dod. Adu. part. 2. Colchi-
co Narcissus Botanicorum: Narcissus autumna-
lis peritiss. herbariorum, siue Colchicum luteum
vocatam, cum à floris figura, tum à tempore flo-
rescendi, verum de hoc maiore & de minore ad-
huc certatur & ambigitur num referri debeant
ad Colchici familiam aut Narcissos, quia vires
non sunt exploratæ: quare peritiores multi in
dubium reuocantur, vt Io. Moutonius: Carolus
de Houcin. Apicis versusque naturæ videntur.
Radici siquidem concretio & textura Narcissi
familia, quàm Colchico proximior est: cætera
magis Colchicum æmulantur. Folia aerouirentia

Autumno cum flore luteo è breui pediculo pro-
deunt. Proinde liberum cuique erit Narcissi,
aut Colchicum, vel Colchico Narcissum nuncu-
pare. Clus. hisp. Narcissus Autumnalis quorundā
& maior hisp. Ag. genus amarillaz, id est, Lili-
um flauum. Idem hist. post. dicit, Nonnulli vocant
hanc stirpem Narcissum Autumnalem, alii Col-
chicum luteo flore, cum tamen nihil cum Col-
chico commune habeat præter florem, reliquæ
sunt Narcissi. Quod si Colchicum dicendum,
omnia Croci genera etiam Colchicum appellare
licebit: E Thracia allatum est Cedonari nomi-
ne. Poster non incommode forsan ad Lirium
alterum Theophrasti referri vel *variaz* & *omnes*
Græcè dici.

Tabern. icon. Colchicum luteum. Narcissus
autumnalis maior, Geel wifen zeitlosen. Et u.
Colchicum tertium.

C Bauhin. Phyt. Colchicum 10. luteum: Li-
rii alterum genus Theophr. lib. 6. cap. ult. variat
in hortis Belgii angustioribus foliis aurore
Lobel.

Sub Augusti finem, aurore Clusio, & Septem-
bri, germinare incipit, & plerumque flores. Gau-
det montanis quibusdam hispanis pratis, etiam
in Italia spontè nasci audio, [ait Clusius.] Ex
Thracia ante paucos annos etiam adferri cepit,
cuius bulbos quoddam siccitate pallefecerunt initio
Persici Narcissi esse putabam: sed emergentia il-
licò, postquam telluri fuerunt communi bulbi,
folia, omnem dubitandi occasione. n. ademerunt.
Colchicum flore luteo accepimus a D. Belle fon-
taine, plantandum in horto E. C. Vidi Argentinae
in horto Di. Friderici Meier, à quo bulbos etiam
habui: qui in eius horto virentia habent folia
Februario, & Martio: anno 1606. in fine Octob.
floruit in horto Ill. E. C.

Colchicum?
Et Thra-
cia.

Locus &
compus.

NARCISSVS PERSICVS CROCI FLORE
melino, Colchicis affinis.



Aplanè est
Clus. in Pann.
& in post. hist.
Narcissus Per-
sicus & floris
duntaxat pe-
diculo prædi-
tus veluti cro-
cum Colchi-
cūque: ex-
lit ergo è mè-
branaceo cu-
cull, tanquam
ex vaseulo, aut
rheca flos ob-
longus, Croci
aut Colchici
floris æmulus,
sex foliis con-
stans ex flauo
pallidcentib*,
quorum tria

Descriptio

interiora paulò angustiora sunt, externa latiora.
& summo mucrone nonnihil incurua, siue *am-
quem* quandam habentia, quâ interiorum mucro-
nem amplectuntur & comprehendunt, ingrati o-
doris & Pauperis quasi virus redolentis, *stamina*
sex medium florem occupant, an. foliorum vn-
guibus nata, sed interiorum foliorum reliquis

longiora, exilit è medio oblongior *stilus*, gracilis, & sine capite. *Folia* illi sunt Hemerocallidi Valentini non multum ab illis, lata, plana, eiusdemque cum illis coloris, hoc est, ad ærugineum tendentis, quæ ut plurimum conuoluuntur, aut sese circumagunt: *radix* crassa, bulbosa, à basi (quæ multis fibris donata est) statim extuberans, intus candida, foris pallidior quidem, sed aliquantum etiam nigricans.

Seinel duntaxat Constantinopoli allatum est hoc bulbi genus, mihi quæ (ait Clus. communicatum à Philiberto de Bruxellis, cuius antè meminimus, anni 1575. initio, quem postea variis amicis cum in Belgicâ tum in Germaniâ distribui. Initio Narcissum Autumnalem maiorem, ex bulbi forma esse coniciebam, in qua opinio valde me confirmauit flos sub finem Septembris emergens. Sed postquam folia non subsequi animaduerti, & ineunte demum Vere prodire obseruavi, eaque ab illius foliis colore differentia: tum exactius collatâ inter se utraque plantâ, dispares esse manifestè deprehendi: ætate breui inter folia caput pollicem crassum, breui pediculo inhærens, & in arena tellure vix emergens, ferè aliquoties obseruavi, quod cum inane esset, seminis conspiciendi spes omnis sublata.

Nomina
Lilium al-
terum
Theophr.

Nomen Schedæ illi addite inscriptum erat *Zarem cada persiana*, id est, Narcissus Persicus. Multum verò conuenire videtur, cum Narcisso uel Lirio altero Theophrasti, cuius meminit Hist. Plant. lib. 6. c. 6. florem amplum illi tribuens, coloremque [ut eruditiores volunt] inclinum non nigrum, figura oblongum, serotinumque admodum, post Arcturum & circa Equinoctium sese ostendentem, vel, ut sequente cap. ait, Autumnis primis imbribus, quemque lib. 7. hist. c. 12. caulium tantum floribus habere dicit.

Icon nostra facta est ad iconem quam habebat Clusius in Pann. eam autem in post. hist. mutauit quod folia attingit.

C. Bauh. Phyt. Colchicum n. siue melino flore. Narcissus Persicus Clusii. Quo nomine à Tabern. icon. & hist. cum Cam. hort. cognominatur. Frigori nostro libenter assuecit.

Colchicum vernum flauo flore.

Scribebat Iacobus Plateau [inquit Clusius Hist. post.] Colchicum se habuisse quod verno tempore flauum florem prorulisset: sed bulbum cum eruisset corruptum reperiisse.

Huius, ni fallor, meminit Lobel. Adu. par. 2. Narcissus luteus vernus D. Leet facie Narcissi Autumnalis lutei siue Colchico-Narcissi Botanicoz: Narcissina classis videtur noua, rarissima, & elegantissima planta, quæ quamuis tota facie Narcissum Autumnalem siue Colchicum luteum vocatum cum à floribus figura, tum à tempore cum Colchico florescendi referat, Narcisso tamè propior, quia vere nouo flores laxat. Nouus igitur hic Byzantinus Narcissus folia cum floribus luteis Vere laxat, & utrinque plura, bina & ternum vnciarum, quæ postea excrescunt longiora, Colchici Autumnalis lutei quadantenus: minora tamen paulo, & breuiora: cauliculus compressus ternas & quaternas vncias longus, floribus & staminibus luteis fastigiatus, præd. Colch. lutei similis, sed minoribus. Bulbus Narcisso Autumnali huius speciei similis, satis magnus pro Plantæ ratione.

hunc debemus D. Leet, insigni Londinensi negotiatori, Constantinopoli à suis mercatoribus cum aliis rarissimis bulbis transmissum.

COLCHICVM PARVVM MONTANVM luteum, aliis Narcissus.

Narcissus Autumnalis alter siue minor [Clus. Hist. post.] Octobri mense quemadmodum Persicus, nudum è vaginula membranacea profert florem sex oblongis & angustis foliis constantem, non æqualibus, nam exteriora paulo longiora & latiora sunt, omnia autem mucronata foris flauescencia, interius flaua, ad maioris colorem magis accedentia, flaua stamina medium florem occupant, odoratus est hic flos, soloque pediculo innitens, supra terram non attollitur: florem iam marcescente, emergere interdum incipiunt folia, ut plurimum autem, ineunte Vere duntaxat, terna aut quaterna, plana, viridia, & splendentia instar foliorum maioris, sed longè angustiora, & præter aliorum morem sese contorquentia, & cincinnorum instar conuoluentia: semen plurimum ipsis tulit anno 1591. initio lunii in capitulis vncialibus, ferè trigonis, rotundum, nigrum, cui inhærebat albicans quædam & spongiosa ab vno latere materia: radix pusilla, nigra tunica recta, inferioremque sede tenuibus fibris firmata. Secundus hic Narcissus potest dici *Narcissus immeris* & *uniflorus*. Mihi missus à Generoso viro Carolo de Houchin Colchici lutei minoris nomine, à Iacobo Plateau verò Colchici montani minimi lutei appellatione.



Lobel. icon. pl. p. 148. Colchicum paruum montanum, luteum D. 10. Monn. Teut. 182. Item Aduerf. par. 2. de Narcisso autumnali minore adhuc certatur & ambigitur, num referri debeat ad Colchici familiam aut Narcissos.

Tabern. icon. Colchicum montanum luteum minus, *Heim geel Berg zerlosen* & Hist. Colchicum n.

C. Bauh. Phyt. Colchicum 14. montanum paruum luteum.


NARCISSVS AUTVMNALIS minor & similes plantæ.

Vnicum cauliculus, digitalis longitudinis, gracilem, vacuum, habet hic Narcissus, in cuius summo florem Narcissinum odoratum, sex foliolis albis constantem, & in medio exiguum calycem flauum continet: flori succedit exile

exile trigonum caput, exiguum, nigrum, angulosumque semen continens: radix Narcisso Iuncifolio valde similis, minor tamen, multis candidis tunicis, lentoque succo prægnantibus constans, sed nigra quadam membrana tecta. Tota planta amara est, vt superiores Narcissi, verèque dixit Plinius, odorato, saporem rarè vili non amarum.

Icon quam damus plantulæ à Clusio descriptæ figuram & magnitudinem affabrè sanè exprimit.

Clus. hist. Narcissus quartus siue autumnalis minor. Et post. hist. Narcissus serotinus siue Autumnalis minimus: Incolæ in Hispania *Tomada* appellabant. Plant. icon. pag. 122. Narcissus autumnalis (vt & Dod. in fol.) parvus Clusii Lob. 62. Teut. 158. Lobel. B. 158. Clus. spa de Narciss. C. Bauh. Phyt. Narcissus 29. siue (cum Tabern. icon) autumnalis minor Clusii.



Nascitur plurimus ad Anam flumen in Turdalis, vbi (inquit Clusius) florentem, & suis capitulis iam maturis incipientibus erubam sub Octobris finem, nullis è bulbo natis foliis, nec vlla eorum vestigia obseruans, quod sanè mihi admirationi fuit. Quantum intelligo per fratrem C. Bauhinum, qui communicauit, prouenit in monte Spiegel.

SPARGANIVM PLACÆ NARCISSO simile flore albo Lili.

Supra Valentiam salebrosis & petrosis locis nascitur quædam planta bulbacea, binis foliis prædita, humi stratis, longis, crassiusculis, ex viridi nigricantibus, Narcissi maioris Autumnalis foliis ferè similibus, sed quibus interna parte fecundum nervi mediū longitudinem, alba quædā latiuscula linea ducta est: radix bulbosa multis tunicis constans candicantibus & lenti viscidique succi plenis, ingrati amarique saporis, foris nigro cortice obductis. Etiam C. V. Ioan. Placæ Medicus Valentinus, pedalem caulem [nam radicem cum foliis dumtaxat, eruebat, ait Clus. Hist. & hist. post.], læuem, aliquot in summo flores Liliæ amulos, candidos ferentem, habere, deinde rotunda capitula, in quibus exiguum semen contineretur, asserbat, & Sparganium vocabat.

Casp. Bauhin. Phyt. Colchicum 12. siue Colchico luteo similis (supple planta), Sparganium Placæ Clusio.

TVLIPA SIVE LILIO NARCISSVS.

CAP. IX.

Blaccas inter stirpes, recensetur meritò peregrina illa planta, quæ ob insignem in flore colorum varietatem, omnibus longè gratissima esse solet. Quæ de re lo. Posthius.

Multiplex dicitur florum genus omne colore

Hucusque à Geriis Tulipa missa iugis.

Hanc vulgus Tulipam, doctiores verò Liliæ-narcissum appellant. Cum autem non occurrat nobis, an aliquis de Tulipa verba fecerit, ante Doctiss. & diligentissimum Botanicum nostrum Præceptorum Gesnerum, lubet hic subiungere, quæ in fine operum Cordi, de hac memoria prodidit.

Gesner. de Tulipa.

Anno à Natiuitate Domini 1559. initio Aprilis, Augustæ,

Descriptio



in horro Magnifici viri Ioan. Henrici Heruati vidi inquit is, herbam hic exhibitam, ortam è semine quod Byzantio (vel, vt alii, è Capadocia) allatum erat. Florebant tunc temporis in vno pulcherrimo rubente, magno, instar Lili rubri, octonis condito foliis, quorum quatuor foris sunt, & totidè intus, odore suauissimo, leni, & subtili, qui breui euanescebat. Color interior pallidus est aut subflauus: & stamina tanquam Croci, in medio intercepta, cœu geniculo, ipsa quoque octona, ex quibus itidem alia exterius paulo sunt, alia internis. Calix nullus. Caulis est circiter pedem altus. Folia in eo quaterna albicant, crassiuscula, solida, duos palmos (id est digitos octo) longa, Orchææ ferè foliorum figura, modicè recurvato margine (non aded quidem vt pictura præ se fert, quam antea expressam amicus quidam ad nos misit,) ex his tria inferiora maiuscula sunt: summum, parvulum. Maculæ nullæ dum erant, quas in adultioribus foliis apparere aiunt. Radicem non vidi: sed aiunt esse bulbosam instar hermodactyli ferè, vel Porri formâ & magnitudine, tertio anno florem producere: propagari de radice, bulbo puro adnascente, semen nullum proferre, siue naturi, siue nostri cœli culpâ. Turcico vocabulo Tulipam vocant aliqui. Sunt ex Turcis (inquit Kentmannus,) qui Tulipam dicunt nomen habere à flore, qui formam refert pileoli Dalmatici. Liliæ rubentis genus [pergit Gesner. b. vi.] videtur etiam Tulipa Turcarum, cuius picturam, cum ad virum quemdam Doctiss. misissem is (Cynorrhodon Plinii [vel vt ipse legere mavult Cynorrhodon] esse putauit. Sed ita dictum à Plinio Liliū in Italia quoque nascitur: Tulipa verò ista (nam & alia quendam hoc nomine vocatur herba luteo flore) Italix (ni fallor) prius pe-

Tulipa.

Lilium rubens Cynorrhodon Crinorrhodon.

Satyrium
Erythra-
eum Tul-
pa rubra
Tulipa al-
ba.

regina est, nisi in horto aliquo conspiciatur. Cy-norhodi quidem Lili Hyacintho similis Hely-chius etiam meminit. Satyrium Erythraicum fortè est Tulipa à Turcis dicta: quam vidi Augu-
stus in horto Magnifici viri Io. Henrici Heru-
uarti, quanquam semen ferre negant. Et hæc est de Tulipa.

Satyrium
triphyllo

Nos quidem Tulipam flore rubro, ferere se-
mina obseruauimus, quæ non respondent semi-
nibus Satyri à Diosc. traditi, idèò Satyrium Ery-
thronium dicere non possumus: Tulipa tamen
alba, multa habet quæ respòdent Satyrio triphyllo
Diosc. Suspiciamus præterea priorem Gesneri Tu-
lipam esse inter Clusianas, de quibus postea, præ-
cocem rubram dictam, in eo tamen differt
quòd Gesnerus tribuat flori octona folia: Clusius
autem tantum sex: Secunda fortè referenda est
ad Bononiensem deinceps tradendam.

Narcissus
5 Martib.
qui nota-
tur

Inepè Matth. proponit quandam iconem sine
ulla descriptione sub titulo Narcissi 5. quæ ad
Tulipam referenda videtur, in cuius caule folia
octo spectantur, in flore sex foliola, in epitome
verò septem in caule, quinque in flore.

Lotus her-
ba Homero.
Alc Zempul
Lotus Diosc.
Lotus

Notatu digna sunt quæ Guiland. in Theone de
hac planta scripsit: De herba non arbore intel-
lexit Homerus in Iliade, quando Iouem rem-
cum Iunone habuisse canit, terra subter Lotum,
Crocum & Hyacinthum gignentem. Ac an ea sit
Lotus quam Turcæ *Alc Zempul* vocant, Itali *Tu-*
lipa, nomine barbaro & proinde peregrino, qua-
rendum: quanquam parum referte Autumo, si vel
pro urbana vel siluestri Diosc. Loto capiatur. Ve-
rùm cum Plinius tres laudasse flores annotet, Lo-
tum, Crocum, & Hyacinthum, nec Lotorum, qui
apud Dioscoridem habentur flores, præstanti
forma commendabiles sunt, vix fieri posse
reor, Homerum de iis locutum. Cæterum Lotus
Ægyptia et si flore constet pulcherrimo, nullum
tamen hac parte locum occupat, vt pote quæ in
siccò nasci recuset, Croco & Hyacintho nequa-
quam in aquis prouenientibus. Nec sunt aque
ad coitum aptæ, fundum petente corpore. Sulpi-
cari quis posset Tulipam [inquit Dodon. qui tres
differentes species agnoscit] *πρωια* esse Theo-
phrastrum, si edulis bulbus esset & cogendo efficax.
Nam *πρωια* quidem à Theophr. inter edules
bulbos refertur & herba est, quæ lac cogitur, vt
ait Helychius.

Lobelia *sem-*
centia.

Pytion
Theophr.

Gesnerus Tulipam Satyrium esse existimauit,
an autem conueniat & quantum, ex Satyriorum
descriptionibus relinquemus diligentius consi-
derandum.

Dodonæi icon prior, est apud Clusium pro
Tulipa præcoce alba varia. Secunda autem est
pro Tulipa præcoce rubra: in hist. flo. vnica erat
icon, quæ à Lobelio exhibetur in Obs. 2. loco, cui
floris foliola non desinunt in acutum.

Anemone
Lemonia.
Crinorrho-
don Plinii.
Satyrium

Dodonæi suspicioni subscribit C. Bauh. dicens
apud Matth. Licet alii ad Anemonem Limoniam
Theophrasti, alii ad Crinorrhodon Plinii: alii ad
Satyrium Erythraicum referunt, videtur tamen
ad *πρωια* Theophr. referenda. Gesnero Anemo-
ne Limonia.

Lilionarcis-
sus purpu-
ro Narcissi
Plenus
Casse, Lale.
Zempul
Follorum
numerus.
Purpurea.

Tradit Lobel. in obs. Lilionarcissi varietates
quamplurimas, inquit: an purpuro-Narcissi
Plinii, Turcarum *Casse Lale*, *Zempul*? Omnibus
Tulipæ siue Lilionarcissi speciebus foliorum nu-
merus in caule pedali & sesquipedali, ternus,
quaternus, quandoque quaternarius, septenus & o-
ctonarius: flores senis foliolis, interdum pluri-
bus, quorum vngues haudent, calathum cingian-

tes, constant: quorum alii præcoces, alii autem
serotini. Flos sex foliis obcufis purpurei sangui-
nei Lilionarcissi constat: Radix item & caulis
perfoliatis, in quo quatuor, & nonnunquam plura,
folia, liliaceis & porrinis media: interdum inna-
tum bulbum in folio notauimus apud D. Io. vaa-
der Dill, cuiusmodi in Moly Homericò. 2. Lucu-
lento pendente flore, supremis foliorum oris &
fundo ad basim luteis pallentibus, medium cin-
gente sanguineo subfusco: calyculorum oris &
media carina foris luteis: cætera cuncta sangui-
neo fusco exolero similia: medio intus flamine
nigro, staminibus croceis obducto. Semina, vt
reliquorum, compressa in oblongo tripartito
membrano anguloso folliculo: quæ itidem fa-
ta colorum varias subeunt mutationes, & sæpè
degenerant, vt longo vsu diligentissime animad-
uertit clariss. vir. D. Ioannes Boissot.

Eriophori vocati radix cepaceo inuolucro
obducitur, molli sericeo tomento facta, caltha-
nearum ritu: flos vt reliquorum, sed calathi
fundus siue foliorum vngues atri & mediò lu-
tei conspiciuntur.

Luteo & medio pullo, fundo.
Maculoso, medio fusco folio.
Sanguineus toto calathi fundo pullo.
Vngue toto luteo.

Vngue pullo, triangulis luteis
Flore odorato, aut inodoro.
Totus luteus maior Chalcedonicus, sangui-
neo puniceo par, & similis: odoratus Croci æ-
mulatione & inodorus: præcox & serotinus
aut pallidus.

Niuco candore & rubore confusus cocci-
neus.

Purpureus sanguineus, puniceusque obsole-
tus, candidioribus oris, carinam intercurfante
albo rubore mixta diluta linea, ino ad basim
croceo vngue.

Purpureus coccineus, rubentibus oris, me-
dio folio exteriore candicat, vnguis luteolus,
summo, medio tenus coccineo luculento
croceo.

Coccineus purpureus punicans, tribus ex-
terioribus mucronatis foliis: internis verò re-
tulis.

Rubellus pendente flore in acutum modicè
fastigiato.

Rubidus candore mixtus, nitidus, niueis
oris.

Niuus, extremis & summis rubidus oris,
vndantibus in caule foliis.

Candidus, striatis suauè rubentibus oris.
Parulus, rubidus, candicans.

Rubicundus, rutilans, luteola carina.
Sanguineo, puniceo saturato liuescens, sum-
mis candicantibus oris, expallus, folio latiore,
mucronato.

Obsoleta purpura, summo albicans, purpu-
rante medio.

Imo & summo luteus amœnus, medio coc-
cineo, sanguineo.

Luteus striatis rubentibus oris.
Rubellus niueis oris striatis.

Luteus hilaris oris phœnicis.
Niuus totus, fundo tantillum luteo.

Luteus, phœniceo confusus mixtus.
Luteolus phœnceus, dilutus.

Luteus coccineis rubentibus oris,
Candore & rubore confusus, Rosæ dehis-

centis pallidæ colore.

Luteo

Luteophoeniceus luteouirentibus oris; septenis peramplis foliis.

Purpuroviolaceus.

Haecenus Lobelius apud quem haec consideranda. Folia Tuliparum nobis non videntur esse virore Liliaceo, nec feminis descriptio placet, quae nec plurimum differt ab Aristolochia praedictae femine. Dodonaus dicit cartilaginolum planum. Illud etiam perpendendum venit, quod scribunt de Tulipae nomine aliter ac petiit. Itirpium Guilandinus: Nec hoc negligendum, tradit in Aduers. florem cum quinque foliis, ac etiam iconem proponi in qua tantum quinque foliola sub titulo Lilionarcissi purpurei: eam autem iconem in iconum l. Plant. iterum proponit hoc titulo, Lilionarcissus sanguineus puniceus. Teur. r. 62. In Adu. ponit praeterea alteram iconem sub titulo Lilionarcissi lutei, planè diuersam, ac potius alicuius Narcissi quam Tulipae, si non est error typographicus: de his dicimus, quod ibidem paulo post dicit aduersum Matthiolum, pueros pueris pingere & illudere. De ceteris iconibus Lobelii in obs. & in lib. ic. Plantini postea agemus.

Camer. apud Matthiolum in Epit. pro Narcisso 5. Matthioli ponit descriptionem & pulchram iconem, quae summè placet, & pro plurimis sufficere videtur, ac idem etiam à nobis popositae Tulipae peregrinae, inquit etiam, & ante aliquot annos demum cognita apud nos planta, de facilitatibus adhuc ambiguit. Helichrysum Crataeum non adeò male ad luteum quadrat, quamvis herbarum non integrè descripsit, sed tantum dicat florem esse similem Croco, colore aureo. Tulipae differentias quod attinet. Prae aliis floribus varietas est in praecoci: Praecox lutea vel planè aureo colore, vel pallido. Adhuc vel rubris maculis confersa, & alia maiore ex parte rubens. Item vel aureo fundo vel nigro. Semina etiam discrepant, quae in nonnullis flaua sunt, in aliis nigricant. Praecox rubra, eaque vel purpurascens, vel coccinea. Item purpurascens albis oris decota. Nec non dilutè rubens, vel incarnata, vnguibus vel inferioribus foliorum particulis candidis. Alba, ferè prima omnia florere solet, sed & frigoris vehementia aliquando succumbit, si non satis profundè intra terram abdatur. Est vero quaedam penitus candida, excepto fundo qui nonnihil flauescit: quaedam diluta rubedine inficitur, & tertia violaceis maculis pulchrè distinguitur. Media siue Dubia, lutea, aurea, pallida: itemque conglobato flore, nò vt reliquarum parulo: & lutea media fusca, purpureis staminibus, & praeter has, quae virentibus striis variatur. Denique nana siue pumilio flore aureo. Rubra coccinea, fundo flauo, nigro, subaerente, in caeruleum vergente. Est inter has quae nigrum fundum habet & foliorum in flore virentes apices. Praeterea paruula admodum strictis foliis colore saturo rubro. Incarnata, languida coloris, nigricantibus staminibus. Serotina. Haec plerumque maxima est & pulcherrima, sed minore colorum diuersitate commendabilis. Lutea nimirum, aurea, pallida, itemque renella strictifolia interhasce, latifolia quoque rursum, eaque diclonos, nec non cristata Papaueris modo, siue *àegyptiacae*, id quod etià in rubra admodum grandi notauit. Est & suauis robore purpurascens, qualis in Paeonia colos. Tandem quae Solis oculis vocatur, fundo nigro, quem circulus aureus ambit, reliqua floris parte eximè rubicunda: cuius varietas etiam in odore habetur, qui in qua-

dam planè Lilium conuallium dictum emulatur. His plerisque interdum accidit, vt proliferent extra terram, id est, vt inter alas foliorum protrudant bulbum, qui sensim tabescente matris superficie incrementum capessit, quemadmodum hoc à C. Clusio in Pannonicis affabrè depingitur.

Ceterum mitatur Adrian. Spieg. inter Narcissos relatum cum flore, quem vulgus peregrino vocabulo *Tulipanum* & *Delipanum* vocat. Ipsi enim inter Lili genera rectius videtur collocandus. Quo nomine Veteribus dicta sit haec planta, multi dubitant. Sunt tamen peritiores nonnulli, qui ad Satyrium Diofcor. quibdam *Satyrium* *erythraeum* cognominatum referendum censent, ad cuius tanè descriptionem multis notis accedit.

Haecenus autem Tuliparum bulbi nobis [inquit Clusius qui Liliaceam stirpem appellare videtur] Byzantio missi sunt, praecoci quidem *Cassale*. Serotinae uerò *Capata lalé*: à locis nimirum vnde primùm Constantinopolin illati sunt appellatione indita: *Cassale* vrbs est in peninsula Gazaria dicta, quae inter Propontidem & Euxinū Pontū sita est. *Canalla* uerò in Macedonia vrbs maritima. Sunt qui Tulipan praecocum purpureum Colinosandalon esse velint, à Veteribus inter Coronarias herbas numeratum: Nos Tulipae duo primaria genera obseruauimus: *praecox* vnum, *serotinam* alterum, tamen inueniuntur quaedam veluti dubia, quae medio inter vtrumque genus tempore florere soleant, potius tamè inter serotinas habendae, quam inter praecoces. Praecocior Tulipa vnicum fert caulem, pedalem maximam ex parte, interdum ampliotem, totamque virentem, & breui quadam incanaeque lanugine aspersum, non concauum, sed firmè medullà plenum: hunc plerumque terna amplectuntur folia, nonnunquam quaterna & quina, inferiora lata admodum, vt etià palmatae latitudinem expleere viderim, & liliacea, longiora tamen, & crassiora, carinata, supra terram sese pandentia & contorquentia, superiora autem minora, & angustiora, eaque vel propenduntia & nutantia, aut interdum surrecta, omnia autem colore ex caeruleo virente aut arugineo, & veluti farina asperso. Summo cauli insidet magnus flos, vnicus (geminos etiam aliquoties vidi, vel summo caule coniunctim nascentes, vel bifido inherentes, in sua spectans, sex foliis vt plurimum constans, tamen si septenis & octonis conspexerim] eiusdem initio cum caule coloris, & interdum ad terram sese inflectens, illicque incumbens, vt colubri aut serpentis caput in terra decumbentis eminentiat, deinde paulatim sese subleuans, & colorem mutans, atque tandem sese explicans, & calathi Cyathique instar in fundo pandens, ex quo sena aut totidem quot foliis constat, stamina prodeunt, modò lutea pallida, modò nigricantia, pediculis etiam quae stamina sustinent, mirum in modum variantibus. Excusso flore, succedunt membranaceam triangulare caput, satis magnū, oblongiusculum, vel breuius ventrique niagis prominulo, quo in tres partes à summo dehiscente, conspiciuntur sex ordines feminis plani, cartilaginosi, liliacei ferè, & circumatae propemodum rotunditatis interdum, altera tamen parte, quae capitis centrum & interiora pertingit, oblongiusculi vt plurimum, pallidi, fului, aut rubescentis, & si imbres frequentiores ceciderint, etiam fusci. Radix bulbacea interdum, breuior est, nonnunquam oblongior, crassa, inferiore sede nonni-

hil prominens, uti Colchici radix ferè, fibris aliquid tenuibus donata, & foris fulvescente, sed magna ex parte nigricante, membrana obduta, quæ interna parte lanuginosa est, Castanearum corticis instar, aliquando autem ad eodent tomento plena, ut mollissimè recubet bulbus, qui solidus est, firmus, & velut albamem oui coctum candidus, gustantique dulcis, saltem non ingratus. Summa autem in præcoce est coloris varietas: nec maiorem in vilo alio flore videre memini, nisi fortè in Papauere. Etenim aut omninò luteus est, aut ruber, aut albus, aut purpureus: interdum etiam bini vel plures ex his coloribus in eodem flore permixti conspiciuntur. Non desunt qui cærulei omninò coloris se vidisse asserant, mihi sanè hæcenus videre non contigit.

TVLIPA PRÆCOX FLAVA.

Descriptio Lutea Tulipa vel ad auri fulgorem accedit [pergit Clus. in hist. post.] aut pallet, foliorum autem vngues plerumque aurei sunt, licet etiam habuerim veluti fulgine aspersos: odor quasi Cere recentis, siue etiam Croci, interdum nullus, vel admodum imbecillus.

Tulipa flava. Hic notandum à Clusio poni in post. hist. iconem quæ non erat in Pannonicis, aliam iconem habet pro Tulipa flava siue lutea quam

Zalmonarçifus albus.



ponit postea pro Tulipa præcoce alba, ut iterum monemus. Quæ verò hoc loco proponitur in post. hist. pro lutea ponitur: ea est in libro Iconum Plantarum delincata hoc titulo p. 130. Lilionarcissus albus parvus & parvus, medio iuxta carinam rubellus nitens, Lob. Teut. 166. An Schvven. in cat. Siles. Tulipa lutea 1. *Aureolam imperia* Theoph. Narcissus 6. Matthioli. Geeler Tulipan. Gelbe Turckische Clarenissen. Plures sunt nobis Matthioli impressiones, verum in nulla invenimus iconem Tulipæ luteæ.

Habeo in horto E.C. Tulipam luteam præcoce, quæ pallet, vngues aurei parvi florum, folia quina in cuspidem desinunt, floret principio Aprilis.

TVLIPA PRÆCOX RUBRA.

Rubra Tulipæ color nunc saturatio est, modò dilutior, & gratissimi aspectus, interdum etiam inelegans, & obsoletus: foliorum vngues vel lutei omninò, aut tanquam leui quadam fulgine in luteo aspersi, in quibusdam nigra macula medium vnguem luteum tantummodò inficit, in alijs totum ferè ita occupat, ut nihil nisi lutea

quædam linea nigrum vnguem ambiens conspiciatur: interdum ad eodent magni sunt isti vngues, ut dimidiam folii partem occupent. Huius vngues odor alias gratus est instar Mali aurei, magna verò ex parte valde obscurus, vel Papaueris virus quodammodo referens. Hæc Clusius hist. post.



Clus. in Pannon. & Hisp. eandem iconem habebat. Icon eadem erat apud Platimum p. 126. hoc titulo Lilionarcissus purpureus lagueus p.

niceus quintus Lobel. 65. Teut. 162. Hist. Lugd. ponit pro Tulipa maiore Clusii quam scribit esse Narcissum quintum apud Matth. Idem sentit C. Bauh. qui pro iconem Marth. ponit similem iconem Clusianæ. Camerarius in hist. Germ. & in Epit. nouam iconem ponit Tulipæ nomine. Schvven. Tulipa præcox rubra. Narcissus 5. Matth. Rotet Turckische Tulipan.

Tulipam rubram primùm vidi Montbelgardii in horto Ill. mei Principis allatam ex Italia, pulcherrimus sanè flos omnibus admirandus, ex rubro fuscus cum vnguibus luteis quotidie se expandens & recludens, multis diebus integer remansit mense Aprilis. Casp. Bauh. attulit bulbum, non se propagauit, & tandem periit.

TVLIPA PRÆCOX ALBA.

Tulipæ albæ flos omninò candidus est, nisi tria exteriora folia dorso cineracei vel interdum etiam cærulei quidpiam coloris admixtum habere viderentur: vngues lutei, nonnunquam veluti fulgine aspersi, apices & stamina pallent. Hobui (inquit Clusius) quibus vngues prorsus albi esset, apices nigricantes. Iam ante monimus iconem hoc loco positam, in Pannon. olim locatam à Clusio sub titulo Tulipæ præcoce luteæ, cui fortè ex prædicto loco transfe-



renda

tenda dicta flaua siue lutea & quæ hic alba dicitur cõ releganda: nobis tamen nouus inde oritur scrupulus quod in Iconibus Plantini pag. 128. hæc eadem sit icon sub hac inscriptione Lilio-Narcissus sanguineus puniceusue obsoletus tribus exterioribus mucronatis foliis, internis verò retusis Lob. 67. Teut. 163. sanè icon non responderet titulo: interna folia non apparent in icone retusa. Tulipa alba præcox in horto Ill. E. C. W. multis annis durauit non se propagans, ad hæc fortè potissimum referendus Narcissus Matthioli 5. Lob. etiam in Obf. meminit Lilionarcissi præcocis niuei.

TVLIPA PRÆCOX PURPUREA.

Purpurea Tulipa aliàs saturatior est, & violaceum, siue amethystinum colorem habet, aliàs Pæoniæ floris æmula, nonnunquam dilutione, & Damascenam siue Prouincialem (quam eruditiores Prænestinam vocant) rosam colore referens: interdum verò aded diluta, vt albescere videatur, aliquando ex purpura nigricat & obsoletior est: omnium autem vngues cum apicibus aut pallent, aut lutei sunt coloris, tametsi nigros etiam apices habeant nonnullæ, & pediculos eas sustinentes quadam veluti fuligine infectos. Inuenitur & odorata, & inodora.



Facere verò non potest, quin hic adiciat Clusius, quæ circa simplices has, & vnius coloris Tulipas obseruauit. Habuit enim anno 1585. & aliquot subsequentibus, cuius flos cum præcedentibus annis elegans ruber fuisset, postea variè commixtus ex rubro & flauo inter se confusus coloribus, modò flauo medium quasi folium occupante, modò rubro, vel utroque radiatim per oras discurrente, fuerit. Similiter flauam quæ flauum, & rubrum: & purpuream quæ album & purpureum colores variè inter se commixtos, & radiatim folia secantes habuerint. At illud etiam obseruabat, quotquot sic natiuum colorem mutarunt, subinde corrumpi folitas, voluisse tamen antè, hac colorum varietate heri sui oculos oblectare, tamquam ipsi extremum vale dicturæ. Quam hic iconem ponit Clusius pro Tulipa præcoce purpurea, apud icones Plantini p. 129. posita est pro Lilio-Narcisso purpureo violaceo Lob. 67. T. 163. In Pann. hist. aliam iconem habebat Clusius pro Tulipa præcoce purpurea, quæ in lib. Ic. Plant. ita inscribitur, Lilio-Narcissus sanguineus puniceusue 8. Lobel. 66. Teut. 163. Schvvench. Tulipa purpurea præcox, leibfarbner Turckischer Tulipan.

TOIR. II.

TVLIPÆ PRÆCOCES VARIE.

Tulipa varia aded multiplex est, vt difficile sit omnes eius differentias verbis exprimere. Nam cuiuscunque tandem præcocis Tulipæ semina excussa, & tellure sepulta gemminant, non omnia retinent natiuum matris colorem, in varios colores transformant flores, præsertim Albæ, cuius semine prognatas plantas insignem colorum varietatem præ reliquis nancisci, experientiâ & diligenti obseruatione didicit Clusius. Semina enim in eodem capite nata, à semetipso collecta, eodémque ferè momento terræ Autumno commissa (quò tempore, non verno, ferenda sunt omnium bulbaccarum & tuberosarum semina, vt feliciter proueniant, vel etiam maturius, cum spontè defluant) plantulas proximo subsequente vere prodixerunt, quæ post quintum, sextum, septimum, imò etiam [vt aliæ aliis facilius adolescunt] octauum, nonum, & decimum annum flores protulerunt, eosque aut omninò albos & matrem referentes, aut albos varios, vel purpureos, ac purpureos varios, quorum videlicet purpurea folia albis oris ornata fuere. Quantum ad flauas aut Rubras attinet, pleræque proles matris colorem retinent: sæpè etiam in alium commutant.

TVLIPA PRÆCOX LVTEA VARIA.

Luteæ variæ Tulipæ flos explicatus, nonnuncquam primis diebus rotus luteus apparet, quarto deinde, aut quinto demum die, illius folia rubris virgulis, extrinsecus leuiter per oras distinguuntur, interiore parte omninò lutea remanente, præsertim tria externa, & vnguem



nonnunquam habent veluti fuligine tinctum, apices interdum luteos, & pediculos eos sustinentes fulcos. Interdum externa floris folia circa mediū raris rubris radiis insignita sunt, interiora autem frequentioribus, & ad extremum vsque folium ferè excorretibus, atque aureos vngues: pallida stamina habent. Nonnunquam exteriorum foliorum oræ foris planè rubent, interioris à medio ad extremas oras rubris virgulis distinguuntur: interiora folia externè omninò rubent, internè autem à medio ad summum, rubrum neruum protensum habet: latera verò rubentibus radiis exornata. Sunt etiam quorum exteriora folia dorso omninò luteo sunt, per oras verò, dilutioris cinnabaris colore virgatim distincta, interiore parte ad vnguem vsque cinnabaris color tota occupat: interiora autem folia


Kkk 3

cinnabaris etiam colore omnino infecta conspiciuntur, nisi duplex nervus luteus secundum longitudinem, & luteæ virgulæ in extremis oras excurrerent, illius apices nigricant, pediculi eos sustinentes lutei, nonnulli tamen fuligine infecti, vngues aurei, magni, stamina quodammodo superant. Aliorum exteriora tria folia mucronata & lutea sunt, præter oras, quæ purpurâ rubescere radiatim intercartilante insigniuntur, deinde extremæ oræ luteæ sunt, interna parte circiter medium folium, frequentes rubri coloris radios habent: interiora folia, orbiculato mucrone prædita ab infimo ad summum oblongis rubris lineis distinguuntur, præter extremas oras quæ luteæ sunt, interior pars minus radiata quam exterior, vngues magni lutei, quemadmodum stamina cum suis apicibus, hi odorati. Est & cuius folia extremam cuspidem orbiculatam habent, foris omnino aurea, luteis oris: intus autem omnino lutea, aurei siue potius rubri coloris, flavo permixti, linea radiatim medium folium, transversumque secante: pediculi lutei sunt, apices cineracei: aliquantulum odoratus est. Cuius item folia orbiculato prorsus sunt mucrone, dorso in extremum usque mucronem luteo, oris latis, ex aureo rubris, vnguibz luteis dimidium folium occupantibus, staminibus & apicibus luteis: nonnihil etiam odoratus. Alii similiter huic pares, sed dilutiore colore præditi, staminibus & apicibus duntaxat variantibus: sed nec hi odore carent.

Icon à Clus. proposita iam olim exhibitæ erat in Pannonicis sub eodem titulo: eodem lib. icon. Plantini reperitur p. 133. cum hac nomenclatura Lilio-Narcissus luteus coccineus rubentibus oris Lob. 67. Teut. 167.

TVLIPA PRÆCOX RVBRA VARIA.

Descriptio



plerumque velut fuligine infecti: cuius flos satis odoratus est. Interdum exteriora folia luteas oras foris habent, interiori autem dilutiùs rubent, & quasi radiatim in luteas oras satis latis rubedo desinit: interiora verò similiter rubent, sed latiores oras habent, rubro colore, radiatim ut in exterioribus desinente, vngues luteos, stamina cineracei coloris: & istius flos nonnihil odoratus. Nonnunquam dilutiore minii colore rubent vtrique folia, mediocres oras habentia,

foris minii colore interiora folia ferè tota occupant, virgatim tamen in oras luteas desinente, magnis vnguibz flavis, apicibus cineraceis, pediculis ea sustinentibus luteis, flos vtrunque etiam odoratus. Aliorum exteriora folia, medio dorso luteo sanguineis virgulis distincta sunt, reliquâ parte rubrâ, oris tamen luteis: interiora omnino ferè rubra, sed rubro colore radiatim in aureas oras desinente, interiori parte totâ prope modum luteâ, nisi circa medium folium rubris radiis distinguerentur, vngues cum pediculis luteis, apices nigri. Quorundam folia omnia mucronata, externè dorso lutei coloris, reliquâ parte sanguinei, præter oras quæ luteæ sunt, internè sanguineis radiis tota respecta, externis tamè oris luteis: interiora foris sanguinis modo omnino rubent, luteæ seu flavæ oræ sunt, coloribus tamen sese muicem commiscantibus, internâ parte omnino flava sunt, nisi circa medium crebrioribus sanguineis radiis instar orbis quodammodo insignita essent: vngues, stamina, & apices cum superiore genere conveniunt. Sunt aliorum etiam omnia folia mucronata, oris aureis reliquâ parte rubris: præter exteriorum foliorum dorâ, quæ aureis quibusdam virgulis aspersa sunt, omnium vngues lutei radiatim in rubro comixti, pediculi lutei, apices nigri. Nonnullorum externa folia mucronata, interna orbiculata, tota rubra, exceptis oris, quæ aurei coloris sunt radiatim in rubro desinentis: exteriora verò folia saturatiora sunt, omnia tamen interiori parte magis aurea sunt, vngues, stamina, pediculi, cum præcedente conveniunt: omnium istorum flores satis odorati. Invenitur etiam cuius folia parvas oras aureas habent, elegantissimo rubro colore reliqua occupante, vngues flavos, stamina veluti fuligine tincta, apices obsolete purpureos. Hæc Clusius.

Clusius icones duas suas sub eodem titulo posuerat in Pann. quamquam antè in lib. icon. Plant. p. 133. sunt posita cum his titulis, integra planta pro Lilio-Narcisso luteolis aucta parte foliis secundum ora striis rubris decorato, intus verò luteo amœno: plantæ non integræ titulus, Lilio-Narcissus luteus hilaris, oris rubris, striatis, carina subuirdi: Teut. 167.

TVLIPA PRÆCOX ALBA VARIA.



TVLIPA præcox alba varia aut omnia folia extremâ parte mucronata habet, aut tria duntaxat exteriora, sed interiora orbiculata. In nonnullis externa folia ad extremum usque omnino ferè alba sunt, exceptis oris quæ elegantis & dilute admodum purpureascentis, siue carnei, ut ita dicam, colo-

coloris sunt: interiora verò magis purpurascunt, vngues lutei, deinde exalbidi, stamina cum suis apicibus flaua. In quibusdam exteriora folia exalbido sunt dorso purpureis virgulis asperso, reliqua parte purpurascente aut incarnata: interiora folia omnino purpurea sunt, vngues stellatim flauis, deinde albi, apices lutei, pediculi eos sustinentes voluti fulgine aspersi. Aliorum externa folia albo etiam sunt dorso, pluribus purpureis punctis distincto, interiore parte diluore purpurâ nitentia: interna folia saturatioris sunt purpureâ quâ in superiore, vngues flauis radiati stellâ instar, apices nigri, fulci pediculi. Interdum externa folia magnas oras carneo colore præditas habent, reliqua parte alba: interiora verò quasi carnei sunt coloris. Nonnunquam externa folia pallescunt sunt dorso, alias omnino alba, præter oras quæ foris breuibus & raris purpurascens radiis exornantur: interiora tota alba sunt. Quorundam exteriora folia dorso & extremo mucrone pallent, alioqui candida omnino, oræ interiore parte paucis purpurascens radiis distinguuntur: interiora folia à medio ferè ad extremas oras purpurascens radiis foris aspersa sunt, intus verò omnino alba, præter oras quæ rarioribus virgulis distinctæ sunt. Aliquâdo externa tria folia profus alba sunt: interiora autem oras nunc paucis, modo multis purpurascens radiis siue carnei coloris virgulis distinctas habent: omnium vngues flauis sunt, apices & pediculi pallent. Inuenitur etiam cuius omnia folia coloribus quidem albo & carneo permixtis prædita sunt, sed qui cineraceum carneo colori temerè perfunsum referant, vel similis planè coloris cum tenuiore illo sericeo panno carnei coloris, cuius subtegmen album est, Germani Silberfarb/hoc est, argenteum colorem vocant: huius vngues exalbidi, apices obsoletè purpurascens, pediculi albi sunt.

Lobel. Icon. Pl. pag. 127. eadem est figura cum Clusiana [quam etiam in Pannonicis habebat] cui titulus est Lilio-Narcissus coccineus, rubentibus oris, mediis foliis candidans, & ad basim notulis rubris cordis effigie, aspersis, Lobel. 67. Teut. 165.

TULIPA PRÆCOX PURPUREA VARIA.

Purpurea Tulipæ variæ flos magnâ ex parte omnia folia mucronata habet, interdum tamen externa duntaxat mucronata sunt, interiora autem orbiculata & obtuso mucrone prædita: est etiam cuius omnia folia orbiculata habent mucronem, vt ex singulorum descriptione videre licebit. Nonnunquam igitur omnia folia mucronata Pæoniæ polyphylo, & pleno flore, purpureum colorem imitantur, orasque habent ex albo purpurascens, vngues, ex luteo viridique coloribus, simul quodammodo permixtis, subobscuris, exalbido orbe radiatim eos ambiente, pediculos flauos, sed veluti fulgine infectos apices nigros: illius flores magni sunt & admodum paruli. Mucronata etiam singula folia, foris vt plurimum purpurea sunt, interius mediâ parte carnei coloris, oris ex albo pallentibus, vnguibz, staminibus, & apicibus flauis siue luteis. Interdum omnia folia mucronata, foris & intus purpurea sunt omnino, extremaque oras albas

habent, vngues luteos albo orbe circumdatos, apices obsoletè purpurascens initio, deinde vbi obuerti sunt (solent enim omnes bulbacei generis florû apices explicante sese flores aperire & inuicere) flauo polline aspersos, flauos pediculos. Aliorum singula folia etiam mucronata, & saturatior purpureo colore prædita, omnium oræ exalbidi, vngues albi, in imo tamen flauis, apices & stamina pallida. In quibusdam omnia similiter folia mucronata, sed color purpureus diluore, magisque floridus, oræ exalbidi, vngues ex viridi pallentes, pediculi nigricantes, apices pallidi: odoratus est plerumque istarum Tuliparum flos, reliquiarum inodorus, vt etiam subsequenti. Reperiuntur quorum omnia folia



mucronata, obscurioris purpureæ & quasi amethystina colore prædita sunt, magnis autè oris albis, vnguibz, staminibus & apicibus flauis. Quorundam contra florû singula folia orbiculatis sunt oris, illisque magnis & albis, reliqua parte saturatior, nitentèque purpureo colore prædita, flauos vngues &

bit albus oris, cineracei apices, flauis pediculi. Nonnullorum interiora folia aliquantulum orbiculata, diluore purpureo colore splendent: interiore parte tota ferè alba sunt, omnium oræ magnæ, alba, vngues, stamina & apices flauis coloris. Reperitur etiam cuius externa folia mucronata & reflexa, exteriorè parte obscurioris purpureæ colore prædita sunt, interiora verò orbiculata & diluore purpurascens, vtraque autem in magnas albas oras desinentia, & interiore parte veluti purpureum orbem, totum florem per medium ambientem habentia, luteos & flauos vngues albo orbe inclusos, apices obsoletè purpurascens, flauos pediculos. Est præterea cuius omnia folia mucronata, & tria externa foris purpurea, omnia autè magnis oris albis prædita, interiorèque parte omnino alba, nisi mediâ eorum partem veluti purpureus oris secaret & varium faceret, eius vngues flauos ambit albus circulus, stamina cum apicibus pallent.

Sed antequam finem huic capiti imponam (ait Clusius) addicenda putavi, quæ circa Tulipæ, semine Constantinopoli misso natus, obsequabam. Magnum seminis illarum cumulum accepit Ill. vir Augerius de Busbeque cum plerisque bulbaceis stirpibus eo anno quo Viennam veni: hæc, cum sequente anno in Galliâ proficisceretur, mihi reliquit: ea verò demum annis 1574. & sequente 1575. confectum [quod vetusta essent, & vieta, vixque nascitura existimarem] terræ mandauit. Ex his tamen ingens Tuliparum numerus prognatus est, quarum nonnullæ quinto, sexto, atque etiam sequentibus annis flores tul-

lerunt insigni colorum varietate commendabiles. Nam flavos omnino, rubros, albos, & purpureos, vel ex his coloribus inter se commixtis, hoc est flavam variam, rubram variam, albam variam, purpuream variam, nactus sum præcoci: sed inter illas etiam fuerunt, qui diligentius observanti, potius ad Dubiarum vel Serotinarum Tuliparum classem referendi videntur, quam Præcocium: nam licet æquali cum præcocius, magnitudine nonnullæ assurgant, eodem tamen cum Dubiis, siue serotinis, tempore florere animaduerti de iis autem suis capitibus. Tulipæ Byzantinæ genus alterum flore bino, rubescens & vario, nullum cum hac inscriptione *Lilæ de duobus* fori, habet etiam Clusius, Præcocium sic concludens tractationem. Hæc sunt quæ de Præcocium Tuliparum varietate commentare libuit, nec me fugit, quin plures aliæ differentiæ tradi potuissent, sed eiusmodi, quas ad iā enumeratas, tanquā primarias reduci, atque comprehendere sub illis posse existimo.

Lobel. ic. Pl. p. 129. habebat eandem cum Clusio iconem sub titulo Lilio-Narcissi rubelli nitidi, candidis oris Lob. 67. Teut. 166. Ipse etiam Clus. habuit in Pannonicis.

TVLIPA PRÆCOX AMETHYSTINA varia.

Descriptio



versus quod purpureæ striz excurrunt, quoddam quasi stamen representantes. Vngues speciosi aurei, ad tertiam folii partem strias flavas quoque, aureoque nitore splendentes, emittunt. Apices flavi, stilus ut in aliis triquetrus.

Locus & tempus.

Aprilis initio floruit in hortulo Ducissæ Wirtemb. quem colit elegantissimum in Castro Mörtelgardenfi.

TVLIPÆ SEROTINÆ.

Serotina Tulipa, maiore est amplitudine, cubitale enim & tripedale interdum habet caulem, firmiorem, crassiorē, rotundum, fungosa materie plenum, & breui etiam incanaque veluti lanugine, siue efflorescentiā quadam aspersum: hunc alternatim amplectuntur quaterni plerumque folia, nonnunquam quina & sena, earinata, firmiora, quam in Præ-

coce, ut plurimum erecta, non nutantia aut ad terram inflexa, atque oris interdum admodum reflexis, ut sinuosa videantur, aliquando omnia æqualia. Summo caulique pedali vel maiore plerumque, imò cubitali etiam nonnunquam longitudine, nudus supra folia eminet, vnicus infidet flos magnus & oblongus, cyathi modo concavus sex foliis constans, extremo apice omnino mucronato vel orbiculato, aut tribus exterioribus duntaxat mucronatis, interioribus orbiculatis, ut in

Tulipa serotina, polyanthes minor.



Tulipa Serot. polyanthes maior.



Præcoce, & contra: caput in illa triangulare, membranaceum, crassius, vtpurimum, & prominulo ventre, quo à summo dehiscens, sex ordine seminis plani, cartilaginei, fulvi, aut rubescentis, maiorisque quam in Præcoce conspiciuntur: radix præcoci similis, longiore tamen maioreque bulbo constat, pleniusque in reliquis cum illa conveniens.


Tametsi autem hæc Tulipa non fecus ac præcox vnicus vtpurimum constet caule, cum tamen interdum

polyanthes & ramolum habet: nam natæ mihi sunt rubro flore atque etiam flavo præditæ, quibus ex infimi folii ala alter nudus & pedalis tamen, gracilior tamen, & ad summi folii exortum tertius, crassitudine primarium caulem propemodum æquans, eademque altitudine nudus exerecens, adnascetur, singuli etiam suum florem sustinentes: interdum quaterni, quini, & plures, frequentius verò accidit vnicui ramo donetur, quam binis aut pluribus. In hac porro tam insignem colorum varietatem non deprehendi, sed flavas duntaxat, vel ad auri colorem inclinantes, & rubras, vni quibus plerumque nigris, orbe aureo cinctis, easque vel odorato, vel inodoro flore.

Habebat Clusius in Pannonicis iconem Tulipæ

pp. polyclonos minoris. Schvvenck & Catal. Silcf.
Tulipa lutea. Tulipa lutea polyanthos. Geler
Tulipan mit violet blumen.

TVLIPA SEROTINA FLAVA CVI quatuor folia in caule.



Tulipa serotina flava eiusdem ferè coloris est cum Præcoce, hoc est, dilucioris & quodammodo flavi, vel pallescentis, vel intensioris, & quasi auri modo rutilantis, vidi etiam cuius foliorum oræ sanguineis guttis aspersæ essent: foliorum vngues plerumque cetera recentis

runt, interdum nigricantibus quibusdam venis distincti conspiciuntur, vel nigra maculâ notati: apices cum pediculis vel flavi sunt coloris, aut cineracei, vel fuligine quadam infecti, aut omnino nigri.

Apud Lobelium Obs. p. 66. & in Icon. Plant. p. 135. Figura est eadem cum Clusiana, cui titulus: Tulipan siue Lilio-Narcissus latifolius obtusus, phœniceis rubentibus oris Lobel. 66. Teut. 189. Hist. Lugd. Tulipa siue Lilionarcissus luteus latifolius.

TVLIPA SEROTINA RVBRA.

Rubra serotina Tulipa color plerumque saturatior est, & quasi nigricat, interdum dilucior & perelegans: foliorum vngues aut omnino flavi sunt, quales in quibusdam præcocius, aut omnino nigri, qui Sole illustrati caruleum quidpiam permixtum habere videntur, vel maculâ nigra nunc minore, modo maiore [eaque tenui orbe aureo inclusa, ut oculum quodammodo exprimere videatur, quâ de causâ à nonnullis Ochio di Sole, hoc est, Solis oculus cognominatur] flauum inficiente, nonnunquam etiam totum ferè occupante: apices cum pediculis vel omnino flavi sunt, vel nigri, interdum apices cinerei coloris, & pediculi flavi. Ceterum harum Serotinarum Tuliparum quæ vel flavi, vel rubri coloris flore prædita sunt, nullæ hæcenus varietatem in satione Clusio pepererunt, nisi quod interdum ex rubra semine, flauæ: contra ex flauæ semine, rubra, nate sunt, vnguibus sæpenumero variantibus.

TVLIPA COCCINEA HOLOSERICEA.

Tulipa Coccinea, per terram spargit folia larva, longa, carinata, & crebro flexu reflexa, pulchre undulata, colore glauca, alia è

caule orta repada, non ita undulata: caulis teres, virescens, florem sustinet vnicum omnes cocci cortinas amœnitatem superantem, foliis surrectis calathum effigiantibus coccineo colore tinctis, tribus tamen exterioribus externa parte minus hilaribus, atque his quidem foris vngues luteoli, intus nigri sulco croceo ambit: interioribus, tam extra quam intus vngues nigri sulco similiter croceo circumscripti: in fundo latent tres apices breues nigri, ex duarum membranarum quasi coitu seu cohaesu compositi, pulvisculo atropurpureo conspersi, quorum mediû occupat stilus longior triquetrus ex luteo virescens, capite triplo latiore, fimbriis multiplici implexu crispis compactis, florens Aprili in horro Ill. E. C.

TVLIPA DVBIA.


Tulipa medio inter præcociam & serotinam tempore florentes, videlicet quæ marcescente præcocium flore su-

Descriptio

Tulipa dubia. maior.



Tulipa dubia. maior altera.



os explicant, & serotinis florere incipientibus iam senescunt, imò interdum cum illis etiam florent: Dubia quodammodo appellari possunt, cum vtriusque generis naturam referant.

Sunt verò inter eas nonnullæ, quarum flores & ipsa planta serotinarum magnitudinem æquant: aliæ quæ præcoces non superant, nec illis formæ sunt absumiles, & illæ quidem vel amplissimis floribus prædita, vel præcoce non maioribus: sunt etiam quædam præcocius humiliores. Singularum autem differentias quamdiu lucide poterimus hic explicabimus, earum videlicet quæ nobis sunt inspectæ: nam quis reliquarum infinitam

varietatem verbis exprimere quærit

Dubia maior.
Pallidus.
flos.

Dubia igitur maiores, florem non minus amplum habent quam serotina. Illum autem vel pallidum admodum, vel flauum, omnibus foliis mucronatis, & vnguibz flauis instar Ceræ recentis.

Flaua orbiculatis oris
flos.

Inuenitur etiam cuius omnia folia omnino flaua, extremas oras orbiculatas habent, ad præmaturum aurei Mali colorem accedentes: stamina cum apicibus flaua sunt, illius flos odoratus.

Aurea.

Alia item cuius color omnino aureus, externa deinde folia flauo dorso prædita, oras dilutioris cinnabaris colore radiatum distinctas adquirent: interiora verò folia cinnabaris etiam colorem, atque insuper binos luteos nervos secundum longitudinem, & flauos radiolos in latera excurrentes: vngues huius magni, flauis, altitudinem superant apicum, qui nigri sunt, pediculi flauis, sed fuligine infecti.

Flaua cum rubris venis.

Nonnunquam omnia folia orbiculato mucrone prædita flauis coloris sunt, rubris venis secundum eorum longitudinem excurrentibus, nunc tenuibus, modo crassioribus, atque etiam totum dimidium folium interdum inficientibus.

Sunt quibus flores dilutius rubent, & cinnabaris colorem quodammodo referunt, omnium foliorum extremis oris mucronatis; vel saturiores sunt, & quodammodo nigricant, exterioribus foliis mucronatis, interioribus orbiculatis: vnguibz flauis, magnis vel parvis, nonnunquam veluti fuligine aspersis, vel in omnibus foliis, vel in exterioribus duntaxat: apices modo flauis & leuiter nigricantes.

Alba exoluta.

Aliarum flores sunt coloris albi, exoleti, qui vnguibz dici queat; nam folia ex albo pallescunt, eorumque dorsum flauescit: interiora folia orbiculata, vngues & apices pallent.

Orbiculata carnea.

Nonnullarum flores omnia folia habent extremo mucrone orbiculata, dilutissimi purpurei coloris, & quodammodo carnei, maximos vngues albos, quæ capiti adherent flauescences, cum staminibus & apicibus.

Rubescens.

Quarundam paulo saturatius purpurascunt, & aliquarum præfulsum præcociorumque rubescensium varietatem quas Germani *Ternnet*/Austriaci *Muscateller* appellant, colorem referunt: interiora folia orbiculata, vngues cum apicibus flauescunt.

Saturè purpurea.

Reperiuntur item quarum flores saturè admodum sunt purpureæ, & nigrorum accidorum Ceratiorum succum panem referunt, Austriaci *roemel farb* vocant: harum vngues vel subcæreulei sunt, vel ex cæreuleo nigricantes, stamina fusca sunt.

Lilionarcissus luteus.

Tulipæ dubiæ primæ maioris Clusii icon fuit inter icones Plantini p. 134. hoc titulo, *Lilionarcissus luteus phœniceus confusè mixtus* Lobel. 65. Teut. 164. Alteri autem Tulipæ iconi titulus fuit, *Lilio-Narcissus phœniceus* peramænis oris luteis Lobel. 65. Teut. 168.

Lilio-Narcissus phœniceus.

TVLIPÆ DVBIÆ SECVNDÆ media prima.

Tulipæ Dubiæ mediæ, quæ amplissimum florem habent, pauca sunt à me obseruata. Earum vna valdè pallidi coloris, coctum sulphur ferè referentis, propterea Austriacæ nobiles matronæ *Schueßfarb*, id est, sulphurei coloris cognomen illi indiderant: omnia eius folia mucronata, vngues fuligine infecti. Eius vnicum

bulbum Byzantio allatum habuit Generosi D. de Heyenstein, quæ illius prolem communicauit: floruit quidem illa anno 1586. & bonum semen dedit, sed subsequens rigida hiems cum matre corrupta; semen anno sequente terræ emissum, Viennæ in meo hortulo (inquit Clusius) relictum.

Alteræ flauis elegantis coloris florem habet,

cuius omnia folia mucronata, nigri vngues, nigri apices, fuligine infecti pediculi. Hæc anno 1589. florem mihi tulit sedecim foliis confectam, eius verò proles tredecim: at sequente anno, mater duntaxat octo, proles sex.

Tertiæ flos ex flauo & rubro coloribus permixtus, magnis




sex mucronatis flauisque foliis constans, quæ ab ungue omnino nigro, rubras venas per foliorum longitudinem radiatum excurrentes, & in latera sparsas habet, nunc raras admodum, modo densas & confertas.

Icon Clusii est in lib. icon. Plantini p. 132. cum hac inscriptione, *Lilionarcissus candidus suauè rubentibus oris*, Teut. 167.

TVLIPÆ DVBIÆ TERTIÆ mediæ secundum genus, flore præcocius æquali.

Tuliparum Dubiarum mediarum, quarum flores præcocius sunt æquales, & caules inter illarum magnitudinem nonnunquam constituunt, vel plurimum autem Dubiarum maiorum altitudinem æquant, multiplex est genus, cuius differentiæ difficiliter distinguere possunt quam præcocium, ob variam colorum mixturem per totos flores interdum diffusam, vt longa & diligente obseruatione didici, inquit Clusius, aliquas



quas tamen & his quæ vel mihi floruerunt, vel apud alios creuisse significarum est, quæ potèro perspicuitate, pro ingenii mei tenuitate describam.

Sunt igitur quædam Flauæ dilutiores vel pallidiores, quarum externa folia quodam-

Tulipa Dubia media 2. versicolor.



modò foris virefcunt: alia: quarum folia orbiculata sunt, vngues tamen subvirescunt: quarum item folia flauo colore elegantis, interiora tria superne orbiculata, & quibusdam sanguineis guttis aspersa: Nonnulla omnia folia flaua habent, vngues ceræ coloris, quales aliqui ferotina habet: alia: quarum vngues nigra

& splendente maculâ sunt insigniti, vel ex fulco & viridi coloribus commixtis perfusi.

Nonnulla Flauæ variæ sunt, nam licet omnia folia initio flaua sunt, tertio tamen vel quarto die postquam explicati sunt flores, singula folia tenui limbo rubro exornata conspiciuntur, nonnunquam etiam in proliis [nam satis fortificata est] nullus apparet, vel alterius duntaxat annis conspiciuntur: quædam flaua folia habent, oras autem cinnabaris ferè colore infectas: aliarum folia pallidiora sunt, & rubris venis ornatas habent oras: quarum item folia etiam pallent, sed perfusus est Mali autem præmaturi color, præsertim circa oras: inuenitur etiam versicolor elegantissima, cuius color flauus & ruber ita commixti sunt, vt è fericeo pannino flauo, cuius subtegmen rubrum est, constare flores videantur, illius vngues nigri sunt.

Aliarum flores albi quidem sunt, sed in flauo degenerantis coloris qui *ἀνθελευκος*, qualis in Dubia maiore descriptus est, harum folia vel omnia mucronata, vel interiora orbiculato mucrone cōstant, vngues, stamina, apices pallent.

Quarundam flores *ἀνθελευκος* etiam sunt coloris, sed alius color adiunctus; nam cuiusdam folia omnia mucronata, extremum illum mucronem rubro colore tinctum habent: alia pallidiora sunt, & oras rubris venis distinctas habent: in nonnullis foliorum oras, vel purpureis venis distinctas, vel carnei coloris omnino sunt, qui etiam media folia occupat.

Vnam habui A.V. ferotinæ semine natâ quæ anno 1589. florem prorsus album protulit, licet initio virefcens color perfusus quodammodò conspiceretur, staminum apices fusi fuerunt.

Nonnullarum flores A.V. sunt octauæ A.V. præcoci similes, ique, vel dilutiores, interioribus foliis quodammodò orbiculatis, vnguibus nunc exalbidis circa summum purpureascentem maculâ insignitis, staminibus exalbidis, eorum

apicibus nigricantibus, modò vnguibus & staminibus candicantibus, vel vnguibus exalbidis subcæruleo orbe inclusis, albis staminibus, nigricantibus apicibus: aut saturatoribus foliis præsertim exteriori parte, exterioribus mucronatis, omnium oris candicantibus, vnguibus exalbidis subcæruleâ maculâ insignitis, albis staminibus, apicibus eorum nigricantibus: quarundam folia mucronata dilutiorisque sunt coloris aut saturatoris. Inueniuntur etiam quarum flores plurimum ad A.V. præcoci secunda & tertia colorem accedunt: & alia semine à Boisot misso nata elegans in cuius flore purpureæ venæ per totum folium dispersæ sunt, floruit hæc primum anno 1590.

Purpurearum flores coloris nunc sunt dilutiores & magis floridi, foliaque interiora orbiculata habent, exalbidos vngues, purpureascentia stamina, eorum apices nigricantes: inodò quasi similes Purpureæ dilutiori dubiæ maiori, candicantibus oris, vnguibus vel ex albo flauescentibus, vel flauis omnino, aut veluti fuligine infectis, aut ex cæruleo, flauo, & subvirescente coloribus commixtis: modò saturatoris coloris, cui albicantes tamen quædam venæ permixtæ sunt, vnguibus aut ex flauo nigricantibus, aut flauis omnino, aut ex viridi nigricantibus, aut subcæruleis, siue ex cæruleo flauescentibus, aut cæruleis omnino, nisi flauescens orbis ambiret: Sunt etiam quarum flores diluæ purpurei illum ferè colorem referunt, qui in Caryophylleis floribus remisse miniatis è Silesia primum delatis conspiciuntur, Viennenses & Silesiæ matronæ Pommeransfarb / quali aurei Mali colorem illis tribuunt, quia dilutius rubenti coloris flauus quodammodò perfusus videtur, horum color vel dilutior, præsertim interiori parte & per oras, vel saturator, interdum internè dilutissimus, foris saturator, vngues vel flauo, vel flauum colorem fuliginosus ambit orbis, vel ex viridi nigricant, vel fusi sunt: vidi etiam quarum flos ad postremam differentiam Secundi generis valde accederet, rubro tamen colore alium superante: quædam plurimum accedunt ad eam quæ inter Dubias maiores octauo loco reposita est, verum humilior, foliis interioribus orbiculato mucrone præditis, vnguibus vel omnino albis, vel candicantibus, & superiore parte ad cæruleum colorem tendentibus, staminibus exalbidis, apicibus ad fulcum vrgentibus, vel vnguibus cæruleis, aut ex cæruleo virefcantibus, vel nigricantibus: alia: Dubiarum maiorum nono generi similes ferè, licet minores, quarum vngues vel fusi sunt, vel ex cæruleo nigricant, vel flauo nigro orbe flauum colorem ambiante.

P-V. florum folia vel dilutior colore purpureo sunt prædita, vel saturatiore, omnium oras mucronate, vel interiorum orbiculatæ exalbidæ sunt, vngues aut albi, aut subcærulei, aut albi quidem, sed quos latus orbis carnei coloris ambit, stamina plerumque nigricantia.

Inter reliquas Rubræ mihi natæ quarum folia foris ad purpureascentem colorem accedebant, interioribus autem coccinei ferè coloris erant, vngues, stamina, apices, flauo: item quarum flores rubri, foliis tamen exterioribus secundum longitudinem flauus color aspersus: & quarum color splendens, sed obscurus & ad lateritium accedens, vngues flauo vel nigri: præterea quarum flores R. ferotinæ similes, quæ ab vnguibus nigris, flauo orbe cinctis, *Oculus Solis* cognominata est.

7. Purpurea.

9. Rubra.

Alia item cuius flos nondum mihi conspectus dum hæc scriberem; verum pictura à nobili viro Io. de Hogelande Lugduno Batavorum missa anno 1590. deinde illius vnica quam habebat bulb-
bus eiusdem anni Autumno, cuius flos omnia folia mucronata habet: eaque vt ipse Hogelandius ad me scripsit, initio quidem omnino viridia, deinde oris veluti pallefcen-
tibus, quæ tandem in rubrum colorem mutantur radiatum sese alteri colori commiscen-
tem, color etiam ille viridis fenescen-
te flore elanguescit, præsertim interiore foliorum parte: & sanè subsequen-
tibus annis bulb-
bus ille florem mihi dedit, qualem descripserat. Sed & alia semine mihi nata est, quæ similem florem produxit Lugduni Batavorum anno 1595.

Sunt omnes hæc dubiæ mediæ secundæ classis [præter postremum genus] mihi natæ semine, vel Byzantio allato, vel à Nobil. Viro. Io. Boissot communicato, vel (quod magis mirandum) aliquot etiam præcoces. Nam anno 1586. ex purpureâ præcocius florente habui P. ferotinam elegantem dilutiorem: è P-V. autem præcoci, P. ferotinam ad rubrum quodammodo tendentem, & P-V. ferotinam dilutiorem elegantem: Anno sequente raris e P. præc. Rub. ferot. elegantem, ad carneum colorem accedentem; vnguib-
us ex caeruleo nigricantibus: 1588. autem anno è P. præc. *ἀρχαῖα* ferotinam: R. ferot. vnguib-
us & staminibus flauis, P. ferot. nigricantibus vnguib-
us, & P-V. ferotinam: ex A. præc. Flauam ferot. & P-V. ferotinam. Contrà ex A-V. ferotinâ nate sunt præcoces Alba, Flaua, Rubra, vnguib-
us flauis; Rubra *Ochia di Sile*, & P. dilutior.

Cuiusdam porro R-V. quæ anno 1597. primum Bruxellæ florem protulit, semine, nactus est iam dictus Boissot, & quædam Nobiles matronæ Dubiæ etiam Tulipas mira colorum varietate ludentes, vt ad me perscriptum est: etenim & flauas & pallentes, ex albo item pallefcen-
tes, siue *ἀρχαῖα* purpuralescentes, intensius aut dilutius rubentes, lateritii coloris, atque aliis coloribus insignitas habuerunt: quibus etiam similes & aliæ elegantissimis coloribus variè mixtis postea mihi semine natæ, & singulis annis adhuc nascuntur, quibus pares numquam antè conspex-
it: ita Deus in istis floribus admirabilem suam potentiam ostendit.

Cæterum anno 1599. mittebat lac. Plateau Tulipæ, quæ illi semine nata erat, monstro-
sæ quidem sed non inælegantis, iconem, colore à reliquis differentem: eius enim flos, ipso referente, prorsus viridis, internè sex parua cralla-
que alia etiam viridia complectens, caput ambientia, vt initio parua Brassica florida siue Cypria videretur. Primo quo florem tulit anno, se neglexisse scribebat, vitium aut naturæ ludum esse existimans: sed cum subsequen-
tibus quatuor annis florem non variare animaduerteret, nullum autem probum semen præbere, eius rei pertæsus, bulb-
um alteri donauit.

Sed & mihi biennio post, ex semine natis ferotina mihi florem dedit sex foliis, vt reliquæ, constantem, prorsus virentibus, exceptis oris quæ pallidæ erant, & vnguib-
us, qui ex viridi pallefcen-
bant. Floruit etiam mihi anno 1596. alia viridis cuius oræ albæ fuerunt. Breuiter, singuli anni nobis proferunt nouum aliquod Tuliparum genus, nec ante cupiam conspectum.

Ex præcoci-
bus inter-
dum seroti-
na.

Colorum in
Tul. p. 11
summa var-
ietas.

ferot. Vi-
ridis, dupli-
ci foliorum
in flore se-
rie.

ferot. Vi-
ridis, oris
pallidæ, &
albis.

TVLIPA BVLBIFERA.




Nos Tulipæ Bulbiferæ iconem proponimus ex Clusio, quæ verò de ea scripsit paulo post, vbi de cultura tractabimus, recensentur. Schvven. Car. Siles. l. 2. Tulipa bulbifera, Lilionat-
cillus bulbum ferens in horto. Tabern. icon. Tulipa bulbifera. Tarcijsen l. 2. l. 11.

TVLIPARVM ICONES EX LOBELIO, diuersæ ab istis quæ Clusius habet in postrema historia.

Multa sunt figuræ & icones Tuliparum ex Lobelio cum suis titulis in lib. icon. pl. quæ non sunt in poster. histor. Clusii, de quibus hic agere statim vt illustrior sic historia Tuliparum.

TVLIPA LVTEA OBTUSIS foliolis florum.

Nos sæpius obseruauimus in horto Ill. C. Wirtemb. Montbelg. pulchrum genus Tulipæ flore luteo, cui florum foliola obtusa, quæ non se multiplicabat: cui optimè respondebat [potissimum quoad florem & folia] icon à Lobel. in-



Obseru. p. 69. secundo loco posita, cui titulus est: Lilio Narcissus Chalcidicus rotus luteus, sanguineo puniceo par, & similis huic in icon. florum cui foliola in acutum non desinunt: existimamus tradi à Clusio, pro dubia secunda Hana. Dodonæus lib. fl. eam iconem solam posuit pro Tulipa. H. Lugd. iconem habet cui flos deorsum inclinatur, alioqui non multum differens a iam dicto: de eo tenet ea: Tulipæ genus

Tulipæ genus quidam esse arbitrantur plantam quam *Oulondiam* Græcum vulgus appellat.

TVLIPA PHOENICEA LVTEIS ORIS
flore parulo.



L Obeli-
fusa iconē
Tulipæ ha-
bet cū hac
inscrip-
tione, Lilio-
Narcissus
luteis oris,
flore paru-
lo: huius
descriptio
fortē est
quæ antē
posita est
Lobelio se-
cundo lo-
co. In scō.
Plant. libr.
huius figuræ
titulus est
est Lilio-
Narcissus

phoeniceus luteis oris, flore parulo. Hist. Lugd.
coniunxit hanc iconem cum alia sub titulo Tu-
lipæ luteæ.

TVLIPA COCCINEA PVNICEAVE
Rutilans.



I N libro Ico-
num Plantini
p. 128. est figura
cum hac inscrip-
tione: Lilio-
Narcissus coc-
cineus puni-
ceusve rutilans,
Lob. 67. Teut.
165. Dolendum
est, quod Lobel.
Tulipas suas, nō
descripserit nec
natales earun-
dem assignarit,
vt rei herbariæ
studiosi certio-
ris aliquid con-
cludere possent.
Amplius igitur
de his cogitan-
dum.

TVLIPA COCCINEA CANDI-
dis oris.

I N libro Iconum Plantini pag. 130. est figura cū
hac inscriptione: Lilio-Narcissus coccineus
Tom. II.



TVLIPA RVBRA, ORIS ET VÁ-
ginulis albis.

H Vic, qualis aliis, radix bulbosa: folia quo-
que consimilia, non undulata: caulis sin-
gularis, cubitalis, fuscus. Flos senis, itidem vt a-
liæ, foliis constans: singula sanguineo rubore in
media maioreque parte tincta, oris circumqua-
que & vnguibz albidis: apices crocei: stilius
vt cæteris friquetus. Hæc nostra fortē ad præ-
cedentes dubias Clusii referenda.

Schvven. in Cat. Silef. meminit Tulipæ rubræ
candidis oris. Lilio-narcissi rubelli candidis oris
Lob. Roter Tulipan mit weissen spizen.

TVLIPA NIVEA TOTA.



S Ynt in libro Descriptio
Icon. Plant. p.
131. figuræ duæ
cum hac inscrip-
tione: Lilio-
narcissus niueus
totus, Teut. 166:

TVLIPA CANDORE ET RVBORE
confusa.

H Anc iconem inuenimus tantū in libro
LII


Iconum Plantini p. 137. titul. Lilio-Narcissus cado- & rubore confusus Teut. 166.



TULIPÆ PVMILES.

Tulipa dubia pumilio.

Descriptio



Tulipa pumilio alba.



regens plurimo, denso, candido, mollique tomento suffulta est, ut molliissime bulbum recubare necesse sit.

Inuenitur etiam alterum pumilionis Tulipæ genus, quod mihi (Cluii verba sunt) quidem conspectum non est: sed iconem suis coloribus expressam accipiebam anno 1596. ab erudito viro Io. de longhe, Ecclesiæ Middelburgensi in Matthiæis, addita hac descriptione: Mitto ad te Tulipæ quidam iconem, ad ipsius plantæ similitudinem expressam, hoc est, eadem quâ Tulipæ magnitudine, paribus caule, flore, foliis quæ paullo longiora & angustiora: habere debet] & bulbo quem erui, ut pictor commodius exprimeret. Tribus iam annis continuis in horto habui florem proferentem, sed vnicum: nec florem habuit quâdiu singulati folio prædita fuit, aliarum Tuliparum modo: nâ superiore anno habui flore suo onustam, & aliam unicum folium producentem, quæ nunc quaterna folia nacta, primum florem demum tulit, alteri protus similem, ut certum sit id genus maiorem amplitudinem non adquireturum. *radicem ille.* Tota verò planta [quantum ex iconem deprehendere potui] palmo maior non est, quatuor promens folia angusta, carinata, Tulipæ Mompelianæ foliis similia, inter quæ cauliculus prodiit vncialis aut paullo longior, nudus (præter aliarum Tuliparum morem) ex viridi purpurascens, summo fastigio florem gerens sex foliis constantem, foris nonnihil purpurascens, intus candidis, umbilicum occupante oblongo capitulo sex flauis staminibus lecto, quod an semen protulerit, ignoro: florem autem tulisse Aprilis inde conicio, quoniam sub Maii initium picturam mittebat, cuius bulbus exiguus, bulbitamen aliarum Tuliparum formam referens, ex spadiceo nigricante cortice testus. Icone accepta, Croci verno tempore florentis genus initio existimabam.

Caterum non omnes flores diu in sua coloris elegantia & venustate perdurant, verum nonnullarum magis caduci, breui marcescunt, aliarum firmiores sunt & coloris gratiam diutius retinent, præsertim serotina & dubia, omnes certe nubilo cælo sese contrahunt, & pluuio faciliè corumpuntur, etiam antè quàm expandi possint interdum, si continui cadunt imbres: contra temperato Sole illustrati, explicantur & diutius conseruantur: ar vehemente etiam eius ardore nimium excocti, & suo humore exhausti, faciliè defluunt.

Neque omnes versicolores, tam præcoces, quàm serotina, singulis annis eandem coloris gratiam perpetuò retinent, sed alternis variate sæpius obseruauimus: exempli gratia F.V.A.V. vno interdum anno nitidissima sunt, sequente vix alius color, quàm flauus vel albus in eis conspicitur, sic R.V. & P.V. nonnunquam magnas habent oras flauas & albas, sequente valde exiguas.

In lib. icon. plant. p. 127. Tulipa pumilio, Teut. 164.

Caterum tametsi seminibus terre mandatis Autumnò [inutilis enim bulbacearum, & ruberorum maximè ex parte verna est satis] huius plantæ genus conseruari solet: interdum tamen & nucleis maiori bulbo adnat's propagatur, sed nulla inter præcoces Tulipas fertilior, rubra, & alba: omnium autem maximè serotina rubra, quæ adeo fecunda est, ut etiam semine nata, & vix b. m. alias proles generet biennio aut triennio

antequam florere incipiat; quod etiam faciunt pœreque dubia. Solent enim omnes Tulipæ nondum adultæ, & antequam flores proferre incipiant, vt plurimum singulis annis rectâ & quasi ad perpendicularum in dodrantalē & palmarē altitudinem profundius descendere (Apeemineas excipio, & quasdam alias, quæ non in altum, sed in latus & obliquum, ante quàm floriferæ sint: proles è longis venis dependentes spargunt, vt proximo capite declarabimus:) ferotina autem illæ & dubiæ iam dictæ: etiâ in veteris bulbi exuuiio qd substantiæ relinquere, quàm aliū bulbum efformata, similiter in exuuiio substantiæ quidpiam relinquit, quæ in aliū bulbū transit: vt si quis cum dexteritate quadam & industria trimos & quadrimos eruat, exuuiorum vestigia sequendo, nonnunquam velut catenam aliquot bulborum coherentium, & ex primo exuuiio ortum ducentium inueniat: licet interdum accidat vt R. ferotina iam grandior, nondum tamen planè adulta, instar Tulipæ Apenninæ siue Bononiensis proles in latus spargat, vt in meo hortulo, in quo varii generis bulbosæ stirpes florum elegantia & varietate commendabiles alebam & excolebam, dum Viennæ agerem, non semel obseruau.

Memini & bulbos infimâ alâ, quasi summâ tellure natos, in ferotinarum & dubiarum generibus, præsertim (licet etiam in A-V, P-V, & quarundam aliarum præcocium alis bulbi mihi nati sint,) qui telluri commissi, eiusdem coloris cum matre florem subsequente anno produxerint: eundem colorem etiam retinent bulbi matris adnati.

Ex feminibus verò quæ sit propagatio, planè [vt dixi] incerta est, in præcocibus nimirum & dubiis: nam ferotina magna ex parte suum genus conseruare videntur, quemadmodum superiore capite dictum est, aut si aliquam mutationem adquirent, exigua ea est, & plerumque in vnguium & staminum varietate, aut coloris intentione vel remissione consistit.

Solet caulis è medio bulbo erumpere: sed ipso cum foliis iam marcido, & siccatò, si bulbum eruas, ad latus illius enatum conspicias (quod etiâ cuenit in Iride bulbosâ, Colchico & congeneribus aliis,) nouo bulbo paulatim succrescente, & totius plantæ succum ad se recipiente, quæ tempore commodissimè erui potest, erutus bulbos diu extra terram adseruari, & in alia loca etiam procul diffisa sine noxâ transferri.

Omnes autem cuiuscunque generis Tulipæ (vt etiam hoc breuiter annotem) quemadmodum longâ experientiâ didici, quândiu florem non ferunt æquales: planè sunt, & vnicum folium singulis annis proferre solent: at si, dum emerit, sese explicare incipiens, secundum etiam eo inclusum appareat, illo ipso anno florem prolaturum spes est, nisi pruina, aut aliud ab insectorum erosione incommodum eam intercipiat.

Inutilem sanè sationem Veneram Tuliparum obseruauimus, quia Tulipæ multæ in profunditate descendunt, & sic perduntur: bulbis nouimus qui substernant tabulas lapideas: in solo macro & sicco feliciter proueniunt, quàm in pingui & argilloso: plurimi feliciter ætate bulbos terra eximunt, & per plures septimanas extra terram referuant.

Tulipæ, si quidem fides habenda Lobelio, medio iam Vere floret, non modo in Italia, sed etiam Belgicis & Gallicis hortis. Naturæ luxu & lusa huius quàm multas venustissimas florum in de-

Tom. II.

litis habent inter Belgas D. Carolus de Croy, Princeps de Chymey, D. Io. de Brancion, D. Io. Vander Dill, D. Maria de Brimeu. Io. Montonus. In Thracia etiam, teste Dodonzò, & Capadocia Tulipæ exit: Italia & Belgio peregrinus flos. Aprili mense florem Belgium videt: Thracia verò etiam Ianuario, veluti testis est Augerius Busbequius in itinere Constantinopolitano, qui ingentem vbique florum copiam media planè hieme, Ianuario mense sese inuenisse refert. Horum florum insignem varietatem obseruauit ego Sturgardiæ & Montbelg. in hortis Ill. E.C. Vviremb.

An iisdem facultatibus cum Satyrio Tulipæ præditæ sint, neminem periculum fecisse intellexi, inquit Clusius. Io. Müller Pharmacop. Vienn. multos Tulipæ bulbos condidit, radicem Orchidis instar, quibus longè suauiores, & palato gratiores deprehendebam: an verò id præstaret quod Satyrio tribuitur, nondum intellexi. Antuerpianus quidam Mercator cum horum bulborum non exiguum numerum ab amico cum byssinis pannis Constantinopoli sibi missum accepisset, Cepas esse existimans, ex illis aliquot sub prunis assari iussit & vulgarium Ceparum modo, ex oleo & aceto in cœnam sibi parari reliquos, in horto, inter Braslicas & alia olera deposuit. De viribus & facultatibus Tulipæ, nihil compertum habet Dod. aut à quoquam compertum reperit.

Vires Tulipæ,

TVLIPA MINOR LVTEA NARBON.

Minores Tulipæ (inquit Dodon.) foliis sunt angustioribus & ferè porraceis: cauliculis tenuioribus ac brevioribus: floribus minoribus, & minis in latitudinem sese pandentibus: bulbis minoribus, alibic in Gallia Narbonensi ac in Italia nasci feruntur.

Tulipæ minor Dod.

Nonnulli Hermodactylus flore luteo dicitur, sed perperam tamen. Neque enim Hermodactyli species aliqua esse videtur. Narbonensem Lilio-Narcissum luteum montanum, Tulipæ speciem, erutam è Seucenæ Narbonensis iugis à plurimis iam annis, in Belgium deferendâ Lob. & Pena Adu. curauerunt amicis Antuerpianis, qui primam Tulipam illam vocauerunt, ipsi verò Narcisso-Lilium luteum audacius fortè (vt solent, quò reſum cognitioni distinctioni consulant) indigitauerunt.

Hermod.



Flor. itidem singulo bulbo & caule Narcissi minore, tenuiore, delicatesiore, vnicus, luteus, tenuis foliis confans, ad Liliū aut potius ad Liliū lutei Asphodeli florē accedens, filamentis luteis è medio enatis. Bulbus exilior multò, nucleum oblongum Allii æquat, sed que sæpius adnatum Allium exili filo ad.

Descriptio

L. II 2

nexum habet: folia crassiora, pauca, è caule me-
dio, porracea.

De hac Clusius: Tulipæ Apenninæ similis
penè est Narbonensis & Cebennis montibus à
Lobelio primùm eruta, & amicis in Belgicam
missa: minor tamen est in omnibus, flores foris
magis virentes, intrus flauis, delicatius quiddam
spirant: radix etiam è tenuibus nervis in latera
loboles & bulbillos spargit.

Hist. Lugd. dicitur Tulipa minor Dod. & Ca-
mer. in hort. Tulipa minor Narbon. odorata &
cum mediis ferè florens.

Nos hanc Tulipam siccam habemus ex plan-
tis siccis Valerandi Dourez, caule palm tri, bulbo
sublongo, sub quo multæ radiculae, titulus est,
Narcissus luteus: icon quam proponimus est ex
his quas sculptas emimus.

TULIPA HISPANICA NARBONENSI paulò minor.

Tertia in monte quodam Araniocis vicino na-
ta, in Belgicam à Franc. de Hollebeque Re-
gio hortulano missa, Narbonensi paulò minor
est: eius florem non vidit Clusius, sed Narbo-
nensi similem esse intellexit, qui folia tamen ha-
beat foris non omninò viridia, verùm purpuraf-
cente etiam colore perfusa. Illius bulbos ali-
quando aluit, qui vnicò duntaxat folio semper
germinarunt, adeoque inanes paulatim facti
sunt, vt tandem perierint. Miserat præterea idem
Franciscus & alios aliquot bulbos (vt Hispania
bulbacearum, & variarum aliarum elegantium
stirpium maximè ferax est,) quorum maximam
partem in Hispania suâ peregrinatione non ob-
seruabat Clusius, qui tandem Belgicum aërem
retpuentes, contabuerunt.

Descriptio

TULIPA LVTEA BONONIENSIS.

Descriptio



Mediocri-
ter ma-
gno bulbo
prædita est hæc
Tulipa, oblon-
go, fibroso, sa-
pore dulci &
grato, qualis
est Tuberum
terræ, spadiceo,
vt ait Clu-
sius, cortice re-
cta, qui in bi-
nas aut plures
res soboles
singulis annis
diuiditur, pro-
ximo anno
flores daturas.
quin & alias
subinde obli-
quæ & in late-
ra spargit, præsertim, quæ nondum florem tulit)
non in altum rectà mergit: caulem proferit cu-
bitalem, & bicubitalem, nonnunquam in ramos
binos aut ternos Clusac etiam plures ab vna ra-
dice, vt asserit Camer. diuisum, angulosum, colo-
re herbaceo, fastigium versus purpurante: folia
dodrantalia aut ampliora, aliqua minora, vnciam
lata, partim à radice statim, partim à caule exeur,
nullo pediculo, carinata, colore glauco. Flos vni-
cuique ramo, odore suauis Leucon Cheiri dicti,
sed imbecilliore, mediocrius magnus, foliis sex

constans, interdum octo Clus. quorum exteriora
tria, extrinsecus à luteo purpurascunt aut vi-
rescunt, intrinsecus lutea: tria reliqua penitus
lutea nisi quod mucrone tantillum rubent: in
medio apices lutei seni cum stilo triquetro viri-
di. Succedit siliqua magna. Semen, teste Clusio
vt in reliquis Tulipis, sed longè minus.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. p. 145. Bononiensis Lilio-
narcissus luteus [siue Tulipa] Narbonensi folio,
caule, & flore proximus, omnia tamen vegetiora
& grandiora, quandoque flores in caule biparti-
to geminos stellatos, & nonnunquam ternos vi-
deas, iucundo Leucon lutei odore.

Gesner. in fin. hist. Cordi, Tulipa alia Turcica
erudit in Italia, quam Guilandinus Saryrium
triphyllum coniciebat: Lonchitis, inquit Cæ-
salp. cuius opinionem non probamus, à Lanceæ
culpide cognominata, quidam Narcissum luteum
vocat: folia ferè Narcissi, &c.

Camer. hort. Tulipa Bononiensis, quæ maior
Narbonensi & plerumque polyclonos, odorata,
Item apud Matth. Germ. Narcissus 9. Tulipa Bo-
nioniensis: Quæ planta sit Matth. Narcissus no-
nus hic, aut in Epi. Matth. Lat. 8. nescio, nisi sic
hæc Tulipa. Sanè Icon quæ est in epi. Matthioli.
pro Narcisso 8. Tulipam aliquam denotare vide-
tur polyclonem: non accuratè pictam nec descri-
ptam, quod vulgare Matth.

Hist. Lugd. Lilionarcissus luteus Bononiensis.
Schuyven. Tulipa Bononiensis Narcissus 9.
Matth. Tulipa minor lutea Italica, welsch geel
Narcissen liliën.

Tabern. icon. tulipa Italico. 1. Narcissen liliën.
Florer cum sexortinis aut paulò ferius. Nobis
florer Montbelg. mense Aprilis in horto Ill. Princ.
cum binis floribus in vno caule, magnis, luteis,
qui diu durant, postea oriuntur magni calices.
Missi bulbi ab Ill. Guiljelmo Landgraui nomine
Tulipæ Bononiensis, videram alias Bononiæ in
horto s. Saluatoris, folia sunt terna: ea multum
multiplicat, florebat principio Martii: facilius
cæteris apud nos videtur multiplicari nec facile
perire.

TULIPA PVMILIO ANGVSTI- folia alba.

Tulipæ pumilioni angustifoliæ flos senâm
foliorum, albus: internis tribus candidis, la-
terioribus: angustioribus verò tribus exterioribus,
internæ item albis, externæ ex fusco rubentibus,



Croci floris
lutei ferè pa-
ribus & simi-
libus. Trago-
pogi instar fo-
lia angusta,
quina aut se-
na, humi pro-
cumbentia, caulis palmq
altior. Radix
Monspelien-
sis Tulipæ
maior. Bono-
niensis ferè
par, subfusca
foris. Maxi-
mo in prætio
habetur & se-
dulo colitur
(teste Lobel-
Adu,

Adu. par. 2.) in horto amantissimo D. Ioh. de longhe Mesopoli Martiacorum concionatoris, huius studii callentissimi.

TVLIPA PVMILIO ALBA ALTERA
Lufitanica.



Vncialis
aut scf.
quincialis
hæc plantula
hoc anno 1603
à N. le Quel
Botan. Lute-
riano egregio
accepta, ex-
lioribus bre-
uioribusque
angustifoliae
Tulipæ supe-
rioris foliis :
flore albo, e-
xili breuique
pediculo: flo-
rem sicum
vidit Lobel.
Adu. par. 2. al-
bum, lenis fo-
liolis donatū,
staminalisque

totidem: Bulbus valdè parvus effigie aliarum
Tuliparum, duriore involucri, externè pullo,
squamoso, obductus: interiore autem rubens,
quem studiosè in horto alere incepit, vt eius de-
lineationem pressus cum multis aliis exhibere
liceat: spontè in monte iuxta D. Oue ad maris
littora.

COLCHICVM ORIENTALE ET
Syriacum quorundam.



Colchicū
Orientale Italis, Zaf-
farano Orien-
tale Matth. in
epit. minori-
bus exit foli-
is, angustiori-
bus, & magis
acuminatis,
caule rotun-
do, flore grā-
diori. Radicē
bulbosa, cui-
denter scissa,
& lacteo suc-
co prægan-
te. Camer.
in Epit. Mat-
thiol. aucta o-
misit tu n ic-
tum descri-
ptionem.

Lobel. eam iconem habet Obs. cum hac in-
scriptione, Colchicum Syriacum Alexandrinum,
Adu. p. 54. & Ic. Plant. p. 146. Colchicu Syriacū
Alexand. Colchicum Orientale Matth. Teut.
179. De eo autem scribunt Adu. Colchicū deco-
ctis Guaiaci, ad Lucem Veneream, aliisque sudo-
Tom. II.

ificis magno remediorum compendio & ægro-
rum commodo; admittisse Chirurgum quandā
Venerum edoctum illic à plebecula.

Tabern. icon. & hist. Colchicum Syriacum;
Alexandrinum, Orientale, Syrisch zeitlofen.
Gerard. Colch. Syr. Alex. Assyrian Meadow Saf-
fran. Caterum Colchicum Syriacum vel Ale-
xandrinum à nonnullis exhibitum, nihil aliud ef-
se Clusio videtur, quàm Tulipæ genus quale A-
penninarum foret, cui pictor nimis orbiculata
folia tribuerit, ipsi verò plantæ nimis lata &
breuia.

NARCISSVS AFRICANVS BIFO-
lius siue exoticus.



E Crassa læ-
taque v-
trinque com-
pressa, squamo-
sa, veluti nu-
cleis compa-
cta radice, bi-
na tantum c-
dit folia, vn-
cias duas lata,
latioraque: &
vncias quinq,
longa, viri-
dia, læuique,
sub tellure ra-
men aliis duo-
bus foliorum
rudimentis præ-
ditus hic pe-
regrius bul-
bus, paruum

Descriptio

magnum ma-
gnitudine æquans, cuius Lobel. Adu. par. 2. co-
piam fecit præclarus vir D. Iacobus de Keyser.
Frater eius Gouarus de Keyser, bulbos eruit locis
vicinis portui siue Capo bonæ Spei, & primus in
Belgium detulit.

Narcissum exoticum appellauimus cui pro-
prior esse videtur, quoad nomen magis conue-
niens nobis innotescat.

NARCISSVS AFRICANVS
folio rotundiore.



Lobel. Adu.
par. 2. p. 503.
Narcissus Aphri-
canus folio ro-
tundiore & cō-
plicato apud
Dominum de
Keiser variat.

Descriptio

SATYRIVM QVORVMDAM

Erithronium Bifolium flore vnico
radiato albo & purpureo.

CAPVT X.

Descriptio

Satyrion hoc est radice duas vncias longa, alba, crassiuscula, & infima parte crassiore, superiore verò parte gracilescente: *folia* promittit bina, raro terna, inquit Clusius, opposita, primò mutuo se complectentia & florem occultentia, per terram fula, Lili conuallium aut Allii vrsini formâ, crassiora & magis carnosa, ex angustiore principio in ventrè



Cyclaminis instar: *stamina* in medio sena atropurpurea stilum circumstant longiorem, album, truncatidem: nullâ odoris gratiâ, inquit Clusius placens, sed solâ elegantia cõmendabilis: succedit *siliqua* triangularis, nuda s; flos, in viridi spadicea: Capitulũ hũe siliqua teste Clus. continet aliquot *semina* Leucoii bulbosi præcocius alterius semini-
bus ferè respondentia, sed longiora, gracilioraque, flauescens coloris. Quamdiu nullum florem dat hæc planta, vnico duntaxat exit folio.

Est à nobis aliud genus in Italia obseruatum de quo scribit Clusius: *Et folia longiora, maculas albas diutius retinentia, initio dum exeuat, florem etiam amplectentia, qui superiore maior plerumque est, vel lactei omninò candoris, vel mistis purpurascens alboque coloribus constans, staminibus albis, apicibus nigricantibus, huic succedit trigonum caput semina alteri paria continens: radix etiam longa & superiore crassior. Hæc ille.*

Satyrion Diosc. vera vix adhuc Herbariis bene



sunt cognita, tamen ex Dalechampi cõiectura potiùs, quàm certa asseruatione ea hic exhibet Hist. Lugd. Erithronium, montosis & apicis nascitur: radice bulbosâ, inâ parte fibratâ, oblongâ. Porro non dissimili, foris subrufa, intus candidâ, nullâ grauitate odoris iniucundâ, veluti Orcheos, tenera, gustu princi-

piò dulci, qualis est Castanea, deinde acti, Cepæ Alcaloniæ modo, quam aiunt semine perfectio in globosum caput colligi, mali figurâ, crescente verò caule extenuari, ac in longum produci, vt eauli quod satis sit alimentum velut de suo suppediet, nunc simplici, nunc velut è duabus in vnum coeuntibus iunctâ, subnascens aliis perpetuâ, & coherentibus duabus, tribusue, ac interdum pluribus, quæ exhaustâ crassiore, postea magis aufescunt: caule, si ortum eius à radice confideres, proceto, tereti, superne rubenti: *foliis* Rumicis, aut Lili, minoribus, binis, nonnunquam ternis, aliquando quinis, ad terram infractis, virentibus, sed maculis rubris conspersis, tã crebris, vt rubere magis quàm viride videantur: *flore* purpureo, Lilio rubrò, quod Martagon vocant, figurâ simili, priusquam pandatur, oblongo, dum referatur est, sex tolns constante, ad rad. cum candidantibus, reliquâ sui parte atro purpurascens, apicibus rotidem quorũ sunt foliola, niueis superne velut atro capite conspicuis.

Alterum, trifolium videlicet, inuentu rariùs, priori omninò consimile, nisi quod guttis & maculis lacteis folia variegantur, flos candidat. Vtri-
que semen oblongum siliquis includitur, nunc triangulari, nunc quadrangulis, copiosum. Inuenitur genus quoddam vnico, ac lato folio, sine flore, sine fructu. Marem appellant Herbarii.

Florent Aprili & Maio mensibus. Satyrionum historia id repugnare videtur, quòd rotunda & globosa radice non sint, qualem requirit Diosc. At si Satyrion non sunt, tamen ob insignem & venustam figuram describenda fuerunt vulgato apud Herbarios seruatò nomine, quoad verius sit inueniunt, aut è Veterum libris erunt.

Icones quatuor habet Hist. Lugd. primâ titulus est Satyrion rubrum Dalechampi. Secundâ: Satyrion

cyrii trifolium seu album Dal. Tertia Satyrium Dalech. forte Pseudohermodactylus Matthioli. Quartæ autem c. 14. Pseudohermodactylus Matth. In iconc prima non placent duo caules nec radicem figura: in historia etiam duplicat color radices, & quod globosa dicitur, ac etiam numerus foliorum, qui plurimum est plantarum simul protendentium non vnius solius. Non video cur Satyrium, cum lacteis maculis & flore albo magis trifolium dicendum sit, quam præcedens: quod flore rubro: ac cur id quod vnicū fert folium dicendum sit genus, quoddam mas nescimus, quandoquidem potius vitium est quoddam sapius quoque in Tulipis obseruatum. Icon 2. rejicienda non videtur, verum melius placet tertia. Quarta autem ex Matthiolo alio capite omnium pessima est.

Lobel. & Pen. in Adu. innotuisse scribunt non multis ab hinc annis bulbum perelegantem, cui amici Satyrium nomen fecerunt, quique à consulti Medice materie peritis Lugdunenlibus (qui condiendum curassent & exploratum habuissent) visus, Dioscor. genuinus sit habitus, nullā desideratā nota præterquam coloris, qui valde variat loci varietate, ut in Squilla, Cæpis & aliis bulbaceis videre sit: Folia cum habere bina, plurimum terna: flos ex albo purpurascens.

Icon Lobelii nobis displicet, nec terna solet ut plurimum folia ferre, sed bina: nostræ etiam icones quas sculptas emimus non placent.

Satyrii Erichonii Lobel. Obf. seu Satyrii & Dentis canini Belgarum, Hermodactyli & Pseudohermodactyli Italarum Matth. flos aut purpureus, aut candore micat, aut purpurea & candore consulis pallor. Hermodactylus & Pseudohermodactylus Italarum putatus foliis constat infernè angustis, quā radicis ceruici inniuntur.

Dentem caninum Dodon. de purg. Satyrium plærique appellant, & quidem Erythronium dicitur, desiderantur tamen nonnulla. In Matth. huic similis, (si non eadem eadem est) herba, pro Pseudohermodactylo depingitur. Quod si autē hæc est, perperam, duo additur bulbi. Ephemerum. Diosc. esse possit, si in descriptione paulula aliter se haberent.

Clus. Pannon. Dentalis 1. seu purpureo flore. Dentalis 2. seu lacteo flore vulgò Styria Medicis & Pharmacopæis Dentalis appellata, à nonnullis rusticis Schofi mura. Ex Italia Apennino Pseudohermodactyli, & Dentis canini nomine missa: ex Allobrogibus verò Satyrii Erythronii. Eadem leguntur in post. hist. vbi Dentem caninum purpurascens & albo flore inscribit. Nos Dentem canis C. virum Vlyssæ Alexandrum Bononia: D. Gesner. & D. Melchiorum Guiland. hermodactylum nominare audiuius.

Camer. in Epit. Matthioli. figuram pulchram habet sub titulo Pseudohermodactyli & Dentis canini, qui vulgò It. Hermodactilo bastardo. Lectores huius Satyrii historiam conferant cum iis quæ Veteres de Satyris scripserunt, quæ Anno-tauimus cap. de Orchidibus vbi etiam reperient æquiuoca.

Nascitur flore purpureo copiosè ad quorūdam montium radices solo herbo vdo, in Styria non procul Grætzio. Similis planè cum hac coloris, in Allobrogum montibus erutam Valeræ Dourez sibi aliquando missam meminit Clusius: sed & circa Baionam nasci, vicinis Cantabrorum montibus, referebat C. V. idemque Medicus Regius Io. de la Riviere. Floret Aprili, in-

terdum etiam maturis, in hortis præfunt culta. Flore albo aliquando accepit à C. V. Vlyssæ Aldro. rum à Jac. Antonio Cortuso Patricio Patuino, & ab Achille Cromero Medico cum Patuini videret: verum similes etiam radices Francofurtum misit Io. Vincent. Pinellus. Vtraque frigoris patientissima. Lugduni florebat Aprili in horto Valer. Dourez, (imò Io. Bauhini) è iura monte, cuius sedulitate primū nobis, inquit Lobel. innotuit, eruta Alpibus Lemano finitimis: & postea in collibus Taurinensibus Pado, scilicet quicquid diffitis, eandem eruius. Florentem in fine Februarii & Martio floribus albis vidi, in Montibus Euganeis inter Aponense Balneum & Arqua ac aliis in locis illorum montium: Hanc etiam in horto Priuli obseruavi. Antea siccam videram apud D. Gesnerum. Ferrariæ visa in cænobio S. Dominici à P. Angeli, & copiosè in collibus circa Bononiam. Item Basileæ flore albo, mense Martio, in horto D. D. Plateri. Aliud floris genus colore differens nempe rubro ex purpurea: album dat in hortis & spontè copiosè circa Genuam florens Martio & in colle la Bastie: Lugdum habebam in horto meo Genuæ æritum. Prouenit mihi Montbelgardi in horto ex radicibus Genuæ missis protrudens folia & florem Martio, & Aprili euasens.

Styriacas mulierculas radicis exiccate pollicem pulvis puerorum inspergere solent ad enecandas eiiciendâque ventris tinea Clusio relatum est. Ex vino autem haustum, mirificè colidolores mitigare expertus est D. vir Thomas Hauvsteck Sereniss. Archiducis Caroli primarius Medicus: sicut multos eius bulbos non semel Viennam vsque misit, insuper corporis vires reficere & nutrire: ex aqua verò pueros epilepticos iuuare. Ad excitandam, autore Lobelio, venterem magnam vim habere ostendit, humida & calida substantia, cum acrimoniæ paululo iuncta.

MALEAGRIS SIVE FRITILLARIA saturatior & dilutior.

CAP. XL



Maleagris ex radice emergit bulbosa, candida, solida, nullis tunicis septa, Clusio, sed veluti in binas, cæque ut plurimum inæquales partes secta, & cuius medio protuberat quasi pulvisculus quidam, unde caulis emergit, sessili parte, multis fibris donata: caulem pro-mittit tenuem,

singularem, dodrantalem & pedalem, interdum etiam maiorem, foris ex viridi purpurascens vel fusco obsoleto colore præditum, teretem &

leuem, intus fungosum : ad quem sine pediculis adnata hinc inde, nullo ordine *folia* Tragopogonis purpur. quinque sex, septem medio-



criter longa, angusta, carinata, subacido sapore prædita : in summo caule *flos* sæpè vnicus aliquando bini, interdum terni, qualem nos exhibemus (omnes auctore Clusio eodem tempore se aperientes) ex pediculis vnicalibus, cauli concoloribus, incuruis nutantes dependent, pulchri, Campanæ instar, mag-

ni, ex foliis sex compositi [Clusius habuit cum 8. & duodenis] tessellato emblemate, fritilli seu tabula: latrunculari distinctis, plagis alterno rubore, carneo, sanguineoque, & albedine pictis, aspectu pulcherrimo, interiore superficie saturationi purpuræ splendente: singula folia ab imo costam eleuatam habent, ad folii vsque medium abeuntem, in tantillo puniceo, luteolam: in floris medio, *stamina* sex, capitulo farinâ crocea asperso, *stylum* ambiunt triculpidem, coloris herbacei, odoris nullius; florem verò excipit *capitulum*, angulosum, vel, vt tradit Clusius, triangulare, vniciam plerumque longum, supernâ parte crassius & sine coronâ, alioqui Narbonensis Tulipæ capiti simile; quod in se continet *semen* pallidum, compressum, Tuliparum femini accedens, vel, vt ait Clusius, Tulipæ Narbonensis semen quasi referens membranaceo margine latiore, in quo nullum, contrâ quàm in Tulipâ, germen conspicitur.

Ea ex qua curauimus parandam nostram iconem speciosior est & coloratior, paulò citius florens; altera, colore dilutior est, minus speciosa, & nonnihil tardius florens.

Tempus

Flos interdum variat. Floret autem cum præcocioribus Tulipis, interdum etiam Martio in hortis: præcocior videlicet, nâ genus etiam inuenitur magis serotinum, & cum Tulipis serotinis flores explicans, eosque vel saturatiore maculas habentes, vel dilutiores, quemadmodum genus magis præcox, magna autem ex parte, saturatiore.

Clusius icones duas proponit: vni, titulus in Pann. p. 173. Fritillaria saturationis; p. 170. alteri, Fritillaria dilutior. In histor. verò Fritillaria & p. 153. Fritillaria dilutior. Is ait ad se primùm missam hanc plantam à Pharmacopæo Aureliensi Noële Capperon vocato, qui nomen indiderat: quodd eius areolæ versicolores Fritillum quodammodo æmulentur: vulgò Liliū variegatum antè appellata fuit: Meleagridem alii appellare malunt, quoniam eius foliola variis coloribus picta sint, vti plumæ Meleagridis avis, quâ vulgus Gallinam sive Perdicem Barbaricam aut Guineæ vocare solet, diuersis tamen.

Ceterum, qui latè Narcissi nomen extendunt [in-

quit Dodon.] non modò Tulipam, sed & Meleagridem ed referunt, quæ tamen à Narcissi differtens est, Tulipæ similior, subinde florem germinans, quam nonnulli Fritillariam vocant.

Lobel. Obs. & plant. icon. p. 36. Fritillaria sive Lilio-Narcissus purpureus variegatus, Meleagris flos Dodonæi Teut. 170. Item Aduert. par. 2. Lilio-narcissus purpureo-violaceus tessellatus niger, saturatè, dilutè aut obsoletè purpuræ, præcocius, præcox, & serotinus; sive Fritillaria à fritilli similitudine, è Lilio-Narcissi genere, præteritis Aurelianis oriunda iam diu omnium primò in Belgium delata fuit; deinde ex Xantonis, Pictauiensibus & aliis Galliæ pratis, in Britanniam, aliasque Boreales plagas ab amicis missa &c. Præcox florem Februario sæpè laxat, obsoletioris purpuræ, nonnunquam dilutioris. Media mense Martio cum præcocius Tulipis floret, cui flos colore hilarior paulò, pronus propendulusque Campanulæ instar, Tulipæ minor, naturæ admirando opificio variegatus, quodam quasi èble. mare, subalbi, purpureo-violacei saturioris, variorumque colorum, pictus, tessellatus, segmentatulusque. Serotina Xantonica flos pulcherrimus est & saturiore nitidiorque purpureo-violaceo nigro colore gratissimus. Hæc nobis Antuerpiæ iam multis annis elapsis in deliciis fuit. Omnibus semen Tulipæ minus, clauditur oblongo triquetro vtrinque superne compresso membraneo pericarpio.

Spontè quibusdam pratis ad Ligerim flumen non procul Aureliâ, vrbe Galliæ celebri, nascitur, vnde primùm ad me (ait Clusius) missa fuit Machliniam, & Belgicæ communicata anno 1572. [nasci etiam in Nortmanniâ & Britannia minore intelligo.] Deinde Viennæ Austriæ, aliquot bulbos accepi triennio post, munere Ill. V. Ioh. de Vulcop. Misit etiam aliquot post annos Ill. V. Augerius de Bousbeque. Anno verò 1579, in quibusdam pratis quadriduano itinere infra Budam Pannoniæ, ab iis qui Constantinopoli redibant, mense Martio florens obseruata est.

Sed & postea pleraque semine mihi nata sunt, quæ septimo & octauo demum anno, vel etiam seriùs floruerunt: quarum alie binos, quædam ternos, nonnullæ vel geminos, vel duodecim foliis constantes flores tulerunt. Meleagris nobis per aliquot annos floret mense Martio & Aprilis in horto Ill. Principis nostri, missi per Ill. Landgr. Philip. foelicis recordationis, eam nobis etiam misit ex Burgundia peritus Pharm. Toisanus Carolus: obseruauimus non primo anno nec secundo flores proferre, ac cum incipit vnicum, sequenti anno duos, postea etiam tertium; ea autem duplex tum coloratior, tum dilutioris coloris, fert flores Martii principio, & semine deciduo se multiplicat, verum primo Vere solum vnum tenue folium profert. Semina vbi matura committenda sunt terræ.

Fritillaria nigra.

Fritillaria quæ nigra aut obscurior apud Lob. Adu. par. 2. vocatur, internè ex luteo viriscescit cum reflexis oris, viridibus lineis striata; à medio ad centrum subfusca tessellata est, *flos* vnicalis longitudinis, vt aliorum congenerum. Tessulis à medio interno similibus prædita est, cuius flos hilarior purpurascens. Obsoletioris coloris

ex luteo

ex luteo magis viridi, parum subfuso a intus minus tessellata, quemadmodum Fritillaria ex fusco & luteo sublurida, cuius flos longitudine sesquiuunciam æquat: omnibus per flos ris maturitatem, sena folia reflexa sunt.

MELEAGRIS SIVE FRITILLARIA

Pyrenæa flore minore.

Mittebat Venerius bulbos Fritillariæ cuiusdam [inquit Clus. hist. rar. in append. par. 2.] e Pyrenæis montibus erutos, e cuius floribus quos insequente anno proferebat, diuersam esse obseruabam ab iis quas cap. II. lib. II. hist. Pl. exhibui.

Bulbum quidem habebat Fritillariæ illo c. descriptæ formâ similem, minorem tamen: ex quo prodibat pedalis *canticulus*, gracilis, viridis, senis aut septenis foliis septus, ex viridi flauescens, qualia ferè sunt in aliis Fritillariis, in cuius summo fastigio nascebatur flos, aliarum Fritilliarum flore minor, sex foliis constans, quæ extimas oras, nonnihil reflexas habebant, vt parui tintinnabuli formam exprimeret, quorum terna exteriora, internis erant angustiora, omnia obsoleti fortis coloris, circa oras tamen (præsertim interiora) venis quibusdam flauescens distincta, internè verò ex viridi flauescens & splendentis, à mediis porò foliis ad ipsos vique vngues [qui similem colorem habebant] plurimis maculis saturatè purpurascens tessellatim dispositis notata: ex umbilico prodibant sex breuia *stamina* longis apicibus pallidis prædita, cristulco stilo è medio illorum procedente: odor eius grauis, quasi Phalli odorem reterens, & proximè ad eum, qui in Spatula fœtida percipitur accedens.



In earum porò Fritillariæ Plantarum quæ e Pyrenæis montibus eruuntur, floribus, non minor obseruatur diuersitas quàm in illis quæ vulgares in diuersis Galliæ Prouinciis repertiuntur: nam licet omnium quos mihi [loquitur Clus. Exor. in app. altera] quidem conspiciere licuit forma quodammodo similis sit, sex videlicet foliis constans, eorundem terna interna folia magna ex parte tribus externis sint latiora & ampliora, quidam tamen flores illa repanda habeant, hoc est, illorum extimas oras reflexas habent: nonnullorum verò oræ vel non sunt reflexæ penitus, vel certè minimùm: rursus illi flores qui extimas foliorum oras reflexas habent: alii aliis saturationis sunt coloris, quidam etiam adeò saturi, vt nigri videantur, præsertim externâ foliorum parte, quæ nec tessellis distincta apparet: at interna purpureis quibusdam maculis distincta, vel fre-

quentioribus vel minùs frequentibus, aut magis saturis, aut dilutioribus, eaque splendet. Illi verò flores qui folia repanda non habent, vel quorum oræ paululùm duntaxat sunt reflexæ, externâ partè vt plurimùm virescentis coloris sunt, internâ autem ex viridi flauescens & splendentis, quali penè præditus est tenuior ille sericeus pannus vulgò *casetas* vel *casar* nuncupatus, ex flauis & viridibus sericeis staminibus contextus: atque in illis tessellatum illa distinctio obscurius apparet: singulorum autem foliorum vngues internè nonnihil caui subuicidem maculâ impressâ habent: ex floribus verò umbilico sex alba stamina prodeunt, quorum apices pallidi, inter quæ trifidus exilit stylus paulò supra stamina sese exerès. Florent paulò seriùs quàm vulgares serotinæ Fritillariæ, & semen ferunt in thecis siue capitibus triangulis, vulgaris Fritillariæ instar, planum, vulgaris semini prorsus simile, in quo nullum etiam germen conspicitur. Interdum hæc planta binos flores in eodem caule profert, quemadmodum vulgaris. Audio huius generis plantas reperiri quæ proferant florem penè flauum, quas nondum videre mihi contigit. Lobel. Adv. par. Fritillaria Pyrenæa nigra foliis latioribus, quibus aut senis in caule pedali, altioræque. Floruit Londini mense Aprili.

MELEAGRIS SIVE FRITILLARIA

Aquitanica reflexis oris.



Nobilis Vir loh. Boissor genus habebat Fritillariæ magis serotinâ, quod toto bimestri post primû flos ruisse ad me (ait Clus. Pân. & hist. post.) scribebat binis ornatum floribus, missus *bulbus* Autumnum: Maii subsequens initio *florem* aperuit sex foliis, vt in præcociore, constantem, quorum extrema oræ nonnihil reflexæ erant, dorsi nervus paululùm extuberabat, atque virescebat, interiora terna folia externis erant latiora, omnia autem exterius ab imo folio ad extremas oras, obsoletæ purpuræ radiis, sub quibus nonnihil flauis conspiceretur, distinguebantur, interius verò colore ex viridi flauescens prædita erant, veluti sericeus pannus viridis, cuius subtegmen flauum sit: sex *stamina* ex umbilico prodibant pallidis apicibus obsita, alia aliis longiora. Nullum *femen* tulit, proximo anno imminutus bulbos florem non dedic, tandem subsequens rigida hyems omnino corrumpit.

Descriptio

Fritillaria hæc Aquitanica siue secunda species commodè Meleagris aut Fritillaria appellari nequit, quandoquidem colorum in eâ varietas simili modo non est distincta, vt in priorè: etiam & caule qui aliquantulum tenerior, & fo-

liis, quæ in hac paullo angustiora magisque herbacei coloris videntur, & radice, arquetiani floris formâ nonnihil illam æmuletur.

Fritillaria Aquitania Clusii & Boissoti ferotina videtur Lobel. Adu. par. 2. quadrare cum varietatibus Fritillariæ nigræ.

MELEAGRIS SIVE FRITILLARIA FLAVA.

Descriptio



Fritillariæ quoddam genus habuit Ioan. Somer, quod florem produxit sex quidem foliis constantem & nutantem, ut cætera Clusii genera: sed quorum folia sunt flaua coloris rubris maculis distincti, illorum medio neruo prominulo & virefcentis coloris.

Fritillaria lutea Lobelii

Adu. par. 2. differt ab aliis floris colore luteo, rubris maculis segmentato. A Somero Medio-burgensi studiose colitur: Iconem Londiniam biennio elapso accepit, sed minus affabre delineatam, uti D. Clusius monuit.

Huius Fritillariæ luteæ bulbos Lutetia Londiniam misit L. Robinus Botanicus Regius ex Pyrenæis montibus delatos, prouenit autem in Pyrenæorum Canislaure.

Fritillariam flauo flore (de qua Clusius plant. scripsit) vidimus oblatam Ill. Princ. Sybille Anhaltinæ Ducissæ Wirt. florentem Aprili, quæ erat ex horro Steckii, strias habentem internâ parte potissimum flauas.

Fritillaria alba ex phæo purpureo tessellata.

Fritillaria alba, elegantissima ex phæo purpureo tessellata, collecta in Albania à Somero Constantinopoli in patriam redeunte: flos internè rubicundior est, vnguibus albis præditus, Lobel. Adu. par. 2.

Fritillaria floribus albis notulis aspersa.

Floribus albis notulis item fortuitis aspersis, apud Pictones Galliarum Aquitanicæ reperiri, Lobel. Adu. par. 2. retulit Petrus Naudin Saluutii Pharmacopœus egregius, Fritillariam; non procul ab arduis faxosis viis, Passelourdin vocatis, iuxta S. Benedicti vicum, miliari à Metropoli Pictauo distitis, vbi viperæ commendabiles ad Theriacem, ex illo collo & caudâ, captantur.

FRITILLARIA ALBA ALTERA.

Fritillaria alba altera, quam in Lusitanicæ monte oriundam iuxta urbem *Sorte* vocatam anno

1601. florentem memini (inquit Lobel. Adu. par. 2.) in horro D. Matthiæ Craen Medico ætensi Mattiacorum aquæ mariæ actorum Scriba. Anno 1604. huius copiam emit Londini I. de Franqueuille à quodam Botanico Gallo, qui manipulum floribus præditum albis, nullis maculis distinctis aut cellulatis vendidit.

Fritillariæ repertas esse plantas intelligit Clus.

Exot. append.

2. quæ album florem gestat, quæ præcocior sine generis an ferotini sint ignorat, quia nullam similem plantam hæcenus videre ipsi licuit, & rarissime inueniunt intelligit: videlicet inter aliarum myriades interdum vnam ault alteram plantam. Mirtebat eruditiss. Venerius anno 1601. ali-



quot Fritillariæ albo flore bulbos amicis. Høgelandus altero post anno binas habuit plantas quæ flores tulerunt, notis quibusdâ discretas: vnus enim flos totus albus fuit, alterius foris etiâ albus, internâ autem parte venis quibusdâ purpurascens distinctus: Porrectus vnica habuit, cuius flos totus albus fuit.

An apud Recentiores medicum in vsum veniat Fritillaria Clusium fugit. Ob solum tamen elegantiam & venustatem expeti & diligenter in hortis coli potius existimar.

TIGRIDIS FLOS: DRACUNCULI species putata.

CAP. XII.



Pari quere- la cum Dodo. Lobelio, & C. Bauhino, Plantæ huius peregrinæ historiam aggregamus. Siquidem nec nobis hæcenus visa. Eius tamen Iconem apud Cl. Alexandrū, vniis depictam coloribus videre contigit Genero H. Cheralero. Qualem Lobel. affabre expressam à I. de Brancion coloribus ait: vireis

vixentibus oblongis angustis & acuminatis foliis è pullo radice bulbo: flore luteo, exiguis quamplurimis notulis fortuitis punicatibus variato: cuius medio saue rubens stylus exeritur: Omnibus herbariis studiosis ipsam plantam hactenus incognitam: Eiusque bulbum edulem credi perhibet.

Lob. Obs. & Ic. Pl. p. m. Trigidis flos an Dracunculi species: Tigris autem, cuius florem Dod. videre nondum concessum est, quod referenda sit cognoscere, nec dum potuit, videtur tamen ex bulborum genere: aut, quod verisimilius, inter Ari. genera reponenda, & Dracunculi aliqua species esse, nisi pictura imponat. Hist. Lugd. & Gerardo Trigidis flos.

Gener. Cherlerus eius partem aliquam, illam potiss. quæ floribus nondum pansi speciem ferebat apud Robinum Herbarium Regium Lutetiae vidit: saltem ex similitudine eius quidam moti ita censuerunt. Verum ipsammet viridem plantam non vidit. Videant curiosi Rhizotomi an alicui de ad nos inuahi possit. Scimus enim in Magnatibus plurimis admodum desiderari.

LILIVM ALBVM VVLGARE.

CAP. XIII.

Florum delicia Lilium, ex radice bulbosa nucleis multis constante, caulem surgit rectum cubitalem & sesquicubitalem, vel etiam altiorē, singularem, teretem: cui ab imo ad summum adnata folia, nullo pediculo: flores in scapo serie quadam plures non eodem tempore panduntur, odoris suauitate eximia, colore lacteo, lenis pinguis repandis foliis calathum imitati: in quorum medio stylum longiusculum ex albo viridantem trifidum circumstant stamina, foliis numero & colore paria, quibus apices insident crocei. Lilio adscribit Cæsalp. semina rotunda, ossa ex toto, nullā conspicuā medullā, sedentia in angulis &c.



Lilium Vereribus.

Lilia quæ coloris differentia inter se distant, auctore Theophrasto, vnicum ferè caulem habent, duplicem rarò: quam differentiam calum & solum efficiunt. Ex singulis caulibus aliquando vnu, aliquando plura Lilia emergunt: pars enim superma germinat. Sed hæc rariora. Radice est copiosa, carnosa, rotunda. Fructus detractus germinat, & Lilium emittit, sed minus. Reddit & lachrymarum confluxum quendam, quem etiam ferunt. Gaza, nescio qua ratione motus, vertit, Eecit & lachryma cæcum quoddam confluxum quod etiam ferunt.

Cæterum quod dixit Plinius rubens Lilium Crinon vocari à Græcis, docti quidam legendum censent, ἐρυθρὸν κρίνον, vel composita voce ἐρυθρὸν κρίνον: nam etiam album Lilium Crinon vocant. Quod autem Lillii florem Cynorrhodon vocari apud eundem legitur, alii ex Hesychio lectionē hanc retinendam, alii falsū suspēctam, & Crinorrhodon legendum censent. Cynorrhodi etiam appellatio nihil cum Lilio commune habet, verum id Rosam sylvestrem multis aliis locis Plinius vocat. Crinorrhodon verò propriè Lillii rosam & florem significat, quem Hippocrates κρινόρρινον appellat.

Lilium etiam omnibus vbiq; ferè notum sit, inquit Cornar. tamen affabre admodum à Plinio lib. 21. cap. 5. depingitur. Lilium rosæ nobilitate proximum est, & quadam cognatione vnguenti, oleique, quod Crinon appellatur. Et impositum etiam maxime rosas decet, medio proventu earum incipiens. Nec vllis florum excellentias maior, interdum cubitorum trium, languidè semper collo, & non sufficiente capitis oneri. Candor eius eximius, foliis foris striatis, & ab angustis in latitudinem paulatim sese laxantibus, effigie calathi, resupinis per ambitum labris, tenuique folio & semine, stantibus in medio erocis. Ita odor, colorque duplex, vt alius calycis, alius staminis, differentia angusta. Et paulò post de rubente Lilio, itemque de purpureo subdit. Est & rubens Lilium, quod Græci Crinon vocant. Alii florem eius Cynorrhodon. Laudatissimum in Antiochia & Laodicea Syriæ, mox in Phælide. Quartum locum obtinet in Italia nascens. Sunt & purpurea Lilia, aliquando gemino caule, cænosiore tantum radice, maiorisque bulbi, sed vnius, Narcissum vocant. Huius alterum genus flore candido, calyce purpureo. Differentia à Liliis est & hæc, quod Narcissus folia in radice sunt, probatissimis in Lyciæ montibus. Tertio generi cætera eadem, calyx herbaceus. Quæ de tingendi ratione subdit, inferius recitabitur. Et hæc partim de 6. lib. Hist. stirp. Theophrast. translata sunt.

Lilia, inquit Dioscorides, coronamentis se dedunt, Liria à quibusdam vocata, tradunt & purpurea inueniri. Sic Lillii descriptionem perstringens L. 4. c. 19.

Theophrast. Lilia etiam vocauit Narcissos: ac tradit etiam I. D. uilius cion, Susanna & Sosanna dici.

Horatius breue vocat, quia non diu durat. Vnde D. Basilus in explicatione Psalmi 44. Nul- lum florem hoc melius exprimere fragilem humanæ naturæ conditionem refert. Idque etiam Theophrast.

Λουκὸν τὸ κρινὸς ὄν, μαλακότερον οὖν καὶ σύντονον.

Candidum est Lilium, tabescat verò sibi decidit.

Crinorrhodon.

Lilium Plinio. Descriptio.

Lilium rubens. Cynorrhodon. Lilium purpureum. Narcissum.

Disce. mot.

Hebraeis *Scosham*: Arabibus *Safen* & *Alcofam*, Aegyptiis *Symphaphon*, aliis *Tialon*: Syris *Sassa*: Aphiis *Abiblabon* & *Abiblabon*. Keim, & X. i. c. 1. G. c. 1. Crinon basilicon, Crinanthemon, Gallyrion, Grallirion alii, inter spuria Dioscoridis: Lat. Liliū, siue Iunonia, aut Iunonis rosa, Liliū candidum Officin. & vt Adu. tradunt, Liliū Salomonis. Germ. *Weißlilien* / *lilien* oder *Gilgen*. Belg. *witte Iolie*. Gall. *Lis*, & *lis blanc*. Hisp. *Azucena* & *Licio blanco*. Lob & Pena aiunt *Lario blanco*. Angl. *weisslily*. Bohem. *lilium*. Hungar. *Sever lilien*.

Obscurus est Theophr. l. 2. hist. pl. c. 2. locus de Lili & Hippofelini generatione, quem cum nec Theodorus, nec Bodinus [qui malè *Aquapium* pro *Equapio* legit,] satisfaciunt: sic intelligendum censemus: Pr. pristinam scilicet generationem esse Lili & Hippofelini, quum lachryma siue succus seccatus fuerit: id quod obseruatur in Capis, Alliis, Croco, Tulipa, Corona Imperiali, & aliis, quæ à terra eximuntur & seccantur, per aliquot menses vt felicius sequenti anno proueniant & florent, idque non sine ratione manifestum: Illud tamen peruestigandum an ex caulibus concisis nascatur Liliū: quædam sanè Lili genera & Moly ex caulibus producant bulbos in caulibus, quibus se propagant, licet ex radicibus etiam, sicuti Lilia alba producant bulbos.

Ceterum, Lilia adè omnibus notissima sunt, vt planè superuacaneum esse cum Matthiolo putem, exemplo Diosc. adductus, vel ex nobis eorum faciem repræsentare, vel alterius historiam referre: sed tamen quoniam iis quandoque mos gerendus est, qui semper hortis nouis ac variis floribus refertis delectantur: idcirco silentio prætereire non potui, quin hic infererem, quæ ratione, quæue mangonio alba Lilia [si tanta fides prisca rei herbaria: authoribus adhiberi potest] purpurea fieri possint. Quod cum Plinius docuerit lib. 21. cap. 5. vbi de Liliis latius differit, idè eius verba subiiciemus. Inuenta igitur est, inquit Plin. & in his ratio inferendi, monstruosis hominum ingeniis. Colliguntur namque mense Iulio scapi arescentes, Liliaque suspenduntur in fumo. Dein mundantibus se nodulis, in facie nigri vini, vel Græci, mense Martio macerantur, vt colorem accipiant, atque ita in scrobiculis feruntur, heminis facies circumfusus. Sic fiunt purpurea Lilia, mirumque ita ligni aliquid, vt nascatur infectum. Hæc Plinius.

Lilia (vt Anatolius testatum reliquit) totum annum viridia durabunt, si cum ocellula silent, nec dum patentia dehiscunt, decerpta, nouis fistilibus non picatis [lagunculis picatis ne quid ætris subire possit, An. Mizald.] indito diligenter operculo recondantur: sic enim clausa perpetuum annum vegeta manebunt. Sed vt intermedio tempore ad vsum promuntur, statim ad Solem [vel tepidæ aquæ vaporem, An. Miz.] producta, cum senserint eius calorem, aperta panduntur. Potrò vt vicissim, & variis temporibus flores pariant Lilia, bulbi ita feruntur, vt aliqui duodecim digitorum altitudine obruantur, alii octo tantum, alii quatuor duntaxat profunditate mergantur, sic diuersis diebus dabunt Lilia: quod & in aliis floribus fieri pollicetur. Rubescunt Lilia si eorum bulbis diligenter apertis puluis aliquis rubri coloris, modò non sit erodens, iniiciatur,

& pingui solo committantur. Si verò etiam alio colore quis ipsa oblinat, cuiuscunque coloris voluerit Lilia gignentur. Camer. & Florentinus rei rulticæ Scriptor.

In Lili florente caule resecto etiam bulbo femina prouenire obseruatum: quod etiam obseruauit in Iride bulbosa. Liliū plantetur (inquit Crescent.) mense Octobri, Septembri, Nouembri in terra pingui & benè subacta: ac accipiuntur bulbi eius virides, vel sicci, ponunturque per vnam spannam, vel vnum pedem, quod est melius, separati: sicut fit de aliis.

Lili vires tradidit Dioscor. lib. 3. c. 99. sic inquit: Ex lili regii flore paratur vnguentum, quod nervos, priuatimque vuluæ duritias emollit: seruata quoque, adustus proficiunt: aceto verò condita, vulneribus profunt. Ex eorundem succo in aneo vasculo decocto, adiectis aceto & melle, liquidum fit medicamentum, veteribus vlcibus recentibusque vulneribusque vile. Inasata radix & ex rosaceo trita, igni ambastrata sanat, vuluam emollit, menstrua ciet, vlceraque cicatrice obducit. Cum melle autem detrita, præcisissimis nervis luxatisque medetur: alphasque, lepras & furfures emendat. Quin & vlcera in capite manantia extergit, faciemque purgat simul & erugat. Eadem trita cum aceto aut hyoscyami foliis & farina tritica, testium inflammationes demulcet. Semen verò potum, serpentium moribus aduersatur, erysipelatis autem semen & folia trita ex vino imponuntur. Ceterum in Syria, & Pafidia Pamphiliæ Lilia vnguento conficiendo efficacissima nascuntur.

His præterea facultatibus pollere Liliū, Galeni quoque comprobatur testimonio, qui libro 7. simpl. medic. facult. dicat: ita de eo scribit: Lili flos, inquit, temperaturam mistam obtinet, partim ex tenui, partim ex terrena essentia, ex qua vtrique habet. vt gustu sit amaro, partim ex aqua, eaque temperata. Itaque etiam quod ex ea conficitur oleum, citra morium digerendi, simulque emolliendi facultatem habet: vnde fit vteri duritiei aprissimum. Potrò radix foliaque per se trita delicescant & abstergunt moderatè, proinde ambustis quoque competunt. Radicem ergo tostam, deinde cum rosaceo contritam, ambustis, quoad obducatur cicatrix, imponunt: quippe cum alioqui & aliorum vlcium omnium bonum sit inducenda cicatrici remedium. Quinetiam nervos emollit, mensesque prouocat. Folia verò præcoquentes, & ipsa ad obductam vsque cicatricem, imponunt, non in ambustionibus duntaxat, sed aliis quoque vulneribus. Sunt & qui aceto ea condientes ad vulnera suo tempore vtuntur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quam in foliis, quamquam tamen nec in ea ipsa multum inest: nam in primi ordinis abstergentium est medicamentum. Itaque cum aut vitiliginis, aut psoræ, aut lepræ aut aliquid id genus extergere volumus, commiscemus ei aliquid aliorum medicamentorum validius extergentium, cuiusmodi est mel. Ceterum si id moderatè illi ac conuenienter admiscetur, & ad nervorum diuisiones competit, & ad alia vniuersa, quæ valenter exsiccare possunt absque morbo. Imposuimus verò etiam quandoque & foliorum succum cum aceto & melle coctum. Quinque partibus succi plus vtroque erat, atque insigne medicamen ad omnia ea quæ

que exsiccati postulant absque morfu: seu vulnera omnia ingentia, & maxima quæ in capitibus musculorum ceniunt, tum ea quæ nigris molli sunt & diuturna, atque ægrè ad cicatricem perducuntur.

Porro medicum vsum Liliæ exponit Plin. l. 21. c. 19. vbi inter cætera habetur. Succus qui flore expressus est, ab aliis mel vocatur, ab aliis Syriū, ad emolliendas vulvas, sudorēque faciendos & suppuraciones concoquendas. Falsò autem legi, mel vocatur: & legendum esse, Phaselinum vocatur: ex eodem Plinio patet, qui hunc locum citat l. 23. c. 5. Lirinon, inquit, quod & Phaselinum & Syrium vocauimus, renibus vtilissimum est, sudoribusque euocandis, vulvæ molliendæ, concoquendisque intrus. Sed & laudatiss. in Laodicea Syria, & mox in Phaselide Liliū esse, ipse Plin. lib. 21. c. 5. dixit, velut locus suprâ adductus testatur.

Ex Simeone Sethi odoratum frigido capiti prodest. Oleum verò quod ex ipso paratur, vñ habet discutiendi & emolliendi. Huius autem radice quidam vtuntur ad vulnerum sanationem.

Tradit Matthioli. elixir Liliæ radicem, veteri axungia exceptam & illitam, pedum clauos tollere, sed ante triduum remoueri non debere. Eadem ex adipe & oleo adhibitam fluxos pilos replicare: cum multis autem potam, sanguinem extra vasa concretum per alium eicere, suppuraciones moliri & concoquere, & duritias quasque emollire. Stillatitiam florum aquâ dari vtiliter potandam ægrè parturientibus, & ad pellendas secundas addito croco & cassia. Oleū quod ex floribus paratur, valere ad omnes frigidos neruorum morbos, nempe ad conuulsiones, & resolutiones: præstat item ad emollienda articulorum impedimēta, & scirrhosos quoscunque tumores. Illinitur quoque puerperis veri dolore languentibus, addito oleo è Lini semine, præsertim cum fuccida lana is calidis imbuta ventri superponitur. Additur clymatibus cum induratas faeces mollire fuerit opus. Lilia, quæ diu in oleo macerata fuerunt, illita, prius calefacta, apotemata calida circa dolorem maturant ac digerunt, præsertim ea quæ sunt in articulis.

huius aqua stillatitia ex floribus parata in partu facilitando & secundis expellendis (inquit Camer. hort.) efficacissima, vnde non temerè in aliis affectibus danda. Folia incocta vino austero & vulnere diuturno imposita secundū Galeni doctrinam lib. 7. de simpl. Med. facult. multum iuuare, in eundem authorem annotauit Excell. Iulius Alexandrinus Cæsarius Archiater. Si serpentium ictibus auxiliare quispiam aggrediat, Myræanthæ consilio Liliæ folia illinat: ad vetera vlcera, eius succum ad ambusta, eius radicem: nam si indifferenter omnibus eius partibus ad omnes hosce affectus vtatur, scopum non assequetur.

Lilium (inquit Porta) qui radices squamosas habet lichenes, lepras & furfures in facie emendat, & vitilignes emaculat.

Lonicæ aliorum vestigiis insistent, Liliorū vices ita prosequitur: Flores mixtæ sunt naturæ, radix & folia dissipant, exsiccant, atque mundificant, plurimum tamen bulbus. Oleum infimo ventri inunctum, matricem refrigeratam vehementer calefacit, eiuſque humiditates induratas emollit. Radix decocta, tumoribus duris applicata, eos maturat. Tosta verò confusa, cum a-

Tom. II.

qua rosacea commixta, ac reiteratis abs interuallo vicibus admota ignem sacrum extinguit. Simili modo vulneribus imposita farcotica habetur. Eadem prægnantis ventri superposita partum promouet. Radix Liliæ albi domestici decocta, tusa, ac Oleo communi mixta, adhibita tumores emollit. Sed hæc super hanc rem dicta sufficiant.

LILIVM ALBUM SYRIACVM Rauuvsolff.

Liliū quoddam genus in Maiori Barzâr peregrinum mihi obseruatum (inquit Rauuvsolff. in mercatorū potiſsimū officinis, quod in paludibus, stagnis, vdisque prouenire mihi narratum fuit. Caulem erigit oblongum, colore & crassitie nostratium persimilem, latiore tamen multo,

Descriptio

supernâ potissimum parte, quæ trium digitorum latitudinē excedit, ita vt spathe sentim in acuminē desinenti confecti possit. Folia hunc vtrinque stipant plucula, tenella, satis longa, angusta tamen, decidua. Summa Lilia aliquot occupat nostratibus similia.

Clusius sic describit:

Clusii descriptio.

Caules tametsi vulgari Lilio non sūt breuiores, si quis diligenter contulerit graciliores esse deprehenditur, rarioribusque & minoribus foliis septis, atque etiam ipsius flores aliquatō minores, æquè tamen ac vulgares odorati. Nonnullæ verò radices in tantam molem excreuerunt vt vix vtraque



manu comprehendi possent: vñ etiam illarum plures quàm sexagenos flores protulit: caulis autem planus fuit, & tres ferè vncias latus anno verò subsequente ad ingenium rediit. Sic interdum natura in plantis ludere solet.

Liliacea radix missa Coudenbergio: quæ illi flores huic omninò similes tulit: quam quoniam

Mmm

*Lilium fa-
eniam.
Sultan
Zambach.*

*Martagon
Constant.*

*Martagon
candidum
Chalcid.*

Locus.

plerumpue in extremo caule confertim nascebatur, & interdum vitium faciebat, ipse Lilium farum cognominare solebat.

Constantinopoli radices missæ nomine *Sultan Zambach*, quibusdam amicis in Belgiam pro Martagone Constantinopolitano: Hinc apud Belgas modò *Sultan Zambach* appellatur, modò Martagon Constantinopolitanum flore albo, cum tamen, teste Clusio, vnica eademque sit plâta, non duæ diuersæ. *Sultan Zambach*, propter amœnitatem & floris decus, vel fortè quod magno Sultano dicatur, Lilii hoc genus appellatum videtur.

Lobelio Obs. Radix illi Lilii cruenti, sed norulis, labculis purpurantibus variata, nuper Constantinopoli missa. Martagon candidum Chalcidonicum, Indidem delatum visenda venustatis, vt si quid aliud, istud Lilium asseritur: folia Lilii albi nostratis candidiora, & radix itè cognata. Icon. Pl. p. 163. Martagon album, Lilium candidum Byzantinum Teut. 202.

Rauvvolf. itin. Lilii albi genus visum in magna Bazar de quo Theophr. lib. 4. c. 9.

Hist. Lugd. in append. p. 30. Lilium album Syriacum, quidam esse volunt Lilium à Theophr. memoratum lib. 4. c. 9. Cæterum de Stratiote aquatico Theophr. verba intelligenda sunt, cuius meminere Athenæus lib. 14. & Plinius capit. 15. lib. 24.

Camer. hort. Lilii albi species Constantinopoli allata. Apud Matth. Germ. Sultan Zambach. C. Bauh. Phyt. Lilium 2. siue album peregrinum, Clusii Sultan Zambach. Lob. Martagon album. Lilium 1. siue album: peregrinum alterum Rauvvolfii. Lilium pulchrum.

Lilium Byzantinum album ostendit Nobiliss. Frid. Meier Argentinæ mense Maio, quod nondum florebat.

HEMEROCALLIS VETERIBVS.

Hemerocallis (vt Diosc. describit) *folia & caulē* Lilio similia habet, viridia velut Porrum: *flores* in ipso caule sunt per singulas propagines tres aut quatuor, fissurâ, Lilio similes, quum hiare cœperint, colore vehementer pallido: radicem v. magnam & bulbosam. Hæc trita pota, & cum melle in lana apposita, pectus præbet, qui aquam & sanguinem ducit, Folia trita impolita, mammarum ex partu, & oculorum inflammationes mitigant. Sed & radix & folia ambustis commodè imponuntur.

Hemerocallis inter ea quæ folio tantum coronant Plin. numerat. Alio in loco, Hemerocallides, inquit, pallidum è viridi & molle folium habet, radicem odoratam & bulbosam. Quæ de Hemerocallide Diosc. accipienda esse, perspicuum est.

Ex illis verò quæ Theophr. lib. 6. c. 1. de Hemerocallide prodidit, colligere licet, eam à Diosc. bulbosâ distingere: Recensens enim suffrutices coronarios, hanc inter illos, lignosa esse radice, & minutis constare foliis artinuat.

Quando verò Plin. Hemerocalles folio tantum coronari tradit, sibi minus constât: Theophr. enim (vt Dalech. annotat) simpliciter has esse coronarias scribit: ac eius descriptionē alibi traditâ truncatam & deprauatam esse patet confertim cum Diosc.

Athenæus ex Theophr. Hemerocalles inter co-

ronarios flores numerauit, dicens lib. 5. Dipnos ex Cratino:

Pascitur mihi caput ex charo x emerocalle.
Floris Hemerocallis qui noctu flaccescit ad exitum Solis mox reuiuiscens, Cratinus in Effectumatis sic meminit:

*Anemonarum vernis calicibus, Serpillo, Croco,
hyacintho, Elychrysi ramis, Oenante,
caroque mihi Hemerocalle.*

Notatu sanè digna quæ Dodon. de Hemerocallide literis consignauit: Hemerocallidum, inquit, vna frutex, alia flos est. Hemerocallis frutex ex genere est coronariorum & lignosorum de quo Theophr. lib. 6. c. 1. Alia Hemerocallis flos est, cuius descriptio apud Diosc. est suspecta: quod enim radicem addit *quæ arbor. Cyp. Elychrysi*, innuit deprauatam: vel enim superfluis videlicet ampliata: vel duorum Liliorum mutilas descriptiones, in vnam contractas, Hemerocallis videlicet & alicuius alterius Lilii. Nisi fortassis & bulbosum aliquod sit Lilium apophyses faciens: & vnus tantum diei florem luteum habens: quale tamen nondum constat alicubi repertum esse.

Cæterum Hemerocallis Theophr. & Plinii frutex coronarius vulgò creditur.

Dod. & alii quidam Hemerocallidem Diosc. & Athenæi censent esse Lilium Aphodeli radice, & foliis, flore luteo.

Pancratium Monspessulanum, quod quibusdam Scylla maior alba, nostro iudicio non benè dicitur Hemerocallis Theophrasti ac etiam Diosc.

Corona Imperialis Clusio dicitur Hemerocallis, est autem nobis occasio cur dubitemus, vt postea dicitur.

Habetur & Lilium Persicum hemerocallis, siue Sufianum Pennachio, Persiano folio purpureo.

Dicitur quoque de Lilio rubro vel croceo minore, vide Lilium rubrum.

Hemerocallis Cornario Lilium flore nutante ferrugineo. Item Lonic. Gesnero Hemerocallis purp. C. Bauhino an Hemerocallis?

Est tandem Hemerocallis altera Matth. nobis Lilium flore miniat.

LILIVM RVBENS VEL CROCCEUM MAIUS



Par est magnitudine Lilio albo; nisi quoddam *folia* in condita, minus sunt lata, at firmiora, nervosiora, atroviore splendentia, longiora quàm in bulbifero, *caulis* maculatus, bicubitalis, summitas in pediculis aliquid faciescens, singulis singulos flores inhaerentes sustinet, Liliaceis magnitudine, for-

formâ, foliorumque numero similes, verum colore rutilo coruscantes, saturatioribus intus stigmatibus punctati. Radix subest bulbosa è squammis compactis, alba, ex qua ramuli repententes nouos generant bulbos.

Hemerocallin Matthiol. vulgus Liliū filū nominat, cuius flores colore perquam pallido, vt Dioscor. ait, ad eū vt fulgentis auri modo rutilent. In hist. Germ. Ror Goldgilgen. Hemerocallis. Boh. Lilium žlate.

Figura à Camer. pro hoc Lilio posita non placet. Facile crediderim Lonicerum sub his verbis (Lilium croceum, Gelb lilgen / quod excrecit interdum ad duos cubitos, læditurque à nimio Sole) scribere de Lilio rubente maiori, quamuis figurâ id minus exprimat.

Dodon. Gall. Lilium alterum rubrum ab Herbariis Martagon dictum. Item hist. fl. & in fol. Lilium purpureum maius, quod Matthiol. Liliū syluestre in Italia appellari, & Hemerocallida esse, ait: quod tamen verisimile est Hemerocallida non esse.

Hist. Lugd. p. 1493. Lilium purpureum maius Dodon. de fl. Epag. 1498. Hemerocallis prior Matthiol.

Anguill. de hoc Lilio ait esse Martagonis speciem radice alba, floris magnitudinis Lili, & epistola 13. ait: Non inuenitur planta quæ melius respondeat Hemerocallidi Dioscoridis, quam Cinorhodon Plinii, id est, Martagon Liliaceum, Lilium rubens vel croceum alterum, Hemerocallis Matthiolo, quod Italicum cognominat.

Lobel. & Pena Adu. Lilium purpureum siue Chymistarum Martagon. Gall. Lis orangé. Colores Lilio candido quæstos mangonio fuisse, et fere rustice Scriptoris Plinius asseueret, tamē purpurei Lili duo genera sponte non arte oriri cum Dioscor. plurimi montes hodiè restantur. Senēsis vocis huius ignarus, Phœnicum Liliū, valdè alioqui notum, dicit esse, colore perquam pallido Diosc. falsò teste adducto.

Tabern. icon. & hist. Ror heydnisch Lilien. Martagon rubrum. Figura Tabern. placeret pro Hemerocallide Matthioli, quamuis aliter sentiat, qui ei patrocinari statuit.

C. Bauhin. Phyt. Lilium 4. siue croceum maius, rubens Plinii: Lilium rufum Trago. Aliquando flore pleno reperitur, vidimus & candido. Item apud Matthiol. Lilium croceum maius, rubens. Plinii fortè Hemerocallis Dioscor. Brunf. Fuchf. Gesner. Lilium rubens Dodonæo. Lilium rufum, Lilium purpureum maius Lugd. Camer. Fuchfio & Lonicero. Lilium croceum. Tab. Liliū croceum maius. Gesnero Martagon. Lilium purpureum maius Cæsalpino: Liliū sylv. aureo flore. Tragi Lilium rufum mihi ad minus referendum videtur non ad maius. Idem etiam de Lilio rubente Fuchfii & Gesneri: Tabern. Liliū croceum maius mihi videtur potius ad minus accedere, nec velim eius figuram ponere pro Hemerocallide r. Matthioli. Camer. apud Matthiol. nouam figuram ponit pro Hemerocallide, i. quæ nō placet, & quæ fortè Liliū rubri minoris. Lilium purpureum maius Lugd. huc non referendum existimo, vt antè dictum, maius pro minus scriptum. Martagon Gesner. de hortis f. 204. huc non pertinet. Cæsalpini descriptio conuenit minori Lilio rubenti.

Nusquam non protenit [teste Matthiol. in Italia, quandoquidem circa messem in aruis inter segetes, in pratis, in montibus, & in vallibus aureo colore emicat. Ego Lilium croceum maius

Tom. II.

siue rubens vidi Basileæ in horto Di. Doct. Feclis Plateri: Montbelgardi habeo in horto Ill. E. C. Wittemb. delatum ex Marbach ducatus Wirtembergici, vbi florebat Iunio.

Et licet secundum Dodon. purpureorum Lili-
orum in Medicina incognitus sit vsus, & facultas incomperta. Scit tamen Lobel. bulbos Liliū puniceæ eadem posse quæ Diosc. vult de Hemerocallide.

Tempus

LILIVM RVBENS VEL CRÖCEUM minus.

Quammatius bulbus caulem promit angulosum striatum, altitudine selsquicubitali, cui temerè folia numerosa adnascuntur atro virore splendens, perquam angusta, secundum longitudinem neruosa: caulis fastigium in aliquot pediculis firmos, punctis rubris variegatos, modicè hirsutos diuiditur: quorum vnique flos infidet Liliaceus, colore ex rubro flauescens seu croceo, folia intus sulcata & punctis saturatioribus notata habens, odore suauis, flaminibus & pistillo flori concoloribus.

Descriptio

Lilium rufum, Germ. Ror goldgilgen, Plin.



& Diosc. restantur Lilia rubra arte fieri posse, quod an verum sit necne, ii affirmare poterūt, qui hoc experti fuerint. Neque satis constat Trago, an hoc Liliū genus Plinius Rufum dixit.

Hieronymus Brunschweig Narcissum vocauit, nec temerè quidē, cum & Theophr. ipse lib. 6. cap. 6. Lilia Nar-

cissi voce appellaret: Crediderim equidem radicem huius quoque Lili, sicut & albi, maturandis & emolliendis quibuscunque abscessibus prodesse.

Pingit Brunfel. Germ. Lilium hoc croceum minus, sub genere alio Lili Goldwurz & Goldgilgen / aut Rorgilgen.

Apollin. Gelb lilien / cui tribuit eadem vires, quas Lilio albo.

Meminis Anguill. tertie speciei Martagonis radice alba: quam existimat Hyacinthum Homeri, Theocriti, & Pausaniæ, ac Ouidii: ait etiam Dioscor. & Theophrastum huius plantæ meminisse. Non errauerit (opinatur Gesner. horti.) qui Hemerocallidem alpinam appellauerit. Pingitur ait idem postea à Matthiolo pro Hemerocallide altera. In hortis hoc etiam diu viuit &c. Gesnero an hîc assentiendum dubitamus. Si enim Matthiolus hoc Lilium intelligit per Hemerocallidem, quod non existimamus, flores malè picti. Dodon. & Lobelius Hemerocallidem ab Lilio rubro minore separant.

Gesneri

M m m 2

*N. Lugd.
Hyacinthus
Ondius.*

Clasius vocat Liliū rubrum minus non bulbi-
ferum. Hist. Lugd. p. 1493. Liliū purpureum
maius [scribendum, ut iam diximus, erat minus]
Dodon. Item p. 1494. Alterum purpureum Liliū
minus.

Dodon. Gall. Liliū secunda species *Hyacinthus*.
Liliū rubrum, Liliū rufum. Ouidio Hy-
acinthus. Belg. roode liliē. Hist. Lat. fl. & in fol. O-
uid. Huius generis Liliū Hyacinthum appellat
ab Hyacintho adolescente:

*Flos oritur formamque capit, quam Liliū, si non
Purpureus color his, argenteus esset in illis.*

*Non satis hoc Phœbo est, [is enim fuit auctor
hominis]*

Ipsē suos geminis foliis inscribit: & ai, ai.

*Flos habet inscriptum, sine stique litera du-
cta est.*

Huius Hyacinthi meminit etiam Theocritus in
Epitaph. Bionis Eidylio 9.

*Νῦν ἰδὼν δὲ λαβὼν αὐτὸν ἡνίοχος αἰεὶ
Ἀδαμᾶν τὸν ἡνίοχον.*

Ut & Virgilius in Bucol. Ælogo.

Phæbo sua semper apud me

Munera sunt Lauri, & suaue rubens Hyacinthus.

Dicitur rubens Hyacinthus, qui ab Ouidio pur-
pureus appellatur. Color siquidem florum ru-
bens, subinde nominatur purpureus. Existima-
tur & iste Hyacinthus ferrugineus cognominari,
quod ferruginis instar rubeat. Sed non omnibus
hæc sententia probatur, quibus ferrugineus non
alius videtur, quam ad cæreuleum accedens &c.
Hyacinthum purpureum siue rubentem Recen-
tiorum plerique Hyacinthum Poëticum appel-
lant, at nobis magis placet hunc scriptum Hy-
acinthum dici. Theocr. Eidyll. 10. Hyacinthum
ῥοδόν id est scriptum appellat. Pausanias Co-
rinth. lib. 2. Scriptum Hyacinthum aut ei si-
millimum florem Comosandalon ab Hecimio-
nensibus appellari, memorie prodidit. Sunt in-
quit, corollæ ex flore contextæ, quem *καμάρω* dicunt
incolæ appellant. Hyacinthum illum existimo:
est enim ei tum magnitudo tam colore persimi-
lis: habet præterea eandem luctus indices lili-
ras.

Lobel. & Penæ in Obs. pag. 84. & Adu. pag.
61. Liliū purpureum minus, Chimistatū Mar-
tagon. Gall. *Lis orange*. Ital. *Giglio rosso*. plant.
icon. pag. 164. Martagon Chimistatū. Liliū
purpureum siue Phœniceum vulgare. Lobel. 84.
Teut. 204.

An Camer. apud Matth. Germ. *Rote Gold-
gilgen*/Hemerocallis.

Tab. int.

Tabern. icon. & hist. *Groß gold gilgen*. Liliū
aureum maius. Quamvis Compiler maioris vo-
cet, huc reducimus, quia figura satis accedit ad
minus: præterea maioris bonam figuram alio
ponit titulo, miror eum qui Patrocinium Matth.
suscepit, hanc figuram maluisse assumere primā
Herocallide. Casp. Bauh. Phyt. Liliū n. siue cro-
ceum minus.

Liliū croceum minus, Basileæ in hortis pro-
uenit, Nos habemus Montbelgardi in orto E. C.
id etiam collectum in Passau in orto D. J. ab

Andlav. plantavi in orto E. C. Hoc

Liliū reprints propagines
ex se dimittit multas.

LILIVM PHOENICEVM

DILUTVM.



Ob. icon.
Pl. p. 164.
Martagō Chy-
mistatū al-
terum: Liliū
phœniceum
dilutū Teut.
204. C. Bauh.
Phyt. Liliū
siue phœni-
ceum.

LILIVM CRVENTVM

LATIFOLIUM.



Blbo innititur
omnino tali,
quali Liliū albū:
caule verd dona-
tus, non vt cætera
Lilia, crasso, qui
florem producit u-
nicum, cruentum,
sex foliis latis con-
stantem. Cauli fo-
lia rara, valde la-
ta, Plantagini si-
milis.

Tabern. icon. &
hist. Breyt bley-
terich blis gil-
gen: Liliū crue-
tum latifolium.
C. Bauh. Phyt. Li-
lium 6. siue cruen-
tum latifolium. Tab.

LILIVM BVLBIFERVM MAIVS.



Bleubitali
interdum
assurgit caule,
finito, crasso,
f. lris septo li-
laceis, suba-
tris, in summis
alis crassiores
bulbos gestans,
& amplos flo-
res rubros, Li-
lio puniceo
minori non
bulbifero con-
colores. Tene-
rioris huius
plantæ, ante
quam flores
ferre incipiat,
bulbis secun-
dum caulem
inter-

inter folia natis non minùs donatæ sunt, quàm reliquæ duæ species: sed quando robustiores sunt floresque aliquot annis protulerunt, vix, nisi in summo caule, ubi in alas diuiditur, & secundum flores, maiores bulbi nasci solent.

Liliacea stirps, seu Liliū bulbiferum 1. siue vt Clus. appellat cruentum, Martagon bulbiferū 1. Liliacea stirps Clus. seu Liliū bulbiferum, siue vt appellant, Liliū purpureum siue rubrū maius, Martagon bulbiferum maius.

Lobel. Obs. Liliū cruentum bulbos gerens summo alis diuiso caule: Liliū cruentū varietas Martagon, cui flores rutilant, bulbos nucleis stipatos summo caule alis diuiso profert. Icon. Pl. pag. 169. Liliū cruentum Teut. 209.

Hist. Lugd. Liliū cruentum bulbos gerens Lobelii.


Casp. Bauh. Phyt. Liliū 7. siue bulbiferum latifolium.

Floret hæc planta Liliacea cum duabus subsequentibus Iunio, alia aliā paulò maturius, semēque perficit Augusto, bulbi in alis (inquit Clusius) hæreere solent, donec vento aut contritu excutiantur, imò interdum plantæ adhuc inhærentes, fibras deorsum spectantes agere solēt, tanquam ad communem matrem terram aspirantes, & illā se condi cupientes.

Hæc quidem nullibi spontè nascens à Clusio obseruata est, sed eā primū Liræ conspexit Clusius in horto Mariæ de Brimen, quæ deinde bulbis in terram depactis, reliquis Belgicis hortis breui tempore communis facta est, atque etiam nunc Viennensibus ac aliis vicinis, Clusii operā: nam ipsa aliquot maiores bulbos è Belgica mitebat.

Solent verò tum hæ, tum aliæ duæ non bulbifera, cum primū florū gemmas ostendere incipiunt, à formicis admodum infestari, sic vt eo tempore nunquam immunes ab ipsis conspiciere liceat: non secus ac Præniæ flores antè quàm explicentur, qui mirum in modum etiam à formicis appetuntur, præsertim qui plenus est, & ille etiam explicatus atque apertus.

LILIVM BVLBIFERVM INCANVM.



Vix cubitalē (inquit Clusius) excedit altitudinem, caule etiam est firmo, striato, ex viridi nigricantibus foliis præditi, quæ tamē cum summo caule incanā lanugine pubescunt: eius flores igneo rubore non rutilant, vt in superiore, sed magis pallescunt, & ad Liliū puniceū nō bulbiferi ma-

ioris colorem plurimū accedunt. Eius adu-
rioris caules paucos etiam bulbos, eōsq̃ supe-
riore minores, nisi in summis alis gestare solent.

Tom. II.

Liliacea stirps, Liliū puniceū, siue, [vt Clus. hist. appellat] cruentum: Liliū bulbiferum, siue Martagon bulbiferum 2. Et Pann. Liliū purpureum siue rubrum bulbiferum, Martagon bulbiferum incanum. Clusius proponit figuram quæ est It. Pl. secundo loco Liliū cruentū bulbos maiusculos gerentis, ubi duæ figuræ sunt sub vno titulo.

Casp. Bauhin. Phyt. Liliū 19. bulbiferum incanum.

In montanis pratis Austriæ & Styriæ spontè creſcit, sed rarior inuentu. Cæterū omnium flores terram spectant, & per interualla in summo caule nascuntur, foliaque ad pediculum reflexa habent: semen etiam in trigonis capitibus duplici serie in singulis angulis continetur, fuscū, planum, cartilaginofum: radix luteo Ochre colore infecta est, quam ob causam à Germanis Goldwurze/ id est, aurea radix appellatur.

Locus & tempus.

LILIVM BVLBIFERVM REPENS.



Scammato
Sui tho cum aliis huius generis onuenit: cæterū caulis firmus, striatus, cubitalis, ac maior multò, maculis nigris notatus, lanuginosus, in alas diuisus, flores multos profert amēnos, Liliū formā, nec non aliquatenus, odore, ex senis repandis aliquantū foliis, multo croco tinctis, intrinsecus multis litis asperatis

Descriptio

(qua parte & color folii mediū diluor punctilq; saturatè sanguineis notatis: extrinsecus lanugine leui perfusus: quorum non nulla clatiorem, latiorē, saturatioremque costam, profundo vtrinque ad latera sulco, habet: medium florem obſident reliquorum instar sēna stammina pistillumque triquetrum, eodē cum flore colore præditi: folia ferè Martagonis, quorum alis bulbi frequentes intident. Multū se propagat bulbis ac etiam maioribus repentibus.

Lubet hic subnectere Clusii descriptionem quæ sic habet: Inter Liliū purpureū bulbiferum maius & incanum, media est magnitudine, nonnunquam etiam primū æquat: sed caules sunt infirmiores, graciliorēque, ipsique cum foliis dilutiore virore præditi: flores secundo generi similes. Hoc pæpetuo fecunda Bulborum inter folia nascentium fobole onustum est: eiusque radix priore minor è lateribus propagines spargere plerumque solet, quæ ad singula genicula in candidos bulbos excreſcentes, subinde nouas in circuitu plantas producunt, Liliū rubri minoris non bulbiferi modo: eius bulbi in alis nati, secundæ speciei pares, priori tamen magnitudine inferiores: omnesque terræ commissi sui generis plantam procreant, & secundo anno in cau-

M m m 3

lem bulbillis onustum excrefcunt. Ferunt tamen omnes hæ plantæ in capitibus triangulis femel larum cartilagineum subfuscum, quemadmodum Liliū vulgare, quod non sterile est, sed sui generis etiam plantas profert: verum quæ ex bulbillis in alis natis crescunt plantæ longè citius adolefcunt.

An Gesner. hort. Liliū rubens seminiferum, Lilia crocea quæ semina in caule habent? An Clus. Pann. Liliū purpureum siue rubrum bulbiferum minus, Martagon bulbiferum minus, Martagon bulbiferum pratenſe. In hist. Martagon Liliacea stirps: Liliū puniceum siue (ut vocat) cruentum, Liliū siue Martagon bulbiferum? An Lobel. Obs. Liliū quartum Lilio purpureo maiori par: flore Martagonis rutilo: & secundum caulem sesquicubitalem bulbulis à medio ad summum vsque ornatur: Liliū cruentum 4. Icon. Plantar. p. 168. Liliū cruentum secundum caulem bulbulis donatum Teut. 204. An Dodon. rar. Liliū purpureum tertium, Liliū bulbiferum? Histor. Lugdun. Liliū cruentum aliud Lobelii. Casp. Bauhin. Phyt. Liliū 9. siue bulbiferum minus. Habemus copiose in horto E.C. quod se facillè multiplicat ex bulbulis deciduis, quales etiam Stutgardia collectos plantauimus. Bulbulos interdum fert priuſquam florem producat: alioqui in magnam creſcit altitudinem & multa fert lilia.

Locus & tempus.

LILIVM CROCEVM flore pleno.



IN Iconibus colore depictis Ill. Principiſſæ expreſſa hæc figura anno 1608. colore est croceo.

LILIVM BVLBIFERVM cruentum angustifolium.

Lobel. Iconibus Plantarum. p. 166. Martagon cruentum angustifolium exiguis alis diuiso caule nucleis compactos bulbos gerens, Teut. 166.

C. Bauh. Phyt. Liliū octauum, siue bulbife-

rum angustifolium, Lobelio Martagon cruentum angustifolium.



LILIVM FLORE NVTANTE ferrugineo duplex maius & minus.



FLUUS huius bulbus ex squammis acuminatis compactilis, subdulci & viscido sapore, fibris donatus albidis, aliis in imo, aliis quæ cauli committitur, quem erigit bicubitalem, teretem, punctis rubetibus maculosum: cui ex interuallis radiata circumnascitur foliorum Lilia-

ceorum arrouirentium series: circa caulis etiam summum, singularia folia temerè quæ fors tulit apponuntur: caulis fastigium ornant Liliacei penduli flores, sex foliis pinguibus purpurascens, sanguineo saturiore guttatis, reflexis admodum, constantes: quorum medullium occupant toridem ferruginei apices cum pistillo, odore graui.

Cordus sic descripsit: Caulē erigit plerumque bicubitalem, teretem, gracilem, & viridem, solidumque, inferius purpurascens maculis conspersum; foliis quincuncialibus longitudine, & duarum vnciarum latitudine, glabris, ex rotundo turbinatis, & pinguibus vestitum, iisque iuxta annexum angustioribus, superne nigricantibus, inferne autem viridibus, eminentibus, ramosisque, à tergo & in mucrone coeuntibus venis: Flores æstatis initio præni summo cauli adnascuntur Lilio figura similes, multo tamen minores: nam senis vncialibus constant foliis medii digiti latitudine, sursum reflexis, colore in pallido rubentibus, intusque purpureis maculis conspersis, substantia pinguibus, carnis & glutinosis: stami-

stamina ferunt singuli flores sensa, foliis numero respondentia, in quorum extremitate oblongum & transversum quiddam est, colore in ruffo purpureum, rubiginoso pulvisculo, statimque percutitur conspersum: è medio staminum prodeit incurvus apex in triquetrum rubenque capitulum defluens, viridi & triquetro folliculo insidens, qui defluentibus florum partibus solus remanet, & resupinus sursum incurvatur, paulatimque increfcit, donec vicia longior & semuncia latior fiat, qui inferius angustior existit, idè sex eminentibus angulis totidemque lateribus còstatur, intus autem tribus membranarum ceu parietibus in tres camerulas per longitudinem dividitur, in quibus bini contigui, parvorum, latorum, planorum, leuium, sibi inuicem superiacentium & flauorum seminum ordines continentur. Radicem habet bulbosam, diuturnam, inglandis quantitate, pinguis, crassius, acuminatis & lauis aut luteis squamis, veluti nucamentis furtim spectantibus compositam: à qua alii exigui prodeunt bulbi, quibus se propagat. Saporem habent lentam, glutinosum & nauseosum, tam flores quam radices, Liliis spori respondentem. Nascentur in sylvis & frutetosis locis, tam editis quam planis.

Clusius in post. hist. duas proponit icones: vna est titulo Lili montani siue sylu. 1. maioris, quæ apud Lobel. in Plant. pag. 163. est pro Hemerocallide flore rubello, Teut. 207. Alteri verò iconi apposuit Clus. titulum Lili montani siue sylu. 2. minoris, eam autem iconem Lobel. inter icones Plantini p. 163. ponit pro Lilio montano. L. 85. Teut. 207.

Brunk. Germ. Goldwurz / Goldgilgen. Apud Doctos, inquit, nec apud Diofcor. certum nomen nondum inueni: quamvis aliqui ad Hastulam regiam & Aspidilum aptare velint. Communia Herbaria, Aspidilum nominant, quod G. Heydnisch blumen / vel Heydnische gilgen appellant.

Cord. in Dioscor. Hemerocallis sylvestre Liliū est, quod Germ. Goldpolne / siue Goldwurz appellant. Pharmacopolæ verò Asphodelum, sed falsò. Goldgilgen etiam dicitur.

Gesner. Cord. in hist. addit figuram ex Trago dicens: Hemerocallis rubens, quæ Italorum Martagon videtur, quo pro Asphodeli imperiti quidam hactenus abusi sunt. Olim in ea sui inquit Trag. sententia, vt crederem Goldwurz & Heydnisch blumen esse Asphodelum seu Hastulam regiam Dioscor. sed animaduerti non esse, nec video quò rectius referri possit hoc Liliū genus, quam ad Hyacinthum Poënarum, de quo Virgilius Aëgl. tertia & Ouidius. Idem mecum sentit Marcus Placcarius.

Appollin. fol. 94. vocat Goldwurz / wildschwertel quod non placet.

Fuchs. hist. cap. 40. Asphodelum Officinarium Aspidilum, Germ. Goldwurz / Asphodelum feminam vocat, quam propriè Hastulam regiam vocari dicit, hanc exhibet pro Asphod. femina, Theophrast. lib. 3. cap. 12. & pro Asphodelo Hesiodi, & Galeni lib. 2. de alim. facult. Hastulam regiam etiam Apulei putat. Verum in sc. libro Fuchsius mutata sententia vocat Liliū purpureum & Goldwurz.

Cornar. In Germania pauci aut nulli verum Asphodelum norunt, nam ea radix quam Officinæ Aspidilum corruptè vocant non est. Nostris dicitur Goldwurz. Hemerocallidem Dioscor. dictam Plinius ex Theophrast. Hemerocal-

les appellat lib. 21. cap. 10. & de eo rursus eodem lib. cap. 21. Galeno Hemerocallis appellatur, Herbariis Liliū sylvestre aut marinum. Nostris Meerlilien aut wilde heydnische liden. Quidam tamen huc Asphodelum esse: Alii & verisimilius, Narcissi speciem volunt.

Theophr. Gohus in Onom. Hyacinthus, Golde wurzel / heydnisch blumen. Asphodelus idem. Hastula idem. Oportebat scribere quem Hyacinthum intelligeret. Autore Matthioli. Inter Lilia meritis annumerari potest quod Martagon Chymiste appellant, & Fuchsius Asphodelum feminam putauerat esse, sed hanc suam mutauit sententiam, sui erroris conscius factus. Item Epic. cum add. Camer. pag. 571. Martagum Chymistis.

Apud Anguill. fit mentio Martagonis vulgi & Alchimistarum, radice lusea, de hoc loquentem, vt puto.

Dodon. Gall. Liliū sylu. in quibusdam Officiis Asphodelus, quæ non sine magno errore usurpant pro Asphodelo. Belg. Lof de liden. Hist. flor. & in fol. Liliū sylvestre: Gall. Lis sauvage. Non amplius ergo facit Hemerocallidem.

Diligenter inquirendum qua in re differat Hemerocallis hæc Lobelii à suo Lilio montano. Ostendimus autem Clusium eam iconem ponere pro Lilio montano siue silu. 1. maiore.

Cf. Liliū in syluis vulgò Martagon, Liliū silu. Liliū purpureum gerens florem.

Thal. Harc. Liliū purpureum silu. falsò pro Asphodelo habitum, Goldwurz passim. H. Lugd. Martagon Matth. Camer. hort. Liliū silu. Martagon flore subrubro & albicante falsò olim pro Asphodelo habitum. In hist. Matth. Germ. dicitur flore pænè albo.

Tabern. icon. & hist. par. 2. pag. 527. heydnisch lilien mænlein / Liliū Sarracenicum mas. Item ic. p. 640. & hist. par. 2. heydnisch lilien dæs weiblein.

Casp. Bauhin. Phyt. Liliū 19. siue montanum nostrum maius. Clusio Liliū sylu. 1. Gesnero purpureum mas. Liliū 20. siue Martagon montanum minus. Idem apud Matthioli. Liliū 16. siue Martagon flore rubello, an Hemerocallis Dioscor. Huius duas proponit icones Tabern. nomine Lili Sarraceni maris & femina. Vt verum fateamur nondum intelligimus diuisionem C. Bauhini, dubii hæremus an Tabern. Liliū Sarracenicum mas. sit nostrum Liliū flore nuntantè maximum de quo paulò post.

Liliū purpureum Martagon dictum flore inclinate, vidi Ferrariæ in orto Monasterii S. Dominici à l'Angeli, Patau in orto Triuifani. Montbelgardi spontè copiosè in monte Bat. Ex orto meo transluli in hortum E. C. Basileæ Frater obseruauit in monte Metzer, vbi etiam obseruauit. Genevæ in montibus abundat. Passim vtrumque genus Clusii prouenit in siluis & vmbrosis pratis Leytenberg, eorumq; montium, qui à Calenberg Austria, ad Alpes vsque procurunt: Nascentur & in plerisque Styriæ ac Vngariæ siluis, atque montibus illis siluosis, qui non procul Francofurto in ripa Mœni sito, ad Septentrionem absumt. Minus autem olim obseruare meminit in multis Germaniæ siluis, non modò editiore loco sitis, sed etiam in plano. Plantatur hodie in hortis hic Narcissus: (inquit Tragus) sicut alia quoque florum genera, volup-

Gohus in Onom.

Martagon vulgi & Alchim.

Hemerocallis. Non est Asphodelus. Liliū silu. Dod. mutauit sententiam.

Liliū purpur. Diosc.

Locus:

tatis gratiâ. Aliâs in altissimis sylvis Heluetio-
num, & eâ quoque quæ Hercynia dicitur, nec nò
monte Tonitruî, qui à Vualgoia non longè ab-
est, sponte sua prouenit.

Lilii Mar-
tagonis Vi-
res.

Qui difficulter urinam reddunt, radicem in
vino decoctam bibant: prodest id medicamenti
mulieribus, inquit Tragus, quibus menses impe-
diti sunt. Omnes calidi abscessus & tumores ra-
dice tusa emolliiri possunt, præcipuè verò mam-
marum & genitaliû. Quidam vini facibus prius
concoquendam tradunt. Radix in cinerem reda-
cta, cumque melle temperata, illita alopecias ex-
plet. Reliquas cum Lilio albo vires obtinet.

Dod. mor.

Perhibet quoque Camer. Empiricos vti radice
in contusis membris & vlcerebus. Contra Dodon.
dicit: Vsum hoc Lilii genus in medicina nullum
habere, cum tamen olim illi Hemerocallidis vires
ascripserit. Minimè tandem viribus, quas Apol-
linaris ei tribuit, fides est habenda.

LILIVM FLORE NVTANTE ALBO.

Descriptio

Lilii montani siue siluestris tertium genus sil-
uosus montibus ad Francofurti Septentrio-
nem inuentum, humile, Secundo generi proxi-
mum: florum tamen colore varium: nam antè
quàm explicentur, foris carnei quodammodo
coloris sunt, explicati verò, intus albi, & notis
quibusdam purpureis insigniti.

Similem stirpem habui, inquit Clusius, mune-
re N. V. Boissot veteris amici, quæ tandem adole-
uerat perinde ac primi generis plantæ: sed eius
radix Ochreæ colore minùs tincta, quàm superio-
rum. Sed Francofurtensis quidam cuius vnam ha-
bebat, cuius flores interiore parte omninò niuei,
nec vllis notis distincti. Habui etiam à Doctiss.
viro Ioachimo Venerio similis plantæ bulbum
Burdigalæ missum, cuius forma ab illius bulbo
non differebat, sed eius caulis & folia magis câ-
dicabant, flores autem antè quàm expanderen-
tur multâ lanngine erant obstiti: explicati verò
proflus niuei, nec vllis maculis infecti, staminum
apices non ferruginei coloris vt aliis, sed flauî.

Est nobis Montbelgardi in horto Il. C. Wir-
temb. Lilium flore nutante, quod cæterâ simile
præcedenti flore lacteo, staminibus herbidis, qui-
bus insident apices lutei: pistillis virefcit florens
Iunio. Attulit Gener Io. Henricus Cherlerus
Romæ ex horto insignis Pharmacopæi Coruini.
Floret Montbelgardi Iunio.

LILIVM FLORE NVTANTE MAXIMUM.

Descriptio

Bulbus maximus profundè in terra latitans:
caules aliquot cubitorum: florum ingens
nûmerus, qui videntur minùs maculati: folia an-
gustiora videntur, multò plura, & quædam ver-
ticillatim disposita.

Hoc primùm vidi in Than Alsatiz vrbè in
horto Dj. à Pfirt parte vmbrosa, vnde transtuli
Montbelg. in hortum Ill. E. C. Wirt. Obseruavi-
mus postea in Duc. Wirtèbergici vrbè Marbach
in horto Ludimoderatoris florens Iunio.

Hoc genus suspicamur depingi & describi à
Lobel. Adu. par. 2. Lilium silu. siue Hemerocallis
moschata Polyantes, Martagon Imperiale nu-
perorum, Insulanis nostris Gallo-Belgis, Mar-
tagon à l'Espineere: Hoc Lilii montani nouum ge-
nus à florum fortura coronata, Martagonis Impe-

rialis nomine insignitum aut vocitarum, conspe-
xi. Peregrinæ elegantiz plantâ gauisus sum. Elap-
sis aliquot annis mihi huius bulbos nonnullos



munere dedit
D. Ioh. de Frâ-
queuille, stir-
pium & flori-
ratorum cal-
lentissimus
qui annis plus
decem illos
Insulis à quo-
dam Botanico
nactus est &
aluit, fouteque
studiosè in
horti delitius;
vbi rarâ tran-
splantatione
florum pyra-
midatum acer-
uum, centum
viginti & plu-
rium, suauissi-
mo spectacu-
lo, iucundissi-

mi Rosæ Moschatæ odoris æmuli, densissimè
bicubitalem ex purpureo fuscum caulem fasti-
giantem. Flores pares, similes Hemerocallidis
secundæ nobis modò descriptæ; dilutiores & lu-
cidiores, per exortus quinque aut sex variè & fu-
scæ caulem ornant, fortuitis ex fusco purpureis
maculis latioribus diffusi, circum agunt & co-
ronant. Semen in vasculis compressum, aliis
ferè par & simile: Hoc primi ante omnes Bota-
nici Gallo-Belgæ nacti sunt: sed vnde delatum
nescio. An icon. Pl. 168. Hemerocallis flore ru-
bello, T. 207.

An Clus. Lilium montanum 4. quoddam ge-
nus, cuius flores primo non dissimiles, sed se-
rius sese explicare soliti, illique non insuauis o-
dore præditi.

MARTAGON ALBICANS PICTVM ad iconem cum coloribus.



Marte-
gon flo-
re albicante,
qui hoc anno
1608. non flo-
ret in horto
Ill. Princ. sed
picta colori-
bus icone ex-
primere cu-
rauius, to-
tus albidus,
est cum colo-
re subcaru-
leo & pun-
ctis plurimis
notatus, api-
ces cum ca-
pitis longi
purpu-
reis, altitudi-
dine exce-

debat quatuor pedes, Anno 1604. Iunii 2. Gold-
wurz vti ascriptum iconi.

LILIVM

LILIVM FLORE MINIATO NVTANTE,
siue Hemerocallis Chalcedonica aliquibus.

EX radice bulbosa, emergit caulis bicubitalis, minimi digiti ferè c. altitudine, in parte punctis rubentibus guttatus, ceterà virefcens, còcaus, paulò postquam è bulbo eluctatus est, radiatas fibras circumquaque emittens: per quem frequentia oriuntur folia indigesta, Lili Martagonis, striata, acuminata, per marginè nonnihil veluti pilosi ostentantia, sapore oleraceo prædita, flos cauli summo reflexo infidet plerumque vnus, aliquando duo aut plures, colore phœniceo pulcherrimo, quorum singuli Liliaceis similes fenis foliis constant, vtunque angustiorib⁹ quam Lili albi, hæc striis notata, quæ extorsu reflexæ, ceu Martagonis, apicibus circa caulem còcunt, prominentibus, nudis, miniatis apicibus, quos pallida flamina sustinent, quorum medium obtinet pistillum apicibus concolor. *Semina*, Clusio recte, sunt in anguloso capite plana, Martagonis

aut Lili sylvestris semini ferè similia, sed nigriora, minora, neque adeò spongiosa, terge commissâ prodierunt, planaque foliola tulerunt: Radix vix plurimum non est adeò magna vt quidam existimant, sed Lili semestris radicem haud multum superat, colorque dum recens eruta est adeò illi perhumilis [etenim si diutius extra terram adseruetur purpurea ferè tota est & subinde quibuslibet notis saturatè rubentibus inspergitur] vt etiam in stirpium cognitione admodum exercitati nisi eas inter se conferant, difficile discernere possint: Huius tamen radix è tenuioribus squamis contexta est, nec minùs fibris suprà & infrà quàm illa donata.

Bulbum accepi (inquit Clusius) qui primis annis vnicum florem semper mihi protulit, tandem quaternos, altero tum insequente anno senos, eosque omnes ex summo extimòque caule simul prodeuntes, quemadmodum alteri floruit, tredecim flores extimo caule, eoque vnciam lato, sustinens, saturatè rubentes cum præcedente anno quinque duntaxat extimo etiam subrotundo caule vt meus tulisset. Sed & Patricia quædam Viennensis aliquot habuit plantas, inter quas vna extimo caule duas vncias lato tres & viginti flores tulit. Gen. Io. Van der Silf plantam habuit semine naram, quæ primo quo flores proferre cæpit anno octonos, proximo autem insequente quadragenos protulit. Pictura à Raffio mihi donata vicanos aut plures flores ab extimo caule plano propendentes habebat. Binas habui saturatiores flores gerentis plantas, quarum prior quaterna, altera septenos flores tulerunt, omnes summo caulis fastigio æqualiter innascentes, nò temerè per caulem sparsos, quemadmodum Lili album aut siluestre ferè solent: singula autem hoc peculiare habuerunt, vt vnus medius inter reliquos surrecto pediculo nasceretur, & in alterà quidem ille duodenis foliis constans, & quodammodo gemellus, vt in secundâ subiectâ iconè videre licet. Ceterum duorum generù esse videtur hæc planta: vna videlicet dilutioribus floribus prædita, altera saturationibus. Ego sanè longâ experientiâ didici, eas plantas quæ dilutiores ferunt flores, caulem & folia viridiora habere iis quibus saturatiores sunt flores: postremis enim caules & folia plerumque ex purpurâ nigricant. Deinde mihi conspectæ sunt radices Constantinopoli allatæ, quibus color purpurascens fuit, dilutiores protulisse flores: aliæ contrà saturatiores. E florum verò numero, an certa aliqua differentia [vt initio existimabam] constitui possit, plurimum ambigo, cum eas stirpes quæ numerosos tulerunt flores, subsequente interdum anno, paucos, aut vnicum duntaxat, habuisse obseruauerim: at keto & pingui solo depositos bulbos, plures vt plurimum proferre flores animaduersum.

Ob floris venustatem plerisque Italiæ locis *Ri-
zo de la Signora* appellatur hæc planta.

Lob. Obl. & Icon. Plant. pag. 169. Hemerocallis Chalcedonica purpureo sanguinea polyanthos, Lob. 35. Teut. 208. wilde liliën vom Caluarien / von Constantinopolen mit völe bloemen Belg. Iterum Hemerocallis Bizantina altera Teut. 208. In indice Hemerocallis flore rubello: Belg. Schoon Claer wesse lilië von Caluarie. Lili Calcedonicum miniatum, siue hemerocallis, admodum elegans hoc Lili genus ob floris decus colorisque flammæ nitorem: vtriusque Cinnabaris natiui & factitii, intensi aut diluti coloris, miniati tintillatione splendidiorem: eius duas va-

*Zufniera
Gartens,*



et ceteras aut plures obseruare licebit. Præcox, quinos, senios, denosque ut plurimum profert flores: & nonnunquam eius radix excreuit & luxuriat ut caulem edat duorum ternumue digitorum latitudinis, qui Lobel. & Penz in Adu. amicisque sæpè triginta & plures flores protulerunt. Sero- tinum quandoque dñi multisque annis vnicum florem edit: at temporis consequentis plures, sed seriùs, superioris Martagonis floribus claptis, erumpunt flores quemadmodum amici nolque iamdiu obseruauimus. Caulis cubitalis, ceterà non dissimilia. Liliū rubrum, Z. *finiare*, Liliū rubrum siue miniatum Chalcedonicum Constantinopoli missum, *Sultan Z. vnbach*, ab aliis denominatum *Corona di Re*, hoc est, Corona regia, &c. Habetur præterea Liliū Byzantinum minus saturato flore *modicus*. Liliū Byzantinum miniato dilutiore flore. Relatum est, conspectas esse Liliū huius Byzantini plantas, quæ florem ferrent prorsus niueum, in cæteris alteri patem.

Hist. Lugdun. p. 1498. Hemerocallis altera Matthioli: quæ Lugduni in horto quodam Dalech. industria creuit.

C. Bauh. Phyt. Liliū 17. siue Martagon purpureo sanguineum polyanthos. Hemerocallis 2. Matth. Chalcedonica Lob. Liliū 18. siue Martagon phœniceum vnico flore Clusio. Liliū rubrum Z. *finiare*. Lobelio Hemerocallis Byzantina.

Floret Iunio aut paulo seriùs, Constantinopoli Vietnam Clusio delatum, ex hortis vltra Bosphorum in Asia sitis bulbi allati: Nouo Vere solet emergere. Liliū genus flore vnico minùs coloris inclinato, ut Martagon, habui Montbelgardi in in horto E. C. missum Sturgardia, vbi florens vidi Iulio: folia vorare solent insecta quædam rubra: in horto Monb. protulit 2. flores. D. à *belle fontaine* Vesuntio misit mihi bulbum cum hac inscriptione: Hemerocallis Chalcedonica. Heidelbergæ sicca plantà nos donauit Dominus Sprengerus.

De facultate huius comperti habemus nihil, nisi Dodonæo Circumforaneorum aliquis, quorum plena sunt omnia, pertinaciter resistere conetur.

LILIVM PRÆCOX NVTANTE flore rubro.

Descriptio Hæbat [inquit Clusius Hist. post.] Amplif. vir Io. Martoff. Pat. Franc. genus Liliū rubri ex Sturgard. Ill. D. Wirt. horto acceptum, quod vno ferè mense maturiùs Byzantino flores proferbat: nempe sub finem Maii aut initium Iunii, ut mihi referebant qui viderant. Erat autem *floris* color (illorum testimonio) minùs satur & longè dilutior eo, qui in floribus præcedente capite descriptis apparet: *caulis* sanè, ut ex planta quam mihi donabat deprehendere licuit, gracilior & breuior erat Byzantinis adultis, cubitalem videlicet altitudinem non multum excedens: *folia* quæ inhærebant angustiora & magis saturatà viriditate prædita: *bulbi* squamæ (nam squaræatam radicem habet perinde ac Bizantinū) longè etiam breuiiores erant: tulerat verò illo anno tres flores summo caulis fastigio æqualiter insidentes, mihi autem Lugduni apud Batauos sequente proximo anno vnicum (tam longâ enim in itinere morâ radix valdè afflicta fuerat,) eius, quem supra dixi, coloris, proximè autem insequente binos duntaxat. Licet autem matu-

riùs altero flores proferret, illo tamen seriùs germinare solebat. Cæterum, sub initium anni 1594. monēbat me Thobias Roelhus, Io. Somer varias & elegantes stirpes attulisse inter quas binæ essent Lilia miniato seu rubro flore, maturiùs Byzantino flores proferentia, quorum alterum angustiora folia haberet illo quod Constantinopoli allatum: alterius verò folia multò breuiora essent, ac paulò tatiore. Horum icones suis coloribus expressas, sed radice mutilas, cum aliquot viris quæ plantæ folijs sequente Iunio ad me mittebat.

*Lilium præcox mutante flore rubro,
tenuifolium.*

Valdè autem diuersum est Angustifolium 3. Clusij, non quidem floris formâ (nam eius etiam folia circumuoluta & reflexa) sed colore, qui Lilio cruento maiori, non bulbifero similis est, tum situ, foliorumque per caulem sparsorum dissimilitudine: multa enim & conferta fert folia, cubitalem & ampliore caulem confusè vestientia, admodum angusta, & longa, instar panis foliorum Tragopogi: caulis item fastigium flores proferit non eodem ortu, ut in Byzantino, sed in summis alis, inter angustissima foliola *gallias* nascentes: an viris quæ radix Byzantini radicem æmuletur, me fugit, ait autor noster: nam neutrius plantam videre mihi contigit. Sed & triennio post iconem suis coloribus expressam ad me mittebat idem Io. Somer, qualem ille depingi curauerat ad normam eius plantæ quæ ipsi eodem anno quinque & triginta flores protulerat. Illius floris (Exot. par. 2. Append. 2.) colorem plurimum ad Mali Aurantij præmaturi colorem accedere obseruabam: odorem autem non adeò suauem ut eius quod præcedente capite descriptum est, sed potius Liliū montani flauo flore odorè referre. Hæbat porò Amplif. vir Nic. Vanden Branden Consiliarius Bruxellensis plantam similem Sometianæ, quæ anno à Christi natiuitate 1602. longè etiam plures tulisse fertur flores in vnico, sed illo plano, caule: anno autem insequente non minorem florum numerum tulisse ad me scribebat. Cæterum aliud eius genus reperitur etiam præcox & angustifolium, longè nitidioribus floribus quàm Sometianum præditum; nam prorsus miniatos illos fert, ut Byzantinum, certè magis saturis quàm Sometianum, nec eos inodoros. Præfectus Curatorum Bruxellensis sub extremum annum 1602. pusillum bulbum eius generis mittebat, quem ex Italia recentè accepisse scribebat: & licet is bulbus Nucis Auellanæ magnitudinem vix superaret, sequente tamen anno quatuor flores tulit eius quem dixi coloris: eius etiam folia licet angusta ut alterius, magis tamen saturâ viriditate prædita, & magis splendens mihi videbantur, atque inordinatè quædammodum flores in caule nascebantur: obseruabam etiam eius caulem & folia non adeò breui marcescere ut alterius, sed diutius perdurare. Vtrūque genus, ab ijs qui diu aluerunt, Martagon Pomponij vocatur, & hac appellatione ex Italia se accepisse asserunt. Rarum adhuc est in his Prouincijs, quia adnatis difficillimè se propagat, nec apud quempiam ipsam plantam semen præbuisse intellexi.

De hoc Lob. Adu. part. 2. inquit. Exinio ornamento decorat Botanicorum paradisos Hemerocallidis Macedonicæ tenuifoliæ miniati coloris: Liliū siluestris montani Macedonici, &

CORONA IMPERIALIS SIVE
Tusai alii.

Radix bulbosa, rotunda, crassa, diuersa à Lili-
orum forma, est enim compressa ex magnis
crassissimis & succulentis squamis compacta,
colore interdum albo, nonnunquam etiam pur-
purascente, sæpè pallido, odore fatido & viroso,
vri & foliorum: Colchicum olente, Clusio verò
hircum, nares etiam procul feriente, qui eruit
binas & amplius libras pendente. *Caulis* tol-
lit singularem, bicubitalem aut etiam altiore, di-
gitali crassitudine, inferiore parte plusquam
pollicari, firmo, intus fungoso, viridi, rotundo,
quidem, sed ad cubiti altitudinem striato, *foliis*

Descriptio

Odore

Pondus



magna parte
stipatum nu-
merosis, sple-
dore viridanti
nitentibus,
Liliaceis vel
Lilii montani
floribus Lob-
pluribus indi-
dem ortis, æ-
quali ordine;
alii incondi-
tis, nullo nixi
pediculo, sed
latiore sui pa-
te cauli adna-
tis, ita vt ap-
pendices pau-
lùm eminen-
tes ab iis pro-
pagatis caul-
reddant non-
nihil angulo-
sum. Suprà au-
tem densius

hoc foliorum agmen, caulis ad pedem, nonnun-
quam etiam cubitum protenditur nudus, sine fo-
lius, gracilior quàm inferius, & teres, neque stria-
tus & viridis, sed lævis & purpurascens coloris,
Serpentariae iuxta maculosus, qui in summo toti-
dem pænè in angulos definit quos flores sustine-
bit, nempe binos, ternos, quaternos, quinos, se-
nos, aut plures, omnes Vere quasi equaliter, sed
contrario situ nascentes, singulòsque inter bina
folia inferioribus longè minoræ & angustioræ, æ-
quali ferè longitudine, quin flores primùm e-
rumpunt, inter folia latens, candicanteque sunt,
deinde paulatim incrementum sumunt, vnà etiã
succrescente eà caulis quæ illos sustinet nudà
parte: florum verò *pediculi* qui sexcunciales in
augmento deorsum innituntur è quibus flores
penduli sunt circum circa regum coronas imita-
ti, Lilii candidi, vel Martagonis pares, flammeo
colore rutilantes, Lobelio ex phœniceo ruben-
tes, patuli, senis constant foliis latis, per extre-
mum mucronatis, pulchra striarum saturatione,
siue purpurarum Clus. d. c. tantum picturà
variegatis, laciniata cæsurà subinde ludentibus,
vngue autem, inquit Clusius, singulorum foliorum
nonnihil foris eminente, & ex nigro purpuran-
te, quorum vnusquisque fundum obscuriore
colore pictum obsidet gemmantis liquoris mar-
garita argentea limpidissima & dulcissima, per-
tinacis durationis, post multos etiam dies à refe-
ctione, de quo liquore Clusius ait: Flos abso-
lutus & maturus expanditur, tintinnabuli mo-

Martagonis Pomponi, splendissimi miniati co-
loris, D. I. Someri: Martagonis Pomponi So-
meri: Lilii rubri præcocis Clusii, luculentus flos,
intaminatè fulgens, miniati coloris &c. Debe-
tur hæc planta, præfata D. Somero, qui primus
eius bulbum è Macedoniæ montibus effossum in
Belgium derulit, & amicis communicauit. Hanc
quoque aliquot annis ob florum decus N. C. Ar-
bergius studiosè coluit, nec non alii Mediobut-
gentes.

LILIVM NVTANTE FLORE FLAVO.

Elegans Lilii montani genus à nemine quod
Clusius de sciat scriptum: cuius bulbum misit
Io. Robinus & descripsit, florem habere ex au-
reo flauescente, foliis instar Lilii montani, aut
Byzantini, vt sunt Lilii montani siue Martagonis
Matth. flores. Misit ad me, inquit, Burdegala erudi-
tiss. Io. Venerius istius Lilii crassos bulbos, mo-
nebat alterum altero magis præcoces flores pro-
ferre: addebat insuper se aliud adhuc genus ob-
seruasse, cuius flores nullis punctis internè di-
stincti: nasci in *Cageire en barcelus* nuncupatis lo-
cis, atque Pyrenæorum montium aliis, vnde ipse
retulerat. Ac se spontè nascentes eruisse natos in
monte *Campsaure* vocato, & alio in loco qui à
Lilio nomen sumit: isticque à rusticis *Consol*
appellari, id est, Consolidam, quòd eius radice
contusa & imposita, tam hominum, quàm ani-
malium vulnera, mirum in modum curari refe-
rant: atque adeò Pyrenæorum montium incol-
as nullum aliud remedium vsurpare.

Lilium montanum flore flauo Lobel. & Penæ
Adu. non dissimilem vulgum, ortum, & natales
habet, montium nempe Pyrenæorum, Lilio Bi-
zantino miniato aut syluestri montano Lilio.

MARTAGON FLORE LVTEO PRÆCOX.



Hemero-
callidem
siue Martagò
flore croceo,
quod Tur-
cis *chibund*
vocat, vidi
flauescentem
cum octo flo-
ribus infrà re-
clinatis in hor-
to Stœckii, nò-
dum tamè ex-
pansis Iunii 8.
videtur præ-
cocior ea He-
merocallide,
quam habent
in horto Prin-
cipissæ, in qua
nondum appa-
rent flores mē-

sis Iunii 9. Eius flores sunt miniati vt ait hor-
tulanus: Martagonis autem crocei flos apertus
fuit 11. Iunii, intus punctis notatus, capitula api-
cum crocea ferè.

do propendens, iurei Mali siue Citrii colore, sed pallidior, venis purpureis summam venustatem adferentibus: singula floris folia interna parte in ipsis vnguibus singularibus tuberculis candidis prædita sunt, quæ meridiano etiam Sole limpidissimam dulcemque æquam exsillant lachrymarum in morem, vt vniones propendentes Lobelio visci grano ferè pares, videantur, sed abundantius pluuio tempore: ea deinde tubercula, marcescentibus floribus in albas lacunas abeunt. Ex ipso penitus floris umbilico prodeunt pro foliorum numero, stamina candida ad eò coniuncta, vt pro vno fallant obiter intuentem, apicibus maiusculis in Ochram vergentibus: breuiore trifido stilo inter ea latitante: Caulis reliquus suprà nudus eminet supra florum coronatum agmen, confertâ duntaxat minoram & angustiorum comâ: interdum etiam mihi, inquit Clusius, nati sunt supra flores non vnus cauliculus siue ramulus, sed bini terni aut plures, suis etiam foliis singuli ornat: Creuit porro Viennæ planta vdenis pluribusque, aut paucioribus floribus prædita; caulis suprà septenos aequaliter propendentes denud nudus, quasi dodrantali longitudine assurgens, reliquos flores singulos inter folia nascentes protulit, longi, densi, & multifida aliâ foliorum comâ supra eos fusâ. Sed & in telligebam ab his qui aliquot annis Constantinopoli hæserant. caulem nonnūquam supra priorem illam florum aequaliter propendentium seriem, dodrantali longitudine attolli, aliâque florum seriem gestare, aliquando etiam tertiam, ac tum demum foliorum comam supereminentem: eas verò stirpes vnicum florum ordinem subsequenter annis plerumque ferè obseruari, vt peculiare genus non sit censendum, sed Naturæ luxuriantis quidam duntaxat lusus, licet mihi etiam altero anno duplicem florum seriem gestare similem plantam meminerim. Habuit autem Viennensis quædam Patricia, cuius caulis supra terram planus pedali longitudine extabat, deinde in binos ramos fidebatur aequali longitudine excresecere, singulos vdenis floribus onustos, magnâ etiam fusâ supra eos foliorum comâ. Habuerunt & alij & ego similes plantas in binos caules cubitali panē supra terram altitudine diuisas, quorum alter octo aut plures, alter quinos aut senos flores tulit: mea verò planta hoc etiam peculiare habuit, quod eminens coma multifida fuit. At Viennæ obseruata Tufai plâta, reliquas quas postea obseruauerim florum numero superauit: nam quinquagenis aut pluribus floribus onusta fuit. Illi. Cætorum Principi Wilhelmo Gaterus Cuius Londinensis monebat se plantam habuisse quæ binos & septuagenos flores protulerit. Habuerunt & alij similes interdum, in quibus plures flores nati, vicini nempe, trice- ni aut quadrageni: quotquot autem tam numerosos flores tulerunt, planos, latesque & valde striatos habuisse caules animaduerti, atque proximo insequente anno ad ingenium rediisse, hoc est, caulem rotundum, ternis, quinis, septenis aut octonis floribus præditum habuisse. Nos quoque insignem lulum in eadem planta notauimus: vno anno vnicum caulem ferentem cum corona multorum florum, alio anno duos caules cum magno florum numero, in vtroque caule coronas: sæpe nullos produxisse flores, nonnunquam adfuisse caulem sine floribus &c. Fecunda furcata capita sursum eriguntur magna Dei prouiden-

tia, inquit Clusius, ne dehiscen- tibus semina ante maturitatem excidant.

Ceterum [inquit Clusius] aliud genus est, nec caule, nec foliis, nec florum forma à superiore differens: nam & illos in extrema læuis & nudi caulis parte aequaliter ferè in ambitu nascentes, singulosque inter bina angusta folia sustinet, vti superius, sed color variat, nec vt in præcedente flauus, vel verius pallescens, sed ruber, aut sandatacæ Sandicisque colorem refert, instar Actæi elixi chelarum ferè: sex etiam latis & mucronatis foliis constat, vnguibusque ex purpurâ nigricantibus, cum suis interiore parte candidis tuberculis limpidum rorem stillantibus, & sex staminibus, stiloque æquali longitudine propendentibus. Hoc genus superiore magis venustum mihi videtur.

Variat item in nonnullis plantis florum color: est enim vel medius inter utrumque genus, vel ad prioris, secundæque colorem quam proximè accedit.

Sed & quartam quandam differentiam obseruabam, licet eius florum color proximè ad Secundum genus accederet: angustiora enim folia habebat, illaque & radicem nullo terro odore, quantum quidem naribus manifestè percipi posset, prædita.

Idem Pann. p. 122. & Histor. post. l. 2. c. 1. Hætenus nullam plantam obseruare meminim, quæ Hemerocallidem Diosc. descriptam exactius (in hoc à Clusio sumus alieni) referat: alia est Hemerocallis cuius Athenæus meminit: Pancius iconem mittebat, Coronæ Imperialis nomine insignitam, quam appellationem apud Herbariorum vulgus adhuc retinet: bulbi verò à Cæsaris Oratoribus Constantinopoli missi, quæ Thyschachi, modò Tufai, siue Tursai, Tuschai autem [vt ab iis intelligebam qui Constantinopoli vixerant,] liliū regium significat. Interdum etiam bulbi missi Tursani & Tursana appellatione: sed postremæ hæ voces à Turcis duntaxat nominibus adici solent, ad rei, cui adnexæ sunt, magnitudinem exprimentam. Ex Persia verò Constantinopolim delatos illius bulbos omnino mihi persuadeo, quoniam cum accipiebam inter reliquas hæc fuit inscriptio, Tufai, siue Persiano russo d' d' scil. rivo, con lare sha abassi, hoc est, Tufai, flos Persicus ruber aut decolor nutante capite.

Vidit inter alias rariores stirpes hanc etiam nouam plantam nostra ætas, quæ vocant Turcico vocabulo Tufai, nam Constantinopoli allata est. Alii Liliū Persicum, à natali loco, vulgò ob similitudinem Coronam Imperialem siue Regiam appellant, quam penitus reum simplicem C. Clusius, summus meus (inquit Camer. Embl.) amicus ad Hemerocallidem Veterum non malè referri existimat. Huius flos maturus expanditur, ac in suis propriis pediculis planè deorsum flectitur, at quamprimum flaccescere incipit, succedunt illi satis magna capita [vt quoque in Lilio rubro fieri solet,] quæ excusso flore statim sursum eriguntur, ne scilicet, si deorsum dehiscerent diutius, semina nondum natura putrescant ac excidant.

C. Bauh. Phyt. Liliū 13, siue Corona Imperialis flore luteo, Lobel. Corona Imperialis. Liliū 14, siue Corona imperialis flore rubro, Clusio Tufai 2. Liliū 15, siue Corona imperialis multiflora, Clusio Tufai 1.

Lobel. Obs. Liliū siue Corona Imperialis, Tursani & Lale Herbariorum. Ie. Plant. p. 1. Liliū

Vniones.

Stamina.

Corona plures.

Coma mult. vna.

Tufai n. tur.

lilium siue corona Imperialis Teut. 210. Item pag. 172. Corona imperialis phœnicea duplici corona aut serie florum. Teut. 211.

Aduers. par. 2. pag. 512. Lilium siue Corona imperialis Herbariorum, cuius varietates peramœnæ & perquam speciosæ Belgio & Anglo-Britanniæ iam nostra ætate inquilinæ, oblectationi oculorum magis, hortorumque ornamento, quam naribus dicantur: tetrum namque hircinum halant odorem Imperiales Coronæ, quarum varietates in caule, flore, & folio perspicuæ. Præcocior quæ statim Martio, nec dum lapso floret: folio lato est, dilutius viridi, & flore non dissimili, sed pallidior, à frigore fortè. Quæ media, est elatior, folio itè pallidior sed angustior: & flore item dilutius. Pluricaulos, ut Liliū albū & Martagon siue Hemerocallis Byzantina interdū cūctū fortuito fit Imperialis Corona numerofo florum incrementis: foliis angustioribus, & Minii coloris saturioribus, floribus aspectu iucundis, quales florere Londini in horto D. Ioh. de Franqueville Anno 1600. & Hacknei in horto Nobiliss. Baronis Eduardi Zouchæ 1601. Serotina latioribus foliis atrouitentibus: flore autem ex saturo phœniceo colore. Multis numerosisque latioribus foliis constat, stipatissima bicubitalem caulem ab imo amicientibus, florum elegantissimorum saturorum duplici serie coronatæ, nonnullisque floribus caulis comosum fastigium internascentibus, aspectu iucundissimo. Hac variis in hortis alitur & in honore habetur.

Inter syluestria Lilia Dod. Lat. venit & numeranda Imperialis Corona dicta *Lale & Tursani* patriis vocibus appellari affirmatus.

Hist. Lugd. Corona Imperialis Dodonæi. Corona Imperialis 1. Königsfron / Königsilien. Et Corona Imperialis 2. polyanthos, Geseult Rönigsfron / Lilium Persicum, *Tusai*, aut *Tousai*.

Floret Aprili, interdum etiam Martio, si aeris temperies paullo calidior fuerit. Semen Iunio maturum. Nusquam sponte nascentem hanc plantam conspexit Clusius, sed Constantinopoli delatam, eo quo ad Maximilianum 11. Viennam euocatus est anno, primus Belgicæ hortis communicauit & in Viennensibus reposita feliciter prouenit. Antè ipsius tamen discessum ex Belgio eius iconem [qualem Dodon. in purg. hist. append. exhibuit] Ill. V. Ioh. Brancioni miserat C. V. Alphonsus Pancius Ser. Ducis Fer. Med. Ob seruauit Stuttg. in hort. Ill. E. C. vnde translata in eius hortum Montb. floret Martio, ac hiemem fert non reposita: Visa etiam Basileæ florere eodem tempore, ac semen maturum proferre Iunio.

An apud Turcas medicum aliquem vsu obtineat, non intellexit Clusius, arbitratu tamen vultus & ornatus potius causâ hanc plantam in suis hortis illos alere, quam ob vllas eius facultates.

Hemerocallis vires licebit videre antè.

CORONA IMPERIALIS MONSTROSA.

EX Iconibus coloribus depictis Illustrissimæ Princ. 1608. In magna iconem multo plures

Tom. II.



LILIVM PERSICVM SIVE SVSIANVM.



erant flores ac folia. Est môstrosa Corona Imperialis.

Donauit D. Chero meo Nobiliss. Cortulus Patavii inter alia raritatis plena, Lilium, Persicum ei dictum: cuius caule procerus, non multum crassus, cubitalis, rotundus, flus ab ima parte sursum vortum dense stipatur, Lili crocei foliis, angustioribus, acutioribus, digitalis longitudinis,

Descriptio

longè quàm Coronæ imperialis angustioribus, illis ferè similibus quæ in summo ipsius capite nascuntur, virentis ex cineraceo coloris, siue quodammodò æruginosi (inquit Clusius,) qualis in Tulipæ foliis conspicitur, contortæque verò illa, buxæque sunt odor: summus caulis longum gerit thyrsus florum, selquiuncialibus & longioribus pediculis hæretum, numerosorum, pendulorum, terâque spectantium, Leucoii bulbosi, Theophrast. & nolas imitantium, senis foliis constantium, saturo purpurâ tinctorum, siue, ut ait Clusius, foris purpurâ valde obsoletâ colore præditos, internè autem dilutiores, inodoros, vnguibus subvirescentibus. Ex umbilico sex inæqualia staminula prodeunt purpureis apicibus primum conspicua, qui obuerti, flauo polline conspersi apparent: tria deinde longiora staminula coeunt, stilumque medium florem occupantem æmulantur. Sequuntur deinde sex angula capita siue triangula, quorū singuli anguli bis alis sunt præditi, Coronæ Imperialis capitibus ferè similia, sed minora & breuiora: semine etiam simili, paululum tamen breuiore: Radix qualem nos habuimus bulbosa, Pomi Arancii magnitudinè, subrotunda, fissa: magnis squamis lo-

Nan

ricata, ex albo flavescentes, tenui membrana cin-
cta, substantia eius qualis in reliquis bulbis: Ima
fessilis foramine plurimum pertusa caulis vesti-
gio. Sapor substantiæ peramarus, horribilis.

Sapor

Odor.

Nomina.

Clusio radix est magna, Tufai radici penè æ-
qualis, è paucis squamis contexta, candidioribus
tamen & aliquantulum longioribus, nullò-
que terro aut graui odore nates feriente præ-
dita.

Missi aliquoties pauci bulbi Tufai bulbis per-
mixti cum inscriptione Tufai *fiur Persiano*, si *da-*
manda Penachio Persiano: tandem postremo ac-
ceptus *Sufam-giule* appellatione, quod è Sufis
primùm Constantinopolim allatus sit: hæcque a-
dèd causâ Liliū Sufianum nuncupauit (ait Clu-
sius.) Munere Magnif. V. Iac. Contareni pa-
tricii Veneti ex Italia in Belgicam Ill. Io. de Brā-
cion missus bulbus *Penachio Persiano* nomine, bi-
cubitalem aut ampliorem tulit caulem quinquā-
genis floribus onustum, nullum autem semen:
imò ne germinauit quidem sublequente anno:
illius iconem dum florebat suis coloribus expri-
mebat Raphaël de Coxia Regius pictor, & exem-
plar mihi mitebat. ex qua nostra icon imitata:
flores sunt magis paruli, quàm in pictura expres-
si. Iconem habeo cum magno artificio depic-
tam munere Nicolai Rastii Regis Galliarū Chi-
rurgi, qui Hyacinthi nomine appellabat. De hac
planta scribebat Alphonsus Pancius: *Penachio*
Persianus est planta bellissima, & è specie di Giglio
ò Martagon, diuerso della Corona Imperiale.

Lib. Obs. Adu. par. 2. & c. pl. pag. 170. Liliū
Persicum Lobelij, vulgò *Pennachio Persiano*. Hi-
stor. Lugd. Liliū Persicum Lobelij. Camer.
hort. p. 9. & Tabernac. & hist. Persische Gl.
gen/Liliū Persicum. C. Bauh. phyt. Liliū 12.
siue Persicum maius & minus, Lutetiā ad nos mi-
sit D. Johan. Henricus Cherlerus. Audimus nos
Gallandinum exultimantē *Pennachio Persiano* esse
hemerocallidem: verum hæc opinio, mihi non
satisfacit, multa non respondent & in primis co-
lor.

Hemerocal-
lis Guill.

Floret Aprili, semen illius maturum cum Tu-
fai semine aut paulò post: Inter bulbos Constā-
tinopoli missa fuit Vicanam: ternos tulit caules,
singulos ternis floribus præditos, hic vicinis, ille
triccis, tertius plurib⁹. Bulbos cū selectissimis qui-
busq; aliis rigida & aspera hiēs corrumpit. Non mo-
dò flores, sed abundè semen maturū protulerunt
Lugduni Batavorum. Verisimile est [autore
Clusio] è Sufa vrbe Sufianæ regionis Persidi vi-
cinæ primùm delatam fuisse Constantinopolim.

Camerar. hort. Liliū Persicum: Ital. *Penn-*
nachio del Persiano apud nos quidem perdurat e-
tiam in hyeme non nimis acri, sed bulbus semper
decreuit, nec florem quod ego sciam, in Germa-
nia produxit. In Belgio & Germania rarum ad-
modum fuit: Angliæ hodie alienigenarum opera
conseruatur & propagatur, Lobel. Passim in hor-
tis Italiæ colitur, vnde à Cherlero elegans allata:
speciosos ex Italia ad nos attulit Cl. D. Bierdun-
pfelius Med. doctor, & studii botanici sagacissi-
mus excoltor, quos hortus Ill. Ducis Montbelg.
habet. Floret Maio & Iunio, Montb. postea perit:
vidimus Argentinæ in orto Dj. Frid. Meier.

LILIVM ASPHODELI RADICE

Luteum, siue lilio Asphodelus
quorundam Flore luteo.

Ad vñ vel duos cubitos excrefcit, caule tenui
sed rigido, tereti, cauo, laui, absq; foliis in



sunt numerosa. Porri aut Asphodeli, longa, cari-
nata, striolis per longum donata: flores odore
planè & formâ Lili, sed colore penitus luteo,
post flores inquit Dodon. crasse, triangulares gi-
gnuntur siliquæ in quibus semen nigrum & splē-
dens, Pæoniæ paulò minus.

Gesner. de hort. in append. Gladiolus Indicus
à Calceolario missus Typhæ similis, radicibus
nodis Filipendulæ similibus, quæ iamdiu in hor-
to habet, iisdem ferè floribus quibus Cannæ,
nempe croceis, Lili specie, sed si sine femine de-
cidunt. Liliū luteum Ephemerum quod Tur-
cicum aliqui vocant, alii Gladiolum Indicum,
quem Asphodelis cognatum deprehendi: & c. Si
Gesnerus intelligit, Liliū non bulbosum, com-
paratio floris cum Cannâ [scilicet Indica] non
placet.

Lobel. & Penz: Asphodelus Lili florus & Li-
rio-asphodelus, liliū luteum vel Asphodelum
Pharmacopœis Venetis.

Dod. in post. hist. non meminit ampliùs Lili
non bulbosum lutei maioris & minoris, sed tantum
vnum tradit luteum, & aliud obsoleto colore ru-
bens: de quo mox, si ueritatem de luteo.

Cæsalp. Liliagine vulgò appellantur duæ
Asphodelis affines, floribus croceis, figura & ma-
gnitudine Lili. Maiori caules cubitales, flores
ampli, colore quasi igneo, qui celeriter marces-
cunt. Altera minor in totum non excedens di-
midium cubicum, floribus aureis, radices vt in
Asphodelo, maior in Vere tantum floret, minor
diutius propagatur. Hemerocallis videtur apud
Diosc. præsertim quæ maior: cui Diosc. teste Bul-
bo ingenti similis, videtur autem accipere glo-
bum radicem ingentem. Theophr. inter suffu-
tices coronarios recenset. Theodorus Elium ver-
tit. Hermol. in Diosc. non Elium legendum pu-
tat, Sed Liliū maritimum. Plinii Hemerocallis
descriptio detruncata videtur ac deprauata vt pa-
tet conferendū cum Diosc.

Hist. Lugd. Liliū non bulbosum, Hemero-
callis Dod. Et p. 1590. Lili-asphodilus, Lili florus
Lobelio. C. Bauh. Phyt. Liliū 21. siue luteum
Asphodeli radice. Tabern. icon. & hist. *Geel*
Asphodelien, Asphodelus Liliaceus luteus i.
Clus. Pann. Lili-asphodelus luteo flore elegant
& odorato, Vng. *Zeed Leliam*: Croatis apud quos
etiam flore albo inueniri asserunt Illian Zuver.
Idem hist. Lili-asphodelus luteo flore.

Camer.

Camer.hort.Lilium non bulbosum, siue Arundinaceum flore luteo, odorato admodum. Profecti interdum germina in summitate caulis, vbi flores sine semine deciderunt, quæ terræ commissa statim radices agunt.

Peregrinū Belgio: Floret cū Lilio purpureo maiore & paulo ante, Lilia candida præcedens, Dodonæus. In Vngaria maximā copiā spontē nascentem in multis vliginosis pratis, non procul ab oppido munitis. Nemehvyyvar inueni, Clus. Lilium non bulbosum flore luteo plantauit in horto Ill.E.C.vbi faciliē prouenit & se multiplicat, non ita tamen vt purpureum, semina proferens. Montbelgardi nondum vidi: Hanc plantam primū obseruauit Basileæ in horto Di.Dodonæi Felicis Plateri. Frater Casp.Bauh. attulit mihi Parauio ex horto Di. Trusefani, qui anno- raurit dici à Guillardino Asphodelum Hermaphroditum Recentiorum. *Eriosebach* Arabum.

LILIVM RADICE ASPHODELI PHOENICEUM, siue Lirioasphodelus quibuldam.



Non admodum ab similibus est hæc planta Lilio Asphodeli radice præcedenti, sed in singulis partibus maior, *radix* quippe cōsimiliter glandulis oblogis, filo connexis, strumola, alba, gustu propemodum fatuo: *caulis* digiti crassitudine, duos cubitos altus & maior, fistulosus, enodis, cuius fastigium in aliquot alas

diuiditur: *folia* maiora, carinata, latiora, quam Lutei: *flores* in caulium ramis, altero tantō maiores, Liliaceis pares, foliis tenis constantes, colore tristiore rubent intrinsecus, lutea linea per medium decurrente ad vngues vsque totos luteos: extrinsecus verò folia ad luteum, magis deuerunt.

An Camer.hort. Lilium non bulbosum, siue Arundinaceum flore suberocce.

Clus.Hist.Lirioasphodelus puniceo flore quem Hemerocallidem esse Dodonæus censet. Hemerocallis flos est qui nocte tabescit, Oriente verò Sole pullulat, Athenæo teste, quale istud non bulbosum Lilium, præsertim quod purpureum & fugacissimum est, hoc enim vno tantum die viget, matutino siquidem tempore exortum vesperi flaccescit, quamobrem & propriè *hemerocallis* ab vnius diei pulchritudine dici potest. Cum Dioscor. etiam descriptione conuenit exceptis radicibus. Flores proponit vnius generis Ochra luteo colore: alterius verò purpureos. Purpurei etenim coloris & Hemerocallidem aliquam esse *purpureas* nomen, inter nothas appellationes repperit ostendit: Neque obstat Dod.in fol.quod

Tom. II.

Dioscor.Hemerocallidis magno bulbo similem tribuit. Omnia nomina conueniunt excepta tantum Bulbi Hæmatici appellatione: *purpureas* hæc autem vox purpureo propria est.

Lobel.Obs.Lirioasphodelus phœniceus.Sunt qui Ephemerum & Hemerocallidem dixerunt Plant.ic.p.99.Lirioasphodelus Lob.48.Teut.127. An Bellon.Lilia rubra Turcarum?

Gesner.hort.Lilium rubens arundinaceum Turcarum Bellonio. Si quis à radicis forma Cy-norhodon vocare voluerit aut à foliis Cannorhodon, non absurdè fecerit.

Dod.de fl.& in fol. Lilium non bulbosum flore rubro purpureo.

Tabern.icon.& hist. Asphodelus Liliaceus rubens Rot Zifodit lilien. Histot.Lugd.pag.1590. Lirioasphodelus phœniceus Lobeli. Et p.1499. Lilium rubrum non bulbosum, radicibus tantum differt à Lilio non bulboso luteo, quas multum fibratas habet. Non separabo à Lirioasphodelo, donec aliquis me moneat vbi viderit talē plantam.

C.Bauh.Phyt.Lilium 22. siue rubrum Asphodeli radice: Hemerocallis Diosc. Theophrast.& Plinii non potest esse Hemerocallis Theophrast. est enim frutex.

Lilium non bulbosum habeo in Horto Ill.E. C.Wirtemb.Montbelgardi, quod mirè multiplicat, quotannis florere, semen autem non profert. Basileæ obseruauit in horto D. Felicis Plateri: Suā autem propagante & reptante radice odiosum, ac multo magis quàm præcedens. Valdè luxuriat (vt Clusius testatur) in omnibus Auitriæ, plurimisque Germaniæ hortis.

Facultates Lili non bulbosi incompertæ sunt, cum nullius hac ætate in medicina aut cibatu sit vsus. Hemerocallidis vires tradit Dodon.

Porphyranthes.

C.B.not.

Locus.

Vires

GLADIOLVS SIVE XYPHION.

CAP. XIV.



Cvm Iride bulbosa multā habent similitudinem Gladioli, *folia* cultrata, striata, caulem vaginā tanquam concludum aliquidq; circumplectentia: *caulis* sesquicubitalis, singularis, teres, geniculatus, nonnihil, circa summitatem maximē, purpureascentis: cui *flore* longa serie è vaginā pro-

Descriptio

silientes nascuntur, quasi intortī, longi, aliquomodo similes Iridi, sed minores multo, nunc vno versu eodem vergentes, nunc duplici, colore suauerubenti, formā Liliaceæ, foliis tenis constantes, quorum tria inferiora, Zonam habent per longum decurrentem, modò saturatius purpurascens, modò in medio albescens, *apicibus* atro purpureis medium occupantibus. *Radix* duobus constat bulbis, gustu acri, altero alteri incumbente, alteroque magis quàm altero vegeto,

Nnn 2

adnatis quoque per intermedias fibras subinde bulbillis quibus se propagat, sub bulbis sunt duæ radices satis crassæ, tres vncias circiter longæ, præter fibras quæ defunt in iconè Matth. Nostra etiam figura iam empta sculpta displicet.

Hunc porro Cordus hist. sua diligenter sic descripsit. Victorialis femina, id est filu. Gladiolus, rectum & mucronatum emittit folium: è quo alia duo aut tria erumpunt, Iridi similia, multò tamen angustiora, utrinque striata, & Iridis modo sibi inserta: iuncum, teretem, cubito longiorem, & glabrum caulem amplectentia: in cuius summitate quinque, sex aut septem egregiæ figuræ & coloris flores, Sole cancrum ingrediente, se proferant, à se inuicem distantes, in vnam partem caulis se inclinantes, & deorsum nutantes: constant hi sex foliis, vncia parum longioribus, simul ab vno exortu proceduntibus: ex quibus quatuor semuncia paulò latiora sunt, colore roseo, sed multò lætiorè & pulchriorè: interdiu, cum Sole tanguntur, ignis & scintillarum modo exteriori superficie profuscantia, & veluti flagrantia, reflexis labris profundioris calathi figuram referentia: reliqua duò foliola prædictis multò tenuiora sunt, ac intra florem constituta, inferius aliquantulum prominent, & candidam, longam, & in medio latiore maculam habent, quam vndique purpurea linea circumscribit, & terminat: superiori floribus folio stamen subest trifidum, & inter hoc & folium singularis apex. Floret paucis diebus, ab inferiori parte incipiendo: aperiente enim se qui in summitate est flore, inferior flaccescit & clauditur: floribus singuli folliculi succedunt, in rotundo modicè oblongi, tenuibus venulis distincti, Nucis Auellanae quantitate: qui cum immaturuerunt in tres partes diuiduntur, & tenuia, paleacea, flauaque semina ostendunt: in quibus rubens, cartilagineus, & paruus est nucleus: radicem habet non profundam, paruum, rotundam, bulbosam, ab ima basi versus germen turbinatam, aliquot crinitis & reticulatis tunicis, veluti loriciis vestitam: quibus detractis duo exigui candidi, carnosique apparent bulbi vno alteri infidete, superiori quidem Veris initio, minore sed vegetiore: inferiore autè maiore & latiore, verum flaccido & fungoso: perit enim & flaccescere incipit, prioris anni bulbus Veris initio, supernalescente alio: itaque simul decrescenstem & increscenstem radicem habet: nonnunquam etiam inferiori subest textius bulbus, sed adeò flaccidus & inanis, vt inter cfodiendum (quia non est spectabilis) negligatur, dum floret superior & minor bulbus increscit, vincitque soliditate & qualitate inferiorem: nam cum flaccescere flos incipit, digiti crassitudinem, & globuli figuram acquirit: fibras ab inferioris bulbi base emittit tenues, candidasque: saporem radix habet præ cæteris herbæ partibus excellentem, nempe dulcem & modicè acrem, relinquit enim in palato aliquandiu linguam & fauces aliquantulum vrontem & saluam elicientem, [flores & folia idem faciunt] acrimoniam.

Xiphion seu Gladiolum caruleo flore describit Tragus, cuius descriptio integra post traditur sub Iride tenuifolia Michelsfeld.

Gesner. Gladiolus vernus. Gladioli segetalis [linguæ ceruinae Apulci Dodon.] plerisque dicti, flores [purpurei:] vulgò appellatur *Monacucie*: Arab. *Kasiflore*. Ital. *Gladiol*. Et quamvis Diosc. tradiderit quòd superior radix magnitudine in-

fieriorem superet, plerumque tamen contrarium visitur. Plin. hac in historia à Diosc. differt: siquidem in palustribus & aquosis inueniri existimat. Ex quo facile crediderit Matth. Plinium illum vocare Gladiolum quem passim Officinæ Accurum nominant. Lobel. & Pena Adu. p. 47. *Epion*, Gladiolus, Germ. *Schwertel*. Gall. *glais*. *Segetalis* Romanis. Hæc ille qui ait Narbonensè vnum habere florum ordinem, italicum duos. Item Obf. & Ic. Pl. p. 98. Gladiolus Narbonensis. Adu. p. 47. & pag. 99. Gladiolus italicus binis florum ordinibus.

Idem Adu. par. 2. Gladiolus minimus, minor quam vulgaris Narbonensis Gladiolus: floribus concoloribus, minoribus vno versu digestis in pedali gracili caule: foliis item duplò minoribus. Radix Sisyrynchii aut Gladioli parui. Floret in hortis Londinensibus D. Guill. Gais & D. de Franqueville Maio mense. Floris omnino albi Gladioli radices & tamen anno 1601. à D. I. Robino Botanico regio Lutetiæ accepimus. Sata Londini in horto D. de Franqueville viguere.

C. Bauh. Phyt. Gladiolus. 1. vtrinque floridus Matth. Lob. italicus 2. Gladiolus floribus ab vna parte caulis digestis filu. Cordi. Narbon. Lobeli. Item hist. Matth. Gladiolus.

Nascitur Cordo editis, frutetosus & herbosus locis, magis tamen planis nec adeò altis: ac solum amat lutosum, provenit copiosissimè in siluulis frutetosis circa pedem Lanterbergi, quem hodie montem Diui Petri vocant, vno atque altero ab Hala Saxonica miliaribus. Frequens in Hæturia & in comitatu Gositiensi, in pratis & in arvis inter fruges, vnde Segetalis plerisque dicitur, Matthiolo. Passim Montpelii in fegetibus provenit. Florentem vidi mense Aprili, Hanc plantam prius videram in horto Di. Gesneri Tiguri, postea Patavii in horto publico, & Di. Trinesani, & Di. de Musali al. ponte Molini, Venetiis, ac spontè inter Ferrariam & Bonoriam: Lugduni habebam in horto: Genevæ frequens in hortis florens Maio: in Iulii principio reperi copiosè in prato vbi Gratiola & Oenanthe quædam inter Burdigni & Thuri florebat & semen habebat. Montbelgardi habeo in horto Ill. E. C. transplantatam ex hortulo meo, & ex horto Dj. à Morlor senioris: D. Agerio teste, qui plantam siccam dedit, provenit in pratis pallidiore flore, planè albo vidi Sturgard. in horto Ill. C. Wirtemberg.

Nunc Enlis appellati radix dulcis decocta & trita farinæ admixta panem dulcem acque innoxium reddit. Per multas iuxta eam scolopendras reperiunt, teste Theophr. gaudent enim ea herbæ, frequentesque congregantur in ea. Potest ex autoritate Dioscor. superna radix cum vino & chure imposita, spicula & aculeos extrahere. Cum farina verò Liliacea & aqua multa, panos discutit. Vnde eiusmodi emplastris additur. Ducit & menses apposita. Tradunt etiam superiorem radicem cum vino potam, Venerem stimulare: inferiorem verò steriles facere. Quin & supernam radicem cum aqua bibendam commode exhiberi pueris, quibus ex intestinorum hernia, intestina in scrotum delabuntur.

Similes vites ei & Plin. lib. 25. cap. 21. attribuit dicens: Xiphii radices superior pars cum chure trita, æquo pondere, admixto vino, ossa fracta è capite extrahit, aut si quid in corpore suppurat, vel si calcata sint ossa. Et rursus de eadem lib. 26. c. 8. Xiphii radix superior urinam ciet. Infantibus enterocelcis datur ex aqua, & illinitur ve-

hoc vitis. Et rursus c. 70. Appetentiam Veneris facit radix è Xiphio superior, data potui in vino.

Galeo. Gladioli radix, & maximè altera superna, attrahendi, discutiendi, & nimirum sicandi vim habet. Et 8. de facult. simpl. med. Xiphii radix maximè altera quæ superior est, attrahit, digerit, desiccaturque.

IRIS BVLBOSA LATIFOLIA FLORE
cæruleo & candido.



Senà vt plurimum habet folia, longiuscula & latiuscula. Hemerocallidis Dodonæi, siue Liliisphodeli foliis ferè similia, breuiora tamen, alternatim inuicem amplectentia, mollia, in terram prona, supernè ex viridi palientia, infernè verò incana: è quorum medio flos exilit, è membranaeco inuolucro,

vnicus, odoratus, cæruleus [interdum lactei cædoris] nouem foliolis constans, Iridis figurâ, quo marcescente, vtrinque alii singulares succedunt. Nullus est illi *caulis*, sed flos longo duntaxat pediculo insidet, vt in Croco: *radix* bulbosa, candida, Auellana: instar dulcis, multiplici cortice nigricante inuoluta, cui (præsertim dum florèt) aliquot, præter fibras, crassæ, longæ radicula subnascuntur, vt in Hyacinthi radicibus interdum fieri solet.

Huic Clus. Hisp. Iridis latifolia purpure siue cæruleæ cognomen dedit. Hanc Hispani, vel *Lirio* simpliciter, vel *Lirio espannana*, Cordubenses *Lirius azules*, appellant, hoc est, Lirium, ensiforme, & Lirium cæruleum. In Histor. verò post. vbi eadem repetit, Iridem bulbosam, latifoliam, siue primam vocat. In Plant. Icon. pag. 96. Poëtarum Hyacinthus latifolius, Iris bulbosa, Latifolia Hispanica Clusii. L. 50. T. 133.

Inuenitur in Lusitania, Bæticaque collium radicibus, non procul ab Anâ flumine sitis, & copiosè circa Antequeram & Cordubam. In Lusitania porrò Ianuario, in Bætica autem Februario florentem obseruabat Clusius, & eruebat, apud Belgas delata [Cordubâ enim ad amicos Belgas aliquos bulbos mittebat] nondum flores dederat, quem octénio post inde discessit, ad Cæsarem Maximilianum 2. profecturus, idèoque nullum semen obseruare potuit: in illis tamen, quas in Hispania eruebat, stirpibus, infimam partem pediculi, qui primum florem sustinuerat, & inter folia reconditam, in rudimentum longi triangularis capituli definire conspiciebat, multa candida granula continentis: quo argumento adducitur, semen Aprilis aut Maij maturum istic esse posse.

Tom. II.

IRIS BVLBOSA TOTA VIOLACEA
vel cærulea.



Hvic nucleatus bulbos, non minùs altum nobis caulem protulit, quâ Hispanicus Poëtarû Hyacinthus, pluribus vtrunque foliis stipatû, paullo latioribus, insigniter tamen acuminatis, & carinatis; & interna parte membrana candidâ succinctis, foris striatis: flores binos protulit, alterum alteri succedentem;

Descriptio

inferiorem paullo ortu, ex vagina laxiore quàm Hispanicus iam dictus, nouem foliis similiter constantes, sed extrinis repandis multò per omnem dimensionem maioribus, extrema parte fimbriatâ, modicèque fissa, cæruleo-violaceâ, mediâque sui parte, pro villosâ fimbriâ maculam luteam oblongam minorem, quæque non per folii Costam, vt in Hispanico, decurrat, habente, à cuius lateribus Zonula albæ virgatæ exeunt, vbi verò arctari folium incipit, (quamquam interni) altero tantum latius est Hispanico) per Costam totam punctulis cæruleis albidisque guttatum est, extrinsecus autem ferè virelens: hisce tribus totidem superposita sunt putpurocærulea; angustiora quàm in Hispanico, nec vt in illo appressa, sed interuallo satis magno recedentia, bifido nihilominus extremo, quibus sub sunt ligulae, quâ repanda folia spectant, albo purpureoque virgatæ, altera parte violaceæ: tria tandem surriguntur violacea, angustiore ceruice quàm in Hispanico, sed latiore extremitate.

Hanc sic describit nostro iudicio Clus. n. post. Crassiore & latiore folio, ac veluti Cepaceo, viridiore, parte interiore carinato, siue striato, multisque quasi bulbis argenteis resperso: crasso firmoque caule, quem quaterna aut quina folia amplectuntur: binos ex vaginulis, vt plurimum, promit flores inuicem succedentes, interdum vnicum duntaxat, nouem foliis constantem, violacei prorsus & elegantissimi coloris, interdum dilutioris, inodorum tamen, quorum tria maiora sunt, ad terram inclinata & prona, vt in vulgari Iride, & labrorum instar propendunt, tria alia angusta & extrema parte bifida, alaræque iis incumbunt, vique ad luteam maculam [quæ maioribus pro fimbria est] pertingentia, tria alia surrecta, supremæque parte latiuscula, infima verò valdè angusta; floribus succedunt trigona laxaque capita: quibus semen rugosum, fuluescens, Erui magnitudine, quod maturum, in capitibus crepitat, si moueantur: radix magna plurimis membranis renacibus, nigricantibus circumuoluta, intus alba, & sessili parte fibris prædita, quæ singulis annis nucleos circa latera depõnit. hu-

N n n 2

ius folia nouo Vere demum germinant.

Est hæc Clus. Hisp. Iris bulbosa angustifolia purpur. Et hist. poss. Iris bulbosa violacea siue 2.

Lobel. Ic. Pl. p. 94. Hyacinthus flore Iridis Theocriti & Poëtarum, in Anglia proueniens Lobel. 48. Aduers. 47. Teut. 30. Adu. par. 2. Iris bulb. fa Pyrenæa, quæ prouenit in Souton monte, Anglo-Britanica vocata minor, fortè eadem.

Quia verò Lobel. hanc Iridem primus Belgis communicauerat missis ex Anglia aliquot ad amicos bulbis, spontè istic nasci Clusius existimabat & in Angliam profectus anno 1571. frustra in agris & collibus requirebat, donec Bristolium quum venisset, ubi Lobelium conueniebat, ab eo intelligeret, istic primùm illi innotuisse, ex hortis, in quibus colebatur, erutam, vnde Londinum amicis misisset. Verisimile, Hispanicis naibus quæ plerumque Bristolium comeabant, primùm istuc ex Hispaniâ aut Lusitaniâ delatam. Multos post annos eruditiss. vir Io. Venerius, Clusium Exor. app. 2. monebat, hanc plantam maximâ abundantia spontè nasci in Pyrenæi montibus, atque anno à Christi natiuitate 1601. se inter multas myriades earum quæ cæruleum siue violaceum florem gerunt, vnicam plantam reperisse, quæ florem prorsus niueum haberet: anno autem insequente, quum denuò montes illos conscendisset, venustarum plantarum quæ in illis nascuntur conquirendarum causâ, paucas similes reperisse scribebat, quarum vnam Io. Hogelandio, alteram ipsi Clusio mittebat. Ea præter expectationem [nam valde adstricta] anno 1603. binos flores tulit prorsus niui coloris, præter partem maculam flavam, quæ vt in iis quæ violaceum colorem habent, terna repanda folia inficiebat illosque vt violaceos odoris expertes.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. floruit Iunio.

IRIS BVLBOSA VERSICOLOR

πελὺξ ἄνθος.

Descriptio




HABVI (inquit Clusius) anno 1592. plurimas Iridis bulbosæ versicoloris plantas, quæ propter magnam humiditatem, à frequentibus imbribus, feraces fuerunt proferendis amplioribus floribus, binis scilicet, vel ternis: binas, quæ quaternis floribus erant onustæ. Summo, caules

fastigio innati bini ex iisdem vaginis emergentes, quemadmodum in Secundo genere solent, alter alteri succedentes, in nonnullis etiam tertius: Aliæ, præsertim versicolores, latifloræ saturatiore, præter geminos illos flores in summo caule natos, ex singulari vaginâ infra illos sita, & altera sequente, singulares produxerunt ramulos, teretes, geniculatos, sustinentes binas vaginas, è quibus emerferunt singulares flores, primariis non

minus elegantes, & perinde odorati. Habui etiam anno 97. multas Iridis bulbosæ plantas, quæ quaternos flores tulerunt.

IRIS BVLBOSA, CÆRVLEO & albo Verticolor.



RAdix huic bulbosa, adnatis bulbis subinde se propagans, colore albo: caulem tollit ad cubitum vnum & dimidium, rectum, geniculatum, teretem, cui folia adnascuntur, caninata, pellucida, argentea membranula intrinsecus obuelata, extrinsecus colore cævio

striato, quorum latera cis fastigium, quod perquam acuminatum vix dimidii cūmi latitudine est nonnunquam, coalescunt: flos ex vagina glauca emicans, pediculo canalicularato insidet amoenus, novem foliis Iridum more constans, quorum tria surriguntur, non tamen capitibus cōiuncta, sed modicè distita, colore, dilutè cærulea: his totidem alternatim intericiuntur repanda, quorum costa per longitudinem discurrens ex luteo viret (basis verò tum horum tum præcedentium lutea est,) extremamque partem, quæ latior & ferè rotundata, magisque teretiusculis reflexa, albam possident, locoque supercillii amula fimbria, crocea decurrit Zona ad ipsius vsque folii cum pediculo commissuram, à cuius lateribus interna parte oblique lineæ purpurascens excurrunt: atque hisce quidem tribus totidem incumbunt folia, ex albo cærulea, exactè zonam cum virgatis lateribus obtegentia, eousque donec repanda folia dilatarî incipiant, ibi verò zonæ luteæ finem denudantia, bifida extremitate, introsum reflectuntur, quibus subsunt singulis singulæ occultatæ ligulæ, quæ repanda folia spectant lutea: quæ verò postrema hæc, albida.

Hanc ni fallimur, sic tradit Clusius: Ei quinque aut sex sunt folia angusta & tenuia, cubitalis longitudinis, internâ parte striata & candicante, externâ autem rugosa, viridis cum cineraceo cōmixti coloris, caulem amplexantia cubitalem, interdum etiam maiorem, nodosum, vnicum plerumque florem, rarò binos, è membranaceis vaginulis proferentem, Iridis angustifoliæ floribus forma similem, &c.

Tertiam hanc Iridem Clus. in Hispan. bulbosam angustifoliam flore vario Hisp. Lirio Illyric. In post. verò Historia, Iridem bulbosam tertiam siue versicolorem appellat. Plant. icon. p. 95. Hispanicus Poëtarum Hyacinthus. Iris bulbosa angustifolia flore vario Clusii, Lob. 48. Teut. 30.

Copiosam habeo in horto Ill. E. C. Montbelgardi,

gardi, habetur etiam Stutgardiae: florēt Iunio: eādem attulit Gener Romā ex hortō ill. legatī Hiſpani, à Coruino Belga eiufdem Pharmacopoeo experientiſſi ſicuti alia plura. Sapiens nobis prouenit ex ſemine ſato primo annō vitium proficiens ſorem.

IRIS BVLBOSA LVTEA.

Verſicolori per omnia ferē ſi nilis (inquit Cluſius Hiſp.) Iris bulbōſa anguſtifoſia luteo flore, cui à ſloris colore, flauæ, ſive luteæ cognomen indidi, quāque Luſitani *Reyllabues*, vocabāt: In poſt. verō Hiſt. Iris bulbōſa 4. ſive lutea: breuiore tamen eſt caule, gracilioribūque & ex viridi pallescentibus foliis: ſlos vnicus interdum binis, cōtractiores, latiores tamen, ex vaginulis ſummo cauli

inhærentibus prædeunt, lutei coloris, inodori, mediæ inter ſecundum & tertium genus magnitudinis, quemadmodum & ſitiquæ, ſeu caput trigonum, in quo ſemen ſuperiori ſimile continetur: radix tertii generis radici ſimilis, quæ nucleis, non ſecus ac illa, propagatur. Sed hæc in flore quandam etiam differentiam habet, licet exiguam: nam inuenitur latiore aliquantulum, ſaturatioreque & magis rutilante aureo colore, radice item breuiore, & craſſiore, membranacea præterea illa vagina, vnde primum folia emergunt, ſanguineo colore, à ſummis vaginæ oris in inferiorem illius partem radiatim deſinentem, magis infecta eſt, quā illius, quæ dilutiore eſt flauo colore: nam illa interdum ſanguineo hoc colore caret. Vtriuſque autem, quemadmodum & Tertiar, folia ante hiemem germinare ſolent.

Obel. Icon. Pl. Hyacinthus Poëtarum luteus, Lob. 49. T. 132. Cuius in par. 2. Adū. aliquot tradit ſpecies.

Nasçitur (inquit Cluſius) pingui ſolo, & petroſis collibus ad Tagum ſitus, ſupra Olyſſipponem, vbi eam eruebam Decembri Anno 1564. cū aliquot aliis rariſſimis ſtirpibus, & inde ad amicos in Belgium mittebam. Florēt tamen paulo maturius Tertio genere, eodem ferē quo ſecundum tempore: breui tamen fe mutuo conſequantur, & interdum ſimul florere conſpiciuntur.

IRIS BVLBOSA CÆRVLEA LVSTANICA.

Quinta (inquit Cluſius) Iris bulbōſa, mihi primum conſpecta Lugduni Batavorum. Nihil verò ea differt caule ſoliis, & forma ſloris,

ab Iride bulbōſa, cuius ſlores verſicolores, ſolius ſloris color diuerſus eſt. Nam nouem, vt ille, ſolius conſtat, quorū terna inflexa & terram ſpectantia, cæruleū habent colorem, venis ſaturatioribus à mediō folio, in latera excurrentibus diſtinctum, & ab illo ad vnguem vſque, maculā flauam ſatis latam; mediū folium per longitudinem ſecantem: terna illis incumbentia & gibboſa eiufdem etiam coloris, paulo tamen vntioris: tria ſurrecta folia magis ſatura, odor panē ſlorum Tiliæ: binos autem, ternōſue in eodem caule fert ſlores, qui reliquarum Iridum bulbōſarum ſloribus magis ſunt ſerotini, iſſque marcidis demum apertuntur ſub initium Iunii. Floribus ſuccedunt triangula oblonga capita, vt in verſicolore Iride bulbōſa. E Luſitania porro hoc Iridis bulbōſæ genus, paucos ante annos; primum in Belgicū deſertur. Sequente autem anno, è tribus bulbis ab amico acceptis, vnus ſlorem longē elegantiorē iam deſerpto protulit, amplioribus labris nempe conſtantem, tribuſque foliis ſurrectis latioribus, gibbis etiam amplioribus, totūque ad eō ſlorem multa ſaturatiore purpurā nitentem, & magis expanſam, idem tamen qui in altero odor: caulis præterea circum nodos, quibus folia inhærebant, ex purpurā nigricabat. Hæc quā mihi ſpontē naſcens non ſit obſeruata, nullum nomen vulgare intellexi ſed qui hortorum cultū delectantur Batavi, Luſitanicę cognomen dederant. Omniū porro iſtarum ſlorib, illius præſertimque vario eſt ſlore (quia vt opinatur Cluſius, reſcidum quēdam ſuccum in lateribus exſudant) formicæ mirum in modum ſunt infeſta. Præterea omnium iſtarum, tam illarū quarū n mentionem fecimus, quā ſubſequentium, ſlores marceſcere iā incipientes, hanc peculiarem notam habent, quod mſuorum vngium inſtar contrahantur: quod etiam aliorum Iridis generum ſloribus euenit.

IRIDIS VERSICOLORIS CLASSIS

2. Cluſio.

Sunt, auctore Cluſio, aliæ Iridis bulbōſæ ſpecies non eæ quidem aliunde inuencæ, ſed ſemine apud Belgas natæ, quarum hiſtoria prætermittenda non videtur, eamque ob cauſam, ſuperioribus ſubnectendam eſſe exiſtimaui.

Prima igitur verſicoloris quoddam genus eſt, à ſuperioribus diuerſum non ſolis, caule, aut radice, his enim cum Tertio aut Quarto genere conuenit, ſed ſloris colore: quia tria eius folia ad terram inclinata, ſive labra, flaua ſunt, & Quarti generis foliis propendentibus liliorum inſtar terē ſimili, magnā tamen aureā maculā in prominente & reflexo labro inſignita, ad quam infimo folii vngue intuiſecus excurrunt aliquot venæ quodammodò purpuraſcentes: tria autem gibba & illis incumbentia, dorſo & alis pallent, lateribus candicant: tria verò ſurſum erecta, ex albo ſubcærulea ſunt, hoc eſt, albicantis ſunt coloris, quem ſubcæruleæ ſaturatioreſ vel dilutioreſ vene diſtingunt.

Alterius terna inflexa folia pallent, & labrum habent flaua maculā inſignitum, a qua ad vngue vſque anguſtiora ſunt, vt in cæteris generibus, & internē quibuſdam venulis purpuraſcentibus diſtincta ſunt: tria gibba folia ligulam regentia & cærulea ſunt coloris, vel albicant, ſummo tamē

gibbo pallefcence : terna furrecta exalbida funt, neruus tamen per longitudinem excurrrens flauelcit. Vtriufque flores odorati , Tertij generis fupra defcripti florum inftar: radix etiam non minus quàm in illo fecunda producendis nucleis. Illas habui munere Ioh. Boiffor anno 1586. quadriennio verò pòft, tres alias communicabat, quæ in fequente anno hos flores prorulerunt.

Prior quæ erit illius Tertium genus ab ipfo acceptum, latiore, breuioreque fuit flore, cuius terna inflexa folia, lato & propendente funt labro, mediâ aureâ maculâ (quam albus orbis amittit) insignito, per oras crispo, cærulei coloris, à maculâ autem vique ad vnguem folij, extenditur neruus extrinfecus virefcens, intrinfecus pallidus, multis purpureis venis in latera excurrentibus, tria gibba, alataque folia purpurafcentis funt coloris, gibbus albicans, alæ cæruleæ, tria fursum erecta folia, ex cæruleo purpurafcunt.

Alterâ, siue eius Quarta, florem habuit, cuius terna folia terram fpectantis, flaua funt coloris, aurea maculâ labrum occupante, à quo ad infimos vngues: interiore parte fpatie funt quedam venæ dilutiùs purpurafcentes: folia iis incumbencia exalbida funt, præter medium neruum ad extremum folium excurrentem & gibbum, qui pallidi funt coloris, furrecta terna folia, infimâ parte ex cæruleo purpurafcentibus venis funt diftincta, lupernâ candicant.

Tertia siue Boiffori Quinta floris, terna incurua siue inflexa folia, protius lactei candoris fuerunt, præter maculam illam medio labro impreffam, quæ antea coloris erat: gibba præterea folia illis incumbencia, alba fuerunt, vt & terna erecta, cæceptâ illâ infimâ parte circa vngues, quæ tenuè quidpiam fubcæruleum habere vifa eft. Odorati etiam hi flores erant. Ex cuius generis femine natæ funt hæ varietates, nihil ad me perfcipsum, nec forfitan quifpiam tam exactè obferuauit: odor tamen qualis in Verficoloris illâ in Tertio genere fuprà defcriptâ, me in fufpicionem adducit, ex illo originem lumpfiffe.

IRIDIS BVLBOSÆ VERSICOLORIS claffis tertia Clufio.

QVas [inquit Clufius] Irides bulbosas prime Flauæ-Variæ à Boiffoto primum mihi miffæ, æmine ego nactus sum anno 1590. duobusque illum fequentibus, fubiiciam.

Vna, quam F-V. hoc eft Flauam-Variam maiorem, & omnium elegantiffimam meritò appellare poffum, caulem non minus altum habet, quàm Tertium illud genus verficoloris flore à me tertio loco defcriptum, videlicet cubitalem aut ampliorem, folia latiora & breuiora, media ferè inter illius & Secundi generis folia, florem maiusculum, cuius terna folia inflexa & terram fpectantia lutei funt coloris, & aureâ maculâ in medio labro infinguntur, oris quodammodo purpurafcentibus anguftiore foliorum parte quæ gibbo integitur, intrinfecus multis fubpurpureis venis in latera excurrentibus notata: gibba & incumbencia folia diluto purpureo colore funt prædita: tria erecta valdè faturâ purpurâ nitent, & quafi violacea funt, præfertim medius per longitudinem extenfus neruus.

Alterâ etiam F-V. & latiflora, sed paulò hu-

milior terna ad terram inflexa folia flaua coloris habet, aureâ maculâ infingita, à quâ, ad infimum folij vnguem, multis purpurafcentibus venis interiore parte funt diftincta: gibba folia quodammodo purpurafcunt, neruum tamen fubflauum habent: tria folia erecta, purpurei funt coloris.

Tertia F-V. floris forma eadem, & terna illa folia inflexa flaua coloris, aureâ maculâ infinguntur, quâ verò parte bifidis & gibbosis illis foliis integuntur, radiis obfoletè purpurafcentibus diftincta funt: furrecta terna folia ex cæruleo purpurafcunt, medius autem per longitudinem excurrrens neruus flauelcentis eft coloris, & tria aliis incumbencia, obfoleti, cui flaua quidpiam permiftum eft.

F-V. Quarta, etiam latiflora, terna inflexa folia pallida habet, aureâ maculâ infingita, quâ autem parte camerato folio integuntur, purpurafcentibus venis funt diftincta: gibba folia, etiam purpurafcunt: tria verò erectiora folia, cæruleum habent colorem.

Quinta F-V. quæ anguftiflora eft, tria ad terram fpectantia folia, flaua funt, aureâ etiam maculâ medio labro infingita, & incumbencia illis folia candicant, neruus tamen eminentior quodammodo *ἀρχιάνθος*: fursum affurgencia folia exalbida funt, imâ parte fubcæruleis quibusdam venis leuiter diftincta.

Sexta F-V. etiam anguftiflora, & humilior, non valdè abfimilem matri, hoc eft, Primæ à Boiffoto miffæ, habuit florem: sed quibusdam notis fecundè ab ipfo acceptæ respondentem, vt media quedam fpecies inter vtramque cenferi poffit.

Latiflora eft, & elatior Septima F-V. cuius inflexa folia habent latiora labra, flaua coloris, aureâ maculâ infingita, quâ verò parte gibbis foliis integuntur, ad vnguem vique, interius ex cæruleo purpurafcunt: gibba & alata folia etiam purpurafcentis funt coloris, gibbo tamen dilutiore: furrecta folia latiuscula funt, & illis magis purpurafcunt, cæruleique quidpiam admixtum habere videntur.

Humilior, latiflora tamen, eft Octaua F-V. cui terna terram fpectantia folia flaua funt, aureâ maculâ maiusculâ notata, internâ parte quæ cameratis bifidisque foliis tegitur, purpurafcentibus radiis in latera excurrentibus diftincta: gibba cristataque folia, purpurei cæruleo comixti funt coloris, ipfo gibbo ex purpura flauelcente; erectiora folia, cærulei purpure permixti funt coloris.

Anguftiflora, sed humilior etiam, eft Nona F-V. cuius trium foliorum, terram fpectantium labra longiora funt & pallida, orifque aliquantulum purpurafcentibus maculâ aureâ longiore infingita, reliquâ parte bifidis foliis rectâ, internè purpurafcente, præter medium neruum qui aurei eft coloris, foris ex viridi pallefcantis: gibba cum fuis cristatis foliis, purpurea, gibbus paulò dilutior: furrecta terna folia, purpurâ faturatione nitent.

Decima cuiusdem ferè altitudinis eft cum fupiore, cuiusque terna folia ad terram prona, pallefcence funt labro, breui flauâ maculâ in longos radios definente infecto, anguftior folij pars foris virefcens, internè viridibus venis prædita: alata & bifida folia, exalbida funt, ad *ἀρχιάνθος* colorem tendentia, gibbus pallefcens; terna folia quæ fursum attolluntur, alba funt, medio neruo circa vnguem pallefcence.

Vndecima, eadem quidem forma, sed diffinis prorsus color: nam terna inflexa folia alba sunt, flaua tamen maculâ insignita: gibba his incumbens, purpurascunt: tria, sursum erecta purpurei, seu violacei sunt coloris: breuiter non minus ab similibus est Angustifoliae versicolori satuta, in prima classe.

Media quodammodo inter Latifloram & Angustifloram est Duodecima, eaque elatior, labris eorum foliorum terream spectantium ex albo purpurascens, aureâ maculâ notatis, quæ medium etiam folium per longitudinem secans, ad infimum vsque vnguem angustior protenditur, eius latorem interius saturatioribus venis purpureis distincta: folia cristata & bifida illis incumbens, diluti purpurei, & quasi ad rubedinem edentis sunt coloris, gibbo paulo magis saturo: similibus panem coloris sunt surrecta folia, eorum tamen, vngues aliquantulum saturatiores. Istarum porro omnium flores odorati sunt, & Terti generis floribus versicoloribus odoris gratia respondent.

Et hæc quidem summa sunt differentia: Iridum bulbosâ radice præditarum, quæ mihi semine F. V. primæ Boissiori nate: aliæ tamen etiam nate, sed quarum colores proximè ad istarum colorè accederent: propterea minimè huc inferendas putauim.

Illud præterea in istarum Iridum plantis semine natis obseruabam, plurimarum vaginam illam initio emergentem, quæ ut in primo descriptis exeunt folia, rubri siue languinei coloris radiis esse affectam, non secus ac Quarti generis primæ speciei in prima Classe vaginulam.

Sed & Decimum tertium genus semine mihi natum, quod florem demum tulit anno 1594, quadriennio videlicet postquam semen telluri creditum. Cubitali verò assurgit caule, nodoso & geniculato, instar aliarum Iridum huius generis, quem ambiunt longa & angusta folia, carinata ut in superioribus reliquis: humilis caulis sustinet florem reliquis forâ similem & nouem foliis constantem, sed colore diuersum: nam terna maiora labro propendete prorsus cærulea sunt, tumentem maculâ aurei coloris à medio labro ad infimum folii vnguem discreta, his incumbens, fornicataque & alata folia saturæ purpuræ colore sunt, ligulâque, tegut, terna surrecta, oblonga, angusta, saturæ purpuræ (cui rubedo levis admixta) nitent: odor tenuis, nec ad eas quæ versicolore sunt flore suauitate accedens: capitula trigona longaque instar capitum versicoloris, quæ tamen nullum semen tulerunt: radix bulbosâ vel reliquarum Iridum bulbosarum, plurisque nucleos ad latera generans. Floruit primo anno circiter quindecim dies ante illas quæ cæruleæ & flauæ sunt flore: altero cum iisdem, Iunio videlicet. Huic prorsus similem Hispani accipiebant anno 1596. ab eruditiss. viro D. Simeone de Tovar Hispanensi Medico, ut ex eius flore, quem insequentis anni Maio dedit, obseruare potui: ante vñ semine ipsi nata esset, aut aliunde missa, nihil adscriberebat.

Superioribus annis ut antè dictum est, in Flauæ Iridis bulbosæ semine natis plantis nullam varietatem obseruaueram: at anno 1597. cum in hæc, tum aliis insignem varietatem habui. Nam anno 1593. scorsim in diuersis puluinis Flauæ, Albæ, F. versicoloris semina terræ commisi sub finē Nouembris: nata ex iis plantæ nec loco motæ, quarto post anno flores prorulerunt: ex Flaua quidem, aut flauos prorsus, aut flauos quorum

surrecta folia aut pallesbant aut exalbida, vel cærulea erant, vel fuligine infecta cum fornicatis foliis: ex F. versicolore autè, flauos, flauos item quorum surrecta folia alba erant, vel initio labra habentes flaua aureâ maculâ, insignita, deinde flauus ille color maculam ambiens cæruleum colorem prorsus contraxit, folia fornicata & surrecta saturæ purpuræ nituerunt: vel etiam alios illis per similes, quorum tamen flaua labra oras auream maculam ambientes, habuerunt: versantis ex cæruleo coloris, & alios matri similes: ex Alba verò pallidos, surrecta folia alba aut exalbida habentes, aut ex cæruleo purpurea, aut matri propemodum similes. Quam varietatem produciunt reliquæ plantæ illis seminibus nate, indicabit dies.

Idem Exot. par. 2. App. 2. ait. Cæterum ex Epistola quam ad me dabat Venerius illo ipso anno quo Iridem illam niteo florè mittebat, varia alia Iridi bulbosarum genere ab ipso in Pyrenæis montibus obseruata fuisse intelligebam: quæ scripto comprehenderat, ut ad me mitteret exactam earum plantarum descriptionem: Verum, dum in variis illorum montium iugis, quæ panem sexagena conscendit, perlustrandis erat occupatus, scriptum illud ipsi excidisse & periisse magno cum suo dolore: se enim non probè quænam inter illa esset differentia meminisse, ceterò tamen se scire, viginti sex generum descriptionem fecisse: eam autem Iridem quæ flauum aut rubrum habet florem, in earum numero non comprehendi, quoniâ in illis montibus nullam similis coloris reperit.

legens Iridem bulbosam varietatem in Pyrenæis montibus.

IRIDES BVLBOSÆ ET ALBÆ.

Miro colorum incremento bulbosæ Lobelii Adu. par. 2. Irides, sat non secus ac Tulipæ præcoces satæ, semineque ortæ, albæ potissimum, variant, quæ insigni metamorphosi, colorum varias subeunt differentias: In bulbo alioquin folio, caule, cæterisque plantæ partibus discriminis persequimur. Has differentias alunt cultiora D. Joh. de Franqueville nostræque vireta.

De Iridum bulbosarum viribus nihil comperit habet, aut ab aliis traditum accepit Cluius.

SISYRINCHIVM VETERIDVS.

CAP. XVI.

ET hoc quodammodo Theoph. aut l. 7. c. 12. de Hist. Plant. ad bulborum genus redigi desiderat, quod radice orbiculetur. Nam colore quidè penitus discrepat, candet enim, nec squamis constat. Huic peculiare datum est, ut ima { vna, Gaza legit } radix primò augeatur. Hieme, tam ineunte Vere, quod in imo excreuerit, contrahatur, supernumque crescat quod manditur. Radix (ut idem inquit de caus.) ut reliquarum generis eiusdem, dulcis est, partes verò superiores ex causa siccitatis insuaves & propemodum insipidae.


Post Theophrast. inter genera bulborum, quæ Græci fecere, Plin. l. 19. c. 5. Sisyrinchion numerat: perhibens, mirum imas Sisyrinchii radices crescere Hyeme: Vere autem, cum apparuerit Viola, minui & contrahi, tum deinde bulbum pinguescere.

Descriptio

IRIDI BVLBOSÆ AFFINE

Sisyrinchium maius.

Descriptio



Irides bulbosas proximè, line controuersa, subsequi debet planta quædam flore Xyridis, minore tamen, & orbiculata, vt Xiphium, cuius duo genera in Hisp. peregrinatione à Clusio obseruata, Maius & Minus. s

Maius sic describit: oblongis angustisque foliis, mollioribus quàm Iridis bulbosæ folia,

& ad Allii aut Hyacinthi botryodis folia proximè accedentibus, striatis, viridibus, & humi plerumque fufis: rotundo, dodrantali, striato, firmoque caule: qui ex multis inuolucris tanquam è vaginulis, flores promit quatuor aut quinque, alternatim prodeuntes, hoc est, vt primo marcescente alter succedat, deinde tertius, & sic deinceps, Xyridis potiùs florem referentes, quàm Iridis, ex nouem foliis compositis, quorum tria vt in iam descriptis Iridibus bulbosis, deorsum inflexa, pro fimbriâ, luteam maculam etiam habent: alia tria sursum aliquantulum attolluntur: tria vero reliqua, quæ in aliis ligulam tegere solent, surrecta, summa parte diuisa & bifida. Est verò totus flos pulcher aspectu, coloris cærulei, præter maculas illas, & odore quidem præditus, sed valde fugax: floribus succedunt folliculi, vaginis quibusdam cutaceis inclusi, ad eò tenui membranâ constantes, vt semen rotundum, paruum, subrufum, quod in illis continetur conspici possit: radix bulbosa, gemina, planta ipsa florente, & altera alteri insidens Xiphii modo, superior, plena, candida dulcis, edulis, & pueris expetita, inferior [flaccida totam nimirum substantiam ad se trahente superiore, vt in Croco Xiphio,] & tandem euanescens cum inhzrentibus fibris: multiplici verò cortice reticulato, crasso, nigro integitur, Xiphii radices instar, & adnatis sese propagat: nam quinas, interdum etiam senas, aut plures plantas quarum singuli bulbi suo retiformi tegmine inuoluti erant, alio villosio capacioreque tegumeto simul compressas erueremini, in collum supra urbem Olyssiponem accliuatibus, apud suburbanum Magni. & Gen. viri Ferdinandi Corinho, equitis Lusitani, multis peregrinationibus in exterarum regiones factis, clari: atque etiam Gadibus, non procul à ponte, qui eam insulam continenti nunc coniungit: vnde eius bulbos in Belgium ad amicos mittebam.

Clus. Hisp. & hist. post. Sisyrinchion maius, Lusitani Nozelhas (quasi Nucleas siue paruas nucas) appellant, quod pueri istic eius bulbo perinde atque Auellanis vescantur, & in delitiis habeant. Plant. ic. p. 77. Sisyrinchium Cordi & Clusii

Lob. 50. T. 133. Sisyrinchium Cordi nobis, & bulbis silu. Fuchii.

Floret verumque genus Martio, natali solo: sed Te apud Belgas Maio duntaxat: interdum etiam Iunii initio, idque valde rarò, vt pote quod alternis vtplurimum annis, duntaxat prodire soleat, imò paulatim plerumque contabescens, prorsus tandem sæpenuero pereat.

IRIDI BVLBOSÆ AFFINE

Sisyrinchium minus.



SIMILE
Sest (inquit Clusius) præcedenti, minus tamè, gracilioribusque foliis: flores è vaginulis prodeuntes, colore superioris floribus similes, sed magis odorati, tenuiores etiam folliculi minore & exiliore semine pleni: radix item minor, non minùs tamen, quam superioris, reticulato cortice testâ, & gemina.

Sisyrinchium minus, seu genus alterum, quod Hisp. Lirio, nonnullis Maçucas dicitur, ad eum bulbum accedere videtur quem Theoph. l. 7. cap. hist. nouel, xior vel nouel, xior cognominauit. Crescit Valentino Hispaniæ regno, sed Murciano frequentissimum obseruabat atque eruebat Clusius, præsertim tribus leucis supra eius regni Metropolim, Murcia vulgò appellatam, quæ Vereribus Murgis, dicebatur, itinere Granatensi.

Ad ventris tormina (inquit Clusius) vtile esse referebant incolæ: sed deuorata radice, illico corpus saltatione esse exercendum.

FLOS PERSICVS SISYRINCHIO
congener.

Floris Persici [inquit Clusius Hist. post.] supremam caulis partem cum flore suis coloribus duntaxat expressam, anno 1594. Pragâ accipiebam ab Efaia le Gillon, meo fororis filio: pulcherrimus, summo cauli satis gracili & virecenti innitens, & ex membranaceo inuolucro instar folliculorum, qui Iridum flores ambiunt, emergens, tribus tantum foliis (si picturæ fides est adhibenda) constans, mucronatis, binas uncias longis, minimum digitum latis, dorso elatiore, cærulei coloris ad eò elegantis. vt cum centiarella cæruleis floribus contendere possit: inter nâ parte ramosa quædam stamina in multas tenues fibras secta continere videtur rufi coloris, apicibus verò albis: infra illum addita erat alterius floris gemma suo membranaceo folliculo etiam inuoluta. Expressa autem fuerat hæc icon Constantinopoli à pictore industrio, de alterâ, quam

quam pictor quidam Persicus ē Persia attulerat, ubi nasci, & *baie* vocari asserbat. Constantinopolis verò esse ignotam hanc plantam. *Bale* porro, Turcis florem significare, antè dicere memini.

IRIS VULGARIS VIOLACEA SIVE
purpurea hortensis & siluestris.

Iris hortis nostris vulgarissima, radice per obliquum agitur crassa, rugosa, gustu acris consumproque superfluo humore tandem odorata: caules cubitales & sesquicubitales, ramosi, teretes: folia vnciam lata aut latiora, rigida, striata, in culcratum mucronem aut gladii exeuntia: flores amœni, violacei, tribus foliis repandis, per oras infimas albo violaceoque variegatis, Costa interius ad medium vsque folium crocatis apicibus villosa: totidem surrectis, obtusis mucronibus, & ferè rotundis, carinata inclinatione coeuntibus: intra quæ tria longè prædictis sex minora, dilutiora viola tincta, in summo filia, quibus posticâ parte totidem concolores fibræ, albicantibus apicibus apprimuntur.

Quandoquidem Cordus in Hist. sua nobis diligentissimè viderit Iridem vulgarem descripsisse, lubet eius descriptionem ubiungere, qui ait: Iris quæ apud nos in hortis, vineis ac murorum coronis fertur, ab vno capite plura & erecta erigit cubito longiora filia, dura digitorum latitudine, recti uenia, inferius in radicem capitibus coniuncta, ceu ex omnibus vnum fiat, & sibi in uicem inserta, singulorum a-



perto & inciso ventre ceu carina alterius dorsum excipiente, superius verò alæ modo in latitudinem explicita, & in mucronem gladii figurâ desinentia: è quorum medio caulis assurgit sesquicubitalis, rectus, teres, & glaber, veluti cinereo polline conspersus, facillè abstergentibus cedente, quinque aut sex geniculis interseptus, ex quibus singula exeunt sine pediculo caulem amplectentia folia, inferioribus eò minora, quò summitati propinquiora: flores in summitate post medium Veris per interualla erumpunt, primum conuolutis in turbinem membranâ, paulatim se in nouem folia explicantibus: ex his tria inferiora digitali sunt longitudine, circa exortum angusta, reliqua sui parte vncia multò latiora, deorsum inflexæ linguæ figura, foris liuidi coloris in cinereo, & iuxta principium viridia, intus verò purpurea, latis & lacteis venis se violaceo splendore miscentibus, maximè ubi versus exortum gracilescent: adheret iis in interiori sinu inferius lutei coloris & in longitudinem exportrecta lanugo, oblongis pilis, hirsutæ campæ

aliquam similitudinem referens: in summa totum folium Iridis omnes colores representat, unde nomen inuenit, lanuginem cuiusque folii aliud paruum obteggit folium, in summitate in duas partes dissectum, ab utroque latere herbacei coloris, in medio liuido extante dorso: reliqua tria folia, & ipsa linguæ aut cochlearis formam habent, prius tamen latiora, & paullo breuiora existunt: & quemadmodum illa deorsum incuruata ascendunt, sic hæc sursum versus reflexa iunguntur: color his est utrinque in cinereo liuidus, quæ verò prioribus alterno politu adnectuntur purpuræ maculæ luteo colori insperguntur: durat ferè octiduum flos, deinde contrahitur, exciditur & decidit, inferius oblongum, ac sexangularem folliculum relinquens, intus in tria loculamenta interseptum, in quibus rotunda sunt & oblonga semina. Radicibus nititur multis, inuicem in latitudinem sibi adnatis, dum digitorum crassitudine, geniculatis, in transversum striatis, per superficiem terræ sparsis, foliis modicè in flauo rubentibus, intus autem candidis, ex inferiori parte longas tenuisque fibras in terram agentibus, ex his aliquot, quæ adhuc nascuntur lutei coloris in fine aut capite existunt: grauitate tota herba, ut sambucus ferè, dum teritur, spirat, præsertim radix, quæ etiam gustata, cognidii modo fauces exurit.

Siluestris Iris, inquit idem Cordus, satiuæ similis est, paucisque notis a satiuâ distinguitur, sicut minoribus & hyeme prorsus non apparentibus, cum satiuæ folia hyemis sequæ tunc cetera resistent: eandem etiam quæ in satiuâ breuiorem fert, è quo flores ferè viginti diebus ante satiuæ flores erumpunt, colore magis purpureo, quibus defluentibus, pollicari quantitate succedunt folioli, sex lineis concavis in longitudinem striati, in maturitate tribus commissuris se apertientes, rotundo & cartilagineo semine pleni. Radicem habet digitali crassitudine, dodrante breuiorem, geniculatam, transversam à posteriore parte, singulis annis putredine tantum ferè amittentem, quantum ab anteriori parte æstatis capiti restituitur, nec satiuæ in modum densum caespitem constituentem. Sapore & odore atque aliis qualitatibus satiuæ respondet. Nascitur editis & cliuosis locis inter arbuta: Liliū Scheyder hense bey hâfhet / quod omnium primò floret.

*trih. Syluæ
Iris Cordo.*

DE IRIDE VETERVM SENTENTIÆ.

Iris [Consecratrix] Theophrast. passim ita delineante, odoratam adeptam radicem: folium non ut Gladiolus, sed harundinaceum potiùs. Odorata autem radicis rationem calori in terra concluso imputare debemus. Verùm neque limosam, neque pinguem, neque lentam, glutinosamque terram esse oportet. Hac enim de causa Iris melior in Illyride, quàm in Macedonia est: in Thracia verò, ceterisque frigidioribus locis, ac minùs coctioni idoneis, odore penitus caret. Ager enim præpinguis, & humor multus & hyems vehemens prohibent. Tepidis tamen atque gracilibus minùs odorata creatur propter molliem aëris. Floret & Consecratrix (Iris) æstate, & Lauaria dicta, flos aspectu pulcher, sed caret odore. Odoratorum igitur (quibus ad vnguenta vtuntur) in Europa, ut tractu frigido, nullum præter Irin inuenieris, quæ tamen optima apud Illyricos exit: non quidem parte mari-

*Iris illyrica
catur melior,
Macedonica.
Inodora &
bi.*

Illyridi.

tima, sed mediterranea, magisque ad Septentrionem sita. Verum loci à locis differunt, ita ut producere meliorem possint. Non immeritò sanè ni reuerentia præstaret Nos in Theophrastum inueheremur, In Europa namque multa odorata proueniunt, Nardus Celtica, Phu, Asfarum, & alia quæ hic recensere non statuimus. Finis Theoph. Gustus nullus ei accommodatur nisi quod ablaqueatam soleant rescicare: radicula enim quas Thracia fert, vidilicet quæ odore Nardo similes, & alia quædam paruam exilemque odoris gratiam habent. Virides enim aut nihil olent aut non æquè: siccata nimirum redolent ut Iridis radix.

Illa quoque non omittenda differentia est [inquit Plinius lib. 21. c. 7.] odoramentorum multa nihil pertinere ad coronamenta: ut Irim atque Saliuncam, quamquam nobilissimi odoris vtramque. Sed Iris radice tantum commendatur vnguentis & medicine nascens. Laudatissima in Illyrico. Et ibi quoque non in maritimis, sed in syluestribus Drilonis & Naronæ. Proxima in Macedonia longissima hæc & candida, & exilis. Tertium locum habet Africana, amplissima inter omnes, gustuque amarissima. Illyrica quoque duorum generum est, Raphanitis à similitudine, quæ & melior. Rhizotomos subrusa. Optima, quæ sternutamenta tractu (falsò legitur pro tractu iuxta veteris manuscriptorum codicis fidem Cornar.) mouet. Caulum habet, cubitalem, erectum. Floret diuersi coloris specie, sicut arcus cælestis, vnde & nomen. Non improbat & Pisidica. Et fossuri tribus ante mensibus multa aqua circumfusa, hoc veluti placamentum terræ bladiuntur, circumscripta mucrone gladii orbe triplici: & cum legerint eam, protinus in caelum attollunt. Natura est feruens, tractataque pustillas ambusti modo facit. Præcipitur ante omnia ut casti legant. Terebines non sicca modo verum & in terra celerrimè sentit. Optimum antea Irimum Leucade & Elide ferebatur: iam pridem enim & feritur, nunc è Pamphylia. Sed Cilicium maximè laudatur atque Septentrionale.

Diosc. qui vnus duntaxat Iridis meminit, sic de ea differit: Iris à similitudine arcus cælestis nomen habet. Folia profert similia Gladioli, maiora tamen & latiora ac pinguiora: Flores in caule aequaliter se distant, citos, incertos, varios. Aut (hic legitur Attico more pro Lac.) enim albi, aut pallidi (αχα Fuch. vertit virides quam benè iudicent alii) aut melini aut purpurei, aut cærulei conspiciuntur. Vnde ob varietatem cælesti Iridi assimilati sunt. Radices subsunt geniculatæ, solidæ, odoratæ, quas post sectionem in vmbra siccatas, & filo transmissa reponere oportet. Est autem melior Illyrica & Macedonica: & inter has optima est, quæ densam radicem habet, & aliquantulum obrusam & ægrè fragilem, & colore subfuluam: & quæ valde odorata est, & gustu amarior, & odore sincera, & non situm redolens: & quæ dum tunditur sternutationes mouet. At Africana colore alba, ad gustum amara, facultate secunda est. In vetustate verò terebines sentiunt, odoratiore tamen tunc sunt.

Matth. & Amatus scripserunt, se tum Antiquorum tum Recentiorum reperisse neminem, qui in simplicium medicamentorum libris, Iridis Astragalitis meminere, idè quid certi hac de re proferendum, se non habere.

Cæterum Gal. lib. 1. de comp. med. sec. locos d. 1. ex Sorano transcribens meminit Iridis, quæ cognomine Altragalitis dicitur.

Alibi quoque [lib. 10. & post eum Marcellus Medicus mentionem facit Iridis Chalcædoniæ & alio loco Iridis Illyricæ. Idem lib. 5. simpl. c. 2.]

Iris Græcum nomen (inquit Cornar.) apud Latinos retinuit, nostri ab odore *Violwurzg* vocant, vulgus Herbariorum Liliū cælestē, à colorum varietate quæ in floribus conspiciuntur, appellat. Sed quam idem vulgus intea Iris & Ireos distinctionem facit, iuxta vulgatum versum: Iris purpureum florem gerit, Ireos album, ea vanissima habeda est. At melini flores sunt, qui Cydonii colorem referunt. Illyrica Iris laudatissima est, post eam Macedonica, quam etiam Galenus lib. 7. *αχα* in Asclepiadeo quodam acopo habet. Sicut etiam Carthaginensem in quadam ther. lib. 2. de antid. recipit, quamquam eam quæ ex Libya magna sua ætate plurima afferebatur, tantum ab Illyrica deficere asserat quantum mortuum corpus à viuo: etiam si in aliis gentibus non ita multum Illyrica inferior reperitur. Sicut hodie de Italica & Gallica ac Germanica testari possumus.

Athenæus lib. 15. Deipnosoph. testis est Pliniū scribere Iridis flores Lupos nominari, quod Lupi rictui labrisque similes sint. Iris radix autore Mesue simpl. purg. l. 1. c. 8. est herba, quam *αχα* id est Liliælem, vocat author Græcus, cuius flos vel cæruleus, ac versicolor, ut Iris arcus cælestis, vnde illi nomen, vel albus. Alterius radix vel optima est, si magna, dura, densa, crebrè geniculata, ex albo rubescens, odore ceu viola aromatico, sapore acri, & mordente. Veris initio collecta secundum bonitatis rationem flos obtinet, cæruleus præsertim: albus enim ad omnia est imbecilior. Liliū cælestē, inquit Gorop. Iris est. Liliū Francis. Iris spei tessera. Nimis audaces illi fuerunt, qui varia singularum herbarum nomina principis caput in Pedacio adul. ademerunt. Corrupta esse pleraque fateor, ut in Iride factum, ubi legitur *αχα*, vel ut Marcellus legi posse putat, Talpida. Quid clarius si legas *αχα* id est *αχα* id est *αχα*. Idem alii Elpida, id est, spem &c. Iris Iunonis dicta. Ternarii vis in Iride &c.

Iris siue Ireos siue Iridis in genituo casu proferas [ait Cord. in Diosc.] eadem est, quapropter ineptè, quidam tanquam diuersas distinguunt, Iris & Ireos. Est autem Iris Illyrica ea radix quæ in pharmacop. Ireos & Germanic. *Violwurzg* appellatur: non quod verè sit violæ radix, sed quod odore violas imitetur. Ea propemodum sola ab Authoribus cunctis aliis eius speciebus præfertur. Sed suas habet quibus ab Illyrica distinguatur notas. Est enim horribilior, odore iniucundior, & multò maiore acrimonia gustanti molestior, fauceque grani Gnidii modo exurit, quapropter caliditate quidem Illyricam plurimum luperat: sed quantè hæc illa est superior, tantò etiam aromatico odore & sapore inferior existit. Vehementius quoque alium quàm Illyrica purgat. Est etiam in floribus differentia, siquidem nostra Iris purpureum fert florem, in arcus cælestis, colorem variatè, vnde totum Iridis genus nomen inuenit. Illyricum candidum verò producit. An Cordus degustarit & viderit Illyricam virentem accipies hæremus. Nostra enim Iris odorator & siccata, ac siccatione multarum plantarum acrimonia & ma-

Radix.
Illyrica
Macedonica
Africana
Illyrica duplex.

Sternutamenta mouet.
Pisidica.
Colligendus superfluous modus.
feruore

Irimum.

signitas retunditur: illud etiam perpendendū an in Illyrica omnis Iris sit candido flore.

Placet etiam hic subicere descriptionem Iridis Tragi, ut Lectores considerent, an eandem cū Cordo intelligat: Iris (inquit ille), quæ Gladiolorum omnium præstantiū in censetur, radicem habet serpenteū ac contortam, quæ supra terram potius quā intra humū conspiciebam se præbet, nam primaria radix nulli facit, nec humo contegitur, at radiculæ illi adnatæ intra humum latent, à quibus candida & primaria radix nutrimentum recipit. Māto mensē inter folia quæ gladii formam imitantur, caulis exit rotundus, florum vasculis seu calycibus oblongis & acutis conspicuus. His oblongis quos diximus calycibus maturitate ruptis, flos exit diuersicolor. Nam tria illius præcipua folia, eā parte quā versūs terram inflectuntur, ex viridi & pallente colore diluta purpura, purpureis simul lineis, seu venis per hos ipsos colore ductis intus verò purpureo colores admixtis candidis, & puniceis lineis, media denique sui regione lutea lanugine superciliorum formam repræsentante, emicant. His contraria tria alia in altum globi instar coacta sese attollunt, aquei coloris, ex purpura simul albicantis & lutei, non aliter atque reflexus splendoris auri fulgentis, aut cuiusdam admodum ex variis coloribus intertextis telæ, Germani ein viderſchein vocant. In medio integri floris, tria alia foliola breuia, angusta, arcus cælestis instar, coloribus variis tincta apparent. Ex his quæ de floribus Iridis Germanicæ diximus, colligimus illos nouem foliis, totidemque coloribus constare. Hi ipsi flores odoratissimi cū marcescere ac decidere cœperint, nullum post se vellemē, vel fructum (quod ego sciam) relinquunt: neque etiam passim hæc Iris, nisi plantata fuerit, reperitur. Ego namque omnes ferè Germanicæ regiones crebris, herbarum gratia, professionibus susceptis, perlustravi, nec vspiam locorum eam spontē nascentem inueni, nisi in altissimo quodam & graminoso monte non procul à Valentia arce sito, vnde euulsam in hortulos meos illam transtuli. Radix illius non perinde dura ac solida est, atque illius quam Genuensem dicunt, neque etiam ad eodē odoratā, licet feruentis sit saporis, & linguam gustata adurat, non minùs quā peregrina, quo sit ut in plantis diuersitas regionum magna constituat diuersitatē. Quemadmodum enim frumenta & vīna pro situ & locis natalibus ab inuicem differunt, ita herbæ & radices pro ratione terræ in qua nascuntur, & cœli temperie, vel deteriores, vel meliores fieri consueverunt. Quanquam hæc nostra Iris, eā quā quotidie vtimur longē sit inferior, multū tamē affinitatis cum eadem habet, si formam & temperamentum consideres. Quapropter vocamus illam Iridem, non quidem Illyricam, sed Germanicam. Eralibi: Cæruleus verò, Gladiolus, radice, foliorum forma, caule denique ad Acorū adulterinum ferè accedit, nisi quod flores huius [qui & ipsi tria folia sursum, tria alia deorsum vergentia, & in orbem pulchrè circumacta, obtinent] ex cæruleo colore purpurant, & nullo post se relicto semine decidunt. Dicimus insuper vtramque in caput 22. l. 4. apud Dioscor. collocandas, quo loco *ἱρις*, quam nonnulli *ἱερὴ ἀνέλις*, Irim sylvestrem, Cacos, & Gladiolum vocant, descripta est. Quod si cui videatur *ἱρις* [de quo alio loco egimus] vocandum, cum eo minimè cōtendendum existimamus. Gladiolus cæruleus Tragi, fortè idem cum Iride sylu. Cordi, id tamē

diligentiùs considerandum: nescimus cur ille non iunxerit Gladiolum suū cæruleum potius cum Iride quā cum Gladiolo flore luteo siue Pseudo acoro.

Iris nititur radicibus torosis, odoratis, & geniculatis, quas apud nos in Gallia (inquit Ruelius) adhuc exitu Veris terra erutas dedicant in orbes, & funiculo traiectas priùs, lixiuo macerāt ad exhauriendam succei vim, quo tinearum iniurijs, quibus adhuc herentes sunt oportunæ; minùs pateant: dein siccatas recondunt. Plerique curatas ad hūc modum Iris talcas armariis indūt, ut suo perquam iucundo odore vestes commendent: nec his preparandi Veterum vsus exoleuit. Inuenitur, inquit præterea, apud nos frequenter flos emaculati candoris, cuius radix cum Illyrica de odoris principatu contendit. Quod si vires quibus donatur radix libeat consulere, deprehendes quæ à Doctonibus traduntur, ad amussim respondere. Cū ergo tota Dioscor. pictura huic, quam Liliū vocant cæleste, suffragari cognoscatur, eam esse Irim nemo ibi inficias. Sunt qui pudendo errore aliam assignent herbam recto, aliam casui paterno, ut Iris ab Ireos, tāquam purpureus color à niueo distingui putetur Herbariis. Verūm hæc opinio anilibus nugis adnumeranda, nec digna quæ esibetur, nedum à pul-latis & rudibus explodatur.

Quam vulgus inter Ireos & Iris distinctionē facit, ait Cornar. iuxta vulgatum verbum

Iris purpureum florem gerit, & Ireos album: ea vanissima: Macedonica Gal. l. 7. x^o ym habet, sicut etiam Carthagineensem in quadam the-riaca lib. 2. de antidot. Irim Raphaniticū Fuchsi, Raphani quæ à similitudine Raphani sic est dicta, Gal. Paulus, Aëtius, Astragaliticū, quod radix eius cum Astragali radice similitudinem habeat, vocant. Florentina Florentinæ quā tantum Officinæ vtuntur, Germanica non dissimilis sapore acri & mordaci. Iris in vniuersum fatiua & silvestris. Hæc duo rum est generum: altera fatiua & vulgari similis, foliis tamen, flore, caule, radicēque paulò minoribus.

Iridem Illyricam noui præferri [inquit Mat. thiol.] non quod genere vel specie à nostrate differat, sed quod cæli solique illius conuenientia præstantioribus polleat facultatibus. Satiua (ut arbitror) ex agresti originem duxit. Sunt qui putent nullam Iridem domesticam reperiri, quod scripserit Theophrast. nullum Iridum cultum ac commodari. Sed ii meo quidem iudicio decipiuntur, quandoquidem Theophrast. eo in loco non de omni in vniuersum Iride differit, sed de Illyrica tantum: quæ cum loci ac cœli clementia in Illyrico tractu optima spontē proueniat, non est necesse ut colatur. Præterea cū hodie Iris domestica passim in Italiæ hortis spectetur: silu. autem in pluribus montibus spontē nascatur, floribus & foliis fatiux longè minoribus, radice tenuiore, breviorē & aridiore, nulli quidem absurdum videri debet, si nos vtramque depingi curauimus. Sylu. plurima oritur in Goritienſi agro, Saluatino monte, & Iapidix collibus inter laxa, odore non ingrato, & in campestribus non longè à Sontii ripis. Recenti Illyrica destitui-mur. Sibi manifestè repugnare videtur Plin.

quod lib. 21. c. 7. Raphanitem, quæ candicat, Rhizoromo quæ rufescit antepoluerit: c. autem 2. sibi prouocant, Iris ruffa melior est quā candida. Dioscor. præstat quæ subrusto constat colore. Cornarius Irim Astragalitem & Astragalum idem esse existimat, quin & Plinio per Iridem Rapha-

Preparanda di ratio in Gallia

Iris sativa vulgaris, Iris silu. vulg. similis

Theophr. explicatur

Locum

Sylu. sua spontanea sibi prouocant. Illyrica destituitur

*Iris Astragalus
galus et
Raphanitis
non est
Astragalus
ne Galle
Cornar.
Iridis non
meminit
Gal. in
simpl.
Match no-
tatur.*

Ireos Offic.

*Iris flore
luteo.
pallido.
purpureo.*

*Iris
illyrica.*

*Definitur
Plinius
contra
Matthiol.*

nitem Astragalum intelligi censet: verum ita Iridem Astragalitum à Galeno cognominatam esse putauimus, quòd radice referat Astragalum: quemadmodum Raphanitis à Plinio dicta est, quòd radice Raphanum representet. Iridem memorie proditam fuisse Galeno in lib. simp. med. nusquam reperi. Si *Iris sylu. Matthiol.* tantum paulò minor est satua, & in eo tantum differt vt primò dicit, nulla opus erat figura, si verò, vt ait, sibi contradicens longè minor, icon parum eius demonstrat plantam. Quomodo scit an *Iris Illyrica* differat genere vel specie, si non virentem viderit & contulerit cum Italica. Idem in post. Com. lat. & Ital. cum magna. fig. *Iris capitula* edit oblonga Gladioli modo, crassiora tamen, in quibus semen concluditur rotundum Sefamæ magnitudine, quo fit vt ii errore ducantur qui Iridem nullum ferre semen contendunt.

Iris cuius tantum radix à medicis commendatur, ea est herba, Amaro hæc scribente, quam hodie officinæ sub nomine Ireos monstrant. Reperiuntur vari colorés, in vnoquoque flore, candidi, pallidi, lutei, purpurei, vt plurimum cærulei, vt faciliè quis intelligere possit Iridem dici, non obdura nitatem colorum in specie, sed in indurando potius. Quamquam non abs te cilet quoque dicere, Iridem sic nominari, ob diuersitatem varietatemque colorum in specie. Quam *Iris* quædam albos flores habeat, alia luteos, alia verò pallidos, nonnulla autem purpureos, vt Ferrarius in horto Migi. Muci P. adnotauimus, & eas diligentiſſimis discipulis nostris indicauimus. Imò hanc sententiam verissimam esse, varia Dioſc. Græca exemplaria attestantur: cui Plinius testem sit Liban. in Nat. hist. cap. 7. quòd dicit: Floret *Iris* diuersi coloris specie, sicut arcus celestis, vnde & nomen. Ceterum *Iris Illyrica*, omnium consensu cæteris præfertur, & omnium est laudatissima, quamquam tamen in multis orbis regionibus, minoris licet nominis nascitur: nempe in Hispania, Germania, Gallia, & Italia, quæ si non *Illyrica*, aut Macedonica, quibus primas & secundas Dioſcorides adſcribit: bona tamen censenda est, & eò magis quòd odoratior fuerit. *Illyricæ* verò, vt refert Plinius, loco à nobis citato duæ sunt species, altera Raphanitis, ob similitudinem sic dicta quæ eius radix cum Raphano habet. Altera rhizotomos, quatum melior habetur, quæ ad subruborem tendit, vt in præſenti loco Dioſc. tradit, à quo nec Plinius diſſidet. Mart. Plinium (pergit Amatus) errantem ostendere nititur, quum tamen Matthiolus ipse magis reprehensione dignus sit. Nam Plinius nihil quicquam à Dioſcoride hac in re variat. Plinium accusat cum inuere videatur, quod Raphanitis melior est Rhizotomo subrufa, adde vt subrufam postponat non subruſe, quum tamen Dioſc. Iridem colore subrufo maximè laudet, & cæteris anteponat. At hæc tam parua sunt, vt paucis opus habeant responſis, præcipuè si litteram legerimus, vt in eodice antiquissimo ad hunc modum legitur: *Illyrica* quoque duorum generum est, Raphanitis à similitudine, qua & melior rhizotomos subruſa. Sic enim legendo omnis diluitur dubitatio. Nec enim aliud quàm litera vna permutatur: vt facili loco, quæ perperam postea dictio, quæ scripta fuerit. Sed esto phraſis, vt in Frobenianis habetur codicibus: legatur, scilicet, Raphanitis à similitudine, quæ & melior rhizotomos subruſa, imò contrarium, qui vel mediocriter in lectione doctrinaque Pli-

niana verſatus fuerit, depræhender, quum dictio quæ, non referat aliud, quàm Rhizotomos subruſa, quæ, & melior. Quod Plinius verò sic intelligendus sit, & quod cum Dioſc. subrufam Iridem laudat, non aliunde comprobatur, Iri volumus, quàm ab ipſo Plinio, qui se ipſum declarat, & cum Dioſc. subrufam Iridem laudat lib. 2. c. 20. quò Iridis proſequitur inuamenta, dicens: *Iris rufa* melior quàm candida: hæc Amatus.

Iris Illyrica figurâ non differt ab Italica, nec alia in ea differentia cognoscitur, quàm quòd tum Vere tum Autumnno floret. Hanc autem plantam esse Hyacinthum Latorum ex Palladio apparet &c. Quod ad verba Dioſc. [pergit Anguill.] *Iridis* & dicitur quædam parua &c. ea non sunt vertenda vt quidam faciunt: Flores in caule æqualibus inter se ſpatiis diſtant, vt apparet ſed veterem flores ſummo caule alterno ſitu &c.

Species [inquit in Antid. Meſ. diſt. 5. cenſ. 11.] *Iridis* à Melue dictæ, paſſim reperiuntur: quatum radices in noſtra Italia cum ſiccantur, ita rugoſæ & parue deueniunt, vt vix præter corticem [ſi cum ipſo cortice ſiccantur] quicquam de ſua interiori parte ſeu alba odorata pulpa retineant: Si ne cortice verò, quaſi ad nihilum rediguntur, cum ſiccantur. Quæ autem radices huiusmodi è plagis Orientalibus deferuntur decorticatæ, & ſiccæ ſunt carnoſæ, & lenes, tanquam ſi tunc recentiffimè fuiſſent collectæ, quapropter noſtracibus meliores iudicantur. Huiusmodi enim plantæ, ſerè omnibus notæ ſunt. Quæ autem *Illyrica* dicitur, eſt ſpecies in *Illyria*, id eſt, in Sclauonia naſcens, & eſt illa quam Dioſc. meliorem, eſſe teſtatur. Ipſa autem quam in noſtro horto habemus, ſtorem magis gerit quàm Ireos, diuerſi colorem, lineatum, viridem, ſive caeleſtem, & rubet, vt eſt caeleſtis arcus, id eſt *Iris*. Folia enim exiliora, nec non & minores radices, ſed virtutes [vt putamus] maiores, quàm dictum Ireos habet. [Hæc Monachorum *Iris Illyrica* forte Matth. ſylueſtris minor.] Eſt etiamnum (præter præſentem) in *Illyria* & altera *Iris*, noſtrati ſimilis. Apuli vulgò *ſpathulam* appellant, ſed nò ſatidam, & à nonnullis *Liliatis* & *Lilium* dicitur. Quapropter quandoquæque Ireos reperitur ſcriptum, abſolute ſcilicet, quod non ſpecificatur de albo, ſemper purpureum eſt ponendum. Et ſi haberi poterit de *Illyrico* adminiſtretur: ſi autem non Orientale, vel noſtras ſubſtituendum erit. Similiter quandoquæque reperitur ſcriptum Ireos, & non ſpecificatur de flore, ſemper radix intelligi debet. Folia enim [quod ſciamus] non habentur in uſu. Item ſi queratur aqua Ireos, & non præciſe ſcribitur ſubſtinata, ſemper ſuccus radicis, vel ſaltem decoctio ipſarum (vbi deſiciunt virescentes radices) debet intelligi: [Idem cenſet Fuch.] Hoc etiam notandum in radicibus Ireos, ſcilicet quòd recentes quaſi in odore iudicantur, ſiccæ autem maximum & ſuaſum ſpirant odorem.

Dodon. Gall. *Iridis* prima ſpecies; qui licet duas proponat deſcriptiones ſatius *Iridis*, vnam tamen ſolummodò figuram exhibet: per primam intelligit Fuchii, ex quo deſumpta icon, Tragi & Match. primam quæ in hortis colitur: per ſecundam intelligit album proferentem ſtorem, quam Iridem Florentinam vocat. Idem de ſt. ait: *Iridis* ſpecies ſtoris colore diſtinctes complures eſſe Dioſc. innuit, non in vno colore, vt Lacuna exiſtimauit: ſed in diuerſis, vt reſtis eſt Muſa, &c. *Iris* Matth. alia eſt ſatua eaque ſel-

cæruleis vel niueis floribus. Cum sativa & silvestris in hortis reperitur, neque hæc opinor in illam cultu degeneret, specie eas differre existimandum est. Marthiolus indistinctè loquitur qui simpliciter Illyricam ab Italica nihil differre dixit: Theoph. verba non intellexit. Iridem Apollonius ex Elide, ac Cilicia probabat.

In Thracia ac reliquis locis frigidis & in Germania [ait Cronenburg.] odore penitus caret. In Officiis corruptè genitium pro recto vsurpant. Vanum quoque est, quod aiunt,

Iris purpureum florem gerit, Ireos album: cum vna cadetque herba sit, licet aliunde inuenta, odoratior habeatur: Qua gratia pulvis radicis cum armariis, & vestibus inspergi, non sine hilaritate, & eximia fragrantia consuevit. Sed dubitauerit hic aliquis quâ ratione istæ radices verustate odoratiores fiat, cum hæc quatuorvis corrumpere soleat? Cui respondeo, id per siccitatem fieri, humore nimirum exhausto, ac veluti excocto, siccitas siquidem, auctore Theophrasto, odoribus conuenientior est, atque omnia in vniuersum odorata, eò inclinant. Hodie promiscuè Florentina & Germanica pro Illyrica malè vsurpatur. Herbarii Lilium cæleste nominare malunt. Biennium seruatur Mesicæ, aliis quinquennium. Iridem nostratam sine odore esse quis dicat? siccata enim suauiter olet, etiamsi macerata fuerit in lixiuio feruente, quomodo solet à mulieribus fieri vt linteis gratum concilient odorem: Florentina Iris vialis non malè nobis videtur vsurpari pro Illyrica: potissimum pro ea quam obseruauimus aliquando vendi pro ea: utraque enim radix, non parum differt à Germanica, quæ siccata tota rugosa.

Ob coloris florum Iridis cælestis æmulam varietatem Priscæ Gēs hanc plantam Iridem vocauit, Græca nimirum origine, quibus vt annotat I. Ob. & Pen. Theophrastus, etiamque Theophrastus & Dioscorides dicitur, id est, sacra, cælestis, atque admirabilis, qualem arcum fœderis post diluuium à Iehoua sancti narrat diuina pagina. Hodie cūctæ ferme Gentes deprauatè vocitant, Germ. ein Vioget / Schwertel / Flandri, Itali, Hispani Lilium. Galli etiam Glayent, propter florum cū Lilio & Gladiolo similitudinem. Quod idem vsu venisse Poëtis & imposuisse Historicis in Hyacinthis & Lilis dicitur. Multiplicem foretur varietatem, non modò viribus sed etiam magnitudine, odore, & potissimum florum colore. Cuius multiplicis venusta mixtura, non modò in diuersis plantis, sed etiam in vniis duntaxat floribus spectanda venit. Elegantiæ siquidem hortensis amantes non modò purpuream (quæ vbiuis ferme Europæ tunc oritur, omniumque frequentissima viuitur) sed etiam quasdam floribus candidis alunt, non item luteis vt quidam doctus putat.

Ab omnibus auctoribus (id attestante Lobel. Ad. par. 2.) Iris Illyrica celebrata est & primum locum sortita. Florentina autem passim hodie nobis pro Illyrica obruditor, & plaris fit à mercatoribus quam Veneta, quia candidior & fragrantior: at tamen ex Illyria, hodie Sclauonia dicta, Iris Venetias deferri solet: quare Veneta, Illyrica legitima omnibus vno ore censetur: subiecti coloris, non candidi, etiam Plinii & Dioscor. suffragio, omnibus præferenda. Non multum à Lusitanica biflora foliis differre lictis prodidit fidelissimus scriptor Clusius noster: pedalis caule, raro ampliore, & flore Iridis Lusitanicæ forma, colore & odore persimili, paulò maiore.

re tamen: radice nodosa, & geniculata, odoris dum recens est, ingrati, at siccata satis grati, insipidi initio gustus, postea tamen feruidi, faucesque ventis. Secundum locum sibi vindicat Macedonica Plinio, longissima radice, tenui & albida: In quo quantum à Dioscor. distet & quomodo inter se conueniant fuscè prosequitur: cui enarrando superfedens, cum iam ex aliis supra de hoc actum sit.

Iris apud Camer. hort. dicitur: Hyacinthus Virgilii, Columellæ, Palladii, maxime secundum Anguill. In Illyria hodierno adhuc die eius floribus vruntur in corallis quemadmodum Theophrast. & Athenæus quoque tradunt.

Tab. hist. & ic. Iris. Et Iris vulgaris 2. Itera Iris sila.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris. 1. siue vulgaris cærulea, variat colore floris vel cæruleo vel purpureo, cæruleo obsoleto, cinereove. Iris 5. siue sila. maior, quæ sativa vulgaris similis. Iris sila. Marthiol. in folio Lat. pag. 17. & Icon. 4. pag. 2. Iris sila. maior. Item Lacunæ. Non separo has tres Irides Tabern. quia non indicat discrimen. Marthiol. autem dicit sila. satiuâ paulò minorem. Iris cærulea vel purpurea, alia vulgarior est obsoletioris coloris nec tam grandi flore, foliis & radice, nec etiam tam odorata hæc quàm sequentes. Iris domestica flore cæruleo quæ ab Illyrica non differt nisi quod Illyrica sit odoratior & bis floreat in anno. Cæterum, falsum id esse comperimus, quod Adrian. Spieg. placet, Iridi nepe florem esse sine fructu. In aliquot siquidem Iridibus fructum vidimus.

Iris. Iris, duos, &, & spavia ab admiranda celestis arcus millecoloris imitatione, d. & spavia Iris Galeno: radix Illyrica: sic enim legit Hadrian. Iun. apud Dioscor. pro uideus, lubrico errore in scriptura A, quod geminatum sit M. Al. Blato gilsen / blaw schwertel / Violonrtz / himmel schwertel. Belg. Lisch ouerzer Gall. Flambe, Glayent. Ital. Giglio azzurro à celeste: irios & Iride. Hisp. Lirio cardeno.

Incipiente foliorum defluuio colligendas radices docet Dioscorides. In fine Veris Iridem colligit Crescent. & siccatur, perque duos annos seruatur. Irim Illyricam paruum & tenuissimam plantam Constant. ex recentibus plantis Ianuario vsque ad Aprilem mensem. Vulgarem & omnium tritissimam Iridem in omnibus, quas Clus. adiit, Prouinciis obseruauit, vel hortis, vel muris, aut etiam interdum rectis innascentem. Natalitiis gaudet non admodum feruidis vt Aphricæ, neque ita frigidis vt Septentrionum: sed montosis temperatis & riguis, cuiusmodi ex Hispania hodie valde odoratam laudatissimam ferunt, & ad fluminum crepidines canit Nicander Neronianam Illyricam non maritimam, sed Septentrionalioris & riguæ à flumine Macedonia, sic vocato.

Transfudi in hortum Ill. E. C. ybi non solum Vere flores, sed interdum Autumnò. Monspeli obseruauit florentem mense Martio & Aprili: In Italia non longè à Verona copiosè spontè ad sepes prouenientem: Florentinæ & Lugdunæ: magna copia à la roche in hortis florentem April. Genæ & Basileæ in hortis florentem Septembri anno 1571. Prouenit in vicinis montibus radice etiam odorata, unde mihi allata per D. Petrum Turnerum Medicum Anglum. Audio abundè prouenire in Munchstein.

Vis omnibus excalescentia, extenuans, contra tussim efficax: humorum qui agrè eiciuntur,

C. B. 1661

Nomina
linguarum

Ex Hisp.

Locus
&
tempus.

crassiciem digerunt, vel attenuant: bilem, crassamque (crassa & cholera Plin.) pituitam ex hydromelice drachmis septem epotæ purgant. Solum conciliant, lachrymas ciunt, torminibus medentur. Eadem potæ ex aceto serpentium [& arearum Scorpionum, in pane vel aqua addit Plin.] iictibus auxiliantur, lienosis, conuulsis, perfrictionibus, horticibus, & quibus genitura [genituras absumit, Plin.] effluit. Menses ex vino potæ pellunt. Decoctum earum foeminarum foribus vtiliter imponitur, ad emolliendos locos, laxandaque in eis venarum spiracula, ischiadicis (& lumbis cum resina illinitur Plinio.) infunditur. Fistulas ac sinus carne explet [sarcotica est.] Radices ex melle glandis (glandis modo, scitè collyrii modo, vertunt) modo subdita partus extrahunt; quin etiam coctæ & illitæ strumas veteresque duricias emolliunt. (Succo duricias omnes emollit. Plin.) Siccæ quoque vlcera replent & cum melle purgant (capitis præcipue suppurationes veteres.) Nudata ossa carne operiunt. Doloribus capitis cum aceto & rosaceo magna cum vtilitate illinuntur. Admotæ cum albo veratro, & duabus mellis partibus, lentiginis & vitia cutis in facie à Sole contracta emaculant. Pessis, malagmatis, & acopis inferuntur. In vniuersum, magni sunt ad omnia vlus.

Diosc. ergo & Plin. naribus subductam sternutamenta mouere tradunt. Sed hic (inquit Cornar.) subdita pro subducta falsè legitur: quod vitii etiam in aliis locis occurrit, velut alibi indicatur.

Addit Plin. Infantibus eam circumligari salutare est. Dentientibus præcipua est, tinearumque vitio laborantibus instillata. Contra canum morsus ex oleo imponitur, & contra perfrictiones; sic & nervorum doloribus. Dolori capitis cum Cotoneis Malis aut Struthis illinitur. Crapulas quoque & Orthopneas discutit. Vomitiones citè duobus obolis sumpta. Ossa fracta extrahit imposita cum melle. Ad paronychias farinâ eius vtuntur. Halitus oris commanducata abolet, alarumque vitia. Sedes rimas & condylomata, omniaque in corpore excrecentia sanat. Ex eo quoddam Iridem calidam & siccam ac tenuium partium, amarumque cum aliqua tamen dulcedine esse, concludit Galenus. Eam vrinæ & menses prouocare, bechicum esse medicamentum, pleuriticis, peripneumonicis ac purulentis congruens: conferre item comitialibus spasmodis, palpitationibus & tremoribus; ut & sinuosa vlcera carne implere, purgareque: lateris, iecoris, lienisue dolores sedare, vt & capitis: nec non genituræ profluvio congruere & ad vteri foemina.

Iris calefactoria & multum tenuium partium est [attestante Paulo] extergitque ac concoquit. Ad tussim itaque conducit, & humores in thorace ductu faciles efficit, & tormina sanat & vlcera fœdida purgat. Pota verò cum aqua mullâ alium euacuat.

Radix (vt nobis autor est Mesue) est calida sicca ordine tertio, acris: terget, coquit, resoluit, lenit, aperit obstructa, sedat dolores, pituitam crassam, & mistam illi bilem purgat, ac præter hæc aquas serofas, idque clementer. Materiam crassam, lentam, hærentem in thorace, ac pulmone, coquit, tenuat, ac promptè educit, visceraque omnia expurgat. Hepatis quoque ac Lienis, & vicinarum partium tollit obstructiones: affectus ab ea excitatos, hydropem, dolorem, tumo-

rem, duriciem, & similes sanat aut lenit. Omnes quoque tumores etiam duos, & strumas digerit, præsertim neruorum & iuncturarum maximè cū Betæ vel Brassicæ succo vel vino, & melle, & oleo chamæmelino. Cephalalgiam veterem sanat: præsertim cataplasmate imposita, & succo eius in nares attracto. Hic enim sternutamentum mouet, & per nares detrahit vim maximam excrementorum in partes alias, per meatus occultos aliqui defluxorum. Succus autem ex ea vt absinthio extrahitur. Cum sapa autem tussim veterem ab humore crasso, lento, factam, multum iuuat, & ab eodem spirandi difficultatem. Vterum præterea expurgat. Pesto, quoque supposita vel emplastro admota, vteri dolores sedat, menses euocat, abortum facit. Vlcerata antiqua, sordida, putrida purgat, terget, carne proba implet, quali etiam ossa nuda vestit. Ischiadi salubriter aut clystere inicitur, aut emplastro imponitur. Os si colluitur aceto cui incocta fuerit, dentium dolorem sanat, & rheumatismum sistit: supposita item hæmorrhoidas aperit. Inuitam feminis vacuationem sumpta cohibet. Succus eius cum farina fabarum & cinerum illitus, faciem expurgat, eiusque maculas deterget. Oleum denique Iridum nervos & iuncturas firmat, spasmus ex repletionem, Cephalalgiam, dolorem hepatis, splenis, renum, vteri, iuncturarum, thoracis & podagræ, pleuritidem, peripneumoniam, oblitum iuuat, catarrhum coquit, somnum conciliat temporibus inunctum: aurium dolores instillatum auri, natium graueolentiam ipsis iniectione corrigi. Fit autem Oleum Iridum ex floribus Iridis, & radicem dimidio, vt rosatum oleum & violatum. Ne ventriculum lædat, sumatur ex mulla & pauca spica, vel cū sero lactis, melle, & Mastiche: ad affectus autem thoracis, & pulmonis, cum sapa, vt dixi, propinatur.

Gladiolus qui cæruleos fert flores [duce Tragō] hoc tempore vtriusque corporis partibus adhibetur calidæ temperaturæ herba, & expellantis ac resiccantis facultatis. Radix lurci Gladioli astringit. Aqua cærulei Gladioli stillatitia pota aduersus omne genus veneni, ad febres ardentes tempore pestis facit, nec non ad incensum Epar, & pleuriticum morbum. Radix eiusdem vino decocta & pota hydropem expellit, menses grahit, & calculum renum stillicidio vrinæ auxiliatur, aqua eius radices distillata trium aut quatuor cochlearium mensura, aliquoties per diem pota vsu gratio est, sed in expellendo ea mala quæ recensuimus non perinde efficax. Eadem tamen continuè & frequenter pota, obstructiones iccinoris soluit, vitia thoracis & pulmonis expellit, expurgatque, doloribus lienis & matricis ac torminibus opitulatur, aluūque soluit. In vniuersum magni ad omnia vlus est radix Iridis, nam non solum in vinum, & Ceruissam suspensa, hanc dulcem conseruat, illud verò iucundò cū odore, tum sapore commendat, sed & pistoribus ad parandum formentum triticeæ panis magnoperè vsitata.

Præter vires quas illi adscribit Diosc. (si Macethiolo credimus) aliis pluribus pollet, quandoquidem compertum est, mansam oris halitum commendare: dentium dolores mulcere, si radicis decocto iidem foueantur: coquit item, abstergit, digerit, resoluit lenit, referat, expurgat, & inicit: vulnerariis medicamentis immista sarcotica est. Radicis expressus succus bilem fluam, pituitam, & aquas cutem subeuntes pellit: hæmorrhoi-

rhoidas solum elicit. Radix ipsa contrita, & ex aceto bibita, omnibus aduersatur venenis. Succus narius infusus cerebrum à pituita misericè purgat: ventriculo tamen nocet, cum per se tantum bibitur: ideoque à peritis medicis exhiberi non solet, nisi admissa mulla & radice Nardo.

Illyrica regio [ait Amatus] hodie Sclauonia dicitur ex qua hodie quoque ad nos Iris optima adfertur, quæ calida & sicca propè tertium gradum temperamenti locatur, & ex ea eclegma in Officinis contra pectoris vitia paratur. Nam tusi vilis est, & humores viscidos & contumaces extenuat: communis autem Iridos (nam Illyrica sicca ad nos defertur) succo contra hydropem vitimur, non contemnendo profectò iuuamento, vt curatione 23. Centuriæ primæ nostrarum curacionum abundè diximus, vbi vnciam integram e-lectuarii è radice cum melle parati, pro alio subducenda propinamus: Imo & succi huius nostratis Iridis, ad vnciam vsque vnam, nonnunquam cum melle rosaceo colato, aliquando verò cum decocto Senæ, vel aqua mellis mixtam prebemus.

Nostratis succum, aiunt Aduers. Hydropicis propinant Medicelli (ex horum No. Wier. Obs.) freti quidam: incertum maiorène cruciatu an commodo ægros vexet? Exhibent autem, teste Fallopio, 3ii. aut iij. succi (radicis) Iridis, & e-ducit aquam satis copiosam, sed tanto cum dolore vt sit mirum: ideo hocce remedio vti minime tutum, quamuis id commendat Brassauiola. Aquam distillatam è purpureis floribus Iridis cū speciebus Diatrionfantalon & Cinnamomo, vt efficacissimam in hydropicis commendant, teste Camer. Holerus & Gesnerus.

Ad Hydropem valet succus radicis Ireos, debet autem capi agrestis [inquit Gatinaris] quia fortioris est resolutionis, huius etiam hortulanum vtiliter operatur.

Dicit Gordonius quod sanat eos qui sunt possibiles sanari.

Vnguentum Irinum Dioscorita parare præcipit: Olei lib. 73, & quincunem, Spathæ lib. 6, & bese- sem sumito, & Spatham amixtis aquæ heminis decem tenuissimè consulam, in ahenum ad olei immisam coquito, donec odorem contrahat. Deinde in craterem melle oblitum excolato. Ex hoc aromatis imbuto oleo primum Irinum præparatur Iride inspillato oleo, vel vt præscriptum est, macerata. Aut hoc modo. Olei lib. 70, & quincuncem, ligni Balsami lib. 5, & sextantem confusi, velut dictum est, simul coquito. Deinde exempto Balsami ligno, Calami confusi lib. 9, & dextantem, Myrrhæ vino vetere oddrato maceratæ grum iniiicio: Postea acceptis ex spissati ita & aromatis imbuti olei libris 14. Iridis confusæ æquale pondus immittit, & ad dies ac noctes duas finito, deinde fortiter ac violenter exprimito. Et si efficacius hoc esse voles, æquale Iridis pondus iterum atque iterum in ipso macerato, & excolato. Optimum est quod odore nihil aliud præter solum Iridem redolet. Tale verò est quod in Perga Pamphylia, & in Elide Achaia præparatur. Vim habet calefaciendi & molliendi. Crustas vlcærum & putredines ac fordes repurgat. Et affectionibus circa vretum cõuenit, & inflammationibus & præclusionibus. Fœtus item eiicit, & hæmorrhoidas aperit. Facit & ad auris sonitus, cum Aceto & Ruta & Amygdalis amaris. Et ad destillationes diuturnas, narius ex eo illitis, & ad ozenas. Purgat etiam aluum cyathi mensura potum. Facit etiam ad val-

Tom. II.

uulosas affectiones. Mouet quoque vrinas. Et ægrè voméibus opitulatur digitis aut vomitoriis ex eo illitis. In anginis etiam illinitur, aut cum aqua mulla gargasatur. Ita etiam in faucium asperitate. Datur item his qui cicutam, aut fungos, aut cõriandrum biberunt. Irini præparatio satis clara est. Aëtius & Paulus idem parant, sed spissamentis pluribus inditis, quàm Dioscor. in duobus parandi modis habet. Hodie simpliciter sine spissamentis paratum in Officinis habetur. Apud Strabonem libro 12. laudatur Selgica Iris, & vnguentum quod ex ea fit Silgesium appellatum. Quod dixit Cornar. optimum est quod solum Iridem redolet, in Græcia habetur ^{ipsis Selgice} fal- sò pro 33.

IRIS DALMATICA MAIOR FLORE vulgari minus violaceo.



Spectatæ
Sulphuratus
dinis, & ma-
gnitudinis est
hæc Iris: caule
bicubitali, te-
reti, minimi
digiti crassitu-
dine: alis cre-
bris donato, iii
quorum extre-
mis flores mul-
tis magni, toti
cyanei, excep-
tis paucis in
vnguim alis
striis obliquis
versicoloribus,
alternorūq;
foliorum sim-
bria crocea, an-
gusta quidem
sed elata: folia

Descriptio

verò, quàm in villa alia in horto Ill. C.E. latiora, vncias tres lata nonnunquam: explicatas Aquilæ alas referunt, vltimo proximum sinu suo semper excipiente, colore glauca.

De hac ni multum fallimur Lobel. Obs. & Ic. Plant. p. 61. Leut. 87. Iris Dalmatica maior, cuius aspectus hilaris; peruenuit foliorū exortus, lateratim traiectus, & radiatim alas Pauonis explicatas imitatus: floribus pluribus ex vno caule multis concauo alis, luculentæ magnitudinis, violaceis nitentibus senis foliolis, alternatim etiā repandis. Viret Belgica hanc in delitiis habent; munere Cl. Medici Pancii Ducis Ferrariensis. Semen præfert in filiquis angulosis.

Iris Dalmatica maior Clus. Hist. vulgari forma & magnitudine similis, sed flos elegantior & vnicolor; atque in summo caulis fastigio & ramis confertim nascens: semen in breuiore filiqua angulosum, pallidum; & rugosum: floret Vere, sed serius aliis apud nos saltem. Et Iridi Asiaticæ cæruleæ omnium Iridum amplissima, Iris maior latifolia tertia Clus. Hist. post. siue Dalmatica maior; non valde abfimilis est, quam ante multos annos in Belgicam vsque misit Alphons. Pancius, nisi quod flores concolores, summo caulis fastigio magis confertos habere videtur, iucundissimo spectaculo: semen etiam in breuiore capite minus, pallidum, angulosum, rugosum.

Tab. 101.

Tabern. icon Iris Dalmatica maior, Dalmat. tisch vielwurz. In hist. vielwurz von Constan- tinopel. Iris Chalcidonica altera. Egregius Her- barius Tabern. vel eius Compiler, descriptione Lobelii huius Iridis addit, ex consideratione figuræ non plantæ, ac præter mentem Lobelii & Clusii dicit habere folia nonnihil angusta & acuta: titulus in historia transpositus competet alteri figuræ.

C. Bauh. Phyt. Iris 7. siue Dalmatica. Camer. hort. Iris Dalmatica Clusii, quæ forsi- tan ad Illyricam nomine loci posset referri.

Iris Asiatica cærulea omnium Iridum ampliss. Dalmatica affinis.

Descriptio

Sena, septena, octonaque habet Altera folia, om- nium Iridum amplissima, & in latum expansa, viridis cui ærugo permixta videatur coloris, mu- tuis se amplectentia, è quorum medio caulem promit sesquicubitalem, interdum etiam bicu- bitalem vel ampliore, firmum, crassiorē su- periore, læuē, geniculatum, multisque alis concavum, è quibus copiosi (nullam enim fe- ratiorem conspexi) vaginulisque inclusi pro- deunt si res, magni, nouem foliis constantes, quo- rum terna inflexa dilutè purpurascens atque ad cæruleū tendentis sunt coloris, multis purpu- rascentibus venis ab infima parte, & staminē- fimbria flaua in longitudinem & latera excu- rentibus: bifida folia exalbescunt, gibbo tamen illorum dilutè purpurascens: tria quæ sese attol- lunt folia, angustiorē & ima parte quibusdam purpureis breuibus venis distincta sunt, ubi verò se in latum expandunt subcæruleum habent co- lorem, dilutiorem adhuc quàm inflexa: & flo- rum Sambuci odorem, grauiorem tamen, quo- dammodo æmulantur: his succedunt rariores si- liquæ, siue capita crassa, triangularia, & obtuso mucrone prædita, quæ maturitate dehif- centia semen continere deprehendunt crassum, angulosum, durum, flauescens, superiorem ferè par- radix crassa est, magna, nodosa, multis longis crassisque fibris donata, lateribus, vt reliquæ, se propagans, & si repurgata exsicceat, odorata.

Cum Clusii petiisset à Magn. D. de Vignad sibi mitti Constantiнопoli alia vasani, hanc conse- quutus est, quæ magnam habet affinitatem cum Dalmatica maiore Belgis nuncupata. Est iq Pann. ipsi Iris 2. Asiatica cærulea: in post. ve- ro Hist. Iris Asiatica cærulea, siue latifolia ma- ior 2.

Casp. Bauh. Phyt. Iris 8. Iridi Dalmaticæ af- finis.

IRIS DALMATICA MINOR
flore purpuræ dilutioris.

Descriptio

Iridi Lusitanicæ seu bifloræ similis [inquit Clusius Histor. Hispan.] quam Pancius ad nos mitit nomine Dalmaticæ minoris insignitam, nisi quòd paulò angustiore folio videatur: flores pur- puræ dilutioris, & terni aut quaterni in singulis caulis, oblongiori pediculo inhaerentes, semen in breuiore triangula siliqua, angulosum, palli- dum & rugosum: floret serius Vere.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. p. 62. Teur. 88. Iris Dalma- tica minor bifloræ Iridi facie, omnique sui par- te persimilis, sed tota minor & flores dilutiores



Iris maior latifolia Byzantina Dalmatica
à Panto missa similis.

Iris maior latifolia 18. Clusii Byzantio missa fo- liis quinto generi (Iridis maioris latifolia, siue Asiaticæ purp.) non dissimilibus, sed breuiore ali- quantulum caule, in aliquot ramos diuiso, qui sustinent flores vaginulis emergentes, iam dictis paulò minores, quorum color medius inter se- cundi & quinti generis flores: radix quinto ge- neri similis. Icon quam Clusius ponit pro iam dicta Iride est Icon Plantini p. 62. sub titulo Iri- dis Dalmaticæ minoris.

IRIS DILUTE CÆRULEA
inuolucro albo, fortè Dalmatica.



Tabern. hi- stor. & Ic. meilwurz. Iris dilutè cærulea inuolucro al- bo.

Proponit Ta- bern. vel eius Cõpillator fi- guram non in- tegram sine vl- la descriptione, si stirps no- ua cur non des- cripsit, cur Mar- thiolum imita- tur: si liceat aliquid conie- ctari, suspicor posse ad Chal- cedonicam re- ferri, quæ ei

non nota, vt apparet ex descriptione Dalmati- cæ, cui tribuit folia nonnihil angusta & acuta, quæ verba addidit de suo ingenioli vir descri- ptioni Lobelii, consideratè potius figurâ quàm plantâ, cuius nomen in historia transpositum v- antè dictum.

C. Bauh. Phyt. Iris 4. siue dilutè cærulea inu- olucro albo Tabern.

Iris

Iris maior latifolia sua Damascena caerulea Clusio. 4.

Iris maior latifolia quarta siue Damascena Clusii, non dispar est foliis & radice Iridi Dalmaticæ maiori, quam N. V. Io. ab Hoghelande misit Lugduno Batavorum anno 1590. Damascenæ nomine, ipsi semine natam.

Cubitalem autem biennio post aut paullo maiorem protulit illa *caulem*, in quo multi vt in Asiatica caerulea flores totidem quot ea foliis, nec minus amplis constantes, eiusdemque penè coloris, terna tamen inflexa paullo dilucius purpurascere & ad caeruleum colorem tendere videntur, atque magis complicari: terna bifida & gibba villosa fimbria incumbens, angustiora & cinerei quodammodo coloris: terna verò inflexa dilucioris caerulei sunt coloris, & latis interdum candicantibus venis externa parte còspersa sunt: odor Asiaticæ similis. Hoc autem in eius aliquot floribus obseruabatur, vnum ex illis foliis quæ sursum attolli solent, subtus perinde, atque inflexa albescere, etiam aliquantulum inflecti, similis coloris esse, & fimbriam illam multis villis constantem habere. An porro lingulis annis similes proferat flores, tempus docebit.

Iris Asiatica purpurea maior latif.

Folia habet similia Iridi secundæ (Inquit Clus.) siue Asiaticæ caeruleæ, paullo tamen breuiora, & angustiora: inter quæ exit *caulis* cubitalis, rotundus, digitalis crassitudinis, in aliquot ramos diuisus, qui promunt è membranaceis thecis flores superiore minores, nonnihil odoratos, quorū labra, siue folia ad terram inflexa, saturatioris sunt purpureæ, & infra circa vnguem, quæ videlicet hirsuta illa & pallescens fimbria excurrit, variis venis distincta: his incumbunt tria alia latiuscula bifida folia, quæ candicantes ligulas tegunt: deinde è lateribus surgunt terna etiam folia, eleganti purpureo colore prædita; flori Lusitanicæ bifloræ ferè similia, latiora tamen: succedunt triangulares *siliquæ* obtuso mucrone, in quibus *semen* inæquale: *radix* tuberosa, Secundæ similis.

Est hæc Clus. Pann. Iris tertia, siue Asiatica purpurea, missa Constantinopoli nomine *Alaiæ Susani*. Huius iconem posuit in post. Hist. nomine Iridis latifoliæ maioris 54. quæ est Ic. Plant. pag. 59. sub hoc titulo, Iris nostras vulg. lib. 32. T. 85.

Casp. Bauh. Phyt. Iris 9. siue Asiatica purpurea Clusii.

Missæ etiam hæc Constantinopoli ab Ill. V. Dauide Vngnad. Florétque Maio.

Iris maior latifolia flore purpureo cum aliqua rubedine.

Iris maior latifolia sexta, quam ad me (inquit Clus. hist. post.) Viennam misit Io. Boissor 1588. congener fuit Asiaticæ purpureæ. Similia enim folia habuit, caulem paullo maiorem, flores similes, aliquantulum maiores, inodoros, quorum terna surrecta folia aliquid rubedinis habere videbantur: radicis amplitudine conueniebant.

Iris latifolia maior purp. quibusdam Illyrica.


Iridis maioris latif. genus 7. in Francosurtenfibus hortis obseruabat Clus. hist. cui Illyricæ co-

gnomen dederunt: longæ autem latæque folia habebat, Dalmaticæ maiori penè paria, caule non minus grandem, nec rariore minorisue flores proferebat, nouem, vt reliqui, foliis constantes, quorum terna inflexa & terram spectantis, planè purpurei siue violacei, dilucioris tamen, sunt coloris, nullis, nisi circa inferiorem partem, venis distincta, fimbria mediū folii neruū occupante, albis staminibus, flauo apice præditis donata, tria surrecta folia eiusdem ferè, sed magis à luti coloris, vt & tria bifida ligulam tegentia, & fimbriæ incumbentia: odor satis suauis.

Iris maior latifolia cui in flore crassa vena purpurea.

Iris maior latifolia octaua siue vulgarior altera, quam Clus. in hortis Francosurtenfibus conspicietur, similia habet folia præcedenti sextæ Illyricæ cognominatæ, ab exortu circa *radicem* purpurascens, *caulem* cubitalem aut ampliorem, multos è vaginulis, purpurascens radiis insignitis proferentem flores, nouem foliis constantes, quorum terna incurua multis crassis venis purpureis sunt notata, fimbria ad labrum inflexum protensa, capillaribus staminibus flauo apice præditis donata, terna erectiora plerumque bifida sunt, coloris inque habent obsoletum, in quo purpureum quicquid magis vel minus saturum elucet, alata angusta folia fimbriæ incumbens eiusdem cum surrectis sunt coloris, præter medium neruū in longitudinem excurrentem, qui ex cauleo purpurascit: odor florum Sambuci. Breuiter, Iridi obsoleta Belgicæ valde similis est.

IRIS LUSITANICA VERNA VIOLACEA, & Clusii maior Latif. nona cum venis purpureis.



Iris Lusitanica verna Lobel. Obs. Dalmaticæ Iridi maiori cum foliis, cum caule & ternis quaternisue floribus similis, sed colore omnino violaceis, seu purpureis saturatioribus: cuiusmodi ipsam vidisse iuvat hoc Verè in Viridariis Ill. D. Io. vater Dill, & Maria Scherz. Icon. Pl. pag. 63. Iris Lusitanica Verna Teut. 89.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris 18. Iconem eandem cum Plant. habet Clusius pro Iride latifolia maiore nona, cuius descriptio eiusmodi est. Mihi missum Bruxellis à N. V. Io. Boissor, Iridis maioris Descrip-
genus; quod Maio floret, quodque breuiora quam Iris maior octona habet folia, aliqui non dissimilia, nec minus circa radicem, quæ inuicem amplectuntur, purpurascens: caulem cubitalem & ampliorem, in alas diuisum, in quibus multi

flores, totidem quot præcedentes foliis prædictis, quorum terna deorsum inflexa per oras subcærulea, circa vngues ex flauo candicant, deinde multis crassiusculis saturæ purpuræ venis ab imo in longitudinem excurrentibus sunt prædita, stamina fimbria superiori n. milis est: terna erecta folia candicantis ex cæruleo sunt coloris, eorum oræ quodammodò flauescunt, vngues tenuioribus venis distinguuntur, bifida & alata folia fimbriam regentia ferè ex flauo candicantior præcedenti similis.

Iris maior latif. angustioribus foliis, purpureis floribus minoribus Clusio 19.

Iris maior latif. 19.

Iris maior latif. 19. Clus. Byzantinæ magnitudine par, angustioribus tamen foliis, quam à Boissot accipiebam, caule gracili, pedem & semissem, interdum etiam cubitum alto, in ramulis diuiso, quibus insident flores omnibus prædictis minoribus, tribus foliis ad terram inclinatiss, dilutè purpureis, tribus verò erectis obsoleti purpurei coloris, qualis in vulgaris quodam genere conspicitur: radix non magna, nodosa. Eius flos mihi primùm conspectus anno 1590. cæteris florulentibus.

Iris maior latif. Romana cærulea Clus. 24.

Iris maior latif. 24.

Iris maior latif. 24. Iridi 23. siue Illyricæ par, Viennam mihi missa [ait Clus.] à I. Boissot Romanæ maioris cæruleo flore nomine: etenim caulem, folia, radicem omnino similem habuit, anno verò 1585. florem etiam parem, exceptis tribus surrectis foliis, quæ ad cæruleum colorem magis tendebant, fimbriaque inferiorum magis flauescente, & odore vulgaris Oxyacanthæ qui in præcedente ad bifloram Lusitanicam magis accedit.

Iris latifolia maior, cui ora ad flauum obsoletum accedunt.

Iris maior latif. 10.

Iris maior latifolia 10. Clusio, à Io. Boissot missa, paulò humilior, quam nona: flores gestans, ei forma quidem similes, diuersi tamen coloris: nam terna inflexa folia, licet illius foliis non sint disparia, oras ad flauum obsoletum accedentes habent, venasque paulò dilutiores, terna sursum erecta obsoleti sunt coloris, ex flauescente & purpurascite mixti versicoloris, eius quam à Camerario accipiebam, foliis non ab similia, paulò tamen dilutiora, circa vngues etiam magis flauescencia, & tenuioribus purpureis venis notata, angusta, alataque folia simili colore prædita, præter medium neruum qui magis purpurascit: odor etiam florum Sambuci æmulus. Pr. Iride modò dicta figura apud Clusium est quæ Icon. Plant. p. 59. ponitur nomine Iridis candidis floribus.

Iris latifolia maior cum oris purpurascens.

Iris latif. maior 11.

Iris Clusio latifolia maior Vndecima, à Iohan. Boissot, similiter communicata decimæ paria habet folia, inter quæ cubitalis ferè & dictæ æqualis assurgit caulis, ternos aut quaternos è vaginis viridibus, oras purpurascens habentibus, ferens flores, quorum color obscurior & saturatior, quibus nonnunquam inspersæ lutidæ maculæ &c. Odor idem cum superiore. Paulò tamen hæc seorsus floret.

PLANTARVM

Iris latifolia maior flore versicolore?

Iris latifolia maior 12. [quæ Clusio perit] præcedenti satis colore scribebat respondere Io. Boissot, & peculiare id habere, ut inflexa folia duobus diuersis coloribus secundum longitudinem sint discretæ, altera videlicet parte reliquorum foliorum colori respondente, altera diuerso: eamque à Bruxellensi ciue accepisse, qui semine natam ibi assereret, cum aliis Iridibus, quarum nonnullæ vnicum duntaxat folium variegatum habebant, quædam versicolorem tantum neruum medium folium secantem, eumque vel ampliorum, & latiorum, vel angustiorum, ut mirum dictu sit quomodo Natura in his floribus ludat.

Iris latifolia maior versicolore carulea dilutior Clus. 13.

Iris latifolia maior 11. Ciui Bruxellensi semine natam scribebat Io. Boissot instar duodecimæ varietate colorum conspicuam, non adèd tamen elegantem, sed coloris ex cinereo pallentis, ut versicolor cærulea dilutior dici queat.

IRIS ALTISS. BICOLOR CÆRULEO obsoletum cinereæ mixta.



Rarior hæc Iris, proceritate vulgarem superans: folia non minus lata: floris autem suauiter odoratis, & vulgari minoris, non obuia amœnitas, cuius tria extrema folia repanda, lumbæ orâ saturâ purpureâ tincta sunt, inde vsque ad fimbriam crocatam humani supercillii

æmulam, saturis lineis purpureis longis campum album percurrentibus, vtrinque autem à fimbriæ lateribus oblique ferrugineæ lineæ luteos margines distinguunt: terna quoque folia, ut in hoc genere fieri solet, introrsum curuata surriguntur, colore magna parte ex ferrugineo cinereo obsoletò, imâ parte rigidiuscula lutea saturâ ferrugine guttata: penitissimâ & vltima terna in costa foris intusque leucula & sordida purpura pallescent, vtrinque lateribus luteo lurido infectis.

Lobel. Obs. Item in append. Iris flore cæruleo obsoletum cinereæ. Plant. icon. p. 60. Iris flore cæruleo, cinereæve polyflora, Lobel.

Basilæ in horto D. Felicii Plateri vidi Iridem maximam & pulcherrimam, cui flores non multum differunt à vulgari purpurea siue cærulea, folia repanda sunt cærulea, superiora nescio quem ruborem habent, dedit mihi plantam, quam plantavi in horto E. C. vbi nunc abundat flores

florēs Maio, cuius mihi videtur habere paulo minorem speciem nonnihil variantem.

Iris maior foliis duobus coloribus distinctis, albo & viridi Clus. 16.

Iris maior latifolia 16. quæ ex eorum numero quas Boissot misit, *Iridi maiori latifolia 19.* siue luteæ variegatæ valde similis, & illius quidem semine natam putat Clusius: *Folia* tamen illi breviora & (quod rarum) magna ex parte duobus coloribus distincta, albo & viridi, sic quidem, vi albus per longitudinem excurrit, nonnunquam dimidium folium occupans, interdum ferè totum, aliquando eius duntaxat partem: iisdem etiam coloribus interdum distinctæ vaginæ flores includentes: qui terna ad terram inflexa folia superiori similia habet ferè, staminea tamen fimbria tota flava est, bifida folia illam regentia flava, cuius etiam coloris sunt terna illa sese attollentia & tota ferè surrecta, vt in præcedente, infimâ autem & angustiore parte, purpureis velut maculis internè aspersa sunt: odor qualis in præcedente, nonnunquam adeò imbecillis vt vix deprehendatur. Floret Maio cum superiore.

Iris exotica colore quasi pallido fuligine perfusa Camerarii Clusio 14.

Clus. Pann. *Iris 5. exotica Camerarii*, siue obsoletior, quæ ex *Iridi varia caulifera Pannonica* nata censetur. Hist. post. *Iris maior latifolia 14.* cui ampla sunt folia, & latiora longioraque quàm in præcedentibus, viridia admodum, rugosa, aliquantulum crispâ, mucrone nutante, è quorum inedio emergit cubitalis aut maior caulis, lævis, rotundus, viridis, in aliquot ramulos diuisus, qui è virentibus vaginulis satis amplos promunt flores, nonnihil odoratos, & ad vulgaris *Oxyacanthæ* floris odorem accedentes, quorum tria reflexa folia pallida multis crassius purpureis venis à foliis infima sede, & à fimbria, ad extremas oras sparsis, prædita sunt, labris etiam saturâ purpurea nitentibus: tria illis incumbientia, sub quibus occultantur ligule, coloris pallidi tanquam fuligine perfusi, vt etiam sunt tria erecta, sed magis luridi: nullum mihi hæc tenus semen tulit, tametsi multos annos iam aluerim. Maturius paullo florere secunda, & color floris aliquando saturior, interdum dilutior. Hanc actus est à Ioach. Camerario Reip. Norib. Medico primario, vnde verò ille habuerit ignorat.

Caesp. Bauhin. Phyt. *Iris 12.* siue exotica Camer.

Iris maior latif. pallescens ex albo cum purpureis venis.

Iris maior latifolia 17. Clusii, quæ à Boissot missa, pedalem habuit caulem, rotundum, geniculatum, binos aut ternos, ex membranaceis vaginis promès flores, quorû terna terrâ spectantia folia pallescens ex albo sunt coloris, multis purpureis venis ab infimâ foliorum basi, quæ angustior est, in latera, tum à fimbria, quæ flava est, ad extremas foliorum oras procurentibus, quibus singulares, interdum binæ purpureæ maculæ sunt aspersæ: bifida folia fimbriam regentia aspersa sunt coloris, cuius etiam terna surrecta, excepta eorum angustâ basi, quæ flauescens, multis purpureis venis in latera procurentibus,

Iris maior latif. purpurea foliis repandis candidantibus, purpureæ venis distincta Clusio 22.

Iris Clusii maior latifolia 21. Non minus mimis ampla habet folia quàm 20, inter quæ caulis affurgit pedalis, teres, geniculatus, viridis, sustinens membranaceas thecas virides, per oras leuiter purpurascens, è quibus emergunt bini aut terni flores, iam descripto paullo minores, nouem foliis constantes, quorum terna terram spectantia ab imo angustiora, candidantia interius, saturâ purpuræ venis eleganter distincta sunt, latiore verò parte omnino purpureâ: villosa fimbria infernâ parte flauescit: supernâ purpurascit: bifida foliola sub quibus latet, floridi purpurei coloris, vt terna folia surrecta: flos tenuiter odoratus. Hæc mihi inquit, nata est Francofurti ad Mœnum, semine spontè deciduo, & florem dedit anno 1592. Maii initio.

IRIS FLORE ALBO.



Quia purpuream

vulgarem Iridem rectè norit, is nullo negotio hanc albam assequetur: nullam quippe in radicibus, fulcorum florumque forma differentia notabilem animaduertimus, in quibus tamen vtiq; coloris non modicum est difformen: folia enim colore ad glaucum magis accedunt, flores paucos, sed eo tamen grato odore præditi, lacteo candore perfusi sunt, extimorū costis non minus quàm Purpureæ extra virentibus, quibus intus lutea crocomata respondent, imorum autem foliorum margines luteæ stric percurrunt.

Descriptio

Tradit Ruell. inueniri frequenter Iridis florem emaculati candoris, cuius radix cum Illyrica de odoris principatu contendat.

Cord. in Diof. & Obs. Sylu. *Iris Illyrica flore candido.* Non placet Cordum Illyricam astruere flore albo, vt poitea dicitur.

Brunsch. & Gesn. hort. *Iris flore albo.*

Est autore Marthiol. in fatiurorum genere, quæ niuei candoris flores profert, quam in pluribus Herrunæ locis vidit, cuiusque radix fragrantia & virium robore Illyricam ferè æquat.

Dodon. Gall. *Iris altera flore albo, Iris Florentina*, Officinis Ireos: Gall. *Flambe blanche*, Germ. wets Diollwurz & wets Schwertel. Belg. wittisch / quæ omnino præcedenti similis, foliis, caulibus, forda florum & radicem, nisi quòd flores non habet diuersos colore, sed nœcos: Radix paullo minor, & optimi odoris maxime sicca. Cur Florentina potius censenda sit ea quæ albo flore quàm altera, non video, quandoquidè ibidem copiosa, nec etiam radix nobis obseruata

Iris Florentina.

Dodonæi

minor, sed potius maior.

*Plantin.
caner. not.*

Plant. Icon. p. 59. Iris nostras vulgaris candidis floribus. Lob. 32. Ad. 31. Teur. 35. Figura strigosa Iridis apud Plantinum non placet pro alba, albâ enim non vidi strigosa, sed cum crassis nodosis radicibus. Lobelius posuit eam figuram in Belg. pro vulgari filu. Iride; hinc fortè accidit vt tr. C. Bauh. duas fecerit Irides albas.

Camer. in hort. Iris alba Illyrica vulgò, vel potius Florentina. Item apud Matth. German. Iris Florentina cum floribus albis.

Tabern. histor. & Icon. Iris alba weiß weilwurz. Item Iris Florentina weiß weilwurz. Duas proponit figuras Tabern. sed non demonstrat in quibus differant.

*Tab. mor.
C. B. lapsus
Garr.*

C. Bauh. Phyt. Iris 2. siue albò flore, Matth. sativa niuei coloris, Lob. nostras vulg. candidis floribus. Iris tertia, siue Florent. alba, Gesnero Florentina: Cordo Illyrica: radices siccatae non corrugantur & differt à præcedenti, quod hæc radice sit minore: Cur Frater separet Iridem Florentinam albam à Matthioli alba nescio: quum Florentia sit in Hetruria vbi obseruauit Matth. flore albo: Gesnerus non dicit Iridem Florentinam cuius ineminit flore esse albo: Florentia obseruauit frequenter vtriusque coloris radices quæ solent pro Iride Florentina vendi, sunt maiores, crassiores, solidiores, candidiores, odoratiores, quàm vulgaris nostratis: an regio solumne sit tantum in causa diuersitatis à nostra asserere non ausim, vel an sit species diuersa, vidi aliquando radicem etiâ vendi pro Illyrica Iride, quæ sanè solida & odorata, sed minor Florentina: Cordi verba præcedenti capite adduximus, vbi non dicit an Illyricæ radix sit minor vel maior vulgari.

*Locus &
tempus*

Iride alba aliquando primo Vere collem plenum reperit Camer. circa Priuernum urbem in itinere Neapolitano. Vehementiores hyemes apud nos ægrè ferre potest, & in primis à niue liquefacta, & rursus gelascente tutanda. Iris alba in Austria & Vngariæ hortis rarior, & Clusii tantum operâ illis cognita, acceptis è Belgio radicibus.

Iris Florentina.

Basileæ accepimus datam ex horto insignis Pharmacop. Ioh. Heitzman, quam plantauimus Montb. in Horto II. E. C. eam primò videramus, Bononiæ & Florentiæ in horto Nic. Ferrariensis & aliis flore in rotum niueo, exceptis apicibus luteis in medio foliorum: postea obseruauimus Geneuæ & Lugduni. Non videtur nobis propter colorem album particulatim vocanda Iris Florentina, quum verâque abundant Florentini, & vtramque indiscriminatim sumant à bonitate autem potius vtramque Florentinam de nominari, non propter colorem: quanquam vtriusque radix soleat etiam candidior crassior & solidior vulgari esse. Narrabat mihi olim insignis Pharmacop. Valerâdus Dourez, qui in Illyria siue Sclauonia fuerat, Iridem ibi dari flore albo potius quàm purpureo, spontè in montibus prouenire & radicem similem Florentinæ virentem gustu esse, non minùs feruenti quàm nostras, eam quæ in humidioribus locis nascitur deteriorationem quæ non possit sicari.

Illyrica.

Iris maior latif. candida cym multis foliis purpureis Clusio 27.

Iris maior latif. 27.

Lata pedalisque fere longitudinis folia habet elegans aliud Iridis genus, Iridis Aicholtzianæ foliis prorsus similia, radicem etiam & caulem,

qui perinde atque in illa, ad foliorum latus ex radice nascitur pedalis, tenuis, in quo singulares aut gemini flores à vaginulis ex pallido virescentibus prodeunt, forma Aicholtzianæ similes, sed colore variantes, nam terna folia propædientia candicant, purpureæ exoletæ venis ab infima eorum sede per latera excurrentibus vsque ad extimam fimbriam subcæreuleis villis constantem, tria autem incumbentia & ligulam siue stamina tegentia, alba sunt, earum tamen gibbo subcæreulo: terna surrecta etiam candida, & ab infimâ, sed multis purpureis venis distincta, donec in latitudinem expandi incipiant: flori successit triangulum caput binas pæne uncias longum, crassiusculumque quod maturitate dehiscens Iulio, semen ostendit rugosum, subfuscum, erui magnitudine: radix hieme folia non retinuit.

Floruit Aicholtzio primùm Maii initio, Anno 1574. vnica quam habuit planta, eadem areola in qua 25. Aicholtziana reposita erat, & quæ etiam oppositam areoleam occupabat. Itaque non dubium quin eius semine deciduo nata sit, tamen huius flos odoris gratia commendabilis non fuerit, qui tamen in altera deprehendebatur. Mirum enim in modum variant quæ ex semine nascuntur Irides, non secus ac præcocces & dubiæ Tulipæ, atque Papauera, vt longâ experientiâ didicist.

IRIS LVTEA, FOLIIS FLORVM repandis variegatis.



A Mæna est florum huius Iridis elegantia, alterna ex extimis totalutea sunt folia, nigricante purpura circum guttata; alterna pulcherrimè virgata, striis suprema folii parte intrinsecus atro sanguineis per album Campū discurrentibus: inferna verò eiusdem faciei parte ad fimbriæ

crocatæ latera vtrinq; minùs saturis lineis, crebris admixtis concoloribus guttulis, luteolum campum obliquo ductu pingentibus, extrinsecus verò ex luteo herbida sunt: intima terna folia bifida penitus lutea, tergo appressas habent ligulas herbidas, apicibus lacteis.

Hanc sic describit Clusius. Iridi latifoliz maiori 15. rugosa sunt folia, minùs tamè lata, longa, & viridia quàm in 14. secundum radicem omnino interdum purpurascencia, è quorum medio caulem promit cubitalem, lauem, viridem, aliquot ramulis donatum, quibus insident flores è vaginulis emergentes, magni vel prorsus inodori, vel Oxyacanthæ vulg. florum instar odorati, coloris varietate commendabiles: nam tria folia quæ

quæ sursum spectant & atroluntur, raro se mutuo amplectuntur, aut eacumine nutant, sed plerumque (nisi marefcere incipiant) recta sunt, ut in Iride bulbosa, nonnihil tamen conuexa, angustiora, lutei coloris, quemadmodum & illa quæ ligulas fimbriamque incontegnunt: tria ad terram inflexa, circa basim & exortum pallent, reliqua parte candicant, multis tamen purpureis radiis ab ipsa sede ad extremas usque folii (quod plerumque saturatius purpurascit in earum stirpium floribus, quæ circa radicem nulla purpura sunt suffusa) pallidas oras, eleganti piccata decurrentibus: villosa fimbria, quâ parte integitur, lutea est, extrema verò exalbida, pallentes ligulæ, magna triangula & obtuso aliquatulum mucrone prædita capita, semen Orobis magnitudine, fuscum, rugosum continentia: radix nodosa, vulgaris Iridis instar, foris flavescentis: multis utrinque nascentibus fibris firmata, quæ repurgata & exsiccata, odoratissima est, & cum llytica, quæ in Officinis habetur, odoris gratia contendere posse existimatur.

Est hæc ipsi in Pann. Iris 4. varia caulifera, Pannonica, sub quo titulo eam & Tab. exhibet. Lob. Obs. Iris lutea variegata. Icon. Plant. p. 66. Teut. 97. rara species. Flores sunt lutei. Chamæiridis Monspeliciæ tribus repandis foliis peregrinâ elegantia striatis, obscure violaceis. In Belgii hortis provenit munere Clusii.

An Matth. Ital. cum magn. fig. Iris flore luteo, quam in multis hortis Bohemiæ vidis, & non vult intelligi Acorum vulgare: Oportebat demonstrare discrimen inter Iridem luteam & Acorum vulgare, si poterat.

C.B. Phyt. Iris 6. siue sativa lutea, Matth. Iris sativa floribus auctis. Iris 10. siue varia caulifera, vel 4. Clus. Iris 16. siue lutea variegata Lobel. Iris 17. Variegata Camerarii sive alia.

De hac Camer. hort. ait: Iris variegata è luteo & purpureo obsoleto flore, quem in locis natalibus non promittit: in hortum verò translata, contra aliarum sylvestrium plantarum naturam, altero anno floret, & quotannis postea, ac longè latèque serpit. Idque verum esse experientia me docuit, cum eius generis plantas ex monte quodam Franconiæ propè arcem Comitum de Cassello mecum deportassem in hortum. Foliis est Acori vulgaris, id est, Aquaticæ flauæ Iridis, sed latioribus, & rarissimè ut aliorum erectis, sed plerumque mucrone languido & incuruo.

In montanis supra arcem Diui Georgii, herbido solo, & collibus Stamphen imminentibus, in Vngaria transdanubiana, aliquot miliaribus supra Posonium, primum observabat Clusius, genus illud cuius folia purpurascens colore circa radicem non sunt perfusa: deinde frèquentius utrumque genus in Leytenberg monte supra maderstorf, & siccioribus pratis Sopronio vicinis. Crescit etiam in collibus non procul ab Entzestorf in Lange-thal, Magnif. D. de Entzestorf. Floret Maio: sub lunii hinc semen maturum. Est mihi in Horto E.C. pulchra Iris primum visa Basileæ: postea Sturgardiæ in hortu Ducis Wirtemb. Basileæ in hortu Guarini florentem vidi Maio: folia vulgari Iridi ferè similia, caules magni, flores lutei, qui in repandis foliis pulchras habent strias violaceas: habui Basileâ & Sturgardiâ.

Iris maior latifolia Ochroleucus Clusio 28.

28. Iris maior latifolia 28. multa habet folia, inuicem


amplectentia, cæterarum fridum instar, vnciam lata, inter quæ pedalis geniculatus, teres, viridis exilit caulis, summo fastigio sustinens binas membranaceas vaginas ex viridi pallescentes, è quibus emergit flos reliquis Iridum generibus forma similis, colore autem diversus, nam ex albo pallescit, siue *αχρηνκος* est, & terna repanda folia ab imo ad extremas oras flavescentibus sunt distincta, fimbriâ albicante, sed quadantenus à bifidis foliis (quæ simili colore sunt prædita, gibba tamen dorii nonnihil purpurascens) integitur, flavescente: surrecta folia ab imo gracilia, internâ parte multis in latera sparsis venis obsoletè purpurascens sunt distincta, ubi verò sese in laxum expandant, *αχρηνκος* sunt coloris.

Nullum in hoc flore odorem deprehendi: sed eius stirpem Maio florentem observabat Clus. Francofurti in Myleri Pharmacopœi orto. Ei similem, nec vlla ferè in re differentem etiam alebat, soli flores discrimen faciebant, qui paullo candidiores videbantur. Non dubium est, multò plura inueniri maioris Iridis genera:

Iris maior latif. surrecta floribus solis flans & purpureis lineis distinctis Cl. f. 10.

Iris maior latif. 20. Clusio à Boissier missa, quæ *Iris Clusio* biennio post duntaxat florem tulit, a Decima ^{20.} nona, nec gracilitate caulis, qui in ramis etiam diffusus, nec angustia foliorum, nec r. l. ne differt: flores similiter magnitudine parces habet, sed diversi coloris: nam terna ad terram inflexa, diluti, & quidem obsoleti purpurei sunt coloris, multis saturatioris purpure venis à fimbria ad oras se spargentibus: fimbria flavis staminibus constata: terna illam regentia obsoletè flavescent: terna surrecta inferius angusta flaua etiam, sed purpureis venis distincta, latiore autè parte pallescentis coloris, quodammodo tamen suffulci, leuissimâ, & quæ vix apparet, purpurâ: Sambacianæ odorem refert, sed paulo grauiorem.

IRIS LATIFOLIA MAIOR SVSIANA VEL Chalcedonica, flore maiore variegato Clusio prima.



SENA aut OCTONA habet folia, Iridis Lusitanicæ bifloræ foliis non absumilia, mureo sese ut in aliis Iridum generibus amplectentia: è quorum medio caulis exit cubitalis aut amplior, rotundus, geniculatus, digitalis crassitudinis, florem sustinens omnium quos unquam in Iridibus con-

spexerim maximum, novem, ut reliquorum, foliis constantem, colore tamen ab illis differente:

nam tria ad terram inclinata folia crassa sunt, interiore parte omnino nigra, nisi quadam venæ ex purpura candicantes intercursarent, ab infima basi ad medium usque, nigri panni instar, medium folium occupante, foris multo dilutiora sunt: terna illa minora eis incumbencia quæ ligulas tegunt, fornicata & bifida sunt, & eiusdem ferè coloris, paulo tamen dilutioris, licet ad obscuram purpuram accedentis: tria surrecta, palmaris sunt amplitudinis, & membranaceæ panè tenuitatis, plurimis lineis ab infima basi ad extremum usque folium excurrentibus, partim nigricantibus, partim ex cineraceo candicantibus, ut Americani Pauonis expansam caudam ferè imitentur, internè circa vnguem nonnihil hirsuta. Nullum odorem in hoc flore deprehendi, sed solâ coloris varietate commendabilis est. Illi succedunt, sed raro admodum, capita trigona crassa, uncias tres, quatuor & quinque interdum longa, numerosum semen, rugosum, fuscum, Pisi ferè instar magnum, continentia.

Nomina

Iris maior latifolia sive Susiana Clusii, quæ ob floris amplitudinem & venustatem primum locum merito sibi vindicare videtur, Constantinopoli missa est *Alaia Susani* & *Alaga Susam* nomine cum hac additione, *flori belli pintati, ch'anno buono odore*, h. e. eleganter picti flores boni odoris: atque *sa. fi. r. bianco & negro*, id est, florem fert ex albo & nigro varium: elegantem sanè florem comperimus sed nullum gratum odorem deprehendimus. Ego [ait Clusius] quia ex Susa, Susianæ Prouinciæ Metropoli, primum in hortos Constantinopoli vicinos ultra Bosphorum stros illatam puto (nam id nomen indicare videtur,) Susianam nuncupo. Hiemis iniurias difficilior fert in horto reposita reliquis Iridis generibus, quod, ut & plerique alii, nostro damno experti sumus. Rarius etiam cæteris floret, & vnicum, ut plurimum, florem profert, Maio: semen maturum Iulii initio.

Lobel. Obs. p. 34. Iris Chalcedonica maxima variegata, luculente magnitudinis, maculis fortuitis, transuersis & obliquis, giluis, cinereis & puniceis, foliis tantillum, gladii ritu, vndantibus. Cætera cuncta Iridi vulgaræ aut Dalmaticæ similia. Vidimus Bruxellis. Plant. icon. p. 67. Iris Chalcedonica variegata L. 34. T. 92.

An Camer. hort. Iris Bizantina à C. D. Io. Aicholtzio communicata, quæ hyeme in fidelibus apud nos asseruanda est.

Tab. n. 1.

Tabern. icon. Iris Chalcedonica variegata *weilmurg mit mancherley farben eyfflein besprencht*. Item Iris Chalcedonica 2. *weilmurg von Constantinopel*. Quam intelligat Iridem Tabern. vel eius Compilerator nescio, non describit.

C. Bauh. Phyt. Iris 19. sive Chalcedonica maxima.

IRIS BIFLORA LVSITANICA florè violaceo Clusio 22.

Iris bifl.
Lusit. 22.

Iridi Lusitanicæ seu bifloræ 22. folia sunt vulgaris breuiora & angustiora: alioqui non valde dissimilia: in summo pedali caule flos est purpurascens vaginulis prominet, nouem, ut aliarum Iridum flores, foliis constans, violacei omnino, siue saturatioris purpuræ coloris, qui in inflexis & propendentibus foliis intensius nitet, viollosa illa fimbria quâ donata sunt, prorsus can-

didâ. Vnicum autem singulares caules plerumque florem ferunt, interdum, sed raro, alterum, rarissimè tertium, singulati quemque vaginula



inclusum, iuncundissimi odoris, & Oceananthem Liliū conualium cognominatâ & nulantis: conspectus aliquando mihi eius flos duodenis foliis constans, ut interdum Natura in floribus luxuriat: semen angulosum, rugosum, in triangulari capite satis crasso, sed rarius fert: radix illi subest, nodosa, geniculata,

lata, solida; pollicaris crassitudinis, gibba, intus candida, ingrati saporis initio, & paulo post feruidissimi gustus, multis fibris summâ tellure hærens, & subinde in plures propagines è lateribus nascentes diuisa.

Nascitur multis Lusitanicæ locis supra Tabum vel pingui solo & in aruis, ut circa Conimbriam, celeberrimam Lusitanicæ urbem, ubi illam florentem mense Nouembri eruebam, vel salebrosi & lapidosi locis, ut circa Caxcays maritimam urbem & portum, vnde delatam Olyssiponem, ad amicos, deinde in Belgicam misi, & inter chartas repositam cum aliis plantis ipse detuli: nam licet integro anno istic latuisset, terræ tamen commissa in horto Ill. V. Caroli Audomati, sequente Vere floruit, postea etiam Autumno, cuius rei causâ bifloram cognominavi.

Lob. Obs. & Ic. Pl. Iris biflora Lusitanica, an Astragalites Actii L. 3. c. 3. nostro Belgio, Hispanico delata solo, etiam inquilina facta est: Vere & Autumno florem odoratum violaceum, singulis caulibus cubitalibus & sesquicubitalibus, singulum aut alterum, villosa candore fimbriatum proferens: densa breuique radice, frangentique contumace, facie & foliis Dalmaticæ similis, sed magis sparsis.

C. Bauh. Phyt. Iris 13. Vere & Autumno florens.

Camer. hort. Iris Lusitanica biflora à Clusio depicta in Hispaniis & ad me missa.


Iris Illyrica biflora similis Clusio 23. flore purpureo.

Non multum à Lusitanica biflora (inquit Clusius) differre videtur, quam aliquando Venetiis accepit C. V. Io. Aicholtzius Iridis Illyricæ appellatione, in cuius cultissimo horto florentem Maio conspicebam. Quia enim aut sena ex singulis radicis capitibus promittit folia, illius foliis simillima: caulem, raro ampliorem, qui in summo è vaginulis purpurascens florem promebat Lusitanicæ forma persimilem, paulo tamen maiorem & tencriorem, nec adeo suavis odoris,

odoris, licet ad eum satis accederet: nullum ferunt obseruabam: *radix* nodosa & geniculata vt superioris, odoris, cum virens est, ingrati, exsiccata verò satis grati: & insipidi initio gustus, postea tamen feruidi, faucisque vrentis.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris 14. siue Iridi bifloræ affinis.

IRIS FLORE VIOLACEO FOLIO VIRENTE, an Clusii 25. caule foliis nudo.



Iris quædam est, foliis latis virentibus, ad colorem foliorum Spatulæ fœtidæ accedentibus, quæ striæ manifestæ percurrunt. *Flos* culmo insidet dodrantali aut pedali, totus violaceus, sex foliis constans alternatim repandis, iuxta quorum cilia partim alba, partim violacea, striæ albæ excurrunt, sur-

rectorum foliorum dorso singula singula apprimuntur ligula, extremo bifido. Inter surrecta verò & repanda folia apices oblongi, cærulei, farinacei, purpureis insident pediculis. *Radix* crassa, transversa, internodiis distincta, plurimis fibris crassiusculis ad summam basim donata: substantia molli, aquea, sapore amariuscule paulò post fauces vrente, nullo odore notabili virens.

Obseruata mihi primum in Vireto Nobiliss. D. Baronis ab *Aigle pierre*, cui ex Belgio allata dicebatur. Mihi ab hinc per plures iam annos in horto Ill. E. C. Montb. culta. Floret Aprili.



Considerandum an iam descripta sit Clusio Pann. sub Iride 7. siue caulifera purpurea. Et post. hist. sub Iride maiore latifol. 25. de qua inter alia hæc habet. Peculiarem autem habet hæc præter cæteras Irides notam, vt nulla folia per hiemem retineat, sed omnia haccrescant & exsiccantur, nudaque conspiciantur, deinde ineunte Vere noua germina proferat.

Casp. Bauhin. Phyt. Iris 12. siue hyeme folia amittens.

Iris maior latifolia purpurea caule nudo
alia Clusio 26.

Iris maior latifol. 26. Clusii, sine dubio ex eius semine, quod cum aliarum Iridum seminibus & multarum radicibus, ante aliquot annos in Belgicam ad amicos Viennæ mittebam, prognata est elegans Iris, quam ex Anglia rediens florentem conspicebam Augusto in horto Nobilis Viri Io. de Hoboke, archigrammatei Antuerpiani: per omnia respondebat 25. nisi quod folia circa radicem saturatius purpurascere mihi visa sunt: an porro hyeme folia amittat, me fugit.

IRIS HUMILIS LATIFOLIA COLORE
violaceo, & faxatilis eadem, nec valdè
similis, Clusio primum genus.
Chamæiris niuea.



Iris hæc pusilla planta-
la est, *radice*
crassa, alba, ru-
gosa, acri: à
qua folia exc-
unt aliquot,
Iridis vulgaris
foliis similia;
semunciam
lata, duas tres-
ue uncias lon-
ga: caules bre-
uissimi, qua-
drantales: *flos*
violaceus &
purpureus, vt
in Iride vul-
gari, sed per o-
mnia minor,
nec odore ali-
quo excellens:

Hanc sic tra-
dit Lobelius:
Mimica &
rarissima om-
nium Iridum:
radicis plexu,
substantia de-
sa & colore
Illyricæ non
abimilis, cau-
le verò nullo,
præsertim na-
taliis, folio
latiusculo ri-
gido, mucro-
nato, palinum
alto, cuiusmo-
di Gladioli:
flore, semine;
siliqua, Xyri-
dis fœtidæ.

Hæc mox quæ

de terra assurgit humilis remanet, proindeque nonnullis Chamæiris nuncupanda videtur. Ex quo eam è Montpelienti agro in Belgium & Angliam transiit, frigido humentique solo excepta non secus ac innumera calidarum regionum peregrinæ stirpes, soli & calit temperie varias subit mutationes. Caulis illi quippe dodrantalis nonnusquam pedalis, flores albi aut lutei, aut violacei, alibi caule vidui, dilute rubentes, violacei, striati, ex luteo pallentes, obseruantur. Cœmodam habet iconem Aduers. Iris parua, qualis spontè provenit. In Obs. aliam ad cultam siue sativam. Vtraque est Icon. Pl. pag. 64 cum his titulis 1. Perpulula Iridis latifolia varietas. Clusius pro modò dictis Iridibus Iconem aliam ponit, nempe eam quæ est Icon. Pl. p. 65. sub hoc titulo. Chamæiris niuea aut candida Lobel. 33. Teut. 91. De Chamæiride autem Latifolia, de qua hic agimus, scribit hæc Clusius in post. hist. Iridis genus humilius in Lusitanæ saxosis & mari-

nā aureā afflatis locis supra Olyssiponem obseruabam, cuius folia eiusdem ferē cum Lusitanicā biflora erant latitudinis, sed breuiora: radix illi similis, geniculata & obliqua: Flos mihi non conspectus, mensis enim erat Nouember, sed siliquas siue capita acuminata, inania in humili & vix suprà terram assurgēte cauliculo reperiebam triangularia, magna, pro plantæ proportionē. Similis verò plantæ semen ad Ill.V. lo. de Brancion missum est à Lobelio è Mompelio: ex quo natæ plantæ superiori ferē similes, quæ florem dederunt vel caruleum dilutiorem & quasi cælestem, ternis labris dorsum inflexis paulò saturatioribus, aut candicantem omnino, aut palentē, eumque modò dilutiōis & quasi exalbidi, modò saturatioris & ad flauū proximi coloris, aut purpureum siue violaceum, & illū etiam differentem: nam vnus color planē nigre violæ, alterius prona in terram tera folia, ab ipsa basi & exortu, ipsaque fimbriā flauā, albas & latis laticas venas ductas habebant, & variegatum Limacis dorsum ferē referebant: semen in triangulis magnis capitibus, Orobi magnitudine, pallidum, rugosum, oualis formæ. Omnium verò flos inodorus Aprili plerumque aperitur cum sequentibus.

Pro Iride sua latifolia Clusius ponit iconem Chamæridis nigræ aut candidæ Lob. Icon. Plant. pag. 65.

C. Bauh. Phyt. Iris 21. Dodon. hist. Iris minor. Clus. Hist. Iris humilis latifolia flore purpureo siue violaceo. Item Pann. Chamæridis latifolia maior coloris saturatioris nigre violæ. In hist. post. Chamæridis latifol. genus 1. Iris minor ex auctoritate plerumque purpurea. Item apud Matth. Germ. Iris syl. humilior purpurea maior. An Tabern. Icon. Iris siluestris minor latifolia Flein breytlererich himmel schwertel, cuius figura non placet.

Plurima, auctore Lobelio, oritur in agro Norbonensi, locis aridis & saxosis, secus specum illam sesquimiliare Mompelio distitam, via quā Frontignanā itur, in cuius, & rupium commifuris frequens adolefcit prope Ferulam.

Est mihi in horto E.C. Montbelgardii.

IRIS HVMLIS LATIFOLIA MAIOR
acaulis: Clusio Chamæridis latifoliæ
genus alterum.

Descriptio



Chamæridis [inquit Clusius] prorsus excaules, siue excaules, nunc describendæ restant, quarum videlicet flores nullo caule sustentur, sed succulentis & infirmis duntaxat pediculis inniuntur, vt Croci, Colchici, & similia. Istarum etiam duæ differentiz: Vna enim

majoribus latioribusque est foliis, Iridis maioris foliis latitudine vix cedentibus: Altera paulo minoribus & angustioribus, tamen Angustifoliæ Iridis, quam deinde describemus, foliis latiora sint.

Harum igitur maior breuius est foliis, intercedum tamen etiam pedalibus, Iridis vulgaris modo lactis, & secundum radicem magna ex parte purpurascens; inter quæ multi flores è vaginulis prodeunt singulari pediculo duntaxatque fulti, vulgati paulo minores, Lusitanicæ bifloræ æmuli, tum magnitudine, tum colore, qui saturatioris nigræ violæ est, præsertim tria folia terram spectantia, quæ villosam fimbriam, vique ad bifida illa, quæ ligulas tegunt, folia, ex caruleo purpurascens habent, sub ligulis verò, siue staminibus, luteam: omnia autem florum folia, tam quæ sursum attolluntur, quàm quæ repanda terram spectant, inferiore & sessili parte, albis quibusdam radiis variata sunt. Sunt autem eius flores, vel aliquantulum odorati, vel inodori: triangula capita magna, mucronata, in quibus semen orobi magnitudine pallescens, quod exsiccatum rigas contrahit & fuluescit: radix nodosa est, vt reliquarum Iridum, & adnatis se propagat. Alius semine nati est Boissolo Bruxellæ Chamæridis latifoliæ maioris genus, mari per omnia simile, præter florem, qui non purpureus, sed caruleus elegans fuit.

Icon quam Clusius exhibet pro Chamæride latifolia maiore ea est Ic. Plant. pag. 65, sub hoc titulo. Chamæridis latifolia flore rubello Lob. 31. Teut. 91. Non est acaulis quamuis talis in descriptione dicatur ipsa planta.

Lob. Obs. Irides Austriacæ humiles speciosius rubris floribus & violaceis odoratis Clariss. viro D. Brancioni Viennâ misit Clus. vna cum Chamæride purpureo odorato flore.

IRIS HVMLIS LATIFOLIA MINOR,
& eius varietates quinque.



Chamæridis latifolia minor Clusio recte, breuiora angustioraque, paululum sunt folia, qualia Chamæridis latifoliæ Hispanicæ aut Gallicæ, de quibus miris huius capitulis flores paulo minores: capita triangula & mucronata etiam minora: semen minus. In floribus summa varietas: licet ferē

omnes fimbriæ villosæ supra stamina caruleos habeant; infra verò vt in modò dicta luteæ. Ex his verò paucas duntaxat adnotauimus, nam omnes, valde difficile.

Vna saturatioris purpureæ colore nitentem habet florem, intercedum etiam dilutiorem, illumque odoratum, hunc minimè: ternis foliis quæ attolluntur

luntur & inflexa quodammodo supernè se mutuo contingunt; in utraque, modo orbiculatis, modo longioribus & bifidis.

Altera odorato est flore, cuius inferiora labra nonnihil purpurascunt, surrecta verò cærulei sunt coloris.

Tertix flos quodammodo rubet, interdum diluore & suavi quadam rubedine velutque carneo colore præditus est, præsertim foliis sursum erectis: villosa fimbria superior pars albicat, inferior lutea est: est autem odoratus, aut inodorus. Horum omnium stamina cærulea.

In quarta floris color pallescens, nonnunquã exalbidus: folia sursum spectantia ab ipso statim exortu in viroque genere purpurascens quibusdam lineis decorantur, deorsum verò inflexa, in pallescente exalbida sunt, in albicante autem viridi colore perfusa: pallescens item Oxycanthæ vulg. floris odorem prorsus æmularur: alterius etiam odorus.

Quinta solo floris colore à Quarta differt: is enim flavescit, & superiora folia purpurascens virgulis siue radiis exornatur, propendens labra vel nigricante, vel dilutè purpurâ in medio infecta sunt: odoratus huius etiam est flos. Stamina porro huius & quartæ alba sunt. Omnium verò foliola stanina & fimbriæ, magnam partè regentia, bifida sunt, binasque pinnas surrectas, vt ea quæ in Iridibus bulbosis, habent. Purpureæ præterea, albæ, & versicoloris folia secundum radicem plerumque purpurascunt.

Nascuntur omnes in nudis & apertis collibus Pannoniæ & Austriæ. Cæterum tamen insignem, inquit Clusius, varietatem ex semine deciduo spontè gigni non est dubium. Nam versicoloris semina à me in hortulo terræ commissa (illius enim ob floris elegantiam periculum facere volui) & pallidas, & albas, & versicolores matri similes protulerunt, & alias præterea ad eam quidem accedentes, sed leuibus quibusdam notis inter se discretas, quales verbis exprimere difficillimum, verèquè de iis illud Poetæ dici posse existimem:

facies non omnibus vna,

Non diuersa tamen, qualem decet esse sororum.

Clus. pro Chamæiride latifolia minore, prima, excauli, iconem proponit cui caulis foliatus, quæ in Iconibus Plant. pag. 62. posita est sub inscriptione Iridis violaceæ parua Lob. 3. T. 89. Est etiam cum caule apud Clusium ic. cui super scriptum, Chamæiris latifolia minor 4. quæ Icon. Plantini pag. 66. inscripta, Chamæiris altera lutea T. 91.

Iris humilis latifolia minor tenerima; Clusio Chamæiris latifolia minor sexta.

Chamæiridem latifoliam minorem sextam infra Budam in Pannonia Mæsiæ finitima Decembri erutam, dum Constantinopoli Viennam rediret Ianuario sequente mihi (inquit Clusius) Stephanus von Hausen dono dedit, quam propter teneritatem fictili credidit, & ad eò diligenter fouit, vt Maii sequentis initio florem dederit: à Latifoliis autem minoribus iam descriptis nec radice differt nec foliis, quæ circa radicem non purpurascunt: nec eius flos illarum floribus dissimilis est, plurimum enim ad Quintam genus accedit: labra tamen propendens obsoletum colorem pallido permixtum habent, & ab eorum ima parte vsque ad extremam fimbriam quæ pallida est, purpureæ excurrunt venæ: pinnata

Tom. II.

terna folia quæ alba stamina tegunt, ex pallido albescent: sursum verò erecta pallida sunt, circum tamen obsoletè purpurascens radiis aspersa. Illo quidem anno *Chamæiris* fuit. Sequente tamen breuem admodum caulem, vix ternos digitos supra terram eminentem habuit, cui infederunt bini flores. Eam cum reliquis ferè Iridum generibus, & selectissimis quibusque aliis stirpibus penitus corruptit anni 1585. asperissima hyems. Cæterum apud Belgas multò plura Chamæiridis latifoliæ genera aluntur, semine nata, præsertim Bruxellis. Inter cæteros autem Ioh. Meitens, illius virbis Medicus, diligenti cultura summam in ista stirpe varietatem adquisuisse perhibetur. Aliquot eorum genera communicebat mihi 1590. anno N. V. Io. Boissot: sed cum quædam perierint, an cum superius descriptis illarum aliquæ conueniant, nihil affirmare possum: duarum tamen quas conseruaui, & quæ biennio post florem dederunt: vt quarundam etiam aliarum, quæ in meo horto spontè nata; eodem anno floruerunt, historiam adiciam.

IRIS HUMILIS LATIFOL. MINOR ELE-gantiù. variè picta, Clusio Chamæiris 7.



re caput, quod pluuiæ corruperunt. Florem cum aliis Chamæiridibus Aprili dedit nulla odoris gratia commendabilem.

Clusius iconem nouam proponit.

Iris humilis latifolia minor flore vario eius foliis valdè incuruis: Clusio Chamæiris 8.

Chamæiris latifolia minor 8. auctore Clusio, aliquam affinitatem habere videtur cum septima siue elegantissima ei spontè nata Fracofurti: florem cum aliis dedit Aprili. Nouem autem vt reliquæ folia habet, quorum tria deorsum inflexa & terram spectantia, longa, & præter reliquarum Iridum morem ad eò incurua sunt, vt extremo mucrone floris pediculum auersa parte amplectantur: colorem verò habent infimâ partè flavescentem, deinde dilutè purpurascens, saturationibus tamen venis distinctum, ab infimâ basi & villosâ fimbriâ candicante, flavescentibus apicibus donatâ, quam integi bifidum foliolum exalbidi & pallescentis ex dilutè cæruleo colo-

PPP x

Chamæiris 7.

Descriptio

ris, quali etiam surrecta tria sunt folia: odor ferè florum Sambuci aut Thalictri.

*Iris humilis latifol. flore pallido, albucan-
te & vario, an Clusio Chamæiris
latif. minor. 9.*

Locus. Est nobis Montbelgardi in horto Ill. E. C. Iris parua latifolia flore ex luteo pallido & albicante ac vario, quæ nobis missa Vezuntione à D. à Belle fontaine: Eam prius videramus non longè à Marnant in Burgundia in horto Nobilis ab Aigle pierre anno 1588. florebat Aprili.

Tempus. Considerandum an hæc non tradatur per Clusium in post. hist. pro Chamæiride latifolia minore nona, de qua ait: Quam à Iacobo Plateau accepisse scribebat Boissotus, radice, foliis, floris formâ, cæteris Chamæiridibus erat similis. Eius tria folia terram spectantia *ἀνθεράκια* erant coloris, ab imo ad extremam usque fimbriam purpurascens radiis aspersi: sub fimbria verò, quæ folium sese magis pandit, purpureâ maculâ erant notata, radiatim in latera se spargente, oræ autè erant exalbide: fimbria ab imo ad folii inflexionem flauis villis constabat, ubi verò purpuream maculam attingebat, albis: bifida folia eam regentia alba erant, quemadmodum & terna folia sese attollentia, sed neruus medius in utrisque *ἀνθεράκια*, infima pars surrectorum foliorum obsoleta purpuræ radiis distincta, suprema verò, internè paucis notis leuiter purpurascens infecta: expers autem licet odoris, coloris tamen gratiâ non carebat. Illi non dissimilis spontè nata Francofurti, quæ eodem anno flores dedit.

*Iris humilis latifol. minor flore vario
violaceo, Clusio Chamæiris 10.*

Chamæiris latif. minor Clusio 10. Chamæiris latifolia minor 10. mihi, inquit Clusius, Francofurti nata non inelegans, quæ semipedalem cauliculum proferebat, teretem, geniculatum, summo fastigio gestantem membranaceum folliculum purpurascens oras habentem: è quo emergebant bini flores non magni: nouem etiam foliis constantes, quorum tria repanda basi erant angustâ, foris purpurascens, internè autem candicante, & saturæ purpureæ venis distinctâ, usque ad folii inflexionem: labra verò propèdientia ad eam saturi violacei coloris, ut quodam modo nigrescere viderentur: fimbria villosa flauescens infimâ parte, reliquâ purpurea erat: terna eam integritatè purpurei erant coloris, veluti & terna surrecta folia: nullâ autem odoris suauitate commendabilis.

*Iris humilis latifolia minor flore vario, foliis
inflexis candicantibus, Clusio Chamæi-
ris latifolia minor 11.*

Clusius scribit Francofurti sibi natam Chamæiridem latifoliam minorem vndecimam non inelegantem, quæ à tuberosa radice dodrantem aut pedem longa producebat folia, instar eorum quibus aliæ Chamæirides sunt præditæ, lata videlicet & mucronata: inter quæ assurgebat cauliculus duas aut tres uncias longus, sustinens summo fastigio, veluti folliculum binis membranaceis foliis constantem: è quo prodibat flos nouem foliis præditus eiusdem formæ cum aliâ Chamæiridum flore, quorum terna versus terram inflexa, latiora, candicantique coloris erant,

ab infimâ sede (quæ angustior) multis venis ex flauo purpurascens in latera expansis distincta, usque ad extremam fimbriam, siue supercilium, usque deinde à supercilio ad extremas oras: quæ albescens, crassioribus, & coloris purpurei micidioris: terna verò surrecta, quæ inter illa nascebantur, infimâ parte valde erant angusta, venis quibusdam furci & luridi coloris distincta, postea in latum se pandebant, tenerimæque erant, & exalbidi coloris: terna reliqua, quæ breuiora & in fornem conuexa, bifidaque erant, aliquantulum reflexis sursum alis, ligulam pallescentem tenebant, & fimbriæ siue supercilio trium propendentium & terram spectantium foliorum imminebant, colorisque erant albi, cui subcaruleus color nonnihil admixtus, præsertim in ipso gibbo: odor nullus aut ualde exiguus.

IRIS ANGUSTIFOLIA MINOR Clusii quarta.

Est nobis Iris angustifolia sicca ex plantis Valerandi Dourez, dodrantalis, ac etiam minor



& maior: radice obliqua torosa, sub qua crassæ fibræ albæ: veterum foliorum vestigia multa, folia autem angustâ graminea in acumine desinencia: caulis ipsis foliis breuior, in cuius summa parte magna capita, seu silique, quales in Xyride siue Sparhula vulgari, ex tenui vagina prodeuntes: Quarta Clusii, nec foliorum, nec florum formâ nec capitibus, seminibus, aut caule, & radice differt à Tertiâ: humilior est duntaxat, eius etiam flores paulò minores, & angustiores, meâ quidem opinione, atque etiam dilutiores. Primæ tamen floribus saturatioribus. Illi porro Iridis marinx minoris nomen est impositum, quoniam non nisi locis maritimis spontè proveniat.

De hac censemus scribere Lobel. & Pen. Adu. his verbis: Iris maritima Norbonensis, an Medium Dioscoridis? &c.

Hæc autem planta eadem videtur cum Xyride maritima Hist. Lugd. de qua hæc tradit: Inter permulta & varia purgantia quæ in littora fluctus ciuium, planta hæc sæpius reperitur, quam Xyrim marinam vocant Herbarii. Radice est longa, crassa, geniculata, cortice rufo obducta, multum fibrata: caule pedali, foliis vndique aggestis operto, longis, virgatis, in acumine mucronatis. In caulis fastigio tres quatuorve filique prominent, & ipsæ rufescentes, angulosæ, seminibus fardæ velut compressu dilatatis, rufa membrana contextis, perspicua tamen vtrinque macula in medio nigra: cum manduntur lignosæ & duris, gustu subatringentibus.

Nascitur hoc genus Clusii quibusdam Hispaniæ & Galliz Narbonensis locis maritimis, veluti non procul Valentia, & monte Setio vnde in Belgium delatum, suâ varietate hortos istuc exornat, non minùs quàm Austriacos, Clusii operâ istuc è Belgio accersitum nam illo genere carebant Austriaci.

IRIS GRAMINEA CUI PEREVNT
quotannis folia.



P Vlchrum quoq; sui spectaculum oculis offert in tanta Iridum varietate, & hæc pusilla, ex cuius radice inodora, tenuiore & graciliore quàm cæterarum Iridû, nodosa, nigro cortice tecta, obliqua, breui tempore, magnum cæspitè occupante, vt eum difficultate erui queat, tales palmarum tenues sur-

riguntur: flor amœnus è subiecto calyce sex profundis sulcis, toridèque acutis porcis exarato, emicat, foliis quidem senis aliarum more confans, sed multum diuersis: primum enim tria extrema folia repanda, extremâ orâ albis violaceisque striis obliquis variata sunt, inde contractius folium quasi ex isthmo eluctatum paulatim latèscit purpurascens in lateribus, nullâ in medio hirsutâ fimbriâ, cuius locum supplet linea lata lutea triis purpureis picta, cui extrinsecus respondens costa ex luteo virefcit: hisce incumbant similiter repanda tria illa bifida folia, quæ in medio quidem è viola purpurascunt, à lateribus autem è diluto rubore fere cinerea sunt, quibus auersa parte apprimuntur stantina latiuscula cultrata coloris ferruginei: hisce alterno positu interiecta sunt tria reliquis minora duplò folia, colore violaceo, neutiquam in summo, reliquarum more cœuntia, sed apicibus conuolutis à se inuicem dissita. Odor nobis gratus Prunorum, & Clusio Armeniaci mali. Succedunt capita sublonga & turgida, valde eminentibus costis prædita: Hanc vocamus gramineam propter folia tenuia angusta valde, non rigida, virentia, longa, & quæ hyeme accrescunt. Clusius ait se huius Iridis duas differentias deprehendisse, vnam pedalem interdum adquirere caulem teretem, binòque aut ternos in eo plerumque gestare flores, Alterius caulem vix dodrantalem superare altitudinem, & vnicum, magna ex parte florem proferre.

Est hæc Iris illa Illyrica ab Hermolaò visa Paduæ in horto Fœlicis Sophiæ odore Pruni præmaturi.

Cord. Obs. sylu. Herba Irinis foliis Ollingero ex Italia pro Iride Illyrica missa. Iris silu. altera Matthioli est foliis Gladioli longioribus, radice tenui, lignosa, geniculata, subrusa, inodorâque: Tom. 11.

caule breui, flore cæteris longè minore, odore Armeniaci Mali. Constat hic foliis nouem purpureis, quorum extrema, superiore tantum parte aureis pinguntur lineis: sunt qui hanc legitimam Illyricam putent, in quorum sententiam etsi iam pridem deuenierim, tamen rem longè aliter se habere postmodum comperi. Quandoquidem præferri Illyricam nouerim non quòd genere vel specie à nostrate differat, sed quòd cœli, folique illius conuenientia præstantioribus polleat facultatibus, quod docuit ante Galenû Theophr. l. 9. c. 7. Scribitur iam Iris sylu. altera dicta, & in hortis frequens est, tum ipsius floris amœnitate, tum coloris præstantia, tum etiam quòd nouis delectentur homines. Sylvestris vtriusque generis plurima oritur in Goritensi agro Saluatino monte, & Iapidiz collibus inter saxa, odore non ingrato, quamuis etiam ambas viderim in campetribus, non longè à Sontis ripis. Iridem esse Illyricam Hermolaus Barbarus existimauit: sed ab Illyrica & legitima Iride eam differre, Antonius Muza in Examine simplicium, satis ostendit.

Nos (inquit Dodon. h. fl.) Chamæiridem nuncupauimus, antiqua desinitum appellatione, nisi forè Iris sit Astragalites dicta, cui aliquatenus similis est. Iris perpusilla silu. angustifolia Lob. Obs. quam iamdiu descripserunt, & vocarunt Chamæiridem Herbarti nostri, foliis gramineis, rigidis, spichameis & pedalibus, pusilli gladioli similibus, floribus expassis, cæruleo-lanceis, aliquando purpureo-lanceis, nouem foliolis confatis: caulis palmaris & dodrantalis: radix gracilis, minimo digito duplò minor, acris, gustu Xyridis: in Germania & Belgio frequentior prouentus. Chamæiris autem inter Irides minima est, folia habet Gladioli minora, angustiora, pinguiora: radices foris ruffæ, intus candidæ, duræ, gustuque feruentes. Considerandum an sit minima Iris & folia an sint pinguiora quàm Gladioli, nobis non videtur.

Plant. Icon. pag. 69. Chamæiris angustifolia Lob. 34. Tent. 97.

Peregrina Iris Dod. non modò Belgio aut Germaniæ, sed & Italiæ, vt fertur, est: non nisi in Locis & in hortis reperitur. Floret Maio mense: folia tempus. hyeme pereunt: Vere erumpunt noua. Prouenit vtraque passim in pratis Viennæ Austriæ vicinis ad radices montium sitis, præsertim quæ in altiore caulem assurgit, pluresque flores profert, nec differre putat Clusius (minorem saltem) ab ea quam Dodonæus Chamæiridem simpliciter, Lobelius autem Iridem perpusillam siluestrem angustifoliam, appellant, Belgicis hortis iamdadum familiarem.

Est nobis in horto Ill. E. C. Iris quædam parua cui folia hyeme accrescunt. Genevæ in hortis habent: folia producentem ibi vidimus Martio & florentem Maio: Genevæ adferendam curauimus & plantandam in horto E. C. ubi nobis floruit etiâ Autumno: Lugduni habebamus in horto, nec non alii: Placentiæ in Italia obseruau in hortis, & Basileæ, audiui qui vocarent Grassilgen, Lilia graminea: quibusdam Cosmofandum dicta fuit.

Facultate & vitibus hæc Iris acris & impensè calida est, aliisque Iridibus similis.

IRIS TENVIFOLIA MAIOR FLORE
cæruleo & striato, Angust. 1.


P Lurimum differt huius radix ab aliarum: Est enim & compluribus fibris albis, cum non- Descriptio
Ppp 3

Illyrica dicitur
ferentia.

Contra
Hermol.
Chamæiris

Dodon.

Descriptio



cultantia: reliqua tria violacea surguntur.

Plant. Icon. p. 69. Iris sylvestris Byzantina per-
ramœna. Teut. 97. Falluntur qui Irin n. siue angu-
stifoliam mediam, siue variam Irin angustifoliam
Pannonicam Clusii vario flore, Constantinopo-
li collectam putant, & idē aut Illyricæ maioris,
aut silu. Constantinopolitanæ cognomen illi in
Belgica dederunt: cum Clusius non inde adue-
ctam, sed in vlginosis pratis vrbi Viennensi vicini-
is erutam, & ipsius semina in Belgicam miserit.

Iris angustifolia altera quæ perelegans est nul-
libi Clusio Hist. post. fuit inspecta antē quā in
Austriā proficisceretur: habetque cubitalia, in-
terdū etiā longiora, folia, admodū angusta, mini-
mi digiti altitudinem non excedentia, viridia, nō
tamen splendentia, summā parte mucronata, in-
fima verō quā sub terra latent, purpurascencia,
nullo ingrato odore, vt pleraque aliarum angu-
stifoliarum, prædita: caules habet sesquicubita-
les, nonnunquam bicubitales aut ampliores, re-
ctos, teretes, firmos, licet intus cauos, genicula-
tos, virides, summo fastigio in binos, aut ternos
ramulos diuisos, quibus insident bini aut terni
flores, Iridis bulbosæ versicoloris latifoliæ flo-
ribus formā similes, odorati: quorum tema fo-
lia deorsum inflexa, infimā parte, & quatenus bi-
fido alatoque folio ligulam occultente teguntur,

nulla actimo-
nia adtrin-
gentibus con-
flata: folia au-
tem cubitum
aut sesquicubi-
tū longa, semū-
ciam lata, quæ
attritu olera-
ceum quid re-
dolent, acumi-
nata: caulis fo-
liis longior,
teres, in tres
aut 4. furculos
diuiditur, quo-
rum singulis
singuli mūdēt
flores, Chamæ-
ridis herbacea
magnitudine,
sed amēniore
elegantia: quo-
rum tria folia
rependa per
extremitatem
violacea sunt,
inferius paullo
albo violaceo-
que variegata,
nullā fimbria
Zonulæ vic-
cariā donata,
sed pulcherri-
mis Iridis lōgis
obliquis, vio-
laceis, albidis,
ferrugineis pi-
cturata: hinc
tisia bifida su-
pra posita pur-
puroviolacea,
ligulas atro-
purpureas oc-
cultantia.

Clus. in Pann. & post. hist. præter modō dictam
Iconem aliam habet, cui titulus Iris angustifo-
liæ 2. species altera, quæ non parum differe vide-
tur, licet in descriptione nulla fiat differentia
mentio.

Iridis angustifoliæ siluestris varietates, Belga-
rum sedulitate in nostris hortis (inquit Lobel.
Obs.) culæ visuntur, angustifolia & latiore folio
sesquicubitali Irides: sed vtique flores
terni & quaterni iuxta cauliculi cubitalis ra-
mulus, cæteroquin cum superiore haud absim-
iles. Eas videntes primū videndi copiam fe-
cit in suo viridario peritissimus Allardus Ruerius
D. Medicus Insulanus: postea Joh. Doune/ aliā
vogelsang: alique non pauci. Quas Irides in-
telligit Lobelius cerrō affirmare non possum.

Primum illam spontē prouenientem, non pro-
cul Vienna Austriæ in pratis supra Himbergam,
Eberstorf ad paludes, atque Austriæ pratenibus
locis (ait Clusius) reperiēbam. Mittebat postea
ad me illam siccam, in Sudetum montibus eru-
tam Ludo. Camerarius. Anno verō 1579. fre-
quentissimam circa Sackturniam Ill. Comitis de
Zrinio arcem, aliisque pratis vlginosis inter Mu-
ram & Drauin Hungariæ Cisdanubianæ flumi-
na, quemadmodum etiam in Comitatu Saladien-
si inter Lindvva & Mulam fluuium obseruabam.
Floret & semen profert eodem quo superior
tempore. Iris hæc tenuifolia maior habetur in
Horto Ill. E. C. missa Sturgardiā.

IRIS ANGVSTIFOLIA FLORE ALBO.



Irin candidis
floribus an-
gustifoliā, Lob.
Adu. par. 2. Iri-
di Clusii voca-
tæ, siue Iridi
angustifoliæ
Clusii secundæ
similem in pen-
silibus Adoni-
disque hortis
alebant Medio-
castri Mattia-
corum D. Cor-
nelius Coorue,
sesquipedali-
bus aut pōte
longioribus fo-
lis, parum di-
gitum latis, in
sesquipedali
aut bipedali
caule,

caule: floribus albis aspectu suauissimis donato, quorū terna repāda folia latiora venis siue neruis suauē rubentib. iucundē insignita sunt, nec non oris perpolitē breuioribus lincis concoloribus striata: aliis verō incumbētib. ternis, & totidē angustioribus surrectis foliis penitus candidis. Radice Iridis Clusii vocata, siue angustifoliæ secundæ non absimili, multis fibris donata. Francoalle, vulgò *Franckelal* à Nicolao von Brabāt in Belgium primū missa.

IRIS TENVIFOLIA FLORE VIOLACEO,
an Clusii tertia?

Hanc apud D. Platerum vidi, *f. lio* duriore, solidiore, rigidiorēque, quā Iridis gramineæ, colore glauco Iridis vulgarioris, longitudine cubitali. *Caulis* cubitalis, *flores* gent intense purpureos, paucos, foliis non ita vt vulgò videmus, reflexis, instar florum Iridis gramineæ: cui etiam similes sunt subsequeutes *su que* angulose. Nos Basileā Montbelgardum in hortum III. E. C. Wirtemb. transfuimus.

Considerandum an hæc sit Iris angustifolia tertia Clusii hist. post. de qua scribit: Ex radice nodosa multa producit folia firma lōgiora quā secunda, & prioris foliis magis angusta, saturaque viriditate prædita, nonnihil etiam fœtida: inter quæ cubitalis assurgit caulis, firmus, aliquot flores proferens, Secunda floribus longiores, & Primæ floribus pænē similes, sed longē saturatiore purpurā & quasi nigrā præditos: quibus succedunt capita primæ capitibus similia, semine etiam simili plena: radix, vt dictum est, nodosa, dura, foris nigra, minimi digiti crassitudine, interna parte ex albo flauescens, antrosum & in latera progrediens, aliarum angustifoliarum Iridum instar, & tandem veluti in orbem sese spargens (quod omnibus Iridibus est commune:) multis fibris donata gracilibus, duris, siccis, lentis tamen, & fractu contumacibus, quarum anteriores & nouellæ crassiores, molliores & candidæ. Cæterum huic suæ Iridi tertiæ Clusius Iridis marinæ maioris nomen indidit quoniam iisdem in locis cum quarto proveniat.

An Dodon. Hist. & in fol. Iris quam minorem siue tenuifoliam appellant, aliis quidem similis, sed minor aut tenuior, quæ folia habet breuiora, angustiora, nigrioraque, aut cæsi quasi coloris, quæ conficiata, grauiusculum reddunt odorem, Spatulæ fœtidæ propemodum persimilem, sed tamen min⁹ grauiorem: caules similiter breuiores, sæpē vix cubitales: in quibus flores bini, terni, alterni, colore cæruleo saturato, subinde Violaceo purpureo, formā aliarum Iridum propemodum similes nisi quod ipsius foliola singula angustiora sint, & superiora contrā in se mutuo nō adeo recuruentur, sed ferē erecta cōstant: inferiora verō ac deorsum reflexa fimbriam non habeant, sed solam lineam hincam: quā tamen parte calyci proxima, nonnihil hirsuta est: radices quoque oblique, nodosæ, & sibi inuicem implicite, & quandoque quādam allaram densiores, lōgas, multasque fibras inferius de nitentes, foris rufæ, intus subcandidæ aut subluteæ, gustu feruido, vt aliarum.

Nascitur in Germania, teste Valerio Cordo, & non procul. Floret eodem quo aliæ tempore. Videtur nonnullis Plinii Rhizotomos. Sed Rhizotomos Illyricæ est species & quidē præstantior, Plinio auctore: hæc verò contrā aliis o-


dore & potentia inferior, nec in Illyride sed in Germania reperitur: proinde non Illyrica, aut Rhizotomos, sed sui generis Germanica & tenuifolia quædam Iris, quæ Spatulæ fœtidæ species haberi possit si semen quod in siliquis gignitur, non vt aliarum Iridum planum, sed velut Spatulæ fœtidæ rotundum esset.

Cæterum potentiā huius radix vehementer calida feruēque est, facultate & viribus aliis Iridibus non inferior: ad eadem, ad quæ illæ, ea propter, præsertim recens, vt ilis.

Vt verū fateamur Iridem Dodon. non possumus asserere eandem cum Clusiana 3. quia ip. à Dodongo proposita pro Iride minore, à Clusio ponitur pro Iridis angustifoliæ 2. specie altera: præterea ignoramus an eadem sit cum Cordi & Gesneri Iride tenuifolia.

Facilem:

IRIS TENVIFOLIA MICHELFELDENSIS
spontanea: fortē Clusii Angustifolia
maior siue prima.



Frequens est in palustrib⁹ Michelfeldensis prope Basileā spontanea quædam Iris, *caule* duos cubitos superante: *flore* magno satis, cæruleo, vel purpureascente, *siliqua*, magna, longa, foliis cubitalibus, angustis, angustioribus inquam, quā Gladioli. Hanc nobis Fr. Casp. Bauhinus loco dicto collectā misit.

Descriptio

Considerandum an hæc sit Iris tenuifolia Cordi H. pl. [quæ Gesn. annotante, non procul Tiguro nascitur] tenuior satia, siluestri & Xyride, foliis dodrantalibus aut pedalis, semenciā latitudine nunquam superantibus, plurimis à dēso radicū cæspite assurgentibus. Caules satia Iridi similes profert, multo tamen graciliores, in apricis pratis cubitales, in frutetoso verò proceriores, flores foliorum numero positi & forma satia similes habet, nisi quod minores magis; purpurei sint, & flaua erucæ simili lanugine careant, cuius vices occupant: iuxta singula tria inferiora & inflexa folia, totidem liuentis in purpura coloris stamina. Radices subsunt multæ, transuersæ, graciles, in superficie nigricantes, & propter vetustas foliorum reliquias villosæ, intus candidæ, sibi ipsis implicite, à quibus prædictarum Iridum modo exeunt fibræ & Cirri: erita, recentis adhuc folia medium inter syluestrem Iridem & gramen odorem spirant: Radices verò præscriptarum more fauces exiunt. Nascitur in apricis planisque pratis, & frutetosis ac humentibus campis &c.

Hæc puto (inqt Gesn. hort.) est quæ in pratis humidis quibusdā apud nos crescere copiose: & feminæ quoque profert, Illyricæ similis, vt audio: com-

munii vrbana vndique minor. Eadem in hortulo meo iam aliquot annos durat. Ab hac differre puto duas siluestres à Matthiolo exhibitas, in montibus & collibus laxosis nascentes.

Tragus, fortè hanc tradit his verbis; In quibusdam humectis pratis & campis, quæ Rheno prope Vormatiam, & Oppenheimium oppida, adiacent, Gladioli cærulei quoddam genus inueni, cuius flores aequi penè coloris, sed cum cæruleo mixti videbantur esse, ternis versus terram inflexis foliis singuli præditi. Cæterum quod ad reliqua attinet, hoc est, folia, caulem, & radicem: Iridi de qua sequenti agemus capite, per omnia accedit hic Gladiolus, nisi quod tota sua substantia magis exiguus, & angustioribus foliis & acutioribus illà esse deprehenditur. Semen fert in oblongis ac triangularibus siliquis, non aliter atque Gladiolus luteus. Inter omnes Gladiolos nullus sanè extat, qui mihi quidem apertius ad Xiphion seu Gladiolum Diosc. referri posse videatur, quàm hic ipse Gladiolus cæruleus exiguus, quem Germani *flein blat* & *Schwerel* vocant.

Iris angustifolia maior Clusii Hispan. Iris 10. Pann. Et Hist. post. Iris angustifolia prima & maior, quæ multa profert folia longa, rigida, angusta, nigra, quæ compressa vel contracta, ingratum tetrumque odorem spirant, propemodum vt Spatulæ foetidæ vulgò appellatæ folia, minùs tamen graucolentem; inter quæ caules teretes, oblongi & cubitales, interdum etiam longiores exurgunt, quaternos aut quinos flores ex vaginulis lateralibus prominentes; Iridis bulbosæ versicoloris floribus formà non admodum dissimiles, colore cæruleo saturatiore præditos, quibus succedunt oblonga capita trigona subrufa, multò firmitiora, magisque cartilaginosa, quàm latifoliarum Iridum, his paria quæ in Tripolitana, angulis etiam eminentibus, & quodammodò geminis, quæ dehiscentia, semen duplici serie digestum, aliquantulum compressum & angulosum, ossæque duritiei, subrufescente membranà rectum ostendunt: radices obliquæ, longæ, nodosæ, graciliores quàm in latifolia, Tripolitanae radicibus æquales, foris nigricantes, intus candicantes, aut pallescentes, sapore acri & feruido, multas longatque fibras spargentes. Istius genus inuenitur, iam descripto per omnia simile, præterquam quodd in eius foliis contractis nullus grauis odor percipitur.

Locus.

Primi generis primùm conspiciebat in Belgicis hortis cultam, deinde anno 1561. plurimam spontè nascentem in amplissimo quodam prato, flumini Rheno vicino, viâ quæ Mogutiâ Oppenheimium ducit, obseruabat: aliquot deinde post annos, herbosis quibusdam locis iuxta vias, & ad quorundam pratorum margines non procul à Manderstorf, quinto à Vienna Austriæ milliari, atque etiam apud Walterstorf: postremum anno 1597. in pratis quibusdam Hungariæ apud Lindvva Ill. V. D. Banasy arcem.

Floret vtrumque genus Maio, interdum duntaxat Iunio, si asperior hiems præcesserit: semen maturum est Augusto.

Iris angustifolia flore violaceo, reflexis foliis lacteis, & purpureis venis variis. Clusii s.

Iris angust.
5.


Iris angustifolia quinta nec foliorum forma, nec radicibus multum differt à maiore marina: nisi quod folia habere non videatur tam atra viridi-

tate prædita: flores etiam plurimum differunt: nam tria surrecta folia purpurei sunt coloris & violacei, tria verò reflexa, & terram spectantia paulò latiora sunt, & multis lacteis purpureisque venis alternatim permixtis ab ipso folii vngue exorientibus, atque secundum longitudinem & in latera se spargentibus, gratissimam varietatem efficiunt. Floret cum marinâ, seriùs primâ, Iunio videlicet mense, semen maturitatem adquirat Septembris initio. Hanc spontè nascentem non vidit Clusius, sed in Belgicis duntaxat hortis cultam obseruabat.

IRIS TRIPOLITANA. FOLIIIS longissimis flore aureo.

Proximis annis (inquit Clusius) Tripoli adferebatur Iridis genus quod 1599. florem protulit Amstelredamensi Ciui, qui eius caulem cum flore & siliqua ad me mittebat Iunio mense: ipsam etiam plantam biennio antè mihi communicauerat, quæ quidem etiam nunc viget, sed florem nondum tulit: Est verò hæc Iris Tripolitana è celsiorum aut altius affurgentium genere, folia habens reliquis quas cospexerim multò longiora, bicubitaria videlicet, mediæ inter latifoliam & angustifoliam latitudinis, vnciam videlicet lata, reliquarum Iridum foliis magis viridia, non tamen splendentia, vt Xyridis: caulem habebat inter folia prodeuntem, quinque pedes longum, vel etiam longiorem, rotundum, firmum, licet non valde crassum, nodosum, & aliquot breuioribus foliis præditum: in cuius summo bini & terni flores è vaginis prodeuntes, nouè foliis in ambitu quodammodò sinuosis, constant, Iridis bulbosæ flauo flore floribus formà non dissimiles, aurei coloris, quorum tria maiora versus terram valdè reflexa, & iis incumbentia tria alia minora alata ligulam flauam regentia, tria reliqua è lateribus maiorum prodeuntia, affurgent instar illorum quæ in Iridibus bulbosis conspiciuntur, bifidumque mucronem habebant: floribus successerunt trigona capita, in singulis lateribus geminâ costâ siue neruo secundum longitudinem eminente, non dissimilia capitibus Iridis angustifoliæ maioris, similibus etiam feminibus plena: radix digitalis crassitudinis, nigricans, & nodosa, instar radicis angustifoliarum.

IRIS TVBEROSA BELGARVM.



Et Andem, inquit Lobel. Obs. quâ nostri hodiè Iridem bulbosam nuncupant & perperam Matth. Hermodactylum verum facit, cum Alandroando peritiores Itali pleriq; Diosc. priorem Lonchitidem sanxerunt, quod nulla extaret planta propius Lonchitidem adumbrans.

brans. *Folia* illi *Hyacinthi* poetici, porracea, striata, rigida, quadrangula, in mucronem cuspidatam fastigiata. *Flos* quadrantenus Iridis, cuius *folia* repanda, seu galericuli hiantibus comicis personis similes, obscurè virentes, fimbriis nigricantes. *Semen* inuolucris clausum, (Lanceæ simile, triangulum Diofc.) angulosum. *Radix* tuberosa variè depacta: quæ in plures digitarum, flore marcido, propagatur: vnde *Hermodyctyli* nominis occasio. Quem ad vinum depingi Bononiæ curauit beneuolentia Cl. præceptoris V. lyllis, ab hac nostrate tantillùm variare videtur.

Plant. Icon. pag. 98. *Iris tuberosa* Belgarum, Teut. 134.

Ad *Irides* pertinet (inquit Dodon. in fol.) & quam tuberosam cognominari contingit: *folia* sunt huic oblonga & angusta, ferè *Chamæziris* *folia* referentia: tenuis cauliculus: *flos* verò in cacumine erumpit forma *Iridis*, verumtamen & minor, & angustiorum foliorum, qui obscurè viret, ac, quo *Iridis* floribus fimbria loco, nigricat: capitulum satis magnum perfectio semine dependet, in tres rimas faciscens: semen rotundum, Ochro minus, initid inalbicat: non vnius formæ radix, ante florem duo aut tres veluti bulbi coherent, hoc verò enato in plures singuli extuberant propagines, quarum nonnullæ digitum referant. Peregrina stirps est, quæ ex *Orientis* partibus, & vicinis *Constantinopoli* regionibus, & in *Italiam*, & in *Belgium* illata fertur. *Iridis* sylvestris genus esse videtur: atque idcirco à forma radicum, *Iris tuberosa* dici potest. *Marthiolus* *Hermodyctylon* esse: alius *Lonchitim* priorem esse suspicatur. Cum *Hermodyctylo*, quo *Oscitæ* vrantur, à *Serapione* sic appellato haudquaquam responderet. Si autem idcirco *Hermodyctylus*, quod radix digiti figuram quandoque referat, alium esse à *Serapionis* *Hermodyctylo* oportet. Nam *Colchicum Diofcæ* *Serapioni* est *Hermodyctylus*: ab hac *Iride* autem differens est *Colchicum*. *Lonchitim* verò hanc esse priorem, non ita quoque constat: Si etenim ex eo *Lonchitis* nomen habet, quoddam semen triquetrum lanceæ cuspidi simile sit, hæc *Lonchitis* esse nequit: cum semen non sit triangulare. De facultatibus autem huius *Iridis* nihil scribendum occurrit.

Hermodyctylus Camer. apud *Matth. Sprengelium* dicitur, Arabibus *Surungen*. Ital. *Hermodyctylo*. *Folia* hic inittit prælonga, binum dodrantum, ac etiam longiora. Porri aut *Asphodeli* quadrantenus similia, longè tamen angustiora: breviora verò sunt, quæ circa radicem exeunt. Radices habet quatuor ex vna eademque basi prodeuntes, digitorum figura, colore subrufescente, albis in summitate vnguibus: caulis è medio prosilit tenuis, in cuius summitate oblongum prominet capitulum *Pyræ* figura, *Ephemeri* *Golchici* modo.

Oritur in *Orientalibus* regionibus, & in *Arabia*.

SPATVLA FOETIDA, PLERISQVE XYRIS.


CAP. XVI.

Nolentibus volentibus ab Equo ad Asinum, ab odore, inquam, grato, ad foetidam, plerisque Xyrin vocatam descenditibus, hoc solatiū occurrit, Deum & naturam nihil vnquam fru-

stra fecisse. Quemadmodum enim Asinus ad iter perficiendum, quàmuis non tanto, tam celerè, tamque expedito cursu, vt Equus accommodet, attramen ad melius esse saltem necessarius est. Simili planè modo *Spatula foetida* licet non ita iucundè ad cursum mundi huius faciat perficiendum, ad mala tamen plurima præcauenda & corrigenda multum præstat.

Radix itaque incurta, Dodon. in nouellis plantis, rotunda & veluti *Bulbi* aut *Cepæ* alicuius caput, ex qua

Descrip.



put, ex qua fibræ dependent crassiusculæ, veteribus & multorum annorum plantis, multæ, longæ, geniculatæ, libè inuicem implicate, magnum veluti capitem constituent, denique vt formâ, ita & acrimonia intensâ ad *Iridis* accedit: *folia* multa cubitalia, in cultratû mucronem desinunt, angustiora quàm vulgaris *Iridis*, atro vitore splendentia, foetidum *Cymicum* odorem attritu obolentia: inter hæc caules plures glabri, crassitie mediocri per media *folia* recti assurgunt, quorum singuli canaliculato calyci insidentem ferunt florem *Iridis*, sed minorem, nouem

foliis constantem, quorum tribus repandis ex purpura obsoleta albicantibus, virgatis, nulla fimbria villosa donatis, terna, modico intervallo imposita, fuliginoso colore, bifida, ligulas concolores occultantia: reliqua tria modicè erecta, ab exortu ad medium vsque circiter fusca, deinde ex albedo leuiter purpurascentia: *Lobelio* flores dicuntur *Iridis* filii: ternis foliolis surrectis nec reflexis, purpura saturatiore *Violæ Martiæ*, & in medio venis nulliôs luteis, & phœniceis: floribus succedunt *siliquæ* oblongæ, (vel vt ait *Cordus* siluestris *Iridis* folliculis similes vtriculi, sed paulò maiores & triquetri,) quæ per maturitatem *Pæoniæ* instar dehiscences semen ostentant rotundum, rubrum, minoris *Pisi* magnitudine, gustu feruido: figuræ adpositæ, quas iam

sculptas eminus non placent : *radix* non bene picta; apud Fuchium & Marth. quoq; non placet.

Hanc his verbis lib. 4. cap. 22. delineauit Dioscorides : *Xyris* folia habet Iridis, & latiora, & in cacumine acuminata : quorum è medio caulis erumpit cubitalis, fatis crassus, in quo siliquæ sunt triangulares, & super ipsis flos purpureus, medio puniceo : semen in folliculis simile fabis, rotundum, rubens, & acre : *radix* crebris cincta geniculis, longa ac rufa.

Xyris apud Cordum, sine dubio est illa Iridis species quæ ab It. *lis* *Spatula* fœtida nominatur, quam al. qui sine flore esse male crediderunt. Producit vero *Xyris* siliculitris Iridis species, folia caules, flores, & radices satius æqualia & similia, nisi aliquid impeditur, nam flores magis saturatâ ardent purpurâ.

Xyris ea Gladioli species esse videtur Corn. quam officinæ spatulam fœtidam appellant.

Si *Spatula* fœtidæ *radix* colore vti & flos respondent descriptioni *Xyridis* Dioscoridis, *Xyridem* assereret Anguillara.

Spatulam foetidam vulgò dictam *Cordus* & alii *Xyridem* Dioscoridis faciunt. Sed Diosc. *Xyridi* caulem crassum cubitalemque dedit, qui non est, inquit Gesner. in *Spatula*.

Lobelii & Penæ Adu. describunt, & *Xyridem* adstruunt, ac putant legendum apud Diosc. *xyris* pro *xyris*, radicem paruum. His porro testibus seueriores isti notarum exactores, vt plurimum indicant se nec multas plantas vernaculis natalibus eruisse, neque virium periculum multû fecisse. Dum enim nescio quid coloris & magnitudinis desiderant in radice & flore, nō meminerūt utrâvis harum, vt plerâq; alias facile nonnihil, non ita magna de causa, mutari. Et enim si Iridis radices & flores colore, magnitudine, densitate, bonitate & odore adeo variât, vt cū Florentina si nostrâ cōponas longè aliâ colore & odore putes, quid nō possit tantilla mutatio *Xyridi* contingere.

Lobel. Obserr. & Ic. Plant. p. 70. *Xyris* agria Theophr. Teut. 98. *Xyris* siue *l'ess d'apria* Theophr. Adit. *xyris*, siue *xyris* appositè quidem *xyris* ob folii similitudinem, quasi rasorium cultrum aut nouaculam dixere. Est enim illi folium, ancipiti nouaculæ similis, acutiore acie, & tenuiore ridigioreque quàm Gladiolus aut Iris mucrone. Lat. plerumque *Xyris*, Iris silu. & *Spatula* fœtida, tum ob eandem folii figuram (*Spata* enim gladium significat) tum quod grauem exhalet odorem, vulgò nuncupata est. Germ. *welsch schwertel* & *wantleyß* Frant/ à cimicibus necandis. Belgic. *wantleyßweyt*, *wildtisch* & *sindende lisch*. Gall. *spatule* ou *glayul* puant. Hisp. *Cris spadanal*.

In Hetruria & aliis Italiæ locis spontè exit: apud Belgas [autore Dod.] vix aliis locis, quàm in hortis reperitur: florem edit Iulio & Augusto, semen Autumno maturatur. Spontè nascens quibuldâ præsertim Gallo-provinciæ & Angliæ, vbi quàm vberissima, prope vda prata & littoreos maris aggeres inspicere licet Lobel. Flores apparent Iunio & Augusto in Anglia. Passim Monspelli provenit inter dumeta secus vias. Florentem vidi Maio, eadem mihi vîsa in orto Cl. V. D. Fuschii. Genevæ habui etiam in orto semine turgentem Octobri. Patauî vidi in orto Iesuitarum & D. Triuesani, & Pasqualigo. Venetiis in hort. Nob. Cornari. Veronæ in orto D. Alexandrini Serrarii Medici & Nobilis, dicti Musardo. Ferrariæ in orto Monasterii S. Dominici à L'Angeli. Basilæ in hortis D. Doctor.

Fœlicis Pluteri & Zvvingeri cum fructu mense Iunio. Habeo in orto E.C. cuius Stugardie in orto Ill. Ducis collegi semina.

Ea vi & acrimonia prædita est *radix*, tamen Corulam aut Cimices oleat, vt contra capitis vulnera [Diosc. quidem teste] faciat & fracturas: educat auculeos & omne telum extrahat citra dolorem: admixta floris æris tertia parte, radices Centaurii quinta, & melle, sanet tumores & inflammationes cum aceto imposita. *Radix* cum passo confusa bibitur ad conuulsâ, ruptâ, coxendicum dolores, vrinæ stillicidia, & alui profluvia. Semen ad ciendam vrinam efficacissimum est trium obolorum pondere in vino potum. Idem & lienem abluunt cum aceto potum. Lobel. Ad alui profluvia bibitur non secus ac Rhubarbarum & Alarum: ventris fluores, materiam per vrinas deducendo & auertendo, supprimit: ceterum opilionibus & rustico- rum plebi in præfectura Sômerferi Angliæ, huius radices decoctum, aut etiam insulum purgationes, Iridis modo, molitur. In omni alui profluvio nolimus experiri hanc feruidam radicem, fortè possêt tolerari vsus in profluvio alui pituitoso.

IRIS PALVSTRIS LVTEA SIVE acorus adulterinus.

CAP. XVII.



IN obliquâ & compli-
catas radices
agit multum
fibratas, quæ
propter so-
litorum vesti-
gia & vene-
nolas reli-
quias foris
villosæ nigre-
que sunt, in-
tus verò ru-
bentes, sub-
stantia poro-
sa, & cœu filis
quibusdâ ve-
nosæ, sapore
adstringen-
tes fluene:
nouis. quo-
tannis oculis

instar Typhæ aquaticæ gemmæ: *Folia* Gladioli, vel Iridis potius, longa, mucronata, quorum ea quæ propè radicem sita sunt subruia nonnunquam apparent: *caulis* duos cubitos æquat, & interdum superat, rectus, lævis, teres, spongiosus & interdum aliquousque inanis, in alas diuisus: *flores* Iridum formâ ferè, lutei, inodori: quorum tria folia reliquis sex maiora, extrossum repanda, lutea, simbriz supercilium imitantis loco, & vtrinque adiacentibus folii marginibus lineis nigris variegata: hæc intercedunt terna, alterno positu, surrecta, valdè angusta & breuia, tota lutea: sicut & intima quæ crista bifida reliqua- que forma cum iride violacea vulgari conueniunt, solo colore illo luteo quo fulgent excepto, quibus à dorso appressa semina, ex luteolo rubedine quadam prædita: sapore est flos totus feruidissimus.

Xyris vera
Cordus
Spatula
fœtida.
Flores con-
tra opilio-
nem quo-
rundam.
Gladioli
species.
Angul. du-
bitat.

Locus &
tempus.

diu non quidem in primo occurſu, varum paulo poſt, fauces omni Piperis acutiſſimis vrit: ſilique longæ, ut in Spatula, ſemen continent ruſſum, compreſſum Lupini inſtat. Odorem tota herba non ſpirat. Tragus ſemen tribuit luteum larum quod formâ vicium compreſſam referat, ſaporis ingrati planè.

Perſuaſum eſt omnibus Acorum eſſe quæ Cordo Geelſchwertel, ſed à veritate diſtat hæc opinio. Hermolao Barbaro, Acorus falſo vocatur Iris lutea ſive Pſeudoacorus. Noſtri Sepſari (inquit Tragus cum Brunſel. & Manardo) & Magiſtri illorum contendunt Gladiolum luteum, Acorum eſſe à Dioſcor. lib. 1. cap. 2. deſcriptum, ſed nō a conueniunt: Germ. Gäl waſſer gilgen / Liliū aquaticum luteum, & Dracēz rourz & Gälſchwertel / hoc eſt, luteum Gladiolum vocant, dicitur inſuper in cap. 22. lib. 4. apud Dioſcor. collocandum quo loco xyc quam nonnulli *Irion dicitur*, Irin, ſylueſtrem, Cacos, & Gladiolum vocant, deſcripſa eſt. Qui ſyluo frequens oſtenditur, paluſtris Acorus eſt, inſipidus, inodorus, non vtendus niſi Medicus imperaue- rit.

Apollin. qui vocat Geelſtien', malè cum Hieſt. Brunſch. Acorum purat, & deterius vires confundit vtraruſque plantarum, quæ multum inter ſe diſcrepant. Figura quam habet eſt apud Tragum pro *Irion* ſeu Gladiolo paruo minore.

Fuchſ. Icon. pag. 6. Gladiolus luteus, vel Acorus vulgaris, Geelſchwertel. Gladiolum luteum ſeu Irin luteam Officinæ perperam Acoro appellant: & maiore cum errore radicibus eius pro legitimo Acoro vtuntur: Plerique hæc occaſione Pſeudo-Acorum nominant: Dodon. Iridem luteam ſylu. aut potiùs Pſeudo-Iridem nuncupare mauult, Iridi pro Acoro ſimilem.

Gefner. hort. Acorus falſa, id eſt, Liliū aquaticum flore luteo.

Lobel. & Pen. Adu. Obſ. & Icon. Pl. Acorus noſtras paluſtris, id eſt Liliū aquaticum luteum Matthioli. 22. Butomon Theoph. Valerando Pſeudoiris & Iris lutea Dod.

Cluſ. poſt. h. Iris paluſtris nonnullis, peritiores veriùs Butomon appellant.

Tab. Ic. & h. Iris paluſtris lutea, Geelwaſſerſchwertel.

Iris paluſtris lutea, Pſeudo-Acorus, ſive Acorus adulterinus, Geel Gilgen / geelſchwertel / geelwaſſerſchwertel / Dracēz rourz / Belg. Geelſch & Boex boonen. Gall. *glayel* & *Flambe baſarde*, Angl. *Glads* don or falſe Acorus.

Nafcitur vbique in paluſtribus aut his coniu- ctis ac vicinis locis cuiuſmodi ſunt rigua prata & fluuiorum margines: Pſeudoacorus paſſim locis paluſtoſis circa Montbelgardum, prouenit copioſè etiam in hortis quod maturum obſeruauit Septembri. Monſpelii vbi abundat circa aquas florēt Martio & Aprili. Bononiæ ad montes Appenninos florentem vidi Aptili, vt etiam in horto S. Saluatoris. Baſileæ & Lugduni Maio, ſicuti & Geneuæ vbi abundat circa *Arus*. Tiguri aliquando deguſtati flores, qui mihi tantum ardorem & feruorem excitarunt in faucibus vt ſummam acrimoniam vix potuerim mitigare Oxycrato, radix autem inſigniter aſtringit.

Radix lutei Gladioli, autore Trago, vino de- cocta & pota, continuas alui fluxiones ſiſtit, do-

lores veſicæ & coxendicis mitigat, & ad omnis generis ſanguinis profluuiâ facit. Acorus Officin. rarò intra corpus aſſumitur. Sunt qui è floribus eius aquam deſtillant, ad inflammationem oculorum. Alii Eclegma è radicibus aduerſus calculum conſciunt. Nulli ſuaſerim cum Trago uſum tam acris floris ad inflammationem oculorum, nec tam adſtringentis radicis ad calculum, non benè etiam percipimus quomodo dolores veſicæ & coxendicis mitigare poſſit. Abſurdum videtur quod Tuſſ. Ducketus ait radicem Acori vulgaris cum caliditate aliquid adſtriſtionis habere, ſiquidem inſignem habet. An verò habeat caliditatem nobis nondum conſtat. Inuenteratus eſt [inquit Turn.] error Medicorum & Pharmacopæorum, herbam ſumentiam pro vero Acoro formâ quidem ſimilem, ſed plurimum viribus differentem. Acorus calidus eſt in tertio. Gladiolus paluſtris (quem pro Acoro ſubſtituunt) frigidus eſt, mirumque in modum obſtipans & adſtringens. Cuſtus abundè monſtrat eius radicem immenſam adſtringendi facultatem obtinere: hinc eſt quod diuerſam planè à Veri Acori radice vim fortita ſit: nam vt hæc tenuium eſt partium & facultate calida, atque adeò detergit, extenuat, atque diſcurit, ita illa conſiſtentia craſſaſum partium, & facultate frigida conſtringit, coſtat, cogit & coarctat. Quare vtiſſimam non eſt, vt verum Acorum, nec menſes euocat, ſed potiùs ſupprimat: ſanguinem etiam vndeunque manentem cohibet: proinde rectè Pandect. author ſcribit, eum qui ſecum Acori radicem geſter, à nullo, ſanguinis profluuiio corripit: & ex Recentioribus aliqui hanc facultatem Acori noſtri obſeruarunt: atque hinc adeò tradunt eius ſuccum igne expreſſum, menſes nimium promanantes conſtringere poſſe, id quod certè de Acoro vero affirmare vaniſſimum erit.

Notatu digna hiſtoria occurrit apud Cluſium, de Medico Viennenſi magnæ autoritatis viro: Cluſii verba hæc ſunt: Viennæ magnæ autoritatis Medicus magnopere ſe mirari ſcribebat, me in Acori hiſtoria non adſcripſiſſe eius radicis uſum, ſterilitatem mulieribus inducere: ego reſpondebam me magis adhuc mirari quod hæc ſcriberet, quum non ignoraret, neminem à Veteribus hoc Acoro tribuere. Sed bonus vir adhuc in vulgari multorum opinione verſabatur, qui exiſtimabat Butomon, cuius radice nonnulli magno errore pro Acoro vtuntur, legitimum Acorum eſſe, quum tamen proſuſ diſſimiles ſint vtriuſque facultates. Ex hac Hiſt. Cluſii patet quanta in hæreſi verſentur omnes Iuniores Medici (vt quondam Nic. Lonicerus ad Hieron. Monochium ſciitè verèque ſcripſit) qui herbarum & aliorum ſimplicium medicamentorum indagationem, non ad medicos, ſed ad pharmacopolas pertinere opinantur, fata interim hominum non ſua ſed aliena fiducia gubernantes. Nos interim non exiſtimamus Pſeudoacori radicem ſterilitatem mulieribus inducere, quinimò vtilem putamus ad promouendam conceptionem mulieribus nimium humidis ac gonorrhæa laborantibus. Radices [inquiunt Aduerſ.] vt Doctus Belga ait, tantopere adſtringunt, & planè Iridis facultatibus aduerſantur, vt neuiquam ſuſciliſ auctor literis mandarit, hæc vel duntaxat appenſas appreſſaſque corpori quemlibet ſanguinis fluxum ſiſtere.

ACORVS VETERIBVS.
CAP. XVIII.

A pud Theoph. nihil observauimus, quod Acoro Dioscoridis respondeat, legitur quidem vox Acori historia sua lib. i. cap. 22. vbi Gaza vertit Veneria, non bene nostro iudicio.

Acorum depinxit Plin. lib. 25. c. 13. dicens: Acoros Iridis folia habet, angustiora tantum & longiore pediculo, radices nigras minusque venosas, cetero & has similes Iridis, gustu acres, odore non ingratis, ruptu (ruptu Veterum) faciles. Optimæ Ponticæ, dein Galaticæ, mox Creticæ, Sed primæ in Colehide iuxta Phasin annem, & vbiunque aquosis. Recentibus virus maius [magis. M. fortassis, vires magis] quam vetustis. Creticæ candidiores Ponticis. Siccantur tribus in umbra digitalis frustis. Nec non inueniuntur, qui Oxymyrtinæ, radicem Acoron vocant: ideoque quidam hanc Acorum agrium vocare malunt.

Acoros.
Iris.

Acorum folia Iridi similia habet [inquit Dioscor. lib. i. cap. 2.] sed angustiora, & radices non dissimiles sed perplexas, & non in directum productas, sed obliquas ut plurimum, & superficie geniculis distinctas, subalbas (imbricatas), id est, interprete Ruellio, albican-tes: potest tamen vocabulum, ut quidam volunt, significare, non nihil intrus vel subtrus albi- cantes, Turn. gustu acres, & odoris non inui- cundi. Præstat autem Acorum densum & album. incorrosum, plenum & odoratum. Hoc autem est quod in Colehide (Colechide) & Galatia Asple- tion appellatur.

Delc&us

Flora addit Serapio, & dicit esse Croceos.

Asple-
tion.
Chorus A-
phrodisius
Veneria.
Piper a-
queum.

Cæterum in Diosc. suppos. [Cornario teste] di- citur, Aliis etiam Chorus, aut Aphrodisius: Ro- manis Veneria, nonnullis Radix nautica, Gallis Piper aqueum.

Vires Acori ex Veteribus quod attinet, tra- dentur ex post Calamum aromaticum vulgarem.

Necessarium sanè non sanè non solum, ast etiã scitu iucundum Equiuocum Acori & substitu- tum. Nam Calamus aromaticus Officinarum plu- rimis est Acorum, quamuis Garcias & Acolta Calamum aromaticum verum siue Indicum non fuisse malè censcant. Habetur & Acori nomine Galanga maior & minor, & Acorus Qualce- beni in Epist. ad Matth. Camer. apud Match. Ger- manic. loco Acori habet Acori vulgaris particu- larem speciem, in Thuringia: Lobel. autem Obs. Iridem luteam in Bohemia. Gladiolum caru- leum siue Pseudoacorum Tragus. Perperam quoque olim Pseudoiride lutea vbi sunt pro aco- ro. Hac à nobis traditur sub Iride palustri lu- tea, seu Pseudo-acoro. Anagallis Theophrasti, Ve- neria, & Herba diuener Anguill. Vbi Acorus apud Theoph. lib. i. c. 22. legendum Anguria vel Anguria, quod non animaduertit Anguill. nec Scaliger apud Theophr. observauit, nec Lobel. & Pena, nec Ro- bert. Constant. Acorum syluaticum dicitur de Achillea. Millefoliæ striatioti attribuunt nomen Acori syluatici. Acorus syluaticus Græcis Myrio- phyllon Apuleo: de quo sub Millefolio aqua- tico Matth. Non desunt, qui Acorum (inquit Ruell. p. 283.) Oxymyrtinæ radicem vocent, hanc verò Acorum siluestre. Alii verò Acori syl- uestris nomen Anagallidi communicarunt. Aco- ro deficiente, radix Azari substituitur: Gal. Fuchf. Borgar. quod non placet propter vim pur- gantem per inferiora & superiora, quæ non tri-


Anagallis.

buitur Acoro. Acori defectu ad statum & t. epar & henem iuandum, Cumini par pondus, & ter- tiã partem Aristolochiæ substituit Auicenna, Syl- uius & Placotomus, Borgar. Fayasius in Gal. de simpl. lib. 6. c. 11. Pro Acoro, Radix Acanthi, Tract. quid pro quo ex Galeno.

CALAMVS AROMATICVS
vulgaris multis Acorum.

Quam nota Sepalsis radix, & antiquum no- men, tam ignota multis sæculis exstiterit plã- tæ totius facies.

Ea igitur radix, quæ olim sola erat in Offici- nis admodum vulgaris, habebat figuram plantæ sub terra repentis, quæ nonnunquam excedebat longitudine palmum, quæ tamen compressior erat, quàm rotundior, ger. iculata (atramen- tum)



non crassa ut in Iride) intrus alba, odore grato prædita, tatis amara & acris. Multæ foliorum partes sicæ, multæ- que reperie- bantur, adhæ- rentes, Iridis atundinacea folia quadran- tens præ se ferentia: ex hortenti autem plantam sic describemus.

Radix lon- ga, multis ge- niculis inequalis, summa ter- rà obliqua seu transuersa hæ-

rens: externa parte candicans, quum sub terra latet: supra terram extans, virelens: interna parte candidissima, firma, atque amara, innu- meris internâ parte adnatis fibris crassiss & albi- cantibus, etiam odoratis donata: serpit autem & summa tellure sese diffundit, è lateribus, & singu- lis ferè articulis seu geniculis propagines alterna- tim in obliquum spargens, ut breui tempore ma- gnum spatium occupent: filia surgant cubitalia & sesquicubitalia aliquatenus Spatulæ fortidæ, angustiora, colore herbaceo, margine subinde ru- bente, & propter terram penitus rubentia, mediâ costâ clariore, (Clusio Iridis tenuifoliæ maioris ferè, sed multò longiora, sapore subamaro acris & aromatico, triâque iucundo & aromatico spi- rant odore, quem etiam resiccata & exsucca, vel post multos annos, inquit Clusius, retinent, sub hiemis initium marcescunt & siccantur, in eunte autem Vere noua germinant, ut in Iride angustifolia: pro flore iulium seu nucamentum proferit rigidum & oblique surrectum, teres, sen- sim in acumen definens, squammulis imbricatis virentibus compactile, apicibus exsertis multis, luteis, prodians è sinu mediis foliis statim à radi- cem aliis exorti, ut reliquis angustioris bre- uiorisque, ita & crassioris: Iulus vnicus (aliquâ- do teste Clusio,) sed rarissimè geminus: folicu- lis, dum se explicat pallidis, muscosis, inodoris, qua-

quatuor foliolis constantibus; plenus: is paulatim deinde incrementum sumit, donec humani ferè digiti longitudinem, crassitudinemque adquirit frequentibus tuberculis viridibus tam eleganti serie dispositis, vt recentem Pinastricomum æmulari videatur.

Legit & in Mæotide odoratum nasci Calamum Hermolaus, radice subalbida, & sine fistulis: plena intus & amara, specie Acori: de quo & falsi quidam sunt, Acorum eam putantes. Quantò autem amarior, inquit, tantò & calidior est Indico. Vtrumque tamen genus Acorum odore superat. Teredinibus vt Acorum incessitur: omninoque vicarium pro Acoro est, ab Ionia, & Ponto, & Herculis Columnis, profusque apud omnes, qui mediterranea colunt Aphricæ, vt si eadem non sunt planè, maxima tamen germinatitate videntur, vt auctores plerique tradunt. Sed fallitur Hermol. dum nostrum Calamum aromaticum vulgarem Diosc. putat.

Fallitur & Marcell. qui odoratum calamum, suâ ætate adeò notum esse scribit, vt non sit lōgius de eo agendum. Apparet ergo Marcello non fuisse notum verum calamum, qui non erat tunc vulgaris, nec etiam nunc.

Hinc verius ait Sylius: Qui in Officinis calamus est, non Calamus, sed radix est, neque ea Calami, sed plantæ alterius: neque ex India videtur afferri, quia vili venditur, & sæpè recens multum cernitur, subalbus, non puluerulentus inter frangendum, ac viribus pollere indicant odor & sapor aromaticus. Acorus: quibusdam Calamus aromaticus: ignotus quibus adhuc est verus Acorus, eius loco vtuntur interdum Calamodorato. Verus Acorus multorum iudicio nihil aliud est quàm radix quæ hodie in omnibus totius Europæ pharmacopoliis, Calamus aromaticus appellatur.

Illi autem sententiæ subscribit Cordus in Dioscor. Vulgo, inquit, in omnibus Pharmacopoliis Calamus aromaticus est, sed nihil habet cum vero Calamo similitudinis, eam opinionem etiam ante nos oppugnant Marpurgus & parentis Eur. Cordus: Vocatur in pharmac. absolute Calamus, aut cognominis aromaticus, neque genicularis harundinis modo ex intervallo radices aut culmos habet, neque iubatam in summitate paniculam, sed magnum florem Iridi æqualem, colore luteum, caulēque & radices solidas: in summa Iridi cognata est plāta, nihilque aliud quàm verus Acorus. Nihil mouet nos Hermolai Barbari autoritas, scribentis se legisse in Mæotide etiam odoratum nasci Calamum radice subalbida &c. Calamus quem Barbarus describit idem cum vocato vulgo Calamo aromatico existit, ideòque non merito eos reprehendit qui Acorum esse putant. Hæc Cordus, quem miramur Calamo vulgari aromatico tribuere florem Iridi æqualem, luteum, quam nullum tamen florem ferat, sed veluti sulum sullo Coryli similem.

Brunk. germ. Tragus & Manardus Acorum eā esse radicem sentiunt, quæ Germ. Calmus / Lat. & Officinis Calamus aromaticus dicta fuerit, sed perperam.

Calamus Aromaticus seu odoratus verus (ait Fuch.) in officinis nostris non habetur. Nam qui hoc nomine venditur Calamus non est sed radix. Neque habet eas notas quæ illi à Dioscor. tribuuntur. Siquidem Arundini similis non est, nec odore fragrantissimo præditus est: fistulis denique totus plenus nequaquam est, nec ex India affertur. Qui igitur in officinis prostat, ra-

dix est, non quidem veri odorati Calami, siquidè vili pretio venditur, & sæpè admodum recens cernitur, sed eius qui in Mæotide nascitur. Porro cum hæc radix in commanducando glutinosa

fit, linguam adstringens, amara & subacris, eique propemodum omnes veri Calami Indici notæ quadrent, profecto tute, & citra vilius reprehensionem pro vero Septasia in eius penuria vt possunt. Argumentum Fuchii ab odore non placet, quia non videtur nobis deesse in vulgari Calamo odorato, in eo præterea adstrictionem non animaduertimus qualem Fuchius asserit.

Cornar. hæc de Calamo ait. Calamus aromaticus siue odoratus officinarum genuinus est & non Acorum Diosc. vt quidam asserit, qui etiam hodie in officinis nomen retinet, & verus habetur, & nostri, sicut est, *Woltrichende Calmus* *Wurz* vocant. Quare non audiantur qui Calamum odoratum se nunquam vidisse asserunt, & non calamum, sed radicem, eamque magis albicantem quàm fuluam, siue ruffam, velut ipsi *κρίνον* vocem interpretantur, pro Calamo vulgò vendi asserunt. Nam radicis Calami vsus est, nō ipsius Calami. Verum descriptio Calami odorati, qua ab aliis calamorum generibus distinguitur, partim ad Calamum, id est, harundinem ipsam pertinet, partim ad ipsius radicem. Quod enim dicit optimum esse qui fuluus est ad radicem referendum est: quod frequentibus geniculis præditum ait, & assulosè in multa segmenta diffingi & fistulā arancis plenam habere, [ad Calamum:] quemadmodum etiam in nostris Calamorum generibus videmus: hodie subalbidus maxime probatur, quin aliàs ferè ad fuluum colorem declinet. Nos Cornarii distinctionem non probamus: Dioscoridem omnia de Calamo dicere, non de radice existimamus. Verisimile Cornarium nunquam vidisse verum Calamum aromaticum, nec etiam Calami aromatici vulgaris plantam integram, in qua nullus Calamus: Calamum verum habemus qui similitudinem habet cum arundine.

Non tamen probamus figmentum Matthioli in Calamo aromatico. Radicula enim (vt cum Theophrast. loquar) quæ Thracia fert, videlicet quæ odoris Nardo similis sunt (*κρίνον* & *αρίζον*) & aliæ quædam, quæ paruum exilēque odoris gratiam habent: videntur esse radices illæ, aut eiusmodi quas *Αίρ* vocant Incolæ: nos falsò Calamum aromaticū. Nascuntur enim in Thracia & Ponto. Calamus autem trans Libanum. Qui non ampliùs conuehitur ad nos.

Bachanell. de consens. med. dicit Verum Calamum non haberi, & pro eo accipi radicem Acori.

Acorum Dioscor. facit Lonic. officinarum Calamum, proque Acoro in El. Diacori sumit, quoniam sanè respondeat descriptio Acori Dioscoridis. Sed Lonicus non contentus figura vna, iterum aliam ponit, quæ olim posita fuerat à Matthiolo pro Acoro, & vocat Acorum Apothecariorum quasi differrent.

Helfricus: Acorus, Calamus Acori, Calamus, *Helfrici er.* *ακόρον, μύρρα, κρόνον, γαλάνη, γαλάνη, γαλάνη*, Galanga. Si Galanga eadem cum Acoro cur separat Helfricus.

Falluntur Monachi suspicantes Calamum Aromaticum vulgarem esse radicem veri Calami: Calamū aromaticus officinarum [aiunt hi] non est Calamus, sed si quis dixerit quod hæc radix quæ recipitur in Officinis pro Calamo est radix ipsius Calami: hoc fortassis poterit esse. Ver-

*Substituitur
Veri Calami
notæ.*

Fuch. nos.

*Cornar. lo-
bitur.*

*Matth. nos.
Radicula
Thracia
Theoph.*

*Air.
Calamus
Aromat.
falsus.*

*Acorus non
Calamus.*

*Lonicus
nos.*

*Helfrici er.
nos.*

*Monach.
error.*

*Calamus
vulg. fori.
Calami &c.
et radix.*

rum tamen cum petitur Calamus non est accipienda radix, nisi urgente necessitate in ipsius Calami penuria.

Non verus Calamus. Calamum Aromaticum qui in Officinis pro Calamo venditur non esse Calamum odoratum Diosc. suspicantur Manardus lib. 6. epist. Fuchsius in paradoxis: & Hermolaus, qui hunc Acori vicarium fecit.

Acorus. Equidem non video [inquit Alois. Mundell.] quomodo quorundam descriptio Calami apud Diosc. vulgari conuenire possit, tanquam ab eo longè aliena. Quare plurimum dubitamus ne verus sit Diosc. Calamus, sed magis ad Acori radicem accedat, quemadmodum etiam Manardus & alii nobiscum suspicati sunt. Pergit *Qualcebenus* ad Matth. Calamum vulgarem, quem Acorum in tuis Com. affinas nec malè, si florem Iridis similem in Acoro requiras (cuius tamen non meminit Diosc.) omnino metuo ne verus sit Acorus, quia ad vitigineis floribus modum efflorescit. Huic respondet Matth. Sole clarius Calamum vulgare nostrum nil aliud esse quam legitimam Diosc. Acorum.

Calamus arom. falsus. Flos similis Iridis. Crediderim cum Manardo aliisque nonnullis id omnino legitimam Acorum esse, quod non modo Seplasia, sed omnes in vniuersum Calamum falso odoratum vocant: Folia quæ integra ad nos vnà cum radicibus [vt hæc pictura demonstrat] è Constantinopoli allata sunt, ferè Iridis. Retulit mihi Io. Merula, qui pluribus annis degit apud Lithuanos, frequentissimè in Lithuania & circa Tartarorum fines: foliis Iridi æmulis: flore etiam simili, colore roseo purpurascens nulla ex parte vario: vocatur ab incolis suo idiomate *Tartarschi Zelii*, id est, Tartarica. Non potui non maxime Brassavolum admirari, quod sibi tam facile persuaserit vulgarem Calamum legitimum & Calamum odoratum esse à Diosc. Theoph. Galeno & Plinio descriptum. Idem in Com. Lat. cum magn. fig. & Italicis: Acorum legitimum quod falso Calamum aromaticum vocant foliis Iridi angustioribus, radicibus haud in rectum descendentibus, sed in obliquum actis, in caulium cacuminibus, vt affirmabat Qualcebenus, nucamenta, legitimæ Acori plantæ imaginem damus, quam Constantinopoli ad me misit Cl. Augerius de Bulbecke, è Nicodemia petita. Veritati se opponunt qui dicunt Calami aromatici radices Iridi non esse similes: delirant cum contendunt nihil aliud esse vulgaris Calami odorati radices, quam generis cuiusdem Iridis. Infaniunt cum dicunt recentes calami radices omni prorsus sapore & odore destitui, & paulò post affirmant easdem recenter effollas esse amariss. & odore admodum ingrato: minime hoc credendum iudico, vt qui recentiss. hæc radices degustauerim, ac etiam Tartaros compertum habeam sapidissimè pro obsonio cum pane deuorare: Legatur Anguillarii libellus. Hist. quoque Germ. *falmus* / Acorum, Bohemicè prust morec. Brassavoli porrò sententiam refutat Matth. his argumentis: Primum ex ipsa Calami appellatione, deinde ex eo quod dixerint Theophr. & Plinius non differre hunc formam à reliquis sui generis, id est, ab omni Arundinum genere, vtique constat odoratum Calamum genere & forma Arundinem præ se ferre, odoratum tamen, non autem esse radicem. Quocirca Plinius Diosc. fortasse secutus dixit. Fistulæ (hoc est cavitati) inest araneum, quod vocat florem: non autem radici, vt contendit Brassavolus araneum illud inueniri in vulgari illo Officinarij. Præterea vulgare calami radices quas A-

Objectionum. Matth. argumenta non esse Calamum Galeni.

sunt: sed transuersim, quemadmodum & Iridis. Cæterum has radices non esse calami, euidenter intuentibus apparet, quandoquidem etsi complures illius Acori radices habeantur, quæ sicæ gerunt in cacumine folia, Iridi omni ex parte similia: nulla tamen vsquam inuenta est, quæ secum Arundinis trunculum cacumini annexum deferat: nempe Acori proprium, non odorati Calami est, Iridis folia ferre. His itaque rationibus Fuchsi quoque sententia improbanda mihi videtur. Porro minime compertum habeo Diosc. nedum Galenum dixisse aliquid odorato Calamo inesse amaritudinis, quam tamen in Acoro haberi Galenus prodidit. Præterea maior inest vulgari Calamo acrimonia quam suo referat Galenus.

Cronenburg. de comp. med. sentit cum Matth. non esse vulgarem Calamum verum & nos eo destitui. Nihilominus tamen concedit substituire vulgarem eius loco non esse piaculum.

Amat. Lusit. se opponit Matth. his verbis: Post longam inuestigationem firmiter asseuero, communem Calamum aromaticum verum esse Acorum. Ex India Lusitani nostri singulis annis adferunt, veluti Mercatores ex ipsa India per mare rubrum in Chairum, & Alexandriam deferentes. Venetias portant, Calamis similem, vnde nomen accepit, odore suauis, & aromatico, album & subrum, crebris geniculis, qui quum frangitur in assulas multas diffilit, fistulosus, araneolo illo albo plenus, nam quum manducatur glutinosus cum quadam adstrictione subamara sentitur, vt facile iudicare debeamus, Calamum odoratum vulgarem Officinis verum esse. Matth. credidit Calamum aromaticum harundinem siue Calamum, non verò radicem, esse debere: At mea sententia decipitur Matth. quum licet Theophr. & Plinius in Calamo odorato calamum & non radicem laudare videantur, alibi tamen Calami aromatici radicem desiderant, & eam cæteris partibus calami anteferant: Vt apud Plinium est l. 24. c. 11. In quo, quum Calami odorati iuuamenta enumerat, inquit: efficacissima autem in omni harundine, quæ proxima radici: efficacia & genicula. Per quæ verba manifestè percipitur, quod ex omni Calamo siue harundine radix efficacior est pars: qua de causa Calami odorati radix quam Calamus potius in opus trahenda est, vt merito hæcenus pharmacopola, hac præciosa & exotica radice pro vero & germano Calamo odorato, vsi sint. Nec enim est quod alium desiderant, modò vulgarem recentem, minime verò inueneratam habeant, quem ex odore & sapore facile discernere possunt. Quantum verò ad Dioscoridem attinet, si quis introspectiens cum accuratius expenderit, inueniet illum potius de radice loqui quam de Calamo, quum radix geniculata dicatur, calamus verò potius nodis cinctus.

Amato respondet Matth. in Apologia his verbis. Quod Plinius ait efficacissimam in omni harundine eam esse partem, quæ radici proxima, quis non videat de harundine non de radicibus intellexisse Plinium. Namque examinaturus quamnam partes in vniuerso Calamo cæteris præstent, partes radicibus proximas cæteris præstare inquit: quod facile prudens animaduertet lector. Nec enim aliam ob causam putat Plinius maiori vi pollere eas Calami partes quæ prope radices habentur, quam quod eadem ibi crassiores, vegetiores, robustioresque in omni harundine

genere reperiantur, quàm in cæteris earundem locis : quo fit, vt etiam Calami ipsius genicula efficaciora pariter ipse existimauerit Plinius. Quippe & genicula robustiora sunt & crassiora. Quam ob causam Calamum illum prætulit Diosc. quin densè fuerit geniculatus. Quod Calamum, non radices, describat Dioscorides, apertè quidem constat, cum ait : Calamus odoratus in India nascitur, melior est fuluus, densè geniculatus, & qui assulosè frangitur, plenà araneorum fistulâ. Hæc ille. Quæ tamen perperam Lusitanus intelligit. Quippe Calamus in primis harūdinem designat non radicē. Præterea propriū harūdinis est pluribus constare geniculis, & assulosè frangi. Deinde fistula, in qua quiddam araneæ telæ simile concluditur, calamo tantum debetur, non radici, quæ solida, dura, lignosa, & vbique occlusa spectatur, in omni harūdinum genere. Ad hæc fuluus color Calamo sanè debetur, non radici. Quippe quod radix in harūdine perpetuò albicet. Ad id autem quod proprium sit radicis (vt ille contendit) vt ipsa geniculata dicatur, calamus verò potius nodis cinctus, Dioscor. ipse respondet. Quandoquidem is non inodò quarundam plantarum radices geniculatas facit, sed etiam caules, & calamos nonnullarum stirpium reddit geniculatos, vt faciliè quis certior fieri poterit, qui eius Codicē legerit in Hydriopere, in altera Cyclamino, in Gentiana, aliisque nonnullis. Plinius tritici culmis genicula quaterna, faris sena, hordei octona tribuit. Hinc libro senect. Culmo geniculato inquit Cicero. Constat præterea hæc radices ex Lithuania, & Tartaria finibus, quinetiam ex Ponto, vbi passim ferè proueniunt, ad nos conuehi. Quod maximo cuique argumento esse potest, eos prorsus hallucinari, qui eas ipsas radices Calami odorati esse contendunt, quod nullus extet auctor (quod videtur) qui scripserit odoratum Calamum alibi prouenire, quàm in India & Syria.

Sed de his quid nobis videatur, intellige. Figura & descriptio Calami vulg. Acori postremo a Matthiolo exhibita, satis demonstrat iconem non fuisse factam ad plantam missam Constanti-nopolim (vt ipse ait, sed potius arbitrio, vt quondam plures alias plantas : satis id indicant folia ad Iridem nimium accedentia. Non est quod cum furore (eius verbo vitimur) Anguillaram delirare dicat, qui dixerit generis cuiusdam Iridis, quandoquidem ipse olim scripsit ex Io. Merula autoritate flore esse Iridi similem, quæ sanè verba in postremis commentariis non debent omitti si vera, si falsò addita, corrigenda erant : Nolimus tamen dicere cum Anguillara Iridis speciem, quamuis habeat non paucam cum Iride communia, & meritò Iridi subnectatur, licet flores, iulis Corylorum similes, multum differant ab Iridis floribus. Argumentum Matthioli à trunculo Arundinis inhiatum erat, quia deest etiam Iridis caulis : Matthiol. dicit partes mutilatas ficas reperiri : adherentes Iridi similes, Apollo autem arundinacea folia quadantenus præ se ferre : nos vtunque non malè dici posse existimamus. Theophrast. lib. 7. cap. 12. scribit Harūdinaceum potius constare folium Iridi.

Argumentum præterea Anguill. ab odore gratiori in sicco Calamo aromatico vulgari vt demonstrat Iridis speciem & non Acorum, minus firmū est. Theophr. enim l. 6. de caus. cap. 17. non solum radices Iridis siccitas reddere ait,

sed etiam Arundinum & Iuncorum, & Gladioli.

Amatus Lusit. Matthiolum temerè reprehendit, & ascribit radici vulgaris Calami notas, quas Dioscor. vero Calamo attribuit : suspicor etiam non verum quod ait has radices ex India deferri.

Calamum vulgarem aromaticum existimauit Manardus esse Acorum, cum quo non sentit Anguill. credens potius aliquam speciem Iridis, ob quasdam partes quas habet conuenientes cum Iride : nempe quod hæc radix sit coloris carnei (incarnati) internæ, & quod habeat folia quæ ei videntur similia : quod quod magis siccatur, eò meliorem acquirat odorem, & cum carie corroditur odorem habeat gratiorem, id quod dicit Dioscor. cōuenire Iridi. Recens verò est ingratisimi odoris & summe amara.

Aduert. Acorus Diosc. & Acoros Theophrast. Officinis falsò Calamus.

Radice quæ inter aromata ex Oriente allata venditur vulgò pro Calamo aromatico sperabatur Cæsalp. flores & fructus, quales in Iride videntur, daturam vt folia, cum potius conuenire cum iuncis reperta sit, huic satis conuenit Costi Arabici descriptio, quamuis pauca eius notæ ab Autoribus tradantur. Sunt enim inæquales Costi radices & tuberosæ, vt patet ex Helenio quo adulteratur, & ex radice Rhodia cui Dioscor. Costum comparat.

Nostrium Officinariū Calamus (inquit Clus. apud Garc.) nihil nisi radix est cui omnes notæ Acoro à Veteribus adscriptæ pulcherrimè conueniunt : Solebat Antuerpiam Vlyssipone aduehi Calami genus vsuali nostro simillimum, sed tetri odoris & saporis horridi. Quale genus tetri odoris fuerit considerandum : de eo verò quedam capite de Calamo aromatico vero

Bernard. Palud. in extrema Lithuania Tartar-
fi ab incolis appellari asserbat, quod à Tartariis illius vsus primū ipsi esset demonstratus.

Indocti practicanes pro Calamo aromatico Antiquorum, inquit Tabern. verò Acoro falsò vtuntur, quem errorem confirmauit Cornarius.

Gerard. Angl. Acorus Officinis falsò Calamus, Bastard or false Calamus.

Casp. Bauhin. Phyt. Acorus i. siue Officina-
rum Calamus aromaticus, huic volunt aliqui conuenire Costi Arabici descriptionem apud Dioscor. lib. 1. cap. 15. alii Iridi volunt cognatum, alii cum Iuncis magis conuenire statuerunt.

Viret hodiè planta, testis est Cæsalp. apud Sereniss. Magnum Ducem foliis valde odoratis : gaudet aquis. Anno 1574. Clusio primū conspecta est Viennæ austria legitimi Acori planta virens, munere Ill. V. Auerii de Boubeque, Dauidis Vngnad, & Caroli Rym, qui omnes Legatorū officio apud Turcarum Imperatorem defuncti fuerant. Hanc porro, cum frigoris patientissima, hiemis intemperiem non reformidet, quamplurimis communicabam, adeò vt nunc vulgatissima facta sit. Ingenti quodam lacu ad radices præcelsi montis iuxta Prusam Bichyniæ urbem spontè nasci intelligebant, & humidis locis gaudere, & secundum fluentia longè felicius prouenire quàm siccis experiebantur. Sed & C. V. Bernard. Paludanus, copiosè admodum supra Vilnam urbem in paludibus, extremà Luthaniā Moskouiā spectante inueniri referebat. Habeo in horro Ill. E. C. Montb. vbi se multiplicat, & iulos fert, à me apportatum Sturgardiā ex horro Ill. Ducis.

antè etiam attulerat Ill. meus Princeps ex Pfortzeim Marchionis Badensis. Vidi Lutetia in horto Io. Robini regii hortulani: Argentina in horto Di. Melchioris Sebitzii Medici, Sturgardiae in horto Ducis Pharmacopœi, insignis hanc plantandi ratione docuit: Calamus plantandus solo humido & arenoso & non remoto ab aqua: quotannis ex terra eximendus & abscessis radicibus summitates in terram reponendae, distantia palmi: hac ratione valde multiplicantur atque vt plurimum floret secundo anno à transplantatione, iulus ad est Iunio, Iulio & Augusto.

Vires

Vim habet Acori radix calefactoriam, decoctum ipsius potum vrinas mouet, ad lateris & thoracis ac hepatis dolorem, ad tormina item & rupta ac conuulsa commodum. Lienis consumit. Prodest & vrinae stillicidio, & ad virulentarum bestiarum morsus & ad infellus velut Iris ad menses ducendos. Succus radicis depurgat ea quae pupillis tenebras offundunt. Radix autem & in Antidotos vtiliter ammiscetur, Diosc. Acori radice vtitur Galen. quae gustu acri & modice amaro, odoreque non iniucundo, ordinis tertii in calefaciendo & exsiccano. Vnde constat quod facultatis calidae est, & consistentiae tenuis. Huic consentaneum est, vt vrinam moueat, & lienes induratos iuuat. Acorum in sua natural. h. passim commendat Plin. ad pectoris dolores, ad Tenesmum, ad duritias & collectiones omnes, ad contusa & cuerfa, & ad interiores foeminarum morbos. Cum radix Calami aromatici vulg. inquit Fuchsius, in commendando glutinosa sit, lingua astringens, amara, & subacris, eique propemodum omnes veri calami Indici notae quadrent, profecto & citra vilius reprehensionem pro vero Scapulae in eius penuria vti possunt. Lectores considerent quae Fuchsius de glutinositate & astringione in Calamo aromatico vulgari dicit. Acorus (autore Marthiolo) in vino aut hydromelite coctus, aut eius puluis inspersus & haustus, tollit à frigida pituita aut flatibus ortos morbos, quales sunt dolores colici, laterales, tussis, conuulsionis, obstructions hepatis & lienis: prodest iis in quibus ex ictu, aut contusione sanguis coit, & difficulter vrinam reddentibus, difficulter concoquentibus datur quotidie Acori pulverizati ʒi. cum pari portione Cinnamomi ex vino absinthie calido. Vbi recentis Acori copia est, conditur Saccharo aut melle, quo modo ad nos importari solet, etiamque in Germania & Italia eadem ratione condiri consuevit, ad omnia praedicta efficax. Ex Acoro fit Oxymel ventriculo & frigidis insigniter vtile, hoc modo; In pulverem crassiusculum teritur, affunditur acetum, operculatur, post triduum ad dimidias coquitur, perque linteum transmittuntur; dein additur mel pro arbitrio: iterum coquuntur ad acetum consumptionem. De hoc Oxymelite datur quotidie vncia vna cum supra dicto Acori decocto. Dodonaei aetate eclegmatis non absque fructu additur quando crassi, crudi, frigidique humores pulmonem & pectus occupant. Referebat Clusio Bern. Paludanus Tartaros plerumque circumferre hanc radicem, & aquam non bibere, quin prius Acori radix in ea fuerit macerata. Simile quidpiam de huius plantae nomine etiam tradit Marthias à Michovv Sarmatiae lib. 2. cap. 12. Recentes verò radices suo cortice delibras & diligenter repurgatas condire solent Constantinopoli, atque in vsum adseruare: manè enim ieiuni plerumque manducare solent aduersus corrupti

aëris contagia, vt referebat N. V. Philibertus de Bruxella. Condiunt etiam nunc in Germania Nobiles aliquot matronae in domesticum vsum, & pletique Pharmacopœi, quorum nonnullos [adèd nunc vulgaris istic est planta] singulis annis ad centenas libras colligere intelligit, & non contemnendum ex ea quatum facere.

GALANGA MAIOR

Galangam maiorem radix est duorum pollicum, maioreue crassitudine, crebris pollicaribus apophysis subinde donata, cortice satis extenso, circularibus zonis cincto, fusco, aut rubente, substantia solidiuscula, cinerea, albicanteue, punctulis (quae extrema sunt fibrarum) notata, matrice magis fusca, fungosaque, odore grato acuto, sed qui cedit Minori, vt & saporis acrimonia.

Galanga Clusii.



Galanga Acofi.



Zingiberi similem, sed maiorem, nonnunquam capitula hastulae regiae modo proferentem.

Euch. Ross. pro Galgan (Galanga) habet nescio quam fictitiam iconem.

Lonic. sub his verbis: Grosse Galgan/ Galanga

langua maior &c. Figuram plantæ non vix ponit, quæ potius nonnihil ad Calamam vulgarem accedere videtur.

Galangam maiorem [ait Anguill.] Acorum esse censet Lonicerus, quæ opinio verisimilior quàm Marardi. Turcis & Arabibus adhuc hodie dicitur *Vaete*, (legimus nos à Serapione *Rhulungen* dici, sicut ab Auicenna *Casirudan*) quo nomine Serapio Acorum appellauit: color qui attribuitur à Plinio Acoro lib. 25. cap. 13. in Galanga reperitur: cur vocata fuerit hæc radix Galanga nescio, quia non est Arabum Galanga.

Scribit Matthiol. epist. ad Qualebenum, Toto celo errare eos qui Galangam Acorum esse contendunt. Braßau. Afferere Acorum Diosc. aliud non esse, quàm radicem, quàm Offic. Mauritanos secute, Galangam vocent: adeo vt maluerint cum Lonicerò errare, quàm cum Manardo bene sentire. Braßauoli secutum esse fuchsum: Eumque cum sibi nimis pumila videretur prioris Galangæ radices quàm vt Acori referrent, ac propterea Braßauoli sententiam non probandam duceret, in suis de stirp. comment. alteram crassiorẽ Galangã, quæ iam pridem in Italiam fertur Acorum contendisse, verum eam non esse Iridi similem. Maiorem Galangam minore ignauiore, colore etiam dilutiore, minusque odoratam. Explodendam Monachorum in Mesuen. scribentium opinionem, qui contra Braßauolam & Fuchsum quasi velle videtur Galangam potius odoratum Iuncum esse quàm Acorum, quod tamen planè falsum. In post. Com. cum magn. fig. Lat. & Ital. addit aduersus Anguillaram, leuẽ, eorum rationem esse qui velint vno tantum inspectu Galangæ folio esse Acorum: tamen si concedant facili folium illud fuisse Galangæ, quod sciat hanc folio esse Cyperi latiore, vegetiorisque, Iridi non omnino dissimili: Ait porò in hist. Germ. Galangam Diosc. & veteribus Græcis ignotam, eamque esse duplicem maiorem & minorem. Matthiolus olim asserbat Galangam non esse Iridi similem, nunc ait folia Iridi non admodum dissimilia: nò puto illi vnquam visam virentem fuisse.

Neque Acoſta, neque Garcias ab Hort. Clusio satisfaciunt in Galangæ maioris descriptione, præsertim si ea quæ Europæ Officinæ vtuntur legitima est Galanga maior: etenim ejus radices multo maiorem habent similitudinem cum Iridis, quàm cum Asphodeli aut Zingiberis radicibus. Et certè omnino sibi persuadet Galangam nostram maiorem Iridis genus esse, huic fortè simile quod in sua Pannonicarum stirpium historia primum est, nihil tamen statuit.

Hist. Lugd. Galanga maior Penz. Item Galanga maior Acoſta.

Castor. Durant. figuram Costæ habet, quam etiam nos ponimus, licet non placeat, quia insignem demonstrat varietatem si bene facta: quod vix puto.

Galanga maior feritur in India Iaua, duntaxat radice vt Zingiber non femine, licet apud auctores aliud reperiat Garcias. Sed tamen & ex femine sata prouenit in India, in hortis, sed exigua quantitate, quanta videlicet acetariis & huius Gentis vsui medico sufficit. Cum essem Patruui Galangæ maioris nomine plantam vidi in horto Nobiliss. viri Jac. Cortusii, Iridi valdè similem foliis & radice.

Calida est siccaque tertio gradu: ideoque confert phlegmaticis & Stomachi humiditatibus, digestionem calore suo iuuat, cruditates statuit.

Tom. II.

que dissoluendo. Colicæ opitulatur, anhelitus suauitatem conciliat. Renes calefacit, semen, virgæque erectionem concitat, Serapio: Galangæ puluis naribus inditus, Cerebrum confortat. Confert etiam Cordis palpitacioni. Syncopas abigit. Vertiginosis ex planraginis succo auxiliatur. Omnibus denique morbis à frigidityte ortis confert, Lonicerus. Insigne Pharmacum; quo nos [inquit Io. Agricola] intolerabilem cruciatum sedare adfueuimus, qui nonnunquã circa vngues digitorum pedis cuiuspiam dolore inæstimabili affligit, vt Paronychia dici posset. Accipio autem Scobem Croci Martis, sic Chymistæ Cuprura appellant, collige illam sub incude fabri cius metalli, misce ferè cum tantundem laeoris Galangæ, adpone dolenti loco, & illicò ingentem illum dolorem sedabis.

Adeo autem vulgaris est, teste Acoſta, apud Malabareses huius radices vsus, vt non modò in medèis morbis eã vsurpent, sed in farina etiam conuertant, ex qua, seu nucis Indicæ lacte, nonnunquam Sura, aut Iagra excepta, certum quoddam panis genus pinunt in tenuium placentularum formam, quod *Apas* vocant: in delitiis est hic panis, præbentque iis qui ventriculi debilitate & frigidityte laborant in alui, doloribus, vteri affectibus, & vrinæ difficultatibus: ac miram eius efficaciam experiuntur, sine obhumores crassos & pituitosos, statimve aut arenulas in vteribus aut collo vesicæ congestas, vrinæ difficultas atque sitis, vel etiam ex carnis excreſcentia in ipso vesicæ collo aut meatibus nata. Præbent verò edendum huc panem, deinde haustum *Nimpa* (quæ veluti aqua ardens est) concedunt: in inguinibus verò supràque pubem & collum vesicæ, folia Nymphae decocta in aqua & macerata, atque adhuc calentia applicant.

Nimpa

GALANGA MINOR.

T Aleoſæ [quæ scilicet forma importati solent] minoris Galangæ digitalem, & minorem radices crassitudinem arguant, vnde iuncæ crassitudinis apophyses pronascuntur, eã ferè formã quã Cyperi radices conspiciuntur, Zonulifq; circularibus, perinde vt maior, cinguntur, cortex exterior rufescens, at multo odorator: substantia interior, vt rubricam amuletur, dura, compacta matrice parua solida, sapore & odore longè vegetiore generosiorque quàm Maior, & feruore aromatico teras saties abundè implente. *Eicquid præcedente habetur.*

Descriptio

Garcias hanc dicit duorum palmorum altitudine frutescere, foliis Myrti, radice nodosa.

Euchar. hoc titulo. Galanga, Galgan / figuram habet falsam, quàm etiam posuit pro Cypero.

Roessl. not.

Gesl. in cat. pl. Cyperus Babylonicus *Tax. d. 772*; Galganwur; / Galenga.

Matth. Galanga minor: Cyperus Babilonicus. Lonicerus sub nomine *flor Galgan* / sic etiam habet figuram, quã nonnihil ad calamum aromaticum accedere videtur.

Cyperus Babilon. Loniceri not.

Afferit Garcias Galangam veteribus Græcis ignotam; Arabibus non satis perspectam. His *Calnegiam*, licet omnes Mauritani & Serapio corruptè legat *Culangen* aut *Galangen*: eſeque duplicem, alterã minorem in China Lauandoa. Alteram maiorem in Iaua Lanruaz. In India vtramque Lancuas appellari. Auic. & Serapio nem exactam huius plantæ notitiam non habuisse hinc factum putat vt duo diuersa capita de

ea [quod etiam annotant Aduers.] scripserint. Antonium Musi Leonici testimonio, velle Galangam esse Acostum Veterum, sed non esse. Explodendam Monach. dist. n. c. 4. in Mesuem, opinionem, qui Galangam Schinanthi radicem velint.

Galanga (inquit Acosta ex vers. Clusii) medicamentum visibus humanis valde necessarium est, dignumque ut Pharmacopoea in suis Officinis perpetuo habeant: una minor, altera maior. Arabibus dicitur *Cauligian*, de ea confusè Auicenna, videntur Greci & Arabes, ut Auic. & Serapio, non habuisse perfectam eius cognitionem: Bellunenensis in suo Dictionario ait Auicennam scribere de duabus, licet tantam una. Opinio Monach. dum scribunt Galangam esse lunci odorati radicem, à ratione longè abest, quam etiam redarguit Amatus in Diosc. Galanga minor adfertur ex China. Hâc aliqui dicunt esse Acorum: sed folia gladiolo non similia, Galanga non est radix Schinanthi ut voluerunt Monachi.

Gariophyl. Galanga minore utendum in omnibus compositionibus suadet Cordus in Disp. in Atom. Gariophyl.

Galanga minuta siue minor quam vocant Officinam, sit Cyperi species potius quam Galanga aut Acori, est Lobel. & Penz. in adu. difficile ita tuere. Folia si sunt Myrti, ut quidam affirmant, non parum ab utroque illorum etiamque maiore Galanga distidebit. Verisimile, aut diuersas putatas fuisse Arabibus utramque Galangam aut non admodum notas Auic. & Serap. ac propterea eos caput duplex de ea instituisse: Lob. Obs. vbi figura ex Clusio l. c. p. 53. H. Lugd. quæ absurdissimum esse dicit, Galangam lunci odorati speciem statuere: & Tab. icon. Galanga minor.

Minor cum Rhabarbaro ex Chinaram regione in Indiam aduehitur.

Locus.

RADIX S. HELENÆ GALANGÆ species.

Descriptio



tinuum. Sapor eius aromaticus est & gratus ut Galangæ quædam species esse videatur: pollicari sunt crassitudine aut circiter. Herba verò parum habet caulis, & humi spargit ramos: folia fert ampla admodum viridia.

Nascitur communiter locis humidis in Flo-

rida.

Monard. par. 2. Ind. occid. l. 1. c. 4. *Pater noster* de S. Helena, quia portu quondam proueniat ita dicto. In Clusii vers. Radix S. Helenæ, qui annotat ex descriptione facultaribusque huius plantæ colligere licere, ad Cyperi genus aliquod referri posse, sed videant Lectores quæ Clusius de Drackena scribit cap. sequenti.

Hist. Lugd. *Pater noster*, vel Radix S. Helenæ Monardi.

Calida est in fine gradus secundi, sicca in primo, aut aliquid magis. Herbam Indi lapidibus terunt, eaque vniuersum corpus balneaturi fricant: aiunt enim cutem adstringere, membraque roborare odoris gratia. Hocque sæpius faciunt, ob insignem utilitatem quæ inde ipsis resultat. Puluerem tenuissimum eius tam Indi, quam Hispani in vino infusum ad ventriculi dolores, facili cum successu hauriunt.

DRACKENA RADIX.

CAP. XIX.

Radix Drackene ita bene descripta & depicta est apud Clus. de peregr. & Exot. ut nihil addendum videatur.

Londini (inquit) mihi donabat Gen. Eques



Frâcisus Drake quasdam radices, cum tribus aut quatuor lapidibus Bezaat Peruanis, quas Autumnus præcedente [absoluta navigatione, quâ totum Orbem, superato Magellanico tractu, circumueerat] tecum retulerat, illas summas apud Peruanos æstimationis esse asserens, propterea, illius

qui mihi eas donabat gratiâ, huic radici Drackene cognomen indebam, & ipsam in tabella expressam lectoris oculis proponebam.

Semunciali autem hæc, magna ex parte, erat crassitudine, & prælonga, subinde in nodos & inqualia capita extuberans, atque in summis capitibus, veluti è crassis squamis contexta. Dentarie resedens, siue verius *brassica*, [quam cap. 22. lib. 5. meæ Rarior. Pl. hist. describebam] ferè instat, fortis nigricans, rugosa & dura, quia ressecata, interiore parte alba: tenues fibras hinc inde adnascens habebat, quasdam crassiusculas, & maiusculas, duras & lentas, à quibus alii nodi dependebant: nullo manifesto odore præditam esse obseruabam, sed saporem habere deprehendebam nonnihil adstringentem & linguam exsiccantem initio, diutius verò manducata, remem suauemque acrimoniam in ore relinquere. Magnam quidem affinitatem habere videbatur cum radice S. Helenæ, de qua Nicolaus Monardes lib. Simpl. med. ex Occidentali India delatorum.

Scd

Sed cum N. Eliot, qui Drake in ea navigatione comitatus fuerat, Hispanos in Peru maximo in pretio habere, nec nisi difficulter redimi posse, referret, ab istis didicisset, folia præfens venenum esse, ipsam autem radicem, non modò illius veneni, sed etiam aliorum antidotum esse, & corac vitales facultates roborare, si pollinis in modum trita manè ex pauxillo vino sumeretur, ex aqua febris ardores mitigare: earum facultatum ratione, valde conveniret cum radicibus, veneno aduersantibus, de quibus eodem libro Monardes, in his tamen aromaticum saporem, & coloris gradum desiderabam, quem illis radicibus tribuit.

Hist. Lugd. Drakena radix. Tabern. Icon. Bezoardica radix. Noster Gener Io. Cherlerus anno 1606. ex Anglia Londino redeuns, munere celebris Pharmac. Jacobi Gareti attulit radices Drakenas, quas cum aliquandiu masticarem, a credinè molestem adhuc sentiebam, quam postea etiam deprehēdebam, & in iis, quibus anno 1609. Basilæ Cl. V. D. Iacobus. Zwingerus me donabat.

DRAKENÆ AFFINIS RADIX.

DRackenæ radices quodammodo affines videbatur [inquit Clus. Exot.] earum radices, quæ in ingente illa Prætoria naui Protegem ex Orientali India reuēcente, & ab Anglicis Naucleris occupata, reperiæ fuerant. Et enim tuberosæ erant, & quantū ex earū forma colligere licebat, summā terræ superficie repentes, multique vil-

lis & fibris obsitæ, fuliginoso colore præditæ, nihil tamen ad flauum tendente, saluam, dum manducabantur inficientes & amaræ, foliorum quidem aliquos pediculos adhuc retinentes: quæ illa verò illa fuerint, nemo facile dixerit. Ceterum magni vsus apud Indos fuisse, verisimile erat, quandoquidem prorex eas referret cum nobilibus aliis medicamentis in Orientali India natis. Iacobus Gareus cum sequente plantula resiccata mittebat.

Contrayerua radix.

Ex Charcis prouincia Petuana radices quædam venenis resistentes (inquit Manard. apud Clus.) aduehantur, iisdem radicibus valde similes, sed minores, & siculnei folii odore. Hispani Indias inhabitantes *Contrayerua* appellant, quasi dicas alexipharmacum, quoniam earum puluis ex albo vino sumptus, aduersus omne venenum cuiusque tandem sit generis, præfentissimum est

remedium, vino sublimato excepto, quod solâ lactis portione extinguitur, vomitione illud reiceere faciens, aut per sudores euacuans. Sed & a-matoria pocula, eo puluere hausto, educi ferunt. Ventris etiam animalia pellit. Gustata radix, aromaticum quiddam sapit cum acrimonia coniunctum: quare calida videtur secundo gradu.

ZEDOARIA.

CAP. XX.

Descriptio

Zedoaria duarum circiter vnciarum longitudine, minimo digito minor, foris cinerea, extensa, intus ex cinereo fusca, duriuscula, solida, tanquam concretus quidam succus, paucis apparentibus per substantiam fibris, sapore amaricante, & acri aromatico. Huic per omnia similis altera, figurâ duntaxat breuior, crassior, tuberosi.

Radices peregrinam naturam indagentibus Veterum notæ se primùm offerunt annotandæ.

De Zurumbetigitur, id est, Zedoaria, Serapio ex variorum autoritate ita scribit. Zurumbet sunt radices rotundæ, similes radicibus Aristolochiæ rotundæ, in rotunditate earum, & sunt similes in sapore & colore Zinziberi, & afferuntur de Zeni. Zurumbet est calidum & siccum in secundo gradu, & impinguat, impinguatione conuenient, & aufert ventositates. Et de proprietate eius est, quod aufert odorem Alliorum, & Ceparum & vini: proprietates eius est quod confert morui venenosorum, & retinet ventrem, Resoluit apostemata propriè quæ sunt in matrice, & retinet vomitum & confert ventositati colicæ.

Ex Auicenna si roges, Zedoaria quid est? Respondet is: Porciones similes Aristolochiæ, minores tamen eas, & est in sua virtute. Et melior quidem est illa, quæ cum Napello crescit, & eius vicinitas debilitat plantam Napelli. Item Zurumbet quid est? Est lignum simile Cypero sed est maius & minus odoriferum. *Natura*: Calida est & sicca in tertio. *Operationes & proprietates*: Resoluit Ventositates. *Decoratio*: Est impinguatua, & abscondit odorem vini, & Alliorum, & Ceparum. Membra anhelitus & pectoris. Est lætificatiua confortans cor. Membra nutrimenti. Retinet vomitum. Membra expulsionis, stringit naturam, & confert ventositatibus matrici. *Venena*: Confert mordicationi venenosorum vermium valde, ita ut propinqua sit Zedoariæ. *Permutatio*: Ponitur loco eius in venenosis, quantum ipsa & medietas eius durungi, & duæ tertiæ ponderis eius de taraxacon syluestri, & medietas ponderis eius de granis Citri.

Auicenna igitur easdem vires recenset, quas Serapio ex diuersis autoribus suo Zurumbet assignat. Hoc tantum distat, quod Auicenna calidum & siccum ordinè tertio statuit. Serapio autem ex Aben Mesue calido & sicco duntaxat. Hic conferre moribus venenatorum, ille valde conferre moribus venenatorum vermium, ita ut ad Zedoariâ proximè accedat. Quibus verbis innuit (inquit Hist. Lugd.) aliquid esse inter Zurumbet & Zedoariam discriminis.

Serapio de temper. simpl. cap. 261. Zurumbet aliud describit. Ex Galeno tradens id esse ex speciebus odoriferis, ac propterea admisceri in confectioibus aromaticis, & esse calidum & siccum prope tertium gradum, & in virtute sua simile Cassiæ lignæ & Cubebis. Et ex Possidonio Ci-

Zurumbet Arab.

Zurumbet.

Serap. m.

namomo Cubebam substitui posse: Et Paulum eadem quæ Galenus iisdem efferre verbis. Malè autem pro Cassidonio legit Possidonium. Zerumbet verò cum Pauli Arnabone idem faciat: ac eiusdem descriptionem subiungit auctore Isaac, Melarugia & aliis, inquit: Est arbor magna quæ nascitur in montibus Lubnem, id est in Oriente, nullum faciens fructum, habens folia longa, quorum color est inter viriditatem & Citrinitatem, similia foliis salicis, & ita color est ramorum etiam, & habet odorem sicut odor Citri; est calida & sicca, & styptica, resoluit & stringit ventrem. Virtus eius est sicut virtus Nucis Mulcatæ, verum est subtilior ea. Quum sit iterutatorum cum eo, & oleo violaceo, confert dolori capitis feruido & humido, & confert stomacho & hepati propter suam aromaticitatem. Ex quibus perspicere licet Serapioni Zerumbeth & Zedoariam easdem esse radices, nisi deprauata sint eius exemplaria; item aliud Zerumbet arborem. Auicennæ verò diuersas esse plantas, vt qui Zedoariæ radices Aristolochiæ radicibus comparat, Zerumbeth lignum Cypero: nisi hic sit Interpretum error, qui Zerumbeth Aristolochiæ radicibus, Zedoariam Cypero comparasse debuissent: præsertim cum ei quæ Cypero similis est, easdem prorsus tribuerit vires quas Serapio Zedoariæ, vt ostendimus. Hæc Arabes de Zedoaria & Zerumbet literis mandant. Ex quibus expendere oportet, an duæ radices, quæ in Officinis Zedoariæ & Zerumbet nomine veniunt, ea sint quibus vsi sunt Arabes. Sed hic quid dicendum, ex sequentibus colligemus.

Zadura.
vlt.
Arnabo.
Costus.
Zerumbet.
Zedoaria
rotunda.

Zadura, alii Zeduaræ radice [de qua Serapio cap. 172.] nunc ferè nostræ ætatis [inquit Ruellius] Medici, contra pestilentis cæli contagia vntur. Officinæ & Medicorum vulgus Zedoariam nominat. Zadura permultis Recentiorum medicamentorum compositionibus expetitur. Arnabo Mauritanis nomine Zerumbeti venit, qui de ea re parum sibi constantes Zedoariam alibi interpretantur, nomenclationis aucupio planè nobis imponentes.

Zerumbet
Serap.

Vulgaris vsus Zedoaria Anguillaræ est Costus. Zerumbet & Zedoaria rotunda res eadem sunt secundum Serapionem, hodiè potest videri Venetiis, quò satis adfertur. Zerumbet (vt scribit Syluius) Serapioni, Auicennæ, alijsque, & Zedoaria, Actuario in aurea antidoto dicitur, & idem in *diakousis*, & in diantho, alibi *zadura* & *zadura*: res est ac nomen barbarum Græcis prioribus incognitum. Est autem Zedoaria radix Aristolochiæ rotundæ æmula, sapore & colore zingiberis, calida sicca gradu secundo, eadè Serapioni dicitur zerumbet sine h.

zedoaria.
zerumbet.
zarnab.
zarnab.
Carnabium.
plum.

Idem sentire videtur Fuchs, qui de comp. medicam. ita scribit zadura, zaduaria, zudar, zadera & zaduar posterioribus Græcis appellatur, officinis zedoaria, Serapioni zerumbeth. Sapore ac colore ferè zinziberis. Quod Mauritanis zurubet nominatur, id recentioribus Græcis zarnabū zarnabadū, vel Carnabium & Carnabadium. Paulo autem Arnabo dicitur. Serapioni est rotunda & globosa, Aristolochiæ rotundæ radici similis. Hæc hodiè inter zedoarias longas ex India & Oriente afferuntur. Hinc est quod plerique zerumbet interpretantur zedoariam simpliciter, sed minù rectè, nam adiciendum erat rotundam, vt discrimen à vera & longa zedoaria hac adiectione innumeretur. Quapropter pro zerumbeth, rotun-

da illa nobis vocata zedoaria accipienda erit. Faciem Zingiberis representat, inquit Matthiolum, radix illa quam Mauritanii, & Officinæ zedoariam appellant, odorator tamen, amariſcula, neque adè vt Zingiber acris. Huius nusquam, quod sciam, meminerit veteres Græci, nisi Recentiores ab Arabicis edocti, nempe Agrius & Actuarius, eam suis medicamentorum compositionibus admisceant. Zedoaria [vt cap. 172. testis est Serapio] conuehitur è Sinarum regione ultra extremas Indiæ oras. Non desunt qui credant, quod Arnabo, de quo scribit Paulus, & Mauritanorum zedoaria vnum & idem referant medicamentum. Verum Serapionis testimonio cap. 271. Arnabo apud Græcos nihil aliud designat, quàm zerumbet apud Arabes: quippe quòd hoc loco de zerumbet eadem scribit Serapio, quæ de Arnabo ante ipsum adnotauit Paulus. Est autem Arnabo, vt ex Serapionis autoritate memoriæ prodidit Isach, arbor procerà in Oriente proueniens. Quibus facile patet, Arnabo non modò zedoariam non esse, sed nec in Europam ad nos aduehi. Quo fit vt Cordus aberrasse deprehendatur: quippe qui zerumbet zedoariæ genus existimet. Hunc fortasse secutus Fuchsius in lib. de comp. medic. non sine magno errore putat zerumbeth & zedoariam idem esse.

Cæterum zingiberi aroma aliud simile Arnabo videtur, quod zedoariam Officinæ Arabes verò, zerumbet vocant, à Græcis prætermisum, quia Carpesum Cubeba est, non verò zedoaria.

Diu existimauit Garc. zedoariam quæ celebrior est, eam esse quæ zerumba dicitur, & medicamentum est Persis expetitur, quod hinc [ex India] Ormuz defertur, inde Asiā in minorem & Venetias: zerumbet appellatur Arabibus, Persis & Turcis zeruba: in Guazarate, Decan, & Canara *Cachoraa*: in Malauar *cha*. Copiosè prouenit in Malauar, Calicut videlicet & Cananor siluis spontè. Si autem pangatur aut feratur, plurimis etiam locis: inde à multis Zingiber siluestre appellatur, nec id sine ratione, quoniam eius folia Zingiberis foliis similia sunt, longiora tamen & magis aperta: eius item radix Zingiber maior. Radix eruta, confcinditur & siccat, deinde in Arabiam, Persiamque defertur, in Gida & Alexandriam; vnde postea Venetias & in alias regiones transfertur. Conditur etiam Saccharo, & Zingibere præstantior est.

Auicenna lib. 2. cap. 43. duntaxat Zerumba aut zerumbet nouit. Sed quoniam eam vidit in frusta rotunda, interdum verò in oblonga, concisam ad Sinum Persicum vehi, duo genera esse existimauit zerumba & zerumbet. Hæc etiam de causa folia, quæ non viderat, prætermisit: & quemadmodum ipsa radix ex India in alias regiones transferatur, duntaxat expressit. Et certè etiam hodierno die, diuersum est præteritum eius quæ in rotunda frusta reſecta est, ab illius quæ in oblonga concisa est, vt minores Zingiberis radices villoris altimantur quàm prægrandes. Quod verò iuxta Napellum nasci optimam scribit, planè fabulosum est: quandoquidem Napellus vix hic reperitur [non sunt enim huius regionis siluæ procreando Napello aptæ,] & zerumba plurima, vt diximus, nascitur siluosis Malauar locis: cum etiam aliis multis sara prouenit: nec quemquam [tamei diligentissime perquisitum] hanc radicem iuxta Napellum visisse intellexi. Præterea ex reliquis Auicennæ iam adductis locis manifestum est, quàm sibi parum constet,

confer; vt facillè hinc iudicari possit cum Zumbet historiam planè ignorasse.

Serapionis autem legitimi Codices non habent additam expositionem Zerumbet, id est, zedoaria, sed ab interprete insertam verisimile est, qui differentiam inter Zedoaria & Zerumba ignorabat. Id ex sequentibus facillè deprehenditur, cum ait, è Chinatum regione aduchi, rarumque apud Indos inueniri. Zerumba verò abundè in India nascitur.

Non defuerunt qui crediderint, Arnabo, de quo Paulus lib. 7. cap. 3. scribit, idem esse cum Zerumbet. Verùm ex vtriusque historia, satis manifestum est, diuersas esse plantas. Siquidem Arnabo Pauli arbor est procera, suauis odore fragrans: Zerumba verò graminea est planta, vt modo diximus.

Ceterùm minùs sunt audiendi, qui aut Ben album & rubrum, aut Carpesium esse volùt: quoniam hoc vtrumque medicamentum huc non sine quæstu conuehitur. Zerumba verò hinc in externas regiones exportatur. Præterea longè diuersa est vtriusque facies à Zerumba.

Clusius apud Garciam ait Zeruba siue Zerumba forsitan erit ea radix, quam capite de Costo Venetiis adferri dixi, Zingiberi aded similem, vt nihil supra, plerumque tamen maiorem, & intus pallescentem. Inuenitur Antuerpiæ apud quosdam aromaticos Zedoariæ quoddam genus illis Blockzeval, id est, tuberosa Zedoaria nuncupatur, rotundum instar Aristolochiæ rotundæ, foris nigricans, interdum cinerei coloris, intus candidans, gustu viscalis Zedoariæ. Idem in append. hist. Dodon. Gall. cap. 18. Zedoaria rotunda Arabibus Zumbet (quamuis Serapio describat aliud Zumbet arborem) recentioribus Græcis Ζαδύρα, Offic. Galliæ Zumbeth. Belg. Zedoar bloef. Interdum reperitur cum Zedoaria vulgaris, verùm ignari Pharm. reiciunt vt inutilem. Ex descriptione Isaaci apud Serapionem apparet Zedoariam Arabum diuersam à vulgari Officinatum. Rondelopinatur esse Dioscor. Costum 1. siue Arabicum: pauca notæ deficiunt.

Zeduria siue Zadura herba & zerumbet: Prostant [vt voluit Lobel. & Pena in Adu.] peregrinæ duæ radices in officinis, neutra Græcis memorata: & vtræque & nominis sic radices eiusdem meriti putatur. Eidem Lobelio alibi: Zeduarium Officinatum, Belgic. Blockzedoar videnti & habendi copia fuit Antuerpia.

Hist. Lugd. Zerumbet Serapionis & Zedoaria eiusdem radices partes. Zerumbet Serapionis Clusio.

Casp. Bauhin. Phyt. Zedoaria 1. siue longa quæ ad Costum Syriacum Dioscor. referenda. Zedoaria 2. (quæ Græcis recentioribus Ζαδύρα) rotunda. Vnam tantùm radicem censemus, licet formà differant, sed eiusdem radices partes diuersas. Zedoaria 3. siue tuberosa foris nigrans, zerumbet Serap. Clusio. Vnam Zedoariam existimo non tres: siue neminem inuenio qui duas rotundas faciat.

Vnus ad colicos cruciatus, præsertim aduersum venenata, certissimus. Lob. & Pena Adu.

ZEDOARIA GARCIE.

Qvod nos hic [inquit Garc. lib. 1. Arom. Hist. cap. 42.] Zedoariam appellamus, Auicennæ lib. 2. cap. 752. (tamen non nouerit) Geiduar dicitur, aliud nomen ignoro, quia nascitur regionibus Chinenſum provincie vicinis. Magno

verò emitur Geiduar, nec facillè inuenias, nisi apud Circumforaneos quosdam & circulatores, quos Indi loques, Mauritanii Calandares appellant, hominum genus quod peregrinationibus & stipendiis emendicando vitam sustentat. Ab his enim & Reges & Magnates Geiduar emunt. Est verò Geiduar magnitudine glandis, eiusdemque ferè formæ, colore sublucido. Vnicum huius Geiduar fragmentum, quod circiter dimidiam vnciam pendebat, à Nizamoxa semel impetraui: sed id in Lusitaniam cum insigni lapide armenio missum, vnà cum naui perijt. Ostenderam id priùs Pharmacopolis in Chaul & Goa: sed nemo illorum nouerat quid esset. Aliud paucillum apud istos circulatores vidi: sed non emi, quòd fraudem metuerem. Vtile est autem istud Geiduar ad plurima, sed præsertim aduersus venena, & virulentorum animalium istus, morsusque.

Porro hoc medicamentum Dioscoridi incognitum fuit, cum etiam Auicennæ. Incognitum etiamnum Europæ esse putat Geiduar Clus. hic descriptum, & difficulter cognitum iri credendū est, ob eas rationes quas noster Author in medium profert. Nam quam Zedoariam vocamus, nihil minùs est quàm Geiduar: sed ex Zerumba forsitan erit generibus, quam sequenti capite noster Author describit. Tamen non desint, veluti in Costo diximus, qui eam inter Costi genera Diosc. descripta referendam censent.

Hist. Lugd. Zedoaria Garcia.

Casp. Bauhin. Phyt. Zedoaria 4. quæ Geiduar Auic.

ZINGIBER ET EIVS SILIQUA.

CAP. XXI.



Zingiberis Descriptionio

Radices pluribus tubibus planis, vnciam aut sexcunciam longis, digitali crassitudine, angusta ceruice commissis constant cā ferè ratione quā Anemones radix, vestigiis foliorum seu Zonis præcinctæ, cortice extenso, ex cinereo fulco, substantia intus cinerea, albicante, solidiuscula, fibris

longis & crebris intertexta, sapore feruido aromatico, Piperis æmulo. Prior nostra icon est ex Lobelio parata, quam tamen reiecit, aliam vt veriorē ponens.

Zinziber sic describit Garcias. Est similibus Iridi aquaticæ aut Gladiolo [non Arundini] foliis, magis tamen nigricantibus: caule cum foliis duorum aut trium palmarum altitudine, radice etiam Iridis, non serpente, vt voluit Ant. Musa exam. simpl. At nec admodum acris est, præsertim eius quod in Baçaim natum est, ob nimiam, quæ dominatur humiditatem.

Zingiber sui generis planta est, autore Diosc. in Troglodytica Arabia magnâ ex parte nascens: cuius radices Cyperi modo paræ sunt, candicantes & odoratæ, atque Piperis sapore imitantur.

Non est [inquit Plin.] huius arboris (Piperis) radix ut aliqui existimauere, quod uocat Zimpiberi, alii uero Zingiberi, quamquam sapore simile.

Zingiber.
Diosc. not.
Gingiber, ut in Plinii Codice legitur, herba est nomenclatura Barbara, antiquitati uiribus quàm facie notior: ut cuius Diosc. radicebus duntaxat paruas ut Cyperi memorat, eui tamen non similes admodum & multò maiores sunt. Effigiem quæ est tota Iridis aut Xyridis, ex virore nigricantibus foliis surrectis, hic damus, aiunt Lobel. & Pena Adu. nulli dùm depictam, qualem alebat Antuerpianus Pharm. Guill. Driefsch. cuius munere accepimus: tamen si flores ut pote Septentrionali rigidoque cælo, nullos prompsit. Siliquam perelegantem habemus Morgano recens allatam ex Indiis Occiduis, pusillâ Melegettæ parem: sed triplici carina triquetra graciliorem, & admodum Xyridis siliquæ accedentem: sed cortice capillulis obductam, albidam, intrus oppletam semine pari, lucido, Melegettas mansu facili, & multò gratiore, Zingiber prorsus testante: subrus etiam quâ siliquâ hæsit scapo arguit Gingiberis stipitem: quare omnes istas siliquas, Cardamomi esse plantarum consimilium, nec Gingiberi absimilium, non absrequidam peregrinator narrabat.

Cardamo-
mi siliquis
similes
Iconem suâ
priorem
falsam fa-
ciunt Leb.
Lin. scorami
con illegi-
tima
Icon noua
Lobeli.
Hæc Lobel. in Obs. tribuit semen aromaticum subastringens gustu, Zingiberis colore, album, Cardamomo maiori ferè par, sed oblongius, minusque feruidum, in triquetra item siliqua, rugosa, duriuscula, villis quibusdam & cirris obducta, chamæiridis pusillâ siliquæ non dispari. Libello autem de Balsamo ait, viso Zingibere legitimo, perspicuè percepi Zingiberis iconem munere missam à Dreisch Commentitiam & effictam è quodam veteri Botanico Germano esse. Nonus variarum rerum, ratioremque Indicarum stirpium author Io. Hugo Lin. cortus Barauus non nisi illegitimam zingiberis effigiem dedit, nos legitimam effigiem damus. Arundinem Vallatoniæ præ se fert nuper enatam. Calcetur ager proferit zingiber, ut notat Vartomanus, quod haud dubiè radix est, eruiturque nonnunquam pondo vnciarum duodecim. Nec omnibus est eadem amplitudo. Plus non agitur in profundum radix, quàm adernos vel quater nos palmos, Harundinum modo. Cùm eruitur Zingiber, relinquunt internodium radices in serobe, unde erutum est Zingiber, terramque radici aggerunt, seu femina eius radices, proximo anno eruturi fructum, id est, Zingiber. Qui Zingiber viderunt in India, hac facie [id nos docente Ruell.] representant. Radix geniculatis serpit internodiis, crebròque ex iis & ex acumine nouas radices spargit: folia bis rære in anno fundit arundinacea, sed quæ in breuiorem exilitatem fastigiantur: in totum Gramen dicunt æmulari, nec quicquam in ea regione frequentius inueniri. Subdunt nonnihil subesse discriminis in sapore quod maximè sentitur cùm præcox vel intempestiua fuit messis. Oportunum legendi tempus cùm folia inaruerint, alioquin & teredinibus obnoxium est, & carie tentatur: Cæterum [inquit Cornar.] quod Dioscorides radicales Zingiberis paruas esse dicit, quales sunt Cyperi, id est lunci

Radices de-
scriptio.
Folia Arun-
dinacea.

quadrati: id etiam hodie in plerisque apparet. Secundum notandum est (momentibus Monachis,) quod Mesues in fine ipsius descriptionis docet nos cognoscere qualitates & notas boni zingiberis, dicens. Et sit zinziber album & mundum, & recens: dicit autem album ad differentiam illius quod videtur esse rubei coloris: quod quidem non est purum sed tinctum cum quodam bolo, non Armeno (ut dicunt) atque vti nam esset, quoniam inde minus malum proueneret: sed cū bolo Apuleis, seu alterius loci nostræ regionis. Tingunt autem ipsū, non ut bonificetur, sed ut sit magis ponderosus, & ut impleantur foramina vermiculorum, ne videatur perforatum, & non tectens. Excusantes enim malitiam dicunt, quod ad meliorem ipsius conseruationem hoc faciunt, Attamen nos experti sumus, quod ita corroditur à tineis tinctum. Primum nempe zinziber est album, & quod quærit in præfenti & sequenti descriptionibus, & aliis locis. Unde sequitur, quod tinctum siue rubrum, & non album zinziber, non est admittendum ad medicinæ vsum.

Aduehitur, inquit Mathiolus, Zingiber in Italiam copiosum ex Calcut magno Indiæ emporio, atque ex Tragodytica Arabia non solum tractu temporis exiccatur, sed & saccharo recentissimum asseruatur, vel quodam mellis genere, quod quibusdam è siliquis exprimit. Id sane longè magis Veneto præstat: cùm hoc Officinatum mangonio ex aridis fiat radicibus, longo temporis tractu, modò acerrimo lixiuio calce, quernoque cinere parato: modò muria: modò dulci aquâ maceratis & edomitis, quibus odor non modò deperditur, ac euanesceat: sed & sapor & acrimonia subrahitur. Illud uero statim cū è terra effusū nulla ferè maceratione cōdiatur, Vires & facultates non exiit, sed eas seruat. Quamquam Braslausolus non rectè velle videatur, quod Venetiis magonizatum Zingiber gustantibus plus acrimoniæ relinquit, quàm illud quod recentissimum in India siliquarum melle, aut Saccharo conditum asseruatur, & cum aliis aromaticis generibus ad nos conuehitur. Quod quantum à veritate & ratione distonet, ii iudicare poterunt, qui diu in myropolis versati, rem omnino exploratam habent. Monachi de Carie contrarium asserunt contra Amatum dicentem: Aduehitur porro zingiber ex Insula Cananoris. Radix alba, quæ ne euanescat, ac vermibus corrodat, terra quadam rubra aqua dissoluta inficitur, ac sic insectam, rubrum zingiber appellat. Recentes radices, saccharo aut melleo quodam liquore ab Appolline conduntur, natali solo delicatiores, & siccilibus in Italiam apportantur, ut idem sit Venetiis & Mediolani, officinarum mangonio, ex aridis veterascentibusque radicibus: Verumtamen facillimè deprehenditur ex Braslausolo, quoniam ex recenti zingibere conditum, minus acre est, & gustu delectabile, ex veteri autem mordicat, nec ita gustum satiat, ac in fine nonnihil, velut filamentum, in ore relinquitur. Huius Math. verba corrumpit, nec sinceram hominis mentem assequitur, potissimum quod acris illum dixisse notet, Venetiis mangonizatum Zingiber, dulce autem viride proptia in patria conditum, quod si scripserit prædicta legentes diiudicent: Enimvero minus acre legitimum censet, id est minoris acrimoniæ, sophilico comparatum, quod tum acerrimo lixiuio, ex querno cinere, calcæque maceratum, modò muria, modò dulci aquâ

modò munià maceratū, modò dulci aquā maceratur: in his etenim est odor, ac naturæ acridinis parte spoliatur, non potest tamē tēporis curriculum, nō extraneā, ac intima subeire induere acrimoniā, ex maceratione præter naturam imbuta, eāque acquirat, acritus quā recēs asseruatū appellari, quod si aridum, non præmaceratū, conditurum fuisset, maiori profectò acumine gustum vellicaret: Sicque Matthiolum etiam impugnat, quòd humiditas aquea in viridi Zingibere de qua Gal. 7. sacrimoniā hebetat: ac nisi alios sales, recentiorū afferat, anagyrum mouebit, & à probatissimis viris facile refelli poterit.

Maximil. Trans de Molucis insulis Zingiber hoc modo (teste Clus. apud Garciam cuius descriptionem iam antè posuimus) describit. Zingiber verò passim in singulis Insulis huius Archipelagi nascitur: aliud feminatim, aliud sponte prouenit, sed quod feminatur nobilissimum est. Herba similis illi quæ Crocum (Indicum intellige, siue Curcuma) fert, & eo modo eius radix ferè nascitur, quæ Zingiber est.

Nunc Zingiber [vt Acolta ex vers. Clus. delineat] trium aut quatuor palmorum magnitudine assurgit, foliisque est Milio maiori, quod lachryma lobi vulgò nuncupatur, admodum similibus, caule verò Asphodelini crassitie, ex multis foliorum inuolutis constāte, vt veluti exigua quædā arundo appareat: radicibus quodammodò Iridi similibus. Mirabilis est figura Acoltæ, quæ non respondet descriptioni, eāque idèò omittimus: Cōpil. H. L. scribit foliis Lachrymæ lobi, seu Milii Solis: meliùs verò Clusius vertit, Milio maiori.

Hist. Lugd. Zingiber Penz. Item Zingiber Acoltæ. Anton. Zigafetta narrat in insula Thidore nasci Zingiber, idque recēs panis modo, quòd recens acre non sit veluti est siccum, parua plantam quæ caules ferat palmum altos, folia item similia, sed angustiora & breuiora, quorum nullus vsus.

Plant. Ic. p. 70. Zingiber Lob. 37. Adu. 33. Teut. 99. Et p. 71. Zingiberis siliqua cum grās suis Lob. 37. Teut. 99.

Zingiber Græcis ζῆγγιβρι: Germ. Zimber/ Zingiber. Belgis, Gengeber/ Gengber/ Gember/ Gingebar: Gallis, Gengembre, Zingembre. It. Gengeno, Zenciero. Hisp. Gengibre, Gengibre valadi. Anglis Genger. Appellatur Arabibus (vt ait Garc.) Persis & Turcis Gengibil, non Lengibil [vt corruptè legunt Serapionis lib. simpl. cap. 336. exemplaria] in Guzarate, Decan, Bengalacū adhuc recens & viride est, adra: siccatum verò, *seutle*: in Malauar, tam viride quā siccū, *imgi*: in Malayo, *aliaa*.

Pharmac. Guill. Driefsch alebat Antvverpiæ: Succulentē recens conditæ ex Indis variis locis, nec non Aphricæ finitimæ in Europam vltimam Septentrionalem & Meridianam vñum feruntur. Fließelingæ Zelandorum vidit Lobel. Obs. in horto Ill. Principis Mauritiū à Nassau, vbi alebat, solo leui, lateritis fragmentis rubris quo gaudet permixto. Persimilis aut eiusdem Zingiberis radices ibidem duo Pharmacopœi. Nascitur Zingiber in omnibus Indiæ prouinciis Garcie cognitis, semine aut radice satum. Nam quod sponte prouenit, exigui est momenti. Optimum & frequentissimum est Malauaricum; Arabibus & Persis maximè expetitur. Secundum locum obtinet quod in Bengala inuenitur. Tercium quod in Dabul & Beçaim, totaque eā maritima nascitur. In solidioribus & mediter-

raneis vix crescit, neque inde ad nos adfertur. Inuenitur etiam in Insulis Diui Laurentii & Comaro, quæ Aethiopie sunt conterminæ. Inde sumptum occasione nonnulli, vt scriberent apud Troglodytas & Arabes nasci. Colligitur & eruitur Decembri & Ianuario, deinde aliquātulū siccatum limo obducitur, non quò maioris sit ponderis, sed vt foraminibus obruratis, diutius sine corruptione in sua humiditate naturali conferuetur. Nam non probè obductum, teredini obnoxium est: Galen. lib. 6. simpl. è Barbaria conuehi scribit. Si per Barbariam Indiam intelligit, benè quidem, at si eam Africæ partem quæ nunc Barbaria dicitur, malè. Diosc. autem lib. 2. c. 171. in Troglodytica Arabia nasci tradit: (Plin. in Arabia & Troglodytica:) Nascitur quidem apud Troglodytas & Aethiopes, sed adeò exigua quantitate, vt ipsis incolis vix sufficiat. In Arabia verò non nascitur, quandoquidem ad Arabes exportatur.

Radices Zingiberis præceptore Dioscor. eligi debent, quæ teredinem non senserunt. Celeriter enim, attestante Plinio, cariem sentiunt, quamvis in tanta amaritudine.

Viridi herba ad multa vtuntur, quemadmodū nos (inquit Dioscor.) ruta, in potionibus quæ cibo præmittuntur coquentes, & aliis coctis ammiscentes. Vm habet calefaciendi, concoquendi, alium molliendi, moderatè stomacho cōmodam. Facit etiam ad ea quæ oculorum pupillis tenebras offundunt. Ammiscetur quoque antidotis. Et in summa Piperis facultatibus quodammodò simile est.

Zingiberis radix [teste Galeno] vilis est, quam vtrique ex Barbaria ad nos conuehunt. Excalfacit fortiter sed non statim primo occurſu velut Piper inde sanè & ipsum minùs esse subtiliū partium partium quā Piper existimandum, siquidem in tenues solueretur partes, & celeritè actū, vt illud, fieret calidum. Apparet enim illaboratam & crassiorē adhuc quandam ei inesse substantiā, nec eam siccam & terrestre, sed humidā potiùs atque aqueam. Quo fit vt faciliè perforeretur, cū scilicet recremētū inſit humiditas. Neque enim quicquam eorum quæ aut planè sicca sunt, aut humida, sed elaboratam & familiarem continentia humiditatem, huic vitio obnoxia sunt. Idem vsu venit Piperi longo: Atque hinc est quod diutius perseuerat quæ proficiscitur à Zingibere aut Pipere longo caliditas, quā quæ ab albo aut nigro. Nam sicut ab aridis caliginis flamma simul celeritè accenditur, & vndequaq; dispergitur: eundē in modū quæ à siccis potestate medicamentis edicitur caliditas. Atque prodit ab humidioribus, cū ligna sunt viridia, & tardius accenditur, & durat diutius. Ex quo fit vt vtriusque medicamenti diuersus sit vsus. Si quidem vbi totum corpus celeriter excalfacere consilium est, ea tunc exhibenda sunt quæ & celeritè à caloris nostri contactu incalſcant; celeriter quocunque ferantur. Verū vbi partem quamvis refrigeratam recalfacere studemus contrā agendum, nimirum quæ tardè caleſcentia plurimo tempore perdurant; ea præbendo: Ceterū licet Zingiber & Piper album hac ratione [alii legunt longum] à nigro Pipere differant, non magna tamen est differentia: at Nasturtium, Sinapi, Thapsia, & agrestium Columbarum stercus maiori tempore perdurant. Radix Zingiberis condita ad affectus ventriculi frigidus confert, sumpta manè jejuno ventriculo. Corrigit omnem ventriculi humiditatem, ac om-

Troglodyta

Zingiberis
mesit.

Delestam,

Vires
vsus

nem corruptionem generatam in eo ob nimium esum fructuum. In Syropo aut Saccharo condita confert tussis & refrigerationibus: pectus purgat, atque maturat pituitam viscidam & lentam. Valet contra obstructions hepatis, generatos a friguitate & humiditate, memoriam iuuat. Sperma auget & ad Venerem incitat. Denique Ginger calefacit ac vtile est in cibis, datum cum purgantibus vehementioribus, vt Colocinthide, Homodactylis & similibus, eorumque malitiam corrigi.

Calidum esse 2. gradu & nonnihil humidum Dodonæus statuit.

Inbecillo stomacho [aiunt Aduers.] vites instaurat, calorem fouet, aluumque emollit Dioscoridi: nempe si maturæ, sed teneræ, recentisque radices comedantur, nondum exhausto humido lubricante & purgante, vt vidimus in Iride, quare vetustiores siccant potius & sistunt aluum. Succulentæ autem recens conditæ, multa commendatione ex Indiæ variis locis, nec non Aphricæ finitimæ in Europam vltimam Septentrionalem & Meridianam venum feruntur: tamen iam vt emolliente exoletâ: maceratas lixiuo condiant saccharo etiam nostrates Veneti, Antuerpienses, & alii institutos passim.

De Zingibere condito.

A multis, vt testatur Plin. ob id, quod teredinem facili sentiant, radices Zingiberis condiri solitæ sunt. Quem ad finem Fuch. & Cronenburg de comp. med. zingiber conditum Meluæ ita conficiunt. Recipiunt zingiberis recentis, si habere possint, aut saltem arte humectati, partem vnâ, cum Sacchari partibus tribus, & coquunt. Sunt tamen qui zingiber humectatum cum saccharo clarificato triplo condiant. Humectandum autem zingiber album, purum, recens, aqua frigida assûsa. Qua ratione non solum radices, sed & fructus sicciores recentibus similes redduntur. Biduo enim sine coctione, in aqua frigida macerata hæc omnia intumescunt. Sunt qui zingiberis & aliarum radicum librâ vnâ coquunt in aqua, donec tenerescant, deinde tritas per cribrum setaceum trahunt, & denuo cum Sacchari libris tribus ad mellis consistentiam coquunt. Zingiber verò conditum intemperiem ventriculi frigidam & humidam sanat, & ab ea tardam ac deprauatam concoctionem, quæ cibos in acidam cruditate corrumpit. Viscerum lubricitatem corrigit, flatu dissipat, alimenti in iecur & vniuersum corpus distributionem accelerat.

Zingiberis species Mechinum dicta.

Descriptio

Est mihi zingiber, colore externo magnitudinis & figura ad vulgare zingiber proximè accedens, quemadmodum & saporis feruore. Verum consistentiâ est compactiori, duriori, paucioribus fibris intertexta, coloris ex cinereo nigricantis: de quo ni fallor Lob. Conditur etiam & prostat in Officinis alia radix Mechinum hodiè dicta zingiberi cognata, à quo nec maturitate aut improbitate differt, vt parum verè scripserunt, sed potius specie & concretionem, (caret quippe fibris & filamentis) perspicuitate, fuscedine, soliditate, & acriore gustu, nec teredinem exedi solita.

Lobel. & Pena Adu. & ex iis Hist. Lugd. Mechinum & zingiber fuscum Officinarum.

Secacul [inquit Rond. de cur. morb. in paraly.] est quod vulgò Mequicum appellant, radix simillima zingiberi, & conditur vt zinziger, sed est calidius, sine humiditate, quæ tamen reperitur

in zinzibere. Ob id zinziber patitur castem non Mequicum, qua nota distinguitur à zz. sicut etiam filamentis & villis quibus caret Mequicum, non autem zz.

ZINGIBERIS MECHINI RARA varietas.



Nec vnâ quâ nobis vîta antea hæc quam iconè exhibemus Mechinum species, nuper adferri cœpta, cuius Morganus aliquot emit libras. Vulgatum zingiberem aut Mechinum refert, sed elegantior aspectu, colore Mechinum, cortice zingiberis albi, sed squamatum geniculato, & ferè

articulato veluti Doronicum: aspectu pellucido: gustu quàm zingiberis multò acriore, & sicciore: carie non exesa.

Lobel. & Pen. Adu. & Ic. Plant. Mechinum rara varietas.

Hist. Lugd. Mechinum Penæ. Rara Mechinum species.

CVRCVMA SIVE TERRA merita Offic. radice Crocea.

CAP. XXII.



Cvrcuma vnde generum promiscuè in myrotheis reperitur: vna breuior, crassior: altera gracilior, longior: maxima longitudo vix duas excedit uncias, minima plus quàm dimidio minor: in vtroque genere oculi subinde conspiciuntur & radicum nouæ propagines, adhuc zonæ circulares. Superficies rugosa, coloris crocei, qui in penitioribus partibus interior apparet, quo & aquam in qua maceratur aut saluam si masticetur,

tur aut saluam si masticetur, tingit. Substantia solida & compacta, nec ita teredini obnoxia ut Zingiber, sapor amarus cum acrimonia aromatica, nonnihil ad zingiberis saporem accedens.

Garcia radix recens, intus crocea, foris Gingiberi perisimilis: vehementi amaritudine & acrimonia, dum recens est, caret: siccata vero acris est, sed non adeo ut zingiber, putoque sine noxa posse sumi: foliis est Milii maioribus, caulique foliaceo.

Acosta, maiora latioraque habet Crocum Indicum folia quam Orchis Serapias dicta, colore foliorum Scilla, dilutiora tamen & tenuiora.

Quid Plinio Dioscoridique fuerit Cyperus Indica herba, non facile fuerit ostendere, cum suo nomine nec Officinis, nec Herbariis quibuscumque, sed quodam potius ascititio & vulgari noscatur.

Defertur ad nos (Ruellii sermo est) ex India radix, quam officina Terram meritam appellant. Ea Gingiberi permixta sepius inuenitur, & propterea eius refert, manducataque magnam Crocati liquoris vim reddere cognoscitur, pictorisque ideò optime cognita, & iis, qui pro phaleris equorum ea vtuntur. Siquidem inducta verum aut fulgorem mentitur, quare auri loco ad exornandas aeneas laminas opifices vtuntur. Hanc igitur Plinii Cyperidem, siue Diosc. Indicum Cyperum id esse, quod terram meritam officinis appellari modò diximus, non ambigimus: cum ex India cum Gingibere deferatur, carereque dotes ei ab iis Autoribus attributae respondeant, nec effectu reclamante. Namque si libeat vim eius experiri, inuenies partes pilosas ea perunctas confestim glabrescere, tam aperte pilos derahit. Hæc Ruellius à cuius opinione non videtur discrepare Sylva.

Hoc interdum inter Zingiberis radices inuenitur (ait Fuchs. de comp. medic.) & Curcuma Sepalsis nominatur. Porro Serapionis Curcuma, ut ex vtriusque Historiæ collatione patet, non est nisi Chelidonium maius. Quapropter de Serapionis sententia Chelidonii potius radicem, quam Cyperi Indici Pharmacopœis vtendum esset. Nihil autem refert vtro vtiatur, quod Cyperus quoque Indica præsentem Diosc. attestante, pilothri vim illa exhibeat. Idem Monach. in Mss. Cronemburg. de comp. med. lib. 1. Apollo. & Clus. in sine Dodon. Gall. cui *racine d'Inde* græcè dicitur, Lat. Cyperus aut Cyperus Indicus Diosc. Offic. Curcuma, & Cornar. Colleg. med. Florentin. idem facit, quanquam videantur contrarij omnibus ferè reliquis cum dicunt de hac radice: Illud Curcuma Veterum esse non abs re plerique existimant. Idem cum superioribus sentit Amatus, qui dicit: Ruellius Cyperum Indicum, radicem quandam esse, quam Officina Terram meritam appellant, ait, quam nisi Curcumam Officinarum intelligat, procul dubio errat.

Curcuma, quæ à Veteribus Cyperus Indica dicitur, Cordo in Hist. duplicis est differentiæ, videlicet longa & rotunda &c. Idem in Diosc. ait, Cyperus Indicus cui à Dioscor. tribuitur amaritudo, cum ubique Curcumam in Pharmacopoliis vocant, quidam etiam Terram meritam.

Officinarum Mauritanos secutarum Curcuma (ait Matth.) præ se fert omnes notas, quas Indico Cypero reddidit Dioscor. Quandoquidem Gingiberi similis, eius odorem ferè redollet, gustu subamarefcit, & mansa Croci modo inficit. Quibus etiam illud accedit, quod depi-

latis medicamentis quibusdam admiscetur. Verumtamen sciendum est hanc non esse Curcumam à Serapionis Interprete pro Chelidonio descriptam: ipse enim nihil aliud pro Curcuma intelligit, quam Dioscoridis Chelidonium: quod fit, ut non desit suspicio erroris vel Interpretis vel Scriptoris, cum Curcuma neque Mauritania, neque Græcum sit vocabulum: Aphri enim Chelidonium Kautoch appellat, unde palam est Curcuma pro Kautoch in Serapione deprauatè legi. Quo factum est, ut priores tum Medici tum Sepalsarii, qui nunquam hæc perpenderunt, fuerint hallucinati: quippe cum eos lateret, cuiusnam plantæ radicem, Indica Cyperus referret, Chelidonii maioris radicem esse crediderunt, ob Croci succi similitudinem. Itaque Serapionis deprauatam lectionem secuti, Indicum Cyperum Curcumam vocauerunt. Indici Cyperi meminisse Serapio Dioscoridem secutus, proptèr capite de Cypero. Ex quo aperte constat, Curcumam Serapionis deprauatè inscriptam, Sepalsarium Curcumam, quæ procul dubio Indicus est Cyperus esse nequaquam. Crocum Indicum, inquit Garcia in Canara appellatur *Alad*: sic etiam in Maluara, sed propriè *maniale*: in Malayo, *cunber*: à Persis, *darzard*, quod lignum luteum sonat: ab Arabibus *habet*. Huius mentionem facere videtur Amel. lib. 1. cap. 200. & Caledniam siue Chelidonium appellare. Fieri autem potest, ut corruptum sit vocabulum, vocatæque sit hæc radix initio Arabibus *Aled*, quemadmodum & Indis, postea vero corruptè Caledniam. Ut autem hoc facilius credamus, me impulit, quod cum; caput de Curcuma siue Cucurmani lib. 2. cap. 166. [quod etià huic radici simile est], scripserim videam. Solet enim Auicenna de simpl. aliquo medicamento dubitans, diuersa scribere capita. Neque eorum auctoritas me mouet, qui per Curcumam Chelidonium intelligi dicunt, quoniam crocea sit radice, scribatque oculis perutile esse, quæ notæ etià Chelidonio conueniunt.

In nostris exemplaribus (inquit Clus. apud Garciam) Auicenna lib. 2. cap. 200. Chelidonium describit. Capite autem 166. de Chorcumani siue Chorchumina agit, cum hac interpretatione: Et est fex olei de Croco. Officinatum Curcuma, Dioscor. Cyperum Indicum volunt Recentiores. Præter nomina ab Orta enumerata ait Acosta ex vers. Clusii, Crocum Indicum, Arabibus etiam *Curcum*, Turcis *Sirosh* appellari.

H. Lugd. append. p. 11. Crocus Indicus Acosta: Terra merita.

Tab. ic. Curcuma, Cyperus Indicus, Gilburtzel.

Plant. ic. p. 72. Terra merita, Curcuma Pharmac. Cyperus Indicus Diosc.

Ceterum Curcumam seu Terram meritam Officinas nos verum Indicum Cyperum statuimus. Nec illorum sententia nos mouet qui Galangam, Cyperum Babilonicum esse tradunt. Sicuti nec eorum, qui per Cyperum Indicum, radicem Chelidonii intelligi volunt.

Nascitur plurima in regionis Maluara parte, videlicet in Cananor, & Calecut. Prouenit etià hic Goa, sed exigua quantitate. Magna eius copia ad Arabes, Persas & Turcos deferretur: qui omnes apud se non nasci, sed ex India adferri fatentur.

De viribus hæc prodidit Diosc. Narratur & alia species Cyperi in India nasci, zingiberi similis: quæ commansa crocea & amara reperitur: illita autem, pilis corpus denudat. Est per se, ait Plin. Indica herba quæ Cyperis vocatur, Ginc-

giberis effigie: commanducata Croci vim reddit. Cypero vis in medicina psilothri. Illinitur pterygiis. Plinius non distinxit vires ut Diof. quæ enim Diof. attribuit primo Cypero, hic etiam secundo attribuit.

Hæc & nonnulla alia sic tradunt Auerf. At vires perquam similes quasdam habet [præter Crocum succum quem mansu remittit] cum zingibere, tamen si gustu ignauiore, ingratiore, dote autem referendi viscera potiore: Ideoque hodie plerique cum zingibere miscent ad Ictærum. Vis autem philothri illa feruida videtur elanguescere, longa temporis & locorū intercapedine, atque tereidine, cui eadem obnoxia est, sed minus quam zingiber. Picthoribus & Chymistis hodie frequens est. Croco indigeno [inquit Garcias] vulgò vtuntur ad tingēdos condiendosque cibos, cum hic, tum apud Arabes & Persas, ob eam mirum causam, quod viliori ematur, quam noster Crocus, qui apud eos etiam prouenit: huius tamen etiam in medicina vsus est, præsertim autem in ocularibus medicamentis: tum etiam ab pso-ram, si cum Mali aureæ succo & Cocci, siue Nucis Indicæ oleo misceatur. Ad eisdem affectus commendat etiam Auicenn. Curcuma.

COSTVS. CAP. XXIII.

Missâ descriptione Costi, genera & delictum ita delineat Diof. Ex Costo præstat Arabicus, qui albus est & leuis, & plurimum ac iucundum habet odorem. Secundum locum obtinet Indicus qui plenus est & leuis, & niger, velut Ferula. Tertius est Syriacus, grauis, colore buxus, odore nates percellens, Optimus autem recens, albus, plenus per totum, densus, aridus, non corrosus à tereidinibus, non graue olens, ad gustum mordax ac feruens. Vim habet calefaciendi, vrinam ciendi, menses ducendi, & ad veteri affectiones auxiliarem, & in pëssis & perfusionibus ac fomentis. Contra viperarum morsus sextantem bibere prodest: & ad thoracis dolores, & ad conuulsa ac inflationes, cum vino & absinthio. Sed & Venerem stimulat ex vino mulso: Ducit etiam lumbricum latum cum aqua, illinitur quoque cum Oleo in rigoribus ante febrium accessionem, itemque resolutis. Purgat & maculam Solarem illitus cum aqua aut [pro h leggit & Marc. quod ad me attinet malo legere h quum ita legerit Gal. de simpl.] melle. Ammisce- tur etiam in malaginata & antidotos. Sunt qui admistis Helenii Comageni radicibus adu- lterent. Quod deprchenſu facile est. Neque enim ad gustum feruens est Helenium, neque odoris gratiam validam & nates percellentem exhibet.

Costus leuicula, planè amarâ, plurimam autem acrem calidam in se qualitatem simul & facultatem continet, autore Galeno, adeò ut etiam exulceret, cum ex oleo corpus eorum quibus per circuitu rigor inuadit, ante accessionem illo confricatur: sic verò etiam in resolutis & Ischiadicis, atque in lumina in quibus exalfacere partem quamuis, aut ex alto in superficiem extrahere quippiam est opus, ad Costum confu- gitur. Eadem de causa vrinæ mensesque prouo- cat, & ad rupta, conuulsa, ac laterum dolores congruit. Porro ob amaritatem quæ illi inest lumbricos necat, ob eandem & ad contractas vel ex Sole maculas, i phælus Græci vocant, cum aqua

aut melle vsurpant. Inest item statuosa quædam illi temperiei humiditas, per quam & Venerem excitat cum vino mulso. Hætenus Galenus. Libro verò de simpl. ipsi attributo quatuor Costi traduntur species, Ægyptius, Arabicus, Indicus, & Syrius.

Cæterum Theophr. inter ea [quibus ad vna- guenta vtimur] Costum reponit. Amaracinum enim ex hoc fieri scribit. Acredinem quandam, inquit, cum caliditate moderatam habet.

Plinius de Costo sic paucis agit: Radix & fo- lium Indis est maximo pretio. Radix Costi gu- stu feruens, odore eximio, frutice aliàs inutili. Primo statim introitu annis Indi in Parale insu- la, duo sunt eius genera, nigrum, & quod me- lius, candicans. Pretium in libras 16.

Auicennæ species tres sunt. Arabicus est, in- quit, albus, leuis, aromaticus. Alter est Indus, qui est magis leuis. Tertius est amarus, grauis odo- ris, qui nominatur garyophyllata. In quo à Diof. dissentit, scribente tertium esse Syriacum, grauem, colore buxo, & odore feruentem.

Serapio de Costo omnia ex Diofcoride & Ga- leno exscripsit.

Officinæ Arabes secutæ Costum fecere dupli- cem, dulcem & amarum. Diof. tamen & Plinius neque dulcis, neque amari mentionem vllam fe- cerunt.

Horat. Achæmenium Persicum dicit. Achæ- menii enim Persæ dicti ab Achæmino Rege, vn- de Costum venit.

Costus verus (si Bacch. credimus) non habe- tur, sed pro Costo quædam vulgaris radix vendi- tur, nec inuenitur dulcis & amarus, ut vulgus pu- tat, sed albus & niger, nunc Venetiis optimus venditur.

Costus amarus, siue Costus amara, siue Co- stum amarum (omnis enim generis Monacho- rum testimonio legitur) in Mesu. Antid. & in multis aliis locis dicitur ad differentiam dul- cis. Nec conuiendum cum asserentibus dul- cem Costum in rerum natura non reperiri, cum Costi sint plures species, & quod aliqua ipsarum dicatur dulcis probetur per plures non spernen- dos auctores. Nos autem non possumus deter- minare de Costo, quoniam adhuc nec Costum Amaram, nec Costum dulcem (supple veram) vi- dimus: quia hæc radix, quæ communiter hodierni aromatarii pro Costo vtuntur, non est Costus, nec Costi species: Etenim quilibet legens scri- pta doctiorum de Costo, clarè percipit, hanc Of- ficinarum radicem, non esse veram Costum. Diof- cor. quidem, Serapio & Auicenna tres describunt Costos, Arabicam scilicet, Indicam & Syriacam: sed cum loquuntur de costo Arabica, dicunt, quod est alba, leuis & Aromatica, & nihil de a- maritudine tangunt. Quod autem subtricerunt, Macer & Constantinus apertè dixerunt, quod nò est amara. Vnde Costus Arabica, quia non est a- mara, rectè dulcis potest appellari. Sed quia nec amara, nec dulcis vera habetur Costus, loco eius secundum Auic. ponitur medietas ponderis eius de optimo Pyrethro. Et secundum alios, loco eius ponitur Helenium, id est Inula vulgò dicta.

De Costo velut de re nota [ait Cornar.] Diof. tradit, ut cuius radicem solum expeti conſitet, id quod Plinius quoque dixit. Radix Costi gustu feruens, odore eximio, frutice aliàs inutili. Sc. Diuersa ab hoc (ait præterea) herba est iti- dem costus appellata hortensis, Piperitis aut siliqualtrum potius censenda. Ac quod in po-

Crocus no-
str.

Costus a-
rabitus.
Costus
Indicus.
Syriacus.

Delectus

Adulteru.

Temperâ.
Exulcerat.
Ad Ischia-
dicos.

Ad lum-
bricos.

Garciam Venetiis adfertur Costi quoddam genus Zingiberis radicibus adeò simile, vt nihil luprà, intus etiam fibrosum sed pallefcens, & eximie amaritudinis. Non defunt qui Zedoariam vsualem inter costi genera referant: & primum apud Diosc. descriptum Costum esse autement, quòd multas notas habeat, quæ Arabico illius Costo pulchrè quadrent.

Hist. Lugd. Costus Syriacus & Arabicus.

Camer. hist. Germ. ad Epit. Matth. Costus Arabicus omnino zingiberi cognata radix, not. G.

Lob. & Pen. Adu. zingiberis effigie Costus Arabicus & Syriacus: Item radix quæ cepit è Syria & Aegypto Venetias asportari zedoarie effigie: primus omnium Valerandus Dourea verum Costum esse censuit, cui Gesnerus primum frustum inter magnam copiam zingiberis fortè repertum specimen futurum Venetias ituro dederat. Turcæ institores persæpè venditabant Valerando rati esse zingiberem sylu. Ea Veterorum Medicorum collegio oblata adeò placuit vt dignam censuerint quæ Theriacæ inferretur anno 1563. Si cui propius zeduarium videretur exprimere noster Costus Syriacus Zingiberis radice simili & maiore, sua sanè opinione fruatur: nam & hanc dicunt ab vsque ultimis Oceani Orientalis Chinæ plagis in Persiam & Syriam, vbi etiam sed pauca oriatur, transmitti.

Tabern. Icon. & hist. Syrisch Costenwurzel. Casp. Bauh. Phyt. Costus 1. siue Arabicus Dioscor.

COSTVS INDICVS CLVSII, quibusdam locostus.

Iocostus nobis cognitus est radix pollicari crassitudine, cortice rectus crasso, rugoso, & inæquali, fusco foris, intus candicante, qui etiam color est reliquæ radicis, substantia verò solida; sapor amaricans cum acrimonia, quem mansu

promit, vnà cum odore violaceo vel Iridis Florentinæ. Adhæret frustum caulis ferulacei, striati, fuscogosa, & ex albedo fuluescente medulla copiosa factum.

Lobel. in Obs. Costus cum caulis ferulacei frustulo, radice pulla, num Diosc. Indicus Costus: Et Costus facie radicis Cetaurii maioris.

Iam decem & quinque annis elapsis Venetias adferri cepit. Costus ille nigrior eximia Iridis suauitate, mixta tamen cum tantilla hirci graueolentia. Antidotis minimè excludendus, etsi gustu peramarus & ingratus.

Plant. Icon. p. 74. Costus facie radicis Centau-



Descrip:

rii maioris cum caulis ferulacei frustulo, radice pulla. Num Diosc. Indicus costus: Costus Indicus Clusii. Lob. 38. Teur. 104.

Garc. in ea est opinione, vt vnum duntaxat costi genus esse credat. Costus, inquit, Arabibus dicitur *Coff* aut *Caff*: in Malaca vbi eius plurimus est vsus, *Puchos*, & inde, vehitur in Chinæ regionem. Græci & Latini ab Arabibus nomen mutuati sunt. Nam quod Serapio lib. simpl. cap. 318. *Choff* appellat, corruptum est exemplar, legendumque *Caff*; & quotquot conueni Arabes, cum nunc *Caff*, nunc *Coff*, nunc *Costi* vocant. Describitur autem Costus ab iis, qui viderunt, Sambuci effigie, & Arbuti aut Azimbri magnitudine, florem odoratum profertens. Porro quod Arabes eius duo genera faciant, amarum & dulce: factum esse puto, quod hoc medicamentum cum recens est & incorruptum, nullius amaritudinis sit particeps, candidiusque persistat: vbi autem verustate corrumpi incipit, amaritudinem contrahit, sitque nigricans.

Non videtur Clusio in Garciam huius Costi descriptio cum Veterum Costo continere. Nani ex Dioscoride, inquit, satis manifestum est, illorum Costum radicem fuisse, cum ait: Sunc qui admittis Helenii Comageni prædatis radicibus adulterent. Verisimile enim non est, fruticis ramum tantam habere cum radice affinitatem, vt radice adulterari possit. At nostri auctoris Costus minimum radicis habet, & ferè nihil nisi lignum est suo cortice contextum. Quare aut Veterum Costum ignorasse dicendum est, aut Arabum Costum (si is quem describit illorum Costus est) à veterum Græcorum Costo diuersam esse plantam. Costi genus Antuerpiam è Lusitania inuehitur solidum, cortice cinereo, intus candicans, interdum verò cinerei coloris: odorata est admodum radix, violaceum siue irinum spirans odorem, præsertim dum manditur: ei caulis fragmentum quod è terra extat, plerumque inhære adhuc conspicitur, ferulaceum quiddam referens, & fuscogosa medullam continens, vt facile appareat Costo nostri Auctoris plurimum conuenire.

An Amatus in Diosc. de hoc ait, dicens, Franciscus Lusit. qui Anconæ agit, mihi aliquot radices dedit, quas sub nomine Costi allatas esse dicebat, vt erant Venetias amicis missi, qui omnes verum Costum esse sensere &c.

Hist. Lugd. Costus Indicus. Matth. in post. com. Ital. Costus delatus ex India, vbi ipse Indis *Coff* dicitur quem existimo verum Indicum Diosc.

Camer. ad Hist. Germ. & Epit. Matth. Costus Lusitanicus qui Iridem redolet.

Tabern. Icon. & Hist. Indisch Cost wurzel. Costus Indicus.

C. Bauh. Phyt. Costus 2. Costus Iridem redolens, an Indicus Diosc.

Nascitur circa Guzarate, inter Bengala, Delli, & Cambaya, in Mandou & Chitor: Inde multi currus onusti *Uptor* aduehuntur in urbem primariæ regni dictam Amadabar, quæ in desertis sita est, & in Cambayete non procul à mari sitam urbem: vnde postea per maiorem Asiæ, nonnullam Africæ partem, & vniversam Europam deuehuntur.

Præcellit qui intus candidus est, cortice cinereo: inuenitur tamen etiam colore buxi, cortice pallefcens. Tanta est odoris fragrantia prædictus, vt plerisque nares feriat, & capitis dolorem excitet: gustu nec amaro, nec etiam dulci, ramentis iam senescens interdum amarescat. Nam recens acri

acri gustu est, vt reliqua aromata. Hoc vtuntur in multis medicamentis Indici Medici.

COSTI MOLVCENSES DVO.

Rvpellensis Medicus Louanicas duas radices peregrinas Costum admodum similes, Lob. & Pē. Adu. impertuit quas acceperat à Naucleris è Molucis Insulis, quarum altera maior

corticem referebat Sambuci adultioris & cineracei, rugis & plicis frequentibus, sapore & odore vehementi: altera minor radices Solani furiosi effigies, colore diluto pullo, gustu virente, vt vix ardorem lingua ferre aut sustinere queat. Illis iam persuasum erat Costi esse speciem, tametsi parum odorum esset, has autem

ambas Molucenses minus odoras iudicio studioforum subdidimus.

Plant. Icon. pag. 73. * Costus Molucensis corticosus, rugosus: †, Costus effigie radices Solani furiosi. ‡, Molucensis lignosus feruidior. Ad. 35. Teut. 105.

Casp. Bauh. Phyt. Costus 3. siue alius corticosus, Costus 4. lignosus feruidus. Costus 5. siue effigie radices Solani furiosi. An à Casp. Bauh. Ex duobus costis Molucensibus Lobelii in Adu. bene tres fiant considerandum.

Hist. Lugd. Costus Molucensis corticosus.

COSTVS HELENII FACIE OFFICIN.

Monuit Cordū Dioscor. quodam pro costo Comageni Helenii, hoc est Inulæ in Comagenie Orientis regione prouenientis, radices vendere. Sunt enim nostrā Campanā Inula densiores, quapropter facile hodie imperitis pro vero costo substituantur, ac hodie non mi-

nus quam olim adferuntur. Ex præter hunc nullum alium habent Pharm. vero costo similiorem. Nostrati Inulæ per omnia est similis, nisi soliditate tantum differret: colorem habet in cinereo candicantem, saporem amariusculem vt nostra, non tamen adeo acrem, idque adeo quoniam inucterascit antequam ad nos perferatur.

Lobel. & Pena Aduers. Fusca, grauis, & inodora radix Helenii, compacta, concretionem ignota, quā Officinæ hodie abutuntur Pro costo.

Plant. Ic. p. 73. Costus Comagineus adulterinus Officinarum, Teut. 102.

Casp. Bauhin. Phyt. costus 6. siue amarus Officin. seu Helenium Comagenum Diosc. & Cordo Helenii Comageni radix: & Lobel. Ic. costus Comagineus.

An Tabern. Costus Officinarum amarus, Biter costen wurz.

COSTVS DVLCIS OFFICINARVM

Centaurio magno cognatus.

RADIX Descript.

Rapud Camer. in Epit. notata D. Costi pharmac. species maior, solida, ponderosa & crassa radice, lineis à cætro radicis ad superficiem ductis apparentibus multis, species videtur Centauri maioris, etsi odorem eius non habet, saporem verò subdulcem.

Consideretur quæ dicuntur à Camer. de odore Centaurii maioris: illud etiam notetur: ad hist. Germ. ponit figuram notatam D. sed radicem non separari à Costo notato B. C. nec ibi fieri huius maioris Costi mentionem, vnde igitur tanta dissonantia.

Tabern. Icon. & h. Costus Officinarum dulcis Sūb Costensvūrtz, ita dictus, quia nullum singularem saporem aut odorem habet, ponderosior & solidior est amaro costo, contortus & rugosus: Non ausim asserere, costum Camer. & Tab. eundem. Vna tabella vtriusque figuras, proponimus.


C. B. Phyt. Costus 7. Costus dulcis Offic. Tab. Ic. p. 904. Costus Offic. dulcis. Camerario litera D. costi Pharmac. species maior.

COSTVS INGRATVS SIVE

Thapsiæ species.

Nuper vendi cæpit (autore Cordo in Diosc.) costi vice radix per transversum in taleolas secta, crassitudine plerumque manum complens, foris fusco, intus candicante colore, cortice crasso, substantia rata & leui: odore, cum teritur, rancidam aliquam pinguedinem olens.

R. r. 3



gustu supra modum acris, nauseosa, rancida, saluam creans & strangulationem comminans: non sine vitæ periculo lumitur: est enim Thapzia species in monte Garzano effossa, ut ipsi ex Agyrtis audiuius, qui semen eius nobis attulerunt, in umbellis, sceniculi aut Anethi modo, enatum, crassum, nigrum, magnitudine & figura Tritici, sapore radicis fux, quam Agyrtæ corrupto nomine vnâ cum Italis *Coffones*, quasi Costum amarum vocant: foris imposita efficacius etiam vero Costo, & profundius attrahit ruborem, tumoremque excitat & exulcerat.

C. Bauh. Phyt. Costus octauus.

An Camer. ad Epic. Marth. Figura notata A. Costus est amarus Pharm. levis, albus, intus medulla per medium magna, lineis in cortice transversis, ingrato admodum & vitioso sapore, medicato tamen.

CANNA SIVE ARVND INDICA, quibusdam flos cancri.

CAP. XXIV.

Descriptio



Inquilina Orbi nostro, caule geniculato cubitum & sesquicubitum alto surgit: Felis quam pro plâz modo maioribus, cornicula chartacea conuoluta primo pululatu æmulantibus, quæ ubi explicantur insigniter apparent amplâ, duorum palmorum latitudine, triu quatuorue longitudine, tenera, membranacea, modicè in acumen desinentia, à neruo medio secundum longitudinem decurrente, ex potrectis in margines agmine prædenso venulis obliquis: caulem summum ornant flores minio saluatorie tincti, Gladioli haud ita absimiles, capitello verrucoso insidentes, quod delapso flore grandescit, triangulumque fit & veluti spinosum (inquit Clusius,) ut Ricini fructus, in quo continetur semen per maturitatem fuscum atrum, & rotundum, Fabæ Veterum, siue fructus Loti magnitudine: radix nodosa & crassioribus fibris stipata, alios radicis nodos adnascens habens, qui stolonibus etiam matri similes proferunt. Hanc etiam describit Clusius, nec ferè aliter.

Vitæ Cæci.

Cuentas.

Quo nomine Veteribus dicta sit hæc planta Clus. se ignorare ingenue fatetur. Nonnulli hac ætate, quia illius flos nondum apertus, cancri vulgò dicti chelas, formâ & colore referat, Florem Cancræ nuncuparunt: alii Cannam Indicam, quia ex America primùm delata sit, & eius stolonibus Cannarum siue harundinum modò nodosi sunt: appellare maluerunt: Hispani & Lusitani *Cuentas* dicunt, à numero, quòd ex huius granis spherulæ ad numerandas preces idoneæ,

feri soleant, non secus ac ex tenellis Malis Aurantis.

Lob. Obs. p. 29. Arundo Indica, florida, Canacorus quorundam. Et p. 639. Folia Cannæ Indicæ, quibus G. Elemi inuolutur. Advers. Lobel. & Penz. Arundo Indica florida, ambigua inter Cannas & Acorum naturæ & figuræ. Parum mihi videtur habere similitudinis cum Cannis siue harundinibus & Acoro, nisi id propter radices dicatur nodosus.

Gesf. passim Canna Indica: Gladiolus Indicus, iisdem ferè quibus Canna, floribus, nempe croceis, Liliæ specie, ab Hispanis *Chenra* vocata, Arundo Indica. Non placet comparatio Gladioli Indici cum Canna Indica, longè diuersius flos: Gladiolus autem Indicus Gesnero est Lilium non bulbosum flore luteo quibusdam dictum.

C. Bauh. Phyt. Arundo Indica latifolia.

Hist. Lugd. Arundo seu Canna Indica Clusii & Dalechampii.

Canna Indica Montbelgardii pulchrè mihi prouenit, lata in Horto E. C. ac floruit Septembri, eam habui Lugduni in horto, vidi etiam mense Septembri Basileæ paruum plantam in horto D. Felicis antè multos annos, & postea anno 1592. mense Nouembri repositam pulchrè florentem: mihi etiam antehac obseruata erat folio lato & oblongo mense Aprilis Bononiæ in horto ad S. Saluador. Doctus vir Georgius Periburger Patavii annotarat ex Di. Guilandini colloquiis, in horto Patavino Cannam de India esse Cassiani Bassi Mestocalanum: Frater etiam C. Bauh. annotauit se ita audiuisset Guilandinum nominantem. Nos Elemi resinam huius foliis aliquoties vidimus inuolutam.

Lusitanie quibusdam monasteriis valdè frequentem videbam, inquit Clusius, sub stillicidio ad muros satam, etiam ipsa brumâ florentem: nunc passim à rei herbariæ studiosis alitur in fistilibus, ornatus gratiâ, rarè tamen apud Belgas ad frugem peruenit, quòd ferè admodum germinet, nec hiemem ferè istic potis sit, ut in sequentem annum seruetur. Viennæ autem Austriæ, multis annis in fistili alebamur, singulis annis flores proferentem, & probum semen interdum dantem, licet non adeo nigrum, ut quod in calidioribus regionibus crescit, sed fusci duntaxat coloris, minuscè etiam sese radice propagantem, adeo ut alternis annis fistili eximere, & nodos diuellere cogeremur, cè ratione, plures plantas ex vna adquirentes: verùm hieme in hypocaustum seu vaporarium recipienda erat, & proximo fenestræ vitæ loco, ut aère externo per rimulas ingrediente non nihil resciri posset, frigidioris aperti aëris, atque etiam cameratæ cellæ impatiens, semel autem aut bis ad summum, singulis hebdomadibus, adfusa leniter aqua riganda. Illud etiam in hac planta obseruabam, è vetustis stolonibus, cum marcescentes in vaporario præscinduntur, lachrymam exstillare albam, Tragacanthæ æmulam, subdulcem & lentam, æque in ipsis foliis istic etiam senescentibus, tenuè quoddam excrementum niri sapore.

* * * * *

ORCHIS SIVE TESTICVLVS
in genere.

CAP. XXV.

C Vin bulbis, Cæpa sc. Porro, Allio, Hyacinto, Asphodelo, Croco, Colchico, Tulipa, Lilio, Iride, atque aliis shis affinitate quadam cognatis, & Orchides censere conueniat. De quibus Theophrastus hæc scripsit. Quod si vera sit, quæ mirabilia & rara de Scorpione herba narratur, & reliqua huiusmodi haudquā incredibilia dici conuenit, quæ aliarum plantarum viribus attribui videntur. Humanis ergo corporibus ultra illa quæ sanitatem, morbos, mortemque spectat, herbas quoque alias suis viribus quid conferre possent asserunt, ut puta generandi seminis facultatem, atque sterilitatem, & quosdam ex eodem valere utrumque facere, sicut qui testiculus (ἰσχίον) appellatur. Cum enim gemini sint, alter magnus, alter autem parvus, magnum efficacem ad coitum datum ē lacte caprino tradunt, minorem verò obesse, ac inhibere. Habet foliū scillaceum (σκιλλοειδές) Læteris, verum leuius atque minus caulem simillimum (ἀνδροειδές) spinæ, quam Piritum vocant. Mirum ergo est, ab vna eademque natura, diuersitatem tantam virium proficisci. Nam vim eiusmodi esse duplicem, absurdum putari minime debet. Tum enim alii quidam, tum Aristophylus Pharmacop. plaricis, vires quoddam comperitas se habere dicebat, partim ut quis magis coire valeat, partim ut nihil penitus valeat. Id quoque se protogare plūs, minūse temporis posse, seu bimensē, aut trimensē: quæ quidē herba vel ad temperandos, castigandosque adolescentē aliquando se vti aiebat.

Orchis, quam Græci Cynosorchin vocant, folia habet (ita describente Dioscor.) per terram strata, circum caulem & fundum, oleæ molli similia, angustiora tamen & leuiora ac longiora: caulem palmi altitudinis: in quo flores purpureos: radicem bulbosam, oblongam, duplicem, angustam velut oleæ, alteram inferius: & alteram plenam, alteram mollem & rugosam. Orchis autem altera, quam alii Serapiadem vocant, velut etiam Andreas (ὁ δὲ σερραπεδίαν ὀνομάζει ἡνὶ ὅς ἐστιν Ἀνδρῆς, Matth. exempl.) ob multiplicem radicis vsum. Folia habet Porro familia, oblonga, sed latiora & pinguis, in alia incurua: cauliculos palmum altos: flores subpurpureos. Radix subest testiculis similis.

Cynosorchin, inquit Plin. aliqui Orchin vocant, foliis Oleæ mollibus, ternis, per caulem semipedis longitudinis, in terra stratis: radice bulbosâ, oblongâ, duplici ordine, superiore, quæ durior est, & inferiore quæ mollior. Idem etiam de altera Orchidi Dioscor. sententiam exponit, partim item Theophrast. Sed inter pauca mirabilis est, inquit, Orchis herba, siue Serapias, foliis Porri, caule palmico, flore purpureo, geminâ radice, testiculis simili. Quidam folio Scillæ esse dicunt, leuiori ac minori, caule spinoso.

Ceterum Theophrast. locum mendosum esse testatur Plinius, ut recte Hermolaus annotauit. Non enim Silphii, seu Læteris folium habet Serapias, ut Gaza conuenit, ἀνδροειδές pro σκιλλοειδές legens, licet id vulgata exemplaria habeant. Et enim Silphio folium est Apii, non Scillaceum, aut portaceum, ut Serapiadi.

Deinde quod sequitur de caule, & Gaza sic reddidit: caulem simillimum spinæ, quam Pi-

rum vocant: penitus falsum ac corruptum est. Siquidem spinosus huic herbe caulis, Apio (Raphano silu.) inquit Hermol. non Piro similis est.

Cornarius tamen legendum arbitrat, ὅτι ὁ γὰρ ὁ ἀνδροειδὴς ἢ ὁ χρυσοειδὴς ἀπὸ τοῦ χρυσοειδὸς. Sed nihil pronunciat, studiosos saltem admodnuisse vult, & ἀνδροειδὴ Plinium legisse: & radicis siue testiculad ἀπὸ τῆς radicem, quæ Pyri figuram habet, similitudinem esse: & ἀπὸ τοῦ vocem remere ἀπὸ τοῦ accreuisse sibi videri.

Orchis inquit Apul.] Græcis dicitur Satyrion, aliis Cynosorchis, aliis Extaticos, Erythron, Pannon, Serapion, aliis Orchis, Aegyptii Menem, Galli Vram, Itali Priapicon, alii Orminalem, alii testiculum leporinum nominant.

Multa (teste Rob. Cont.) Orchidis genera *Orchis odorata* deprehenduntur, inter quæ, quod Læserem refert *re Læserem*, odore, vulgò dicitur Benion.

Orchis Fuchsio dicta herba est, quod radices sibi inuicem haud secus atque duo testiculi cohæreant. Cynosorchis verò quoddam canum testiculis similem radicem habeat. Nota est herba utraque Orchis & Herbariis & Officinis.

Nostri (ait Cornar.) priorem *Enabenfrant* appellant: posteriorem *Ragwortz* / utraq; ab efficacia ad Venerem excitandam. Officinæ Testiculum canis vocant & cum Satyrio confundunt. Lectores ex sequentibus facile cognoscere possunt an duæ Orchides Dioscor. ita notæ ut sibi persuader Cornarius.

Errant (Matthioli quidem sententia) omnes ferè huius ætatis Seplæ, quippe quod Canis testiculis legitimi Satyrii vice passim in medic. vrantur. Nam hæc plantæ [si Dioscoridi credimus] notis ac facie maximè inter se distant, quamuis viribus & facultate non longè sint dissimiles. Verè autē Satyrium hæcenus in Italia videre Matth. non licuit. Testiculorum potè in Ananienfis montibus aliisque compluribus locis non modò duo inueniuntur genera: sed alia quoque longè plura, quibus & illud addendum esse existimaue- rit, cuius radix humanæ manus similitudinem refert. In eo crasse videtur Fuchsio quoddam Satyrium triphyllum, perinde atque canis testiculus cum duabus radicibus pictura expressit contra Dioscor. delineationem. Hallucinantur præterea, inquit ille, vna cum Mesue Patres illi reuerendi, qui eius antidotarium commentati sunt: quippe qui malè sibi persuaserint, tot esse Satyrio radices, quot Cani testiculos. Verum ii Dioscoridem consulant, & hinc quàm apertè decipiantur, intelligent. Sed his facile erandi occasio potuit dedisse Plinius, quem lib. 26. cap. 10. Orchin, id est, testiculum, cum Satyrio turpiter confudisse constat. Matthiol. proponit aliquot icones Testiculorum siue descriptionibus quas difficilè discernere & potiss. ex magnis iconibus. Multa sanè Orchios & Satyrii genera in nostris regionibus (inquit Tragus lib. 2. cap. 82.) nascuntur, quæ vno vocabulo Germ. *Margendrehen* vocant, propterea quod nonnulla eorum folia maculata, ac licuis quibusdam fugillata appareant: Anticula alias, quæ plerumque variâ peritæ artium *Stendelburg* / *Enabenfrant* / & *Creuzblumen* / appellant. Theophrast. omnes sub ὁρχων vocem comprehenduntur. Diosc. duo Orchios proponit genera, quorum alterum *χρυσοειδὴς* vocat, hoc est, Testiculum canis, alterum verò *ἀνδροειδὴς* cognominari tradidit. Nescio quid in hist. Germ. lib. 1. cap. 122. faciat figura Orchios, cum in contextu eius, nullam faciat mentionem,

In Thessalia molliorem in lacte caprino viri bibunt ad stimulandos coitus: duriores verò ad inhibendos. Aduersatur alter alteri. Orchis alterius radix maior, siue vt alii dicunt durior, ex aqua pota excitat libines: minor siue mollior è lacte caprino inhibet. Eiusque radices sanant oris vlcera, thoracis pituitas. Aluum sistunt è vino pota.

Orchis, inquit Galenus & Cynosorchis eadem herba nominatur. Vis radices eius, quæ bulbosa est & dupla, humida est & calida, & gustantibus dulcior (duriuscula Hist. Lugd. malè) apparet. Verum maior radix multam superfluum & flatuosam humiditatem habere videtur. Quare etiam pota Venereum excitat. Altera verò minor vice versâ, satis elaborata est, vt temperamentum eius ad caliditatem & siccitatem repat. Vnde non solum ad Venereum non excitat, sed etiam in totum contrâ inhibet & reprimat. Et max. subdit. Orchis quam Serapiadem vocant, siccior vim habet quam prior. Vnde ad Venere non similiter idonea est: Sed imposita tumores discutit, & vlcera sordida purgat, & herpes sanat. At siccata multò adhuc magis siccatur, vt etiam putredinosa & maligna vlcera sanet. Nam & subaltringuens quid habet. Et propterea cum vino pota, aluum sistit.

Camer. Radix Orchidum in vino stiptico cocta & rursus excoctata non laxi successu datur in dysenteria.

SATYRIUM VETERIBVS IN GENERE.

Satyræ duo tradit Dioscor. Vnum, quod simpliciter Satyrium vocatur ab ipso, quodq; alii Trifolium (τριφυλλον) dixerunt, quoniam vt plurimum folia tria (Marc. αἱ δὲ τὰ πρὸς τὴν ἄκρην φέρει δὴ τὴν νεκράσιν). Sic & Serap. & Orib.) ad terram refracta profert. Lápacho, aut Lilio similia, minora tamen & rubicunda. Caulem habet nudum [Lilium] longitudine cubitalem, florè Liliæ specie, album: radicem bulbosam, magnitudine (ovæ) Mali (num quantitate, num alia ratione simile Mali velut Dioscor. valde ambiguum, Gemma), fuluam (πύρρον, fuluam potiùs, quam rutilam dici putat, idem Gemma) intrinsecus albam, velut ovum, gustati dulcem & ori gratam. Alterum, quod Satyrium Erythronium aut Erythraicum cognominatur, quodque semen habet Lini semini [quis scit an deprauato codice Græco pro λινοσπέρμῳ sit legendum λιδοσπέρμῳ, vel νεοσπέρμῳ] simile, sed maius, robustum (ἐμφανέος) [splendens, & laue. Est radicis eius cortex subgracilis] Orib. πυκνός id est, densus Matthiol.] & fuluus: interna verò pars alba, gustati dulcis, & ori grata. Nascitur in apicis, & montanis locis. Et hoc inter spuria Diosc. alii Melium aquaticum vocant, alii Extaricon, alii Præapicum, aliis autem est Satyriscus, aliis Orchis, id est Testis Satyri. Romanis Molorticulum Veneticis.

De Satyrio ita Plin.: Duo Satyrii genera: vna longioribus foliis quæ Oleæ, caule quatuor digitorum, flore purpureo, radice gemina ad formam hominis testium, alternis annis intumescente ac resedente. Altera Satyrion Orchis cognominatur & femina esse creditur. Distinguitur intermodiis & ramiflore frutice, radice fascinis virili. [ego sane hic pro virili membro fascinum dictum accipio: vnde Horat. Ode 8. epod. Minusve liguet fascinū.

Nascitur ferè iuxta mare. Græci Satyrion, foliis Liliæ rubri minoribus, & tribus non amplius è terra exeuntibus tradunt, caule leui, cubitali, nudo, radice gemina: cuius inferior pars & maior mares gignat, superior ac minor feminas. Et a Satyrium aliud genus Satyri (Erythraicon appellant) semine viticis maiore, leui: duræ radicis, cortice rubro intus album iacudi, sapore subdulce: ferè in montosis inueniri.

Subicit (inquit Corn.) & hoc genus Satyrii Plinius ad præcedens. Galenus verò & posteriores Græci Satyrium Diosc. posterius omiserunt. Dalechamp. ait Plinium miscuisse Orcheon, Satyriorumque descriptiones. Planta quæ Græcis ορχέον Latin. quoque Satyrion dicitur [inquit Matthiol.] Arab. *Gaf alchaleb*, *Chaf alchaleb* lue *Taurich*: Ital. *Satirio* & *Satyrione*. Germ. *Stenzelwurcz*: Hisp. *Satyrion*, & *Supino de Raposa*. Gall. *Satyrion*. Sed quum Matthiolus antè dixerit verum Satyrium videre sibi non licuisse, cur tribuit illi inaniter vulgaria nomina.

Dolet Anguill. sibi incognitum Satyrium primum & secundum: Nec vix adhuc Herbaris vera Dioscor. Satyræ benè cognita sunt. Nec ita obuium est, quam plantam per Satyrium Basilicum, cuius semen ad Epilepsiam commendat, intelligit.

Ainatus ait veros Satyriones adhuc desiderari.

Fuchsum reprehendit Matthiol. quòd Palmas inter Satyri genera depingat, cum potius inter canis testiculos sint repta utandè.

Idem notat Meisem & Monachos, quod Satyris duos tribuant testiculos. Francisc. Alexand. verò ait contra Matth. Meisem non dixisse Satyrium sine testiculo, n vulpis duos habere testiculos.

Satyrium autem Matthioli primum à Calce. Satyrii æolario ei missum, teste Pona in d. descriptione motis Baldi Phallon Hollandicum est, cui adaptata tria folia Lapathi, de eo agemus lib. 40. de Fungis, sub Fungo Phalloide.

Satyrium quidem Erythronium dictam, volebat Val. Dourez esse medullam Nucis Cuciochoræ, vt monimus lib. 3. Est & Satyrium Erythronium quorundam bifolium flore vnico albo aut purpureo radiato, de quo hoc libro post Tulipis egimus: Tulipa tandem rubro flore fortè est Satyrium Erythraicum auctore Gesnero: nos haec opinionem improbauimus. Satyrium tamen triphyllon Dioscor. habet, quod conuenit cum Tulipa alba. Nunc Hyacinth. stellaris dumetorum quibuldam Satyrium verum dicitur, & Satyrium Erythronium: quam opinionem Dodonæus in fol. reprobatur. Vltimò habetur Satyrium Erythronium Matthioli à Cerhino missum, auctore Lobelio. Corn.

Orchis speciem, Satyrium primum existimat dicens: Satyrium noscunt & nominant etiam Officina, etiam si cum Orchis confundant. Nostri Stendelwurcz dicunt. Syluius Orchis speciem somniat Satyrium, idem Monachi in Mef. idem Cordus in antid. ac propterea eum superbè reprehendit Francisc. Alex. Satyrium Trifolium Fuchsi in Hist. pl. est Orchis species: De comp. verò medicam. ait nullum Satyriorum cognitum: Tragus sub Satyrii & Orchis nomine 19. plantarum species, ni fallor, comprehendit. Matth. ait omnes ferè Medicos huius ætatis & Seplarios errare, quòd canis testiculis legitimi Satyrii vice passim in medicamentis vtantur.

Pro Satyrio quidam Manu Christi & Palma Christi vtuntur, Fuchsi teste de comp. sed malè.

Satyrium Erythraicon

Plin. not. Matth. cef.

Fungus Phalloides Cuciochoræ Nucis medullæ.

Hyacinth. stellaris dumetorum.

Antiballos meca.

HISTORIÆ PLANTARVM:

quæ, ut ait, ad libidinem nullum imperum exci-
tat. Pro Satyrio substituit Fuchius radices Or-
chios vel Cynosorchios. Cronemb. ait solere
Sepiasarios Colonienfes facere Orchin Fuchii
marem angustifolium. Satyriorum vice solent
fufcipi canum testiculi, ut ait Amatus.

Operæ prætiâ ducit Tragus, paucis com-
morare, vnde Satyriones primam suam originem
trahere videantur. Non enim ex semine pro-
prio, ut sua fert opinio, hæc plantæ primam ori-
ginem ducit, sed ex alieno potius, hoc est, ex sper-
mate Turdorum & Merularum. Cum namque
Vere appetente antequam Turdi terra nostra ex-
cedant, aues commiscetur, mira videas, maxime
cum in luniperorum montibus, & pratis conue-
nerint, ita ut verisimile sit ex spermate horum, si
quando in terram fortè deciderit, Satyriones
primum nasci. Nam quemadmodum ex historia
florum videre est, tertio demum anno Satyri-
ones primos proferunt flores, quos nullum ut di-
ximus semen conficitur. Deinde constat, Saty-
riones, nusquam lætius provenire, quàm in mon-
tibus luniperorum & pratis, in quibus locis au-
culæ elcas suas quærere assolent.

Vires

Satyrii Triphylli radicem bibere oportet in vi-
no nigro austero ad Opisthoronum. Vtere præ-
ceptore Diosc.) etiam ipsa, si voles cum muliere
coire. Dicunt enim ipsam imperum ad coitum
concitare: Erythronium vero fertur non secus
atque Scineus libidinem excitare. Proditur e-
tiam, si modo radix manu teneatur Venerem sti-
mulare, eoque magis si bibatur in lacte Ovis
colonicæ (in lacte Ovino M.) data, nervos inten-
dit: eadem ex aqua remittit. Altera tumores &
vitia partium earum erumpentia, cum polenta il-
lita sedat, vel per se trita. De Erythronio ait: Ve-
nerem etiam, si omnimodò manu Erythraici radix
teratur [teneatur alii Cod.] stimulari narratur,
adeoque si bibatur in vino austero. Arietibus
quoque & hircis segnioribus in potu dari, & à
Sarmatis, equis, ob assiduam laborem pigriori-
bus in coitu, quod vitium proledamum vocant.
Et paulò post. In totum quidem Græci quum
concitationem hanc volunt significare, Satyriion
appellant. Hæc Plinius.

Idem de Indi herba apud Theoph. Prodigiola
sunt quæ circa hoc Theoph. autor alioqui grauis,
septuageno coitu durare contactu herbæ cuius-
dam, cuius nomen speciemque non posuit. Pos-
sit itaque & hæc Satyrium appellari: sicut idem
Plin. Aristolochiam Polythizon esse dixit.

Satyrium, aut Triphyllum (inquit Galen.)
humidum & calidum temperatura est. Quamo-
brè gustu quoque apparet dulce. Attamen recre-
mentitiam & flatuosam humiditatem possidet:
quocirca ad Venerem concitat. Hæc verò & her-
bæ ipsius radix præstare potest. Porro, ut quidam
aiunt, ex vino nigro austero potum sanat opi-
sthoronum. Hæc de Veterum Satyriis.

ORCHIS BARBATA FOETIDA.

Historia Orchidium vsque aded obscura est
propter insignem varietatem, ut nesciamus,
quæ nobis præmitenda sit: videtur tamen Or-
chis quam Barbatam foetidam vocamus, à cæte-
ris Orchidibus tot manifestis signis differre, ut
facile a quolibet, à cæteris distingui possit: quæ
occafio ut ab ea incipiamus Orchidum differen-
tias recensere:

Eius igitur bulbi, & reliquæ plantæ partes, si
cum congeneribus conferantur plerumque ma-
iores videntur: quippe cum bulbos iuglandem vna
cum suo callo



carnoso equa-
res magis in di-
ne obitu ue-
uerimus: filia
multa, magna,
L. liacea, la-
uia, & à radi-
ce, & in
caule, ad i-
psam vsque
spicam ferè
nata: caulis
crassus spicam
densam susti-
net florum ferè
tidorum: quo-
rum singuli pe-
diculo viridi
[cui appositum
foliolum sex-
tante longius]
intorto, ventri-

culo insident, calcari admodum breui, & viridi,
galea & alis foris ex albo virentibus, intus
purpureis punctis & striis notato: à la-
bello exterius albedo, interius purpurâ punctato
aruncus demittitur triplici cincto viridanti
compolitus, quorum laterales crispi breuiore
que, & conuoluti interdum, medius longior bis-
fidus propendit: odor grauis & viscosus: semen in
capsulis pusillum, vel ut ait Dodon. in valvulis o-
blongis itariis perexiguum.

Hanc cognouit Dodon. scribens in Hist. Gall.
Testiculus hirci, Gall. *Cuillon de Bouc*
Boexcillefens / vocatur etiam Testiculus lepo-
ris: sine iudicio in Officinis vsurpatur etiam pro
Satyrio. Item hist. fl. & in fol. Tragorchis cui
folia maiora quàm aliorum Orchium. Testiculum
leporis plerique appellant, nos ab odore, quo hir-
cum dum in flore est, refert, *tragorchis*, & hirci tes-
ticulum, dicere maluimus.

Lobel. Obs. Testiculus hircinus Adv. p. 62. Or-
chis Saurodes vel Scincophora, lacertarum æmula-
tione, Corn. Gemmæ: siue Tragorchis altera, vul-
garis testiculus hircinus seu Tragorchis, & Lepo-
ris testiculus nostras Adv. p. 62. Lobelius duas ico-
nes proposuit vnius plantæ, cur autem diuersis
locis posuerit nescimus. In iconibus Plantini
vnicam, eamque ponit quæ posterior p. 90.

Hist. Lugd. Orchis Saurodes vel Scincophora
Gemmæ, Testiculus Hircinus vulgaris.

Tab. Ic. & Hist. Orchis hircinus 1. & 2. *Boex-
hôle* 1. & 2. Duas proponit icones: non ta-
men demonstrat quæ in re differant: videntur sanè
duæ icones vnius plantæ.

C. Bauh. phyt. duas facit diuersas plantas: vni ti-
culus, Testiculus 14. hircinus longiore angustio-
reque folio. Alteri autem, Testiculus 15. hircinus
breuiore, latioreque folio. Addit inter utramque
non magnam esse differentiam: An ipse cum
animaduerterit considerandum.

Solo pinguissimo nascitur, Lobel. Floret cir-
ca finem Maii ac ferè vsque ad medium Iunii:
provenit in collibus muscosis, præsertim inter
vmbrosas conualles. Circa Montbe' gardum læ-
pius vidi etiam in horto Ill. E. C. priusquam ador-
nare

nare curarem, sponte enim multis in locis proueniebat: Inibi flos Maio.

Dodon. in hist. Gall. dicit: odor multum olfactibus capitis dolorem creat. Radix Testiculi succi plena, potissimum Testiculi hircini si edatur, aut cocta cum lacte caprino bibatur, Venereum excitat, roborat & corpus nutrit: Hecticis & iis qui alimento egent singulare remedium. Eum vero in Hist. Lat. pleraque omittere placet, ait autem: Nostra ætas omnium Orchidum bulbis ad Venereum excitandam vitur: & pharmacopœi compositionibus eò facientibus indifferenter quous adfiscunt: præstantiores sunt Tragorchios bulbi. Assumendi autem non sunt ambo bulbi, sed durior, plenior & succi plus habens: flaccidior ac rugosior minùs idoneus est. Est autè plenior, non semper qui maior, sed non raro minor, si videlicet bulbi colligantur priusquam stirps defloruerit: aut cum primum caulis erumpit. Nec etenim succulentior, alterum magnitudine superat, priusquam semen maturari cœperit. Nam alternis annis vnus bulbus intumescit, alter verò residet ac perit, ac cum durior ac succo plenior crescere incipit, alter flaccidusque contrahit, donec maturato semine vnà cum foliis & caliculis subinde totus subsident ac pereat: eo qui interea creuit vegeto ac succi pleno: & vicissim. Cur Dodon. eligit potius fœtidos, an quia fœterent, vt Hirci qui talaces sunt? Quod ad nos attinet, nos existimamus odoris boni & grati potius roborare corpus, alere, & sperma augere quàm fœtida.

Omnia Testiculorum & Satyriorum genera [vt Trago placet] quæ Germ. Stendelwurze appellant, calida sunt & humida. Nec debent nisi necessitas id postulauerit intrò sumi. Foris cataplasmatibus insitit imponuntur. Radices rotundæ & pleniores (sunt enim vt diximus nonnullæ vacuæ marcidæ & rugosæ) omnium Satyriorum, in cibo vel eclegmate vsurpatæ, ad Venereum stimulos addunt segnioribus. Vtilis est hæc medicina ad conseruandum & augendum genus humanum, modò ritè & quo debet modo vsurpetur. Rursus aridæ & marcidæ Satyriorum radices Venereum inhibent, quo nomine cœnobitis qui castitatem vouerunt (vt hi loquuntur) viles fuerint. Paucos tamen in eo ordine hominum reperias qui id medicamentum experant. Radices plenæ in lacte caprino bibi possunt, aut cum albo Pipere & melle, insitit Eclegmatis, confici ac assumi. Radices Satyrii maximè eius quod odoratum esse diximus cum vino & melle decoctæ, vlcera oris & quæcunque eius vitia sanant. Radices eadem tussæ, & illitæ, inflammationes leniunt, tumores discutiunt, vlcera fluentia purgât, sanantque veluti Aron & Dracunculus maior.

ORCHIS GALEA ET ALIS ferè cinereis.

Hvic bulbi fibræque appendæ haud aliis ab-
similes: folia duas vncias lata, quatuor aut
sex longa, quaternæ aut quina: caulis dodranta-
lis flores sustinet in spicam digestos, odoratos,
quorum singuli pediculis semuncialibus insi-
dentes, calcar breue exprimit: galea alisque foris
cinereis, intus rubentibus & saturatioribus pu-
niceis lineis striatis, quibus interiecta bina fo-
liola oblonga, valde angusta, rubentia: labellum
oblongum, in bis binas alas rubentes dissectum,



intus albi-
dum, punctis
rubris pictû,
foris ex albo
ad purpuram
declinans: in
riclu apices
herbidi. Cir-
ca Montbel-
gardum abun-
dat in colli-
nis pratis flo-
rens Maio;
Genueæ in-
dem copio-
se.

Fuchs. hist. Orchis mas
latifolia.
in vniuersum
maior quàm
fœmina, pro-
teriorque, vt
pictura ipsa

pulchrè declarat. Icon. dicitur G. Breit fua
benfraut mennle. Is autem pro descriptione
sue Orchidis ponit descriptionem Dioscorideam,
non tamen indicans se Dioscor. descriptionem
ponere, quæ sanè non responderet iconi, folia enim
non sunt Oleæ similia.

An Trago, Sarycium mas quorundam, pri-
mum idemque vulgarissimum, Maio mensis flo-
rens, quod in pratis reperitur, ternis aut quater-
nis plerumque foliis vestitum, Lili similibus.
Porro in duas species hoc genus, quod ad florem
attinet dirimitur. Aliud namq; flore comar pur-
pureo, aliud niueo, cœque Aniltochix vulgaris
flori consimili, &c. Eius autem Icon Fuchsi-
anæ similis est.

Satyrium
mas.

Aliud florè
purpureo;
Aliud
Alid.

An Matthioli in Dioscor. picturam habet nò-
mine Testiculi, postremo loco: Camer. in Epit.
hanc iconem omisit, & aliam subititit mutata
nonnihil descriptione: de planta autem, cuius i-
conem Camerarius exhibet sub Orchide albâ
calcare longo agemus.

De nostra Orchide Dodon. Gall. Orchios pri-
mum genus, le premier coillon de chren masle
dixit, Orchis, Cynosorchis, vnde dicit, Testicu-
lus, Testiculus canis: Officinis Satyrones, quam-
uis parua sit similitudo. Foliis Lili conuallii, flo-
res odorati atque variegati Dodonæus ean-
dem iconem ex Fuchsiō habet quam nos: ve-
rùm lib. de flor. & in fol. mutauit iconem & nu-
merum, & dicit: Cynosorchis altera foliis tri-
bus, oblongis & latis est, sed quàm antecessentis
(Cynosorchis prioris Dodon.) minoribus & an-
gustioribus, quinque aut sex, nonnullis caulè â-
plectentibus, qui dodratalis est: spica densâ, bre-
ui, in qua flores multi, colore ex candore pur-
purascentes, multis purpureis punctis, & inte-
riore partes obscurioribus copiosis exiguis lineis
ornati: formâ galeam aut hiantem cucullum
quoque referentes, dependente ex singulis velu-
ti animalculi quadrupedis, aut homunculi exten-
sis brachiis & diuicatis cruribus absque capi-
te corpusculo, eodem ferè modo, quo ex Saturni
ore depingi solent dependentes pueruli: radices
subsit duæ globosæ, nuclei Nucis Myristicæ ma-
gnitudine: adhærentibus ad annexum fibris ali-
quot crassiss.

Lobel. Obs. Cynosorchis maioris secunda spe-
cies Aduers. pag. 62. Cynosorchis altera Dodon.
Angl. Doggis codices. Alia icon est in Plantis

ai iconibus p. 175. hoc titulo, Cynosorchis maioris secunda species : & Cynof. altera Dodon. T. 214.

H. Lugd.
ger.

Hist. Lugd. Orchis 1. species Dod. 5. Matthioli. Ic. ex Matth. quam non audeamus dicere priorem Dod. lib. fl. nec in post. hist. suspicamur potius secundam, cuius descriptionem etiam ponit hist. Lugd. sed male nostro iudicio ad alteram iconem refert.

Tab. Icon. & Hist. Cynosorchis maior. 2. Grossfnabenraut 2. Et post. Testiculus latifolius 5. Matthioli, Breyt Stendelmurg. Duas figuras vnius plantae.

C. B. Phyt. Cynosorchis tertia latifolia hian-te cuculo.

Thal. Hircyn. Orchidis Dodonæi secundum genus.

ORCHIS STRATEVMATICA- MAIOR.

Sunt & Strateumaticæ vel Anthropinæ dictæ quæ iudicio plurimorum cæteras pulchritudine vincunt: flores vt galeæ vel galeati homunculi truci-

cis duntaxat manibus pedibusque. Prior eminente caule, folio amplissimo, id est, longo simul & lato, & subrotundo inter initia, flar intus candidus, maculis purpureis intertinctus, foris velut fibris purpureis, ac citrinis, impensius rubes: huius prouentus vberior in syluula Floridæ vallis: erupit mense Decembri, floret



Descriptio

à Maii auspiciis ad finem vsque.

Lob. Obs. & Ic. Pl. p. 184. Orchis Strateumatica, vel stratiotes maior, siue Militaris C. Gemmæ, quam merito Basilicam tertiam vocitare licet.

Hist. Lugd. Orchis strateumatica maior Basilica tertia Gemmæ.

Tabern. Ic. & hist. Testiculus 5. militaris Stendelmurg.

Orchin latifoliam alteram, quæ haud dubie genus Orchidis amplissimis foliis est, Clusius non modò in siluis Nemethvivar oppidi vicinis, sed etiam in Leytano saltu supra Manderstorf obseruabat, foliis quidem magnis & latis, sed infra superiorum amplitudinem, caule penè cubitali, magnis floribus spicacim congestis, eiusdem cum aliarum Orchidum floribus formæ, purpureis maculis aspersis, exalbidâ galdâ flores lingu-los tegente, radicibus geminis, crassis, superiore tamen breuioribus.

C. Bauh.

Phyt. Orchis 18. bifolia altera Clusio, Orchis latifolia altera. Cur C. Bauh. vocat bifoliam? Clusius non scribit talem esse, quinimò iconem, cui multa folia in post. hist. ponit quæ à Lobelio Strateumatica dicitur: eam autem ipse C. Bauhin. separans à Clusiana latifolia altera facit Orchidum 34. siue militarem maiorem.

ORCHIS STRATEVMATICA MINOR.

Cogmatu Strateumaticæ alterum genus (inquit Corn. Gemma,) folio quidem lato, sed breuiore, comâ magis propendulâ, propiusque cõsertis floribus, & ad vnum latus nutantibus galeis: color foris ex albo & cæruleo nonnihil cineritio mistus: habet maculas coloris puniceih: ad nos è montosis & asperis non procul à Bruxellensi ciuitate mittitur. Flos apprimè venustus utriusque generis, sed inodorus.

Lobel. Obs. p. 92. & Ic. Pl. p. 184. Orchis strateumatica inoi C. Gemmæ. Descriptionem Gemmæ posuimus, quæ respondet nostræ Orchidi galeæ & alis cinereis, pro qua tamen Lobel. etiam videtur habere iconem: diligentius hæc hist. examinanda.

Hist. Lugd. Orchis Strateumatica minor Gemmæ.

Tabern. Icon. & Hist. Testiculus strateumaticus minor 10. Stendelmurg.

C. B. Phyt. Orchis 34. siue militaris minor.

Strateumatica folio Liliifolius quàm simillima.

Præter iam dictas Strateumaticas, vel Militares, vidit aliquando Corn. Gemma & tertium genus folio lato, Liliifolius quàm simillimo, oblongo scilicet, & in mucronem subrotundum deinente, cui flos Liliifolius lacteus planè columbarum effigiem alis exporrectis pedibusque quàm optime repræsentans. Gaudet montosis & aridis: floret eodem tempore cum Anthropinis.

CYNOSORCHIS PRIOR DODONÆI.



Cynosorchis prima species, Dodon. hist. fl. & in fol. folia habet lata, pingua, Liliifolia propemodum similia caulem pedalem, aut alciorem, angulosum; & in eo flores copiosos, spicacim digestos, colore rubentis dilutæ purpuræ, cucullo aut galeæ parenti similes, ex qui-

quibus parte inferiore laciniosum quiddam, canis aut alterius animalis quadrupedis exuvio simile dependet, dilute & ipsum purpurascens, punctulis magis purpureis respersum: pro radicibus præter fibras supra adhaerentes, gemini sunt bulbii veluti testiculi, formâ aliquantulum oblongi, quorum vnus plenior ac vegetior alter rugosior.

Cynosorchis inquit Adu. omniū notissimus magnitudine, in pratis frequentissimus riguis, primò pillularum speciem habet Elleboris erumpentis, vel Colchici, deinde Lilii conuallii aut vulgaris: folia exerit terna aut quaterna, lenta, crassa, & mucore turgentia. Caulem verò sesquipedem longum, glabrum, nitidum, nycæum in summo: spicato flore conspicuum, odoratum, purpureum, maculis albicantibus, atque pullis variegatum: radix geminis constat bulbis effigie testiculorum, quos quasi pubes supernè multæ ambiunt fibræ, quibus, non secus atque ipsa planta superior, bulbii alimoniam adipiscuntur, & alternis perennem: alteri nempe iam flaccido & vacuo, altero succedente turgido & succi viscidii limpidi pleno, albuminis Ovi, quasi foret semen genitale, magnitudo quanta maioris dactyli, interdum Nucis iuglandis adulto: vieto verò, & rugoso multò minor, & situs inferior. Dulcis sapor, mucagineus, emplasticus, insulsus, odor candidus, pellucidus.

Lobel. Obs. Serapias Diosc. Cornelio Gemmæ: siue Basilica Syderites vel Erythræa floris omnino purpurei, & aliarum omnium facili princeps. Cynosorchis nostra maior p. 62.

Icon. à Lob. & Dod. proposita similis admodum est Cynosorchis maiori alteri Lobelii & Cynosorchis tertio Clusii: neuter tamen certum aliquod discrimen tradere videtur: Lectorum præterea erit perquirere an hæc ab aliquo alio Botanico tradatur descriptione vel iconè.

Hist. Lugd. Cynosorchis maior 3. Lob. Serapias Diosc. Gemmæ.

Tabern. Ic. & H. Cynosorchis maior. 3. Großfnabenkraut: Icon eadem cum Dodonæo & Lob. descriptio autem diuersa à Dodonæi descriptione, quam Tabern. posuit pro suo Cynosorchide priore, vt dictum.

C. B. Phyt. Cynosorchis 2. latifolia, altera Lilii folia.

Thal. Harc. Orchidis Dodonæi primum genus. Eiusdem alia species foliis quatuor vel quinque multò longioribus, dodrantalibus.

Hödelein. Folia lata cum nervis apparentibus, multis maculis aspersa, flores aut volanti similes, purpurei. Lectores considerent, an duæ icones & descriptiones vnus plantæ: non videmus occasionem cur Compilator separatim capite.

C. Bauh. Phyt. Orchis 31. de qua Lobelius.



ORCHIS MAGNA LATIS FOLIIS, GALEA fusca vel nigricante.



Folia habet quatuor Descriptione aut quinque, magna, lanceolata, striata, & teretipalmata, vncias circiter tres longitudo, nitida, & præter hæc duorum foliorum in terra racemata: cauli striato, sesquipedalis, superiora versus purpurascens, in quo staminibus maiusculorum, galea breui atropurea striata, quibus apprimuntur binæ alæ concolores, calcati paruo, ad pediculum longiusculum contortum angulosumque appresso: ex pediculo pendet labellum exuias martis aut zebellini expansas, egregie exprimens, vnâ cum crusculis & cauda aduersâ parte ex albo purpurascens: intima floris penetralia rubro candidoque variata sunt: odor levis non ingratus: sapor viscidus insuavis.

Hanc obseruauimus in Ducatu Wirtembergico cum contenderemus per montem ex vrbe Dornstet ad urbem Nagel, florentem menses Maii medio.

Icon quam proponimus ex iis quas sculptas emimus quod radices & folia attinet, non malè conuenit plantæ descriptæ, verum flores non placent: considerandum an ab aliis Botanicis sit descripta.

ORCHIS ORNITHOPHORA FOLIO MACULOLO Lob. Ic. Plant. p. 183. Teut. 219.

Orchidis Ornithophora foliis maculosis C. Gemmæ sunt, teste Lob. Obs. differentia accidentales plurimæ. Floribus: purpureis, purpurascens, albis. Foliis: prægrandibus, paruis, ovalis figuræ, ex lato in acutum desinentibus, ex acuto in amplum & rotundum.

Floret medio Aprilis ferè, & quandoque sub initium Aprilis vel finem Martii mensis.

Hist. Lugd. Orchis Ornithophora, foliis maculosis, Gemmæ.

Tabern. Hist. & Ic. Testiculus 15. Ornithophorus satis latis foliis, striatis, valde maculatis, diuersorum colorum floribus, purpureis, albis, & ex purpureo pallido. Testiculus vulpinus, Süßholz Tom. II.

ORCHIS ALIVS PURPUREVS, ALIVS
ex roseo eandus Trago siue quartus.

Satyrium
primum
Diosc. Tra-
go.



Testiculus
4. purpu-
reus alius
roseo ean-
dus.

Orchidis hęc
Icon quod sit
referenda confi-
derandum, nos
iam sculptam e-
minimus; huic ferè
similis est apud
Tragum, cui titu-
lus Satyrium
primum Diosco-
ridis, das 4.
Stendelmurz
Mennin. Ei-
dem Trago est
alia icon cui ti-
tulus, Cynosor-
chis mas quarto
loco descripta.
Hęc icon acce-
dit ad iconem à
Trago inscrip-
tam, Satyrium

mas quorundam, de qua egimus sub titulo Or-
chidis galea & alis cinereis.

Tragus autem sic describit: Quartus Testicu-
lus dum est generum si florem, quem alius pur-
pureum prorsus, alius verò ex roseo eandum,
purpureisque ac exiguis maculis notatum pro-
fert, consideres. Planta est omni ex parte satis
magna, cuius viridia & mollia folia Lilium ferè
referunt: Radices illius quę succulentę sunt &
dulces binis oblongis auicularum ovis, aut vete-
ris galli gallinacei testiculis, conferri possunt.

Considerandum an alius quispiam botanicus
huius Testiculi meminere, & inquirendum an
Tragus forè intellexerit Orchion maiorem to-
tum purpureum, licet nostra icon ac etiam ico-
nes ambę Tragi minùs respondere videantur.

CYNOSORCHIS DELPHINIA MACV-
lofis foliis flore purpuro-violaceo.



Cynosor-
chis Del-
phinia Lobel.
Icon. Pl. p. 174.
sessilibus est &
maculosis, ob-
tusioribusque
foliis: flore pur-
puro-violaceo;
caule ses-
quicubitali
maiusculo, o-
liuari gemino
bulbo T. 214.
Vide H. Belg.
Lob. p. 214.

C. B. Phyt.
Testiculus 8.
morianis fo-
liis sessilibus
maculatis.

Icon nostra ex

emptitiis an conueniat considerandum.

CYNOSORCHIS MINIMIS SECVNDVM
caulem maculosis foliis, floribus purpureis.



Cynosor-
chis Lob.
1c. Pl. minimis
& secundum
caulem peda-
lem maculosis
foliis: floribus
purpureis,
Lob. 1c. Plant.
p. 175. Teut. 214.
C. Bauh. Phyt.
Testiculus 7.
morianis mi-
nor foliis ma-
culatis.

ORCHIS MAIOR TOTA
purpurea non maculata.



Gemino bul-
bo magno
donata est hęc
Orchis, altero o-
blongo: folia
quaterna aut se-
na, longa, lata, la-
uia, splendens;
caulis dodranta-
lis & cubitalis
crassus, in sum-
mitate purpura-
lens: flores con-
fertim multi pur-
purei, & inter-
dum albicantes,
odore ferè nul-
lo: labello tripar-
tito, medio seg-
mento proten-
sore, tatis pun-
ctis purpureis in

viridi albicantēue notato, alis foris intusque
purpureis, calcari satis longo purpurante. Hęc
etiam folio maculato reperitur de qua antè.

Fuchf. Orchis fœmina minor. Icon. p. 119. Or-
chis foemina altera, Sed mal. Knabenfräulein
das ander, Minor est ut figura demonstrat.
Non placet Fuchfium iconem 4. loco ponere nec
demonstrare quā in re ea Orchis differat à præ-
cedentibus, quę nostro iudicio non erat sepa-
randa à secunda siue maculata Orchide.

Dodon. Gall. Orchios 4. genus, Second coillon
de chien femelle, valdè simile foliis secundo (nobis
dicto, Orchis maior tota purpurea folio macula-
to:) flores carnei coloris cū maculis paruis fuscis
(brunes:) Radices rotundę, sublongę, similes ovis
auium, minores radicibus secundi. Dodon. Ico-
nem Fuchfii habet, an eandem plantam quam
nos intelligat affirmare non possumus.

Mat.

Mathiolus multos Testiculos describit, (sed tantum icones proponit, & primo loco in vna tabella duas quæ differre videntur, quod autem referendæ nobis certè incertum, si licet coniecturari, accedere videtur vna ad Fuchianam anse dictam: De altera iconem eiusdem tabellæ vix habemus quod dicamus, conferatur tamen cum Cynoforchide tertio Dodonæi.

Hist. Lugd. Icones Matthioli duas in vna tabella proponit sub hoc titulo: Orchis 4. & quinta Dodonæi i. Matth.

Tabern. icon. & Hist. Cynoforchis maior prima *Grosfnabenraut* / describitur à Dodonæo & Matthiolo foliis latis pinguibus, Liliorum foliis valdè similibus: caule anguloso palmum alto vel paulò maiore: flores spicæ modo purpurei, galeam apertam referentes, labrum inferius punctis purpureis notatum: radix constat duobus globulis. Icon descripta est ex Matthiolo: descriptio autem ex Dodonæo de floribus [nulla icon] sed diuersa à Matthiolo: Descriptionem Dodonæi conuenire cum iconem Matthioli dicere non audemus, nec etiam scimus an exierit Orchis caule anguloso.

Item: Testiculus vulpinus 3. *Füchshölein*. Compil. ponit iconem valdè foliosam per totum caulem [qualem habet Matthiol. sub prima Testiculorum specie] hanc non describit, ea enim descriptio quæ est tertio loco non pertinet ad Orchidæ cui numerus tertius ascriptus: Iconum p. 665. pro testiculo 12. posuit iconem (sine descriptione) folioso admodum caule.

Casp. Bauhin. Phyt. Testiculus 6. morionis fœmina alter.

Hanc Orchin florentem Aprilis in pratis obseruauit propè Massouian Abbatiæ: & prope *pon de Roide* Burgundiæ, præcedentem folio maculato, & non maculato, de qua hoc capite: vt & hanc cum sequenti in eodem prato. Maculatam collectam in monte *Rar* transituli in horum III. E.C. Circa Montbelgardum & Bessordiam, circa duneta floret adhuc Maio.

ferentem, de qua Lobel. Ic. Pl. pag. 181. Teut. 219.

Et Obs. Orchis Ornithophora, vel Ornithes folio læui C. Gemmæ. Testiculus noster papilionis alas expansas referens, Adu. p. 62.

An Lob. Adu. p. 63. Testiculus vulpinus foliis latiusculis & toto caule appressis, floribus Papilionis volantes, aliisue passis se librantes æmulantibus.

Hist. Lugd. Orchidis Dodonæo quinta quædã species reperitur: floribus caule herbaceo subvirentibus &c. Pro hoc quinto Orchide fortè malè posuit Hist. Iconem Matth. primam quam postea Iconem Lobelii & Dodonæi ponat sub titulo hoc: Orchis Ornithophora folio læui, Gémæ.

Casp. Bauhin. Phyt. Orchis 30. spicæ ex herbaceo subvirente.

ORCHIS ORNITHOPHORA CANDIDA.

Plant Icon. p. 183. Ornithophora candida Teut. 219. Vide h. Belg Lobel. C. Bauhin. Phyt. Orchis 32.



ORCHIS MINOR PURPUREA ET ALIORUM colorum cum alis virentibus.



Radix in testes duos rotundos, alterum superiorem, alterum inferiorem, diuisa, cum fibris aliquot adnatis: *folia* octo aut vndecim nonnullis, magna, duas uncias aut paulò plus longa, angusta: *caulis* palmum aut sesquipalmum altus vel altior: *Flores* suaucolentes, vna vice se pãdentes, rubentes, labello lario, quàm præcedens, fimbriato; calcar etiam breuiore, saturatioribus punctis puniceis in albo carneoe distincti: *ala* mediã parte virentes, magis tamen intus quàm foris

Descriptio

ORCHIS ORNITHOPHORA FLORE colore herbaceo.



Am & quinta (inquit Dodon.) Cynoforchios quædam species reperitur *fœlis*, vt secūdus (nobis dictus Orchis galea & alis cinereis) canis testiculus: *caule* pedali: *spica* longa: *flores* colore herbaceo subvirentibus, ex quibus quod lacinia similè dependet, oblongum est,

& quasi quadrangulum.

Dodonæus omnia icones & descriptionem quam habebat in hist. Gal. pro quinta, aliam in histor. flor. ponit, cui in fol. iconem addit plurimum diston. II.

HISTORIÆ PLANTARVM

reliquâ rubentes, striati, singulorum florum pediculis appositum folium purpureum.

In hoc genere duplex florum varietas reperitur præter iam dictam : vni enim labellum albi-
cat, vix tantillum purpurei habens, purpura fu-
giente punctarum, per reliqua cum iam descrip-
ta conueniens : alteri flos totus cum calcari al-
bet, nonnihil ad luteum inclinans : alas cum su-
perposito folio striæ virides percurrunt : folium
quoque floris pediculo appositum virefcit. Hæc
Orchis multam ludit magnitudine & colore.

Fuchf. Hist. *Orchis serapias* aut *serapis*, Paulo &
Actio testibus, Græcis dicitur : *Serapias* Latinis :
Germ. *Ragwürz* Gall. *Serapim à trois couillon*.
Triorchis Serapias mas. Triorchis manifesto
ex ea appellatione argumento, quod non duabus,
sed tribus testicularis radicibus in terra nitatur.

Quo faciliè à prius dictis determinatur Orchidi-
bus. Item Ic. Triorchis mas minor. Fuchfius
ponit descripienem Diosc. pro sua, non demon-
strans esse Diosc. quod non parum duplicet. Si
Orchis de qua hic agimus reperitur cum tribus
bulbulis siue testiculis, id euenit propter iunio-
rem plantam adiunctam & primum proueniente.

Duplicet & Dodon. qui in hist. Gall. huic Or-
chidi, in sua descriptione tribuit tres bulbos, li-
cet non viderit, quod patet ex lib. ejus florum &
postrema historia, ubi scribit in nulla Orchide non
contingisse plures videre quam duos bulbos.

Matth. in Diosc. quarto loco Testiculi species :
In epit. pro tertio sine descriptione. In histor.
Germ. pro secundo.

Poterit considerari icon Cynosorchis morio-
nis fœminæ Dodon. & Lobelij de qua antè : quæ
videtur exprimere Orchidem de qua hoc loco a-
gimus, multa respondent, eadem est etiam in
Lugd. ut antè dictum.

An Tabern. Icon. & Hist. Cynosorchis morio
2. Gesprengt Knabenkraut : Hæc postrema Cy-
nosorchis habet folia læuia, angusta, striata, simi-
lia angustæ Plantaginis. Flores valde expansi, re-
tro pædet veluti corniculum : eis foliola quædam
auriculæ Morionis similia. Icon Tabern. eadem
est cum icone Cynosorchis Morionis fœminæ
Lobelii in Obs. & Icon. Plant. de qua antè pro-
ximo titulo egimus.

Tabern. icon & hist. Triorchis mas minor
Alein Ragwürz Mannlein. Icon modò dicta
est ex Fuchlianis, qualis nostra, cuius descriptio-
nem non ponit, & non benè separat capite pro-
prio ab aliis Orchidibus : nullam ponit descrip-
tionem conuenientem.

An Clus. in Pann. & hist. post. hanc tradit, cum
scribit : Orchis colore vario, siue quinta, qua-
tuor aut plura habet folia, summâ tellure iacen-
tia, Belgicæ Orchidis quæ passim in pratis matura
purpureum florem fert, similia, sed nullis ma-
culis aspersa : caulem palinarem, aliquot mino-
ribus foliis septem : cuius summum, multi flores,
exigua galeâ quobus foliolis constante, tribusque
aliis foliolis galeam ambricantibus : latiore barbâ
propendente, & obtusiore calcari præditi, & in
spicam nascentes exornant, coloris aut purpu-
rei saturatioris, aut dilutioris, aut ferè carnei,
atque etiam omnino albi, barbâ tamen plerum-
que vel exiguis, vel maioribus maculis sacurè pur-
purascensibus aspersâ, interdum etiam protus
nullis, præsertim in lacteis floribus : semen vt in
reliquis contortis vasculis continetur : geminas
radices, vnam superioris anni flaccidiorem, al-
teram recentiore, succulentam, tegunt mul-

ta candida crassiuscula fibræ. Inueniuntur pas-
sim in pratis Viennæ vicinis.

Clusius pro sua Orchide quinta, ponit iconem
Testiculi morionis maris Dodon. Hist. fl. & po-
stremæ, siue Lob. Obs. & Ic. Pl. Cynosorchidis
morionis cui folia maculata : Considerandum
an sit eadem cum nostra purpurea minore, cui
alæ virentes, quamvis C. Bauh. separaret.

C. Bauh. Phyt. Testiculus 9. morionis foliis ses-
silibus non maculatis. Orchis colore vario Clu-
sii. Testiculus 5. morionis fœmina Matthioli
Icon. p. 559. Testiculi species tertia. Lob. Cyno-
sorchis morio fœmina.

Hunc Orchin minorem cum præcedenti ma-
iore obseruauimus florentem ex primis Aprilis in
pratis humidis circa Montbelgardum : & propè
Moruillars flore albo & carulco & alido, hos
etiam florentes Maio circa Montbelgardum
transfusi in hortum Ill. E. C. Est ex primis specie-
bus Orchis vere florentibus, ac cum magno
toto purpureo floret : Genææ quoque obserua-
uimus.

ORCHIS SIVE CYNOSORCHIS tertius Dodon. Lobel. maior alter.

NO Iconem quam hic ponimus cum aliis
sculptam eminus, de qua Fuchf. icon. p. 18.
Orchis fœmina angustifolia, Sæmal Knaben-
kraut. In hist. Orchis fœmina maior, vt pictu-
ra satis demonstrat. Fuchfius iconem ponit ter-
tio loco, siue
vlla descriptio-
ne, non demon-
strans qua in re
ab aliis differe-
rat.



Dodon. Gal.
Orchis tertius
genus, premier
couillon de chien
femelle, magna
& lata habet
folia, Liliortum
foliis penè si-
milia : flores ca-
rulei [perles :]
radices rotun-
dæ & sublongæ
forma Quo-
rum autum : su-
perior rotunda
& parua, infe-
rior nonnihil

longior & crassior, utraque saporis valde dulcis.
Dodonæus iconem Fuchianam habet in sua hist.
Gall. Quo nomine tradar in hist. fl. c. 61. asserere
non audemus, nullam ibi figuram habet, conside-
randum an describat his : Tertia Cynosorchis
species folia edit angustæ &c. Dodonæus in fol.
candem historiam habet & iconem, quam inscri-
psit Cynosorchis tertius. Hæc autem Icon est
apud Lobel. Obs. p. 89. cum hac inscriptione Se-
rapias Diosc. secundæ C. Gemmæ, &c. Icon post.
Dodon. & Lobelij tantum habet similitudinem
cum Cynosorchide maiore Lobelij & priore Do-
don. in post. hist. vt insigne aliquod discrimen sta-
tuere non possimus.

Hist. Lugd. Serapias Dioscor. 2. Gemmæ. Or-
chis Basilica altera, Cynosorchis altera maior
Lob.

Hist.

Tabern. Icon. & Hist. Cynorchis maior 4. Groß knabenfraut. Icon Tab. est eadem quæ Lobelii & Dodonæi in post. hist. sed sine descriptione.

C. B. Phyt. Cynorchis 1. latifolia floribus purpureis intus albicantibus.

ORCHIS MAIOR TOTA PURPUREA maculoso folio.



Orchis maior tota purpurea folio maculoso, quæ in re differat de prætis maculis nigris in foliis considerandum ab ea quam maiorem totam purpuream non maculatam diximus: dicitur Fuchf. Icon. & hist. Orchis mas angustifolia, Schmal knabenfraut Viennæ / Alterum genus angustioribus foliis quam

Orchis mas latifolia, & maculosis magis, floribusque purpureis constat.

An Trago Cynorchis mas, Testiculus quartus duum generum, de quo paulo antè scripsimus, aliis roseo candidus.

Matth. Testiculi penultima figura ex Fuchfio sine descriptione. Figuræ tamen ex Plantino melius placent quam Fuchfii quas hic habemus.

Hist. Lugd. Iconem habet ex Matthiolo cum hac inscriptione, Testiculus morionis mas Dodonæi, ibidem descriptio ex Dod. de floribus: additque, Orchis secundum genus facit Dod. Matth. Testiculum quartum.

Apud Dodon. Gall. Icon Fuchfiana: Orchis secundum genus primo (sive ei cui galea & alæ ferè cinerea) nonnihil simile, foliis tamen angustioribus, tenerioribus, cum maculis nigricantibus: Flores modò carulei obscuri (pers. obscuri) modò nitui candoris. Radices oliuarum modo rotundæ: vna noua & plena, altera fungosa rugosa & flaccida. Idem hist. fl. & in fol. Testiculus Morionis mas, cui folia sunt quinque, aut sex, longa, lata, læuia, Lili foliis similia, quædam minora, superius maculis aliquot subnigricantibus signata: quorum vnum & subinde alterum caulem quoque circumplectitur: caulis dodrantalis: flores in spica purpurei, circa umbilicum albidiores, odorati, & aspectu grati, posteriùs corniculum habent propendens, simile ferè corniculo Regii floris: anteriori verò cucullum auriculatū & cristatum Morionis referunt. Nam cuculli cuiusdam & parentis galeæ modo flosculus hiat, & angusta foliola, quæ à lateribus surgunt, auriculæ: quod verò è medio attollitur, cristam refert: radices gemini sunt globuli nucleo Nucis Myristicæ similes, supra quos fibræ exeunt. Si Dodon. eandem quam nos intelligit, considerandum an icon bene respondeat.

Tqm. II.

Tab. Hist. & Ic. Cynorchis maculata **Mariendrech Mänlein.** Cynorchis morio mas, **Gesprengt knabenfraut:** Quintæ speciei folia sunt crassa & lata, multis maculis aspersa. Flores prioribus similes, coloris nonnihil viridis, huic similis sexta foliis maculatis: quæ maculæ sunt ex nigro virides, flores albi & purpurei grati odoris, similes capitibus Scultorum. Icon prior Tabern. accedit ad iconem Matthioli, secunda ad iconem Dodonæi: quas autem plantas intelligat non asserimus adhuc.

C. B. Phyt. Testiculus 4. morionis mas foliis maculatis.

Orchis fatidissima Clusio.

Similem quintæ (Orchidi colore vario) observabam [inquit Clusius in Pannon. & Hist. post.] in pratis vrbis Londinensi in Anglia proximis; ubi etiam n. erub. n. grandiore paulo. Horum purpureorum spicæ teretissimi fœtoris.

Casp. Bauh. Phyt. Orchis 13. fatidissima Clusii.

ORCHIDIS GENVS PARVVM FLORE proflus purpureo odoris suavisimi.



Quintum Testiculi genus Trago bipartitum est, vtrumque folio vestitum Lilio simili: **Flore** emicans purpureo proflus, nec enim illas ostendit litoras, eoque instar frumentorum in spicatū desinente cacumen: quod in hoc genere minimum existit suavisimo commendatur odore, & ad Gariophyllæam accedens odor.

cedente. Nasceitur vtrumque in asperis plerumque montibus subter Iuniperos, terrâ forti & alba gaudens. Orchis quinta odorata, **Sas 5. wo. richend Nargendreh. n.**

Tragus propriam huius habet iconem: considerandum an icon nostra ex empiriis pro ea poni possit, vel an aliquam potius denotet Orchidem.

Perpendendum etiam an à Clusio in post. hist. sic tradatur: Orchidis genus elegantissimum siue tertium binis crassis bulbis præditum, vno succi pleno, altero flaccidiore, quod in Orchidibus vulgare est: foliis longis, angustis: caule interdum pedali, spicâ florum elegante, odoratâ, quorum galeola obscurâ purpurâ niter, hiatus cum propendente labro candicant, purpureisque maculis insigniuntur. Inuenitur in pratis Nemeth-vyyvar Dn. de Batthyán vicinis, supra Rabam & inter flumina Muram & Drauum.

C. Bahin. Phyt. Orchis decimaquinta obscuræ purpurea.

ORCHIS MINOR FOLIIS TENUIORIBUS reflexis flore punicante.

Orchidis minor (species Thalii, foliis est tenuioribus in terra, vixit, quibus, lenis, septem alicuiusmodi, breui d' gual, quandoque dodrantali, tenui, spica breuior florum puniceorum pauciorum. Nascitur locis apricis circa Gerencrodum.

ORCHIS PARVO FLORE RVBRO sine phaniceo.

Delemp.

Icones su-
pra p. 14.

Orchis hæc palmo maior foliis pluribus non magnis, caulem multum amplexatibus: floribus veluti in spica sexunciali longa, & penè vincta lata, parvis, rubris, & penè vinctis coloris: an forte Testiculus morio rectius Dodonæi?

Icon quam posuimus est ex iis quas emittit, quæ aliquatenus exprimit nostram plantam.

Considerandum an de hac scribat Clus. H. post. Orchis 2. cui folia sunt plura, quam latifolia alteri, angustiora: caulis gracilior, pedalis, flores rubri pulcherrimi, quales ferè in Belgico illo Orchidis genere videre memini, quod è pratis Lothario vicinis erubatur. Crescit in eodem iugo Greben pone arcem, & plerisque gramineis locis, inter flumina Muram & Drauutum apud Sackturnya Ill. Comitibus de Zrisio arcè. Tradidit autè hanc prius iisdem planè verbis in Pannon. sub hoc titulo; Orchis flore rubro elegantissimo.

C.B. Phyt. Orchis 12. flore rubro elegantissimo rubro. Montbelg. mense Iunio florètem vidi.

TRAGORCHIS MINOR FLORE fuliginoso.



Ob. obf. p. 90. & cl. Pl. p. 177. Tragorchis minor & verior C. Gemma, siue Coriophora, vel coriophora flore intar camicu: Flore est fuliginoso, figura, color & odor Cimicis, folia non ab simile minori Delphinio Satyrifco: gaudet in gutta: floret cum Delphinio. H. Lugd. Tragorchis minor & verior Gemma.

C.B. Phyt. Test. 16. siue hircinus minor.

Tab. Ic. Testiculus hircinus 3. minor, Klein Boeckh. Icon quam his posuimus an respondere possit Tragorchis minor considerandum.

ORCHIS BATAVICA



Dodrantali affurgit caule, quem tenua aut quaterna ambigunt angusta folia: summus caulis sustinet breuiorè spicam florum elegantis interius rubri coloris: trifido labro propendente.

Orchis 6. siue Batavica (Clus. Pann. & H. post.) ingrati odoris est, quam nò inepse Tragorchin minorem nuncupari possit censet Io. Hogheladius.

Rara inuentu crescit in marinis aggeribus, interdum etiam reperitur circa Hagam Hollandia. In hortos autem translata, latius explicat florum comam, in metæ quasi formam desinentem.

ICONES ORCHIDVM QVAVRVDAM.



Icones propositæ, sunt ex iis quas sculptas emimus, considerandum an sint plantarum diuersarum à iam traditis: insignis enim varietas est Orchidum. Sunt nobis sanè aliquot Orchidum differetia, quas accepim, Argentina à Do. Veldario Chelio insigni Medico ex plantis vi existimamus D. Aggeri stirpium diligentissimi investigatoris, ac ab aliis, quas describere nunc non valeamus, nec pingere lubet, quia nihil certi proponere possumus, ac ignoramus ubi collectæ, & an sint iam descriptæ.

ORCHIS

ORCHIS MINOR ANGVSTIFOLIVS IN
suprema parte longis foliis.

Testiculi 16. minoris (Flein Bnabenwurz) Tabern. more solito nullam exhibet descriptionem. Si leon ad plantam facta, notabile est Orchis genus, in eo differens à cæteris, quod folia superiora iuxta flores sint longa, cum aliis sint brevia.

C.B. Phyt. Orchis 29. Tab. 16. minor.

ORCHIS PARVIS FLORIBVS, MVLTIS
punctis notatis, An Cluso Orchis
Pannon. 4.

Berborum altero oliuari, altero rotundiori fibræ adnascuntur ut in cæteris: caulis sesquipalmaris & dodrantalis, cui circumscripta folia quina septenque, sesquiunciali latitudine, longitudine palmari; quorum aliqua repanda, alia caulem involuunt: flores in spicam satis brevem confertim digesti, ferrugineum conum in fastigio caulis ante-

quam explicentur æmulantes, odore mellico: flores singulares exigui, calcaris herbido brevissimo, galea ferruginea, alis vel totis herbidis, vel ex dimidio purpurantibus, intus rubro punctatis: *labellum* simile quodammodo animalculo quadrupedi tripartito vel quadripartito, alato, foris penitus albicante, intus creberrimis punctis saturatè purpureis notato: apicibus in rictu luteis.

An Trago; Tertium peculiare quoddam Satyrii genus, caulem proferens teretem & mollè: folia Lilio similia: radices gemellæ & rotundæ, exiguæ, flore copioso, ac racemi instar coacti, foris ipadicco, intus verò candido & minutissimis maculis asperso plenum. Gaudet humo argilloso nasciturque tam in pratis quàm montibus. Proinde Iunio mense florere incipit.

Nos iconem Fuchianam proponimus [quæ non placet] de qua ille Icon. p. 320. Orchis angustifolia femina tertia: *Schmal Bnabenwurz*

weible das britt. Verùm quàm Orchidem intellexit Fuchsius propolita iconè perquirendum, quandoquidem nihil annotavit præter nomina.

Dodon. in hist. Gall. Iconem Fuchii habet sub hoc titulo Orchios quintum genus, *le tiers couillon de chien femelle*: Valde simile est foliis secundo (quod vocamus Orchin purpuream maiorem maculatam), flores parvi, simul conglomerati, externè coloris Castaneæ, internè albi, plurimis maculis notati: radices duæ similes duabus Nucibus longis & rotundis, vna maior altera.

Dodon. in Hist. fl. & in fol. omisit hanc historiam & iconem, quasi de planta incognita & quæ non extaret olim scripsisset.

Clus. Pann. & Hist. post. sic describere videtur: Quina aut sena sunt Orchidi quartæ folia: spicæ elegantium pusillorum florum purpurascèntes galeæ testorum, prominulo labro & in quatuor barbularum diviso, albo, purpureis punctis distincto, parvo calcar à tergo prominente, tenuis odoris, sub quo, ut in reliquis Orchidibus torosum & contortum est capitulum exiguum semen scobis instar continens: geminas radices habet testiculorum modo efformatas, vnam plenam, alteram marcidam, supra quas ex imo caule ortæ fibræ expanduntur. Nascitur ad montis Glesfeld imminuentis radices, binis supra Neapolim Austriæ miliaribus, abundantius tamen in montium tenui gramine testorum declivitatibus, supra Radam, Medeling, Baden, & plerisque aliis editioribus siccioribusque locis Viennæ vicinis. Illi similem eruebam montibus Greben proximis, sed longè ampliorem, crassiorèque & longiore spicâ præditam.

Icon quæ proponitur ab Hist. L. sub Orchide quinta Dodonæi exhibitæ est à Dodonæo uti dictum, & Fuchio. Verùm an ei conveniat descriptioni appositæ ex libro florum pro Tertia Cynorchidis specie, considerandum: quia Dodonæus in fol. pro ea longè aliam iconem proponit, nec scimus an descriptio ex libro florum Dodon. ei iconi quam nos etiam habemus respondeat.

An Camer. hort. Orchis minor. Cynorchidis. Testiculus canis minor flore guttato linguineo. Locus tempus.

Circa Montbelg. abundat ac floret Maij: Genæ Observavi florentem Maio: Frater Casp. B. misit collectam in pratis propè Dornacum.

ORCHIS ROTVNDVS DALECHAMPII.



Est nobis inter plantas nostras siccas Orchis rotunda Dalechampii cognominatus: quem Hist. Lugd. sic describit: *radice* constat gemina, testiculis simili, carnosa, superne fibrata: *caule* vnicu, cubitali, rotundo: *foliis* ad summum tribus vel quatuor, latis, venosis, pallidis, Arundinis in- Descriptio

star è caulis amplexu sese explicantibus : flore puniceo in capitulis globosis & aliquantulum compressis, non aliorum generum modo in thyrsis longo & spicato emicante capituli vertici velut de industria affixo : Clivosis pratis frigidorum montium gaudet.

Thal. sic describit : Orchidis species testicularas radices minores obtinens : folia etiam aliquantulum minora quam cæterarum specierum, quatuor ferè, lævia, splendens : cauliculum rectum, pedali non multum maiorem, in cuius summo fasciculus florum parvus conspicitur, non quidem spicatus, sed in umbellæ parvæ ferè modum explicatus : figura Schæznoprasii.

C. Bauh. Phyt. Orchis 39. lutea globoso flore. Orchis rotundus Dalechampi. Orchis rotundus Dalechampi non est flore luteo, sed flore puniceo : nolim Orchidem Dalechampi locare inter pusillam [38.] Clusii & Frisii (40.) Lobelii : Dalech. enim planta magna est, differunt præterea 38. & 40. colore.

ORCHIS SIVE TESTICVLVS maximo flore.



A Pud Matthiol. sine descriptione extat in Côm. cum magn. fig. Lat. & Ital. sub titulo, Testiculi tertii, Icon quædam cum maximo flore : in eadem tabella alterius plantæ icon cui calcaria longa, quæ fortè ad Orchidem aliam calcari longo referenda. Apud Hist. Lugd. sub titulo tertiar speciei Marth. (vbi dictarum plantarum icones) extat iam dicta.

Tabern. Icon. & Hist. Testiculus 13. Stendelwurzt, Enabentkraut.

C. B. Phyt. Testiculus 36. Tabern.

Pulchrum hoc genus Orchidis attulit nobis ex Italia Gener Cherlerus

ORCHIS FVCIFLORA, GALEA & alis purpurascensibus.

Foliorum huius, quæ Plantaginis angustifoliz foliis respondent, alia reflectuntur, alia caulem ambientia surguntur : in caule palmari & dodrantali flores rari calcaris expertes, galeæ & alis purpurascensibus, linea virescente à summo ad imum decurrente : quod, labelli loco est, amplum existit & pingue folium, fucum pulchrè exprimens, colore fuliginoso & ad obiectum lucis hilariori vel tristiori, eleganti luteolarum linearum discursu variatum, nec vt areolæ tres circulos, medio ferrugineo describant : rictu conca-

uo, viridi, supra quem in rostellato latent apices lutei, ima Labelli ora luteola, ceu cauda, fuscum reflexa, aversa parte albet, in ambitu ad ferrugineum declinans : pediculus incurvus, ventriosus, cui appositum folium, turrectum sesquiunciam circiter longum, angustum.



Triorchis formina Fuchsi, Ragnwurzt meible. Orchidis Serapiadis seu Triorchidis alterum genus flores obtinet diversis coloribus distinctos, purpureos videlicet,

candido, viridi, & nigricante : inferiorique parte fuci planè effigiem exhibet.

Orchis sexta Tragi. Das 6. Margendrehen. Testiculus sextus. Satyrium alterum Diosc. provenit in asperis plerumque montibus subter luniperos, terrâ fortè & albâ gaudens, radice gemellâ satis magna, binas Nuces Myristicas repræsentante, dulci, succulenta, flore diversicolore, nam constat is purpureo, luteo & viridi, qui tamen commiscetur. Forma floris ita se habet vt inferior illius pars crabonem, superior verò quæ capitulata & alata quodammodo esse cernitur, auriculam, repræsentet. Exiguum huius Testiculi genus (est enim hic magnitudine foliorum, caulium, & radicum differentiâ,) folia Allii fert, maius verò Lilii.

C. Bauh. vult Testiculum 6. Tragi esse Orchidem Melitriam, de quo mox.

Triorchis Dodonæi Gall. Orchis Serapias formina. Triple couillon de chien semelle, ou Moufibre. Germ. Ragnwurzt. Belg. Ragnwortel. Is in eadem Historia Gal. amittebat & tribuebat tres bulbos in sua descriptione, quasi ipse observasset, & iconem Fuchsi proponebat : in hist. fl. aliam posuit, & in postea. duas novas : illi quæ in lib. florum præponitur titulus, Orchis Serapias secundus minor : alteri, Orchis Serapias secundus maior.

An Lobel. & Penz. Adu. Vulpinus testiculus minor foliis binis aut ternis caulem spithameum imum ambiens, summum verò floribus luteo-fulvis paucis, fucum colore & effigie præferentibus : exigui bini subsunt testiculi.

Testiculus Vulpinus secundus Lob. Obs. p. 88. videtur Sphegodes Gemmæ. Nescimus cuius culpa in iconibus Plantini hæc figura ommissa sit, & alia posita p. 179. sub titulo iam dicto : de hac iconè postea sub titulo, Sphegodes hirsuto flore. Item Obs. p. Sphegodes C. Gemmæ, Gall. Moufibre, Belg. wefpe. Testiculi vulpini varietas Adu. p. 62. Huius è sola magnitudine & foris intensi & remissi colore varietas gemina conspicua. Icon. Pl. p. 18. Testiculus Vulpinus maior & Sphegodes Teut. n. 7.

Hist. Lugdunens. Orchis Serapias secundus

duos Dodon. Matth. Testiculus secundus. Sub dicto titulo Hist. Lugd. est icon & ex Fuchio. Est & alia eisdem plantæ sub titulo, Orchidis 2. species, est & Orchis Spherodes Gemmæ.

Tabern. Icon. & hist. Testiculus 7. Sphegodes Stendelwurcz. Testiculus vulpinus 2. fuchphodæ lin. In descript. 3. Folia quinque aut sex striata latiuscula, Plantagini angustifoliæ nonnihil similia, quædam reflexa, caulis palmaris, cum floribus quinque vel sex, qui foliis aliquot costat, in quibus partes inferiores habent aliquid nigri, quod refert imperfectam apem. Non placet Compilatore ponere Testiculum modo ab eo descriptum, capite diuerso à Sphegode, quem non descripsit: si enim hic non idem, saltem erit valde similis. Huc etiam referendam censemus ineptam figuram cum flore quadripartito sine descriptione Tabernæ iconum & Hist. cui titulus Triorchis femina, Kagiwurcz weiblun.

Casp. Bauhin. Phyt. Orchis 23. Fucum referens maior, foliis superioribus candidis & purpureiscentibus.

Montbelgard abundat florens Maio, etiam in horto Ill. E. C.

ORCHIS MELITTIAS.



Obf. Icon. Plant. pag. 180. Orchis Melittias, siue Apis cadauerulum exprimens Belg. Bienn Teut. 217.

Hist. Lugd. Orchis Melittias Gemmæ, quæ videtur referre Orchin Serapiæ Dod. in hist. stirp. Gall.

Tab. Hist. & Icon. Orchis Melittias, Bif blumick Gylwurcz.

Casp. Bauh. Orchis 24. Fucum referens minore foliis subuirentibus: vel Orchis apem referens. Orchis 6. & Satyrium alterum Diosc. Trago: Orchis Melittias Lobelio.

Orchidis triæ Tragi meminibus nomini Orchidis Fucifloris, ubi eius descriptionem proposuimus, consideretur an & icon: perpendendum etiam an nostra icon ex emptiis eo referenda, vel eadem cum præcedenti ad strigiflorem plantam minus concinnè pictam.

ORCHIS SIVE TESTICVLVS SPHEGODES hirsuto flore.

Galea alæque expandit virentes, tristiorique & obsoletiore fuliginoso colore fucum potius aut vespam quam apem præfert: folium infimum hirsutum, quod prolabello est, in quo non lutearum linearum, ut in illa, discursus vllus conspicitur, sed solummodò liuidæ dux reliquo folio læuiores, depressoque transuersa lineola

coniunctæ H. maiusculam Romanotum efformant: alias verò duobus locis coeuntes infulam Ovali figura, lignosam hirsutamque circumferunt.

Plant. Ic. pag. 180. Testiculus Vulpinus secundus Sphegodes Teut. 217. Lobel. Obf. p. 88. nomine Testiculi vulpini aliam posuit iconem, quæ apud Dod. in his postrema est nomine Orchidis Serapiadis secundæ minoris.

C. Bauh. Phyt. Orchis 25. Fuciferens tertia.



ORCHIS MYODES GALEA ET ALIS herbis: & Orchis Serapias tertius Dodon. & Myodes. i. Lobelio.



Folia tria, quatuor aut quinque, vnciam lata nonnunquam angustiora, longitudine circiter palmari: caulis tenuis, palmaris, bipalmaris & maior: flores sustinet ex pediculo surrecto, ventrioso, cui appositum folium ad ipsius floris cacumē vsque pertinens, raris, nullo calcari:

galea & alis colore herbaceo, reliqua parte muscæ corpusculum affabrè exprimente, prona parte albidæ oris ferrugineis, superius verò colore fuliginoso, Zonâ subcærulea septum cingente, in retu geminis corniculis stipato apices lutei occurrunt.

Lobel. Adu. pag. 62. Testiculus Vulpinus floribus muscam, sed colore rubiginos obsoletoque & inamænâ fuscædine purpureascente. Fucum exprimentibus. Considerandum an hæc conueniat cum iconē sequenti de qua Lobel. Ic. pag. 180. Item Obf. Orchis myodes prima C. Gemmæ, floribus muscam exprimens.

Hist. Lugd. Triorchis Serapias tertius Dodonæi. Male impostus titulus Triorchidis, cum Dodonæus dicat duos testiculos non tres vifos. Hist. præterea ait: Orchis myodes prima Gem;

H. L. 204

ma viderat referre Orchim Serapiam feminam Dodon. in hist. stirp. (Gall.) Conferenti non videtur nobis respondere.

Tab. 100.

Tabern. icon. & Hist. Testiculus muscarius 1. Stendelmurg. Icon est eadem cum Lobelia: verum nescimus cur Compilerator hunc testiculum & ceteros separet capite proprio.

C. Bauh. Phyt. Orchis 26. muscæ corpus referens.

Circa Montbelgardum abundat florens Maio.

ORCHIS MYODES FLORE grandiusculo.




Lobel. Obs. & Ic. Plant. p. 182. Teut. 129. Orchis Myodes altera C. Gemmæ folio lauiore & flore grandiusculo. An Lob. & Pena Aduers. vulpinus testiculus foliis Plantagineis, venosis, reflexis, &c.

Hist. Lugd. Orchis Myodes altera Gemmæ.

Tabern. Hist. & Icon. Testiculus muscarius quartus Stendelmurg.

C. Bauh. Phyt. Orchis 28. muscam referens maior.

ORCHIS MYODES LVTEA.



Q Vadraplicem vulpinum testiculum meminerit Lobel. & Pena floribus quæsitum: Papilionis nempe, Fuci, Muscæ, postremi è colore qui luteus totus & ceteris rarior multò nec descriptus. Erue- runt hunc Norbonæ æstuosis & aridis sterilibus, decliuis inter Cistum marem & Illicem Cociferam, atque in herbis Gramuntia siluæ vi-

Obiit de cinis. Lame.

Lobel. in Obs. habet iconem multis annis antè à Dodonæo de flor. exhibitam pro Orchide Seta-

piade tertio, ea omissa est à Lobelio inter icones Plantini: nescimus igitur an Lobelius benè posuerit Dodonæi iconem pro sua Orchide lutea: Dodonæus non tribuit suæ Orchidi florem luteum: An conuenire possit ea quam hic posuimus dubitamus, nos eam cum ceteris iam sculptis emimus. Apud Plan. Ic. p. 181. alia icon est non parum diuersa à Dodonæi & nostra cum hac inscriptione: Vulpinus testiculus siue Orchis Myodes lutea Narbonensis congener cum minimo Testiculo Vulpino, floribus muscam colore & effigie præ se ferentibus, Teut. 218. In hoc titulo nos non intelligimus quid luteum dicat, & muscam colore præ se ferre, muscæ enim vulgares non sunt luteæ.

Observauit Dalechampsius apud Hist. Lugd. in editis montibus Orchios genus humile, rarum, flore luteo, tribus aut quatuor foliis constans, cetera vulgò cognitis simile, propè oppidum Montspelio vicinum Veganium nominatum, id genus nascitur.

Tabern. Hist. & Icon. Testiculus muscarius 3. luteus, Geel Stendelmurg. Tabern. imitatus est Lob. assumpsit figuram Dodonæi, an bene iudicent alii.

C. Bauh. Phyt. Orchis 2. muscam referens Lutea Lob. icon. p. 181. Vulpinus Testiculus Myodes luteus Norbon.

ORCHIS PARVA AVTVM-nalis lutea.



D Vobus Daur tri- bus foliis Plan- taginis quin- queneruiz si- milibus, veno- sis, glabris, imò caulem com- plexis, donata est: ipse ve- rò caulis iun- ceus, pedalis, interdum di- midio minor rhyllum gerit longum stula- torum pusillo- rum, ex herbi- do colore in luteum ver- gentium, su- ui moschi ferè odore fragan- tium, è caule

appresso veluti calyce prominentium: bulbis cau- li imò adhæret vnicus exiguus, à quo fibræ propa- gantur quibus vnicus aut alter bulbis pendu- lus adhærescit. Hoc Orchidis genus attulit nobis, non recordamur vnde, Gener Cherlerus: Ta- lem Orchidem attulit nobis Guillelmus Vais- sant Chirurgus ex Mesike in montibus Burgun- dia, franchises montagues dictis, vbi Burgundicè passemies vocant: Icon nostra quam iam sculptam emimus non malè exprimere videtur: nos existima- mus hanc depictam apud Lobelium Obs. & Icon. Pl. p. 187. Teut. 212.

An

An Clus. Pann. Orchis pusilla, pallida, odorata:
& Hist. post. Orchis septima.

Tabern. Ic. & H. Triorchis lutea 1. & 2. Geel
Wagwurz 1. & 2. An Gefner. Hort. Testiculi si-
ue Orchidis species minor bulbo singulari, de
qua prius aiebat, Satyrii species an Orchidis
herba, quæ reperitur bulbo singulari semper si-
milis alioqui cæteris, sed minor, foliis binis, con-
siderandum: Monorchin dixeris. C. Bauh. Phyt.
Orchis 38. odorata, radice vnica, rotunda, Pisi
magnitudine, Testiculi species minor bulbo sin-
gulari Gefn. Orchis pusilla pallida odorata
Clus. Orchis 41. Triorchis lutea foliis oblon-
gis & glabris: Triorchis lutea C. Gemmæ Lob.
pag. 94. Obf. & Icon. pag. 187. vbi bina iungatur
figura, at secunda intelligenda. Orchis 42. Trior-
chis altera lutea. Orchis minor Leodienfis Lob.
Obf. p. 90. & Ic. p. 187. C. Bauhinum tres statuere
plantas constat, vnam ex Clusio, duas ex Lobe-
lio, perpendendum quot sint. *Suspiciamus* apud
Lobelium duas icones vnius plantæ nec scimus
an Clusii Orchis pallida diuersa sit, quamuis v-
nius tantum bulbi meminere, vti etiam in iconē
nostra vnicus bulbus appictus.

ORCHIS FRISIA HIRSVTA.



L Obel. Obf.
& Ic. Plant.
pag. 186. & Hist.
Lugd. Orchis
Frisia littoralis
Gemmæ.

Tabern. Ic.
& Hist. Testicu-
lus luteus, Or-
chis lutea, Geel
fnabentraut /
quam Lobelius
describit in suis
Obf. & nominat
Orchidem Fri-
siam littoralem,
duo habet folia,
bifolio similia,
paulò minora
quàm Plantago
angustifolia, as-
pera & hirsuta

castru: caulis palmum altus: Flosculi multi ex lu-
teo virides, vt in Hyacintho maiore: radices
duæ paræ rotundæ. Icon est Lobeliana.

C.B. Phyt. Orchis 40. lutea, hirsuto folio. Fri-
sia littoralis Lobelio, vbi duas iungit, ac prima fi-
gura huic conuenit.

*Orchis sue Triorchis lutea altera
nonnihil hirsuta.*

Triorchis lutea altera C. Gemmæ Lobel. Obf. &
Hist. Lugd. folio est rotundior & latior quàm
superioris, virentiore trifolia, & nonnihil hirsu-
ta: videtur eadem aut congener cum Orchide
Frisia Orientali: quæ gemina inferiora folia Bi-
folii, Plantaginis latifolia angustiora edidit, &
in dodrantali cauliculo herbaceos siue luteo vi-
rentes flosculos in horro D. Brancionis.

ORCHIS SIVE TRIORCHIS LVTEA
tertia oblongioribus radicibus.

L Obel. Obf.
pag. 93. Tri-
orchis lutea ter-
tia C. Gemmæ a
oblongioribus
radicibus oliuari-
bus bulbis, Plant.
icon. p. 186. Tri-
orchis lutea ter-
tia Geelrag-
wurz 3.
C. Bauh. Phyt.
Orchis 43. siue
Triorchis lutea
radice oblonga
fibrosa.

ORCHIS SPIRALIS ALBA ODORATA.

D Vplici radice nititur bulbosâ, oblongâ, vil-
losâ, ima versus acuminatâ, aliquot fibris Descriptis
donatâ. E cuius summo folia, vaginato pedicu-
lo vnciali surgunt viridia, pingua, semunciam
lata, vnciam aut amplius longa, dorso crasso a-
uerfa parte, quâ ex atro virentes venulæ ab imo
ad summum conspiciuntur. Iuxta hæc coliculus
quoque erigitur dodrantalis aut pedalis, teres, fo-
liolis acuminatis ceu vaginis vestitus, iisdem ta-
men vix ac ne vix quidem prominentibus. Flos-
culorum odoratorum thyrsus, albidorum, clau-
iculatimque hærentium ita nutat, vt spirarum in-
star summa versus circumagatur. Hi interna par-
te ex luteo virent, ad latus verò duo foliola can-
dida veluti alæ hærent: Vtriculi succedunt vt in
reliquis ferè Orchidibus, parui puluerulento se-
minio repleti. Thyrsus florum amaricatus & iu-
cundi odoris est.

An Trago Satyrium 7. minimum daß kleinste

Satyrion /
quod ait pro-
uenire locis
humidis Sep-
tembri. Re-
periuntur,
inquit ille,
bina Satyrii
genera ad-
modum exi-
gua, quorū
flosculi aui-
culus volan-
tes imitatur,
coloris ex vi-
ridi lutei.
Caulis horū
haud temerè
digiti longi-
tudinem ex-
cedunt. Na-
scentur par-
tim in apri-



Trag. mor.

cis montibus Iunio mense, partim verò Autumnò appetente in vlginis campis & pratis. Tragus habet iconem respondentem nostræ Orchidi spicæ albæ, in sua descriptione intellegit fortè etiam luteam, quamvis non distinguat aut particularum describat.

Brunf. Tom. 1. Satyrium odoriferum.

Cordus hist. Testiculus candidus odoratus minor. Et supra figuram, Testiculus pumilio Tragi.

Testiculus odoratus Dodon. Gall. vocatur, *Conill: n odoriferant*: Belg. *wolriechende Standel cruyt* & *klein Standel cruyt*. Est hic Dodon. hist. fl. & in fol. Testiculus quintus odoratus siue pumilio nuncupatus, omnium foliis minimus.

Lobel. & Pena Adu. Testiculus odoratus, minimus omnium flosculis, odore Lili conuallii. Obs. Testiculus odor. Orchis spiralis C. Gemmæ. Icon. Pl. pag. 186. Teut. 221. Et Obs. Tetrorchis alba spiralis vel autumnalis C. Gemmæ. Testiculi odorati varietas: non aliud à superiore, sed ut plurimum oliuaribus oblongis bulbis donatur. Icon. Plant. pag. 136. Teut. 226.

Orchidem Hore albo, odorato vel Spiralem C. Gemmæ ad Camer. hort. misit ex Silesia D. Fridericus Sebizius.

H. L. Testiculus odoratus Dodonæi. Tetrorchis, vel Triorchis alba Gemmæ.

Tab. nos.

Tabern. Icon. & Hist. Testiculus minor, odoratus, *klein wolriechend* *fnabenfraut*, cui folia inter Orchides omnium minima Plantagini non nihil similia: sed valde angusta & parua, colore viridi, caulis tenuis: flores multi parui, albi bene olentes: floret Augusto & Autumnò. Et Triorchis odorata, *Groß wolriechend* *fnabenfraut*. Non erat separanda capite hæc Orchis à præcedente.

C. Bauh. Phyt. Orchis 44. Triorchis alba odorata oblonga radice Lob. Orchis 45. Orchis alba odorata minor. Satyrium odoriferum Brunfels. Satyrium exiguum & 7. Trago. Testiculus odoratus spicalis minor Lob.

Locus.

Editis incultis & aridis locis plurimum reperitur: Augusto aut Septembri flores promit, Dodon. Sabulosis arenibus atque squallidis locis Norbonæ maritimis & Angliæ mediterraneis nascitur, Lob.

Tempus

Autumno ante Vergiliarum occasum in arenosis, siccis & accliuibus pratis interdum etiam humidis floret. Montbelgard nobis occurrit Augusto & Septembri non longè ab horto ferarum, Vnde in hortum Ill. E. C. transtuli. D. Turnerus Medicus Anglicus dedit nobis collectam Heidelbergæ. Circa Basileam ad Byrsch caltrum haud ita infrequens.

Vires

Radix Orchidis potissimum odorati cocta in vino & pauco melle sanat vlcera putrida oris, inquit Dodonæus, qui cur huius facultatis non meminere in postrema historia nescimus.

ORCHIS RADICE REPENTE.

Descriptio

Pluchram Orchis speciem radice repente misit insignis Medicus D. Doldius, quem sic describit Camer. hort. Orchis minor flosculis albis, foliis crassis nigris, radice repente geniculata, & ubi folia emergunt, apparent pusilla rudimenta tanquam naturæ testiculos effingere conâcis. Nascitur spontè in opacis siluis, in ramens arborum, quæ longa vetustate emarcuerunt.



Ad hortos trāstatus durat, sed colorem acquirit magis pallidum, nec tam crassa manent folia.

Camer. hort. & Icon. p. 35. Orchis minor radice repente. C. B. Phyt. Orchis 46. radice repente Camer.

ORCHIS LILIFOLIYS MINOR
Sabuletorum Zelandiæ & Batauiæ.

Ortu & facie, compactiligi: squamarum serie similis Eriophoro Bulbo, fibrillis, impactus solo; eminentibus bulbis subuicibus. Cauliculus palmaris, flores non annotati fuere à Guillelmo N. mercatore Batauo, qui hanc descriptione dedit Teutonice, & prouenire ait iuxta maritimos fa-

bulosos aggeres Hardemo proximos, in silua Terrea vulgo *Wendenbosch* idem sanè reor (inquit Lobel. Adu. par. 2. cum nostro nouo Satyrio Zelandico infra scripto, in herbarione olim reperto, elapsa ætate 1603. iuxta aggeres fabulosos Walachriæ inter Pyrolam nascente, quod omnes quadam foliorum similitudine ducti, nec non flosculorum herbaceorum (ni labat memoria) & longiusculi seminis fuliginosi inuolucris, Orchidis Littoralis Frisiz, Orchin sabuletorum maritimorum diximus. Radix illi geminas quandoque gerna, sed rarò, altera alteri innata, foliaceis albis inuolucris tecta, intus viridis, gustu suavis. Infima fibrillis impacta fabuletis, arida, inutilis & flaccida. Cauliculi binum, ternum vnciarum: folia bina Liliacea duas vncias longa. E regione pagi *Oost-Capel*, id est, facelli Orientalis, à me vltimum collecta. In Batauis est Chamæ-Orchidis nouum genus aggerum Zelandiz.

Figura non responder descriptioni, potissimum quoad radices, quæ nihil simile habent cum

cum Orchidibus, in quibus fibræ tenues ex bulbis prodire non solent, sed supra & iuxta bulbos.

Orchis amplissima foliis binis splendentibus.

Orchis prima amplissimis foliis, quæ a nemine (ut suspicatur Clusi.) obseruata, bina habet folia, Ellébori albi foliis amplitudine non cedentia, aliquot venis à pediculo ad extremum vsque folium productis insignita, supernè virentia, infernè diluciora, prorsus tamen splendentia: caulem cubitalem, paucis foliolis siue inuolutis prædum, pentagonum: flores in summo spicatum coherentes, cuius autem coloris, cuiusve formæ ignorat, cum antequam aperirentur, plantam duntaxat obseruauerit: radices binas, crassas & parui Napi modo oblongas, supra quas infimo cauli inhaerent aliquot fibræ satis crassæ.

Solum conspecta est hæc Orchis Maio mense anni 1579, in decliuitate montis, in quo extructa est arx Ill. V. Balchafaris de Bathyan p. m. Greben nuncupata, inter Drauum & Saum amnes, binis vltra Warasdinum miliaribus.

C. Bauhin. Phyt. Orchis bifolia l. latissima.

ORCHIS ALBA CALCARI LONGO.



Hermaphroditicâ Orchidæ hanc haud temerè dicas, ut quæ Cynosorchis & Serapiades dictas, quod quidem ad radicem formam attinet, medium quiddam obtineat. Radix enim duplici constat bulbo sublongo, pyriformi, productiore demissa fibra, quæ in capite alias plures a-

quæ crassas quaquaversum exerit. A qua in imo statim folia insignia prodeunt duobus vel tria, lara, plantaginea, minùs ramen neruis insignita superna parte, læuia, saturè virentia: Reliqua verò octuplò vel decuplò minora, angustioraque caulem nullo ordine decorant pedalem aut sesquipedalem, angulosum, striatum: Cuius summa flores spicatum occupant odoratissimi, albi, Papilionem expansis alis æmulantes, quorum foliorum supremum leuiter erectum obusulo mucrone sub se bina in summo, inclinatione quadam coeuntia, herbaceo colore prædita comprehendit: lateralia duo alarum instar expanduntur: productæ autem longum folium, minùs reliquis, album, & ferè herbidum, linguæ caninæ exertæ instar, quod, ut in priore similitudine maneamus, papilionis corpus referre dixeris: aucta floris parte prominet calcar longissimum, prope floris basin album, cætèrâ viride: vnicuique autem pediculo intorto herbidoque appositum est folium acuminatum: sapor foliorum amarus:

Tom. II.

Radicum aqueus insipidus.

De hac Dodon. Hist. fl. & in fol. Testiculus siue Orchis Serapias: folia profert duo aut tria, læuia, latiuscula, at Lili foliis multò minora: caulem dodrantalem aut altiorē: flores in eo raros, candidos papilionibus expansis alis quodammodo similes: &c. Eius icon est bifolia, Dod. incob. olim in hist. Gall. lib. 2. cap. 46. ex Fuchio erat trifolia, ac ej dicebatur Testiculus Vulpis: Gall. Couillon de venard Germ. groß Stendelkraut. Belg. Greet Stendelcruyt.

Satyrion τριφυλλιον Græcis, Satyrium trifolium Latinis, Officinis nostris (inquit Fuch.) incognitum aut inusitatum: vulgò Testiculus Vulpis aut sacerdotis. Germ. Stendelwurcz: Gall. satyrium à trois feuilles, nominatur. Satyrion autem nomen fecerunt Satyri, qui primi sylvestres dii colludentes nymphis per sylvas & antra ad firmiorem Venerem herbam hanc inuenerunt. Trifolium verò, quoniam tria fert folia ad terrâ versa. Folia tria fert Rumici aut Lilio similis, minora tamen & rubentia. Caulem nudū, longū, cubitalem. Florem Lilio similem, album. Radicem bulbo similem, mali modo extuberantem, foris rufam, intus oui modo albam, gustu dulcē, & ori gratam. Quod verò hic dicimus Lilio similem: non sic intelligendum venit quasi quantitati & tota figura Lilio similis flos sit, quando euidentissimum sit Liliū quantitate sua Satyrii florem multis modis superare. Denique nec figura etiam per omnia respondet: quare hæc similitudo ad colorem & floris essentiam refert potius debet, quæ planè eadem est cum Lili colore & essentia, id quod conferenti hos duos flores manifestum fiet. Icon. pag. 408. Satyrium trifolium meiss Stendelwurcz. Ichnis non describit plantam cuius iconem exhibet, sed detorquendo accommodare conatur descriptionem Dioscor. suæ iconi, quam hic ponimus trifoliam, vti, eam sculpti æmimus, quod ei non conuenit.

Fuch. mor.

Matthiol. in Dioscor. cum magnis Icon. Lat. l. 3. cap. 126. picturam solam habet in e descriptione sub Testiculi specie tertia. In Ital. cap. 137. Ej ap- pingit tantum duo folia: sub eo tamen titulo 4a eadem tabella icones duarum plantarum.

Dicitur Lobel. Obs. Testiculus Vulpinus primus Anglis flores Ballofes. Hisp. satyrion. Icon. Plantar. pag. 178. Testiculus vulpinus primus cuius flores culices expriment. Lobelius in sua iconē duo tantum habet folia: is præterea aliam habet iconem parum differentem nomine Orchis Hermaphroditicæ de qua mox: considerandum in quibus differat.

Hist Lugd. Testiculi tertii species Matthiol. in ea tabella ex Matthiolo dæ icones diuersarum plantarum: præterea Hist. Lugd. ponit eiusdem plantæ iconem alteram sub hoc titulo: Orchis Serapias primus Dodonæi: ponit & tertiam trifoliam, cum hac inscriptione: Testiculus vulpis Dodonæi, tres igitur icones vnius plantæ sub diuersis ponit titulis.

H. L. error.

An Thal. Harc. Orchis bifolia, flore purpureo & candido etiam in montibus passim ac pratis. Triplici autem differentia reperitur. Altera latifolia est, foliis orbicularibus ferè, vnciarum sex longitudine, quatuor latitudine: tertia breviora omnia continet.

Flor purpurea.

Camér. horti. Orchis bifolius, qui nonnunquam trifolius nascitur, vnde Fuch. Dioscoridis Satyrion esse placuit.

Tabern. Icon. pag. 667. & Hist. lib. 2. pag. 394. Testiculus Vulpinus latifolius, Fuchs. hōdlein / fles

T c c

genblumen / Item Icon. p. 674. Hist. 353. Satoryium trifolium, Beckegeyl.

Tabern. in iconibus & hist. sui immemor quatuor diuersas tradit huius icones: ac Commentum videtur quod Ic. pag. 674. & hist. 355. habetur sub hoc titulo, Satoryium Triphyllū Sten-delyur.

C. Bauh. Phyt. Orchis Serapias 19. bifolia minor flore Papilionem referens. Satoryium trifolium Fuchsi. Testiculus vulpinus primus Lob. variat, communiter quidem est candido: reperitur & purpureo. Huius binæ icones apud Tab. nomine Testiculi Vulpini latifolii & Triorchis maioris. Nos in hoc genere purpureo flore non obseruauimus, nescimus etiam cur C. Bauhinus Orchidem 19. iam dictam à 21. separarit, de ea scribit: Orchis trifolia maior. Satoryium trifolium Fuchsi: Huius duæ icones apud Tabern. Satoryii Triphylli nomine & sub Triorchis trifolia: inter hanc & Orchidem bifoliam minorem, parua nisi ratione numeri foliorum differentia.

Non longè Montbelgardo eundo Hericuriarum. Obseruauimus præterea variis in locis, nominatim in valle montium aridorum dicta Griesbach, ubi florebat & Iunio odoratissima.

C. B. nat.

Locus & Tempus.

ORCHIS HERMAPHRODITICA bifolia.



differat à præcedente perquirendum.

Hist. Lugd. Orchis Hermaphroditica Gemmæ, siue Orchis Psycoides diphylla.

Tabern. icon. & Hist. Testiculus vulpinus 4. hermaphroditicus, Fischhødtin. Non placet Compil. non subiungere hunc Testiculum Testiculo Vulpino latifolio suo. C. B. Phyt. Orchis 20. bifolia minor altera, vel Hermaphroditica.

Tab. nat.

ORCHIDIS GENVS QVIBVS DAM

Satoryion castratum. Item aliud genus cum quatuor radicibus.

L. Ob. Obs. p. 97. Satoryion castratum vel Eunuchum ex genere Cynoforchios C. Gemmæ. Ic. Pl. p. 192. Teut. 225.

Hist. Lugd. Satoryium castratum Gemmæ.

Tab. Ic. & Hist. Testiculus sextus, Castratus.

C. Bauh. Phyt. Satoryium 15. cuius radix in dua



tantum oblongas partes diuiditur.

Est nobis nescimus unde Orchidis genus caule palmari & pedali, cui radices quatuor crassæ viciales, & sesquinciunciales, folia plura, vicia tres longa, angusta, in acutum desinentia. flores parui, spicati, sub singulis foliis longiuscula.

ORCHIDES, CVLICES MINORES triphyllæ.



I. Con. Plantini p. 178. posita Ic6 cum hac inscriptione, Culices triphyllæ Teut. 217. Casp. Bauh. Phyt. Orchis 22. trifolia minor, Culices minores triphyllæ Lobel. Icon. 179. Vide descriptionem in hist. Belgica Lobelii.

ORCHIS BATRACHITES.



L. Obel. Obs. Orchis Batrachites vel Batrachoides C. Gemmæ. Lobel. Obs. Belg. vers. fens. 1. Ranula à floribus figura: Ex eorum genere quæ sexus ambigui sunt, vt & Hermaphroditicæ Testiculum non malè appelles. Sunt enim media inter Serapiades & Cynoforchis, maximè quoad formam radicis. Hist.

Hist. Lugd. Orchis batrachoides Gemmæ.
Tab. Ic. & Hist. Orchis batrachoides frefch
Blumliche Geylourz.
Casp. Bauhin. Orchis 37. siue Hermaphroditi-
tica.

Buzeiden siue Buzidam Arabum.

Ait Auic. Buzeiden esse medicinam ligneam in-
dam, in qua sit virtus similis virtuti Been. Et
Serapio, Buzeiden, inquit, est species Satyri-
onis. Salomon Ebēhafem.] Buzeiden sunt radices du-
ræ, albæ, similes behen albo, confert podagræ, &
doloribus iuncturatum. Et est medicina Iudæ,
quâ nos parum vitimur. Quidam verò detulere
eam ad nos, & vidimus eam sæpe. Aben Mes-
ai.] Melius quod est ex buzeiden, est album, ha-
bens lignum grossum, & multas rugas. Illud ve-
rò quod est subtilis ligni, habens superficiem le-
nem, parvæ albedinis, est non bonum, nullius iu-
uamenti. Habix dixit sicut iste. Et dixit cum
hoc, quod iuuamentum eius est sicut iuuamen-
tum hermodactylorum, ad remouendos dolores
iuncturatum, & ad conferendum podagræ. Me-
sarugia.] Buzeiden est calidum, augeat in sperma-
te. Et de proprietate eius est, quod laxat a-
quam citrinam. Sed illud est malum testiculis. Et
rectificatio eius est cum Sinapi, & melius ex eo
est nouum. Et dosis eius, pondus est drachma-
rum duarum.

Digitri Citrini Arabum.

Asafafasia siue Digitri Citrini sunt, autore Auic.
figuræ volæ manus colore mixto ex citrinitate &
albedine duri & nonnihil dulces, quidam sunt
citrini & puluerulenti absque albedine. Digitri
trocei, vt exemplaria habent, sunt gummi seu
vena tinctorum: thalis.

PAMATA SATYRIA IN GENERE.

CAP. XXVI.

Satyrion Græcis, Satyrium regium Latini-
s. Oñic. Palma Christi. Arab. *Buzeiden*: Auic.
Digitri Citrini. Germ. *Creuzblumen*. Gall. *Saty-
rium royal*. Palmam Christi propter similitudi-
nem quam eius radix cum humana habet manu
dixerunt. Verum Satyrium, inquit Matthio-
lus, hætenus in Italia videre non licuit. Pal-
ma Christi radices, Auicenna Digitos Citri-
nos nuncupat, etsi eas Digitos citrinos esse per-
peram, nullaque, quod libro suo legerim, rati-
one ducti, negent Monachi illi.

Fuchsius Palmam Christi non rectè inter Sa-
tyrii genera depinxit, siquidem ea potius meo
iudicio inter Canis testiculos erat representan-
da.

Palmis duabus Christi adibus & Serapiadibus
(aiunt Lobel. & Pena Adu.) accenset Triorchim
Serapiada Aegineta (addere enim tertiam quan-
dam videtur) terno donatam didyino, quam a-
liàs Palmam Christi opinabamur: tum quia suc-
culenta minùs, sicciore est, & vehementer de-
terget, intrò forsiquè vicicribus admota: tum e-
tiam quòd Melancholicis, Quaternariis, Epilep-
ticis, neruorum offarctu, & puitiosa saburra op-
pressis miram præter opem, fluxum dysentericiū
istat, quor qualisque facultates Palmæ Christi
Recentiores vendicant, [ne cuiquam imponat

Tom. II.

Palmæ Christi vehementer purgantis hamony-
mia,] dignandas sanè Aegypti Venerandæ Se-
rapiadis deæ Augusto cognominæ: aliòquin
nihil attinuit à cæteris secreuisse, & Serapiadis
nuncupasse. Rationibus hisce faucebat ex lectio-
ne coniectura, nam vbi *palma christi*, vbi multi vñs, le-
gendum *palma christi* multifidam radicem: & fortè
vtrumque, multifidum multique vñs radicem in-
nuebat, & mox inferiùs vbi Dioscor. *palma christi*
oxychlois *oxychlois*, id est, Radix subest testiculis simi-
lis, aut pusillis testiculis, legebam multifida leui-
ore inethesi multò, quàm in superiore capite,
vbi pro Olea suffecerunt merito quidam Squillæ
teneram Pancratium. Verùm tamen si cui hæ-
minùs allabescant Serapiades, exploret superio-
rum Orchium facultates, quæ multò tamen in-
gnauiore & mucore elumbes magis videntur,
aut alias aptiores adducat, & lubenter vltro indi-
ctas istas Palmatas Antiquis profitebimur. Her-
bidos pratensèque colles frigidiores amant tum
minor tum maior, legimus etiam in Alpibus Ra-
uisburgi & Nozereti Germaniæ. Maio flore &
foliis exit: maior foliis similibus, sed latioribus
Porri, mucronatis, ad terram reflexis, crassiss, in-
terdum maculatis fulcis, & nigricantibus notulis:
flores purpurascens Cynolorchis adeò similes
sunt, vt nili propius spectes easdem putes. Ra-
dici item geminus est bulbus, altero eum pido, al-
tero prægnante & succulento, vtroque tamè ob-
longiore, nonnihil compresso, & ima sui parte
in fibras inæquales ternas aut quaternas veluti
digitatas abeunte. Hunc marem appellant. Fumina
verò floribus candidis, vel e purpura rub-
tibus, dilutè e caruleis, cucularis, crebriores mac-
ulas purpureas & rictum ostentantes habenti-
bus: foliis minoribus, & inspersis punctulis: ra-
dice consimili. Sunt vt hist. Lugd. norat, qui vo-
cant Palmam Christi Buzeiden, siue Buzidam
Arabum. Satyrii autem huiusce radices nihil mi-
nùs quàm ligneæ sunt, nec ex India petuntur, vt
voluerunt Auicenna & Serapio. Matthiolus Sa-
tyrium Basilicum siue Palmam Christi Auicennæ
Digitos Citrinos esse vult: At Satyrius Basili-
ci radices duræ non sunt neque croceæ, neque
ad tingendum viles. Quare id à Digitis citri-
nis Auic. & Rhafis perpicuè differte videtur.

*Serapia-
des.
Orchidis.
facultates.*

*Palma
mas.*

*Palma fa-
mina.*

*Non sunt
Bezidami.*

Thalium hanc pag. 112. Satyrium recentiorū
Græcorum iuxta Dodonæum mas, aliàs Palma
Christi: Serapias mas Anglis, Orchis autem fa-
mina Tragi. Atqui Satyrii huius maris cuius
videlicet folia maculis destituuntur, diuersæ ali-
quor differentiarum in hancynia occurrunt, quæ sub
duobus præcipuè generibus comprehendi potè-
runt, quorum alterum sit latifolium, alterum an-
gustifolium: quorum etiam vltiorem tradit
distribut. onem.

Orchis Serapias Lobelii Cæmerario hortii, seu
Satyrium basilicum aliorum, flore candido, dilu-
tè rubefcente & rubello. Ex his tertium folia in-
terdum maculis cruentis aspersa gerit, interdum
(An Plantini icon. pag. 188. Palma Christi mas) si-
ne maculis. Priora verò duo maculis in horto
meo nunquam carent, nescio an alibi etiam.

Satyrium Basilicum mas & femina amarum
est, referente Fuchio, magis tamen amarum quod
maculosum constat foliis. Ideoque non perperam
censent Auicenna & alii quidam ex recentiori-
bus medicis, qui calidum esse & siccum in scō-
do ordinē tradunt. Vñs eius ad erogandam e-
ntem, ad neruorum dolores, & contra noxia me-
dicamenta. Fertur & aquileum esse radix gu-
stata. Semen ex vinò sumptum nouem diebus, co-

initiales sanat. In eundem effectum vinum diluitur herbe decocto. Scobs radices propinatur in vino ad arcendam quartanam, quam & vomitione curat paulo ante accessione pota. Plura in praesentia rescire de huius facultatibus non licuit. Satyrii Basilici radices, Orcheos radices sapore & gustu referunt, quare & facultatibus similes existimantur. Niculus Florentinus capite de quartana curatione vim habere ait & per superiorem & per inferiorem ventrem purgandi, & aduersus quartanas febres inueteratas, post purgationes radices partem pollicis longitudine tulam cum vino ante accessione vtiliter exhiberi, hocque remedio ter sumpto bilium quendam post 44 aut 45 accessiones, a febre quartana fuisse liberatum.

PALMATA NON MACVLATA.

PEdalem hanc caulem erigit, in quo folia oblonga sesquiunciam lata, laeua, nullis admodum obscuris fugientibusque notis maculosa; flores spicati, purpurascens, alas pandunt utrunque purpurantes, interiectum autem folium galea æmulum non item: labellum dilute purpurascens, guttatum, tripartitum demittunt: calcar paulo ultra mediam pediculi longitudinem protenditur: vnus vero cuiusque floris pediculo intorto adpositum est foliolum mucronatum, semunciale & sesquiunciale, nonnihil rubescens. Radix subest gemino digitato bulbo constans cum fatua dulcedine aliquantulum amariens.



bescens. Radix subest gemino digitato bulbo constans cum fatua dulcedine aliquantulum amariens.

Lobel. Obs. Serapias mas laui folio, floribus dilute purpureis notulis conspersis. Satyrium Basilicum primum Dod. Palma Christi Herbariorum: Belg. handefens cruyt, Germ. Creutz blum Icon. Plant. p. 188. Teut. 22: Satyrium Basilicum primum, siue Satyrium basilicon maius Dodon. de fl. quod plerique marem appellant, floribus est dilute purpureis cum punctis. Palma Christi vulgo dicitur: Germ. Creutz blumen: Belg. handefens cruyt / Gall. Satyrion royal. Sunt qui velint Buaeidem vel Buzidan Arabum esse: sed absunt. Matth. Satyrium Basilicum Digito citrino Auicennae esse vult: & Monachos dubitantes ea de causa reprehendit. Dodonaeo tamen magis placeat Monachorum haesitatio quam Matthioli assertio. Satyrium basilicum vulgo vocatum à Digito Citrino Auicennae & Rhazis differunt.

Tabern. Icon. & histor. Palma Christi mas. r.

Dodon. à hendtlenburg Mannlein / Creutzblum.

C. Bauh. Phyt. Satyrion 4. basilicum pratense latifolium: Satyrion femina Brunf. Palma

Christi mas laui folio Lobel.

Obseruauit Genetrix foliis non maculatis. Flo- Loc-
ret mense Maio in pratis circa Arve fluium. tempus

PALMATA SPECIOSIORE THYRSO,
folio maculato.

CAulem pedem al-
tum & sesqui-
cubitalem ali-
quando erigit
subpurpureus,
in cuius fasti-
gio spicati in
dispositi flo-
res rubentes,
vel dilute pur-
purei, calcari
trientem pol-
licis circiter
longo, cristis
duab' crectis:
galea è duobus
foliis cui ter-
tium appres-
sum incumbit
composita; la-
bello in tres

lacinias diuiso, saturata purpura guttato, pediculo purpurascens, cui semper appositum acuminatum folium è viridi nigroque purpureum: huius flores obseruantur & intonsius purpurei & penitus quoque albi, folia plura qualia Orchidum vulgarissimarum, & à radice orta caulem ambientia, & è caule ipso nata, infima, sublonga, satis lata, superna angustiora, alterno situ posita, crebris maculis nigris notata; radix ex gemino bulbo composita, quorum alter maior, effectus alter albus, vegetior, in quatuor aut quinque digitos abit, ad quorum coniunctionem propagantur fibræ. Sapor radices aqueus, viscidus, non sine leui amaritudine, folia multo amariora. Huius è foliis non maculosis petita varietas, nullo alio discrimine, conspicuo, de qua ante: Altera quoque varietas ex bulbo maiore tridactylo.

Icon nostra ex emptitis non in omnibus placeat: eam autem Fuchsius posuit pro Satyrio Basilico femina, & Digito Citrino Auicennae: eius descriptionem recitamus sub Palmata angustifolia purpurea. In Iconibus Fuchsi p. 410. figurae titulus est, Satyrium basilicum mas alterum & reus mentis deo vider.

Considerandum an Tragus huius iconem habeat, hoc titulo, Orchis femina altera, Creutzblum / weblin / de qua scribit, Satyrii alterum genus, radix quæ formam repræsentat binarum manuum inuerso ordine inuicem superpositarum, quarum recentior natu cum flore augmentum capit, altera marcescente. Nascitur hoc genus Orchis in quibusdam pratis & nonnullis gramineis montibus. Radices tam huius quam superiorum Testiculorum ferè dulces gustatae.

An Matth. in Diosc. Palmæ Christi, cuius radices Digito citrino appellat Auicenna, genus maius, quod Anania Vallis montibus inuenitur, & folia ferè Lili habet laeua, parula, maculis quibusdam nigris respersa: caulem rotundum, lauem: florem spicatum, varium, in purpura alba.

albicans, odore non ingrato : radices duas, quæ sanè testiculos referrent, nisi ramis quibusdâ, quasi digitis, humanam manum exprimere viderentur. Icon à Matthiolo proposita non responderet eius descriptioni, potius videtur Icon nostræ Palmatæ cum longis calcaribus rubellis.

Dodon. de fl. Satyrium alterum maius : quod femininam vocant, Satyrium alterum Basilicum dicitur.

Lobel. Obsl. (& ex eo Hist. Lugd.) Serapias femina pratenfis, foliis notulis inpersis, siue Palma Christi : Adu. pag. 63. Satyrium Basilicum alterum Dodon. Icon. Pl. pag. 188. Palma Christi Serapias femina pratenfis, Teut. 223.

Tabern. Ic. & Hist. Palma Christi maculata.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 5. Basilicum pratenfis maculosum.

Thal. Harc. Satyrium femina, foliis maculatis passim.

Passim secus vias & in dumetis observatur : Cuiusmodi in locis utcumque obuiam per comitatum Montbelgardensem observauimus. Maio & Junio florentem. Eadem observata nobis in valle Griesbachiana ad therinas acidas. B. filicæ quoque multis in locis occurrit. In hortum Montbelgardensem translata maximo & latissimo florum Thyrsis prodit, qui & palmum altitudine superaret. Cum effemus Gencuæ observauimus Florentem mensè Maio.

PALMATA MACVLATA.



Non in eam altitudinem excrescit in quâ præcedens, radicebus tamen tetradactylis conuenit, nec non foliis, nisi quodd evidentiùs maculosa sint. flores verò purpureo colore præditi, saturisque punctis notati, cristas duas erigunt, alarum expertes : vnicuique autem flori appositum folium acuminatum saturatè purpureum.

Plant. Icon. p.

188. Palma Christi Serapias femina pratenfis Lob. 95. Teut. 223.

Dod. de fl. Satyrium Basilicum alterum.

PALMATA ALBA.

Palmatæ maculatæ flore albo antè meminimus quæ à præcedenti fortè solo colore differt. Icon quam his ponimus, ex est iis quas emimus iam sculptas, quæ accedere videtur Lobeliae albæ, qui eam separat à præcedenti : de ea legitur Lob. Obsl. & Icon. p. 109. Serapias candido flore montana maculatis foliis. Cynoforchis montana, folio maculoso C. Gemmæ, pratensis item eadem niueo flore crebra visitur, cætera haud ab similia.

Tom. II.

PALMATA SIVE SERAPIAS PALVSTRIS
latifolia flore albo subpurpurascente.

C. B. Phyt. Satyrii 2. basilicū maius latifolium.

PALMATA, SIVE ORCHIS PANNONICA
floribus exalbidis, & alba Griesbachiana.

Hist. Lugd. Serapias candido flore Lobel. cætera haud ab similia Satyrio Basilico altero Dodonæzi.

Tabern. Icon. & H. Palma Christi maculata montana hendefens wurtz.

C. B. Phyt. Satyrium 6. basilicum montanum maculosum.

Serapias palustris latifolia, Cynoforchis palustris platyphyllos, folio latius, latoque flore albo subpurpurascente C. Gemmæ, Lobelio Obsl. Præcior est Violaccæ Cynoforchis Ic. Pl. pag. 190. Teut. 224.

Hist. Lugd. Cynoforchis palustris platyphyllos Gemmæ.

Tab. Icon. & Hist. Palma Christi palustris 3. wasser handlens wurtz.

C. B. Phyt. Satyrii 2. basilicū maius latifolium.

Illius primū Lenalcentia folia tria, aut quatuor habet Orchis 7. Clusii in Pann. octaua in Hist. post. Gue Pannonica; dilutioris & quasi pallentis viriditatis, nullaque macularum asperginē notatis, ingrati saporis : Palmarem caulem amplectuntur aliquot foliola; in cuius summo fastigio flores spicatum digesti

Ttt 3

nascuntur, exalbidi & quasi pallidiusculi coloris, nullis punctis distincti, antequam morionum hiantibus cucullis similes, utrinque aurij, & latiusculo pallido labro propendente, posteriore vero parte corniculum habentes, ut Consolidæ regalis, aut Linariæ, sed latius & obtusius, grauius odorati, florum Sambuci odorem referentes: ad horum exortum singula foliola nascuntur pallentia, & floribus colore respondentia: radices geminæ, veluti palmæ, in binos, aut plures digitos distributæ sunt, quarum vetustior fungosa, nigrior, & flaccidior est, altera candida, vegetior ac solida, paucis supra earum exortum nascentibus fibris.

Aliud genus est formâ, magnitudine, cæterisque notis illi par: sola varietas in floribus, qui in hoc purpurei sunt, foliola sub floribus nascentia etiam purpurascunt. Inuenitur utrumque genus non modo in Leytano saltu supra Manderstorf, aliisque Austriæ inferioris siluis: sed etiam editioribus quibusdam pratis Viennensi saltui proximis. Floret autem Aprili, nonnunquam etiam Maio, pro mitiore videlicet aut rigidiore vernalis aëris constitutione.

Locus & tempus.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 13. flore Consolidæ regalis Sambuci odore. Collegimus Palmatam florentem Maio & Iunio, in valle fontium acidorum Griesbachiana ad Herciniam siluam cui radices & folia respondent iconi propositæ ex Clusio: Eadem est cum iam à nobis descripta Palmata flore albo circa Montbelgardium obseruata.

Palmata & Serapias Batrachites.
Lobel. Icon. Pl. p. 193. Serapias Batrachites vel Myodes Teut. 226.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 14. batrachites. Vide Hist. Belg. Lobelii.

PALMATÆ CUIVS DAM ICON.



Non occurrit nunc ad quam speciem Palmatæ hæc icon sit referenda, ea est ex iis, quas emimus iam sculptas.

PALMATA SERAPIAS PALVSTRIS leptophylla, violacea, maculata & non maculata.

Cynosorchis palustris altera C. Gemmæ, Lobel. Obs. serius florens, comâ violaceâ, foliis interdum læuibus, interdum maculosis. Icon. Pl. p. 190. Teut. 224. Icon Lobelii non demonstrat folia tenuia, vel angusta esse.



Hist. Lugd. Serapias palustris altera leptophylla, Gemmæ. l. c. Serapias palustris 3. Gemmæ. Miror Compilatores ex duabus iconibus à Lobelio propositis sub vno titulo, duas statuere plantas, vna ex iconibus representat plantam iuuenem, quæ caulē non protulit.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 3. basilicum maius latifolium alterum.

PALMATA ANGVSTO FOLIO vilissima palustris.



Cynosorchis folio & angusto, seu leptophylla omnium vilissima C. Gemmæ, Lob. Obs. quæ Icon. Pl. 193. T. 226. Figura Lobelii non demonstrat folia angusta.

Hist. Lugd. Cynosorchis leptophylla Gemmæ. Tabern. Icon. & H. Palma Christi palustris 2. wasser henden kurg.

C. B. Phyt. Satyrium 16. palustre folio læui.

PALMATA SERAPIAS MONTANA folio læui.



Serapias montana folio læui. Cynosorchis montana folio læui C. Gemmæ, Lobel. Obs. & l. c. Pl. p. 191. Teut. 225.

Hist. Lugd. Serapias montana folio læui Gemmæ.

Tabern. Icon. & Hist. Serapias montana Berg. Enaben. Frant.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 11. basilicum montanum bicubitale.

Serapias montana folio læui Lob.

PAL.

PALMATA FLORIBVS IMPENSE RVBRIS.



Lobel. Obs. & Ic. Pl. pag. 191. Cynoforchis Dracontias foliis & floribus impense rubris C. Gemma, floret circa finem Aprilis, aut initia mensis Maii. Nascitur in humidis, & viginosis, praesertim vbi nigriterrae est. Hist. Lugd. Cynoforchis Dracontius Gemma. Tabern. Ic. Tragorchis *Bofas* Geyl. Male ponit Compil. hanc iconem sine descriptione capite separato ab aliis palmatis.

C. B. Phyt. Satyrium 18. palustre foliis & floribus rubris.

PALMATA PALVSTRIS NEPHELODES



Cynoforchis palustris, Lophodes vel Nephelodes C. Gemma. Flos illi communis ferè cum ceteris maculosis, proinde huic communem appinximus deflorescentis Satyrii formam, vna cum corniculis quibus ferè atomon prorsus includitur, Lobel. Obs. & Icon Plant. p. 195.

Hist. Lugd. Cynoforchis palustris altera, Lophodes Gemma. Tabern. Icon. & Hist. Palma Christi palustris. 1. *Wasser bendlen wuerd.* Casp. Bauhin. Phyt. Satyrium 17. palustre alterum maculatum.

PALMATA, SIVE CYNOSORCHIS MACROCAULOS GALERICULATA C. Gemma.

Cynoforchis macrocaulos, vel Conopsea, sive galericulata C. Gemma. Floret circa medium finemque mensis Maii usque ad Iunii ferè medium. Lob. Obs. Flores in hac iconem multum habent similitudinis cum praecedenti nostra Palmata calcaribus longis. Hist. Lugd. Cynoforchis Conopsea.



Tabern. Icon. & Hist. Testiculus galericulatus, Snabenfrant. Compilator ponit palmatam hanc extra ordinem aliarum cum Orchidibus, cui bini testiculi, nulla addita descriptione. C. Bauh. Phyt. Satyrium 12. montanum bicubitalae.

PALMATA CARYOPHYLLATA.



Plant. Icon. p. 194. Orchis Serapias Caryophyllata sive inaequalis. Et T. 1. p. 277. Flos Orchidis Serapiadis Caryophyllatae sive odoratae descriptae p. 226. C. Bauh. Phyt. Satyrium 1. basilicum maximum. Vide Hist. Belg. Lob.

PALMATA ANGVSTIFOLIA MACVLATA purpurea.



Palmatam quam observauimus in valle Griesbachiana acidorum fontium, florentem Iunii principio, foliis est angustis, macularis & non macularis, quinque vel sex alternatim per caulem prouenientibus, inferiora latiuscula, vnciam tamen multo angustiora, retro

Descriptio

hexa, quatuor vel quinque uncias longa, superiora, breuiora & valde angusta: caule cubitali, aliàs maiore, interdum etiam minore: flores multi, spicam breuiorem exprimentes, purpurei: radices pluribus digitis constant.

Icon quam proponimus est ex iis, quas iam sculptas eminus, quæ aliquo modo expriment nostram Palmatam angustifoliam.

PALMATA RVBELLA CVM
longis calcaribus rubellis.

Descriptio Duplioi nititur radice palmata, vigore vicissitudinario annuatim in iis pulcherrima observatione se exerente; nam ea quæ cauli pabulum pariter & fulcrum subministrat, tota flaccida appareret effoque, quæ verò sequenti anno caulem producit, plena succulentaq; sapore viscido: plurimis aliis quin digitis uncias longis prædita sunt. Obseruati sane nobis in utraque ad viginti quatuor: infra supraque palmatas radices aliz, crassitudinis fibrarum Hellebori: folia prodeunt palmum longa caulem amplectentia, angusta, qui cubitalis, scilicet cubitalis, atque etiam altior, quem parua & angusta quædam foliola stipant, supræmâ verò thyrus occupat peramœnus dodrantalis plûs minûs, flosculorum rubellorum, calcari prælongo, & vnguiculis auium recuruo, prædiorum, quibus dehiscenibus succedunt vtriusque striati, semino puluerulento ferrugineoque: odor non vehemens nec ingratus.



Icon nostra est ex iis, quas iam sculptas eminus, quæ non malè respondet nostræ Palmatæ, & à Fuchio exhibita, nomine Satyrii Basilici maris primi.

Matth. n. r. Matth. in Diosc. Palma Christi. Descriptio non respondet iconi: in comm. cum Iconibus magnis Latinis, Palma Christi maior. Item Epit. p. 561. vbi etiam descriptio non conuenit cum iconi.

Camer. n. r. Camer. in Epit. aliam posuit iconem quam non diuersam à nostra suspicamus, in ea tamen non benè exprimentur calcaria, descriptio quoque non conuenit. Item in Hist. Germ. Matth. 4. Testiculus, Palma Christi.

An Lobel. Obs. & Plant. icon. p. 189. Serapias minor rubello flore nitente, angustifolia, nullis inspersis punctulis, Lob. 95. Teut. 224.

Hist. Lugd. n. r. Hist. Lugd. p. 1562. Serapias minor rubra Gemmæ. Item p. 1568. Satyrium Basilicum maius Dodon. Planè displicet quod hist. ponat iconem ex Matthiolo & descriptionem ex Dodonæo diuersæ plantæ.

Tabern. Icon. & Hist. Palma Christi minor, mas, Flein hendlens wurz Männlein, Creutz blum. Palma Christi femina pendens wurz weiblein. Prima icon est ex Lobelio, altera est ex Matth.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 7. basilicum angustifolium, Palma Christi maior Matth. Orchis femina Trago. Satyrium 9. basilicum angustifolium tertium, Serapias minor rubello flore Lob. Nobis dubium an duæ plantæ, suspicamur vnâ.

Palmatam quandam cum paruis flosculis rubellis & longis calcaribus in longis veluti spicis inueni Iunii principio in prato inter Malmunster & S. Germain. Transili Montbelgardum in Hortum Ill. E. C. Item inter Raupach & Befordiam Iulii principio, provenit etiam circa Montbelgardum: olim collegi Tiguri.

PALMATA MINOR ODORATISS.
purpurea siue nigra.



PALMATA Christi, siue Digitorum Citrinorum Auiæ. genus minus Matthiolo quod in Ananiz montibus habetur foliis constitit Croci: caule dodrantali, iuceo, læuque: in cuius cacumine flos emicat purpureus, amaranthi æmulus, qui recens odorem quam suauissimum reddit.

Dodon. ex Matth. Satyrium basilicum minus. Satyrium basilicum alpinum, flore ex purpura nigro, tanquam adusto (vnde Brandeius nomen imposuit) odore omnium suauissimo, seu Styrciaci quem etiam aridus & in pollinem tritus, diutissimè retinet.

Nos [ait Gesner. horti] etiam aliquando plantauimus Laufannæ: sed vix vltra annum puto in hortis durare, & semen inutile esse, sicut reliqua Orchis genera.

Bened. Aret. Palma Christi minor Matthiolo. Satyrii species odorata, & præstantissima Brandeius.

Minus modestè, inquit Adu. facit Senensis, qui hærentibus Citrinis digitos Auiæ esse hæc Monachi conuiciatur, nullamque allatam rationem conuenit: cum ipse ne vmbra quidem adferat vilius. Et vires Digiti Citrini huic asserit, magno incommodo eorum, qui fidem illi adhiberi forent.

Hist. Lugd. Palma Christi minor, Matth. Satyrium Basilicum minus Dodon.

Tabern. icon. & Hist. Palma Christi minor femina, Flein händlens wurz weiblein.

C. Bauh. Phyt. Satyrium 10. basilicum angustifolium alpinum, flore ex purpura nigro.

An Camer. horti. Orchidis Serapiadis siue Satyrii

tyrit Basilici odoratissimo flore minimo quaedam species alpina, coloris ex puniceo nigricantis, quem Dysentericis præbent fruxum cum Ovis, vel in puluerem redactum ex vino propinane.

Satyrion basilicon minus odoratum in peregrinatione nostra Rhetica per Vallem Telinam inuenimus in monte Burmio, tunc nominatū fuit nobis G. Breente, & Italicè ibidē Morete. Cū essemus Mōspeliū delata hæc planta ex montib. circa Gangen. Genevæ cū tempore pestis inferuimus, inuenimus in monte Salene. Huius exsiccati pulvis (inquit Matthioli.) ex aqua ignitum chalybem experta, epotus (vt perhibent ii qui ita esse experimento comprobant,) dysentericis maxime prodest. Idem aquam præstare aiunt, quæ per vitrea organa ex iis elicitor. Radices huic similes, sed quæ alteri magnitudine cedunt. Excalfaciunt utraq; (vt auctor est Auicenna) siccantque secundo recessu. Crassa corporis excrementa pellunt, faciemque detergunt. Dantur maniacis magno iuuamento: quin & in nervorum affectibus. Seminis pulvis drachmæ pondere ex vino potus, comitialibus subuenit. Item radices decoctum vino diutius commistum, quod bibendum paratur tam in prandio, quam in cæna. Radices, Nicolii Florentini testimonio, febrē quartanam fugant: is namque earum tantum vñ Biliorum quandam curatum retulit.

SATYRIVM ERYTHRONIVM MATTH.

Satyrīi Erythronii vocati radice, Mali effigie, coriæ tenui & rufa: candiâ intus pulpâ, sapore dulci, orique non ingrato, Damasco Syriæ misit ad me [Clusius] Cechinus Martinellus Rauenas Pharmac. præstantiss. & rei herbariæ admodum studiosus, cuius imaginem excudi curauimus.

Hist. Lugd. Satyrium Erythronium Matthioli. Hanc, inquit Adu. ostentabat nobis (quasi nunquam vidissimus) & penè inuitis risum excutiebatur Iacobus Cortusius, dicens, se manibus duntaxat atrectando totum turgere Veneris libidinibus.

Nos annotauimus historiæ nostræ lib. tertio Valerandum Dourez. existimasse Satyrium Erythronium Matthioli esse medullam Nucis Cuprophoræ.

OROBANCHE ET HÆMODORVM
Veteribus & in genere.

CAP. XXVII.

Duplicem esse Veterum Orobanchen ex mox tradendis colligere licet. Vnam quæ

legumen sit, aut leguminum, Erui præsertim, vitium & pestis. Alteram quæ cauliculus tantum sit subrubet.

Hanc Dioscor. describit his verbis: Orobanchē (ὀροβάνχη) cauliculus est subrubet, ad duos dodrantes (sempipedalis,) & interdum maior, insurgens, foliis subpinguib. hirsutus, tener, floribus subalbicanibus aut melini coloris præditis. Radix subest digiti crassitudine perforata, vt inde caulis rescicetur. Videtur nasci inter legumina quædam, & ipsa strangulare. Vnde etiā nomen accepit. Editur oleris modo crudus & coctus, ex patina velut alparagus. Quin & cum leguminibus coctus facere putatur, vt ipsa citius coquantur.

Inter reiectanea, alii legunt *ὀροβάνχη* alii *λεονομή* [Leonem] Cyprii *δυσήλη* vocant. In communi *Leo Thyrse* *λεονομή* [Lupus] nominatur. Sed ne stateram, quod dicitur, transgredi videamur, Theophrastum, qui primam & secundam Orobanchen seu legumen depingere videtur, adorimur. Quædam autem sunt [inquit lib. 8. c. 8.] perspicuè multorum communia, sed quia in quibusdam maiorem vim habent (*δυσήλη*, sic legendum sensu ita postulante, non *δυσήλη*, vt in publicis exempl. legitur,) horum existimantur, veluti Orobanchē (Eruanga *Γαζα*) Orobi, Aparine *Λέντις*. Sed Orobanchē quidem Eruum vincit propter imbecillitatem, Aparine autem inter lentēs benè nutritur: & ea quidem Orobanchē quodammodo similis est, quia totam plantam aggreditur & veluti brachiis amplexatur: sic enim strangulat, vnde ei nomen. Quod autem statim à radice Cuthino & Fœnugræco (*Κούτιον*) subnascitur Hæmodoron (*ἡμωδωρον*, & *αἰνιδωρον* legendum vult Hist. Lugd. *Γαζα* Hæmodorō.) vnicaule est, nec dissimili caule, verum breuiore multo, & supernè quoddam veluti caput habet, radicem autem subrotundam. Idem de Caul. 22. de iis scribens, quæ vicinas plantas interimunt, ait: Orobancha vocata Eruum necat amplexu compressuque suo: & Limodora *αἰνιδωρον* legedum Hist. Lugd.) Fœnugræcum interimat protinus radici adnascens.

Orobanches quoque leguminis in diuersis locis meminit Plinius. Est, inquit, herba, quæ Cicer enecat & Eruum circumligando se, vocatur Orobanchē, quam alii Cynomorion appellant, à similitud. canini genitalis: cauliculus est sine foliis [quod malè, vt dicitur,] pinguis, rubens. Estur & per se, in patinis cū tenera est decocta. Et necatur cuminum ab imo dorso (legendum ab Hæmodoro Hist. Lugd.)

Illius & Galenus recordatur simpl. 8. & Alim. i. his verbis. Aparine non modò non esculenta est, sed plantæ Lentis dum assurgit, vndique implexa, ipsam strangulat, suffocat & detrahit, non aliter quàm Orobanchē Eruum. Siccæ frigidaq; est temperaturæ primo ordine.

Sed Cornar. in Dioscor. teste, Plinii locus prior de Orobanchē ex Theophrast. lib. 8. hist. transcripsit. Quod porro lib. 22. dixit sine foliis, nos *ὀροβάνχη* *ἀνὸς* *ἀνὸς* *ἀνὸς* in Diosc. legimus, & foliis subpinguib. connectimus. Non enim penitus sine foliis est, sed in summo caule folsia habet & inter ipsa flores prodeuntes. Nec ignota herba est, sed nomine peculiari caret, nisi quod *ὀροβάνχη* *ἀνὸς* *ἀνὸς* nostri eam appellant. Cornario subscribit Dodon.

ὀροβάνχη *Γαζα*, sic & Larinè Orobanchē, Erui angina [à Theod. Eruanga] ab Erui strangulatu nomen adeptæ est, nempe quod *ὀροβάνχη* *ἀνὸς* *ἀνὸς* id est, quod Orobū siue Eruum strangulat. Neq;

Cynomorion.
Leo Thyrse
Lycos.

Orobanchē
Eruanga.

Orobanchē.
Limodora.
Hæmodorō.

Cynomorion.

Orobanchē
in genere.


ga etiam vulgò (quasi Necam dicere vellent) appellatur, rapiendo enim leguminum inter quæ nascitur, alimenta, ea suffocat & necat.

Orobanchæ æquiuoca.
Cuscuta
Helxine semine triângulo.

Hæc cum Thymo adnascatur, ait Marantha, Epithymi nomen sortita est. Orobanchæ Theophrasti an sit Cuscuta, ut vult Marantha considerandum. Orobanchæ Theophr. & Galeni fortè Conuoluulus niger Gefn. qui nobis Helxine semine triângulo dicitur. Videtur sanè Trago, quod præfens vitium, Angina, seu Orobancha, alter Cuslus Serapionis sit, de quo cap. 41. ita scriptum reliquerit. Est secunda [Cusli sc. species] est nigra, & nominatur sic propter sui nigredinē, & habet semen nigrum &c. Nomina hæc adscribit Lebleb, & Volubilis minor. Cum verò Orobanchæ descriptio, quæ apud Diosc. extat, huic non per omnia quadret, iudicium candido lectori committit. Est præterea Orobanchæ Galeni & Theophr. fortè Helxine Cissampelos. Orobanchæ Diosc. Gefn. quad. p. 42. Aegoletrus Plinii [ni fallitur Gefn. quad.] Rusticis Malus flos, aliis Malus Henricus dictus, perquam similis est Orobanchæ.

OROBANCHE FLORE MAIORE.

Descrip.



C Vitali altitudine exurgit & maiore, caule recto, tereti, hirsuto, pallido, aut luteolo aut subrufo, concaua: in quo non tam folia, quam foliorum rudimenta, angusta, longiuscula, seu ligulæ, celeritè marcescentes raræ: quorum etiam singulæ singulis floribus sunt subiectæ: flores in Thyrsis Orchidum more, sed ex longioribus interualis, Melissæ Fuchsi, magni, hirsuti impensè, colore ex purpureo obsoleto pallido (subalbido Matthioli.) rectum erigentes, è quo prominēt apices nigricantes staminum albidiorum: labrum autem quod demittunt in tres lacinas est diuisum: utique

floris fundus melleo succo viscido madet. Radix bulbosa è squamis compactilis, non admodum altè demergitur. Sapor eius admodum amarus. Flores verum odorem spirant haud ita ingratum.

Orobanchæ, quam vidimus [inquit Matth.] omnibus notis legitimæ respondet: etsi scriptis mandarit Theophr. lib. 8. de hist. & 5. de Pl. caulis; Orobanchæ Eruum necare amplexu: ea tamen quæ à Diosc. representatur, & à Plinio lib. 22. cap. ultimo, nullo sanè amplexu, sed sua tantum præsentia legumina, segetes, Cannabin, & Linum interimit, quæ prope ipsum oriuntur: quam ob causam Ananicles, quod vicinas stranguet, *herbam Lupi* vulgò appellat: nonnullis *Coda di Leone* appellatur: aliis verò *herba tora* quod vacce ea deuorata [ut pastores facto periculo testatur] statim Taurum adeant. Sunt qui [ut loco citato fortè bit Plinius] Cynamorion eam appellent à similitudine canini genitalis: non inconcinna representatione: nam si quis eam contempletur, glabro singularique caule profilientem, confarctos inter se flores, & quasi in glomum collectos monstrantem, genitalis canini effigiem referre perspicit, quod in summo crassius, & veluti galericulo contextum cernitur. Ex quibus omnibus non temerè dicendum existimaucrim, vel Theophrastum hac in re deceptum esse, vel aliam à Diosc. & Plinio Orobanchen concepiisse. In postremis mutata figura. Frustra Matthioli repetit Diosc. descriptionem nihil addens de suo, quasi non nota ei fuerit planta.

Orobanchæ, inquit Turnerus, in multis Angliæ locis provenit, Variis quoque Germaniæ locis obseruauit. Inueni quoque sæpe numero radicibus Genistæ vulgaris pertinaciter implexam. Item iuxta Trifolium pratense marcidum quod enecauerat, vt ex fossione comperi, reliquis omnibus circumcirca Trifolii vegetis & vermantibus. Orobanchen interpretari licet Angl. *Chotefus* & vel *Stranglemede*. Falluntur, qui Cuscutam credunt esse Orobanchen Diosc. Alii sine causa nuper Orobanchen nostram inter Satyria retulerunt. Quod Matth. contra Theophrastum scribit (dicentem Orobanchen amplexu suo complexuque legumina enecare) solâ præsentia suâ id efficere, non placet. Quomodo enim legumina necet, solâ suâ præsentia cum venenatâ non sit? cum etiam ne venenatæ quidem plantæ eas inter quas nascuntur, interimant: Theophr. quoque & Diosc. repugnat. Fortè Matthioli, quoniâ nulla in Orobanchæ folia aut capreolos supra terram obseruauit, arbitratus nihil habere, quod strangulare possit, exceptâ solâ præsentia: neque perplexas radicum fibras animaduertit, quibus non sine errore caret figura ab illo proposita; Tragus tamen rectè fibras expresserat, titulo Satyræ Erythronii.

Reperitur planta Rapo Genistæ omnino similis, caulibus fuscis [brunastres] & coloris fidi, altitudinis pedis, floribus formæ & coloris Rapæ Genistæ: Rapum Genistæ sine dubio species est Orobanchæ [ait Dodon. Gall.] & Limodori: ei autem similis planta est Diosc. *ὀρβάνχη* Lat. Orobanchæ & Eruangina, non tamen Orobanchæ Theophr. sed *λεμόδωρον*, Limodorum aliis vt Phocioni, *ὀσπρηλίον*, id est, leguminum Leo. Idem Hist. legum. Limodorus cauliculus est pedalis aut maior, subrubens, fistulosus, fragilis: flores subcandidi aut sublutei vtricæ immixtis floribus haud multum ab similes: floribus succedunt

cedunt oblongi caliculi; in quibus semina minutiss. candicantia & inutilia. Radices subsunt rotundæ, turbinatæ, digiti aut pollicis crassitudine, foris squamis nigricantibus contextæ: intrus verò subcandidæ aut subluteæ: aridæ verò cornu modo duræ sunt. Theophrastus huiusmodi vitium *ῥαβδόδορον* appellat, veluti *ῥαβδό* hoc est famem adferens, frugum enim alimentum ad se trahit, & perfectè adolescere non finit. Item Hist. in fol. Limodoron, seu Rapum Genistæ, tota facie Orobanchen Diosc. refert, hoc solo ab ea differens, quòd non inter legumina exeat: sed ex fibris radicum Genistæ quibus adhærescit.

Lobel. Icon. Pl. pag. 268. T. 2. Orobanche Hypogenista, & Rapum Genistæ à similitudine. Icò eadem cum iconè à Dodonæo proposita pro Limodoro siue Orobanche. Orchidibus quodammodò cognatum est *ῥαβδόδορον*, siue *ῥαβδόδορον* Theophrast. vel *ῥαβδόδορον* Diosc. & Cynomorion Plinii, cuius varia genera inveniuntur multis provinciis communia. Orobanches liquidem legitimæ illius Dioscor. siue *ῥαβδόδορον* Theophrast. varietates sunt species. Aliæ enim latiores sunt, aliæ humiles, albæ, exalbidi coloris, aliæ flavescentis, aliæ fuscæ, aliæ subcærulei: nonnullæ aliarum radicibus adnascuntur, plurimæ per se subsistunt, & solæ inter alias plantas & gramina nascuntur: pleraque autem omnes vnico simplicique caule sunt præditæ, interdum ramosum & multifidum illum habent. Omnium verò maxima passim in omnibus Europæ siluis nascitur, ut existimo: certè nullas adii, quin ipsam non repperim: eam, quia apud Belgas sæpius vulgaris Genistæ radicibus innascitur, Herbariofium turba Rapum Genistæ appellat, Belgæ Breni Ræpe, Hungari, quia rectè affurgit & firma est, *Misè gjerthyia* misalem candelam, siue cereum appellant, quæ subcæruleo est flore, Cardui vulgaris inter segetes nascentis radicibus inhaerentem olim erucere meminimus cum Mompeli v. uerem.

Eandem habet iconem Clusius nomine Orobanches primæ quam nobiscum proposuerunt Dod. & I. ob.

Ruellius Plinium secutus Orobanchen alteram Diosc. ita describit, ut cum leguminosa hanc confundat.

Ex emendato Theophrast. insigne in Plinio mendum corrigendum. Legimus enim lib. 20. c. 10. Et necatur Cuminum ab imo dorso, cum legendum sit ab Hemodoro.

Tab. Hist. & Icon. Orobanche 2. *Eruenwurzer*. *Sommerwurzer*.

Schvv. Orobanche Diosc. *ῥαβδόδορον*. *Sommerwurzer* / *Schmerwurzer*.

Prouenit in agtis consitis Antena, Pisib, Fabis, Lentibus, & aliis ubi Genista non prouenit. In Belgio & arenosis maris litoribus non rarè reperitur Dodon. Nascitur in segetibus inter legumina: Etiam in sylu. sub Fagis. Maio & Iunio floret, Schvv.

Montbelgardi multis in locis vidi Orobanchè: Genex florentem vidi Maio & Iunio passim *au plan palais*, & pratis: Basileæ etiam florentem Maio, ubi copiosè prouenit. Mompeli cum essem offendi florentem mense Aprili in monte propè Castelnèuf, ut & alibi.

Orobanche, inquit Matthiolus, dicitur aliquibus herba tora, quòd vaccæ & deuorata (ut pastores factio periculo testantur) statim taurum adeant. Orobanches maioris Rapum Genistæ nuncupata, resiccata & trita puluerem ex tepido

vine haustum, præfens esse ad Coli dolores remedium Belgæ prædicant, Clusius.

OROBANCHE FLORE MINORE.

Orobanches vulgari similis est, caule simplicè dodrantali, purpurascente, hirsuto, foliorum acuminatorum squammatum incumben-
tium, præsertim circa imum, rudimentis vestito: radicem fibras habuisse vulgari similes adhuc in planta sicca apparet. Spica floribus constat con-

fertis cucullatis, labello apertè referentè, calyce hirsuto multifido, eiusdem cum caule coloris, subiecto seu per vnicuique flori; folio oblongo, acuminato, hirsuto.

Hanc Orobanches speciem ubi collegimus nò recordamur: describitur ex planta sicca: huic sanè conuenit figura Taber. nostræ

Locub



quæ iam parata erat minùs placet. Fortè ad hanc Orobanchen referenda quæ Mompeli obseruauimus.

Tabern. Icon. & Hist. *Sommerwurzer* / Orobanche prima Orobanche Matthioli floribus ex luteo pallidis, *Eruenwurzer* dicitur German. Theophrast. *ῥαβδόδορον*, Caula Leonis, Mala herba, Herba Tauri, & Herba Vaccæ.

OROBANCHE MINOR PYRPREIS
floribus siue ramosa.

Ramosa Descriptio
est caule; sæpè verò etià plures dodrantales, aut breuiiores, emittit caules, multò tenuiores, quam Orobanches vulgaris, rigidioresque, duros; rufescentes, hirsutos, in ramos subinde diuisos, foliorum dumtaxat vestigiis quibuldam ornatos: Flore, spicati, minores; purpurei, oblongi, hiantes; è multifido calyce emergunt, cui

longi, hiantes; è multifido calyce emergunt, cui

singulo singulum appositum foliolum acutum: sequitur *capitula* turgida puluisculo plena; *radix* tuberosa Auellanae magnitudine; sibi autem propaginibus donata. Sapor plantę aliquantulum amarus. Cæsalp. Orobanche altera ramola.

Locus & tempus.

Camer. in hist. Math. Sommer wurz/ Eruegger, Orobanche.

Vidi Montbelgardi prope Courcelle pagum in agro florentem Septembri; & primo prope Mospelium, ubi in segetibus mense Aprili proueniebat. Basilea etiam vidi, præcipue in agris Canabii consitis. Non ubique vulgaris est, multis tamen in locis reperitur, ut in Thuringia: Camer.

OROBANCHE MAGNA PURPUREA Montepellulana.

Descriptio



recti: *radix* superiorem refert partem radicem Orchidis, nullis testibus tamen aut bulbis donata. Sapor amarus, tetrerrimus.

Lobel. (cuius icon non placet) calcaria nulla appingit. Eidem dicitur Orobanche maior e Gramontio loco Montepellensium.

Considerandum an Clus. Hist. pl. rar. huius meminerit nomine Pseudoleimodori Montpeliani, eius verba sequuntur cap. de Pseudoleimodoro Austriaco Nido auis affini.

OROBANCHE AFFINIS NIDVS AVIS.



DE Nido Auis scribens Tragus, ait flore esse & folio viduum, nihilque aliud esse quam pingue & rectum Asparagi. Qualis verò nobis perfectior reperitur? *caulis* surrigebat modò singularem, modò duos vel tres pedales, aut cubitales, albicantes: foliis vestitos concavis, pelucidis, striatis,

neutiquam acutis, ut Lob. figura docet, sed obtusis, superna parte quodammodo cordis figuram exprimentibus. Quorum summa *storum* Thyrsus, Orchidum modo & formā, occupat, coloris helui aut pallidi, qualis & foliorum tabidorum. Ac occulti quidem ex breuibus pediculis, ut Tragus pingit: ad quorum exortum foliola parua singula sese exerunt. Vbi verò se aperiant, Orchidum more hiant. *Galea* exigua, sub qua ptilulum breue cum apiculis albicantibus: quod utrinque ad latus bina foliola cingunt. *Labellum* magnum ima floris occupans cauum intus. Nullus odor notabilis. Dehiscentibus floribus, utriculi puluisculorum succedunt striati, angulosi, residuis florum foliolis marcidis insigniti. *Radix* crassis fibris, succulentis, fragilibus, tota perplexa, nidorum auium structuram imitans, quorum extrema haud acuta obseruauimus, ut Lob. pingit in suo Nido auis, sed obtusa, ut Tragi & nostra exprimit. Sapor radicis ac totius plantę amarus, horridus.

Dodonæus considerata fortè icone Tragi tribuit flosculos, denegat folia. Dicit namque in hist. Gall. quibusdam Belgis *Vogelneß* / *Nid d'oiseau* est sine foliis, flores cum caule coloris ligni. Lobel. Icon. Plant. Nidus auis ex speciebus Satyrii abortiui, Orchis abortiua, Satyrium abortiuium, species Hypocistis.

Non dubium est Clusio quin Leimodori adnumeranda sit, ea quam Lob. Orchidem abortiuam Germ. *Norgendrehen* / Belg. *Vogelneß* appellant, quamque nonnulli Coagulum Plinii esse hariolantur.

Nidum auis inueni florentem mense Maio in monte Bar quod medio miliari à Montbelgardo distat, inuenimus etiam Maio in sylua Abietum, itinere Montbelgardo Porentium ad radicem Abietis. Audio prouenire Basileæ versus Augustam ad Rhenum: Tiguri cubitalem collegimus. Lobel. reperit in altis montibus *Seuenes* in Gallia Narbonensi cū speciebus Dentariae, prouenit etiā in Belgio in syluis humidis. Hinc rectè Tragus; In Vliginosis & vmbrosis syluis nascitur Maio mēse.

OROBANCHE ET NIDO AVIS affine Pseudo *Nidus* Austriacum violaceum.




Austriacum Clusii in Pannon. Pseudoleimodori in post. Hist. congenerem plantam Orobanche, quę superna parte ipsam æmulatur in montanis supra Badenses thermas obseruabat, quę nūquā antea, quod meminerit, ipsi fuit cōspecta. Pedali affurgit illa *caule*, frequentibus secundum radi-

radicem foliis, tanquā vaginulis, innoluto: spicā gestās florum quatuor foliis cōstantium, superiōre in corniculum desinente, & promulciscē quadam inter media folia prominente, cui adnatæ sūnt duæ tenues barbulae: floribus striata & longa subsunt capitula, semine exili & Orchidum simili plena: subrotundam radicem non habet, qualem suo haemodoro tribuit Theoph. l. 8. Hist. Plant. cap. 8. sed crassas, longas, & obliquas fibras habet, quemadmodum ea planta quæ vulgò Hel-leborines nomen obtinuit. Tota stirps saturo purpuræ & planè violaceo colore prædita est. Floret Iunio.

Lobel. Belg. Ic. Pl. *Dogelone*st; Nidus avis ex speciebus Satyri abortivi, Orchis abortiva. Satyrium abortivum, species Hypocistil.

Considerandum an Lobelius malè suo Nido avis eam iconem adaptarit, quam etiam miramur diuersis locis & nominibus propositam sine descriptionibus, quasi iconē tenus tantum ei fuerit nota planta, vel perpendendum an duas plantas confundat.

DENTARIA APHYLLOS MINOR Taberna montani.



Tenella est plantula Spithameæ altitudinis, succulenta, alba, sine foliis: cauliculus articulorum quibusdam vestigiis distinctus videtur. Cuius summa sterculi tenelli aliquot occupant, ad Orchidis flores quàm proximè accedentes. Radix alba est denticulata. In montibus crevit Augusto.

Hæc Tabern. Icon. & Hiltor. Hein Faal. Fraut.

Dentaria aphylls minor. Videndum quantum differat ab Orobanche nostra alba.

ANBLATVM CORDI, SIVE APHYLLON.

AD Orobanches speciem quandam accedere videtur, hæc planta: quæ ex radice multiplici, mira squamarum denticulatarum congerie stipata, alba, molli, & succosa, caulum erigit minimi digiti ferè crassitudine, dodrantalem aut altiore, teretem, succulentum, fragilem, tenui membrana vestitum, aquea pulpa abundantem: iuxta quem ex longis intervallis auriculæ quadam membranæ foliorum amulæ prodeunt, aduersæ quidem, sed altera tantillū eminentiore. Tertiam & supremam colliculi partem flores occupant plures hiantes, eodémque modo, nutantes, & antrosum spectantes omnes, breui pediculo appensi, à quorum retro pediculorum quoque exortum foliola muniant. Floris colorem ex rufio vel purpureo candicantem dicunt: mihi hætenus non visus. Illis succedunt vascula A-

Tom. II.

uellanæ ferè magnitudine, à pediculo ad mediū calice foliaceo subhirsuto, renello, succoso & quadripartito vestiti, lineis quibusdam ac canaliculis quadripartiti, semine rotunda oua pisciū minima emulante. densissime facta, quod maturum totum nigrum est, papauerinum, sed texturā maius. Tota cæterum planta gustu est æquosio acerbiusculo, non sine aliquo amaritudinis sapore, quæ tamen in semine magis conspicitur.

Cordo hist. lib. 1. cap. 10. addita hæc annotatio à Gesnero ut puto. Anblatium Germ. id est Aphyllon. Orobanchen aliqui putant, non tamen ea, sed ei similis. Nos aliquando Plinij Aegioertho (quam herbam ni fallimur nostri cultici die böß blüm & den bösen heinrich.) esse putauimus.

Vult Dod. lib. frum. ad Limodori genus referendum Valerii Cordi Anblatum. Anblatum verò etiam Dentariam aliquā vocari scribit Matthioli. Cæsalpinus Dentariam vult esse Arachidnæ speciem: sed cum Theoph. Arachidna iudicio meo nihil cōmune habet: de qua inter Legumina sub Arachnida Honorij Belli.

Copiosè reperi Anblatum in Montbelgardensi monte Bér: Medio Maio comperi in montibus vmbrosis sub arboribus eundo Potentillæ S. V. fanum: flores præterierunt & semina erant penè matura, transituli in Hortum ill. E. C.

Præstans est ad rupturās, si in pollinem redacta herba drachmarum duarum pondere in iuleculo in quo Symphytum bulliat quadraginta diluculis continuis sumatur. Imponenda quoque herba ipsa fracturæ, debitorumque liganda pars. Eadem ratione hausta vulneribus internis, variisque affectibus à defluxione ortus prodest. Magnus usus aquæ destillatæ in fluxionibus & Epilepsia, Camerarius. Adstringit, refrigerat & abstergit: Datur pulvis in potu, ad effectus matricis & colicos, Cæsalp.




A R V M. CAP. XXVIII.

Bulbosa Allii radice, bulbis adnatis, nititur, cædida: à qua filia exeu, oblonga, triangula, sagittæ dicta, sed latiora, minusque alata, supra infraque splendentia, sed hinc minus, inde magis viridantia, maculis nigris interdum respersa, gustu, ut & radix, acerrimo, & linguam cultelli instar transadigente: inter quæ, caulis surgit palmaris, teres, striatus, in cuius fastigio è membranæ vagina longa prominet, pistillum atropurpureum, infimā parte apicularum corona acutè cinctum, sub qua racemus baccarum, per maturitatem miniato colore pictarum, denso stipatu confertarum.

Vuu

Aron An-
tiquorum.



Lupha.

Alimon
Thymos.
Dracuntia
Colocasion

Plin. nos.

Nō Aron.
Colocasion.
Arisarum
Dracuncu-
lus ex-
guis.

Serpenta-
ria
Colubrina.
Iarus.

Dracuncu-
lus mi-
nor Diof.

Ari folium, inquit Theophrastus, quod admodum amplum spargitur, est cum latitudine caui atque Cucumeracei, caulibus, ut etiam flos, nullus. Radix inter Oleorum genera multo magis carnosa, levis & crassalatera tenuis atque nervosa, ut sanè quispiam dubitaverit, an inter radices hæc poni de-

bëat: *Arion* quod autore Diof. apud Syros *Lupha* dicitur, folia emittit *Dracunculi*, longiora (codex *Bab. ar. reg. p. a.* Anguill. ex cod. antiquo, *Oriba.* & *Crat. m. p. p. a.* Matth. omnia exempl. microtera) paucioribus distincta maculis (*δρακύντης. i.* immaculata) caulem dodrantalem, subpurpureum, pistilli specie: à quo croceum semen [*Dracunculo* minori conuenit fructus. croceus *Cæsalp.*] radicem *Dracunculi* albam: Hoc autem inter Diof. spuria, alii *Arion*, alii *Dracunculus*, alii *Dracuntia*, *Cyperii* etiam *καλὴ δάκτυλος* dicunt.

Plinius de bulbis agens, *Aron* omnino sic describit. Est inter genera, inquit, quod in Aegypto *Aron* vocant, *Scyllæ* proximum amplitudine, foliis lapathi, caule recto duftum cubitorum, baculi crassitudine, radice mollioris naturæ, quæ edatur (estur *CH.*) & cruda.

Hermol. cui simpliciter *Aros* dicitur, quam *dlantam* pro *Aro* intelligat demonstrat. Hæc à similitudine illa ad *Dracuntium*, ab Officinis *Serpentaria* minor appellatur: itemque *Iarus* & *Aron*.

Plinius notant *Marcellus* & *Cordus*: ille quod *Aron* cum *Dracunculo* confundat: hic verò quod radicem magnam habere scribat.

Tragus tres tradit species: Vnum, *Ari* primum genus & vulgare. Alterum, involucreto & pistillo ex albo luteolo. Tertium *Ari* genus cum nigris maculis. Deinde ait: Omnes vno consensu Herbarii, tradunt eam herbam, quam Germani *Aron* vocant, *Aron* esse, Diof. lib. 2. cap. 162. quod ille *Lupham*, *Alimon*, *Thymon*, *Dracuntium* & *Colocasion* cognominat. Mihi verò non *Aron* sed *Arion* videtur esse. *Aron* quod fugillata lituris folia, profert fortasse exiguus *Dracunculus* fuerit. *Aron* nonnulli, *Serpentaria*, *Colubrinam*, *Dracuntium* minorem nominant. Dicitur apud *Simonem* *Ianuensem*, *Iarus*, *Barba Aron*, & *Pes vituli*.

Figura *Martholi* ficticia ex *Bistorta Rumice* & bulbo.

Fuchfio, cui *Dracunculus* minor Diof. videtur *Aron* & *Aris*, *Iarus* Officinarum, *Pes vituli*, *Serpentaria* minor, & quorundam *Sacerdotis* virile. *Anguill.* asserit nostrum *Aron* esse *Diofcoridis*, ac apud illum legendum *μαρτύρια* & non *μαρτύρια*.

Aron, ait *Amatus* in Diof. non vbique acre, imò *Galenus*; *Diofcoridi* candida radix, *Plinio* nigra.

Aron descendit *Dodonæ*, eiusque figuram exhibet, ac secundo pro *Dracontio* minore proponit, quod quomodo factum sit, non occurrat.

Diof. videtur, ait *Turner.* ostendere *Aron* in sua patria, non fuisse adeo acre ac apud nos comperitur. *Galenus* quoque scribit *Aron* candidum & sicum esse in primo: Quod autem apud nos prouenit, calidum certè est intertio, vnde forte dixerit quispiam, nostrum *Aron*, non esse *Diofcoridis* & *Galen.* Verum *Galenus* seq. verbis lib. 2. de alim. fac. duo esse testatur *Ari* genera, alterum mitius, alterum acrius.

Aron vulgare, [aiunt *Lob.* & *Penz. Ad.*] est plebecula *Barba Aronis*, & *Sacerdotis* veterum aut mentula, racemo purpureo punicante miniatulo: foliis maculis nonnullis nigricantibus insignitis, vnde etiam *Dracuntium* vocatur.

Gichereum seu *Gigatum Cælalpino* vulgò appellatur, foliis maculosis, maculis candidis vel nigris, corniculo pallecente foedi odoris, fructu croceo in æstate: radix tactu pustulas excitat. *Diof.* hanc *Dracuntium* paruum appellat, quam quædam superflua in eius dictione ele-gantur, assumpta ex altera *Dracuntia*, reuocatis apertiss. ecit historia. *Plinius* *Dracunculum* vocat, diuersum ab eo, quem vidit in Lusitania radice subrutula, quam quidam ab *Aro* non distinguunt.

Aron vulgare, inquit *Camer. horti.* Aliud durior folio, virente per totam æstatem, & aliud grande, pistillo albicante, rotundior folio, itidem durante in multam hyemem.

Obseruauit *C. Bauhinus* *Phyt.* *Aron* vulgatum, aliud folio maiore & acutior, aliud rotundior, aliud durior per totam æstatem virente. Sic eius quod maximo est folio, ipsius folii venæ omnes albicant, quod apud *Italos* frequens, aliquando maculis albis asperguntur. Reperitur quod nigricantibus lituris, aliquando purpureis lignatur: quod verò apud nos vulgatissimum nullis maculis notatur. Sic & pistillus colore variat, alteri purpureo, alteri ex albo luteo colore est.

Aron, *Arion* offic. Germ. *Arontraut*, *pfaffenpint*, *Teufelcher Imber*. *B. Calceol.* Gall. *Pied de veau*, *Vit de chien*. Ital. *Aro* & *cigaro*. *Hispano*, *fusa de yaro*. Angl. *Cocholb pint* vel *Rampe*, vel *Aron*. Hung. *Ulatragulya* quibutiam.

Aron in *Hetruria* & in agro *Coritienfi* frequentiss. prouenit in campellibus, in vineis, in semitis propter sepes, præsertim in maritimis *Senenibus*. In *Bohemia* in montibus quibusdam copiosum admodum prouenit minus, *Marthiol.* *Aron* cum maculis nigricantibus vbique vium, vix dum hieme exacta folia edit, *Lo-belius*.

Aron *Monspeli* mense Martio & Februario prouenit. Mense autem Iulio fructu vidi ferentē ad formam racemi. *Basileæ* etiā abundat. In Italia habet tres species *Ari*, vnā cū maculis nigris, aliā luteis, tertiam sine maculis, ut *Patavii*, vbi Ianuario, Februario, Decembri, Martio: *Ferraria* cum maculis nigris in monasterio *S. Domin.* à *L'Angeli*, *Bononiæ* mense Aprilis cū maculis pallidis in monte *Apennino* è regione *S. Mammarum*: *Genue* possim in sepibus quæ stur *Lanis* vixens Martio. *Montebelardi* passim in sepibus virens Martio, Aprilis produens florem. Collectum in *L'iste* spontaneum. Cum nigris maculis plantati in hort. *Il. E. C.*

Quærit

Quærit Io. Fabr. quid causæ sublit, quod Aron, vulgaris aliqui herba in vicino illo (Curie Rhetice) tractu nusquam reperiatur, cum tamen inde ad vnum miliare in maxima nascatur copia, respondeat has aliâque causas ad oculatâ naturæ vim reiciendâs, vel potiùs ad ipsum naturæ magistrum & artificem.

Ari autem radix, autore Theophrasto, cibo idonea est: & folia eiusdem (decocta in aceto madi nimirum possunt,) suavis profectò, & ad fracta utilis.

His addit Dioscor. Radix etiam decocta estur, quippe quæ minùs acris sit. Folia verbò ad esum conducuntur, & arida per se decocta manduntur. Radix, semen, & folia eandem cum Dracunculo vires obtinent. Priuatim tamen radix cum fimo bubulo podagricis imposita prodest. Ceterum eodem quo dracunculi radix modo reconditur, ac in summa ob initio rem quâ prædita est acrimoniam citiùs aprior est.

Plinius Ari vires medicas per longum exponit, quibus ex ipso recentendis super sedemus, eadem quæ habet ex aliis plenius tradituri.

Galenus ex terrea & calida essentia Arum cõstare dicit, & propterea extergendi vim habere, sed non fortè velut Dracontium. Esse igitur in siccando & calefaciendo primi ordinis. Radices autem eius maximè viles sunt, inquit, & in cibo acceptæ crassos humores moderatè siccant, vt expulsiõibus ex thorace idoneæ sint. Sed Dracontion ad hæc commodius est. Idem 2. de aliment. radicem Ari similiter vt Rapi edicit, ex aqua coctam, cum Sinapi aut aceto, oleoque ac garo: cū quibusdam item intritis, cum aliis, cum quæ ex ca- feo parantur.

Radix Ari, vt vult Tragus, eius maximè quod maculata habet folia, siue sicca siue recens tusa, ac ad minùs drachmæ pondere sumpta, remediū est præsentissimum ac minimè fallax aduersus venenum & pestem: quidam tantundem adiciunt theriacæ. Succus herbæ expressus menturâ cochlearis, aut maiore, potus, eandem habet facultates: quod si illi patum aceti admiscueris, quominus linguam vellicet efficit: Aron in puluerem redactum, ac interdum drachmæ pondere cum binis sacchari drachmâs sumptum, suspensio prodest, crassam enim & lentam pituitam incidit, excretionem iuuat, pulmonum & pectoris vitia purgat & ad tussim est maximè vtile: idè remediū stomachum phlegmate, & atra bile infectum purgat: radix Ari siue recens siue arida, tusa ac sumpta, mulieres à partu validè purgat, potestque hoc pacto & iumentis purgandis exhiberi: eadem succus expressus & aqua destillata possunt. Tradunt etiam aquam Ari destillatam ramices sanare, singulis vicibus binis vnciis aut minore mensura potam: ad pestem ac anthracè vix præstantiorem ac salubriorem herbam noui, ac folia Ari recentia imposita: eadem siue arida, siue viridia, ad inueterata & putrida pedum vlcera faciunt: aqua Ari & succus, quauis vetera vulnera purgat sanâque. Ari folia cum radice in vino & oleo decocta, insectiõibus calidis ficus sanant, & sedem precipidentem retrahunt: nonnullæ mulierculæ folia Ari caleis vermiculis sca- tentibus imponunt, quæ sit vt ab actis vermibus casei hac ratione à corruptione vindicati diutius durare possint.

Non desunt, inquit Matth. qui radicibus Ari Calzolari vtantur ad accendos à suis mensis Parasitos, & voraces Lurcones, carum puluerem delicatis epulis admiscentes: nam vbi fauces oc-

cupauerit, tam contumaci ardore afficit, ne posthac quicquam vorare queat, nisi bubulo caprilloue lacte diutius gargazato, aut recenti butyro sensim deglutito. Abstergit Arum, attenuat, aperit, incidit & prouocat. Decocta radix melle excepta, medetur pectoris morbis omnibus pituitosis, expectorat enim valentissimè crassas lentâque excretiones, idèque asth. naticos maximè iuuat. Datur elixa, vel feruentibus cineribus tosta, vtiliter tussientibus, ex amygdalino oleo. Idque bellè quoque præstat lac potum, in quo radix ipsa fuerit incocta. Illinitur eadem, aqua priùs elixa, epiphoris, fugillatis, inflammatisque consillis, fabacea farina addita, & defructo subacta. Subigitur quoque oleo, & tumentibus hæmorrhoidibus comode illinitur: Radicis succus excedentia & contumacia vlcera curat, quemadmodum & narium polypum (omnia vlcera succus, Plin.) folia ambusta sanant. Dantur vtiliter seminis drachmæ duæ ad menses educandos, & secundas pellendas ex vino. Nostrates mulieres ex Ari radicibus stillatitias aquas ad fucum parant, quas ad faciem erugandam illustrandâque magnis laudibus effertur. Id quod etiam efficaciter præstat insolutus radicis succus, ceteris speciem referens, quem Geria vulgò nominant, is siquidem mirum in modum carni splendorem, & candorem conciliat.

Nunc quid Porta importet videamus: Aron folia distincta maculis habet, de honestantium Lunæ macularum imaginè. Dantur vtiliter feminum drachmæ duæ ad ciendos menses. In Aron figacis naturæ artificio multiplici membrana munitus fœtus. Partus omnium animalium extrahit, naturæ ostio circumlitum (idem Plinius,) & seminis vel radicis drachmæ duæ in vini cyathis duobus succiant, si à partu non purgatur, ad secundas trahendas. Eligies Ari fructus ibidem. Calculosis confert (Io. de Mont. expert.) Ari herbe & radicis contusæ succus cum vini cochlearibus tribus, quinquies ieiuno ventriculo assumptus.


Patet autem ex hæcenus dictis falsum esse, quod scribit Fallop. tract. de med. purg. simpl. dicens: Neuter Dracunculus, scilicet nec Aron, nec alter, qui nostris Serpentina dicitur, est purgatorius, quamuis secundum opinionem Melues purget. Sed utriusque sit non sunt in usu. Sed liceat hic subiungere, quod Odr. verè esse contendit: Verum, inquit, tempore suilaribuli nihil edere certum est: quippe quod neque exeat: & captus ventre intestinoque inani videatur. Narrant eius intestinum, per inedia nra conuenire, vt ad ductum propè cohereat: Itaque Verum latebrâ egressum, primum herbam Arum dictam degustare, ut intestinum laxetur, & hiet.

Fallop. not.

ARVM BYZANTINVM.

Cum ante aliquot annos huius Ari tuber cum aliis tuberibus bulbisque Constantinopoli allatis, Viennæ acciperem, inquit Clusius, herbam, vtrum ad Ari, an Aristari genus referrem: deinde cum folia profetere cepit, primis duobus annis pro Aristaro latifolio habui, ducentè me in eam sententiam foliorum quadâ similitudine. Nam ea conspiciebam satis ad Aristari latifolii folia accedentia, nec valde mucronata, sed potiùs orbicularem figuram referentia: nec radicem valdè dissimilem. Verum postquam ea augeri cepit, digitalem longitudinem adqui-


Descriptio



ARISARVM LATIFOLIVM
quibuidam.

C_A?. XXIX.

Description



fluit, multis tuberculis inaequalem, & vicialem autem altiore crassitudine, multaeque proles adnatas habuit folia inter protulit longè maiora, ad Aristol. foliorum accedentia, nec illis minus splendens supernè & infernè eius autem florem duntaxat videre contigit anno 1596. licet octen-
to antè alu-

emergit, cui oblongus *stis* infidet; monâchalis
 cuculli, flos Aristolochiæ floris modo efforatus,
 amplius tamen, extremâ parte fulci coloris
 qui deorsum radiatim tendit, in cæteris albus,
 caninum olens, *pistillum* obtusum, incurvum, &
 velut ex cucullo prospiciens continens: *radix*
 torunda, globosa. Aro minor, flos nigricans, in-
 tus alba, aliquando etiam ruberula & oblonga,
 initio dulcis, deinde acris, minus tamen Ari ra-
 dice (licet Veteres contra sentiant) fibris ali-
 quot supra eam expansis, vt in Olechidibus. *Alind*
 eius genus etiam inuenitur paulo amplioribus
 foliis, & rotundioribus aliquantulum atque
 mollioribus, pluribus tuberculis se propagans,
 oblongaque & crassâ radiculari sæpius in larum
 & obliquum spargens.

Α'ρίστων [ex Diosc. sententia] exigua herbula
est, cuius radix Oliuz magnitudinem implet.

Eius mentionem fecit & ipse Plinius. Aris[inquit] in Aegypto nascitur, similis Aro, minor tamen, minoribusque foliis, & vtiq[ue] radice, quæ tamen Oliuæ grandis magnitudinem implet: alba geminum caulem, altera, vnum tantum emittens.

Arifaron multò minus Aro esse Galenus ait, sed eodem acius, radicem verò Oliuæ magnitudinem habere: eadem verba vt aliolet, transcripsit Paulus, nec plura de ipso tradiderunt.

Apud Hippocratem in l. b. de articulis, legitur vox *αἰεῖς*, sed non pro herba, verum pro instrumento scobina appellato. Galenus autem in glossis Hippoc. inquit *αἰεῖς καὶ τὸ πῦρον, ἀλλὰ καὶ βοτάνη*. *ἡ δὲ αἰεῖς ἄσπετος*. Dicit itaque Galenus, non solum instrumentum, sed etiam herbam esse, quæ *αἰεῖς* appellatur. Nec intelligendum est villo aliquo loco, *αἰεῖς* vocem, pro herba apud Hippocratem repetiri. Hęc igitur *αἰεῖς βοτάνη* an sit eadem quæ *αἰελοῦσι*, pro certo affirmari non potest.

Arifarum nihil aliud, quam Aron paruum esse
putat Cornarius, quid autem per Arum paruum
intelligat non demonstrat.

Corrumpere, inquit Hermolaeus, nomen Arisiri
herbæ Medici, vt ab ipsis iam non Arisiferos sed
Arisus dicitur. Est & Aris herba Hippoc, nec
qualis sit, & an pro Arisaro capiendi sit, non
constat. Arisatum Plinius Erim [Arim], sed, vt
credit Marcellus, corrupta ex Arisaro voce, ap-
pellat. Dubitauit in Plinian. castig. Barbarus di-
minutiua ne forma non Arisiferos sed Aris, quasi
paruum Aron vocanda planta hæc sit. Sed vo-
candum Arisaron esse Paulus testatur.

Arisarum Veronenſium Plinii Aris. Virentis
Ariſari magna copia Lobel. & Penam donauit
Franciſ. Calceolarij. lidem in Adu. quod mirum
ex Matthioli iconem aſſumunt: ac applicant
riſaro ſum Veronenſium: Matthiolus tamen
nec ſuum Ariſarum à Calceolarij miſſum eſſe,
cur igitur Matthioli figuram adaptant ſuo Ariſa-
ro Veronenſium, an quia Matthiolus dixit
Aru minus miſſum per Calceolarij: cur
in Belgio ſatim deſcribunt, aliter quàm vi-
derint: flores tribuentes, quos non viderunt,
quandoquidem eæ radices quas dedit Calceolarij
aliam formam aſſecuta ſunt progreſſu tem-
poris, iudicium eſt Lobelium & Penn. ſuam deſ-
criptionem concinnaſſe ad iconem Matthioli,
quam pro ſua ponunt præterito eius nomine, &
non ad plantam quæ creuit in Belgio: nec pla-
cet ſanè libro Iconum Plantini, figuram Lobeli
ex Adu.

ex Adm.

Querit Io. Fabr. quid causæ sublit, quod Aron, vulgaris aliocui herba in vicino illo (Curie Rhetice) tractu nusquam reperiatur, cum tamen inde ad vnum milliare in maxima nascatur copia, respondet has aliâsque causas ad occultâ naturæ vim reiciendas, vel potius ad ipsum naturæ magistrum & artificem.

Ari autem radix, autore Theophrasto, cibo idonea est: & folia eiusdem decocta in aceto mândi nimirum possunt, inaus profectò, & ad fracta utilis.

His addit Dioscor. Radix etiam decocta estur, quippe quæ minùs acris sit. Folia verò ad esum conduntur, & arida per se decocta manduntur. Radix, semen, & folia eadem cum Dracunculo vires obtinent. Priuatim tamen radix cum suo bubulo podagricis imposita prodest. Cæterum eodem quo dracunculi radix modo reconditur, ac in summa ob mitionem quâ prædita est acrimoniam elui aptior est.

Plinius Ari vires medicas per longum exponit, quibus ex ipso recensendis superioremus, eadem quæ habet ex aliis plenius traditur.

Galenus ex terrea & calida essentia Arum constare dicit, & propterea extergendi vim habere, sed non forte, n. velut Dracontium. Esse igitur in siccano & calefaciendo primi ordinis. Radices autem eius maximè viles sunt, inquit, & in cibo acceptæ crassos humores moderate secant, vt expuitionibus ex thorace idoneæ sint. Sed Dracontium ad hæc commodius est. Idem n. 2. de aliment. radicem Ari similiter vt Rapi ediat, ex aqua coctam, cum Sinapi aut aceto, oleoque ac garo: cū quibusdam item intritis, cum aliis, tum quæ ex caelo parantur.

Radix Ari, vt vult Tragus, eius maximè quod maculata habet folia, siue sicca, siue recens tusa, ac ad minùs drachmæ pondere sumpta, remedium est præsentissimum ac minime fallax aduersus venenum & pestem: quidam tantumdem adiiiciunt theriacæ. Succus herbæ expressus mensurâ cochlearis, aut maiore, porus, eadem habet facultates: quod si illi parum aceti admiscueris, quominus linguam vellicet efficit: Aron in puluerem redactum, ac interdum drachmæ pondere cum binis sacchari drachmis sumptum, suspensiosis prodest, crassam enim & lentam pituitam incidit, excretaiones iuuat, pulmonum & pectoris vitia purgat & ad rursim est maximè vtile: idè remedium stomachum phlegmate, & atra bile infectum purgat: radix Ari siue recens siue arida, tusa ac sumpta, mulieres à partu validè purgat, potèstque hoc pacto & iumentis purgandis exhiberi: eadem succus expressus & aqua destillata possunt. Tradunt etiam aquam Ari destillatam ramices sanare, singulis vicibus binis vnciis aut minore mensura potam: ad pestem ac anthracè vix præstantiorem ac salubriorem herbam noui, ac folia Ari recentia imposita: eadem siue arida, siue viridia, ad inueterata & putrida pedum vlcera faciunt: aqua Ari & succus, quævis vetera vulnera purgat sanâque. Ari folia cum radice in vino & oleo decocta, infestationibus calidis ficus sanant, & sedem procidentem retrahunt: nonnullæ mulierculæ folia Ari cateis vermiculis scaetibus imponunt, qui sit vt abactis vermicibus casei hac ratione à corruptione vindicari diutius durare possint.

Non desunt, inquit Matth. qui radicibus Ari Calzolari videntur ad accendos a suis mentis Paralitos, & voraces Lurcones, eorum puluerem delicatis epulis admiscuentes: nam vbi fauces oc-

Tom: II.

cupauerit, tam contumaci ardore afficit, ne posthac quicquam vorare queat, nisi bubulo caprillæ lacte diutius gargarizato, aut recenti butyro sensim deglutito. Abtergie Arum, attritum, aperit, incidit & prouocat. Decocta radix melle excepta, medetur pectoris morbis omnibus pituitosis, expectoratur enim valentissimè crassas lentasque excretaiones, idèoque asthmaticos maximè iuuat. Datur elixa, vel seuientibus cineribus tosta, vtiliter rursus, ex amygdalino oleo. Idque bellè quoque præstat lac potum, in quo radix ipsa fuerit incocta. Illinitur eadem, aqua prius elixa, epiphoris, singillatis, inflammatisque tonsillis, sabacea farina addita, & defruto subacta. Subigitur quoque oleo, & tumentibus hæmorrhoidibus cò nocte illinitur: Radix nec is exedentia & contumacia vlcera curat, quemadmodum & narium polypum (omnia vlcera succus, Plin.) folia ambusta sanant. Dantur vtiliter seminis drachmæ duæ ad menses educendos, & secundas pellendas ex vino. Noltrates mulieres ex Ari radicibus stillaticas aquas ad fucum parant, quas ad faciem erugendam illustrandamque magnis laudibus effertur. Id quod etiam efficaciter præstat insolutus radicum succus, cerussæ speciem referens, quem Gerfa vulgò nominant, is siquidem mitum in modum carni splendorem, & candorem conciliat.

Nunc quid Porta importet videamus: Aron folia distincta maculis habet, & honestantium Lunæ macularum imaginè. Dantur vtiliter seminum drachmæ duæ ad ciendos menses. In arò figacis naturæ artificio multiplici membrana munitus foetus. Partus omnium animalium extrahit, naturæ ostio circumlitum (idem Plinius,) & seminis vel radicis drachmæ duæ in vini cyathis duobus sufficiunt, si à partu non purgator, ad secundas trahendas. Effigies Ari fructus ibidem. Calculosis confert (Io. de Mont. expert.) Ari herbæ & radicis contrusæ succus cum vini cochlearibus tribus, quinquies ieiuno ventriculo assumptus.

Pater autem ex hæcenus dictis falsum esse, quod scribit Fallop. tract. de med. purg. simpl. dicens: Neuter Dracunculus, scilicet nec Aron, nec alter, qui nostris Serpentaria dicitur, est purgatorius, quamuis secundum opinionem Metues purgèt. Sed vtrūque sit non sunt in vsu. Sed liceat hic subiungere, quod Odor. verū esse contendit. Vrsum, inquit, tempore suilabuli nihil edere certum est: quippe quodd neque exeat: & captus ventre intestinoque inani videatur. Narrant eius intestinum, per inediam ita conuenire, vt ad ductum propè cohæreat: Itaque Vrsum latebrâ egressum, priusquam herbam Arum dictam deglutiat, ut intestinum laxetur, & hiet.

Fallop. not.

ARVM BYZANTINVM.

Cum ante aliquot annos huius Ari tuber cum aliis tubetibus bulbisque Constantinopoli allatis, Viennæ acciperem, inquit Clusius, herebam, vtrum ad Ari, an Arisari genus referrem: deinde cum folia profectè cæpit, primis duobus annis pro Arisario latifolio habui, ducente me in eam sententiam foliorum quadâ similitudine. Nam ea conspiciebam satis ad Arisarii latifolii folia accedentia, nec valde mucronata, sed potius orbiculatam figuram referentia: nec radicem valdè dissimilem. Verum postquam ea augeri cæpit, digitalem longitudinem adqui-

Descriptio

ex Adu. vel potius Matthioli, & iconem Clusii poni sub vno titulo, ita vt sint vnius plantæ duæ icones. C. Bauh. Phyt. Arisarum Dioscor. Aris Plinio. Arisarum. latifolium maius, Arisarum latifolium alterum Clusii hist. Hisp. quod foliis est applieribus, mollioribus. Arisarum 2. latifolium: Arisarum latifolium primum Clusii. Arisarum latifolium Clusii, num idem cum Narbonensi Lob. Obi. Idem apud Matth. Arisarum Martioli. Dracunculus alter, sicut Flexicophyllos Cordi. Cordi Dracunculus nobis diuersus est ab Arisaro Matth. & est Arum Martioli, de quo capite de Aro.

An Celsus. Aro paruum quod in locis asperis nascitur, & inter saxa plurimum in monte Sancti Iuliani prope Pisas: &c.

Arisarum latifolium in collibus Lusitanie frequens salebrosus & lapidoso solo, in sepibus & iuxta vias: vbi Nouembri & Decembri floribus suis prædicitur eruebam, inquit Clusius, atque etiam nonnullis Beturiæ locis solo fecundo & pingui, secundum publicas vias & hortorum ageres, vbi Ianuario & Februario.

Arisari herba, autore Diosc. longè maioris est acrimonie, quam Arum. Vnde imposita nomas sistit. Collyria item ex ipsa sunt ad fistulas. Corrupte eadem indita cuiusvis animalis pudendum. Medetur vtraque [Aris Plinii] vlceribus manantibus. Item ambustis ac fistulis, collyrio immissa. No. nas sistit decocta folia in aqua, & postea trita rosacco addito. Sed vnum miraculum ingens cõtracto genitali, cuiusq; semipini sexus animal in perniciem agi. Amatus addit, multos tanquam pretiosissimi non secrete apud Germanos inferiores contra pestis contagia vti, quod satis mirari non potest Clusius, quandoquidem eius tempore toti Belgio fuerit incognitum.

ARISARVM ANGUSTIFOLIUM.



Folia huius longa sunt, & angusta, instar ferè Plantaginis angustifoliae foliorum, viridia, splendentia, quina, aut sena, post que flos seu cucullus longior & mucronatus, retrorsum inflexus & albicans prodit, è cuius rima oblongus veluti vermis exilit, spithamæ interdum longitudine, indic-

xus, coloris aut purpureascentis, aut ex purpureo virescentis, non ille quidem obrutus extima parte, sed mucronatus: flos, autem, racemi instar confertus, albus (non ruber, vt quidam; qui non obseruarunt, prodidit) vix terrâ emergens suo tempore subsequitur.

Huius picturam Matthioli, sub titulo Arisari alterius exhibet, non quòd prober (non enim verum putat) sed vt de hoc aliorum etiam sit iudi-

Tonn. II.

cium, Lonic. Diosc. *αἰσινέρι*: Hisp. *Frayllos yeruas*, id est Fraterculos: *Μοναχόθεν*, vulgò genitale Monachorum. *Cast. Durant*. Pseudoarifarum. *Clas. Hisp.* Arisarum alterum & Arisarum angustifolium. *Gesner. de hortis*, Arisarum. *Anguill. epist. l. p. 176.* Arisarum foliis angustis. *Lobel.* Arisarum angustifolium cum fructu racemoso albo & corniculo purpureascente. Icon. Pl. p. 559. Arisarum Angustifolium. C. Bauh. Phyt. Arisarum 4. angustifolium. Idem apud Martioli. *Celsus.* Arisarum, corniculo cum sua theca purpureo.

Lobel. in hortis Belgicis, Gallis, & Anglis colitur. In Ericetis & Filicetis Liguriæ præuenit. Anguillarius Matthioli Patavio aluit, qui testatur est plurimum nasci in agro Romano: Hinc confirmatur quod Celsus pinus scribit, inter sepes non longè ab urbe Roma inueniri. Clusius (pote nascens, vt ego qui sicum solum habeo foliis, quod Cortasus Patavii communicaui,) non vidit, sed delatum in hortis aluit, vbi florere Verebat Iulio & Augusto sine foliis fructum proferre. Vix magis est latifolio Arisaro, neque tanta cura indiget.

Locus & tempus.

DRACONTIVM SIVE DRACUNCVLVS
Veteribus & in genere.

CAP. XXX.

Δρακοντίνα, γράδαν (inquit Diosc.) aliis Aro, aliis Itaron, aliis Airon, alii Hieracium, [*αἰσινέρι*] aliis Biron, aliis Hamnagion, aliis Cypreus, Romanis Colubra, aliis Mauraria, aliis Singingalios: Caudem habet leuem, rectum, bicubitale, baculi crassitudine, varium colore, vt Draconi similis sit, purpureis maculis abunde respersus. Folia fert Lapathi figura inter se implicata. Fructus producit in summo caule racemosum, cinerei primùm coloris, vbi verò maturuit crocei ac punicei. Radicem habet magnam, retundam, albam, cortice tenui obductam.

De minore verò Dioscor. sequentia prodidit: *δρακοντίον*, Dracunculus (alter Marcell. Dracuntium minus Hernol.) folia habet: Hederae figuræ, magna, maculas albas habentia, caulem rectum, bicubitalem, varium, anguem referentem, purpureis maculis respersum, crassitudinis baculi: [quæ de caule hic posita, superflua sunt. Celsus.] fructus in summo racemosus, colore primùm quidem herbaceo, maturus autem croceus, gustum mordens. Radix quodammodò rotunda est, bulbi speciem referens, Aro similis, corticem habens tenuem.

Plinius; qui Arum cum Dracontio confundit; plura eius genera facit. Nec sanè caret difficultate, ni quoque confusione scatur, quod spatium Aëtius de Dracontio prodidit.

Dissonant aliquantum in hoc genere Scriptores. Alii Dracunculum ab Aro separant, Alii idem existimant: Theophrastus Aro putauit genus esse sub quo species plures continentur: Dioscor. quatuor videtur fecisse genera: *Dracunculus minor*, *Dracunculus r. arum*, *Arisarum*: Serpentariam sunt qui vocent: Est & herba apud Hippocratem Ophis vocata cuius semen mulcibribus medicinis vtile dicit. Quæ an eadem sit cum Dracontio satis non constat. Idem Hippocr. Candidam radicem cum nominat Dracontii radicem, vt Gal. vult, intelligis. Galenus, Paulus, Apuleius, Serapio, non nouerunt alterum & mi-

Vau 3

norem Dracunculum. Ac credit Marcell. vnum tantum à Dioscorid. traditum, quamvis in cunctis & antiquis. Græcorum codicibus vtrumque eius caput legatur. Nos vnum tantum Dracunculum nouimus & qualem exceptis foliis Diosc. in vtroque capite describit: nouimus & Aron. Quum Plinius triplex Dracontium sibi demonstratum esse dicat, Galenus autem vnum tantum norit, idque Aro simile videtur Cornario in Diosc. supposititium esse alterum caput, quod Dracunculum maiorem describit, ideo quo ipsum hoc loco exemit. Nam omnino de eodem eadem traduntur, sed diuersis verbis, ut ex alio Scriptore id caput adscriptum esse appareat. Multi apud omnes tandem momenti sit, quod ut Lugd. refert, in vetustissimis Latinis codicibus, vnicum duntaxat habeatur Dracunculi caput, alterius vestigium nullum.

Dracunculus vnum
Diosc. sup-
posititium.

Dracontia duo, præter tertium, quod in aquatilibus locis gignitur, facit Dodon. maius & minus, & pro minore, quod non conuenit, Ari figuram proponit.

Apuleius Dracontion Dracontem appellat, & multa eius peregrina adfert nomina, quæ an maiori vel minori aut vtrique conueniant, non explicatur: ut Pythonion, Aesclepias, Anchomanes, Sauchromaton, aut Saucromaton, Therion, Schoenos, Dorcadion, Thyphonion, Crocodilion, Theriophonon, Eminion.

Alterum caput, Dracontii maioris nomine inscriptum, quod merito à nonnullis inter Dioscor. nota repositum est, tanquam legitimum agnouerunt, Oribasius, Marcellus, Matthiolus & Amatus Lusitanus; ac illud quidem priore loco collocant, hoc verò posteriore. Ego verò [Anton. Sarrac.] cum Serapione illud alterum, quauis in codicibus nonnullis occurreret, cōsulcō prætermitti, tanquam supposititium, & ex Crateo, aliusue fortasse cuiuspiam scriptis perperam contextui Diosc. adiectum: maxime cum in vtroque capite diuersas quidem vtrunque voces, & vnam tamen eandemque historiam animaduertem. Si etenim singula expendamus, vix aliud occurreret discrimen, quam quod Dracontii folia Diosc. hederæ comparat, ille quisquis sit, lapathum: Itemque colorem fructus à principio herbaceum agnoscit Diosc. [falsò enim in Aldino exemplari & apud Orib. χαλκωδον legitur, αὐτὸ τὸ χαλκωδόν] ille σπέρμα δὲ, hoc est cinneraceū. Sed fortasse Diosc. ad folii colorem, leuorem, firmitatemque: ille ad eiusdem longitudinem respexit. Cætera, siue descriptionem siue vires species, ferè consentiunt.

Porrò si duplex est Dracontium, quemadmodum Veteres testari videntur inscriptiones, maius inquam & minus: maius Dracontium id agnoscere possumus, quod in plerisque hortis visitur, Autoris nostri descriptioni aptè conueniens: minus verò, Aron passim circa sepes nasci solitum: Sic enim Serapio Dracontii duo constituit genera, vnum quod Dracontium simpliciter, alterum quod Aron appellaretur: ac idipsum innuere quoque visus est Theophr. dum tradidit Dracontii genus quoddam Aron appellari. Attamen quoniam cognatæ ac congeneres sunt hæ plantæ, ac viribus etiam iisdem præditæ, earum nomina nihil mirum apud Plinium & alios rei herbariæ Autores ferè omnes passim confundi: quod vel ante sua tempora factitatum testatus est ipse Plinius, lib. 24. cap. 16.

Δρακόντιον & δὲ ἀκοντίαν siue τὸ αὐτὸν Diosc. Lat. quibusdam Serpentaria, Dracontium & Colubrina: Arab. Luf. Alluf. Germ. Schlangenfraut.

Watterwurtz & Drachewurtz Belg. Speertworte, drachewortele / Gall. Serpenteau ou Serpentine. Ital. Dragantica, Serpentina: Hispan. Dragontia.

Nomen quidem Schlangenfraut (Serpentariæ) à figura sumptis: caulis enim glaber purpureisque resperis maculis, verticillorum facie corpus anguinum representat vel à cauda, quæ illi subtrita est & Draconis intorti modo, inquit Hermolaus.

Dracunculus maior & minor Dioscoridis in vmbrosis circa sepes & maceris gignitur. Colligitur dum maturefcit, & succus exprimitur siccatque in vmbra. Radix quoque mellebis (Hordeo maturefcente, Luna crescente Hermol.) eloræque particulatim concidi, & funiculo transfixa sicari in vmbra, atque ita recondi, solet.

Maior Diosc. Dracunculus excalefacit cum commixto vino. Elixix & tostus è melle in eclegma datur Orthopnoicis, tussientibus, ruptis, conuulsis, distillationibus pituitæ. In vino sumptus cupiditates ad Venerem mouet. Vlcera cacœthæ phagedanasque sanar subactis cum melle aut illitus: maxime si cum vite miscetur alba. Collyriis quoque vtuntur ex eo factis ad fistulas cum melle. Item ad partus eliciendos. Vitilignes cum melle abigit. Polypos in naribus & carcinomata omnium generū dissipat. Succus ipse oculorum medicamentis asciscitur: caligines, nubes, & albugines discutit: herba & radix grauidis, quæ recens conceperint, abortum offendet inferunt. Idem præstat triginta seminis granarum, vtiq; si bibantur in posca. Quidam succum infundere cum oleo aurium doli. Folia seu ipsantia imposuere vulneribus etiamnum cruentis, sicut in vino decocta peritiones habentibus. Eum qui folia manibus confriuerit feriti posse à serpentibus negant. Radicem quoque omnino habentem effollam animalia eadem fugiunt.

Expressus verò è minoris Dracunculi semine succus cum oleo infillatus, aurium dolorem mitigat: naribus etiam ex lana impositus, polypum abluunt: carcinomata illuc silit: triginta eius granarum, si in posca bibantur, abortus inferunt: odorem autem postquam flaccidi flores emarcuerunt, conceptus adhuc teneros enecare: radix excalefacit: orthopnoicis, ruptis, vultis, tussis, distillationibus, auxiliatur: humores peccoris excreta faciles reddit, siue cocta soltaque eum melle, aut per se edatur, siue farina eius ex melle delingatur: vrinam pellit, Venerem excitat, cum vino potus, Phagedanas vlcera, & quæ cacœthæ vocantur, vitis cum melle & Bryonia alba, expurgat, & ad cicatricem petducit: collyria ex ipso ad fistulas & eliciendos partus fieri solent: qui radice suas manus perfricauerunt, à Viperis feriti negantur: illita ex aceto vitilignes emaculat: folia recentibus vulneribus linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decoctus in vino peritionibus appositus prodest: cascus foliis inuolutus, à putredine defenditur. Succus radicis ad nubes, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctæ, ad sanorum vsum, pro oleo recipitur: in Gymnastis insulis, quæ Balceas vocantur, eodam radicem cum melle multo in conuiuiis placentarium loco offerunt.

Dracontium teste Galeno, quiddam Aro persimile obtinet tum foliis tum radice: cæterum illotum acrius, tum amarius: ac proinde calidiorum magis & tenuiorum partium: habet etiam leui-

leuiculam quandam adstrictionem: cetera ad eandem ferè cum commendat ad quæ Dioscorides: addens fructum valentiora esse non foliis tantum, sed & radice.

Idem Gal. 2. de Aliment. Dracunculi æque atque Ari radices bis ténne elixatas, iis interdum in cibo offerri tradit, quibus crassorum lentorumque humorum copia in pectore pulmonibûs ne congesta est. At Theophrast. lib. 7. hist. stirp. Dracontii radicem ad cibum ineptam ac prorsus medicamentosâ facultate præditam esse tradidit, hisce verbis: Radix Dracontii, & esui inepta & medicamentosa existit.

DRACUNCVLVS MAIOR VVLGARIS.



Dracunculo maiori profunde in terra depacta radix eic ferè orbiculata, volam implens, cuius lateribus parui bulbi plures, quibus se propagat, adnasci consueverunt, foris colore buceo, intus candido, sapore feruido: caulis vnicus, rectus, pollicaris & crassior, cubitos duos altus, miraculosa colubri tergora

affabrè mentiens, è runcis conuolutis constans: ipsa verò folia pediculis dodrantalibus fungosis donata, in segmenta digitata finduntur, læuore & splendore Ari, crassitie & colore pari: è quorum medio eluctatus caulis vix digiti minimi crassitudinem æquat, è cuius scapo vagina pedalis exit, colore foris herbaceo, intus in purpura rubente, è sinu pistillum promens nigrum. Ari pistillo maius, in mucronem acutiorem declinens: subsequitur fructus racemosus, granis per maturitatem rubentibus: Odor floris valdè foetidus.

Vtrumque (si Diis placet) Dracunculum Tridenti & Venetiis vidit Matth. Alterum quidem seu minorem & omnibus vulgarem, dicit esse foliis Hederaceis, albis quibusdam maculis conspersis. Nihil video similitudinis cum foliis Hederæ in Dracunculo maiori vulgari, quicquid dicat Matthioli, repetens Dioscor. verba pro te à se visa, idque suo more.

Amato addita est per Constantinum icon Dracunculi Fuchsi, non tamen existimo Amatam hunc tradere, quin puto necire quid scribat.

Scribit Anguill. Veteribus fuisse duo genera Dracunculi, ex Crateua additum Dioscoridi caput de maiore, quod non sit ex textu demendum vt adulterinum. Dracunculum hunc maiorem esse Serpentiariam nostram communem, nec hanc esse Dracunculum minorem Diosc. Videri Theophrast. de hac Serpentiaria communi loqui lib. 7. cap. 11.

Dracunculi seu Dracontii aut Serpentiaria Species duas statuit Gesner. hort. cuius vnam in appendice tradit, quam vocat Dracunculum minorem.

Dracontia, Serpentiaria maior quàm sit Diosc. Dracontium maius (aiunt Lob. & Pena) nullus inficias ibit. Nec vniuerso tractu Græco villa alia Serpentiaria &c. Nouellæ plantæ potuerunt Plinio persuadere plures vt constituerit species Dracunculi, miscerèq; Ari ac Arisari cognatas differentias, vt in Bechio. aliisque locis illi contigit. Nec alterius plantæ videtur geminata descriptio apud Diosc. sed ab alio quopiam, paulùm diuersè descripta.

Tabern. icon. Dracunculus minor. Klein Dracunculus aut Schlangenwurms.

Gerard. Angl. Dracontium maius, Great Dragons.

B. Bath. Phyt. Dracunculus. 2. polyphyllus, qui Diosc. maior videtur & Plinii. Apud Mart. idem.

Dracunculus maior apud Flandros & Gallos, Italosque, procerè crescit, inquit Amatus. Nos variis locis obseruauimus.

Testis est Lobelius in Anglia aquam è foliis Dracunculi stillatitiam cum aqua Dracunculi esculenti, grassante peste, in viâ esse ad sudores provocandos, si vtriusque ꝑss. cum Theriacæ ꝑss. sumatur. Dracontium calidum & siccum in secundo ordine esse dicit A. natus, & alium quoque tentare, idque experientia æquata. nã indicare, idèoque Manardum mids benè Messem taxare certum esse. Dracunculum vim habere aduersus serpentes scribit Io. Fabr. cuius rei argumento esse possit, caulis eius lruis, verticillor, maculis purpureis distinctus, ita vt angui similis videatur, quin & florem habere mirabilem, ori hianti exoræque linguæ similem, sicut & Aron. Reliquæ vires antè traditæ fuere.

Theophrast. Dracontia lru.

Diosc. gēminata descriptio.

Viros.

Manardus repreh.

DRACUNCVLVS AQUATICVS.



Non bulbo tam aliorum Dracunculorum Arique more, radicem habet; sed digitalis crassitudinis, prælongam, geniculatam; transactio situ limoso palustris locorum solo incubet, cui figitur & articuli demissa fibrarum sobole numerosa, botrychi seu cincinni instar. Folia ex iisdem ena-

Descripta

scuntur geniculis dodrantalibus hærentia, Hederaceis paria, figura quoque similis, nullis peramburum angulis, in acumen desinentia, polita, venosa: in folii sinu, quod summo cauli innascitur, racemus comprehenditur, ei similis quem Aron profert.

Bellon. Ob. lib. 1. cap. 18. Dracunculus folio hederæ. Apud Cordum in Dioscor. quidam ar-

Dracunculus aquaticus
Cm.

notat: Est ex alia species Dracunculi. Plinio wasser aron. Cordus in hist. lib. 1. c. 28. Dracunculus palustris. Fuchs. Icon. Dracunculus Plinii tertius, wasser Schlangenfraut. Matth. Epit. cum Camer. addit. Dracunculus aquaticus, Ital. *Serpentaria aquatica*: Germ. wasser natterwurz. Turn. Dracuncium tertium variis in locis Germ. prouenit, ubi vocatur Klein Schlangenfraut / in Anglia uero minime. Gesner. hort. Aron palustre Coldenb. Camer. Hort. Dracunculus aquaticus Plinii. Castor. Dur. Dracunculus aquaticus Italicus: *Serpentaria aquatica*. Dodon. Gall. Dracunculus palustris, quibusdam Arum palustre. Gall. *Serpentine d'eau ou aquatique*. Belg. Drakenwoort. Germ. wasser Schlangenfraut / wasser Drakenwurz / hist. Lat. in fol. p. 329. Perperam uero Hydropiperi rubens dicitur. Describitur istud Dracuncium à Plinio l. 24. c. 16. & tertia eius species est. Lob. & Pena Adv. Aquatica Anguina siue Dracunculus. Ic. plant. Dracunculus arandineae radice Plinij. Hist. Lugd. Herbarijs Dracunculus palustris, quem Arum palustre alij vocant. Gall. *Serpentaire d'eau ou aquatique*. Tabern. Ic. Dracuncium palustre, wasser Drakenwurz. Gerard. angl. Dracunculus aquaticus, wasser Drago.

C. Bauh. Phyt. Dracunculus 3. palustris, arandineae radice Plinij. Item apud Matth. Dracunculus aquaticus.

Locus & Tempus.

Dracunculum aquaticum uidi anno 1595. mense Iunio in horto D. Sprengeri, postea habui Argentor. ex plantis necis D. Aggerii. Fr. etiam C. Bauh. misit pulchram plantam uiccam, quam accepit Hamburgo, nascitur uirginosis palustribusque locis, & in ipsis paludibus ac pigris camporum riualis: solo macro & putrido maxime gignitur: pingui uero & lutofo nondum mihi uisa est nasci: Cordus. Iuxta riualos & labentes aquas frigidarum & calidarum regionum, ut in Belgio, Northmannia, Apuleia, & Hispania Granata, sponte emergere asserēbāt nobis, qui in hortos suos transplantarunt: Lobelius.

Vires

Faculas huius Dracuncii aquatici, aliorum, atque ipsius Ari similis est, sed minus potens, minusque rificax uidetur, Dodonæo & Matth. in Epitom. autoribus.

COLOCASIA.

CAP. XXXI.

Descrip.



Radix tuberosa duplex, altera alteri imposita intercedere ceruice, ut lagenam imitari videatur, alba, vesca, fibris adnatis se propagans; *Alia* tenuior, quatuordecima, Nymphaea formam ligura & magnitudine, longis uermis laboribus albis, similiter donata, crassa

lenia, sed aucta parte nerui obliqui in margines excurrunt crassiusculi, à neruo per longum discursante producti, quos uenulae intercedunt vndatim, pediculus autem crassus non extremo folii, sed aliquot digitos integro folio inferitur.

Meminit huius Theophrastus lib. 4. cap. 10. de plantarum historia, ubi ita scribit. Faba Aegyptia in paludibus, stagnisque exit. Caulis eius, qui longissimus, quaterna cubita perficit: crassitudo digitalis est, similis calamo molli, non geniculato. Rimas intrinsecus habet tendentes per totum, lili modo. Caput in cacumine orbiculatum, vesprium fauo non absimile. Inque singulis cellis singulae fabae continentur, paulo super id eminentes, multitudine plurimum tendens. Flos papauere duplo maior colore roseus in plenum caput. Super aquam folia ad singulas fabas amplexa exeunt. Fabam quamque conterenti amarum illud, ex quo pilula fit, inflexum patescit. Fructus ita se habet. Radix illi crassissima, harundine plenior, rimas similiter atque caulis habens: manditur & cruda, & elixa, & assa: eoque cibo, qui incolunt paludes, vtuntur. Nascitur itaque sponte vel plurima, ceterum & seritur in limo paleis largè admixtis, ut descendat, in eorruptaque maneat sicque fabera faciunt. Si autem seinel apprehenderit, perpetuo manet. Radix enim valida est, nec procul harundinum stirpibus, verum spinis subhorrens. Quamobrem eam Crocodilus refugit, ne occurrens oculo offendatur, quoniam acute non videt. Nascitur haec etiam in Syria, Ciliciæque. *hastamus Theophrastus.*

Hanc amplissima emittere folia tradidit Plinius libro 21. cap. 15. ubi sic inquit. In Aegypto nobilissima est Colocasias, quam Cyamon vocant aliqui. Hanc à Nilo metunt: caule cum coctus est araneo in mandendo: thyrsos autem, qui in folia emicat, spectabilis: foliis latissimis, etiam si ad arbores comparatur, ad similitudinem eorum, quæ Personata in nostris annis vocantur. Adeoque Nili sui doribus gaudent, ut implexis Colocasiae foliis, in variam speciem vasorum potare gratissimum habeant. Scribitur iam haec in Italia. *haec Plinius.*

Aegyptia Faba [ut Galenus auctor est libro primo de alimentis] sicuti nostratem magnitudine longè præcellit, ita & naturam humidiores, magisque excrementitiam sortita est.

Colocasiam quæ Aegyptiis *Culcas*, nemo floribus vel fructibus vquam præditam vidit: unde semper multum miratus est Alpinus Dioscor. Aegyptiam Fabam flores atque fructus ferre, & eam item Colocasiam esse prodidisse.

Arum Aegyptium, Aegyptius hodierno die Colocasias missa, Camer. hort. Viennæ, in alterum annum egregie virebat, totaque planta acerrimi erat lapotis.

Fabam Aegyptiam Marth. eandem cum Colocasias vulgò dicta nostro seculo non dubitamus esse, quamuis Matth. duas esset diuersas plantas. In Faba eius Aegyptia flores & semina ad descriptionem picta esse asserimus, donec nobis aliquis ostendat plantam cum foliis Colocasiae vulgaris & cum similibus floribus & seminibus.

Arum Aegyptium Gesner. horti eruditiores quidam, ut Guilandinus & Marantha esse docent, quod aliqui super pro Colocasias habuerunt. Matthioli hanc Fabam Aegyptiam existimauit.

Ari speciem illam [inquit Marantha] quam Aegyptium Arum eruditores appellant: Colocasiam

casiam bona pars materię medicę Professorum esse omni asseueratione asfirmat, quę cū in Aegypto, nec non in Sicilia (vt audio) perfectissime crescat, omneque sui partes compleat: in Italia tamen nec semen, neque florem, neque etiam caulem vnquam [quauis diuersis locis cōstita à multis sit] vel certē raro proferre est visū: hinc effectum est, vt eos multi acriter damnarēt, qui illam esse Colocasiam contenderent: nisi hoc solum argumento, quod hæc planta caulem non proferat [quod non loci ratione, vitiōque, in quo hæc formatricem vim debilissimam habet, neque vterius quā ad folia extendenda extendi potest, sed suapte natura euenire existimabāt], quasi verō si caulem proferret, Fabā Aegyptiā dici debeat. Ergo hic rectē quidem [vt mea fert opinio] illos reprehendunt, vt qui in errorem delabantur: sed non rectā reprehensione vtuntur: quando illa planta inter Ari species recensenda omnino sit: quod ex foliis & flore, quem nobis licuit videre, à Luca Ghino viro nobis inprimis charissimo, dum viueret, missum: qui, præter magnitudinem, nullam ab Ari flore dissimilitudinem habebat.

Anguillar. qui Colocasiam nostram asserit Fabam Aegyptiam Theophrasti: eorum argumenta refutat qui aliter sentiunt: ridet aliquos qui attribuunt semini quę Dioscorides radici &c. De radice spinosa aliter scribit quā Bellonius. Obscuius verba hæc sunt: Colocasia in Creta & in Alexandria proueniens nominatur etiam Lotus & Fabā Aegyptiā. Perquisiuius cur Veteres vocarint Fabam Aegyptiam cū nullas Fabas ferat. Erroris occasionem inuenimus, nempe quod Herodotus de duabus plantis locutus sit ad Nilum prouenientibus, quarum vna radicem habebat rotundam quę erat Colocasia: Altera in capite quodam ferebat quiddam Oliuarū nucleis simile: reliqui post eum authores alter alterius vestigia sequentes ad arbitrium deinde descripserunt. Nam quod Theophrast. radicem illi (spinosam tribuit, rem aliter se habere experientia ipsa docet. Diolc. Fabam Aegyptiam describens Theophrastum fere fecutus est, & vtrumque interpretatur Plinius. Facessant, inquit, Clusius qui Colocasiam siue Fabam Aegyptiam esse negant, quia flore & fructu caret, sed Arum Aegyptium esse cerebrosū & pertinaciter contendunt. Item apud Garciam: In hanc Lusitanis vocatur planta quædam amplissimis foliis, etsi nonnulli Arum Aegyptium esse censent, Colocasia potius nobis videtur.

Lobel. & Pena Adu. Fabam Græcam & Aegyptiam apprime olim innotuisse Theophrasto & Dioscoridæ certum est. An vero sit ista quam Commentator sibi persuasit, fides sit penes Bizantium picturam, quam subannant aliqui. Nos flores (legendum folia) & bulbi, Arum species esse monuerunt. Et vtiā otium non defuisset Matthiolo, quum illi ostēderetur vera Colocasia, nā ille accuratius stirpem verbis expressisset. Lobel. Obs. figuram habet hoc titulo, Colocasia siue Fabæ Aegyptiæ species, Arum Aegyptium Dodon. & Recentiorum, Hisp. Mant. de nostra Sennora, Icon. Pl. p. 59. Teur. 706.

Hist. Lugd. Lotus Aegyptia Dodon. Bry fractes Ind. Orient. par. 4. Icon pag. 15. Talasse, Arum Aegyptium Culc.

Dodon. in fol. pag. 326. & pag. 563. eam sub Arum Aegyptio & sub Loto Aegyptia pingit & describit, inquit C. Bauh. apud Matthiolum.

In Creta ad magnos riuos, copiosam reperit

Bellon. Colocasiam spontē sine culturā prouenientem. Aegyptii quotidie ferē vescunturradice Colocasię, quę per totam Aegyptum magni est reditus: nihil venalius, inter Gazaro & Rama: inuenit idem Colocasiā abundantem plantitiem quam aquā ex puteo rigabant. Et hæc quidem sparsim traduntur à Bellonio. Apud Aegyptios non secus quā nostri (inquit Alpinus) Rapis, agri Colocasis pleni, ibi spectantur. Belgio satam hiemis scuitia deleuit. Frequens est multis Lusitaniz locis circa riuos, ex Africa primum edelata: vidit Clusius etiam omnium maximam & amplissimis foliis Hispali in horto arcis Regiæ, vbique ramen & florem & fructum ferre negabant. Rauuolf. qui illam toto anno venalem Tripoli Syrię conspexit, vt quā incolæ frequenter vescantur, & tanta copiā in Halepoli asserit, vt eius radice, non minor numerus hominum alatur, quā in Germania rapis, licet illis, & flauā pastinacā non carcant: addit in riuulis spontē nascentem obseruasse, florem autem vel fructum nunquam vidisse. Nullis etiam bladiis florem posse prolici tradit Lobelius. Colocasia est nobis in horto Ill. E. C. Montheilg. Stutgardia delata, quā facile se propagat, vtrumque hinc reponenda.


Aegyptii Culcas radices in iure coctas atque altis multis modis in cibis paratas assidue edunt, & eas tum crudas, tum coctas libentiss. Vires & Vius
ri indulgentes mandunt, quia putant tum semen multum gignere, tum libidinem prauialidē excitare, Alpinus. Per Lusitaniam valde à mancipiis Aethiopicis expetitur, eadē crudā & coctā vescuntur.

Aquam cocturans planta.

Apud Siberos nationem Americā inuenitur radix quę supra terram emittens, amplissima habet folia, in quibus aqua continetur, non secus ac si in vase aliquo asseruaretur, vt emanare facile non possit. Quin & ex radice liquidum sepe cantharum aquę expressit, Benzo.

In regione Saboris reperit Vlr. Schmidel. de nauig. Amer. nō. paucis in locis radicē extra terrā protuberantem, quā magna lata gerebat folia, aquā referta, quam continent in tempus nec facile effluit. Singulę radices ferē mēsuras dimidiatas continebant.

HETICH THEVETI. CAP. XXXII.



Hetich theveti

Hetich theveti auctore Theophrasto de Gallia Antartica c. 53. duo reperiuntur genera: alterum cocturā flauescit, mali Cydonii instar; alterum vērō albescit: vtrique filia sunt Maluaceæ: semen vērō nullū fert: quo fit vt syluestres isti Americani in taleolas diffusi

sis radicib. & terræ denuō commissis propagent:

Americano solo frequentes sunt hæc radices. Non aliud ferè Americanis in vsum cibarium eedit: itaque æquè vulgaris illis ac nobis panis.

Oetum Pl.
nii.
Vingum.

Hetich Americum, Oetum esse Plinii lib. 2. c. 15. putat Dalech. apud Hist. Lugd. pro quo apud Theoph. lib. 1. hist. cap. 11. mendolè legit Vingum. Sic Plinius: Mandunt & Oetum, cui pauca folia minimaque, verum radix magna. Theophr. verò Folia eius magna, germen breue, & (non ut Gaea pusillum) radix longa, sapore præstanti cibo idonea, quæ pro fructu colligitur, cum amnis in alueum redierit, eoque Deorum aras coronant. Quæ autem Theophr. folia ampla, Plinius pauca & minima dixit.

Robert. Const. in Theoph. vocem Hetich corruptam dicit à voce oïtæ Theophr. ac depingi in America Obliquo modo describit Theophr.

C. Bauh. Phyt. Rapum Americanum.


FAALIM THEVETI HELENIO
foliis similis.
CAP. XXXIII.



uerfantur. Huius herbæ experimentum se vidisse ait in duobus commoris à serpente, partim in terra degente, quâ illic Alefab vocant: cuius morsus adeò lethalis est, ut nisi statim succus huius herbæ admoueat, necesse sit hominem interire. Hist. Lugd. faalum Thevet.

BATATAS. CAP. XXXIV.

TRia huius plantæ sunt genera, quæ Batiam peragrans obseruabam (inquit Clusius hist. poster.) colore externo inter se differentia, etiam gustus suauitate: nam aut cortex externus quodammodo rubescebat, siue purpurascens erat [& hoc genus præstantissimum indicabatur,] aut pallescebat, aut albus erat: singula tamen genera albam interiùs carnem habebant. Producent autem illa Cucumeris siluestris modo sarmenca humi diffusa, satis crassa, succulenta, læuia, quibus inhærent folia utunque carnosa, ex viridi canescentia, Ari foliis, seu potius Spinachii, haud dissimilia: si florem an fructum ferat, è nemine intelligere potui; radice autem sit satio: ea plerumque dodrantalis est, grandis raphani nonnunquam amplitudine, nam memini Londini me inuente



parte obrufiores, deinde sursum progrediendo graciliores.

In Hispania [Indiæ] insula, ut Cardan. scribit, Batata folio est Hedere, radix admodum utilis fegitis loco: crescit altitudine Erythrodani.

Anton. Pigafetta in lib. Nauig. Battades in Brasiliæ insula.

M. Fumei in Hist. gen. Ind. Occid. Batatas radices dulces.

Ut Lobelio Obliquo Clusius testis est, Batatas Hispanorum, siue Camotes, aut Amotes, foliis est scabris, & reptantibus, multis, Cumeris asinini æmulis. Plant. Ic. p. 647. Batata Hispanorum, Camotes siue Amotes.

Quidam Ignam putant esse Theoph. lib. 1. hist. cap. 11. in appendix siue appendix quorum, non, ut apud Plinium legitur, Aracos. Satis conuenit hist. radicis Theoph. nisi Theophrastus scriberet folium non habere, neque foliis quicquam simile.

An Vereribus, inquit idem Lobelius, fuerit cognita hæc planta Clusius hæretac. propterea nullum nomen Græcum aut Latinum addit: Hispani Batatas, Camotes etiam nonnulli, aut Amotes, quidam etiam Aies vocant, tamen non nihil, ut aiunt, inter se differant, sitque Batatas radix longè tenerior & suauior, Qui plura de hac radice vult consular Scaligeri exerc. 181.

Nunc adeò frequentes sunt in Hispaniis, inquit Manardus apud Clusium, ut singulis annis è Velaz-Malaga decem aut duodecim longæ naues, quas Carauellas appellant, iis onustæ Hispalim inuehantur. Seruntur verò aut minores integræ, aut maiores in frusta concisæ, solo bene culto, & in suos sulcos ducto, feliciterque nascuntur: nā intra octauum mensem in eam crassitudinem excresecunt, ut edi, & in alios vsus parari possint. Ipso verò Clusio auctore spontè nascitur in nouo Orbe, vicinisque Insulis, vnde primum in Hispaniam delatam ferunt: nunc in multis Batiaz maritimis locis sentur, vel integra, vel in taleolas secta, principatum autem obinet Malacæ nata, quæ & Gades & Hispalim, imò Vlyssiponem etiam vsque deferri solet. Habuit is aliquoties in Belgio satis recentes, sed quæ germinare noluerint, imò breui corruptæ sint, trigidior nimirum regione. Sed & quas Londini eruebat, diuturniore morâ [nam Viennam deferre volebat] antequam telluri comittere posset, corruptæ sunt.

Bata-

vasiam bona pars materiz medicæ Professorum esse omni assueuatione affirmat, quæ cum in Aegypto, nec non in Sicilia (vt audio) perfectissime crescat, omnésque sui partes compleat: in Italia tamen neque semen, neque florem, neque etiam caulem vnquam [quauis diuersis locis cõsita à multis sit] vel certe rard proferre est visã: hinc effectum est, vt eos multi acriter damnarët, qui illam esse Colocasiam contenderent: nisi hoc solum argumento, quod hæc planta caulem non proferat [quod non loci ratione, vitiõque, in quo hæc for. matricem vim debilissimam habet, neque vterius quàm ad folia edenda extendi potest, sed suapte natura euenire existimabãt], quasi verò si caulem proferret, Fabam Aegyptiã dici debeat. Ergo hi rectè quidem [vt mea fert opinio] illos reprehendunt, vt qui in errorem delabuntur: sed non rectè reprehensione vtuntur: quando illa planta inter Ari species recensenda omnino sit: quod ex foliis & flore, quem nobis licuit videre, à Luca Ghino viro nobis inprimis charissimo, dum viueret, missum: qui, præter magnitudinem, nullam ab Ari flore dissimilitudinem habebat.

Anguillar. qui Colocasiam nostram asserit Fabam Aegyptiam Theophrastæcorum argumenta refutat qui aliter sentiunt: rider aliquos qui attribunt semini quæ Dioscorides radici &c. De radice spinosa aliter scribit quàm Bellonius. Obliuiscens verba hæc sunt: Colocasia in Creta & in Alexandria proueniens nominatur etiam Lotus & Fabæ Aegyptiæ. Perquisiuius cur Veteres vocant Fabam Aegyptiam cum nullas Fabas ferat. Erroris occasionem inuenimus, nempe quod Herodorus de duabus plantis locutus sit ad Nilum prouenientibus, quarum vna radicem habebat rotundam quæ erat Colocasia: Altera in capite quodam ferebat quiddam Oliuarũ nucleis similitereliqui post eum authores alter alterius veltigia sequentes ad arbitrium deinde descriperunt. Nam quod Theophrast. radicem illi spinosam tribuit, rem aliter se habere experientia ipsa docet. Diosc. Fabam Aegyptiam describens Theophrastum ferè secutus est, & vtrumque interpretatur Plinius. Facessant, inquit, Clusius qui Colocasiam siue Fabam Aegyptiam esse negant, quia flore & fructu caret, sed Arum Aegyptium esse cerebrosè & pertinaciter contendunt. Item apud Garciam: Inhame Lusitanis vocatur planta quædam amplissimis foliis, et si nonnulli Arum Aegyptium esse censcant, Colocasia potius nobis videtur.

Lobel. & Pena Adu. Fabam Græcam & Aegyptiam apprimè olim innotuisse Theophrasto & Dioscoridi certum est. An vero sit ista quam Commentator sibi persuasit, fides sit penes Bizantiam picturam, quam subannant aliqui. Nos flores (legendum folia) & bulbi, Aronis speciem esse monuerunt. Et vti nam orium non defuisset Matthiolo, quum illi ostendebatur vera Colocasia, nã ille accuratius stirpem verbis expressisset. Lobel. Obliuiscens figuram habet hoc titulo, Colocasia siue Fabæ Aegyptiæ species, Arum Aegyptium Dodon. & Recentiorum, Hisp. *Manta de nuestra Señora*, Icon. Pl. p. 59. Teut. 706.

Hist. Lugd. Lotus Aegyptia Dodon. Brytates Ind. Orient. par. 4. Icon pag. 15. *Talasse*; Arum Aegyptium *Cels.*

Dodon. in fol. pag. 326. & pag. 563. eam sub Aro Aegyptio & sub Loto Aegyptia pingit & describit, inquit C. Bauh. apud Matthiolum.

In Creta ad magnos riuos copiosam reperit

Bellon. Colocasiam spontè sine culturâ prouenientem. Aegyptii quotidie ferè vescuntur radice Colocasiæ, quæ per totam Aegyptum magni est reditus: nihil venalius, inter Gazaro & Rama: inuenit idem Colocasiam abundantem plantitum quam aqua ex puteo rigabant. Et hæc quidem sparsim traduntur à Bellonio. Apud Aegyptios non secus quàm nostri (inquit Alpinus) Rapis, agri Colocasiis pleni, ibi spectantur. Belgio satam hiemis seuitia deleuit. Frequens est multis Lusitaniz locis circa riuos, ex Africa primum ed delata, vidit Clusius etiam omnium maximam & amplissimis foliis Hispali in horro arcis Regiæ, vbique tamen & florem & fructum ferre negabant. Rauuvsolf. qui illam toto anno venalem Tripoli Syriæ conspexit, vt quæ incolæ frequenter vescantur, & tanta copiâ in Halepoli asserit, vt eius radice, non minor numerus hominum alatur, quàm in Germania rapis, licet illis, & flauâ pastinacâ non careant: addit in riuis spontè nascentem obseruasse, florem autem vel fructum nunquam vidisse. Nullis etiam bladiis florem posse prolici tradit Lobelius. Colocasia est nobis in horro Ill. E. C. Montbelg. Sturgardiâ delata, quæ facilè se propagat, verum Hieme reponenda.

Aegyptii Culdas radices in iure coctas atque aliis multis modis in cibis paratas assidue edunt, Vires & & eas tum crudas, tum coctas libentil. Vires & Vires
ri indulgentes mandant, quia putant tum semen multum gignerè, tum libidinem præualidè excitare, Alpinus. Per Lusitaniam valde à mancipiis Aethiopiibus expetitur, eaque crudâ & coctâ vescantur.

Aquam conseruans planta.

Apud Siberos nationem Americanâ inuenitur radix quæ supra terram eminens, amplissima habet folia, in quibus aqua continetur, non secus ac si in vase aliquo asseruaretur, vt emanare facile non possit. Quin & ex radice dimidium sæpè cantharum aquæ expressit, Benzo.

In regione Saboris reperit Vlr. Schmidel. de nauig. Amer. nò. paucis in locis radicè extra terrâ protuberantem, quæ magna lata gerebat folia, aqua referta, quam continent in tempus nec facile effluit. Singulæ radices singulas fere mensuras dimidiatas continebant.

HETICH THEVETI. CAP. XXXII.



Hetich radicis scilicet autore Theueto de Gallia Antartica c. 53. duo reputantur genera: alterum cocturâ flauescit; mali Cydonii instar; alterum vero albescit: vtrique folia sunt Maluacea: semen vero nullū fert: quo fit vt syluestres isti Americani in taleolas discif

sis radicib. & terræ denuè commissis propagent:

Americano solo frequentes sunt hæc radices. Non aliud ferè Americanis in vsum cibarium cedit: itaque æquè vulgaris illis ac nobis panis.

Ocimum Pili.
m.
Vingum.

Hetich Americum, Ocimum esse Plinius lib. 2. c. 15. putat Dalech. apud Hist. Lugd. pro quo apud Theoph. lib. 1. hist. cap. 11. mendosè legit Vingum. Sic Plinius: Mandunt & Ocimum, cui pauca folia minimaque, verum radix magna. Theophr. verò Folia eius magna, germin breue, *et* non ut Gaza pusillum] radix longa, sapore præstanti cibo idonea, quæ pro fructu colligitur, cum amnis in alueum redierit, eoque Deorum aras coronant. Quæ autem Theophr. folia ampla, Plinius pauca & minima dixit.

Robert. Conft. in Theophr. vocem *Hetich* corruptam dicit à voce *etich* Theophr. ac depingi in Americæ Obs. quomodo describit Theophr. C. Bauh. Phyt. Rapum Americanum.

FAALIM THEVETI HELENIO

foliis similis.


CAP. XXXIII.



uerfantur. Huius herbæ experimentum se vidisse ait in duobus commoris à serpente, partim in terra degente, quâ illic *Alefah* vocant: cuius morsus adeò lethalis est, ut nisi statim succus huius herbæ admoveatur necesse sit hominem interire. Hist. Lugd. Faalim Theveti.

BATATAS. CAP. XXXIV.

TRia huius plantæ sunt genera, quæ Baticam peragrans obseruabam (inquit Clusius hist. poster.) colore externo inter se differentia, etiam gustus suauitate: nam aut cortex externus quodammodo rubescebat, siue purpurascens erat [& hoc genus præstantissimum indicabatur,] aut pallescebat, aut albus erat: singula tamen genera albam interiùs carnem habebant. Producent autem illa Cucumeris siluestris modo *sarmenta* humi diffusa, satis crassa: succulenta, læuia, quibus inhzrent folia vtrunque carnosa, ex viridi canescentia, Ari foliis, seu potius Spinachii, haud dissimilia: *florem* an *fructum* ferat, è nemine intelligere potui; *radice* autem sit latior: ea plerumque dodrantalis est, grandis raphani nonnunquam amplitudine, nam memini Londini me inuente



parte obtusiores, deinde sursum progrediendi graciliores.

In Hispania [Indiæ] insula, vt Cardan. scribit, Batata folio est Hedere, radix admodum vtilis segetis loco: crescit altitudine Etythrodani.

Anton. Pigafetta in lib. Nauig. *Bartades* in Brasiliæ insula.

M. Fumee in Hist. gen. Ind. Occiduz, Batatas radices dulces.

Vt Lobelio Obs. fidus Clusius testis est, Batatas Hispanorum, siue Camotes, aut Amotes, foliis est scabris, & reptantibus, multis, Cumeris asini æmulis. Plant. Ic. p. 647. Batata Hispanorum, Camotes siue Amotes.

Quidam Igname putant esse Theoph. lib. 1. hist. cap. 11. *τὸ ἀπὸ τοῦ ἰγνᾶμο*, non, vt apud Plinium legitur, Aracos. Satis conuenit hist. radicis Theoph. nisi Theophrastus scriberet folium non habere, neque foliis quicquam simile.

An Veteribus, inquit idem Lobelius, fuerit cognita hæc planta Clutius hæret ac propterea nullum nomen Græcum aut Latium addit: Hispani *Batatas*, *Camotes* etiam nonnulli, aut *amotes*, quidam etiam *Aies* vocant, tamen non nihil, vt aiunt, inter se differant, sitque *Batatas* radix longè tenerior & suauior. Qui plura de hac radice vult consular Scaligeri exerc. 181.

Nunc adeò frequentes sunt in Hispaniis, inquit Manardus apud Clusium, vt singulis annis è Veléz-Malaga decem aut duodecim longæ naues, quas *Carauellas* appellant, iis onustæ Hispani inuolantur. Seruntur verò aut minores integræ, aut maiores in frusta concisæ, solo bene culto, & in suos sulcos ducto, feliciterque nascuntur: nâ intra octauum mensem in eam crassitudinem crescunt, vt edi, & in alios vsus parari possint. Ipso verò Clutio auctore spontè nascitur in nouo Orbe, vicinisque Insulis, vnde primum in Hispaniam delatam ferunt: nunc in multis Baticæ maritimis locis feritur, vel integra, vel in talcolas scæta, principatum autem obtinet Malacæ nata, quæ & Gades & Hispani, imò Vlyssiponem etiam vsque deferri solet. Habuit is aliquoties in Belgio satis recentes, sed quæ germinare noluerunt, imò breui corruptæ sunt, frigidior enim nimirum regione. Sed & quas Londini cruebat, diuturniore morâ [nam Viennam deferre volebat] antequam telluri comittere posset, corruptæ sunt.

Bata-

Batatas in omnibus Indiæ provinciis admodum communes, cibum multi alimenti esse existimat Monardes, mediæque veluti esse substantiæ inter carnes & fructus, flatulentas tamen: sed assatæ flatus deponunt, præsertim si cum generoso aliquo vino edantur: ex iis etiam sunt Conferuz non minus gratæ, quam Cydoniorum carnes, morfelli, placentulæ, & alia edulia gratissimi saporis: idoneæ enim sunt ad omnis generis Conferuz conficiendæ, & edulia. Temperatæ sunt, & coctæ vel assæ ventrem emolliunt: at crudæ esui non sunt aptæ, quoniam admodum flatulentæ sunt, difficilisque digestionis. Estur, teste Clusio, ab ipsis incolis, aut cruda, aut cocta: nunc Hispanis etiam in deliciis, ob saporis gratiam & ténacitatem, præsertim si sub cineribus cocta, & exteriore tenello cortice repurgata, deinde in orbem concisa ex pauxillo vino, stillantisque rosarum liquoris & Sacchari momento edatur. Sunt qui ex oleo & aceto, & sale esstent: nec desunt qui radices recentes coctas & repurgatas Saccharo condiant, & in usum servent. Sed & radix nō cocta, dum corrumpi incipit, si cultro secetur, non secus rosam olet, quam ipsa Rhodiæ radix. Quocumque modo condiantur assæ vel elixæ, nulli crustulo, aut alio cuius edulio cedant dulcoratâ mollior, cuius aliquantō tenacior, quam tuberi bus aut Napis. Comeduntur & crudæ, viridis castaneæ guttum tum imitantes.

BATATIS AFFINIS IGNAME sive Inhame.

Lectori non ingratum fore existimat Clusius si Batatarum historiam, alterius cuiusdam crassæ radices descriptionem subiiceret, quandoquidem Indiæ Occidentalis & insularum quarundam incolis familiari in usu est.

Varia autem interdum est formæ radix illa, & *igname*, siue *Inhame* appellatione ex



D. Thomæ insulâ, sub Æquatore sitâ, non procul à provinciæ Manicongo continente, delata anno 1596. radices habuit, quarum nonnullæ pedalem aut ampliorem longitudinem æquabant, brachialem autem crassitudinem, vel etiam quarum diameter esset quatuor viciarum: pleræque dodrantalem longitudinem vix attingerent, nec earum diameter binas viciâs excederet: aliquot etiam breviores, sed crassas, & in aliquot quasi breves napos infimâ parte protuberantes, rectas omnes scabro & inæquali cortice, vt Aristolochiæ longæ legitimæ radices, & multis exiguis fibris sparsim nascentibus præditas: ipsa radices substantia alba, lenta, & succulenta est, atque veluti grumosa, tenera tamen, nec ingrati saporis, exiguo autem post momento nonnihil asperi &

acriusculi: assa verd, tenerior est castaneâ, & pyri instar, cui grumosa substantia, edulis. Qualem caulem, aut folia habeat, non intelligebat.

Extat figura apud Clusium in post. Hist. duplex, titulo Inhamc Lusitanorum, quarum minorem ponit Pl.

Icon. pag. 647. sub titulo *Ignames*, & ante eum Lobel. & Pena Aduers. de ea ita scribentes: Sifaro Anglico non parum accedere videntur Bartades seu *Ignames* radices, quæ in Insulis non procul nouo Orbe dissitis, suapte sponte oriuntur. *Phadæ* vernaculè tum indigenæ, tum Hispani illic vocant, quibus hæc in patina



& Veneris illicia frequenter veniunt: singuli bulbi, teretes, oblongi, Napum vtiique obrotum æquant, color pulvis illis foris, albus intus, sapor gratus valde & tener, quasi Milii delicatioris, aut Fabæ frese, coque gustu insulæ sunt nisi condiantur. Quæ de verbo ad verbum recitat Hist. Lugd. sub Batatis Clusio, neglecta interim Lobeli & Penæ Aduers. mentione.

Pet. Aluares Nauig. *Igname* radix ex qua fit panis. Munt. Colm. de Noua Africa, *Igname*.

Diui Thomæ insulanos eâ assâ & elixâ vesci Vires intelligebat Clusius, eisdemque rei gratiâ Lusitani quidam, qui multos isthuc cum viros, tum feminas & pueros emerant, vt Vlyssipone pro mancipiis venderent, istas radices in naues intulerat, in miserorum alimentum. Sale, aut aduersa aceto & oleo interdum eduntur, & vino perfunduntur, nonnunquam coctæ prunis.

Igname genus aliud.

Accipiam inquit Clusius h. post. à Wilhelmo Parduyi radicem cum præcedenti *igname* siue *Inhame*, ei nec formæ, nec colore, nec magnitudine dissimilem, quam *igname* etiam vocabat i. Lusitanus, qui illam ipsi dabat, licet aliud genus esse non inficiaretur: sed totius radices cortex magis inæqualis erat, & veluti quibusdam tuberculis obitus: à quibus tenues fibræ emergebant, præterea radix summo capite, paullo crassioribus durisque, & pedalis siue palmaris longitudinis, fibris, seu verius viticulis, magna ex parte spinosis, erat prædita. Nonnulli *Itam Per*.

Considerent lectores quantum differat à Manihot & Iucca de quibus mox.

A G E S.

CAP. XXXV.

Agiu species innumeræ sunt apud Hispaniolæ incolæ, quarum à foliis & floribus varietas dignoscitur: harum species vna dicitur

Agiu species.


GUANAGUA, hæc est intus forisque albida : alia *Guaragitei*, colorem habet violaceum foris, intus autem candidum, appellant alias *Ages Zaza-neus*, hi rubescunt foris, intus candescunt, alias *Squinetes*, intus forisque albidus sunt. Est *Tuma* : ubique violaceus. *Arrib* : si flavescit pelle carneque. Est alia dicta *Arrib mori* : ei, violacea, carne candida. *Aniguamar* cute violacea est, interius albescit. *Guacaratacca* pelle candescit, violascit carne. Sūt multa præterea, quæ nondum ad nos delata sunt. *Ages* colunt in insula Cuba. Magis pro ferculis aut fructibus videntur, quam ad usum conficiendi panis : ut nostri rapis, raphanis, tuberculis, Napis, Pastinacis. & huiusmodi rebus : Hanc *Agium* breuem Historiam Per. Martyr, lib. Ocean. pluribus in locis tradidit.

MANIHOT THEVETI, IVCCA
& Cassia.

Cap. XXXVI.

Descriptio

Cazabi.



Manihot.


Tucca.
panis.

etica cap. 14. sub Manihot, habet quædam de Arbore succo venenato, ex qua farina & panis fit, ut videre est sub Arbore farinifera succi venenari.

Leri hist. Amer. cap. 9. Manihot radix bona in farinam reducta & bene cocta, si aliter comedatur venenum est.

M. Fumeæ hist. gen. Indiar. Orient. lib. 1. c. 28. In Hispaniola parant panem ex Yuccæ radice, cuius venenatum succum exprimunt. Item lib. 2. c. 71.

Yucca in Insulis Cuba, Hayti, & aliis, cruda lethalis est, in Insula S. Marthæ, salubris, comedunt crudam, tostam & coctam.



Ex S. Dominici vrbe accepi [inquit Manard. ex veri. Clus.] folia herbæ ex qua *Casavi* fit. *Casavi* autem panis est, quo Indi tot sæculis vitam sustentarunt & hodiè etiam vescuntur nostri Hispani : fit verò ex verba ab Indis *Tucca* nuncupata : cuius descriptionem, vires & noxas pluribus prosequitur, ut & Gomara Histor. gen. cap. 71. similia propemodum cum Manardo de Yucca referens.

Communis insulæ Canariæ incolis pastus siue victus arborea radix quædam est [inquit Vesput.] quam in farinam satis bonam comminunt. & hanc radicem quidam eorum *Tucca*, alii verò, *Ignam* vocitant.

Cæterum multa dicuntur esse Iuccarum genera. Vnum altero saavius, æque aliud alio pretiosius est, quo Regulis edumum paratur. Sunt quibus veniantur nobiscis, sunt & quibus populus.

Lugd. hist. duas habet figuras, vnam ex Theodoro, nomine Manihot qualem exhibemus : Alteram, nomine Yucca, de qua nihil præter figuram & nomen. Gerard. Anglus in sua historia cum Yucca, ut vult Lobelius, confundit aliam plantam de qua mox.

Brasilianis frequens est hæc radix Manihot, totique Americæ, inquit, Thevetus.

Radices, aut idem, Manihot Americani aut in mortario contundunt, tam siccas quam virides, aut radula ex amplo arboris cortice, lapillis duris vndique obfusa, ut nos dentatis laminulis ferreis Noces myristicas, in farinam redigunt, quam cribro excretam, adiecta aqua, igni superpositam in vase calfaciunt, quoad Mannæ granatæ instar grumescat, cuius mirifica bonitas & nutriendi vis, potissimum si ea recens fuerit : videnturque ut nos pane, tam cum carnibus quam cum piscibus.

FINIS LIBRI DECIMONON





HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS.

DE RAPVNCVLIS, CAMPANVLIS
ET HIS AFFINIBVS.

IA M. de Rapunculis dixisse conueniet, si iustus ordo seruari debeat. Rapunculos dicimus, à radicum forma, quibus, quia bulb. sa nonnihil amulantur, illis & subiungendos duximus. Habent & id ferè commune inter se Rapunculi, quod Campanaceos flores, venustos sunt tanquam arthem communis familie gerant.

RAPVNCVLVS VVLGARIS CAMPANVLATVS.

CAPVT. I.



VERNIS acerbis expetitus Rapunculus vulgaris, radice mini. ni digiti ferè crassitudine, Napi parui similitudine, alba, dulci: filia ex oblongo per extremum rotunda, per terram sparguntur, nonnihil incisa, hirsuta: caulis cubitalis & squicubitalis, hirsutus, lactescens, foliis vestitus acutioribus, pediculorum expetibus: flores nolas imitantur, per oras lacinia, carulei, quos *vascula* excipiunt oblonga.



Rapunculus 4. siue esculentus, fortè Rapum silv. Diosc. & Plinij. Casalp. Rapunculus vulgò. In hoc genere videtur apud Plinium latione seu Laffine, vt quidam perperam legerunt, teste Hermolao. Fuchsum manifesto errore putare Rapum silv. esse Rapunculum vulgò dictum

Tom. II.

rectè annotant Matthiolus & Lacuna. Sed figura Matthioli nihil valet, nec per Glossatorem melior est reposita. Camer. apud Matth. Rapunculi, Pes locustæ Aue.

Schvv. Cat. Sil. Rapunculus aruenfis. Rapum *Per locusta* *Seser Sif.* *rum.* *Rapum* *sub.* hortense, Germ. Rapüntzel vocatum, Tragus interpretatur, Sifer & Sifarum, de quo Columel. lib. 11. cap. 3. & Iacob. Manlius super Theriacam Aue. qui quidem putet, & non malè, minimum Naporum genus.

Gesler. de coll. stirp. Rapum silvestre 3. flore Calah. cæuleo, die rächten Rapüntzel. Item Rapum silv. Rapüntzeln, commune processissimum. Idem de hort. ait esse Rapi silv. multa genera, quod tamen Diosc. simpliciter sic vocet videri sibi id, quod Tigurini vulgò Rapunculum nominent.

Lobel. & Pena Adu. Rapuntium paruum, Rapulum vulgò, Pes Locustæ Aue. Loban Oof. scribit quod albis floribus variet secus Brugellette Hannoniæ oppidulum.

Lonicer. hist. lib. 5. cap. 241. Rapüntzel, Rapunculum.

Dodon. Gall. picturam habet, ac scribit *rapun* *zeln*, Ripa sylvestris, Neoterici Rapontu, Rapunculum paruum: Gall. *Raponce*: Ger. *Hein Rapüntzel*. Belg. *cleyne aut ghemeine Raponces* *len*. Et in Lat. de flor. Quintum genus Rapi sylvestris facit, ac vulgò Rapunculum nominari tradit, quasi paruum Rapum. Anguill. *Rapontoli*. Fuchl. Rapum silv. vulgò Rapunculus Germ. *Rapontzeln*. Gall. *Raponce*, aut *Repunthun*. Clus. in Pann. & Hist. post. Rapunculus vocatur vulgaris. Brunfell. Tom. 2. p. 56. Raponeoli, sine descriptione.

Rapunculus vulgò dictus, etiam si tum homi-

xxx

nibus sub primum Ver ad esum, cum aceto & oleo actale, effodientibus: tum subros, quibus gratissimus cibus est, eruentibus, raro comperitur ad eam altitudinem progressum, quam ipsi Diosc. attribuit: & si perueniat, à paucis cognoscatur, tamen à plerisque verum & genuinum sylvestre Diosc. tapum esse creditur. Nec nos (inquit Cornar. in Diosc.) nunc refellere volumus, quum aliud quod pro eo ostendamus, non habeamus. Rapunculus non respondet Rapo silu. Diosc. licet crebrius & plerumque ad cubitalem altitudinem progrediatur, ac etiam excedat, quicquid dicat Cornarius. *Rapunculus* confundere Fuchsum cum Rapo siluest. testatus est Lacuna. Eorum autem sententia, qui putant Rapunculum, Rapunculo siluestre Diosc. repugnat Theophrastus lib. 7. c. 6. de plant. hist. quippe qui silu. Rapum radice consistere longa Raphani modo, breuique caule consistere scribit.

Cornar. not.
Si & Fuch.

Locus & tempus

Rapunculus passim provenit etiam in Horto E. C. Montbelgardi, actota hyeme vinct. Geneuz observavi colligentes Februarii principio. Monspelii florentem vidi Aprilis & Basileæ quæ itur Moutets Octobri: vt & Patavii: Nasceitur in arvis non cultis, in collibus & pratis, quin etiam in hortis iam feritur, vt grandiores edat radices, Matth. Non modò hortis & fatis familiare vbiuis, sed etiam siluosis & saxis tum frigidarum tum calidarum regionum, Lobel. Inter segetes provenit. In hortis etiam ad acetariorum usum feritur. Æstate floret & semine prægnat, Schvv.

Vires & v. sus.

In caliditate & frigiditate sicut Matth. in Epit. Cam. radix non lor gæbeft à temperatis, imò nec in aliis qualitatibus. Estur cruda radix, ac pauper cocta in acetariis, quòd maximè gustui placeat, & appetentiam excitet. Creditur quòd radix elixa, & cum longo Pipere deuorata, lactis vbertatem in nutricibus faciat. Radix, teste Lobelio, candida, tenera, acetariis Vernæ quadragesimæ longè quàm Rapo aut Raphano delicatior. Lactis copiam augeri quædam nutrices elixa radice, ex Pipere sumptâ exploratum habent. Montbelgardi & Geneuz hyeme si non rigidior sit, vt & Vere, non solum radices in acetaria assumunt, sed etiam folia.

CAMPANULA PARVA, ANGVILLARÆ Cantabrica.

Descriptio

Campanula, quam Anguillara facit Cantabricam, radice est alba, crassiuscula, modicè fibrosa, subdulci, à qua exeunt cauliculi, non surrecti, teretes, virides, aut subpurpurei, quorum folia primo ortu aliquatenus Violæ Martiæ primis minoribus foliis similia, minora, ex semuncialibus & vncialibus pediculis, quæ mox laciniata sunt hederaceorum instar in latumque magis proficiunt: at progressu temporis, ea potissimum quæ superiorem caulis partem obsident, formam multum dissimilem acquirunt, quantumque iis de latitudine decedit, tantum & plus longitudine proficiunt, sic vt duos digitos longa evadant, vix culmum interdum lata: densò autem agmine caulem stipant, acrimonia nonnulla & amaritudine prædita.

Clusius sic describit. Alunt etiam summa illa iuga præsertim in rupibus & precipitiis, Campanulæ vel Rapunculi genus, cuius radicales fibræ valde serpunt, & vicina loca occupant, subinde germinantes, & novas stirpes procreantes: habent illa inipidioribus aferè folia, deinde statim alia angusta confertim nascentia, Caryophylli secundo loco supra descripti foliis admodum similia, vt incautos plerumque fallat, qui interdam cum suo exipiente erunt. Caryophyllam collegisse exstimantes. Emergit deinde ex harum medio gracilis capiculus, in multos tenues ramulos diuisus, oblongioribus foliis, nullo servato ordine nascentibus, septus: flosculos è singulis ramulis dependentes protulit. Capiculus, sive Ramus, huiusmodi floribus formâ similes, vel eleganti cæruleo colore præditos, vel saturato purpureo colore, hinc violaceo nitescentes, vel dilutiore purpureo colore & quasi cinereo, conspicuos, interdum etiam niteos: capitula deinde Rapunculi vulgaris capitibus similia, aut potius illi Campanulæ minori, quæ cum in Belgica, tum plerisque Germaniæ locis, ad agrorum, aut silularum margines, sub fruticibus secundum profusè motes & convexas vias in umbra provenit. Hinc Lohs, interdum etiam Angliâ. Tota etiam laetescit.

Capitula deinde Rapunculi vulgaris capitibus similia, aut potius illi Campanulæ minori, quæ cum in Belgica, tum plerisque Germaniæ locis, ad agrorum, aut silularum margines, sub fruticibus secundum profusè motes & convexas vias in umbra provenit. Hinc Lohs, interdum etiam Angliâ. Tota etiam laetescit.



Campanula silvestris: namina siue a. pur. ri possit. Item Rapunculus, al. spec. a. bel. qua radix edulis non est, idè Dodonæo aliò referenda videtur. An eadem in hist. Gall. Campanula cærulea minor & sylvestris.

Clusius Pannorm. Campanula minor Alpina, vel Trachelii genus. In sol. Campanula minor Alpina rotundioribus semis foliis, capitulo Campanulæ minori quæ in Belgica & Germania est. Quam Campanulam secundò loco intelligat Clusius nondum nos intelligere fatemur pro Campanula minore Alpina rotundioribus foliis.

C. Bauh. phytop. Campanula minor rotundifolia prima. Rapi sylu. genus minus quod Campanula cærulea Gess. de hort. Campanula minor rotunda: aliis Phyteuma, aliis Cantabrica Plinii lib. 25. cap. 8. aliis Rapi silvestris. genus: floribus est communiter cæruleis, subinde candidis.

Clus. in post. hist. Iconem, eandem proponit quam Lob. & Dodon. Schvv. etiam non facit duersam Clusi Campanulam à Lobeli: Campanula, quæ occasio vt hoc capite ponam Clusi descriptionem nec separem, vt facit C. Bauhinus, donec quid rectius fuerimus edocui.

Schvv. Cat. Sil. Campanula minor rotundifolia Dod. Campanula silu. minima, Clus. Pann. Campanula minor Alpina.

Tabeon. Rapunculus silu. minor 2. Blanc. Mithglöblin/Heine Weisse Rapunzein: Tota laetescit. Item Campanula minor rotundifolia nunc flore, Heine weisse Mithglöblin.

An

An Gerard. Angl. Campanula rotundifolia,
Round leafed Bellflower. Campanula minor
alba. Little white Bellflower.

Campanulam parvam quæ Anguillaræ dicitur
Cantabrica, vidi Patau in horto D. Cortusii, Ge-
neuz ad radicem montis Saleuz, incipientem fo-
lia producere in principio mensis Februarii. Ba-
filez ultra Rhenum in sylua quæ itur Binto flo-
rentem adhuc Octobri, Lugduni cum flore Sep-
tembri. Montbelgardi passim in vrbe abundat in
Arcis muris & portis, florens Iunio & Iulio.
Mense Augusto obseruauimus non longe à pa-
go Cron redeundo Porentuo Campanulam
paruam siue Cantabricam Anguill. cum flore
albo.

Campanula minor rotundifolia
altera C. Bauhin.

C. Bauh. Phyt. Campanula 6. minor rotundifo-
lia altera. Clus. Campanula minor alpina: flos
nunc purpureus aut violaceus, modò colore di-
lutiore & quasi cinereo, interdum niueo. Clu-
sius in hist. post. in folio pro Campanula minore
alpina habet iconem Lobelii & Dod. quæ occa-
sio vt Clusii descriptionem reliquerimus capite
præcedenti: Schvven. quoque non diuersam fa-
cit plantam Campanulam Clusii & Campanu-
lam Lobelii, vt antè demonstratum. Nos ad-
huc ignoramus quam plantam intelligat per
suam 6. Campanulam, nec scimus de qua scriban-
tur sequentia, Schv. Cat. Sil. Campanula minor
pratensis Casp. Bauh. Campanula minor. 2. twice
sen glöcklin / Schbelen. Hæc integra sæpe tegit
prata. Succus ex flore cæruleo expressus viridem
efficit colorem.

Campanula Linifolia cærulea, vel Rapunculus
Campanulatus Linifolius.

Campanulæ tertie Linifoliæ cæruleæ C. Bauh. in
phyt. ex radice tenui, emergunt caules quini, seni,
plures, paucioresque, palmares & sesquipalma-
res, graciles, rotundi, in ramulos non diuisi, foliis
oblongis, angulosis, lino silv. similibus, confuso
ordine infernè, at superne ferè nullis, septi, flos-
culi è caulium summitate dependent, cærulei,
Campanulæ formâ, quibus succedunt capitula
Rapunculo vulgari similia. Hæc alunt potissi-
mum rupes & summa iuga montis wasserfall/
vbi eam ante annos quatuor collegimus.

Rapunculus 7. siue Campanulatus linifolius
Thalii, coliculos profert non admodum rectos
sed procumbentes, foliolos, brachiatos, adnatis
refertos. Folia ei primò prodeuntia sunt vncialia
ferè, subrotundiora, in mucronem tamen pro-
ducta, in ambitu leniter dentata, similia foliis qui-
busdam violæ tricoloris, quam vulgò Florem tri-
nitatis vocant: cætera, quæ caulem frequenter
ambiunt, longiora euadunt, sed tamen striatiora
existunt, lini foliis quodammodò affinia. Flores
plures, cærulei, plicati, in ambitu diuisi in hoc cer-
nuntur. Vbiuis autem hæc species frequens est.

Schv. Rapunculus silv. Campanulatus lini-
folius, kleine Rapunzel, kleine Glöcklin / Al-
peris & petrosi oritur. Quantum differat
Campanula Linifolia à nostra Campanula parua
nescimus, nobis quidem constat eam depositis
prioribus foliis rotundis acquirere folia Lini &
penè diuersam videri. Rapunculum 7. seu Cam-
panulati Thalii descriptio, non videtur malè
Tom. II.

quadrare nostræ Campanulæ paruz. Schvvenck.
tamen diuersum facit.

CAMPANVLA FOLIO HEDERACEO, species Cantabrinæ Anguillaræ.



TEnella est Descriptio
plantula,
coliculus tenui-
bus palmaribus
aut sesquipal-
maribus, ramo-
sis: per quos
filia tenera, hi-
lari virore per-
fusa, Hederæ vel
Cymbalaræ, sed
quorum lacinia
sunt acuminatæ:
flosculus pedicu-
lo fili inftar te-
nui longiusculo
insidet, vni vni-
cus, gracilis, ob-
longus, per
summas oras la-
ciniatus, cæru-
leus, cæteroqui
pallidus.

A Fr. C. Bauh. accepi nomine Campanulæ
Hederaceo folio: Gener Cherlerus ait se colle-
gisse iuxta Aureliam in siluula palustri. Hanc ad
nos (inquit C. Bauhin.) Luteri Io. Henr. Cher-
lerus Philos. D. & nunc in Academia Nemausana
Philosophiæ professor, vnâ cum pluribus aliis
misit.

CAMPANVLA ROTVNDIFOLIA minima.

Campanulæ 7. siue rotundifolia minima C.
Bauh. in phyt. herba est vix quatuor digitos
alta, quæ ex radice exigua, oblonga, albâ, ramulos
profert aliquot exiguos subrubentes & subhir-
sutos, cortice aspero vestitos, quos ambiunt folio-
la ex rotunditate oblonga, serrata, rigidiuscula,
quorum inferiora latiora: cuilibet ramulo qui
sæpè vnus, plerumque terni vel quaterni, flosculus
insidet vnicus, subcæruleus, deorsum spectans,
formâ calathi ex vno folio sexangulo, cui capitu-
lum foraminulis pertusum, vt in Campanulâ an-
gustifoliâ, succedit, in quo semen minutum.

Hanc in Rhætici montibus, cum Italiam An-
no 1577. petereamus, Septembri mense, adhuc
floribus onustam inter saxa copiosiss. vidimus,
nec maiorem inuenimus, quam eam Patau No-
biliss. Iac. Antonio Cortuso Patrio Patauino
ostenderemus, Cantabricam Plinii nominauit.

CAMPANVLA LINFOLIA RARA, flore cærulea.

Rara admodum videtur esse planta, caule est
cubitali striato, foliis non ita multis vestito,
tenuissimis & quouis gramine angustioribus,
duas vncias longis, supernâ parte breuioribus
temerè positis, quo loco prouenire quædam pro-
pagines exoriuntur in minutissima foliola desi-

nentes. In summo rami vestigio flores sursum spectantes in vnum quasi glomerem congesti sunt, Campanulæ planæ similes, in extremo dissecti. cærulei, vt sicca Plateriana insinuat, ipseque Cl. D.D.F. Platerus adserit. Hos flores Calyculi foliacei minimi sustentant.

RAPUNCULI GENVS FOLIO
serrato rotundiore.

Descriptio



Complures statim à radice tollit caules, cubito altiores, nonnihil angulosos, subhirsutos, simplices, quibus ab imo ad summum adnascuntur alternatim folia nonnihil hirsuta, vncialia & sciscuncialia, semineâ circiter lata, pueria vnciam attingunt, in acutum mucronem desinentia, per ambitum serrata, obliquis venis à medio nervo in margines exporrectis. Summus scapus flores ex interuallis profert, Rapunculi vulgaris floribus similes, calyculo exiguo pinnato persimili, ex pediculis vncialibus & sciscuncialibus tenuibus. Radix alba Rapunculi vulgaris crassitudine, multifida, longiuscula.

Rapunculum vocavi plantam descriptam, unde autem habuerim non recordor, similis, si non eadem, Argentinæ 1599. Iulio sicca per Dum. Agerium demonstrata nomine Campanulæ prope Gestin in Styria colle&æ, in floribus siccis dicebat colorem fuisse dilutè cæruleum, pistillus longus extra florem apparebat: Folia in principio caulium rotunda ferè, satis profundè crenata, brevissimis & vix conspicuis pilis obsita.

ERINOS, ERINEOS, VEL ECHINOS
Veteribus & in genere.

Descriptio

Erinos, quod aliqui Ocimodes [ἐρινοειδής] alii Hydreron [ὑδρόν] quasi aquaticam herbam, Romani Ocimum [ὀκίμω] appellant, nascitur, autore Dioscoride apud fontes & fluuios, foliis Ocimi [ὀκίμω] sed minoribus [μικρότερα] Tragus putat legendum [μακρότερα], parte summâ diuisis: furculis quinis, senisve dodrantalibus: flore candido, semine nigro & acerbo: folia & caules lacteo succo turgent (ita Ruell. quam lecti. probat Matth. & Dalech. Cod. meus Basil. & Paris. ἐπὶ τῶν πηγῶν ἐστὶν, liquore plenus:) Huius semen drachmarum duarum pondere ad mellis cyathos quatuor ammixtum, ad oculorum fluxiones sistendas illinitur. At succus aurium dolorem sedat, cum sulphure viuo & nitro instillatus.

Herba quoque quam Græci Erineon vocant, inquit Plinius, videtur reddenda in hoc loco [post Caprificum] propter gentilitatem. Pal-

mum alta est, cauliculis quinis, ferè Ocimi similitudine, flos candidus, semen nigrum, paruum: tritum cum melle Attico oculorum Epiphoris medetur [duabus drachmis cum cyathis mellis Attici quatuor. Cumulatim decrepta: Hæc vetus lectio Com.] vtcunque autem decrepta manat lacte multo & dulci: herba perquam utilis aurium dolori, nitri exiguo addito. Folia resistent venenis.

Echinus acerba est & repellendi ac siccandi vi prædita, ait Galen. de simpl. & ex eo Paulus: qui præterea aquaticam esse scribit, cuius seminis drachmæ, cum mellis drachmis quatuor illitæ, oculorum fluxionem sistant. Succusque ad aurium dolorem faciat.

Paulus bis eandem proponit plantam vt monet Cornar. primò ex Diosc. secundò ex Galen: in eo, nostro indicio, demonstrans sibi non cognitam plantam: facili lapsu apud Galenum per Amanuenfes scriptum crediderim Echinos pro Erinòs, quod non animaduertit Paulus, quanquam Matthiolus Ruell. & Massar. dicunt in venustis aliquot Dioscor. codicibus legi Echinos: addit præterea à Nicandro in antidotis Erinon inscribi. Hinc non refragatus fuerim Io. Agricola, cui herb. Erinòs eadem est, cum Echino, licet Paulus diuersas faciat. Eodem Diosc. propter similitudinem, post Ocimastum descripsit. Sed quia lacte manat vt Caprificus, eodèque censetur nomine, ipsi subiunxit Plin. ipsamque Erinon vocans, ait eius folia venenis resistere. Quod vt doctè Constant. in Lexico notat, sumptè ex Nicandri Thetiæcis. Quin Scholiast. ex Diode [ἐρίων, ἐρίων] dici ostendit. Galenus de Erinòs tacens, Echino omnia tribuit, vbi & ἀγρίων [addendum χυλὸς ἐρίων & ἐρίων & ἰχθυὶν] voces, idem in hac herba exprimenda significant.

Quæ Plinio Læctoris dicitur, quamque vulgò notam scribit, hæc & Lactaria & Anabula nunc dicitur. Eandem aut similem aliqui volunt, illi quam Militarem vocant. Et licet non desint, qui Diosc. Erinon faciant, attamen Gesnero in catal. pl. congeneres non eadem videntur.

Est autem Erinòs herba appellata Cordo in Diosc. quod Caprifici modo lacteum liquorem remittat, hodiè autem incognita est: quamuis Ruellius eam cognouisse videatur, qui hæc scribit. Est & apud Hippocratem Echini herbæ mentio. A Recentioribus Herbariis herba lactis appellatur, à quibusdam Læctoris, & militaris, aliis Ocimum aquaticum. Lactaria rura vocant, trientalibus ramulis; quinis, senisve foliis, Ocimo longioribus, parte supernâ diuisis, albo flore, semine atro, pusillo, acri, duro. Herba succo manat, lactis tum colore, tum dulcedine, vnde Lactaria nomen apud vulgus inualuit. Secus fontes & fluuios inuenitur. Has insuper ei vires præter eas, quas Diosc. Plin. & Galenus Erinò suo adscribunt, assignat. Succus cum sulphure, nitroque instillatur, discutit oculorum caliginem, vomitionesque ciet. Folia in cibo sumpta pariendi præstant facultatem. Vulnus ferro factum intra paucos dies imposita ex oleo sanant.

Cæterum obscurus est Diosc. inquit Anguillara cap. de Erinòs, cum ait ἐπὶ τῶν πηγῶν ἐστὶν ὁ καυλὸς καὶ τὸ πῦμα, an intelligat simpliciter succo plenum, aut succo lacteo: de Tithymalis solet dicere ἐπὶ τῶν πηγῶν λευκὸν, quicquid sit, nullam noui plantam quæ Erinò respondeat.

Nunc quod reliquum est, Erini & Erinei nomen

Erinos purgat.
Ad oculum.
Ad aures.

Echinus

Ad oculum

Ad aures

Paulus

Erinos

dem c

Echinus

Lactaria

Anabula

Militaria

Erinos

Erinos

men sequentibus tribuitur plantis.

Matthioli Erionon volunt aliqui esse Hieracii speciem, de qua nos agimus lib. 24. sub Hieracii Sabaudi genere.

Dalechampsius habet suum Erinum, quem hoc libro posuimus inter Rapunculos.

Erinum quidam existimant esse Efulam siue Tithymalum dulcem, de qua l. 34.

Querunt aliqui, an Noli me tangere sit Erinos, de qua lib. 26.

Rapunculus dicitur Erinus Nicandri & Dioscori.

Videntur aliqui existimare Rapunculum comosum esse Erionon.

Erinos Columnæ ad Rapunculos referenda; cum eiusdem Erini siue Rapunculi genere minimo, de quibus libro præsentii.

Credit C. Bauhinus Elatinem Polyichidem H. Lugd. eandem cum Erino minimo Columnæ, verum fallitur vt demonstratum lib. 29. sub titulo Alfine folio oblongo, hirsuto.

Erineon quidam putant esse Scrophulariam maximam radice fibrosa, de qua hist. l. 28.

Inter Diosc. atcriptitia Epimedio Erinei nomen tribuitur, Erineos pro Acino apud Plinium lib. 21. c. 15. quam Epitetron vocant, vt apud Dioscori. Epimedium vbi Erineos, Fab. Columnæ, cui Epimedium est Lunaria minor botryoides. Vide de his hist. l. 35.

Erineos, Erinos, Erineon, Erinia, Frina de Caprifico, vnde Erinos herba nomen accepit, vide hist. l. 1.

ERINOS MAIOR FAB. COLUMNÆ, RAPUNCULO AFFINIS:



ferrata, supernè hirsuta parum, atque viridia, infernè verò læuia, atque polita, albidioraque: caules postea ab radice emittit plures, secundum loci annique temperiem, pedales, vel maiores, angulosos, hirsutos: quos folia absque petiolis alternatim circumdant, longiora admodum, angustioraque, minulque ferrata, ita vt qui viderit plantam sine caule, atque postea caule præditam, diuersam absque dubio esse censeat, nisi domi cultam obserauerit: folia quidem, quæ, antequam caules ederet, habebat terram tangentia, marcida euanescent, nec in illa amplius inueniuntur. Ex foliorum alis ramuli exeunt, in


Tom. 11.

in quibus sicut in caulibus flores Maio exeunt petiolis paruis hærentes, cæui, quinque diuisuris in extremo dissecti, colore albicantes, & etiam purpurascetes, intus thyrsum habentes qui in tres curuas partes diuiditur: quibus siccatis florum basis extuberat, quæ hirsuta est, & in quinque viridia foliola desinit, semen perficiens Iunio & Iulio, fuscum, minutum, compressum, gustu acerbum, quod cum perfectum & siccatum est, per basis foramina quæ tunc peruia sunt, decedit. Tota planta ex radice, ad florum calyces vique lacte manat dulci, disrumpit.

In locis aquosis; fluuiorum ripis, ac vallibus, ad fontes: & in Montium radicibus vbique frequentissima.

His igitur videtur, natali, loco, formâ foliorum, lactis copiâ & sapore, quæ notæ priuatæ sunt, delineationi Erini Antiquorum respondere.

ERINOS FABII COLUMNÆ MINORI



Erini, siue Rapunculi minimum genus, noua est plantula atque pulchella ex D. Martæ Virginis monte aduecta: quæ radicè habet paruum admodum, fibris diuisam, teneram, atque Rapunculo siue Erino à me depicto similem sapore, lactescetemque: folia emittit parua admodum, digiti longitudine, parè hirsuta,

oblata, latioraque in summo, & per extremum serrata raris diuisuris, nam quæ proximiora sunt radici octo dentes arcum habere videntur; superiora verò minus, atque floribus hærentia binos, caulem emittit ab radice, ex singulis foliolis alis diuisum, ita vt fruticosa videatur, angulosum hirsutum, tenuem: flosculos edit Aprili mense & Maio; inter folia, ex calyce parè hirsuto, in quinque folia desinente, vt in Rapuntio & Campanula pyramidalis dicta videntur, exeuntes, oblongos; cauos, similes Tracheliorum flori, purpureos, intus apicem vel thyrsulum luteum in summo triplici diuisura intortum, vt in congeneribus, continentes. Semen perficit Iunio, & Iulio, minutum admodum, fuscum. Tota planta lacteo succo turget dulci, vt Rapuntium, ita vt gratus sapor palato.

An Erinos Cæsalpini, qui in adificiis nascitur riguis, palmi altitudine ramosa: foliolis breuibus angulosis, vnguis latitudine, flosculos in alis fert, figura Rapunculi, exiles, subcandidos, aut purpurascetes: vasculum paruum figura Rapunculi, in quo semen minutissimum, lacte madet dulci.

C. Bauh. phyt. Erionon Columnæ refert ad Alfinem, verum ibi non reponendam capite de Alfine demonstratur.

Xxx 3

AVICVLARIA SYLVII QVIBVSDAM.

Descriptio.



picibus in medio luteis, longis viridantibus foliis radiatim floris basi circumpositis, quæ summum postmodum coronant fastigium clauæ quadratæ vncialis quam delapsi flores relinquunt: radix singularis, tortuosa, lignescit.

Dodonæus qui in hist. Gall. hanc nostram præsentem plantam Onobrychin appellauit, ait de flor. tertiam quandam Campanulam humilem Anonymon non esse Onobrychin, quod quandoque suspicatus fuerit satis constare. Et hinc patet, quàm malè Lobel. Obs. sequentæ sint Dodonæum, vocando eius & Belgarum Onobrychin alteram. Gesner. de col. stirp. sanè melius inscribit Auiculariam Syluii, Violam quandam anonymon. Iac. Theod. Icon. par. 2. p. 304. dicitur, Viola aruensis Fraumen spiegel. Item p. 316. Pentagonion, Viola pentagonio fuisse de Westeln. Duas habet figuras vnius plantæ, prior mala, secunda bona, non debet separare.

Malè etiam ab Hist. Lugd. Onobrychidis primæ Dodonæi nomine exhibetur.

Audiui qui vocarent Auiculariam Syluii, herbam cubitalem, cui flores pulcherrimi angulosi, violacei, folia parua, subrotunda, mollia. Copiosè in segetibus prouenit, Montpelii vidi florentem Maio, Basileæ Iunio & Iulio: in agris inter Basileam & Hagene. Fr. C. Bauhinus obseruauit inter segetes propè S. Iacobum. Geneuæ habebam in horto pulchrè virentem mense Aprili, florentem Maio & Iunio. Patauii obseruauim primò orientem inter segetes medio Febuario. Attuli Argentina semen datum à D. Friderico Meier seminandum Montbelgardi in horto E. C. quod factum Martio, prouenit & floruit Iunio. Massa ferata Cortulo in agro Patauino, asserente D. Ranzio Medico apud Fontem admirabilem.

TRACHELIUM MINVS MULTIS.

Descriptio **T**rachelus, τράχελος à Græcis appellatur collum, atque aded tota spina à vertice vsque ad os sacrum, τράχελος τῆς σπονδυλικῆς ὀστέας hoc est ab asperitate: quæ nominis ratio & huic plantæ conuenire potest, nisi ob dotes nonnullas quibus

Trachelo proficua sit, Trachelium dicendâ videatur.

Trachelio autem minori radix sapore grato, caulibus ramosis, hirsutis, sed tenuis, breuior, folia breuiora, angustiora, crenata, hirsuta parum, flores in ramulorum extremis, simul multi confertim, pulchelli, cærulei aut violacei, tanquam Campanulæ, ovis in quinque laciniis dispersitis.

Gesner. de hortis ait, Ex Rapi sylu. generibus esse Vuularias quibuldam dictas in pratis nascentes.

Dodon. lat. de flor. & in fol. scribit, Rapi sylu. tertium genus præterque Ceruicariam minorem dicit. Gall. autem Trachelium minus, Petite Gamelle vocat.

Trag. Ceruicaria & Vuularia exigua, zapffen-frant/balsfräut.

Lobel. & Pena Adu. Trachelium minus siue Ceruicaria minor, cui folia aspera Rapuntii aut Saluiz, pilosa: flores densi, pulcelli. Obseru. Trachelium minus. Adu. p. 339. Trachelii varietates, Passim istud etiam asperis saxosis Angliæ & Gallobelgii siluosis fructat: sed strigosius, hilari minus & amœno asperius: alioqui persimile & congener. Item Trachelium minus. Radice fibrosa purpurantibus floribus stipatur, alioqui cæteris haud simile. Icon. Pl. p. 326. Trachelium minus Lob. 176. Teut. 400. Lobel. nobis obcurus videtur. Iconem habet Trachelii minoris ramosi, qualem habet Dod. & Clusius.

Camer. Icon. p. 8. Rapunculus silu. vmbellatus p. 94. [videlicet apud Thalyum,] cuius tres differentias depinxit congeneres iis quas author [Thalyus] descripsit, quamvis non easdem. Quarum vna, nempe elatior signata. respondet iconi à nobis propositæ, quæ est ex iis quas eminens iam sculptas.

Tabern. hist. & icon. Strengemsel/Symphytum petraum. 1. Confolda petraæ prima.

Thal. Hæcyn. Ceruicaria minor Dod.

Clus. in fol. lib. 5. cap. 55. Ceruicaria Sphærocephalos. Trachelij genus floribus summo caulibus & ramorum fastigio confertim, & quasi pile instar, in orbem nascentibus, cuius etiam secundum genus est paulò minus, flores singulares per caulem sparsos habens, præter sphæras illas summo caulibus fastigio innascentes.

C. Bauh. phyt. Campanula 13. siue pratensis.

Schvv. Trachelium minus pratense vmbellatum, Ceruicaria minor, Klein balsfräut.

Abundat passim in pratis Montbelgardi, etiam in horto Ill. E. C. spontè, vbi copiosè floret Iunio, Septembri & Octobri, Basileæ quoque & Camp. Geneuæ obseruauim. Argentina vidi in horto D. Frid. Meier, Iulio florens, flore purpureo cinereo & albo. Trachelio minori uidem natales cum Locu maiore Lobelii [qualidorum marginum & montium pratorum Germaniæ & Angliæ sunt. Ceruicaria minor Dod. Thalyo passim locis apricis maximè. In Silesiæ agris & pratis aridioribus frequentem scribit Schvv.]

Trachelii minoris folia Rapuntii sapore primo Vere acetariis etiam adduntur, Lob.

TRA:

TRACHELIVM RAPOSVM FLORIBVS
plerisque singularibus.

Est nobis ne-
cissimum vnde
de planta sicca,
ex Trachelio-
rum minorum
genere speciosa:
radix crassiuscu-
la, vncias qua-
tuor longa pa-
rum fibrosa: fo-
lia ad radicem
multa ex breui-
bus pediculis
vnciam vnā
vel duas longa,
mediā lata:
caulis hirsutus
pedales in ra-
mos diuisus,
qui desinunt in
folia breuia, lata,
ex quorum me-

dio oriuntur magnæ Campanæ purpureæ, ple-
rumque singulares.

TRACHELII MINORIS SPECIES DVÆ,
siue Rapunculus filu. umbellatus
maior & minor Thalyo.

Lacteo est succo, sicut reliquæ Rapunculo-
rum species. Duplex verò reperitur: maior,
quæ rariùs obuiam sit, ex vna radice numerosissi-
mos profert caliculos, tenues, teretes, scabros, hi-
spidos, sesquipedales, foliis plurimis, oblongius-
culis, angustis, fimbriatis, ac hispidis præditos, in
ymbella parua flores cæruleos continentes: se-
mine fuluente exiguo. Minor species locis aridior-
tibus ac soli expolitis, maximè verò arenosis
frequentior est foliis & caulibus brevioribus, vt
& ymbella sua cærulea:

Thal. Harc. Rapunculus filu. cæruleus ymbel-
latus maior & minor.

C. Bauh. phyt. Rapunc. s. siue ymbel. latifol.
Thalyo, Rapunculus filu. cæruleus ymbellatus
minor. Camerario Hort. Icon. 8. Rapunculus s.
siue ymbellatus angustifolius Thalyo. Rapun-
culus filu. cæruleus ymbellatus maior.

Schvv. Rapunculus filu. cæruleus ymbellatus
angustifolius, quem C. Bauh. Nabelicht waldt
Rapungel vocat, dicitque Augusto flores ferre
in montanis recessibus ad Quissum fluvium.
Quæ sit hæc planta nobis nondum constat: Ger-
manicæ linguæ periti considerent an ymbellatus
bene dicatur Germ. Nabelicht.

TRACHELIVM MINVS ALBUM.

Obseruabam anno 1596. Augusto mense in
culcis horto Domini Friderici Meier, Trache-
lium minus floribus albis non magnis, multis
simul in extremitate caulis, cubitalis, lauis: fo-
liis longo pediculo vncias tres longis, duos latis,
non in acumen desinentibus, vt cæterorum
Tracheliorum, serratis, vix asperis, glabris.

Hoc ex sicca descubimus. Idem verò suspisor

TOM. II.



fuisse quod an-
no 1600. adhuc
floreus Septem-
bri obseruati in
prædicti horto;
cuius flores al-
bi vbi exsiccati
subcæruleum
colorem acqui-
siuerunt.

TRACHELIVM ALTISSIMVM HIRSV.
TVM ASPERIVS, FOLIIS ANGV-
stis, floribus paruis.

Radice cras-
sa nititur
& subdulci, cau-
lem erigit bicu-
bitalem vel tri-
cubitalem, cras-
susculum, hir-
sutum: foliis or-
natum angu-
stis, longis, ad
Echii folia acce-
dentibus, alpe-
ris: flores con-
fertim conglo-
merantur, vt in
Trachelio mi-
nore, campanu-
lati, sed mi-
nores, cum ta-
men planta
maior.

Hoc Trache-
lii genus inue-

nimus 1592. mense Iunio floreus, inter Sultz
Alsatia & Zenne vrbes, artuli plantandum in
hortum Ill. E. C. Montbelgardii.

TRACHELIVM MAIVS PETRÆVM.

Aradice lignosa, & rugosa colore pallido pur-
purascente exeunt cauliculi multi striati;
subhirsuti, cubitales, & cum rubore vi-
rides, qui inordinate emittunt folia oblonga, cte-
nata, nigricantia, suā pariter hirsutie communi-
ta, parte pronā potissimum, vbi etiam albicant,
& Saluæ folia referunt, magis tamen angusta
& mucronata, inter quæ paruula quædam folio-
la prodeunt: in summo caule sunt flores multi a-
ceruatim congesti, quemadmodum in ymbella-
ta Ceruicaria Penz: & inferius ex eodem globuli
quidam, at minori numero, & inferius magis in-
ter caulem, & folia, alii, & adhuc pauciores, for-
mam repræsentant illorum iam dictæ Ceruicaræ;
sed minores, albi, & in quinque, & quandoquæ
Xxx



obseruare potuit: inter rimas florum asperimor-
rem lapidum Baldi, solum circa Coronæ Tem-
plum pullulat.

Vires & v-
sus.

Trachelium hoc non acre, non amarum, sed
tantum adstringens esse sensu dignoscitur, mul-
toque magis ipsa Ceruicaria.

TRACHELIO MAIORI PETRÆO Ponæ simile, si non idem.

Descriptio.



cauli hærentia folia quædam vncialia, longiora
etiam, semunciam ferè lata, quædam breuiora,
præsertim & angustiora quæ in summo consti-
tuta. Quæ verò ramis hærent prædictis multis
numeris minora, ramorum summitatem florum
occupat glomer densus atque crassus, colore in
sicca non satis apparente, facie quodammodò
florum Petasites, è quibus stamina emicant præ-
longa, & quantum connecere licet, nullus ma-
nifestus nec odor neque sapor.

Hanc plantam accepimus à Fratre C. Bauhino
nomine Cistæ Galli Recentiorum ex monte
Baldo: Longè tamen diuersa est à Cistis Galli
quia Campanulas fert, vt primùm animaduerti-
mus 1609. ex pulchra planta Veronâ missâ per
insignem Botanicum & Pharmacopœum Petrû
Ponam. Nos quidem tenemus esse idem cum
Trachelio maiori petraeo Ponæ, qui in monte
Baldo eius iconem proposuit minis artificio-

septem mucro-
natas scilluras
diuisi: è quorû
centro multa
exerunt stamina
sibilutea, quorû
vnum modo
Proboscidis e-
greditur, versus
cacumen satis
crassum, quod
dum maturatur
bifurcatum &
aduncatum eua-
dit: decedente
Augusto florens
conspicitur at-
que talis per
plures dies cõ-
seruatur. Vnde
Ponæ hætenus
semen minimè

lam, nam in ea pro foliorum crenis longi pini
guntur pili.

TRACHELIUM TRAGOPOGI folio montanum Fab. Columnæ.



Non è flo-
tum for-
ma, natali lo-
co, annique
tantum tem-
pore quo flo-
ret, sed & la-
ctis copia, sub-
stantia folio-
rum, & sapore
totius plantæ,
Tracheliorum
varietati, sic à
Recentiori-
bus, quia tra-
cheæ locisque
vicinis medea-
tur, vt dictum,
appellatarum,
reddenda est
hec noua plan-
ta in D.M. Vir-

ginis Monte, sic vulgò dicto, exoriens.

Radice quidem habet crassiusculam albidam
lactescentem, & ex ea plures propagines habent-
es folia angusta, longa, duriuscula, Croci aut Tra-
gopogi formâ, & magnitudine. Veris fine cau-
les pedales edentes subrubentes, atque hirsutos,
quibus folia alternatim, rarique hærent, in quo-
rum summo sex aut septem simul flores purpurei
Nolæ forma, Trachelii vulgaris modo, ex basibus
singulis quinque foliolis viridibus constructis,
exerunt: fructus atque semina Trachelio etiam si-
mila Aestate perficit. Radix perennis est, atque
dulcis, cui apta, sicut vulgare Trachelium, & Ra-
puntium.

Clus. in fol. Trachelij genus elegans obserua-
tum à Fab. Columna.

TRACHELIUM SIVE VIOLA Calathiana Herb. Angl.



Cvæ nulla
præsentis
plantæ descrip-
tio à nobis ad-
feratur, ratio est
quod ad herbâ
iconem expref-
sam, eam teme-
rè more aliorû
effingere no-
luimus. Siqui-
dem nec viua
in nostrû conf-
pectum vquâ
venerit, nec
nos, quod equi-
dem ingenuè
fatemur, linguâ
Anglicanâ quâ
à Gerardo pag.
365. describitur,
callemus, nec
quispiam alius præter eum, Trachelium hoc deli-
nearit. Vocat autem hanc Violam Calathianam,
Angl. The true Calathian Violer.

CAM.

CAMPANULA LYCHNIDEA.



Radice fibrosa est, palmum longa, nigricans, neruum intus habens, in profundum acta, sapore dulci cum adstrictione. Ex ea ramulus fundit multos, rotundos, villosos, incanos, vix palmum excedentes, in quibus folia angustapilosa, incana, per cauliculos incerto ordine distributa, leuiter adstringentia: in summo caulium vertice flores exeunt Campanellae similes, quales in conuoluulo, rotundi, ex candido nonnihil purpurei.

Lychnidis speciem, Myconus appellauit, à foliorum figura, & florum quadam similitudine: quamquam non tam calida sit, ac reliquæ Lychnidis à Diosc. & Galeno traditæ.

H. Lugd. Lychnidis silv. species Myconi:

C. Bauh. Phyt. Lychnis 14. siue silv. Campanulæ flore.

In montibus & locis maximè siccis prouenire Myconus ait, nec alibi à se visam quam in montibus D. Mariz à Monteferrato. Floret Maio mense.



Non desunt, annotante Matthiolo, boni Simplicistæ qui volunt plantam cuius figuram exhibet, esse verum Phyteuma: qua de re tamen adhuc aliis iudicium relinquit. Figura Matthioli depicta est ad siccam herbam.

Campanulam cæruleam satuiam Dod. in hist. Gall. vocat. Germ. Blaw Clockens: lib. de flor. & in fol. Campanulam hortensem maiorem, eoque nomine depingit: dicens: siluestrium Raporum species vulgò Campanula nominatur, plarisque Beluidere. Matthiolus Phyteuma esse existimat, ei tamen latione Theophr. & Plinii similior videtur. Non sanxit autem Matthiolus Campanulam hortensem esse Phyteuma, vt Lob. & Pena asserunt his verbis. Nostrates Campanulæ duæ hortenses, Persicifoliæ, lacticinosa, flore volubilis: eis noliæ, cæruleæ, albidæ: Putantur meritis Theophrasti latione, capitula insunt foraminibus peruiis, quod imposuit Commentatori, qui idcirco putauit & sanxit Phyteuma.

Clus. hist. post. Campanula Persicæ [Mali] folio nunc cæruleum, modò album florem profereus, alibi verò Campanula angustifolia, siue Matthioli Phyteuma.

Tabern. Icon. & hist. Campanula angustifolia Klein glöcklein. An eidem Icon. & hist. Rapunculus 6. nemorosus 2. waldt Rapuntzel. Item Rapunculus 7. nemorosus 1. waldt Rapuntbel.

Gerard. p. 367. Campaula Persiciflora pzeach lased Bollflower. Item Campanula lutea linfo: lia yello w Bollflower. Falsus hic titulus pro Rapunculo nemoroso 3, Tabern. cuius icon à Gerardo proponitur.

An C. B. phyt. Rapunculus 8. siue nemorosus folio oblògo crenato, Tab. Nemor. 2. Rapunculus 9. siue nemor. breui folio crenato Tab. Nemor. 3. Huius aliquot species obseruare licet, vt & Thalius in sua Hircynia monet, huc enim eius secundus, quartus & quintus pertinent. Rapunculus 10. siue angustifolius non crenatus, Thalyo campanulatus nerifolius 2. Item Campanula angustifolia, Lobelio Persicifolia.

Rapunculis annuero, ait Thalius, stirpes illas lacteo succo præditas, ac Rapunculorum modò oblongioribus & lactescentibus radicibus, supernè promerberantibus constantes, & Campanulatos flores edentes, vnde Campanularum nomine communiter herbaris vocatæ veniunt: quibus omnibus folia sunt Nerio similia, longior, magis fibrosa tortuosaque. An Theophr. l. i. hist. pl. c. 21. latione. An Plin. l. 21. c. 22. latione. olus.

Autore Gesnero hort. Germanis quibusdam inferioribus, Campanula cærulea, quæ Coudenberbius Rapi silv. quod Rapunculum vulgò dicunt, speciem minorem facit, eamque hortensem, Belle videre, siue Beluidere, vocatur.

Belle videre, siue Beluidere, vocatur.

Phyteuma.

Lobel & Pen. not.

Matth. not.

CAMPANULA ANGUSTIFOLIA
cærulea & alba.

Procera est ad cubitos duos, caule anguloso, rigido, ex atro virore splendente: folia stricta, non multum culmo latiora; palmo longiora, rigida, leuiter denticulata, proximè cauli alternatim adnascuntur, æque eorum alis pediculi prodeunt, vnum, duos, aut plures flores sustinentes,

Campanæ vel Calathi figura, vt in Rapuntio, sed magis patulos, in quinque acutiores lacinias dehiscentes, colore plurimum cæruleo, rarius albo, à pieibus concoloribus: succedunt capitula, tribus foraminibus pertusa, supra umbilicum sese tollentibus quinque foliolis. Radix quam Rapuntio mi-



giora ac latiora in quibusdam speciebus, in quibusdam etiam breviora ac angustiora. Hincque eas rapunculos *rapunculus* appellant. Harum aliquot species facili admodum industriore herbariarum perscrutatori patebunt. Ego verò recensendo hic tot, quot illo in genere hæcenus per Harcyam nostram mihi observare licuit. Rapunculus ergo Campanulatus Neriifolius *primus* caulem habet sesquipedalem, teretem, parum striatum, inter folia adnata quædam seu brachiola explicatum: *folia* autem Nerii quincunciali longitudine, vncialique fermè latitudine: *florem* Campanulatum, cœruleum, in ambitu orificii parum dissectum. Secundus folia obtinet prior crebriora, pauloque angustiora, longioraque multò, utpote dodrantalia: caulem item crassiorum: *florem* prior maior em. *Tertius* & imple quoque folia exhibet angustiora, secundo tamen breviora: flores verò ampliores maiorisque, Cymbali alicuius patentioris in modum, in extremis oris diuisos. *Quartus* caulibus brevioribus, foliis item minoribus, quorum ea quæ radici propinquiora sunt, vnciarum fermè trium sunt longitudinis, dimidiæ autem latitudinis: quæ verò per reliquum caulis conspiciuntur, iis breviora sunt: floribus est autem admodum patentibus repandisque, sed tertii minoribus. *Quintus* caulis est pedalis, pauloque procerior, alper, non admodum foliosus: folia verò sunt nigriora, vncias quatuor, aut quinque longa, vnam verò penè lata: flores cymbalares, minores, aperti, ventre tamen eius non in rotundam cauitatem expanso, ut in illarum specierum floribus, quas iam recensui, videre est, sed plicato. *Sextus* Rapunculus Campanulatus aut Neriifolius minor, caules erigit pedales, angulosos, scabros: folia eius, ea videlicet, quæ radici proxima sunt, vnciarum quatuor longitudinem assequuntur, vnius verò latitudinem: reliqua quæ cauli appenduntur, triuncialia sunt, & breviora etiam: caules huic speciei in summo in brachiola diuiduntur crebriora, tenuiora, flores exhibentia Campanulatos, cœruleos, plicatos, in ambitu ad orificium diuisos.

Schvv. Campanula angustifolia cœrulea maior Matth. *glocken*. Diosc. Lob. Campanula Persici folia nostras Wald glöcklein / wald Cymbeln / Taubeglocken, Grosse Schellen. Campanula minor angustifolia flore albo, weisse wald glöcklein. Item Rapunculus *rapunculus* aut Campanulatus. Thal. wald rapügel / wald Glocken. Miror non annotasse Schvvenck. quem Neriifolium Thalii ex iam recensitis intelligat.

Locus & Tempus Campanula angustifolia flore cœruleo & albo copiosè provenit in horto Ill. E. C. flore cœruleo inveni spontè florentem Iunio in Alsatia inter Sultz & Zenne Vrbes, alibi præterea flore modò cœruleo, modò albicante variis in locis inter dumeta inveni. Genevæ cum essem abundanter vidi circa Montem Saleuz, & virentem ibi principiò Februarii inveni, provenit etiam copiosè non longè à Geneua in colle *la Bassie*. Campanula angustifolia maior Schvv. in collibus apricis & fructibus Iunio & Iulio floret, vsus neglecti.

Vires & vsus Horti voluptatis causa habent, tamen si in oleum mandiqueat, Lobelius.

VIOLA MARIANA DODONÆI, QVIBUSDAM Medium.

Descriptio Radix vesca, dulcis, alba, longa, crassa: quæ caulem emittit plusquam bicubitalem, tere-

tem, hirsutum, asperum, in ramos diuisum, *folia* Trachelii siue Campanulæ maioris, angustiora, longiora, hirsuta, crenata, & modicè per marginem cuspa: flores ramulorum extremitatibus insident, calathii seu Campanulæ forma, maiores quàm Trachelii, ventriosi, oris in quinque lacinias diuisis, colore cœruleo seu violaceo, purpureo aut albicante, in quorum medio *stamina* latent lutea stilusque e-



rectior e, luteo pulvisculo resperfus: insidet autem totus flos calathio crebris thorulis hirsutis, inaequali, in quinque acuminata lobula floribus latens appressa distincto. Semen exiguum, spadicum.

Rapunculi *Diosc.* alterum *emend.* genus grandius Diosc. Medio vocat: apud

quem autore Cæsalpino, legendum Sciridi [folia similia] ut legit Orbazius [ac etiam Ruell. & Marcell. & Matthiol.] non in Indi, ut vulgati Codices habent.

Gefn. Rapi sylvestris genus maximum, quod aliqui Medion vocant.

Tabern. Hall. & c. Weiss Marien glöcklein, Viola Mariana alba: & Braun Marien glöcklein, Viola Mariana purpurea: Medium, Germ. Glockenbün.

C. Bauh. Campanula 17. Viola Mariana. Sunt qui Rapum silu. Diosc. alii eiusdem [Dodonæus] Raphanum silu. alii Medion Diosc. sed malè, autumant. Variat flore nunc purpureo, cœruleo: nunc suballido aut lacteo: Reperitur quoque flore pleno.

Gerard. Viola mariana, Mercurius violets Coentrie bels, & Viola Mariana flore albo. Rapum silu. Græcis *ραβδων*

Violam Marianam Recentiorum plarique Medion esse volunt, quamvis Viola Mariana, Dod. teste, non admodum respondeat Medio à Diosc. descripto. Quare non Medium, sed potius verum Dioscoridis Rapum silu. videtur (*ραβδων* *αγρια* *Rapum* quæ Græcis dicitur) cum cuius descriptione magis

conuenit. Cuius tamen descriptio superfluatorum quorundam accessione corrupta.

Viola Mariana varietates tradit Clusius. Viola Mariana quibusdam Medium creditur, ut plurimum quidem. Violacei coloris flores gestant: sed tamen etiam albos, interdum exalbidos, nonnunquam cineracei coloris, atque etiam versicoloris, hoc est, ex albo & violaceo, vel maculatum vel radiatum commixtos.

Violam Marianam Dodon. siue Medium quorundam habuit Genevæ in horto. Basilæa vidi in horto D. Felicis Plateri. Patavii in horto D. Cortusii, Iantuario. is vocabat Medium: Bononiæ in horto di S. Saluator, alburgo di S. Catharina: Montbelgardi ex semine mihi feliciter provenit in horto E. C. flore penè candido & purpureo copiosius: primo anno non fert caules, ubi autem semina caules tulit perig. & semine deduo se propagat. Nascitur, ut aiunt, in silvis & montibus, nec non in opacis quibusdam tractibus ut Matth. refert, plarique Italiae ac Germaniae locis: apud Belgas in hortis colligitur. Iunio, Iulio & Augusto mensibus floris eius productio: semen interea ad maturitatem pervenit, neque enim simul sed particulatim floret.

Ceterum, quod ad facultates attinet, si Dodonæo credimus, radix Viola Mariana refrigerantis & nonnihil adstringentis est potentia: cui, ut aliorum sylvestrium Raporum, apta est, & non incommode acetariis additur.

MEDIUM DIOSC. RAVVOLF.



Inter frutescentia sepeque in altum exurgit. Viola Mariana Dodon. persimilis est planta, nec ita obvia cuius differentia apparet, præterquam in foliis quæ in hac diuisa magis, Cichorii instar. Flores etiã magis panduntur, octo foliis in orbem dispositis constantes: radius austrius maior quâ capitulorum seminum, quæ tamen nondum erant matura: Ravvolf.

Ravvolf. Medium verum Diosc. & Mindium Rhazis, cuius icon apud Ravvolf par. 4. N. 284. Medium Diosc. vel Mindium Rhazis foliis Plantaginis minoris, Hist. Lugd. Quæ male conuertit Wedgwart vocabulum Germ. Plantaginem, cum sit Cichorium.

C. Bauh. Phyt. Campanula 18. Viola Mariana lacinia foliis, peregrina.

In profunda tenebrosa & aspera valle Libani: Ravvolf.

CAMPANULA MAIOR ET ASPERIOR folio Vrticæ.



Medium Descriptio
Ma. Viola seu Medium quibusdam dictum accedit: radix alba, Rapunculi, sapore non minus gratos, caules cubitales & caliores, huius in quibus altum autem nascuntur filia Vrticæ, pilosa, acutiora: flores ex foliorum albis cerulei, violacei, aut albi, nec similes, Marianaæ Viola, sed minores, calyce

parvo, nec ut in illa tortilis cannulato, in lacinias quinque, sicuti & flores, diuiso: stili triceps, colore purpurascens, albedo, vel herbaceo, succulentior, staminibus circumscriptur luteolis.

Fuchs. Campanula Germ. Halskraut hoc est, Ceruicaria. Gall. Gandsmyre Dame, ou Gantelle. Dodon. de flor. Rapum silvestre 2. Belgis Halskruyt. Ceruicaria maior, Græcè γαργαλις, præterque Vaulus. In his. Gall. Ceruicaria. Item Læti fol. Ceruicaria maior, cuius flores aut colore candidi, aut dilute purpurei, vel ad ceruleum inclinantes. Huius species quædam est foliis aliquando læuionibus: floribus elegantioribus coloris purpureo cerulei, cuius radix aliquot annis viuax restat, & Vere regerminat.

Clusius Pann. & iust. post. Trachelium foliis vrticæ, & Trachelium aut Campanula vulgò dicta. Campanula quibusdam herbariis vocata Archangelica.

Lobel. & Pena. γαργαλις, siue Ceruicaria & Vaularia, Belg. & Germ. Halskraut. Trachelium siue Ceruicaria: Vaularia Tragi & Herbariorum. Campanula Fuchsii & Archangelica quorundam. Trachelii varietates. Passim istud etiam asperis, fixis Angliæ & Gallo-belgiæ siluosis fructuat: sed strigosius, hilari minus & amœno aspectu, alioqui persimile & congener.

Thal. Harc. Ceruicaria maxima, foliis vrticæ maioris, caule sæpè trineubitali, floribus magnis ceruleis, quandoque etiam albis.

Tab. hist. hb. 2. & Icon. p. 412. 413. & 414. Ceruicaria, Vaularia, Campanula maior 1. Halskraut. Maior 2. Gross Halskraut. Tertia alba, Klein Halskraut. Ponit Taberna quidem icones: sed discrimen non tradit.

C. Bauh. phyt. Campanula n. folio Vrticæ. Variat flore candido, dilute purpureo, vel ad ceruleum inclinante. Reperitur & strigosior. Campanula 12. foliis Vrticæ, sed læuionibus, Dodon. Ceruicaria maior altera.

Gerard. Angl. Trachelium 1. maius. cantabrie bels. Trachelium 2. maius albo flore. Trachelium 3. maius Belgarum Lobelii, durch Trote voort [Tab. Ceruicaria 4. alba.] Trachelium 4. minus Small canterburie bels. Tabern. Ceruicaria 3. alba.

An Gelnher. hort. Rapi sylvestris genus mas

Ceruicaria
alia species

Tab. not.

foliis ferè vrticæ.

Schvv. Trachelium maius purpuro-violaceum
Braune Glocken / Braun finger hûlin. Trache-
lium maius albo flore. Ceruicaria alba Tra-
go, Weiße wald glocken, zapffenfrâut. Trache-
lium alpinum maximum. Ceruicaria maxima, ad
hominis proceritatem sæpè assurgit.

Locus &
tempus

In Pann. Austria, teste Clusio, nullæ montosæ
sunt silvæ, quæ Trachelium vrticæ foliis subcæ-
ruleo flore non alunt: subluniora iuga, vt
Schneeberg & alia similia, itidem quod albo flo-
re cit. In Silesiæ pratis & silvis cædvis saltuosis
inuenit Schwyenckfeldius: maius flore albo in
conuallibus ad Boberum vmbrosis Iulio floret.
Alpinum maximum, sæpè in foueis niualibus
vdis herbis assurgit, Iulio flores campanulati
prominent.

Passim in comitatu Montbelg. provenit Cam-
panula Fuchsi flore dilutè purpureo, vel ad cæ-
ruleum inclinante, vidi etiam candido propè
l'isle Burgundia, vnde transituli in hortum Illust.
Principis. In monte Rössberg propè Nassimuna-
ster inueni florentem mense Octobri, Geneuæ
etiam florentem Maio, Basileæ mense Iunio ex-
tra portam Strin in colle ad sinistram, & aliis
locis multis, radices similes Asphodelo, in syl-
ua quæ itur Basileæ in Birtze Marchionatus florens
Octobri: Vidi Pataui in horto Domini Cortu-
si. Campanulam Fuchsi flore omnino albo vidi
in dumetis eundo Basileam prope Feuray pa-
gum, mense Iulio 1607.

Vires &
Tèperam.

Gustu adstringit, vt hinc exsiccandi illi vim
esse quicquæ conicere queat. Adstringendi ha-
bet facultatem, idæ quæ decoctum stans vncè
ad oris exulcerationes, aliaque eiusdem mala,
quæ adstrictione indigent, confert. Vtilis etiam
haud dubiè ad alia quævis vlcera, ob insignem
quam obtinet in exiccando facultatem, Fuch-
sius. Radices porro omnium horum refrigerantis
potentiæ sunt & nonnihil adstringentis, possunt
autem omnes vnà cum aliis in acetariis eda. Sunt
etiam qui Ceruicariæ radicem decoctum aduer-
sus incipientes oris & tonsillarum inflammatio-
nes confectæ affirmant, Dodon. Radix alba tene-
ra in acetariis apta ieiunio verno præsertim, Lob.

CAMPANVLA SIVE CERVICARIA MA-
ior læuior, flore albo magno.

Descriptio



Nobis de-
dit Domi-
nus Agerius
plantam nomi-
ne Ceruicariæ
maioris flore
albo, foliis gla-
bris, differt mul-
tùm à nostra
Campanula
maior & aspe-
riore, ea enim
vix apparentes
habet pilos,
ferraturæ etiam
minores, nec ita
inæquales, flos
Campanulæ a-
lioqui magnus,
albus. Tota
planta prædicta
minor atque te-
nrior apparet.

CAMPANVLA ALPINA GLABRA FLO-
re diluissimo cæruleo.



minora sunt quàm Campanulæ nostræ minore
flore, flores etiam paulò minores videntur in
num latus versis, ex breui pediculo nutantes.

CAMPANVLA SIVE CERVICARIA BO-
noniensis paruo flore.



Insignis & di-
ligens Botani-
cus Dominus
Doctor Ager-
ius Medicus
Argentinen-
sis pulchram plan-
tam dedit nobis
nomine
Ceruicariæ Bo-
noniensis, vt-
pote quæ Bo-
noniæ copiosè
proveniat. Ea
licet non inte-
gra, bicubitalis
erat, caulis ro-
tundus, fungo-
sus, nonnihil as-
per, folia pæ-
caulem sine pe-
diculis hærent,

eum ferè amplectentia, in quo differt à nostra
Campanula repente flore minore, sunt etiam iis
latiora, latitudinis pænè trium vnciarum, longa
quatuor, plùs minùs, serrata, infernâ parte albi-
cantes pilos habent valdè exiguos: summities
quæ floribus vestita pedalis est, & quamplurimis
abundat Campanulis, quibuldam ex breuib.
pediculis cauli hærentibus, aliis ramulis breuib.
duarum aut trium vnciarum.

CAMPANVLA REPENS FLORE MINO-
re cæruleo.

Campanulæ Fuchsi affinis, sed radix impor-
tuna petulantia reptat, alba, crassa sic latius
fibrata,

fibrata, gustu dulci, suavi: *caules* cubitum vnum aut alterum alti, brachiati, subrubentes, ferè glabri in quibus *folia* alternata, serrata, minimum hirsuta, nec aspera, vt Campanulæ iam dictæ, & angustiora, quæ in caulibus quidem carent pediculis, at inferiora, vt latiora sunt ita longis pediculis sunt appressa: ex foliorum alis Campanulæ singulares prodeunt, violaceæ, magnitudine & formâ Rapunculi fatiui, apicibus chloris, stilo tricipiti, calyculo in quinque lacinias, quæ scilicet sunt floris lacinia, diuiso, Floris verò sextæ laciniae pilosæ conspiciuntur. Nondum expansus flos pentagonus est, interque angulos pulchrè carinatus. Figura quæ Fuchsiiana est, nec prima folia habet. nec in cæteris nimis affabrè picta. Tolerabilis tamen.



alis Campanulæ singulares prodeunt, violaceæ, magnitudine & formâ Rapunculi fatiui, apicibus chloris, stilo tricipiti, calyculo in quinque lacinias, quæ scilicet sunt floris lacinia, diuiso, Floris verò sextæ laciniae pi-

losæ conspiciuntur. Nondum expansus flos pentagonus est, interque angulos pulchrè carinatus. Figura quæ Fuchsiiana est, nec prima folia habet. nec in cæteris nimis affabrè picta. Tolerabilis tamen.

Gesner. de coll. stirp. Rapum minus suis radiculis serpens.

Dodon. de flor. & in fol. Rapi quartum genus.

Clus. in Pann. & hist. post. Trachelium aliud mollioribus foliis, radice mitè serpente, cuius rei causâ rei herbariæ studiosus est exola.

Montbelgardi in Horto Il. E. C. provenit mihi Campanulæ genus, radice reptante, quæ ita replet areas vt vix eradicari possit: eandem vidi in horto Di. Daucurtii in Audincourt, & aliis pagis vt Ran. Floret Augusto, Septembri & Octobri.

Basileæ copiosè provenire obseruavit Frater.

Similes facultates ac temperamentum huic Dodon. tribuit quod tribuebat Campanulæ Fuchsii, dicens, refrigerantis potentia & nonnihil adstringentis, ac radices edi posse in acetatis.

CAMPANVLA SIVE CERVICARIA MEDIA THALIO FLORIBUS CÆRULEIS PARUIS.

Cervicitia Media Thalii, locis montanis & soli meridiano expositis nonnunquâ prodest, caule tereti, aspero, foliis plurimis amictis, minoribus multò, viridioribus superius, inferius candidis, lanugine vestitis, quali folia Althææ, sicut & folia mediam figuram inter Vrticæ maioris breuiora folia & althææ referunt. Caulis vt plurimum vnicus est sine tamosis adnatis, saepenumèr tamen in plures diuiditur brachiatis virgulas. Circa medium ferè caulis vbi maiora folia exoriri desinunt, frequentes ægagropus adnascuntur, ordine per certa intervalla vsque in apicem caulis consequenter, ac ex alis peculiaribus ad latera erumpentes, tenuibus quibusdam foliolis iisque incuspatiis parum ac agminatim denesque sibi coherentibus constitutæ, ex quibus longa serie in scapo flores crebri prodeunt ele-

Tom. II.

ganter cærulei, similes prioribus, sed multò minores.

CAMPANVLA PVLCHRA à Tossano Carolo missa.



Huius *ca-* Descriptio
dix, non altè quidem vt illa demittitur, sed innumeris tamen fibris latè calypitem occupat, candidatibus, lactifluis, dulcibus, *caules* còpules duorum aut trium cubitorum altitudine concaui sunt, minimi digiti crassitudine, striati, minimum hirsuti: folia Vrticæ, Campanulæ maioris quidem formâ, hirsuta,

palmari & sesquipalmari longitudine, latitudine palmari, in ambitu serrata, alternatim ex certis intervalis cauli apponuntur: ex quorum alis singulis singuli flores, partim sursum vergentes, & partim deorsum inclinantes ex breui pediculo purpurascete, albidum cùm cæruleo, calathi effigie, siue Campanulæ, in quinque lacinias longas acutas partiti, foris glabri, intus hirsuti, oriuntur: apicibus totidem luteis, stilo dilutior qui in suprema parte in tres partes finditur, quæ circumflectuntur: Calix quinque cuspides longos habet: flore marcescente succedit magnum capitulum Mespilo simile, deorsum inclinatum, in quo semen. Folia inferiora crant in iconè nostra pingenda latiora.

C. Bauh. Phyt. Campanulæ 10. siue foliis Vrticæ latissimis, quam in horto Ill. Ducis Vviremb. Montbelg. collegit. Clusius hist. post. & Lobel. Obs. & Icon. plant. tom. 2. hanc videntur expromere nomine Trachelii maioris Belgarum.

Tossanus Carolus Pharmacop. Stirpium studiosissimus pulchram hanc Campanulam ex Burgundia misit: quæ quotannis Montbelgardi in horto Ill. E. C. floret Iunio & Iulio.

Locus & Tempus

TRACHELIUM CANDIDUM ANGLICUM MAIUS, FOLIIS FERÈ DIGITALIS VEL CAMPANULÆ.

Semina venusta & rarissime plantæ ad Lobel. Descriptio
miserit D. Thomas Pennæus Medicus Londinensis: ex boreali Angliæ tractu delata, vbi copiosa & nusquam alibi, vel à quoquam obseruata. Tota facie Cervicariæ maioris iam descriptæ ab similibus, sed folia ferè digitalis: Flores item Trachelii vel Violæ Marianæ, candidissimi & maiores & longiores. Caulis binum & ternum cubitorum surrectus. Radix fibrata, crassiuscula, lactescens, variè diuaticatur. Semen Trachelii, sed maius.

Lobel. Obs. Anglicum Septentrionale maius Trachelium candidum.

Vyy



Gerard/ Hi-
stor. Angl.
p. 365. Trache-
lium Gigan-
teum Angli-
s. Giantz Throx
reüuert.

Campanulam maiorem siue maximam, teste



Dodonæo, sūt
qui Columna-
rem & quidem
Plinius indicent,
cū tamen
herbæ Colum-
naris nomen a-
pud hunc non
reperiatur, Alii
Anthemum e-
iusdem faciūt:
sed legendum
lib. 26. cap. 8. E-
ranthemum,
quod Anthe-
midis species
est multū a
Campanulis
differens.
Camer. hort.
Campana py-
ramidalis siue
lactescens 1377

PYRAMIDALIS VALERANDI HIRSVTA.

Descriptio



PRIMO anno
mihī caulem
non produxit,
qui sequente
demum anno in
tantam excreuit
altitudinem, vt
facile lanceam
æquaret, hirsu-
tus, medulla al-
ba firsus, foliis
vestitus infernè
& supernè hir-
sutis, acuminat-
is, serratisque,
Campanulæ
Fuchsi acceden-
tibus: flores lōga
serie, Campanu-
las imitati, Ra-
punculi vulgati
haud maiores,

cærulei, per oras laciniati, ex vno pediculo plu-
res.

Locus

Pyramida-
lis

Quum Lugduni Medicum agerem prouenit
mihī in horto meo, ex semine per Valerandum
Dorez affinem ex Sclauonia delato, ipse Pyra-
midalem nominabat.

PYRAMIDALIS LÆVIS.

Descriptio

LACTE turget radix, Rapunculi similis, resti-
bili fertilitate, se multiplicans, etiam ex fru-
stulo repullulascens: ex qua caules trium qua-
tuorve cubitorum surgunt, leues: foliis vestiti
glabris, oblongis, fortuitis crenis incisis, verū
inferiora folia palmum aut sesquipalmum longa,
palmo latiora, per extremum ferè obtusa, & ea
quoque glabra, raris admodum cæsuris dissecta,
& vix dum serrata: flores à medio caule ad sum-
mum vsque fastigium cærulei campanulas oris
laciniatis exprimunt.

Videtur nobis Hist. Lugd. Pyramidalis nostræ
lævis duplicem & descriptionem & iconem pro-
ponere. Ac primam quidem pag. 642. sub hoc ti-
tulo: Pyramidalis Rapunculi genus Dalech. Al-
teram, p. 827. quam Campanulam lactescens
maiorē Lobelii, seu Pyramidalem Lutetianam
inscribit.

1377, præ reliquis plurimo lacte scatens.

Lob. Obs. Lactescens Campanula maior. Py-
ramidalis Lutetiana. Icon. Plant. pag. 197. Teut.
402. Tabern. hist. & Icon. Campanula Lactaria si-
ue lactescens 1148. g. l. f. c. i. n.

Gerard. Campanula lactescens pyramidalis
Ereople mille Bollflower.

C. Bauh. p. h. y. t. Campanula 2. lactescens.

Pyramidalis nomine ante plures annos, her-
bam vidi Basileæ in horto Domini Doct. Zvyn-
keri, vnde semen habui, quod satum Montbelg.
in horto Ill. E. C. prouenit, & sequenti anno se-
men tulit, hæc autem Pyramidalis differt à Vale-
randi Dourez Pyramidali, hanc enim ad tantam
altitudinem prouenientem non vidi, præterea
folia differunt, in hac glabra, in alia hirsuta, quæ
etiam in hac non ita serrata: radices vt Rapun-
culis, quæ facile se multiplicant.

RAPUNCVLVS MONTANVS, SIVE

Trachelium montanum.



Folia multa Descri-
propter
terram in qui-
busdam dua-
bus vncijs lon-
giora, in aliis
quadruplo ad
Echinum acce-
dentibus, ex
angusto princi-
pio sensim la-
tescentia, sen-
simque dein-
ceps in acu-
men desinen-
tia; vtrinque
hirsuta, non ni-
hil crenata, co-
stâ medium se-
cante. Inter
hæc surgit can-
lis ferè cubita-
lis, hirsutus, enodis, vno aut altero foliolo exi-
guo donatus: flores in caulis scapo superiore,
quinque aut plures, singuli in singulis pediculis
non admodum longis, magni, Campanulæ Fuch-
si similes, ex cæruleo albescentes, calyce hispido
basi completente: radix crassiuscula & lon-
guscu-

giuscula esuigrata.

Hist. Lugd. Trachelium montanum.

C. Bauh. phyt. Campanula 15. siue foliis An-

chus. Inueni in peregrinatione mea Rhætica, cum D. Gesnero Burnonii, florentem Iunio. Habui etiam Argentinae ex plantis Agerii, qui collegit in montibus Styriae prope Celvicam Nardum.

TRACHELIVM PVMILVM ALPINVM,

lanugine pubescens, singulis floribus ex singulis ramulis satis magnis.

T Trachelium pumilum Alpinum Clusii, do-
drantalis est plantula cauliculo striato, in
plures ramulos diuiso, quorum singuli sustinent
flos fati magnum, cauum, Campanulae instar
efformatum, in quinque angulos desinentem,
quemadmodum vulgaris Trachelii, aut Campa-
nulae vulgo dictae flos, cinereo colore praeditum:
floribus succedunt capitula latis magna, trigona,
nutantia, seu deorsum speeantia, quae continent
semen vulgaris Trachelii femini non dispar, sed
minus & exalbidum: folia quae per cauliculum
sparsa sunt, latiuscula basi eum amplectuntur, &
in oblongum mucronem desinunt: quae verò
summâ tellure stirpi inhaerent, latiuscula sunt, &
longiore pediculo innixa: radix pro plantae exi-
litate satis magna, candicans, supernâ parte in
plura capita extuberans, & quibuldam fibris hir-
suta: Tota planta lanugine pubescit, lacteo quae
succo abundat.

C. Bauh. phyt. Campanula 16.

Nascitur in Schneeberg, aliarumque vicinarum
Alpium iugis. Flores profert Iulio.

ALOPECVROS ALPINVS QVIBVSDAM

Echium montanum Dalechampii.

P Pollicaris crassitudinis habet radicem, sensim
gracilescentem, palmo longiorem, in apo-
phytes aliquot abeuntem, teneram, rubentem:
caulis sesquipalmaris aut dodrantalis, crassitie re-
spondet radici, cauus, singularis, hirsutus, crebris
foliis vestitus, aliis palmum ferè longis, aliis bre-
uioribus, potissimum superioribus, latitudine
semuncialis, hispidis, ad Echii folia accedentibus:
thyrsam trium vnciarum, aut palmarem, si maius-
cula sit planta, gerit, florum inter folia emergen-
tium ex caeruleo pallefcientium, oblongorum, &
per oras laciniatorum, erumpentibus è medio
staminulis.

Hist. Lugd.

Echium mon-

tanum Dale-

champii: aliis

Alopecurum

montanum.

Trachelium

dupontii, Clus.

Pann. Ceruica-

ria maior tenui-

folia, Thalo,

Trachelium

dupontii, Clusii,

& Ceruicaria

maior tenui-

folia, Camer.

hort. Camp s-

nula 14. foli-

Echii, siue Cera-

uicaria mar-


tenuifolia Tra-

gi. C. Bauh. phyt. cuius iconem expressam non-
dum vidit.

Alopecurum Alpinum quibusdam dictam, aliis Lorn:
Echii speciem, quod non placet, cum Geneuae ef-
sem, audiui reperti in altissimis Sabaudiae mon-
tibus.

RAPVNCVLVS SPICATVS SIVE CO-

mosus albus & caeruleus: itémque fo-
lio maculato.



Q Vasi par-
tum Ra-
puncium, vel
Rapunculum
vulgus plan-
ta minigita,
ob foliis radi-
cis, quâ sapore
& magnitudi-
ne cum culmi
Rapunculo
habet, simili-
tudinem: alio-
qui folia sunt
Violae Martiae,
longis appen-
dula pediculis,
nonnunquam
nigra miculâ
notata, quan-
quam videas
& stricta ob-
longa, in cau-
le bicubitali,
inani, angulos-
so, lacmanan-
te: in cuius fa-
stigio spicatus
pulcher flos
caeruleus aut
purpureo-viole-
ceus, ex inul-
tis corniculis
circa basin in
segmenta ar-
cuata fissis
compactus,
Huius flos al-
bus cinereus-
ve quoque re-
pertur.

Plant. Icon. p. 329. Rapuntium maius Alopecu-
ri comoso flore, Lob. 178. Test. 403.

Tabern. Icon. & hist. Rapunculus nemorosus. i.
Wald Rapunzel.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Rapunculus 2.
siue spicatus albus, foliis maculatis mas, & non
maculatis foemina, floribus albis cinereis. Ra-
punculum 3. siue spicatum purpur. Dod. Rapum
silu. maius Lob. Rapuntium maius Alopecuri
comoso flore. Rapunculum 4. siue spic. caeruleus.
Trago Rapunculum silu.

An Cest. p. 19. c. 30. Duæ flosculos ferunt ve-
luti in spica dispositos dense, quarum vna foliis
Rapunculi constat: Alcea Archangelicæ mino-
ribus.

Dodon. Gall. Rapum syluestre maius, Rapun-
tium maius & secundum. Gall. grande Rapunzel.

Y y 2



Germ. *Groß Rapünzel*. Belg. *Grote raponces* len, quod sine dubio est *αλμυλαυρ* & Cauda vulpis à Theophrasto descripta, Lat. de flor. Rapi inquit, sylvestris sextum quoddam genus. Rapunculum sextum, colore aliàs candido, aliàs caeruleo, aliàs purpureo, nonnulli Alopecuron appellant: Sed alia est. Tragus describit flore caruleo: vocatque Rapunculum maius & Rapunculum sylvestre, Germ. *wald Rapünzel*. In hist. Germ. Sic audere vnd *gros Rapünzel*.

Lonj. speciem globosam habet flore purpurante. *wald rapünzel*; *groß wald rapünzel*; *Rapunculum sylvestre*.

Lobel. & Penz. Adu. *Rapuntium maius* Alopecuri comoso flore: Lobel. Obs. pingit cum longa spica.

Gesner. hort. Rapi sylvestris genera in sylvis ac montibus, quorum flores seu in spica sunt, alii caerulei, alii pallidi. An eadem de col. stirp. Rapum sylv. floribus vnguium instar recurvatis? Item Rapunculi sylvestris genus floribus caeruleis in se recurvis?

Clus. in Pann. & Hist. post. *Rapunculus* Alopecuroides longiore spica, aut breviori, coloris albi vel violacei.

Schvv. *Rapunculus montanus albus*, *Rapunculus montanus caeruleus*.

Thal. *Rapunculus* sylv. communior, foliis Cervicariae mai. mucronatis, caule cubitali, levi, teretibus, flore spicato, ex viridi leniter albente: passim in pratis & locis quibusdam montanis. Mihi vocatur *Rapunculus* sylv. spicatus albens: licet eius speciem in Thuringiaca silva, floribus proflus candidis viderim. Eiusdem species floribus caeruleis, &c.

Camer. hort. *Rapunculus* flore purpureo, candicante: spicato purpureo & albo.

Geneux albus cum longa spica, variis in locis & provenit, ut inter Urbem Montbelgardum Charmontey, & in sylva le Chesnoy: habui etiam in Horto E.C. à me plantatum, *Rapunculum* flore purpureo & albo globoso, ferè ut in scabiosa, foliis minoribus, quale Geneux etiam vidi, ubi provenit aliud genus cum longa spica plena flosculis albis in monticulo la Bastie. Hoc genus coctum comedi in acetariis Montbelgardi: tale reperit Frater in monte Muxensi Basiliensium, *Rapunculum* spicatum reperi mense Februario in montibus Euganeis Italiae. *Rapunculum* flore globoso Dalech. vocabat, ni fallor, Aphyllantes genus, cum qui globosum habet florem: Ex vicinis Montbelgardo locis magnum *Rapunculum* spica longà transfusi in Hortum E.C. *Rapunculum* flore albo folio maculato observavi florentem Augusto, apud Fontem aridum S. Petri. Minus hæc est Lobelio obuiam multis locis nec nisi montosis aut aliosis pratis & cœualibus, vti sunt Mindeni & Norbonæ Aquitanicæ vicinis pinguibus, etiam Belgii & Angliæ nemorosis. Natales eius, inquit Schvv. montosa & alsiola prata, conualesque nemorosa. Iunio spica viget.

Radix, ut scribit idem Schvv. enck. priusquam caulem protrudat, elixa cum sale, aceto & oleo macerata, cibi appetentiam parit, stomacho prodest & urinas elicit.

RAPUNCVLVS FLORE GLOBOSO purpureo.

Descriptio

Urbitali assurgit altitudine caule satis gracili, parte inferiore purpurascente quodammo-

do, supernâ viridi cui inhærebant aliquot folia, quatuor uncias longa, in ambitu serrata, dodran-



tali pedicelo innixa, & ea quidem quæ infimæ parti caulis adnata erant, secundum pediculum, vnciam aut pollicem lata, deinde sensim in mutationem deficientia, quæ verò medio cauli, & summæ eius parti inhærebant, longè erant angustiora, & breviori petiolo fulta, non minus tamè longa: summum caulis fastigiû desinebat in breuem & quasi orbicularem florum spicâ,

quæ folis staminibus ex purpurâ caeruleis, consistere videbatur: quibus deciduis apparebant caliculi pentagoni: radicem non adferebat, qui in itinere observabat, quia erueri non potuerat, inter saxa & confragosos locos nascentem. Tota autem planta lacteo succo abundabat, non secus ac reliqua genera.

Rapunculus Alopecuroides orbiculari penè spica Clus. Hist. post. sine icone.

Geneux collegimus globosum purpureum radice longâ.

RAPUNCVLVS MINIMVS FOLIO TENUI GRAMINEO.



Omnium Rapunculorum minimus in montibus Rheticis inuenimus, cui radix crassiuscula: caliculus tenuis dudum vnciarum comosum gerit florem caeruleum, Rapunculi spicati: folia caulem comitantur, ipso penè longiora, filii instar tenuia, numerosa. C. Bauh. phyt. *Rapunculus* 7. siue umbellatus folio gramineo.

Florentem observavi Iunio in Rhætia.

RAPVN-

RAPUNCVLVS ALPINVS
partius comosus.

criptio.



Radice squamis veluti compa-
ctili, ex veteri-
bus foliis resi-
duis, vt in Nar-
do Celtica pe-
nè videre est,
crassiuscula,
sensim attenua-
ta, praeclitus est:
folia fundente
numerosa, vni-
ciam vnā aut
alteram longa,
culmum lata, ad
Nardum Celti-
cam accenden-
tia, longis nixa
pediculis: inter
quæ cauliculus
furgit, duum

vinciarum, non sine foliis quæ angustiora: cuius
cacumini flores insident Rapunculi comosi, qui
cærulei, quantum ex sicca planta colligere licet,
stylis longis recuruis prominentibus: picta secun-
dum eius magnitudinem, sunt tamen nobis plan-
tulæ quadam paulò maiores. Hæc planta vide-
tur habere nonnulla similia cum Rapunculo mō-
tis Baldi, cuius etiam vascula hîc pingenda curau-
imus, quia iam sculpta erat eius figura, vt paulò an-
tè dictum.

Habui ex plantis Di. Agerii pro Rapunculo al-
pino Cam. flore cæruleo collecto, in Styriæ mon-
tibus.

RAPUNCVLO COMOSO SPICATO
aliquatenus affinis ex Baldo.

criptio.



Palmaris est
caulis ad-
imum squam-
atus, foliis infimis
Buttonariæ Bel-
lidis cæruleæ di-
ctæ similibus, su-
perioribus Belli-
dis maioris pro-
fundè serratis, la-
tioribus quàm
inferiora, qualia
etiam in summo
caule radiatim
crebra flori subi-
ciuntur, qui cau-
lis comosus: sin-
gulares flores et-
iam manifesti,
vtrem inflatum
referentes, imò
parte laxiores. al-
bicantes, sensim

tenuantur in cerutem violaceam per extremas
oras crenatam, vnde longè florem supereminens,
stamen tenue nigricans in tortiles veluti capreolos
desinens emicat.

Hanc eandem plantam ni fallimur collectam
Tom. II.

in Bassauensibus montibus accepimus à D. Age-
rio, in qua folia vndique serrata & latiora cum
vasculis ad Rapunculi vulgaris vascula accenden-
tibus, quæ curauimus appingenda in tabella Ra-
punculi parui Alpini comosi, qui nondum erat
sculptus.

De hac planta hæc tradidit Ioh. Pona in de-
scriptione montis Baldi. Trachelium petræum
minus in ipsius Baldi aluonibus summitatibus,
cuiusvis alius plantæ steruissimis, inter præcipi-
tes illas cautes ab eisdem veluti cadentibus pen-
dens, germinat. Eam fusè describens, ac addens
perennem & adstringentem esse plantam.

C. Bauhino, dū Rapunculum n. sine Alpium
spicato similem collectum in Baldo D. Guilandino
ostendisset, is Rapunculum montanum, at
Nobilis. Cortusii Cantabricam alteram Angu-
laræ nominavit. Eundem à Dre. Io. Neudorffero
accepit, vt apud Matth. scribit, cuius vna ra-
dix, quæ tuberosa, est inæqualis Rapunculo vul-
gato triplo maior: Ab eodem & duas alias Ra-
punculi species ex monte Sumano, necdum des-
criptas habet.

Iconi nostra sicuti & descriptio factæ sunt ad
plantam siccam, quam adhuc habemus, quæ de-
lata fuerat ex monte Baldo per Abrahamum Be-
chium Medicum, quamque Frater C. Bauhinus
Basileâ misit.

Rapunculi
montani.
Cantabri-
ca 2.

RAPUNCVLVS SONCHI FACIE
vmbellatus.

GVilland. de Meta Medicus rediens ex pere-
grinatione Italica communicabat Rapun-
culum numquam antè Clusio conspectum, qui
abruptus similis erat, vt Rapunculus flore glo-
boso purpureo, & sine radice, quam eximere non
potuerat. In pedalem autem excreuerat altitudi-
nem, vel etiam breuiorem: plura, quàm Primum
habebat folia, breuiore pediculo, eoque plano
subnixa, supernè viridia, infernè exalbida, instar
foliorum Sonchi, quibus valdè forma responde-
bant, erant enim, vtilla, in ambitu dentata, sed
minora: summo cauli innitebatur veluti vmbella,
longiusculorum calyculorū striatorum, in quin-
que angulos desinentium, in quibus stas, coloris
non comperti, quia neque ipse Meta referebat,
neque villus, in totâ plantæ umbellâ, restabat, ex
quo coniecturam facere licuisset.

Considerandum quantum Rapunculus Son-
chi folio Clusii differat à Rapunculo, montis Bal-
di antè dicto.

RAPUNCVLS CRETICVS PETRO-
marula.

Herbam teneram lacte turgentem floribus
cæruleis visui gratam Imperati, sic des-
cribit Honorius Bellus. Folia profert ci-
choracea, magna, profundè incisa, in orbem dis-
fusa, saturè virentia, infernè splendentia, ad
purpuram aliquando tendentia, vt Cyclaminus,
læuis, cum autem semine nata prodit, prima eius
folia Violæ nigre foliis simillima sunt, rotunda, &
aut nihil, aut parum duntaxat serrata: cauliculos
autem multos habet, rotundos, striatos,
bicubitales, aut tricubitales: quibus innas-
cuntur flores copiosissimi, purpurei, hyacinthi
Orientis florum æmuli, densè compacti, vt spici-
cam, eamque magnam referre videantur: quibus

inungi: At si vel florem vel eius facultates spectes, videtur sanè ad Galiospin referenda, de qua Diosc. lib. 4. cap. 90. Nos Campanulam seu Nollam silv. nuncupamus.

An Ruell. lib. 3. hist. cap. 37. Baccharis herba, nostrates Officinæ non norunt, rura apud nos Dux Mariæ Chirothecas appellat.

C. Bauh. phyt. Digitalis 1. seu purpurea. Digitalis, inquit is, dicta à florum similitudine, qui digitale referunt: Sunt qui ad Verbalcum, alii ad Alismatis alterum genus apud Plinium referunt.

Digitalis purpurea *daunulus* Tabern. Germ. fingerkraut/ fingerhütt/ braün fingerkraut/ braün fingerhütt/ wald glöcklin & wald schell. B. Vinger hoer cruyt. Gal. Digitale, *digitier, gants* nostre Dame. It. *ganteili*. Angl. foxe glouc. Hung. *Dy fia gyzeu fia*.


Digitalem purpuream habeo in Horto Exc. C. quam plantavi & seminavi, collectam propè Girarnegni vbi fodinæ argenti, copiosè etiam reperi inter Masinunster & S. Thamarix in monte Rolsberg, vbi etiam collegi semen, mense Octobri florebat adhuc sub arboribus, altitudinis hominis, ni etiam maior, cum foliis latis & valdè hirsutis: non longè à Lutea provenit, & in montibus circa Thermas Plumbarias florens Iunio. Geneuz habebam in horto, Bizantii vidi in horto Domini Doctoris Chiffleti, Basileæ in horto Domini Doctoris Fœlicis Plateri: Bononiæ in horto S. Salvatoris al burgo di S. Catharina. Montbelgardi in Horto E. C. floret Iunio, Iulio, & Augusto, flore purpureo & pænè rubello. Semine maturo Iulio: prope Castellum Passavant Ludrensis ditioris. Flore albo in horto Montbelg.

DIGITALIS FLORE MAGNO CANDIDO
B. Scabitalis est planta, cui *radix* digiti crassiter. *B* dine, alba: *folia* Digitalis purpureæ, hirsuta: *florum* magnitudo par, sed color lacteus, inferna parte intrinsecus punctis fuscis aspersis.

Icon. Plant. p. 572. Digitalis alba. Teut. 674. Digitalem flore albo à se visam Basileæ scribit Fr. Casparus Bauhinus: Eam ego cum pulchro magno flore purpureæ similem habeo Montbelgardi in horto Ill. E. C. florentem Iunio & Iulio.

DIGITALIS LUTEA FLORE MAIORE,
folio latiore.

Minor huic quam Purpureæ magnitudo: nec dissimilis *radix*: *caules* angulosi, nonnihil hirsuti: *folia* angustiora, longa, infernè nervis hirsutis rugosa, superne penitus glabra, atrovi- rentia, in ambitu crenata, sapore subamaro & acri: *flores* Digitalis purpureæ pares, fors in- tūque hirsuti: sed colore, extra quidem di-



lutè luteo, intus verò croco saturatiore, languidèque luteo versicolores.

Figuram Fuchsi Dodon. Gall. habet, non autem describit: sed tantum colore floris luteo distinguit à purpurea, licet foliis multum differat. Digitalis tertia eidem de flor.

An Digitalis lutea Anguill. Digitalis Fuchsi minor flore maiore, Gesner. hort. Digitalis maior flore grandiusculo pallido, Cæsalp. Digitalis lutea, Geelfingerhütt, Fuchf. Thal. ac Tabern.

Casp. Bauh. phyt. Digitalis 2. siue lutea magno flore. Sunt qui Calathianam Violam apud Plin. lib. 21. cap. 6. censent. Hæc non solum floris colore à purpurea variat, sed & foliis, quæ in illa Verbalco similia, in hac verò ex viridi nigricantia, sed lanuginosa.

Digitalem luteam flore maiori luteo reperi copiosè florentem Iunio inter Montbelgardum & Metuelze, eandem habeo in horto E. C. per me satam, vbi ex luteo pallido & albicante florens Iunio & Iulio: Bononiæ in Italia vidi in horto S. Servatoris al burgo di S. Catharina: Quum essem Geneuz reperi in monte Thairi mense Iunio cum suis magnis floribus, foliis latis & hirsutis: prope Castellum Passavant in Ludrensi ditioris flore ex luteo albicante copiosè florentem Iulio vidi.

DIGITALIS FERRUGINEA FOLIO angustiore.



Tres aut quatuor cubitos altus est *caulis* mediocriter crassus, teres, lavis, cuius *scapus* summus in alas aliquot scinditur: *folia* Digitalis subul- tæ angustifolia foliis proxima, longa, angusta, acuminata, atrovi- rentia, nervosa, aucta parte subhirsuta, leui crenarum vestigio per ambitum incisa, alternatim cauli adna-

scuntur: *flores* longa serie thyrsoidè dispositi, Digitalis purpureæ, breviores, rigidiores, fors toti hirsuti, ferruginei, intus eodem colore saturatiore & striis variegato picti, labro productiore villosa dependente, in medio ritu hiantè latentibus sub superioris folii margine apicibus luteis: insidet autem floris recurva basis calyci stellato quinque radiis constante.

Digitalis giluo flore aliàs ferruginea, angustiore calathio, foliis atrovi- rentibus Lob. Obs. Digitalis ferruginea Ic. plant. p. 573. Teut. 675. C. Bauh. phyt. Digitalis 4. siue angustifolia flore ferruginea.

Anno 1592. primùm à me visa Digitalis quam Ferrugineam existimo vocari: floruit pulchrè in horto Ill. E. C. per me plantata: missa autem fuit planta per Insignem Medicum D. Christopho-

Descriptio

Locus & tempus

Vires

rum Schwartz ex horto Ill. Ducis Wirtembergici Principis mei, cui præest, pulchra sanè planta quæ floruit Iunio & Iulio.

Tragus cum Digitalis amara sit herba, facili colligi posse autumat, illam naturâ suâ calidam & siccam esse. Itaque usum illius extare posse in iis, quæ ex calfactionem, extenuationem, absterfionem, & purgationem exposculant. Fucius asseueranter scribit, herbam hanc haud dubiè cum opus est extenuatione, absterfione, purgationis & obstructionis liberatione, efficacem admodum esse. Nam, vt testatur Galenus lib. 4. simpl. fac. cap. 17. amari sapores abstergunt, & expurgant, & quæ in venis est, crassitiem incidunt: quamobrem menses etiam quæ amara sunt mouere possunt, vt ex thorace & pulmone pus educere: potest ergo hæc herba ferè omnia quæ Gentiana. Plurimi verò fit vulgarior illa & purpurea ad omnia vulnera sananda, inquit Aduersaria: de qua etiam in Obs. Lob. Somerseti Angliæ rustica turba huius decocto febricitantibus purgationes & interdum superpurgationes & vomitiones, humidioribus aluo, molitur.

DIGITALIS FLORE MINORE, SVBLVTEO, angustiore folio.

Descriptio



tanquam thyrsus longa serie effigiar tes, quam ortu diuerso, eodem tamen ferè omnes vergunt, dimidio minores Digitalis purpureæ floribus, colore luteo in herbaceum languente, idque tam intus quàm foris, labro intrinsecus villosa, quorum vnicuique ad pediculum folium acuminatum penitus glabrum est appositum. Semen in loculis aliarum huius generis more.

Gesner. de col. stirp. Digitalis flore minore, albiore: Eidem hort. Digitalis maior flore maiore, cui fortè attribuendum nomen quod citat Spiz tründ Fraus. Dodon. de flor. Digitalis quarta flore subluteo. Digitalis lutea, Aduers. C. Bauh. Digitalis seu lutea flore paruo. Duas Lobelius Icon. pingit. Hanc enim nostram minore ramo expressit, quæ ad bicubitalem altitudinem apud nos excreuit, foliisque est longiore, & latiore, pallidiorèq; quàm sit Digitalis luteæ flore magno. Quam verò pingit oblongis angustisque foliis, necdum vidimus. Hæc censetur Damalo-

nium Dioscoridis, & primum Plinii. Fistula pastoris Auicennæ.

In peregrinatione nostra Rhætica cum Gesner. Loc. & tempus
nero Digitem cum floribus minoribus reperi, cui ascripti flores huic albos esse odoratos, folia satis solida, & glabra, bicubitalem caulem & floruisse Iunio circa Walsart. Digitem hæc Genevæ ex vicinis montibus in hortum transtuleram, virebat mense Ianuario, florebat Iunio. Basileæ quæ itur Moutets, in monte Moutets, & iuxta Basileam extra portam S. Albani, florens mense Iulio. Frater obseruauit etiam in monte Munchstein vicino. Montbelgardi quæ itur Dux, & eundo Abervillars. In monte Rolsberg prope Malmunster inueni adhuc florentem Octobri, altitudinis trium circiter cubitorum, flores tamen minores multò quàm in Lurea quæ minor, huic folia glabra. Montbelgardi in Horto Il. E. C. mense Iunio, & Iulio & Augusto, florent pulcherrimè flores ex luteo ferè albi.

IESMINVM MEXICANVM, SIVE FLOS mexicanus multis.

CAP. III.



Iesminum Mexicanum à natalibus dixerunt plantam radicem nitentem, et aliam, Midrag, & si mli, cubitem longitudinem sæpè excedente, paucis fibris donata, circulos Mechoacæ instar si transfusa secetur ostentante, foris nigra, intus alba, sapore primum fatuo, deinde nonnihil acris, & fauces vexante: quæ

terram versus in cervicem paulò minorè, rugosam desinens, caules deinceps plures producit proceros, quadrangulos, nitidos, nonnihil hirsutos, succulentos, qui in ramos diuiduntur, non illos quidem oppositos, sed æquos tuberoso ad ortum & veluti geniculato principio, mox alios aliosque eodem modo pariter, caulis instar quadrangulos: folia ramorum origini subiecta aduersa parti ramo vacuæ foliis respondent, foliis Solani Bellæ donæ similia, acutiora, aucta parte nonnihil candicantia, vtrinque glabra, sapore feruido & virente: flores Solis impatientes ex ramorum alis, eorumque fastigiis ex breuibus pediculis Conuoluuli maioris sed minores, itidem vt illi integri, in calathum lævisculum, plicas quinque habentes diffunduntur, sensimque in tubulum gracilescens, globulo paruo folliculis multitudine amplexo inseruntur, colorum festiua & hilaris varietate ludentes, iam lutei, iam puniceæ, alias puniceo luteoque confusis versicoloribus [quam varietatem in eadem planta est obseruare] fibrarum cisthis è tubulo prominentibus, odore.

odore non inuauit. Vnicuique flori succedit *semen* pulchrum magnum, Ciceris ferè, pentagonum, rugosum, nigrum metidollà alba, quod relicto folliculo suo faciliè decidit.

Et licet nunc adeò vulgaris sit notitià, vt nulla ferè sit opus acuratori descriptione, Clusi tamen Historiam, vt qui plura notata digna obseruari assumeret libuit. Primum igitur emergit *Ocyzi* quod *Cereale* nonnulli cognominant, aut *Cercæ Lutetianæ* ferè modo: deinde caulem promit cubitalem vel etiam interdum ampliore, pollicari crassitudine, succulentum, firmum, ex viridi flauescens, frequenter vt *Balsaminæ* caulis geniculatum, & in multos ramos eodemque similiter nodulos diuisum: qui ex ipsis prodeunt, non bini vtrique, & ex aduerso oppositi, sed singulares duntaxat, alternatim modò in vnam, modò in alteram partem vergentes, & quem primum seruarunt ordinem aut seriem, perpetuò ferè retinentes, hoc est, vt tertius, quintus, & septimus ramus in eandem partem spectent in quam primus: quartus verò, sextus, & octauus [si modò tot primariis ramis planta sit prædita] eodem latere nascuntur quo secundus: folia in singulorum ramorum nodis bina aduersis pediculis semper nascentia, Siliquastri foliis præne similia, viridia, satis carnosà, succulenta, circa pediculum ampla, extremo mucronata, quæ trita, Siliquastri grauem odorem, gustata verò, ingratum saporem, & tandem illius, vel foliorum Tabaci etiam acrimoniam propemodum referunt: flores in extremorum ramulorum alis singuli, longi, concaui, in quinque sinus, antequam aperiantur, complicati, explicati verò Tabaci floribus non valde dissimiles, non tamen in mucronatis angulis, vt illi, desinentes, sed in obtusos, Conuoluuli florum instar, Tabaci etiam floribus ampliores, elegantissimà interdum purpurâ, siue Kermesino colore nitentes, nonnunquam Lateritii, aliquando flauï, aut pallentes, interdum prorsus albi, vel exalbidit duntaxat, nonnunquam obsoletè rubentes aut flauescentes, læpissimè binis coloribus simul elucescentibus, vel purpureo mediam floris partem occupante, aut radiis modò purpureis alternatim totum distinguentibus, vel interdum magnis, nonnunquam exiguis purpurascens maculis vario situ & mixtura per totum florem, vel flauescens, pallescens tunc, aut album, candicantem tunc, vel obsoletum, aspersis, odoris satis suavis, & Narcissinum quidpiam referentis, sex oblongis staminibus, stiloque paulò longiore è medio flore emergentibus: valde autem caduci sunt hi flores: nam cum roctu explicari incipiant post die sub horam octauam antemeridianam [per æstus præsertim sese contrahere incipiunt, florum conuoluuli modo: at temperiore aurâ, integro nonnunquam die expansi permanent, & sub noctem duntaxat contrahuntur: singulis tamen diebus alii recentes aperiantur, qui, si integri quotidie decerpantur, & inter chartas reponantur [diu enim colorem retinent] atque deinde inter se conferantur, iisdem quidem coloribus constare deprehenduntur: ac eorundem situ & mixtione, inter se variare, quisquis diligenter obserauerit, animaduertet. Quæ sanè insignis varietates, quotquot istum florem obseruant in summam admirationem, non immeritò rapere debet: etenim diutissimè viret, & à Iulio mense ad Octobrem vsque [nisi pruina interueniat] numerosâ florum sobole luxuriare solet: caliculi flores amplectentes, & in quinque mucronatas

lacinias sunt diuisi, virides & quasi membranacei, in quibus vnicum semen, nullâ membrana siue pericarpio inclusû, mucrone, cui flos infedit obtulo, infima verò, quâ caliculo adhæret, parte, tanquam exiguâ coronâ ornatum pentagonum ferè, baccæ myrti propè magnitudine, inuidè viride, maturitate fulcum, & quibuldâ veluti tuberculis obditum, spontè, vel tenui vento, vel leuissimâ cômotione decidens, nucleûque continens album, qui tritus in candidissimam, & amyli instar niueam friabilemque pulpam resoluitur: radix satis crassâ & paucayâdus est, intus alba, foris nigra, aliquot fibris prædita, gustu nonnihil acri, cui admista sit superficialia quædam dulcedo. Eam licet annosâ inuidè censeremus [nam singulis annis nobis erant ferenda, hyeme radicem in horto relictam corrumpente] viuacem tamen esse, ab optimo & peritissimo viro Sebastiano V Volmario Ill. D. V Virtemb. Pharmacopœo, & horti Medici tum temporis Præfecto, sumus admoniti. Is enim cum sub Autumnii exitum aliquot plantas eruiisset, & caule præciso, ex illis vnam, propter formæ elegantiam excicandam seruasset, initio autem Martii sequentis cuidam amico ostendere vellet, eam succulentam & quasi reuirescentem deprehendens, terrâ in fictili obruit, & paucos post dies folia proferre cœpit, deinde circiter Cal. Iulii etiam flores. Cuius rei postea nos etiam aliquoties periculum fecimus, atque etiam aliî nostro exemplo. Sed exigui momenti est compendium illud conseruandarum hyeme radicum: nam notio Vere terrâ commissa, forsitan flores proferent quindecim diebus antè quàm illa plantæ, quæ semine terræ eodem tempore credito, surt nate. Aliud autem genus habuimus, quod licet à superiore, caulis magnitudine & crassitudine, ramorûque situ & foliorum formâ non differret, color tamen stolonis & florum dissimilis est: nam dum primum terrâ emergit, caliculi foliorûque pediculi, vt Betæ rubræ iam recens nascentis, purpurascunt, manetque is color in adultæ etiam caule & ramis: flores verò rubente nitidissimâque purpurâ infecti videntur, sex etiam tenuia stamina longiorumque stylum continentes, eiusdem cum superiore odoris. Hi verò non mutantur, sed vnus perpetuò sunt coloris, & quem primi habuerunt, reliqui deinceps retinent: semina in caliculis singularia, superioribus respondentia: radix non dissimilis. Hoc genus è superiore semine, cui rubri flores infederant, originem trahere non est dubium, quia proximo anno & aliis subsequen-
tibus, vtriusque generis semina seorsim terrâ ma-
dauius, vt diligentius istam varietatem & colorum distinctionem obseruare possemus, & competimus ex rubri floris semine nullas alias stirpes prognatas, quàm eas, quæ rubros flores darent. Idem periculum fecimus de grani flauo flore genitis, è quibus prouenire obseruauimus, quæ nullos alios flores darent, quàm flauos. Simile etiam de alborum florum semine factum periculum, ex quo natæ plantæ, albos quidem initid flores dederunt: sed qui sub Autumnum primum explicabantur duorum colorum euadebant, commixtis in eodem flore albo & purpureo, minùs tamen quàm in versicolore primum descripta. Illud præterea obseruabam in ista distinctione, ex solis plantis rubræ semine natis, statim ab exortu initio agnosci posse, quos flores sint daturæ: ex versicolorum autem, flauorum & alborum semine prouenientibus, nullum certum indicium, si mixtæ sint satæ, sumi

Admirabilis 2. rubra flore

Admirabilis flauo flore

Admirabilis albo flore

posse, quia eiusdem omnes sunt coloris in tene-
ta atate. Aliud porrò Rubræ genus mihi Viennæ
Iasmin rosso natum, semine ex Italia allato *Iasmin rosso*, hoc est
Iasmini rubri, nomine: in fictilibus quidem na-
tæ plantæ, pusillæ & humiles erant, latè nihilo-
minus ramos fundentes: quæ autem in horto
latæ, superiori generi rubros flores gerenti lon-
gè ampliores, & latissimè ramos spargentes, ead-
em serie quâ in suprâ descriptis alternatim na-
scentes, eundemque ordinem seruantes, vt vide-
licet alternis in idem latus semper vergerent, at-
que spectarent, ipsi similiter cum suo caule ad-
modum succulenti, & frequentibus nodis siue
geniculis præditi, atque magna ex parte purpu-
rascentes: folia in hoc genere magis atra, magis
splendentia, interdum maiora, altera parte ma-
gis prominula, & inferius suum exortum in ner-
uo habentia, similis tamen cum superioribus &
odori, & saporis: flores aliis forma pares, eod-
emque modo ex postremarum alarum sinibus
nascentes, oblongiores tamen, tenuiores, & co-
lore dilutius rubente, extremâ etiam parte mi-
nùs ampli, sex similiter stamina cum stilo in
meditullio continentes, suauemque odorem
spirantes: semen in caliculo, rubro alteri simile,
hoc est, angulosum, & tuberculis oblitum, sed
breuius & magis crassum: radix etiam breuior
& crassior alterâ, interdum in binos aut ternos
ramos crassos diuisa. Magis serotina est reliquis,
& nisi Solem valdè apricum habeat, vix ad fru-
gem peruenit in frigidioribus regionibus. Ex ra-
dicibus tamen, per hyemem in fictili siccâ terrâ
pleno, conseruatis loco calido, plantas Viennæ
habui, quæ maturum semen protulerunt: sed
cùm per meam absentiam, ex horto non essent
erutæ (suâ illa hyeme anni 1586. corruptæ sunt,
& genus illud mihi intercidit: Lugduni verò apud
Batauos semine peregrè accepto, denudè
natum 1599. sed illud mirum in omnibus his
plantis & obseruatione dignum, quod, cùm ta-
bescere incipiunt, primùm folia, deinde integri
ramorum articuli simul decidant, & circa nudos
iam remanentes nodos, candida quædam efflo-
rescentia interdum adnascatur, quæ temporis
successu concreta, falsi gustum referat: cuius po-
stremæ notæ C. V. D. Ioach. Camer. pro nostra
amicitia primus me admonuit. Caterùm peregrina
& venusta hæc planta, varia pro regionum di-
uersitate obtinuit nomina: Etenim ex Hispaniis
semen primùm missum est, *Marabillas del Peru* ap-
pellatione, propter admirabilem florum in ead-
em stirpe varietatem: deinde *arreboleras* no-
men inditum: ex Italiâ nunc Indici, nunc Mexi-
cani *Iasmini* nomine, ob suauem videlicet eius
florum odorem: Belgæ *Solanum odoriferum*, à so-
liorum cum Solani foliis similitudine, & florum
odori gratiâ vocarunt: Peruanos, à quibus ini-
tiò semen ad Hispanos peruenit, *nachal indi*,
crassâ & in palato formatâ pronuntiatione, no-
minare intelligo: Mulierculæ Viennenses, apud
quas etiam in deliciis est, *Geschefet Indianis*-
Heblumen, id est, versicolore Indicos flores
nuncupant. *nachenus ille*, qui videtur nobis si-
cutus huius Mexicani floris malè Arbori tristis
quondam appinxisse: eius autem figura meliùs
placet quàm Plantini.

Gelseminum rubrum nuperimè visum flori-
bus puniceis putat Cæsalp. Mandragoræ apud
Theophr. vocari. Sed non placet Cæsalpini opi-
nio, quandoquidem comperitur in hac plâta fru-

ctus racematus, vinolusque suo sapore, qualem
requisit Theophr. vires etiam non videntur cõ-
uenire. Meliùs sentit Camer. de hac plâta in hor-
to scribès: Gelseminum siue Iasminum Indicum,
sub quo nomine cùm primùm fuerit ex Indiis a-
liis communicatum, semper prætea hoc nomen
retinuit, quamvis sit planta sui generis, & panca
habeat cū Gelseminis communia. Magis propriè
Flos Mexicanus à loco natali: *baup, ai mdu* quidam
ex Hispanico Marabillas.

Hist. Lugd. Iasminum rubrum Dalechampi,
Flos coccineus.

Habui semina à Fratre C. Bauhino cum hac
inscriptione: semen Indicæ plantæ pulcherrimæ.
Habui à Volmario insigni Pharmacopæo Ill. Ducis
Virt. A. D. D. Fel. Platero, qui vocauit *Tau-*
manthin Peruvianum & Flacquetin Indorum. A
Do. à Pfaffer lap. ex semine collecto in Si. sz. Ac-
cepi semen Stutgardia quod missum fuerat ab
Hortulano Ducis Florentini cum hac inscriptio-
ne *Merauglia di Peru maggior*. Item *Merauglia*
di Peru flore albo. Accepi à Tossano Carolo ex
Burgundia cum hac inscriptione, *Flaculi Indii*. Se-
mina hæc in horto Montbelgardico Ill. Ducis
Virt. fata plantas aliquoties proferebant, quæ
semen maturabant Septembri & Octobri, cuius
plurimum, ubi nigrescebat, spontè cecidit. Mo-
nitus à D. Camerario ramos in terram deposui
qui apprehenderunt.

Scriptis ad Clusium Patavio amplissimus Vir
Iac. Antonius Cortusius, eius quæ vario & flo-
re radices binas drachmas intrè sumptas egregiè
aquas educere. Quod è sapore educere potest
autor H. Lugd. aquosa & humida est quædam
eius portio: ignea verò, calidaque & sicca altera,
quæ discutere valenter possit tu mores frigidos.

CAMPANULA SERPYLLI FOLIA

Io. Bauhini.

CAP. IV.



Viticulosus habet stu-
ticolos Ser-
pyllæ, longas,
multas, in va-
rios ramulos
tenuiores diui-
sas: in quibus
folia ex aduerso
coniugatum po-
sita, Serpylli
æmula, iis ta-
men quædam
maiora, alia mi-
nora, crenata,
nonnihil pilo-
sa, breuissimis
pediculis adna-
nexa. Ex ra-
mulorum ex-
tremitatibus
pediculi oriun-
tur palmares ferè, foliis nudi, in quibus flores bi-
ni ternique, deorsum nutantes, Campanularum for-
mâ, minimi digiti vngui magnitudine cedentes,
colore, si rectè recorder, cæruleo.


C Bauh. phyt. Campanula 9. siue Serpyllifolia
Io. Bauhini.

LINIFO-

Hanc in Rhætia florentem æstate inuenimus. Frater indidem siccam sine flore misit anno 1592. Gener Io. Henr. Cherlerus ex monte Gothardo attulit.

LINIFOLIA CAMPANULA lutea.

CAP. V.



Folia per caules ferè sesquipedales alterno situ, oblonga, angustaque, Lini latius foliorum æmula, laui: caules superius in ramos abeunt qui flores gestant insignis magnitudinis, vnciam longiores, croceo colore micantes, calyce in quinque lōgas aristas fissis, capitulo sequente Lini, sed magis tubinato: *radix*

longa, crassa, lignosa, in plura capita tuberosa diuisa.

Depingant & describunt Adv. ac sic denominant: Campanula lutea Linifolia Montis Lupi, flore volubilis. Hæc Lobel. Obs. videtur Viola Calathiana Plinii, flore luteo.

Hist. Lugd. Hyssopus nemorensis & lutea. Sciendum autem nos iconem solum H. Lugdunensis, huc referre, non item descriptionem, quæ non congruit figuræ.

Plant. Icon. pag. 414. Campanula Linifolia, Teut. 500.

C. Bauh. phyt. Campanula 4. siue Linifolia lutea.

Cum essem Monspestosi mihi allata ex proximis montibus Linifolia Campanula lutea. Gener Cherlerus attulit collectam in planitie propter montem Lupæ.

SOLDANELLA MONTANA quibusdam.

CAP. VI.

Obliviam agit radicem, nigram, crassiusculam, tuberosam, multas longas fibras quibus terræ heret, demittentem, folia tria, quatuor aut quinque pediculis à radice ortis dum aut trium vnciarum nituntur, vncialia aut paullo maiora, circinata rotunditatis, crassa, solida, atro virore splendentia, in quibus nervi vix nisi siccis apparent obliqui: caulis inter folia surgit vnicus ut plurimum, vel duo, odorantes, nudi, qui superius in ramulos paucos diuisi flores gerunt duos trève, nutabundos, nolam imitantes, cæreuleos, fimbriatos, stylo longiore prominulo. Succedunt cornicula vix breuiores,



de acri & ingrato: flores gerit in læui, nudo; gracili, subrubro, palmarique cauliculo binos ternos aut plures, purpure vel saturæ, vel dilutæ coloris, inodores, Campanulæ modo efformatos, deorsum spectantes, & propendentes, vnicofolio in quinque profundas crenas (quæ aliquantulum laciniatæ sunt) & totidem alias singulares, diuiso, constantes è medio protuberante veluti quodam umbone in longum stilum desinente; qui in vâsculum, vel corniculum potius euadit oblongum, durum, membranaceum, mucronatum, paruum, durum, virescens, simul congestum semen continens: radices fibrosæ, candicantes, ex vno veluti capite dependent, quod adnatis se propagat.

Est & aliud genus minore folio; neque circa pediculum, qui breuior graciliorque est, aded circinato, sed sensim ab ipso in latitudinem excrecente.

Inueniebat etiam in ascensu montis Herrenalben in quibusdam vmbrosis locis quoddam genus amplius foliis, sed tenellis admodum, quæ parte inferiore non virebant, superiorum modo; verum non minus rubescebant, quàm Cyclamini flore odorato folia. Soldanellam montanam Aduers. sine flore pingunt, licet illi florem Gentianellæ minoris cæreuleum assignent. Dalech. apud Hist. Lugd. florum picturam habet, sed malam. Vocat Lunariam minorem & Asclepiadem quorundam. Ic. Plant. p. 602. Soldanella montana. Teut. 715. Camer. apud Matth. Soldanella alpina. Violam alpinam foliis Asari minoribus hanc inscribit Gesner. hort. C. Bauh. Phyt. Soldanella tertia siue alpina rotundifolia. Et altera siue 4: folio minis rotundo. Variat prior foliis & floribus: alia foliis superne virentibus, inferne dilutior virore splendentibus: alia foliis inferne virentibus: flos purpureus, nunc saturatior, nunc dilutior, flore etiam niueo reperitur.

In arduis montibus & cellis Alpibus quæ Inf. purgum & Raupurgum ambiunt colligi: ac in quibusdam montibus Auenione non distit magna gliscere copia audiunt Aduers. Copiosè nascitur in Auitrix & Styrix Alpibus; perpetuè nunc obstitit, nusquam verò latiore, aut vberiore conspiciebam, ait Clusius: quàm in iugo Vvechsel nuncupato, supra Alchpang Magn. vici Braum à Khunigspers m. libeti Baronis: ubi

striata per supremam oram crenata, semen continentis.

Hanc sic depingit Clus. Sena habet, aut octona folia, crassa, in orbem ferè circinata, Brasica marinæ, quam vulgò Soldanellam vocant, æmula, sed duriora, supernè virentia, inferne dilutior virentia splendens, gustu primum exsiccante, dein-

Locus & tempus

anno 1576. vnicam plantam lactei prorsus candoris flore inueniebam. Floret istic Iunio, interdum Iulio, & Augusto, niuium maturius aut ferius liquefcentium ratione. In hortos autem translata, etiam Aprili, vel cum Primulâ veris rubrâ floret: difficulter autem cicurari potest. Hanc herbam pulcherrimam florentem vidimus in montibus Rheticis dictis Chempseche & Albula, Iulio mense 1601. Tunc fuit mihi denominata Cyclaminis species. Habuimus anno

1595. in Horto Il. E. C. Montbelgardi, allatam Argentina ex horto D. Friderici Meier.

Ex Theophrastinis illis arufcaſtoribus nonnullos huius foliis, cuticulâ summâ deglubitis, aſciticique abdomini admotis, aquas educere, & vulnera illic mirificè que carne & cicatrice claudere, tradit Lobelius, quod non vidimus. Folium craſſiusculum eſt, & ſubadſtringens, amaricante ſapore, Soldanellę planę ſimillimum.

FINIS LIBRI VIGESIMI





HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS PRIMVS.

HERBÆ SILIQVOSÆ, PLERÆQVE ACRES, INTER
QVAS MVLTÆ CVLINARIÆ.

POST Rapunculos, quid potius subiungi mereatur quàm Rapa, ac his consimiles Napi, Brassicæ, & huiusmodi alia? quas si pleræque in culinas accitas quis dicat, ut rumen impleant, ut ille ait, nulli reluctabimur. Illud potius Herbaria Studiosis ostensum volumus, omnes infra dicendas plantas id habere commune, ut semina siliquis inclusa gerant, acris sanè pleræque sicut & ipsæ plantæ.

BRASSICA VETERIBVS ET IN GENERE.

CAPVT. I.



ORTIS & culinæ familiaris Brassica [ῥαψάνου] quam Theophrast. trifariam diuidit hist. pl. lib. 7. cap. 4. Ac primum quidem in eam, quæ crispā [κροκύλλη]; dein in eam quæ læuis [λεωφύλλη] habet folia; & tertiam agrestem [ἀγροίκην]. Videtur autem priorum [duarum] Brassicarum similiter & hæc esse differentia, quòd harum quædam nullum, quædam malum semen habent. In vniuersum autem crispā [ῥαψάνου] & meliore succo, & maioribus foliis est, quam læuis [λεωφύλλη].

Notandum autem non hic solum Brassicam τὴν ῥαψάνον à Theophrasto nominari, & ita à Theodoro conuerti, sed alius etiam in locis sæpissimè, in quibus Scaliger τὴν ῥαψάνον pro Brassica vsurpat, & non pro radice neque radícula, quæ ῥαψάνος quoque à Græcis vocatur. Ipse etiam Aristoteles Brassicam interpretatur. Scribit enim lib. 5. cap. 19. hist. Nascuntur Erucae ex virētibz foliis, maximè Raphani, [ῥαψάνου] quam nonnulli κροκύβην [Brassicam] vocant.

Adhæc & Athenæus lib. 9. ῥαψάνον Theophrast. κροκύβην esse dicit, ita siquidem illic ait. Theophr. verò ad hunc modum scribit. [τὸ δὲ ῥαψάνον] (λέγεται δὲ τὴν κροκύβην) ἢ μὲν ἐστὶν ἐλεοφύλλου, ἢ δὲ ἀγροίκης: Raphanus, Brassicam dico, altera crispis est foliis, altera siluestris [scilicet Dalechampsii].

Antiquos Raphanum Brassicam vocasse monstrat Apollodorus Carystius.

Raphanum sic vocare nos: ut hospitii

Vos Brassicam.

Plinius negligentius legit, imò nec animaduertit quidem, quæ Theoph. ac Aristoteles de-

Tom. II.

Brassica scripserunt, ipse siquidem lib. 19. cap. 7. Raphano radici tribuit, ac rursus eiusdem libri c. 8. ad Brassicam quoque retulit, Catonem, qui illa ex Theophr. transcripsit, his verbis citans. Sed Cato Brassicæ miras canit laudes, quas in inediendi loco reddemus. Genera eius facit tria: vnam [latius Cato] extensis foliis, caule magno; alteram crispo folio, quam Papiniam vocat; tertiam minutis caulibus, lenem, teneram minimè probat.

Catonis
Brassicæ 3.

Idem Plinius eadem tria genera lib. 20. cap. 9. reperit. In tres, inquit, species diuisere Græci antiquissimi. Crispam quam Selinada [legendum videtur Selinoidea, siue Selinoides, ex Catone c. 157. vocauerunt, à similitudine Apii foliorum, stomacho vtilem, aluum modicè mollientem. Alteram leam, latis foliis & caule exeuntibus. Vnde caulodem quidam vocauerunt, nullius in medicina momenti. Tertia est propriè appellata Cræbe, tenuioribus foliis, & simplicibus densissimisque, amarior, sed efficacissima.

Quòd verò Catonis sententiam de Brassicæ generibus clariorem reddam, verba eius ex cap. 157. adscribam. Nunc vti cognoscas genera earum, prima est leuis, quæ nominatur læia, grandibus, & latis foliis, caule magno, validam hæc habet naturam, & vim magnam habet. Altera est crispā, quæ à similitudine Apii σελινόειδος vocatur. Hæc est & aspectu, & natura bona ad curationem, validiorque est quàm supra scripta est. Item est tertia, quæ κροκύβην vocatur, minutis caulibus, tenuioribus foliis, & acerrima, omnium est istarum tenui succo vehementissima.

Lævia
Crispæ.

Cræbæ:

Atque hæc tria genera Brassicæ agnoscit etiam Eudemus Atheniensis lib. de cleribus apud

Zzz

Halmyrida. Athenæum lib. 9. nimirum quod Halmyrida [quia
nisi in matumis non prouenit] *Leiothyllon*, &
sive *Selinium*.

nihilus Septinius contra, videtur duplicem
Brassicæ statuere differentiam, speciosissimam,
seu dulcem, quæ Cumis: & amaram, quæ in Ale-
xandria oriatur. Quod autem semen in Alexan-
driam è Rhodo fertur in annum efficere brassi-
cam dulcem, sed quæ post id tempus pro natura
loci amarescat. Nicander in Georgicis:

*Læuis quidem Brassica, interdum verò sylvestris
obuia,*

Cum feritur foliosa, in areis horrorum pubescit:

*Crispa verò, fruticosa, Tyrio colore foliis nirenti-
bus,*

Aut Phœniceis, & Halmyridi similis,

Cymis decolor, & aspera, similis est

Soleis, quas assumunt mutari oris calcis.

Cæterum, tria iam dicta genera complectitur
Dioscor. sub Brassica sativa, sub qua etiam Egi-
ptiam habet, quæ propter amaritudinem in Egi-
pto non estur, ait Plinius. Addunt autem Dio-
scor. & Plin. adhuc genera duo, sylvestrem alte-
ram, de qua paulò post: & alteram marinam, de
qua Hist. n. lib. 15.

Sed & cætera genera complura sunt, pergit
Plinius, Cumani fessili folio, capite patulum. Ari-
cinum altitudine non excelsius, folio numero-
sius, quàm tenuius. Hoc utilissimum existimatur,
quia sub omnibus penè foliis fruticat cauliculis
peculiaribus. Pompeianum procerius caule ab
radice tenui, intra folia crasse latet. Rariora hæc an-
gustioraque, sed teneritas in dote, si frigora non
tolerat: quibus etiam aluntur Brutiani, pregran-
des foliis, caule tenues, sapore acuti. Sabellico
vsque in admirationem crispa sunt folia: quorum
crassitudo caulem ipsum extenuat, sed dulcissimi
perhibentur ex omnibus. Nuper subiere Lacu-
turres ex conuallie Aricina, ubi quondam fuit la-
cus turrisque quæ remanet: capite prægrandes,
folio innumeri. Alii in orbem porrecti, alii in la-
titudinem torosi. Nec plus vllis capitis post Tri-
tanium cui pedale aliquando conspicitur, & cy-
ma nullis ferior.

Ex omnibus itaque generibus quæ ex cultu,
locis & forma nomen adepta apud Plinium, duo
nostris vulgò notissima sunt, inquit Cornarius:
Alterum fessili folio, atque ita conflexo, vt om-
nia simul vnum caput efficiant. Quare etiam hæc
puesol, id est, caulem capitatum vocant: sicut etiam
Græci *κραμβην κεφαλατω* dicunt: Alterum ex-
tentis foliis, caule magno, quod partim *Schlaue-
chen*, partim *Losen*, partim *Sträuden* appellant.
Caulium itaque & coliculorum appellationem,
de Brassica etiam nostri habent, in eo quod ip-
sam *föl* vocant, quamuis aliqui etiam *fräut* nomi-
nent, id est olus, quomodo item Latine ap-
pellatur, ob excellentiam.

Esti plurima sint Brassicæ genera, vt ex vete-
ribus rei rusticæ Scriptoribus liquet, quatuor ta-
men duntaxat, quas hodie vilitas esse scribit
Fuch. producit: quarum vna Græcis *λαβή* [læuis]
nominetur, grandibus & laeis foliis, caule ma-
gno: & Germ. *Breiten oder groffer föl* vocetur,
Gall simpliciter *Choulx*. Altera crispa, quæ à simi-
litudine Apii *συνανθής*, id est, Apiana nuncupe-
tur, vulgò crispa caulis, Germ. *Brauser föl*,
Gall. *choulx crepés*. Tertia quæ propriè Crambe,
minutionibus caulibus, & tenuioribus foliis, flo-
re luteo. Germ. *Kleiner föl*, vt ab aliis discerna-
tur, nominari possit, aut simpliciter, & sine ad-
iectione *föl*, Gall. *Choulx rouges*. Quarta, quæ

fessilis sit folio, & capite patula.

Brassicarum nobis notæ hæc, inquit Gesneri,
hort. Alba, nigra, crispa, hirsuta & rubra, quæ
non multum differt à nigra, ita vt fæpidus vna in
alteram mutetur, quod Oligiores testantur. Item:
capitata Brassica hortensis vbinam spontè nasci-
tur nescio.

Tragus præter sylvestrem, has recenset brassi-
cas. Brassicam satiuam maiorem. Brassica satiuæ
maioris speciem alteram. Brassicam crispam, &
capitulatam, de qua separatim egit.

Matthioli sua Brassicæ genera Veterum ac-
commodare studens ita scribit. Satiua Brassica,
Theophr. & Plinio authoribus in multiplici re-
censetur genere. Id quod & horti in Italia atte-
stantur: nam in iis multiplex & varia crescit bra-
ssica. Inter quas nominatim & ea (Brassica crispa)
quam Plinius Sabellicam appellari tradidit, quæ
crispis admodum foliis, Lactucæ modo in se
concluditur, intus albicans, tenera, subdulcis, &
quæ hac ætate omnium præstantissima habetur.
Est & capitata conglomeratis vndique in orbem
foliis, Plinio Lacuturis appellata, quæ vulgò *Ca-
pucce* dicitur. Est insuper ex iis, quæ nostris Italiz
hortis proueniunt, alia quædam [Brassica rapo-
sa] cuius caulis Rapi in morem extuberat, man-
dicurque subinde medulla, pingui iure incocta
raporum modo. Huius non reperio meminisse
Plinium, nec eo vetustiores alios, qui de horto-
rum sationibus scripsere, sicut nec illius, quæ fo-
liis admodum per ambitum laciniatis, minutim-
que intercisus assurgit.

Ex multis Brassicæ speciebus quatuor recipe-
re videtur Camer. horti: Cypriam, siue Pompeia-
nam [multifloram], quam vulgò *cauliflori* vocant:
Rapi caulem, Apianam crispam, & Albam Ge-
nuensem quæ nobis Brassica tenetur secta.

Lonicerus meminit Brassicæ albæ, latæ, crispæ, *Lonicæ*
capitata, & fessilis, sed, quod mirum, nullam de-
scribit.

Simili modo Ryffius oscitanter & ieiunè ni-
mis de Brassica solis nominibus certat. Quatuor,
inquit, earum genera. Prima læuis [λαβή] *Breiter
föl*: altera crispa, à similitudine Apii *συνανθής*,
fräuser föl, vocata: tertia *κράμβη*, *Kleiner föl*,
& quarta *κραμβη κεφαλατω*, Latinis Brassica Lacu-
turus, vel tertia aut fessilis, siue capitulata, Ger-
manis *Cappis fraut*, Gallis, Capini vel Cabini
coles, nonnullis albi vocati, reliqua Brassicæ ge-
nera Galli communi vocabulo *Chouls* [caules]
appellant. Facit & quatuor genera Amatus, quæ
non describit. Horum genus alterum Lacutur-
rem & Caputium vocat. Hisp. Repollo, Colthes
Morcianas: *Caputio*, Gall. *choulx pommés*: Germ.
Cappes fraut. Hæc in orbem porrecta ait, clausa
& apprimè dura, per medium secta, in numero
cernitur folio. Amati verborum testis fuerim, si
ea de quarta, & non de secunda specie tradiderit.

Nostra ætas, vt ait Dodon. non paucas quo-
que obseruauit, vel colore, vel forma differentes,
Brassicas. Quædam enim fessili folio patulæ sunt:
aliæ contracto capitata, nigre nonnullæ, plera-
que albidæ, vel etiam saturato colore virentes.
Iam & læui folio istæ: illæ verò crispe, aut laci-
niato. Est & in caulibus differentia. Nos de eius
octo speciebus [Brassica sc. vulgari, satiuæ, rubra
capitata, crispa, selinoide, sylvestri Crambe di-
cta, capitata albidæ, Sabauda & cauliflora] quas
depingit & describit, seorsim tractabimus, vñ &
de ea quæ sylvestris ab ipso inscribitur, & sylvestri
perfoliata, quam Perfoliatam siliquosam voca-
mus.

Commemorat Aug. Gall. Brassicam, *Cauli o*
Verzi, crisp, capucciati, Verzi fiori, Verzi rapi, & ca-
pucci ferrati.

De brassica duplici campestri Clusii agemus
sub titulo Perfoliata siliquosa; Caulis siue bra-
sicæ, quas Aduersaria tradunt diuersas, sunt hæ:

Alba, sessilis, glomerosa, aut capitata,
Lactuca habitu.

Eadem conuoluta & arctè oclusa,
apud Belgas, rubro colore, enematibus
aprior.

Sabauda, vulgò *Sauoye*, patula &
minùs oclusa, foris virens, intus al-
bicans.

Racemosa nonglobosa, vulgò Ita-
licè *Caults flore*, siue florida Pompe-
iana.

Laciniosa alba, & Rubra Cumanæ
vulgatior.

Nigra, yndantibus, crispis & lacinio-
sis foliis.

Marina multiflora, Sylvestris, mono-
sperma.

Caulorapa, brassica peregrina, me-
dio caule turbinata & rapata.

Obseru. Brassica vulgaris satiuæ, ca-
pitata, floridæ botrytis tenuifolia, laciniosa. Et

Icon. Plant. Lactuca satiuæ sessilis, siue capitata:
vulgaris satiuæ, alba, sessilis, glomerosa, aut capi-
tata, lactuca habitu: patula crispa Sabauda æsti-
ua: Sabauda hyberna, floridæ botrytis, marina
sylvestris multiflora monosperma: Rapa Bras-
sica peregrina, caule rapum gerens, tenuifolia,
laciniosa, & fimbriata. Dalech. apud Hist. Lugd.

Brassicæ tria prima genera facit. Brassicam sati-
uam, sylvestrem & marinam. Nobis relictis dua-
bus posterioribus de satiuæ hęc tantum sermo sit.

Diuidit autem satiuam in albam & rubram. Albæ
septem tradit species. Albam vulgarem seu læ-
uem satiuæ: Albam crispam, capitatam albidam,
capitatam polycephalon, Pompeianam aut Cy-
priam, Brassicam floridam Dodonæi, Asparago-
den, & Raposam. Rubræ agnoscit species 4. Ru-
bræ speciem primam, quam Cumanam vocat, &
Brassicam læuem Catonis, eamque primam om-
nium à Fuchio descriptam esse dicit: secundam,
quam Dodon. Brassicam Lacutrem appeller:

Tertiam, Dodonæo *σουλανθίν* Lat. Apianam di-
ctam: & quartam quam Dodon. nigra, sed Fuch.
Crispam & *σουλανθίν* Apianam à similitudine
Apii cognominet. Huic insuper adiungit Cris-
pam Tragi, & Tenuifoliam laciniatam Lobelii,

cuius gemina varietas. Brassicas suas Taberna in
duo primum distrahit genera: in domesticum si-
ue satiuum, & sylvestre, de quo pòst. Satiuæ aliud
esse læue, idemque duplex, ex viridi album, &
rubrum. Aliud crispum, capitatum aliud: aliud
proliferum floridum, Italicè Cauli fiori dictum.

In specie quidem recenset has. Brassicam 1. fòl-
fraut. 1. Brassicam 2. fòl-fraut. 2. Brassicam ru-
bram, Roter fòl. Brassicam capitatam, Cappel-
fraut / Cappel fòl. Brassicam capitatam rubram.

Rott Cappel. Brassicam crispam, fraut fòl fraut.
Brassicam proliferam, Buschelf fòl fraut. Bras-
sicam crispam proliferam, Buschelf fraut fòl. Bras-
sicam proliferam floridam, Blumen fòl. Brassicam
Anglicam, Englisch fòl fraut. Brassicam Sabau-
dam, Sapphoysch fòl, de qua dubitamus an eadem
sit cum Brassica capitata rubra: Brassicam Sabau-
dam crispam, Sapphoysch fraut fòl fraut. Bras-
sicam tophosam, Büchel fòl. Brassicam Selini-
sam latifoliam, Breyt fraut fòl. Brassicam Selini-
sam angustifoliam, Schmal fraut fòl. Caulora-

pum, siue Rapocalem, Rüben fòl, & Caulora-
pum longum, Langrüben fòl, quas nos non fe-
paramus, & Brassicam rapicaulem inscribimus.
De quibus omnibus suo agemus loco, vt & C.
Bauhini 26. species, ac etiam Hadriani Iunii
lex, inter quas & marinam numerat.

Brassica olus est vulgatissimum, ait Cæsalp. flo-
res pallidi aut candidi, color aliis virentior est,
aliis candicans: aliis ad purpureum vergens: cris-
pitudine & læuitas tum in genere virenti, quod ni-
grum vocatur, tum in candido reperiuntur. At
purpureum nequaquam crispum adhuc visum
est. Omnium crispis inter nigra reperitur: Plinio
Sabellicum: Theoph. Crispum. In hoc genere Se-
linida & Apiana Plinio. Candida & purpurea
breuiore caule, sed qui magis crescit in caput foli-
is rotundioribus: Crispa inter candidas crescit
in caput oblongum, candida, tenerima. Lævis
non nisi ex iure pingui paratur. De hac Plinius
inquit, lævis constat foliis è caule exeuntibus:
vnde Caulodis dicta est, nullius in medicina
momenti: hinc sumptum vulgare nomen *Cauloti*
apud nos. Quædam in caput rotundum crescunt
Caputios vocant. Plinius Cumanum vocat. Qui-
busdam caulis in caput extuberat Rapi similitu-
dine vulgò *Tormentos* vocant &c.

Κραυβή (brassica) Græci, quasi *Κραυβή*, inquit
Suidas, quod pupillis oculorum, quas Græci *Κράβ*
vocat, hebetet. In qua sententia fuit Columella
cum scribit.

Nunc veniat quamvis oculis inimica Cor-
amblæ.

Et melius *κραυβή* quasi *κραυβή* dicta est, quod
το κραυβή: vel rectius *ἀντίβη*, id est, quod
crapulæ satietatque aduersetur, vt dicitur. Græ-
ci veteres etiam (vt dictum) *πάραρον* vocarunt, ob
mutuam quandam amicitiam & affinitatem vi-
trique seminis, vetustioris præsertim, utramvis
plantam generandi. Nicander Colophonius in
Glossis apud Bæotos *παστα* Brassicas nominati
ait. Hoc tamen Dalech. non ad alias, quam capi-
tatas, vel eas, ad quarum radices velut Rapum
extuberet, refert. Brassica à Latinis appellatur,
quasi præfeca, inquit Varro, quod huius scapus
minutim præfecatur: siquidem nunc tonsili,
nunc cymoso caule spectatur. Sunt qui dictam
existiment quasi passicam, quod ex caule minu-
tim præfecetur vt passa fiat, vel *ἀπο τῆ βράχης* id est
à vorando dictam verisimile est. Estur enim to-
ta à plebecula, tum cruda, tum cocta, vel muria ser-
uata: à Germ. fòl. Belg. fool: Gall. Choux. Ital. Caut-
li, Cauloli. Hesp. Verca Cuius: Angl. Cole / Colchur-
tes: Hungar. Dörös kapusta: Boh. kapusta & Ely.

Cæterum, Olus hoc Lachrymis Lycurgi à Li-
bero patre vitibus adalligati natum prodidit
Nestor, in eo libro qui Alexicepos inscribitur:
perniciat forsit cum ea (Viti) odio flagrare
hisce fabularum inuolucris innuens. Vitis enim
& Brassica tantà laborant discordia, vt si in agris
olus hoc assitum Viti proliat, vel vinum exilius
proferat, vel ipsa contestim marcescat, vel certè
samenta eius contabescant. Tam pertinax inter
has plantas inimicitia, vt si defluxionis impe-
tu vna procidat, aut laxior in fauces decumbat
iniecto capiti Brassicæ crudæ succo in excelsu
oris protinus resiliat. Si Brassicæ fuerit vicina Vi-
tis, luxuriantes eius palmites potius repandi cur-
uabuntur, quam recti velint propius accedere
intestina non immemores discordia. Similiter si
quis feruescenti in olla Brassicæ vini paululū
guttatim instillauerit ne ampliùs quidem exco-
quetur, sed suis vitibus defuncta ad perniciem

Nomina
linguarum

no Cæsare & Palladio Cornar. declarauit, parum animaduertentis fuisse, vt *τησιφιδλον γουαμινου παρδμ-βου*, in Trifolio semen conuerteret.

Brassica decimo à factu die se demonstrat, nisi semina quæ solo mandantur, vetustate sint exuta: tum enim in aliam degenerare stirpem Marcus Varro tradidit. Semen vetus tantum valet in quibusdam rebus, vt naturam commutet. Nam ex femine Brassicæ vetere lato, nascuntur Rapa, & contrà ex raporum Brassica. Secari non debet quæ sementi destinatur. Sed occurrît ingens discordiæ miraculum. Hoc olus vitem fugare diximus: Cyclamino & Origano, perarefcit.

De Brassicæ satione hæc Colerus: Ante hiemem excolitur terra & benè adæquatur, mense Februarii seratur semen Brassicæ, etiam si congelata sit terra ac etiam testæ copiosa niue, postea sparge supra finum Gallinarum: prouenient Brassicæ plantæ pulcherrimæ & optimæ ad transplantandum, quæ non corrumpuntur. Item circa diem à Matthia denominatum bonæ matres familiæ ferunt *Rapsamen* aut *Holsamen*, si terræ possunt committere, vel antè terram colunt, deinde circa diem Matthiz ferunt, etiam supra niuem. Quædam in Martii terram madefactam miscent cum semine & ferunt in hypocauftis sub scamnis: ubi gelu præterit in terra ferunt. Aut idem, in Martio, Brassica alba capitata [weissen Höl], ferunt in Martii septimana, circa S. Urbani diem transplantantur, ager bis arandus: vnaque planta distet sesquipedæ, tribus septimanis possit ad radicem cumulanda terra & fodienda: plantando loco ubi meridianus Sol parum luceat, non enim facillè Solem tota die perfert.

Brassica satiuæ, vt scribit Diosc. alio commoda est, si leuiter seruata edatur. Percocta verò aluum sistit, & magis quæ bis cocta, & in lexiuio cocta est. Stomacho autem incommoda est. Et æstiuæ acrior est. Quæ verò in Ægypto est, ob amaritudinem edi non potest. Cæcutientibus tamen & tremulis in cibo auxiliatur: & noxas ex crapula & vino, à reliquo cibo sumpta extinguit. At Cyma ipsius stomacho commodior est, sed acrior est, & magis vinam ciet. Eadem condita, stomacho incommoda est, & aluum turbat. Cæterum crudæ succus cum Iride & nitro deuoratus, aluum mollit. Cum viho verò potus, morsus à Vipera opitulatur: cum fornigræci farina & aceto, podagricis & arthriticis, fordidisque ac veteribus vlceribus, impositus prodest. Idem per se ipsum naribus infusus, caput purgat. Cum Lolii farinâ appositus menses ducit. Folia imposita per se, aut trita cum polenta, faciunt ad omnem inflammationem, & tumores. Ignem item factos, & pustulas nocturnas, & lepras sanant. Cum sale verò carbunculos emarginant. Continent etiam destitutum capillorum in capite. Eadem elixa [ἀλάτωμα] & melli ammixta ad gangrænarum nomas faciunt. Si verò cruda cum aceto edantur, splenis profunt. Sin commanducentur vt succus deuoretur, vocem interceptâ [ἀποκομὴν] & non retusam vt malè Ruell. restituunt. Decoctum ipsius potum, aluum & menses mouet. Flos in pello appositus post partum, conceptionem impedit. Græcè legitur *τὸ δ' αὖθις ἀπὸ τῆς ἰνὴς ἀποκομῆς μετὰ δὲ τοῦ πηλοῦ*, quæ sic Ruellius, flos post conceptionem in pello subditus, partum abortu vitiat. Semen maximè eius quæ in Ægypto nascitur potum, lumbricos expellit. Ammiscetur etiam in antidotos Theriacas. Et faciem ac lentiginis depurgat. Caulis virides vnâ cum radicibus vsti, & adipe suillo veteri excepti

Tom. II.

ac impositi lateris diuturnos dolores sedant. Hæc Dioscorides, in quibus quæ de foliis manducatis tradit: Alclepiades, Galeno teste, de cauliculis ad vocem interceptam præcepit. Brassicæ viridis, inquit, cauliculos absterlos manducandos præbe, & quod instat palcarum exuccum est, expuere iube, luccum verò delingere. Alia, Brassicæ luccum cum melle coctum delingendum exhibe, auxiliabitur confectum.

Brassicam Athenis cibo parari solitam fuisse pro puerperis mulieribus commemorat Athenæus, velut idoneum medicamentum quoddam, & aptam nutriendo corpori. Ephipp. in Gerion.

Oleoque Brassicam in fasciculos collectam incoquere.

Antiphanes in Parasito Brassicam memorat tantum vitem cibum his verbis.

Brassicam tamen vntam coquant, & dñ!

Diphilus in Infatiabili:

Adueniat, quacunque bona sunt asseramus statim:

Brassicam vntam.

Apud Ægyptios in canis statutum est, inquit Athenæus, ante omnem cibum brassicam elixam (ad arcendam ebrietatem) comesse, & ad compositiones ita sese præparare. Multi sanè, vt ab ebrietate vindicentur, præsumunt Brassicæ semen: quamobrem Sybaritæ, vt inquit Timæus, antea quam potarent, Brassicarum esu se muniebant Alexius.

Hæc bibisti plus saris: nunc graue caput,

Sentis, medendum est huic malo ieiunio:

Deinde Brassicam tibi dabit quispiam

Elixam.

Eubulus alcubi:

Vxor mihi Raphanum si tu offeras,

Hanc crapulam è vestigio discusseris

Ni fallor omnem.

Anaxandrides:

Si Lauabitis,

Raphanumque multum editis, hæc mox desinet

Vexare vos capitis grauedo: frontibus

Nubem insidentem tristibus dispergit.

Nicochares:

In crastinum Raphani loco nos balneum

Quod crapulam suæ tuam parabis.

Amphis:

Nullum remedium est ebriis paratius,

Quàm si molesti quidpiam forte accidar

Subito et exim mirum in modum illud dissipat;

Raphanus ut non magis

Ad id valeat.

Brassicæ hanc facultatem Litteris mandauit Theophrastus, & hoc præterea, vitem etiam, dum viuît, odorem brassicæ auersari.

Cur autem crapulam sedet, id causâ subdit Aristoteles in probl. quia eius succus crudos humores & vinosos in aluum attrahit, ac ipsa in ventriculo remanens refrigerat corpus, quo refrigerato tenues humores in vesicam feruntur. Vnde cum humores vtrinque abigantur, refrigeratum corpore, illo crapulam sedari perspicuum est; præsertim quum sequax vini vapor humoribus deorsum conuersis deuocetur, & præceps ad imâ deuoluatur, qui sese effertens in caput, mentis arcem obsidet, & temulentiam grauitatemque creat.

Galenus ex Apollonio in dolore capitis ab ebrietate ad refrigerandum repellendumque, rosaceum per se & cum aceto, aut hedera, aut Brassicæ succo præscribit. Quin & ipsa Brassicæ folia calida macerata, capiti que circumposita, ac obli-

gata naturaliter ebrietati resistere ait.

Apud Græcos porro ad eod frequentis fuit in cibo vsus Brassica, maximè quæ *ῥαβδίζ* dicitur, vt bis cocta fastidini cæperit, & apud Apicios in prouerbiū abiectis *ῥαβδίζ* habuit, quo etiam hodie vitmur, cū rem iterum atque iterum repetitam, non sine molestia, significare volumus.

Quid si hæceadem illa sit, quæ tot exercuit, imò ferè occidit, Grammaticos, illo Satyrici senariolo vaticinante quantum crucis nostris olim Crucis pōneret.

Occidit miseris Crambe repexit a magistro

Antequam autem Medicos populus Romanus reciperet Brassicā sexcentis annis ita vsus est, vt nullus morbus odiretur quem non hoc olere, Marco Catone id annotante, curaret. Ex quo vires eius persequi par esto.

Brassica omnibus oleribus antè stat. Eam esto, ait Cato, vel coctam, vel crudam. Crudam si edas, in acetū intingito, misticè concoquit, aluum bonam facit, lotiumque promouet, ac ad omnes res salubris est. Si voles in conuiuiū multū bibere, cœnareque libenter, ante cœnam esto crudam, quantum voles ex aceto. Et item vbi cœnaueris, comesto alia quinque folia, reddent te quasi nihī comederis, biberisque, bibesque quantum voles. Vt aluum deiciat quomodo paranda & danda sit docet. Si verò ægrè lotium it, Sumito Brassicam, inquit, conuictio in aquā feruentē, coquito paulisper, vt suberunda fiet, postea aquam defundito non omnes: ed addito oleum, & salem, & Cymini paululū inferue facito paulisper, postea inde ius, ulū fugidum fothere, & ipsam Brassicam esse oportet, vt quamprimum excoquat, quotidie id facito. Quæ vocatur *ῥαβδίζ* hæc septem habet bonas in comestura. Et primum leito de omnibus Brassicis nulla est Crambe tertia medicamento. Ad omnes tumores, ad omnia vulnera eam contritam imposito. Hæc omnia vlcera purgabit, sanaque faciet sine dolore, tumida concoquet, vulnera putrida cancroscque purgabit, sanoque faciet, quod medicamentum aliud facere non potest. Verū priusquam id imponas, aqua calida multa lauato. Postea bis in die contritam imposito. Ea omnem putorem adimet. Si cancer ater est, is olet, & saniem spurcam mittit. Si albus, purulentus est. Sed si fistulosus, subtus suppurat sub carne. In ea vulnera huiusmodi tere brassicam, sanum faciet: nam optima est, ad huiusmodi vulnera. Et luxatum si quid est, bis die calida foueto, brassicam tritam apponito, citò sanum faciet. Si bis die apponitur, dolores auferet, & si quid contulum est, erumpet, si brassicam tritam apposueris, & sanum faciet, & si quid in mammis vlceris natum, & carcinoma, brassicam tritam apponito, sanum faciet. Et si vlcus acrimoniam eius ferre non poterit, fornam hordeaceam misceto, ita apponito. Huiusmodi vlcera omnia hæc sana faciet quod aliud medicamentum facere non potest, nec purgare. Et puero, & puellæ si hulus erit huiusmodi, farinam hordeaceam addito, vel si voles eam esse, confectam lautā siccam, sale ac aceto sparsam esto, salubrius nihil erit. Quò libentiùs edas aceto mulso spargito, mentham addens siccam, & rutam, & coriandrum sale sparsam paulò libentiùs edes. Id bene faciet, & mali nihil linet in corpore consistere, & aluum bonam faciet. Si quid antea mali intus erit, omnia sana faciet. De capite & de oculis om-

nia deducet, & sanum faciet, Hanc manè esse oportet ieiunum. Et si bilis atra est, & si lienes turgent, & si cor dolet, & si secur, aut pulmores, aut præcordia, vno verbo, omnia sana faciet quæ intro dolitabant: eodē silphium inradito, bonum est. Cū venæ omnes, vbi sufflatæ sunt ex cibo, non possunt perspirare in toto corpore, inde aliqui morbi nascuntur, vbi ex multo cibo alius non it, proportionē Brassicæ si vteris (vt te moneo) nihil istorum vsu veniet ex morbis. Verū morbum articulare nulla res tantū purgat, quantum Brassica cruda, si eam edes cum ruta, & coriandro conuictam. Sic & Laserpitium tritum cum Brassica ex aceto oxymelli, & sale sparsa. Hæc si vteris, omnes articulares morbos poteris expellere. Nullus sumptus est, & si sumptus esset, tamen valetudinis causa expetiret, eam manè oportet ieiunum esse. Omnis qui insonnifusus est, hæceadem curatione sanum facies. Verū assam Brassicam, & vinctam caldam salis paululū dato homini ieiuno. Quam plurimam ederit, tam citissimè sanus fiet ex eo morbo. Tormina quidem molesta erunt, sic facito, Brassicam macerato benè, postea in ollam conuictito, deferuefacito benè, vbi cocta erit benè, aquam defundito. Ed addito oleum benè, & salis paulū, & cuminum, & pollinem polnæ. Postea bene feruefacito, vbi serbuerit, in catinum indito. Dato edat si poterit sine pane, si non, panis parum ibidem madescat, & si febriū non habebit, dato vt vinum atrum bibat, citò sanus fiet. Et hoc, si quando vsu venerit, vt quis debilis fiet, hæc res sanum facere potest, si brassicam edet ita vt supra scriptū est. Et hoc amplius: Lotiū conseruato eius, qui Brassicam esitauerit, id calefacito, ed hominem demittito, citò sanum facies hæc cura, exper um hoc est: item, pueros pusillos si laues eo lotio, nunquam debiles fient: & quibus oculi sunt parum clari, eo lotio inungito, plus videbunt. Si caput aut ceruices dolent, eo lotio calido lauato, desinent dolere. Et si mulier eo lotio locos fouebit, nunquam ii virosi fient. Hæc inter alia Cato, quæ malimus formali eius Minerva reddere, ne quid verborum eius deperiret, aut aliquid in detrimentum sententiæ omittetur, aut mutaretur, quod dū nitori orationis consultum volunt, fieri consuevit.

Brassica laudes, inquit Plinius, longum est exequi, cū & Chrysiippus Medicus priuatim volumen ei dicauerit per singula membra hominis digestum, & Dieuches: ante omnes autem Pythagoras & Cato non paruis celebrant. Cuius sententiam vel ed diligentiùs persequi par est, vt nescatur qua medicina vlus sit annis DC. Ro. populus. Cato crispam maximè probat, dein leuem grandibus folijs, caule magno. Prodesse tradit capitis doloribus, oculorum caligini scintillationibūque, vel stomacho, præcordijs, crudam ex aceto & melle, Coriandro, Ruta, Mentha, Laseris radica, sumptam acerbulis duobus matutinò: tantūque esse vim, vt qui terat hæc, validiorem fieri se sentiat. Ergo vel cum his tritam, sorbendam, vel ex hoc intinctu sumendam. Podagræ autem, morbi que articularis illini cum Ruta, Coriandri, & Salis mæca, ac hordei farina. Aqua quoque eius decocta, nervos articulōsque mirè iuuari. Si foueantur vulnera, & recentia & vetera, etiam carcinomata quæ nullis alijs medicamentis sanari possint. Fo-

ueri

veri pridē aqua calida iubet, ac bis die tritam imponi. Sic etiam fistulas eluxatas, & tumores euocari, quæque discuti opus sit. Insomnia etiam, vigiliæque tollere decoctam, si ieiuni edant quamplurimam ex oleo & sale. Tormina si decocta iterum decoquatur, addito oleo, sale, cumino, polenta. Si ita fumatur sine pane, magis profuturam. Inter reliqua bilem detrahi per vinum nigrum potā. Quin & vrinam eius qui brassicam esitauerit, asseuati, calefactamque nervis remedio esse. Verba ipsius subiiciam, ad exprimendam sententiam. Pueros pusillos si laues ex vrina, nunquam debiles fient. Auribus quoque ex vino succum brassicæ tepidum instillari suadet. Idque etiam tarditati audientium prodesse asseuerat. Et impetigines eadem sanari sine hulkere. Græcorum quoque opiniones iam & Catonis causā poni conuenit, in iis duntaxat quæ ille prætermiserit. Biles detrahere non percoctam putant. Item aluum soluere, eandemque bis coctam sistere. Vino aduersari, vt inimicam vitibus. Antecedente in cibis caueri ebrietatem: postea sumptā crapulam discuti. Hunc cibum & oculorum claritati conferre multum: succum verò crudæ vel angustis tantum tactis cum Attico melle, plurimum. Facillimè concoqui, ciboque eo sensus purgari. Erasistrati schola clamat, nihil esse vitilis stomacho neruicæ, idè & paralytici, & tremulis dari iubet: & sanguinem excreantibus. Hippocrates cæliaci & dysenterici bis coctam cum sale. Item ad tenebrionem, & renum causā: laetis quoque vbertatem puerperis hoc cibo fieri iudicans, & purgationem feminis. Crudus quidem caulis si mandatur, partus quoque e mortuis pellit. Apollodorus aduersus fungorum venena semen aut succum bibendum censet. Philistion Opisthotonicis succum ex lacte caprino cum sale & melle. Inuenio & à podagra liberatos edendo eam, decoctæque ius bibendo. Hoc & cardiacis datum & comitialibus morbis addito sale. Item Splaneticis in vino albo per dies 40. Ictericis, nec non & phreneticis radicis crudæ succum gargarizandum bibendumque demonstrat. Contra verò singulus cum Coriandro & Anetho, & melle ac Pipere ex aceto, illitam quoque prodesse inflationibus stomachi. Item serpentium ictibus, & fordibus vlcetibus, ac vetustis, vel ipsam aquam cum hordeacea farina: succum ex aceto vel cum Fæno Græco. Sic aliqui & articulis, podagrisque imponunt. Epinyctidas ac quicquid aliud serpit in corpore, imposita leuat. Item repentinæ caliginis: has & si manditur ex aceto. Suggillata verò & alios liuores pura illita. Lepras & pforas cum alumine rotundo ex aceto. Sic & fluentes capillos retinet. Epicharmus testis & genitalium malis hanc vtilissimè imponi asserit. Efficaciùs eandem cum Faba trita. Item conuulsis cum ruta. Contra ardorem febrium & stomachi vitia cum ruta semine: & ad secundas. Et muris aranei morfus, foliorum aridorum farina alterutra parte exinanit. Ex omnibus brassicæ generibus suauissima est cyma, etsi inuulsi habetur, difficilis in coquendo, & renibus contraria. Illud quoque non est omitterendum, aquam decoctæ ad tot vsus laudatam ferere humi effusam. Striptum brassicæ aridorum cinis, inter caustica intelligitur. Ad coxendicam dolores cum adipè peruncto. At cum Lase & aceto in vicem phloethri euulsis illitus pitui nati alios prohibet. Bibitur & cum oleo subseruefactus, vel per se elixus ad conuulsas & rupta intra, lapsumque ex alto. Nulla ergo

Tom. II.

sunt crimina brassicæ: imò verò apud eosdem animæ grauitatem facere, dentibus & gingiuis nocere: & in Aegypto propter amaritudinem non estur.

Sed de brassicæ facultatibus differit Galenus his verbis. brassicæ succum facultatem habet purgatricem, corpus autem ipsius communi siccantium ratione sistit magis, quàm ad deiciendum incitat. Quum igitur quæ in ventre continentur excernere voluerimus, è propinquo cacabo in quo cocta cum aqua fuerit, extractam ipsam protinus in vasa, in quibus oleum cum garo paratum fuerit, conicere conueniet: nihil autem retulerit, si salem loco gari sumperis. Quod si humentem aluum siccare voluerimus, priorem aquam, vbi Brassica mediocriter cocta videbitur, effundentes, aliam calidam mox iniiciemus: ac deinde rursum Brassicam, quoad combuerit, ei incoquemus, quod non facimus cum ventris deiciendi gratia sumitur: volumus enim hoc casu proprium ipsius succum omnem non deponere, sed quoad maximè fieri licet, retinere. Porro nihil quod coquitur proprium succum seruare omnino potest: quin potius omnem abiciit, si coctum diutius fuerit: brassica paucum habet alimentum, & edulium est non firmum, sed laxum. Succum habet non probum, vt Lactuca, sed prauum & graueolentem. Quod verò ad vrinæ attinet, nihil ipsas, quod sciam, insigniter neque prouocat, neque moratur. brassicæ germen quod nonnulli *xylia* nominant, minùs quàm brassicā ipsa siccatur: tamen si aliorum olerum caulibus temperaturà vt plurimum est quàm folia sicciora, potissimum quum iam propè est, vt semen profundant. Et, brassica esculenta desiccandi vim habet, tum esā, tum foris imposita, non tamen etiam admodum acrem. Alioqui & vlcera glutinat, & maligna vlcera sanat: præterea phlegmonas iam induratas, ac ægrè solubiles, & id genus quoque erysipelata. Eadem facultate epinyctidas & herpes sanat. Habet quiddam etiam in se absterforium, quo lepras curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maximè brassicæ Aegyptiæ: quânto scilicet ea temperatura siccior est. Sanè amara qualis semen particeps est: sicut videlicet alia omnia medicamenta, quæ ad lumbricos idonea sunt. Eadem facultate epheidas & lendes, & quæcunque modicam absterfionem postulant, adiuuat. Porro caules brassicæ combusti cineres efficiunt admodum desiccantes, vt videlicet iam & causticam vim participant. Hac ratione ei veterem adipem commiscientes: ad inueteratos laterum dolores, & si quid eius fuerit generis adhibent: nam valenter digerens medicamentum efficitur. *hæc Galenus.*

Simeon Sethi: Malum, inquit, & melancholicum succum Brassica procreat, visum hebetat, & somnum per tumultuosa insomnia interturbat. Succus eius aliquatenus purgat: corpus verò eius ventrem sistit. Quapropter in quibus humectam aluum siccare volumus, ipsam modicè decoquentes, aquamque primam abicientes, confestim alteri aquæ feruenti indimus: nihil enim neque aëris, neque frigida aquæ quod his coquitur tangere debet. Aethiua Brassica peioris succi est quàm hyberna. Vrinam ducit, lumbricos interficit, & iis qui ex vino crapula laborant auxiliatur. Fertur autem ab humiditate ortam hebetudinem sanare. Cocta cum pingui carne, plurimum noxæ atque vitii amittit. Flos eius proprietate quadam semen genitale corrumpit

Zzz 4

utero impositus, & mulieres concipere prohibet. Pulmonem lædit. Tradunt quoque si ante alios cibos assumpta fuerit, ebrietatem arcere. Et quod eius succus cum melle sumptus, magnificè defecationes vocis iuuat. Vulneribus imposita ea conglutinat, & malefica vlcera & induratas inflammationes sanat.

Brassica semen crassiusculè contusum, inquit Matthiolus, & in carniū iure seruēfactum, potūque vnā cum ipso iure colico dolore laborantes præsentaneo remedio iuuat. Brassica tormina discutit, si bis edatur cocta, addito Cymini semine, Sale, Oleo, & hordeaceæ farinæ polline: præsertim si sine pane deuoretur. Idem facilius decocta cum veteri gallo. Idem prodest iecinorosis, lienosis, & renum calculo laborantibus. Prodest percocta tabidis, si frequenter edatur. Succus ex melle coctus visum clarificat, angulis tantum oculorum illitus. Datur succus vtiliter potandus aduersus fungorum venena. Cocta, & longo pipere aspersa vnaque cum iure sumpta nutritibus lactis vbertatem præbet. Caulium medulla ex cremore amygdalino decocta, & cum melle in edegmate parata, datur lambenda magna vtilitate anhelosis.

Brassica, vt scribit Cardanus, triplici nobilitate præstat, nam cibus est & medicina, aded vt Romani non aliam nouerint tam in externis, quam interioribus morbis: Vi tam egregia, vt incocta vas in quibus aqua feruere solent, crustas ab illis auferat: partibus enim tenuibus & nitro similibus prædita est. Sapore aded suauis, vt à plerisque nobilioribus edulis præferatur.

Cæterum scribente Dodoro, Brassica omnis resiccantem & adstringentem facultatem habet: atque vnā nitrosam quandam vehementius abstergentem qualitatem: hanc autem succus aut decoctum eius sibi vendicat: substantia siue brassicæ corpus adstringentem & resiccantem retinet. Deponit etenim brassica decoctione nitrosam hanc qualitatem quæ succo ac humido eius insidet: quam omnem aqua in qua primò decoquitur, ad se pertrahit. Quam ob causam decoctum eius aluum mouet: veluti & succus si bibatur. Abiecto autem primo iure in quo decocta est, aluum brassica siccatur & adstringit: alimentum autem corpori præbet exiguum: succum verò ingenerat non probum, vt pote crassum ac melancholicum, minus tamen crassum aut vitiosum, quæ alba sunt: quæ idcirco & alius præstant.

De Brassica Baptista Fiera sic cecinit.

Iam veniat folio Chrysippi Brassica crispo,

Vel patulo & leui, vel glomerata comas.

Prima salutifera, & ventrem lenire parat,

Bullierit modico si tamen igne, placet.

Omnibus ardor inest grauior tum & esca secundis,

Ne capiti noceant vina superba premunt.

Extremidam referant vesicam, agrumque lienem.

Hepæ & obstruētum semineumque semur.

Arida Socraticam pareret ni Brassica bilem,

Iure erat in morbis omnibus illa satis.

BRASSICA CAPITATA ALBA.

Scienti vlt frequentissima est brassica alba scapitata, ita in hoc genere prima nobis describetur.

Caulum ergo hæc producit crassum, albicans, crasso cortice tectum, medullā parum acri &



subdoli: Folia quæ primū erumpunt lata habet & ampla, subrotunda, nullis effatu dignis lacinis sinuata, longis crassis pediculis harentia, costis nervisque albicantibus intertexta. Quorum inferiora auulsa, aut fortè decidua, stipitem, relinquunt densa vestigiorum serie rugosum & in-

qualem: Superna verò quæ remanent lata quoque & subrotunda, & ex viridi albicantia & cæsia, mutuo incubitu in caput maximum durissimum conglobantur: tam arcto complexu, vt difficilè separentur. Horum interiora planè albicant. Porò glomer appetente Vere, quo tempore semini ergo transplanti solet, parum debescens, è medio caulem erectiorem profert flaribus luteis aut luteopallidis, quibus delapsis siliquæ longæ nascuntur teretes, acuminatæ: semina parietum medulloforum intersepe claudentes rotunda. Hyemem non durant, nisi contra frigus muniantur. Rei familiari potissimum hæc expetita, propter vltimū, & quia diutius in cellis adseruari solent. Hæc interdum elegantissimā naturæ varietate ad 50. Capitula minorā fert, magni illius glomeris loco, vt inferius specialius tradetur.

Capitulum hodie dictum olus, Germ. Capuz, brassicæ genus est, inquit Cordus, quod Cumanum Plinius vocat: sessile folio & capite paululū, non tamen vbique similiter provenit: triticanam, imperialem, & caputale, suspicatur esse H. Iun. quam Nicander καπυτα nominat à tumidi ventris figura.

Fuch. Icon. Brassicæ 4. genus: & hist. brassica 4. sessilis, quam vulgus Capitos caules quasi Capitulos appellat. Nonnulli brassicam albam & caules albos.

Dodon. Gall. brassicæ prima species alba: & Lat. in fol. brassica 6. inter albas 1. quam vulgò Capitatam nuncupari ait: & à nonnullis Brassicam Imperialem, brassicam Triticanam Plinii, quem appositè notat quòd eius Caput terræ aggestione, tale fieri affirmet: quod non aggerando vel accommodando terram tale [pedale scilicet interdum] nascitur, sed sua natura, si tempore & loco idoneis transplantetur, capitatum efficitur. Ipse autem Dodon. olim Fuchianam figuram habebat quam nunc ponit pro rubra, & nouam habet pro alba.

Caulum capitatum [quem Germani Capes vocant] ego [Tragus lib. 2. c. 53.] latinæ brassicæ genus esse existimo, Quibusdam Caulis Imperialis dicitur. Alii Capitum capitatum, Caulum capitatum, & simpliciter Caulum vocant, Auicenna Cannabari [quam vocem ego ad Betam pertinere suspicor.] Serap. Carum vocat. Petrus de Crescentiis, Sambusium, Stephanus de Coruo, Carneum appellat. Apollin. weissföhl & fappis fraus vocat, ac concludere videretur.

tur Brassicam cum beta.

Gesner. hort. Brassica capitata.

Monach. in Mel. Caulis Capitatus.

Lobel. & Pen. Aduers. Brassica alba sessilis glomerata. Obs. Brassica capitata. Icon. Plant. p. 243. Teut. 293.

Est Matthiolo in Diosc. capitata conglomerata in orbem foliis, Plinio Lacuturis appellata. Brassica capitata, quæ vulgò Capucio dicuntur. Item hist. Germ. Cappes / Brassica capitata, quædam viridis, quædam alba.

Tabern. Icon. & hist. Cappens aut Cappes Fraus / Brassica capitata Caulis capitatus.

C. Baub. Phyt. & apud Matth. Brassica i. siue capitata alba, Lacuturis Plinii videtur: aliis Cumana eiusdem: aliis Tritiana. Brassica, siue pluribus capitibus conglobata. Hæc non videtur separanda à priore, cuius videtur monstrum.

Cesalp. Capitum.

Hist. Lugd. Brassica capitata albida, Tertia alba Brassica species: Gal. Chou capu, id est Caulis capitatus. Plinio Lacuturis est Brassica ut vult Matth. & Dodon. Brassica Tritiana. Sed verisimilius est Lacuturin nostram esse Brassicam capitatam candidam. Tritianam verò nostram esse Brassicam capitatam viridem. Est & alia Brassica capitata polycephalos, Quidam id terzæ, cui semen creditur, vbertati ascribunt, quæ tam copiosum alimentum præbet.

Brassica capitata. Græc. κραιβή κεφαλή. Germ. Cappes & Cappes Fraus; weiß kölfraut. Belg. witte Sluiff soolen & Cabusfoolen. Gail. Choux cabuz. Ital. Cabuzzo. Caulo Capucio, Capuzzino. Hisp. Repollo, Colthes morciños. Angl. Cabbage. Hung. Feyer Kapota.

Copiosè colitur in horto E. C. ac aliis Montebeldardi Brassica capitata: longè maximam vidi Argentinæ: Basileæ abundanter colunt etiam in agris & in Asia, habent etiam Lugduni: semel vidi Genex congelatas lanuario. In Ducatu Vvitembergico ut circa fontem Admirabilem agri eà conferuntur, mense Octobri ostendit mihi Ds. Dr. Rontzius in Kircken Brassicam hanc in qua erant ad so. capita parua magnitudinis Oorum, qualem curauimus depingendam: similem polycephalon dicebat se habere Il. Cel. Vvrt. Hortulanus in Göppingen / tales mihi etiam aliquando in Alsatia hartenfchmiller demonstrare in horto Nobiliss. vini Di. Io. Iac. Vvaldner à freudstein compatis mei. Hoc genere in plerisque Germ. partibus, Bauria potissimum auctore Fuchio per integrum anni curriculum quotidie visitant. Albæ & rubræ nusquam maior prouentus & fetura quam apud Belgas, ut testatur Lobel. vultur, qui naues onustas in vicinas Germaniæ, Angliæ & Hispaniæ regiones deuehant.

Semen Caulis capitulati teres & fuscum, quod non peruersum sit, tempore quadragesimæ Martio mense terzæ mediocriter pingui committitur, e qua sexto aut septimo die erumpit, ac nisi frigoribus aut pulcibus terrestribus opprimatur, breui tempore augetur noua illa eruptio. Quamprimum verò recentes illæ & teneræ plantule [Germani Serzling appellant] quatuor aut quinque produxerint folia, id quod in Solstitio æstuali circa Festum D. Medardi fieri solet, tum euelluntur, æ in fasciculis colligatæ aliis regionibus in quibus semen aut perinde prouenire solet, communicantur. Deinceps verò rursus plantantur ex plantulæ in terra pingui & probè saturata. Semen huius oleis peculiari quoque

arte Hortulani elicere solent. Nā capita seu caules capitatos vnā cum radicibus euellunt, in quæ tellis vinarius lumina cura conseruant in Martium vsque mensem, quo tempore capitulatum olus ad collum vsque, hoc est, crassus ille ac callosus caulis, humo rursus inseritur. Hoc vbi æstatis vim & calorem senserit, nouos emittit colliculos per capita supernè erumpentes, viridibus & augustis foliis vestitos, Aprilique mense cum & arbores florent, copiose, luteo, & violis simili flore comantes. Porro flos in longas tandem abit squas, rotundo & fusco semine refertas.

Hoc olere in Germania in cibo, & hominibus ^{Virescit} & iumentis nihil frequentius est, Quin ita vsus ^{Vitus.} eius inualuit in plerisque locis, ut vulgus hominum maximè eorum qui amplam familiam alere necesse habent, vino potius quam hoc cibi genere carere velit. Non solum enim stomacho satis facit, ac famentes probè alit, meliore sui & interna parte, præsertim eos qui eiusmodi cibo assueuerunt, sed & exteriora eius folia, ceteraque partes pabulo bubus exhibentur non ingrato. Quamobrem quod ad mes Tragum quidem attinet, quicquid alii dicant, nolim sanè hoc genus oleis planè contemni, neque etiam facillè omnibus indifferenter eum cibum interdicere consultum velim, maximè iis qui illo assueuerunt, neque alio per inopiam vitare possunt. Consuetudo enim quæ in naturam sæpè numero transit, repentinas mutationes omnino non potest ferre, teste Hippocrate. Hæc tenuioris fortunæ hominibus scribimus quibus per vitæ rationes splendidiorebus epulis vesci non licet. Meo certè iudicio Caulis capitulatus benè paratus, conditus & coctus, multo salubrior est, condimentis illis peregrinis, & sumptuosius. Olux inquam, Capparis & Citrorum, quæ omnia ad eos potius pertinerent videntur, quibus nihil nisi peregrinum placet, aspernantibus domestica, quæ ut passim obvia sunt, ita dubio procul magis salutaria. Sed ut palato suo isti blandiantur certum tamen est apud plerosque Caulem capitulatum ita in cibo expeti & vsurpari, ut ab eo se diuelli non patiantur, ut qui vilitates eius, haud obscure deprehenderint. Nemo igitur non nouit caulem capitulatum coctum, maximè cum pinguibus carnibus & suillis, stomachum latrantem compescere, quamquam & in medicina vsum suum non contemnendum habeat. Brassica capitulata [ut moris est Germanis] in cibo stomacho æstuantem prodest, quare illa eos qui operas exercent vesci conuenit. Vtilis est & ipleneticis, cibi appetentiam inducit, siim sedat. Folia huius inflammationibus & tumoribus vtiliter imponuntur, non aliter atque Beta. Ius conditæ brassicæ sacris ignibus singulari experimento illatum medetur. Quod ad reliqua attinet vide supra.

BRASSICA ITALICA TENERRIMA glomerosa flore albo.

Hæc caule & foliis adeoque tota inter albas ^{Descriptio} candidior, teneriorque videtur. Folia quoque quæ ampla sunt atque rotunda per se dilatatis virentia candicantibus venis intertexta sunt, quædam etiam eorum modicè crispæ ac vario contortu nonnihil rugosa. Foliorum quoque pediculis breuibz auriculæ quædam foliaceæ adhærent. Flores albi quadrifolii uti cæterorum quos nonnisi repidiore Sole illustrata profert; quippe algidi frigoris impatiens, minus ardo so-

zum implexu glomerem laxiorem mioremque efformans. *Huius* semina sunt ut reliquarum lautior hæc, quippe tenerior, delicatioribus expectata, eorum potissimum qui eius norunt gratiam mensis apponitur.



De hac ni fallor Dodon. Alia capitata, albida quam Sabaudam vocant, oblongioribus capitibus, minutiusque atque conclusis, quæ si Vere explicentur, caules emittunt ramosos, floribus albidis speciosos.

Dodon. Gal. Brassicæ 2. species, quæ Sabaudica dicitur Plinio Brassica Lacuturria:

Gall. *Chou de Sauoye*. Belg. *Sauoy foken*. Lat. in fol. Brassica 7. Brabantis Sabauda brassica. Lobel. & Pena Adu. brassica patula, Sabauda vulg. intus albidis, foris virentibus foliis, floribus albis. Icon. pl. p. 244. Brassica Sabauda hiberna Teut. 294.

An Matth. in Diosc. brassica crispa: Plinius eam Sabellicam appellari tradidit, quæ crispis admodum foliis, Laërta modo in se concluditur, intus albicans, tenera, subdulcis, & quæ hæc ætate omnium præstantissima habetur. Item Hist. Germ. *Krauß fôl* Fraus, Brassica crispa.

Figura à Camerario posita, aliam brassicam denotare videtur.

Tabern. icon. & hist. brassica crispa *Frauß fôl* Fraus. An eadem brassica Sabauda *Saffoysch fôl*. Figura est Matthioli.

C. Bauh. phyt. brassica secunda siue alba capitata oblongo, non penitus clauso.

Hist. Lugd. Brassica alba crispa, brassica Sabaudica, *Chou de Sauoye*. Dodon. Lacuturria, Catonis crispa, Plinii Sabellica.

H. Jun. Brassica Lacuturria Plin. B. *Sauoyfche fôle*. Gall. *Chou de Sauoye*.

Tempus & locus

In horto Montbelgardi Ill. E. C. V. Vitr. excolimus, in quo florentem vidimus Septembri & Octobri. Hanc frigoris admodum impatientem tradidit Lobelius. Hyemis vigorem non sustinet, inquit Dodon. neque ad Ver peruenit, nisi admodum clemens hyems fuerit.

BRASSICA SABAVDA RVGOSA.

Descriptio

Huius folia rotunda, rugosa valdè, ac ita quidem rugis inæqualia sunt, ut singula ceu ex vesticis aut valvulis quibusdam consimilibus congesta videantur, subtus extuberantibus atque prominentibus aucta parte, caulis ex brevibus pediculis hærentia, color foliorum ex luteolo quodam & atro viret, quæ pallidè viridatibus costis quoque intertexta sunt. Eadem etiam in densum globum coguntur, sed paruum, & candicantem, dum extremitates interim ob-



scutius virent: *Flos* luteus, *semen* ut in reliquis. Hyemem non fert.

An Dodon. Lat. Brassica Sabauda caulis nomine figuram potius, quæ non videtur responderet descriptioni.

Tabern. Icon. & hist. *Saffoysch fôl* Brassica crispa.

Lobel. Icon. p. 224. Brassica patula crispa Sabauda æstiva Teut. 294.

C. Bauh. Phyt. Brassica 9. siue alba crispa, Matthioli crispa, Lobel. Sabauda æstiva. Quibusdam censetur Lacuturria Plinii: alius eiusdem Sabellica, Matth. Gesner. hort. Lac. Brassica crispa Lugd. Brassica alba crispa Lobel. Brassica patula crispa. Sabauda æstiva Dodon. Brassica Sabauda Tabern. In hac magnam colorum varietatem observauimus: est nucea tota: est quæ candidissima, &c. *Hac Frater*. Matthioli crispa an sit eadem cum Sabauda rugosa dubito propter descriptionem à Matthiolo positam quæ respondere non videtur aliud indicant, nihil. Titulo: Præterea varietatem colorum tantam non existimo cadere in brassicam Sabaudam æstivam, sed potius ad brassicam crispam laciniolam referendam.

Est mihi Montbelg. in horto Ill. E. C. hyemem difficile proferens: obseruavi quoque Gering. in horto Ill. E. C. Vitr. & in *Wörsen steig* in horto Ill. Comitiss.

Locus.

BRASSICA RVGOSA, LONGIORIBUS foliis.

Folia ampla sesquicubitalia ex longis pediculis, inferiori parte amicta. Hæc quàm Sabaudicæ scriptæ dilutiore virore candidiorumque Costarum interceptu, candidior apparet, totaque rugosa, ac veluti sacculis referta est. Tenera quoque magis videtur, nec in capita cogi solet, ut Sabauda flore luteo hyemem vix fert.

Montbelgardi in horto Ill. E. C. V. Vitr. Locus.

BRASSICA MULTIFLORA.

Preæmpla hæc quoque fert folia, cubitalia, longiora quàm brassicæ capitata alba, nec ita lata, nulla insigni laciniarum diuisurâ, dilutè virentia, quædam etiam colore magis glauco, exteriora præsertim, neruis candicantibus conspicua, per ambitum ex longiuscula distantia denticulata, & veluti serrata. In capite glomeratur, sed mollus, minus densis foliorum incubitu formatum. Intra quorum finem flores densissimo stipatu prodeunt exigui, pallidi aut candicantes, velut in umbella positi, qui cum Cauliculis suis aspara-

Descriptio



asparagorum tenellis tene-ritudine & gratiā certare videntur, atque ob id lau-rioribus tan-tum patinis expetiti: Et ipsæ quoque Erucæ, huic apprimè con-colores, sæpè eam depascun-tur, vt pro brassica, brassi-cæ cadaver re-linquant.

Dodô. Gall. brassica 3. siue Pompeiana: Neoteris Cy-

pria: Ital. *Caulisfiori*: Gal. *Chou fleur*, belg. *Bloem foelen*. Idem hist. Lat. brassica 8. Caulisfloræ nonnulli Cypriam vocitant, ea autem cum Plinij Pompeiana conuenit videtur.

Lob. & Pena Adu. brassica florida aut potius racemosa, vel botrytis Pompeiana. Obs. brassica florida botrytis: Icon. Pl. p. 245. Teut. 295.

Cam. apud Matth. G. *Blum fôl*: Ital. *Caulisfiori* optima adfertur Genuâ, aliis brassica Cypria, qui existimant Pompeianam Plinii: esui optima deli-cata, diu potest hieme in cellis referuari. Caulis floridus. Idem herti, brassica Cypria, siue Pom-peiana. Tabern. Icon. & hist. *Blumen fôl*: brassica prolifera florida.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. brassica 7. siue cauliflora, Pompeiana Plinio: Theophr. videtur meminisse, dum scribit genus esse quod nullum aut paruum semen producat.

H. Jun. Brassica Pompeiana Plinii. Cypria Rem-berto. B. Bloem fôle. G. *Choux fleur*. Ital. Cauli flores.

Hist. Lugd. Brassicæ albæ quinta species. Bras-sica Pompeiana aut Cypria. An Gesner. hort. brassicæ genus quod è Syria deferretur, *Conabit* seu *Conauit* vulgò dictum.

Cæsalp. Genus capitatæ brassicæ à flore co-gnominatum, Cauli flores. Theophr. videtur nul-lo semine aut paruo.

Polyflora brassica sæpius nobis prouenit Montbelgardi, in horto Ill. E. C. Vvrit. ex semine peregrino: verum hieme reponenda, & vix se-men maturum profert. Sturgardiz in eiusdem Chorto copiosè excolitur, & editur, vti etiam in E. C. hort. Gœppingæ: Vidi & in horto Ill. C. in Wiesensteig.

BRASSICA ALBA VVLGARIS.

Radix tophosa est, ex qua stipites qui foliis ner-ruorumque diuisi, atque intertextu, rubræ quodammodò responder: folia tamen subrotun-da, ex longis crassis pediculis delicatiora viden-tur, in quibus in circuitu præsertim serraturæ quædam apparent. Tota planta albicat, & cæcio quodam colore obducta est, auriculas habet vti prædictæ. Flores albus est.

Huic altera similis si non eadem quam hortu-lanus diuersam putat, vt pote cuius folia magna,



nonnihil cris-pa; interna verò quæ ad umbilicum plantæ magis candicantia, aut certè ma-culis albis insi-gnita, quæ-dam etiam per ambitum leui-ter serrata.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. brassica 6. siue alba vel viridis. Trag. brassicæ sanuæ maioris spe-cies altera. Al-terum genus purpureo af-fine forma

foliorum candidorum ad caulem accedit ca-pitulatum, sed quæ in caput minimè extube-rent. Hoc quoque genus hyemem contemnit: Caulem fundit admodum procerum, vt qui vni-cus tot folia suppeditare queat quot ad ferculum requiruntur. Tragus Germ. describit cum rubra. Gesner. hort. brassica alba. Monach. in Mef. Cou-les albi. Lob. & Pena Adu. brassica laciniosa al-ba, brassica vulgaris & vulgariss. ex albedo & pullo albicans. Matth. Germ. brassica lenis alba, *Grüntweiss fôl*. Hist. Lugd. brassica alba vulga-ris, læuis, læqua Theophr. Catonis & Plinii: foliis ex viridi cæcio candicantibus, flore tum luteo tum albo. Cæsalp. brassica læuis, Plinio caulodes. Hort. Lusit. brassica alba, *weisser fôl*. Sch. Sefada Byle fêal.

Genus brassica alba hyemem ferebat in horto, in fine Nouembris anno 1569. in ea ap-paruerunt adhuc Erucæ. Monselpi brassicam al-bam cum flore albo copiosè in hortis colunt.

Locus & tempus: Flore albo.

BRASSICA ALBA EXPANSA.

Albæ vulgati in multis adsimilis esse vide-tur. Verum folia hæc fert ampla, ex longis & acutis pediculis, duorum aut trium ferè cu-bitorum, læuia, vix vllis lacinis diuisa, sed tan-tum nonnihil complicata aut conuoluta. Totâ planta adeò expansa est ac patula, vt amplissimæ tabulæ conferti possit. Italicam putamus, nec existimamus hyemem perferre posse.

In horto Ill. E. C. Montbelgardi colitur: Octo-bris sine nondum caulem, nedum principium eius apparuit.

Locus & tempus.

BRASSICA CAVLORAPA.

At rarior multò brassicæ illa species, quæ apatulis foliis glomerem nullum facit, ve-rum, quo solo signo facillè ab aliis separetur, bre-uis caulis, quâ foliorum comæ subest, in rapum esculentum extuberat.

Dod. Gall. brassica 4. hodie dicta Rapæcau-lis. Gall. *chou raux*. Belgic. *raepsoelen*. Et Lat. in

Descriptio

Locus & tempus.

fol. Brassica 9. Rapocaulis vulgò. Brassica caule rapum gerens. brassicæ cuius caulis Rapi in morem extuberat, manditurque subinde medulla, pingui iure incocta Raporum modo, non reperit Matth. meminisse Plinium, nec vetustiores alios.



Camer. Germ. Matth. Rüben fol. Caulorapum. Itorum Torzutos Plini Lacutertes. Idem hort. brassica rapicaulis.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. brassica 8. siue gongyloides, Rapius colis, Catoni fortè.

Caulorapum cinnam vtriusque naturæ vidit Scaliger, sed brassicæ radix

sub terra condita fuit, Rapum supra terram in stipite turgescerebat

Cæsalp. vulgò Torzuti, Plinio Lacutertes, capite prægrandes. Putat Gesner. hort. brassicam hirsutam Monachi in Mesuem esse genus illud cuius Matth. meminit, tanquam Veteribus ignoti, cuius caulis, inquit, Rapi in morem extuberat. Considerandum an Monachi non intelligant aliam.

Lobel. & Pena Aduers. Caulorapa, brassica peregrina, medio caule turbinata & Rapata. Icon. plant. p. 246. Rapa brassica peregrina, caule Rapum gerens.

Hist. Lugd. brassica 7. siue Raposa, Veteribus incognita [nisi sit Rapius colis Gatonis] 2277-2278. En nominari potest.

Tabern. Icon. & Hist. Rüben föll, Caulorapum. Item lang rüben föll, Caulorapum 2. Nos vnam eandemque plantam facimus, ideòque non separamus.

Brassica pulchra quæ ad radicem magnum habet rapum, esui commodum. Non vique adeò crebra est. Basileæ primùm vidi in horto Doctissimi mei Præceptoris Cæli Secundi Curionis. Albam hanc Brassicam habui Genevæ in horto pulchrè virentem Ianuario. D. Dalechampio dicebatur Brassica raposa & 2277-2278. Montbelgardi fata in Illust. E. C. V. Virt. horto provenit. Obseruavi cùm essem apud fontem admirabilem in wisen steig in horto Ill. Comitiss.

BRASSICA MONOSPERMOS ANGLICA.

Descriptio **M** Vnere Domini Friderici Meyeri ex Anglia usque adlata semina habeo, brassicæ monospermæ Anglicanæ, alia nuclei Cerasi magnitudine, alia altero tantò maiora, figura vtriusque turbinata, & acuminata, & thorulis quibusdam secundum longitudinem donata, vel alias tuberculis asperata, colore cinereo.

Locus. De hac Aduers. inquit, locus est oriunda Angliæ maritimis ad Portlandiam Insulam, sed quia inculta, neglecta, hispidior multò, cibo tamen toleranda: cuius semine iamdiu Medicus An-

glus hac parte exercitissimus Turnerus nos donat, eamque vocat, & yndemiquam vocandam à semine singulari volebat. Sunt enim in



florum pallentium alborum congerie elegant, densa, & umbellifera, multis in ramis filiquæ breviores crassiusculæ, quibus singulis singularum inest semen. Folia eadem ferme quæ brassicæ nigre, sed crassiora & latiore aspectu, & fimbriis undulatis plicis, que admodum artificiosis.

Lob. & Pena in Aduers.

brassica marina siluestris multiflora monospermos. Tabern. icon. & histor. English föll fraue Brassica Anglica.

C. Bauh. phyt. brassica 12. siue Angl. Tab. brassica 18. siue silu. maritima. Lobelio marina.

Hist. Lugd. Brassica marina silu. Monospermos Penæ.

Provenit mihi in horto Ill. E. C. Montbelg. ex semine misso ex Anglia per D. I. Gargillum Scotum, ubi multis iam annis durat se propagans etiam furculis, folia valdè crassa, quæ interdum rubent: sapor non ingratus.

BRASSICA TOPHOSA.



Tabern. Icon. & Hist. büchel föll brassica tophosa. Compilatori more suo pessimo sufficit nudam iconem omittit descriptione proponere. Natalem saltem annotasset, ac ita medium eam inuestigandi rei herbæ studiosis reliquisset, nec se suspectum figurarum ficturum reddidisset.

BRASSICA ANGLICANA MINIMA musca.

Descriptio **M** Emerunt Aduers. Lobel. & Penæ, etiam in Anglia horto pusillæ brassicellæ, totam muscam, præterquam ex extremis oras lacinosas fimbriatæque plicis crispantibus, & undulis

rugosis, purpureis asperis maculis, quas etiam ad corollas & olfactoriola nectenda dum tenella adhuc est in hortis colunt.

BRASSICA NIGRA DICTA.

Dodon. Gall. brassica 5. qui ait, sub brassica alba comprehenditur brassica peregrina valde, quæ dicitur nigra, *chou noir*. Caulis niger. Ital. *Negre caules*, Belg. *Schwoere foelen*, Lat. brassica 10. nigra cognominata, de qua dubitatur an ad struthium Plinii referenda sit.

Figuram ponit Fuchianam, quam olim poluerat pro Crispis, idem facit Hist. Lugd. quæ brassicam nigram Dodonzi vocat.

BRASSICA CAPITATA RUBRA.



crasso, atropurpureo, ima parte verrucoso: aliis singulo, aliis in ramos divaricato. Quæ filia fortuito posita stipitata, ex viridi rubentia, aliis sanguineo rubore aut obscuriore etiam tota perfusa, non sine obductu nebula cuiusdam glaucae: crebro crassarum venarum discursu rugosa, patula, firmitate. Flores lutei cauli erecto ha-

rent: quos filique excipiunt palmares, in quibus semen rufum, rotundum. Huius folia patula manent, ac expansa. Hyemem perfert: ac tæpe præsertim culta, at boream acquirit proceritatem firmitatemque, ac ita in pluribus durat annos. Sæpe etiam laterales producit ramulos. Hyeme potissimum culinis expetita, ubi figus extrinsecus præferat. Ramorum extrema aduentante Vere delicatioribus in acetaria expetuntur.

Trago Lat. & Germ. brassica, Foel traüt, brassica sativa maior, brassica sativæ primum genus.

Fuch. Icon. & Hist. brassica 1. genus, brassica laevis: *laie* Germ. breiter aut grosser foel. Galli *Choux* simpliciter dicta.

H. lun. brassica Cumana, laevis, rubra, *laie* *laie* *laie*: Al. Breiter Roter foel. B. Groote roede fol Gloore. Gal. *Chou rouge*.

Dodon. Gall. Brassica rubra prima Catoni, Græcè *ῥαβδωχ*, Plinio brassica Cumana: Gall. *Choux rouge* & *poly*: Germ. Breiter roter foelen / Belg. Groote roede foelen. Lat. brassica vulgaris sativa siue prior, Theoph. *ῥαβδωχ*: Plin. vno loco *laie*, alio Cumanam cognominat: eandem & caulodem quosdam vocitare ait: Cato hanc lauem, appellat, vulgò *Rubra Caulis*. Dodonæus Gal. Fuchianam habebat figuram, quam nunc ponit pro brassica minore: pro rubra verò novam iconem proponit.

Lobel. & Pena Adu. Brassica laciniola rubra Cumana vulgarior. Obs. & Icon. pl. brassica vulgaris, Anglis Keale & Cole: Gal. *Choux verds*, ou *collets*.

Matth. Ger. brassica laevis, Blatt oder Schledde foel traüt / rubra.

Hist. Lugd. Brassica rubra prima species, florem ferens altero anno, sicut & caulis capitulatus. Hæc hyemis frigoribus rariß. læditur, gustu aliquantulum amara ac salsa, maxime ubi adoleverit hiememque attigerit.

Monach. in Mef. brassica siue caulis rubra, siue nigra.


Gesner. de coll. stirp. brassica. Taber. Icon. & Hist. Roter foel, brassica rubra.

C. Bauh. Phyt. brassica 5. siue rubra.

Hort. Lusit. brassica rubra, Brünner foel / rötter foel Koernisch foel. Sci. Boly Schald / Wodre Béal.

Copiosè scribitur quotannis passim in hortis Locus & uti etiam in horto E.C. Hanc brassicam per ali- tempus

Aaaa



Hyemem fert.

Dodon. Gall. brassica rubra 2. species: brassica Lacuturis, Gal. *Chou cabu rouge*. Belg. Koofkens & Roode Sluyt foelen. Lat. in fol. brassica altera species, Brabant. Koofkens vocant: Latine Rosaceam brassicam dixeris. Dodonæus pro hac ponit figuram quam olim habebat ex Fuchianis pro alba.

Lobel. & Pena Adu. brassica coahuoluta & occlusa apud Belgas rubro colore enematibus aptior.

Matth. Germ. Tabern. Icon. & hist. & Hort. Lusit. Rott Cappel fraüt, Brassica capitata rubra.

C. Bauh. Phyt. brassica 4. siue capitata rubra.

Hist. Lugd. brassica rubra 2. species.

Brassicam capitatam rubram habui ex Sultz, ex horto D. Clare à Rinack vxoris præfecti, quæ plantata in horto E.C. Mörbelgardi tulit pulchra capita colore rubro vario tincta, potissimum hieme reposita. Hiemem facile perfert. In Belgio magnus eius prouentus teste Lobelio.

BRASSICA RUBRA VULGARIS.

Procerior hæc reliquis esse videtur. *striptis* namque veluti arborefcit alto, duorum, trium, aut quatuor pedum, aut etiam cubitorum, Tom. II.

quot annos ex semine deciduo in muro è regio
ne fenestrarum ædum in quibus moror duran-
tem vidi.

BRASSICA CRISPA LACINIOSA

Descriptio



crifarum loco expetitas quodammodo repræ-
sentent. *Cossa* plerumque etiam dilutè purpurea
sunt, sicut & ipsi caules *flor* luteus. In cibo rubris
non inferiores.

Fuch. hist. brassica altera crispa, quæ à similiter
dine *Apia* *crispifolia*, id est, *Apiana* nuncupatur,
vulgò *Crispus* caulis: Germ. *Fraüser Föl*: Gal.
Choux crispés. Icon. p. 2. 234. brassica 2. genus.

Dodon. Gall. brassica rubra quarta species,
brassica Sabellica. Neoter. Brassica crispa, Gal.
Chou crispu, velg. ghecronfelde fôlen. Et Lat.
in fol. Brassica 3. Crispa. Theophr. *κρόνιδος* nomi-
nat, atque inter brassicas primo loco refert: Ca-
toni 2. est, Plinio Sabellica. Olim figuram Fuchsi
proponebat quam nunc pro nigra ponit, & no-
uam exhibet iconem pro Crispa.

Lob. & Pena Adu. Brassica nigra vndantibus
crispis & laciniosis foliis: Obs. brassica fimbriata.
Icon. plant. p. 247. Non reperit Matth. meminisse
Plinium, nec eo vetustiores alios, brassica quæ
foliis admodum per ambitum laciniatis, minu-
timque intercisus assurgit.

C. Bauh. Phyt. Brassica 13. siue foliis laciniatis
Fuch. 2. Lob. fimbriata. Apud Matth. videtur
mibi Frater sub brassica crispa Sabauda tradere
varietatem colorum insignem, nostre brassica
crispa latifolia.

Hist. Lugd. Figuram Fuchsi ponit pro nigra
Dodonæ: brassica rubra 4. species: Nigram Do-
don. vocat Fuchsius brassicam crispam: Gal. *Chou*
crispu noir.

Tempus &
locus.

Montbelgardi habemus in horto Il. E. C. Wir-
temb. eam obseruauit cum essem apud Fontem
admirabilem in Visensteig in horto Il. Comitum.

Brassica crispifolia præstantior est leui, inquit
Porta ex Theophrast. quia siccior est, ob id sapi-
dior.

BRASSICA LACINIATA RVBRA.

A Vulgari rubra descripta vixdum magnitu-
dine variat. *Folia* potissimum faciunt differen-
tiam, quæ profundis laciniis sinuatis nonnihil

variant, iisdem modo in latiores, modo in mi-
nores rufus fectis, vt tota penè crispa videatur:
idque potissimum propter minorem laciniarum
contortum: huius quoque *flor* luteus citè *aseta*
& *semen*, vt in reliquis. Hyemem & hæc suffert
Montbelgardi in horto Il. Ex. C. V. Vitemberg,
haud secus ac vulgaris illa scripta, eoque potis-
simum tempore mentis expetitur.

BRASSICA LACINIATA ALBA.

Descriptio



estque vt illa flore luteo, sed minus in cibo acce-
pta, vt hortulanus pertinet.

Tabern. Icon & hist. vocatur Föl Fraüt 2. bras-
sica 2.

BRASSICA TENVISSIMA LACINIATA.



H Adr. Iun.
Brassica
Apiana Plinii,
Sabellica eidem
crispa Plinii: *κρόν*
Nucad. *κρόνιδος*
Theophr. *κρόν*
κρόνιδος Catoni:
κρόνιδος Athe-
neæ, *κρόνιδος* Plin.
Al. *Fraüser*
Föl. B. *Gerouca*
felde oft gebac-
felde Foel. Gal.
choux crispus.
Tabern. Icon
& histor. breyt
Fraüs Föl, bras-
sica Selinisia la-
tifolia. Item,
Schmal Fraüs
Föl, brassica Se-

lenisia angustifolia.

C. Bauh. phyt. brassica 14. siue *Apia* folio angu-
stifolia. brassica 15. siue *Apia* folio latifolia.

Trag. Germ. & Lat. das ander Föl Fraüt, cuius
tria aut quatuor genera, Fraüs Föl. Plinio *Apia*-
na aut crispa. brassica crispa seu Alpina, Te-
nia brassica satius species, cui folia crispa & per am-
bitum

tum incisa: in hoc genere quædam frequen-
tioribus & profundioribus, aliæ rarioribus &
magis exiguis incisuris dissectæ apparent, ita vt
plura eius fastigia constitutere liceat.

Monach. in Mef. Caules crispi.

Dodon. Gall. brassica 3. rubra: Græcè *σινωπιδίς*,
Lat. brassica Apiana: Belg. ghebackelbe Foe-
len. Gall. chou à feuille déchiquée. Et Lat. in fol.
Brassica quarta foliis fistis. Græcis *σινωπιδίς*,
Latinis Brassica Apiana dicta. Plinius Cris-
pam sic dictam vult à similitudine foliorum
Apii: sunt autem Apii folia haudquaquam cri-
spa, sed in varias partes dissecta. Icon. plant. pag.
246. brassica tenuifolia laciniata: Feut. 197.

Camer. hort. brassica Apiana crispa.

Hist. Lugd. duas habet figuras, vnam sub titu-
lo, brassica rubra 3. species Dodon. *σινωπιδίς*: al-
teram verò sub brassica crispa Tragi, & brassica
tenuifolia laciniata Lobelii.

brassicam habemus Montbelgardi in horto
Ill. EC. V. Wirtemberg. tenuissimè dissectam, quæ
hyemem perfert.

BRASSICA THYRSOIDEÆ.

E rubra brassica genere est, patulis ex viridi
atro-rubentibus foliis, subinde laciniatis, per
quæ passim lupinâ parte noua crispiorum foliolo-
rum foboles confurgit, pulchris lemniscis, naturæ
lusu spectando, hinc inde exoriantibus, nunc
breui amento tenuique appendis, nunc latiuscu-
lo petiolo hærentibus, atque etiamnum in alia
deinceps sercula struppâque luxuriantibus, sty-
res, siliqua, semineque ad brassicam rubram vulga-
torem accedunt.

Taber. Icon. & hist. Buschel fôl frâut, brassica
prolifera. Item Buschel frâus fôl/ brassica proli-
fera.

Mira est 6. brassicæ species Hist. Lugdunensis,
quam Asparagodem esse herbarii censent, cuius
mentio fit in Geoponicis Cassiani Constantino
attributis. *Caules & radix* eadem quæ in cæteris
brassicæ generibus. *Folia* nunc sunt laciniata, &
frequentissimis diuisuris incisa, qualia brassicæ,
crispa, nunc planè lata, & expansa. Eadem non-
nunquam tota virent, nonnunquam venis per
ipla folia dispersis, & media costa rubent. Huic
verò id peculiare est & insignè, quod ex foliis ra-
mulum multi breues, torosi, foliosi nascuntur, flo-
rentes suo tempore, & semen edentes, non ali-
ter quam in reliquis plantis, ex caule, vel stipite,
quorum ramulorum cum asparagis similitudo
fecit, vt hanc brassicam asparagodem Græci vo-
cauerint. Hi tenelli asparagi in iure aliquo pin-
gui, vt Capi, aut Verucina eduntur.


Casp. Bauhin. phyt. brassica 10. siue ex cu-
ius foliis ramuli nascuntur. Dalechamp. Aspara-
godes, brassica 11. siue Asparagodes crispa. Ta-
bern. crispa prolifera. Vnam tenemus esse
plantam, non duas.

Vidi in horto Admirabilis Fontis, & in Bir-
chen vrbæ V. Wirtembergica in horto D. I. Lutz
Pharmacop. dicebatur *Federfôl*/ satis ampla
mihi prouenit Montbelgardi in horto Illustr.
E. C. V. Wirtemberg.

BRASSICA RVBRA MINOR.

B brassica tertia propriè vocatur Crambe à
Fuchio in hist. minoribus caulibus, & te-

nuioribus foliis: flore luteo; Germ. *kleiner fôl*
vt ab aliis discernatur, nominari potest. Gall.
choux rouges. Icon. p. 235. brassica tertiū ge-
nus.



Dodon. Gall.
brassica rubra
quinta species
minor. Germ.
kleiner fôlen:
Gal. petit chou.
belg. Sdooren,
Catoni propriè
napel. Omnium
minima silue-
stri penè simi-
lis, foliis primæ
rubra, multo
minoribus, a-
lioqui omnino
similis, fertur
propter semen,
ex quo oleum
paratur, quod
venditur pro
Napi seminis

oleo. Dod. Gall. Figuram non habet, sed eam pro
siluestri posuit ex Fuchio. Dodo. Lat. brassica
5. minor natura sua siluestris: idcirco nec in ciba-
tu desiderata: seminis autem causa præcipuè fe-
ritur, ex quo subinde non exiguus quantus ac-
cedit. Hæc est Veteribus, quam Plinius propriè
napel dici affirmat. Pro hac in hist. Lat. ponit I-
conem à Fuchio positam pro brassica 1.

C. Bauh. phyt. brassica 17. siue siluest. Trago;
Sylu. Fuch. 3.

Hist. Lugd. Postremum brassicæ rubrae genus
Dodonæi. brassica siluest. Item brassica agrestis
napel, cui planè similis est tertia brassicæ
fatiuæ species Fuchii. Figuræ ambæ sunt valdè
similes.

Trago Germ. Crambe vulgaris *Rauchwâl-
fôl frâut/der 4. fôl*. Lat. brassica silu. foliis vulga-
ri fatiua penè consimilibus, sed magis exiguis &
asperioribus, gustuque amarioribus. Brassicæ
vulgaris seu siluestris.

BRASSICA SILVESTRIS.

B brassicæ trifariam dari digestionem superius
dictum est. In satiuam quippe, siluestrem, &
marinam. Et quia de satiuâ hæcenus actum est;
sequitur vt siluestris tractationem suscipiamus.

Siluestri in fit Theophr. plant. hist. lib. 7. cap. 4.
folium leue, sed paruum atque rotundum. Hæc
ramis foliisque permixtis condita est: adhæc
succum asperum & instar medicamenti habet,
quamobrem eo Medici ad aluum purgandam se-
pè vtuntur. Et rursus cap. 6. Nunc de siluestri, seu
ea quam aruensem vocamus, pariter indicare
tentandum est. Hæc aspectu vicina vrbana est;
præterquam quod foliis minoribus, caulibusque
scabrioribus constat, & succo (quia sicciore) po-
tissimum acriori, vehementiorique conditur:
caules sortitur rotundiores, leuiorésque quam
fatiua: & foliorum appendicem illa lata, hæc ha-
bet rotundiorum, vt folium ipsum minùs angu-
latum: nam cætera quidem scabrior tum cauli-
bus, tum foliis constat.

Brassicam siluestrem fatiua similem scribe
quoque Diosc. sed candidiorem, hirsutiorum &
amaram.

Celebrauit & silueftram brassicam siue Erraticam Plinius. Hanc, inquit, alii Petram [quia in maritimis præruptis nascitur, Diosc.] vocant, i-
stimaissimam vino, quam præcipuè Vitis fugiat, aut si non possit fugere, moriatur. Folia habet bina, parua, rotunda, lauia: plantis oleris similior, candidior satua & hirsutior. Sed Plinius hic vt notat Dalech. Marinæ & siluestris historiam confundit. Folia rotunda, parua, lauia marinæ sunt. Nemo bina esse tradit. Res ipsæ salum hoc esse monstrat. Similitudo cum brassica hortensis, folia candidiora, & hirsutiora quàm in satua, & (quod ait Diosc.) amara, siluestris brassicæ sunt. Videtur tamen Cæsalpino Plinius potius interpretandus, quàm confusionis hoc in loco arguendus. Ita namque scribit Syluestris brassica spontè nascens, gustui ingrata, in maritimis asperis, qualis in scopulis illuc nascitur, foliis est ex candido purpurascens, similis satia purpureæ, tantum minor, ne hirsuta, vt Dioscoridis. Hanc Plinius Petram vocat, eque folia bina tribuit, per quæ binas foliorum appendices rotundas intelligit. Theophrastus, vt ex eius verbis colligere licet, hirsutiem negat. Describit alibi Brassicam silv. Plinius, Theophrastum imitatus. Tertia, inquit, propriè Crambe vocatur, tenuioribus foliis, & simplicibus, densissimisque sed efficacissima. Alibi Raphanum vocat, cum inquit, Græci tria genera fecere foliorum differentia, crispi, lævis, tertium siluestre: nam sic Theophr. Græcè vocat quam Diosc. Cramben, & Latini Brassicam. Sed vt nostram hac de re dicamus sententiam. Theophrastum & Plinium nomine Raphani & Brassicæ siluestris, maritimam descripsisse Brassicam existimamus, vt iuo dicetur loco.

Brassica siluestris traditur à Matth. in Diosc. foliis domesticæ similibus, sed Hyolcyami modo hirsutis, amaro ac insuauis gustu.

Syluestris Dioscoridi nuncupata brassica, satiarum minori quinto loco descripta [brassicæ nostræ rubra minor] similis esset, ait Dodonæus, nisi hirsutior, albidior, ac sapore amarior foret: folia siquidem, flores, siliquæque satis respondent. *αβύνη δ' ἐστὶν ἡ Diosc.* Græcè dicitur à quibusdā Hamiliidæ: Lat. brassica sylv. & brassica rustica: Gal. *Chou sauvage ou rustique*. Germ. *See Folen* & *Wilde see Folen*: à Neotericiis Caulis brassica marina, differens tamen à brassica illa, quam Diosc. hoc nomine inscribit, & Recentiores Soldanellam appellant, de qua suo loco. Assumit autem pro brassica silv. Dioscor. Dodonæus figuram, quam pro tertia, vel minore exhibuit Fuchsius.

Tabern. Icon. & hist. *Wilde foel*, brassicam silv. vocat. Nullam autem ponit descriptionem, suspicor factam figuram ad Lobel. in Adu. Brassicam monospermon.

Locus. Nasci autem hanc in maritimis præruptis Dioscorides tradit: reperitur verò ait Dodon. & in multis Zelandiæ altioribus tumulis iuxta mare. In mariumis Senensibus, Argentario promontorio, aliisque um Tyrreni, cum Adriatici littoribus frequens nascitur. Hanc non longè à Terracina vrbe, viâ quâ itur Neapolim plurimam vidit Matth.

Vires. Huius cyma, inquit Diosc. in lixiuio cocta ori non est insuavis. Illita verò folia vulnera conglutinandi, ac tumores inflammationesque discutiendi vim habent. Brassica, autore Catone, erraticam maximam vim habet, eam arefacere, conterereque oportet benè minutim. Si quem voles purgare, pridie ne cœnet, & manè ieiuno dato

brassicæ trita, decoctæque aquæ cyathos quatuor, nulla res tam benè purgabit, neque helleborum neque scamonium, & sine periculo, & scito salubrem esse corpori. Quos diffidas sanos facere, facies. Qui hac purgatione purgandus erit, sic eum curato. Sorbitione liquida hoc per dies 7. dato, vbi esse volet, carnen assam dato. Si esse non volet, dato brassicam coctam, & panem, & bibat vinum lene dilutum, lauet ratò, vtatur vntione: qui sic purgatus erit, diutina valetudine vtetur, neque vllus veniet morbus nisi sua culpa. Et si quis huleus tetrum, vel recens habebit, hanc brassicam erraticam aqua inspergito, apponito, sanum facies. Et si fistula erit, turundam intrò tridito, si turundam non recipit, diluito, succum exprimito, cum in vesicam indito, vesicæ calum alligato & ita premito, vt in fistulam succus introeat. Ea res sanum faciet citò. Et ad omnia vetera vlcera, & noua, contritam cum melle apponito, sanum faciet. Et si polyypus in naso intraverit, brassicam erraticam aridam tritam in malum coniuncto, & ad nasum admoeto. Ita subducto sursum animam quamplurimum poteris, triduo polyypus excidet, & vbi exciderit, tum aliquot dies i dem facito, vt radices polyypi per sanas facias. Auribus si parum audies, terito cum vino Brassicam, succum exprimito, in aurem intrò tepidum instillato, citò intelliges te plus audire. Deinde impetigini parè brassicam apponito, sanam faciet, & vlcus non faciet.

Brassicæ silv. siue erraticæ, inquit Plinius, immenso plus effectus laudat Cato, adeò vt aridæ quoque farinam in olfactu colloctam, vel odore tantum naribus raptò, vitæ earum graueolentiamque sanare affirmet. Hanc in stationibus medicæ, melancholicis quoque ac vulneribus recentibus, cum melle ita ne soluantur ante diem: strumis, fistulis, in aqua contritam, Chrysippus autor est. Et alii verò compescere mala corporis quæ serpant: nomas vocant. Item excrecentia absumete. Cicatrices ad planum redigere. Oris huleæ & tonsillas manducatam & coctam succo gargazato cum melle tollere. Item ploras & lepras veteres ipsius tribus partibus cum duabus aluminis in aceto acri illitis. Epicharmus satis esse eam contra canis rabiosi morfum imponi. Melius si cum lasere, & aceto acri. Necari quoque canes ea, si detur, ex carne. Semen eius tostum auxiliatur contra serpentes, fungorumque venena, tauni sanguinem. Foba cocta splenicis [splenicis ch.] in cibo data, & cruda illita cum sulphure & nitro profunt. Item mammarum duritiæ. Radicum cinis vix in faucibus tumentis tactu medetur: & parotidas cum melle illitus reprimat: serpentium morsus sanat.

Brassica agrestis, vt notat Galenus, quodammodò calidior, siccioreque est quàm domestica: ceu alia propemodum omnia agrestia sui generis domesticis vtraque facultate valentiora sunt. Quamobrem neque intra corpus citra noxam sumitur, vt quæ longius ab humana recesserit temperatura. Eadem de causa & gustantibus amarior est quàm domestica: quamquam domestica quoque acrimoniæ nonnihil & amaritudinis contineat: sed vtramque agrestis habet validam: quare etiam extergit, & digerit, quàm domestica valentius.

Est, ait Dodonæus, brassica siluestris calida, & quia amara, extergens quoque.

ACHANACA INDORVM BRASSICÆ
foliis.in has spinas de hisse, cum in summitate nulla
conspiciantur.

criptio



Huius fo-
lia bifur-
cata & acumi-
nata sunt, Brac-
sicæ amplioris
foliis simillima,
sed non ita
crassa, & te-
nuiore costa, in
horum medio
fructus nasci-
tur cui magni-
tudine, colore
luteo, quem
Alfard nuncu-
pant, alii Le-
facy, rominē
serpentis con-
coloris. Fru-
ctus is magno
apud eos est
in pretio. Tota

planta tibie hominis crassitudine.

Hist. Lugd. Achanaca Theueti.

C. Bauh. phyt. Brassicæ 19. siue Brassicæ folia
petegrina.

In regnis Mely & Tombotu ad fluuium Se-
nega sitis, Medici, *Bisfrains* appellati, aduersus
morbum, qui illic frequentius grassatur, *Borozañ*
nominatus, aut *Zail* Æthiopum lingua, qui ex
immodica Ventre, cui multum obnoxii sunt, or-
tum habet, herbe Achanacæ dictæ decocto, vt
refert Theuetus, potissimum vtuntur. Morbus
autem is genitales partes plurimum occupat,
quæ in homine *Asab*, in femina *Affabatas* nomi-
nantur.

Brassica folio *Nymphaeæ* Caiou-a.

Vidi, inquit Leri hist. Amer. cap. 73. Brassicæ
genus, quod siluestres homines vocant *Ca-
iou-a*, quo in iusculis interdum vtuntur: folia
sunt ei lata & panē *Nymphaeæ* similia.

BRASSICA SPINOSA.



Est hæc C.
Bauh. Phyt.
Brassicæ 16. [apud
Matth. 6.] siue
spinosa, quam
cum integram
Patau in horto
Cl. Bemb non
viderit, eam vt-
que dum integra
offeratur, sic des-
cribit. Ramulus
est sine foliis, aut
saltem obscuris
prope caulis ex-
ortum, in sum-
mo caulis fasti-
gio spinæ tetues,
cauli concolores
digiti articuli lō-
gitudine, ita vt
videantur folia

PERFOLIATA SILIQVOSA.



Elquicubi-
talis & af-
tior est, caule
tereti, tenui, &
in alas diuiso,
ex foliorum si-
nū prodeun-
tes: folia non
diuisa, oblon-
ga, subrotunda,
Napi, colore
glauco, rigida-
la, pingua, fra-
gilia, à caule vi-
dentur quasi
transacti, sa-
pore oleraceo:
flores exalbidi,
Brassicæ: sili-
quæ perquam
longæ, angulo-
sæ semen conti-
nent, Radix te-
nuis, alba, gustu
Brassicæ.

Descriptio

Trago Germ.
& Lat. perfolia-
ta altera, dæ-
ander duræ
iwaçs. Et hæc,
ait i, hæddu-
biæ secundum
Dioscor. Co-
tyledon, seu
vt Marcell.
vocat, Acetabur-
lum, aut Vmbi-
bicus Veneris;
[fräwen nabel]
& quorundam
Cymbalion:
Sed ego nun-
quam hanc ad-
miserim cum

Trago pro Umbilico Venetis, Cotyledonëve.

Brassicæ agrestis species alia [sic enim proposi-
tam à nobis plantam inscribit Cordus, & ex eo
H. Lugd.] cubitalem habet caulem, teretem, gla-
brum, aliquantulum concanum, & in ramulos
diuisum: folia ex intervallo singula profert secus
ramulorum eruptiones, trium aut quatuor vicia-
rum longitudine, paulo angustiora, subrotunda,
glabra, & Brassicæ modo carnosa (in repetitione
verborum Cordi in Hist. Lugd. malè scribitur
corrofa.) flores Veris exitu candidos & oblongos
fert, quibus singulæ succedunt silicula, digito lon-
giores, angustæ, & quadrangulares, oblongo, ni-
groque semine plenæ. Radice nititur exigua, li-
gnola, semelstri & inutuli. Folia Brassicam gustu
imitantur: semen verò amariùs est, & aliquan-
tulum acre. Nascitur pinguibus aruis, leuto &
glutinoso solo.

Dicitur autem Cordo Brassicæ agrestis species
alia, quia iam antè lib. l. c. 31. alterius meminir, de
qua paulò pòst, sub *Glastifolia* Cichoroide, siue
Turriti 2. Clusii.

Hist. Lugd.
not.
Flos cichor.
dus

Hist. Lugd.
1797.

Brassica campestris.

Locus &
tempus.
Collesom
Hisp.

Et licet coeatur Hist. Lugd. Clusii Brassicam campestris i. diuersam facere à Brassicæ agrestis specie alia Cordi, cum ait Clusius aliam pingit & descripsit: Id tamen contra mentem Clusii tenet, cuius verba hæc sunt, Brassica campestris [addit in post. Hist. flore albo] pedales habet caules, candidantes, rotundos, aliquot ramis præditos: folia ex interuallis; Perfoliatæ foliis non valde dissimilia, albicantia, & colore ferè Brassicæ vluialis: caulem sic amplectentia, ut tenellæ plantæ ad Perfoliatam plurimum accedant, gustu seruido: ramulos è lateribus prodeuntes, sustinentes flores aliquot albos, Brassicæ floribus similes, deinde cornicula longa, quadrangula, in quibus continetur semen Brassicæ semini minus, ex rufo fuscum: ita nuncupauit hanc & sequentem, tum quia in agris & campestribus nascentes cõspiciebam & mense Martio florescentes, in Murciano agro, iuxta vias ad Eliocretam urbem vulgò Lorca dictam, ubi Martio florebat: tum quia quid Murciani *Colleion* appellabant, id est Brassiculas. Cordus hanc primam speciem non ignorauit: nam Brassicam Campestris vocat, quam verisimile est apud suos in agris nascentem obseruasse, ac propterea agrestis nomen indidisse: non desunt qui brassicam semine quadrangulo vocent ineptè: à corniculo potiùs, in quo semen, nam semen quadrangulum non est. Sed & hoc genus spontè crescens obseruabam magna copia in aruis Viennensis agri, Maio florens.

Plant. Icon. p. 396. Perfoliata Napifolia Anglorum siliquosa. Lob. 215. Teut. 482.

Taber. Icon. & hist. Perfoliata napifolia *Surdwachs* mit Stodfruben.

Dodon. Brassica silv. perfoliata, quam alteram campestris Brassicam nominant: nonnulli etiam montanam, vel perfoliatam. Huius etiam meminit Camer. apud Thal. quando inquit: In aruis Thuringiæ non admodum diuersa Brassica silv. folio pætæ Thalii nascitur, quæ cum Brassica campestris descripta à Clusio in Hisp. obseruationibus planè congruit.

Hort. Lusit. Brassica campestris Clusii. H. Perfoliata siliquosa, wilder Föl.

A me fata in horto Ill. E. C. quotannis se renouat semine deciduo, eodemque maturo Augusto. Spontanèam magnam obseruavi in segetum agris Ducatus Vviremb. circa Marbach, ubi Romanorum olim erant limites, mense Junij florentem cum siliquis longis.

Eius acrimonia proximè ad Brassicæ facultates hanc plantam accedere indicio est, autore Clusio, & illà valentiorē forsitan esse. De huius facultatibus compertum nihil habet Dodonæus, à nemine enim in cibum admittitur.

Perfoliata siliquosa purpurea Clusio.

Fl. minoribus est virgis, nec aded ramosis, cuius folia in summo aliquantulum serrata, reliquis notis à Prioris foliis non differunt, & seruido sunt etiam gustu: flores Prioris floribus similes, maiores tamen, Leucoi aut Hesperidis floribus magnitudine pares, colore autem Lunatiæ græcæ flori, purpureo videlicet: cornicula succedentia prioribus similia & simile semen continentia. Radix, licet dura fibrisque quibusdam prædita sit, viuax tamen non est, sed prolato semine perire solet.

Clus. Hispan. & ex eo Hist. Lugd. Brassicæ campestris aliud genus, siue secundum. Hist. verò

post. Brassica campestris 2. flore purpureo:

Brassica silv. maior latifolia Thalia.

Radicebus consistit inutilibus, lignosis, candidis: caule, sequis palmari, non admodum recto, rotundo, simplici, nonnunquam etiam brachiato, foliis mollibus, læuibus, subflauis, integris, sine incisuris aut sinuosis crispaturis, mucronatis, duas uncias longis, unciam latis. In summitate in exiguis pediculis racemus florum candidorum existit, ex oblongis vasculis Brassicarum satiuarum modo prominentium: quibus deperditis siliqua oblongæ pronascuntur, semina Brassicæ satiuæ minora continentes.

C. Bauh. Phyt. Brassica 25. siue silv. maior latifolia Thalia.

Turritis vulgarior.

Nasturtio siluestri adiungitur planta, quæ Turritis vocatur: inquit Taberna, radice fibrosa, vt in Plantagine videre est: ima ipsius folia per terram hinc inde sparsa iacent, Saluæ foliis confimilia: ex radice caules aliquot rotundi, exigui, acuminatisque, & læuibus foliis donati, emergunt, quæ acetosæ foliis comparari possunt, in summitate caulium, multa exigua tenellaque foliola conueniunt, sicuti in [Saubertio] Hippuride, quæ velut ex aristis composita sunt. In caulis culmine exigui siliquis sunt conspicui, qui si deciderint, tenellæ acuminatæque reliquæ manent capsulæ [tâschlin]. Cur autem hæc planta Iberidibus annumerata fuerit planè me fugit, nisi fortè ob acrem ipsius gustum contigerit. Confarinator credidit se hîc demonstrare valde industrium, cum tamen ex icone, malè considerata, malè fingat descriptionem. Ex siliquis enim fingit perulas siue capsulas, ac ex siliquis facit folia quod facillè est animaduertere ex sequenti Clusiana descriptione.

Sic autem Clus. de Turrita vulgariori. Drabæ 2. & tertiæ congener videntur planta illa, quæ vulgò apud eos qui stirpium cognitione & studio delectantur Turritis nomen obtinet, ab extremorum caulium forma, qui in metæ aut pyramidis effigiem desinunt: habet verò prima, quæ & frequentior & vulgarior, conferta circa radicem folia, binas uncias longa, succulenta, hirta, & aspera, saturatiore colore viridi prædita: inter quæ pedales, aliquando etiam cubitales promittunt quos inordinata ambiunt folia, circa pediculum latiora, deinde in mucrone desinentia, succulenta & hirta: summo caule conferunt nascuntur multi exigui flores, quatuor foliis albis constantes: quibus discussis, alii apparent, caulibus fastigio sensim, veluti in metæ formam, sese attollente, vt tandem frequentibus longiusculis corniculis cinctum conspiciatur, quæ pusillum, rufum, acre semen continent: radix illi alba, multis fibris prædita, quam tamen viuacem esse non pato.

Tabern. Icon. & hist. Gerardo & Icon. pl. p. 220. Turritis. Teuton. 262. Turrita 1. vulgarior.

Spontè provenit in plerisque Austriæ collibus lapidosus & salebrosus. Floret Maio, semen maturum est Iulio.

GLASTIFOLIA CICHOROIDES IOH.

Bauhini: & Turritis secunda Clusio.

Radice est annua mediocriter crassa, alba, non-nihil purpurascens, fibrosa, subacta, folia, gigni:

germinatione primâ antequam caulem proferat partim laciniata, Cichorei vulgaris instar, vel Hieracii, alia nullo modo incisa, glauca, latidis foliis similia; palmo sæpe longiora semunciam lata lanuginosa, sapore acris & amaro: adulta & quæ in caulibus sunt integra nulla diuisura incisa, glabra, utrinque glauca, oblonga, ita pinnis alarum coeuntia, ut à caule perforari videantur, sapore Brassicæ vulgaris. *Caulis* cubitalis, & bicubitalis, tenuis, colore herbaceo, admixta aliqua purpura, multis ramis longis tenuibusque brachiatus: ex alis & summis ramis flores prodeunt multi simul iuncti ex pediculis semuncialibus, ex luteo in albidum languentes, odore nullo manifesto, quaternis foliis constantes; quæ totidem foris circumstant, sed longè minora & virefcentia, mucronataque, cum illa subrotunda sint, in medio crocata flamina multa, cum stilo viridi. Succedunt tandem *Siliquæ* longæ, rectæ, graciles, in quibus semen.

An Cordo hist. Plant. Brassica silv. virgata: 5. Si tamen nostram plantam intelligit, omisit in sua descriptione folia inferiora Cichorii similia.

An Thalia Harcyn. Brassica sylvestris longifolia?

Huic sibilis est, ait Camer. in addit. Thalii, si non eadem, quæ in Thuringiæ saltibus locis æditis passim nascitur ab incolis Schoßtraut vocata, quæ tamen voce alibi alia plantæ appellatur.

An Clus. Hist. post. Turritis maior siue altera? Rariùs, inquit, inuenitur prior, & umbrâ magis delectari videtur, quare faciliùs in cædis silvis quam apertis collibus (in quibus prior gaudet) nascitur. Floret Aprilis & Maio. Huic valdè similis (nisi eadè sit) nata Jacobo Plateau, semine nescio unde accepto. Illius ad me iconem etiam cum variis aliis mittebat. Non videtur ab similibus Brassicæ virgatæ Cordi. Describit & alius Hist. Lugd. ac depingit sub inscriptione Sinapi albi. Hæc autem tempe eius verba: In asperis & saxosis hoc Sinapi adolescit, radice dura & solida, candida, brachiata, & nonnihil fibrosa, foliis proximè radicem in orbem sparsis, multis infectis Cichorii modo, adulto caule pereuntibus, & exarescentibus, in caule numerosis, læuibus, crassis, in cuspidè mucronatis, quæ caulem attingunt lunatis, caule cubitali, nonnunquam altiore, rotundo, infernè rubente, in ramulos multos supernè diuiso, flosculis multis scatentes, candidis, quibus succedunt graciles & prælongæ siliquæ, multo semine gratioz, acris & fernidi gustus, eleganti specie siliquarum tanquam vallo quodam circa caulem & furculos erectarum: Floret Maio mense. Quidam Thlaspeos, alii Drabæ genus esse volunt. Placet descriptio Hist. Lugd., quamvis in floribus colore nonnihil differat: ac Icon, licet folia inferiora quodammodò Cichorio accidentia habeat, nihilominus melior est nostrâ emptitiâ.

An Iacob. Theod. Tabern. hanc intelligit per Vaccariam, suam par. 2. p. 298. Ruchblumen/ Ein art Marien Rößlin. Icon Tabern. malè repouitur inter Lychnides, malè etiam dicitur German. Marien rößlin, quandoquidem nihil habet cum iis commune: sunt enim huic siliquæ longæ & flores minimi, ut demonstrat eius icon, an sit autem nostra planta asserere non auiam, folia Cichorii inferiora appicta non habet quæ respondeant nostræ plantæ.

C. Bauh. Phyt. Brassica 20. siue silv. foliis circa radicem Cichorii modo insertis. Cordo Brassica silv. virgata, Sinapi album Lugdun.

Glaucifolia mea Cichorioides abundat Mont-

belgardi in Horto Ill. E. C. Vviremb. spontaneâ florens Aprilis, & siliquas habens Iunio: tota hieme viret cum foliis Cichorii. Gargillus obseruat circa Basileam in sabuletis ad Rheenum itinere Grentzachiano.

TURRITIS PVLCHRA NOVA.



Caulis sur-
git tricu-
bitali, striato,
hilaris virore
perfuso, sub-
hirtulo: folio-
rum inferiorum
quædam tres
vncias longa,
angusta, cir-
cumquaque
integra, pedi-
culo longo, aliâ
longiora, qua-
tuor aut quin-
que vncias
colligentia,
pediculû ver-
sus profundius-
culè incisa: at
enim quæ per
caulem conspiciuntur la-
tiora & breuiora sunt, sextantalia circiter, cau-
lem pinnulis complexa, Myagri foliis aliquatenus
similia, sapore nullo eidente. Color om-
nium viridis, porro ex foliis vniuersiusque per
caulem, cubitali serie sursum versus, ramulus
prodit, ut in Glaucifolia Cichorioides nostrâ, cuius
extremum occupant conferti flosculi exiles, folio-
lis oblongis albis constantibus, satuo sapore. Suc-
cedunt siliquæ longæ.

Hanc Argentinz in hortu Dj. Friderici Meyeri Locus &
florentem collegimus mense Maio, qui Turritum Tempus
pulchram nouam denominabat.

BRASSICA SILVESTRIS PRO-
cera Thalia.

Hæc radice fulcitur multifida, candida, ligno-
sa, iuxta cuius caput in terra reclinantur fi-
lia quincunciali sæpe longitudine, vnciali latitu-
dine, hispida, integra, caulem erigit vnicum, ple-
rumque sæpe etiam in duos tresve aut plures a-
lios iuxta radicem diuisum, bicubitalem, rectum
tetetem, flexibilem, iuxta radicem etiam parum
hispidum, deinde tota reliqua parte læuem: cui
folia appenduntur sextantali longitudine, vnci-
ciali latitudine, subcinerea, læuia, non hispida,
ut priora, mucronata: quibus cessantibus, pos-
tea longo ordine, caule videlicet subinde pro-
cerius exrescente, in singularibus exiguis pedi-
culis flosculi parui, candiduli protenduntur, i-
isque euanescentibus subnascuntur siliquæ ad la-
tera compressæ, tenues, digiti longitudine, qui-
bus numerosa semina paruaque continentur. Ex
foliorum autem singulis alis non infrequenter
noua adnata progrediantur, & ipsa copiosius flo-
res ac siliquas proferentia. Nascitur montibus
apricis ac locis cædis, estque sapore amaro.

*C. Bauh. phyt. brassica 21. siue silv. foliis circa
radicem integris & hispidis, Thalia silv. procerâ.*

Lobel. Turritis. Aliquando & maius folia ad radicem, Cichorii instar, inserta sunt. An Turritis eadem sit cum Thalii brassica, vt vult Frater, adhuc dubius sum, de Turriti secunda dicit Clusius folia nonnihil crispa & sinuosa, non tamen ait Cichorii instar inserta, de prima nihil etiam tale dicit, nec icon demonstrat: tamen, vt verum fatear, Turritim secundam malim referre ad Thalii Brassicam siluestrem longifoliam.

Brassica silv. foliis membranaceis Thalia.

IN Ienenibus montibus aliquoties, hanc obseruauit Thalius: iam verò dictis minor est, radice parua, candida, superuacanea, caule breui, geniculato, qui densè ambitur suis foliis, quæ membranaceæ sunt substantiæ, subliuæ, splendens, læuia, vncias duas longa, vnam lata.

C. Bauh. Phyt. Brassica 22. siue silv. foliis membranaceis Thalia.

Brassica silv. folio Beta Thalia.

Descriptio

ASCITUR hæc, inquit autor noster, copiosè in Hainleitta sylua non procul à Sondersbusio sub faginetis. Radice constat lignosa, multifida, fibrosa que: folia betæ, rotundiori ambitu in terræ superficie multa disperguntur, plumbei fulciue coloris, læuia, durioris membranæ instar, sextantalia, caules eriguntur teretes, selquipedales, splendentes, fusci, pauca, oblongiuscula, ac mucronata folia continentes, floresque candidos proferentes, exiguos, sed siliquis longiores exteris speciebus.

Brassica silv. media Thalia.

Descriptio

REUIORA continet folia, numerosa circa radicem, vncialia, oblongiuscula, in obtusum mucronem sinientia, mollia, semunciali latitudine: quæ cauli appenduntur dodrantali, ea parte quæ adherent vtrinque velut alares pinnulas prominentes habent.

C. Bauh. Phyt. Brassica 23. siue silv. media Thalia.

Brassica silv. minor Thalia.

FOLIOLIS multò minoribus, canis, coliculis quadrantibus, siliculis angustis paruisque, Thal.

C. Bauh. Phyt. Brassica 24. siue siluestris minor Thalia.

RAPVM SATIIVM ROTVNDVM & oblongum.

C A P. II.

Descriptio

RAPI folia per terram sparguntur ampla, ad Brassicæ rubræ folia quodammodo accedentia, attrouirentia, aspera, & ad costam vsque ferè laciniata, saporis holeracei: flores lutei: semen in siliquis rufum, rotundum, Brassicæ proximum: radix sessilis in ventrem amplissimum, capiti humano interdum paulò minorem extuberrat, tenuem fibræ alimentum futuram demittens, aliàs pugillari par, aut etiam suppar, quibus vtrinque caro candida, firma satis, sapore æri, magis minùsque vegeto prædita: est etiam vnam genus longa crassa radice, non in ven-



stem extuberans.

Rapum tam Vetres, quam Recentiores duo prima constituunt genera Satium & siluestre. Theophrasti quidem verba de Rapo satiuo hæc sunt. Rapæ (ῥαπαῖδος) alii esse, alii non esse diuersitatem generis putant, sed mare tantum, feminæque differre, nasciq; ambas

ex eodè semine: sed vt efflorescent, raras deponere oportere: nam si densè posita sint, omnes masculifcere. Quod idem futurum sit si in terra vitiosa feratur. Quà de causa femine satas plantas transferentes deponere. Semen quoque deterius, meliùsve visu percipi posse: quod enim probum sit, terue sentiri, quod vitiosum, crispum. Gaudere & frigidibus Rapam, & sic eam dulcescere putari, simulque incrementum in radicem, non in folia verti. Austrinis atque serenis temporibus celeriter caulescere.

Plinius Theophrasti sententiam repetit his verbis. Raporum genera Græci duo prima fecere, mascul. & femininumq; & ea ferendi modo, ex eodem semine. Denfiore enim satum masculifcere, item in terra difficili, semen præstantius quod subtilius. Species verò aut in latitudinem fundi, aut in rotunditatem globari: tertiam speciem siluestrem appellauere. Sed de Rapis &c. abundè dixisse poterat videri Plinius, nisi Medici masculini sexus facerent in his rotunda: latiora verò & concava feminini. Præstantiora suauitate & ad condiendum faciliora, quæ sapiùs lata transeunt in marem.

Quod verò Galenus inter Rapum, quod ῥαπαῖδος est, & Napum qui κοῦραι, non distinxerit, factum putat Cornarius, quòd Theophrast. (vt apud Athenæum habetur) βυνιάδα non nominet, matrem quidem vocet quoddam Rapum, & fortassis hoc βυνιάς sit. Galeni verba hæc sunt. Siue ῥαπαῖδος vocare volueris, siue κοῦρα hanc plantam, oleraceum in ipsa est id, quod è terra eminet, quod verò in terra continetur, radix. Rapi porro satiuus duplex esse genus planum fecit Nicander lib. 2. Georg. apud Athenæum:

Rapi, aduerbe animum, genus duplex est, vt & Radicula:

Oblongum alterum, alterum rotundum, in arvis hortorum conspiciuntur.

Dioscorides rectè distinxit Rapum, & nostrum, inquit Cornar. adhuc hodie vtrumque agnoscunt ac habent, latum & rotundum.

Tragus Rapa depingit & describit, dicens, Rapum vulgare cum oblonga figura masculinum, cum rotunda femininum ex vno & eodem semine gignuntur.

Ex Theophrasto colligere est, inquit Turnerus, Rapum satiuum i. insigniter magnum esse feminam, alterum verò siue longius & exiguius,

lus, quod Plinius ait in latum crescere Marem. Rapum maius, orbiculatum seu turbinatum, Aduersariorum variat radice terete atque rotunda, oblongiore, & Napo similiore effigie, sed maiore triplo. Hæc eadem, aut certe simillima Venetis olitoribus vixit fertur in forum. Hyeme purpurâ nitida & pellucida radice, gustu teneriore, suauiore, in acetariis cruda cum Eruca, Lactuca & aliis illic escitari solita.

Lob. Obſ. p. 93. & Icon. plant. p. 197. Teut. 235. figuram habet Matthioli figuræ similem. Item aliam ex Matthioli cui titulus, Rapum tereci rotunda oblongaque radice, Aduers. p. 66.

Tabern. Icon. & hist. Rapum orbiculatum, Scheibe rübe. Rapum orbiculatum minus, Flein Scheiben Kappen, Flein Scheiben rüben. Rapū longum, lang rüben. Rapum longum minus lang Stoppel rüblin.

Gerard. Rapum maius Great Turnepe. Item Rapum minus, Smal Turnepe, Icones habet Tabern.

Sic & Cæsalpinus inquit, Rapæ quædam sessili rotunditate constant iucundiores: quædam in rotunditate oblongæ sunt: alii color omnibus candidus. Theophrasto mas & femina. Plinius Græcos secutus duo prima genera fecit masculum & feminam.

Contra communē sententiam decernit Matth. dicens: Rapum satium in triplici differentia, sessile, longum, & rotundum: tamen Plin. literis mandauerit longum erraticum esse. Quædam colore purpurea. Matthiolum autem tunc non animaduertisse quid astrueret manifestum fit ex eius post. com. cum magnis fig. Lat. & Ital. Item hist. Germ. quibus in editionibus Rapa duo tantum commemorat, Rapum rotundum siue sessile & Rapum longum.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Rapa. siue satium rotunda seu mas Theoph. & Plinio: variat radice, reperitur vel viridi, vel candido, vel puniceo colore, sic paruitate & magnitudine: communiter tuberosa est, raro globi instar orbiculata: frequentius in latitudinem effusa, quare Tabern. quatuor habet figuras: Habentur nunc quæ foris & intus flauescunt: sic & Bernæ quæ obloletæ nigra, vti plurimum rotundæ, rarius oblongæ, quæ vulgaris dulciores sunt. Rapa 2. siue satia 2. oblonga, seu femina Theophrast. & Plinio. Tabern. duas habet figuras. Hæc Cæsp. Bauh. Ego quidem Tabern. duas priores figuras refero ad Napum, ac separo à Rapa.

Schvv. Rapum longum vulgatius, Rapum oblongum Dodon. Rapum orbiculatum.

Quæ γερρανη & γερρανης, item γαρπη & γαρπη Græcis. Latinis Rapum & Rapa dicitur, unde diminutivum nomen apud Horatium Rapulum. Hebræis teste nomenclatura Eliæ Leuitæ, Trag. Lephet, Arab. seliem, selgem, selgiem, siue Alsegiem. Germ. Rüben. Belg. Rapen. Gall. Raue & Nauau. It. Rapa. Hisp. Nabo: Angl. Turnepe. Hung. Képá. Bohem. Řípa.

Græci quidē γερρανη aut γερρανης vocabulum à figura quæ plerumque rotunda esse solet, deorsulerunt: nam quod in rotunditate circumactum est γερρανης, hoc est γερρανης dixerunt. Et Hippocrates gongyli vocabulum pro globulis orbiculatis, qui deorantur ut catapotia, usurpauit. Rapa verò quod ex terræ rure, quasi ruapa, Varrone teste, nominata est. Alii quod passim rapiatur, api nomen inditum esse putant. A Græcis tamen manasse id nomen facile videri potest, qui chaphyn & rapyn auctore Athenæo dicunt. Ra-

pas Lacedemonios γαρπη id est, ventres vocare Apollas apud eundem Athenæum tradidit. Sed Nicander Colophonius rapas Zacetidas appellari voluit. Amerias & Timachides non Rapas, sed Cucurbitas ita dici arbitrantur. A rapo rapina, Gallis Rabiere & Rapitium deflectitur, unde rapitios caules dixit Caro.

Rapum in hortis & aruis cultis potissimum æstate, Iunio ac Iulio mensibus, copiosissime Genææ ferunt pro alimento tum hominum, tum pecudum, basileæ maxima habent & abundanter vescuntur. Conferuntur etiam agri capis Montb. & in Horto Il. E. C. Vidi Geppingæ Rapas allatas Vlmâ venales, quæ parte superiore rubebant mense Augusto. Sed & Octobri sine nactis sum alias ex Horto Il. E. C. Geppingâ allatas, longitudinis cubiti & semis, ad palmum rubentes, quam partem dicebant supra terrâ extare. In Italiâ notissima præsertim apud Insulbes, ubi statim post messem æstate Iunio ac Iulio (teste Matth.) mensibus in aruis secundo feritur: deinde mense Octobri è terra eruitur: radix in aliquibus locis tam magna gignitur, ut plûs quàm centenas libras pendeat. Ad librarum triginta pondus nos sæpius innumera Rapa vidimus in Ananienſi agro, longa, & colore purpurea.

Rapa quamvis in vniuersum in omni aëre habitabili proueniant, attamen solum putre & solutum pluribus iterationibus arari, vel rastri, largoque stercore satiatum postulant. Nam id plurimum refert, non solum quod melius ea proueniunt, sed quod etiam post fructum eorum sic tractum solum segetes optimas facit, desiderant, nec densa nascuntur humo, sed campis & locis humidis lætantur. Loci proprietas horum semina commutat. Namque in alio solo Rapa biennio lata conuertitur in Napum, & vicissim ex Napo fit Rapū. Semen Raparum trium annorum producit Brassicam, & contra Brassicæ Rapas. Riguis locis rectè à Solstitio feruntur: siccis ultima parte mensis Augusti, vel prima Septembris. Iugurum agri non amplius quatuor sextariis Raparum feminibus oblerendum est. Rapa igitur duas sationes habent, sed meliorem mensis Augusti. Si æstate ferantur ne Culex tenera adhuc proreptia folia consumat, puluis etiam, qui supra Cameram inuenitur, vel etiam fuligo quæ supra focos tectis inhæret, colligi debet: deinde pridie quàm satio fiat, cōmisceri cum feminibus, & aquâ conspergi, ut tota nocte succum trahant. Nam sic macerata postero die rectè feruntur. Veteres quidem auctores, ut Democritus, præcipiunt semina omnia succo herbæ, quæ sedum appellatur, medicare, eodemque remedio aduersus bestiolas vti, quod verum esse nos experientia docuit. Sed frequentius tamen, quoniam eius herbæ minus larga est facultas fuligine: & prædicto puluere vitur, satisque commodè tuemur his incolumitatem plantarum. Rapæ semina Higinus putat post trituram iacentibus adhuc in area paleis inspergi debere, quoniam sunt vastiora capita, cum subiacens soli duntia non patitur in altum descendere. Nos istud sæpè frustra tentauimus, itaque Rapum, & Raphanum, & Napum melius existimamus subacta terra obrui. Locis frigidis, ubi timor est ne Autumnalis satio hyemis gelicidiis peruratur, arundinibus humiles canterii sunt, iisque virgæ transuersæ imponuntur, & virgis stramenta supra iaciuntur, & sic à pruinis semina defenduntur. Vbi verò apricis regionibus post pluias noxia inceserunt animalia, quæ à nobis appellantur Eruce, græcè autē γερρανη nominan-

Locus & tempus

Cultura.

Satio

tur, vel manu colligi debent, vel matutinis temporibus frutices olerum concuti. Sic enim dum adhuc torpent nocturno frigore, si deciderint, non amplius in superiore partem prorumpunt. Id tamen superuacaneum est facere, si ante satiationem semina, ut iam prædixi, succo herbæ sedi macerata sunt: nihil enim sic medicatis nocent Erucæ. Sed Democritus in eo libro, qui græcè inscribitur *πεί δυνάμεις* affirmat has ipsas bestio- las enecari, si mulier, quæ in mensuris est, solu- tis crinibus & nudo pede vnâquamq; aream ter circumbeat, post hoc enim decidere omnes ver- miculos, & ita emori. Hætenus Columella.

Rapæ si serantur diebus calidis, autore Theo- phr. celerius caulescunt, semenque oculis red- dunt. Item, si ratæ serantur, magis grandescunt, ideoque ubi nimis spissæ eius plantulæ natæ fue- rint, cum aliquod robur acceperint, euelluntur aliquæ, ut cæteræ roborentur. Naporum medi- cina est, inquit Plinius, siliquis vnâ seri, sicut O- lerum Cicer: atcet enim Erucas. Quo si omisso iam natæ sint, remedium est absynthii inspersus, & aizoni &c. Nebulis & pruinis, inquit idem, ac frigore vltro aluntur amplitudine admirabili. Quare non sunt in Gallia quàm in Lemouicis copiosiora, suauioraque, assatum suppeditante eius regionis cælo nebulas, frigora, pruinasque. Fri- gore enim dulciora fieri existimantur, & grand- iora. Folia quod plura adimuntur, eò maiores manent radices: Rapæ maledictio, ut in iis agris quibus sanè nunquam proveniat bonum fru- mentum, etiam si simo multo emendetur. Col- liguntur mense Octobri, cum radix hummoperè extuberaverit: quod Nicander in Georg. hisce testari videtur:

Rapæ collige Ærea frigoris iam domita,
Hyemi gratæ famulisque, tum demum orioſi.

Vices

Rapæ demum quia tenui & diluto cortice in- teguntur, faciliè exsiccantur, imbecillesque ad perdurandum penitus sunt, idè si terra coop- riantur, vsque ad ætatem, ut vult Theophr. du- rare & crescere possunt. Quæ verò corruptæ & marcidæ videntur calente aqua madefactæ reui- uiscunt, & ad esum aptæ redduntur. Rapi cocta ra- dix, inquit Dioscorides, alit, inflationem parit, humentem ac fluxam carnem creat, Venerem sti- mulat. Decocto podagræ perñiesque fouen- tur: contritoque Rapo atque imposito iuuantur. Si excavatæ radici rosaceum ceratum adigatur, & feruente cinere eliqueſcat, exulceratis perñioni- bus proficiet. Cymæ eius decoctæ manduntur, & vrinam cient. [Græcè habetur, *ὅτι δὲ αἰνὶς ἀποδίδωκεν τὸν ὑπερβολικὸν ἰσχυρὸν ἐπὶ τῇ ἀνοδύνῃ*. Id est, semen antidotis & theriacis, quæ sensum doloris auferunt, anodyna vocant, idoneum est, *τὸ δὲ σπέρμα τὸ ἀντιδότης καὶ θηριακὸς ἀνὰ νότον ἔχει*. Id est, semen antidotis & theriacis, quæ dolores leniendi vim habent admodum vtile est.

Ruell. not.

Quare Ruellius minùs rectè *ἀνὸδυνα* quæ sen- sum doloris auferunt, interpretatus est: sunt enim ea *ὑπερβολικὰ*, id est, stupefacientia, quæ sensum, non propriè dolorem, tollunt eximia sua frigidi- tate. Anodyna verò quæ non extinguendo sen- sam aut stupefaciendo, sed partes relaxando, & demulcendo dolorem leniunt & mitigant.] po- tum contra venena salutare est: Venerem concit- tat. Rapum muria conditum minùs alimenti suf- ficit, sed multò magis appetentiam recreat. Di- philus Silphinius Medicus, Rapum, inquit apud

Athenæum, extenuat, acris est, ægrè cõquiritur; flatulque gignit. Allum verò faciliùs cõquiritur, & valentius extenuat. Huius meminit Eubulus in Ancylone hoc pacto: Allandum hoc Rapum ala- ſero: Item Alexis in Fanatico: Alloquor Ptole- mæum dum fuisse Raporum alio.

Rapum sale conditum magis extenuat, quàm elixum, ac præcipuè si addatur Sinapi, ut ait Di- philus. Veteres autem, ut auidiores cibi forent vlos Rapis fuisse aceto & Sinapi conditis, plantum facit Nicander libro 2. Georg. his verbis:

Abſcinde radices Raporum, & corticem nondum exuicium,

Illaque purgas a minutim ſeca, & inſolatu
Exſiccata paululùm, inſeruentem cum deneg-
ſeris

Aquam, & abſerſis, obrue multa muria:

Nonnunquam verò muſtum album ſimul cum
aceto mictor.

Par pari, & in ollis ſtipata Rapæ ſale rege:

Sapiùs autem inſerſis vnâ paſſæ acinis, piſſillo
vritum

Sinapi mordax ſemen additur, cui ſi accedit

Aceri ſax, haliu caput rentabit vel robuſtiſſi-
mum.

Sic condita Rapæ muria ru hauries, & cum
tempeſtiuum eris, præbebis cibo indigentibus.

Potèrò tandem ferè Rapi vſum cum Dioc. tradit Plinius. Est & Rapo, inquit, vis medica. Pernio- nes feruens impositum sanat. Item frigus vellit ex pedibus aqua decoctum. Et ius feruens po- dagris etiam frigidis medetur. Et crudum ruſum cum ſale cunctumque vitio pedum. Semen illitum & potum in vino, contra ſerpentes & toxica ſa- lutare eſſe proditur. A multis verò antidoti vim habere in vino & oleo. Democritus in totum ea abdicauit in cibis propter inflationes. Dio- cles magnis laudibus tulit, etiam Venerem eb- eis ſtimulari profeſſus: item Dyonisius, magis- que ſi Erucâ condirentur. Totum quoque ar- ticulorum dolori cum adipe prodeſſe. De Rapis verò ut cibis idem ita ſcribit. Aliis vſus præſtan- tior quàm his non eſt. Ante omnia namque cum- ctis animalibus naſcuntur, nec in nouiſſimis ſa- tiant ruſ alitum quoque genera, magisque ſi decoquantur in aqua. Quadrupes & fionde eorum gaudent. Et homini non minor rapacio- rum (melius ex vetere codice legas Rapiorum) ſuis horis gratia, quàm Cymarum: ſtaccidorum quoque, & in horreis exſiccatorum, vel maiot quàm virentium. Ipſa verò durant & in ſua ter- ra ſeruata: & poſtea paſſa penè ad alium pro- uentum, famemque ſentiri prohibent. A vino atque meſſe tertius hic Tranſpadanis fruſtus.

De iſdem ſic Galenus. Huius plantæ olera- ceum quidem eſt quod terrâ extat, radix autem quæ terra continetur, dura quidem eſt niſi co- quatur, & non eſculenta: aquæ autem incocta nulla plantarum congenerum minùs nutrit. Hanc quoque variè vulgò apparant, adèd ut ace- to vel muria condientes, in totum annum ipſa vſantur. Succum autem in corpus diſtribuit me- diocri craſſiorem. Proinde ſi quis ipſa liberalius veſcatur, ſuccum crudum aſſeruabit, potiſſimum. ſi ipſam minùs uſto in ventriculo conſecerit Quod verò ad ventrem attinet, nemo ipſam, neque deiicere, neque ſiſtere dixerit, præſertim cum cocta bellè fuerit. Coditionem enim diuturniorem poſtulat: eaque eſt laudatiſ- ſima, quæ cocta bis fuerit, Quod ſi ſumpta crudior fuerit, concoctu eſt diſſicilior, ac ac ſtulentia, ſtomachoque noxia. Nonnun- quam

quam autem & ventrem mordicat. Præterea scribit Galenus Rapi semen Venerem excitare, vt pote spiritum flatulentum procreans. Sic & radicem coctum difficilem esse, inflare, & semen generare.

Hic adiungenda Symeonis Sethi de iisdem sententia. Rapa admodum nutrit, inquit, vrinam ciunt, inflant, genitale semen gignunt, fauces leniunt atque thoracem. Crebrior illarum vsus crassum humorem generat, & obstructions iecoris parit. Ventrem nec sistant, nec mouent. Si cum aceto & sale edantur, appetentiam excitant. Horum semen tritum, & haustum magna copia Venerem fuscitat. Aiunt enim qui hoc ipsum semen cum calamintha & lemnia terra sumplerit, eo die neque veneno, neque venenati animalis mortu lædi. Appensum inguinum morbis peculiari quadam proprietate medetur.

Rapi domestici, auctore Matthiolo, radix exalciat & humectat. Semen verò calidum est, & siccum: cum autem etiam sit amarum, abstergit, aperit, digerit, atque flatus gignit. Constat experimento, semen valere ad variolas & morbillos: nam potum semidrachmæ ponderis, morbillos latentes ad cutem expellit.

Valeat, inquit Schvv. semen Rapi longi ad faciliorem Scabiei, Morbillorum & variolarum eruptionem. Nam humores ad cutem propellit, & pondere potum. Rapi orbiculati sub cinere calente assisimus orbiculus calidissimus, post aures applicitus magnâ efficacîa reuellit, capitique & dentium dolores citissimè sedat magno secreto. Raporum longorum assatorum succus cum Saccharo ad tussim infantium vsus non contemnendi.

Rapa non solum omnis status hominibus cibo & alimento, sed & quadrupedibus & canis animalibus pabulo nascuntur. Quid? quodd & Anferes, Anatæque fronde eorum gaudent. Decocta per se radix latiat, inflationem parit, flatuque, humentem ac fluxam carnem creat, modicumque alit. Quamobrem vt id vitii emendetur, solent nonnulli eam cum lacte decoquere, vt palato magis arideant, & efficacius nutrant. Nec desunt qui Rapa condiant, sicuti & Brassicas capitulatas. Baptista Fiera de Rapis, & Napis ita cecinit.

Sunt calida & rigido gaudentia frigore Rapa,

Humidus hinc illis turgidulique liquor.

Gloria Nursims, sitientes cedite Napi

Educat ipse licet vos Amiternus eger.

Cum sapiant Veneri magis hæc si crassa & obesa

Cena ea postremo lenta sub orbe ferat.

Ex Rapis, apud Crescentium sunt composita cum aqua, vt pro coquina tempore hyemis & quadragesimæ habeantur: vt etiam alia cum Aceto & Raphano, Sinapi, feniculis & sale: quæ apud ipsum videri possunt.

RAPVM SILVESTRE *ραβδαν αγρια*

Veteribus.

CAP. III.

Rapum silvestre [*ραβδαν αγρια*] in aruis nascitur, inquit Dioscorides, frutex altitudine cubitalis, ramosus, in summa parte læuis: folia habens læuia, digiti latitudine, aut etiam maiora: fructum in siliquis [*αβδαν*] verum apertis seminum inuolutis [*αβδαν*] alia intus siliqua capitis species est [*αβδαν*] in qua sunt semina nigra, sed intus alba. Ammiscentur in smegmata faciei & reliqui corporis, quæ ex farina Lupini, aut Tritici, [*ραβδαν*] aut Lotii, aut Erui sunt. Hanc autem Dioscoridis descriptionem

corruptam esse scribit Dodonæus, siquidem ea quæ de læuitate caulium ac foliorum, & seminis nigredine, ac interiore eius medulla candida traduntur, aliud pertinere dicit. Ast ego cur sententiam Dodonæi probem non video.


Sylvestre Rapum siue Raporum, species, auctore Plinio, in aruis maximè nascitur, fruticosum in longitudinem radice procurrente, Raphani similitudine, folio anguloso, scabroque, semine candido, duplò maiore quàm papaueris, succo acris: qui circa messem exceptus oculis purget, medeaturque caligini admisso lacte mulierum. Hoc ad læuigandam cutem in facie, totoque corpore vtuntur, mista vrina pari mensura. Erui, hordei, Tritici, & Lupini radix ad omnia inutilis. Quæ postrema in publicis exemplaribus depravissima sunt: ea enim verba, mista vrina pari mensura & cætera, ad ea de quibus hic agitur nihil profus faciunt. Quare ex Dioscoride sic corrigenda. Hoc ad læuigandam cutem in facie totoque corpore vtuntur, admixto in smegmata, quæ ex Erui, Lolii, Tritici, aut Lupini farina sunt.

Placent quæ Casalp. de Rapo sylu. prodidit his verbis: Plinius tertiam inquit esse Rapi speciem, quod idem Theophr. inquit. At Diosc. longè aliter describit Rapam silu. quam in hoc genere nequaquam adhuc vidi. Nec vllam adhuc Turn. comperit plantam, quæ per omnia Rapi silu. descriptionem expleat. Et si enim Præptores secutus, Rapunculum vulgatum esse, Rapistrum, seu Rapum silu. Dioscoridis putarit, penitus tamen perpensâ descriptione, in multis non conuenire deprehendit, Quocirca cogitur & Matthiolus Fuchsii sententiæ refragari, qui manifesto errore putat Rapum silu. esse Rapunculum vulgò dictum: quippe quod illi minimè respondeat. Nondum noui, ait Anguill. Rapum silu. licet sit, qui dicat se scire in Italia prouenire, ego nunquam vidi.

Quod autem Matth. asserit silu. Rapis scatere vbique Hetruriam, nullis reclamantibus notis: Cur obsecro eas notas non clariùs ostendit? Cur in post. com. non patefecit cur aliud Rapum silu. tradidit. Sed hæc Rapa syluestria qualia sint, videamus.

RAPVM SILV. MATTHIOLI.

CAP. III.



Rapi silu. i. Descriptio & Synon.

quam hic (ait Matth. in post. com. Italic. cum mag. figuris, v. m. Rapo Saluarico: & Lat. ac Epit. vbi Rapum silu. Sed Rapam silu. non Diosc. Et non Diosc. H. Germ. vbi waldstruben vocat) appingi curauimus, et si syluest. Diosc. Rapum non refert, refert tamè plurimum domesticum. Rapum sylu. nostrum, frequens in Bohe-mia in agrorum

Vires:

marginibus nascitur: exit folio, caule, flore, semine, domestico simile, sed agrestioribus foliis. Radix illi inest Raphani modo longa, crassaque, sed sapore per omnia domesticum refert. Legitimum nasci copiosum in Hetruria diximus non quod ipsum vlsquam à nobis visum sit, sed quod id ex aliorum relatione intelleximus. Nostri semen cum insigniter amarum habeatur & absterforia sit facultate prædium, alterius loco securius illini poterit, vbi eutem detergere fuerit opus: quin etiam necandis vermibus vtile quoque fuerit. *hæc ille.* Sed quantum fidendum sit picturis, assertionibus & descriptionibus Matthioli, vel vnicus hic locus satis demonstrat, non vilam plantam dicit nullis reclamare notis à Dioscoride: quæ occasio, vt suspicor, eius Rapum non differre ab eius Lampfana, ac etiam ab Erysimo [per quæ intellige Rapistrum nostrum] ei non bene notis: quam opinionem augent, quod Glossatores, Patrocinatores & Simia Matthioli verbotenus eius duntaxat meminerint, nec demonstrarint veras notas quibus possit discerni à Rapistro. Vix etiam puto Lacunam scire quod scribat, quando dicit, *Nabo silvestre* sunt crassi & corpulenti, non tantum quantitas satui.

Matth. mor:

Lobel. & Pena Adu. Rapum sylu. non bulbosum. Est frequentissimum præsertim apud Flandros, Germanos, qui ferunt hoc, quod folia bobus pabulo cedant. Luxuriat enim tanto foliorum numero, vt radix iam non tuberosa aut Raposa, sed exilis nec ventriosa, vsquam sit, aliqui satius rotundæ turbinatæ non dissimilis, sed discretu facilis, crispior, rugosiorque folio &c.

Lobel. Obs. Rapum silu. non bulbosum, Hisp. *Nabo saluage.* Adu. p. 66. & Icon. 198. Teut. 216. Licet Lobelius assumat figuram Matthioli Rapi sylu. aliter paulo tamen sylvestre aut aruorum Rapistrum describit: quæ tamè de Rapo sylu. scribit possunt convenire Rapistro, quod an ei bene notum reuocauimus ante in dubium.

Tabern. Icon. & hist. Rapum silu. Wild Rûben: Figuram habet Matthioli non nihil mutata, & nihil præterea particulare.

Gerard. Angl. l. 2. c. 2. Rapum silu. Wilde Turnepes. Tabern. iconem habet Gerardus.

C. Bauh. in phyt. Rapa 3. silu. & apud Matth. Rapum tertium, Rapa silu. non bulbosa, Rapum silu. Matth. Rapa silu. Cæsalpino. Ego igitur aliò refero Cæsalpini Rapum silu. nempe ad Sinapi Echinatam.

NAPVS.

CAP. V.

Descriptio

Napus satius caule assurgit cubitali & altiore, multis alis concauo: folia parte infima pinnis caulem ramosque amplectuntur, pediculis destituta, aut iis membranis hærentia: & inferiora quidem sinuata, superiora verò non item in acumen deflunt: flores lutei Brassicæ: semen quoque simile aliquatenus in siliquis longis, at radix rapita est, minus tamen in ventrem extuberans, altiusque demissa, sapore carnis comparioris candidæ acrisculo.

Napum Buniadem Græci nominant, omnibus olim cognitam, nunc Medici, pace tamen eruditorum dixerit Ruellius, prorsus ignorant: Sed mirum cur Ruell. non describat, & plantam, vt dicat, prorsus ignotam, notis suis non manifestet.



Apud Athenam habetur, Theophrastum *Cynidæa* quidem non nominasse, cum Nicander eo antiquior eius mentionem fecerit, sed quoddam Rapum maris vocasse, quod fortasse Bunias sit.

Nusquam porò, quod legimus, Napum descripsit Dioscorides, neque Plinius. licet hic ex Theophr. genera eius quinque faciat, de quibus sub Raphano.

Raphanidas enim Theophr. Plinius Napos esse putauit, atque ita transiit. Plinius porò velut horum quinque Naporum generum oblitus, duas rursus differentias facit, vt alter *bouvier* de quo lib. 27. agemus, alter *Cynidæa* appelletur, vtrumque confundens. De hoc inquit: Naporum alterum genus Bunias appellat, & Raphano & Rapo simile. seminis præclari contra venena. Ob id in Antidotis vtuntur ipso.

Quia autem Napi in Raporum genere videntur esse, & Rapo similes (foliis enim & radice Raphanos referunt, caule verò floribus & semine Rapum æmulantur,] idè opinor Galenum, inter Rapum quæ *343 p. d. r. s.* vocatur, & Napum quæ *343 p. d. r. s.* nullum statuisse discrimen, vt fusiùs iam supra dictum.

Huc accedit autoritas Turneri, dicentis. Galenus Napos sub Rapis videtur comprehendere, nusquam enim in lib. de simpl. facult. factam inuenio mentionem, Præterea Paulus Rapum & Napum coniungit. Et hinc fortè Cordus Napos Rapis congeneres esse scribit, densiores tamen, acriores, & minores. Inueniri etiam luteo & croceo colore Napos in Bordseldiano Bransluicensis Ducatus agro, quibus præcipua laus & autoritas attribuitur.

Trag. Alterum satui Rapi genus, planè à vulgari diuersum, Rapum satuum alterum oblongum [prælongum dixisset, si memoria labi non voluisset] siue Napus, *Stechrüben*, *Baumholder Rüben*, *Stuckelrüben*, *Borsfeldische Rüben* [malè, ab oppidulo enim Borsfeld] vbi nascuntur, Bransluicenses Borsfeldische nominant: Verus Napus Veteris, Græcè *Cynidæa*, Serap. Selen dictus.

Matthiolo & Fuchio genera duo sunt, variè interim diuidunt. Fuchius enim in satui & silvestre distrahit. Napi, inquit, siue Buniadis, quem Galenus & alii Veteres in Raporum censum reponunt, duo sunt genera, silvestre & satuum. Satuum quod forma proximè ad Brassicam tertius speciei accedit, radicemque longiorem obtinet: Germani huius generis Napos *Trüden* *Stechrüben* nominant. De silvestri mox agemus. Matthioli in album & flauum his verbis: Napi Theophrasto (vt somniat Matth. non enim recodatur Naporum Theophr.) & Plinio plura produntur genera, quanquam ego mea tempestate duo tantum repererim, nempe album & flauum. Flauj

Flavi tametsi albos crassitudine superent, magisque colore placeant: sunt tamen insipidiores, & gustui odid minus grati.

Matthiolus sequitur Lacuna, qui duas quoque tradit species, albam, quam præfert in Italia, & luteam, quam in Hispania, ut teneriorem, qualis est ea quæ provenit in Somossiera.

Dodon. Gall. Napus hortensis, siue domestica, Lat. Napus.

Napus quem *Nanonem* vocant, inquit Cæsalpinus, radix est in longitudinem extuberans, acrior rapa, amior raphano: color alius candidus, alius buxens.

C. Bauh. phyt. & apud Matth. Napus 1. siue sativa. Napum radice nigra legimus in horto Montbelg. Ill. D. V. Viremb. quem colit Frater Io. Bauhinus.

Gerard. Iconem Rapi totundi Tabern. posuit pro Buniade. Iconem autem alteram Tabern. Rapi minoris, ille posuit pro Radicula sativa minor.

Græcis, *Borias*, non *Borior*, Lat. *Napus*, Germ. *Stiefrüben* / *Enckelrüben*/ Saxon. & Brunf. *Bordfeldische Rüben*. Belgis, *Parische Rüben*. Gall. *nauer* & *naueu*, Ital. *naioni* & *napo*. Hisp. *nabicas*, *nabotengo* d. delgado. Angl. *Manetw*. Hung. *Baro repa*. *Buniade* appellationem à tumente figura, quam præ se fert hæc planta, Græci deflexerunt: namque radix eius in amplitudinem excrevit, & in rotundum extuberat. Cuius, colles, verrucosæque loca *Côlyus* nominant.

Napus de uxam amat, & siccam, tenuique propiore terram. Itaque glareosis fabulosisque arvis melior exit. Plinius pro Rapa de Napis hæc meo iudicio scripsit. Napi verò Amiterni, quorum eadem ferè natura, gaudent æque frigidis. Et alio in loco. Palma Romæ Amiterninis datur, inde Nursinis, tertia nostratibus. Et Martialis Nursinas pilas appellat his versibus:

Nos Amiternus ager felicitibus educat hortis.

Nursinas poteris parvis esse pilas

Seritur, transfertur, semenque perficit, eodem quo Rapum tempore. Rapum etenim transferri, & in alium locum dehi debere ex cuius semine nasciturum expectatur Rapum, certum est: eodem modo & Napus translationem desiderat. Nota tamen [ut capite Rapis iam annotatum] ex Plinio, quod Naporum medicina sit, siliquas vñ ferere. Quo si omisso iam natæ Eruce sint, remedium est Absinthii usus, decocti inspersus, & Sedi quod Aizoum vocant. In horto satis celerrimè nascitur: tertio enim die erumpit, De Napis vide plura capite de Rapis, ubi quæ ex Columella citantur, his omnia conveniunt.

Buniadem habemus in Horto E. C. nec frequens aliàs est Montbelgardi. Mospelii copiosum vidi florentem Vere: Lugduni & Genevæ Aprilis copiosè in cibis vtuntur, uti & Patavii ubi *Nanonem* vocant.

Cocta Napi radix in fiat, ut rectè scripsit Dioscorides, modicum alit. Semen eius potum venenorum vires hebetat, ob id & antidotis admiscetur. Conditur murià radix. Galenus medicamenta simplicia, quæ in theriacam adduntur expendens, silvestris Napi semen ex Creta sumendum esse ait. Cui omnino ad stipulandum esse censet Matthiolus, quoniam Andromachus, nec sativi, nec silvestris meminit, sed dulcis feminis Napi, quod de sativi semine potius intelligendum videtur, quia in agresti nulla dulcedo inest, sed potius acris quedam amarus: in sativo verò contra. Præterea Iunior Andromachus, item Democritus

Tom. II

Napi tantum semen requirunt. Quibus accedit Dioscoridis auctoritas, scribentis Napi semen si præbatur, lethalia venena inefficacia reddere, & antidotis admisceri. At fortasse Galeno compertum erat silvestris ex Creta semen peculiari quadam virtute adversus venena pollere, æque ob id in theriacam addendum, quo tamen si destituamur sativi semine vtendum in antidotis esse censet Matthiolus. Id semen etiam, eodem Matthiolo auctore, necat interaneorum animalia ex limonum aut arantiorum succo potum: ex adianthi siue lentium decocto cum alia exanthemata, tum sublimia illa, quæ vulgò Morbillos vocant, ad cutem pellit, tum quod ab imis corporis partibus ad extimas partes morbosicam materiam ducit, tum quod propria vi morbi malignitati resistit. Datur vuliter cochlearis mensura ex vino, addito seminis lini drachmâ, ad ciendam urinam. Ventriculi cruditates vomitione extrahit, si ex oxymelite & tepete aqua hauriatur. Summo perè etiam prodest multis diebus eius feminis drachmam ex martubii decocto propinare ictericis, & aquæ inter cui incipienti. Externè Naporum idem usus, qui Raparum. Napus in secundo ordine calidus est, & in primo humidus.

NAPVS SILVESTRIS.

CAP. VI.



Flores, siliquæ, Defecti
femina, Sati-
ue proxima sūt:
folia crebrius
disticta, lacinia-
tæque, nullis iu-
dem pediculis
cauli annexa.
Verum radix
sylvæstris na-
turam sapientia-
nor, & pollicis
articulum pa-
rum superans,
turbinata, sapo-
ris acris.

De Napo filii. *Rapi silve-*
hæc Ruellius. *men pro Buni-*
Medici nunc *ade & sili-*
suffecto quodâ *quæ*
sylvæstris Rapi *naure*
feminio, Buni-

dis vice abutuntur. A ruribus tamen quedam herba colitur Rapo, radicique similis, quam *Nanonem* appellant, foliis Rapi, latioribus, post adulescentiam Eruce modo laciniosis, cubitali scapo aut interdum altiore, radice minutula, floribus eidem proximis, Rapitio caule cubitali vel altiore, cuius foliis non secus atque rapaceis vescuntur agri, præsertim cum rusticos olerum inopia premit. Ea tum cocta tum cruda aceto & sale condita deorant. Nec eam crebro frondium autibus coërcent, quominus in eam erigatur, quod in Rapis fieri certum est, ut in radicem incrementa capessant, sed in scapum attolli patiuntur: nam vberiore feminis proventu non mediocrem questum faciunt. Semen huius calfactum trusculbulque molis pressum magnam olei vim remittit, quod non ad obsonia modo, sed ad luminaria quoque lucernarum vtuntur. Auiculas caucis reclusas, Carduclæ, Miliaris, Frigillas, & id genus similes, semine huius apud nos aucupes alunt.

B b b b

Fuchf. Napi alterum genus silueftre, Germ. *Raff* *fieckrüben*, foliis fuis Erucæ non diffimile eft, radice ampliore & rotundiore.

Tragus Rapum siue filueftre, Wild *rüben* & *feldrüben* / sine icone, cui eadem tribuit, quæ Ruellius Nauetæ. Tertium, inquit, Rapum vulgaris facini syluestris est species, quæ cibo non vifurpatur. Seritur illa quibuldam in locis, maxime apud Mediomatrices [his enim nukes è quibus nostris regionibus oleum conficitur, non in magnacopia nascuntur,] seminis è quo oleum isti conficiunt gratia. Quod ad formam attinet, æquat hoc Rapi genus syluestrium Pyrorum magnitudinem, gustu amarum. Hortulani nostri in Autumno ferunt, Aprili deinde mense, veluti & latium Raporum genus, caules illius longi profiliunt, flore comantes violis simili, luteo, copioso, Sinapis instar. Folia eius antequam excaulescit satis molliora lattuo genere, & viridiora, qui fit vt Martio mense inter cætera olera decoquantur. Semen habet nigro Sinapi per simile.

Dodon. Gall. qui depingit, Napis siluestris. Lat. qui iconem omittit, Napi filu. species, Gallia rutibus Nauita, Ruellio teste, appellata. Quæ ex non transplantati semine nascitur & foliis & caule, reliquique Napum æmulatur, sed radice non crassa, oblonga quidem, & haud magna.

Aduers. Lobel. & Penz fuerit fortè Bunias siue Napis filu. quæ conquerantur deceptos Plinium ac Matth. quasi cum Bunio confuderint. Plant. Icon. 200. Bunias filu. Napis flore luteo T. 238.

Gerard. Bunias filu. Lobeli *W'de Naue*. Icon posita à Gerardo est apud Tabern. iconum p. 406. pro Rapo longo minore *Lang Stropffel rüblin*.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Napis 3. siue filu. ex non transplantatorum semine etiam nascitur.

Camer. apud Matth. Si Napi non transplantantur, vt Rapæ silueftres sunt, & possunt vocari filu. Napi. Hætenus non obseruauit lectione vel auditu Napis transplantari.

Rapum filu. Schvv. Rapum filu. Rapaceum semen, *Oris* *famen*. Autumno seritur feminis causa. Aprili floret succrescente semine copiosius. Ex semine oleum extenditur pauperum culinæ inferuens. Auicula eo pascuntur etiam. Ego suspicor intelligi Napum.

Tempus Seritur in agris ad oleum, habemus etiam in horto E.C. In agris Montbelg. & vicinis pulchrè florere conspicitur mense Aprili & Maio: radices subrotundæ sunt, modò longiores, quæ non solent ad cibum assumi, sapore Rapi. Folio autem magis accedit ad Napis vel Brassicas.

RAPISTRVM FLORE LVTEO.

CAP: VII.

Descriptio

Tanta Rapistri lutei, vbi adoleuit, cum Sinapi affinitas vt obiter intuentem fallat: *radix* alba lignola: *caulis* cubitalis & bicubitalis, in ramos crebros diuisus: *folia* Rapitia, sed quæ attrita non acri illo Sinapis odore nares feriant, sed oleraceo penitus: *flos* luteus, minimè diuersus: atin siliquis longè maximum discrimen: siquidem ex in Rapistro duplò longiores conspiciuntur, quàm in Sinapi, nec vt illæ quadrangulæ compressæ, sed multangulæ & turgidulæ: quibus dehiscenibus *semina* comparent similiter membranulæ mediæ adhaerentia, sed numero



plura, & æque lucida & nigra: cum Sinapis sint ruffa nec villo nitore perpolita, quibus tamen acrimoniâ parum admodum cedunt. Nostra figura Fuchfianan non in omnibus placet, priora folia sinuata non bene demonstrat.

Ex Plinio & Theophr. ipsæque adeò quælicunque Dioscoridis descriptione colligitur

Cornar. Irionem non esse aliam herbam, quàm eam quæ inter segetes, Hordei maximè & Auenæ, nascitur, & à nostris *Hederich* vocatur, respondens descriptioni Erysimi (Irionis) Dioscor. vt patebit conferenti cum ea quam ponemus porrea post Erucas. Lamplana à Diosc. nullis nominis describitur, inquit Matthiolus, quare dixerim cum Plinio inter filu. Brassicas Lamplanam esse, pedalis altitudinis, hirsutus foliis, Napi simillimis, nisi candidior esset flore. Nascitur hæc frequentissima in Hetruria, Apulia, atque plerisque Italia locis, iis præsertim campis, qui aratrum eo anno minimè sensere, tamen nobis hac tempestate non fuerit, nisi virgente annonæ penuria in alimentorum vltimè recepta. In Hist. Germ. *Wilde Röl* Lamplana floribus pallidis quales Brassicæ aut Rapæ. Egregii interpretis Dioscor. officio fungitur Commentator qui ait Diosc. non describere Lamplanam: ipse etiam nullam descriptionem exhibet contentus figurâ, de qua dubitant Glossatores & Patrocinatores nec quicquam certi proponunt, quod non mirum. In Com. dicit Matth. flore esse Napi candidiore ex Plinio: In hist. Germ. flore pallido: Glossator appingere videtur flores & siliquas Rapistri flore albo, idem facit Patrocinator, non tamen intelligit plantam, sed eandem nobiscum nempe Rapistrum flore luteo. Matthiolus præterea videtur capite de Irione seu Erysimi eandem plantam confundere in icone, folia enim & flores ac nomen Germanicum videntur cõpetere Rapistro: actalem tunc opinionem Glossatoris satis apparet: diuersa Patrocinatoris vt dicitur sub Erysimi.

Camer. ad hist. Matth. Germ. *Hederich*. Erysimum vel Irion. Figura ex Fuchfio non competet descriptioni Matthioli.

Lonicer. *Hederich* / *Heidenrettich*, *wilder Senff*. Armoracia, Raphanus filu. officin. Rapistrum, *gelbe Rapen*, Cheria, Ponticis Arinon, Leucon: flore luteo interdum albo. Meminit idem c. 195. lib. 5. *des gelben wilden senff* [Sinapi filu. lutei], quod quò referamus non videmus, nisi sit Rapistrum hoc luteum, figura tamen non placet pro Rapistro.

Gesner. hort. Rapistrum passim in aruis nascitur, idem quod Lamplana, vel cognatum agrestis olus. Item in cat. Erysimum. Raphanus filu. Græcis Cheria, Latinis Armoracia, alijs Leucon, officinis

Matth.
C. B. no
Camer.
nosant

Erysimum
Gel Irion
Lamplana
Sinapi
Lamplana

Cheria

cinis hodiè Rapistrum, *η λίζα* apud Theophr. *Hederich*.

Sunt autem *Qz* alp. Armoraciz radices siluestres paræ ac prædura floribus luteis, cæteris iisdem cum Radice siue Raphanide.

An Anguill. Erysimum vulgare? An eidem Lampfana notissima nomen: apud Mediolanenses *di Landri*, & Abrussios *di Lafana*, & in Græcia maximè in Creta vocatur Lampfagida.

Dodon. Gall. Rapistrum Neotericis, quibusdam Sinapi siluestre. Gall. *Velar* aut *Tortelle*, Germ. *Hederich*; Belg. *herich*. Videtur Erysimum Theophrasti; quod Gaza vertit Trionum: non autem Erysimum aut Irio Dioscoridis. Lac. in fol. Rapistrum, nonnullis Sinapi silv. Germ. *Bedersch*. Figuram Fuchianam retinet, nec amplius Erysimum Theophrasti dicit.

Rapistrum (aiunt in Aduers. p. 66. Lobel. & Pena) aruorum vulgè vocatum è Raporum censu est, passim viarum margines & segetes ornans, vbique præsertim Septentrionalium, floribus luteis numerosis Brassicæ aut Rapæ, in caulibus sesquicubitalibus folia insunt Lampfanæ aut Rapi silv. Brassicæ virore & læuore non Erucæ, vt debentur Irioni Diosc. radice tenui, neutiquam fibrosa, gustu item Rapi siluestris, cuius facultates prope sortita est, sed vehementiores, tamen vsus neglecti aut ignoti. Neutiquam est Erysimum Diosc. certè admodum affinis est Napis & Sinapi: tatum namque semen Sinapi ementitur & vsus explet rusticis. Item pag. 69. Item p. 70. *λαμψανη* [Italici *di Landri* & *di Lafana*: Gallis *Sauues blanches*, quasi Sinapistrum album] Nappum siluestrem vocarunt olim. Oulus syluestre Plinii quo vixerunt Iulij Cæsaris milites, perperam Theophrasti Erysimum putatum à Dodonæo. Columella hanc intellexit Lampfanam. Senensis inferius alienis plumis ambigenus euolat: *Miramur Nos Aduersaria dicere Rapistrum tolia habere Lampfanæ*, cum ipsi autoribus sit Lampfana: Præterea ea dicere, folia non esse Erucæ, cum dixerint Rapum habere folia laciniola Erucæ: Nescimus etiam cur scribant habere folia Brassicæ virore & læuore, considerent quibus nota planta, an talia sint folia: Hinc nobis oritur dubium, an Rapistrum diuersum sit ab eorum Rapo silv. non bulboso.

Histor. Lugdunens. Lampfana Matthioli. Et Lampfana vera, falsò Theophrasti Erysimum Dodonæo. Item Irio Matthioli. Tres figuræ vnius plantæ, prior inepta ex Matthiolo, & tertia ex eodem, quæ videtur composita ex Rapistro.

Tabern. Icon. & Hist. Lampfana flore melino: *Aser fôl mut bleich geelen blâmen*. Tabernamontani Compiler non demonstrat qua in re differat Lampfana eius ab Armoracia siue *Heidenrettig*.

Icon. Armoraciz Tabern. per Gerardum Anglum posita est pro Raphano silv. *wilde radisch*/ flores ferens luteos, verum, vt postea dicemus, Tabern. dicit de sua Armoracia, vocari Rapistrum album: Gerardus præterea pro Lampfana & *Doct* creffes ponit iconem Lampfanæ Tabern. verum ille satis indicat se ignorare quod scribat. In descriptione tradit flores esse Hieraci, in Icone verò & in planta quam representat flores non sunt similes Hieracio: hoc etiam annotandum, Lampfanam quorundam flore Hieracii non esse referendam ad Nasturtium siue *Creffes* Anglorum, vt ipse facit.

Tom. II.

C. Bauh. Phyt. Rapistrum i. siue luteum: Matth. Lampfana: variat foliis, aliquando habet sinuata, aliquando non incisa, vnde quidam duas species constituere volunt. Apud Matth. Quæ pro Lampfana à Matthiolo pingitur, Rapistrum esse aruorum ex eius epistolis satis liquet. Hoc Rapistrum à similitudine cum foliis Rapæ dictum videtur: est flore luteo, est albo, aliquando etiam purpureo: i. Rapistrum luteum, Lampfana Matthioli. Frater ponit figuram Matth. à Camerario auctam siliquis & floribus vt mihi persuasæ Rapistri flore albo.


Schvv. Rapistrum luteum: *Epistola* Cordo & Raphanus silv. Lampfana Matth. Lampfana Dioscor. Tabern. *Geelhederich* *Heidenrettig* / *Schônödsef* / *wildsef* / *E* Raporum silv. censu est. An huc referenda sit Armoracia Schvvencfeldii dubitamus, (quam s. icon Tabernamontani possit conuenire,) quia Tabern. dicit vocari Rapistrum album.

Rapistrum flore luteo, Lugduni obseruatum, florens mense Maio, Genevæ Decembri, *Locus & Tempus* silvæ cum flore & siliquis mense Octobri, in vineis ad montem Moutets. Montbelgardi abundat in segetibus florens Iunio & Iulio, Augusto cum flore & semine maturo, prouenit etiam in horto Ill. E. C. Plurimum, inquit Schvvenc. inter segetes hordeaceas & Rapaceas inuitis Agriculis luxuriat, vt interdum totos agros cooperiat Iunio & Iulio.

Resiccantem autem ac extergentem, nonnihilque digerentem facultatem obtinet, Galenus apud Dodonæum hanc etiam malos succos procreare, scribit: Dioscorides verò plus alere ait quàm Rumicem, & stomacho viliorem. Coquantur autem, eodem auctore, caules foliaque, & in cibum recipiuntur. Acrimonia pollet vt & Nasturtium. Semen feruens & acre gustu, yrinam prouocat.

Viret

RAPISTRUM MONOSPERMON.



Rapistri monospermi ramum à D. Rychneto Medico Basilienfi habemus cui flores lutei. Frater Casparus eandem apud Matth. & Phyt. talibus describit: Rapistro Monospermo ex radice longiuscula albicante, parum fibrosa, caules pedales, quandoque altiores, rotundi, tenues, ramosi, eleganter virentes, leuiterque hirsuti exurgunt: folia humi sparsa crassa sunt, Rapi foliis similia, ad principium laciniata, dein subrotunda, leuiter sinuata & subhirsuta: flores secundum cauliculus palmates & tenues, velut in spica dispositi: quadrifolii, eleganter lutei aureiue, quibus *siliqua* succedunt rotunda [eleganter propter strias, per eas quemadmodum] *bbbb*

Descriptio

dum in semine Coriandri discurrentes] in filamentum oblongum abeuntes: quæ quasi geminæ sibi insident, parte tamen superiore maiore, cum in ga semen paruum, oblongiusculum, sed vnicum [vnde ei nomen] contineatur.

C. Bauh. apud Matth. Rapistrum 2. Phyt. quartum siue Monospermon. Huius semen nomine Lampanz monospermi D. Doldius misit, & hic Basileæ in horto D. Zuingeri Maio mense floruit.

Locus & tempus.

Hoc ipsum postmodum, sed multò strigosius [illud enim culturâ elegantius] in agris quâ Augustam Rauracorum itur, ad rubram domum observauimus: idem sed humilior & valdè ramosum, foliis paruis, eleganter virentibus, in agris circa Huringen ad syluam inuenimus: & simile Montspelio ubi quoque spontè creuit habemus.

RAPISTRI GENVS AVSTRIACVM

Folia à radice spargit, hirtis pilis vndique obfusa, sed potissimum & vel magis in aucta parte, profundis segmentis laciniata, quæ & ipsa crebris denticulis serrata sunt. Caudex verò omni hirsutia caret. Folia item superiora quæ ad ramorum exortum hærent tota glabra sunt, non tot nec tam profundis segmentis dissecta, inferioris quoque multò minora. Flores in ramorum extremis umbellati, lutei. Rapistrum vulgare, sed minores: Quos silique excipiunt. Hanc siccam nobis communicauit Agenus collectam in Austria inter segetes, non curauimus pingendam, quia non integra planta & quia nobis non bene notum Rapum filij Matthioli, cuius figuræ non male conuenire videtur.

RAPHANVS.

CAP. VIII.

Descriptio



in quibus semen rubrum, acre: Radix crassa, longa, magnitudine varia, alba, vel rubra, gustu acris & mordaci: recto vix surgit caule, cubitum vnum aut alterum alto.

Dioscor. duo Raphani genera facit siluestre & satiuum. Hoc ait Polyides Eryngium, Romani Radicem nostratam, Aphni Thorpath appellant.



Theophr. in *Raphano* genera *Raphani* di-
tribuit. *Radix* *scaberrima*

Distinguant hæc, inquit, foliis, radicibus, coloribus, saporibus, reliquisque eiusmodi. Vt Radicis genera Corinthium, Cleonæum, Liothasium, Bœotium, Amphissimè Corinthia adolefcit, quæ vel stirpe constat detecta: hæc enim sursum versus protrudunt, nec ut ceteræ in ter-

ram ampliari solita est. Liothasium, quam Thraciam vocant, validissima aduersus frigora traditur. Bœotia dulcissima est, & figura rotunda, nec ut Cleonæa, prælonga. Quibus folia læuia, dulciores saauiorisque sunt, quibus autem scabra, acriores. Genus præterea redditur, quod foliis Erucae simile conficit. Radicis genera hæc notauerunt.

Athenæus Theophrasti locum hunc citat his verbis: Theophr. lib. de plantis quinque Radicularum (*ῥαφανίδων*) genera esse tradidit: Corinthiam, Liothasiam, Cleonæam, Amorrhæam, Bœotiam. Dicitur verò à quibusdam Liothasiam Thraciam esse: Bœotiam dulcissimam omnium, rotandam figurâ: in vniuersum dulciores esse, quarum læuia sunt folia.

Cæterum, quoniam quæ Atheniensibus *ῥαφανίς* dicitur, aliis nonnullis, uti & Callæ apud Athenæum *ῥαφανίς* (quod autem Raphanum Radiculam dixerit ex Aristophane perspicuum est) appellatur: id obiter admonitum lætorem velim, *ῥαφανίς* vocem plerisque antiquiores Græcos, ut ex Apollodoro Carystio docet idem Athenæus, libro x pro brassica usurpasse: vnde Plinio erroris ansa, qui variis locis Raphanum cum brassica confundit, Raphano tribuens quæ Veteres illi de brassica prodidère, quemadmodum & lib. 19. cap. 15. napisi tribuit, quæ Theophrastus lib. 7. hist. cap. 4. *ῥαφανίς*, hoc est de Raphanis, tradidit his verbis: Idem (Græci) Naporum quinque genera fecère, Corinthium, Cleonæum, Liothasium (non Liothasium, ut in vulgatis Theophrasti exemplaribus exaratum est) Bœotium, & quod per se viride dixerunt. Exiis in amplitudinem adolefcit Corinthium, nuda ferè radice. Solum enim hoc genus supernè tendit, non ut cetera in terram. Liothasium quidam Thracium appellant, frigorum patientissimum. Ab eo Bœoticum dulce est, rotunditate etiam breui notabile, neque ut Cleonæum prælongum. In totum quidem quorum tenuiora folia ipsi quoque dulciores: quorum scabra & angulosa, & horrida: amariore. Est præterea genus siluestre, cuius folia sunt Erucae similia.

Cæterum, Raphani radix (autore Theophr.) quasi ex carne & cortice constat. Contrà Plinius ait: Cortice & cartilagine constant Raphani: multique eorum cortex crassior etiam, quàm quibusdam

dam arbotum. Amartudo plurima illi est pro eius crassitudine. Cætera quoque aliquando ligrosa. Scripsit Moschio Græcus vñu volumen de Raphano.

Vulgare & rotundum Raphani genus nobis esse videtur, inquit Tragus, quod Theophrastus Corinthium, Plinius Syriacum, vocavit. Quamquam & Bæotius Raphanus rotundus sit, teste Theophr. gustūque dulcior. At Raphanus prælongus quem Metensis ager fundit, Theophrasti nostrā sententiā radix est Cleonæa, Plinio Algidensis appellata.

Fuchl. Raphanus sativa, Raphanus minor Officinæ.

Lonic. Raphanus, alius longus, alius rotundus. Matth. Radix illi varia, nam nonnullis longa, alba, teres, tenera, fragilis, nec admodum acris, quæ cæteris in Hetruria præstantior habetur: aliis quibus crassa, Napi penè figura, altera longè durior, acrior, & gustui ingrator. Differunt quoque colore. Namque & alba & nigra, vbiq; ferè habetur. Sed hæc altera minùs frequens. Raphanus 1. Raphanus 2. Icones duæ apud Matth. vix mihi discernim monstare videntur.

Habet Camer. horti præter vulgarem Raphanum alium radice nigra, qualis frequens est Argentina. Et alium radice lutea.

Dux sunt Raphani species ait Lacuna: Domestici, teneri, delicati, quibus vulgò vescimur: Siluestres, duri & asperi, Plinio Armoracia, Romæ dicti Ramoracci.

Ositanter sanè ac turpi errore Gesner. horti, cum Bern. Deffenio Plinium secutus tria Raphani genera, crispum, læue, & campestre statuit: Brasicæ hæc Theophrastus assignavit. Sed quod à Plinio Algidense dicitur, longum, succosum, ac transluccidum rectè in Raphanorum numero recensuit & esse scribit, in hortis inferioris Germaniæ tam frequens, vt nullum ferè aliud norint: hoc apud Batauo-Phrysiis in eam magnitudinem crescit: vt viderit quod triginta libras penderet. Quamobrem minimè mirandum, in Germania infantium puerorum magnitudinem æquare, Plinium scripsisse. Vulgaris est Raphanus, qui virilis brachii amplitudinem non excedit. Sunt autem hi transluccidi: & adeo fragiles, vt in taleolas absque ferro confringi queant. Multum ab acredine illa ac saporis vehementia, quæ secundum genus pollet, recedunt: & salugine imbuti, linguam vique adeo non vellicant. Alterum genus Rapi figurâ Syriacum appellatum, in superiori solum Germania prouenit: vehementissimum & tenerimum, nec multà humiditate redundans: quapropter parcius editur. Nam qui assatim ingerunt, præter frequentes ructus, rosionis quendam sensum in stomacho experiuntur.

Raphanum, inquit Amatus, Columella Radiculam appellat oleris vulgatissimum genus, herba caule vno arboreo ferè vt in Ruta conspicitur, asurgens: quare multorum Græci, *ῥαπάνιον*, quasi olus arboreum nominant. Nec Gaza Theophrasti interpres aliter verit. Huius tria Plinius memorauit genera, læue, crispum & campestre. Diosc. quoque trium mentionem facit, hortulani, siluestris, atque alterius Apios dicti. Amatus prælicenter in Raphani historia hinc inde oberrans diuagatur. Nunc enim falsis illis tribus Raphani Plini generibus talpæ instar cæcus incedit: oculos mentis aperire debuisset, & considerare hæc Theophrastum à quo Plinius sua mutuatur, Brasicæ tribuisse. Præterea Dioscorides non tria, sed duo Raphani genera facit, quod per se clariùs est Tom. II.

quàm vt ostendi debeat. Dioscor. enim lib. 4. Apium, montanum aut siluestrem Raphanum, ab aliis solum ita vocari, tradit. Quæ occasio vt etiam ipse tanquam de toto genere diuersis, non tantum capitibus, sed libris egerit diuersis.

Cæterum non minùs turpi cæcitatis notâ corrector eius, seu censor seuerus Rob. Const. inuendus est, vt qui errores hos non annotatit.

Cæsalpin. Radix vulgò à quibusdam Radicula Græcis, quasi radix perspicua: est enim tenella ac fragilis, candida, ferè translucida, flores purpurei aut candidi. Radicis plures differentie: nam quædam in longitudinem crescit, quædam in rotunditatem, has vulgò *Rauanellos* vocant, quorum alii cortice nigro constant, alii candido. Longarum quædam vasto cortice crasso, qui gravior est interno corpore: Hæc Armoracia vocamus, omnes sativa. Theophrastus Raphanida vocat, Theodorus Radicem vertit. Plinius, Raphanos vocat.

Turner. Genera sativi Raphani duo, *Radice longa*, passim in Anglia & Belgio, quibusdam: *Radice rotunda*, Rapo non ab simili, frequentior circa Argentinam, nonnullis Radix Bæotia, aliis radix Syriaca, Angl. *Röunder radice* / *Rape radice* / rarò in Anglia conspicitur.

Theod. Dorst. Raphanus minor vel communis radice interdum magna & oblonga, interdum verò rotunda & nodosa, flores ferè candidos.

Aduers. Raphanus magnus & parvus purpureus. Lobel. Obs. duas habet figuras ex Matthiolo, vna hoc titulo Raphanus magnus Aduers. p. 67. primus Matthioli: alteri Raphanus minor purpureus Aduers. p. 67. secundus Matth. Figura mihi apud Lobelium videntur transpositæ.

Tabern. Icon. & hist. Raphanus rotundus, *Ründer rettig* / Raphanus orbiculatus, *Scheibel rettig*. Duas icones ponit non indicans discrimen: Rapum referunt, potissimum secunda orbiculatâ radice.

Gerard. Pro Raphano orbiculato, *Rönder radisch* ponit Iconem Tabernamontani: eandem & iconi Raphani rotundi inscripsit, Raphanus pyriformis, *peare sassion Radisch*: Præterea pro Raphano sativo, *Garden radisch* ponit iconem Tabern. Rapi longi: pro Radicula sativa minore *Schmal garden Radisch*. Icon. Tabern. Rapi rotundi minoris siue *Ründer Wappen* ei dicti.

Brunfel. Matth. in prior. comment. Ryffio, Camer. hort. Anguill. Gesner. de coll. stirp. & cat. *Raphanus*. Dodon. *Raphanis*, siue Radicula sativa, Radicula sativa minor. Hist. Lugd. Raphanus sativus: Raphanus 2. Matth. Raphanus purpureus minor Lobelii.

C. Bauh. Phyt. Raphanus 1. siue maior, floribus purpureis aut candidis. Raphanus 2. siue oblongus: colore variat, noster albo est cortice: Italis rubello, cuiusmodi est etiam Montbelgardi. Raphanus 3. siue niger. Raphanus 4. siue lat. Raphanus 5. siue Byzantinus. Apud Matth. Raphanus præcox, alius serotinus: hicque albus & niger & rubens: albus, oblongus: ruber oblongus, qui fibras rubentes per substantiam discurrentes obtinet, habetur & radice lutea. Raphanus 1. Raphanus 2. Hæc Frater, cuius icones non mihi videntur monstare differentiam.

Nicol. Abr. à Frambois. Raphanum, *raisfort*, & Rapum, *raue*.

Theophrasto, Dioscoridi, ac Galeno, aliisque Veterum Græcè *ῥαπάνιον* dicitur: posteriores *ῥαπάνιον* appellant: Antiquiores autem & Attici, Brasicam *ῥαπάνιον* vocarunt. Latinis autem *ῥαπάνιον* Radix & Radicula dicitur: Offic. verò Rapha-

nus. Serapioni, annotante Trago, *Fugla*; *huc Fugiel*, Auerthoi *Alphagel*, Hebr. *Zenon*, Rabinis & Thalmudistis *Fugla*, & conuersis literis *Pilga*. Germ. *Reetig*, Belg. *Kadya*. Gall. *Radi*, *Raisfort*. It. *Raphano* & *Radice*: Hisp. *Rauano* & *Rauanillo*, Angl. *Radisch*: Boh. *Rzyceto*. Radiculæ semen Cælius à Marcello Empirico Bacanon dici affirmat: similiter ab Aëcio. Cornarius tamen Cacanon legit. Raphanus quidem *ῥαφανος* auctore Athenæo, id est, quoddam faciliè appareat, sibi nomen ascribit: nam tertio à satù die profilit. Radicis vocabulum, ut auctor est Varro, è Græcia venit in Latium, cum Veteres Græci radicem dixerint, quam nunc Raphanum. Nisi quis forsitan arbitretur nomen accepisse, quoddam ceteras amplitudine superet, vel quàm paucissimis magnitudine cedat.

Satio

Seri vult Raphanus, qualiter videre est apud Plinium, terra soluta, humida. Finum odit, paleâ contentus. Frigore adeo gaudet, ut in Germania infantum puerorum magnitudinem æquet. Scitur post Idus Febr. ut vernus sit: iterumque circa Vulcanalia, (Aliis circa ortum Caniculæ, aliis Calendis Augusti), quæ satio melior. Multi & Martio & Aprili ferunt & Septembri. Incipiente incremento, confert altera folia circumobruere, ipsos verò accumulare. Nam qui extra terram emerit, durus sit atque fungosus. Aristomachus detrahi folia per hyemem iubet, & ne lacunæ stagnent accumulare: ita in æstatem grandescere. Quidam prodidère, si palo adacto cauerna paleâ interlatur sex digitorum altitudine, deinde in semen simumque & terra congeratur, ad magnitudinem scrobis crescere. Præcipue tamen falsis [De brassica hoc Theophr. cap. 7. lib. 2. Causis.] a-luntur. Itaque etiam talibus aquis irrigantur, & in Ægypto nitro sparguntur; ubi sunt suauitate præcipui. In totum quoque fallugine amaritudo eorum eximitur, suntque coctis similes. Ægypto mirè celebratur propter olei fertilitatem, quod è semine eius faciunt. Hoc maxime cupiunt serere, si liceat: quoniam & quasius plùs quàm à frumento, & minùs tribuitur, nullumque copiosius oleum.

Gaudet autem [auctore Theophrasto] frigidibus Radix [papuris], & sic eam dulcescere putant, simulque incrementum in radicem non in folia verti. Austrinis atque serenis temporibus celeriter caulescit. Hyeme cum maxime viget radix terrâ obruta, ut nullam imbrem admittat, ac directis quibusdam foliis mira crassitudine distenditur. Sed Raphanus quia nullam vim germinandi ab imis obtinet, alimentumque capit, quod non sursum transmittere apta sit: idcirco subtus crassatur, amplissimæque efficitur. Causa verò, ut nulla putredo, nulla corruptio accederet, humo congestitæ datur, quæ aquam arceat, & in totum, omne quod alienum est, admitti non patitur. Post æstatis Solstitium Iunio ac Iulio commodissime feritur.

Tempus & locus.

Raphanum vidi florentem Aprili flore cæruleo: Genæz Nouembri, flore cæruleo & albo, ibidemque cum pauca cærulei parte Maio. Basileæ Raphanus est in vigore Augusto & Septembri. Lugduni principio Maii habent edules. In pago *Fempa* (inter Basileam & Ounersheim ad Rhenum serè sito) vidi Raphanum radice rotunda Rapi instar: ita ut non faciliè quilibet distinguere possit, nisi gustu, quem cum mense Septembri degustarem, non videbatur differre à longo allato Argentina, ubi cum Raphanum quoque obseruau: talem quoque vidi in Masinunster,

qui loco humido creuerat, non poterat manû amplecti, ac sapore erat non admodum acris. Patuli habent rotundum, breue, album, non vique adeo acrem & rubrum, sicut & nigricantem oblongum, satis magnum, valde acrem. In Passuaue Abbatis Lutrensis in horto Domini V. Valther ab Andlavy, vidi crassissimum & maximum ad magnitudinem cruris excresecens: talem habemus in horto Ex. C. Hortulanus hyeme reponendum seminat, huius radix sub terra tota latet, ac tota hyeme ad cibum adaptari potest vique. ad Veti ut & alterum longum, tenerum, album, extra terram eminentem: cuius radices habentur edules Iunio. Et hic potest dici longissimus & præcedens crassissimus. Longissimi habemus genus cuius pars extra terram eminens rubet. Raphanum nigrum attulit mihi Hortulanus Ill. E. C. ex horto Gæpping, duplicem, vnum paruum qualem aliquando vidi Argentinâ millum, & qui Montbelgardi etiam prouenit in horto Ill. Ex. C. magnus crassus est. Viderentur diligenter non indaganti duo genera, verùm tempus satioris tantum differentiam facit in radicis forma: veterique mense Octobri datus. In omnibus autem probandis, Plinius maxime spectat caules. Immitium enim rotundiores, crassioresque: folia verò tristiora & angulius horrida.

Raphani sue radicis vires, Diosc. declarat his verbis: Flatus gignit & exalfacit: ori quidem gratas stomacho minime commodas: rudius prætere mouet, atque vrinas ciet: alium quoque bonam facit, si quis: ipsam summis cibo sumperit, quippe quæ tum distributionem magis adiuuet: præsumpta verò cibum suspendat: quare & ante cibum vomituris conuenit; quin & sensum aciem excitat. Elixæ verò si sumatur, valet ad eos qui tussi diuturnâ infestantur, quique crassiores succos in prætere cumulant. At cortex ipsius ex aceto multo sumptus, vomitiones potentius mouet, hydropicis accommodatus: impositus etiam tumorem lenis est vtilis. Cum melle vero nomas sistit, & sub oculis lugillata tollit. Auxiliatur & à Vipera com morsus, necnon & Alopecias densas atque lentiginis cum Loliacea farina extenit. Est & auxilio tam cibo quàm potui is qui à fungis strangulantur, mensuraque pellit. Semen vomitiones excitat, vrinas eicit, & lienem ex aceto potum extenuat. Decoctum anginosi cum aceto multo calente gargarizati prodest, & contra Cerastræ morsum ex vino potum auxiliatur. Cæterum ex aceto illitum gangrenas etiam valenter emarginat.

Raphani vis mira fere hæc Plinius de Raphano tradit: colligedi spiritum, laxindique rutum. Ob id cibis illiberalis, vti que si proximè olus mandatur, si verò cum Oliui drupis, rarior rusticus sit, minisque foetidus. Cocti dulcescunt & in Naporum vicem transeunt. Crudos medici suadent ad colligenda acia viscerum dandos cum sale ieiunisse esse, atque ita vomitionibus preparant meatum. Tradunt & præcordiis necessarium hunc succum: quando phthisin cordi intus inhaerentem; non alio potuisse depelli compegitum sit in Ægypto, regibus corpora mortuorum ad scrutandos morbos insecantibus: Atque ut est Græca varitas, fertur in templo Apollinis Delphis adeo cæteris cibis prælatum raphanus, ut ex auro dicaretur, & beta ex argento, rapum è plumbo. Scires non ibi genitum M. Curtium Imperatorem, quem Samnitium Legatis aurum repudiaturum afferentibus, rapum torrentem in foco inuentum Annales nostri prodide-

Locus & Tempus

Vires & vis

re. Scripsit & Moschion Græcus vñum de Raphano volumen. Vilissimi in cibis hyberno tempore existimantur: sisdemque dentibus semper inimici, quoniam atterant. Ehora certè poliunt. Satiui decocti manè poti ad ternos cyathos, comminuunt & eiciunt calculos. Idem in posca decocti contra serpentium morsus illi nuntur. Ad tussim etiam manè ieiunis raphanus prodest cum melle: Semen eorum tostum ipsūque comanducatum ad Lagonoponon [ilium cruciatus ē flatu, & casculo:] Aquam foliis eius decoctis bibere, vel succum ipsius, cyathis binis contra phthirias, phlemoni ipsos illinare tulos, liuori verò recenti corticem cum melle, veternois [Veternum, siue animi, siue corporis stupiditatem & ignauiam vocant: stolidum Catullus, graue ac fuscum horat. appellat: Catullus.

Nunc cum volo de tuo ponte mittere pronum,
Si pote solidum repente exirare veternum.]
autem quam acerrimos mandere, semenque tostum dein contritum cum melle suspensiois. Idem & contra venena profunt. Caterò & scorpionibus aduersatur: vel ipso, vel semine infectis manibus impunè tractabis: impositoque Raphano Scorpiones moriuntur. Salutares & contra fungorum aut hyoscyami venena æquè, vt Nicander tradit. Et contra viscum quoque dari Apollodoti duo iubent. Sted Citicis semen ex aqua tritum. Tarentinus succum. Lienem item extenuant: iochori prolunt, & lumborum doloribus. Hydroticis quoque ex aceto aut sinapi sumpti & lethargicis. Praxagoras & iliosis dandos censet. Plistonius, & cœliaci (stomacho tamen aduersari Dioscorides testatur. Verùm cœliaci prodest, quoniam vrinam ciet.) Intestinatorum vlcerà [illa detergendo, alioquin irritant:] sanant: purulenta præcordiorum, si cum melle eduntur. Quidam adhuc coquere eos in luto illitos malunt: sic & feminas purgari. Ex aceto & melle sumpti, intestinatorum animalia detrahunt. Item ad tertias decocto eorum potio cum vino, enterocelis profunt, sanguinem quoque inutilem [In vesica concretum & intestinis: ex matris, & vtero.] sic extrahunt. Medius adhuc & sanguinem excrementibus coctos dari iubet, & puerperis ad lactis copiam augendam. Hippocrates capitis mulierum defluuia defricari raphanis, & super umbilicum imponi, contra tormenta vuluæ. Reducunt & cicatricem ad colorem. Semen quoque ex aqua impositum, sistit hulcera quæ phagedænas vocant. Democritus Venerem hoc cibo stimulari putat: ob id fortassis voci nocere aliqui tradiderunt. Folia quæ in oblongis duntaxat nascuntur, excitare aciem oculorum dicuntur. Vbi verò acrior Raphani medicina admota sit, hyssopum dari protinus imperant. Hæc antipathia est. At aurium grauitati succum Raphani instillant. Nam vomituris summo cibo esse eos, vilissimum est: (Dioscorides vomituris dat ante cibum: à cibo verò vt roboret ventriculum & cibi distributionem adiuvet: hic itaque obliuiosè Plinius vomituris summo imperat cibo.)

Sed Galenum audiamus de Raphano tum vt cibo, tum vt medicamento loquentē. Vrbani, inquit, homines solam radicula crudâ vt plurimum ante alios cibos cum iugaro alui deiciendæ gratia mandunt, quidam autem aceti quidpiam admiscunt. Rustici verò cum pane sæpenuerò vescuntur, vt alius obliuiosus quæ sua sponte proue-

niunt. Radicula autem caulē etiam ac folia mandunt, sed coacti potius quàm voluntarii. Radix aurem ex his est quibus assidue vescimur, estque obsonium magis quàm alimentum: nimirum quæ & ipsa cum manifesta calfactione acutandi habet facultatem. Nam qualitas æcis in ipsa superat. Vere autem caulem quendam, qui in altum assurgit gignere consuevit, quemadmodum & alia omnia quæ caulem sunt productura: quem caulem elixantes mandunt cum oleo & garo & cum aceto, vt Rapæ caulem, ac sinapi, & laetuce, nutritque magis caulis iste, quàm cruda radícula, vt qui in aqua acrimoniam omnem ponat: paucissimum tamen & ipse habet alimentum. Quidam autem non caulem modò, sed & radículas ipsas elixantes mandunt, non aliter ac Rapæ. Et alio in loco, Raphanus, exalface quidem ordinetertio, desiccat verò secundo. Quin & semen ipsum plantæ efficacius est, facultas ei inest digerendi. Itaque ad fugillatâ, & aliud genus liuida, ob talem facultatem accommodum existit. Caterùm, cùm Medicos, tum idiotas illos mirari subit, qui à cœna crudos eos concoctionis iuuandæ gratia edunt. Ipsi quidem se experientia id abundè comperitum habere dicunt, nullus tamen exemplum illorum sine damno potuimiri. Hæcenus Galenus. Cuius equidem verba ed libentius recitauimus, quòd non solum vulgi, sed etiam Medicorū errorē lepidè notare videatur, qui crudas Radículas à cœna esitabant, iuuandæ concoctionis gratia: quibus quidem verbis Dioscoridem obiter carpere videtur, quippe qui hoc loco ita sensisse videatur, idque tum robóranti ventriculi tum cibi distributionis adiuuandæ gratia.

Simeon Sethi discrepantes hæc sententias adhibita distinctione componere nititur: dum quibus alius facillè subducitur, quique flatibus caret, iis vult exhibendas ante cibum Radículas: contrà verò à cibo, iis qui flatibus laborant, quibusque cibis in ventriculo supernat, ac etiamnum difficilis est alius. Verumtamen neque hoc ipsū quēquam citrà damnum experiri posse, cum Galeno crediderim.

Raphani recens minutim incisâ radix (vt scribit Marth.) albo meraco insperfa, & in fartagine calfacta, pubique admota, remoratam vrinam pellit. Idem præstat eiusdem succus diuinarum vnciarum pondere ex vino Cretico haustus. Corticis vncia cum mercurialis pari pondere, citoci granis quatuor, pulueris cassie odoratæ drachma, succi fabinæ drachmis duabus, omnibus simul in mortario contulis tenuissimo linteolo exceptis, veterique cœuici admotis, ægrè parturientibus misericordè subuenit. Eiusdem radicis succus cum oleo dulcium aut amararum amygdalarum, & vini albi & colocynthidis momento aurium sonitus tollit, si calidus instilletur.

Raphano autem comesto lacticipia esse vitanda, quòd corrumpantur & vitium inde contrahant, monent. Raphanus à cœna manducatu grauem reddit anhelitum, si quis statim ab ea sumptu somnum caperit. Grauidis vt apud Dorilheum legimus, non conducit, expellit enim fetum, trahit menses, educitque secundas. Succus eius inueteratis vlceribus illitus, ea renouat gangranamque in eis erodit. Idem præstat puluis eius. Succus Raphani cum melle decoctus, atque modico aceti admisto, percolatus, prodest contra febrem quartanam, & contra oppilationem lienis, si in potu sumatur. Cutem subeuntibus a-

HISTORIAE PLANTARVM

quis, lienosilique vtiliter Raphanus emplastrum modo imponitur, vt Dioscorides testatur.

Raphanus domesticus & culentus, ait Fernelius, sine offensione vlla vomitione purgat, atque ventriculum blandè exinanit: quæcunque nimium in eo crassa sunt attenuat, quæ lenta sunt detergit, ac demum stimulat expultrice vi sursum extollit, nulli ætati neque prægnanti infensus. Terrunt autem radices eius concisæ vnciæ duæ, assusæque mulla succus exprimitur tepidus offerendus. Seminis [quod efficacius sit] semuncia vel ziii similiter terantur addita mulla aut fero lactis aut aqua hordei.

Radice cum sale tritam in malignis febribus sub pedibus ligari testatur Schvvenckfeldius. Scribit Camer. apud Matthiolum Germ. si in excavatum Raphanum aqua Maioranz immittatur, & per aliquot dies sub terra desossus detineatur, aquam illam visus debilitati mederi. Si in Raphanum cauatum veretrum immittatur, lapidem [teste Font.] ni magnitudo obster, trahet. Quidam in Raphano cauato crocum adiciunt. Nec solum calculi causa hoc fit: sed etiam in difficultate vrinæ ob crassum viscidum & glutinosum humorem, aut sanguinis trombum meatum obstruentem. Aqua Raphani radices, hæc enim minutim coneditur, ac distillatur] per triginta dies mane ac vespere singulis vicibus tribus aut quatuor vnciis pota medetur calculo, facitque ad aquam intercutem, modò ægrotus à nimio potu abstineat. De cætero vtilis ad omnes hæcenus recensitos affectus. Fit & ex succo Raphani expresso cum Saccharo aut melle Syrupus, apprimè idoneus calculosis lienosilique. Oleum quoque ex hoc parant ad dolores aurium, spinæ dorsii, atque tenum, à frigiditate ortos.

RAPHANVS BYZANTINVS.

Descriptio

Raphani Byzantini semen habuit Camer. horti Constantinopolitani, qui postea tamen degenerauit in communem, ac solos flores ac semina protulit radice penitus lignescente.

RAPHANVS RAMVLA CRETENSIBVS dicta.

Descriptio

Raphani vulgati seu nostratis modo scapum erigit cubitalem aut sesquicubitalem, itidem brachiatum. Folia posita & ordine vt in prædicto, sed læuia, tenera, & præ glabritie non nihil splendentia, figuræ vt in illa varia. Quædamq; dissecta magis, quædam magis integra & subrotunda: suprema ad Lapsanz quodammodò accedentia. E ramorum supremis alternato positi ex vnciali serè pediculo flores dilutè purpurei emicant, raphani nostratis similes. Succedunt vascula, alia uerbis, alia gemina, alia longa teretiaque, sed omnia in exacutum mucronem fastigiata, semen continentia Raphani, rotundum, in pulpa fungosa delitescens, sapore grato, minimum, aut etiam nihil, acris, ita vt ad auellonarum nucleorum etiam saporem quodammodò accedere videatur, quatenus ex sicco deprehendere licuit. Radix tenuis, fibrosa, candida, qualis quidem hæcenus nobis oblerat.

Ramulæ Cretensis nomine à fratre C. Bauhi. ad semen accepimus quod satum in horto Ill. Ex

C. VVitem. Montbelgardi non prouenit: postea Daniel. du Vernois Medicinæ candidatus attulit nobis sine nomine plantam collectam Basileæ in horto clariss. viri Domini Iacobi Zvyngeri pro Raphani specie rara: Nobis quoque siliquas cum seminibus nomine etiam Ramula Cretensis Basileæ in prædicto horto collectas, communicauit Doctus Vir Conradus Phittherus Basili.

RAPHANVS SILVESTRIS VETERVM.

De hac seorsim agendum duximus, ea potissimum de causâ, quod qualis sit, hodie non constet. Radicula igitur siluestris [iapyris a'yeia] quam Romani apud Diosc. Armoraciam vocant: Folia habet satiaz [Eruca Theophr. qui Raphani quintum genus facit & siluestre vocat] similia, sed quæ ad Lampsanam propius accedant. Radix est gracilis, longa, subacris. Est [inquit Plinius lib. 19. c. 5.] etiamnum vnum siluestre [Raphani genus,] Græci Agrion vocant, Pontici Armon, alii Leucon, nostri Armoraciam, fronde copiosius, quam corpore. Idem lib. 20. c. 4. Raphanum siluestrem esse diximus. Laudatissimum in Arcadia quanquam & abbi nascitur.

Porrò tam folia, quam radix, auctore Diosc. olerum vice decoquuntur. Excalfacit autem, vrinam ciet, æstusque est. Vtilior, tradente Plinio, Raphanus silu. vrinæ duntaxat ciendæ. Cæterò, bilem detrahunt cortices in vino. Præter ea, quæ circa eos dicta sunt, stomachum purgant, pituitam extenuant, vrinam concitant. Est & latui [legendum siluestris] vñs in Italia, & Armoraciam vocant.

Agrestis Raphanus, teste Galeno, in tertio ordine calefaciendi, & in secundo desiccandi satius efficacior est.

RAPHANVS SILV. MATTHIOLI.

Matthiolus, vt præ cæteris se, non dico Rhizotomum, sed quarumlibet stirpiura Rhizorichum [eradicatorem] ac Numen quasi omniscium ostenderet, ita de Raphano silu. in suis in Diosc. com. differit. Romani suam antiquam Raphani silu. appellationem retinent, qui ipsum primæ literæ Metathesi Ramoraciam appellant. Cæterum, cum siluestris satia longè durior, acriorque deprehendatur, Diosc. codex hic etiam mendisuspicionem non vacat, vt pote qui Armoraciæ radicem reddat teneram, mollèmu & subacrem. Fuchs eam esse stirpem putat quam Raphanum rusticum nonnulli vocauerunt. Si is Romam vñquam profectus esset, nunquam [vt arbitror] in errorem incidisset, spontè namque [ait in Epit.] prouenit in campestribus in agro Romano. Anguill. Raphanus silu. vocatur Romæ Aramoraci & Remolaci è Mazorechi. Per Ramanus [Raphanos] siluestres Lacuna intelligit duos asperos qui Plinio dicuntur Armoracia, & nomen antiquum conseruant, ac Romæ dicuntur Ramoracia.

Lat. Armoracia. Castil. Xaramago. Ital. Ramolacci. Matthiolus qui temerè nimis Diosc. codicem mendo laborare scribit, non demonstrat quam plantam intelligat, nec eius Glossatores patroni & Simiz: meliùs sibi consulissent, & iconem, aut saltem

saltem descriptione, quam plantam intelligerent, indicassent. Lacuna quidem videtur intelligere Raphanum fatium longum, crassum, duriorum, qui per hiemem referuari potest.

RAPISTRVM FLORE ALBO STRIATO, Sinapi agreste album Trago.



Rapistrum flore albo striato folia habet Sinapi Erucae diuisura simili, hirsuta, sapore oleraceo: caules ramosos, hirtos: flores albos, Erucae maioris, striis caeruleis variegatos, apicibus luteis, filiquas pulchras, longitudine ferè digitali, vbi maturuere nodis instar caudæ Scorpionis distinctas, striatas: in quibus pro-

nodorum numero semina: radix satis tenuis, alba, aliàs simplex, aliàs multifida.

An Trago sinapi sylvestre ad aquas proueniens flore albo?

An Dod. Gall. Sinapi sylvestre [sinapi agreste?] quod idem cum Tragi Sinapi suspicor esse, quamvis figura ad Erucae maiorem pertineat.

An Turn. planta VVeissenburgi weisbederich, & quibuldam Wylbreting dicta? Is quidem existimat esse Radicem filustrem Dioscoridis. Hæc ed loci semper inter Rapas nascitur, Rapistro similima, breuior, flore albo, radice exili, sapore aliquatenus & forma Raphani longi: folia incisa seu laciniata Raphani fatii modo, leuiora nonnihil quam Rapistri. Videtur Plinius hanc pro Lampfana sumere lib. 20. cap. 9. & falsò inter Brassicarum genera reponere: cum inter Raphanos collocare debuerit. Siquidem Plinius multis locis Radicem appellat, Brassicam appellandam, vt lib. 11. c. 23. & lib. 27. cap. 24. atque ita vtramque plantam videtur confundere. Eius verba, quæ huc me inducunt, sunt ista, inter Brassicas sylu. & Lampfana &c.

Czsalp. Lampfana, flore candido, Diosc. olus sylu. Plinio inter sylvestres Brassicas Lampfana, quæ Iulius vixit apud Dyrachium. Lonic. Gelber wilder Senff [Sinapi luteum silu.] cuius figura, qui suo more nescit quid scribat, videtur demonstrare Rapistrum, de quo hoc capite agimus. Plant. Icon. pag. 199. Rapistrum flore albo, Erucae folius Teut. 237. Tabern. Icon. & hist. Armoracia Weisbederich, quod quidam volunt Lampfanam, alii Raphanum silu. alii nominant Rapistrum album, quidam Armoraciam. Et alibi Rapistrum purpureum, Braun hederich. An Rapistrum flore albo fuerit bene notum compil. Tabern. nos læt, quia album non describitur apud eum nec an colore floris tantum differat purpureum, annotatur ille aliqui pro sua indigni prudentia so-

let icones diuersas exhibere plantarum solo colore differentium: Lectores tamen considerent, an extet purpureum & diuersum ab albo, aliis notis quam colore. Schvvenck. Armoraciam Tabernæ ad Rapistrum flore luteo refert, quod non improbamus, si consideretur icon: verum nomen Rapistri albi non videtur conuenire, vt antè dictum, Item Rapistrum album, Raphanus silu. Lampfana seu Brassica silu. Matth. weisbederich. Ad iconem purpurei Rapistri Tabern. scribit Gerardus, Rapistrum aruorum Charlock aut Chardick, quam plantam intelligat perpendendum. C. Bauh. phyt. Rapistrum sine album: hoc flore purpurascens etiam reperitur.

Floret passim in agris Iulio & Augusto, obseruatur etiam Monspelii, Genouæ, Basileæ, Montbel. Locis & gaudi passim in agris. Campis rapaceis cultis & tempus in cultis, sed rarius occurrit Schvvenckfeldio.

Semen, autore eodem, ex calcificandi, fuscandi, Vires abstergendi, & digerendi vi potest.


ALSINE NODOSA DALECHAMPII.



In agro Monspelienfi plurima gignitur, radice simplici, longa, parum capillata, ex cædido flauescens: foliis prope terram multis longiusculis, angustis, Alsinæ haud multum dissimilibus: caulis multis, pedalis, flore albo, ex quinque foliis composito: semine in nodosis striatisque globulis multis, seorsine consequen-

tibus, & quasi veruculâ transfixis, peculiari omnino figura.

Hist. Lugd. Alsine nodosa. C. Bauh. phyt. Alsine 23, sine semine globoso.



RAPHANVS SYLVESTRIS, SIVE ARMORACIA multis.

Radix crassa, surculosa, repens, sapore fetidissimo: caules singulares bicubitales, concaui, striati, recti & rigidi: folia inferiora, antequam caulem proferat ampla, Lapathi, rugosa, vbi caulem autem proferit, in eo folia palmum longa, vnciali latitudine aut paulò maiore in ambitu profundè satis serrata, gustu minus, seruido quam radix: ex quorum alis surculi tenues prodeuntes flores sustinent positi & formæ Nasturtii palustris cum apicibus luteis.

Habent (inquit Turner.) Dioscor. & Plinius Raphani genus, quod Græcis dicitur *ραφανιον*, Lat. *Armoracia*. Ital. *Ramoracia*, teste Matthiolo. Tradit Dioscor. Radiculam silu. folia habere Raphani hortensis, nisi quod ad Lampfanæ folia



crem, vt vulgati Codices Græci habent, quam emendatior legant *μακρὰ* pro *μαλακή*. At Germ. *Meerrettich*, radicem habet admodum acrem & mordacem. Quare nequit esse Radix silu. Dioscoridis.

Thlaspi maius, inquit Cordus in Dioscor. sine dubio est ea herba quam ego *Meerrettich* appello & Arabes *Nasturtium album*.

Brunfelsio: Armoracia aut Raphanus maior. Matth. passim in suis Commentariis. Thlaspi Crateuz, Raphanus vulgaris, Raphanus rusticus, raphanus rusticus siue maior, vt vulgò. Cam. apud Matthiolum raphanus sylu. raphanus montanus, rarò reperitur semen, vnde Petrus Crescentius scribit semine omninò carere: docti vocant Thlaspi Crateuz, & multi vocant Thlaspi magnum. In horto, raphanus rusticus, vulgò Armoracia.

Gesner. in cat. plant. Armoracia vulgò rapistrum *ραπίστρου* Theophr. sylu. Brassica, quibusdam Lampfana. raphanus sylu. Ponticus Armon, aliis Leucon: Officinis hodie rapistrum vt quidam volunt, ego autem existimo *Meerrettich* esse Thlaspi alterum.

Tabern. Icon. & hist. raphanus marinus *meerrettich*, Thlaspi alterum Diosc. Sinapi Persicum, raphanus maior, raphanus còdimentarius, raphanus obolioniorum Arab. Nasturtium album.

C. Bauh. phyt. raphanus 6. seu Thlaspi alterum Dioscor. Apud Matth. raphanus rusticus siue silu.

Gerard. raphanus rusticus.

Schv. raphanus rusticus, raphanus magnus, & *ραπίστρου* Dodon. Armoracia Plinii. raphanus rusticus, Lapathi folio, videtur Lobelio & Penz in Aduers. capite proprio Molybdema Plinii. Sinapi Persicum. Potest dici hydro-piper etiam hæc, quam nonnulli Lepidium Pauli & Plinii dixerunt. raphanus rusticus plebeculz.

Lobel. Obs. figuram habet ac scribit, raphanus rusticus Thlaspi & Sinapi Persicum, Armoracia Tragi, Thlaspi Crateuz Diosc. Lobel. in Obs. in Append. p. 499. Crassa radice raphanus rusticus florens, Aduers. pag. 135. & Obs. 173. Plant. Icon. p. 320. raphanus rusticus, crassa radice, Lapathi folio, Lobel. 173. Lobel. in Append. Teut. 304.

Nomina *Raphanus sylvestris*, sine Armoracia multo-
Liquarum, rum vocatur Hipp. de morb. mulier. *ραπίστρου*

propius accedant. Quod si verum est, errant quicunque plantam illam folio Rumicis, radice acetrima, Germ. *Meerrettich* & Angl. Redcole dicunt, Armoraciam aut Radicem siluestre putant. Nihil enim simile habent, Rumicis & Raphani domesticæ folia. Scribit idè Dioscor. Raphani sylu. radicem esse gracilem, teneram, sub-

rip. Gesner in Cat. *ραπίστρου* Theophr. Germ. *Meerrettich*: Gall. *Raisfort* sauage. Angl. *Boorse* Radisch, *Montaine Radisch* Great/Raisfort/Redcole Gerardo.

Copiosè alimus in horto E.C. ob eius multum usum in coquina hyberno tempore: abundat propè Lure spontè in agrois quorundam marginibus. abundat extra portam Helicurianam iuxta agros Canabinos, quà itur ad ædes carnificis: odiosus in hortis suo reptatu. Geneuz in hortis floret Maio, Basileæ abundat in multis hortis, item Lugduni: vidi Patauii & Veronæ in hortis: passim humidis & vmbrosis hortorum locis, Schvvenckf.

Extremæ planè est acridinis, annotante Schvvenckfeldio: Aperit, pellit, incidit, prouocat, attenuat, abstergit. Teritur cum vino, aceto & melle condimentum vice. Appetentiam facit. Verum caput ladic, & nidorosas eructationes mouet. Biliosis & caput dolentibus noxius. Vnum & arenas valenter pellit, Menstrua prouocat. Io. de Monte Exper. Senex Monachus cum sentiret se calculis vexari Raphanum rusticum *Meerrettich* tenuiter infecabat, in linteolum reponerat, & in vino macerabat, & mane & vespere cum velleret ire cubitum poculum ebibeat per triduum, hoc solo remedio vsus non vexatus amplius fuit à doloribus ob calculos & arenas.

SINAPI VETERIBVS ET IN GENERE

CAP. IX.

Sinapi licet nec à Theophr. nec à Diosc. in genere diuidatur, aut describatur, Plin. tamen triù generum esse dicit. Vnum gracile: alterum Rapi foliis simile: tertium Eruca. Sed alia adhuc potest ex semine desumi diuisio, quod colore vel est albo, vel atropurpureo, vel rubro.

Cæterum, tria se obseruare genera scribit Ruellius, & ex eo Carolus Stephanus, quem sequitur Gesner. hort. Siluestre vbique spontè nascens, exilius, quod vulgus gallicum à minori proceritate *Sanselam* vocet. Alia autem duo numerosioribus, altioribusque ramulis brachiari, Rapo similia, sed folio minori & asperiore. Verum semen variare, in vno rufescere, in altero candicare ex toto. Hanc *Blancham Moustardam*, illam *nigram* rusticos vocare, vtramque verò communiter *Seneue*.

Tragus capite de Sinapi satium [cuius alterum fulco seu pullo, alterum verò albicàte prægnat semine] & sylvestre recipit, ibidemque plures plantar. confusè tradit.

Fuchsius quoque & post eum Ryfius, genera duo agnouit, non semine tantum, sed & foliis & floribus distantia. Primum siquidem rapitium frondem exprimere videtur, floremque luteum obtinere, ac semen album proferre: Alterum verò in Eruca folium laciniari, floreque albicante, & semine vesco pulloque constare, scribit.

Trium Plinii Sinapis generum meminit Matthioli, eaque in Italia obseruari scribit. Horum autem vnum [Sinapi eius tertium] quod tum folio, tum etiam semine tenui dicit, erraticum [H. Lugd. quæ Matthioli genera & figuras recepit, Sinapi silu.] facit. Videtur hoc nobis Sinapi Erysimi folio. Alterum verò [secundum] quod Rapi fronde constat, cæteris maius hortense [latium H. Lugd.] vocat. De hoc dicitur sub Sinapi siliqua hirsuta

hirsuta albo, non respondente descriptioni. Tertium [in inscriptione primum] & ipsum sativum [hortense H. Lugd.] statuit, femine albo, minusque acri. Dicimus & hoc Erucam maiorem.

C. Bauhinus vt & Camer. apud Matth. Germ. *caldem* Sinapis exhibuit species, nisi quod hic pro siluestri, altam plantam dederit, quæ nobis videtur Eruca quorundam silu. repens.

Lonicerus aliter distinguit: in Luteum enim & album à flore sumpta varietate diuidit. Illud duplex rursum tradit, hortense & siluestre, ambo feminibus albis. Exhibet autem pro hortensi luteo, Sinapi album. Syluestre existimamus esse Rapistrum flore albo striato. Sinapi album, quod Græcè Euzomon, Latine Erucā vocari scribit, similiter in sativum & agreste dirimit. Satiuum album satiuo luteo: agreste album, agresti luteo, inquit præter flores in omnibus respondent. Pro Sinapi silu. albo ponit iconem Erucæ satiuæ.

Brunfel. duo Sinapis genera agnoscere videtur. Album & nigrum. Ita namque scribit. Eruca album Sinapi est, nigro virtute calonsicā similis, adeo vt sine damno in vltim venire vix possit, ni lactuca addatur, à cuius frigore ad temperamentum adducatur.

Dodon. Sinapios tria genera esse tradit: satiuā duo, & siluestre tertium. Satiuo priori flores esse dicit cum semine luteos: alteri flores quidem luteos, sed semen è nigro subruflum, interiore medullā è luteo virefcens. Sinapi satiuum Dodonæi pridus, quoad figuram, Erucam maiorem satiuam flore albo demonstrat: Alterum Sinapi album exprimit. Siluestre, cum Sinapi Eryfimo Tragi cognatum credimus.

Lobel. & Penain Adu. præter duplex Sinapi satiuum, Erucæ & Rapifolium, duplex quoque Agreste constituunt. Primum Apii, aut potius laueris folio, quod quale sit, fatemur ingenuè, nos adhuc ignorare. Et alterum Sinapi silu. minus, Irionis veri folio, aut Burfæ pastoris. Hoc si ex figura Lobelii Obs. & Icon. Pl. coniectari liceat, Sinapi Eryfimo simile fuerit. Lob. Obs. & Ic. plāt. sub titulo, Sinapi satiuum Erucæ aut Rapi folio Adu. p. 67. iconem falsam exhibet, Erucam enim maiorem potius ex Matth. exprimit. Sub Sinapi etiam agreste Apii aut potius Laueris folio Adu. p. 68. male adaptat figuram Sinapi albi, vt dicitur sub Sinapi siliqua hirsuta, albo.

Cæsalp. Sinapis triplicem differentiam assignat. Rapa folio, flosculis luteis, semine fuluo, satiuam & siluestrem. Tertiam, folio laciniato, floribus quidem etiam luteis, aut semine ex flauo candicante. Est hoc nobis Sinapi album illud vulgare, semine ruffo.

Atque has Sinapi differentias, vt & eas, quas C. Bauhinus in Phyt. inter Erucas recenset, cum nostris mox feorim distinctius trademus. Plurimæ sanè præterea extant plantæ, quæ passim apud Autores Sinapis nomen si vendicarunt, vt Sinapi Persicum, Alliaris, Capparidis, Lepidium, Erucæ, & alia plura, de quibus singulis suo quoque pertractatur loco.

Apud Athenæum distione Sinapi vsus est Nicander Colophonius in theriacis:

Est vel Cucurbitulam aneam, vel Sinapi.

Idem in Georg.

Mordaxque semen Sinapi.

Et alibi.

Nasurium verum, solus nigrisque Sinapi.

Græci plerique *σινάπι* & *σινάμη*, Attici verò, vt apud Athenæum legitur *σινάμη* dixerunt, sic Galenus appellat, Paulus & Aetius. Dioscorides vtroque modo vocat, Latini Sinapis & Sinapi. Arabe

Cardel. Hebr. *Chardal*, quemadmodum in Cant. cap. 7. Rabi Salomon testatur. Germ. *Senff*, Belg. *Mouffact*: Gall. *Mouffarde*, *Senene*. Ital. *Senape*, Hispan. *Mollaza*: Castal. *Moffalla*: Port. *Mofarda*. Angl. *Müsterd* & *Seuberye*. Boh. *Borické* Hung. *Müstar*.

Notandum autem his nominibus & condimentum, quod ex huius plantæ semine conficitur appellari. Plinius Sinapi etiam à quibusdam Thapsi: ab aliis Saurion dici refert. Est autem tam Sinapi, quam Napy sua ratio ac interpretatio. Nam etenim dicitur, autore Athenæo, quasi *ναπύς*, quia *πύος* & *επίπυος*, sine natura sit: velut Aphia, quia ob paruitatem natura priuatum sit. Quod ob pusillam molem non esse, aut vix esse credatur. Alii Napi per priuationem, videlicet *Νάπη*, quasi immitte dici volunt, quoniam acrimoniæ vehementis particeps sit. *Σινάμη* verò, *σινάμη* *σινάμη* *σινάμη* *σινάμη*, quia olfactu oculos lædat. Et hinc fortè meritò à Poëtis, fletum factura, lachrymosa & tristis cognominatur, apud Athenæum Crates Cleonem ira percitum, contracta fronte, & indignabundum, excandescensque innuens dixit:

Sinapi conspexit, & frontem contraxit.

Quod verò Gallis *Mouffarde* vocatur, ex eo factum videtur, quod cum multo Sinapi ad intinctum conteri soleat. Camerario tamen apud Matth. germ. Mustarda dicta placet quasi Mustum ardens, quod ignea vi semen nares & cerebrum apprehendat, lachrymas excutiendo, nullo asperitimi saporis præuio odore. Vnde natum apud Francos diuerbium, quo, cum insignem veteratoris astutiam indicare volunt, inquirunt, Callidiorem esse Sinapi.

Terram, vt inquit Palladius, diligit aratam, & si fieri potest, congestitiam, quamvis vbiuncum nascatur: sarculari debet assidue, vt respergatur puluere, quo fouetur: non minus gaudet humore: de quo semen legere disponis, suo loco esse patieris: quod ad escam parabis, robustius facies transferendo. In Sinapi vetus semen inutile est, sationi, vel vsui: quod dentibus fractum, si intus viride videbitur, nouum est, si album fuerit, vetustatem fatetur.

Sinapis sementem auspiciantur Autumno, Vere perficiunt, quinto die post satum comparet. Accitimum, inquit Plinius, sapore, ignei effectus ac saluberrimum corpori Sinapi, nullā culturā prouenit, melius tamen planta tralata. Quin è diuerso vix est satō semel eo liberare locum, quoniam semen cadens protinus viret. Eligere præcipit Diosc. quod non obaridum sit, & fuluum, & adustum: sed quod fractum intrinsecus viride, & velut succulentum sit ac cæsum colore. Tale enim recens esse & in vigore constitutum. Porro Antiphanes excellere putat Sinapi Cytium: optimum commendat Egyptium Plinius, probat Alexandrinum Galenus, Pythagoras principatum habere ex his quorum in sublime vis feratur, ludicauit: quoniam non aliud magis in nares & cerebrum penetret.

Sinapi in medicina multæ & magnæ vires: Nam, autore Dioscoride ad calcificandum, attenuandum, attrahendumque efficax est. Commanducatum autem valet ad pituitam capitis eliciendam. At succus ex aqua mullā, contra tonsillarum præduros tumores, veteresque & callosas arteriæ scabritias gargazatu prodest. Ipsum verò Sinapi tritum & naribus admotum sternutamentum ciet. Comitialibus quoque auxiliatur, & vultus strangulatu oppressas excitat. Quin & le-

thargicorum capiti derafo illinitur. Ficus autem admixtum & impositum donec rubescat locus, valet ad exorandum cruciatus, lienes, ac in vniuersum ad quemuis diutinum dolorem, cum ex alto in summam cutem quidpiam extrahere est in animo, trāsato scilicet in alteram partem affectum. Alopecius etiam illitum medetur, faciem purgat, & oculorum fugillata tollit, cum melle, adipe, aut cerato. Cum aceto verò, lepræ & feræ impetigines eo perunguntur. Sed & contra febiles circuitus aridum bibitur, polentæ modo potui inspersum. Emplastris quoque extrahendi vi præditis, sique quæ ad ploram faciunt, vtiliter amullecetur. Succurrit & auditus grauitati incertisque sonitibus cum fico tritum, auribusque inditum. Ipsius verò succus cum melle ad oculorum hebetudines genarumque scabritias conuenienter iungitur. Cæterum exprimitur recenti adhuc semine succus, atque ita in Sole siccatur. Vtus eius, ut scribit Plinius, etiam pro pulmentario in patulis decocto, vltra intellectum acrimonia. Coquuntur & folia sicut reliquorum olerum. Ad serpentium ictus & scorpionum tritum cum aceto illinitur. Fungorum venena discutit. Contra pituitam tenetur in ore mansum capitis pituitam elicit, *amphiprotæ*, [Diosc.] donec liquecat, aut gargazatur cum aqua multa. Ad dentium dolorem manditur. Ad vnam (ad tonsillas, diutiusque & callosas arteriz scabritias succus mixtus cum mulla gargazatur, gargazatur cum aceto & melle. Stomacho vtilissimum contra omnia vitia, pulmonibusque. Excreationes facili facit in cibo sumptum: datur & suspensio. Item comitialibus tepidum cum succo cucumerum. Sternutamentis caput purgat, aluum mollit, mensura & vinam ciet. Hydropticis imponitur: Cum fico & Cumino tusum ternis partibus comitali morbo. Et vuluorum conuersione [strangulatu Diosc.] suffocatas excitat odore, aceto misto: item lethargicos.

Calefacti & siccant ordine quarto, Galeno asserente.

Plinius corrigunt.

Vox (inquit Cornar.) lithanicos, falsò pro tetanicos apud Plinium supposita. Nulli enim sunt lithanici, sed tetanicorum affectio media est inter Opisthotonicorum & Emprosthonicorum affectionem, utramque complectens: quando distentio aut rigor neruorum, antè & retrorsum contingit.

Symeon Sethi scribit Sinapi vim habere dissoluendi, & discutiendi humiditates quæ in capite & stomacho sunt. Conferre etiam lienis affectibus ab humiditate & flatu procreatis. Item quartanis morbis, qui ex adusta pituita contracti sunt. Ad hæc & podagris à pituita factis. Officere verò visui, & calido capiti, & iecori. Adiuuare concoctionem & distributionem ciborum crassarum partium. Minuere quæ in ventriculo sunt humiditates. Illitum lepris eas in melius mutare. Linguas etiam humiditate grauatas siccare. Sic cum melle sumatur, tussis resoluitur. Cum caricis verò schiadicis illitum, & henosis vtile esse: trahere enim quæ intus sunt ad corporis superficiem. Suffitum verò & incensum serpentes fugare.

Sinapi in scorbutico, inquit Marcel. Kirsch. Transylu. vtilissimum est. Hinc nauta in magnis nauigationibus copiâ Sinapi sese munire solent, eo tanquam præsentissimo prophylactico Theriacæ vntes. Habet enim vim calfaciendi, extenuandi, dissoluendi & discutiendi humiditates in ventriculo & lienis affectibus, adiuuat concoctio-

nem & distributionem ciborum crassarum partium.

Qui ex Tridentino agro in Germaniam multum comportant, auctore Matthiolo, Sinapi albo cadis imposito, dulcedinem multum conferunt. Folia (de vulgari Lobel. loquitur) tenera Sinapi in acetaria veniunt.

Quomodo porro Sinapi ad condituras Salgammorum & ad Embammata præparari debeat docet Columella, in hunc modum. Semen Sinapis diligenter purgato, & cribrato, deinde aqua frigida eluito, & cum fuerit bene lotum, duabus horis in aqua finito, postea tollito, & manibus expressum in mortarium nouum, aut bene emundatum conicio, & pistillis conterito, cum contritum fuerit, totam intritam ad medium mortarium contrahito, & comprimito manu plena: deinde cum comprelleris, sacroscato, & compositis paucis carbonibus viuis aquam nitratam affundito, ut omnem amaritudinem eius, & pallorem exaniet: deinde statim mortarium erigito, ut omnis humor eliquetur. Post hoc album acre acetum adicio, & pistillo permisceto, colatoque. Hoc us ad Rapa condienda optime facit. Cæterum si velis ad vsum conuiuiorum præparare, cum exanieris Sinapi, nucleos pineos quam recentissimos, & amyllum adicio, diligenterque conterito infuso aceto. Cætera, ut supra dixi, facito. Hoc Sinapi ad embammata non solum idoneo, sed etiam specioso vteris: nam est candoris eximii, si sit curiosè factum. Hæc ille.

Nostri autem mustum semen nocte macerant aqua, deinde manibus expressum adiecto aceto pilâ terunt, acerrimo ciborum condimento. Alii per vindemias cum musto maduerit semen conterunt, ita magnam acrimonia vim exiit, totoque anno feruatur. Nec hodie quicquam hyeme ad intinctus ubique cibis frequentius immiscetur, gratissimo oblongiorum condimento: nihil quoque frigidis diebus magis epulas videtur commendare. Quod si vel assidua consuetudine, vel usu, gratia ciborum exoleat, huius acrimoniâ fastidiosis gustum reuocant, & hoc velut irritamento elanguescentem appetentiam inuitant, quo velut igniculo morosius palatum titillante, vorandi moluntur audientem. Sed huius vis confestim in sublime fertur, ut ex Plinio diximus, nec aliud magis in nares ac cerebri penetrat. Quare si modus abfuerit, huius odor naribus raptus, statim sternutamenta ciet, & vellicans sensum lachrymas elicit, quod & testatur Columella canens:

Sæpe lacessenti sletum sacra Sinapis.

Ad dolorem capitis sæpè recurrentem, caput & tempora, cum oleo & Sinapi parato pluries illinit VVirt. Empiricus. Sed aboleuit oleum Sinapium, etsi ubi ad summum excalefacere opus fuerit, maximam opem præstare valeat. Hoc autem non nisi collachrymantibus oculis exprimi potest: tanta enim est vaporis acrimonia, ut concepto vapore illico prodeant lachrymæ. Miscetur quandoque cum eo, quod è pistaceis nucibus elicitur: perungunturque eo genitalia in frigidis, ut felicius coeant, addito Lalete, & Moscho. *Aqua Sinapis* ex herba flore linnii principio destillata, pellit vlcera gingivarum, ore sæpius ex ea colluto. Conducit ad membrorum Phthisim, si sæpius inde fricentur, inde enim vigorem, & carnem recuperant. Medullam ossium calefacit, si sæpius ex ea fricentur, & per se iterum siccantur. Prodest contra frigidum morbum articularum, si inde

si inde fricescunt & iterum per se fricescant.

SINAPI SILIQUA LATIVSCVLA GLABRA fem. ruffo, siue vulgaris.

AD cubitos aliquot excrefcit, caule imâ parte hirsuto, superiore glabro, frequëntibus ramis brachiato, eoque tereti & fungosâ medullâ pleno: *filia*, inferiora quidem lata, dissecta tamen, Rapi-
tis similia, hirsuta, superiora verò tenuiora & glabra, odore si terantur eodem qui in semine percipi solet: *flores* Erucæ minores, & Rapi-
strilutei, ex quatuor foliis apicibusque mediis occupantibus compositi, quos quatuor foliola pallido herba-



ceo colore prædita obuallant, odore suau: hos excipiunt *siliqua* glabra, satis breues, Erucæ maioris similes, sed minores, ex breui pediculo, quæ commissurâ ratione, ut in illa, dehiscunt, *semina* claudentes plûs minus octo. cum in Eruca multò sint plura, colore minus obscuro, & paulò maiora, in hoc à Rapistrâ seminibus differentia, quòd ruffa sint nec lucida, cum illa nigra sint & nitida, cæterum Sinapios huius semina tenui membrana separantur, cui ordine adherent, sapore acri: *radix* candida, lignosa, fragilis, fibrata. Nullus, quod sciam, bonam iconem exhibuit Sinapi de quo hic agitur, vixque ab aliquo ritè descriptum videtur: propterea placuit, & de nouo describere, & depingere.

Brunfel. Sinapi. Cord. in Diosc. Sinapi hortense, herba cum semine suo omnibus nota. Notâq; ibidem Gesner. satium à siluestri culturâ solùm differre. Fuchs. Sinapi vulgare omisit.

Tragus Sinapi satium, Gemein Senff sam, vnde garten Senff mit braunen samen. Miror Tragum alioqui Botanicum diligentem nec figurâ nec descriptione hoc Sinapi ritè descripsisse aut distinxisse à Sinapi albo. Ait quidem Sinapi sat. i duo genera, quorum vnus sit semine pullo seu sulco, de hoc loquens.

Lacuna proponit plantam Erucæ facie pro Sinapi primo, & descriptionem, quæ mihi non videtur competere Sinapi vulgari, sed potius Erucæ.

Dod. Sinapi hortensis secunda species. Neotericis Sinapi commune, Gallicè *Senne de lardin*, ou *Moutarde*: Germ. *Zamer senff*. Belg. *ghe-mein Mostaert*: Item Sinapi siluestre. Lat. in fol. Sinapi alterum satium ex quo condimentum conficitur, quo ad ciborum intinctus vtuntur *simul vnaque*. Item siluestre. Non est Dodonæo in hist. Gallic. figura pro Sinapi secundo siue vulgari, in Lat. habet figuram Sinapi albi. Quid per Sinapi siluestre intelligat nescimus, nisi tradat spontaneum: Is enim sibi non constet in hist. Gall. proponit figuram Erucæ sub titulo Sinapi Tom. II.

filu. in Latina verò appingit iconem filu. Matthioli, figurâ sanè duæ non parum differentes.

Aduers. Lob. & Penz. Sinapi satium Erucæ, aut Rapifolium, Gall. *Senne d. mestique*, Germ. *Senff*. Angl. *Mustard* & *Senbrye*. Magis abest Sinapi à Napo vitium acrimoniam, quam specie, facie, vel nomine. Napi enim immitte aut vehemens interpretantur, siliqua rapacea, semine minore, acerrimo, oleoso. Item p. 63. Sinapi agreste Apii, aut potius Laueris folio, Gall. *Senne sauvage*, Germ. *wilder Senff*. Belg. *wilden Mostaert*, ruribus semen nigrum penuriam satini refert, quod ostendit flores & siliquas, ad satiorum viarumque riuulos & depletas fossas luxuriare solitum.

Hist. Lugd. Sinapi hortense cæteris maius & vulgarius nigrum Galli dicunt, siliquæ hirsutæ plenæ semine ruffo, nigrescente, calido & acri. Malè dicit siliquas hirsutas, malè etiam Erucam representantem figuram ponit.

C. Bauh. phyt. Erucæ. Sinapi Apii folio: Sinapi gracile Plinio: Sinapi Brunfelsio: Sinapi luteum satium alterum pullo seu fusco semine Trago. Sinapi agreste Apii aut potius Laueris folio Lobelii. In semine differentia apparet, aliud enim subruffo aliud albo est. Item apud Matth. Sinapi 2. Apii folio, gracile Plinio: Sinapi Brunf. Sinapi sat. luteum Trago: Sinapi alterum Matthioli, Lac. Cæsalp. Sinapi primum Caut. Sinapi hortense Fuchsi: Dodon. Gall. & eadem in folio. Sinapi 2. satium: Sinapi satium Lugdun.

Sinapi filu. luteum Lonic. Si *Fraser* non tradit locis citatis, Sinapi vulgare semine ruffo, nescimus ubi eius meminerit aut quale intelligat, Brunfelsius sanè de vulgari scripsit: Tragus meminit eius in descriptione, nomine seminis pulli seu satini, non item cum in titulo iconis posuit, Sinapi luteum satium *Cæler senff*, titulus enim hic & icon sunt Sinapi albo semine. Lobelii Sinapi agreste Apii folio descriptum in Aduers. an huic iungendum nescimus, nisi dicamus cum intelligere vulgare Sinapi non cultum: figuram quam Lob. eo titulo posuit est Sinapi semine albo. Vulgare autem Sinapi semine albo reperiri non existimamus, quod semine est albo, flauoq; diuersa est species à ruffo, non colore tantum, verum etiam figura. Sinapi luteum Tragi cum vulgari non confundendum. Matthioli figura posita pro Sinapi 2. non conuenit cum vulgari: Cæsalpini primum est vulgare: Lachna per suum Sinapi 2. non intelligit vulgare, nec descriptione, nec figura. Fuchsius non tradit Sinapi vulgare: Dodonæo in hist. Gall. Sinapi hortense est album, diuersum à vulgari, in hist. Latina Sinapi vulgare dicitur ei secundum, sed figura non conuenit. Lugdun. hist. satium Sinapi est album. Loniceri sylu. luteum non est vulgare, nec descriptio nec figura conueniunt, Lonicerus suo more omnia confudit. Figuram Sinapi vulgari conuenientem apud nullum Matthiolum, nec per C. Bauhinum auctum, nec in cæteris editionibus video.

Considerent Lectores an Gerard. lib. 2. c. 9. per *Sinapi syl.* Sinapi silv. wilde *Mustard* intelligat Sinapi vulgare: quamuis icon non respondeat, quam Tabern. posuerat pro Eruca palustri minori, quæ alioqui parum conuenit cum Sinapi.

Hoc Sinapi obseruauit Geneuæ, florens Maio & Iunio, Augusto, Montpelii, Lugduni, Basileæ, & aliis locis. Montbelgardi semine maturo Iul. Tempus & lio, proueniens etiam in Horto II. E. C. ac alibi Locis non satum: sed ex semine variis locis ex improviso delapso.

SINAPI ALBUM SILIQUA HIRSUTA
femine albo & ruffo.

Descriptio



Radix candida digitali est crassitudine, longitudine palmari, & sesquipalmari, multas longas à lateribus fibras obliques emittens: ex quacules surgunt aliquot, duos aut tres cubitos alti; crassitudine pollicari, multis alis concavi, hispidi, inanes: filia Rapæ profundè sinuata, pilis spinulifera

suprà in frâque donata: flores, suaevolentes, bractice; colore luteo: siliqua ex pediculo vncâ longiores, asperæ, hirsutæ, in hoc ab Eruca differentes, cui glabræ, in latam cuspidem desinentes, qui excide nubus duabus siliquæ partibus remanet appensus, cum interiecta membrana lucida, quæ solet separare semina pauca, rotunda, alba vel flavescentia, maiora quàm Erucæ, & Sinapi vulgaris, nec ita actia vt Sinapi vulgare: Sinapiam descriptum reperitur etiam semine albo.

Plant. Icon. p. 203. Sinapi agreste Apii aut potius Laueris folio, Lobel. 100. Teut. 241. Figura aliquomodo respondet non item titulus.

Brunf. Erucæ, (weissen senff) malè nostro iudicio.

Cord. in Diosc. & Zozar, Latini Erucam: Germani weissen senff vocant, quoniam simile per omnia Sinapi sit præterquam semine candido. Gesnerus ibidem ait: Errat Cordus nam quod Sinapi album Germani vocant, omnino Sinapi species est: Huic ad stipulatur Theop. Par. in Anato. viuo. Sinapium pro Eruca hæctenus, sed falsò, accepisti.

Fuchs. Hist. Sinapi primum genus rapitiæ frondem exprimens, flore luteo, semine albo, quod Germ. geelen garten senff nominant, Ic. Sinapi hortense, Zamer senff.

Trag. Sinapi luteum satium, Wäler senff, Zäim vnd garten senff mit weissen Samen. Sinapi albicante semine. Hoc, inquit, quibuldam Eruca est, Dioscoridi in Zozar. Atqui vt ingennè dicam, inquit is, quod sentio, ego Erucæ nomen vbiçunque offendo, de Rucula, Germ. Rautech, & non de albo Sinapi intelligo, neque quid hac in re Seplassiani & Doctores ipsorum pronuncient, magnoperè sollicitus sum.

Lacuna
not.

Lacuna. Sinapi secundum, foliis Raphani patulè minoribus, floribus luteis, siliquis hirsutis, semine albo, pharmacopœi interdum confundunt hoc Sinapi cum Eruca. Quod in Pharmacopœis culpata Lacuna, ei euenit, confundit Sinapi cum Eruca, vt suis dicitur locis. Figura quam ponit quadrat descriptioni, & in eo melius quàm Matthioli docuit.

Matth. not.

Matth. Sinapi tertium & ipsum satium est, se-

mine albo, minulque acti. In post. côm. Ital. idem tradit, addens hoc semen dici Roccheta. Figura Sinapi albi est apud Matthiolum posita pro Sinapi 2. is non videtur agnovisse discrimen inter Sinapi & Erucam: In hist. Germ. in descriptionibus omnia confundit, in descriptione primi Sinapi, meminit siliquarum hirsutarum quod nostro Sinapi albo competit, verum eiusmodi siliquæ hirsutæ sunt in figura Sinapi eius secundi. Descriptio ibi nulla quæ in omnibus conveniat cum Sinapi vulgari semine ruffo, nec figura posita pro Sinapi tertio respondet Sinapi semine albo.

Idem in Epit. cum addit. Cam. Sinapi alterum Græcis *εὐρωπαικόν*. Italis Senape, siue Senaura saluatico: Germ. Gelber Senff. Cornicula ei hirsuta. Item Sinapi tertium. Italis Senape bianca siue Roccheta: Gallis Moutarde blanche. Semine est albo.

Ex epitome Matthioli apparet, eum confundere Sinapi genera & eorum nomina: Camerarius ommissa figura Matthioli aliam ponit pro tertio Sinapi huc non pertinentem, est enim Erucæ sylvestris. Effigies à Camerario ad hist. Germ. posita quæ mutata, pro secundo cum siliqua hirsuta non displicet pro Sinapi albo, ac melius placet quàm Patrocinatoris, qui glabram appinxit. Sinapi illud; ait idem Matth. quod tum folio, tum etiam semine tenui nascitur; erraticum est. Item in post. edit. cum Additamentis C. Bauhini. Erraticum folia habet tenuiora plura ex vno tametsi prodeuntia, caulem rectum, firmum, asperum, hirsutumque, à medio ramosum: corniculis numerosis atque hirsutis. Nascitur locis incultis, in campestribus & inter rudera. Possit quis existimare Matthiolum per Erraticum Sinapi intelligere non cultum, si non diceret corniculis hirsutis, præterea figura posita pro Sinapi primo Erucam potius denotat, præferenda tamen figuris nouis Glossæotis & Patrocinatoris Matthioli, qui siliquas hirsutas appinxerunt quæ non sunt hirsutæ, nec in Erucæ, nec in Sinapi vulgari semine subrustico. Icon à Matthiolo posita pro Sinapi 2. non conuenit cum vulgari, sed est Sinapi semine luteo siue albo, eadè cum Tragi & Fuchsi figura. Matth. in Hist. Germ. Sinapi primum, Garten senff. Rapis simile, flore luteo, siliquæ hirsutæ in quo semen Schwartz rotundè est subrustum, Raporum semini simile. Secundum Sinapi hortense, non ita altè crescit, foliis Sinapi similibus, flores interdum albi interdum lutei, semen rorleechter, id est, rubellum. Sinapi silu. provenit in agris flore luteo, satiuo simile nisi minus semen Korschwartz subrustum. Matthioli. in sua hist. Germ. omnia obscuriora reddit: mutato ordine in descriptione & non in figuris, prima enim est quæ Erucæ similis, cui Camerari. in histor. German. & Epit. & C. Bauhinus addiderunt siliquas hirsutas: prius Sinapi conuenit cum vulgari si non diceret siliquis hirsutis: posset & siluestre aliquomodo quadrare cum non culco Sinapi. Secundum Sinapi satium quod referendum non videmus, confusa descriptio videtur: Figura respondet Sinapi albo.

Aduers. Lobel. & Penz Sinapi alterum satiuum Gallis Seneur blanc: Belgis Wyrt mossaert: Germ. Weisser senff. Existimo Lobelio non fuisse notas differentias Sinapi, nec scivisse quid esset Sinapi album: figura quam exhibet Obs. & Ic. pl. pro Sinapi agresti, Apii aut potius Laueris folio Adui p. 68. aliquatenus conuenit nostro Sinapi albo, non item titulus: Celsalp. Sinapi 1. folio Rapæ, foliis luteis; siliqua breui, semine luteo. Sinapi 2. folio

Tabern. hist. & Icon. xcggeniffa. Erysimon 2.
Gerard. Angl. Erucæ satuz nomine proponit
Iconem Tabern. sed malè.

SINAPI SYLVESTRE MONSPESSVLA-
num lato folio, flosculo luteo minimo,
siliqua longissim.

Descriptio **P**er huius caulis lesquibitales, non nihil stric-
tos, teretes ferè, & solidos, folia conspicun-
tur Den 15 Leonis foliis respondentia tum ma-
gnitudine tum forma d. lobata, glabra aut nul-
lis certè effatu dignis pilis donata; odore & sapo-
re acri prædita: flores lutei, parui: siliquæ dein o-

nuntur densis-
simæ & longis-
simæ, admo-
dum acri femi-
ne refoctæ.

An Catalp. I-
rionis species
altera amplior.

Hinc eandem
plantam aut sal-
tem valè simi-
lem attulit mhi

Fr ter ex horto
Pisanino no-
mine Erysimi.
Florat & siliq-
uas fert circa
M. octulum
mense Martio
loco sicco.

Locus &
Tempus.



SINAPI GENEVENSE SYLVESTRE

Descriptio



Ita appello
spontanæum
quoddam Sina-
pi Genevæ a
me observatū,
cui ex radice
simplicibus,
hæc ferè te,
multi statim e-
xornantur cau-
les propter ter-
ram nonnihil
heruti, ramosi:
per quos folia
Erucæ similia,
divisurâ non
minis frequen-
ti dissecta, ve-
rùm latitudine
Monspellulano
maiori ceden-
tiâ, divisurâ e-

tiam diueria: licet flores Monspellulani floribus
sint maiores: siliquæ ex pediculo mediocriter
longo graciles, tres vix longæ, semen bipaten-

tibus: cum claudant totum sinum caulinum.
Idem forte est quod vidi apud Dominum To-
cobum Zvingerum in horto flore luteo, foliis
tamen multo maioribus, culturâ fortè id cau-

SINAPI MONSPESSVLANVM SILIQUA
asperâ bifurcâ.



Statim d. ra. Descriptio
Silice lignosa
folia exeunt fre-
quentia, similia
ferè Erucæ mi-
noris foliis, a-
cria: interque
hæc caules ali-
quot palmares
aut etiam cubi-
tales, in rama-
los aliquot di-
uisi: floribus Si-
napeos luteis,
paruis, decidu-
tibus siliquæ
succedunt, cre-
bræ, vnciam lō-
gæ, teretes, as-
peræ, aliquæ
secundum cau-
les ramiflve as-

cedentes, aliæ longè ab iis abscedentes & velu-
ti rectâ foras proteritæ, semen claudentes minutis-
simum, saturatè rufum.

C. Bauh. Phyt. Erucæ 13, siue Sinapi paruum si-
liqua aspera huius lo Babin.

Mense Autumno nauci inter Monspelum
& Montem Esperon: nos paruum obseruauimus,
magnum obseruauit Genet Cherlerus in vdis
fossulis inter Monspelum & Thermas Bellelu-
cianas.

Locus &
Tempus.

SINAPI ECHINATVM.



Descriptio
Sinapi fami-
liare est Sinapi
Echinatum, cui
caulis lesqui-
cubitalis, teres
asper & pilis
rubris hirsu-
tus, multis alis
concauis: folia
ad Cichoreæ
sylvestris folia
accedunt, siue
Hedypnoidis,
vel Hieracii,
interdum eius-
dem magnitu-
dinis, aliàs ma-
iora: flores per
ramos copiosi,
Erucæ floribus

similes, lutei, è quatuor foliolis compositi: quos
excipiunt siliquæ breuissimæ, trientem pollicis vix
æquantes, sed crassæ, & quatuor costis cristatis,
in medio lacuna donatis pinnatæ, semen continen-
tes. Hæc herba actimonia non caret.

C. Bauh. Erucæ 15, siue echinata siliqua.

Hist. Lugd. Sinapi echinatum.

An Catalp. Sylvestris Rapa, de qua scribit
spontè in aruis nascitur: radice non crassa, nec
rotunda

rotunda, sed ~~enim~~, & longa, vt Raphani sylvestris: foliis Rapæ minoribus, hirsutioribus, similiter angulosis: caule breui, ramofo: floribus aureis, capitulis Fabæ magnitudine, angulosis: intus ossileum quid continetur: vnicò semine ob siliquæ breuitatem. Mihi omnia videntur conuenire cum Sinapi Echinato, quamuis Frater ex silu. Cæsalp. Rapa faciat Matth. Rapum silv. verum descriptio capitulorum sem. Cæsalp. non conuenit cum siliquis egregiè à Matthiolo pictis.

Floret in segetibus circa Monfessulum, mensè Martio, Aprili & Septembri.

ERUCA MAIOR SATIVA ANNUA

flore albo striato.

CAP. X.

Alba, lignosa, tenui radice donata, saporis acris: caules subhirsuti cubitales & sesquicubitales: folia Sinapi albi, minor, teretia, glabra, eiusdem cum radice saporis: flores quadrifolii, è cæruleo albi, stinis nigricantibus picti, quales Sinapi albo agresti Trago, ex calycibus hirsutis, siliqua ex breuibus pediculis glabra, quales in Sinapi siluà glabra, sed longiores à lateribus se apertientes: per membranam distinctæ, cui adhærent multa semina flaua, maiora quam Sinapi iam dicto, minus etiam rotunda.

Theophr. Erucæ meminit satiuæ inter olera, cui tribuit radicem lignosam.

Dioscorides *Erucæ* [ita enim Erucæ græcè vocatur] domesticum non desinit.

Plinius de Erucæ inquit, tantam inesse in condiendis obsoniis suauitatem, vt Græci *Erucæ* appellauerint.

Cord. Hist. Erucula

maior, cuius comoda descriptio. Gesnerus addidit figuram ex Trago. Trag. Erucæ siue Rucula marina maior, *Graßrauten* Sinapi 8. Fuchsius huius figuram habet pro Sinapi altero genere, cuius etiam descriptio non malè quadrat: vocat Germanicè *Weissen garten senff*, ait etiam eo loco perperam eos agere qui altero genere Sinapi pro Erucæ vtuntur. Considerent autem Lectores an ritè distinguat Erucam à Sinapi. Is enim cap. 100. huius iconem iterum habet nomine Erucæ silu. & *wilder weisser senff*, vt etiam in Iconum libro. Huius tamen descriptio Erucæ silu. nullo modo conuenit.

Apollin. *Weiß senff*. Pro eo pingere videtur Erucam satiuam, an eam intelligat nescio. At guill. Erucæ Dioscoridi Ibericè dicta sylvestris.

Matthiæ. in Dioscorid. pingit titulo Erucæ satiuæ, cuius in corn. Ital. post. aliam habet figuram, ac eadem tradit. Idem rursum eandem

Tom. II.

habet figuram sub titulo Sinapi primi: quod in textu vocat Sinapi satiuum tertium. In post. quoque com. Italicis cap. 142. eandem tetinet figuram quam olim habebat pro Sinapi primo, ac addit, Sinapi tertium vocant Erucam. Item in hist. Germ. *Weisser garten senff* oder *Kauesen*. Erucæ satiuæ. Idem etiam Erucæ figuram habet hoc titulo *Gelber aut Roter Senff* Sinapi. Matthioli *mirè* confundit historiam Sinapi albi cum Erucæ maiore, vt & aliorum Sinapi generum cum Erucis, vt nullus se ex eo extricare possit.

Si apud Matth. in Epit. & addit. Camer. sementinus pingeretur, & nihil hirsuti in siliqua, figura benè placeret: præterea figura posita pro Sinapi. Erucam melius refert quam Sinapi. Glossator & Patozinator Matthioli pro Sinapi primo Matthioli figuram ponunt accedentem ad Erucam, sed non conuenit siliqua hirsuta apposita, neque Sinapi neque Erucæ.

Lonic. *Weiß milder Senff* oder *Wilde Kauesen*. Sinapi silu. album, siue Erucæ sylvestris. *Stirpium* imperitus Lonicerus Erucam à Sinapi non nouit distinguere.

Dodon. Gall. Sinapi silu. *Sennefauage*. Item alibi Erucæ Romana, *Roquette Romaine*, *Rooschê Kaessen*. Lat. in fol. Erucæ satiuæ, stoculi sublu. *Dodon Lap. N. n. existimo* Dodonæo notam Erucam satiuam, quia eius figuram posuit in hist. Gall. pro Sinapi silu. licet non respondeat descriptioni eius Sinapi silu. Erucam Romanam non absolutè describit, nec figuram apponit. In hist. Lat. Laudabilem figuram habet: sed non benè tribuit flores luteos: Præterea p. 694. pro Sinapi satiuo priore figuram habet multum accedentem ad Erucam satiuam flore albo, quæ non respondet descriptioni quam ibi ponit Sinapi satiuo prioris.

Lacun. Erucæ satiuæ, flores lutei. *Quamuis* Lacun. cuna ponat figuram Erucæ, existimo nihilominus ei incognitam, quia tribuit flores luteos: præterea similem ferè figuram ponit pro Sinapi primo: in descriptione dicit Sinapi habere flores albicantes cum forma crucis, quæ Erucæ videntur competere: vt verum fatear, puto illum confundere Erucam cum Sinapi.

Gesnero passim Erucæ, Erucæ flore albo, Erucæ hortensis.

Dorsl. Erucæ satiuæ formè similis vero Sinapi.

Camer hort. Erucæ maior.

Brunkel & Cæsalp. Erucæ.

Lobel. & Pena Adm. Erucæ satiuæ duplicis meminere, quæque illis Erucæ nostras dicitur vulgaris notissima, eam cum Hispanica compararunt, tanquam ex qua hæc facillimè percipiatur. Lob.

Obs. Erucæ satiuæ, Erysimum Gesneri. *Miror* si nota fuerit vulgaris cur non demonstrant discrimen in colore floris insigne: tribunt enim Hispanicæ colorem luteum: nec video cur in Obs. posita huius Erucæ figura ex Matthiolo desumpta sub titulo Sinapi satiuæ Erucæ aut Rapi folio, Adu. pag. 67. Hisp. Mostaza. Figura posita pro Erucæ satiuæ demonstrat nostram vulgarem: apud Gesnerum per Erysimum, intelligo Erucam perennem flore luteo culcam. Plant. Icon. satiuæ Lob. 101. Teut. 241. Apud Plantinum p. 202. est etiam alia figura ex Matthiolo malè posita pro Sinapi satiuo Erucæ aut Rapi folio Lobel. 100. Teut. 241.

Hist. Lugd. Erucæ satiuæ. Similem figuram Erucæ habet Hist. Lugd. sub titulo Sinapi Hortensis.

Nec placet Gerardum iconem alterius plantæ assumere ex Tabern. pro Erucæ satiuæ.

Cccc



Nomina
linguarum.

C. Bauh. phyt. Eruca. Eruca latifolia alba sativa Diosc. Idem apud Matth. Eruca Cordo Dioscor. Celsalpino Eruca. Cordus olim apud Diosc. per Erucam intelligere videbatur Sinapi album, quemadmodum etiam vult ibidem Gesnerus.

Erucum Græcis: Eruca Romanis: **Ægyptiis** **Erbreice**: Afri **Afris** nominatur: Arab. **leigir**, **Ergir**, seu **gargir**: Germ. **Käufchen**, Belg. **Kochet**, **Käsette**, Gall. **Rquette**, Ital. **Rochetta** & **Rocella**: Hisp. **Oruga** & **Oruga**. Hæc autem nostras Germ. **Groß Käufchen**: Tingo **groß senff**, Belg. **Noosmische** **Nederen**: Angl. **Cicat** **Nodet**. Boh. **Ey-lir** **horeice**.

Erucum dictum voluit, quod iura commendet, habeatque peculiarem in eis gratiam: quod dixit Plautus, in conchendis oblonis tanta est Eruca suauitas, ut Græci **Erucum** appellauerint: Erucam verò, quod erodat: nam si degustaueris, bis & linguam satis acriter vellicabit: Alii sic appellatam putant, quod vrendi licentiam nanciscatur, quasi dicas Virucam, uti eversa litera. Est etiam Eruca apud Latinos bestiola, quæ Græcis Campe dicitur. **Weiß senff** vocant nostri (ait Cornar.) quasi dicas Sinapi album, eod quod silu. maximè Eruca semine, Hispani pro Sinapi vtantur. Quibus emconis Poëta hæc adornant, infra de viribus patebit. Theophr. meminit Erucam satiuam celerrimè prouenire, Columella:

Itemque Eruca salax secundo prouenit horro.

Plinius **Æstate** & **Hyeme** facillimè nasci, frigorum præcipuè contemptum esse.

Erucam maiorem satiuam vidi Monspessuli, Lugduni, Basileæ, & Genevæ in hortis florentem Nouembri, & tota hyeme virentem. Mont. belgardi in orto E.C. vbi à me facta ex semine decido se renouat. Veronæ, florentem Martio obseruavi. Nemausi studiosè colli à quibusdam obseruauit Gener I. Henr. Cherlerus, qui memores (vt illimet referunt) versus illius:

Excusat ad Venerem, tardus Eruca maritior.

Vires.

Cruda Eruca, vt scribit Diosc. coitum largiore cibo concitat: ac ipsius quoque semen eiusdem est effectus. Vinas mouet, concoctionem iuuat, aluòque est accommodata. Semine in condiendis oblonis vtuntur: quod vt diutius perennet, aceto lacteue subactum in pastillos digerunt, atque ita reponunt. Erucæ facultatem & vsum medicum, Plinius explicat his verbis. Diuersa est quàm Lactuca natura, conciliatrix Veneris: idcirco iungitur illi serè in cibis, vt nimio frigori par feruor immixtus temperamentum æquet. Et alio in loco. Erucæ semen Scorpionum venenis & muris aranei medetur. Bestiolas omnes innascentes corpori ardet, Vita cutis in facie cum mellesillum: lentigines ex aceto. Citatrices nigras reducit ad candorem cum felle bubulo. Atunt verbera subituris potum in cibo, duntiam quandam contra sensum inducere. Putant subtrita Erucæ si fricentur oculi, claritatem restituere. Tussim infantium sedari. Radix eius in aqua decocta fracta ossa extrahit: Tria folia siluestus Erucæ sinistra manu decerpta, & trita in aqua multa si bibantur, regio morbo medentur. Galenus quoque scribit hoc olus manifestissimè calcæcere: quare solum ipsum mandere, nisi Lactucæ foliis misceatur, non esse facile. Semen autem generare, & coëundi appetentiam excitare. Capiti etiam dolorem inferre, præsertim si quis ipso solo vescatur. Non solum autem supradictorum, anthorum, sed Poetarum etiam testimonio Erucæ stimulantæ Veneri rata videtur. Martialis.

Renouans
Venerem

Et Venerem renouans Eruca nigræ tantum.

Columella:

*Et quæ frugifero seritur vicina Priape,
Exiit et Veneri et nos Eruca maritior.*
Salacem Ouid. us nominant:

Nec minus Erucas inbeo vitare salaces
Item Lant. Lyppius 2.

Denorat Erucas qui cupit esse salax.

Folius, vt author est Matthiolus, coctis additòque Saccharo, tussibus pueris propinatur tussicolum, quod tussim sedat, semen contusum ex vino potum, lumbricos interimit, tumentem lienem minuit. Folia contusa palpebris imposita, visum acuant: semen cum melle mistum, maculas omnes & xuos faciei illitu tollit, efficacius verò addito felle vaccino aut bouino. Ossium fragmenta extrahit radix in aqua decocta & imposita. Ergo præfero folia radici quicquid scribat Matthiolus. Sunt qui pro certo, inquit Camerarius, afferant multos se annos ab apoplexia & eiusmodi affectibus immunes præstitisse puluere ex Erucæ & Cymini partibus æqualibus.

ERVCA ROMANA SEV GENTILIS SILI.
quæ angustâ, folio lato.

NOrimberga à Domino Doldio pro Erucâ Romana seu gentili quorundam accepi hæc:



bam nostræ Erucæ, flore albo similem, foliis lauis, caulis hirsutis, siliqua diuersæ admodum, sunt enim tenues valdè & longæ, flores in sicca albicant. De ea scribit Doldius: Est & Eruca alia ab Anglicana in orto Camerarii, latiore folio rugosiorque, Verbenæ lupinæ quoad inferiora similior, sed floribus albis, annua, quam Roma-

nam vocant, an sit dubito: facerem hanc eandem cum Hispanica Lobelii si siliquæ non impedirent.

ERVCA SATIVA HISPANICA MAIOR
flore luteo.

SAtius duæ cibus gratiores & nobiliores: Maior Hispanica vocata, à nostratū maioribus foliis Silymbrii & semine nigro, floribus luteis, corniculo Sinapi maiore distat: hæc quia in condimentis lautior, vel ad Venerem vegetior erat, Gentilis vulgò vocata fuit: quo vocabulo Hispanica & Itala gens designat quamlibet rem aptam reddere hominem latum. Monachi in Magalon insula maris Narbonensis, huius Gentilis Erucæ semine à Fratre quodam Hispano donati, quotannis hocce ferebant & in mensis cuiuslibet vel maximo gulæ irritamento vel blandimento præ-

Defertur

ferabant. Non eget vtriusvis fufioris descriptionis, quum vulgaris fit notiffima, & ex illa facillime percipiat Hispanica, Lobelius.

Lobel. & Pena Adu. Eruca maior fuit Hispanica & Gentilis. Miror non demonftrari difcrimen infigne in floribus: qui vulgari non lutei, feminum etiam color diuerfus: eandem hanc facerem Erucam cum Romana defcripta fi filiquæ non impedirent: Monfpelienfes Monachi hanc non habebant in hortis, quod animaduertim: fed vulgarem præcedentem flore albo ftriatam.

Magalonæ in monafterio noftro tempore, inquit Lobelius, fupererat copiofiffima Eruca.

ERVCA ANGLICA FOLIIS LATIS, FLO- ribus minus luteis filiquis ftriatiff.

Eruca Anglica foliis latis, fimilibus Verbenacæ vulgò dictæ, fed latius virentibus: floribus minutis luteis & parum relinquentibus poft fe femina ftriatiffimis filiquis, Camerarius.

Camer. hort. Eruca tertia Anglica.

C. Bauh. phyt. Eruca 2. f. luteifolia Anglica.

ERVCA TENNIFOLIA PERENNIS flore luteo.



Sylvestris E.

Eruca radice alba, craffa, latis longa, ex qua multi procedunt caules, crebris alis. coccæu, ftriat, parum hirsuti: folia crebris incisuris Dentis Leonis, aut argutioribus hieracii minoris diuifa, alijs Nasturtii, cuius etiam folia colore atroviorente & glabro imitantur, sapore feruido Satuariæ: cum & flores.

fed colore præditi luteo, serie fimili difpofitos gerit odoratos: filiquis fuccedentibus longis, angulosis.

Icon nofta quæ ex Fuchfio, in quibufdam non placet: & multò minus Lobelii & Camerarii Erucæ fylvestris quæ videtur potius conuenire cum Eruca nofta inodora.

Diofc. *ἡ ἑρκεὶς ὕλη* [Erucam filu.] nominat, dicitque maxime in Iberia, quæ Occidentem fpectet, nafci. Sed de filu. Eruca tam ex Diofc. quam ex Plinio vide plura inter vires.

Fuchf. Hift. Eruca hortenfis (feu fatua): In Iconibus vocat etiam Erucam fatuam Camer. weiff. fer fenff.

Dodon. Eruca fatua & hortenfis. Belgicè Wilde Rofene. Lat. in fol. Eruca filu. Eruca fuit Rucula marina minor, ficut rauchen. Sinapi nonum.

Matth. (qui figuram folam sine descriptione proponit.) Camer. in eisdem Epit. Lob. & Penæ Adu. Obf. Ic. Plant. Teut. p. 144. & Læcæne, Eruca fylvestris.

Anguill. Eruca in Italia Rucula & Ruchetta.

Gefner. hort. Eruca flore luteo, Eryfimon hortense puto. Sylueftris Eruca ab hoc Eryfimo genere differre non videtur, Eruca fylvestris Carolo Stephano. Item in cat. plant. Eryfimum, apud Italos Nobilis Eruca: *ἡ ἑρκεὶς* Eruca generatiua.

Hift. Lugd. Eruca filu. Et alibi Eryfimum verum. Lugd. Hift. duas figuras vnius herbæ mihi videtur habere, prior cil. ex Matthiolo sine descriptione, altera est noua.

Crafp. Eruca altera frugicofa.

Lonic. Weffer fenff. Sinapi aquaticum. Figura quæ apud Lonicerum est, conuenit cum Trag. Eruca, verum non nouum Loniceri sine iudicio de plantis ferbere.

Tabern. Icon. & Hift. Eruca filu. Wilde Rucula fenff. Wilder Weffer fenff. Si Compilator intellexit vulgò dictam Erucam filu. vt omnia indicare videntur, indistinctè dicit fux priori valdè similem nulla facta coloris mentione, in primo enim dixit coloris esse albi, vulgaris autem est lutei: figura præterea non placet, quæ potius conuenit Erucæ nostræ inodoræ.

Gerard. Iconem habet Tabern. dicens, Eruca filu. flore luteo.

C. Bauh. Phyt. Eruca 2. f. flore luteo maior

filu. an Diofcor. fylvestris? Item apud Marth. Eruca maior fylvestris Matthioli, Eruca filu. Cur Erucam Tragi minorem fuit eius Sinapi nonum ab hac feperet & ponat nono loco sub Sinapi Bursæ folio, nescio. Non placet cum affumpisse figuram Tabernamontini.

Eruca tenui folia perennis flore luteo, fuit fylvestris Græcè *ἡ ἑρκεὶς ὕλη*, Germ. Wild fenff. wilde rauchen, ficut rauchen. Wilde Rofene. Gall. petite Roquette & Roquette sauvage. Ital. Ruchetta gentile & Rucula fatuatica. Filp. Oruga filu. Angl. Wilde Roet.

Paffim prouenit circa muros & in muris ac rudibus, flores Genevæ adhuc copiofè mense Nouembri: Lugduni & Monfpelluli Martio & Februario. Bafilæ in hortis Iulio & Augufto. Montbelgardi à me facta in hortulo nico, ac etiam in Horto E. C. muros occupauit, in quibus durat, & præterea femine deciduo fe multiplicat, hie: memque patitur, floret Iulio & Augufto.

Sylvestris Eruca femine tradit Diofcor. Iberiæ incolæ, maxime qui Occidentem fpectent, pro Sinapi vti, Elle potè, quàm fatua, ad mouendum vrinam efficacior, & multò acrior, quod facile crediderim, fi quidem feruido magis est fapore. Sed hie contra mentem Diofcoridis sentire videtur Matth. vt qui omnia ea, quæ de fatua, fuit priore Eruca à nobis tradita funt, efficacius præftare fcripferit. Magis, inquit, excaffacit, ficcæ, at: enuat, aperit, incidit, extrahit, extergit, prouocat, quàm fatua, valentius tamen. Coctæ & deuorata infantium tuffi medetur, addito faccharo. Proditum adhæc tria filu. Erucæ folia, fi nifta manu decerpta, illicoque deuorata, auriginolos fanguis, quo nolim vti remedio, quia fupercilicofum & vanum exiftimo.

ERVCA SYLV. ANGVSTIFOLIA flore luteo.

Promit inflexis cubitalibus cauliculis flores luteos Erucæ fylvestris. Cornicula filiquarum Sinapi funt aut Nasturtii fylvestris, vbi femina acce, vti folia angustiora, Erucæ fylvestris conco-

CCCC A



Eruca siluestris angustifolia.

ERVCA MINIMO FLORE
Montspel.

ERVCA INODORA.

Descriptio



loria, sed minimè diuisa, Tarconis ferè paria, quæ Erucam aut Taconem sapiunt, quibus idcirco affinis naturâ putatur. In horto Coldembergii nostri (inquit Lobel. Obs.) non vulgaris peritæ viri oritur.

Lobel. Obs. & Icon. Pl. Eruca silv. angustifolia.

C. Bauhin. Phyt. Eruca 14: siue angustifolia.

Hist. Lugd.

lidi, quatuor foliis constant: *siliquis*, vncias duas longæ graciles. Nullum ego in hac plantâ siue odorem siue saporem insignem animaduerti.

Tabern. hist. & Icon. Eruca silv. Wild. Rauschen; wilder weisser senff. Figura Tabern. exprimit nostram Erucam inodoram, sed descriptio Tabern. & nomina cætera non conueniunt nostræ Erucæ inodora. Sed hoc non nouum Compilatori figuras non ponere suis locis, quanquam icon etiam Lobelii & Camerarii pro Eruca siluestri posita, hanc nobis melius exprimere videntur quam Erucam siluestem ab iis traditam.

Erucam inodoram voco herbam à me repertam florentem Iulio in terra argillosa vitium quæ sunt vltra Rhenum ad Burckheim generosâ Baronis à Schvvende, vno milliari ab vrbe Brilsaco.

Eryfimo similis herba S. Alberti.

Herba Sancti Alberti (infit Cæsalp. c. 65. libri 8.) vulgò appellatur quadam Irione similis: caule striato, recto, cubitali, altiorique: foliis magnis laciniatis, læuib: *sifoculis* luteis, in summis ramulis rectis: *siliquis* fert grandiores, ac firmas: in quibus *semen* simile prædictis: eo vtuntur ad fistulas:

C. Bauh. Phyt. Eryfimum 4. siue Eryfimo similis, læuis, laciniata, floribus luteis, Herba S. Alberti Cæsalp. Cæsalpini descriptio videtur conuenire in multis cum nostra Eruca inodora, eandem tamen asserere non auiam.

Eruca Vrbeuetana floribus albis, siliquis hirsutis.

Foliis donatur maioris Erucæ, sed hirsutis: caulibus dodrantalibus: floribus albis: siliquis Rapi similibus, hirsutis: tota planta à tertio genere Sinapis (Sinapi albo) distat solum paruitate, & florum albedine, Cæsalp.

Genus hoc Erucæ, inquit noster autor, spontè nascitur in parietibus, & rudicibus, frequens in agro Vrbeuetano.

IRIO, SIVE ERYSIMVM

Vetenbus.

C A P. XI.

DE Eryfimo [quod aliqui Chamæplion, Magi Herculis Alphita, h.e. polentam, Egyptii Earethmu, Romani Irionem vocant] Diosc. licet satis clare scribat, dicatque hoc esse foliis Erucæ syluestris: cauliculis in lori modum sequacibus, & flexilibus, floribus luteis, siliquis in cacumine corniculorum figura & gracilibus, vt Fænogracæ, quibus exigua concludantur semina, Naturæ similia, feruidoque gustu. Attamen Plinius Eryfimum, herbam iamiam à Dioscor. descriptam, & inter plantas acres ab eodem recensitam, folio Erucæ siluestris, cum Irione, quam à Græcis Eryfimon vocari dicit, & Theophrastus inter legumina connumerat, & Sesamo similem facit, Taconemque Gaza vertit, admodum inconsideratè confundit. Irionem, inquit, inter fruges Sesamæ similem esse diximus & à Græcis Eryfimon vocari. Galli Velarum [vetus codex Cornu Vellum habet.] appellat. Et addit: Est autem fruticulosus, foliis Erucæ angustioribus paulò, semine Nasturtii.

Quia

Quia potro, Galenus quoque & inter simpli-
cia Iriosis semina facultate feruida ac calida Na-
sturtio acrimonia & igha facultate praedito com-
parat: & inter alimenta Iriosem corporis essentia
ferè eundem generis cum Sefamo esse dicit, sed
esui candiorem, minus etiam alimenti corpori
præbere, & omnino deteriorem esse: Perspicuum
fit, hæc Eryfima inter se multum differre, etsi Plin-
nius ea non distinxisse, sed pro eadem planta ac-
cepisse, videatur, quamvis idem medicamentis an-
numerandum potius, quam frugibus lib. 22. con-
ter dat.

Eruca silvestris angustifolia Lobelii, v. apud
Hist. Lugd. videre est, Lugdunensibus Erysimum
verum videtur, sed malè. Est & suum Erysimon
cum aliis Trigo, quod Verbenam feminatam vocat.
Hermolaus & Ruellius silvestrem illam E-
rucam, quam Nobilem vocant Itali, Erysimum
esse dicere: quorum sententiam Matthiolus im-
probat, & duo alia Erysimi genera, attamen fal-
sa, proposuit. Priori notas ferè omnes à Dio-
scoride traditas competere putat. Alterum,
cui folia sunt minora, cornicula paulò vegetiora,
magis genuinum esse censet. At Matthiolus re-
preherdant Pena & Lobelius, quod Rapistum
vulgò à Rapi sapore & aliqua foliorum similitu-
dine sic dictum, loco Erysimi prioris accepit,
quod neque Dioscoridis Erysimò respondet, ne-
que cum Mattholi Eruca silvestris foliis simili-
tudinem habet. Tù odor, &apor rapi non aded
ut in Erysimò acris reclamant: præterea Erysimi
vires, de quibus mox dicemus. Est & Erysimum
Theophrasti quorundam, quod nos Fagottiti
cum lib. 23. i. scilicet.

Erysimon Græcis dicitur, quod Lat. Erysimum &
Irio, German. heddy, seider senff, Belg. witte
Mostaert. Gall. V. clarde de Latorrelle, Ital. Iriosa.
Hisp. Kinchaon, Hung. Besereu fii, hoc est, ama-
ra herba.

Erysimon quidem àmò nòd epetem, id est à multi-
plici foliorum sectione: nam Eruca modo laci-
niata conspiciuntur. Alii ab oleris præstantia di-
ctum volunt, quasi epetem, quod est pretiosum &
notabile. Nonnulli àmò nòd epetem, quod ob suam
caliditatem maxima trahendi facultate praeditum
sit. Iriosem autem Latini ab irruendo nuncupar-
unt, quod ignea vi & feruido sapore irruat in
gustum.

Erysimum circa vrbes, domorum areas, autho-
re Diosc. hortis que nascitur. Erysimi femina si-
cum melle delingantur, tradente eodem, contra
thoracis fluxiones, purulentas excreationes ac-
ruses, morbum regium, & ischiadem, efficacia
sunt. Bibitur & semen contra venena. Ex aqua
verò aut melle illitum, prodest carcinomatis oc-
cultis, duritiis, parotidibus, ac testium mamma-
rumque inflammationibus. In summa attenuat
& calcificat. Cæterùm ad elegmata redditur mi-
tus & accommodatus, si aqua maceratum tor-
reatur, aut linteo illigatum subactaque farina
oblitum massetur.

De Erysimi viribus Galenus sic scribit. Erysimi
semen sicut gustu Nasturtio apparet simile, ita fa-
cultate igneum est & calcificans. Porro ybi in ec-
legmate vi ex usu est, præstat aqua maceratum
refrigerare, aut linteolo inuolutum, & crusta pi-
storia circumlitum torrere. Vile est cum ecleg-
mate ad promouendas crassorum lentorumque
peccoris pulmonisque humorum exspuiones.
Quin & parotidas induritas, & duritias an-
quas vberum & testiculorum iuuat. Refert Dio-
scorides quod cum aqua & melle cataplasmat

modo illitum oculis prodest cæcitis. Eadem tra-
didit Plinius, & præter ea quædam alia habet. E-
rysimum vtilissimum tussientibus cum melle, &
in thoracis purulentis excreationibus. Datur &
regio morbo, & lumborum vitis, pleuritidis, tor-
minibus, coliciis. Illinitur verò parotidibus &
carcinomatibus malis. Testium ardoribus ex aqua,
aliàs cum melle. Infantibus quoque vtilissimum.
Item sedis vitis & articularis morbis cum melle
& fico. Contra venena etiam efficax potum me-
detur, & suspensio: item fistulis cum axungia ve-
tere, ita ne intrus addatur.

ERYSIMVM TRAGI, FLOSCVLIS LV- TEIS IUXTA MUROS PROVENIENS.

Radix minimi digiti est crassitudine, lignosa; Descriptio
alba, acis, & Rapæ sapore: caulis tubercu-
lis, hirsutus, seliquis cubitum altus, foliorum ortu al-
tèro stipatus, quorum forma ad Eruca aut Bur-
sas accedit: sunt enim altè si-
nuata, hirsuta, & Burse foliis
non paulò ma-
iora, sapore ole-
ræco: stipes
pulsilli, luteoli,
quatuor lobulis
constat: sicut
in silicis lon-
gis atque re-
ctis continetur
puillum, ferui-
dum.



Cordo in
Diosc. Epetem & Erysimum.
Irio Germanis
schneid senff, a-
bas schneid senff,
stein senff, & uo-
perus, luo, qui
à Dioscoride

hoc loco describitur & femina Verbenæ etiam,
verum, ut ait, magno errore. Nam Irio. Sinapi co-
gnata est herba.

Tragus Germ. Eysenfraut das weiblin/ das
Sibent senffraut. Et quidem non placet nomen
Eysenfraut, existimatur enim esse Dioscor. & Sera-
pionis Erysimon aut Iriosem. Quare conside-
randum proponit, an non Iriose melius conue-
niat quam Verbenæ lupina.

Fuchius præsentem hanc nostram plantam Verbenæ
exhibet titulo Verbenæ rectæ sine Maus, quam Verbenæ
in contextu alio nomine Crisam Galli vocari recta
scilicet. Eysenfraut das mennle. Item Sinapis al-
terum genus sylu. Grosse wilder senff.

Dodon. Gall. Erysimon Dioscoridis & non
Theophrasti, Latine Irio, quibuldam xaudis.

Lonic. Eysenfraut weiblin/ numeratum inter
Sinapi genera: Lat. Verbenæ femina. Item Irio & Verbenæ
Erysimon.

Gesner. hort. Erysimum Tragi vel Dodonæ,
Verbenæ femina non rectè dicta à quibuldam
cum Sinapis sylvestris potius genus sit.

Brunfels. Verbenæ femina. Hierobotanæ fem-
mina.

Math. passim in com. Erysimon, Irio. Et hist.
Germ. Irio, i. Seiderich. Fuchium aperte errasse
existimat, qui Verbenæ rectæ florem luteum tri-
buit: Errorum autem Fuchii Brunfelsium forte probat.

Erigeron.
Senecio

March Lap-
sus Garj
Icon compo-
sitæ ex dua-
bus planiss

Specie

Mark. 1000.

Marble Tris

Locus &
tempus.

Viter.

fecuti facile deprehendi posse putat, quod in suis
com.pl. primò editis pro Verbenaca femina eam
plantam depinxit, quæ à Diof. cæterique an-
tiquis Scriptioribus Erigeron siue Senecio nun-
cupatur, tametsi mutata sententia lib. de comp.
med. Verbenacam perperam Sinapi altæram speciem
esse contendat. *Matthiæ* suo more ptopo-
dit figuram plantæ sibi incognitæ, quam puto
tompositam ex duabus plantis: priora folia &
flores videntur facti ad Rapistrum, hinc sit vt *Ca-*
mer. proponat pro eo iconem Fuchianam, quæ
Rapistrum flore luteo: nomen Germ. *Eberich* eam
etiam plantam notat: verùm siliquæ non conue-
niant quæ *Erysimi* Tragi videntur: interea egre-
gius Commentator eam figuram proposuit hinc
deceptione, in com. ann. 1559. & ann. 1581. quæ
verò dixit in comm. Ital. com. mag. fig. & in hist.
Germ. quadrat *Erysimi* Tragi, cuius figuram *G.*
Bauhini appo'suit *Matthioli*, [ea in parte mul-
tùm diffidens à *Cameratii* sententia.] Non vi-
deo quomodo Verbi: na flore luteo *Brunfelsii*
& *Fuchii* possit esse *Senecio* siue *Erigeron*; vt vult
Matthiolus, ego mihi persuado [quod ei con-
suetum] nō intellexit quid scriberet.

Lob. & Pena Aduerf. Irio fite Erythimum Dio-
 scor. Angl. *Callosa Medocoe*. Hic dicit esse Irio-
 nem quem Medici docti nōs & experientis
 commendat his verbis : Dum postremò in Iri-
 nis commentabatur Senensis Dictator, aurga-
 batur non defuturo canes [sic] se doctores foli-
 tus nuncupat] qui se suæ impetitiæ allatrarent;
 Vt nam habuisset ille canes similes non ad la-
 trandum, sed veltigandum Erythimum, quod vel
 Pharmacopœorum Montpellierensium lixe pos-
 sint illi hodie in titulis & rudibus passim indi-
 care: est enim ibi doctus & indoctus vsu fre-
 quentiss. ita multiplici & felici successu notissi-
 mus, sed in Anglia non item, quāuis non mi-
 nits obuia. Nam ne Medicis quidem aut Pharma-
 copœis peritiōribus certum ita, quænam sit Irio:
 hoc factum, aut quia in vsu Medicinæ nondum
 fuit hic deductus, aut quia à Mathiolo, cuius
 commentaria plerique sunt veluti Sybille folia,
 Rapissimum vulgè à sapore Rapæ, & nonnulla folio-
 rum similitudine loco Iriosis acceptum.

Tabernaicon. & hillor. Erysimum, Irio 1. weg
senff/ bederch.

Gerard. Elytimum Dioſcor. Lobeli, Bauſen
Greffie.

C. Bauh. phyt. Erysimum i. siue Irio vulgatum.
Item apud Matthiolum. Itonis nomine Matthio-
lum Rapistrum proponere, sunt qui statuunt, veri-
tatem ex verbis, a ex secunda editione adici-
mus, colligere est eum intellexisse id quod vo-
catus i. Erysimum, siue Irio, vulgatum: Irio La-
tinez, Castori, Catalp. [Lacune etiam Eruca la-
x.]

Erysimum Tragi obseruavi Geneuæ cum flore
menſe Maio: Monipeli, Lugduni, Baſileæ, Mont-
belgar di paſſim & circa cancellarium in caſtello.
in compitis, ſepulchretis, & ruinofis, vt Aduerſ.
perhibent, locis frequens, multas Galliarum regionibus
notiſſimum, ſed in Anglia non item quamuis
non minus obuium.

Lobel. & Rena, tantas attribuunt ei dotes, quæ
affluantius & largius pluri nomum, vocæ rauri
etiam diuturnæ & propè inuictæ, sunt ad præ-
senti præsidio, ut si semel ferme superent. Est enim
iniquum, moderata quædam tenuis subfilaritas
& incidentis, cum humidis abstergentibus par-
tibus, permixtio, cuius beneficio crassæ pituitæ ci-
tæ exsiccationem nimiam inciduntur, & incil-

propter flatum nonnulli commixtum non magno conati expectorant & alitergunt: arteriacum igitur est laudatissimum, nempe vnum & idem preparans & eductens: exempla succurrunt quamplurima, quæ secundis tum præceptoribus, tum nobis postea successerunt. Phosphate methini tum iuvenes, tum ætatis provec-tæ, quibus ferme iam amissa vox & spiritus, limpida forsorquæ vox paucis diebus restituta fuit. Vno Erylimo & opera eximii præceptoris Rondeletii, qui primus vsum monuit. *Syr. de Eryli-mo efficacissimus:* cuius beneficio iuvencale decenno raucedine laborantes, percurat. *℞. Erylimi totius rectis M. 6. Radicum Helenii, Tussilaginis succo adhuc perstantium, glycyrrhizæ an. vnc. ii. Borraginis, Cichorii Capillorum Veneris an. M. i. siflorum cordialium, Anthos, Stoechadis vel Betonicæ an. M. s. anisi ꝑij, passularum mundatarum ꝑij. incisis & contusis fiat omnium decoctio ex aëre in sufficienti quantitate bordei, hydromethos, & ꝑij. succi Ictoms, ad lib. duas vel tres: expressio-ni dissilue Sacchari q. d. fiat Syrupus: quo diu & continuè vtendum purgato corpore.*

ERYSIMON ALTERVM MATTHIOLI SI-
liquis paruis quibusdam Den-
taria.



LEntas cubitoque longiores tortuosas virgas prociunt: filia inferiora quidem Inonis Tragifolii aliqua modo similia, protendunt ad nectum usque propemodum dissoluta: reliqua vero, quae per ramos crebra, leuiter laciniosa, vincta pilis minus longa: ex quorum alis siccis luteis emicant quibus elapsis

fuccrefcunt *filiqua* crebra, modice in arcum curva-
ta, femenciâ longiores, plures ex eodem pun-
ctoonundâ, bifores: *femen* continentes copiofum,
perparvum, ruffum: *radix* alba lignefcit, paucis
fibris dotata.

Pictor & Sculptor non bene imitati sunt Ico-
nem quam imitandam proposueramus.

Matth. in Diof. Irio alter, huc Erysimum aliud omnibus Iriionis notis præditum. In Hist. Germ. Irio 2. *Ederich*, qui ipsi videtur melius convenire cum descriptione Iriionis. Sed Iriionem hunc, si bene notus fuisset Matthiolo, meo iudicio descripsisset.

Camer. ad Matth. Germ. scribit abundare pro:
pè mure Venetorum; existimasseque primò An-
guillaram Iricnem esse Veterum. Gesner. hort.
Detentaria alia (Irio quibusdam seu Erysimum pu-
tata) in Italia sic dicta, quod siliquulas ferè den-
tibus similes toto caule emittat. Ap. Angull. Erysi-
mum siue Irio.

Matthioli

Matthioli æquanimitas, aiunt Aduersaria quasi lux imbecillitatis conscia, primo suo Irioni subdidit alium in postremo auctario, quem potiorum primo putat, quia folia minora, & cornicula paulo vegetiora sint, ut ex iconibus, inquit Commentator, patet. Sic nos audios discendi huius mutatione sententiæ causam aliquā, ut solitus est, in sicco deserit. Quid hic folia minora, & cornicula vegetiora agant nescimus: ut ut sit nos benigne omnia interpretamur, nempe tantum Virum [vt constantis animi opinionem, quam de se doctis viris suis Commentariis excitauit, retineat & foueret] noluisse quicquam demere, aut demendum esse suspicionem dare, sed humano more & prudentiā tacite meliora, quæ à meliore tām suo, tum aliorum iudicio profecta essent, deterioribus subdere, quasque vniuersum opus de integro recoquere: Magni Ciceronis exemplo, qui se dedit recoquendum Moloni Rhodio oratori. Hac Aduers. ex quibus apparet nondum fuisse illis notum illud Erysimum.

Hist. Lugd. Irio altera Matthioli. An eidem præterea Saxifraga aurea Lobelii. Cæsalp. Irionis species tertia parua.

C. Bauh. Erysimum, siue plurima cornicula munda habens. Apud Matth. Erysimum 2. siue plurimis corniculis iunctis. Videtur H. Lugd. Saxifragæ Romanæ nomine proponere.

Inonem Dr. Cortusio dictum vidi in horto Di. Gesneri, qui dicebat ab Italibus vocari Dentelariam. Geneuæ & Montbelgardii habui in horto: fortè Dentelaria dicta eo modo quo Dens Leonis, à foliis, cui similia vel Bursæ pastoris, aut Cichorio siluestri, ita enim sunt denticulata, maximè prima, sed multò minora, Floret & semen profert Iunio & Iulio. Frater C. Bauhinus habuit Basileæ in horto patris. D. Cortulus misit mihi semen quod in Horto E. C. satum hanc habebat inscriptionem: Irio seu Erysimum. Gener Io. Henr. Cherlerus asserit crelere circa Montspeliū copiosè.

DELPHINIUM MINVS CÆSALP. FLORE albo, filiquis longissimis.

Caulis simpliciter constat [inquit Cæsalp. lib. 8. cap. 67.] ultra dodrantem; in quo folia usque ad medium sine pediculo hærentia, non lacinata, ut reliquis, sed tantum in ambitu serrata, dorso incuruo, ut Delphinium ob id dici possit, subhirsuta: in cacumine stoculi insunt candidi, & filiquæ longissimæ, numerosæ, rectæ, tennes: in quibus minuta semina: oritur in asperis, sed tamen riguis. Idem lib. 6. in fine c. 59. Parua planta, foliis Delphini effigie, curuo dorso. Fortè mihi Delphinium inter affines Irioni descriptum.

ERVCA PVRPVREA, ALIIS CERVLEA, siue viola Petrea.

Radicis mittitur Eruca cærulea mihi dicta recta, palmari, alba vel subrubra, tenui, subacti, fibris aliquot capillata, matrice lignosa: folia per terram spargit plurima oblonga, hirsuta, Bursæ pastoris diuisura profundà, crebrà, sapore oleraceo quodammodo, colore viridi, aliquando inferna parte rubente: caules modò singularis, modò terni, quaterni, seni & plures, palmum nonnunquam superantes, interdum capitales, hirsuti, striati, propter humum

purpurantes; supernè virentes; cœcaui, brachiati: in quibus ex intervalis folia, infimis a-



lis breviora, latitudine iis parum cedentia nec tam altè ut plurimum lacinata: flores ex ramorum lateribus & summo fastigio alternò sicut multi insident pediculis semuncialis tenuibus. tantillâ language obstitis, odorati suauiter, cærulei aut purpurei, vel purpureo-violacei, albive, suauolentes, quaternis foliolis latiusculis con-

stites, staminula lutea cū stilo continentes: quib. decidentib. suboriuntur filiquæ oblongæ, glabræ, in quibus semen minutum, acre. Variat hæc ætatis ratione, nec non loci, prout lato solo surgit, vel squallido & sabuloso nascitur, ac sæpè iidem in muris modò maior modò minor, foliis valde varians. A plurimis annis hanc plantam Erucam denominauimus purpuream, propter aliquam similitudinem foliorum cum Eruca, & quia in muris primò inueneramus. Inter plantas ficas Do-

Viola po-

mini Agerii comperi dici Violam Petream Domestica Hardero.

C. Bauh. Phyt. Eruca 6. siue palustris cærulea maior & minor. Apud Matth. Eruca tertia siue cærulea.

Observauimus hanc Erucam vernò tempore, vi Martio, florentem in muris circa templum & Castellum Bessfordiense, item Bessanti in muris. Item circa S. Susanam pagum III. mei Principis circa rupes. Septembri florentem vidi Bessfordiæ, & Claravallis muris: In l'isse abundat in Vineis, in Sancti Hippoliti oppidi muris. Frater C. Bauhinus misit repertam Basileæ propè S. Iacobum atque Münchseia. Vidi etiam flore rubescens & albo.

VELLA ERUCE FOLIIS FLORE violaceo.

Ignota hodie Vella, quæ in lib. simpl. med. ad Paterniacum Galeno attributo sequentibus describitur: Vella herba est foliis quidem minor, quàm Eruca, sed non dissimilis, flore violaceo: semen habet velut in folliculis oblongis, ordinis stipati, prout Nasturtii: & gustu calefactoria est; submordens, & viribus relaxans, vnde ad tussim veterem, & ad regium morbum cum melle optimè facit. Ex his autem manifestum sit hanc nec Plinii Gallorum Velarum (aut Velam, ut vetus Cornarii codex habet) quod Irionem inter fruges & quidem Sesamæ, similem esse, ac à Græcis Erysimon vocari dixit, esse posse. Nec (quod Nasturtium aquaticum Anguil. vult.) Sisymbrium secundum à Fuchio pectum. Vella sequidem fl-

viola

re violaceo esse dicitur. Irio autem flore luteo, ut & Nasturtium aquaticum albo. Nec, quam Vellæ Galeni Guilandino aliquando nomine exhibuit nobis Frater C. Bauhinus. Hæc enim nobis videtur Sisymbrium Cardamines species quædam insipida.

Sylvestris
arboris
pauca
species
sunt

SINAPI AGRESTIS FLORE PURPUREO,

Descriptio

Radice firmatur parua, tenui, fibrosa, parum sub terram descendente, albidâ, ex qua folia exeunt Chelidoni maioris incisurâ, distant quod nec succum luteum edunt, nec casia, sed viridia, sunt, aspera hincque obsita, atque extremum folium non retusum, ut Chelidonium, sed acutum habent, atque mucosa sunt: caulis angulosus est atque alis multis diuiditur: flores edit purpureos, umbellatos, ferè quatuor foliis constructos, Chelidonio parvis: siliquas postea alicratim, frequentes, que hærentes, rectas, quarum extremitates partem versus tendunt, quibus spica confici videtur siliquarum duorum digitorum, quæ cum exiccari incipiunt, flauescunt, atque vento flante, vel aliquo illas tangente, disrumpuntur ab imo, atque semina isculantur flaua Cardaminæ modo: parua, gustu acri: sicuti etiam folia.

Locus

Tempus.



Fab. Columna. Floret Martio, & Aprili mense perficitur: nisi diligens sit cultor, huius semina non colliget.

ERVCA QVIBVSDAM SILVESTRIS REPENS flosculo purpureo luteo.

Descriptio

Sithamam vnam aut duas altos habet caules, striatos: modicè pertusos interdum rubentes: quibus folia adnascuntur Nasturtio vel Erucæ parua, confusimiliterque crebris diuisuris incisa, latiora in inferioribus partibus, gustu oleraceo, colore atrouirente: flores parui lutei, quadrifolii, acris sapore: quibus succedunt siliquæ cylindricæ, breviores quàm in Erucâ, longiores quàm in Radicula sylu. Dodon. cum qua magnam habet affinitatem: semen continentes minutum. Radix insigniter repens, albet, sapore magis ignauro quàm Raphanus.

Fuchsi. Sin. Sinapi purpureo genus sylu. florent

wilder sciss. In hist. Eruca sylu. In hist. Fuchsi descriptio conuenire videtur, sed figura eo loco



Sinapi sylvestre. Cui Gloissator relicta figura Matthioli aliam proponat valde differentem nescio.

Tabern. Hist. Klein wasser Raufen. Eruca palustris minor. An Taberna intelligat Erucam nostram repentem asserere non auiam, quia Compilator non indicat cuius coloris sit flos: me etiam latet quæ sit eius maior cui tribuit flores albos.

Gerard. Iconem Tabern. ponit pro siluestri Sinapi, unde Mustard, an bene inquirant alij.

C. Bauh. phyt. Eruca 4. siue flore luteo minor sylu. Eruca 5. siue palustris luteo flore: Eruca palustris minor Tabern.

Hæc copiosè prouenit Genevæ en plain palau. Montbelgarci ad ripam fluminis quâ iuxta Courville, & ad pontem, etiam in horto Ill. E. C. pontè, odiosa suo repectu hortulano. Inueni etiam propè Porentium loco arenoso ad fontem mirabilem dictum Crusen, qui veluti è puteo proueniens profundo, ubi interdum parum aquæ, ita interdum siccus effluuit, ut torrentem magni consiliat, qui Porentium fertur, fons visu dignus. Obseruaui Erucam hanc Basileæ, quâ iuxta Neuvhaus, Lugduni in prato Bellecour. Circa Bedfordiam copiosè florens Lulio: Eruca syluest. Fuchsi copiosè proueniens & florens in horto Ill. E. C. Innio 1606 propè hortum arborum perennatum ipontè Stutgardæ.

RADICULA SYLV. SIVE palustris.

Eruca sylvestris aliquatenus similis locis non aquosis prouenienti: pro diuersitate loci multum solis ludit, quædam enim lata & teratantum, caule vnicò, subinde rubente, modò cubitali, modò trecentibitali crasso, in ramos diuiso, maiore quàm Erucæ sylvestris: foliis etiam latioribus, longioribus, quamquam nonnunquam satis tenuiter dissectis, sapore Raphani, sed leniori: flores lutei, minimi, multis numeris minores quàm Erucæ sylvestris, siliquæ itidem breuiiores & crassiores, teretes: radix interdum vnica cum suis fibris. Hæc planta affinis est Sinapi meo aquatico Putauino.

Tabern.

vistrum
maiscum

Tabern.
Icon. & Hist.
Rapiſtrum a-
quaticum.
C. Bauh. in
Phyt. Rapi-
ſtrum 3. Ge-
rard. Rapiſtrū
aquaticum.
Dodon. hanc
depingit & de-
ſcribit: ei dicitur
Raphani ſe-
cunda ſpecies.
Radicula ſyl-
ueſtris, quibuſ-
dam Radicula
paluſtris. Gall.
Raiſort ſauuage,
ou Raiſort
d'au; Germ.

Wilder Käutig. Belg. wilder Radies/ & watter
radies.

us. & Hanc obſeruau florētem Maio Geneuz: Mō-
ap us belgardi in pago Courcelle cum flore Iulio & Au-
guſto: circa pontem Vauiaucourt, nec non in Hor-
to E.C. Aquatica eſt planta. Frater C. Bauhinus
vidit Baſileæ in filiis. Ex ſemine decem multum
ſe propagat.

RAPHANVS AQUATICVS

Tabern.



Raphanus
aquaticus,
waſſer käutig/
Tabern. icon. &
Hiſt. multum di-
fert à Raphano
vulgari ſua radi-
ce rotunda, lon-
ga, incuruā, &
foliis acutis pro-
fundè inciſis. Ra-
phani tamen ge-
neri aſſignatur
propter acrem
ſaporem.

Gerard. Ra-
phanus aquati-
cus, waſſer Ka-
diſch / flore lu-
teo.


Conſideran-
dum quæ planta

hæc, & an ab alio aliquo autore tradita ſub alio
nomine.

ERVCA PALVSTRIS MAIOR

flore albo.

riptio Radice nititur craſſa, lignoſa, aſpera: can-
aliculis donatâ pluribus, magnis, rotun-
dis, mediocriter altis: quibus inſident flores
multi, exigui, candidi, quatuor foliolis con-
ſtantes: his decidentibus ſuccedunt ſiliquula o-
blongæ, tenues: ſemen acris ſaporis includentes:
Tom. II.



folia eius magna,
profundè ſerra-
ta; acumina-
ta.


Tabern. Icon.
& Hiſt. Eruca
paluſtris maior,
Gropi waſſer
käutig.

Gerardus pet-
peram iconem
Tabern. ponit
pro Sinapi ſati-
uò altero.

Gerardus er-
ror.

SINAPI AQUATICVM

Patauinum.



Qvòd in Deſcriptiō
quis &
propter aquas
inuentum Sina-
pi reſerat, ita
indigitauimus:
ſilicet quidem
minutum diſſe-
cta, diuiſurā
Chondryllæ à
Matthiolo ex-
hibita: quæ au-
tem iuxta radi-
cem ſingulariorā
miſcere inſe-
cla ex ſunt, per
ſegmentū
oraſ ſerrata: ra-
dices parui ſerē
digiti craſſitudi-
ne, ſequipalmū
longæ, teneræ,
albæ, paucis ſi-

bris donatæ, ſapore acris & amaro, quo & folia
ſunt prædita.

Talem obſeruau Patauū repetam ad Portā Locū &
Linianam in aqua & iuxta aquam, meſe Februa- Tempus
rio: eius caules, ni multum ſallor, attulit poſtea Fr.
C. Bauh. nomine Sifymbrii aquatici D. Cortulo
cauos, in varios ramos diuiſos, cubitales, craſſos,
in quibus ſecundum diuaticationes folia ſimpli-
cia, longa, anguſta: in extremitatibus flores multi
lutei non magni, quibus videntur ſuccedere ſili-
quæ. Cum Radicula ſylueſtri Dodonæi aliquid
ſimilitudinis habere videtur, potiſſimum quod
folia inferiora attinget, non tamen eadem eſt.

CAKILĒ QVIBVSDAM, ALIIS

eruca marina, & Raphanus
marinus.

Qvamuſ tenuis, longa tamen, ſatis eſt huius
radix: numeroloſos caules proferens dodrante
D d d d

Cakile Serapionis.
Eruca folio.
Napi flore.
Eruca marina.
H. Lugd.
nut.



Locus &
Tempus.

Virus

altiores, folia Recte, minora, pinguiora, glutuacri, subulso: flores peculiaribus furculis lateralibus insident, Erucae aut Brassicæ positu & forma, colore purpureo: filique crassiusculæ, breues, bina semina singulæ concludunt.

Anguill. & Lobel. Obs. Cakile Serapionis. Adu. & Icon. Plant. Cakile Serapionis. Eruca folio. Napi flore, vulgò Eruca marina.

Hist. Lugd. tres figuras vnius plantæ habet. Primæ quidem titulum fecit, Nasturtium marinum. Alteram inscripsit Eruca marinam. Hanc autem Myconum ita vocasse dicit quòd sapore Erucam æmuletur, & non nisi in maritimis nascatur: Catalanos *Rucas de Mar* appellare. Tertiam, Cakile Serapionis Synonymon fecit. Et quæ hanc eandem planè, vel certè similem dixit cum Eruca marina Myconi, magis mirari subit, cur frustra tam suo, quàm emptoris impensu tot icones proposuerit.

C. Bauh. Phyt. Eruca id. siue marina, filiquæ hanc cuspidi simili. Cakile herba, quam olim nominavi Raphanum marinum, propter odorem, saporem, & acrimoniam, quam cum hoc omnes ferè partes communem habent.

Apud mare cum essem Monspelii florentem vidi, & filiquas ferentem mense Augusto. Genue in horto meo floruit Maio. [Montbelgar] di prouenit mihi in Horto E.C. Vidi Heidelbergæ in horto D. Sprengeri florentem Iunio.

Myconius frequenter se experimento obseruasse & compertum habere scribit, aquam huius [Cakile] stillatitiam tepidam, quatuor vnciarum pondere mane potam, colicis doloribus, nephriticis, & calculosis, mirè conferre.

CAKILE SIVE ERUCA MARINA
Latifolia.



NObis dedit D. Agerius nomine Erucae marinæ foliis non incis collectæ iuxta alteram apud mare Adriaticum, folia huic laciniata quædam, sed non in partes paruas diuisa, ut in vulgari: sunt enim lata, & pleraque tantum sinuata.

SCOPA REGIA VETERVM.

CAP. XI.

SCOPÆ regis, Plinius de Violis verba faciens, Scopæ regis grauem odorem assignat, non leuiorem ei, quam Calatham appellat, quanquam folia eius oleant, non flores. Idem vbi de Siderite fermum habet, ait. Nostri eam, quæ laetissimo (laetissimo vet.) est folio, Scopas regias vocant. Medetur Vfus anginis suum. Hæc Plinius de Scopis regis, quem Anginæ non regias, sed potius dissolutas scopas tradidisse dixerim. Quod enim genus ei sit inter Violas Scopæ regis, parum liquet. Est quidem Scopæ regia, secundum Hermol. in Coroli. Sideritis prima Diosc. de qua H.n. lib. 28.

Scopam regiam, faciunt Dioscoridis Bunium, Ruellius, Gesnerus ex ascripta. Diof. & Brunfels. in Onomastico. De Bunio agetur lib. 27.

Scopæ regis dicitur de Tagete siue Garyophyllo Indicano auctore Gesnero in cat. de hoc lib. 25.

Scopam regiam Plinio Sideritim latifoliam dictam eam esse Ruellius creditur, quæ Herba Carpentaria vulgò dicitur: Et hæc est Barbarea nostra, de qua mox dicemus.

Scopæ regia Pand. est herba S. Iohannis quam Hypericum lib. 29. inscripsimus.

Scopæ regis, quæ apud Plinium demonstratur, ramis oblongis, foliis ex intervallo, lactucinis, sed rigentibus & lanuginosis: flore luteo, radice promissa, tenui iuxta Gesneri opinionem, fortè Pulmonaria Gallica fuerit, ac etiam Sideritis illa Plinii, Scopæ regis appellata.

Scopam regiam Sideritim quidem esse putat Dalech. apud Plinium, sed Achilleam cuius folia odorem multum spirant, non insuauem, verum medicatum, auctore Dioscoride, ut pro latissimo folio cap. 5. legendum sit tenuissimo, vel quod magis placet. Latissimum folium intelligamus totius plantæ comam latissimè se spargentem. Nam multis virgis multumque spatii occupantibus ea planta surgitur. Coronis autem expectatur flos ex albo aureus. Quamobrem inter luteos flores hic à Plinio recensetur.

Scopam regiam quam Plinius inter Sideritides connumerat, Casalp. Sclaream vulgi esse contendit. Videtur hæc nobis Gallitrichum latium de quo lib. 28. Hist. n. Sed quod nos in tanta Veterum & Iuniorum diuersitate nihil habeamus, quod certè concludamus, nullus equidem narrabitur, siquidem ab his nullà satis certà historia sit descripta.

BARBAREA.

CAP. XII.

Radice albâ donata est, mediocriter crassâ & oblonga, sapore acriore: caules dodrantes & altiores, striati, multis alis concavi: in quibus folia Raphanis minora, laciniâ extremâ Nasturtii folium extremum æmulante, atro virore splendentia, sapore minus vegeto quàm radix: flores parui, lutei: filique confusiles, multæ, tenues, teretes, in quibus Dodonæo auctore, ex Carpentariis virore huiusmodi.

Hanc vocauit Ruellius Carpentariarum herbam, & Galloriam Carpentariam, existimans Plinii Sideritim, folio latissimo, siue Scopam regiam. Fusch.



Fuchl. Diax
Barbaræ herba
[S. Barbaren
fraut] Herba-
riorum.

Trag. qui
herbam S. Bar-
baræ vocat, ac
Sinapi s. facit
flore luteo,
Senff fraut/
wasser senff.
Sylvestre ge-
nus Nasturtii
aquatici & Si-
napi rectè sta-
tuitur.

An Anguill.
Pseudo-buniū?
An eidem Sco-
pa regia quæ
inuenitur in li-

bris falsò Galeno attributis.

Gesner. hort. S. Barbara herba, Carpentaria,
Gillis vulgò dicta, Nostris [Tigurenſibus] Kä-
fressch; aliquibus Scopa regia. Ait hic sibi videri
Matthiolum herbam S. Barbara vulgò dictam pro
Eryſimo pingere. Eidem in cat. pl. Buniū, quod
quidam interpretantur Wild kreissig; S. Bar-
baræ fraut: Herbe au charpentier. Item Sideritis
Plinii latissimo folio.

Dodonæo, qui Barbaræam, ac etiam Nastur-
tium, & Cardaminū hybernū vocat, ^{laudat Boissier}
[salum Buniū] Dioſcoridis videtur, nec esse Si-
deritis latifolia, aut Scopa regia, vt aliqui putent.

Aduers. Lobel. & Penæ volunt Barbaræam non
esse Pseudo-buniū vocandū, sed potius Pseu-
dobuniadem. Et sic Lobel. Obf. & Icon. Plantin.
scribit.

Videtur Hist. Lugd. Eriſcis annūmeranda her-
ba illa quam alicubi in hortis colunt & aceriis
immiſcent, & quam vulgares herbarii S. Barbara
herbam appellant.

Tabern. Ic. & H. Barbarea mas & femina. Com-
pilator ponit duas icones vsque aded similes vt
nullam demonſtrent differentiam, nec etiam in
descriptione vlla traditur. Gerardus pro Barbarea
poſuit iconem Barbarea femine Tabern. & præ-
ter omnem rauionem, pro Sinapi satia iconem
Barbarea maris Tabern.

Quam plantam Franciscus Indiæ, de qua mox,
inter vices intelligat per Scopam regiam, nesci-
mus nisi velit Barbaream.

Ad Scorbutum laudat Marcus Mitrch. plantam
quæ Pseudobuniū Dioſcoridis iudicatur, nec
non Nasturtium aquaticum maius.

In campeſtribus paſſim, teste Fuchſio, nascitur.
Maio & Iunio menſibus floret, ac ſubinde in ſili-
quis ſemen proſert in campis, ait Dodon. ac hor-
tis in quibus Olera ſeruntur, tum alibi veluti ſe-
cundum ſemitas ac vias quandoque nascitur: To-
ta hieme viret. Locis incultis, vt vult Hist. Lugd.
maximè vliginoſis & aruiſ humidis. Barbarea
prouenit Montpelii, Baſileæ florens menſe Maio,
Iunio, & Octobri ad ripam fluminis Bieſe & in
parua Baſilea ad portam Riemerhor in pratibus:
Patauii & Bononiæ in horto S. Saluatoris albur-
go di S. Catharina. Genevæ virebat menſe Martio
in horto meo, & florebat Maio: Montbelgardi
paſſim floret Aprilis, ſemen maturum Iunio: in
horto E. C. quorannis ſe renouat ſeminè deciduo.
Barbaream flore pleno circa Baſileam repertam;
Fora. II

& à fratre C. Bauhino datam, demonſtrauit mihi
Arnold. Gillenius.

Fuchſio guſtanti primum ſubacris eſſe, dein Temper-
parum etiam adſtringere videtur, vt calidam &
ſiccā eſſe heimo dubitare debeat. Vulnerariam Vires.
herbam eſſe & temperamentum eius & experien-
tia docet. His vetò potiſſimū viceribus mede-
tur, quæ impura ſunt, & in quibus caro ſuper-
creſcens fuerit: nam quia valentet ſiccāt, idē ſor-
des extergere, & carnes minuerē poteſt. Valdè
ait Dodon. excaſſat ac ſiccāt, vt pote ſapore
acris, & Naſturtio facultate aſſimilis, acetiariis ve-
rò additur hyeme præſertim, cū Naſturtii copia
deſit: Medetur verò & eadē Scorbutum non mi-
nus quā Naſturtium. Semen admodum quoque
acre, calidum ac ſiccum, adeoque tenuium par-
tium, vt urinas euocet, & coherentes calculoſas
arenulas diſſoluat ac expellat. Calida & ſicca ſe-
cundum Lobel. initid ſecundū exſtit: terræ ſub-
ſtantie nonnullius particeps, idē gargarizatur
ad anginas pituitoſas & Vuas relaxatas. Succus
commodè Clymeni vice & titu exterſis ſiue
mundificatiuis vulgò vnguentis ad ſordida vl-
cera miſcetur. Urinam ciet, calculoſos & ſarſes Ve-
ſicæ decocto aut cibo pellit, vt Lauer, cuius ſerē
par guſtu. Inexplicabili cum agrotantium iua-
mento apud Franc. Indiæ de Gutta, vomitoriū
medicamentum paratur, cum aqua ſtillata Aran-
tiorum immaturorum tepida, & ſufficienti quan-
titate pulueris Scopæ regie, hoc quidē medica-
mentum mirabile eſt atque diuinum, & à pauci-
ſimis Medicis probè cognitum, quod podagricis,
Gonagricis, ac Iſchiadicis affeſibus præcipuè
præſentaneo, & maximo eſt iuamento. Bilem
enim præſertim, & alios poſtea humiores per ſu-
periora & per inferiora iucundis abſque com-
paratione expurgat, quā Thlaſpi ab Aſcio aded
in hoc caſu celebratū, nullum imprimi calorem,
ſortum non perimit, neque educit, vt effici Thlaſ-
pi, nullamque acrimoniam & mordacitatem hæ-
bet: quare hoc eſt medicamentum longè ipſo no-
bilius, tutius, atque iucundius, vt experientia ſæ-
piſſimè à me fuit comprobatum.

Pemitorij.
Aqua ſtill.
Arantiorum.

BARBARÆA MYRALIS IOH. BAVHINI

Barbarea muraria radice lignoſa, albidā tenuiſ-
ſimis fibris capillata, ſapore oleraceo eſt: cauſis Deſcriptio.
teretes, hirsutus, interdum rubelſcens, rectus, peda-
lis vel cubitalis, ac etiam maior; ramoſus aliquan-
do: ad cuius imum ſolia multa circumquaque
procumbentia, vt plurimum, vnciam longa, ali-
quando longiora, trientem vnciæ ſerē lata, ſubro-
tunda, hirsuta aſperuſcula, ſerrata, pediculis bre-
uibus aut nullis, interdum vbi cauſeſcere potiſſi-
mū incipit, ſatis longis pediculis adhzrent: in
caule minorā nullo pediculo annexa, pinnata, ſa-
pore eodem cū radice: flores in ramulorum ex-
tremirate multi ſimul iuncti, candidi, quatuor
foliis conſtantes, apicibus in medio luteis, quibus
ſuccedunt ſiliqua copioſa, longæ, teretes, ſecun-
dum caulem ſurrectæ.

C. Bauh. Phyt. Eryſimum s. ſiue Eryſimò ſi-
milis hirsuta non laciniaſta floribus albis, quam
cū Patavii D. Guilandino offendisset Dryo-
phanon Plinii (cuius lib. 28. cap. 9. meminit) &
Drabam alteram nominauit: at Nobil. Cortulus
Eryſimum tertium vocabat.

An Lobel. Obf. Barbarea, Herba S. Alberti Bo-
nonienſium. Hanc licet frater C. Bauh. ſeparet &
D d d d

Locus &
tempus

mea Barbarea murali, vocetque eam in phyt. Barbaream. siue mihorem, quam ienne expressam nondum viderit, meo tamen iudicio, est vna eademque planta, idem minime separanda.

Floret Vere Monspeisuli: Genue maior in horto meo virebat tota hieme, nec primo anno caulem aut flores ferebat: at post semina proferebat Iunio: Copiosum inueni mense Iulio in monte Thuri cum filiquis plurimis longis in caulibus rectis. In l'isle Burgundiz omnium maximam vidi in muris quibusdam & radicibus castelli, virens Ianuario & Februario: Montbelgardi in muris quibusdam Castelli inueni, nunc fata in Horto Ill. E. C. occupauit novos muros & seipsam in illis propagat. Fr. C. Bauhinus obseruauit basileæ in muris mœniorum: attulit mihi Pataui.

DRABA LVTEA QVIBVSDAM.

Descriptio Ignola est radix, alba, minimo digito minor, sapore Raphani rustici, minus feruido: ex qua caules aliquot attolluntur, recti, rigidi, cubitales & maiores, ramosi: quibus folia ab imo ad summum crebra alternatim adnascuntur, omnia yniformia, longitudine quadrantali & maiore, latitudine circiter vnciali, acuminata ex angusto principio, quâ pedicello breui adnectuntur, hirsuta, serrata, sapore remissiore quàm radix: *flosculi* Erysimi, luteoli, quadripartiti: quibus succedunt *filiquæ*: quæ in siccatilla (quam Pet. Turn. Angl. Heidelbergæ ad Neccarum collectam mihi attulit) semen claudabant tenue, longum, striatum, rufum.

Solidago Camer. apud Matth. Germ. & in horto dicitur Arabis quorundam floribus luteis, quam commode refertur posse putari ad Solidagines, quo nomine aliquando ex Anglia missa fuit.

C. Bauh. phyt. Draba 5. lutea strictissima longisque filiquis.

Locus & tempus Vindem vidi in montibus Rhæticis: Burmii Iunio mense florentem altitudine duorum cubitorum cum dimidio: quæ quia videbatur odorem habere Raphanis, tunc nominavi Raphani odorem habentem plantam: Stutgardiz in horto Ill. E. C. floret Iunio, vnde attuli plantandam in horto eiusdem Cels. Montbelg.

DRABA LVTEA ALIQUATENVS SIMILIS

pro Spiræa missa ex Lusania.

Planta isthæc pro Spiræa Theophrasti fortè Clusio (lib. 1. plant. hist. cap. 53.) missa fuit Basileam C. Bauhino, inde ex Lusania: cui iam siccata, caulis tenuis erat, fungosus, fractuque facili non ligneus, vthæc quoque ratione censeamus, non fruticem esse vllum, sed ex plantarum genere habendum, Drabæ iam dictæ luteæ aliquatenus similem, formâ porro caulis rotunda, nerui secundum eius longitudinem decurrentibus inæqualior reddita, modò albido, modò verò puniceo aspersus colore: folia per continuum caulis ductum, nullo ordine sparsa, duas vncias longa, in ambitu altrinsecus serræ in morem asperata, supernâ parte paulò saturatiore virore, vt infernâ d. luore, tincta: neruque subpunctico per folii medium spatium conspicuo satis donata, tenera siue admodum fragilia, ramus desinit veluti in spicam, aut vnam flosculorum exilium muscosam, angustam, duas circiter vncias longum, albidam, gustu amarissimam: Si spica siue vna in ramo quem habuimus lata esset, non male exprimeretur per iconem Spirææ Theophrasti fortè Clusio: Lectorem erit rem diligentius examinare: ramum quem habemus dedit nobis Ba-

filex 1668. diligentissimus Botanicus Gillenius Hassicus Medicinæ D. cui dono dederat Frater C. Bauhinus. Historiam autem & Iconem Spirææ Clusii posuimus Promptuarii nostri siue Histor. gen. lib. 4.

SINAPI PYMILVM ALPINVM FOLIO Belidis Clusio.

Sena aut septena, humi secundum radicem expansa, habet illa foliola, Belidis foliis non dissimilia, teneriora tamen, & leui acrimoniâ prædita: è quorum medio, terellus & gracilis prodit cauliculus, raris foliis septis, palmatis, aut paulò altior, in cuius summo sem aut septem erant flosculi, quatuor albis foliis constantes, in quibusdam plantulis totidem sine flore filiquæ siue cornicula satis magna pro plantulæ ratione, duplici serie, quemadmodum in Cardamine alterius & similibus corniculis: semen continencia exigui, planum, rufescens, nonnullâ acrimoniâ præditi: radix summa tiliure serpens, noua germina subinde profert.

Plantulam Cardamines æmulam, Sinapi pulchrum alpinum, an ad Cardamines, an ad Sinapi genera referre debeat, nondum apud se constituit Clusius.

Casp. Bauh. phyt. Sinapi 2. siue alpinum

marinum.

Obseruabat eam Clusius in Escheriano iugo scopulis inhaerentem.

BVRSIA PASTORIA, SIVE PILOSELLA filiquosa.

Affinis est hæc Bursa pastoriæ minimæ: rad. & vtilius, tenuis, & fibrosa, vbi minima non fibrosa: folia similiter per terram sparsa, nonnihil hirsuta, viridia, interdum nonnihil rubra, in minima minora, quàm Alfinæ minor. in aliis vulgaribus Alfinæ magnitudinis, vel maiora, sunt etiam nonnunquam maxima Bursa pasto-

Descriptio

pastoris non lacinata: *caulis* interdum adeo exiguus ut vnciam non excedat, aliis etiam dodrantalis & maior, iuxta terram nonnihil hirsutus & ruber, superius glaber & viridis, & nonnunquam foliis nudus, aliquando vno aut altero donatus; ramulos vel non ramulos: *stipulis* aliquot albi ordine nullo, *Bursa* vulgaris: *filiqua* longæ, teretes & tenues, ex satis longis pediculis.

Ad *Myagros* referendam censebat *Gesnerus*, ut patet ex annotatione ad plantam meam siccam. Existimo dictam fuisse *Dalechampia Aizoon thelyphonum*.

An *Thalio*, *Pilosella* filiquata maior & minor? *Acrem* habet (ait *Camer.* ad *Thalii* hist.) hæc plantula saporem instar *Nasturtii*, eam *Gesnerus* inter *Myagri* species retulit. *Hucille*, qui eius iconem habet in fine horti, sub titulo *Pilosellæ* filiquatæ. Ea facta est ad plantam siccam meam quam rediens *Montpelio* *Gesnero* miseram. Eiusmodi icones & descriptiones passim *Camer.* habet, quæ *Gesnero* præceptoris meo communicaram, mei tamen non meminit.

C. Bauh. phyt. *Bursa* pastoris 7. siue *Bursa* pastoris similis filiquosa. *Pilosella* minor *Thalio* & *Icon. Camerarii*.

Schvv. *Bursa* pastoris *Myagri* folio, *Nagelæ* frast.

Montepelii in agris viridioribus florentem observavi Vere: *Geneuz* mense Martio & Aprili: *Bononiæ* in mutis palatii atque in iis locis medicis magnitudinis, ut pingitur à *Camerario*. *Montbelgardi* medicorum & ad muros horti ferarum maximam: inter *S. Thamaris*, urbem & *Than* ad *Alsatiam*, in ægris medicorum. *Beffordia* in arce supramurum observavi omnium minimam, ita ut describerem aliquando pro planta particulari.

DE LEVCOIO EX VETERVM SENTENTIA.

CAP. XIII.

Leucoium (λευκοῖον) notum est, siquidem *Dioscoridi* fides habenda est, sed est in flore differentia: Namque aut albus, aut luteus, aut cœruleus, aut purpureus reperitur. *Hermolaus* & *Marcellus* in hoc *Dioscor.* contextu ista verba, aut cœruleus, in *Leucoio* abundare existimant, putantque ascititia esse, ideoque extirpanda. ut adstimulatur *Fuchsius*, ac *Plinii* auctoritatem adducit; qui lib. 21. cap. 6. *Viola* plura genera enumerans, purpureæ, luteæ & albæ duntaxat meminerit. *Marcello* (inquit *Matthioli*) *Dioscoridis* interpreti subscribendum puto, qui *Leucoium* cœruleum hoc loco accreuisse suspicatur, vetustiss. *Dioscoridis* *Longobardis* literis scripti testimonio nixus, in quo nullum planè de cœruleo *Leucoii* colore verbum legebatur. Suspicionem hanc augent, eamque comprobant *Oribasius* & *Serapio*, quos item verbum hoc loco non habere comperit in simplicium censu, cum alioquin reliqua *Dioscoridis* referant. Cœruleum *Leucoion* (repetit *Cæsalp.*) in hoc genere non visum, à solo *Dioscor.* positum, nisi superfluum fuerit id verbum, vel fortè *Cyanus* flos intelligendus. Caterum, dum (ὡς τὸ λευκοῖον λευκοῖον) radicem *Leucoii* nigri in lib. de nat. mul. in vino bibendam præcipit *Hippocrates*, μέλαν & nomine purpureum haud dubiè designat, nam hic color propinè ad nigrum accedit. Sic & ἰσχυρόν Θεο-

Tom. II

phasto dicitur, *Viola* *Martia*, à nigricantibus purpureæ flore. Sic & cœruleus non alius indicatus à *Diosc.* esse videtur *Cornario*, quam albus, qui leui robore amixto cœli colorem refert. Superest ut quod nostrum hac de re sit iudicium, liberè dicamus. Verba igitur illa, aut cœruleus, nullo modo penitus ascititia credimus, eam vel foldm ob causam, quod in cunctis *Dioscoridis* Græcis edicibus legantur. Ad auctoritatem *Plinii* respondetur *Fuchsius*; *Plinium* non loqui de *Leucoio* loco citato, aut si loquatur, *Leucoia* à *Violis* non bene distinguere; & per purpuream *Violam Martiam* tantum intelligere: per albam verò, *Leucoium* bulbosum *Theophrast.* florum primum dictum. Quod verò *Matth.* in Italia natum non sciat, ac idè *Marcello* subscribat, ineptè facit, non enim vna fert omnia tellus. Latè siquidem patet naturæ vis, & admirabilis eius *Maestas*, quâ potest multa quodcumque & ubique variare & quæ nobis, nostro orbi, & sæculo negavit, aliis dedisse. *Oribasium* & *Serapionem* in depravatam exemplar incidisse poudè dixerim. *Dioscoridem* porò per cœruleum *Leucoion* *Cyanum* non intellexisse, quod *Cæsalp.* post *Hermolaum* & *Marcellum* somniat, tum utrorumque florum differentia, tum folia, tum caulis, tum tota denique plantæ facies, clarè demonstrat. Cur denique *Dioscorides* voce disjunctuâ vltus esset, si, quod *Cornario* videtur, per cœruleum album indicare voluisset.

Stat igitur quatuor esse *Dioscoridi* genera, solâ florum colore discrepantia. Nec hoc mirum videri debet, cum & apud *Tragum* recentiorum, quinque diuersa *Leucoii* genera extant, à diuersitate colorum apud Germanos sortita nomina, luteum sc. album, purpureum [braun] roseum, [leibfarb] & rubrum. Sed de his Iuniorum & nostris observariis differentiis seorsim tractabimus.

Leucoii [τὸ λευκοῖον] nomen quamvis propriè *Violam* albam significet, si eius græcæ vocabuli compositionem spectes, attamè quotquot de his scripserunt, omnia *Violarum* genera cuiuscumque tandem sint coloris vnita hac *Leucoii* appellatione designarunt. Non est tamen quod per purpuream hic intelligas eam, quæ Græcis ῥοζ & Latinis propriè *Viola* dicitur: nam earum alia ab his de quibus hic agimus familia est, hique tum qualitate tum facultate, adde etiam forma contrariæ. Homines enim illorum florum capti venustate & fragrantia, inquit *Pena*, ut vsum ad coronamenta sic nomen commune lanxere, posteaque magis consuetudinem, aut florum similitudinem quam rationem secuti, multos & varios flores *violas* nuncuparunt, idem nomen variis atque longè diuersis plantis quales sunt *Viola* & *Leucoia* imponentes. Est & *Leucoium* bulbosum. Quæ omnia suis locis declarantur.

Hoc porò *Violarum* genus, ait *Diosc.* alii *Regium* siue *basilion*, Romani *Violam* albam, alii *Augusteam*, nonnulli *Violam* matronalem, aut *Passerinam*, aut *Polyphuram* vocant.

Hermolaus barbarus testimonio fretus *Columella*, *Ligustriam* Romanis hanc *Violam* vocatam tradit.

Dicitur Arab. nunc *Cheiri*, nunc *Alcheiri*, præ- Nomina posito articulo: Germ. Veichen. belg. Violeren. lingua Gall. Violettes. It. Viola. Hisp. Violeras. Quidam verò *Violam* albam [Leucoium] appellant, à foliorum canicie, non à florum colore, qui, ut dictum, aut albus est, aut purpureus aut luteus, aut, quod cum nonnullis *Adrian.* *Spieg.* negat, cæruleus.

Eddd 3

Tarentinus apud Ruellium Violam purpuream post Idus Martias, item Calendas Martias feri iubet, sed violam qui saturus est terram stercorantem & repastinatam pedis altitudine in pulvis redigat, atque ita plantas hornotinas, scrobiculis pedibus factis ante Calendas Martias, dispositas habeat. Semen autem Violæ, sicut oleum, duobus temporibus in areis sentur, Vere vel Autumno. Colitur eodem modo quo & cætera olera, ut iunctetur, ut sarriatur, ut interdum etiam rigetur. Nascitur vitis modo è supernis quasi è puppi dicas non prorà.

Vires &
Vfus.

Leucoium
melinum.

Semen.


Ad secundas educendas, & sanguinem ex vteris pellendum, Leucoii semen tritum, cum vino bibendum exhibet Hipp. de nat. mul. & ad eadem eodem modo radicem fumendam tradit. Est autore Diosc. ex Leucoiis commodum ad medicum vsum cui color melinus, huius flores aridi decocti ad infusus, ad vteri inflammationes, & ad ducendos menses faciunt. Excepti verò cerato, rimas in sede sanant: cum melle feruida oris vlcera. At semen ipsius duarum drachmarum pondere cum vino potum: aut cum melle appositum menses, secundas, & fetus ducit. Radices cum aceto impositæ, lienem reprimit & podagricis profunt. Leucoium frutex vniuersus extergentem facultatem possidet, plus tamen flores, & inter hos qui sint sicciores magis etiam quàm virides, aded ut oculorum cicatrices crassas extenuent. Tum menses quoque eorum decoctum mouet, & lochia partumque enitutum elicit: ac si bibatur abortum facit. Est ergo id medicamentum, ut si quod aliud, amarum. At si quis vinum eius vehementiam multâ aquâ admista retundat ac mitiget, aut certè id genus aliquo, habebit & ad phlegmorum non malum medicamen. Sic decoctum eius si non merum fuerit vteri phlegmonas, idemdem periculum sanat, potissimum quæ diutino tempore ad scirrhii modum induruerit. Sic eum Cerato vlcera ægræ ad cicatricem proueniencia curat. Sunt verò etiam qui cum melle & ad Aphthas adhibeant; semen eum eiusdem sit facultatis aptissimum est duarum drachmarum mensurâ potum, tum mensibus ciendis impositum conuenire creditur partumque viuentem interficere ac mortuum elicere. Radices similis quoque facultatis, nisi quatenus crassioris sunt essentia, & magis terrene: cum aceto lienes induratos sanant. Nonnulli verò & phlegmonas induratos iis curant. Extenuant, menstrua & vrinam ciunt. Sed, teste Plinio, minor vis est recentibus, ideoque aridis post annum vtendum. Lutea dimidio Cyatho in aquæ tribus, menses trahit. Radices eius cum aceto illite sedant lienem. Item Podagrâ & oculorum inflammationes, cum myrrha & Croco. Folia cum melle purgant capitis vlcera, cum cera rimas sedis, & quæ in humidis vnt. Ex aceto verò collectiones sanant.

Inter omnia Violarum genera, luteas calidiores temperamento prædicas esse, præsertim aridas, testatur Tragus. Flosculi harum recentes in aqua decocti & poti, contra vulus inflammationes valent. Succus oculis inditus purgat illos, unguis maculas & caliginis discutit. Idem si è aqua trahatur, non solum menses, sed & secundas, & mortuos partus extrahit. Neque debet ex his summa in necessitate constitutis. Aqua stillata, per diem bis pota, quatuor aut quinque leuissimum mensurâ, vitiis hepatis & renum apponitur, conducit, & Venerem stimulat. Per alios dies continuè vsurpata, omnia interna

membra roborat, sanguinem & humorem exhilarat, dolorem sedat & quietem inducit. Cum melle oris vlcera sanat. Conferua huius cum aqua eius stillatitia crebro sumpta (vt rei huius testis est Camer. hort.) præteruat ab apoplexia & iuuat paralyticos. Melius Oleum de Keiri, ex floribus, Lutei Leucoii conficit, vt Chamæmelinû, ac quod tenet, digerit, ob id dolores thoracis, fenum, mernorum sedet.

LEVCOIVM LVTEVM VVILGO

Cheiri flore simplici.



Notissimû Descriptio.

parietinis quod Cheiri cum Arabibus vocant Officinæ, radicibus, fureculisque seu ramulis vberius fruticantibus, lignosis, quos obsident folia nullis appensa pediculis crebra, vnciali & ampliore longitudine, ex angusto principio sentim dilata, tamen videntia, aut cænescentia, idque maximè prona parte, sa-

pore subacri: flores crebri, lutei, valde odorati, sapore mihi ingrato, quatuor foliis constantes, staminibus sentis stiloque chloris in medio penitus ferè latentibus. Succedunt filique longæ in quibus semen lacum, rufum, gustu acri & amaro.

Matthioli in prior. com. Leucoium in eod. cum mag. fig. vt & apud Bauh. Leucoium aureum: in hist. Germ. Leucoium luteum, Gelb negel vieln / Cheiri Arabum. Trago. Fuchl. hist. Gerard. Viola lutea Dodon. de flor. & in fol. Lob. Adu. Icon. M. Schv. Leucosum luteum. Obl. Leucoium floribus luteis.

Gesner. in cat. pl. Hesperis, Viola lutea, Barba. Hesperis ris Cheiri, nonnullis Herba Gallica, Leucoion. Viola alba & Leucoium Diosc.

H. fl. Lugd. Leucoium aureum Matthioli, Plinio Viola lutea: verius dici for. φαιοχρῶς Theophrasti perit Herbarii autumnant.

Clus. Pann. Leucoium luteum sativum.

Camer. hort. Leucoium flore luteo simplici.

Tabern. Icon. & Hist. Viola petraea lutea.


C. Bauh. Phyt. Leucoium ro. siue luteum foliis virentibus, Brunfelsio in 4. p. 49. Leucoium. Quibusdam φαιοχρῶς Theophrasti quiddam lotus flos flammæ, id est, lutei sit coloris.

Alia nomina sunt, Leucoium luteum, Leucoium Nominis luteum flore simplici, Arab. & Offic. vulgò Cheiri. linguarum r. siue Keiri. Germ. Gele Veyelen / Gele Veyel gel Veyelchen. Belg. Geel violieren. Grein violieren / parietinis, aut saxatiles Violas dixerit Dodon. Gall. Violettes sautes: Montb. Violettes de S. George It. Viola giara. Hisp. Violetas amarillas & Albelis. Angl. Wallè Gylloster, Wälbe lotter & Brockgloster. Hung. Sarga Viola.

Leuco.

& *Leucoium lateum* floret Monspelii tota hyeme. Passim, vt Basileæ & Montbelgardi in muris copiosè prouenit, florens April, Maio, Iunio, & Iulio, & Augusto videt etiam in Horto E. C. Claraualæ Septembri.

LEVCOIUM LVTEVM PLENO FLORE.



Non vide-
tur differre
ab eo cui flos
simplex, nisi
quòd diutius
durat, & magis
arborescit, quod
cultura faciunt
omnia florum lu-
xurians ei non
permittenda, alio-
qui facillè pe-
ririt, vti solet
Leucoium sim-
plex, postquam
siliquas pertulit,
quæ in hoc
interdum leui-
ter apparent,
sed ad frugem
non perueniunt,
quod hactenus

obseruauerim, licet *Pistor* noster non vias sili-
quas nostræ iconi appinxerit.

Viola lutea multiplex vel polyanthos quam *H. Lugd.* spectandam proponit, est flore densiss. foliis stipato & congesto, suauissimi odoris, nullis siliquis, nullo semine, abeunte in floribus amplitudinem eo succo quem siliquarum & seminis esse oportebat, cultu & mangonio talem euadere auiunt, præsertim si tenellæ plantæ antequam floruerint sapientius transferantur.

Dodon. de flor. Leucoium flore multiplicate.

Lobel. & Pena Ad. Leucoium luteum duplis floribus.

Icon. Pl. & Schvvenck. Leucoium siue Keiri duplici flore multiplex Geseit geel Veiel.

Gerard. Viola lutea multiplex: Double Wall flower.

Camer. hort. Leucoium flore luteo pleno.


C. Bauh. Phyt. Leucoium n. luteum pleno flore.

Leucoium luteum flore pleno, Vidi bifantii in variis hortis, vti in horto Di. Abbatis de Van Prioris in Telpach. Sturgardie in horto Ill. Ducis, plantauit in horto E. C. Montbelgardi. nasilex obseruauit in horto Di. Dis. Felicis Plateri, & D. Iacobi Isele, vnde Montbelgardum attuli, floret April & Maio: ramulis depactis in terram propagatur.

Leucoium luteum arborescens

Leucoium accepimus Sturgardiâ ab Illustriss. Nostra Ducissâ Sybilla Anhaltina vxore Ill. Ducis Wirtemb. Principis mei Clementissimi, antehac non visum scribunt, ac florem simplicem interdum pertinere ad amplitudinem monetæ quam Iuliam vocant: nos adhuc tantæ magnitudinis non vidimus, licet plantæ nostræ Montbelgardi florent & siliquas ferant. Quamuis ex semine proueniant, propagatur etiam ex fuscis, quod flore pleno est.

LEVCOIUM LVTEVM SYLVESTRE Clusii.



Sylvestre au- Descriptio

Stem caules
fundit multos
dodrantales &
ferè cubitales,
angulosos, striat-
tos, multis alis
concauos: folia,
alia quidem si-
nuata, semunciat
lata & angustio-
ra, vnciam & ses-
cunciam longa,
angusta, nullò-
que modo inci-
sa, viridantia, in
hæctis. cultu
multò magis lu-
xuriant dupla
latitudine lon-
gitudineq: flo-
res multi coacer-
uati leucii lu-

tei satui, colore item luteo prædit, minores qua-
tuor constantes foliis, odore grato: postmodum
siliquæ nascuntur tenues Clusio, plano semine
plenæ.

An *Lobel. Obs. Keiri* siue *Leucoium marinum*
flore luteo, facie *Keiri* vulgò lutei: folia item viti-
dia: sed maiora, latiora & flauentia ex viridi, in
Belgii hortos translata.

*Clus. Pann. Leucoium silv. Rhizoromæ mulier-
culæ, Wild gelbe Deyl vocant.*

An *Camer. Hort. & apud Matth. Germ. Leico-
cium silv. quod Norimbergæ passim in locis
montanis prouenit, cuius pulchram & raram spe-
ciem reperit Bononiæ: Thal. Harc. Leucii lutei
silvæ species, foliis dodrantalibus tenuioribus hor-
tensibus, &c.*

*Tabern. Icon. & Hist. sicut & Gerard. Leucoium
silv. 4.*

*C. Bauh. Phyt. Leucoium iz. luteum silv. angu-
stifolium.*

*Leucoium luteum silv. satum in Horto E. C. ex semine collecto in Gallia feliciter prouenit: Locut & Tempus
florens Maio, Iunio, Iulio, & Augusto. Tale etiam
collectum à Genero Cherlero in Lio Venetorū,
& horto Patauino: D. Agerius attulit Bononiâ
Leucoium silvestre folio valdè angusto. Inue-
nit Clusius in montibus supra Badenses thermas
& in Leytenberg, locis Meridiei obuensis & sale-
brofis florens Maio.*

LEVCOIUM LVTEVM SILV. PANNON. ferrato folio, obtuso & acuto.

Leucoium luteum silv. ex Pannonia per D. Descriptio
Agerium delatum caules habuit ferè similes
præcedenti: folia in obtusum desinunt, in ex-
tremitate ramulorum flores multi glomerati lu-
tei, quales in præcedenti: An huius sit alia spe-
cies vel varietas tantum asserere non audemus,
Quum iconem nostram curauimus parandam nō
erat nobis iam descripta planta: sed tantum
mus iam depictus, in præcedenti tabella.

LEVCOIVM HYEMALE ET DIV DV-
rans purpureum & roseum, ac
etiam album.

Descriptio **N**on tam florum, quam caulis & foliorum color Leucoio nomen fecit: siquidem *fulva* incondita semunciam aut vnciam lata, palmum vnum aut duos longa, tota albet; obfusco mucrone, incanum mollique lanugine pubent: *caulis* cubitalis & sesquicubitalis, lignosus, in ramos multos fissus, incanus similiter & tomentosus:



flores extremis ramulis herent, ex oblongo calyce piloso erumpentes, & quatuor foliis compositi, colore vel albo, vel coccineo, vel saturatiore viola eo praeclari: vnde *siliqua* nascuntur palmum circiter longae, quae duos continent seminum velus, quae compressa, orbiculata, rufescentia, sapore praedita sunt acrisculi: *radix* lignosa, alba. Por-

ro: ex eo genere, quod florem gent purpureum, specimen habeo quod flore multiplici infigne.

Figura nostra Fuchsiana non vndique placet, quia non arborecens picta.

Dioscor. *adonidis*, flore purpureo & albo. Plin. Viola purpurea & alba. Tragus Germ. winter Viol. 4. Matronalis, weis per silgen braun. Viola hyemales 4. alba, incarnata, rubra, purpurea. Lat. Leucoium siue Viola purpurea, caerulea, rosea, candida, Braun/rot, leibfarb Violaten, quae altero demum anno florent.

Dodon. de flor. & Hist. in fol. Leucoi genus candidum minus a foliorum non florum colore nuncupatum, Belg. Streuvioleren nominat, flore rubenti, candido, aut ex purpureo puniceo, aut cineri candidiori proximo, subinde vario.

An Viola matronales Veteribus Graecis & Latinis cognita fuerint necne nondum compertum habet Fuchsius, Germ. dicitur weis ch veiel, Gall. gysléer. Tria sunt genera, candida, punicea, & purpurea, nec differre admodum nisi solum floribus videntur. Ibidem apud Fuchsium Lugduni excusum quidam addidit. Viola matronales ibi dictae, nobis Bacchares videntur. Fuchsius qui tres figuras posuit, non annotavit vllum discrimen inter hyemalia & aestiva Leucoia, ponit tres icones quae potius demorstrate videntur aestiva quam hyberna, quas frustra forte curavit pingendas si colore tantum differant: nos eam quam proponit pro Viola matronali purpurea huic capiti praeposuimus, quia iam erat inter eas quas e minimis & paulo melius accedit ad hyemalem quam alia duae quae ad aestiva relegauimus. Quam hic posuimus Hist. Lugd. non bene ponit pag. 864. errore forte typographi pro Viola matronali alba, quam nos Hesperidem vocamus.

Viola *amè re l'weu*. Leucoium, non a florum albedine, sed foliorum canitie, cinereoque colore dictum ait Lobel. & Penz in Aduert. videtur. Etiamnum hodie, ut Diosc. suo vulgatis. cognitionis illa triplex est florum varietas: vbius prope modum Gentium: sed alba & purpurea caerulea non nisi sat. Obs. Leucoium purpureum & album, Leucoia Dioscoridis. Icon. Plant. Viola alba & purpurea Teur. 329.

Tabern. Icon. & Hist. Leucoium album. 1. purpureum. 2. violaceum. 3. weis ch veiel/ Braun/veyel braun. Tres ponit icones, nec demonstrat in quibus differant, indistincte de iis etiam scribens, Compiler Tabern. Hac praeterea Leucoia potuisset relinquere iuxta Leucoium luteum.

Camer. hort. Leucoium album hortense si uti. Fructus flore al-
cosum. Item rubrum & purpureum nec non varicosum. Discrepant etiam quoddam statem vnicam durent quaedam plantae, quaedam aliquot annos. Atque insunt etiam purpureo ob colorem dilutiorem & saturatiorem aliquot differentia.

Gesner. in cat. pl. Viola alba, Leucoion Diosc. purpureum & caeruleum.

Corn. Leucoium nigrum Hippocratis. Matth. in com. cum mag. fig. Leucoium album & purpureum. In hist. Germ. weis/rot/braun Veyel/Leucoium album, rubrum & purpureum.

Hist. Lugd. Leucoium album & purpureum Matth.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 1. folio incano maius flore albo, cinereo, purpureo, rubro, luteo, versicolore, in hoc genere non puto extare luteum.

Gerard. Leucoium album, purpureum, violaceum, weis ch veiel violet colour Stoeck flower. Leucoium hyemale & diu durans flore roseo, Montbelg. in horto E. C. quod hieme repone oportet. Monspeli habent Leucoia mixta ex albo & purpureo, alba & purpurea quae in herbis tota hyeme florent, ut & mense Martio & Maio. Genue in hortis vidi florentia Orobri & Nouembri alba Leucoia & purpurea, & interdum in hortis hyemem persisterentia, Marq. florentia: Lugduni varia habent genera, vbi etiam variegatum vidi. Bononia flore purpureo, in horto di S. Saluator alburgo di S. Catharina. Leucoium prouocat Montbelgardi in hortis, folio cineritio cum quibusdam ciniis, ut in marino Monspeliiano spontaneo, Iunio & Iulio flores albos odoratos & siliquas profertens.

LEVCOIVM PURPUREVM FLORE
pleno.

Speciosus est admodum *stos* Leucoii purpurei siue violacei pleni, in ceteris non differentis a praecedenti hyemali purpureo simplici, de quo Aduert. Lobel. & Penz: Mangonio holitorio, re. petitaeque crebriore transplantatione Leucoii purpurei, flores magnitudinem luculentam assequuntur: multiplici singuli praequantur *siliqua* fectura, Rosam moschatam aequante: sed *semine* orba sit.

Icon. Plant. Leucoium siue Viola purpurea Viola flore pleno. Rubrum Leucoium flore pleno, magno, pulchro, admodum iucundi odoris colitur, teste Camer. apud Matth. Germ. in Belgii Valentiana & Monte Henaut: inde in alia loca transferretur, diffuculter hyemem perfert, ac ex surculis propagatur.

Vidimus

Vidimus Lutetia mense Augusto flores in cultiff. horto Robini hortulani regii. Nobis prouenit Montbelgardi Leucoium purpureum flore pleno ex semine misso Argentina per D. Friedericum Meierum, creuit etiam ex fuscis, is etiā siccam plantam miserat.

LEVCOIUM AESTIUM FLORE
purpureo & roseo ac albo.

riptio



Benis foliis
Emergunt,
hyemalibus
Leucoiis simi-
libus, minori-
bus, teneriori-
bus, flore nunc
purpureo, &
roseo, nunc al-
bo. Leucoii cā-
didum genus
minus quod
Belgæ hette
violeren vo-
cant, à maiore
non forma, sed
magnitudine
folia differt: cau-
les solidique ha-
bet similia, sed
minora: flores
etiam non v-

nus coloris: sed vel candidos vel rubentes, vel puniceos, vti maioris: filiquas etiam & semina similia. Vocatur autem & hoc candidum à foliorum canitie, vti dictum.

Tragus Germ. Sommer violen/ Viola aestiuales, Violarum tertium genus. Leibfarb/rot/bratin purpurfarb/weiß: Lat. Viola diversicoloris alioz flore alia albo, alia roseo, nonnulla rubro, quadam purpureo.

Lobel. & pena Adu. Viola annotina, flores exoleti coloris in cœruleum vinaceum languescens ferens.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 2. siue folio incano minus, floribus candidis, rubentibus, puniceis, vti maius, à quo solā magnitudine differt. Sed quod Frater ex Dodon. hæc duo genera solā magnitudine differre scribit, id approbare non possum. Differunt enim etiam in eo quod non arborecat: folia etiam prima differentiam aliquam ni fallor habent.

Alteram ex Fuchsi Iconibus ponimus, quæ pro ambabus esse possit cum etiam eas nonnisi colore differt tradat.


Hist. Lugd. Leucoium album & postea Leucoium puniceum Fuchsi rectius sic appellatum quàm Viola matronalis punicea, quo nomine Fuchsius pinxit.

Leucoium æstivum flore purpureo & roseo in multis hortis feritur, vti etiam in E. C. Horto. ex semine variis ex locis conquisito: Scutgardia nomine Viola Lombardicæ: Vere satum floret Iulio, Augusto, Septembri: Autumno perit, nec hiemem perfert etiam repositum, quod flore albo marcescendo acquirit aliquid purpurascens. Floret hoc genus, non quidem Vere apud Dodonæum, sed Ianio, Iulio, aut Augusto, & eodem quidem quo satum est anno: hyeme perit.

Viola matronalem albam, puniceam & purpuream admodum calidas esse fapor foliorum &

radicis, qui acris est, abundè docet Fuchsi-
Humiditatem autem multam, Galeno lib. 4. cap. 18. de simpl. medic. facult. teste, ed quod amarum non sint, admittam habent. Incidendi & digerendi per habitum vim obtinent. Ideoque radix vt & folia decocta in aqua, conuulsis, difficultate spirandi laborantibus, & veteri tussi auxiliantur. Vrinam & menses ducunt, sudoresque ciendi facultatem habent.

LEVCOIUM HIEMALE DIV-DVRANS.
flore albo, folio viridi & liu-
do glabro.



Pari cū Leu-
coio, cui
folium inca-
num, magni-
tudine est, siue
caules, siue ra-
mos, seu folia
spectes: huic
tamen folia gla-
bra, atro virore
splendent: flores
suauolentes al-
bent, Leucoii
iam dicti formā:
nec dissimiles
bipatentes fil-
iqua seminibus
plenæ.

An Lobel.
Obs. Leucoii
maritimi species
albi floris colo-
re duntaxat va-
riatis, & folii

exilitate à Leucoio marino luteo, cui folia viridia in Belgii hortos translata.

An eadem Icon. Plant. Keiri marinum flore candido? Ic. enim non malè conuenire videtur.

Dodon. in fol. Leucoia non nulla, quorum herba folia haudquaquam candida, mollia aut lanuginosa, sed virentiora, ad lutei Leucoii foliorum leuitatem & colorem accedentia.

Camer. hort. Leucoium rariis, folio planè viridi, flore albo admodum odorato, quod per aliquot annos durat, sed hyeme est in cella asseruandum. Item apud Matth. hist. Germ.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 3. siue maritimum candidum.

Gerard. Leucoium marinum flore candido Lobelii.

Leucoium folio viridi, glabro, flore albo in horto Felicis Plateri, quod plantavi in horto Il. E. C. Montbelgardi, primo à satione anno rarè caulem profert: apud nos hieme sub tectum reducendum: quædam plantas obseruavi eodem anno satas Montbelgardi flores Augusti: sed flore minori & minus specioso: Basileæ 1609. in horto fratris C. Bauhini hiemem pertulit, plantas attulimus Montbelgardum.

LEVCOIUM MARITIMUM MAGNUM
Latifolium.

Leucoii maritimi radix priusquam caulescat, molli, tenera, longa, crassa, alba, gustu acri non ingrato, Raphanum æmulante: folia la-
ta multa è radicis capite funduntur, foliis leucoij

Descriptio

Tempus
Locus &



fatiui hortensis, paria, longa, lacinia, vnciam penè lata, caulis crassiusculus: quinque vel 6. vniatim: flores quadrifolii purpurei.

Tale Leucoium obseruatum Mompeli, idem etiam attulit mihi Frater caule cubitum excedente, crasso, cum siliquis longis & laticulis villosis, omnium prima folia (vni in satis obseruati) sunt angusta, nò

laciniosa, talia etiam superiora, sed breviora Clusio, flores odorati, coloris dilutionis purpurei, sed quodammodò obsoletæ, in siliquis duplex ordo seminum planorum, subruforum, intercurrente membrana: radix multifida, non petennis, sed postquam planta florem & semen protulit [quod secundo plerumque anno, interdum & tertio fieri solet,] perit.

Lobel. & Pena Adu. & Icon. Pl. Leucoium maritimum maius.

Clus. qui in Hist. & Hist. post. in fol. Leucoium maritimum maius vocat: Assumpsit iconem Lobelii, cui ille Icon. Pl. p. 332. titulum fecit Keyri marinum flore candido: verum ea icon distituit foliis diuisis qualia suo Leucoio in descriptione Clusius tribuit.

Camer. hort. Leucoium marinum Clusii maius. Et apud Marth. germ. Leucoia iuxta mare reposita.

Pictura Hist. Lugd. quæ Leucoium maritimum maius vocat, facta est ad plantam siccam & agglutinatam, quam habemus ex Valerandi Doureæ stirpibus: inferior pars plantæ erat acaulis Leucoii (vt nobis videtur) maioris, rami autem cum floribus & siliquis adiuncti ex minori Leucoio marino.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 3. maritimum purpureum sinuato folio. Tabern. Icon. & hist. Leucoium marinum, maius purpureum 3. Groß braun Meer veyel. Gerard. Leucoium marinum purpureum Lobeli, purple Sea stock gilliflowers.

Locus & tempus

Obseruauimus ad mare Mediterraneum prope Mompeli flores Aprilis, ubi etiam Frater vidit flores Maio & Iunio. Gener. Cherlerus annotauit in toto Narbonensi litoreo tractu obuium: In Stutgardiano Ill. E.C. V. virt. horto, obseruauit flores adhuc Nouembri. Basileæ in horto Di. Zvingeri cum siliquis & flore Septembri. Ex semine provenit Moniberg. in horto quod excolimus pro Ill. E.C. VV. quod anno 1597. non tectum hiemem pertulit, ac saporis erat acris accedentis ad Raphanum, flore purpurascens vario, id etiam reponimus hyeme.

LEUCOII AFFINE TRIPOLIUM AN-

guillare, & Leucoium maritimum

Camerarii.

Descriptio.

Provenit Tripolium inter Scillam & Caribdim circa S. Georgium. Folia similia Planta-



gini, angustiora, & crassiora, exilit à medio caulis palmum alicuius tres ramos diuisus: flores similes Violæ matronalis: radix alba acris, odore Raphani, crassa, non odorata vt vult Dioscor. quia Crataeas legit raphanum simpliciter, quemadmodum & Plinius, vox igitur Leucoii est superflua: Anguil.

Camer. hort. Leucoium marinum aliud, Tripolium Aloisii siue Crucigera. Icon. p. 24. Leucoium marinum.

Icon Leucoii marini Camerarii non mihi videtur respondere descriptioni Anguillare, non enim sunt folia Plantagini similia.

LEUCOIIUM MARITIMUM angustifolium.



Radice crassa, lignosa, Descriptio. alba, cui plures crasse fibræ & plura capita esse solent, multi caules exoriantur singulares vel compositi, multo tenuiores & candidiores quam precedenti, palmares, dodrantales: folia breuia, parua, candida, nullo aut obscuro laciniarum vestigio incisa, quæ, vt ait Clusius,

mollia & incana, neque adeo crassa aut diuisa, flores in ramulis superiori (siue maiori) minores, coloris pulcherrimè rubentis, & dum flaccescere incipiunt saturatiore, quales Leucoii vulgaris rubri flores, & odorati quidem illi, verum minus superiores: siliquæ succedunt tenuiores multo, & breuiores quam in precedenti, teretes: semine copioso minutissimo rufescente.

Lobel. & Pena Adu. Leucoium marinum minus, vehementius acedine linguâ vellicans quam maius. Obseruat. Leucoium marinum minus flore purpurante. Hesperis Theophr. quorundam. Icon. Leucoium maritimum minus angustifol. Teut. 400. Clus. Hist. & hist. in fol. Leucoium marinum minus, quod ob coloris in flore mutationem nonnulli Mompeliani, dum istic essent Tripolium vocare solebant.

Hist. Lugd. Leucoium maritimum minus, radice

Tripolium

dice parua, breui, candida, foliis multis. Leucoium maximum minus Hist. Lugd. facili nobis persuademus idem esse cum minori de quo hoc capite agimus, quamvis figura multum differat: quæ fortè facta ad plantam primò florere incipientem, prima enim folia non videmus, nec scimus an à quoquam picta: quæ occaso vt ad nostram iconem addiderimus separatim, folia ex Hist. Lugd. Hoc præterea notandum Leucoii huius minoris superiores ramos pictos sub figura Leucoii maioris, vt antè dictum.

Tabern. Icon. & Hist. Leucoium marinum 1. Fleine rôtledete Meer Veiel. Item Leucoium marinum minus luteum: 5. Flein geel Meer Veiel: primo Leucoio simile, excepto colore luteo. Compilerator pro Leucoio luteo marino minore ponit iconem propositam à Clusio & Lobelio, qui colorem non tribuunt luteum: præterea Compilerator vidit luteum, quod alii alio colore viderunt: oportebat annotare locum vbi viderit, ac cur duas ponit figuras cum colore tantum differre dicat.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 5. maritimum latifolium: Lugd. Hist. maritimum minus. Leucoium 8. maritimum angustifolium, Clusio & Lobelio marinum minus, flore dilutè purpureo, quandoque rubro & luteo. Cur non separemus Leucoium maritimum Hist. Lugd. à maritimo angustifolio antè diximus.

Gerard. Leucoium marinum flore candido Lobelii, White Sea stocke gillflowers / & postea Leucoium marinum minus, Lob. & Clus. Small yellow sea stocke Gillflower. Gerard. icones Tab. habet: verum per priorem intelligit fortè Keiri marinum flore albo Lob. Icon. Pl. p. 332.

Dodon. de flor. Sylvestre quoddam Leucoium humile & paruum, quod in Zelandia locis exit maritimis, ac iuxta Monsipelum quoque vti Gellnerus scribit. Lat. in fol. Leucoium sylv. angustifolium, quod sub noctem odoratus est, & Hesperis esse creditur: quæ, Plinio autore, nocte odoratur. Camer. hort. Leucoium marinum minus.

Monsp. cum vidimus essemus iuxta mare Mediterraneū florens Augusto, frater C. Bauh. Maio & Iunio. Floret, autore Clusio, Iulio & Augusto eodem quo satum est anno, deinde perit: Nascitur Mediterranei maris littoribus per Hispanias & Narbonensem Galliam multò frequentissimè. Non modò Zelandia maritimis spontè nasci tradit Dodon. verum & in Narbonensi Gallia, ac pluribus per Hispanias locis maritimis Mediterraneis, cuius odor apud Hispanos sub noctem Occidente Sole intenditur, qui aliàs per diem exiguus.

LEVCOIVM MARINVM PARVVM folio viiente crassifol- culo.

Paruum sanè est Leucoium mihi marinum denominatum à D. Friderico Meyer stirpiū studiosissimo: cuius caules observavi tenues, palmates, folia perillosa rara, quædam vicia digiti paulò longiora, nonnihil sinuosa, succulenta, & crassifolia, glabra, virentia: flores latis magni pro herba proportionem, purpurascens, suc-



LEVCOIVM MARINVM CRETICVM
duplex.

cedunt tenues
filique: florens
vidi Argentinæ
in horto præ-
dicti mense Iu-
lio, & mense
Octobri. A.
Thoma Plate-
ro Medico et-
iam datum
est.

Iosephus Casabonus, ex peregrinatione Cretica redux, semen ad Clusium mittebat Leucoii marini appellatione, è quo tres diuersæ plantæ ortæ. Earum maxima & prima, caules habuit procumbentes, rotundos, durissimos, multis ramis donatos, in quibus flosculi quatuor foliis constantes, initio rubentes, deinde ex cæruleo purpurascens, extremo bifidis, & cordis, vt vulgò pingitur, effigiem propemodum referentibus, quasi ex umbellâ, Inonis vulgaris instar, sensim prodeuntes, qui vbi floris folia coniungebantur, radiantem imitabantur flauam stellam: floribus successerunt duarum fortè vinctarum siliquæ siue cornicula teretia, in quibus semen oblongiusculum castanei coloris. Ipsius verò plantæ folia longiuscula fuerunt: à Thlaspi foliis non valde differentia, nullis [in caule præsertim] evidenti-
bus crenis donata, crassiuscula, & aliquantulum amara. Altera priori similis erat, nisi flosculos habuisset dimidio minores, & initio prorsus albos, deinde tamen paulatim purpureum quidpiam contrahentes, sed nihilominus magis ad albedinem inclinantes. Floruit vtrique Iulio, medio Vere, hoc est, Aprilis fata. Tertia promebat initio præcedentibus duabus longiora folia, eui-
dentibus & conspicuis crenis secundum oras donata, Leucoii Dioscoridis Lobeliani instar, è quorum medio exiuit cauliculus rectus palmari altitudine minor: quum florere incipit, nempe Augusto, à latere verò plures fundebat ramulos, in quibus flores, secundo generi ampliudine pares, colore tamen differentes. Nam propius accedebant ad Leucoii marini Lobeliani latifolii colorem, magisque purpurascens erant, quàm in primo genere.

HESPERIDES FLORE PURPUREO, AL- bo & vario. CAP. XIV.


Radicibus aliquot parvis, lignosis, & albis nititur: caules eugens cubitum & plutquam sesquicubitum altos, hirsutos: in quibus alternatim folia Eruce, sed non ita laciniata, in ambitu serrata, acuminata, hirsuta, in virore nigricantia,

lapoze actiusculo: ex foliorum alis erumpunt ramuli, in quibus flores, formâ ad Leucoium luteum accedentes, odoris suauissimi, colore nunc albo, nunc purpureo, aliâs confusis cum albedine maculis purpureis variato: semen in filiquis longis continetur, ipsum oblongum, rufum, acre.

Fuchf. Leucoia, Viola alba, Cheiriz Keiri: Germ. *Viol.* Gall. *violier*, Leucoium Dioscoridis. Hæc ille, qui duas figuras habet, alteram nomine *Viola purpurea*. Frustra duæ figuræ: præterea mirum cum has vsque aded dissimiles plantas à Leucoio luteo, Leucoia facere.

Trag. Germ. & Lat. vocat Germ. lingua *winter Violent*, ed quod hyemem ferre possint, aut ad discrimen aliarum, *Gross Violent*: scribitque *Hermol. Persicam, Parthicam & Peregrinam* vocare. Quod si præterea hæc *Viola* radicem haberet nigram & instar cornu durum, facili dixerit *Aethiopida* Dioscor. Verum cum & in *Arcadia Aethiopis* nascatur tanquam peregrina planta, nihil statuere potest. Insignis sanè error *Tragi* existimant *Violam Persicam Hermolai*, quandoquidem is ibi *Gelseminum* tradit.

Trag. nos.



Gesner. hort. meminit nomine *Viola matronalis Fuchfii* [sed ficto ab eo nomine,] *Viola hyemalis*, *Brabantorum* moschabloomen, *Tigurrenium* vñst *Uegeles* & *Viola Hispanica Soleiri*: Aliquos interpretari *Hesperidem Veterum*: flores ferre anno secundo, albo, interdum roseos, aut quod rarius subrubentes.

Eruc.

Dodon. de flor. *Viola matronalis*, coloris candidi aut rubentis, dilutave purpurea, *Erucæ* species videtur.

Camer. hort. *Hesperis nostras*. *Lobelius* non placet dici *Violam marinam*.

Locus.

Consultè, inquit *Lobelius*, non faciunt, qui istam plantam *Marinam* *Violam* *Damascenam* & *Exoticam* vocitant, cum in *Nivobrigum* montosis & siluosis locis, etiamque in *Anglia* pratis fruticet. Obs. *Viola matronalis* & *Damascena*, *Viola alba* *Tragi*. Et alia, quam suauiss. odoris totamque minorem & floribus albis alit in horto *Ioh. Muttonis*. Icon. plant. *Viola matronalis* siue *Damascena* *Teut.* 493

Hesperis.

Clusius in *Pann.* & *Hist. in fol.* eandem cum *Lobelio* iconem habet pro *Hesperide inodora Pannonica* silu. De odorata autem alibi in lib. citatis ait: *Hesperidi* nomen inditum auctore *Theophr.* lib. 6. de causis plant. cap. 25. quod nocte plus redoleat, quam interdiu, cui iussragatur *Plinius* lib. 21. cap. 7. Communis opinio obtinuit, ut ea quam nonnulli *matronalem* *Violam* vocant, & quæ inter *Leucoii* genera referri debere videtur, *Hesperidis* nomen sibi proprium adscriberet: quoniam eius flos, sub vesperam præsertim gra-

Leucoium

to odore feriat, interdiu aut nullum aut leuissimum spiret. *Matronalis Viola* dicitur quod *matronis* atque virginibus sit in deliciis.

Violam matronalem vel *Violam* *Damascenam* & *marinam*, quorundam *Violam* *moschabellam* vocatam, albam & purpuream *Erucam*, *Thlaspi* aut *Rapunculum* gustu sapere scribit *H. Lugd.* quibus idcirco affinem naturâ & facultatibus proximam putat: cum tamen cum *Rapunculo* nihil commune habere videatur. Non bene præterea sub titulo *Viola Matronalis* albæ posita, icon *Leucoii* purpurei *Fuchfii*, ut antè de *Leucoio æstuo* monuimus.

Calp. Bauhin. phyt. *Viola matronalis* siue *Hesperis* prima hortensis: variat colore floris, modò candido, modò dilutè purpureo, modò rubro: habetur & minor floribus albis.

Schvv. Hesperis alba, *Hesperis* purpurea, *Prouenit* spontè in *Sequanorum* vallibus quæ *Rhenus* fluit sub sepibus, floret *Aprilis*, *Mai* & *Junio* mensibus. *Hesperides* vbique in hortis, *Tiguri*, *Basileæ*, *Ferrariæ* obseruauit: *Lugduni* & *Montibelgardi* copiosè, florentes adhuc *Septembri*, ubi hyemem solent perferre: *Patau* virentes *Decembri* & *Ianuario*: *Februario* florentes flore purpureo. *Genue* virentes *Ianuario*. Notatu dignum *Hesperidem* purpuream senescentem interdum mutare colorem, & varium pulcherrimum acquirere ex albo & purpureo striatum.

In *Syrupo Magistrali Comitisse*, præscribit *Wier. de Scorbuto*, succum è floribus *Hesperidis* expressum, cum alius vocans *Damascibloomen*. Sunt autem harum *Violarum* folia, gustu quidem acris & calida, *Erucæ*, cuius species videntur *Dodonæ* sapore & facultate proxima. *Matronalem* porro *Violam*, tussis, conuulsis, & difficulter spirantibus mederi traditur apud *Clusium*: vrinæ insuper & sudores propellere, incidere, abstergere, & digerere. Semen acre, fuscum aut rufellens, *Erucam*, *Thlaspi* aut *Rapuncium* [*Rapunculum* *H. Lugd.*] gustu tota sapit, inquit *Lobelius*, quibus idcirco affinis natura putatur.

ESPERIS PANNONICA INODORA.

Syluestre hoc *Hesperidis* genus, cubitali assuetudine, dudum generum foliis donatum,



infima ex angusta ceruice mox dilatantur, tandemque in acumen desinunt, sinuatis nervis prædita, alia lata, tessili- que basi cauli adnascuntur, utraque serrata, hirsuta, candidiora, molliora, que quam in *Hesperide* nostra vulgari: flores ex quatuor compositi foliis, colore exalbicante, vel purpurascens, formâ tamen vix cum subsequen-

quentibus longis torosis siliquis, *semineque* ruffo, cum vulgari hesperide conueniunt.

De hac Clusius: Vulgari Matronali Viola adeo similis est, vt ex vtriusque collatione vix discrimen conspici possit. Flores in extremis ramulis copiosi exalbidi, qui atatis successu purpureascent: cornicula, semina, radix etiam ipsa cum vulgari omnino conueniunt: solo floris odore, cuius in hac nullam gratiam percipere potui, differunt.

Camer. hort. & Icon. Hesperis Pannon. à Clusio exhibita. An Gesner. hort. Viola matronalis siluestris: Clus. Pann. Hesperis altera Pannonica inodora syl. hist. in fol. hesperis tertia, hesperis silu. Clusii icon est eadem cum Lobelii iconè Obliquam pro Viola matronali posuit.

C. Bauh. phyt. Viola matronalis, siue hesperis 2. silu. inodora.

Argentinae Dominus Vldaricus Chelius dedit plantam ex Agerti stirpibus siccis, cuius inscriptio erat, Viola matronalis seu Damascena Austriaca. Solet altero plerumque à germinatione anno, & à maturo semine, perire. Crescit passim Viennensis agro ad montium radices, & vinetorum in colibus sitorum margines. Floret cum vulgari, nempe Maio & Iunio.

HESPERIS FLORE VIRIDI.

IN horto quodam Basileæ legit Frater C. Bauh. Hesperidem, quæ magnitudine quoad omnes sui partes à vulgata differt, dein floris colore qui viridis est, & sine odore. Inscribitur idem ab ipso in Phyt. hesperis, siue hortensis flore viridi.

An Schvv. hesperis viridi flore, Viola matronalis viridi flore, Grün vinter Diolen, Iunio & Iulio florens.

HESPERIS COLORE INELEGANTI.



Basileæ in horto D. Chmieleccii collegi Hesperidem quam Clusii Alpinam primam denominabat. Folia serè sesquipalmum longa, duarum unciarum & semis latitudine, nonnihil sinuata, mucrone obtuso, hirsuta & aspera: flores quales in Hesperide vulgari, sed non expansi, coloris minimè hilaris sed pallidi, multis venulis distincti.

Sic describit Clusius, cubitali excreuit altitudine, multisque ramis prædita est, quos confuso ordine ambiunt folia, Matronali Viola similia, paulò tamen latiora, & crassiora, aridiusculo primum gustu, postea acri & saluam ciente, extremis ramis in oblongis pediculis insident flores similes, quatuor foliolis, vt illi, constantes, coloris

Tom. II.


admodum inelegantis & obsoleti, & fului, infinis venulis ex atro purpureis intercurrentibus, odore interdum nullo, aut adeo tenui, vt vix narius percipi possit, sed sub vesperam gratissimo & suauissimo: flori succedunt oblonga, torosaque cornicula quadrangula, in quibus duplici ordine semen continetur, vulgari hesperide simile, sub-ruffum: radix fibrosa.

C. Bauh. Phyt. Viola matronalis siue hesperis 4. montana pallida odoratissima.

Hesperis colore ineleganti prouenit in Horto Il. E. C. Montbelgardi Anno 1588. ex semine quod collegeram Stutgardia in horto Ducis: florem protulit Augusto eodem anno quo lata: & Septembri. D. Iacob. Mieg Medicinæ candidatus Basileæ nomine Keyri marini: Basileæ etiam obseruauit florens Septembri, in horto D. Dris Martini Chemeleci Poloni.

Radix vtp̄ plurimum biennium non superat, sed postquam defloruit & semen tulit, perire solet, si tamen præcis caulis ad frugem peruenire non sinatur, noua germina interdum producit. Spontè nascentem & semine prægnantem primum inueniebat Clusius in Prellaenberg Ham-burgensi monti vicino, Vngariæque extremo, quæ Austriam spectat, mense Iunio anni 1576. Eius deinde semen terræ commissum subsequente Vere, plantas protulit, quæ altero anno duntaxat floruerunt Maio, & sequente hieme perierunt. Solent verò quæ semine nascuntur plantæ, floris colore multum variare, nonnullis maternum colorem reuertentibus, aliis aut dilutiùs pallescentibus aut magis obsoletum adquirentibus, omnia tamen folia crebris venis ex atro purpureis distincta habentibus.

HESPERIS SYRIACA.



Dodranta. Descriptio
lia folia, aut minora, palmum lata, valdè aspera & hirsuta longis nixa pediculis, obtuso mucrone nonnihil in ambitu sinuata. Flores in breuibus caulis figuræ quidem nostratæ & vulgaris Hesperidis, sed colore fusco & lurido, multis venulis per eorum folia discurrentibus. Si-liqua insignis longitudinis se-

quantur recurra, torosa, semen duplici serie continentes.

Clusius dicit Hesperide iam descripta [quam nos flore ineleganti diximus] multò vegetiorem, ampliora habentem folia, crassiores caules maioresque flores, quatuor tamen foliis etiam constantes, eiusdem planè coloris, sub noctem valdè odoratos, interdum odoris expertes: Cornicula multò crassiora, semen paulò crassius: Radicem non multum abscilem.

Camer. hort. Hesperis Syriaca, quam alio no-

Ecc

minae vocant Leucoium Syriacum, Pannonica similis, sed crassior & minus procera, siliquis rotundis, & quasi geniculatis. Item Leucoium Syriacum, rectius Hesperis Syriaca.

Clus. Hist. in fol. Hesperis Syriaca.

C. Bauh. Phyt.

Viola matronalis siue Hesperis peregrina siliquis geniculatis. Camer. Hesperis Syriaca. Huius iconem proponit, & aliam etiam Hesperidis Syriacae nomine Tripoli sponte prouenientis addidit: verum non videntur diuersae, ut & ipsemet Camerarius innuere videtur. In horto Cl. D. D. Felicis Plateri legimus.

Locus & Tempus

Mense Iulio florentem vidimus & siliquas habentem Plotzheim Marchionatus in horto D. Grienninger Pharmacopaei insignis. Obseruauimus etiam in Ducatus Vviremb. Grentzen in horto D. Braun praefecti pagi. In Syria maritima crescit, teste Clusio, cuius semen in Italiam allatum, deinde Viennam missum plantas produxit. Semen maturescere non potuit, quia serius floruerunt. Altero etiam anno perire solet eius radix.

HESPERIS SYRIACA ALIA.

Descriptio

Hanc Tripoli spontaneam inuenit Rauuolus, & Camerarium quoque aridae plantae fecit participem. Videtur autem ob locos natales & exiccationem nonnihil strigosior praecedente, alioquin parum diuersa.

Camer. Icon. Hesperis Syriaca, siue Leucoium marinum D. Rauuolfii. C. Bauh. Phyt. Non videtur diuersa à praecedenti Syriaca.

LEUCOIVM MARITIMVM latifolium flore caeruleo purpurante.

Descriptio



Alterum Leucoium marinum quod alunt horti quidam Belgii natiuis maritimis natalitius, non ita diuersis est foliis, sed latioribus, hirsutioribus: flores caeruleo-purpureos in palmaribus & sesquipedalibus coliculis: semina in siliquis minoribus multo Leucoii lutei.

Lobel. Obs. [cuius & descriptio est]

Leucoium marinum alterum latifolium, Icon. Plant. Purpureum-violaceum.

Hist. Lugd. Leucoium marinum alterum latifolium Lobelii.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 6. siue maritimum latifolium alterum.

Tabern. Hist. & Icon. Leucoium marinum caeruleo-purpureum, Blauw purpür braun / Gros Meer veien.

Gerard. Leucoium marinum latifolium, Broad leafed sea flower. Glosflower.

HESPERIS ALPINA SIVE MVRALIS minor repens.

Radix Alpinae Hesperidis serpit oblique, summo ferè capite hærrens, fibras crebras subinde demittens, capita etiam plura habet: folia in orbem multa per humum sparguntur, ex angusto principio sensim latescencia, sinuata, & serrata, candicantia, & hieme quaedam rubentia, pilosa, Barba-



tae mutatae foliis accedentia, sapore acris praedita, atque per caules ceruuntur, lata basi eos complectuntur, non minus iam dictis dentata: cæterum flores in dodrantalis caulibus ramulorumque fastigio multi coaratu albicantes, quatuor foliolis constat, quos longa serie sequuntur siliquae, duas tunc vnas

longae, alias ferè sesquipalmares, angustae, compressae, in quibus duplex, interuentu membranæ, versus seminum foliaceorum ruforum, saporis acris.

Noster pictor non expressit pro arbitrio iconem nostram, potissimum radicem repentem.

Clus. Pann. & Hist. in fol. Draba altera, siue 2. missa ab Alphonso Pancio Leucoii montani nomine. Drabæ foliis foliorum formâ & colore similis, subacido sapore incho, deinde acris: ramulis serpentibus.

C. Bauh. Phyt. Draba 2. siue alba siliquosa. Draba 2. Clusii. Draba 3. siue alba siliquosa repens Lob. Obs. app. 463. & Icon. p. 161. tom. 2. Fratri Joh. Bauhino Hesperis alpina minor.

Hist. Lugd. Eruca muralis Herbariorum, sapore primo satuo, tandem subacti & mordaci.

Hesperidem alpinam collegi Septembri in rupibus inter Clarauallum & Ran: Semen etiam maturum in muris horti Castelli Claraualis: vidi etiam Salinis in muris horti Nobilis Vanserrant minorem florentem Aprilis. Frater Casparus Bauhinus misit Basileâ repertam in monte Blauwen. Lugduni nobis prouenit in horto nostro, Genevæ etiam florebat Ianuario & Aprilis ac Nouembri. Florens Maio copiose in muris S. Vrsanæ, vnde transfusi in hortum Ill. C. & floruit Martio. In parietinis, murorumque rimis & inter saxa nasci tradit Hist. Lugd. Inuenit in Tauro monte Clusius: meminit & Ferrariâ in Belgicâ ei missam: floret Aprilis.

Locus & Tempus

HESPERIDI ALPINÆ SIVE MVRARIÆ affinis Draba succulenta.

Frequentibus etiam ramulis constat, exadem radice prodeuntibus, tenuibus, deinde in caput

Descriptio



ior exit *caulis*, gracilis, quem per intervalla ambiunt & amplectuntur *folia* superioribus minora & ac petiolum latiora: *flores* spicae instar supremum caulem ambiunt, ut in Priore, & quatuor albis foliolis constant: quibus succedunt teretia & oblonga *cornicula*, duplici ordine, rufum, pusillum, & planum *semen* continentia: *radix* tenuis & repens latè se se diffundit, & nonas plantas singulis annis producit, viuas, & totà hyeme vi-


rens. Clusius & Lobelius eandem habent iconem, verum an de eadem planta scribant asserere non audemus, diximus autem iconem Clusii & Lobelii non malè exprimere nostram *Hesperidem* alpinam siue mutati, verum Clusii descriptionem non respondere nisi Lugd.

Arabis seu *Draba* altera Pena & Lobelii.

Clus. Pann. & Hist. *Draba* tertia succulento folio.

Crescit, inquit Clusius, in declivi montis Her-nalben, supra Zeehof, villam Cœnobii Gamin-genfis, vbi serò floret: at in hortos translata, maturis, cum precedente, nonnunquam etiam ante hiemem. Luxuriat in hortis vbi semel sata. Lobel.

HESPERIDI ALPINÆ, MVRIARIÆVE similis surrecta & magna.



Tom. II

IN montibus Inter S. Hip-polytum & Mesche mensis Aprilis sine ob-servavi plan-tam trium penè cubitorum, ex radice crassius-cula fibrosa, sa-pore aliquan-tum acri, exo-riuntur aliquot caules crassi, hir-suti, recti, su-pernè ramulos rectos alterna-tim inter folia proferentes: fo-lia iuxta terram ex crasso pedi-

culo dodrantalia ad *Hesperidem* vulgarem ac etiam murariam accedentia, sinuata, & nonnihil laciniata, *Drabæ* modò vtrinque hirsuta, alternatim lato principio caulem penè amplectentia, breviora precedentibus, odore accedente ad *Lepidium* Pauli, sapore amaricante: in extremis ramulis multi *flores* cum quatuor foliolis albis ad-luteum nonnihil vergentes, in medio apicibus, externè minimis foliis viridibus ambientibus, sili-quis succedentibus duabus vnciis longioribus, nondum maturis.

Hæc eadem est fortè cum *Hesperide* alpina maiore aut valdè similis, quæ Lugduni & Genevæ nobis provenit in hortis nostris, in qua sili-quæ plurimæ Leucoiorum ac *Hesperidum*, sex se-ptemque vncias longæ, latiusculæ, compressæ, glabræ, semine compresso, latiusculo & penè quadrato.

In Icone nostra folia prima nimis angusta & acuta depicta sunt.

De hac fortè hæc tradit Lobel. Communes in-ter Sinapi, Buniadem & *Thlaspi* figuram & vires habet. Provenit ea non procul Magdalenzano, & caulibus illis celsissimis Galloprovinciæ, flo-risque Augusto promit luteis, Erysimi, nec sili-quas dispares: in gracilibus ramis ad summum & imum vnâ è radice, digitum crassa, fibrosa, pe-dem longa *Rapistris* folia, *Thlaspi* aut *Drabæ*, leuter laciniata, albida & hirsuta, sapore Erysimi, aut Buniadis Barbareæ.

An Lob. & Pena Adu. Icon. Plant. & Hist. Sinapi & *Thlaspi* media Prouincialis plan-ta.

C. Bauh. Phyt. *Draba* 4. Erysimi flore & sili-quis Aduers. Sinapi & *Thlaspi* media. Fratri Io. Bauhino *Hesperis* alpina.

LYNARIA MAIOR SILIQUA RO-tundiore.

Bilbonac caule assurgit bicubitali & tricubita-li, in ramos diuiso, satis crasso, colore glauco aut rubente, hirsuto: *folia* Vrticæ, maiora ali-quando duplò & triplò, hirsuta, serrata, opposita interdum, aliàs ad ramulorum propagationes singulâri, sapore oleraceo: ramis indident *flores* multi simul iuncti, ut in *Brassica* vulgari, pulchrè rubentes aut carneo colore præditi, striati, odore debili, vngue, intus conspicuo & albicante, extrâ enim flos totus rubens, sine vllò vnguis vesti-gio: *stamina* quatuor virescentia apicibus luteis seu chlotis: hæc omnia excipit *calyculus* oblon-gus phœniceus è quatuor foliolis, duobus ma-ioribus, totidem minoribus compositus: *siliquæ* oblongæ, latæ, figura suauis, compressæ, filum summa parte emittentes argenteâ bracteolâ ex-teriores vtrinque laminas intercedente: *semina* tria aut quatuor orbiculata, compressa: *radix* stru-mosa seu glandulosa.

An Cordo Obs. Sylv. herba hederaceis aut Cu-meraceis foliis. Ibi annotatum, *Lunaria* Græca fortè.

Gesner. hort. *Lunaria* Græca rotunda & longa Ollingeri. Rotundam, inquit, intelligo, cuius si-liquæ sunt rotundæ: longam verò siliquis lon-gis. Nascitur in montibus quibusdam, cum alibi, tum Helueticorum circa Glaronam & Curiam: species duæ sunt, vna floribus inodoris: altera odoratis: & hæc quidem editoribus tantum lo-cis, nullo alio discrimine. Facile semine prodit, duratque in hortis nostris: & folia [*Violæ* nigræ

ferè similia maiora] per hyemem retinet. Anno secundo caulem fundit (& circumquaque fruticans latiore solo ad tres cubitos assurgit) cum floribus & siliquis latis, argentei nitoris cum maturuerint. In ea læuitate Lunæ faciem noctu representari aiunt : inde nomen. Quo Veteres nomine plantam hanc dixerint, nondum constat, herbarii quidam *Bolbonac*, alii *Bulbonach* nuncupant, nescio quâ dialectico aut significatione, Hælli *fluteren* vocant. Græca vnde sit cognominata nescio, nisi aut nomen aut res è Græcia in Italiam fortè primùm illata sit. Semen latum, compressum, rufum, & cum aliqua amaritudine acerrimum est: vnde Thlaspi generibus adnumerant, & Thlaspi montanum appellatur: ad indicandum simul formam, siliquæ præsertim ac seminis, facultates & natales, poterit

Thlaspi
montanum.



Thlaspinon
est

& Lunare cognominari. Accedit sententia mea: D. don. qui Thlaspi præsertim Crateuz, hoc esse putat.

Non esse Thlaspi Crateuz contendunt in Aduerf. Pena & Lobel. his verbis: Lunaria vulgò nuncupata Raphanius à nonnullis Crateuz Thlaspi credebatur, sed eius acrimonia ad Ichthidicos multò inefficacior: Et rursus alibi: Bulbosa foliata, Officinarum Bolbonac, Lunaria Græca Recentiorum, non est Armoracia, siue sylu. Raphanus Di. f. aut Thlaspi latifolium Crateuz.

Lunaria maior, inquit Camer. hort. Bolbonac aliorum, flore cœruleo vel purpureo, Thlaspi Crateuz Dodonæi.

Tabern. Icon. Viola Lunaris. 1. Monneyel. Schvv. Lunaria Græca Recentiorum, Silber blumen fluteren.

Hist. Lugd. Viola latifolia.

Helperis. Viola Bulbonac. Lunaria Raphan. Hesperidibus affinis est (inquit Adr. Spieg.) ea quam Violam latifoliam, alio nomine Bulbonacam, & Lunariam Raphanitim vocant: item quam Lunariam odoratam & regiam & Græcam. Vtique folia lata sunt: sed Bulbonacæ asperiora Raphani modo, & crenata. Græcæ verò molliora & per ambitum serrata. Vtrique flos quoque Leucoii quadrifolius, purpureus, aut subcœruleus: sed fructus latus, foliaceus, ferè quæ rotundus.

C. Bauh. phyt. Lunaria r. siue maior siliquâ rotundâ: varians floribus purpureis & subcœruleis. Lunaria 2. siue maior altera Dodon. Lat. minor præcedenti & flore albo.

Crescere copiosè in salibus Thuringiæ siluæ testis est Camer. hort. In Silesiæ autem hortis Maio & Iunio florere, Schvvencsfeldius. Lunariam maiorem in Allatia VVatvillæ in horto vidi cum siliquis rotundis, semine maturo: Patani in horto Triuesani. Veronæ in horto Domini Alexandri Serrati Medici: Ferrariæ in Mona-

Locus
Tempus.

sterio S. Dominici à l'Angeli florentem Martio: Bononiæ in horto di S. Saluator al burgo S. Catharina. Lunariam maiorem flore purpureo cum quibuldam stribus albis. Basilicæ in hortis, Florentiæ in horto Nicolai Ferrarientis florentem Aprilis: Lugduni habui in horto Maiis mensis florentem & siliquas profertentem: Montbelgardi in horto Illensis Celsi abundat & seipsam suo semine propagat, primo anno non fert caules nec floret: secundo vbi semen maturuit perit.

Calido acrisque & amaro, vt tradit Lobel. gustu est, præsertim semina. sed tamen radices acetariis, vt Rapuntia, manduntur, nec perinde sunt acres, vt Crateuz Thlaspi radices traduntur. Absstergit mollicè, calfacit, vinam cit, vt Rapunculus. Semen tritum cum aquis appropriatis exhiberi Epilepticis scribit Schvvencsfeldius.

Vires.

LVNARIA MAIOR SILIQUA LONGIORE.

Atis hæc est Lunariæ præcedentis foliis, serratis, acuminatiquæ: flos consimilis purpureus: at quæ eum excipit siliqua, oblonga est, & quæ prædictæ Lunariæ siliquis latitudine multum cedat, binis vtrinque membranis mediam argenteam spontè per seminis maturitatem relinquentibus.

Descriptio



Huius speciem cum siliquis longis ostendit Dominus Agnens cum hæc in scriptuone. Viola latifolia odorata folis exquisitè rotundis. Vitzæ proteriens Viola Lunaris seu latifolia 2. Tabern. Hæc latè videtur differre à præcedenti, folia Tiliam maiorem expriment, ac mihi lauiora videntur quàm cæterarum. Is

Lunaria folio rotundo siliqua longiora

etiam demonstravit aliam titulo Violæ latifoliz non exquisitè rotundâ sed oblongâ: illi sanè foliis multò longioribus Lunæ modo, qualis autem siliqua sit mihi non constat, videtur tamen diuersa ab ea cui nomen indidit à siliqua rotundior.

Lunaria folio longiora

Lob. Icon. Lunaria Raphanius, siue Bolbonac radice redituina p. 396.

C. Bauh. phyt. Lunaria 3. siue maior siliqua oblonga.

Tabern. Icon. & Hist. Viola Lunaris. 2. Monneyel 2. Violæ Lunariæ 2. radix.

Gesner. hort. & de Lunariis, Lunaria longa siliquis longis. Existimo ea quæ ex Gesnero capite de lunaria maiore siliqua rotundior exscriptus huc referenda esse.

Schvv. Lunaria Græca perenni radice, waldsvetelen, Sile.

Ciuf. in fol. Viola latifolia, Lunaria odorata. Camer. hort. Lunaria maior alia flore albicante odorato, perennis Heluetiis, vbi quoque copiosè proerit.

Thal.

Thal. Harc. Lunaria Græca, Viola latifolia filiquis non orbiculati ambitu circumscriptis, sed oblongioribus: scribit apud eundem Camerar. perenni esse radice, & floribus albicantibus, odoratis.

In monte Saleuz, non longè à Geneua abundat cum longis filiquis: translata in hortos hieme non perferebat, & virens Ianuario, florebat Maio. In monte circa Lacum Seben Abbatiz insignis nobilium Dominarum quarum sum Medicus, reperi cum filiquis Augusto. Spiræ anno 1595. Iunii 2. D. Teugenagel mihi denominauit & demonstrauit Lunariam, quam vocat perpetuam radice, floribus cæruleis, filiquis longis. Argentinz in horto Friderici Meier vidi filiqua longa Octobri. Basileæ in horto Dom. Zvingeri Septembri eandem obtulerunt. In montanis siluis Austriæ & Styriæ vicinarumque siluosis locis, atque etiam in Pannonia interamni, autore Clusio, spontè magna copia prouenit.

Semen abstergit & vrinas prouocat. Quidam in Heluetiis Chirurgus ex Lunariæ perennis confutis foliis & Saniculis parabat vnguentum Vulnerarium non contemnendum. Pulvis feminis amarissimi, cum aqua appropriata exhibetur in Epilepsia, Camer.

ALLIARIA.

CAP. XV.



EX radícula tetenui, lignosa, alba, Allium obolente, caules promit cubitales & sesquicubitales, tenues, subhirsutos: folia primum rotunda, Hederæ terrestres modo: mox nonnullum acumen assequuntur, serrata, sapore & odore Allii, mitiore: ex foliorum alis ramuli erumpunt, in quibus *stoculi* multi albi-

di, quatuor foliolis constantes, in quorum medio apices ex viridi flauescetes: semen in filiquis longis angulosis, nigrum, oblongum.

Ruell. & Fuch. Alliaris & Alliaria. Sunt inquit is qui putet Scordotum hanc esse, falsi quadà odoris cognatione: siquidem Scordotis foliis est similitudine Quercus. Alliaria verò frondibus Vitiæ modo fimbriatis: Illa quadrangulo caule, hæc rotundo: illa flore subrubro, hæc luteo: Illa tantum subolet Allium, hæc ita repræsentat, ut iusto Allii odore nares impleat.

Trago, pingenti & describenti dicitur Thlaspidium secundum Crateuz, videtur posse dici Cornuta Thlaspi species.

Autor Pandectarum Ranam marinam, Alliarium, & Pedem Asinium vocat.

Anguill. Rima Maria.

Lonic. vulgò Alliaris, Alliaris, Thlaspi Cornuta.

Gesner. hort. Alliastrum vel Alliastris Recentiorum.

Dodon. Gal. & Lat. Alliaris quorundam Scordotis, non tamen vera, quæ etiam Scordium dicitur. Querunt Adu. Lobel. & Penz. Num Cista Galli Herbariorum sit *Androsogon*? an num potius Alliaris Recentiorum? & postea Alliaris, *Pes phos.*

Asini Pandectarum, an Alektorolophos Plinii? Matth. Lacun. Lob. Obl. & Icon. Plant. Camer. hort. & Epit. Matth. Tabern. Cast. Hort. Lufit. *Alliaris*. C. Bauh. Phyt. foliolatissimo & subrotundo. Camer. apud Matth. Germ. *Alliaris*.

Alliaris Lat. Germ. Knoblauchkraut / leuchel, Nomina leuchelkraut / Salskraut. Belg. loof / Sonderling, loof / Gall. L'herbe des aux, Alliare: It. Alliaris, Boh. Gesenowa hylina. Alliaris autem dubio procul dicta, quòd folia digitis comminuta Allium redolcant, seu Porrum sectium cum Nasturtio.

Alliarium copiosè florentem vidi Monsp. mensis Martio & Basileæ. Geneuz virentem Decembri versus Cologni, & Februarii principio, quæ itur Saleuz, florentem mense Martio in colle iuxta Rhodanum, & Maio filiquas ferentem Iunio cum semine maturo. Montbelgardi passim spontè prouenit etiam in horto E. C. virens Febuario. Obseruaui Bononiæ & Patauui mense Martio. In Ducatu Virtemb. non longè à fonte & Balneo mirabili circa pagum Boll & Eyfelberg / semine maturo Augusto.

Vrinam cit, teste Ruellio, si recens in potu teratur. Sicca in vino coquitur, ad serpentium mortuus, & venena omnia efficax. In rosionibus stomachi, dysenteria, contumacibus vrinis, ex multa duobus denariis datur bibenda. Lentam pectoris crassitiem digerit. Contra veterè rûssim ex resina & melle sicca lingitur. Longis præcordiorum inflammationibus cerato collecta prodest. Podagras acri aceto circumlitas mulcet. Imposita mentes excit. Vetera vlcera purgat & ad cicatricem ex melle perducit. Recentia quoque vulnera cogit farinæ conspersus. Excrecentia in corpore compescit. Alliaris commodè totius succis, quæ embammata seu intinctus vocant, adiungitur, debet autem aceto, sale, & gingibere condiri. Eiusmodi certè embammata, quæ hoc pacto vt diximus ex Alliaris conficiuntur, non sunt nimium feruentia, & Tragi quidem iudicio gratiora ac etiam vtiliora his quæ ex Sinapi sunt, multò tamen illis mitior & vsu commodior existit. Vis plantæ huic à Matth. assignatur calfactoria & deficcatoria, verum non adeo vehemens, vt in Allio. Attamen hinc certò colligi potest, quòd ea crassos humores extenuare, & lentos incidere valet. Semen emplastri modo impositum, vuluæque admotum mulieres vteri strangulatu oppressas liberat, & excitat. Semen tritum, naribusque impositum sternutamenta excitare cerebrumque purgare Tab. prodit. Herbam in oleo & aqua decoctam potè Asthmaticis subuenire scribit Cam. Sunt. Dod. testimonio, qui folia enematis incoquant, quæ vel ad coli, vel nephriticos dolores iniiciuntur: in quibus non modò status insigniter discutere, sed ex calculo dolores mitigare ac sopire feruntur. Excalfacit autem & resiccit secundo ordine intenso aut tertio remisso. Alliaris singularem vim ac proprietatem, quæ putredini aduersatur, habet. Eademque vlcera putrida ac fordida abstergit & mundificat, minori tamen cum efficacia quàm verum Scordium, Mirum igitur nemini videri debet, si nonnulli antiquorum Arabum præcipuè pro Scordio vero Alliarium sub-

Locus & Tempus.

Vires & vsus.

Locus.

Colligendi
tempus.Succi pra-
paratio &
reformatio

Sal ex ea

Vfus

stiterint. Causa fortè fuerit quòd Scordium in illis regionibus minimè creuerit, neque nisi sicum & vt plurimum obsoletum haberi potuerit, & Alliaria apud ipsos prodierit. Sed quia in exicata herba parum facultatis & virium remanet, idcirco ipsis in fine Aprilis aut ineunte Maio colligi, & postquam per diem vnum in vmbra exicata fuerit, minutim incidi contundique in mortario, & praelo succus exprimi solet, qui in vitreis ampullis, superinfuso pauco Oleo, etiam ad tres vsque annos referuatur. Idem quoque sartagini succus infusus lento igne inspissari potest & ad eundem vsum in multis annos referuari. Magma deinde exiccatum & in cinerem reductum, aut ex eo Sal extractum maximo cum fructu mundificationis admiscetur. Succus verò siue simplex inspissatus vnguentis cataplasmatibusque inditur ad Gangrænam aliaque vlcera, putrida, fordida ac maligna, vt in tractatu Fabricii Hildani de Gangræna & Spacelo videre est: Abstergit enim, vt antea monitum, mundificat & putredini resistit, parumque à vero Scordio discrepat.

SISYMBRIUM CARDAMINE, SIVE Nasturtium aquaticum.

Descriptio



Nasturtium

Senecio

ERUCA facie folia proferit viridia & attrouitenta, sapore hortenſis Nasturtii, mitiore: caules proceri, ferè, striati, concaui, ex viridi rubentes nonnihil: flores quadrifolii, albi, apicibus lateis: filiqua oblonga, bene habitæ: in quibus exigua semina, fulua, gustu acria: radicis vicem supplent, capillares fibræ candidæ, quas à caulibus imis demittit. Variat, inquit C. Bauh. hæc prout humidioribus, aridioribusque locis enascitur: illud foliis ferè Terebinthini magnitudine: hoc triplo minoribus, quamuis viribus non discrepent: sic & tenuioribus foliis & simplicibus cauliculis locis siccis reperitur.

Sisymbrium irio, teste Dioscoride, sunt qui Cardaminem, alii Sion etiam appellant. Est verò herba aquatica, quæ in iisdem quibus Sion locis provenit, Cardamine idem nonnullis dicta, quòd gustu Cardamum, id est Nasturtium, repræsentet. Folia primùm rotunda prodeunt: augeſcentia verò Erucæ modo ſinduntur.

Plinio (qui cum Sisymbrio priore Dioscoriconfundit, vt videre est n. n. g. lib. 28.) vocatur Sisymbrium in riguis natum, simile Nasturtio. Palsim verò ab omnibus hæc planta traditur.

Ruellius magnâ confidentiâ scribit neminem negaturum fore Sisymbrium Dioscoridis, esse Nasturtium aquaticum Officinarum & vulgi *Cresionem*.

Cordus tradit Sisymbrium hoc alterum Dioscoridis solo nomine priori simile. Nam Nastur-

tij potius quàm illius speciem esse. Quapropter etiam à Græcis *Nasturtium* Nasturtiarum & à German. *Brin* ferè vocari, monèque Recentiores maximo errore Senecionem appellare.

Nasturtium aquaticum (referente Trago, Germ. & Lat. lib. 1. cap. 26.) *ayonapdu* quidam appellant, quamuis ad pratenſe videatur hæc appellatio referenda. Iacob. Manlius Nasturtium agreſte, Saturagi, Senation, & Lepidion vnius & eiusdem plantæ nomenclaturas esse cenſet. Non defunt (inter quos Simon Ianuenſis est) qui Nasturtium hoc Thapsiam Indam, Sceſſabram, Ozimū, Carmenū, Hoalmarā, nūcupatā velint, Lombardi (teſte Mālio) Crifonū nomināt. Meſue Scifabram, Ozimum maius, Serapioni cap. 73. Ozimum carmenum dicitur. Sunt qui Nasturtium aquaticum, Nasturtiarum Cardaminem, Sisymbrium, Sium & Lauer appellant. *Tragus* autem eorum ſententiæ ſubſcribit, qui Sisymbrium alterum Dioscoridis, Nasturtium aquaticum aut certè eam plantam eſſe affirmant, quam is Sion non odoratum, Crateas autem *ſion*, & Plinius Thymbrum appellauit, qui ſit vt Sion exiſtimet. Sed malè. Eſt enim Sion ipſius non odoratum, Anagallis aquatica, de qua ſuo agemus loco.

Autoribus Monachis, alterum Sisymbrium à Dioscoride deſcriptum quod eſt aquaticum, quòdque vulgò *Cresionem* & *Cresionem*, & Nasturtium aquaticum nominant, aliqui Cardaminem quaſi Nasturtiarum ſtatuant. Nonnulli etiam [vt Dioscorides tradit] Sion.

Auicenna vocat iſtud Pupillam oculi, & Erucam aquæ, & Apium aquæ, & facit de eo caput quod eſt de pupilla oculi. Sed exiſtimauit idem eſſe cum Sio: quia fecit aliud caput, quod inſcribitur de Sumio, vbi B. Illunenſis pro Sumio vertit Sium, & pro pupilla oculi *Charealham*: vt ſupra quod eſt pupilla oculi: Et ſequitur: exiſtens in aquis ſtans, & in ipſo eſt bonus odor, & dicitur in cap. de Cif. &c. In cap. de Caſ. autem ſcribendum *Charealham* præſatum, quod eſt Pupilla oculi. Ergo ipſa duo capita ſunt vnum & idem, vt legenti non eſt dubium.

Quibuſdam hoc Sisymbrium aquaticum falſò Lauer dicitur.

Erant Simon Ianuenſis & Pandectarius ſcribentes *Cresionem* eſſe Dioſc. Senecionem.

Iouert. in Præſ. ſua vocat Senecionem aquaticam.

Falli dicit eos Matth. qui pro Sio herbam *Cresione*, vulgò vocatam, tam ſcilicet dulcem, quàm acrem, ac ſubamaram, in medicamentis vſurpant. Quippe quòd ea non alia ſit planta quàm Sisymbrium aquaticum, quod, Dioscoride teſte, aliqui Cardaminum, alii Sium appellant. Piſtūram huius Sisymbrii, vel Nasturtii aquatici habet Matth. ſine floribus & ſiliquis, huiusque ſummitates videtur appinxiffe ſuo Sio. Camerarius ad hiſtor. Germ. aliam poſuit figuram cum ſiliquis & floribus.

Anguill. dicitur Vella (cuius mentio ſit in lib. *Vella* Goſimpl. Gal. attributis) nihil aliud eſſe, quàm Sisymbrium 2. à Fuchſio piſtūram, quod eſt 3. Matthioli, Sium Crateuæ, Sisymbrium 2. Dioscoridis, quòd notum ſit in Italia ſub nomine *Cresione* & Senecion Serapionis. Conſiderandum tamen in Nasturtio aquatico ſtorem eſſe album, Vellæ verò tribui ſtorem violaceum, vt monuimus cap. de Vella.

Dodon. Gall. *ſion*, Sium, Lauer, Gall. *Cresion aquatique*. Lat. in ſol. Nasturtium aquaticum. Sion Crateuæ. Lonice. Sisymbrium, Cardamine *Grecorum*

rum, Nasturtium aquaticum, Offic. Lacun. Sifymbrium tertium, Sifymbrium Cardaminon: Cronemb. de comp. med. Alterum Sifymbrii genus, Cardamina. Io. VVeyer. Nasturtium aquaticum maius, Marc. Hurfch. Nasturtium aquaticum minus, Græcis *μαύρον καρδαμύνην*, dictum Scorbuto *δι' ἀποψύσσον*: Eusch. Roessl. Nasturtium aquaticum, Senecion. Cæsalp. Sifymbrium aquaticum.

Hist. Lugd. Sifymbrium Cardamine 1. Cressio vulgaris Matthioli.

Cratæz Sion Erucæ folium, Nasturtium vulgi [sic enim Adu. Lob. & Penz inscribunt,] quia non perinde odorato est gustu, vt Dioscoridis Sion, minisque medicato & acri sapore, idcirco Plebecula Nasturtium aquaticum; Cratæus etiam *ὀξύς*, id est, paruficiendam dicit. Huius varietas duplex, vna minor æqualis fermè Dioscoridis Sioni siue Lauci, cui conuictor, & similis eatenus, vt non rarè rustici vitramuis pro vtralibet accipiant. Hoc Sifymbrium ni fallor vocant alibi Adv. Cardaninem aquaticam & Betulam. Icon. Plant. p. 209. Teut. 150. Tabern. Hist. & Icon. Sifymbrium aquaticum, Græcè *καρδαμύνη*. Lat. Sion aquaticum, Nasturtium aquaticum, Anagallis aquatica, Sifymbrium Cardamine, Lauer: Ital. *Gorgolestro*, Gall. *La Berle*. Hisp. *Rabacas*. Mium lac. Theod. tot miscere nomina diuersarum plantarum: confundit cum Nasturtio aquatico nomina eius plantæ, quæ à plerisque Anagallis aquatica dicitur, quæ Germ. *Wachspüngen*: & Gall. *la Berle* dicitur.

Gerard. Sium minus, Smal water Cresse. Græc. *σίον*. Lat. Sium alterum & Sifymbrium, saporis est Nasturtii satui. Nescimus quid venerit in mentem Gerardo vt poneret iconem Sifymbrii aquatici. 1. Tabern. cum dictis nominibus Tabern. quod deterius, cum mox tribuere nomina Nasturtii aquatici Sio medio siue Pastinacæ palustri Tabern. ac id denominare malè Nasturtium & Sifymbrium aquaticum.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium aquaticum primum *μαύρον καρδαμύνην* aut *καρδαμύνην* Diosc. & Plinii fortè lib. 20. cap. 22.

Σίσυμβριον ὀξύς seu *καρδαμύνη* Diosc. Sifymbrium, Cardamine, siue Nasturtium aquaticum: Germ. *Brunnfress* oder *wasser freß*: Belg. *waterkerse*: Galli. *Cresson*. Ital. *Sifenbro aquatico* & *Cressione*. Hisp. *Berros*, aut *Agriris*. Angl. *Water cresses*. Boh. *Kicicha* potocuy.

Sifymbrio montes plerique scatent, inquit Plinius, sicut in Thracia, vbi aquæ deferunt ex iis auulsos ramos, seruntque. Item Sicyone ex suis montibus, & Athenis ex Hymetro. Simili modo & Sifymbrium ferunt. Latissimum nascitur in puteorum parietibus, & circa piscinas, & stagna. In fontibus calidioribus aquæ supernatare, ac Maio mense ingruente flosculos admodum exiguos & candidos proferre, testatur Tragus. Sifymbrium Cardamine siue Nasturtium aquaticum abundat circa Geneuam, vt in *plain palais*, vbi tota hieme viret iuxta fontem, ac eo in acetariis vtuntur. Obleruauit in Italia inter Veronam & Castelfranc. Monspelii vidi cum flore Martio mense. Montbelgardi mulas in locis prouenit ac tota hieme viret, floret Iulio & Augusto.


Excalfacit, autore Diosc. vrinæ mouet, ac crudum etiamnum estur. Purgat etiam lentigines ac vitia cutis in facie à Solis ardore contracta. nocte tota impositum & matutindè detractum. Efficax est teste Plinio, aduersus aculeata animalia, vt sunt crabrones & similia. Sedat capitis dolorem:

Item Epiphoras. Alii panem addunt, alii per se decoquunt in vino. Sanat & epinyctidas, cutisque vitia in facie mulierum intra quartum diem, nobis impositum, diebusque detractum. Vomitiones, singultus, tormina, stomachi dissolutiones colubet, siue in cibo sumptum, siue in succo potum. Non edendum grauidis, nisi mortuo conceptu. Quippe etiam impositum eiicit. Mouet vrinam cum vino potum. Quos vigilare opus sit, excitat infusum capiti cum aceto.

Galenus Sifymbrium Cardaminem dictum, sicum quidem, tertii ordinis calescientium ac siccantium esse dicit: humidum verò & vitiè secundi.

Cum Raphano & Petroselinæ radicibus secto, ex albo meraco & butyro calefacto, calidèque pubi admoto, vrinæ educit ac trahit, Matth. Sincipiti illito veterinos inuat & præsertim fo-liorum succo. Quod Plinius scripsit: quos vigilare opus sit excitat infusum capiti, cum aceto: Matthiolus ait succum cum aceto naribus impositum id facere: dicit ex sententia Plinii vitandum grauidis, quia nimidum pellat. Plebecula vt tradit Lobelius in quadrageno veris ieiunio multum in acetariis vorat, ac potionibus ad cal-culum accipit, nec malè cedit. Hæc herba ait Camer. in hist. Matth. est ex iis, quarum vtilis vltus est in obstructionibus & putredine hepatis & lenis, idè non solum hydropicis valdè vtilis, sed multò magis iis qui laborant Scorbuto morbo vulgari Saxonibus & Septentrionalibus, si per aliquot dies in potu detur.

SISYMBRIUM CARDAMINE, SIVE
Nasturtium aquaticum flore
maiore elatius.



Nasturtium hoc aquaticum caules habet infirmos graciles, canaliculatos & veluti intortos, cubitales & bicubitales, in ramulos aliquot circa summitatem diuisos: in quorum extremis flores simul multi vt in Nasturtio pratensi, eadèque ferè magnitudine, pediculis semuncialibus & longioribus,

inodori, albi, quatuor foliis constantes, apicibus purpurantibus, stilo viridi: quibus succedunt filiquæ longæ, in quibus semen: folia ex interuallis alternatim in caule & ramulis disposita odore & sapore Nasturtii vulgaris, nonnihil amariçante, alata, quorum singularia segmenta intervallo distantia, oblonga sunt & sinuata, atriplicis syluestris ferè modo, infima verò vbi primum prodeunt, rotundiora, vt in Iberide Fuchii. Radix repit, hinc inde demissis fibris tenuibus.

Figura nisi iam facta fuisset meliorem curassimus parandam: Hanc autem plantam propter

*Nasturtium
aquaticum
amarum*

magnam similitudinem cum *Sisymbrio*, *Sisymbrium* & *Nasturtium* aquaticum vocamus. De hac fortè *Thalin* *Harc.* sequentibus agit: *Sisymbrium* alterius secunda species, seu *Nasturtium* aquaticum, amarum, priori omnino simile est: nisi quòd grandius paulò assurgat, ac folia magis acuminata, longioraque habeat, & nigriora: saporis vehementer amari, ita vt prioris modo in mentas recipi non possit, nisi decoctum, iuribus tamen prioribus abiectis tamdiu donec amaritudinem omnem deponat. Hoc autem antequam caulescat folia exhibet rotunda, ampla admodum, duarum ferè vnciarum. Ac vtraque species non rarè iisdem in locis simul & semel reperitur.

*Camer.
no-
tatur*

Sion alterum sic vocante & scribente *Camer.* ad *Hist. Germ. Matth.* J abundantiæ riuulos & locis humidis, potissimum in siluis, vbi vt plurimum reperit, caule tenero, lato, *Nasturtii* fontani tenuiore & delicatiore. Item in lib. *Icon. siue Epit. Matth.* Sium vulgare. *Ital. Sio falso.* An *Matth.* intellexerit per Sion quod olim pro vero exhibebat & postea pro falso, eandem plantam quam *Camerarius*, consideratione opus habet. In icone *Matthioli* flores minimi, folia *Apiorum* modo diuisa. In icone autem *Camer.* (quæ quoad folia potissimum, minus placet) non ita diuisa, flores etiam maiores: nos igitur quod antè diximus, *Iconem Matth.* figmentum ex diuersis plantis censemus. Hoc etiam hîc notandum, descriptionem *Camerarii* posse conuenire cum *Sisymbrio* *Ca:* damine minore.

Sinapi.

An *Trago* *Nasturtii* aquatici genus, *Sinapi* sextum flore albo in littoribus & ad fossam gustu subamaro.

*Nasturtium
riuale.*

An *Gesner. hort.* *Nasturtium* aliud riuale circa saxa riuorum *Stein* *fressch.* A cerum *Nasturtii* aquatici genus siccius dumulque & acius. Item in cat. *Nasturtium* *tylv.* *fressch. hort. Steir.* *Stein* *fressch.*

*Cardamon
agron.
Lathul.
Sion.*

An *Lacuna* *Sisymbrii* aquatici alia species maior, vulgò dicta *Borrazas*, quæ reformidanda, quia aliqui eius esu mortui.

C. Bauh. Phyt. *Nasturtium* aquaticum flore maiore. Sium vulgare *Matth.* Sion *Matthioli* & *Italarum* *Lobeli.*

C. Bauh. apud Matth. *Nasturtium* aquaticum alterum, quod amarum est & vltra cubiti altitudinem assurgit, foliis magis acuminatis, de quo *Thalys.*

*Locus &
tempus,*

Nasturtium prædictum obseruau copiosè ad riuos vallis *Grisbachianæ*, vbi fontes acidi, & apud fontem acidum *Bibelsaw*, aliquid amaritudinis & hirsutiei vbi obseruau. Vidi præterea inter *Röslingam* & *Pfulingen* in Ducatu *Vvirtembergico*: inter *Malsmunster* & *Raupack*: inter *Bessfordia* & *Daniutia* ad ripam fluminis, florens *Aprilis* & *Maio*. *Frater Casparus* misit aliquando collectum *Basileæ* ad riuos: Semel etiam vidimus, non longè à *Molendino Montbelgardi*, iuxta flumen.

SISYMBRII CARDAMINES SPECIES quædam insipida.

Descriptio *Caules* multi cubitales ac maiores, striati, glabri, caui: *folia* dodrantalia alternata, foliolis constant in alæ propinodum formam digestis, aliis aduersis, aliis alternatis, ad communem costam geminè pinnà caules complexi annexis, vncialibus, ad *Sisymbrium* *Cardamines* flore maiore fo-



Matthiolum hanc intelligit per *Vellum Anguill.*

An *Casalpino* *Accipitina* altera similis primæ (siue *Seriphio* *Germanico*): foliis crassius diuisis, ad *Nasturtium* accedentibus, minoribus: flosculis candidis, filiquis prælongis & tenuibus. Descriptio *Casalpini* in quibusdam conuenit cum nostra planta.

Vidi in horto *Di. Friderici Meyer* *Argentinae*, vbi pluribus annis ad maturum durat, florens *Mai*o, vti *Montbelgardi* in horto *Il. E.C.* vbi plantatur.

*Locus &
tempus.*

SERIPHIVM GERMANICVM SIVE SO- phia quidamdam.



Alta est *Acubium* aut *sesquicubium*, compluribus ramis fruticans, duris, lignosis, in alas multas diuisis, tereubus, subhirsutis: folia tenuiter incisa, *Abinthii* *Pontici* officinis dicti, sapore oleaceo, leui acrimonia prædita: flosculi crebri, parui luteoli, quadripartiti: quibus succedunt filiquæ vnciam circiter

longæ, filii instar tennes, seminum loculos foris ostentantes: ipsum verò semen minutum, rufum: Radix alba.

De hoc *Tragus*. Nihil refert, inquit, siue species *Abinthii* sit, siue *Abrotoni*. Si *Diosc.* non diceret *Seriphium* in *Egypto* provenire, existimarem esse nostram *Wormfrucht*, ac hoc pro eo vterer, vocabo *Seriphium* *Germanicum*, & *Lumbicorum* herbam. In *Bauaria* & *Hassia* semen hoc *Wollfamen* appellant.

Gesner. hort. *Nasturtii* genus *tylv.* quod *Mols* *famen* vocant.

C. Bauh.

C. Bauh. phyt. Nasturtium sylv. Monophyl-
lon latiore & angustiore folio reperitur, quare
duas figuras habet Tabern. Thalictri nomine, sed
Diosc. non est: nec etiam Scirpium Abfinthium
veliqui volunt.

Tabern. Icon. & Hist. Thalictrum, Herba So-
phia latifolia, Sophienfräut Mänlein. Thali-
ctrum, Herba Sophia angustifolia, Sophien-
fräut weiflin. Hactenus aliqui Sophiam existi-
matunt verum Scirpium, aut Abfinthium mari-
num, sed errant. Est verum Thalictrum aut
Thalictrum Antiquorum. Herba Sophia quibus-
dam dicitur Eruca geratina.

Dodon. Gall. Thaliectron, Thalicetron & So-
phia.

Aduers. describunt ac dicunt, sitne Sophia
Chirurgorum Thalicetrum Diosc. Sophia vulne-
raria apud Septentrionales. Paracelsus nullum
non vlcus, se ea percuraturos pollicetur, q. d. di-
cerunt at Chirurgis practicis, qui ætate Guidonis
& Petri Argelatæ vixerunt. Quarit & Lob. Obs.
Eruca Geratina dicta Italorum an Sophia Belga-
rum: an num potius Matthioli Erysimum? Idem
alibi figuram habet hæc scribens, Sophia Chirur-
gorum sitne Thalicetrum Diosc. Aduers. p. 329.
Thalicetrum Dodon. vel num sit Eruca gerati-
na Italorum? Perperam Scirpium germanicum
Tragi, Fuchsi, & Cordi, Icon. plant. p. 735. Teut.
901.

Apud Fuchsin Hist. Lugd. impressa pictura est
sine descriptione cap. 124. hoc titulo: Nasturtium
sylvestre. Oportebat apud Fuchsum relinquere
figuram cap. de Abfinthio, existimabat enim esse
Abfinthium Scirpium quod apparet ex filiquis,
quas attribuit Scirpium, qua in re merito repre-
hensus Matthiolo. Lonicer. seu in fraut, welsa-
men / habicht fräut / Scirpium, vulgò Accipitri-
na, Officinis Santonicum, Ital. Seme santo, Gall.
mort des vers, Hisp. Semiente lumbrizes. Sophiam
describit, & depingit si contulisset Santonicum
Officinarum, siue semen Gal. & Hispanicè ab hoc
denominatum, vidisset se confundere duas plan-
tas.

Hist. Lugd. huius figuram habet sub titulo
Thaliectri Dodonæi, confundens hoc cum Thali-
etrio Antiquorum. Cæsalp. Accipitri-na vulgi.

Scirpium germanicum, quibusdam, siue So-
phiam copiosam, obseruauit Tubingæ & Stut-
gardie Ducatus VVirttembergici, vbi præceptor
meus Fuchsius vocabat Nasturtium sylv. Basileæ
etiam florens Iunio, propè S. Iacobum proueni-
re annotauit Frater C. Buhinus: Semine matu-
ro Octobri abundè vidi iuxta Castellum Flori-
mont siue Blumberg. Genevæ multam & ex se-
mine deciduo virentem mense Martio. Mont-
belgardi est mihi fata in horto Ill. E. C. florens Iu-
lio. In Sabaudia frequens circa muros & rudera
vidit Gesnerus. In veteribus maceris, locis ru-
deratis, lapidosis, ac non rarè arenosis, ac aliis
incultis exit, vbi semel nata singulis facillè recur-
rit annis. A Iunio in Autumnum vsque, & qui-
dè participatim, floret: semen interea perfici-
ens.

Facultate, eodem tradente, Sophia rescicans &
adstringens est, & particeps alicuius frigiditatis.
Semen huius assumptum ventris fluores sistit:
aduersus dyfenterias commendatur: sanguinis
profluuia reprimat. Cæsalp. ait: Semina laudas
ad lumbricos necandos, ab iis puto, qui ad Scir-
pium referrebant.

SIVM SEV LAVER MATTHIOLO siliquosum.

CAP. XVII.

Quandoquidem Matthiolus videtur habere
Sium, quod fictitium, lubet particulatim om-
nia recensere quæ in suis in Diosc. Commentariis
annotauit.

Sium legitimum Diosc. in scaturientium fon-
tium riuis, quorum aquæ hyeme calent, ætate
verò frigidescunt, plerumque nascitur, à nostrati-
bus Senensibus vulgò vocatur Gorgolestro, pin-
guis est planta, caule recto, foliis latis, in ambitu
ferratis, Olusatro similibus, sed minoribus & odo-
ratis, floribus candidis, semine corniculis incluso.
Rari admodum sunt fontium riui, quibus aquaticum
Silymbrium innatet, qui Sium etià non habeant.
Plin. Sium cum aquatico Silymbrio confudisse vi-
detur: quòd Sio Silymbrii aquatici vires assigna-
uerit, nominis fortasse communitate deceptus.
Nam Dioscor. testimonio Silymbrium hoc, quod
aliqui Cardaminam vocant, nonnulli etiam Sium
vocant, vnde, quòd fortè existimauerit Plinius
Sium & Cardaminam vnam & eandem plantam
esse, vni tantum Sio vtriusque facultates reddidit.
Serapio Sium Senacion vocat: Græcis σίον: Lat.
Sium, Mauritan. Rot cathalmi & Inhamchanelle,
seu Hamchanelle. Germ. wassermerck: Hispani
Rabacas, Galli, Berle. Item in Epit. Lat. edita
anno 1571. eadem Icon cum sequenti titulo &
descriptione. Sium vulgare, Italis Sio falso, caulem
edit striatum, ramosum, inanem, tenerum, fragi-
lemque: folia gerit Apii, non infusua, flosculos
in summitate albos, semine corniculis incluso,
paruo, mirutoque: radice supernacanea. Pro-
uenit tantum in aquis decurrentibus, atque, vt
Sion verum excalcificans est facultatis, quæ ta-
men imbecillior illi est, quàm legitimo Sio.

Matthioplus præter modò dictum Sium sili-
quosum, in sua Epitome iam dicta aliud proponit
ymbelliferum, cui tribuit nomina, quæ Siliquoso
Sio tribuebat. De ymbellifero autem suo capite
agemus: Sium siliquosum cum descriptione reti-
net Matthiolus anno 1583, in com. cum magn. fig.
quamquam icon sit nonnihil mutata, folia mi-
nùs rotunda, nec ita ordine ferrata, præterea non
addit Sium ymbelliferum: In com. Ital. cum magn.
figuris 1568. icon est Sii siliquosi, sub titulo Sii
vulgaris: mutauit nonnihil descriptionem, omi-
sit enim quæ scripserat de corniculis, & aliam
præterea posuit iconem Sii ymbelliferi sub titulo
Sii veri. In Hist. Germ. 1563. cum magnis figuris,
Sii siliquosi iconem nonnihil mutatam habet, de
qua modò dictum, additis his nominibus Bach-
pungen / wasser merck: Sium. Ital. Sio & Gorgole-
stro. Gall. Berle. Boh. patoc viif. Descriptio eius
non conuenit cum iconè, tribuit enim in ea ym-
bellas. Nomen Bachpungen solet attribui Ana-
gallidi aquaticæ siue Boccapunge quorundam.
Si liceat nobis candidè dicere quod sentimus, Ico-
nem cum corniculis ac siliquis falsam censemus,
& tres plantas per Matthiolum confundi, & Mat-
thiolo euenire quod reprehendit in Plinio &
aliis, & confundere Nasturtium aquaticum cum
Beccapungo & Sio ymbellifero.

Camer. ad epit. Matth. pro Sio vulgari Mat-
thioli ponit iconem nostri Silymbrii Cardamine
dicti floribus maioribus, & in Hist. Germ. pro

Matthioli
errores pla-
ræ.

Camer. not.

Sio altero : quod non probamus, vt paulò pòst dicemus: præterea in Hist. Germ. pro Sio & *Wassferm* [omisso nomine *Bachpungen*,] & in Epit. pro Sio veto posuit Sium *umbelliferum*, de quo inter *umbelliferas*.

C. Bauh. not.

C. Bauh. apud Matth. pro Sio vulgari siue secundo, ponit iconem Tabern. quæ Matthioli iconem imitatur, verum eam plantam dicit esse *Vellam Galeni*, Anguillæ, quæ nihil aliud est quàm *Nasturtium aquaticum* vulgare, de quo antè egimus & postea agemus. Is præterea pro Sio vero iconem ex Tabernam. posuit quæ Sii *umbelliferi*, de quo dicto loco. Ad hæc quid Lobelius dicat, videamus: Sion Matthioli & Itatorum, inquit in Obs. prouenit riguis & riuiis, vbi Cardamine folio ad *Nasturtium hortense* & Cardamine accedente. Cauliculi pedales & interdum cubitales. Flores albi, & Cornicula Sii Cratæ, gustanti acres: Plurima hæc Taurinis Pedemontanis collium & montium rinulis, vbi collegimus cum Petro Rapalino pharmacopæo Triuerensi simplicium peritissimo. Hæc Lobelius. Sed quam plantam intelligat, nescimus, is habet iconem Matthioli, quam nos sciticia censemus, ut antehac dictum à nobis, nullam sanè nouimus plantam affinem Cardamini, cui folia sint Apii modo, qualia demonstrantur in iconè Sii siliquosi Matthioli. Nostra *Sisymbrii Cardamines* species in siliqua accedit quidem ad iconem Matthioli, si folia Apiorum essent diuisa: præterea desinitur sapore aliquo insigni aut manifesto.

Lobel. not.

Sisymbrii Cardami. not. species insipida.

Apiorum essent diuisa: præterea desinitur sapore aliquo insigni aut manifesto.

SISYMBRIUM CARDAMINE HIRSVTVM minus flore purpureo.

Descriptio



Radices proferunt multas capillatas, tenues, folia ferè similia *Nasturtii* aquatico, mollia, pilis ornata, sapore *Nasturtii*: caules multos didrantes ac etiam minores, in principio nonnihil hirsutos, *stefan-* paruos albos, quibus superueniunt *siliques* multæ longæ, tenues, in quibus tenue semen fuscum:

Reperi: etiam, ni fallor cum cubitalibus caulibus, inferius rubentibus, striatis, hirsutis, maioribus etiam foliis videtur in humidioribus locis variare.

Nasturtii aquatici tertia species.

Considerandum an *Thalius* de hac scribat. *Sisymbrii* alterius seu *Nasturtii* aquatici tertia species, nullam habet figuram: offendi extra aquas, loco opaco, ultra *Vulkenridam*, radice candida, lignosa, citris plurimis oblecta: circa quam in terræ superficie densa, foliorum rotundiusculorum, nigrorumque prioris speciei paulò minorum, congeries latè dispergitur, ex quorum medio caules oruntur plures, cubitales ferè, folia oblongiuscula: continentes, ac flores frequentes,

candidos. Semina huic siliua sunt in oblongis siliquis striatisque siliulis. Hæc ille.

In peregrinatione Rhætica collegi plantulam quam nominabam *Nasturtium*, longa siliqua, folio rutaceo, florebat & siliquas longiusculas incipiebat proferre Iulio, duas vncias circiter alta, radicibus tenuibus fibrosis: quæ sanè planta an sit diuersa vel eadem cum præcedenti asserere non ausim. De ea autem hæc *Frater Phyt.* *Nasturtium* 8. siue alpinum matinum 2. siliqua longa obseruavi inter plantas *Frattis* Io. Bauhini. Doctor. Theod. Collado *Lautannensis* Medicus ex Rhætia attulit quod palmatitudinem æquat, foliis *Rhæfæ* vulgaris. *Nasturtium* 3. aquaticum minimum. Cardamine 49. Dalech. variat magnitudine fortè ratione loci, nam in aquaticis maior est, in *Vinetis* verò *Wilenfibus* riguis, vbi copiosè obseruauimus, minor multò, vt & *Pataui*no.

C. Bauhinus apud Matth. in *Diofcor.* addita noua iconè sub titulo *Nasturtii* aquatici minimi, diuersum facit à *Sisymbrio* aquatico altero Matthioli, ac mutata, ni fallimur sententia, quæ erat in suo *Phyt.* vbi tradebat *Nasturtium* 8. alpinum minimum secundum siliqua oblonga, pro duabus plantis: vnam tantum nunc facit, ac sic de ea tradit. *Nasturtium* minimum siliqua longa, quod ex radice tenui, fibrosa, caules rariùs palmares, sed minores, tenues, striatos emittit, circa quos folia oblongis pediculis donata, pleraque tripartitè diuisa, quædam tamen in partes quinque, vel *Rhæfæ* vulgaris modo diuiduntur. Flores obtinet albos, tenues, in summo comantes, quibus succedunt siliquæ longæ, angustæ, exiguo & lubet semine resectæ. Variat ratione loci in aquaticis namque planis maius, in *Vinetis* riguis *Wilenfibus* miliari *Basilæ*, longè minus reperitur, cuiusmodi & *Pataui* obseruauimus. Prouenit etiam in alpinis locis humidis. Dicitur Cardamine quarta Dalechamptio, *Sisymbrium* aquaticum minus, *Camer.* apud Matth.

Matth. in *Diofcor.* edit. anni 1554. *Sisymbrium* aquaticum alterum: vbi icon sine descriptione. Epit. *Sisymbrium* aquaticum minus, Ital. *Crescione minore*, folia & caules edit longè minores ramulis numerosis: floribus pusillis, tenuibus, albicantibus, in cacumine tantum comantibus, non solum in riguis & aquosis prouenit, sed etiam in hortis & secus vias. Imbecillus est altero: namque minus calfacit & siccit: vbi verò alterum non sic ad manus, hoc vt præstabit. In com. cum magn. fig. addit esse sapore acuto. Idem in Ital. cum magnis Icon. In Hist. Germ. *Nasturtium* aquaticum 2. brun. fræ 2. Si Matth. eandem plantam nobiscum intelligit summities in *pi-aura* non placent, & denique tota icon.

Camer. in hist. Germ. Matth. & in Epit. omittit Matthioli iconè aliam substituit pro *Nasturtio* 2. aquatico. Placet autem hæc *Camerarii* melius quàm *Histonæ* Generalis ideò, assumpsimus.

C. Bauhinus, vt pòst dicetur, Matthioli *Sisymbrium* aquaticum hoc alterum idem facit cum *Iberide Fuchiana*, quod nobis non satisfacit.

An Lobel. & Pena Aduert. Cardamine siue alterum *Sisymbrium* *Diofcoridis*. A Cardamo, cuius acrimoniam velcentibus refert, dicta Cardamine fuit, veluti *Helleborine* ab *Helleboro*, tametsi propiùs accedit *Craux* Laueri, siue *Nasturtio* vulgari aut vero, quàm *Diofcoridis* Sio, aut etiam quàm *Sisymbrio*: etsi *Diofcorides* *Sisymbrii* fecerit speciem tribuentem quidem nominis plantæ menthæ hortensi similitudine, atque hinc

huic aquaticæ; ansæque Plinio confundendi
vires Laueris atque huius Sisymbrii, quod Sion
etiam vocant. Est enim fontem limpidorum
que rivulorum sectatrix hæc vbi Sion, sed tota
tenella, gracilisque: folia promensima, strata latius,
in nerueis cauliculis rotunda Erucæ, aut
aquatici Nasturtii vulgaris: quæ autem in caule
sesquipalmari vel pedali angustiora multo sunt,
etiamque hortensis Nasturtii diuisura: floribus
summis albidis, acris gustu, ac in acetariis tamen
minoris commendationis. Dubii sumus quam
plantam intelligat Lobelius: apud Matthiolum
quem citat, est icon Sisymbrii aquatici alterius
cum flore minuto & copiosiss. umbellam penè
referente, verum Lobelius in obseruat. icones
longè diuersas proponit floribus paucis & magis,
quæ Iberidem Fuchii expriment de qua
paulò post.

Gerard. Cardamine latifolia, Great lobde
schmoek. An Gesner. Nasturtium in vineis nascens
quod Rabbreschdy appellant, foliosum, acre, Fe-
bruarii florens.

Lacur. in Diosc. figuram habet Matthioli sub
hoc titulo, Sisymbrium Cardamine.

Hist. Lugd. Sisymbrium Cardamine 2. Mat-
thioli. Item paulò post: Cardamine 4. Dale-
champi, Cardamine minima aquatica. Figura
Cardamines Dalechampi quodam modo placet,
& melius quàm Matthioli, verum melior Came-
rarii quam exhibemus.

An Iacob. Theod. Icon. & Hist. Sisymbrium a-
quaticum 2. Brunfres. 2. Figura est Matthioli in
qua summitates non placent, vt dictum, si ea-
dem sit cum nostra.


An Gerard. qui iconem habet Matth. ex Ta-
bern. Cardamine latifolia, Great ladie smocks.

Paschim Montpelu prouenit, vbi flores & sili-
quas profert mense Februario & Martio. Patavii
quoque copiosè proueniens obseruauit, & Gene-
uæ [vbi in acetariis vtuntur,] paschim & maximè
inter pontem Arue & Lanti florens Aprili: Plan-
tas similes siccas habui à D. Tho. Platero Med.
Basileæ collectas. Hanc quoque Cardaminem
reperi, aut saltem simillimam maiorem prope
Masmunster loco vmbroso iuxta aquam ad mu-
ros, & in propinquis montibus secus torrentes,
vt in monte Rotsberg virentem mense Octobri:
Fuert eadem, ni fallor, reperta Iulio cum siliquis
in peregrinatione mea Rhætica redeundo Bur-
mo, & in monte Vvesen Heluetiæ, cuius odor
tunc mihi videbatur esse Alii.

IBERIS FYCHSI, SIVE NASTURTIVM
pratense siluestre & flore pleno.

C A P. XVIII.

Eradice tenui & alba multiq[ue] fibris capilla-
ta, caulem profert singularem dodrantalem,
rectum, teretem, glabrum, & quasi contortum,
iuxta terram rubentem, qui in ramis diuiditur,
in quorum summitate flores simul multi vel albi
di purpurascetes, quatuor foliis obtusis veno-
sis constantes, in quorum medio stamina lutea
fena cum stilo: quibus succedunt siliquæ oblon-
gæ, atropurpureæ, semen continentes: folia duum
generum, inferiora enim per terram sparguntur,
rotunda, ex longis & tenuibus pediculis, in
quatuor quinq[ue] aut sex foliola rotunda diuisa,
ad costam per intervalla adhzrentia: superiora
verò quæ in caule sunt, quaterna aut quina, sine



καρδαμίνης, ἀγροκαρδαμίνης, Galeno & Paulo alio
nomine Lepidion: Iberis, Nasturtium agreste
Latinis, Germ. Gaißblüm, Gall. passe rage aut
Nastor sauage: non aliâ ratione quàm quòd ple-
rosque, qui in illius notitiâ nondum peruene-
runt insatiet: posse etiam commodè Germ. dici,
wilder fress: Dicit præterea manifestum fieri ex
flore lacteo, hoc est, ex albo purpurascete, her-
bam cuius picturam exhibeat esse Iberida: Fuch-
sium autem falli facile cognoscent, quibus nota e-
rit vera Iberis, & qui hanc contulerint cum Ve-
terum Iberide.

Dodon. Gall. figuram habet ac describit: dicens;
σισυμβριον καρδαμίνης. Lat. Sisymbrium Cardamine,
quibusdam etiam Sium, Gall. passe rage sauage,
aut petit cresson aquatique: Germ. Gaißblüm, wilder
fress, & wiser fress/ Belg. Coecksbloemen
& Cleyn water fress. Herbariis quibusdam flos
Cuculi. Nasturtium aquaticum, non est Iberis, vt
quidam existimant.

Gesner. hort. Dodonæi Iberis, Nasturtium pra-
tense quoddam sylu. Item in cat. plant. Iberis,
Agriocardamon καρδαμίνης, fortè Stein fress
sich.

Gualtero Ryffio est Iberis, sed planta quam i-
cone exhibet, non placet, nec nomen additum
Steinfressich.

pediculis cau-
li adnexa, in
tenuis por-
tionculas qui-
nas, septen-
nas, & ter-
denas ad co-
stam vique
dissecta. Sa-
pore est to-
ta Nasturtii a-
quatici.

Trago in-
scribitur Na-
sturtium pra-
tense, gaisch-
blüm, Nastur-
tium 3. Ait por-
rò posse voca-
ri Agriocarda-
mum & Na-
sturtium agre-
ste: non au-
tem quòd Dra-
bam suspica-
tur, multò mi-
nus quòd sibi
persuadet ex
Nasturtio a-
quatico siue
Sisymbrio pro-
creari, vbi se-
men eius per
inundationes
in prata reici-
tur: quot sunt
oblectio prata
& vitidaria quæ
non aluntur
fluminibus, &
tamen ea plan-
ta abundant.

Fuchsius al-
erit, quod vo-
cetur Ge. Iberis;

Galeno & Paulo alio
nomine Lepidion: Iberis, Nasturtium agreste
Latinis, Germ. Gaißblüm, Gall. passe rage aut
Nastor sauage: non aliâ ratione quàm quòd ple-
rosque, qui in illius notitiâ nondum peruene-
runt insatiet: posse etiam commodè Germ. dici,
wilder fress: Dicit præterea manifestum fieri ex
flore lacteo, hoc est, ex albo purpurascete, her-
bam cuius picturam exhibeat esse Iberida: Fuch-
sium autem falli facile cognoscent, quibus nota e-
rit vera Iberis, & qui hanc contulerint cum Ve-
terum Iberide.

Ad Cardamines siue Sisymbrii alterius genera referendam meminit Cluius ante multos annos ab Alfonso Pancio missam Machliniam *sanchula* folia nomine.

Eam commodius Lobelius inter Cardamines recensuit, trifoliamque cognominavit, de qua in Obs. hæc scribit: Cardamine trifolia, quibudam hortis cultiorib. repertu facilis, Nasturtii Cardamines gustu & facie plantula palmaris Sisymbrii Carda. sed posito terno, Oxys Plinianæ ritu, humi procumbente. Flos in pediculis albus lopyri vulgaris aut Cardamines. Radix multum fibrosa.

Inscribitur à Clusio Cardamine alpina. trifolia: à Lobel. Hist. Lugd. & Gerard. Cardamine trifolia: Tabern. Icon. & Hist. 3. C. Bauh. Phyt. Nasturtium alpinum trifolium.

Inuenit Clusius in siluosis montibus, nudo solo potius quam herbofo, ad Abietum & præaltorum arborum radices, tota hyeme etiam virentem. Floret Iunii, in cultis verò etiam Aprilis.

Anno 1571. Iulii 7. inter plantas siccas Aggerii Argentinae reperi plantam [nullo tamen ascripto nomine] quæ optimè respondet figuræ Clusii posite inter Pannonicas pro Cardamine alpina trifolia.

IBERIDI FVCHSII ALIQVATENVS SIMILIS Cardamine Dalechampii odorata.

Cardamine odorata radice est, crassiuscula, sensim gracilescente, dodrantali, granulis plurimis candidis, & Coriandri semine non maioribus, tuberosa, albæ Saxifragæ modo, multum fibrata, foliis Sisymbrii Cardamines Dodonæi, humi striatis, amplioribus, nigricantibus, gustu acribus, sed odore cum manduntur tam suauis, vt ad Cinamomum accedat: flore ac fructu est Nasturtii.



Hist. Lugd. Cardamine odorata 5. Dalechampii: seu Nasturtium odoratum, quidam Callitichon Plinii lib. 25. cap. 11. esse putant.

In Sequanorum siluis, Abietibus & Picis confitis, Cardamine odoratam vidit Dalechampius musculo solo.

IBERIDI FVCHSII VEL NASTURTIO aquatico affinis Cardamine alpina media Clusii.

Cardamine alpina media; siue 2. Clusii sine figura, habet folia in orbem disposita, duorum digitorum transversorum longitudine, profundioribus crebris incisâ, & laciniata, vti in Sisymbrio cardamine, siue Nasturtio aquatico Tom. II.

vulgò nuncupato, hirsuta & aspera; superne veluti cinereo colore aspersa, inferne verò viridiora, sapore primum acido aliquantulum, deinde calidiusculo: ex quorum medio prodit cæculiculus dodrantalis aut amplior, tenuis, albos flusculos in in summis ramulis ferens: deinde siliqua teretes, paruas: semini obseruare non licuit: radix longiuscula est, albâ, quibudam fibris capillata.

Nascitur in Styria inferioris scopulis ad Monasterium Neuberg[quod Alpium iugo illi imminenti nomen imposuit] in Styria inferiore. Florebat Augusto.

MYAGRVM VETERIBVS.

CAP. XIX.

Myagros, quem aliqui, Dioscoride distantes, Melampyron vocant, herba est ferculacea. (apud alios de cremorum genere Syriac. legit Plin. rapum dicitur ferulacea) bicubitalis, foliis Rubia similibus, pallidis: semen verò gerit Fœnogræco [sic Ruell. & Sarracen. vers. Lat. Sed hic in Græca pro Fœnogræco, malè quædam dicit, collo simile, retinet] simile, pingue.

Non eadem omnino Plinius tradit: Myagros herba ferulacea est, foliis similis Rubia, tripedanea, semine oleosum, quod sit ex eo.

Paulus Agin. lib. 7. locis duobus diuersis de hac eadem planta egit: ac priore quidem Myagros [quasi Mulsipulam diceret, siue Mulsariam, quæ insidentes, siue præteruolantes muscas glutine suo implicet] appellat: posteriore verò Miaron (quod impurum significat & sordidum, cuiusmodi Melampyrum est) nominat: hic quidem Dioscoridis, illic verò Galeni ipsissima verba referens. Quare Cornarius hoc Pauli loco Myagros vbiq[ue] merito legendum censet, & non Miaron; quod alia non sit herba à Myagro, ordinemque lectionis hic perturbatum esse, vt primum habeatur Myagri semen, deinde interpositis quibudam sequatur Miaros, quæ eadem sit cum Myagro, & sic restituendum esse ordinem.

Cæterum Melampyri nomen dubium puto, ac ei euenit, quod multis aliis nominibus, vt vnum de pluribus plantis dicatur:

Præterea hoc loco fortè etiam legendum; vt admonet Cornarius, quædam Myagros, vt etiam habet Paulus Agineta lib. 7. cap. 3. Vel dicendum Melampyrum aliud Diosc. aliud Galeni, cuius meminit lib. 1. de alim. & Theophrast. quod vocatur à Cornar. brandewitzgen, Triticum nigrum, Ingetum est, quid intelligat Diosc. lib. 3. cap. de Cratægonon, per quædam Myagros, vbi Plin. habet lib. 7. c. 3. spica Triticæ, & Theophr. lib. 9. Myagros, quod Ruellius lib. 3. cap. 64. suspicatur corruptum, Cornatio idè asserente, reponuntq[ue] Melampyron. Fortè non intelligit de Myagro, quod mihi videtur verisimile; communius enim, vt puto, nomen apposuisset, videlicet Myagri, sed de Melampyro Theophr. & Galeni, quam meam opinionem augent Plinii verba cum dicit. Cratægonum spica Triticæ simile est, multis calamis ex vna radice emicantibus, multorumque geniculorum.

Myagri semine, inquit Diosc. torrefacto & iusto, virgas oblinunt, iisque Lucernarium vice videntur. Cæterum, hoc pingui (oleo) corpore scabritas expoliri, læuigariq[ue] constat. Galenus scribit Myagri semen pingue esse: nam, si tundatur, oleosum quid effundere, quod emplasticam vim habeat: Diuersam ab his facultatem tribuit

Plinius huic oleo, nempe quod medetur oris ulceribus eo perunctis.

MYAGRVM DICTVM CAMELINA.

Descriptio

EX vno caule cubito aliores rami, tenues, erectes, recti, subhirti, fungosa medulla facti, ramosi: quibus alternatim latiore basi adnascuntur *folia* Drabæ, oblonga, mollia, non aspera, & Rubiæ cui Myagrvm Dioscor. comparat, pallida, pinnis caulem amplectentia, leuiter in ambitu serrata, sapore oleraceo: Ex pediculis satis longis, flores pusilli luteoli, quadrifolii: quorum singulis singula succedunt pericarpia gigantis Vuaræ aliqua-tenus similia,



turgidula, oblonga, cum quatuor angulis vel costis, *semina* continentia multa, oblonga, triangularia, Nasturtio minora, coloris fere Fœnugraci, saporis Nasturtii, quæ in ore retenta contrahunt mucilaginem quandam: *Radix* vbi adoleuit lignosa nonnihil & fibrosa.

Nostra figura officinarum deprauata per Sculptorem: male enim omittit pinnæ caulem amplectentes: flores nimis magni.

Tragus Linariam veram vocat, Linariam quintam, seu Quintam Linariæ speciem facit, scribens eam passim inter Lina reperiri, ac Lino ad id similem existere, vt ab illo vix separari possit. Hanc potè à Ger. Dort. i.e. Zizaniam, communi omnium vitiorum, quæ inter segetes enascuntur nomine appellari: esse Pseudo-linum: Ruri in agro Vormatiensi Soler frat. & in Alsacia Frimmel & Kuel dic.

Idem postea lib. 2. cap. 15. ait. Plantam superiori libro inter Lunarias quinto loco descriptam: Sesami genus esse statuo. Tamen descriptio Sesamæ, quæ apud Theophr. lib. 9. extat, huic nostræ plantæ non per omnia respondeat, vt rarè stirpem inuenias, quæ vno & eodem modo à diuersis Scriptoribus depingatur, hæc tamen obstare non potest quominus Sesamam nostram agnoscat. Hæc ille, qui etiam inuuit Plinii Sesamum, ac etiam Columellæ, nec non Dioscoridis vt & Theophrasti: Titulus in Hist. Lat. figuræ est Sesamæ, Germ. flachs Dort. In Germ. Sackreht. unde gemin flachs traur / Sz sunst flachs traur / Linaria vera, siue quinta. Sed quæ Obsecro tanta similitudo Sesamæ Tragi cum Lino vt vix separari possit: ipsa figura Tragi monstrat magnum discrimen, qui viderint Sesami plantam & semen, nunquam concedent Trago, hanc plantam esse Sesamum Dioscoridis, Theophr. & Plinii, vt ipse sibi falsè persuadet. Præterea Tragus non animaduertit non ubique receptam hanc stirpem, quod infra patebit ex Ruellio.

Anguill. Myagrvm Diosc. in Italia quibusdam in locis *Senenzina*, in aliis *Durella* dictum.

Lobel. & Pena Aduers. quibus Myagrvm, Germ. & Gall. *Cameline* dicitur, quod quidam minus Sesamum putarunt, scribunt ineptire Senensium, dum doctis nullâ melioris historię commentatione aduersetur, Pseudo nesciunt quid intrudens, quæ Vacaria videtur,

Dodon frum. describit dicens: Cameline, Germ. flachs Dort. & Lem Dort. Gallis *Cameline*. Officinæ præterque Sesamum appellant, oleoque huius pro Sesamine vtuntur: est cereale Erysimum, quod à Galeno ac à Theophrasto *Erysimum* appellatur. Eadem quoque tradit in fol. vbi Camelinam siue Myagrion vocat, siue Theophrastæ Erysimon, & Myagrion Dioscoridis. In Hist. Gall. lib. 4. cap. 35. depinxerat & descriperat, ibi vocabat *Linum triticum* Theophrasti, Linum triticum.

Falli autem eos qui Myagrvm Dioscoridis non agnunt, arbitrantur esse Sesamum, testatur Gesner. horti, qui primus mihi hanc plantam pro Myagrō monstrauit, nec video quidquam quod magnopere repugnet.

Lacum Sesamum. Lonic. lein Dort. aut flachs Dort. Græcè Pseudolinum, Officinæ Sesamum.

Vt autem eò clariùs ostendatur, quàm cæcè Ruellius in Hist. Myagri circumagatur, potior rem eius historię partem duximus ascribendam: Melampyron, inquit, est Triticum vitium esse Galenus fateatur, eius tamen exortu degenerare, nihil incommodi sentit. Hoc Siculo Triticum peculiare fecit Theophr. Granum tamen innocens, nec sicut Lolium graue, ac caput tentans. Herba proficit tripedanea, surculosa, foliis Rubiæ pallidis, semen colli figura, oleosum: totum hoc vt Dioscoridi placet, tundunt &c. frequens Sueffionibus meis semine in colli speciem exportata: rura nostra Cameliam vocant, de qua in Myagro nonnihil letiam erit dicendum. Myagrvm siue Melampyron herba surculosa, semen Fœnugraci &c. Myagrvm herba Plinio ferulacea &c. Hinc rusticum in Gallia serunt quamuis & suæ spontis inter segetes inueniatur: Melampyron ideo Græcis quasi nigrum Triticum dici crediderim. Nostri vocant Cameliam aut Camaminam, semen senniculo simile in vtriusque conceptum. Fateri cogit oculata fides, semen *triticum* hoc est Fœnugraci, non *triticum* i.e. colli, vt in quibusdam legitur exemplaribus] similitudinem referre &c. Considerent lectores an Ruellius non confundat duas diuersas plantas. Quod enim Cameline Myagros sit inquit Cornar. nondum satis probauit Ruellius. Melampyron esse illa non potest. Manet Myagros herba adhuc ignota, siue Melampyron siue Melampicon, eadem etiam vocetur. Mirum Ruellium priore loco semen colli figura dicere: deinde posteriore refellere. Meretur sanè Ruellius reprehensionem Corsarii: dum tribuit suæ herbæ diuersas figuras feminis.

Est hoc Matth. in prior. comm. Sesamum quorundam. Ceterum etiam hanc plantam pro Sesamo exhibuit, quod varia herbariorum de eo sit sententia: Sibi quidem, vt ingenuè fateatur, pro legitimo Sesamo non placet quoddam historię refragetur, quam de Sesamo Theophr. & Plinius tradiderunt, sed ea saltem ratione depingi curauit, vt lectores admoneret, quod ea notis veri Sesami non respondeat, quodque in manifesto errore versentur, qui secus opinantur. Eadem repetit in post. com. latinis cum mag. fig. omittit tamen iconem. Ait præterea in post. comment. Ital. scribere quidem Ruellium, Myagrvm nasci in Gallia,

à suis vocari Camelinam & Camaminam, se tamen non audere Ruellio subscribere, quia hactenus non videtur Myagrū in Italia. Ceterum eos haud dubie falli crediderit, qui putant vulgare illud aurei coloris semen, quod aliqui Drodam, Drodellam alii, nonnulli verò Dorellam dicunt, legitimum referre Myagrū. Is figuram ex prioribus com. ademptam huc reponit, ac præter iam dicta subdit. Non desunt præterea qui plantam, quam Pseudomyagrū appellauimus, legitimum esse contendunt. Verum hæc Rubiæ folia non gerit, sed Glasti, & semen Nasturtii. Figuræ titulus, Myagrū falso. Idem in Hist. Germ. dicit: Quidam existimant Sesamum esse *Lein Dorter* aut *flachs Dorter*, quod mihi non placet, quia existimo *Lein Dorter* esse verum Myagrū, de quo in in 40 libro. Idem in eadem Hist. Germ. figuram prædictam habet, ac dicit, *Lein Dorter* aut *flachs Dorter* sumunt aliqui pro Sesamo, sed male, vix diximus, melius cum Myagro conuenit, de quo Diosc. lib. 4. cap. 112. Vocatur etiam Pseudolinum. *Me silente* ex allegatis locis apparet Matthiolum non nouisse Camelinam Ruellii. Drodellam suam & suum Sesamum quorundam, vnam & eandem plantam esse, ac eum eā figurā malè pictā dixisse habere folia flacidis, ac hinc putasse Aduersaria Matthiolum Vaccariam intellexisse eā figurā, quod tamen ex prædictis non fit verisimile: Figura etiam Matthioli, quam in re accedit ad Limum vt mereatur dici Pseudolinum?

Camer. apud Matth. Germ. Myagrū quorundam: in Epit. Matth. Pseudo-Myagrū.

C. Bauh. apud Matth. Myagrū 1. siue satium. Myagrū 2. siue syluestre, aut Pseudo-Myagrū Idem in Phyr. hortum meminit his verbis: *Mud. 3. 3. 4. Diosc. lib. 4. cap. 112.* meminit, quod aliqui volunt idem cum Myagro vulgè dicto, at Rubiæ folia suo tribuit Dioscorides: & Plinius lib. 27. cap. 12. cui Myagros dicitur. Quibusdam tamen nostrum secundum Myagrū est Theophrasti & Galeni Erysimum: aliis Sesamum ob seminis similitudinem & olei vbertatem. Myagrū 2. hortense: Myagrū Dodonæi, Cameline Myagrū Lob. icon. p. 224. Item: Myagrū tertium siue Myagrū syluestre, Sesama Trago, Pseudo myagrū Matth. Hoc satū tantū à superiore differre volunt, cum tamen illud foliis sit sinuatis, hoc verò Glasti folio non sinuato. *Qui considerabit* varietatem foliorum Camelinæ, & aliqua conferet cum Rubiæ foliis, aliquam similitudinem inueniet. Paruum inuenio affinitatem seminis Camelinæ cum vero Sesamo. Ex figura malè picta Matthioli & ex eius verbis de Glasti foliis in ea iudicare non possum diuersitatem. Si statuendum propter figuram diuersum genus separandum etiam erit Tragi Sesamum, in quo folia non Glasti, sed ad Linum potius accedentia, & vt ipse ait, Lino adedō similia, vt ab illo vix separari possint. Ego igitur non separo: sed figuram Matthioli non placere dico ac esse plantæ ei non benè perspectæ & cognitæ. Tragi autem Sesamum factum ad strigolam aliquam plantam spontaneam & siccō loco natam: non propterea aliam.

H. Lugd. vnius plantæ duas habet figuras. Vni titulus est, Myagrū Dodon. Hoc, inquit, Ruell. & eum sequuntur Dodonæus, atque alii Dioscoridis Myagrū, quod & Melampyrōn vocari tradit, esse putant. Altera inscribitur, Pseudo-myagrū Matthioli. Nec hoc ait, Matthiolum sine ratione intrusit. Sunt enim, qui legitimum Myagrū esse contendunt, alii cum folia Rubiæ non

Tom. II.

habeat, sed Glasti potius, & semine ei sit Nasturtii, non Fœnugræci, ab eis discessit Matth. & non Myagrū, sed Pseudo-myagrū appellat.

Taber. Icon. Myagrū r. Hist. Myagron, Chamelinum.

Gerard. myagrū Golde of pleasure.

Primum vidi Tiguri in horto Di. Gesneri: vidi Loc. & Basileæ confitum agrum ante 30. annos in quo florebat & siliquas habebat Maio. Genevæ in horto meo pulchrè virebat & adhuc florebat Nouembri ex semine deciduo, hiememque perseuebat. In Italia copiosè vidi, vt Patavii in horto publico: florens Martio & virens Februatio & inter Vicentiam & Villanovam: Monspelii abundat in agris. Circa Montbelgardum Myagro confitos agros habent ad oleum, quod dicunt caput grauari, vidi ptope *Granges* quod quotannis semine deciduo se renouat, quodque maturum Iunii principio. Agros benè subactos (inquit Ruellius) stercoratosque hoc semine perinde quasi Napis serunt. In tanta est apud nos [Gallos] nobilitate, vt ruri nemo non conspiciat: Et iam suæ spontis inter segetes inuenitur. Assatim inter segetes Lini vbique locorum, maximè verò in Alfatia, & tractu Rheni, Tragus.

Rueticis nostris (inquit Ruell.) Camelina aut Virens Camamina, oleo distringendo, quàm optimè cognita. Eius semen in arcis paucis rura flagris decutiunt, & vannis in auram vento silentem iactant, dum siliquarum recementa vanescant: cum trifolibus molis subiiciunt versandòque subinde oleum expriment, quo non ad lumina tantum Lucernarum, sed & ciborum quoque condimentis pauperes vtuntur, magno huius olei prouentu. Vix quicquam aliud aded ab auiculis inuaditur, atque hoc semen, quod animaduertentes quidam, id colligere ac alendis auiculis referuare studuerunt. Oleum ex hoc semine conficitur longè præstantissimum, estque Tragi iudicio gratius & iucundius Oleo Oliuæ. Sed non video eoque quomodo præferri debeat, huius Sesami oleum, Oleo Oliuarum, vt Tragus præfert, dum sibi persuadet verum Sesamum, ac vires Sesami attribuit. Audio hoc oleum frigore non concre-scere. Modicè, vt Matth. asseruit, calefaciat; humectat. Accedit omnino ad Sesami vires semen auiculis gratissimum. Paratur & ex eo oleum similis facultatis.

MYAGRVM TVRCICVM.



Hoc longè Descriptio

tenerioribus virgulis, quàm præcedens, nascitur, sed cultura fructuosior fit ait Camer.] semen minus in vasculis vegetioribus profert. Herba eiusdem est fere naturæ cum Myagro.

Camer. ad hist. Germ. & Epit. Matthioli. Pseudo-Myagrū alterum, species prima Myagri putati, quæ quia rarior est Myagrū

F fff 2

græ Turcici nomē sortitur ab hortulanis. Turcise
 her leindotter tenuis. C. Bauh. phyt. Myagrum
 4. siue sylvestre alterum.

CAMELINA MYAGRVM ALDROANDI.

Descriptio

Est hæc ex seminibus, quæ ab Excellentissimo
 Aldroando ex Italia nobis attulit Illustr. Dux
 Wirtemb. Creuit in horto Montbelgardenſi ſata:
 Folia numeroſa à radice exeunt, longo pediculo
 hærentia, repanda, principio ſubangulo, oblon-
 ga laciniata, qualiæ ferè ſunt Barbarea, coſta inſi-
 ghi pallide virenti donata, à qua nervi ſaturatio-
 ni colore exeunt. Cauſes inter hæc prodeunt
 multi, pedales, teretes, ac craſſi ſatis, lentique,
 quibus folia præcedentibus ferè ſimilia, ſed ſupe-
 rius nullo pediculo hæret. Summitatibus ſtoſculi
 inſident candidiſſimi tetraphylli, quales Scor-
 dothlaſpi velut in umbella diſpoſiti. Succedunt
 ſiſtula ſublonga. Radix alba eſt, ſim plex, ſibs
 tenuibus capillata. Odor foliorum herbidus, ſicut
 & ſapor, gratus tamen ſatis: Radicis verò ad Na-
 ſturtii ſaporem quodammodo accedit, ſed minus
 acris, ac mitius palatum & linguam vellicat.

Locus &
Tempus.

Nemini hæcenus quod conſlet cognita aut
 deſcripta planta nomine *Cameline Myagro*, à D.
 Aldroando donata, ſi Amanuenſis vel hortula-
 nus bene ſcripſit.
 Sata in horto Ill. C. V Wirtemb. Montbelg. A-
 prilii, floruit Iulio.

MYAGRO AFFINIS PLANTA, SILI-
quis longis.

Descriptio

Huius plantæ radix lignoſa, alba, ſimplex, ſi-
 bris aliquot donatur, cauſis plurimum va-
 riat: eſt vbi vici-
 am parum ex-
 cedit, frequen-
 tius altior, cubi-
 talis vel bicubi-
 talis, ſingularis,
 firmus, ſtratus,
 ſubhiſutus &
 nonnihil rube-
 ſcens, medullâ
 ſabmucina ple-
 nus, in ſurculos
 aliquot diuiſus.
 folia, Cameline
 ſimilia, alterna-
 tim poſita, vici-
 am lata, tres
 quatuorve lon-
 ga, ex anguſto
 principio ſen-
 ſim dilatata,
 ſenſim deinceps
 in mucro-
 nem deſinunt, ætæ ſæpe viridia, ſapore amaro
 prædita: flores parui, multi, conſerti, lutei, qua-
 tuor ſoliolis conſtantes, apicibus itidem luteis,
 breuibz pediculis inſident: quibus delapſis,
 alternatim ſuccreſcunt ſiliquæ tenues, viciâ lon-
 giores, quadratæ, ſemen copioſum, tenue, ob-
 longum, amarum, claudentes.

Icon. pl. Cameline, Myagrum alterum Thlaſpi
 effigie.

Hift. Lugd. ſunt duæ figuræ vnius plantæ. Pri-
 ma, Sinapi amarum Dalechampii vocata. Altera,



Myagron aliud Thlaſpi effigie Lobelii: nec tres
 nobis videntur ſtirpes.

C. Bauh. phyt. Sinapi 11. ſiue Hiſlopi folio, Si-
 napi amarum Dalecham. Myagron 1. ſiue ſiliqua
 longa: Et Leucoium 13. ſiue luteum ſylu. exiguis
 ſtoſculis. Viola lutea ſylu. Tragi, ſed vna. Sed ſic
 boni viri ſua diſant opera.

Tragus Lat. & Germ. Silueſtres Viola Luteæ.
 An Geſner. hort. Leucou ſylu. genus minus:

Myagrum alterum Thlaſpi effigie Lobelii
 Obſeru. & Icon. Plant.

Compiler Tabern. duas quoque vnius plan-
 tæ ſub diuerſis titulis icones propoſuit. Ac pri-
 mam quidem Hiſtor. lib. 2. & Icon. plant. 449. Ery-
 ſimum 3. wegſenſ 3. Huius iconem Gerardus
 ponit pro Eruca ſylueſt. anguſtifolia *Eryſimum*
 ſiſced/wilde Noctæ. Alteram verò Icon. p. 866.
 Hill. 338. Myagron 2. leindotter. Addit & ſe-
 cundam Gerard. quam Camelinam vocat *Eryſimum*
 acla wormſeed, Eryſimum Galeno & Theo. *Camelina*
 phraſt. Hanc plantam non obſeruauimus à
 quoquam dictam Camelinam. Gerardus iconem
 ex Tabern. habet, ac ei euenit, ni fallimur,
 quod illi, vt duabus iconibus vnius plantæ diuer-
 ſos tribuat titulos & diuerſas deſcriptiones. Aſt
 horum ſaltem in ſurſum ignorantia meretur ve-
 niam.

Florēt Iulio & Auguſto. Inueni propè Cha-
 ſtenoy ad ripam aquæ propè Molendinum quâ
 iur Montbelgardo Beſſordiam, poſtea alibi locis
 ſiccioribus, tranſtuli in hortum, vbi quotannis
 ex ſemine decido ſeipſam propagat. Inueni co-
 pioſè in pago Courchaton florenti mēſe Octo-
 bri. Sata in horto Ill. E. Celf. ſemine decido ſe
 propagat quotannis.


MYAGRON MONOSPERMON.

Craſſa & alba eſt radix: quæ cauſes proſert a-
 liquot, cubitum aut ſeſquicubitum altos.

glaucoſ, tere-
 tes, læues, ſo-
 lidos, medullâ
 candidâ far-
 ctos, multis a-
 lis concauos:
 folia Glaſti ſa-
 tiui ſuperiori-
 bus foliis non-
 nihil ſimilia,
 nonnupquam
 laciniata ta-
 men, præſertim
 inferiora, ſimi-
 litæque illis
 cæſia, nullo
 pediculo, pin-
 nis ſuis cauſes
 amplectentia,
 ſapore olera-
 to: flores lu-
 tei, quadrifolii,
 minores mul-
 to quàm Braſſicæ, paulatim nec eodem tempore
 ſeſe explicant, aliis primulûm à calyce erumpen-
 tibus, aliis in ſemen abeuntibus, quod ſingulare in
 ſingulis ſpiculatis buſculis, ſurſum ſpectantibus,
 & cauſibus, tamuliſque appreſſis.

Casp. Bauh. Phyt. Myagrum 5. ſiue monosper-
 mon.

Aptid Fratrem C. Bauhinum vidi plantam non-
 Tempus



Descriptio

mine Myagri monospermi quam descripsit. Basileæ anno 1595. mense Augusto obseruari brachiatam cubitalem totam siccam seminibus onustam in horto Domini Doctoris Felicis Plateri, vnde accepi semina ferenda in Hortum Ill. E. C. Montebelgardii. Spontè obseruauit spontaneam in agro inter Dampierre & S. Mauritium.

MYAGRO AFFINIS HERBA, CAPITULIS ROTUNDIS.



que porriguntur: in singulis capitulis semen inest vnicum, flauum, oleaginosum, nullo sapore manifestum: folia Myagro similia, minor, hirsuta, aspera, nonnihil succulenta, quæ per caules & ramos disposita, nullo pediculo, amplexicaulia, alas utrinque pinnatas proferunt, sapore viscido, & nisi obliet leuiscula acrimonia, fatuo, infima ex longis pediculis leuiter sinuata sunt.

Sunt autem plurimi anni, ex quo hanc plantam vocauit Myagro affinem cum capitulis rotundis. Semen huius misit à Domino Doctore Schvartzio Myagri nomine.

C. Bauh. Phyt. Myagrum 6. siue Myagro similis siliqua rotunda, quæ Io. Bauhino creuit.

Camer. ad Matth. Germ. Myagri species cum rotundis capitalis, ferè eiusdem naturæ cum Myagro. Et Epit. Pseudo-Myagrum 3. species 2. Myagri putat, exilior, valculis rotundioribus, alibi in aruis spontè nascens.

Annua planta flores & semina fert matura cum Myagro, Iulio, & Augusto, ac quotannis se ipsam seminat. Myagro affinis cum capitulis rotundis & flore lateo in Ill. Princip. horto florens & virens cum suis capitulis Iunio 1608. Stutgardia.

MYAGRO SIMILIS FLORE ALBO.

Numerosa statim à radice fundit folia, glabra, vncias tres longa ad Iberidis folia accedentia, laciniata nonnihil: Inter quæ caules surgunt, medullâ farchi, alis concavi: Quatum exortum, folia ambiunt alata, & veluti denticulis laciniata. Flosculi in fastigiis candidi, exigui, quos vascula

Tom. II.



SESAMVM VETERIBVS.

CAP. XX.

Sesamum, vt Theophr. sparsim habet, pingue, selt, radice singulari coheret, numerosiore tamen, quàm Milium: stirpe assurgit simplici, altâ, forsùm vires suas omnes intendente: caule ferulaceo, multiplici quoque magis, & crassiore, quàm Milium, calamo constat, vnde omnium, quæ ex æstiuis sementibus ager recipit, Sesamum tertio inoleuissimum esse, plurimumque polle emaciare putatur. Flos etiam foliis constat. Totâ quadraginta diebus à satû consummat. Sua proprietate cernitur: nam semen gerit in siliqua, magnopere circumseptum, modo peculati quàm legumina. Sesamum viride nullum animal mandit, propter amaritudinem & grauitatem saporis, sed siccatum acceptius euadit, fructusque eius suauis efficitur, candidus dulcedine præstat, nam genus quoddam candidum.

Plinius tribuit folia sanguinea, caulem ferulaceum: semen in valculis, ab Indis venire ait, ex eo oleum confici, colorem eius candidum: Simile hinc esse in Asia Græciaque Etylimum, idemque fore, nisi pinguis esset quod trio vocetur, medicaminibus annuerandum potius, quàm frugibus. Et paulò inferius, Sesamum in calida maceratam exporrigi iubet, deinde conficari, frigida immergi, vt palæa fluctuent, iterumque exporrigi in Sole super Linthea. Quod nisi festinatò peragatur, lundo colore mucescere. Dioscorides omiſſa descriptione, vires eius inter fruges ita persequitur. Sesamum stomacho nocet, & animæ grauitatem facit, si quando commanducata dentium committularis inhaerit. Admota verò neruorum crassitiem discutit, aurium fracturis & inflammationibus, ambustis item, & coli doloribus ac Ceraſtæ morsui medetur. Capitis autem dolores ex ardore contractos cum rosaceo lenit. Sed & herba in vino decocta eadem præstat, sed maximè oculorum inflammationibus doloribusque prodest. Ex ipso quoque semine fit oleum, quo Aegyptii vtuntur. Sententiam verò verborum Dioscoridis ferè explicat, inquit Cornarius, Plinius lib. 22. c. 25. his verbis, Sesama trita in Ouo sumpta, inhibet vomitiones. Aurium inflamma-

sequuntur subrotunda, acuminata, longo pediculo hærentia; ad Myagræ cum rotundis seminibus accedentia. Radicula longa, alba, simplex, vel cum paucis fibris.

Inter Bono Locus.

niam & Florentiam reperit cum floribus & capitulis. Dominus Agerius quoque Bononia delatam communi, cauit.

Radix

Caudex
Caulis

Flos

Semen.
Sapor

Genus casti-
didam. Fp-
ita. Semen
Cilior

trio

Sesama

Virg.

fff

Plinius no-
tatur.

tioni illinitur, & ambustus. Eadem efficit & dum in herba est. Hæc amplius oculis imponitur decocta in vino. Stomacho inutilis cibus, & animæ gravitatem facit. Stellionem moribus resistit. Item ulceribus quæ cæcæ vocant. Hæc Plinius loco vulgata exemplaria vino, pro Ouo habent quod verisimilis vetus Codex noster legit. Deinde in vulgaris est, amphus hoc, quod vetus habet. Hæc amplius, ut de herba accipiamus. Quod autem Stellionem moribus resistere dicit, Diosc. non habet, nisi Cerastion Stellionem reddidit. Aetius certè lib. 13. cap. 12. ad Stellionis morbum, Sesamum vultus imponi tradit. Ita etiam Paulus lib. 5. cap. 10. Sed & artuum doloribus convenienter imponi posse apparet, vellet enim per se legi debet non per se, quod intestinum crassum significat.

Oleum.

Galen. lib. 7. Simpl. Pharm. Sesamum, inquit, non parum viscosi ac pinguis in se habet. Vnde meatus obducit simulque molli, & moderatè calidum est. Eandem vim habet & Oleum ex ipso. Sed lib. 1. De aliment. ait. Pingue est Sesamorum semen. Quapropter etiam repositum citissimè oleosum fit. Ob id igitur citò replet eos qui ipsum edunt, evertitque stomachum, & tardè concoquitur & pingue alimentum corpori præbet. Hinc clarum fit vigorem & robur ventris partibus addere non posse: quemadmodum neque aliud quid de pinguibus. Est autem & crassi succi & ob id neque citò transit. Edunt autem ipsum solum non ita valde, sed cum melle cocto in placentas efformant, quas Sesamidas plerique vocant. Inspergunt etiam ipsum panibus.

Oleum Sesaminum, ut tradit Mesues, impinguat, semen auget, asperam arteriam lenit, & vocem ob id claram reddit.

Plinius error

Ceterum, vires, quas Sesamoidi Diosc. ascripsit. Plinius, dictatore Cordo, Sesamo assignavit, malè Sesamum pro Sesamoide in hoc auctore legens. Plinium autem, quod idem miratur, secutus est Ruellius.

Ruellius
notat
Sesama

Memorable illud est, quod Q. Curtius refert, militem, qui cum Alexandro Caucasum transiret, ac inopiâ frumenti, cuius nihil, aut admodum exiguum reperiebatur, propè ad famem veniret, succo ex Sesamo expresso hand secus, quam Oleo artus petiunxisset.

Æquiuoca.

Sesamum quoniam à Diosc. non describitur, fit ut in eo demonstrando plurimum erreretur. Si quis loca expendat de Sesamo apud Theophr. Dioscor. & Plinium, colligere est, nullam earum plantarum, quæ pro Sesamo passim ab Authoribus accipiuntur, esse verum Sesamum. Prior quidem Sesami nomine vulgò recepta, de qua hoc capite agimus vera videtur, sed vera certò affirmari non potest. Sesamum, qui arbutantur

Sesamum
Myagrum

Myagrum Dioscoridis non agnitum decipiuntur. In Sesami & Myagri explicatione, ait Guilandinus, mirum quàm Matth. cæcutiat, quando Myagrum esse, Sesamum primò à se loco locatum, nescit. Sesamum Cordi & Tragi, Sesamum Matthioli quorundam, dicitur nobis Myagrum Camelinae.

Myagrum
Camelinae

Non solum Officinis notum est hodie Sesamum, sed etiam quibusdam locis apud nostros [inquit Cornar.] nascitur, & in cibi usum venit, Lentis modo coctum: Appellatur autem Schwaden. Sed decipiuntur, aiunt Cord. in Diosc. & Geln. hort. qui Sesami loco accipiunt Schwaden. Multum rei herbariæ consulissent, si, quod decussisset, indicassent quid per Schwaden intelligerent. Dicere quis posset eos ignorasse quid scriberent, aut saltem inter scribendum dor-

Corn. Cord.
Schwaden
vixantur.

miussit. Sesamines flores [Itali Sesminos vocant] Sunt qui à Sesmino semine distirguere non valeant, Cordus. De hoc lib. 4. sub Gellemino. Sesaminum cum Sesamoide confundit Plinius, ut dictum est cum teuto Ruellius.

Quale porro sit illud oleum de Sosyma (cuius meminit M. Paulus Venetus) parvulos nigros faciens, considerandum aliis reliquimus, nos nihil tale de oleo Sesami annotatum invenimus, fortè oleum Sesami miscebatur cum aliis.

Officina plerique Myagrum [fleschdorfer] Sesamum appellant, ac malè eo, cuiusque oleo, pro Sesamo utitur, nobis ait Cornar. Matth. & Dodonæo. Sesami olei vice, quod exlubebat, Haly pueris quamprimum erant nati, nos scilicet ut confusum vis oleo huius, quod etiam faciebat Valembertus. Sesamo deficiente substituitur Tract. qui pro quo, Semen Lini.

Sesima
num.

Substituta
Myagrum
num.

Semen
Lini.

SESAMVM



Sesamum per
Sesamum cu-
bitalem folia
habet semun-
calibus pedi-
culis breviter,
crassiuscula, ex
atro virore nō
nihil rubentia,
oblonga, acu-
minata, subin-
de quoque si-
nuata: ex quo-
rum alii flores
emittant, cala-
thi formā, ob-
longi, albi,
hinc nascuntur
siliquæ rectæ se-
cundum cau-
lem ascenden-
tes, quatuor

costis donatæ: in quibus semen dulci albâ medulla præditum.

Accepti à Cl. Paludano Sesami Indiæ Orientalis nomine, semina, alba, oblonga atque compressa, modicè acuminata, qualia præcedentis, quæ vix diuersa existimant. Quædam eorum pullo sunt colore, quædam fusco, sapore dulci.

Tamet si Sesami semen, à quo copiosum exprimitur oleum, Officinis nouissimum sit: pauci tamen reperiuntur Sesamarii, qui Sesami plantas viderint voquam, cum nullum, vel rarissimum, quoddam agros steriles reddat, feratur in Italia. Si quidem quoddam Myropolis habetur, ex Græcia & Peloponneso ad nos conuehitur. Hæc Matthioli, qui in prioribus com. figuram exhibet hoc titulo, Sesamum aliorum, in post. verò hoc, Sesamum. Ait autem is: Mihi planta, quam pro Sesamo hic depingi curavi, quamque misit ad me Pisis Lucas Ghinus, si verum fateri debeam, non placet, quoddam Historiæ refugetur, quam de Sesamo Theophrastus & Plinius tradiderunt. Quare non ausim ego affirmare hanc geminum esse Sesamum, quod in primis cultum non gerat multo crassiorum, altiorum, numerosiorumque, nec radices longè plures, sed seipsum tabe annulum, in quo fabarum more siliquæ gradatim exeunt triquetre, aut quadriquetre, in quibus semen: Deinde quoddam eius folia non rubescant, nec flos herbaceo

Sesamum
aliorum.

TELEPHIVM VETERIBVS.

CAP. XXI.

herbaceo sit color. Hanc autem plantam depingi curant, ea saltem ratione, vt illud lecores admonerem, quod ea, meo iudicio, notis veri Sefami non respondeat: quodque in manifesto errore versentur, qui secus opinantur. Non ausim inquit idem in Hist. Germ. dicere herbam hic pictam esse verum Antiquorum Sefamum, vt quidam existimant, potest verò merito dici Pseudo-sesamum.

Alt dixit sententiam suam Matth. videamus nunc alios, an hac planta pro legitimo Sefamo sit recipienda. Semen Sefami officinarum [ordium turin Adv. Lob. & pena] perpetuo nomine & vsu Sefamum fuit, quod factum vidimus adultum. Si ruborem desiderat in Sefamo Senensis, docti in illo pudorem, vt qui vnus plantulæ fortè aridæ animaduersione, de Sefamo aduersus omnium iudicia statuerit. Sefamum vocatur Dodonæi hist. frugum, & in Ital. Camer. in Hist. & Epit. Matth. Lob. Icon. Pl. Tabern. & Anguill. cui & *Susfami*, & in Sicilia *Giugulena*. Quam benè verò Wirsung. in ind. suæ med. vocat, leindotter semen lasminum, Sessaminum, perpendant lecores.

Prosper. Alpin. (*Sempfen*, *Sempfeni* & *Sesamum* dicitur) Histor. Lugd. vt & Camer. hortu Sefamum verum. An Tragus de hac (sibi fortè non ritè cognita) Sefamus peregrina & ipsa iam pridem ad nos adportata est, nostratè per omnia ferè similis.

Sesamum & Sisamum, Sefama Latin. *Σισάμου* Græc. Leindotter/ *flachsdotter*. Germ. Gall. *ingoline*. Ital. *Sesamo*. Hisp. *orgilum* & *Alegria*. Arab. *Sempfen*, siue *Senfèra*. Offic. vulgò *gingolena*, Camer. Epit.

Sesami semen acceptum Lutetiâ à Chirurgo insigni Rasso, seminavi in Hortu E. C. Habui etiam semen à Fratre Casparo Bauhino & à D. Doctore Io. Schvartz. Vidi etiam Venetiis. Basileæ in hortu Di. Dis Iacobi Zvingeri, à quo etiam semen habui.

Oleum quod Aegyptii *Siris* appellant, ad cibos in frequentissimo est vsu. Planta decocto vtuntur in totu ad Ophthalmias, ad tussim, anhelitum, que difficultatem, pleuritidem, perimeumoniam & tumores duros scirrhosos: mulieres pro vteri duritie infestatione faciunt, & vtuntur ad capitis furfures, liuorè/que faciei: & ad tumores scirrhosos: planta & feminibus coctis cum melle, ad exsiccatos neruos, ad combustas partes, ad calidas inflammationes: Decocto in clysteribus ad colicos dolores, & ad emolliendam aluum: Ad mouendas menstruas purgationes. Seminis ad cibum vsus est antiquus, pauci est nutrimenti. Oleum faciemque eius bibere, vt impinguescant mulieres in balneis familiarissimum habent. Oleo etiam ad multa alia Aegyptii vti consueuerunt quippe ad cutis pustulas, asperitatem, atque omnem defecationem ex humore melancholico comitatam, tum epoto, tum in cibis frequentato, vel ipsi affectis partibus iniunctis. *Secrerum* apud quosdam ad cutis pruritum, eius quatuor vncias multis diebus bibendam exhiberi, ad anhelitum difficultatem, pleuritum desperatam, perimeumoniam, ad mouendos menses, atque ad vehementes stomachi, intestinorum, vterique dolorum cruciatu demulcendos, intus & extra. Non solum hac Aegyptii manifesta fuerunt, sed multi alii ferè eadem memoriæ prodiderunt, vt est Rhafis, Auicennas, Haly, Serapio, atque alii. Sefami vires ex Antiquis antè sunt scriptæ.

Telephium, inquit Dioscorides Portulacæ simile est & foliis & caule: alas verò binas habet singulis foliorum geniculis inhaerentes. A radice ramuli [addit Matth. Codex *ευωδ*, *λεωδ*, id est, angusti, tennes,] seni, septenive prodeunt, foliis referti cœruleis (*κυανουχθ*), quam vocem Plinius non expressit, crassis, lentis, atque carnosis: flores denique lutei, aut candidi (Vet. tantum *λευκ*). Sed vulgatam lectionem rectiorem vult esse Goupylus, quod in Telephio flores lutei spectentur, Sarrac.) Nascitur in vineis & locis cultis Vere.

Dioscoridis Notha tradunt, quibuldam semperuium sylu. dici, Esse & qui Portulacam sylu. appellent, Romanos illecebram, Aegyptios Anoth, Aphricos Aurtopurin.

Telephium ita describit Plinius, vt ex Dioscor. transulisse videatur. Verba eius hæc sunt: Telephium Portulacæ simile & caule & foliis. Rami à radice septeni, octonive fruticant, foliis crassis, carnosis. Nascitur in cultis & maximè inter vires.

Folia, auctore Diosc. ad sex horas imposita, vitiliginem albam sanant: verum postea hordeaceam farinam adhibere oportet. Tollunt & vitiliginis, ex aceto in Sole illita: sed vbi inaruerint, abstergi ea oportet. Eadem & Plinius, nisi quod in vsu ad vitiliginem dissentiant, & hac parte rectius Cornarii iudicio videtur hoc quod Plinius tradit: Illinitur lentigini, & quum inaruit, deteritur. Illinitur & vitiligini terhis ferè mensibus senis horis noctis, aut diei. Postea farina hordeacea illinitur. Medetur & vulneribus & fistulis.

Telephio siccantem & extergentem facultatem adscribit Galenus, non tamen manifestè calidam, ita vt primo quidem ordine calefaciat, siccet autem secundo intento, aut tertii initio: proinde ad putrida vlcera conuenit, & leucas, & alphas cum aceto sanat.

Veniunt autem nomine Telephii plures plantæ: Ac primum quidem Telephium Guilandini, quod nobis placet & Telephium Scorpioides vocamus, de quo mox. Est & Telephii genus fruticosum peregrinum. An hæc Hist. g. lib. ii. Colutea Scorpioides minor. Nec est Telephium, Fabaria siue Faba pinguis, vt quidam volunt apud Matthiolum. Est enim hæc Anacamperos, de qua dicemus Hist. nost. lib. 35. Telephium Galin Glossis Hippocr. diuersum puto à Dioscoridis Telephio propriè dicto, & idem cum Semperui siue Aizoi tertia specie lib. 4. Dioscor. quæ etiam Telephium dicitur: nos igitur non dicimus cum Cornario simpliciter Telephium esse *Γεννρβλειν*, vt dicemus capite de Sedo paruo ex flore luteo.

Folia Portulacæ.

Vires.

Telephii æquiudacæ nomines. *Teleph. Scorpioides*, Colutea Scorpioides minor. *Anacamperos*.

Sedum siue semperuium *ραινυνη* *α* *ε* *ο*.

TELEPHIVM SCORPIOIDES.

Ex gracili radice aliquot emittit ramulos, palmares & sesquipalmares, tennes, teretes. folia rara, breui pediculo annexa, Portulacæ minis succulenta, læuia, indiuisa, candicantia Cassalp. quibus subsunt bina exigua, circinata, Coluteæ Scorpioidis, forma & magnitudine: Mihi

Descripti

Montspeli videbatur vix habere saporem manifestum, nisi fortè paululum amarescentem: Jac.



Gargillius Scotus, tamen annotavit esse sapore acriusculo, & aromatico, & mansu odorem in naris Abrotoni emulum exhalantia: in summis ramulis strobili exigui, lentis floribus minores, persimili tamen forma, colore luteo: quibus siliqua succedunt Scorpionum caudas imitatz, crebris internodiis interceptz, intortaque, auctore Celsalpino, Meli-

loto vulgari similes. Nobis videtur cum Doctissimo Melchior Guillandino hæc planta optimè convenire cum descriptione Telephii Dioscori & Plinii, quam antè posuimus.

Scorpioides

Iconem huius nomine, Scorpioides sc. sed sine descriptione ponit Matth. ac ait: Suis notis veram Scorpioidem referre putamus: etsi non desunt Viri Doctissimi, qui aliter sentiant, volentes, Nicandri Scholiast. autoritate hanc ipsam Telephium appellari debere. At ego horum sententiam prorsus nihili facio, quod nō prohibeat nomenclatio illa apud Scholiasten, quin rectius Dioscoridi Scorpioides appellatur.

Telephium

An de hac Anguill. loquitur, quando ait: Telephium Crateuz nihil aliud est, quàm Dioscoridis Scorpioides, aut Scorpiurus. Item, Scorpioides vocant herbarii Bononienses Lunariborsiam. Hinc nostræ dubitationi ansam præbet Gesnerus hort. qui dicit, Lunaria butissa Emilii (sic enim herbarii quidam Scorpioides Matthioli nominant, si benè memini) herbula est strobulis luteolis: siliquis gracilibus, longis, articulatis, inflexis. Quæ Telephio nostro Scorpioidi quàm optimè conveniunt.

Lunaria vicia

Scorpioides Matth.

Lacun. Lob. Icon. Plant. Iconic. qui & Scorpionum Nepam à Diosc. vocari ait: Camer. in Hist. Germ. Matth. & Epit. Cast. Scorpioides. Dodon. Gall. & Lat. in fol. H. Lugd. Camer. hort. qui & Telephium Anguillæ vocat, Scorpioides Matthioli.

Quærunr Lobel. & Pena Aduers. Scorpioides [Matthioli depicta, non descripta] an Crateuz Telephium? Ratio cur dubitent, est quòd vagum & pluriusculum Telephii nomen sit ex Crateua & Dioscoride. Aiunt autem Crateuz notas, vti recentiores doctores scitè monuerint, Scorpioidem Dioscoridis lib. 4. calce penultima exprimere videri: nec sanè abs re, nam facultates illi inesse eximias ad dissempulotica & innicta vlcera, quod & animaduersioni facti periculi crebra testatur. Recentiorum verò & Montspeliensium Portulacæ foliam Scorpioidem, vulgò sic dictam, qui Telephii speciem coniecerunt, non infimè niti ratione.

Herba amoris

Celsalp. Telephium vocat, scribitque ab Italici Herbarum amoris cognominari, ac à quibusdam Scorpioidem censeri. Huius solum cum salua

applicatum cutim rubescit: aliquando & pustulas excitare: vnde nunc iocus puellaris in amore explorando: si enim cutem rubefaciat, tantum amoris putari indicium: sin autem pustulas excitet, odii. Et hunc vsum Antiquos Poetas Telephio tradidisse, constare apud Theocritum, qui ob id phileron appellavit.

C. Bauh. phyt. Telephium s. siue Dioscoridis, seu Scorpioides, ob siliquarum similitudinem.

Scorpioidem veram, vt arbitratur Matthioli, vidit primùm in Foro-Julienfi agro in ciuitate Austriæ, quodam in hortulo Cl. Medici Iuliani à Marostica Teruissensis. Spontè in agris cultis Montspeli circa Castellneuf provenit. Florentem autem obseruavi mense Aprilis, Maio & Iunio, siliquas verò ferentem mense Octobri. Florens & siliquis adhuc abundans in horto meo Geneuz mense Nouembri: mense Aprilis ex semine deceduo iterum proveniens, flores & siliquas habens mense Maio, Lugduni habebam in horto, Basileæ provenit in horto Domini Doct. Platerii: Montbelgardii in horto meo, & in Horto Ill. E. C. florens Iunio & Iulio.

SCORPIOIDES EX SENTENTIA Veterum.

CAP. XXIII.

Ne, mense herbula est, inquit Dioscorides, foliis paucis: semine caudæ Scorpionis effigie. Illa Scorpionum ictibus præsentaneo est auxilio. Ita Plinius: Ex argumento nomen accepit Scorpius herba, si. men enim habet ad similitudinem caudæ Scorpionis, folia pauca. Vallet aduersus animal nominis sui.

Galenus verò excalescere quidem ordine teruo, desiccare verò secundo scribit.

Ceterum brevis hæc delineatio Antiquorum facit, vt aliam atque aliam pro Scorpioidem herbarii exhibeant. Est suum Scorpioides Matthioli, quod nos ad Telephium referimus, de eoque iam iam egimus. Est suum Scorpioides Dodonæi & aliis, nobis Scorpioides, siliqua campoide hispida de quo mox. Scorpiuri nomen, auctore Dioscoride, sibi vindicat Heliotropium magnum, quod à nobis H. n. g. lib. 35. maius inscribitur. Scorpioides species à quibusdam sit calculula: sed falluntur, teste Matthiolo: est Hist. n. g. lib. 35. m. g. d. 35. Caltha.

SCORPIOIDES SILIQA CAMPOIDE hispida.

Ex radice plerumque singulari, ferè buxæ, exili, recta, longiuscula, dodrantes vel pedales ramulos paulum humo surgentes emittit, vel per terram sparsos, angulosos, subhirsutos, ex quibus enascuntur folia Bupleuri, pinguiora, minus nervosa, albida, locis calidis mediocriter spissa, nonnihil hirsuta, longiusculis pediculis appensa, sapore subacido prædita, Iacobo Gargillio Scoto, mihi autem videtur habere aliquam acrimoniam: & ex eorundem alis pediculi palmares & sesquipalmares, tenues, quorum summitati insident strobili duo aut tres, vel quatuor, similes Meliloto Germanicæ Fuchsi, minores, luteoli, quorum singulis singulæ succedunt siliquæ hispide, per maturitatem fusæ, Euæ, villosæ, in se conuolutæ, spiras imita-

Descriptio



imitata, tuberculis semen falcatæ Lunæ effigie continetibus, gibbosa.

Dodon. Gall. Scorpioides. Belg. Scorpioides. Frust, quibusdam hasenoore. Gall. Aureille de Lieure. Lat. n. fol. Scorpioides prior: ad Scorpioides accedit ac legitima Dioscoridis apparet: à Plinio Lit. nè Scorpius quæ appellatur. Lob.

Adv. Obf. & Icon. Pl. Scorpioides repens Bupleuri folio Dodon. effig. 43.

Tabern. Ic. & Hist. Scorpioides Bupleuri folio, Raupenfrucht. C. Bauh. Phyt. Scorpioides. r. siue Bupleuri folio. Est hoc quibusdam Clymenum Diof. & Clymenum alterum Plinii, aliis Catanance.

Scorpioidem filiqua simili Erucæ primò repertam Montspeli prope patibulum & Castelnau, in colle iuxta viam ad ripam fluminis: Folia videntur habere aliquam acrimoniam: filiquas fert cum floribus mense Aprilis: hanc denominauit Scorpioidem, non quidem Dioscoridiam quam vidissem à Dodonæo depictam, postea obseruauit Tiguri in horto Petri Trigulacei Chirurgi insignis. Genetæ provenit in horto, floruit & semen protulit, quod Autumno germinans hiemem pertulit, virens adhuc mense Ianuario, postea emortuum nouo frigore superueniente. Basilæ in horto D. Felicis Plateri florens & filiquas habens Iunio mense, in horto Parrisi à Fratre satum Basilæ. Parauit in horto Cortotii pulchrè virens mensis Martij principio. Montbelgardi satù facile provenit sed hiemem vix perferit, multò maius quàm Montpel. euadit: habeo in Horto E. C. vbi etiam in maiorem provenit altitudinem quàm Montspeli. In Oliuetis & aridis montosis Montpel. vicinis, frequens Lobelio occurrit hæc, alibi rara planta, nec nisi in hortis videtur.

SCORPIOIDES MONTANA. N. V. M.

Scorpioides montanum Herbariis quibusdam dictum in altis & asperis montibus nascitur, radice crassiuscula, nigra, in fibras multas & breues se diducente: foliis, multis, longis, angustis, lanuginosis, Leucoio purpureo similibus, sed margine non incisis: caule palmum alto, foliola pauca mittente: fuscis tribus vel quatuor, cæruleis, in exiguum, rotundumque capitulum, siue Corymbum conglobatis. Rara hæc planta est, montiumque solitudinibus inaccessis tantum familiaris.



Quum rara sit planta oportebat annotare locum particularem vbi provenit,

C. Bauhinus Phyt. Scorpioides siue montanum Hist. Lugd. quid?

HYPECOON VETERIVS. CAP. XXIII.

Hypecoon Diosc. autore, aliqui Hypoptheon vocant. Nascitur in frumento & arvis. Folium habet Rutæ simile: ramos paruos. Vim habet respondentem Papaveris succo, Scribit Plinius Hypecoon in segetibus nasci, foliis Rutæ. Naturam eius eandem quæ Papaveris succo.

Galenus: Hypecoon, inquit, frigefacientem vim habet, ex tertio ordine frigefacientium, vt à Papauere parum absit: Ita etiam Paulus. Non satis, inquit Cornarius, notum est hodie quæ herbasit, de qua hic scribunt prædicti.

Hypecoon Dodonæi, quod in purg. exhibet, cuique historiam Hypecoi Dioscoridis ascribit, Hypecoon filiquosum dicimus. Plantam verò Hist. Lugd. titulo Hypecoi demonstrat, eamque falsò Dodonæum in purg. Hypecoon Dioscoridis facere scribit. Thalictrum paruum esse dicitur lib. 30. Nihil tamen minus est quàm Hypecoon Dioscoridis, quod Matth. in com. Ital. & Lat. cum magn. fig. & ex eo Camer. ad Hist. Germ. & Epit. Matth. Hypecoi nomine pingit. Alciæ hæc est, vt videre licet Hist. nost. gen. lib. 31.

Hypecoon Ruffa folio

Temperamentum

Hypecoi qui voca. Hypecoon filiquosum. Thalictrum

HYPECOVM SILIQVOSVM.



Plurimos ex radice simplice, Gerani Robertani vel potius moschati æmula, rubescente, caules emittit laeues, pedales, in alas frequentes, circa summum dispositos: folia maiore ex parte fundit quoque radix, Rutæ sylvestr. tenax. foliæ aut Fumariæ similia: flores lutei & senis compunctus foliis.

Descriptio

duobus aduersis magnis, nervo viridi donatis, ex sublongo quadrangulis, quatuor reliquis interiectis multo minoribus, in quorum medio apices. Semen oblongum fert, siliquis inclusum articulatis, tres, quatuorue vncias longis, rotundis, multumque falcatis.

Matth. in post. com. Ital. picturam habet nomine Cumini silu. alterius sine descriptione.

Aduers. quæ describitur & depingunt, Cuminum alterum Dioscoridis siliquosum vocant.

Aduersariorū figuram & situlum retinent Icon. Plant. & adhuc exhibent alteram, quam Cuminum silu. alterum siliquosum Lobelii inscribunt. Is autem Obs. eandem cum Clusio figuram habet, cui titulum facit. Cuminum silu. alterum Dioscoridis: Italorum Hypocoum Clusii & Dodonæi. Clusius porro, qui melius descripsit quàm alii, potissimum florem, ait. Cùm primum hanc plantam obseruarem, illud mihi visum est plurimum ad Hypocoi Historiam accedere, quod Græcis *ὑποκόινον* & *ὑποκόινον* dicitur. Non desunt tamen qui ad Cuminum sylvestre alterum Dioscoridis referre malint, licet facultates sint dissimiles. Vocatur hæc Granatensis & Murciansis *Adorita*. Cur tandem planta, quæ Græcis *ὑποκόινον* & nonnullis *ὑποκόινον* teste Dioscoride, dicitur, pro Cuminum sylvestri sit habenda, nulla occurrit ratio: pro hac tamen ad se missam Mathiolus refert, si Dodonæum non fallit pictura.

Camer. hort. Cuminum sylvestre alterum Mathioli vel potius Hypocoum Clusii. Camer. in Hist. Germ. & Epit. Matth. Cuminum sylvestre alterum, Græcis, *ὑποκόινον* dicitur. Ital. *Cimino saluatico secundo*. Huius effigiem Camerarius ex nostra planta sicca, olim Gelsnero cum aliis plurimis communicata, depinxit.

Tabern. Icon. Cuminum silv. 2. Hypocoum Diosc. Groffer horn fummel. Item Cuminum siliquosum minus, Klein horn fummel.

Locus & tempus. Hypocoum Clusii, Monspelii cùm essem reperi cum flore & siliquis propè Lacum, non longè à Balneo, quod à Baleruch cognominatur: quod non inagnum: aqua salis & ita calida vt vix quis calorem pati possit. D. Dalechampius cùm ei demonstrassem transeundo Lugduno ex planta mea sicca curauit depingendum: Gelsnerus ad meam descriptionem adscriptis. Securidacis aliquos malè adnumerare. Florens: Iunio vidi Bislex in horto Domini Doctoris Fælicis Plateri. Inter semina quæ hortulanus Ducis Florentini Stutgardiam misit accipi nomine Hypocoi Candia: quod seminaui in Horto Illustr. Exc. C. Montbelgardi.

Securidaca

Hypocoum Candia

DENTARIA QVINQUEFOLIA.

CAP. XXIV.

Descriptio

Radicem habet Coralloides prima, & squamatis denticulis compactam, albam, nitidam: caules cubitum alti, tenues: folia quina in idem punctum coeunt, Pentaphylli modo, oblonga, acuminata, circumcirca serrata, paucis nervo medio obliquis in marginem exsertentibus venis: flores summo caule herent Hesperidum ex albo purpureascente colore, quibus & non absimiles superueniunt semen continentes siliques.

Hanc sic describit Clusius. Est dentata radix, lue inæqualis & pluribus crassis squamis exaspe-

rata, & raris fibris inter illas nascentibus, prædicta, ex qua prodeunt caulis rotundus, pedalis, in quo per intervalla quina folia longiusculo pediculo



subnixa, longa, in ambitu serrata, molliora quàm in superiore, neque adeo saturata vinitate prædita: flores in summo fastigio iam dictæ floribus persimiles, quatuor videlicet foliis, Leucocii florum instar, constantes, colore dispersi.

Dodon. de purg. in append. Violam appellat propter florum cum Leucocis similitudinem.

Camer. ad Hist. Germ. Matth. Dentaria dicitur: in Epit. Dentaria minor, siue Sanicula quinquefolia. Ital. *Dentaria minore*. Germ. *Zanfraut*. Eadem in hort. Dentaria bulbifera Pentaphyllos. Clusio Dentaria 7. siue pentaphyllea 2. à foliorum vni pediculo inhaerentium numero, non ineptè fortasse dici posse videtur.

Huius meminisse Iosias Simlerus ad finem Commentarii de Alpibus his verbis, *wilder senff* herba eius nominis prior vno pediculo septena habet folia, supremo caule multos flores purpureos, & partim albos [albos ego, inquit Clusius, duntaxat conspexi] post quos cornicula subnascentur semen continentia minutum [non satis exactè obseruasse videtur, nam Hesperidis semini dispar non est] compressum: radix subest alba alabastris modo splendens, lquamea. Nos Dentariam vulgè nominamus à forina radicum, quod ex pluribus squamis, quasi dentibus componatur. Dodonæus ad Leucocium referre posse putat.

Macklinæ nascentem conspiciet Clusius in cultis. horto Ill. V. lo. de Brancion ex Allobrogibus & Italia acceptam. Ad cubiti altitudinem crescit cum Coralloide altera septifolia, umbrosa loca amat, & latices, primo Vere statim emergit. Simlerus.

Locus & tempus.

CORALLOIDES PRIMA, QVINQUEFOLIA.

CAP. XXV.

A radice nodosa, & in plurimos articulos distincta, tenuibusque aliquot fibris, ex articularum distinctorum prodeuntibus donata, exeunt aliquot folia, longis pediculis nixa, in quinque profundas & ad pediculum vsque sectas lacinias, in ambitu crenatas, diuisa, scabra, & tactu aspera, saturè virentia: caulis pedalis aut amplior, rotundus, summo fastigio, quinos aut senos flores, bulbiferæ floribus similes gerens, colore tamen paulò magis saturatè purpureascente, qualis ferè in floribus Violæ latifoliz non viuacis, quam nonnulli Lunariam Græcam appellant: succedunt capitula longiora semine plena.

Gelsner.

Gesner in Hist. Cordi, figuram ponit & Kentmanno acceptam, dicens: Aliqui, n^o fallor, Coralloidem Cordi, Saniculam albam vocant, alii temere Aconitis adnumerant. Hæc ille, qui si plantam hanc nostram intelligit, figura non placet. Cordum etiam aliam intellexisse existimamus. Idem de hort. scribit esse Saxifragæ montanæ speciem, ac tursus eandem nomine Saniculæ foliis Pentaphylli maioris ex Matthiolo indigitat. Ibidem quoque Saniculam albam appellat, & Hestiacam ac Italarum Dentariam.

quam Galliâ viâ, feruente bello inter Imp. Carolum V. & Gallia Regem Henricum II.

CORALLOIDES ALTERA SIVE SEPTIFOLIA.



Altera Coralli aut alabastritis marmoris polita æmulam habet radicem obliquam, tuberibus inæqualem: caules cubitales: ex quibus orti pediculi foliorum sustinent duas aut tres coniugationes, quibus superadditur semper extremum instar: singulariâ verò folia oblonga, serrata, Coralloides

Descriptio



Matth. in Diosc. lib. 4. cap. de Symphito, hanc describit dicens: Recensetur à Germanis inter Symphiti genera quædam foliis Pentaphylli maioribus. In post. com. Ital. non solum describit, sed depingit quoque, titulo, Dentariæ alterius.

Aduers. picturam habent non vsque adeo commodam, hoc titulo: Nemoralis alpina herbariorum Alabastritis, Coralloides Cordi: Meliorem hoc nomine habet Lob. Icon. Plant.

Clusius in Pann. hinc ita inscribit: Dentaria Matthioli, Pentaphyllos 4. Est hæc inibi sine descriptione. Eandem exhibet Hist. post. cum descriptione, quam hoc in loco posuimus, sub hoc titulo: Dentaria 6. Pentaphyllos 1. Sextam, inquit, Coralloidem alteram dixisse Cordum, nonnulli arbitrantur. Matthiolus Dentariam minorem: mihi Dentaria *pentaphylla* prima à foliorum vni pediculo inhaerentium numero, non in neprè fortasse dici posse videtur: quemadmodum nec Dentaria *pentaphylla* altera.

C. Bauh. phyt. Dentaria 1. siue Pentaphyllos: Dentaria minor Matthioli.

Ni imperitior Taberna foret, grauem sanè censuram mereretur. Tres quandoquidem vnius plantæ figuras proponit Quartam, quam i in Hist. facit in ic. Dentariam quinquemfoliâ, & Consolidam Dentariam vocat. Cui in Hist. 2. titulum tribuit in ic. Dentariam alteram Matthioli appellat. Cuius in Hist. tertio loco meminit, ea ab ipso in Icon. Dentaria corallina altera nuncupatur. Egregius, mehercle, Botanicus.

Qui variis titulis lectores ludere nouit.

Cæterum, hæc & alie, quia radices habent Coralli æmulas, idè Coralloides & Alabastritis cognominantur. Sunt autem qui has ad solidagines referant & Symphita, alii inter Saxifragas, alii inter Saniculas recensent. Nobis in hac controuersia, hæc collocare integrum esto, donec vel tu, vel alius aptiorem perquirat locum.

Ad Allobricarum Alpium radices supra Lemnæ lacum, cum sequente spontè nascentem, obseruare memini (inquit Clusius) ante quadraginta annos, dum per Heluetios, & Gallia Narbonensia patriam redirem, præclusa per reli-

quædam præcedentis foliis sunt proxima, paulò maiora: flores similiter extremo cauli ex longis pediculis hærent magni, Leucoii aut prædictæ Coralloidis similes, è quatuor foliis compositi, colore niueo vel purpurascēte, hinc sequuntur in longis siliquis semina compressa.

Clusii descriptio hæc est. Huic aliqueot è radice exeunt folia, quina interdum, sed maximâ ex parte septena, longæ costæ inhaerentia, foliorum Fraxini instar digesta, hoc est, vt ex aduerso bina semper respondeant, folium impar extremam alam occupet, omnia in ambitu serrata, dilucius virentia quàm Sexta [Dentariæ 1. quinquemfoliæ] folia, & subtus candicantia: caulem etiam pedalem, rotundum, binæ aut ternæ foliorum alæ, iis quæ à radice prodeunt non dissimiles, ornant: eius autem summum, flores superioris floribus pares, quatuor videlicet foliis constantes, candidi tamen coloris: cornicula quæ succedunt, etiam paria, simile semen continentia: radix minus squamata, quàm præcedentis, Quinta (Coralloides Enneaphylli) radici semè respondens, & paucis crassioribus fibris firmata.

De Coralloide hæc & minore bulbifera hæc Cæsalpinus tradit: Duæ in montibus nascuntur frequentes in sylvis, quas vulgò Dentarias vocant, distant inter se magnitudine: nam maior Folia fert ab radice diuisa in septem vt plurimum partes, Ellebori nigri modo, mollia, angulosa, Cichorii modo, inferius subcandida: caulem simplicem, cubitalem aut paulò breviorē, in cuius cacumine vnicum folium, similiter diuisum sustinet, è cuius sinu ramulus attollitur, in quo flores candidi, vt Leucoii, & siliquæ simplices, quod in hoc genere paucis contingit: radicem digiti crassitudine summâ tellure oblique tendentem, frequentibus geniculis pulchre dearticulatam, colore candido, splendētem alabastritis modo, quasi dentes, vnde nomen assumpsit, quæ tamen vetustate nigrescit, fobolē à lateribus candidam ferens: hæc tantum in altissimis nascitur. Minor ad decliuora etiam loca descendit,

maior: septifolia

Descriptio

Alabastritis

Locus

*Dentaria
minor bulbifera*

minoribus multo foliis, & in pauciores partes diuisis, in caule pluribus per intervalla dispositis: radices simili figura tenues fert, nigricantes: flosculos purpureos: siliquas exiles: pectiliare huic in foliorum alis singulis sobolem gighere, quæ sunt radicula ex duobus aut tribus geniculis constantes, nigrae veluti parva Mora, quæ in terram decedentes germinant, idcirco rard in hac reperiuntur flores & siliquæ, cum sobole apta nata sit facilis quàm semine propagari. Altera etiam est huic similis, breuior, non ferens soboles supradictas. Lycoctonum Ponticum Dioscorides vocat inter Aconiti generâ.

Dodon. append. putg. *Dentaria altera*. Et in fol. vbi exhibitam repetit: *Viola dentaria altera*.

Lobel Obs. & Icon. plane. *Alabastrites altera*, *Dentaria altera* herbariorum: *Coralloides altera* Cordi. Hist. Lugd. *Dentellaria altera* Dodonæi. Hi omnes pingunt cum quinque & cum septem foliis sub modo dictis titulis. Apoll. rad. i. *Sanicula alia*. Gesnero hort. Saxifragiæ montanæ speciem altera cum septenis foliis in vno pediculo. Circa Sabaudiam [de vitæque loquitur] *Pulmonaria* vocatur.

Camer. hort. *Dentaria bulbifera heptaphyllos*:

Clus. Pann. *Dentaria heptaphyllos* 5. Hist. post: *Dentaria* 8. siue *Heptaphyllos*, à foliorum numero, quæ in eodem pediculo nascuntur, hominata. Huius etiam meminit loco citato Iohannes Simletus his verbis, *Wilsden senff*, herba eius nominis altera quinque folia habet vno pediculo florem qui Hesperidis purpurascens flore, vel Lunariæ Græcæ inodoræ est, non vidisse [inquit Clusius] existimo, aliâs superiori non dissimilis: tota substantia vtriusque æneise, Sinapi æmulans, aut Raphanum.

C. Bauh. Phyt. *Dentaria* 2. siue *Heptaphyllos*.

locus &
tempus

Coralloidein siue *Dentariam* Patavii vidi Martio; quo tempore iam defloruerat. Montebelgardii in monte *Bar Maio* defloruerat: Septemfolia nunc in Hort. E. C. est. Basileæ Frater observavit in monte Murenli Septemfoliam. Prope *Neuschastel* Burgundie in fine Septembris in colle iuxta pagum *Dembelio* virens adhuc cum foliis septem: Genevæ florebat Aprilis & Martio pulchro flore cæruleo in horro meo: Copiose provenit in monte *Salève*. In monte *Thuri* vidi cum foliis septem, & cum foliis quinque mensis Iulii principio cum siliquis. Quidam rusticus *Rizotomus* vocabat *Re du poumon*, id est, radicem pulmonis, à forma ni fallor: *Dalechampsii* faciebat *Aconiti* *Lycoctoni* genus.

CORALLOIDES ENNEAPHYLLOS Clusii.

Descriptio

*P*edaleiti proferit *caulem*, firmum, rotundum, lizuem, quem in summo terè ambiunt tres pediculi (rarissimè quatuor), singuli terna folia sustinentes, ampla, mucronata in ambitu serrata, saturatè virentia, gustu feruido: summum *caulem* exornant quini aut seni flores, quatuor foliis constantes, *Dentariæ* *Heptaphylli* florum æmuli, deorsum spectantes, & propendentes, colore ex herbaceo pallescente: flores sequuntur oblonga *cornicula*, torosa, mucronata, qualia sunt *Dentariarum* *Pentaphylli* & *Heptaphylli* *cornicula*, & in his etiam simile *semen*, hoc est, *Hesperidis* ferè, sed crassius atque virescens, quod dissiliens corniculis exhiante quàm probè maturum videatur, alia præ-



terea folia à tædice proferit, terna tantum in singulis oblongis pediculis nascentia, superioribus multò ampliora, sed breviora: *radix* novella alba est, vetusta nigricat, multis articulis sic distincta, vti plurimis dentibus coagmentata videatur, *Dentariæ* *apollinæ* radices non valde absimilis.

Lobel. Obs.

Dentaria altera sine icon.

Clus. Pann. *Dentaria* 2. siue *Coralloide* radice. Hist. post. *Dentaria* 5. *Heptaphylli*.

C. Bauh. Phyt. *Dentaria* 4. *triphylls*, quæ semper tria folia iuncta habeat. *Dentaria* *pulilla*, *Enneaphyllos*.

Exit in vmbrosis Austriæ, Styriæ, Carinthiæ, Pannoniæque silvis, non modò ad montium radices, sed etiam circa mediam eorundem regionem, vbi præaltorum arborum silvæ vti plurimum, in Alpibus huiusmodi, desinere solent. Inveniebat Clusius, & vltra *Drauum*, in monte *Greiben* imminenti, cum Quarto genere *bulbifero* (*Coralloide* minore *bulbifera*) a: quæ etiam *Herciniæ* silvæ Bohemiam ambiente.

Floret Aprilis, vicinis *Vienne* Austriacæ silvis, & aliis humilioribus: semina prægnans est Maio. At in montibus ferit.

CORALLOIDES MINOR BULBIFERA



*M*inor *Coralloides* obliqua radice geniculatim incedit, candida, tenui, squamata: *caulis* selquicubitalis ferè, tenuior quàm villus præcedentium: vnde exorti rari pediculi folia quina ad rachim adnexa sustinent, modò rectè à regione posita, modò alternatim, selcunciam aut duas vncias longa, semunciam latiora: cæterum

quæ circa caulis fastigium conspiciuntur, nullum talem observant ordinem, sed singularia fortuito posita, longè iam dictis magnitudine concedunt, non minus reliquis serrata: extremus caulis in pediculos multos abit, quibus hærent

fructus

flores, cuiusmodi sunt precedentium, purpurea (quam magna ex parte sicci amittunt) diluiores nitescentes: *semen & filiqua* vt heptaphylla. Verum & præter hæc omnia ad foliorum alas bulbi quidam, veluti in Lilio croceo bulbifero, adnascuntur, per maturitatem nigricantes, ex quibus non secus ac ex semine propagatur.

Lobel. Obs. & Ic. Pl. Dentaria Bulbifera. Clusius Pann. Dentaria 1. Hist. post. 4. siue baccifera. Cæsalpin. Dentaria minor Lycoctoni Pontici Diosc. & Theophrasti Aconiti genus. Vide antè verba Cæsalp. capite de Coralloide septifolia.

Tabern. Hist. Dentaria 4. Icon. Dentaria septifolia. Ecce vocat Septifoliam, cum plerumque quina proferat, vt pictura eius & aliorum demonstrat.

C. Bauh. Phyt. Dentaria 3. siue baccifera.

Coralloidis pulchram speciem attulit Frater collectam in monte Castello Patauii. Anno 1595. Iunii 6. eandem n. fallor vidi Heidelbergæ in Horto Di. Sprengerii cum bulbis in caule, quos accepi plantandos Montebelardi in Horto II. E. C. Misi etiam nomine Dentaria bulbifera: Habui etiam Argentina à Friderico Meyer.

Cæterum, nullas harum plantarum facultates Clusius compertit.

ACONITVM LYCOCTONVM DODONÆI siliquosum, ad Coralloides fortè referendum.

Eius icon in peruetusto manuscripto Græco codice reperitur qui Viennæ Pannoniæ in Bibliotheca à D. Maximiliano 2. Imp. Aug. instituta asseruatur. *Folia* ei sunt non omnino vt Platani, sed lata: *caulis* tenuis & lævis; *siliqua* tenues & oblongæ: *radices* non modò cirros, verum ipsas Squillas marinas referre videntur. Lycoctonium tertium Ponticum cognominatum Dioscoridi esse potest Dodon. Hist. Lat. in fol. 436. Mihi videtur figura à Dodonæo ficta aut pessimè expressa: ac exilimo à Barbaris ita effictam plantam partim ad descriptionem, partim ex aliqua plantam ineptè, vt solebant Barbari: si considerentur siliquæ & flores, fortè videbitur habere aliquid commune cum Coralloide: Dodonæi descriptio est fortassis ex figura. C. Bauh. Phyt. 332. Aconitum 3. siue Lycoctonium foliis serratis, siliquis oblongis: an tertium Dioscoridis?

LYSIMACHION VETERIBVS.

CAP. XXVI.

Lyfimachia, quam aliqui Lytron appellant, insit Dioscorides, *caules* emittit cubitales, aut etiam altiores, tenues, fruticosos, à quorum geniculis *folia* prodeunt salignis similia, gustu astringentia: *stos* est fulvus aureusue. Nasctur in palustribus & secus aquas.

Inuenit & Lyfimachus herbam Lyfimachiam quæ ab eo nomen; teste Plinio, accepit, celebrata Erasistrato. Folia habet Salicis, viridia, florem purpureum, fruticosa, ramulis erectis, odore graui. Gignitur in aquis.

Hæc Græcis *Λυσιμάχη* & *Λυσιμάχον* dicitur, Latinis Lyfimachia, à Lyfimacho Rege inventore: vel à pugna dirimenda: id enim est *λύσις* *λύσις* certamen dicere. Est enim ei vis etiam

Tom. II

belluarum animos feroces, & mutuos hostiles congressus placandi.

Foliorum succus quæ pollet adstringendi vis, vt refert Dioscorides, sanguinis reiectiones supprimit: valet etiam ad dysenteriam, seu potui datus, seu etiam clystere infusus: fluorem quoque muliebrem sistit, subditus in pello. Sed & herba sanguinis è naribus profusio subuenit, iisdem indita. Est & vulneraria, sanguinemque supprimit. Accertimum verò nidorem suffita reddit, aded vt & serpentes abigat, & mûscas enecet.

Vim & vsum medicum sparsim proponit Plinius: Vis eius tanta est vt iumentis discordantibus iugo imposita, asperitatem cohibeat. Lyfimachia odorem fugiunt serpentes: Si ore sanguis reiciatur, siue feminarum vtero, Lyfimachia pota, vel illita, vel naribus indita, sistit: atque etiam recentibus plagis medetur. Capillum Lyfimachia fluum facit.

Galenus. Lyfimachia, inquit, adstringentem qualitatem prædominantem habet, ob quam & vulnera glutinat, & sanguinis è naribus eruptiones sistit, si nares eâ obturentur, & medicamentum est quod etiam alias sanguinis eruptiones cohibet, tum ipsa, tum adhuc magis succus ipsius. Quint & pota, & per clysterem infusa, dysenterias & sanguinis reiectiones & fluxum muliebrem sanat.

LYSIMACHIA LUTEA.



Svbrubente *Sradice* repitice, summo cepite hærent nititur: *caules* autem proferit sesquicubitales & bicubitales, striatos, hirsutos: quibus ad genicula adnascuntur *folia*, terna aut quaternaria, rarius bina, Salicis latifolia, acuminata, supernè atrovirentia, infenè magis candicantia, lanuginosa: *flores* in extremis ramorum fastigiis lutei, Hyperici acidi saporis, ex quinque foliis componuntur, totidem staminibus medium occupantibus, odore nullo. *Semen* Coriandro par, sapore haud legniter adstringente.

Fuchsis, Tabern. Turn. & Camer. ad Hist. Germ. Matth. pingentibus, *Lyfimachia lutea*. Dodon. Gall. *Lyfimachium verum*, seu *luteum*: Lat. fol. *Lyfimachium legitimum*. Matth. Lacun. Cæsalp. Anguill. Camer. in Epit. *Lyfimachia*. Gesn. hort. & Thallio *Lyfimachium luteum*. Lonic. Geel W. derich. Salicaria, *Lyfimachium Græcè*.

Agnosce officinas & herbarios duo Lyfimachia genera, purpureum & melinum scribit Corn. sed à Salicis foliis Salicariam appellare. Contra Anguill. negat esse duas Lyfimachias diversorum colorum.

Gggg

902
Lobel. & Penz. Adu. Obs. & Icon. Pl. *Lyfimachia* lutea, siue *salicaria*.

Ruellius modò hanc *Lyfimachiam* asserit, modò aliam. Vnde eum nesciuisse quid scriberet, coniciamus.

Cast. *Lyfimachia* falsa. C. Bauh. Phyt. 1. *Lyfimachia* siue lutea maior : *Lyfimachia* Dioscoridis.

Lyfimachia lutea, *Aquidagium*, vulgò *Salicaria*. Germ. Geel Weiderich. Belg. Geel Weiderich. Gall. Corneille, Soucy d'Eau, perce buffe, ou Chasse buffe. Italis & Hispanis *Lyfimachia*.

Locus & Tempus.

Lyfimachiam flore luteo Montepessuli observauit : Geneuz copiosè au plain palais propè Arue flumini : Basilez florentem vidi mente Iulio extra portam S. Albani. Montbelgardi variis in locis, vt è regione arcis in fossis : Item extra portam Helicurianam quam *Rachette* vocant. Est etiam in Horto Il. E. C. à nobis plantata.

Virg.

Pro Suchaa Arabum sumunt Bononienses in suo antidotario semen *Lyfimachiae*, praesertim luteae, cum sit praestantius quàm purpureae semen est. Serpentinae & musci *Lyfimachiam* aduersarii certum est.

LYSIMACHIA LUTEA
minor.

Descriptio



IN Pannonia collectam asseruo *Lyfimachiam* luteam minorem cubitum altam, hirsuto caule, in quo ex certis intervallis terna radiata folia, quàm nostrae vulgaris minorae, leuiter acuminata, vncias tres longa, vnam plus minus lata : ex quorum alis inaequali longitudine exeunt pediculi, aliàs non totam se-

munciam aequantes, hirsuti, quibus haerent flores lutei in quinque laciniis digiti, apicibus totidem in medio luteis : folia, auctore Clusio, recentia acidulant, deinde saluam sciunt, infimaque parte nigris punctis distincta sunt : flores cum grauitate odorati : radix geniculata, ex singulis vt plurimum geniculis nouas propagines producens, & subinde agens, quibus telluri firmiter inhaeret.

Clus. Pann. *Lyfimachia* prima, *Lyfimachia* altera flauo flore.

C. Bauh. Phyt. *Lyfimachia* 2. siue lutea minor.

Argentinae anno 1595. habui ex plantis D. Agerii *Lyfimachiam* luteam minorem.

LYSIMACHIA ALTERA LUTEA
Lobelio, flore quasi spicato.

Plant. icon. *Lyfimachia* lutea altera, aut *Lyfimachia* salicaria : Onagra quorundam



C. Bauh. Phyt. *Lyfimachia* 3. siue *hystolia*, floribus globosis luteis.

Lyfimachiam locum secundam picatam apud Platinum, vidi apud Fratrem C. Bauhinum, Basileae anno 1594. siccam eandem habeo.

LYSIMACHIA PURPUREA
quibusdam spicata.



Plures parit radices, digitales, ligulas, albas, caules ad hominis altitudinem latiore solo adulescunt, rigidi, in alas diuisi, angulosi, subrubentes : folia vt plurimum bina ex certis intervallis, aliàs terna, saligna, quàm luteae *Lyfimachiae* strictiora, acuminata, sicco gustu : flores in spicis dracunculibus,

aut brevioribus, hilari purpura oculos perstringunt, quorum singuli senis foliis constant, staminibus concoloribus medium occupantibus, ex calyculis oblongis striatis, subpurpureis.

Icon nostra ex Guariniana non multum placet, dubitamus etiam an hic ponenda.

An Trago Germ. Ein heidnisch wundkraut / optima vulneraria herba reperta in equo per Lupum dilacerato. An Lar. Solidaginis species Bernadino de Rentzingen?

Matth. *Lyfimachia* altera flore spicato : Centaurium magnum à quibusdam putatum. *Lyfimachia* altera Lacunae. Camer. Hort. *Lyfimachia* purpurea, Tabern. Camer. ad Matth. Germ. Castor. *Lyfimachia* flore purpureo Anguill. Casalp. Camer. hort. *Lyfimachia* 2. Turnero. Gerner. hort. *Lyfimachium* purpureum cognominatum flore rubro, non colore solidi, sed specie tota diuersum à luteo. Dodon. Gall. *Lyfimachium* secundum : Lat. fol. Pleudo *Lyfimachium* purpureum alterum. Falluntur, inquit, qui pro Centaurio colligunt : sed multò magis, qui ipsum Centaurii speciem esse rentur.

Lobel. Obs. & Icon. Pl. *Lyfimachia* purpurea, forte

fortè Pliniana. *Lysimachia altera* Matthioli. Hist. Lugd. *Lysimachia altera* Matthioli. C. Bauh. Phyt. *Lysimachia* 3. siue spicata purpurea, fortè Plinii. *Lysimachiam purpuream* quibusdam flore spicato vidi Monspelii & Genevæ ac Basileæ florentem ad Biscam mense Iunio & Iulio. Montbelgardi abundat propè *Adincourt* & iuxta viam quâ itur *Souchaur*.

LYSIMACHIA PURPUREA Pannonica.



Nostre *Lysimachia* purpurea spicata affinis. Pannonica *Lysimachia*, caule quadrato, in oppositos ramos diviso, sed tenuiores: in his folia angusta apiculata, ex aduerso sita, nervo secundum longitudinem decurrente: in summo caule flores in longa spica cohaerent, quaterni ferè, aut singuli etiam alternim & graminei folioli sinu prodeuntes, colore purpureo præditi, his senis contexti, & calyce oblongo mitiore quàm in purpurea spicata nostra, striato, ad Calamethæ calyces accedente. Rarè cubitale altitudinem hanc *Lysimachiam* superare testatur reliquit Clusius, foliaque si mordeantur gummosa, deinde nonnihil acrimoniae & amaritudinis exerere: radicem duram lignosam, multos caules singulis annis proferre, & subinde lateribus se propagare & multis fibris inherere.

Clus. Pann. *Lysimachia* 2. *Lysimachia minor* rubro flore. Caip. Bauh. Phyt. *Lysimachia* 4. siue rubra non siliquosa.

Accepi plantam ex Agertii siccis Argentinae 1595. quæ colore florum valdè placet, qui mihi caeruleus ferè videtur, inscriptio erat, *Lysimachia purpurea* Pannonica Clusii.

EPHEMERON MATTHIOLI.

Prodit foliis oblongis, latis, duriusculis, veluti liliatis, sed tamen minoribus, cauliculis compluribus rotundis, cubito altioribus, non absque adnatis: quos superius quinquefolii candidi conuectant *stipules*, haud magni, successivè prodeuntes, semen succedit in rotundis capitulis exiguum, crassis & multis fibris capillatæ radicis.

Ephemerum quod filii Irin appellant in Ananienfibus montibus tam in pratis, quàm in silvis copiosè nascitur, vbi Indigenis vocatur vulgò *Giglio Matta*, hoc est, Liliolum stultum. Huic certè, nisi me fallit iudicium [inquit Matth.] omnes proflus notæ conveniant, quæ alteri *Ephemerum* & *Dioscori* tribuuntur, & Galib. 6. *Ephemerum* non Tom. II.



Matthiolum non descripsisse plantam vulgò non notam, si eam benè agnovit.

Plant. Icon. Lob. & Obs. *Ephemerum* Matthi. vel potius *Ephemerum spurium*. H. Lugd. *Ephemerum* non lethale. Matth.

Tabern. Icon. *Ephemerum* Matth. Wiseri Zeitlosen, rechteblumen.

Matthiolum aliud *Ephemerum* exhibet, quod in hortis Belgia aliter, quàm ab eo depingitur enatum est: verum illud cum *Ephemerum* Dioscori, immò nihil convenit: Dioscorides *Ephemerum* ait à nonnullis appellari *Iris dyesaur*. Ast mauult Dodon. de purg. legere *velut dyesaur*. Nam si folium caulesque Lili, citius Liliolum silv. quàm silvestris *Iris* videtur nuncupandum *Ephemerum* Matthioli.

C. Bauh. Phyt. in app. *Ephemerum* i. siue Matth. *Ephemerum* 2. siue Matthioli, vel potius spurium Lobelii. Vix credimus easdem esse, cum illi folia Lili & radix vnica digitalis tribuatur: huic verò folia & radix liliatis ascribantur: imò figurarum nulla similitudo: verum cum neutram viderimus nihil statuere licet. Idem tradit apud Matth.

LYSIMACHIA SILIQUOSA HIRSVTA; maiore flore purpureo.



Multis filii. Descriptio
bris capillatæ radice nititur, caules emittens tenues, teretes, rubentes, subhirsutos: folia sepe bina, non exactè aduersa, Salicis, crenis rubentibus incisa, glabra, gustu viscido; aliquod coloris vestigium relinquente: flores longis, quadratis, hirsutis rubentibus siliquis in qua-

tuor foliola fatifcentibus infident, dilute purpurei, ex quatuor foliis cordatis striatis compofiti, in quorum medio fibra ex luteolo herbida: *siliqua* prapropero ortu flores at. teuerentes *semen* continent pusillum, lanugine candida involutum.

Trago Salicaria altera pitipiteas ferens *Viola* Andree wederich mit braunen Violten.

Fuchf. *Lysimachia purpurea*.

Meminit huius Gesner. in fine Hist. Cordi cap. de Chamnerio, dum Chamnerii speciem describit, quam Delphinium esse putat: Herbari quidam [inquit] putant esse quam *Filium ante patrem* appellant, quod siliquam & in eis scitien ante floris exitum ostendat, rectius si *Partus ante* ab eis appellaretur. Iam apud à tere. siliquula per extremum in expansum florem exeunte, Buccinariam dici audio. Ruellius Bellium cum Anupatze confundit, Delphinium non existimo. Filus ante patrem vocatur, ab aliis (in Germania inferiori praesertim) Antoniana vel S. Antonii herba: Nostri Schoßfraut appellant: Dodonaeus inter Lysimachias describit. Appellatur, si libet Epilobium. Idem de hort. scribit Antonianam vel S. Antonii herbam, ab aliquibus Filium ante patrem, & aliis Lychnidem maiorem & hirsutam appellari.

Dodon. Gall. *Lysimachia* 24. Filius ante patrem, *Lysimachium purpureum* primum. Lat. in fol. Pseudolysimachium purpureum 1. Quae porro de hoc tradit, cum ad intelligentiam verborum Gesneri iam dictorum conspectu videantur, ea adscribere placuit. *Lysimachia* species habetur. & à Fuchio ante nos, inquit, pro *Lysimachio purpureo* descripta: non est tamen legitimum *Lysimachium*, sed spurium ac Pseudo-*lysimachium*. Qua de causa & alii maluit ipsum nominibus Gesneri compellere, & Epilobion, aut Chamnerion vocitare: *Chamnerion* quidem, quod flos sit Leucoio similis super siliquam natus, *Chamnerion* verò à similitudine aliqua cum Nerio siue Rhodendro, praesertim altius assurgens, cuiusque flos è lationibus foliis compofitus exiguum rosam æmulatur. Idem verò & Antonianam dici à nonnullis refert: sed tamen & aliam ait Antonianam esse, quae dentium dolori medeatur. Nominatur verò & passim Filius ante patrem, propterea quod siliqua appareant prius quam flos. Censetur etiam à quibusdam Onagra Veterum, quae & Oenothera siue Onuris. Dioscorides verò hanc ait esse iuvencem praegrandem arboris instar: *Lysimachium* verò istud purpureum non nisi herba est, hyeme etiam inarescens tantum abest ut frutex sit, aut arborem æmulari queat.

Aduers. Lob. & Penz. *Lysimachia siliquosa*, Filius ante patrem. Lobel. Obs. & Icon. Plant. *Lysimachia siliquosa*, Delphinium Dioscoridis Dalechamptio. H. Lugd. *Lysimachia purpurea* 2. Dodonzi. Tabern. Hist. & Icon. *Lysimachia siliquosa* 1. C. Bauh. phyt. *Lysimachia* 5. siue *siliquosa hirsuta* magno flore.

Lysimachia siliquosa hirsuta maiore flore purpureo. Germ. Rort & Braun weiderich. Gesn. Schoßfraut. Eidem Epilodium, Filius ante patrem, Antoniana, vel S. Antonii herba, Lychnis maior & hirsuta aliquibus, Gal. *Lysimachie rouge*, Dodon.

Filius ante patrem maior folio hirsuto, variis locis provenit, circa Montbelgardum mense Augusti florentem vidi inter Dale & Audincourt, paludoso loco, ac etiam in horto E. Cel. Provenit

Montepelii: Basileae propè Moutèts, & propè Birsam intra urbem & extra portam S. Albani ad Birsam eandem florentem vidi Iunio, Iulio & Octobri. Frater observavit ad Rhenum extra portam Righen. Ferraria in Cænobio S. Dominici à l'Angeli vidi. Guilandinum vocare Delphinium mihi indicatum. Iuxta scrobium, fossarium, fluitiorum, rivulorumque margines, aliisque humidis locis reperitur: quandoque tamen & in siccioribus exit, praesertim quod latioris folii florem gignit. Tota ferè æstate floret. Dodon:

Cætetum, vsum in Medicina [eodem referente] cum nullum habeat, vires quoque eius ac temperamentum cognoscere non contigit: Gesnerus tamen calidam & siccam secundo gradu indicavit esse, atque ex diversis constare partibus, nonnullis evidentè adstringentibus, aliis verò modicè abstergentibus.

LYSIMACHIA SILIQVOSA HIRSVTA flore minore.



hirsuta, coloris ex rubro pallentis, vel albid: radix multis fibris est capillata.

Dod. Lat. fol. Pseudolysimachium purpureum minus.

Tabern. Hist. & Icon. *Lysimachia siliquosa* 2. C. Bauh. phyt. *Lysimachia* 6. siue *siliquosa hirsuta* parvo flore.

Lysimachia hirsuta siliquosa flore minore, provenit Montbelgardi, ut in Horto E. C. spontè.

LYSIMACHIA SPECIOSA QVIBVSDAM Onagra dicta, siliquosa.

Lysimachia species reliquas proceritate superat hæc quibusdam putata Onagra, tres quatuorve aut plures cubitos alta, caule glabro, canaliculato, subrubente, copiosa medulla alba fungosa pleno, foliis multis ab imo ad summum, sicut & in ramis, donato, ad Salicis aut Nerii folia accedentibus, oblongis, mediocriter angustis, acuminatis, vtrinque glabris, rara quædam per ambitum crenatim vestigia ostendentibus, obliquis ad latera venis, à nervo medio secundum longitudinem decurrente deductis, sapore subadstringente & glutinoso, non sine aliqua obscura atrimonia: in ramis tuberibus longa serena (nec)

Onagra


Nomina

Locus & tempus

Descriptio

Locus

Descriptio



nascuntur filiqua longæ, quadrata, (ceu in Lysimachia cui Filius ante patrem nomen) rubentes aut ex rubore in cinereum declinantes, subhirsuta, biuolux, in quibus semen papposotomento delicatissimo inuoluitur, perpusillum, oblongum cinereum, filiquarum porro fastigia in quaternis folia angusta explicantur, flores sustinentia speciosos

Leucoii, purpurascetes, quorum medium occupant stamina candida, apicibus rubentibus aut luridis, pistillo longiore, in quatuor cruscula desinente. Radix alba, longè latèque repit, gustu insipido viscosoque.

De hac Hist. Lugd. *ὀνoθήρα, ὀνoθήρα, ὀνoθήρα* Dioscoridis *ὀνoθήρα* Theophrasto, *ὀνoθήρα, ὀνoθήρα* Galeo, Latine similiter Onagra, siue potius Oenagra, & Oenotheris, Oenuris à vino dicta. Frutex est arboris specie, ita deserviente Diosc. admodum magnus, folia habens amygdalæ similia, sed latiora, & Lili foliis similia, flores rosarum specie, magnos, radicem albam, longam, quæ siccata vini odorem reddit. Nasctur in montanis locis. Eadem Plinius tradit.

Franc. Calzol. insignis Phamacop. dicit in sua montis Baldi descriptione, provenire ibi Onagram, hanc fortè intelligens. Onagram quidem siue Mulcibutam in Veronensi Baldo Lobel. & Pena sciscitati sunt: sed id responsi tulerunt, nullam repertam plantam quæ quadret Onagra.

Nullum inquit Matth. in Diosc. licuit repetere qui mihi Onagram, siue Oenotheram, aut Onuris Dioscoridis, siue Oenotheram Theophrasti ostenderet. Ad me scripsit Lucas Ghinus, scriptis à se ex Apennino translata, foliis Amygdalæ. Quæ sanè omni ex parte Onagram referre videtur, cisi ipse quoque pro certo non ausit asserere hanc legitimam esse Onagram.

Gesner. in sine Hist. Cordi, depingens & describens vocat Elobii quintam speciem, quam priuatim Chamænerion nuncupat. Aliqui verò seâr fraûr Ignatiæ. Nec assentitur illis qui Lysimachii speciem hanc esse suspicantur. Idem tamen rursus de hort. Antonianam herbam, S. Antonii, Filii autè patrem, speciem maximam facit.

C. Bauh. phyt. Lysimachia 10. siue Chamænerion dicta, latifolia, flore caruleo & albo, sed rariùs.

Lysimachiam speciosam filiquosam, Dalechampsio Onagram dictam, vidi Basileæ spontè & in hortis cum flore Iunio. Frater C. Bauhinus observavit in monte Moutets. Mense Octobri repertum in monte Balon, florentem Augusto. Abundat circa Montbelgardum quâ itur Adin-court, vnde transiit in Hortum Ill. E. C. Aqua in qua radix maduerit in potu data, auctore Diosc. fetas mitigat & cicures reddit: illita quoque maligna vlcera muleet. Adiecit Cræteus, inquit

Tom. II.

Plinius, Oenotheridè, cuius aspersu è vino feritas omnium animalium mitigaretur. Ex per se Oenothera effertantia sese vlcera sanat, sita *ὀνoθήρα* Dioscoridis exponens. Huius radix, inquit Galenus, arcta vinolum quiddam redolet: Sed & facultatis vini est maxime.

LYSIMACHIA LÆVIS.



Lævis non Descriptio
men meruit, rō quod nullis penitus pilis sit obfita sed quod vix eded tenuibus tam in caulibus bicubitalibus, altioribusque, teretibus, rubentibus, ramosis, quàm in foliis (quæ bina opposita, ex intervallo, latiuscula serrata) donata sit, ut oculorum aciem ferè fugiant. Sunt autem

subadstringente sapore folia: flores filiquis longis Lysimachia filiquosæ hirsutæ similes, sed foliorum instar lævibus, quibus flores insident minores diluioresque, quàm in iam dicta Lysimachia: semen simile: radix multis fibris intertexta, squammosis stolombus se propagat.

An Aduerf. Lysimachia filiquosæ altera species?


An Dodon. Gall. Lysimachia secunda alia specierum minima.

Lysimachia, siue Filius ante patrem, lenis, floret mense Iunio. Eadem nomina à Gesnero huic, ni fallor, attribuantur, quæ alteri hirsutæ quam lævem maiorem vocat. Basileæ in sylis observavit Frater Montbelgardi florens & semine maturo Augusto.

Locus & tempus

LYSIMACHIA SILIQUOSA

speciosa, angustifolia.



Superiori tota quidem Descriptio
facie similis, foliis est confertim multis simul coaceruat, Linariæ foliis & longitudine & latitudine paribus: flores consimiles purpurantes; longis incanis iam dictæ corniculis insident, minores: radix repens cum præcedentis radice conuenit.

Planta hæc ut refert Hist.

Gggg 3

Lugd. quæ Linariam rubram vocat, Herbariorum quorundam iudicio Therionarca est Plinii, fruticosa, foliis subviridibus, flore roseo. A plerisque etiam an Delphinium sit Græcorum non sine causa ambigitur, quod huius folia incisa non videantur; qualia Delphini à Dioscoride describuntur. At si diligenter notas à Dioscoride memoratas expendamus, & Delphini historia parum distat.

Lebel. Obs. & Icon. Pl. Chamænerion Gesneri, Delphinium Buccinum Dioscor. Lyfimachiz siliquosæ varietas.

An Gesner. hort. Antoniiana, Filius ante patrem minor, Schöb frait.

C. Bauh. Phyt. Lyfimachia n. siue Chamænerion dicta angustifolia. Epilobium [var. Schöb, Viola super siliqua] sextum Gesner. ad Cordum.

Lyfimachiam siliquosam speciosam angustifoliam repertam Geneva iuxta Annuum Arut. D. Dalechampius vocabat Thetionarcam Plinii lib. 25. cap. 9. & aliorum Delphinium. Frater Casp. Bauhinus attulit ex Italia nomine *Herbe mora* Cortuso, & Chamænerii Gesnero.

Et quia dubitatur an sit Therionarca Plinii & Delphinium Dioscoridis, idem vires etiam adscribendæ earum plantarum veniunt. Therionarca Magica omnes feras torpescere, nec nisi Hyænz virgæ aspersu recreari auctor est Plinius. Et alio in loco, Serpentes necat, inquit, & cuiusque admotæ feræ torporem adfert. At cum Therionarca dicatur, quod sit *volucribus videri*, hac admodum non feras omnes torpescere & serpentes necari sed venenatas tantum bestias, & mortu idæve noxias; melius fortasse dixisset Plinius. De Delphinio verò scripsit Dioscorides semine nihil vtilius bibi posse à Scorpione percussis. Aiuntque obiectâ herbâ Scorpiones resolui, atque ignavos torpescere: se notâ verbâ eâ sese recolligere.

NOLI ME TANGERE:

CAP. XXVII.

Descriptio.



in ambitu ferrata, mollicella: ex quorum alis pedicelli tenent, in quibus ex duobus foliis sese

Spice radices higit fibrosas: à quibus caulis surgitur cubitalis, dilutissimè vires, inanis & diaphanè, copiosum succum inspidum pressu remittens, per intervalla geniculis, ad quæ toporum podagricorū æmula subinde tuberosa; interceptus: folia Cynocrambes, latiora; obtusio-

explicat flores, Nasturtii Indici floribus affimiles; minores, corniculo intorto, ex flauo rubentes punctulis rubris saturationibus guttati, in quorum medio exalbida staminibus succedunt siliqua oblongæ Chelidonii maioris; angulosæ, quæ maturecente semine leui contacta semine excusso dissiliunt, multis terrorem incutientes; Vermiculorūque instar conuoluuntur: Vnde Noli me tangere nomen inditum. Non in omnibus placeat figura nostra Guariniana.

Trag. qui in Hist. Germ. Springkraut / ein wild Ringelstrauch & wolffstrauch vocat, ac in Lat. Mercutialem 4. siue siluestrem alterâ, & Elulam 7. seu dulcem statuit, Leptophyllum Tithymalum appellat. Verum hæc opinio penitus damanda est, cum vix quicquam commune habeat cum Tithymalis: nec enim folia, nec flores, nec semina respondent, quod mecum Gesner. pluribus in locis sentit: Apocynon eminus appellans.

Lob. & Pena Adu. Persicariam siliquosam vocant, cauendumque etiam præcipiunt, ne quis Mercutialem putet, eamque in eos vsus legat, ut nonnulli hallucinati fuerunt. Negantque esse Senensis Phyllon: Statuentes potius esse alteram Elulam sylvestr. Tragi: nec agnoscens se Elulam istam Tragi tradidisse pro Persicaria siliquosa.

Hist. Lugd. Persicaria siliquata: An eadem Chrysa: Ac certe: Si Chrysa Hist. Lugd. non est Noli me tangere, erit ei valde affinis.

Recordor à me hanc herbam primò visam in valle Leborana, inter Kapelsstein & S. Mariam, ubi fodinæ argenti, cum ellæ adhuc puer, cuius semen subito suo saltu horrorem mouit. Inueni in monte propè Eschen Il. mei Principis, ac transfuli in hortum E. C. Tubingæ cum ellæ Fuchsius præceptor meus Mercutialis speciem faciebat: Basileæ vidi ad Pontis finem quæ itur Balneæ guent in itinere ex Morat Basileam copiose reperitur Balstätt & Wallbürgi loco humido florantem mense Septembri cum seminibus maturis: Basileæ in horto D. Theoderi Zvinckes observauit florentem Iunio. Frater Casp. Bauhinus anno tavit provenire in Münchstein. Tiguri in horto Gesneri vidi. Inueni florentem cum semine maturo Augusto mense in ascensu montis Ballon. Dy. Melchior Sibitzius Medicus Argentinæ mihi scripsit quosdam vocare Hydriopiam à turgentibus folliculis. Viennæ Austriæ in siluula Wolff dicta reperitur.

Distillatam aquam ex herba Springkraut Virens vel hirschemeldén dictam Vraillauiz in calculo renum misicè prædicant: Noli me tangere, articuli turgiduli visuntur, ceu demonstrante natura in promouenda vires eius vsum plurimum valere. Hanc quoque in Oleo Liliorum aut alio decoctam applicari Gelsæus non putat inutile. Folia eius aliquot viro stranguriâ laboranti vtiliter imposuit, ac miram etiam vim habere dicit in cienda virina, ac aquam distillatam præferat: quæ si copiosius hauriatur vel diabetem inducit. Folia quinque in poculum vini nuper imposuit mulieri *sparyvaca*, & vino epoto melius habuit. Canis, cum deditur iusculum in quo manipulus eius decoctus erat, per sesqui horam postea copiosissimam reddidit urinam, pluribus verò horis post etiam alius copiosè mota est: cuti imposita *pariani*. Impatiens herba facultate fertur perniciosâ ac inter deleteria habenda Dodon.

BALSAMINA FOEMINA PERSICI
folia, vel Salicis folio.

CAP. XXVIII.

Balsamina, quam Fœminam vocant, radice fibrosa & candida nititur: caulem autem habet enormis crassitie, cum altitudo cubitum sæpè vix æquet, rarò autem & parum superet: estis verò cortice aut ruffo aut rubescente, aut herbido te-ctus, succo satuo prægnans, glaber ferè, cum inter-ram ramis, quos nullo ordine emittit, tomento le-ui vestiantur, foliis dense stipati, Salicis aut Per-sicæ, acuminatis, per ambitum serratis, succulen-tis, sapore amaricante præditi: è quorum alis flores simul plures, Impatiens herba Dodonæi (a' d'icere) proflunt, calcarì longo ex carne co-lore herbaceo, reliquis verò flos rubescit: fructus qualis Balsaminæ maris, acuminatus, verrucosus, in quo semen clauditur.

Matth. in post. com. Lat. & Ital. cum mag. fig. Camer. in Epit. Balsamina altera. Ital. Balsamina maggiore, siue fœmina. Germ. Balsam fraut weible. Balsamina fœmina Persici folia, Persica-ria nonnullorum, Aduers. Lob. & Penz. Anguill. Balsamine altera, Itolorum herba di Sancta Catha-rina.

Gesner. hort. Balsaminæ vulgò dictæ, Her-bæ noli me tangere cognatam suspicatur.

Trag. Balsaminæ alterum genus.

Cord. Hist. Balsamella, cui Gesnerus addit figu-ram, vocans Balsaminem peregrinam, alteram Fu-chsii, Dodonæi fœminam.

Dodon. in fol. qui describit & depingit sub ti-tulo Balsamina, ait, vulgò Balsaminam nuncupat: & quandoque neutro genere Balsaminum.

Plant. Icon. Balsamina fœmina Persicifolia.

Tabern. Iconib. & Hist. Cam. apud Matth. Germ. & Hort. C. Bauh. Phyt. Balsamina fœmina. Hist. Lugd. Balsaminum, seu Balsamina Matth. Balsamina Fuchsii: duas proponit Icones.

Balsamine fœmina folio Salicis Montbelgardi faciliè prouenit in Horto E. C. non maturefcit quòtannis semen, licet sæpè. Basileæ habui in Horto Patris, apud D. Doctorem Fœlicem Plate-rum vidi florentem Iunio: obseruauì Eslingæ & Patavii.

Putant quidam [id quod etiam scribunt] & hanc ipsam esse cu n altera Momordica viribus. Verùm Matth. nullam eius experientiam ha-bet.

ISATIS, SIVE GLASTRVM SATIVA ET
spontanea.

CAP. XXIX. }

Pollicaris huius radix albida, & lignosa ad cu-bitum aut sesquicubitum descendit: caules teretes, rigidòsque surrigit, ramosos: flores in ramulis lutei, crebri, exigui, ex foliis octo, maio-ribus, alternante situ cum minoribus positis: sta-mina lutea: capsula seminum nigricantes, linguæ auis similes, sed multò breuiiores, angustiores: que, costâ longitudinem pereurrente, secundum quam etiam aperiuntur. Folia ad Cynoglossum accedentia, nonnihil glauca, longa; ad cubitum etiam, glabra, quædam ex prioribus interdum hirsuta, ac etiam nonnunquam sinuata ad Hes-



peridis folia ac-cedentia, quæ-que in caulibus & ramis sunt, nullo pediculo interueniente adnascuntur, pinnatis bar-bulis ad basin donata, glabra.

Duo Istatis Diofci gene-
ra duo

genera tradun-
tur à Dioscori-
de: Istatis quæ-
dam

Glastrum dome-
sticum, Istatis

a' glauca Glastrum

syluestre. De

domestico in-
quit: Istas sa-
tiua quæ caret

Vet.] quâ La-
narum Inse-

tores vtun-
tur, folium ha-
bet Plantagini

simile, verùm

pinguius ni-
griusque: cau-
lem altitudine

duos cubitos

excedentem.

Syluestris iam

dictæ similis,

sed folia habet

maiora, ad La-
struæ proximè

accedentia:

caules verò te-
nuiores, mul-
tífidos qua-

dântenus ru-
bentes, è quo-
rum cacumine

folliculi multi dependent, quandam linguarum effigiem referentes, in quibus semen: florem me- linum & tenuem.

Sciendum autem, quod secundum Dioscori-dis descriptionem, quæ hodie apud nos domesti-ca est, syluestris sit apud Dioscoridem: & contrà, quæ in aruis nascitur, domestica, angustioribus ca-nim foliis constat, & paucioribus ramis, non ta-men ea in vsu est apud Lectores nostri tempo-ris, neque caulem adeò altum gerit.

Verùm prædictas descriptiones erroneas esse & mendosas attestatur Cornarius. Ait enim me-linum florem, & tenuiores ac multífidos caules, & in cacumine folliculos illos linguarum quan-dam effigiem representantes Istas habere sati-uam, non syluestrem. Contineri autem in iis se-men nigrum Melanthio (ait Cæsalp.) simile. Sed & caulem duos cubitos excedentem, & non, vt quidam dixerunt, vnum solum cubitum superan-tem producere. At syluestrem Istas nigriora fer-re folia, cauliculum minorem & crassiores, flo-rem purpureum, aut cæruleum: fructum aspe-rum, cruciformem, seften includentem foliis par-uis, & assidue per intervalla quinis distinctum.

Hoc modo legentibus, vt Hermolaus legit, no-strum Glastrum, teste Cæsalpino, satiua Istas ad a-mum quadrabit: syluestris autem Istas, ex

Istatis do-
mesticaFolium
Plantagini
simileIstatis silv.
Istas a
Istas præ-
sima

*Herba S.
Antonij*

planta fuerit, quæ vulgò herba S. Antonii vocatur ob effectum. Nos de herba S. Antonii agimus lib. 22. titulo Dentellaria Rondeletii.

*Lactuca
generis.
Brassica
filia.*

Plinius utriusque Itatini inter Lactucas sylvestres recenset, cum autore Casalpino, aptius inter Brassicas sylvestres numerari debuissent.

*Luteum
Vitruvii
falsò.
Vaccaria*

Victorinus (& eum secutus Cordus in Diosc.) ait Dalech. in annot. apud Plinium, falsò putatur glastum esse luteum Vitruvii: Itatis adhuc à Lobel. depicta non alia est, quàm Vaccaria, de qua lib. 29. Anil quod Fragosus describit, quòdque in Occidentali India coli asserit, nil nisi Itatidem Clusius dixerit. Glastum, vt ait Cornar. Gallica vox fuit Iulij Cæsaris ætate, hodie & Itali & Galli

Guadam

guadam vocant. Marcel. Medicus Empyricus Vitrum appellari dicit herbam, quam Græci Itatida vocant. Si igitur Vitrum vox rectè legitur, vt Itatidem significet, vox Rnta, aut vt alii habent,

Vitrum

cluta, in supposititiis vtique falsò legitur, & frustra laborarunt qui pro ipsa Luteam (quam Holzer. Geldam vocari ait) ex Plinio & Vitruvio substituere conati sunt: sed sunt hæ voces omnes merito nobis suspectæ.

*Rnta. Glu-
ta*

Lutea

Itatin satiuam, inquit Ruellius, siue Glastum, quo Insectores lanarum vtuntur, Glastum olim Græci dixere, nunc guadam, vel potius gualdum, nonnulli S. Philippi herbam, alii Indicum, alii Pastellum. Caruleam spumam cortinis innatantem, Indum nostri vocant Insectores. Diosc. Egena quoque vocari tradit, quam suspicor Ighen ab Hippocrate dici.

*Rnta. Glu-
ta*

Sunt id perhibente Dodonæo, qui apud Cæsarem & Plinium non Glastum, se Vitrum legendum esse existimant, nec desunt qui in Nitrum commutent. Verisimilius Marcellum pro Glasto voce Gallica Vitrum perperam scripsisse, quàm Cæsarem aut Plinium pro Vitro Germanorum Glas, aut ab hoc formatum Glastum supposuisse. Extat Pastelli siue Pistelli nomen apud Plinium Valerianum lib. 2. cap. 3. Ab Auic. cap. 512. dicitur Nil. Natantem autem spumam, quàm Itatidis dilutum, cum panni lanæ tinguntur eructat, sunt qui Indicum & quidem alterum Diosc. esse existimant, quod tamen non omnino manifestum, nam ex Itatide effervescente Indicum effecti Diosc. non asserit, sed ex zreis valis attolli tantummodò habet.

*Ignis Hip-
pocr.*

Dioscorides, ait Constant. sub Itatidis nomine duas plantas complectitur, tantum sylvestris ac satiuæ apposita differentia. Vtramque suo nomine distinguunt Plinius, satiuam glastum vocans, sylvestrem verò Itatin: quem imitari potius deberent Interpretes, quàm nomina confundere nullius auctoritate utramque plantam Glastum vocantes.

*Vitrum a-
pud Casalp.
Nitrum.
Marcelli
error
Pastellus,
Pistellus
Nil Auic.*

Itatin satiuam & sylvestrem, ferè omnes vno ore nominant, sed pungunt Fuch. Matth. Lacun. Lonic. qui etiam Lytrum vocari ait: Ryffius qui satiuam Glastum vocat simpliciter, sylvestrem verò, sylvestre Glastum: Amat. Dodon. Camer. in Hist. Germ. Matth. & Epit. C. Bauh. apud Matth.

*An Indicu-
m. Diosc.*

Tragus pingens satiuam tantum, sylvestrem nihil differre ait, nisi quòd non vbiq; locorum plantetur. Contra Tabern. Icon. & Histor. sylvestrem tantum exhibet. Lobel. & Pena in Adu. Glastum satiuam, & Glastum siue Itatin sili. nominant & describunt, ac in Obs. & Icon. Plant. iidem nominibus pingunt.

Itatin pingens. Lat. Glastum satiuum, & Itatis domestica. German. Weid & Endich Ryff. Belg. ling. uari. weedr. Gall. guesde, ou Pastel cultrée: Ital. guado domestica: Hsp. pastel: Angl. Weede & weade. *Itatin uirga.* verò Glastum, seu Itatis sili. & spontanea, Germ. wild weid, Belg. wild weed. Gall. pastel sauvage: Ital. guado saluatico: Hsp. pastel saluago: Angl. wild weade. Vtramque vocant Mauritanij dila, dileget, efure, chat, chat, alchat, alden, aut adhlen & nil, Sic & Græci zoin; Lat. Glastum & Guadam Ryff. Itatin. Germ. weidr Endich: Belg. weed: Gallic. du guesde, pastel de Languedoc: Ital. guado: Hsp. pastel: Angl. weede & weade: Boh. wayde indifferenter vocant. In Tholafana regione, inquit Lobel. virens herba guede, glebz tabefacta herbæ pastel vocantur, ceruleus verò ille color, qui inde conficitur Indicum. Germ. Jendich. Carol. Stephan. domo rust. Gall. garde & guesde idem esse scribit, quod Veteribus Glastum & Itatis.

In Ducatu Wirtembergico Marbaci & Tubingæ vidi spontè prouenientem Itatidem: obseruavi etiam Basileæ: Frater arnotauit prouenire ad Rhenum extra portam Riehen: Vidi præterea spontaneam in agris Alsatiæ: Satiuam vidi Patavii in horto publico, Basileæ in Horto Di. D. Fœlicis Plateri. Montbelgardi vidi serentes & transplantatos agros integros, habeo in Horto H. E. C. quæ scilicet propagat, semine deciduo: nescio an satiuam differat à spontanea, præterquam ratione culturae, primo anno non solet caulescere, caulem vbi produxit plerumque perit: floret Maio & Iunio. Basiliæ ad Rhenum spontanea pukhrè virens Octobri & Nouembri.

Cæterum sentur in latis & pinguibus agris, Satio copiosissimum in Galia Narbonensi & in Italia, vt in Vmbria, circa Noceram, quòd ibi Itatis copiosissima feratur, sicut & in Germaniæ agro Erphordiano. Ea permagnum quæstum iis regionibus adfert. Sylvestre Glastum locis incultis & pinguibus prouenit. Maio & Iunio mensibus ambo florent. Vt olim ita & nunc Glasto satiuo Insectores lanarum vtuntur. In Neustria quoque Galliæ, & apud eius Provincie Bellocassios Glastum feritur, & collitur, dilutius quidem in pannis tingendis quàm quod prouenit apud Tectosages, vulgò sen Loregeois, indigenis tamen valdè fructuosum, & vtile.

Illita folia Itatidis, teste Diosc. tumores omnes V discutiunt, cruenta vulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt: ignem sacrum, Phagedænas, putrescentia vlcera, & quæ serpunt, sanant, Sylvestre Glastum eadem præstat: potu & illitu lientosis auxiliatur. Plura vide sub finem. P. lib. 22.



HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS SECVNDVS.

CAPSVLAS, SEV VASCULA FERENTES HERBÆ, ACRES
& calidæ ferè omnes, vt Nasturtia, Thlaspi & similes.

A Siliquosis herbis haud ita longè recedunt, quæ minuta quadam vascula ferunt pro semini theca seu bursa: quarum multa in superiori libro dici poterant, nisi hac ipsâ seminum receptaculi notâ manifestâ distincte fuissent. Proinde peculiari libro illas comprehendere libuit, quem tamen si quis videret appendicem facere prioris, ut omnium sit vna Classis, & illam rationem adducere possit, quod & ha quoque pleraque acres ac calide sint.

NASTVRTIVM VETERIBVS.

CAPVT. I.



Oc tanquam notum non describunt Auctores: tantum ex attributis colligere licet aliquas notas. Dioscorides Ibericæ foliis & radicibus duabus (odore) Nasturtio comparat: Erysimum semine flauo: Sisymbrium aquaticum sapore acri. Galenus vitide inquit venire in obsonia cum pane, quoniam eius mordacitas humiditatis admixtione moderata sit, non exurens, vt si siccum esset; semen quoque adurens, vt Sinapis. Theophrastus innuit satium esse, quando ait: mense Iulio Nasturtium ferere assolent: exit à satû die quinto: semen autem vetus celerius prouenit: constat acris succo. Genera huic minimè plura: diuersitatem enim generis ei deesse omnino volunt: Sed & Dioscorides vni tantum meminit. Plinius duo tradit, ac alterum album, & alterum nigrius facit, sed nequaquam describit; meminit & Isidorus, cui effectum maiorem ad omnia tribuit.

Kardamon Dioscoridis spuria, nunc Cynocardamum, nunc Iberim, nunc Cardaminaceum seu Cardamanticum vocant; *Ægyptii Semerth*: Romani & officinæ *Nasturtium*; Barbari quidam Herbarii *Cressionem hirtensem*, Apuleius Cardaminam, Serapio *Norph*, *Alchep*, *Marchita*: Auerrhoes *Alcharif*: Mauritanii *Naf*, *Alchep*, seu *Narf*: Germ. *frees* / *Gartenfres*: Belg. *fers* / *hafffers*. Gall. *Cresson*, *Cresson de iardin*, *Cresson alenois* ou *Nasturt*: Dodon. Ital. *Nasturtio*, & *Agretto*: Hisp. *Nasturcio* & *Malpica*. Angl. *Verdin Cressys*, & *Towre Cressys*. Boh. *Kzerica*.

Nonnulli *Kardamon* Græcis dictum putant, quasi *Kardamon*, quod caput domet: nam arcem mentis.

Tom. II.

tis obsidens sua ferit acrimonia, & ignea vi pre-ditum caput tentat. Aliis *τὸ κάρδαμον*, id est, quod pupillas coeuntibus oculorum palpebris abscondat, ita dici aiunt: nam luminibus ad-motum subinde cogit conuiuere. A quo *καρδαμῖνον* verbum declinarunt, quod conuiuere dici-mus. Nec defunt qui dictum arbitrentur à *τὸ πῦρ καρδαμῖνον*, quod cor foueat, & in syncope cardiaca plurimum valeat. Id innuere videtur Aristophanes, cum ait, *ἐχθρὸς ἐστὶν ἀπὸ καρδαμῖνος καὶ αὐτῆς*; Edi heri Nasturtia. Quid Nasturtiaris? Et, *ἐκκαρδαμῖνον* & *καρδαμῖνον*, id est, qui acris sunt animo, iustique, quique Nasturtia tuentur, id est, acutè cernunt. Nasturtium verò Plinio auctore nomen accepit à narium tormento. Et inde vigoris significatione Prouerbum id vocabulum vsurpauit, veluti torporem excitantis. Quæ vulgarium Plinii codicum lectio cum vix tolerari possit, voce excitantis ad præcedentem gi-gnendi casum non rectè relata, cum potius excitans scilicet significatio, siue prouerbium, legi debere videatur, Cornarius multò emendatius locum hunc legisse videtur, hoc modo. Et inde vigoris significatio prouerbio eius elum vsurpauit, veluti torporem excitantis. Est enim re uera prouerbium, *ἐστὶν καρδαμῖνον*, Ede Nasturtium, quod in socordem, ignauum, & hebetem dic-batur, propterea quod vim Nasturtio inesse credebant animi vigorem excitandi, vt ex Plinio dicemus. *Cresson* fortè dicitur, quia perenni sobole, summis feruoribus, vel etiam *Brumæ* rigoribus spretis, crescit. Francigenæ etiam *Cresson d' Alenois* ab alendo fortè vocant.

Omnis est tēporis, loci, & cæli, teste Palladio, simum non desiderat: humorem, quamuis diligat, tamen deesse non curat. Si cum Lactuca

H h h h

feratur, nasci fertur egregiè. Semen per quin-
que annos servatur.

Locus

Nasturtium, inquit Plinius, in Arabia miræ
amplitudinis dicitur gigni. Idem cum Dioscor.
optimum esse dicit Babylonicum. Aristophanes
apud Athenæum Milesium excellere putat.

Vires &
Tempus.

Omnium semen Dioscoride autore est aere, exalfacit, stomacho aduersatur, alium turbat, tinea excutit, liene immunit, parrus exanimat, menses excit, venerem stimulat, Sinapis & Erucæ simile intelligitur: lepras & impetigines absterget. Illium cum melle lienum extenuat, fauos expurgat: pulmonum vitia extrahit, sorbitionibus incoctum: serpentium venenis potum resistit, atque eas suffitus fugat: capillorum defluvia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit & rumpit: coxendicibus cum potentia commode ex aceto illinitur: tumores collectionesque discutit: ad suppurationem perducit furunculos, illi cum muria. Herbae ad omnia eadem effectus, licet minor.

Plinius diffusius Nasturtii vires declarat, & in quibusdā à Dioficoride dissentit. Nasturtium, inquit, venerem inhibet, animum exacuit. Aluum purgat, bilem detrabit potum ex aqua decem denarium pondo. Cum loamento strumis illicum operitumque Bradica preclare medetur. Nigricapitis vicia purgat. Vsum compurgat, commotas mentes sedat ex aceto sumptum, lienem, ex vino potum, vulum cum fico. Tulsim ex melle, quotidie ieiuni sumant. Semen ex vino omnia intestinorum animalia pellit, effaciacus adhibito mēstastro. Prodest & contra suspiria, & tulsim cum origano, & vino dulci. Pectoris doloribus decoctum in lacte capris. Panos discuit cum pice, extrahitque corpore aculeos. Et maculas illitum ex aceto. Contra carcinomata adicitur Ovarum album. Et lienibus illinitur ex aceto. Infantibus verò de melle vrilissimē. Sextius adicit vsum serpentes fugare, Scorpionibus resistere. Capitis dolores contrito, & alopecias emendari addito Sinapi, grauitatem aurium trito imposito auribus cum fico. Dentium dolores infuso in aures succo. Porriginem & vlcera capitis cum adipē asferino. Furunculos concoquit cum fermento. Carbunculos ad supurationem perducit & rumpit. Phagedenas vicerum expurgat cum melle. Coxendicibus & lumbis cum polenta ex aceto illinitur: item Licheni: item vnguibz scabris: quippe natura eius caustica est. Siluestri verò ad omnia ea effectus maior. *Hac Plinius.*

Dioscorides tradidit Nafurtii semen *αμυραν*
περιου, id est, Venerem stimulare. Plinius con-
tra Venerem inhibere. Cui assensit Florenti-
nus in Geoponicis Constantino attributis, *φασι δ*,
inquit, *τις εχοντες καδουρα, ουστην του σιδαιου* *τις*
δου. Et addit *αερεσιον εφελκιδις* *εχοντες*. Sed
quum hæc tum Dioscoridi, tum experientia re-
pugnent, dicendum aut eos Nafurtii virtutes nō
rectè intellexisse, aut Codices eo in loco depra-
uatos esse.

Galenus perspicue eius vires & facultates explicat. Nascitur semen, inquit, adurentis seu caustica facultatis participes est, velut Napy. Proinde coxendicis & capitis dolores leuat, atque adeo rubrificationem efficit & exalfacit sicut Napy. Misceatur quoque remediis iis, que exhibentur asthmaicis, tanquam scilicet id, quod crassos succos valenter incidere valeat, velut & Napy. Nam per omnia ei simile est. Porro & herba arefacta similem feminim possidet. Humida vero adhuc ac viridis, pro-

per aquæ humiditatis mixtionem, multò semine inferior est, adeoque tunc mordacitas eius moderata est, ut cum pane eo uti liceat. Hæc Galenus.

NASTVRTIVM VVLGARE.

Racilis est radix paucisque donata fibris: ex qua primum enata folia minutis incisuris dissecta, Erucæ minoribus, adulta vel Erucæ modo diuiduntur, vel integra in margine duntaxat serrata crenatæ conspicuntur, sapore acit acerranis expetita : *cavilis* singularis in alas multas diuisus, colore est glauco, rotundus, pede altior, ac etiam cubitalis : *fofolius* albi vel purpureascentes quatuor foliolis constant : *Semen* suuilem, vel, vt ait Dodon. ruffo colore rubens, feruido gustu in *liquis* vel valulis paruis rotundiusculis, Thlapii vulgatilissimi, compressis.

Theod. Dorsth. cap. de Nasturtio, tantum de
hortensi scribit, Nasturtii licet aquatici iconem



Simili modo Domus rust. Car. Stephani & I. Liebaule confusè de Nasturtio ait: *Cresson de cailler & alenois & la Berle*, amant loca humidâ. fontium ripas & riuiulos, nullam requirunt culturam in hortis præter continuam rigationem & aquam ad radicem: vtrique magna virtus. Quid sit *cailler* nescimus, videtur tamen intelligere Nasturtium aquaticum: Quid etiam ei *Berle* dubiū. Nasturtium aquaticum non alitur. Nasturtium hortense non requirit multam aquam & continuam: Vt paucis dicamus Liebaultius nobis videret non intelligere nominatarum plantarum differentiam & culturam.

Gefner. hort Nasturtium maius album & minus nigrum. Sylvestre perfimile hortensi puto me in altis quibusdam montibus olim reperisse. Item in append. Nasturtium hortense, foliis validius: hoc duplex n. fallor: minus scilicet ac maius, quod ad Ranuncul. pratensis folia turn forma, tum magnitudine accedit. Nasturtium alpinum hortensi minori perfimile: minus iam altero anno mihi durat & semina proculit.

Nasturtium antequam caulescat, folia habere modicè lata, diuisaque Marantha tradit : at cum caulem ediderit folia mutare, esse enim tunc oblonga, tenuia, digiti longitudinem aequantia.

Suspicion

Suspicio Maranthæ non notum Nasturtium latifolium, quamobrem considerandum quam Iberidem intelligat de qua agit p. 91. quam Diosc. dicit Nasturtii foliis.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium n. siue hortense commune: Nasturtium album Plinio. Aliud est foliis simplicibus, quod læue & albius, vel subhirsutum, minus que album: aliud foliis valde diuisis, hoc maius & minus, aliud crispum & non crispum. *Synonyma* Nasturtium hæcenus non vidimus: Meminit olim Gesnerus Nasturtii subhirsuti, vt videre est ex eius verbis postea positis sub Nasturtio latifolio.

Ruell. Cord. in Dioscorid. Corn. Brunsch. Matth. Lacun. Lonic. Ryff. Amat. Anguill. Euch. Roess. Brunfels. Carol. Steph. Gesner. coll. stirp. Gerard. Dodon. Gall. Lob. Obs. Tabern. Cæsalp. Apollin. Camer. ad Hist. Matth. Germ. & Epic. *Nasturtium*. Camer. hort. *Nasturtium nostras*. Trago. Fuchs. Dodon. Lat. Hist. Lugd. *Nasturtium hortense*. Lobel. Icon. Plant. *Cardamon, Nasturtium hortense*.

Nomina & Synonyma linguarum, vide antè. Nasturtiū vulgare vidi Montpelii florens Martio, Patauī virens Febuario: Genevæ tota hyemē virens. Lugdunī semine maturo Iunio, Basilæa florens Octobri. Montbelgardi abundat etiam in hortis, vt in Horto E.C. tota hieme viret: vere tamē scitatur ad acetaria quod tenerius multo.

Duo Nasturtia quæ recensimus postea ab hoc vix differre viribus existimamus: facile patiemur etiam nobis persuadere huic ac eis conuenire vires à Diosc. & Galeno attributas, quas antè tradidimus. Vsurpatur passim ad ciborum condimenta & intinctus, & venit quoque per ætatem cum Lactuca atque aliis herbis oleo, aceto, & sale in mensis. Attenuat, inquit Matth. inundat, aperit, prouocat, incidit, vrit & resoluat. Nasturtium hortense in cataplasmate resoluat carbunculos, arthriticidem, ischiadicam, furunculos, & omnis generis apostemata, potissimum si adqueat feruētum. Sucus Nasturtii infusus auri, curat dolorem dentium à causa frigida. Semen masticatum & retentum in ore vtile ad paralysem linguæ: in paralyti aliorum membrorum applicatur cum sacculis semina in vino cocta: idem remedium confert, colica Laborantibus. Honestus quidam Mercator bibliopola Lugdunensis ætate consistente cū crudeli dentium dolore cruciaretur, & insomnis esset à triduo, lecto remedio modo scripto: succum Nasturtii calidum curauit in aurem instillandum: inde sentit magnum susurrum, sine dolore obdormiuit, à longo somno excitatus nullum ampliùs sensit dolorem: licet hoc medicamentum successerit, nolimus tamē temerè cuiquam præscribere, veriti, ne dum pellere vellemus dolorem hunc, aliū deteriorem excitaremus, nempe inflammationem aliquam in aurē & potissimum membranæ extensæ supra calcem quæ est in tympano, verceretur etiam attractio nem humorum in eas partes sine inflammatione: in causa tamen frigida non improbaremus sacculos semine calidos, vel ex ipsa herba, ac etiam masticatoria & collutiones. Belgæ Nasturtio cum pane & butyro mense Maio frequenter vescuntur. Facit ad graue illud malum, quod Scorbuto appellant: nec minor est huius, quam vel Cochleariæ, aut Nasturtii aquarici in hoc morbo vis & facultas. Ex alio delapsis aut præcipitatis datum confert: sanguinem coagu-

Tom. II.

latum dissoluit, & ne alicubi in corpore coeat aut coaguletur præcauet: sudorem etiam mouet, vt Recenciorum experientia inuentum ac comprobatur. Cardamomi loco ponit Nasturtium Colleg. Forentinum. Aqua in fine Maii distillata, cum melle permista, lineis pannis in ea immersis variolis imponitur. In quem usum etiam manè ac vesperti cum aqua Fragorum permista bibitur. Eadem quatuor viciis pota discutit tumorem, pollit lumbricos ventris, Vlcera & tumores reprimat, si sæpiùs inde fricentur.

NASTURTIVM CRISPVM IOH.

Bauhini.

Descriptio



Acies reliqua, siue caulium, siue florum alborū seminumque, cū Nasturtio vulgari conuenit: at folia plurimum differūt, miris modis laciniata, & crispis oris fimbriata; sapore & odore vulgarioris Nasturtii.

C. B. Phyt. Nasturtium n. siue hortense crispū in fratribus Io. Bauhini orto col-

Tempus

lectum. Nasturtium crispum primò vidimus in pago Tremū, in orto concionatoris I. Aran, qui dicebat ex Belgio allatum, à quo etiam habuerat Nobilis Vir D. Michael à Franckmont, ex iis hortis attuli plantandum in Hortum Ill. E. C. vbi viret Montbelgardi, semine turgens Augusto, floret, Iunio, se multiplicat semine deciuo.

NASTURTIVM LATIFOLIVM

Dioscorideum Io. Bauhino.



Stipiti crassitudinis radicem habet, albam, lignosam, quam plurimas rigidas à lateribus fibras emittentes: caulem erigit crassitudine digitali, cubitalem, statim à radice in crebros ramos diuisum densèque frutescentem: folia infima per terram sparguntur quinque viciis longa, sessu quinquè cir-

Descriptio

citer lata: crenata, subinde circa pediculum nonnihil sinuata, & auriculata, quanquam hoc ræ, H h h h 2

rius, superiora folia angustiora existunt, aliquando tamen infimis longiora: *flos, filiqua, semen, sapor*, cd. r, cuiusmodi in Nasturtio vulgari: flos interius suauem odorem spirat, cum nimirum quem Sinapios.

An Gellner. hort. in apped. Nasturtium Hispanicum. Item paulo post: Nasturtium hortense aliud est foliis simplicibus, pollicem latis, tres longis, idque vel laue, vel albius, vel subhirsutum, minusque album.

Camer. apud Matth. Germ. folium depictum habet nomine Nasturtii latifolii, qualiter & in hort. vocat.

Tab. nov.

An Iac. Theod. Tabern. Icon. Nasturtium Hispanicum, & Hist. vbi figura transposita, quæ nō multum placet si nostrum Nasturtium latifolium intelligit vt suspicor.

C. Bauhin. Phyt. Nasturtium 10. hortense latifolium. Nasturtii Dioscoridei nomine à Ioh. Bauhino missum. Fortè hoc Nasturtii Hispanici nomine Tabern. exprimere voluit: at figura non conuenit.

Tempus

Nasturtium latifolium simile formâ & gustu vulgari, demptis foliis inferioribus, quæ lata vt in Iberide vera Monspelii proueniête, primò habui Lugduni in orto, deinde Genez: postremò introduxi in Hortum Ill. E. C. vbi nunc viret totà hieme foliis latissimis, neminem scio qui descripserit: nec recordor vnde semen habuerim, à triginta annis in hortis color: hiemem facillè profert.

THLASPI ANGVSTIFOLIVM FVCHSII, Nasturtium sylvestre Ioh. Bauh.

Descriptio



Nasturtii vulgaris foliis similia, laciniata, multò tamen minora: ab Iberide huic absumili differunt, vt pote cui folia infima per extremam oram serrata duntaxat aut crenata existunt & latiora: nā superiora, tenuia, angusta, Iberidis pænè sunt odore & sapore vehementer acri: *filiculi* minimi albi, visum ferè fugiunt, ad Iberidis flores accedentes: quos nec dum delapsos *filiqua* numerosissimæ excipiunt ex longiusculis pediculis, parvula, rotundæ, compressæ, & supremo margine fissæ: quibus dehiscentibus duo *seminula* ruffa oblonga cum valvulis excidunt, relicta membrana alba dissepiens: Dodonæus acris & feruēs

semen dicit. In figura Fuchiana hic posita desunt folia inferiora.

Brunfels. Bursa pastoris minor, Klein Beschel fraut/ Germ. communiter Seidel abschnenden dicta, qui ex ea ludicrum faciunt.

Fuchs. Icon. & Hist. Iconem tantum proponit, sine descriptione, titulo, Thlaspi angustifolium.

Trago pingenti Thlaspidii genus, describenti Nasturtii quintum genus.

An Brallau. in exam. pil. aggreg. Iberidis species? Cornar. in Dioscor. Thlaspi alterum genus.

Matthiol. in post. ital. com. in Dioscor. figuram habet Iberidis nomine, quam suspicor esse hoc Thlaspi angustifolium, quam opinionem confirmat nomen *wilden fress* in Hist. Germ. positum, vbi eadem figura, & præterea descriptio quadrans potius Thlaspi, quam verè Iberidi.

Retinuit idem nomen Germ. & eandem figuram Camer. in Hist. Matthiol. Germ. Iberidis nomine, vt & in eiusdem Epit. quam postea in Epit. male iterum exhibet pro Lepidio.

Dodon. Gall. cuius descriptio valdè ieiuna figuram Fuchsi habet, vocatque Thlaspi. Thlaspi angustifolium, & Thlaspi minus. Lat. in fol. Thlaspi minimum. Foliola inferiora non pingit Dodonæus, nec etiam habet figura nostra, quæ iam facta erat. Non placet quoque eum dicere semen valdè exiguum, non tamen minus quàm superiorum: Thlaspi eius antè dictum latius semina habet rotunda multò maiora, sicuti eius alterum, oblongum etiam maius.

Osyridis folio Thlaspi minus hortense vulgare acerrimum vocant Adu. Lob. & Penz. & luteum ac album tradunt etiam in Icon. Plant. aîuntque: Paulò diligentiores Pharmacopœi & Herbarii Angliæ & Germaniæ minorem speciem Thlaspi vocant & alunt in hortis ad medicum vsum, quia sit feruidioris gustus. Eius cæteroquin tota facies, ramulis multis, floribus, & foliis Thlaspi faretur, catenulæque differre videtur, quia tota minor & tantoperè sarmentosa, vt scoparum vice sit ad verrendum non secus ac Iberis, cuius etiam floribus albidis, crebris, parvis. Eadem in orto Morgani nostri, etiam luteis floribus visabatur mense Iunio. Item Hist. lib. 2. cap. 37. Iberis 2. Item cap. 48. Thlaspi minus Germ. siue 16.

Apud Tabern. ram in Icon. quàm in Hist. sunt duæ icones vnius plantæ: vna Iberidis nomine, altera Thlaspi minoris Germanici titulo. Nulla autem perfecta, nec descriptio alicuius momenti: cur etiam Iberidem Germanicè *groß Besenfraut* vocet, nulla est ratio.

C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 29. siue Osyridis folio. Bursa pastoris minor Brunfels. Minus hortense vulgare Lobelio pag. 214. luteum est & album, Icon Lobel. apud Plant. videtur repræsentare Thlaspi Fuchsi de quo hic agimus: verum non intelligimus cur Lobelius dicat Osyridis folio, flore etiam luteo non vidimus.

Schvv. Thlaspi minus Osyridis folio, Lobel. Thlaspi Osyridis folio acerrimum & album, Clus. Alyssum minimum, Thlaspi minus Germ. Streinfrant/ wegfresse/ Klein Besenfraut. Mihi videtur Schvvencck. eam plantam intelligere, quam nos hoc capite tradimus: verum non cõuenit cum Alyssò minimo Clusii, diuersâ admodum planta figurâ & temperamento, subacidum habere saporem dicit Clusius: dubitamus an bene notum ei fuerit nostrum Nasturtium sylvestre Thlaspi angustifolium Fuchsi, quod Nasturtium

Aurtium silu. voco, Brunfels. Bursam pastoris
minorem, flein Deschelfraut / Germ. communiter
Seckel abschniden Fuchl. Trag. Besam
fraut Dodon.

Basilica copiosum obseruari cum siliquis in mense
Octobri & Nouembri ad horreum Nosodochii
& versus papyracea molendina, ad fontem prope
textorum panni fossas, & aliis locis, in mense
Iunio florentem & siliquas habentem. Genevæ
versus Nosodochium & S. Geruadium, folia pri-
ma omnino vulgare Nasturtium imitantur, su-
periora ad Iberidem accedunt: florebat & cap-
sulas proferebat Maio. Et in Burcken ad mu-
ros spontaneum: A me Vere fatum in Horto Ill.
E.C. Horuit Augusto eodem anno: Inueni prope
Beffordiam cum flosculis & semine maturo
Septembri, Sturgardiz sponte iuxta muros Ill.
E.C. horti florens ex valvulis Maio mense. In
Alfaria in hospicio prope Bercken semine maturo
Iulio.

Non placet Brunfelsium huic plantæ easdem
tribuere vires quas Bursæ pastoris vulgari, huic
enim plantæ sapor insigniter acris. Caleface-
re & siccare quarto gradu semen, scribit Schvv.
& causticæ facultatis, esse, & ad calculum laudari.

IBERIS ET LEPIDIUM.

Veteribus & in genere.

CAP. II.

Quoniam in dubium magna verborum con-
tentione reuocatur, an Iberis & Lepidium
Veteribus sit vna eademque herba, idcirco hac de
re vno capite ambas hasce plantas complecten-
tes problematicè agere libuit. Ac primum
quidem, eorum opinionem, qui à nobis recedunt
& affirmatiuum tenent, adducere visum
fuit.

Herbam igitur, inquit, quæ à Græcis Iberis
dicitur, Paulus Lepidium, & ἀρχιγενήδιον, id est,
siluestre Nasturtium appellari scripsit. Aëtius
Cardaminem, quia odorem, saporem, & figuram
Cardami, hoc est, Nasturtii habet, & Galenus
odore & viribus Cardamo simile Lepidium esse
dicit. Quare in Dioscoride λέγειται ὅτι ἀρχιγενήδιον
pro ἀρχιγενήδιον falsò legi Cornarius existimat.
Galenus etiam Lepidium eandem esse herbam
cum Iberide, declarat his verbis. Damocratis
extat libellus Clinicus inscriptus, in quo versibus
Iambicis de tribus differit medicamentis.
Ac primò quidem eo, quod ex herba, quam ipse
Iberidem appellat, constat. Mox subiungit Ga-
lenus. In Iberide medicum quandam amicum
suum hac herba curatum esse, quam ipse Damo-
crates Iberidem appellat, vt qui ipso visu her-
bam cognorit, nomen autem eius nullum audie-
rit, quin etiam idipsum ignorarit is, qui eum vi-
sum eius docuit. Verum ex signis quæ scribit,
videtur Iberidem appellare, quæ à Græcis Lepi-
dium appellatur, à regione in qua amicus eius
curatus est, appellatione ducta. Damocratis
autem versus Iambici quibus eius effigiem de-
pinxit, hic Galenus subiicit.

Herba hac vbique multaque frequens nascitur,
Monumenta iuxta antiqua, muros & veteres,
Tristiaque quondam publicè pedibus vias,
Quas iuxta ararum duxit haud quis agricola.
Semper virescens, foliis Nasturtii,

Florentibus vere, at tamen maioribus:
Caulum cubitalis longitudinis gerit,
Paulò minorem, aut rursus ampliorem, ab hoc
Aestate pendunt folia, donec multa hyems
Sarmenitiam deducat hac ad imaginem, &
Deiecta & exsiccata deperant gelu.
Adnata radici tamen cernes alia.
Aestate florem fert colore lacteo
Multum, tenuem, variumque valde, cauliculis.
Ad quem sequitur semen penitus sic exiguum,
Visum ferè ut fallens, oculos quoque effugiat.
Odorem habet radix inde acerrimum,
Vero similem quàm maximè Nasturtio.

Addit rursus his Galenus. De hac Iberide etiam
Archigenes scribit, Lepidium ipsam appel-
lans. Dicit autem & splenicis, & ischiadi-
cis ipsam conuenire. Ad ischiades & perfrige-
rationes Hygieni Hipparchi authoritate
Herbam Iberidem quam aliqui Lepidium vo-
cant aut Agriocardamum (Nasturtium sylvestre)
colligito &c. Cum igitur Iberis & Lepidium ea-
dem sit herba, perspicuum est Iberidis caput cal-
ci primi libri Diosc. à nimis curiosis Librariis
vel Medicis, non à Dioscoride adiectum fuisse,
cùm is Iberidis locus non rectè assignetur, sed li-
bro secundo, in quo cum permixtis plantis quæ
acri facultate præditæ sunt, de Lepidio tractat.
Neque enim duobus locis de eadem herba dice-
re potuit Dioscorides. Adhuc in eius descri-
ptione corruptus est locus, μέγας δὲ ὄντων πυρραίων,
ἢ ἑλαττων, id est, caulem cubitalem aut minorem:
Deest enim vox καυλὸς & μέγας, vt sic legitur μέγας
δὲ καυλὸς ὄντων πυρραίων πλείους ἢ ἑλαττων, id est, caulem
longitudine cubitalem, maiorem aut minorem,
sic enim Damocrates habet. Sic & Aëtius
versum Damocratis, sed lege carminis soluta
recitans, & Archigenes in Epistola ad Aristonem
referente Aëtio, in qua iidem planè verbis
Iberidem describit, vt vel ex Dioscoride exteri-
pisse videatur, vel ex ipso Archigene ad finem li-
bri primi Dioscoridis caput de Iberide aliquis
attexuerit. Vidimus (ait etiam Matthiolus) pri-
mum Iberidem extra ciuitatem Tridenti, vbi
vulgò dicitur alle Lasse, effigie mimirum, qua des-
cibitur à Diosc. ac aliis pluribus Græcis auctoribus.
Huius Gal. in simpl. censu nusquam separatim
meminit, sed hanc & Lepidium non nisi nomi-
ne differre prodidit. Quod idem etiam ex Da-
mocrate & Hygieni Hyparchi auctoritate lib. 9.
de comp. med. secund. locos, circa finem, vbi de
coxendicū curatione agit, testatur his verbis: Si
coxendicum dolores leuare est animus, herbam
Iberidem quam aliqui Lepidium vocant, aut Na-
sturtium siluest. colligito: Ex eius certè sen-
tentia asserere non dubitauerim, Iberidem apud
Græcos eandem esse cum Lepidio. Vnde perspi-
cuum est, hoc Iberis caput huiusce primi vo-
luminis calci accreuisse nimia vel librariorum,
vel medicorum curiositate. In quam sententiam
cum antedictis causis, ea ratio me potissimum
deducit, quod constat, huius primi voluminis
calcem, non esse legitimum locum, in quo Iberi-
dis historia fuerit collocanda: quandoquidem
eiusmodi herbas Dioscorides lib. 2. ordinatè dis-
posuit, ac de eis differuit, vbi priuatim Lepidio,
quod Damocrati Iberidem existimamus, pro-
priam assignauit sedē. Quare apertè hallucinari
deprehenduntur Monachi illi venerandi, qui in
Mef. comm. scripsere, cùm expresse contra Gale-
nū H h h h 3

Barbari
et Ruell.
Lepid.

Ieni & Pauli auctoritatem, & contra rationes, quas superius adduximus, aliud à Lepidio Iberidem esse contendunt. Manifestè etiam aberrant Barbarus & Ruellius, cum Lepidium illud esse putauerunt, quod vulgus Herbariorum Raphanum rusticorum appellat.

Et hac illi qui affirmantem tenent: Sed antequam negotium, quam amplectimur, & veriorum adducamus, paucis de his duabus plantis Veterum placita examinemus. Iberis igitur, siue Cardamine Dioscoridis (Cardamantica aliis,) folia habet Nasturtii, Vere virentiora. Caulis longitudo cubitalis est, plus minùs: locis incultis nascitur. Aestate porro lacteum florem promittit, ac tum quoque efficacior est. Radices binas habet Nasturtii similes. Lepidium verò, quod aliqui Gingidium vocant, herba nota est; quæ muria cum lacte conditur: folia habet non tam mollia & candida ut Draba. Plinius de Iberide hæc habet. Inuenit nuper, & Seru. Democritus è primis medicamentis, quam appellauit Iberidem: quanquam ficto nomine inuentioni eius assignato carmine. Nascitur circa vetera maximè monumenta, parietinæque & inculta itinerum. Floret semper folio Nasturtii, caule cubitali, semine tam paruo, ut vix aspicere possit. Radici odor Nasturtii. De Lepidio ait. Peregrinum fuit Lepidium. Scribitur à Fauonio. Deinde quum fructuauerit, iuxta terram præciditur. Tunc runcatur stercoreatūq;. Per biennium hæc. Postea in eodem fructibus videntur, si non leuitia hyemis ingruat, quædo impatientissimum est frigor. Exit & in cubitalem altitudinem, foliis laurinis, sed mollibus. Apud Galenum in curatione doloris Ischiadici legitur supra posita elegas descriptio ex Democrito carmine conscripta in hanc sententiam. Iberis dicta à regione, in qua sanatus Medicus, herba frequens vbique iuxta muros & vetera monumenta, ac vias, semper virentes: sed vere foliis Nasturtii minoribus: caulibus cubitalis, paulò maior, vel minor: à quo aestate pendunt folia vsque ad multam hyemem, donec genia pereant: hos aestate lacteus: semen exiguum, ut vix cerni possit: radix odore acerrimo, ut Nasturtium.

Recentis ita Veterum placitis, Lepidium idè esse, cum Iberide non concessimus Cornario & aliis: Ex Plinio enim Dioscoridis fortè coartatione apparet magnum discrimen. Iberis inculta, Lepidium verò peregrinum colitur: Iberidi folium Nasturtii, Lepidio folia Laurina: Iberidis radix ruiditur difficulter Plinio, Lepidio conditur Dioscor. Et quamuis dicat Galenus Iberidem Lepidium etiam vocari, non sequitur propterea esse vnā & eandem plantam, nec legimus quenquam ex Veteribus id asseruisse. Idem nobis euenire videtur in Iberide quod in Crisanthemo, quod cõpetit Elichryso & vero Crisanthemo, quod deinde vocatur Bupthalamum, nomine alterius plantæ dictæ Bupthalamum. Cur remouendum sit vnum caput ex Dioscor. ut vult Cornarius, non video, nisi remoueatur etiam ex Plinio & Paulo: Quam plantam intelligat per multis inuestigandum: Si Iberis eandem cum Lepidio Dioscor. ut vult Matthiolus: Draba quam pingit Matthiol. non potest esse Draba, ut bene annotauit Anguillara & Guiland. cum dicat Dioscor. *δραβα ὁμοειδὴς τῇ ἰβερὶ, ἀπὸ τῆς ἰβερίας* Maluimus igitur existimare Lepidium Pauli, Plinii, & Dioscoridis & Galeni idem esse.

Iberis.
Locus
Vitis

Lepidium.
Cuiusdam.

Laurina
folia

Iberidem autem apud Dioscor. Plinium, & ex Democrito Gal. & Paulum & alios, eandem plantam, quæ dicatur etiam Lepidium, diuersam à Lepidio modò dicto. Putat Galenus Iberidem eandem cum Lepidio esse, ait Celsalpinus, quod & Agriocardamon (ilustre Nasturtium) appellatum est, sed apud Dioscor. diuersa eorum mentio reperitur. Lepidium fortè appellatur, quia Lepidas (squamas leproforum) auferat. Paret autem ex Dioscor. Lepidium diuersum esse ab ea quam Iberidem vocauit: nam Iberidi vires in radicibus: Lepidio in foliis: huius præterea vsus in cibis: Iberidis nequaquam. Err. r. autem putatum eandem esse huxit ex communitate nominis, & vitium. Paulus Aegineta rem aperuit iniquens. Ischiadicos in totum restituit sanitati Iberidis herba vsus, quam Lepidium quoque, alii Nasturtium appellant. Quæ verò apud nos fructuosa nascitur: foliis Lauri similibus, & multò amplioribus respondere, multa experimenta testantur, non solum in coxarum, sed in aliis quoque diuturnis affectibus, & quæ sequuntur. Columella Lepidii duo genera facit, sylvestre, & sativum, fortè Iberidem pro sylvestri accipiens. Solum ansum dubitandi præbet, quod Dioscorides Lepidium herbulam dixit esse, quod Iberidi magis quam Lepidio conuenit. Sed tamen Dioscoridis Lepidium idem esse cum Plinii & Pauli Lepidio, ac longè differre ab Iberide colligi potest ex Draba, cuius folia Lepidio comparantur à Dioscoride. Iberida quæ cum Lepidio eandem esse existimant, caputque de Iberide tanquam superuacaneum à Dioscor. volumine rescandū esse asseuerant: non ita fortasse licenter (autore Marantha) hoc pronuntiasent, si quæ cap. de Draba habentur, animaduertissent. Hanc enim vult Dioscorides folia habere Lepidii, sed molliora & candidiora, sed nulla est conuenientia in foliis inter Iberidem & Draba: v. huic enim lata sunt, illi satis angusta, & Nasturtii more incisa: si veram Drabam existimemus [ut, ceterè vera est] plantam illam quæ ab omnibus ipsa existimatur, & ab Andrea Matthiol. perbellè depingitur. In Iberide folia in prima germinatione eorum videtur descripsisse Dioscor. cum Nasturtii foliis similia esse dicit: nam postquam caulè ædidi, nullam cum Nasturtio retinere similitudinem videntur: ita ut hanc solum ob causam multis diu incognita fuerit, & [ut verum fatear] mihi etiam non propter id solum incompetita diutius fuit, sed etiam quòd folio in eadem ætate variare ita solet, ut vna eiusdem speciei plânta alteri dissimilis penitus videatur. Scribit Dioscor. Iberida duas radices habere, sed pluribus inueniri, non solum à nobis obseruatum est, sed à Democrito scriptum, cum inquit:

Adnatæ radices tamen cernes alia.

Et hæc passim Marantha, qui quam plantam per Iberidem, cum ait: nam postquam caulem edidit &c. intelligat, mihi nondum constat. Lepidium Serapioni Setragi, ex Dioscor. herbula est vulgò nota, Democrito Iberis appellata, ex Gal. ut etiam ab Archigene, in Epist. ad Aristonem, & ex Agrio. Quam verò iola nominis appellatione differre credantur Lepidium & Iberis, idè vel Librariorum, vel Medicorum curiositate, quod in fine primi voluminis legitur, Dioscoridi acceperit putauerint Ruell. Manard. Marcell. ac Matthiolus. Caruimus tamen, contradicentiū ita arguit: Lepidium tanquam Iberida describit Galenus, ergo &c. quæ autem sit argumentum,

Iberis.
Lepidium
diuersum

Draba

Lepidium
Setragi
Iberis.
ex Iberidis
caput apud
Diosc.

eam, nullâ liuoris lentigine, suis diiudicandum scholasticis relinquitur Apollon.

Quum autem Lepidium ex Dioscoride herbula sit, Iberis autem cubitalis (siquidem veritati magis, quam auctoritatibus credendum sit) nec possunt, nec debent, Auctores probi & eruditi Apollinis opinionem non candidè amplecti, videlicet Lepidium, ab Iberide diuersum ex Aëtio, olus esse in Syria folia habens Seridis angustifolia. Nullâ propterea fulciuntur ratione, quâ Iberidis caput imprudenter arborum aceruo Dioscoridi crepisse tueri credunt, & quod dissonâ in fitione cum his societatem, confortiumque inierit, propterea vel expungendum, aut quo dissiliat restitutum. Quod verò Galenus, atque Aegineta, priuatum huic Iberidi caput aliquod nō dicarint à Lepidio separatam, sciendum, quod Galenus Dioscoridi in simplicibus vbique non responderet.

Est autem ab hoc Lepidio Plinii dissimile, in cubitalem exiens altitudinem, foliis Laurinis, non autem Nasturtii.

Plantæ, quæ ἰβερὶς, καὶ ἀναστύρις, & ἀναστύρις αἰνῶν Græcis dicitur; nomen Latinum est Iberis, & Lepidium: Arab. Sietaragi, Aseitaragi, seu Sirharegi, & Hausab: Ital. Iberide, & Lepidio: Germ. wilder Fress: Hispan. Nasturtio monte fino, Gallic. Chasse rage, passe rage: & Nasturtium.

De viribus Iberidis & Lepidii dicamus. Radices Iberidis binas Nasturtio odore similes, calefaciendi & adurendi vi præditas, sed ætate cum caulis lacteum florem promat, efficaciores esse, prodit Dioscorides. Est hinc Ischiadicis vtilis, si cum axungia fuisa emplastri modo, quaternis horis impostæ fuerint: deinde verò in balneum descendant, ac postea oleo ac vino cum lana locum affectum perungant. Idem hoc auxilium de Iberis radice præscripsit Damocrates hoc lambo.

Hanc erutam larga satis cape copia
Æstas, nam tunc optima & fortissima est
Adhuc recens: siccata sit, sed debilior.
Tusam hinc probè (nam difficile est cundetur)
Pauca subaltamque excipies axungia.
Curique toti, & maxime coxendici
Adhibebis, & ligabis, & fines duas
Horas mulieribus viris sed quatuor.
Hinc balneo inductus, nec ullo ex vnguine
Nec smegmate ullo pinguiore collines.
Sudore sed modico exiliente, in solum
Merges, iubens perferre: nam mordacitas
Ingens, caloris sensus atque exoritur.
Verum hinc rigatos leniter perducito.
Ulati enim quamuis manibus sint plurimum,
Exibit ac tamen pedibus suis valens,
Quicumque consilium hoc bonum susceperit.
Ad multum oleum miscebis hinc vinum modicum,
Et concuties, & illines lotos eos,
Ac mox madore terso & pinguedine
Totum teges crus mollibus tu uelleribus.

Hos versus apertè declarat Plinius his verbis: Radici Iberidis odor Nasturtii. Vfus ætate efficacior, & recenti tantum. Tunditur difficulter: coxendicibus, & articulis omnibus cum axungia vtilissima, viris plurimum quaternis horis, foemina minis dimidio adalligata, vt deinde in balneis descendatur in calidam, & postea oleo ac vino corpus perungatur: diebusque vicinis inter-

positis idem fiat, si qua admonitio doloris super sit. Hoc modo rheumatismos omnes sanant occultos. Imponitur non in ipsa inflammatione, sed imminuta.

Galenus eadem ex Damocrate refert. Radix Iberidis, inquit, odore acerrimo est, vt Nasturtium, hæc intus in magna copia (difficiliter autem tunditur, ætate & recens, nam tunc fortissima) cum modica axungia adhibetur toti cruri & maxime coxendici, finitur per quatuor horas in viris, minus in mulieribus, deinde aufertur, & crus in balneo ponitur, post inungendum ex oleo & vino, ac demum tersa pinguedine, & sudore, tegendum molli lana, vt æger ambulet, & suis pedibus obeat munia: si opus fuerit, tependum post dies viginti.

Hoc sanè vtendi modo, & inueteratos capitis dolores, & alias omnes quacunque corporis parte inueteratas & ægrè solubiles affectiones ac resolutiones se curasse Damocrates, & omnino vitia in quibus alii remedio ex Thapsia vruntur se hac herba perlassisse ait. Idem omnino ad Ischiadas remedium Aërius bis habet. Lepidium, inquit idem Galenus, ex quarto est ordine excalefacientium, simile Nasturtio, tum odore, tum gustu, tum viribus: sed minus eo delicat. Cæterum apud Dioscoridem legit Cornarius, ἰβερὶς καὶ ἀναστύρις, ἵππευσι καὶ πολεμικοῖς, & postea oleo cum lana locus perungatur, pro ἰβερὶς καὶ ἀναστύρις, hoc est, oleum cum vino locis illinatur: sic enim habent Damocrates & Plinius, vt ex superioribus intelligitur. Sic & Aëcius: ἰβερὶς καὶ ἀναστύρις καὶ ἀναστύρις, ἵππευσι καὶ πολεμικοῖς, καὶ ἀναστύρις, καὶ ἀναστύρις, καὶ ἀναστύρις, καὶ ἀναστύρις. Egressus autem vino & oleo multo perfusus ac deterfus, coxendicem lanis puris tege. Et alio in loco. A balneo ad oleum multum paucum ad modum vinum admisceto, & illinito.

Iberidem porro à Lepidio diuersam esse plantam, vel vsus amaranum clarè demonstrat. Auctores enim locis iam adductis Iberidis radices solum præscribunt, seu folia Lepidii duntaxat. Vis foliorum acris & excalefaciens, inquit Dioscorides, quapropter trita ischiadicis præsentissimum est auxilium, si cum Helenii radice, quarta parte horæ illinatur: lienosis simili modo prædest: lepras eximit. Radix appensa collo, dolore dentium liberare existimatur. In quibus verba illa, si quarta parte horæ illinatur, quæ Græcè leguntur ἀναστύρις καὶ ἰβερὶς τέταρτον ὄρας, mēdo nō carere suspicatur Cornarius. Cum enim cæteri omnes Auctores, vt diximus, emplastrum ex Lepidio impostum, quatuor horas linendum præscribant, credibile non est rectè hic legi, vt quartam horæ partem imponatur: neque enim tam breui tempore vires suas exerere potest: & fieri potuit, vt τέταρτον pro τέσσαρες sit suppositum, quod facile euenire potuit, si quaternarii numeri nota & interpreti fuit exprimenda.

Porro reliquum Lepidii in medicina vsus, & ex eius radice amuletum, Plinius aliter quam Dioscorides refert his verbis, Vfus eius non sine lacte. Lepidium inter vrentia intelligitur. Sic & in facie cutem emendat exulcerando, vt tamen cera & rosaceo facile sanetur. Sic & lepras & psoas tollit semper facile, & cicatricum vlcera. Tradunt in dolore dentium adalligatam brachio quâ doleat, compescere dolorem.

IBERIS.

CAP. III.

Descriptio Statim è radice alba, lignosa, mediocriter crassa, paucis fibris donata, crebros profert caules dodrantes & altiores, duos, frequentibus alis concauos: folia quidem prima longis pediculis appensa, semunciam lata, duas tresve uncias longa, per extremum ferrata: superiora verò & quæ in caulibus ramisque, Linariæ foliis paria, angusta, acuta, nullo pediculo donata, nec crenà villâ incisa: sapor omnibus feruidus Nasturtii: flores extremis ramulis coaceruati hærent, candidi, Nasturtii floribus similes: semen continetur minutum in parvis thecis oblongis, quarum valvulas dissepit membranulâ.

Quam Fuchf. & ex eo Amatus, hoc titulo

exhibet, non simpliciter Iberis, ut præfens, sed Iberis Fuchfii à nobis cognominatur. Hæc Matthiol. in Dioscor. neglecta descriptione picturâ exprimit priorē, Iberidis nomine: posteriore Lepidii Dioscoridis, ac Diosc. & Galeni Iberidem dicit, ut & Lepidium. Lacun. figurâ Matthiol. Iberidis nomine retinet. Idem



Matthioli.
Lapsum.

in post. com. Ital. & Lat. cum magn. fig. eadem scribit. Figuram tamen aliam habet, quæ fortè non Iberidis: sed Nasturtii nostri sylvestris siue Thlaspi tenuifolii Fuchfii. Plantæ illius iconem esse magis adhuc indicat Histor. Germanic. eius, ubi descriptio videtur esse Thlaspi tenuifolii & non Iberidis, præstitisset Matthiolum retinuisse figuram priorem licet non exactam.

Gesner. Iberis (sic scribendum sine aspiratione) à Matthiolo depicta.

Dodon. Dodon. Gall. figuram Iberidis titulo exhibet non adeò commodam, potissimum quod inferiora folia concernit: quare merito Lat. in fol. meliorem paulò restituit. Ait autem Galeno *matthioli* à Plinio lat. Hiberin, Nasturtium silv. & similiter etiam Lepidiam vocari. Existimari etiam herbam esse Græcâ dictam, de qua Apul. cuius ad Ichiadicis usus quoque commendatur.

Ortus A.
pul.

Aduers. Lepidium herbula Dioscoridis, Damocratis & Galeni. Iberis Cardamantice Nasturticifolia: quæ irrepit alienissimum loco Dioscoridis codici lib. cap. vltimo. Paulus l. cap. de coxendice eam Iberidem, Lepidium, vel Nasturtium agreste nuncupari scribit. Lobel. Obf. Iberis Cardamantica: Gal. *Cress. n. sauuage & Passerage sauuage*: Anglis *Sciarica* / *fresse* & *wilde fresse*. Germ. *wilder fress*. Hisp. *Masturco saluage*. Ital. *Nastur saluatico*. Icon. Pl. Iberis Cardamantica, Lepidium, Iberis Plinii.

Histor. Lugd. pingenti, Iberis siue Lepidium Matthioli, quod in contextu, doctissimorum, ut

ait, Herbariorum iudicio, Iberin veterum Græcorum, siue Lepidium esse dicit, *Nasturtio saluatico* Italorum: *Passerage sauuage*, & *Cresson sauuage* Gallorum.

Iberidis nomine pingit Camer. in Hist. Matth. Germ. & Epit. Thlaspi angustifolium Fuchfii, siue Nasturtium silvestre nostrum.

Taber. Icon. & Hist. Iberis i. cuius figura mala. C. Bauh. Phyt. Iberis.

Iuxta veteres muros & inculta itinerum in Italia alibique provenit: apud Belgas non nisi hortensis est. Ab Herbariis colitur in hortis. In Italia tamen & Gallia Narbonensibus locis incultis spontè nascitur, Hist. Lugd. Iberidem obseruavi secus vias in muris & marginibus agrorum Montpelii: Arelatæ & Florentiæ in Autumno floret & semen fert, toto anno durat. Lugduni spontè proveniens abundat, virens adhuc & florens mense Septembri & Octobri. Tiguri in horto Gesneri satam vidi. Heidelbergæ mihi attulit Petrus Turnerus Anglus Medicus: ibidem etiam spontaneam obseruavi: Patavii passim circa moenia virentem adhuc Decembri obseruavi.

Tab. mat.
Locus

Tempus

NASTURTIOLOVM ALPINVM CAPS.

Nasturtii vulgaris Ioh. Bauhin.



Vix tres uncias altum est mihi dictum Nasturtiolum, radice lignosa, paucis fibris donata: Coliculis duo aut tres, per quorum summa capsula Nasturtii vulgaris, non dissimili ordine posita: folia parvis simplicibus, caulis, angusta, uncia, quantum animaduerti, bre-

Descriptio

uiora: *stipendi* parvi, albi, ut existimo.

C. Bauh. Phyt. Nasturtium g. siue alpinum minimum, capsula Nasturtii hortensis, quod habet Ioh. Bauhinus.

Nasturtiolum mihi dictum inveni in Rhætiæ monte *Nombr*, propè Balneæ *murinbe*: æstate florebat & siliquas habebat. Ex herba sicca descriptum.

NASTURTIOLOVM ALPINVM

tenuissimè diuisum.

Nasturtiolum tenuissimè diuisum, aliàs trium unciarum plantula, aliàs ferè dodrantalibus (Clus. vncialis, *siliola* habet minutissima, terna, quina, septena ad costam annexa [Clusio viridia, gustu acri & feruido,] sic ut tota interim ala semunciam interdum non sit longior, aliàs uncias duas excedat, sapore feruido Nasturtii: *coliculus* habet plures, nonnunquam vnicum: in cuius fastigio *stipendi* multi sunt coaceruati, candidi pro plantæ

Descriptio

plantæ proportionem magni, è quatuor totius pastoris minimæ: radix alba, crassiuscula, longa, fibris longis donata.

Clus. Pann. & Hist. post. Cardamine 3. sitæ alpina minima, quæ Gesnerus in Epistolis Nasturtium appellat. Hist. Gen. plant. p. 1180. Thelipi mon-



tanum minimum Dalech.

C. Bath. Phyt. Nasturtium siue alpinum minimum primum.

Tabern. Icon. Cardamine alpina. Alp. Gaud. blum.

In ipsi scopis summi iugi Schneberg, dum per niuem glaciali duritie constrictam ferreis vncis ad pedes alligatis Clus. delaberetur inuenit mense Augusto florentem, ubi niues iam primam dissolui incipiebant. Inuenitur autem & in Tirolensibus atque Salisburgensibus montibus teste D. Ioach. Camer. Ex Gesneri epistolis apparet etiam in Helueticis albis nasci.

CORONOPUS RUELLII, SIVE Nasturtium verrucosum.

Terræ ap-
primit
caules, nun-
quam surgen-
tes, spitha-
meos, ramo-
sos, rigidulos;
per quos folia
laciniata, cæ-
sura foliorum
Nasturtii, nec
ita dissimili
aut odore aut
sapore: *stipulis*
secundum cau-
les minuti, al-
bi; *seminum*
loculi scabri,
inequales, lap-
pulas imitati,
quasi echini
parui murica-



ti, quorum singulis granum vnicum nigrum gigante vitigineo ferè par: radix longiuscula, satis crassa.

Math. in post. com. It. & Lat. cum mag. fig. asserit, Ambrosia (hanc non describit, quati non rite visam) à Cortuso missam genuinam aded referre, ut nihil in ea desiderari possit: ast decipitur. Cum esset Bononiæ D. Vlysses Aldroand. denominabat Holostium Dioscoridis, Herbam Canoram, eiusdem etiam opinionis erat Robertus Constantinus.

Camer. in Math. Germ. Ambrosia, falsè dicta

marzenseß. Ambrosia à Matthiolo in com. Lat. picta, quæ à Cortuso missa, non potest bene agnosci ex figura: pro Ambrosia prima Matthioli missa est ex Italia planta quæ nihil aliud est, quam Nasturtii sylvest. genus: fieri potest Matthiolum suam ex hac planta adulta & seminibus abundante curasse depingendam. Eidem Epit. Ambrosia: hort. Coronopus repens Ruellii: Cornu ceruinum vulgè dicta herbula, quænam apud Veteres haberetur non aude asserere, nisi forsitan, Pes sit miluinus, cuius Columella meminit, cuius sententia & Dalech. est, ita enim nobis presentibus vocauit. *Nasturtium autem nostrum verrucosum*, de quo Ruellius hoc loco agit non posse esse Coronopum Veterum sic probamus: Primum videntur non posse dici folia oblonga, cum sint multum dissecta & similia Nasturtio. Secundò non auidui eius vsum esse in oleribus [quamvis fortè possit esse cum sit herba mollis.] Tertiò non adtingit huius radix, sed est odoris & saporis Nasturtii. Quarto nihil habet simile cum Phyllo. Quintò folia non sunt similia Holostio [si verum est Holostium quod exhibet Ruellius] nec graminis. Sextò nihil simile habet cum spinis. Septimò longa melius possunt dici folia Cornu Cerui quam Nasturtium verrucosum, legæ autem esse dicit Dioscor. cap. de Caranante.

Lobel. & Penæ Adn. Coronopus Ruellii, multò melius Coronopi species habita, quam illa Serpentina Matthioli. Item Cornu cerui alterum vulgi, Coronopus repens Ruellii, echinato seminum inuolucro, de quo dubitant an Coronopus Theophrasti? Sed iam clarum quid respondendum Lob. Obf. roganti, Coronopus repens, an Pes miluinus Columellæ Ruellio: Ic. Pl. Coronopus repens Ruellii, & Cornu cerui alterum vulgi. Et postea Obf. & Icon. Pl. Ambrosia spontanea strigosior. *hæc est* diuersa faciat Lob. nos tamen cum C. Bath. vnam esse censemus. Quamvis & ipse in Phyt. duobus diuersis in locis eandem proponit; nunc enim Coronopum 3. filu. repentem Nasturtii folio vocat: nunc Ambrosiam 2. siluestre: *Præterea* non video cur Ruellii Coronopus, quæ ad Nasturtium accedit melius habenda sit Coronopi species, quam Serpentina, ut vult Lobelius, quam quæso similitudinem cum Coronopo maiorem habet quam Serpentina. *Idem* assumit figuram Matthioli, & titulum ei facit Ambrosia, quæ in re inter nos non conuenit: est enim nobis illa Icon Coronopi Ruellii.

Secundam speciem Pedis ceruini facit Dodon. Gall. asseritque proximè accedere descriptioni Coronopi Dioscoridis, quamvis Ruell. non possit induci, ut credat verum Coronopum: Et qui pulchre hanc plantam descripsit Ruellius, nominauit Coronopum Ruellii, Belg. Crayen Doer aut Naen Doer. Gall. *Pied de Corneille de Ruell*. Hanc suam opinionem tanquam errorem retractat in Hist. Lat. his verbis: Cornu cerui alterum repens: Ruellius qui hanc ante nos lib. 2. cap. 64. & cap. 134. descripsit, Cornu cerui quoque appellari ait, & Pedem Miluinum Columellæ esse suspicatur: ad Coronopi descriptionem aliquo modo accedere videretur, nisi quem Codex Cæsareus exhibet differens multum ab hoc Cornu ceruino esset, ac manifestè ostenderet legitimum Coronopum hactenus fuisse incognitum. Quam ob causam Coronopus dici non debet, sed Cornu cerui alterum ac repens nomi-

Lob. lapp. 171

nandum: posset verò & Pseudocoronopus dici, si modo hæc appellatio retinenda.

Hist. Lugd. vnius plantæ tres figuras habet. Primam titulo, Ambrosiæ primæ Matthioli: alteram Coronopi Ruellii ex Dodonæo: tertiam Coronopi repentis Lobel.

Tabern. Coronopus repens, Coronopus aruësis, fridender / Frischenb / feldt hurgborn / Ader hurgborn. Potè nota hæc Tab. nomina Germanica non placent.

Locus & tempus.

Montbelgardi spontè copiosè provenit circa vrhem, vti etiam in Horto ill. E. C. semine decido quotannis se renouat: vidi in Allacia in Castello Eisenheim spontè, vbi Floret Iunio & Iulio, audio copiosè provenire inter Basileam & Argentinam, & Basileæ in hortu D. Dis Felicis Plateri. Lugduni habui in hortu. Horbugi in Il. E. C. in A. Maria arce obseruavi. Genevæ copiosè.

NASTURTIVM SYLV. VALENTINUM Clusio.

Descriptio.

VNICO hæc planta assurgit caule, sed statim à radice, supra solum, multis alis diuiso, hirsuto & aspero, virente, rotundo, pedalis longitudinis: inferna silva qualia sint pronuntiare non possum,



quia iam in semen magna ex parte euascat plantæ eam obseruabam, inquit Clusius, quæ tamen sub alis caulibus inherebant, tenuia erant & multifida, Nasturtii vulgaris, & legitimi, foliorum penè æmula, tenuiora tamen & viridia, acris gustu, vt Nasturtium: extremis ramis fert multos, spicæ in speciem, congestos flosculos, quatuor foliolis pallescentibus constantes, in quibus totidè staminibus, quibus euanescentibus, succedunt stigmata breues, duabus valvulis siue utriculis constantes cum lingula prominente, non quidem sursum erectæ, vt reliquarum congenerum, sed deorsum inflexæ, in quibus Nasturtii æmulum semen: radix est singularis, candicans, satis crassa, non tamen viua, sed quæ singulis annis perit. Eodem loco, eodemque tempore, nempe Martio, florentem hanc plantam & semine iam plenam inueniebam, quo Alysson Galeni, Valentino videlicet regno. & quia pleraque notas cum Nasturtio communes habere conspiciebam, Nasturtii nomen indidi: cui quantum ex gustu iudicaretur, per similes facultates habet. Hæc sententiâ, nomen immutare non debuerat Lobelius, qui ipsam stirpem nunquam conspexit: nam plantis mihi antea ignotis & primum obseruatis, festinanter, & tumultuario quodammodo impetu nomina dare non soleo, sed prius

omnes illarum notas & reliqua necessaria mature perpendo, antè quàm aliquâ stirpem certo nomine donare aggrediar, vt facile animadvertent, quotquot meas lucubrations diligenter & sedato animo legent: malo enim interdum ipsas plantas diuina relinquare (vt mihi adhuc vsa venit in his commentariis) cum incommodo nomine applicando mihi ipse non satisfacio, quàm temerè nomen aliquod, naturæ plantæ non satis respondens donare. Sed quam quæso maiorem aſſinitatem habet hæc planta cum Erucâ, quàm cum Nasturtio? Si quis vtramque stirpem sano iudicio conferet, inueniet profectò me, non sine probabili causa, Nasturtii siluestris nomen huic plantæ dedisse.

Clus. Hist. & Hist. post. Nasturtium silv. Valentinum.

Lob. Obs. & Icon. Plant. Eruca Nasturtio cognata tenuifolia.

Casp. Bauhin. Phyt. Nasturtium silv. Erucæ affine.

Nasturtium Peruanum foliis Lenticule.

Herbam habet Monardes ex Peru allatam Nasturtium appellatam, exiguam, foliisque habentem rotunda, Lenticulæ foliis paullo maiora.

Huius citæ succus recentibus vulneribus instillatus, ipsaque herba superimposita, ea curat, & ad cicatricem perducit, haud leuis quàm Tabacum. Nasturtii est sapore, & valde calidæ temperaturæ esse videtur.

THLAPSI VETERIBVS ET IN GENERE.

CAP. IV.

Θάλασσα, herbula est, referente Dioscor. angustis foliis, digitali longitudine, ad terram conuersis, in summo fistis (Anagallis Matthiol. ait, lupicor in Diosc. mendam subesse & hanc notam de foliulis legendam) subpinguib: caulem autem remittit tenuem, duorum palmorum altitudinis, qui propagines paucas habet, & circa totum ipsum fructus est tubulatus & summa parte (diuinus Matth.) in quo semen est simile Nasturtio (Anagallis) disci figura (Monardes Ruellius legitur videtur quædam quod vertit Lenticulæ elhgie) velut compressum (Anagallis) ex qua re nomen habet. Florem verò habet subalbidum: & in viis ac parietibus & sepibus nascitur. Semen eius acre (Pergo) est, & calefacit, bilénque sursum ac deorsum purgat, acetabuli mensurâ potum. Infunditur etiam per Clysterem in coxendico morbo. Ducit etiam sanguinem potu & internos abscessus rumpit. Mouet item menses & factus perdit. Crateus etiam aliud Thlapsi recenset quod aliqui Sinapi Perlicum (Anagallis) vocant. Habet hoc folia lata & magnas radices: sed & hoc infusus ad coxendico morbum ammiscetur.

Cornarius in suis in Diosc. suppol. refert hoc alios Thlaspidium (Anagallis) alios Sinapi Perficum (Anagallis) alios Sinapi syluestre (Anagallis) alios Myiten (Anagallis) alios Myopteron (Anagallis) alios Dalimophon (Anagallis) alios Bitrum (Anagallis) Aegyptios Suitepmon (Anagallis) Romanos scandulacion (Anagallis) alios Capsellam, alios Pedem gallinaceum vocare.

Plin. Thlapsi duo genera facit: vnum angustis foliis digitali longitudine, in terram veris, in cacumine diuisis, cauliculo semipedali, non sine ramis

Descriptio
& Synonyma
Nasturtium
Peruanum
facultas.

Locus
Vires

Thlapsi
Anagallis
Sinapi
Perficum.

tamis peltarum specie, semine incluso [fructu, forte deest Corn.] Lenticulæ effigie [Cornar. videtur Plinius legisse *κακοειδής*,] nisi quod infringitur [in *κακοειδής*] unde nomen. Flos albicat. Nascitur in semitis & sepibus. Semen asperigutis, bilem & pituitam vtrinque extrahit. Modus sumendi, acetabuli. Prodest & ischiadicis infusum, donec sanguinem trahat: menses quoque ciet, sed partus necat. Alterum Thlaspi aliqui Persicum Napy vocant, latis foliis, radicibus magnis, & ipsum vtile ischiadicorum infusioni. Thlaspi ferè omnes in Theriacam immittunt, inquit Galenus, id quod ex Creta affertur & quod ubique nascitur, colore ex pallido flauum, figura rotundum, admodum parum, vt Milio multoties cedat. Melius autem est quod à Cappadocia affertur immittere, quod colore ad nigredinè multum discedit, figura autem non exactè rotundum est, & magnitudine multò maius quam prædictum, habetque quadam sui parte, velut paruum quandam compressionem [*ὀρθοκονία*] à qua etiam Thlaspi nominatum est. Nascitur autè, vt hoc, ita etiam alterum in Cappadocia plurimum. Quare non simpliciter id quod à Cappadocia affertur optimum est, sed quod peculiariter in Sauro nascitur, dissimilèque est Cretico & passim nascenti.

Thlaspi semen [ait idem de simpl. med. facult.] habet & ipsum facultatem acrem, adè vt internos [intestinos Paul.] abscessus potum di frumpat, menses prouocet, & (quod Paul. omisit) fœtum necet: ab inferioribus partibus iniectum ischiadicis dolores finit, sanguinolenta euacuat: Est alioquin & supernè & infernè bilisolorum humorum oxybaphi mensurà (acetabuli instar, Paul.) potum, euacuatorium.

Colligi scribit Corn. ex Galeno duplex esse prius Thlaspeos genus, & tertium esse quod Diosc. & Plin. alterum fecerunt. Cæterum quod Plinius semen lenticulæ effigie dixit, tum de lenticula legumine, tum de vase fistili ad lenticulæ similitudinem efformato, accipi potest: hoc & *φασκόλιον*, & *παραθήνη* *κακοειδής* Græcis appellatur, & fomentis gratia adhibetur, velut lib. 9. c. 1. comm. medicorum ostensu. Diosc. *δισκοειδής* dixit, quod Plinius videtur *κακοειδής* legisse. Thlaspi etiam à Lacertis, quæ iisdem incultis locis quibus hoc nascitur frequentes inueniuntur, Saurion præter alias ab hoc numeratas appellationes posteriores Græcos nominasse apud M. Virgilium legimus, quasi non satis à seminis figura, quod infractum & veluti contusum videtur, indicasse id fuerit: nisi à notissimo insecto quod frequens in hac herba inuenitur adhuc indicaretur. Thlaspiion Galeni & Thlasposis secundum Hipp. Robert. Const. in lex. græco distinguit *θλάστιον* & *θλάστιον*, Sinapi Persicum vocat, & Pedè gallinaceum; *θλάστιον* autem *εἶδος*, Thlaspi, genus herbarum Diosc. Sunt, inquit, qui vocent eam herbam, Thlaspidion, forma diminutiva. Gal. genere scem. *θλάστιον* Hipp. etiam *θλάστιον* vocat. Apud Gottzium, cui herbula est semine Nasturtii, acri, quod mansum Sinapis modo linguam & os vellicet, Sinapi rusticum dictum fuit a plerisque, ab herbariis autem Nasturtium testorum. Guill. Rhegin. Nasturtium erraticum appellat, ac Sinapi sylu. esse negat, carpitque Manardum, dicens: ignotum adhuc nobis existimat Manardus, quod passim quidem in semitis frequens, vt apertè Dioscorides docet, quale nostrum reperitur: vulgatissimumque quibusvis colligitur, acre

ac mordax semen est, & vices habet causticas: misceturque in Theriacis veneno quouis profligando idoneis.

Thlaspi nomine tandem venit Thlaspi vulgaris, de quo mox dicemus. Thlaspi etiam aliud genus faciunt eam plantam quam Germ. apud Corn. *Besemfraut* vocant. Et in hoc etiam si ambigua res sit, tolerari possunt, quæ de re videantè. Thlaspi alterum Crateuas tradit, quod aliqui Persiconapy vocant, latis foliis, alii Pastoris Bursam vulgò dictam. Sunt & qui Thlaspi tertium genus, Sinapi Persicum dictum, Rhaphanum maiorem, syluestrem, & priuatim Armorationem vocatum, esse volunt. Sed in eo palam falli videntur. Neque enim Dioscorides & Plinius de hoc siluissent.

THLASPI VVLGATIVS.



EX *radice* latius crassa & fibrosa, lignosa, alba, subacri, caules exturgunt hirsuti, teretes, rigidi, brachiatii, quibus filia sine pediculo adherent, longa, sensim angustiora, reddita, serrata, siue crenata, gemina pinnula caulem amplectentia, sapore cum morlu aceri: *stipulis* minutis, albis, multij; vt in Bursâ pastoris dispositi, quatuor foliolis, constantibus, rotidem virescentibus eas sustententibus; apicibus candidis: *capsella* præmaturio ortu flores occupant, foliaceæ, subrotundæ, infractæ in summo, fissæ; in quibus *semen* acre, Sinapi aut Nasturtii, inquit Lobel. Ruell. ita describit: Thlaspi, siue vt aliis placet, Thlaspidion; quod

Diosc. & Plinius tradunt, esse nemo inficiabitur eam plantam quam vocant Herbarii Nasturtium testorum, quod subinde nascatur in parietinis: alii syluestre: vulgus nostrum Sinapi rusticum appellat, quoniam digitis friarum Sinapi subolet. Hæc in scrobibus, semitis & sepibus inuenitur;

foliis in terram se convertentibus, digitum longis, angustis, & quadantenus pinguibus, per extremitatem leniter incis, caule sesquipedem alto, agnatis in eo paucis calycibus capitulatis, breui pediculo nitentibus, quadam ligularum vel Cochlearium effigie, in quibus semen continetur Nasturtio simile, sed latius & velut infractum, Lunata plantarum specie. Calyx cum petiolo ligulæ formam exprimit, quæ tumidior vna parte sit, & altera pressior. Id quod in summo fructum in latus pandi designauit Dioscorides. Imò is repando dorso prominulus extuberat, aduersa parte funditur in latum. Folia colis decumbunt in radicem. Semen acerrimi gustus deprehenditur, ita vt mansum Sinapis modo linguam & os velli- cer. (Quare vt Galenus scriptum reliquit, potum rumpit, hærentes menses ciēt, partus enecat. Isthicaditis auxiliatur, subter per sedem alio diraisum, vt pote cruenta deiiciens strigmenta, quippe cum eximie purget, bilem vtrinque detrahit. Modus sumendi acetabuli mensura.)

C. Steph.
not.

Eadem quæ Ruellius Car. Steph. tradit, quem tamen nominare non dignatur, sed pro suis venditat.

Cordus in Dioscor. Thlaspi minus, *Deschelskressen* / vel *groß Deschentrant* / & *wegfresse* vocat. De hoc ait in Hist. Thlaspi Cardamoides, siue Nasturtiarum semen habet copiosum, totis ramulis adnascens in singulis pericarpis, iisque inferioribus connexis, superius aliquantulum concavis & compressis, geminum: figurâ & quantitate Nasturtii, colore rufum. Folia gustu vehementer acra sunt, & Nasturtium æmulantur. Semina autem glutinosum lentorem acrimoniæ commixtum habent.

Gesf. not.

Cordo per Gesnerum adaptata est icon ex Trago qui aliud tradit, Thlaspi nempe latâ filiqua.

Fuchs. not.

Fuchsius qui Thlaspi latifolium cognominat, non satis demonstrat quam plantam per Thlaspi, vt vocat, Thlaspidiū, Sinapi agreste, Capsellam, Scandulaceum, Gall. *Senne Sauvage*, quod quidam Nasturtium testorum, Sinapi rusticum & Bursam pastoris nomen, intelligat. Eius descriptio est repetitio penè descriptionis Dioscor.

Ruellius vt Cornatio placet, primus cā herbam quæ ab Herbariis Nasturtium testorum appellatur, Thlaspi esse censuit, & à vulgo Gallico Sinapi rusticum vocari dixit. Hoc ex Germanis nonnulli secuti, eam herbam *Bauren senff* (Sinapi rusticorum) appellant.

Thlaspi tertium descriptum à Dioscoride ex Crateua videtur Anguillaræ, optimè dici posse illud, quod depictum à Fuchsio & Matthiolo, notissima in Italia planta.

Quæ Herba *Thlaspi* Græcis, Thlaspi quoque Latinis dicitur Matthiol. pingenti, Barbaris Nasturtium testorum: Italis *Thlaspi*: Germ. *Besem fraut*: Hisp. *Puniques de flor blanche*: Gall. *Senne Sauvage*.

Scandulaceum.
Sinapi.

Lacuna in Diosc. qui Græcè *Thlaspi* & *Thlaspi* Lat. Scandulaceū & Sinapi sylvestre: Cast. *Mosfaza saluage*. Franc. *Moufard* aut *Senne Sauvage* vocat, per totam Italiā legitimum Thlaspi ceteri scribit.

Dodon. not.

Dodon. Gall. & Lat. Thlaspi alterum, Neotoricorum Nasturtium testorum, & Sinapi rusticum: Germ. *Bauren senff* aut *Baurenfress*: Belg. *Bauren mosfart* aut *Boerrenfesse*. Hæc ille, qui videtur Thlaspi verum intelligere, quamuis ieiuna descriptio & figura.

Gesner. hort. Thlaspi verum.

Lobel. & Pena Adv. Obs. & Ic. Pl. Thlaspi vulgatilium Vaccariz folio aut Myagri pinnato, omnibus Thlaspi vocatum & receptum. In officinis in usu est, & ad antidota pro vero accipitur Thlaspi.

Digna sanè Cæsalpini verba, quæ adscribantur. Folia fert ab radice Iberidi similia, longiora, ac similiter diuisa, in caule autem solum angulosa, pollicis latitudinis, caulis propè cubitalis, ramis in summis tenuibus, parulis: Rosculi candidi in cacuminibus: fructus specie & magnitudine Nasturtii, in extremo diuisi: semina intus subrotunda, nigricantia, acra: &c.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi, siue folio acuto. Hoc Matth. Lob. Dod. edit. Latina, pingunt foliis non crenatis: At Tragus, Fuchsius, Lonici. Dod. edit. Gall. Tabern. foliis ferratis, quemadmodum apud nos prouenit, nec licuit hæcenus figure Lob. similem videre.

Schvv. Thlaspi latifolium, Thlaspi officinarū *Groß seckelkraut* / *Groß Teschelkraut*.

Thlaspi vulgare circa pontem d'Arue Genevæ habebam in orto cum semine & filiquis Maio, semine maturo Iunio. Basileæ in orto D. Plate- ri, Patavii in orto Triuefani, & alibi obseruauit.

Montbelgardi multis in locis spontè, ceu etiā in orto Ill. E. C. ex semine deciduo se propagat, in Alsatiæ agris inter Basileam & Mulhufam abundat florens Iunio. In fossis, semitis & sepibus prouenire scribit Fuchsius, Maio & Iunio mensibus, floribus & semine prægnans. Thlaspi Cardamoidi tribuit Cordus radicem semestrem. Nascitur lutosus & pinguibus aruis, secus vias inter legetes, copiosissimèque inter Goslarium & Hildesheimium in Saxonia legitimum reperiri in Italia certum est ex Matthiolo, siquidem eo maximè abundat & Goritiensis ager & Coradifcæ moenia in parte quâ Sontius aluit. Nascitur & frequentissimè & acerrimum Pago S. Petri non longè à Goritia, aliisque circumstantibus locis semine perquam acro. Multò vberimè prouenit cultis & incultis aruis Italiæ, Germaniæ & Angliæ: sub ætate florens, ait Lobelius.

Vires à Fuchsio attributæ huic Thlaspi ex Dioscor. Paulo, Galeno & Plinio antè sunt à nobis scriptæ: Is autem scribit semen huius calefacere & exsiccare in quarto gradu: semen acre est, calefacit, siccantis est nature, attenuat, prouocat, incidit, vrit perinde vt Nasturtii semen, Schvvenkf.

Locus
tenqua

Temper
& Vires

THLASPI CAPSVLIS HIRSVTIS.



Requentes statim è radice simplice lignosa fundit caules humi sparsos, teretes, hirsutos, dioicautes, aut etiam cubito maiores, in alas aliquot fillos: folia infima quidem longis appenduntur pediculis. Erucæ latifolæ diuisurâ, superiora verò per caules crebra, nullò interueni-

Descriptio

DRYOPHONON PLINII.

A Vrois nomen merito sibi vendicat, ut qui ad primū his verbis depinxerit. Dryophonon similis herba est (Dryopteri) cauliculis tenuibus, cubitalib, circudatis vtrinque foliis, pollicari amplitudine (vel latitudine, & longitudine. Latitudine potius intelligit Dal.) qualia Oxymyrsines, sed candidioribus, mollioribusque, flore candido Sabuci. Edunt cauliculos decoctos. Semine verò eius pro Pipere vtuntur.

Hæc paucis immutatis ita reddit Ruellius: Dryophonon olus sylvestre Filicalem specie æmulatur, ramulis setiquipedalibus, quos circundant vtrinque folia, pollicari amplitudine, Rusco similia, nisi quod teneriora sunt, & candidiora, flore Sabuci lacteo, semine gata mortuaci, vnde eo vice Piperis vtuntur, conuincuntque cauliculos in cibis ad modum gratos. Dryophonon Plinius Dryopteri similem fecit.

Idem Officinis Gallorum Myrtum memorale appellari scribit, sed nullo modo cum Dryophono conuenit Myrtus memoralis. Nos de hac egimus lib. 13. hoc titulo: Vitis Idæa angulosa.

Thlaspi Creticum Cordus Creticum Thlaspi putat, quod pro Draba Dioscoridis quidam monstrat, vt etiam annotat Dalech. apud Plinium. Verba Cordi hæc sunt.

Quædam exemplaria Arabam, alia Drabam, quædam etiam Arabidam appellant. Cæterum non male ait Virg. Marc. nullam esse apud alios Authores herbam hoc nomine. Plinius tamen eius mentionem facit sub nomine Dryophani. Arabis siue Draba secundum Dodonæi opinionem est Dryophonon Plinii: Thlaspi Candia vulgi. Est nobis Arabis Dodonæi Thlaspi Creticum quorundam, de quo mox dicemus. Dryophonon Plinii peritiores arbitrantur Rhus Plinii nonnullorum: Clusius: qua de re vide H. n. lib. 6.

Authore Guilandino vt testatur, Casp. Bauhin. Barbarea muralis, de qua priori libro dictum, erat Dryophonon Plinii. Pro Dryophono tandem Plinii quidam [ait Dal. in annot. ad Plin.] Filicem florentem monstrant. Consule lib. 37. H. n. generalis.

THLASPI CRETICVM QVIBVSAM
flore rubente & albo.

Descriptio



Cadem pedalis altitudinis aut prociore vnico adolefcit, sed crebro alarum stipita vberim fruticæ, dno, lignoto, glabro, viridante: foliis tum caulibus rami amicum turlogis angustis, ex angusto principio sensum dilatatis, iberidis folia æquantibus, nonnihil in-

terdum crenatis, potissimum inferioribus, tapore feruido & subamaro: flores vmbellatim coherent dilute rubentes, vel, vt ait Dodon. è cæruleo rubroque permixtis, vtrisque dilutis, eleganter purpurascens, foliis quaternis, duobus maioribus, totidem minoribus, constantes: quos si-lique vel thecæ excipiunt Thlaspios bifidæ, in- fractæ, & fissura stila præferentes, quibus semen continetur, Dod. acre veluci Nasturtii. Radices plures, crassiusculæ, duræ, albæ.

An Anguill. Thlaspi Cappadocicum Galenit Matthiol. in post. com. Ital. d. pingit sine descriptione, sub titulo, Thlaspi 4. figura non ad nodum probandâ. Dod. gall. Op. 3. Lat. Arabis & Draba, Plinii secūdam quorundam opinionem, Dryophonon, Neotoricorum Thlaspi Candia, vocati etiam addit Op. 3. vel 4. cap. 16, lapsu facili ex a in a.

Thlaspi Creticum siue Cappadocicum quorundam, si benè meminit Gefn. epist. quadam ad Occomacius amariūq; est cæteris, siue Nasturtii, siue Thlaspios generibus. Is n. horto habet herbam floribus & seminibus eisdem [flores vtriusque quaternis constant foliolis: quorum duo semper latiora sunt, & alia duo minoræ;] foliis verò multifidis, quam Sesamoidis nomine accepit: Ac dicit Dodonæum Thlaspi Creticum Arabam vel Arabin facere.

Lob. Obs. & Icon. Plant. Thlaspi Candia vmbellatum iberidis folio.

Camer. ad Mart. Germ. Thlaspi 4. Hort. Thlaspi Creticum flore purpureo & subalbido, amarissimo folio.

Casp. Bauhin. Phyt. Thlaspi 13. siue vmbellatū Creticum iberidis folio, quorundam Dryophonon Plinii, aliorum Draba Dioscor. Et sanè, inquit, descriptio in multis conuenit, flore est purpureo, aliquando subalbo & luteo: habetur in horto Bombiano.

Schvvenckf. Thlaspi Creticum.

Propagatur, inquit Camer. non solum semine, verum etiam ramulis depactis in terram: Tene- re plantæ prius quàm flores produxerint, in cel- la asseruata, altero anno florent egregie.

Iulio & Augusto mensibus florem ac semen profert, Dodon. In Silesia hortis semen Augusto & Septembri maturum, Schvvenckf. Thlaspi Creticum vulgò dictum vidi florens Basilæ in horto Theodori Zvingeri & aliis, florens Iulio mense & adhuc Septembri. Genevæ satū in horto meo ex semine misso per Zvingerum, florebat Iunio. Sturgardiz copiosum vidi: Satum Montbelgardi in Horto Ill. E. C. facile pro- uenit, floret Augusto, Anno 1608. Iulio in horto Il. Ducis florebat Thlaspi Creticum flore rubente, quod vulgare, & albo, quod nondum videramus, dicebat se habere flore mixto.

Feruentis gustus: ac potenter, idcirco ex- calfaciens huius non minus quàm Thlaspios semen, autore Dodon. qui præterea vires tribuit Drabæ, quæ postea recensentur ex Vetroibus cap. de Draba.

Thlaspi Creticum foliis indiuisis, seu Lini amatum.

Thlaspi Creticum appellatur herba, quæ etiam apud nos reperitur locis asperis in monte S. Iuliani: surculis dodraptalibus: foliis angustis, indiuisis, seu Lini: capitula fert cacuminibus: in quibus flores stipati, subrubentes: & fructus in eodem capitulo stipatos, profundiori sectione, quàm Thlaspi nigrum: seminibus intus flauis, a-

Thlaspi Cappadocicum

Thlaspi Creticum, Dryophanon, Draba.

Locus & tempus.

Flore albo, ex mixto. Vires.

maris & acris: herba quoque amara est. Galenus meminit Cretici Thlaspios.

THLASPI VMBELLATVM
aruenſe amarum.

Scriptio Esquipalmaris est & altior plāca, *coliculis* pluribus, ramosis, striatis, subhirsutis, quibus *folia* adnascuntur oblonga lberidis, ex angusto principio sensum dilatata, & circa extremitatem crenata, crassiuscula, subhirsuta, sapore perquam amaro, sub-



crinent minutum, & cre, C. Bauh. Radix lignosa, alba, fibrosa. Hæc planta accedit ad Thlaspi Creticum vulgo dictum.

Est Trago Thlaspidi aliud genus sine icone. Tabern. Hist. & Icon. Thlaspi amarum siue 10. Bitterbaurensis / caule tenui, sed robusto, flore albo instar Coronæ.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 14. siue umbellatum aruenſe lberidis folio.

Basileæ in agris, mense etiam Octobri, & mense Iunio. Cùm essem Genevæ inveni circa Thuri copiose florentem Iunio, idque inter segetes. Montbelgardi variis in arvis, vt eundo ex *Arbis Audincourt*, & in agris circa *Chaux*: transfui in Hortum Il.E.C. floret Augusto, Sturgardiz colunt in horto Il.E.C. Iunio & Iulio copiosum obleruui inter segetes flore albo & purpurascete in agris inter pagum *Longenelle* & celebrem Sanum siue Salubrem fontem Il.E.C. Wirtemb. in comitatu Montbelgardenſi.

THLASPI PARVVM VMBELLATO
flore niueo odorato.

Thlaspi 4. (lege 5.) paruum odorato flore, quod Iacobus Plateau mittebat, inquit Clusius Hist. post. humile est, ex femine natum, singularibus virgis assurgit, rotundis, in plures ramos diuisis, per quos vt per caulem, sparsa erant angusta & extremo mucrone serrata *folia*, Cretici foliorum æmula, acris gustu prædita: summo caule & extimis ramis, nascebantur veluti quædam in vnum caput congestæ umbellæ *florum* niueorum, odoratorum, quibus successe-
runt theca Cretici Thlaspi vasculis similes, in



THLASPI VMBELLATVM TENWITER
diuiso folio amarum Narbone, sic.

Thlaspi speciem, vel vt alii volunt Nasturtium sylvestre, quod cum Thlaspi umbellato aruenſi amaro pictum est, Anno 1561. & 1562. inueniebam Monspelio eundo ad montem *Esperon*, & verius oppidum Gangen, florentem inter saxa mense Octobri, & propè *Casleone* inter *Perous* & Monspelium in marginibus agrorum mense Maio, & veniendo Lugdunum mense Iunio, si bene recorder: Planta autem est multum accedens, Thlaspi umbellato aruenſi amaro-

foliis crassiusculis cum aliquot parvis lacinis siue portunculis, ferè floribus iisdem sed paulo minoribus. Est semispichamea: *cauliculis* aliquot firmitculi in ramulos diuisi: *radix* singularis crassiuscula, in fibras distributa: hæc verba ascripsit Gesnerus: Sesamoidis species minima, quæ in meo horto mihi nata: vtrum in eo fallitur: *Est mihi* alia planta inter meas agglutinatas stirpes, pedalis, cum pluribus caulibus ramosioribus, cui in summitate ramulorum flores copiosi, radix crassior. Scribit Gesnerus iuxta eam; quæ sequitur Thlaspidium quoddam videtur, inest semen tenue, latiusculum, rufum, subamarum. *Est mihi* adhuc hoc anno inter siccas cum prædictis alia plantula monoclonos, altitudinis quatuor vnciarum, per totum cauliculum foliosa, in quatuor ramulos diuisa, tum copiose umbellato flore: eam Monspelio. detulit Frater C. Bauhinus ac misit cum hac inscriptione, Thlaspi Candia umbellatum lberidis flore ex monte Ceti, florens Maio & Iunio: Hæ autem tres plantæ sunt tantum vnus, sed varietatis occasionis loco. Hoc verò Thlaspi non mihi amplius vt sum nisi inter meas plantas siccas, donec hoc anno 1607. conspectum, sed non agnitum antè florem emissum, in horto Theobaldi Nobilior generi mei Pharmacop. Il.E.C. quod prouenit ex femine Monspelio misso Doctissimo Medico, D.D. Danieli du Vernoy, nomine Thlaspi umbellati, quod præcedenti anno terræ commissum (multum euarians, vt solent plantæ quæ ex calidioribus locis in frigidiores transferuntur) per hyemem edurauit, & hos sequenti ineunte Aprili mense cauliculos primum protrudere cepit ex vna radice plurimos, striatos;

quibus semen: ramis etiam Cretici instar, non viux.

Thlaspi hoc ab eundem Clusio Thlaspi in Allobrogibus inuenito, flore niueo; quantum differat cogitandum.

Descriptio

Descrip.

Sesamoidis species. Thlaspidium quoddam.

Thlaspi umbellatum.

Locus.

longa serie foliorum ad extimam vsque promi-
nentia caulis donatos, folia autem ima sustinen-
tur petiolo vnciali, superne in quatuor portiones
crassiusculas, latusculas, mediâq; sui parte sulca-
tas desinentes, media porro folia lumnâq; petiolo
dâas circiter vncias plus minusc longo prolu-
cantur, érenarumque impari numero pro pe-
tioli longitudine breuitateque differunt, ita quide
vt longiores pediculi 4. vel quinq; portionib. à
se inuicem impari intervallo è regione colloca-
tis distictisque constant; breuiiores verò modò
duobus, sed rarissimè, modò tribus, trifolii in mo-
dum, modò quatuor, modò quinque quoque, sed
rariùs, disparique longitudine dotantur. Florere
porro cœpit iam declinante Maio, etant verò
flosculi in vmbellæ circinnatæ morem numero-
siores dispositi, vel intra caliculos adhuc condi-
ti latentesque, vel iam sese in apertum florem
pendentes explicantesque, albidî, quaternis con-
stantes foliolis, quorum externi ad instar amari
Nasturtii duobus aliis longioribus foliis in am-
bitum sparsis, duobus verò aliis interioribus bre-
uioribus absoluuntur, in media verò regione
staminibus aliquot croceis decorantur. Folia de-
gustata saporem amarum acremque sensui offe-
rebant, vt & flos mansus, remissiori tamen gra-
du. Superueniunt capsulæ & semen.

Penâ & Lobel. Aduers. & Icon. Plant. Thlaspi
hoc, Thlaspi alterum vmbellatum Nasturtii ho-
tensis folio, Narbonense, inscribunt. Lobeli
autem descriptio: vt & eius icon non in omni-
bus placet.

Id. Dalechamp. videtur paulò melior, de de-
scriptione taceo, quæ sic habet: Nasturtium sylue-
stre Dalechampii radice est longa, tenui, candi-
da, fibrata: caulibus multis fruticat dodranta-
libus, & si pinguius solum fuerit pedalis, folio
est satiuo, copioso, densius per annos congesto:
flore in vmbellæ ex albo purpurascens: semine
in latis vaginis, Thlaspeos modo bifidis, gustu a-
cri, & satiuum Nasturtium odore imitante. In
agris frumentariis provenit, & lapidosi mar-
cisque.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 1. siue Nasturtii folio pe-
reginum. Thlaspi alterum minus vmbellatû
Nasturtii hortensis folio Narbonense Adu. *Cur*
primum Thlaspi dicatur nescio, mihi potius vi-
detur locandum post Thlaspi vmbellatum aruen-
se quod ego amatum cognomino: quibus benè
cognita fuerit hæc planta considerent quantum
similitudinis habeat cum Nasturtio hortensi.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi Narbonense vmbel-
latum, Thlaspe von Langedoof mit vielen
geharrff blumlein.

THLASPI FOLIIS GLOBULARIÆ.

Descriptio
Longè latèque serpit *radiculis* longis crassius-
culis in aliquot capita diuisis nixum, quæ
subinde reptando demissis fibris denuò radican-
tur: *folia* per terram sparsa, aut in eam reclina-
ta, satis crebra, Globulariæ foliis quodammo-
dò similia, pediculo vnius aut duarum etiam vnci-
arum, ad exortum rubente nitentia, vix totam
vnciam longa, subrotunda, crassiuscula, atrovi-
rentia, potissimum hyberna, sapore amaro: *cau-
tes* palmares aut etiam longiores, teretes, glabri,
per quos alternatim nascuntur *folia* coloris ferè
glauci, pediculorum expertia, imâ parte caulem
còplexa, quo ferè modo *folia* Bursæ pastoris Per-
foliaræ folio acuminata. Summum caulis cacu-

men confertos sustinet *flores*, liberidis Fuchsi in
morem, nec ita dissimiles, maiusculos, singulos
quatuor foliis coloris lactei constantes, pluscu-
lis etiam apicibus in calyce viridante latentibus.
Quibus succedunt *filiquæ* latusculæ compressæ,
bursularum pastoriarum æmulæ, ex sinu suo api-
culas exiguas emittentes. *Semen* complectentes
subruffum, exiguum, aciusculum, & subamarum.

Clusius Pann. & Hist. post. Thlaspi montanum
2. siue Thlaspi Badense.

Visa planta florente, nisi iam ex Clusio figurâ
habereim sculptam me absente, aliam propone-
rem, quandoquidem ipsimet Clusio non placet
nec nobis.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 8. siue Bellidis cæuleæ
folio.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi album supinum.
Itegent meß
Bauren freß.

D. Dr. Mar-
tinus Chem-
nitius dedit
Basilæ colle-
ctum in mon-
tibus prope
Delsburg:
florentem vi-
di Martio in
horto Ioan.
Heitzman
Pharm. Mensè
verò Maio re-
peri prope S.
Vrsane lapido-
sis locis cum
flore & fili-
quis penè ma-
turus. Clusius
obseruauit in
decliu monti-
tis illius glabri, qui vrbi Badensi imminet, quar-
to à Vienna rariari, florens Aprilis, seménq; pro-
ferens Maio & Iunio.

Thlaspi folio rotundo.

Quod à Camer. hort. Thlaspi 7. rotundifolium
Thuringiæ: & C. Bauh. Phyt. Thlaspi 7. folio ro-
tundo nuncupatur: eius nullam adhuc reperi de-
scriptionem: considerandum an sit Thlaspi no-
strum foliis Globulariæ.

THLASPI FOLIIS GLOBULARIÆ AFFI-
ne siue Alisefolia cum Myagris foliis.

AD Thlaspi Globulariæ foliis nobis dictum
non nihil accedere videtur, sed hoc quàm il-
la exilius. Nam & *radix* longa, crassa, in plura
capita diuisa, & *foliola* numerosissima quibus-
dam albidis pilis oblita, quædam interdum sinua-
ta: succulenta, crassiuscula, & oblongiuscula,
humî sparsa, atroviuentia: quibus præteritorum
foliorum filamenta substrata. Ex quibus *surculi*
emergunt palmares aut altiotes, teretes, alterno
foliorum angustiorum subpinguium atroviuenti-
um quoque ex ima parte coliculum amplecten-
tium posu donati. In furculorum diuisorum ca-
cuminibus, *flosculi* quoque plurimi, lactei, qua-
drifolii, dictæ plantulæ foliis similes. Sapore est
acri.

Huic

Hæc plantæ accedit multum si non idem Thlaspi petraeum, Myagrosdes Pona.

Quodnam sit Matthioli Thlaspi tertium, non possum [inquit Camer. ad Hist. Matth. Germ.] diuinare, nisi illud sit, cuius semen nostris Officinis in usum venit. Similia enim habet folia & radicem, quemadmodum ab eo pingitur: caules verò frequentioribus foliis sunt stipati, ramulis verò in orbem pulchrè digesti flosculi insidēt, neque etiam saxofa amat, quod de suo Matthioli scribit, sed pingui solo nascitur. Quod & Pennæus Londinensis Medicus in monte *Satene* propè Geneuam in saxorum crepedinibus, reperit: foliola habet longiora, minora, iuxta radicem paulum crenata & aspera, atrourentia. Semen rufum quemadmodum Nasturtii vasculis clauditur. Prouenit etiam in monte Ammam Heluetiorum. Idem in Harc. Omnia Matthioli saxatilis Thlaspeos iconem aliam substituitur ex ipsa plantula depictam, quam antehac nemo arbitror exhibuit, donec Matthioli illud Thlaspi [tertium] nobis quoque innotesceret. Idem in Epit. Thlaspi tertium inscripsit. Sed nescio eut Thlaspi Officinari non potius referatur ad primum Matthioli quam ad tertium: nec etiam inuenio Matthiolum dicere tertium saxofa amare, pro tertio placet: nec illa planta Camer. respondet tertio Matth. cum mutabat iconem, oportebat etiam descriptionem Matth. in Epit. mutare.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi tertium: saxatile Camer. in Epit. Matth. Quod enim Matthioli Ico. pro Thlaspi tertio pingit, non rectè exprimit folia, quæ nimis longa & acuta: Quare Cameraarii figura nobis probatur ex plantæ viridis cum figura collatione. Nos eius imaginem exhibemus in tabula Alines-foliæ cū Myagri capitulis.

In peregrinatione Rhætica cum D. Gesnero, anno 1561. Burmii cum effluens in monte Nombre reperi cum vasculis mense Iunio. Anno 1591. Frater C. Bauh. sine nomine ad me misit, qui scribit, se in monte *Wasserfall* copiosè collegisse. In altissimo monte trans Sanctum Vrsum ex præruptis rupibus, quas Rupes *Sambra* vulgò vocant, loco cæterum aprico Maio florens, nec dum semen profersens, ex quo nostra descriptio.

THLASPI CAPSVLA cordata peregrinum.



Tom. II.

Plcherrium Thlaspeos genus hocce, primum Henr. Cherlero in Clariss. Zvingeri obseruatum, pedalem altitudinem adsequitur. Caulis in aliquot ramulos diuisus, foliis stipatur lini facie, in summo obtusis, glaucis, temerè oppositis. Cuius ut & ramulorum eius extrema flosculi ornant exigui purpurei, quos

exciunt siliquæ foliaceæ, cordatæ, eleganti virore conspicuæ, minimi digiti vnguem latæ, lineæ quadam bipartitæ, & ut vno verbo dicam siliquis Thlaspeos latissimâ siliquâ dicto figurâ per similes. Radicula duriuscula est & alba. Plantæ sapor subamatus non sine acrimonia quadam. Semen eius paruum, oblongum, luteolum, acrisculum est sapore, ibinimè ingrato.

De loco in descriptione. Floruit ibidem Iulio & Augusto quo iam siliquæ & semina matura à Cherlero in hortum Mompelgardensem tempus. conicienda collecta.

NASTURTIVM VEL THLASPI maritimum.



In sesquipal-marem & ferè cubitali plantam fruticat, lignosis, satis fragilibus, hirsutis subrabentibus ramulis, per terram sparsis: per quos folia viciat, per angusta, incana hirsute obita, sapore Nasturtii: flosculi extremis ramulis congesti, albi, cum partibus quibusdam cyanis, odorati;

Nasturtii similes: quibus, succedunt capsellæ parua, oblongæ, utrinque acuminatæ: in quibus semen pusillum rufum: radix maiuscula, crassa, alba.

Et hoc illud est, quod Lobel. & Pena in Advers. & Icon. Plant. Thlaspi Norbonensis, Centunculi angustifolii, & Alyssi Italorum nomine proponunt, de quo aiunt. Fecerant iamdiu Itali Alysson quodpiam, eoque Commentator sequitur, lubenter, inquit, posuissim si habuissim: igitur factum benè, quod non habuerit, quippe doctiorum omnium Monspelienium suffragio Thlaspi hæc annumeranda non Alyss. Suspicio Nasturtium nostrum maritimum non per Lobelium disunctum ab Alyss. siue Thlaspi multorum. Icon & quadam in descriptione Lobelii conueniunt cum Nostro Nasturtio vero, quædam cum nostro Alyss. minore quorundam, Monspelienfes id diligentius perpendant.

Thlaspi maritimum Dalechampi sic describit hist. Lugd. Thlaspi maritimum idque minimum in maritimis profuit, radice lignosa, longiuscula, in furculos diuisa, candida: caulibus multis, dodrantalibus, simplicibus, foliis multis, exiguis, angustis, longis: flore in summis caulibus copioso: semine flauo, lato, Thlaspi simili, acris, in loculis turbinatis concluso. Idem hoc Thlaspi alibi habet hoc titulo. Thlaspi Narbonense Penæ. Eadem etiam sub Alyss. Matth. ita scribit: Hanc Plantam Itali fecerunt Alyssum, vel Alyssi genus, quos secutus Matthioli lib. 3. At doctiorum omnium Monspelienium sententiâ Thlaspios generibus adnumeranda est, non

Tab. Lugd. Alyssi. *Sed Hist. Lugd.* illo cap. Narbonense Thlaspi idem facit cum Matthioli Alyllo à quo non parum diuersum: capite autem 45. pro Thlaspi Narbonensi ex Adu. Lobelii & Pena transcribit quæ scripsit, & iconem illorum ponit, hac ratione diuersas confundens plantas: culpa Compilatoris ignari stirpium.

C. Bauhin. Phyt. vocat Thlaspi 22. siue Alylson, dictum alterum & maritimum, atque: etli Lobelius velit Thlaspi Narbonense Centunculi angustifolio, idem esse cum Italorum Alyllo, variat tamen. Hoc enim ab Italico differt foliis angustioribus, rarioribus, siliquis minoribus, longioribus, quod optime exprimitur ab auctore Herb. Lugdunensis.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi Narbonense Centunculi angustifolio: Alylson Italorum.

Locus & tempus.

Toto anno videtur florere. Vidi florentem apud mare & locis arenosis & salugine abundantibus, vno miliari à Monspelio mense Augusto & Aprili, & iuxta aquas mortuas mense octobri. Frater C. Bauhin. attulit mihi Monspelio cum hac inscriptione Thlaspi marinum florens Maio & Iunio.

THLASPI MINVS QVIBVSDAM, ALIJS Alylson minus.

Descriptio



Non vna specie facie occurrit hæc planta, aliàs pusilla admodum, aliàs dodrante maior, crebris virgultis duris fruticans, asperis & incanis, in ramos fistilis, & in terram aliquando reclinatis: folia infima, cum caulem non fert, oblonga, vncialia aut fuscuncialia, culmo latiora, admixtis sæpe aliis latitudine & longitudine his cedentibus, quæ v-

træque caulescete plantæ ferè decidunt: superiora autem, quæ in caulibus & ramis satis sunt frequentia, admodum sunt angusta: omnibus porro communis color incanus, magis tamen parte inferiore, ad tactum asperitas, neruus vnicus folium bisecans, sapor fatuus: flores creberrimi, Thlaspeos montani lutei, multò minores: colore aliàs luteo, quam varietatem est vbi in eadem planta obseruare liceat: quibus serie longa, vt in hoc genere fieri adsolet, capsulæ succedunt lenticulæ grano formæ & magnitudine pares, circumactæ sulco in medio protuberantes, vbi semina subsunt pusilla, quaternaria, singulis locellis membranulâ disclusis bina, rufa, quæ humore madida mucaginem reddunt, radix demittitur lignosa, alba, plerumque simplex: annua stirps.

An Trago Nasturtii genus quartum Germanis dictum Klein Seckelkraut vel Tschelkraut, quod aliter describit, atque sub Thlaspidio comprehendit.

An Dodon. Gal. Thlaspi 4. cui folia longa, an-

guista, aspera, caules lignosos, rotundos, flexiles, flosculos paruos, albos, siliquas largas, semina fusca, gustu valde calido, Nasturtii instar, adscribit Hoc Thlaspi cur Dod. Lat. omiserit miror.

Hist. Lugd. Alylsum minus Dalechampi vocat, de quo ait: In sabulosis crescit radice candida, parum fibrata, satis longa, cauliculis multis, rotundis, lanuginosis supra terram parum exstantibus: foliis multis albicantibus & tanquam cinere conspersis, Aizoo minoribus, similibus, si non lata forent, gustu fatuis cum paucula adstrictione: flore in summis virgis copioso, luteo, semine Lini, minuto, ruffo, in loculis scuto similibus, duplicibus, membrana tenui & pellucida distinctis. Si Dalechampi Alylsum idem est cum nostro Thlaspi minore quorundam, icon in Histor. posita non placet.

Thlaspi generibus quodammodo congener esse videtur Clusio Alylsum minimum, foliolo gustus subacidi, sed salium quodammodo cientis, flosculis luteis quinque foliolis constantibus. An verò nomen aliquod vulgare obtineat apud eos populos vbi nascitur non intellexit, affinitatem autem habere videri scribit cum ea planta, quæ à vulgo Dioscoridis Alylson esse creditur. Nos suspicamur Alylsum minus, siue Thlaspi minus de quo agimus à Pena & Lob. in Adu. non distinctum à nostro Nasturtio, siue Thlaspi maritimo.

Thlaspi inquit Camer. & Matthioli Germ. similis est plantula quæ quibuldum Alylsum dicitur, flore albo, in summis luteo, hisluta, &c. Idem ad Epit. Matthioli. ait. An veterum autorum hoc sit Alylson, cum aliis adhuc subdubito. Hæc ille. Proponit autem iconem ex Gesneri Iconibus, quam eandem esse plantam quam Matthioli exhibet nondum concedo.

C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 23. siue Alylsum dictum tertium luteum.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi minus clypeatum 2. Klein Schild Besenfraut. Figura Thlaspi seu Alylfi quorundam minoris male ponitur à Tab. pro Thlaspi clypeato minore Lobelii, quæ nobis dicitur Lunaria biscurata minima.

Confundit Schvz. hoc Alylsum minus cum Thlaspi angustifolio Fuchsi, quod nos Nasturtium syluestre esse dicimus. Alylsum Matthioli, & minimum Clusii, Seckelkraut, Hort. Lust. idem facit, at male.

Genue & Lugduni abundat floréque mense Maio: in Ducatu V Wirtembergico propè fontem Admirabilem in monte Eichelberg flore luteolo albescente, vbi marcescit Septēbri. Mōtbelgardi copiosè in mea vinea, flore albo. Nusquam non crescit Viennensi agro ad aruorum, vinetorumque margines quibus à publica via separantur, quin etiam siccis & graminis agris nō modò Austria, sed etiam Moravia, & Pannonia. Floret toto Aprili, interdum etiam Maio.

THLASPI MONTANVM LVTEVM.

Non pauca huic cum Thlaspi quarto Dodonæi communia, potissimum verò folia oblonga, incana, maximè infernâ parte, aspera, ad oleæ formam nonnunquam accedentia: radix longa, lignosa, multifida, numerosos, humifusos, lignosos caules profert, cinericeos, dodrantes & longiores: ac flores copiosi eo ordine digesti quo in iam dicto Thlaspi, multò maiores & saturatè lutei: capsellæ quoque non dissimiles, stilum è capite proferentes umbilico prominulo


semen



semen clauden-
tes. In planta
siccata nullus sa-
por inignis ap-
paret, aliquan-
diu masticata,
postea tamen
habere videtur
aliquam acri-
moniam lin-
guam siccans.

Lob. Icon.
Pl. Thlaspi 20.
sive montanum
luteum.

Shv. Thlas-
pi luteum rep-
ens Lobel.
Thlaspi luteum
supinum mon-
tanum / Klein



gnosos, ruben-
tes, erectos
producti, in ra-
mulis aliquot
diuisos: folia
priora longa
quatuor un-
cias, & vnam
lata, superiora
Leucoii lutei,
incana aut in
nigro virentia;
subhirsuta, sa-
pore oleraceo,
subacti; flores
inæquali licet
pediculorum
tenuissimorum
ortu in umbel-
la dispositi, al-
bi, quatuor fo-

Descriptio

Friedent Thlaspi/ Arenosa preceptat loca.

Thlaspi montanum flore luteo voco herbam,
quam fr. C. Bauh. scribit se inuenisse propè Bas-
ileam circa Birsfecken super rudera in monte.
Hanc eandem plantam mihi misit cum flore Iu-
lio mense ex Champagne Burgundie insignis
Pharmacopœus Toffianus Carolus, quam cu-
raui plantandam in horto Ill. mei Principis,
sed folio multo maiore ad Oleam acceden-
te, de qua planta scribebat floribus esse Kei-
ri sive Leucoii lutei, eiusdemque odoris, florere
vere. Floruit Montbelgardi toto Iunio &
Iulii principio, quo tempore siliquæ apparue-
runt.

THLASPI MONTANVM MINIMVM Monspeliensum folio laciniato.

Lignosis, albis, prolixis, multifidis *radiculis*
nascitur, ex quarum capite *sarculi* emergunt
numerosi, interdum vix vnciales, aliis trium qua-
tuorue vnciarum altitudine, ramosi, congesti, exi-
les, albi: quibus paullatim delabentibus sensum
succedunt longiore intervallo diffusæ *siliquæ*, Mi-
lii grano æquales, ex rotundo oblongæ, in duos
loculos interueniente candida membranulâ di-
uisæ, ex pediculis longiusculis pendentes: *semi-
na* minuta, rufa: folia tum ex radice statim,
tum ad caulium, ramorumque diuisiones, vncialia
vel semuncialia, in profundas angustissimas la-
cinias ad costam vsque incisâ. Sapor acer.

In Bourtonet iuxta Monspelium, à Genero
Cherlero collectum.

Leucoium luteum montanum supinum Pona.

Plantam nobis misit diligentissimus Pona, An-
no 1609. cui inscriptum Leucoii lutei montani
supini, ea sanè habet similitudinem quandam
cum Thlaspi nostro montano, sive Thlaspi su-
pino luteo Lobelii, folia tamen omnia rotun-
diora, iuuenis est planta quam misit, in qua
pauci rami, vix duas vncias longi, radix crassius-
cula qualis in prædicto Thlaspi, cum fibris qui-
busdam.

THLASPI CAPSVLIS SVBLONGIS incanum.

Ex radice satis crassa: cubitum longos ac e-
tiam longiores, lentosque *ramos*, & planè li-

liis cordatis constantes, staminibus in medio lu-
teolis: *capsula* succedunt sublongæ, hirsuta.

An Matth. in post com Lat. & Ital. cum magn.
fig. Thlaspi tertium: Figura sola sine descriptione.

Thal. in Harcyn. Thlaspi Matthioli tertium.
Camer. ad descriptionem Thalii addit: Passim
quoque nascitur apud nos hoc Thlaspi, sed vi-
demus parum congruere cum Matthioli pictura
3. Thlaspeos, quod in saxosis nasci plerumque asse-
rit: hoc verò nunquam eiusmodi locis inue-
ni, sed potius circa sepes & alibi strigoso
gramine obductis areis: idèd in nostra editione,
omissa Matthioli saxatilis Thlaspeos iconè, a-
liam substituiimus ex ipsa plantula depictam, quâ
antehac nemo, ut arbitror, exhibuit, donec Mat-
thiolum illud Thlaspi nobis quoque innot-
sceret. Hæc Thalij descriptio bene convenit cum
Thlaspi nostro incano: an idem Matthioli, asse-
ret non asum; siliquæ etiam non vndique plâ-
cent: præterea Matthiolus ponit tantum titulum
Thlaspi tertij cum figura: nec video eum eius
meminisse in contextu, aut dicere in saxosis na-
ci: de suo Thlaspi altero id dixit, quàm bene, di-
cetur sub historia Thlaspios cum lata siliqua: de
Thlaspi saxatili Camerarij sub nomine Alline-
foliæ cum Myagri capitulis.

An Camer. hort. Thlaspi 6. incanum fructu-
sum Franconie?

An Lobel. Icon. Thlaspi album supinum. I-
con. Lobelij mihi videtur non vndique vera.

Lobel. Obs. & Icon. pl. Thlaspi incanum Me-
chliniense, finitimo Mechliniæ ruti fructuat O-
leræ foliis, multisque summo diuisis hirtis ramu-
lis, pedem & sesquipedem longis, flos albus & in
pericarpis rotundiuseculis summum caulem am-
bientibus exiguum semen minus cæteris.

Clusius in Pann. & hist. post. Thlaspi incanum
Machliniense, Thlaspi genus à nonnullis Ma-
chliniense cognominatum, folia habens vntiam
longa, dimidiam lata [inæqualiter & inordinate
amplectentia caulem pedalem aut amplio-
rem,] cineracei coloris & acris saporis: cau-
les in ramulos diuisi, extremis albos flores pro-
ferunt, quatuor bifidis foliis constantes, in ca-
put cogens & quasi umbellatim nascentes, qui-
bus decussis, paulatim illa capita succrescant &
producentur, vasculaque ostendunt mucrona-
ta, breuia, semen continentia: radix albicans,
fibris, quibus prædita est; sub terrâ latè serpsit
Dracæ instar:

Taber
Lobel. not.

Tab. Ic. & Hist. Thlaspi duodecimū, siue album lupinum 2. ligende weis baren senff. Icon Tabernae ferē eadem quē Lob. apud Pl. cui nomē respondere non videtur: pingit enim plantam surrectam non supinam. Compilerator mihi videtur descripsisse secundum iconem.

Locus.
Vitis.
Schwartz
ner.

An Schvv. Thlaspi album supinum: Tab. Thlaspi album 1. & 2. Lob. Thlaspi album supinum, weisser weg aut Bauren Senff/ Vratisl. weisse weggresse/vbi secus vias extra pagos passim provenit: Aestate floreat & semen fert. Calefacientis & siccantis naturae. Herba incensā pestis tempore aëris vitia corrigere vulgus credit. Miror cur dicat primum & secundum Tabern. primum enim album, est montanum vt annotavit Clusius, ac nos etiam observauimus, parua planta, non supina, nec apta igni, vt est secundum: si Tabern. eandem intellexit [quod nos suspicamur esse] is habet iconem Lobelii mutatam non nihil: titulus quo supinum dicit non placet, id non demonstrat icon. C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 9. siue album supinum Lobelii. A Fratre non scribitur an ei notum. Considerandum an eius 17. folio incano, flore albo, sit idem cum nostro Thlaspi capsulis oblongis.

Locus &
tempus

A D. Sprengero habui Heidelbergā semen pro Thlaspi incognito, satum Montb. in horto Ill. E. C. primo anno floruit ac hieme perit, quod in cista repositum sequenti anno floruit per plures menses, ac secundo anno durauit. Hoc idem reperi spontaneum iuxta Oenereheim cum flore & siliquis Iulio, vbi in quibusdā plantis in multis caules, in aliis in pauciores excreuit, ad tres cubitos eandem etiam reperi. Nascitur plerisque Austriae & Moraviae locis, secus vias, & agrorum margines, gramineisque in cultis locis non minus quam in Belgica Thlaspi genus illud, quod nonnulli Machliniense cognominant, quia iuxta Machliniam Belgicae celebrem urbem plurimum nascatur publica via quā Antuerpiam itur.

Thlaspi arborecens folio viridi.

Spitz vbi Camera Imperialis, in horto cultiss. rariss. plantis D. Tengenel Adseffloris, Thlaspi vidimus anno 1595. mense Iunio arborecens, fruticosum, folio linariae, verum non acuminato, sed in extremitate obruso, succulento, crassiusculo, glabro: sapore acri, flosculi coloris non recordamur.

THLASPI SEMPER VIRENTIS species candida.

Descriptio




Mihi insignis Medic^o Christ. Schwarz anno 1591. mense Aprili plantā ex horto Ill. D. VVirtemb. cui praest, quam vocat speciem Thlaspeos semper virentis, quam plantaui Montbelg. Ea erat ramola cum multis foliis oblongis, incanis siue candidis, flores in umbellis albi, sitiqua parua subrotunda.

PLANTARVM

An Camer. hort. Thlaspi 4. semper virens biflorum, folio Leucii.

Hist. Lugd. Thlaspi montanum candidum Da-lechamp. alterum. C. Bauh. Phyt. Thlaspi 16. siue Leucii folio incano, quod inter fratris Ioh. Bauhini plantas tantum obseruauimus.

THLASPI FRUTICOSVM ALTERVM LOB.



Quum effemus cum Ill. nostro Principe Duce VVirtemb. Heidelberg anno 1595. insignis & diligentissimus stirpium indagator & Pharmacopaeus D. Sprengerus dedit nobis ramū plantae pro Thlaspi fruticoso Lobelii altero, palmo longiorem, tenuem, cuius folia alternatim disposita, vnciam breuiora, vix

culmum lata, in acutum desinentia, & albida siue cinerea, in superiore caula parte ex longiusculis pediculis alternatim capsula sublonga, in quorum extremitate cuspis, in extremitate flores plurimi umbellam representantes: vascula similia Thlaspi quod vocamus siliquis sublongis incanum, similes flores, eadem vtrorumque dispositio: folia autem diuersa. Nos curauimus pingendum nostrum ramum iuxta Lobelii iconem, qui suum sic tradit: Folio est Thymbræ hirsuto: cauliculos emittit plures pedales fruticis specie, e quorum summis flores albi & femina in compressis folliculis.

Clusius iam dictum vel valde simile sic describit: statim à radice multas emittit virgas inaequales, frequentibus ramis donatas: folia illius angusta, mucronata, nullo seruato ordine, caulem & ramos ambiunt, satis manifeste accimoniae: extremi rami multos albos flosculos in caput ferunt, quibus excussis, subsequuntur plantae thecae in spicem speciem nascentes, superioribus similes, duobus vtriculis constantes, in quibus semen: radix crassiuscula, dura, non viuax.

Lobel. Obs. & Icon. Plantar. Thlaspi fruticosum alterum. Miror ita ieiunē descriptum, nec annotatum locum vbi proueniat, ego vt antè dictum, Heidelbergae accepi à D. Sprengero sicce plantae ramulum, dicebat esse Thlaspi fruticosum Lobelii: folia rara, angusta, vncia digiti breuiora, acuta, cinerea: capsulae oblongae cum cuspidē, similes Thlaspi incano siliquis oblongis, flosculi maiusculi, albi in sicca planta.

C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 27. siue Thymbræ folio fruticosum.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi fruticosum 2. Clus. H. post. Thlaspi 5. [legendum 6.] Hispanicum flore albo.

THLASPI

THLASPI FRUTICOSVM FOLIO Leucoi marimi minoris.



Virgæ numero-
sparæ, crebris
Leucoi mino-
ribus folijs:
flores candidi,
copiosi, & semen
compressum
Thlaspi parui.
Radix lignosa,
fibrosa, in Bel-
gii hortis.
Lob. Obs. &
Icon. Plantar.
Thlaspi fruti-
cosi folio Leu-
coi marini.
C. Bauhinus
Phyt. Thlaspi
26. siue Leucoi
folio frutes-
cens.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi fruticosum fo-
lio Leucoi minoris, Baumh. & Baur. sensu.

LEVCOIVM CVM SILIQVIS rotundis flore luteo.



Plures ex ra-
dice candida,
fibrata, mediocri-
ter crassa, caules
proferit cubitum
altos, teretes,
leuiter hirsu-
tos, & in mul-
tas alas diductos:
folia semunciam
plus minus lata,
palmum longa,
subhirsuta, & nõ
nihil incana: flo-
res extremis ra-
mis copiose con-
gesti hærent, par-
ui, lutei, quadri-
folii: quibus su-
perueniunt vtri-
culi turgidi me-
dium dissepiente

membranula tenui, cui adhærent semina, folia-
cea, orbiculata, ruffa, Leucoi granis similia.

Clus. Hist. & H. post. Eruca peregrina, Leu-
coium semine rotundo vulgò quorundam.

Lob. Obs. & Icon. plant. Patauinum Leucoium
marinum.

Tabern. Hist. & Icon. Leucoium marinum lu-
teum maius. Groß geel Merweyeln.

Hist. Lugd. Eruca peregrina Clusii, Patau-
inum marinum Leucoium Lobelii.

C. Bauh. Phyt. Leucoium 7. siue maritimum
luteum, siliquis rotundis.

Gerard. Leucoium marinum latifolium Bro-
ad leaved Gilloflower.

Leucoium cum siliquis rotundis denominaui
hanc plantam, quia foliis subhirsutis, albidis, &

semine compresso magis accedit ad Leucoia
quàm ad Erucas, à quibus diffidet non parum.
Lugduni habebam in horto, ibi etiam curau
depingendum. Montbelgardi in horto Ill. E.
C. satum mihi prouenit, ac primo anno florere,
hiemem perfert, nec perit postquam tulit semen.
Argentini vidi virentem Octobri in horto
Friderici Meieri. Valerandus Dourez annota-
uit, Aprili mense florere & in maritimis lituris
& Illyrie passim prouenire, D. Jac. Zyngerus
misit mihi anno 1595. semen cum hac inscriptio-
ne, Leucoium Patauinum Lobelii quod mihi
prouenit & repositum hiemem pertulit, floruit
Iunio, Iulio, & Augusto, quo etiam tempore se-
men maturum. Crescit quibusdam Castellæ lo-
cis incultis, & secus vias, vbi Maio florere. In
Belgiam allata non nisi Iunio & Iulio.

LEVCOIVM SPINOSVM, SIVE Thlaspi spinosum aliis.



Dodran-
tali ferè Descriptio
est radice, cras-
sifusculâ, con-
torta, lignosâ,
foris prope-
modum fuscâ,
iatus buxæ,
in plura capi-
ta facellente.
stolones lignosi,
crebri, dua-
rum, triumue
vinciarum, aut
paullò longio-
res, fusco, aut
incano, porra-
ceæ corticæ
vestiti, in ra-
mos frequentes
diuisi, alii in
spinas longius-
culas, rigidas, mordaces, rectasque abeunt, positi
& formâ Pimpinellæ spinosæ: folia per imos ra-
mos pauca, per superiores conferta, incondita,
Thlaspios montani lutei, semuncialia, atque vn-
cialia, vix culmum lata, mucrone obtuso, crassa,
incana, sapore Brassicæ acrisculo: extremis
ramulis hærent ex mediocribus pediculis, gemi-
no ordine viridantes capsula capitulis Myagri si-
miles, bifores, dissepimento membranulæ luci-
dæ in duos loculos distinctæ, semen continentes
rufescens, rotundum, compressum, gustu acris.

Lob. Obs. Icon. Pl. & Hist. Belg. Thlaspi fru-
ticolum spinosum Narbonense.
C. Bauh. Phyt. Thlaspi 28. siue spinosum.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi spinosum, Stes-
chender Thlaspi/ oder Bauren freig.

In ipsis præruptis montis Lupi saxis & cauti-
bus G. Cherlerus collegit Iulio siliquas feren-
tem: dudum habui, verum existimabam esse
Leucoium Patauinum spontaneum, consideratis
capsulis & non spinis.

Huc non malè posset reponi Galastuیدا quam
Honorius Bellus dicit spinosam, foliis esse Leu-
coi albi, floribus albis, siliquis rotundis. Verum
de ea lib. n. circa finem.

LEVCOIVM LVTEVM SPINOSVM.

Descriptio



Leucoium spinosum Creticum, quo nomine appellatum, inquit Clusius, dubius sum. Nata autem est hæc planta etiam Iacobo Plateau, semine peregre accepto. Illam certe nascentem non vidi, sed iconem ipsius manu delineatam ad me mittebat cum breui descriptione idem Plateau. Eam videlicet crescere ad cubitalem aut maiorem altitudinem, & in multos ramos duos & lignosos spargi, quos cingerent folia confertim nascentia, incani & cineracei coloris, per oras nonnihil dentata: & sparsim in ramis multos flores nasci, flauos, quinque foliis constantes: eos autem ramulos initio latis tenellos esse, paulo post tamen, duos & spinosos euadere. Quale semen eius esset, non adscribebat, sed duntaxat sciscitabatur an Hippophastum Dioscoridis esse posset. Sed cum Dioscorides suum Hippophastum, humilem herbam esse asserat, sine caule, sine flore, inanibus tantum capitulis, foliisque spinosis, radículas habere molles & crassas, & quibus foliis etiam & capitulo succus exprimitur, & in usum adseruetur, non video quâ ratione hæc planta eius descriptioni accommodari queat.

Quoniam porro folia, Leucoii marini foliis non valde dissimilia habuisse videbatur, Leucoii spinosi appellationem obtinere posse arbitror, donec aliud magis aptum, & ipsi plantæ conueniens reperiat, tamen si flores eius pluribus foliis quam Leucoiorum flores præditi sunt.

Miror apud Clusium titulo Leucoii spinosi additum Creticum, quandoquidem in descriptione non dicit Creticam stirpem, sed aliud ibidem tradit Leucoium Creticum, quod non spinosum.

THLASPI FOLIO ALLIARIE.

Descriptio

Hæc folia infima lata & rotunda sunt: quæ autem superius in caulibus quos à fibrosa, oblique acta, serpente, alba, tenui, lignosa, Alliumque obolèter radice, plures emittit, ceteres, leues, & cubitales, altioresque, folia inferiora sunt Alliarie familia, alia ad Napy folia quodammodo accedunt, oblonga, auersa parte cæcia, aduersâ in luteo virescentia, duabus pinnulis subrotundis caulem amplectentia, sapore oleraceo, nonnihil ad Cepas quoque accedente, & quorum alii rami nascuntur, similiter foliati: flores Nasturtii aquatici, albi, quadrifolii: silique vno loculo donata, subrotunda, nulli fissura, semen continent singula singulum, flauum.

Lobel. Icon. Plant. Camer. hort. Thlaspi Pannonicum. Clus. Pann. & Hist. post. Thlaspi i. mon-

icum pelatum. Icon non adeo feliciter in Belgica expressa ut necesse erat. C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 4. siue Glutifolio.

Thlaspi Pannonicum primò vidi Argentinæ



apud D. Fridericum Meyer, deinde Sturgardiz in horto Ducis vnde attuli plantandum in Hortu Ill. E. C. vbi feliciter hiemem pertulit & floruit tota æstate, ac deinceps se propagat, folia inferiora similia sunt Alliarie. Inuenitur vmbrosis locis ad arcem Stichenstein, & quâ iter est ex ea arce ad Snerberg, nusquam alibi Clus. obseruatum; nunc verò eius operâ, missis Viennâ eius Plantis, & semine ad amicos, Belgicis & Anglicis hortis inquilinum factum. Floret Iunio, semen Iulio & Augusto ad maturitatem peruenit.

SCORODOTHLASPI VLYSSIS

Aldroandi.



Scito, hercule, nomine Scorodotylaspi plantâ hanc vocauit Cl. Vlysses Aldroandus rerum Naturæ sagacissimus vebigator, & apud Bononienses Physicus celebrissimus: Hic Illustriss. Principis D. D. Friderici Ducem VVirtemb. & Teccensem, Comitem Montbelg. &c. Dominum meum Clemētiss. cum Italia

illas oras lustraret, multis perelegantibus feminibus exoticarum plantarum donauit, inter quæ & hoc fuit, quod sequenti anno in horto Montbelgardensi dicti mei Principis confectum in talenta excreuit plantam, qualem modò describam:

Radice nititur singulari, albâ, paucis fibris donata: ea veluti in capita diuiscatur numeroso foliorum stipatu longis pediculis prædita, quæ ex principio angusto sensim ouatam figuram acquirunt, & subrotundo ambitu finiuntur, quorum priora foliis Bellidis quodammodo respondent, quadam leuiter laciniata, quadam paucis denticulis, alia ferè nullis donata. Color virescens est, plusculis ex costa neruis excurrentibus. At quæ alterno

no posito cauliculis hærent folia, præsertim suprema, minimis ceteris alis caules amplectuntur. Cauliculorum fastigio stesati insident albi, parui, Bursa pastoris vulgaris, quatuor foliis constantes, cum apice in medio, quos bursa sequuntur oblique, subrotunda, cordata, non snultrum compressa, ad Thlaspeos cordati burfulas accedentes. Tota cæterum planta Allium redolet manifesto odoratu, ac etiam non tacta. Radicula & folia oleraceo gustu prædita sunt, grato, & vel tantillum acedinis sapidæ in faucibus relinquente, non sine halitu Alliaria, unde apto nomine insignita ab excellentissimo Aldroando, cui viro hoc nomen obleruantia ac memoria *juniorum* lubentes reliquimus, eiusdemque vestigia historię nostræ, cum alibi sæpe, ex merito tanti viri imprimere volumus. Noua est hæc plantula, nec à quoquam, quantum nobis quidem constat, hæcenus prodita. Unde nec aliis celebrata nominibus quam iam prælibato.

Montbelgardi in orto Ill. C. Wirt. quem excolimus sata produxit flores & siliquas Iulio.



Cantibus: foliis sinuosis, hederaceis, carnosif. Flosculi candidi & semen exile, in quibus gustu & habitu Thlaspi expriment.

Lobel. Obs. & Icon. Plant. Hederaceum Thlaspi.

Casp. Bauh. Phyt. Thlaspi n. siue repens Hedere, quod nondum videre licuit.

THLASPI ALEXANDRINVM

Cortusi Joh. Bauhino.

ALISSVM VETERIBVS ET IN GENERE.

* CAP. V.



M^lic ad me. aliquando Cl. V. Dn. Cortusius plantam hoc titulo; *Thlaspi Alexandrino*, bella planta. Est autem herba dodrantalis, ex radice singulari quaternos caules emittens, teretes, glabros, multis alis cœcaus: ad quorum diuicationes propagationelque, superiore præsertim parte, folia singula ve-

lut Perfoliatæ, ramos amplectuntur, subrotunda: ramorum extremis longa serie vtrinque ex brevibus pediculis appenduntur siliquæ circinatæ, quales ferè Thlaspios tenuifolii Fuchsi, maiores, in mucronem leuiter obtusum desinentes, quas secundum longitudinem percurrit costa, à qua vtrinque valuulæ bipatentis siliquæ dehiscences abscedunt, dissipimento medio relicto, inque singulis valuulis singula semina compressa, tuffa, ex latiore basi in acutum desinente, videtur habere aliquid commune cum Thlaspi Hederaceo Lobelii.

C. Bauh. Phyt. Tlaspi 12. Alexandrinum Cortusi. Io. Bauhin.

THLASPI HEDERACEVM.

IN Portlandiæ peninsula, Cornubiæ vicino portu Plimmourne / aliisque maritimis Angliæ cauitibus, repens herbula, dodrantalibus & spithamæis gracilibus cauliculis, striatis, puni-

V^aria est apud auctores Alyssi historia. Et quidem ex Dioscoridis sententia *ἀλυσσος* frutex parvus [*εργαδεν*: Ruellius addit vnicaulis] est, subasper, folia habens rotunda, circa quæ fructus, duplicis scuti figura, in quibus semen est aliquantulum latum. Nascitur in montanis & asperis locis.

Hoc, vt opinor, ab Alyssio Plinii discrepat, is namque videtur Rubiam minorem Alyssum facere, cum enim de Erythrodano, seu Rubiâ maiore, dixisset, subiungit. Distat ab eo, qui Alysson vocatur, foliis tantum, & ramis minoribus.

Aliud insuper & Aetius describit his verbis. Alysson aiunt esse Sideritim heracleam appellatam, quæ iuxta vias nascitur vbique, purpureum florem habens, & folia crassiora. Aetij opinionem tuetur etiam Paulus. Cornarius autem diuersas herbas rectè statuit Sideritim heracleam, & hanc quæ propriè Alysson vocatur: quum illa impropiè, & tamen ab affectu, idem nomen adepta sit.

Galenus quoque de diuerso ab his Alyssio ex Asclepiadis autoritate loquitur. Alyssos, inquit, herba est Marrubio similis, sed asperior & magis spinosa (aculeata), circa pilulas (orbiculos) florem ad cœruleum vergentem profert.

Cæterum, *ἀλυσσος* Græcis, similiter Alyssum Latinis dicitur, quoddam morbos à cane rabido mirificè iunct, autoribus Galeno, Aetio, Paulo, Plinio & Pausania.

Alyssi decoctum, inquit Dioscorides, potum singultus qui sine febre sunt soluit. Idem facit & detentum, aut naribus admotum, At cum melle tritum, lentigines & maculas Solares depurgat. Putatur & canis rabiem sanare, cum cibo confusum & exhibitum [*λύσσαν κυδός ιδέαις, στροκπέν ιδέαις & δδέν*. Lat. ex vet. cod. *λυσοδέν-τες ιδέαις στροκπέν εν ιδέαις & δδέν*, commorosos à à rabidis sanat confusum & in cibo datum.] Sed & id domo suspensum salutare esse dicitur, tum hominibus tum aliis animalibus, ne fascino laedantur. Quin & puniceo paniculo alligatum, pecorum morbos abigit.

Quod verò de singultu ille, idem Plutarchus

Lotus;

scripsit, τὴν δὲ ἄλυσον χαλαρὰν ἐστίνην ἐν λαβύνῃ
ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, οἱ δὲ σπέρματα αὐτῆς ἀπαλλάτ-
τονται λυγροῦ: Id est, Alyssum herbam manu te-
nentes solùm, alii verò inuuentes, singultra libe-
rantur.

Galenus dilucidius eius facultates declarat.
Mirificè iuuat morfos à cane rabido. Sed & iam
rabienti data sæpè ipsum sanauit. Et hæc quidem
facultas ex similitudine totius naturæ constat,
experimentoque solo cognoscitur, nec ratione
percipitur. Alioqui ex vlu comperitur modera-
tè siccare ac discutere, & aliquantulum exterge-
re. Hac ratione & vitiligine, & maculas faciei
à Sole prognatas expurgat.

A cane commorosos, Plinio etiam teste, rabiè
sentire non parit, petus adalligatūque. Mitū
est quod additur, saniem conspecto omnino frutice
hæcari. Infanti sanari ex veteri codice Corn.
legi, qui tamen non infaniam, sed singultum le-
gendum ex Plutarcho putat. Ex Galeno, inquit
is, & Plinio clarè patet, commorosos à Cane ra-
biofro fruticem siue herbam Alysson auxiliari:
Verùm Dioscor. verba ita iacent, vt ipsius canis
rabiem sanare dicere videatur: δὲ αὐτὸν ὁ καὶ τὸν
καὶ τὸν αὐτοῦ, σπέρματι δὲ ἄλυσον ἐν δόδον: nisi ἄλυσον καὶ
eam rabiem quæ ex Cane homini inducta sit ac-
cipere velimus.

ALYSSON SILIQUA LATA ASPERA
quibusdam Lunaria flore luteo.

Descriptio



dine & formâ similes, ex quatuor foliolis contex-
ti: quibus delapsis siliqua oriuntur ex oblongo
rotundata, villo aspero tecta, compressa, semen
claudentes similiter compressum: filia germi-
natione prima ex oblongo rotunda, postmodum
in longum protractiora, in obtusum mucronem
desinunt, nonnihil sinuata, Leucoii foliis similia,
albicania, hirsuta & tactu aspera, sapore olera-
ceo prædita.

Dodon. Gall. Alysson Neoteritorum, quorun-
dam Lunaria maior.

Gelner hort. Alysson Dioscoridis Dodonæo:
Lunariæ maioris species aliquorum. Lunariæ
Græcæ similes producens siliquas herba Alyssis
cognata. Et de coll. stirp. Lunariæ species. Lu-
naria lutea. Alysson quorundam. Lunaria à
Gratarolo missa. Item de Lunariis. Ab Vlyf-
fe Aldroando herba missa, Lunaria appellata. A-

lysson Dioscoridis existimatum.

Lobel. & Pen. in Adu. Alysson, & nonnullorum
Lunariam appellant, ac dicunt, nullâ melius A-
lyssio Dioscoridis quadrare. Iidem cap. de Thla-
spi Narbonensi, Alysson Belgarum & Francorū
vocant. Lobel. Obl. & Icon. Plant. Alysson Dios-
coridis putatum.

Cæsalp. Lunaria tertia, Alysson Dioscor.

Hist. lugd. Alysson Dodonæi, Recentiorum
quorundam Lunaria maior. Alysson Dalecham-
pii.

Casp. Bauh. Phyt. Lunaria 4. siue lutea aspera:
dicitur Dioscoridis.

Hort. Lulit. Alysson Dodonæi, Lunaria lutea
siue Græca.

Alysson siliqua lata, aspera, Lugduni mihi e-
rat in horto. Basileæ in hortis siliquas fert Iunio
mense, Septembri semine maturo: mihi etiam
obseruata est in hortis Patauii Bernardi Triuefa-
ni: Ferrariæ Monasterii S. Dominici à l'Angeli.
Bononiæ vt S. Saluator al burgo di S. Catharina.
Florentiæ: & Parmæ Nobilis Ant. Lulitæ do-
rens Aprilis. Montbelgard. in horto Il. E. C. hic-
mæm perfert, se nempe abundat Augusto & Se-
ptembri, florens adhuc Octobri.

ALYSSON ANGVILLARÆ.



Hoc nomi-
ne inter

Valeradi Dou-
rez plantas her-
bam Macenio
fruticofam, ra-
mis, duris, li-
gnosis, tereti-
bus, hirsutis: se-
lia similia Thla-
spi minori, vel
Alyssio minori
quorundam, la-
tiora, asperiora
hirsuta, subro-
tunda, in obtu-
sum acumen de-
sinentia, siliq. e-
câ sunt dispositæ
serie quâ in ma-
diolo Thlaspi,
hirsutis peci-

cellis hærentes, compressæ, circinate rotundita-
tis, in umbonem modicè protuberantes, triplo
maiores quàm Thlaspi modò dicti, multum aspe-
rez, stilum exiguum è summo proferentes, mem-
branulâ lucidâ valvulas determinante. Semen
quale sit, nequeo animaduertere: nec quales
fuerint flores ausim, licet adhuc vieti adfint, asse-
rere: videntur tamen lutei vel pallidi fuisse.

Matth. in post. com. Ital. pingit hoc Alyssum
ex sicca procul dubio planta, ac ait. Cum sciam
multos bonos Simplicistas plantam, cuius figurâ
apponimus, verum Alyssum existimare, appone-
re volui: quamuis non respondeant omnes notæ.

An Lobel. & Penz. Adu. & Icon. Plant. Thla-
spi Græcum propinquius fortè Dioscoridis Poli-
gonati (Polygoni) folio aut Oleæ, Lentis femine?

Considerandum sanè quantum differat hoc
Thlaspi ab Alyssio, de quo Anguillara epist.
12. pag. 217. An Cæsalp. Thlaspi quoddam genus
in monte S. Iuliani in Pisana, floribus luteis: fru-
ctu lato ac valde depresso, diuino specie duorum
nummorum?

A. C. Bauhin. Phyt. Thlaspi 21. siue Alysson dictum primum. Matthioli Alysson Icon. 4 p. 498. Thlaspi Græcum propinquius Diosc. Polygonati folio aut Oleræ, lentis semine Lob. icon. p. 213. flosculis albis interdum luteis? Apud Lob. in Adu. & Pl. Icon. legendum Polygoni folio & Typographi errore positum esse Polygonati satis apparet, quæ obsecro similitudo Polygonati cum olea? in descriptione præterea dicuntur folia pusilla, glauca, albidulae, Leucoii lutei, sed multo minora: quæ sanè nihil commune habent cum Polygonato: Miror hoc non correctum. Quisnam scripsit de duplici colore florum?

LVNARIA BISCUTATA.



Biscutata Lunaria caules habet exiles, pedales, & cubitales, tenues, teretes, in alas aliquot diuissos, paucis foliis donatos: ea enim magna ex parte statim ex radice medio-criter crassa [Bursæ aut Maluæ Lob.] exorta per terram sparguntur, palmum longa, & breviora, paulò semencià la-

tiora, sinuata, aspera, hirsuta, ca. sinuata [Lobelio abent, Hieracii aut Leucoii, sed minora:] hærent extremis flores coaceruati tenuissimis hærent pediculis, luteoli, parui: at quæ hos sequuntur pericarpa pulcherrima, foliacea, peltata [semè pellucida Lob.] didyma, ad ligulam extra scutulam quoque prominulam adnexa, quorum singulis singula clauduntur semina latiuscula, orbiculata, compressa, rufa (Leucoii purpurei & albi sapore & effigie potius quam Nasturtii Lobel.)

Et hæc est illa, quam Lobel. & Pena Adu. Thlaspi paruum Hieracifolium, siue Lunariam luteam Monspel. & Leucoium luteum marinum (Biscutellam, addit Lobel. in Icon. Pl.) Lunariam minorem alteram vocitant. Huic nullus locus certior quam inter Thlaspi omnium iudicio putatur. Hæc primum culta in hortis Italicis vocabatur Leucoium marinum non ita magnâ similitudine.

Clus. Pann. & Hist. post. Thlaspi clypeatum, Thal. Leucoium monranum.

Camer. hort. Thlaspi bifulcarum, vel Lunaria bifulcata à Clusio & Lobelio depicta. Crescens copiosè prope Capuam, foliis aliquantulum diueris, ferè Napi vel Rapistræ altitudine sesquipedis non multo minor.

Tabern. Icon. & Hist. Thlaspi minus clypeatum 1. Flein Schild Thlaspi.

C. Bauh. Phyt. Thlaspi 24. siue biscutatum minus folio crasso hirsutissimo.

Lunariam biscutatam seu Didymi, vt nomina-

bat Gesnerus, obseruauimus Monspelii cùm efsemus secus viam quâ itur Frontignanum & ad montem propè Castelnou non longè à fluuiio: hanc eandem priùs videramus in peregrinatione nostra Rhætica cum Gesnero in monte Burmio vicino, cum semine maturo Iunio mense. Geneuæ sata in horto nostro primò pullum caulē protulit, tota hyeme integris foliis abundauit & sequenti anno maio Maio mense floruit. Frater C. Bauhinus Monspelii florentem etiam Maio & Iunio obseruauit. Montbelgardi in hor. Ill. E. C. Wirt. eodem anno quo sata, floruit & semen maturuit Augusto & Septembri, hiemem pertulit: semen fuit missum per fr. C. Bauhinum cum hæc inscriptione, Thlaspi species Bononiæ: Basileæ vidi florentem cum semine maturo Augusto in horto D. Dis. Jac. Zvingeri. In partibus Monspelienis hoc Thlaspi collegit Lobel. & minorem Lunariam alteram vocitabat. Hæc primum culta in hortis Italicis & peregrina creditur. Supra Badenses thermas, viciniquè collibus, adeoque totâ illâ collium catenâ, quæ per Leytenberg & supra Manderstorf ad Danubium vsque versus Orientem excurrit, copiosè auctore Clusio nascitur.

Cum Leucoio, purpureo præsertim & albo, in foliis & vitibus nonnulla huic communia Lob.

LVNARIA PELTATA MINIMA quibusdam ad Thlaspi referenda.



Inter Valerandi Dourez plantas sine nomine plantulam pulchram reperi-mus quam etiam Gener Cherlerus attulit collectâ in Nemausensi agro: Ea palmobrevi plâcula, radice simplice, lignola, vnde plures pullulât colliculi, simplices aliâs, aliâs etiam alis concaui, in terram repandi, re-

nues, asperi, ex rubore obscuro incani: per quos foliola alternata, aspera, & inferiore præsertim parte incana, Thlaspi minoris foliis similia, sed multis numeris minora: flosculi luteoli summis hærent coliculis & ramulis, quos denso agmine stipati consequuntur orbiculi foliacei, glabri, maiores quàm Thlaspi dicto: sub quorum umbone minimum elato semen coërcetur singulare, minutum, rufum.

Thlaspi alterum minus Clypeatum Serpilli folio Narbonense; nuspiam Lobel. & Penæ visum, nisi in agro Narbonensi Monspelienisque, locis squallidis, sabulosis, prope pusillas Anchusas.

Casp. Bauhin. Phyt. Thlaspi 25. siue Clypeatum minus.

K k k

Locus & tempus

BURSA PASTORIA.

CAP. VI.

Bursa pastoris nonnunquam palmaris, pedalis, & cubitalis interdum planta, radice nititur recta, alba, fibrosa, sapore subdulci & nauseoso: à qua prodeunt folia oblonga, modò integra, aliàs profundè in ambitu laciniata, nonnihil hirsuta, pediculis ferè vncialibus, cum superiora in caulibus nec pediculum quidem habeant, immediatè adhaerentia, inter folia exurgit caulis vnus, terni, quaterni, qui rursùm in ramulos diuiduntur, qui à medio ferè ad summum vsque fastigium

foliosos nullo ordine emittunt, pedicello tenui semunciali, paruos, albos, ex quatuor foliolis constantes, & in medio flammam aliquot lutea habentes, interdum corymbatim in summo caule quasi umbellam conficiunt: quibus succedunt seminum receptacula ex acuto principio in latusculam bifidam crumenulam



Descript.

definentia, femina Brunfelsio parua & nigra. Hæc magnitudine & foliorum diuisura mirè ludit, vt quis diuersas possit suspicari species.

Guido not. Guido, nimis licentiosè Galeni locum interpretans ait Polygonum esse virgam vel Bursam pastoris: Polygonum & Bursa pastoria multum differunt.

Euchar. Roess. Bursa pastoris & Pera pastoris.

Brunfels. Bursa & Pera pastoris maior, cui descriptiones Dioscor. de Polygonia & Sanguinali minime quadrant.

Cord. in Dioscor. Bursa pastoris, Klein Salschellkraut / id est, Bursa pastoris minor.

Trag. Bursa pastoris, Bursa pastoris maior & vulgarissima.

Cornar. in Diosc. credit Bursam Pastoris vulgi Medicorum esse Herbam Medicam. Sed Descriptio Medicæ Cornarii non conuenit cū bursa pastoris vulgi Medicorum, suspicio mihi aliqua oritur de Crista gallinacea, vel Cornarium nescire quid scribat, stirpium enim non fuisse peritum suis ex libris satis apparet: vulgi autem bursa pastoris vel Christa gallinacea nullo modo conuenit cum descriptione Medices.

Cornar. not.

Matthioli qui sine descriptione pingit, ait non defuisse, qui Thlaspi & Bursam Pastoris vulgò dictam, vnam & eandem esse plantam existimarint. sed eorum sententiam prorsus explodendam merito censet. Licet enim figura similis esse concedatur, attamen quod Lacuna monet, viribus & temperamento multum differre.

Gemma sub. not. Cæsalp. qui Bursam pastoris vulgi inscribit foliis Erucae, semine exiguo & fluo, sapore sub-

cri: at totà herbà insipido & glutinoso, ait apud Antiquos inter Thlaspi genera numerari. Id autem Thlaspi descriptionem Dioscoridis partim ostendere: nam folia in cacumine diuisa, & fructus in extremo lato huic plantæ magis conuenire. Ex Galeni historia colligere licere Bursam pastoris esse Thlaspi deterius. Ac Bursam nostram pastoris Capicellam dici inter cætera nomina Dioscoridi ascripta.

Thlaspi gemm.

Fuchs. hist. & Icon. Dodon. gall. & lat. in fol. bursa pastoria. Gesner. hort. bursa pastoris maior & minor. bursa pastoris, Thlaspi fatuum. Lobel. Obs. & Icon. Plant. bursa pastoris. Cam. hort. bursa pastoris eleganti folio instar Coronopi repentis. Eidem in Matthiol. hist. Germ. & Epit. vt & H. Lugd. bursa pastoris. Tab. Icon. & Hist. bursa pastoria maior. Item bursa pastoria minor.

C. Bauhin. Phyt. bursa pastoris prima maior folio sinuato. Secunda bursa maior folio non sinuato, bursa pastoris folio integro. De qua ait: Naturæ lusum tantum existimabamus, verum cum aliquot annis idè obseruauerimus, à priori distinguendam censemus. Tertia bursa pastoris media, Tabern. bursa pastoris minor.

Schvv. Cat. Sil. bursa pastoris maior, Siles. Teschelkraut / Salschenkraut / Blutrtraut.

Nominia

Bursa pastoris, vulgò Officin. & It. Bursa pastoris, aliquibus Pera pastoria, & Pera pastoris, nonnullis Herba Cancræ, Crispula, Sanguinaria & Sanguinalis dicitur, nec iniuria, [vt videtur Trago] cum sanguinis eruptiones sistere possit. Videtur tamen ipsi non Sanguinalis sed Sagittalis esse legendum, quod si firmum esset, certè hæc planta non procul à Verbena prima Dioscor. distaret. Nihil tamen asseminat. Inuenimus nos manuscriptum per Leodigarium Ritziarum Bursam pastoris esse Io. Frisio in Dictionario Lonchitum alteram Plinii, Germ. Teschelkraut / Teufelskraut / Blutrtraut / & hirtensckel: belg. Dorselens cruyt. Gall. Bourse de pasteur ou Berger & Tabouret. Geneuens. l'herbe d'Espinglier. Castil. Pan y quesillo. Hung. Pastor & Zenty. boh. Fodosska.

Bursam pastoriā vidi florentem Martio, Patuui Februario. Geneuæ passim Ianuario, Martio, Maio, Nouembri, aulicæ florentem adhuc Octobri, Lugduni abundat. Montbelgardi floret Martio, ac interdum tota hieme etiam in horto Il. E. C. spontanea, ad hortum ferarum vidi florentem Aprilis, folio non sinuato, an perpetuo talis nondum obseruavi. In Ducatu VVirttembergico circa fontem Admirabilem florens Augusto, In monte Teck Octobri. Secus vias locis desertis & incultis, ac in rudetibus vt plurimum spontè prouenit: & quandoque maior, lubinda verò minor, & omnia exigua. Floret, viget, ac semen perficit totà æstate.

Locus & tempus

Vires huius non vulgares celebrantur, ex aceto enim, id scribente Fuchsis, critica collectionum inflammationes refrigerat, ac ed confluentes humores cohibet: imponitur sacris ignibus & quibus stomachus æstuat. Succus eius purulentis auribus infunditur: cruenta sanat vulnera, mirè efficax est in comprimendis omnibus sanguinis eruptionibus. Bursa pastoris siccata, ait Tragus, vino rubro vel aqua pluuiali, in qua chalybs cadēs extinctus fuerit, decocta, ac pota, dysentericis ac lientericis, fluxiones alui cohibet, vrinæ sanguinolentæ medetur, sanguinis excretaiones, menstruūque abundantiam profluua sistit, omni-

Vires

umque

umque internorum viscerum qualvis erôsiones sanat: eadem aqua destillata per aliquot dies continuos mensurâ quatuor aut quinque cochlearium pota efficit. Errhinon ex lineo panno factum, succoque herbæ madesactum ac naribus inditum, sanguinem sistit: idem succus, vel aqua etiam destillata, vulneribus recentibus colluctandis utilissima sunt: Multi in ea sunt sententia, ut credant, sanguinem è naribus aliisue vulneribus manantem cohiberi, si herba saltem, apud eum hominem incaluerit.

Bursâ pastoris, autore Matthiolo, ex refrigerantium est, exsiccantium & adstringentium genere. Quapropter prodest trita & emplastri modo impolita inflammationibus & sacris ignibus, decoquitur pluuiâ aqua: cum Plantagine & Armenio luto, bibiturque eius decoctum ad intestinorum difficultatem, & ad cruentas excreationes. Sistit mensum abundantiam, si eius & Persicarie decocto insideant mulieres: esturque ad idem, & contra denique omnes fluxiones efficax est, tenui pulicula circumlita & in oleo fixa: additur in emplastris, quæ ad capitis vulnera componuntur, & in vnguentis copulatis: ad gonorrhæam accipitur vicia una succi è recenti herba expressi, cuius si copia non detur, dupli n iuris decoctæ licet herbæ, additis camphoræ granis tribus, bibiturque diebus aliquot continuis. Succus cum Aenozoi succo aut aceto mistus partium calidas collectiones, & sacrosignes extinguit. Sunt qui scribant Bursam pastoris. Icterus profigare, si simul folia, flores, & Therac calcēs indantur; ut nudum pedè cōtingat, eoque modo decambuletur: decoctum in collutione omnes sanat faucium tumores. Succus villiger podagræ calidæ pudendorumque feruidis tumouribus illinitur. Celebris ad sanguinē sistendū & fluxiones repellendas, succo potio in spuito sanguinis & dysenteria, trahitur & super varos ad sanguinem inde fluentem. Cæsalp. Herbam ex aceto terit & carpo adhibet ut fluxum sanguinis sistat, & rigorem tertianæ compescat. Bursam pastoris frigidam & siccam in tertio gradu ceteris Lacunæ, ac idē restringere omnem partem, & reprimere omnis generis fluores.

Lacunæ bellum mouet Lob. eumque cum pluribus aliis taxat, dicens: Gustu non perinde ut Thlaspi acris, sed exiccante potius quàm refrigerante. Nam qui quia sanguinem sistat (sistit autem strenuè) frigidam faciunt, infelici argumento vtuntur, etenim umbellæ, floresque gustanti aliquid acrimoniæ inurant, indicioque sunt siccando colligendoque sistere, ut porri succus, vitriolum, vitrica: non refrigerando: trita carpis imponitur, additâ Plantagine, ad tertianas spurias, purgato prius corpore. Ad hæmorrhagiam sanguinis ex quacunque parte fluat Bursam pastoris contusam, cum aqua frigida applicat Timot. Ross. parti vnde fluit, & subito cessat. Si è naribus fluit aut ex alio capitis loco, apponit capitis pulvis, subitoque supprimit. Aquam destillatam Bursæ pastoris aut decoctum eius menstruos fluores & dysenterias rubras potam compescere scribit Brunfels. Sic & pectus ex corone factum & succo eius intinctum naribus inditum sanguinem inde fluentem sistere. Herbam gestatam cum naturali calore tepefacta fuerit, idem quoque facere perhibet, quod difficulter credimus, & quia res herbaria certè infinita est, id aliorum obseruationibus iudiciis & experientiis conferendū relinquimus.

Tom. II.

BVRSÂ PASTORIS PARVA folio glabro, spisso,



BVrsula i-
sta parua Descrip-
ta est, radice vni-
câ, sed in te-
nuiores sub-
diuisa: folium
primum sim-
plex, rotundū,
paruum, alia
Bursæ maioris
more aliqua-
tenus lacinia-
ta, crassa, gla-
bra, vix sexta-
talia: cauliculi
singuli vel
plures, dodra-
tales, ac etiam
minores: fl. f-
culi multi si-
mul, albi: sili-
qua rotundio-

res quàm in vulgari. In foliis nullum manifestum saporem animaduerto, in summitatibus ingratus est.

Plant. Icon. Pastoris bursâ minima.

Tabern. Icon. & Hist. Nasturtium petræum, C. Bauh. Phyt. Bursâ pastoris 4. sive minor: Bursâ pastoris 6. Tragi sine icon. huc autem Bursæ pastoris cum non sint vascula, ut vult Tragus, acinis peporum similia, merito existimo Tragi Pastoriam bursam 6. huc non referendam, sed ad sequentem.

Itinere Masnûster, Than, & Frausmatten inueni mensis Aprilis sine Bursam pastoriam hanc, antehac non visam; reperi quoque in muris quibusdam inter Remiremont oppidum Lotharingæ & Plumarias Thermias, paruum, singularem caule. Nobis etiam data sicca Argentingæ à D. Vldarico Chelio Medico insigni. Basileæ ad margines aruorum vtrunque raro, præsertim extra syluam propè Wyl pagum obseruauit Genet Cherleus.

Locus & tempus

BVRSÂ PASTORIA MINIMA, oblongis siliquis, verna, loculo, oblongo.



BVrsula hæc Descriptio
minima,
radice est te-
nuissima & ra-
dem fibrosa: à
qua per terrâ
sparguntur fo-
lia multa in
circulum o-
blonga & an-
gusta, & mu-
cronata, vix
vnciam longa
interdum ru-
bentia, hirsu-
ta, viridia mo-
do, modò rubē-
tia, oris per ex-
tremū aliquot
crenis inci-
sis, sapore pri-
Kkkk 1

mum fubastringente, tandem acris, nitroso & vellicante; interque *caulis* cum vnus, alius bini, terni & plures teretes, palmares, aliquando vix fetales, *fusculos* sustinent simul multos albos, aliquando purpureos Burſæ paſtoris vulgaris maiores, quatuor foliis biſidis conſtantes, ex pediculis pluſquam vncialibus: *loculo* oblongo compreſſo nulla lacuna vt in Burſa vulgari, nulloque diſſimulamento intrinſecas diſtinctio: *ſemen* continente minutum, rotundum: Semine maturo & decidente remanet tenuis membranula alba, qualis in Lunaria maiore.

Hanc describens Tragus, aurlam pastorem
6.& postremam fecit, quam fr. C. Bauhinus in
Phyt.ad præcedentem refert contra meam sen-
tentiam vt iam antè annotatum.

Brünfels. picturam exhibuit nomine **Geng-
blum**; quæ melius placet quàm Lobelii. Huic
autem in Aduers. & Obs. & Icon. Plant. Parony-
chia Alfine folia.

Dodon.Lat.in fol. Paronychiæ vulgaris titulo depingit & describit, ac dicit: Veram & legitimum hanc esse non constat, vix enim Dioscor.

ἡ ἀρχαία τῆς βοτάνης οὐκ ἔχει τὴν παρὸν ἐν τῇ φύσει, καὶ τὴν ἐν τῇ φύσει οὐκ ἔχει τὴν παρὸν ἐν τῇ φύσει, καὶ τὴν ἐν τῇ φύσει οὐκ ἔχει τὴν παρὸν ἐν τῇ φύσει.

id est, Paronychia fructus est similis Peppo, longitudine minor, foliis vero maior. At vulgaris Paronychia nec fructus in modum veluti Peplus affurgit, nec maiora ei, sed minora quam Peppo sunt foliola.

Tabern. Icon. & Hist. Alfine minima.

Camer. qui ad hist. Thalii Pilosellam siliquosam minimam omnium vocat, inter figuras iconem sub Pilosella siliquata ponit pictā ad meam plātā, quam cum descriptione Gesnero miseram.

Hist. Lugd. Myositin parvam Dalechampi inscribit.

C. Bauhin. Phyt. Burfa pastoris 5. sue oblongo loculo minor dicitur. Hæc, inquit, non solum magnitudine & paruitate variat, siquidem etiam nunc in viciis, & sequequentian lingua reperitur: verum & foliorum formâ discrepat: habetur namque foliis integris, vt Lobelius, Dodonæus, Lugdun. pag. 124. lib. II. cap. 3. & Tabern. Icon. pag. 703. pingunt: datur & lactoribus lactiniatius; foliis quemadmodum Lugd. pag. 128. l. II. cap. 54. nunc Myofotidis parvæ exprimit. Similem postiori ex monte Sfrigely quæ tur in Italiam habemus, quæ tamen non solum folia in orbem humi strata habet, sed paulo altius quina fensæ obtinet larea lacinia, & in cauliculis summo vnicum quod in summitate tripartitur, capsulam quin etiam obtinet priore duplo maiorcm, câmq; non oblongam, sed subrotundam.

Schv. Burla pastoris minima, Silesiis Hungers blumlin (flos famelicus) dicta. Credere enim vulgus ait eius vberem proventum annonę caritatem denotare.

Gencuæ *en plain palai*, floret principio Martii & Aprilis, pafim fecus vias & in fegetibus Montebalgardi flores Martio immixtus in Horto E.C. Monfpelii florebat Vere, Propè Beffordiam medio Aprilis inueni cum membravillis tenuibus remanentibus à fémine deciduo. Frater a filicæ obferuauit. In Silefia [inquit Schvveçk.] Aprili floret in multam ætatem, uccrefcente intermin fémine. Atenolisagris & hortis plurimis

BVRSA PASTORIA FOLIIS

Perfoliatæ.

Bersam pastoriā Perfoliatæ folio, voco pul-
chram herbulam, cui *radix* tenuis, suprà vni-

ca, max fibrosa, aliquot coliculos palmarēs & breuiores (interdum vnicum) emittens, colore ex fusco leuiter rubente & virente, veluti glauco-
legues, teretes, ex foliorū alis ramulos nonnunq:
producentes: *folia* superiora alternatim caulem
line pediculis amplexantur, alis eorum ferē con-
currentibus, vt & caule perforati quodammodo
videantur, venati longitudine, dumde angustio-
res, densiuscula, glabra, glauca vt Perfoliata: *stef-*
culi positi florum bursæ vulgaris, parui, albi, qua-
tor folioli constantes inuoluere totidem flo-
riorum in fusco vicidium circumdati, ex pedicu-
lis tenuissimis feminalibus, in medio *stamina*
crocea: decedentibus floribus, inō anæquam vi-
etiam in torum decedant, subnascuntur *stique*
paræ bursæ pastoris, formā cordatā, veluti in-
fracta, vt in Thlaspi, *feminaque* continent par-
compressa, rotunda, subruffa: Sapor plantæ sub-
acris.

Camer. in fine hort. ex plantis meis ficcis
sub titulo Pilosellæ figuram habet.

Hist. Lugd. sub Thlaspi primo genere à Dale-
champ. observato.

Tabern. duas figuras habet tam in Icon. quàm

Hist. Ac primā
Thlaspi oleraceu
Baurensenff,
inscribit: alterā
Thlaspi minimū
Clusii, fleinfi
Thlaspi.

Clusii Pann. & Hist. post. Thlaspi pumilū, Thlaspi 3. Thlaspi montanum minus, seminibus acris saporis. Fortè eadem cum nostrā, sed minor ratione loci ubi provenit.

C. Bauh. Phyt.
Thlaspi 5. sine
Perfoliatæ sine
Brassicæ cāpestris
folio, maius.

Schvv. Bursam pastoris minorem appellat.

Bursam pastorem folio Perfoliatæ inueni in Burgundia iuxta Oppidum Insulam in vicibus ad dextram quæ iurad ad Tres Reges, florebat Aprili. Hanc Monspelii vidi, vbi florebat & capsulas ferebat mensis Martio. Montbelgardi in Horto Il. E. C. copiosè spontè prouenit : & florere Martio & Aprili, Gesnerus ad meam plantam siccam adnotauit: Ad Myagrios reuelerim. Offendimus quædam maturis mensis Maio in Ducatu Virr. inter Leuenberg & Sturgardiam.

BVRSÆ PASTORIAE SVBLONGO LO-
culo affinis pulchra planra.

PER terram spargit *folia*, *Barbarea* muralis aliquatenus *fimilia*, breviora, latiora, magisque rotundata, duas vncias lata, per ambitum serrata, hirsuta, aspera nonnihil, cuiusmodi etiā per caules ramosque, sed portione minora, cernuntur sine pediculis, statim autem ē *radix* tenui plures emittit *caules*, alios aliis feliciter adolefcentes, cubitum altos & ampliores, nonnunquam in ramos plures diuisos, quos non, ut



Barbarea, cauli apprimis, sed abscedentes diducit: flores singulis ramis multi coherere, parui, albi, quos excipiunt serie longi. *caul.* bursa pastoris sublongo loculo similes, bifores, qui in medio striam habent, quorum altrinsecus abscedentibus valuis semen apparere minutum, relicta dissepiente membranula.

Hanc plantam cum liccam ante 30. annos inuissem D. Gesnero, ad eam annotauit, videri referri posse ad Myagri sylu. speciem. Sed perinde est sine ad Myagron, siue ad Bursam pastoris referas, inquit C. Bauh. in Phyt. qui hanc inter Bursas pastoris sextum locum dedit, ac Bursam pastoris loculo oblongo maiorem appellat.

Monspeli Martio florentem & siliquis ferentem legi, quo mense etiam Basilicis locis campistris siccioribusque provenire solet.

Bursa pastoris affinis herbula foliis Thymi.

Humilis quedam herbula affinis Bursae Pastoris, copiosa in Sicilia & in Plumbinensi agro secus vias: ramulis dodrantalibus multis humi procumbentibus: foliis Thymi, rotundioribus, candicantibus, subhirsutis: quae *foliis* fert tota hyeme candidos, veluti in capitula aceruatos, in summis ramulis, odore quasi similino flavo mellis, fructus minutos Iberidi similes: Planta insipido sapore constat, vt Bursa pastoris, Castalp.

DRABA VETERIBVS.

CAP. VII.


Auctoritate Dioscoridis *Δεδών*, herba in cubiti altitudinem assurgit tennes spargens virgas & ab utroque latere *folia* veluti Lepidii, teneriora (*αμυδαπτεον*, quod etiam significat molliora), tamen & candidiora. In summa vero parte umbellam quemadmodum Sambucus (*ακτις*) quae flores habet albos (*αλβη λευκη*, vulg. *verga*) (tenuis), ac sic etiam Manardo legi placet: Huius herba coquitur cum pitana, maxime in Cappadocia. At fructus (*καρπος* ipsius aridus, Piperis (*πριπέρος*) loco obsonis miscetur. Et quoniam haec postrema, At fructus &c. Plin. de Dryophono tradit, Cordus coniectura ductus (non quidem sat probabili nostro iudicio) Drabam Dioscoridis cum Dryophono Plinii vnum & idem esse existimat.

Scrapio Drabam, Oribasio Braben dictam (inquit Sarrac.) Nasturtii generibus annuerat, & Nasturtium Orientale appellat. Ceterum inter notha Aldini exemplaris, hoc ipsum caput,

vt Hermolaus habet, cum Arabidis herbae inscriptione reperitur, ita vt Arabis & Draba vnius & eiusdem plantae diuersa nomina fuisse videantur.

Ast ab hac opinione alienus est Cornarius ac Drabam herbam suppositam esse in Diosc. & ab aliquo adscriptam existimat: eo quod bis in hoc libro habeatur, tum hoc loco, tum ad finem post Glaucum ante Telephium intrusa. Sed istuc Arabis appelletur, & alias eadem de ipsa tradantur, iisdem etiam verbis: vt nec de nomine, nec de re satis constet: maxime quum apud nullum alium Scriptorem, neque Drabes, neque Arabidis herbae mentio fiat, altero sane ex altero corrupto. Quare non videt, quantum fidei debeat haberi his, qui Nasturtium Orientale, vel Babylonium esse Drabam dicunt: aut etiam Cuminum syluestre.

DRABA MVLTIS FLORE ALBO.



Vix cubiti superat Descriptio

Draba, *caule* rotundo, striato, ex radice lignosa surgente, multiplice: quem *folia* alternatim basi imò amplectuntur, oblonga, vix iam & testunciam lata, sinuata: *caulium* fastigia in creberrimos abeunt surculos, & ipsos quoque foliosos: quibus umbellatim insident *flores* candidi, quibus delapsis *capsulae* suboriantur, coreulum imitatae ex cono stylum exiguum prominentes, quae binis suis loculis torde *semina* parua ruffa continent.

Nascitur, inquit Matth. in Ananienii agro planta foliis Lepidii non dissimilibus, & umbellam ferē Sambuci, Drabam ad amulum referens, quemad-

modum & in Galliis nasci Ruellius testatur.

Camerarius cui ad Hist. Germ. Matth. & Epit. Arabis siue Draba dicitur, habet folium in sua iconie valde hirsutum, nos talem hirsutem non Kkkk 3

obseruauimus. Pannonica sane Draba hirsuta est, verum pili breuiss. eaque non solum serrata, sed etiam laciniata, vt obseruauimus in planta nobis per Agerium data pro Pannonica in Austria collecta. Montpelienſis concolor nobis videtur & eiusdem formæ. Eidem in horto Arabis uerior.

Lobel. & Penx Adu. Obs. & Icon. Plant. Arabis siue Draba. Hist. Lugd. Arabis seu Draba Matthioli. Casalp. Draba. Clus. Pann. & Hist. post. Draba vulgaris i. folio in ambitu dentato ex viridi cinereo, sapore acrisuſculo &c.

C. Bauhin. Phyt. Draba prima umbellata: quam ait Matthiolum, Lonic. & Lugd. dentatis pingere foliis, quod hæcenus in ipsa planta obseruauerit: at Lobelium, Castor, Clus. sicut hic dicat dentata, foliis integris delineare.

Nomina

Draba multis flore albo, præcæ Agerie, Agerie & Arabis, Arabis siue Draba, nonnullis Nasturtium Babilonium & Orientale. It. Draba. Ger. Turkish freſh: Gall. Drane.

Locus & Tempus.

Drabam Montpelii in marginibus quorundam agrorum iuxta urbem: Patavi in horto publico & apud Cortusum florere vidi mense Martio: Frater florentem obseruauit Maio. Nulli ferè agrorum margines circa Viennam, totaque adeo inferiore Austriæ, hac plantâ, non sunt obſiti, quæ subinde in ipsa etiam arua late irrepit. Floret Maio & Iunii initio, semen sub Iunii finem maturum est. Meminit Cluſius etiam hanc plantam legere in Insula illa quæ facit Rhodanus in duo cornua diuisus inter D. Aegidii Fanum & Arelatem, dum Massiliam proficereſceretur.

DRABAE SPECIES GLABRA.

Descriptio

Pro Drabæ specie dedit nobis plantam D. D. Agerius Argentinenſis Medicus, collectam in horto Bononiensi, quæ multa habet similia cum Draba ante descripta, excreſcit tamen penè ad duos cubitos, quantum colligimus ex plantis siccis, an vnum vel plures ferat caules ignoramus, ii tamen sunt concaui, glabri: per illos alternatim caulem amplectentia folia serrata vel laciniata, sed minora multò longitudine & latitudine, in ramos superiores partes diuiduntur, qui longiores quidem: sed minus se expandunt: flosculi minimi albi: quibus capsula succedunt parua.

DRABA MINOR CVM ORBICVLARIBUS CAPITULIS.

Descriptio

Draba minor: Drabæ genus minus Cluſii sine icone, multa promit à summo radices capite foliola, longis pediculis nixa, aliquantum angulosa, villis quibusdam obſita, inter quæ gracilis exilit cauliculus, palmatis, paucis foliolis longioribus præditus, qui à medio ferè ad summum orbicularibus capitellis onustus est, membranulâ in binas partes diuisis, semen exile, fuscum, continentibus: radix, pro plantæ exilitate, satis crassa, paucissimis fibris donata: viua vix arbitrat, nam præcedentis anni cauliculus adhuc retinebat ea planta, quam Gulielmus de Mera Medicus, in itinere obseruatam, & inter chartas repositam, floribus tamen carentem, Cluſio Francofurti donabat Anno 1593.

LEPIDIVM PAVLI.

CAP. VIII.

EX radice digitali repente surgit caulis singulatus, rectus, gracilis, læuis, fungola medulla fartus: bicubitalis & altior: folia Mali Citrie, sæpius maiora, in ambitu crenata, rigida, ex viridi in luteum vergentia, sapore Sinapios: flosculi pusilli, copiosi, albi, apicibus herbidis.

Ambæ nostræ icones sunt ex Guarinianis, quam autem plantam denotet secunda, nondum nobis constat.

Facile autem nobis persuademus plantam

quam hic tradimus, nempe Piperitin, esse Lepidium Plinii Dioſcor. Galeni, & Pauli, diuersâ plantam ab Iberide Dioſcor. Plinii & Democratis, vt monuimus antè capite de Iberide: in quo nobiscum sentiant plures, vt Marantha.

Quæ autem Veteres tradiderunt de Iberide & Lepidio, item æquiocationes, nos tradidimus antè.

Hæc hanc fortè existimat in Dioſcor. Lepidium Colanella satium Plinii reg.


Lepidium peregrium Plinii Raphanum Lepidium, Raphanum in Pannonia dictum, Pauli Lepidium. Ruellius ad radicem siue Raphanum recitit.

Lepidium Antiquorum, Piperitis &

Siliquastrum Plinii multis putatur, quam secutus sententiam aliquando est Brassavolus: nunc verò mutauit, & Pauli & Plinii Lepidium existimat, ac etiam Dioſcoridis, distinguit enim ab Iberide eiusdem. Serapionis & Arabum etiam Scitegeri facit, offendens Auicennam postremo loco de Scitegeri confudisse Iberidem & Lepidium. Vocat præterea Peneſellam.

A Cordo describitur & vocatur Lepidium siue Iberis maior. Item Piperina & Zinziberina.

Lepidium



Lepidium, inquit Tragus, est Germanis dictum *pfeffertraut*; hoc est, Piperitis *Sensitraut*; nam ad Sinapi referri posse neminem hunc putat.

Math. in Diosc. non potest non admitti, quod tam facile crediderint Hermolaus, Manardus, ac Ruellius illos secutus, Lepidium eam plantam esse quæ vulgò in Italia appellatur *Raphanus*; nisi nostratam Piperitim, quæ proculdubio Plinianum refert Lepidium, Raphanum vocauerint.

Fusch. ab Iberide distinguit Lepidium, vulgò herbariorum Piperitim.

Lepidium Diosc. & Piperitum Anguill. diuersam facit à Galeni Iberide & Lepidio.

Lacun. in Diosc. vocat Lepidium Plinianum & Pauli, & Piperitim vulgi.

Gesner. hort. Lepidium Aeginetæ, *Sensitraut*, Romæ *Crapinella* dicta.

Apoll. rad. i. in Triphera Saracenica magna, Lepidium Plinii, Iberidem Pauli secundam. Idem cum Piperite maiori, vulgò *herba Priuera* [si herbula nomine dignaretur, sique Actio non reclamaret] cum Anguillario Dioscoridis Lepidion concluderet.

Piperitis Neotericorum seu quorundam sylvestris Raphanus, Gall. *Passerage*, Germ. *pfeffertraut* Belg. *peper cruyt*. Videtur Lepidium Pauli & Plinii, non item Dioscoridis: Non est etiam Piperitis Plinii, licet interdum ita vocetur.

Lobel. & Pena in Adu. meribò tuerentur Ruellium aduersus Matthiolum cap. proprio de Lepidio, dicentes: Piperitis, Gallia plebi *passerage*, Pauli etiamque Plinii Iberidis siue Lepidii notas explet: futiliter Senensis Barbaro & Ruellio insultat quum lapsos dicit, vt putarint *Raphano* Italici dictum Lepidium esse: perspicue Ruellius hunc errorem detexit. Hodierna die vocatur Raphanus agrestis Officinis & mulierculis Belgis: Gallica plebecula etiam nomine Raphani sylvestris Piperitim seu Lepidium vocitat, vt monet Ruellius Matthiolum decipiens, neutrquam deceptus. Lobel. Icon. Plant. Raphanus sylu. offic. & Lepidium Aeginetæ vocatur: Idem ait & in Obseru. vbi etiam Lepidium maius Cordi & Tragi nominatur.

Hist. Lugdun. Lepidium Pauli & Plinii, Lepidium à Diosc. prorsus diuersum. Lepidium Pauli & Plinii primum, siue maius, à Recentioribus Piperitis nuncupatum.


C. Bauh. Phyt. Lepidium i. siue latifolium.

Hort. Lusit. Lepidium Pauli Aegin. & Piperitis cum Brunfelsio, tum (non est autem Piperitis Plenii acerrimo gustu linguam vellicante) ab Offic. Raphanus sylu. [non ille quidem de quo post satium diximus, neque Raphanus rusticus] sed qui à Gall. *Passerage* nominatur.

Lepidium siue Piperitis Genevæ in hortis copiose prouenit & serpit admodum: in horto meo pulchre, denique tota hieme virebat, florebat mense Iunio. Spontè prouenit apud fluium Montpelii. Lugduni, Basileæ, & Montbelgar di in hortis meis & alioem florens Iunio & Iulio, suo repleti in areis infecta hortulanis, Parauit in horto Musati, vidi & Ferraræ in Cœnobio S. Dominici à L'angeli.

LEPIDIVM NON REPENS.

Radix fibrata, ex qua folia oriuntur primum palmaria & sesquipalmaria, angustiore principio, penes pediculum sextantalem aut quadrantalem, sensum dilata ad ternas circiter



Lepidio Pauli aliquatenus similit.

Per lignolos ramos, inæquales, buxcos, variè diuaticatos, folia Ocymi foliis respondentia, acuminata, hirsuta, sapore acriculo: flores extremis ramulorum confertim congesti.

Locus & tempus

DENTILLARIA RONDELETII.



virgatis, sensum denuo in obtusum mucronem disinctia, nullis per ambitum crenis dentata, sapore Lepidii Pauli feruido.

Icones nostræ duæ ex Guarnianis nobis videntur mediciter exprimere Lepidium non repens.

Lobel. Obs. & Plant. Icon. Lepidium annuum.

C.B. Phyt. Lepidium: siue Glastifolium.

Lepidium non repens aliquando annuum plantam existimauit, quia sæpius in Horto Ill. E. C. hieme perit semine deciduo spontè iterum proueniens, tandem comperti etiam hiemem perferre posse. Idem vidi Argentine pulchre virens Octobri in horto Friderici Meyeri.

Descriptio

Stelones Smultos, sesquicubitales emittit, striatos, nigricantes, in alternos ramos crebrò diductos: folia pinnis caulem cōplectuntur, glabra, atroveridia, teruidi saporis, Conyze foliis paria, per extremos ramulos multis numeris minora: flores cacuminibus hærent Kkkk 4

acervatim congesti, oblongi purpurei, calyce hirsuto. *Semina* magna, nigra, acris.

Gesner hort. Dentelaria Montpelii dicta, & alio nomine Flammula: An de hac loquitur etiam Gesnerus in fine hist. Cordi cap. de Chamæneriis? Clus. Hist. Antonii Nebrissenfis Lepidium. Quorundam Molybdæna, hoc est, Plumbago Plinii putata, vulgò Herba S. Antonii dicta. Narbonensium suo tempore Dentilaria appellata, Granatiensis vulgi *Beleza*. Lob. & Pena Adu. Obs. & Icon. Plant. Dentaria vel Dentilaria Rondeletii & Narbonensium: Aeginetæ Lepidium itidem putatum: Molybdæna Plinii. Cæsalp. Itatis sylvestris Herba S. Antonii. Camer. hort. Molybdæna seu Plumbago Plinii, Dentilaria Rondeletii: Romæ, herba S. Antonii, Italis *Crepantilla*, In Illyria *Cacurida*. Tabern. Ic. & Hist. Plumbago quorundam, *fioldfraut* / *wasfer pfeffer* / cui plantæ non conveniunt nomina Germanica. Clariss. Vir. D. Vlysses Aldroandus, cum Bononiæ essem, vocabat Plumbaginem Plinii. C. Bauhin. Phyt. Lepidium, seu Dentilaria.

Sunt 28. anni, quum stirpis huius (cuius tum florum & fructus accuratam picturam à me desiderabat, meque adhortabatur ut gnauiter in hocce Herbario pergerem, sicut & ipse in suo faciebat, addens bonam esse inter mortales eiusmodi contentionem) descriptionem cum ipsa planta mihi D. Gesnero nomine Dentilaria Rondeletii, ut tunc vocabant Montpelii, ubi florentem observabam mense Septembrii. Vidi præterea circa Arelatam, & vno circiter miliari ab Auenione, iuxta castellum Papæ. Lugduni habeam in horto. Mihi etiam visa Basileæ in horto insigni D. D. Felicis Plateri, vnde transtuli in Hortum Ill. E. C.

Herba acris. Radix ad dentium dolorem commendatur.

COCHLEARIA.

CAP. IX.

Descriptio



profundo nervorum discurfu sulcata, rotunda, aliàs angulosa: at quæ in caulibus nascuntur, oris reflexis magis func laciniata, longioraque & sine pediculis, gemina ala, libera tamen caulem amplectentia: caules à radice plures, an-

gulosi, subpurpurei, in ramulos subdivisi, doctantales & minores, maiores verò cum semine proferunt: flores multi, candidi, quaternis foliolis constantes, multique staminibus croceis cù stilo viridi: succedit in *siliquis* semen. Totius plantæ sapor acris, Nasturtium respiciens, sicut & odor.

Dodon. gall. cuius figura non placet, Latine Cochlearium vocat, Germ. *löpfelkraut*: Gall. *Herbe aux cueilliers*: Belg. *lepelcruyt*.

Britannicam veram, Britannicam Plinii, Scimus, inquit Lobel. & Pena in Adu. visam esse Herbam Cochlearis, verum neutquam Plinianæ descriptioni congruit. Lobel. Obs. Cochlearia Batava: Telephium Lacunæ, Thlaspis & Nasturtii affinis. Icon. Pl. Cochlearia Batava.

Gesner. hort. Cochlearia, vt & Io. VVierq, quam Telephium aut Britannicam esse negat.

De hac Hadr. Iun. in nomencl. rei herbariæ: Britannica Plinii, Herba Batavæ peculiaris: quam Frisios monstrasse Romanis militibus tradit, vt putat, quòd confines Oceano Britannicæ velut propinquæ eius nomen dedicaverint: in quo linguæ imperitia falsum puto, quum vocis originem referendam existimem ad *Breitten* / ita dicuntur cæspites è quibus aggerum moles adversus maris impetum surgunt, in quibus copiosè provenit.

Hodie Cochleariam indigitamus, quòd in oblongis foliis extremitas in Cochlearii formam rotundetur. Hollandi inde *lepelcruyt* / & *lepelbladen* appellant. Non desunt qui Telephii nomine eam designari malunt.

C. Bauh. Phyt. Cochlearia folio subrotundo.

Marcus Hirschcherus in thes. Cochleariam duplicem facit Britannicam & batavam.

Cochlearia semen accepi anno 1590. à fratre Casparo Bauhino, quod Autumno satum & hyeme repositum in cella pulchrè virens remansit, & Maio cæpit florere, folia similia primis foliis barbatæ: remanet in horto, hiemem profert & quorannis se semine deciduo propagat, & primo Vere caulem producit, florens Martio & Aprilis in horto Ill. E. C. Montbelgardi.

Catèrum facultatem habet, teste Dodonæo, calidam euidenter & siccam, virenti Nasturtio sapore & qualitate persimilem. Malo quod Scorbutus Germania nuncupat, efficaciter medetur, in lacte aut vino decocta, & aliquot continuis diebus epota. Tales plantarum species in quaque regione à Deo creantur, quales hominibus & animalibus ibidem natis maxime còveniunt. Quod oculatus testis multis documentis monstrare possem, inquit Solenander. Imò tam confidenter hoc nixus comperimento sæpenumerò probavi, ex plantarum nascentium frequentia me ferè animaduertere posse, quibus morbis popularibus, nimirum *influxibus*, quolibet Regio subiecta sit. Observamus hoc ipsum apud Danos, Phrygios, Hollandos: quibus Scorbutus dictus morbus frequens, istius quasi proprium medicamentum, Cochleariam scilicet, copiosè provenire.

Cochlearia minima.

Dominus Eödyfeter Medicus ostēdit mihi Pfortzhemiz in horto Dj. Soceri Grüningeri Pharmacopœi Cochleariz genus paruum, florens cum siliquis mensis Maii 20. anno 1595, quod dicebat sibi missum nomine Britannicæ, ac diuersum putabat.


tabat à precedenti genere: folia autem non multo maiora quam in Alind vulgari proferebat.

PIPER INDICVM, SIVE CALEUTICVM, siue Piper Siliquastrum.

CAP. X.

Piper Caleuticum, siue Capsicum oblongius.

Descriptio



Capsicum siliqua latiore & rotundiore.



torto, insident exalbidi, septenis foliis striatis constantes, medium occupantibus violaceis apicibus, totum autem florem in ea parte amplectente calyculo viridi in mucrones aliquid acuminato. Siliqua succedunt, nunc longæ corniculorum instar habentes, vel rectæ, vel incurvæ: nunc breves & contractæ, per maturitatem puniçantes, vel arborubentes, nitidæ: semen copiosissimum continentes compressum, rotundum, folum. Radix brevis nec caule crassior, numerosissimas à lateribus fibras circumquaque spargens: nulla est plantæ pars quæ a-

Piper Indicicum siliquosum caulibus profert singularem pedalem aut cubitalem, angulosum, hirsutum, solidum, cæterâ virentem saturatius, cæduntaxat parte quâ folia oriuntur rubentem: exeunt autem folia è dimidiatis geminis, Pennicæ latiora, acuminata, atrorubentia, aut ex viridi in flavum vergentia, crassiuscula glabra, nervo secundum longitudinem decurrente, à quo ad margines oblique venæ derivantur, pediculo vinctis: vnam aut duas longo appendicem: ex horum alis ramuli propagantur, foliis consimilibus ornati: flores verò tum ex foliorum alis, tum ad ramorum diviçationes pediculo longiori, canaliulato, saturatâ rubedine tincto, deorsum con-

crimonia non sit prædita, sed præter reliquas indomitus est sensum & siliquarum feruor ventisissimus.

Siliquastrum, Fuchsi sententiâ, convenientissimo nomine à Plinio lib. 20. cap. 17. dicta est herba hæc, à siliquis nimirum magnis & oblongis quas producit.

Eadem etiam ab eodem Piperitis, quod semen eius gustatum Piperis saporem & acrimoniam præ se ferat, nominatur. Alia tamen est ab ea quam vulgò Piperitum appellant, ut monuimus. Sunt qui Piper Hispanum, alii Piper Indianum, nonnulli etiam Piper Chalebut vocant & Brezilicum. Avicennæ, zingiber caninum Fuchsi, Trago, atque aliis videtur esse: Dodonæo Actuarii Capsicum, fortè quod semen comestum mordet, à *gusto* mordeo. Siliquastrum autem Plinii esse, herbam cuius picturam damus, vel inde constat, quod Plinius Castore Siliquastrum demonstrat, caule rubro & longo, densis geniculis, foliis Lauri: semine albo, tenui, gustu Piperis. Et alio in loco: Panax Piperis saporem reddit, & magis etiam Siliquastrum, ob id Piperitidis nomine accepto.

Hanc Piperitidem cum Fuchsi in quatuor distinguamus genera: In Piper scilicet Caleuticum nigrum & rubrum, seu maius & minus. Preter quæ, alia sunt bina, quorum primum, maioris discriminis gratia, Piper Caleuticum siue Capsicum oblongius; alterum Capsicum siliqua latiore & rotundiore inscribimus. Alii alias differentias notant in siliquis, ratione formæ & coloris. Formæ quidem, quæ tum longa, eaque vel crassa, vel gracilis & incurvata: tum brevis, eaque lata, vel rotunda, & denique (ut prodit Camer. hort.) piloso caule, pilis albis prædita, latioribus foliis, fructu longo, plerumque in acuminatam longam appendicem desinente, à flore quoque quam in aliis maiore: Color aliis initio niger, aliis viridis, in maturitate autem, aut croceus aut rubicundus. Cætera in his omnibus non valde dissimilia sunt.

Monard. ex vers. Clus. Axis seu Capsicum (-n vers. Ital. Axis aut Pepe d'India,) Piper Indicicum (Americum potius Clus. cuius omnia genera aliquando vidit colore flavescente,) folio viridi, Ocymo latifolio simili, flore albo; fructu diuersæ formæ, oblongo, rotundo, Melopeponis formâ aut Cerasiorum.

Credit cum Ruellio Gesnerus id omnino esse Mauritanorum Cardamomum vel Cardumenum maius, quod nos Piper Indicicum appellamus, attestante Matthiolo (pertinaciter nobis contrariâ Lacuna,) cum nec sit Serapionis, nec Avicennæ Cardamomum.

Matth. German. Piper Indicicum siue Caleuticum: siliquâ vna digitum longa: rotundâ alterâ.

Camer. ad Hist. & Epit. Matth. duæ figuræ: priori titulus Siliquastrum siue Piper Indicicum; alteri, Siliquastrum varietas triplex.

Apud Cordum, qui Peperitum, siue siliquastrum Peruvianum cognominat, est annotatum, esse Capsico fortè, aut Cardamomo Arabico cognatam plantam. Ibidem Gesner. ex Trago figuram apposuit.

Idem Gesnerus passim, Capsicon recentiorum Græcorum, Piper rubrum, Piper Indicicum, & Cardamomum Arabum, eius opinio, vel asserentè Clusio, sufficienter refutatur à Matthiolo.

Lobel. & Penz. Adu. Capsicum Actuarii, siue Caninum 22. Avicennæ, Caleuticum Piper recentiorum.

Piperitum vulgare

ribus. Lob. Obs. vnam habet figuram hoc tit. Capsicum [Tab. Ic. Siliquastrum.] Piper Indicum: & alteram, Capsicum brevioribus siliquis. Et postea Capsicum, Piper Indicum longioribus siliquis: Piperitis Cordi. Siliquastrum Plinii & Tragici: perperam longum Dioscoridis. Icon. Plāt. Capsicum Actuarii, siue Caninum Zingiber Auicennae: Calecuticum Piper, siue Piper Indicum longioribus siliquis.

Nomina Casp. Bauh. Phyt. Capsicum 1. siue siliquis longioribus recuruis. Capsicum 2. siue siliquis oblongis. Capsicum 3. siue piloso caule. Capsicum 4. siue siliquis latis, cordatis.

Piper Indicum, Calecuticum, Brasilianum, Americum, siue Capsicum 2. & 3. Siliquastrum Plinii, & Piperitis: Germ. Indianischer oder Calecutischer Pfeffer / Schotenpfeffer / Persischer Pfeffer: Belg. Brezilse peper. Gall. Poivre d'Inde, & Poivre d'Espagne, & de Bresil. Ital. Pepe d'India. Boh. pepe Indyarsky aut Turecky.

Locus & Tempus.

Piper Indicum siue Calecuticum, siue Piper Siliquastrum vidi Basileae in hortis mensē Nouēbris cum pulchris longis siliquis: Geneuae etiam. Montbelgardi in Horto E. C. provenit mihi cum fructu magno longo, & cum fructu magno breui.

Capsicum hoc seu Piper Indicum diligentissime colitur tota Castellā cum ab Hortulanis, tum à mulieribus in aediam suarum pensilibus hortis. Meminit etiam videre Clus. anno 1586. maxima copia cultum in suburbanis Brunnæ urbis celebris in Moravia, quo cultores non contemnendum quæstum faciunt: est enim apud vulgus frequens in vsu. Sed & hæc omnia genera aliquando vidit colore flavescente in Lusitania, monasterio quodam circa Olysiponem.

Vires & Vfus.

Vtuntur eo totā Castellā per totum annum cum virente, tum siccō pro condimento & Piperis. Valenter excalescit atque desiccatur, inquit Fuchsius, id quod feminis insignis acrimonia, & foliorum amaritudo eadem sententiam monstrant, ut certe non temerè plerique hoc semine loco veri Piperis vtantur, ut quod easdem facultates haud dubiè habeat. Dodonæus hoc Piper Indicum calidum siccū nque esse ordine tertio, eademque quæ Fuchsius de eius viribus tradit, quibus addit eos cibos quibus miscetur, croceo colore infici, ventriculum excalescere, ciborum coctionem promoueri, itum nas, ceteraque ordinata discutit, eodem cum melle illito maculas faciei lentiginisque deleri, frequentem tamen eius usum noxium esse, quod malefica quædam vis eaque occultā prædictum sit, quā canes, si id comederint, interimit. Piperitis, inquit Plinius, quam & Siliquastrum appellamus, contra morbos comitiales bibitur: vtilis gingivis, dentibus, oris suavitati & ructibus. Auicenna Zinziber caninum, canes interficere scribit: calidum esse ordine secundo, siccum primo, recens cum semine tritum cutis & faciei maculas lentisque abstergere, durorum tumores digerere. Particulatim concisum (inquit Monard.) & iusculo maceratum, meliorem saporem edulis conciliat, quàm Piper vulgare: ideoque eius vsus est in omnibus in quibus aromata ex Moluccis insulis & Calecutio delata commendantur: in eo solum differens, quod illa multis aureis emuntur, hoc sola ratione acquiritur: nam in vna planta colliguntur aromata in totius anni usum, minore dispendio, & maiore commodo. Flatus discutit, vtile pectori & perfrictionibus, calefacitque & roborat partes internas. Caliditatis & siccitatis in quarto ferè

gradu particeps, siliquarum decoctum ritè paratum aquas hydropicorum educit. Indi nonnulli vnguentum quoddam ad confirmandos dentes conficiunt ex vnionum feracibus conchis & huius plantæ foliis crementis vna, & aqua maceratis, donec calcis candorem referant. Eo illitos dentes aterrimos reddunt, simulque absque dolore semper conseruant, ut tradit apud Camer. hort. Benzo Mediolanensis lib. 1. c. 3. historię noui Orbis;

PIPER SILIQUA PARVA BRASILIANVM



Fruticosum hoc Capsici genus, obleruaturn à Clusio apud Morardem, cubitalibus ramis, virentibus, foliis hortensis Solani ferè, aliquid angustioribus: flore candido, exiguo, ut Solani hortensis, fructu in longis pediculis paruo, per initia viridi, deinde nigricante, ubi maturuit, rubro,

De triplici

continente multa semina latiuscula alterius Capsici modo, tam feruidi gustus, ut fauces aliquot dies incendat gustatum.

Idem eodem loco figuram exhibet, cui titulum fecit, Capsicum Brasilianum, atque hoc Lusitanos vocare Pimenta de Bresil, hoc est, Piper Brasilianum.

Lobel. & Penz. Aduers. Capsici varietas, multò breuioribus, rotundis, turbinatis, eodem semine prægnantes, Augusto & Septembri maturans siliquas.

Lob. Obs. Capsicum brevioribus siliquis. Pl. Icon. Capsicum, Piper Indicum brevioribus siliquis.

Matthiol. Hist. Germ. lib. 2. cap. 87. Piper Indicum paruum & rotundum.

Hist. Lugd. Capsicum a Brasilianum Clusii.

C. Bauh. Phyt. Capsicum 5. siue siliquis rotundis Cerasi formæ, aliquando latioribus, aliquando angustioribus est foliis, hoc pingit Tabern. Ic. pag. 859. Siliquastrum rotundi angustifolii nomine. Hocque plerumque surrectis est cauliculis.

In nonnullis Lusitanie locis floret, & fructu proferit toto Autumno, & in calidioribus regionibus etiam hyeme. In Brasilia abundanter, multiplicique in vsu esse intelligebat descriptionis auctor.

Locus & Tempus.

Piper siliquosum magnitudinis baccarum Asparagi.

Parua sunt grana, Asparagi vix maiora, sed oblonga, quippe ouata, cuticulā contexta miniata, splendete, vti Pseudocapsici fructus. Intus penitus seminibus scatet oblongis, flauis, compressis, per ambitum angulosis, quæ si vel linguae adhi-

Descriptio

beas

beis quemadmodum & ipsas baccas tritas aut disceptas, mirum quam insigni acredine eam agoriantur ac vellicent. Sanè Pseudo-capsici aliquid genus nouum & peculiare esse facile crediderimus. Thomas Platerus Medicus perdoctus, attulit nobis ex Hispania, aliaque per multa exotice elegantia causa gratissima, leuimus Montbelgia horro Ill.C. Wirt. quem curamus excolendum.

Piperis Indici paruum genus filiquis oblongis.

Basilæ in horto D.D. Felicis Plateri, mense Nouembri obseruauit cum flore & filiquis penè maturis paruum genus Piperis Indici siue Capsici, cui *folia* similia Alfine maiori, non multò longiora vucià digiti, si pediculum demas subrotunda, *filique* parue eiusdem longitudinis.

Idem est vt existimamus, cuius accepimus filiquas rubras à D. Friderico Meyer, cui titulus, Piper surrectum minus, quod repositum in Hypocausto hoc anno 1605, durat cum stugis spe.

ANIL SIVE NIL INDORVM COLOR.

CAP. XI.

A Nil Arabibus Turcis, omnibusque iis Nationibus dictum, vocatur in Guzarate vbi fit, *o alis*, nunc verò plerisque Nil: Herba est, quæ feritur singulis annis, Ocymo similis, eodemque modo colligitur, & siccata maceratur. Hanc deinde probe contulam & in panes coactam, per aliquot dies siccandam exponunt: & siccata viridi colore prædita videtur: quod magis exsiccat, eò magis ad cæruleum tendit, donec tandem in cæruleum exsiccaturum siue Venetum colorem euadat. Id Anil probatur quod maximè purum est, quodque vsum arenæ modo non remanet, sed in tenuissimam farinam diffunditur. Alii id præferunt, quod in aquam coniectum fluitat; Leue igitur esse debet & benè coloratum.

Pro Ocymo Mangiricam habet auctor [Garcias,] inquit Clusius, quod vocabulum quorquor Lufftanos consului Basilicum seu Ocymum interpretati sunt. At mihi iniqua admodum ista comparatio videtur, siquidem non solemus ex Ocymo pastillos conficere, sed potiùs ex Isatide quæ huius plantæ descriptione multò elegantius quadrat. Sed hic Fragosi inscitiam mirari licet qui in Rhapsodia sua (quam ex Orta meaque in eù annotatiuncula, tum etià ex Monarde, maxima ex parte conuexit, malignè suppresso omnium nomine) nugatur me velle Mangiricam eandem plantam esse cum Isatide, quam existimo pluribus notis cum Anil Garcie descripto potiùs conuenire, quàm Ocymum, cuius foliis suum Anil depingit. Sed an quæso Anil quod sic eulumnior postea describit, quodque in Occidentali India coli afferit, cum Ocymo peculiare quiddam habet? Imò ipsum nihil nisi Isatidem describere; vel mediocriter in re herbaria versatus facile iudicabit.

Costa Ital. Anil Arabum, Turcarum quorundam mercatorum Nil, Herba; ex qua fit color cæruleus.

Camer. Hort Nil siue Anil egregia planta ex qua fit Indicum.

C. Bauh. apud Matth. & Phyt. Isatis 4. siue In-

dica.

Herba est in Insula Iaua, ait Linschot. de hac verba faciens, quam Indi *Enger* vocant, ex qua suum Anil parant. Crescit ea in locis syluestribus sine omni cultura. Eadem contulà Bombacem quoque tingunt. Folia habet ea herba Rosmarini similia, sed non tam longo est virgulto, surrecto interim velut Thymi.

Nos Hist. nost. l. i. arborem quandam foliis Coluteæ, nomine Anil exhibuimus. Anil nomine missa planta Clusio est Sefbam Alpini de qua libr. eodem.

Appendix ad Caput vltimum Libri XXI.

Cum per loci angustiam nobis inibi non lieuerit Isatidis absolvere historiam, quædam & hic de ea substituimus: nec abs re, cum etiam cum Anil aliqua sit illi conuenientia, & hic liber præcedentis sit velut Appendix.

Præter igitur vires quas ex Dioscoride tradidimus, quædam ex Plinio, Galeno, & aliis substituimus.

Glastum, inquit Plinius, sanguinem sistit: phagedænas & purulentia vlcera quæ serpunt sanat: item tumores ante suppurationem. Contra ignem sacrum radice vel foliis prodest, vel ad henes potum. Simile Glastum, inquit Plin. in Gallia vocatur, quo Britanorum coniuges, natusque toto corpore oblitas, quibusdam in sacris & nudæ incedebant, Aethiopum colorem imitantes.

Omnes verò, Cæsar ait, se Britanni Glasto inficiunt, quod cæruleum efficiat colorem, vt ea ratione truculentiores visu, & aspectu formidabiliores & horridiores hosti sese ingerant in præliis: Propterea Martialis cæruleos Britannos indubie dixit, ait:

Clandia cæruleis cum sit Rufina Britannis
Edra.

Horat. Epodon. 16.

Nec fera cærulea domuit Germania pube.

Cæruleam vocari dicunt interpretes, ob cæruleum oculorum colorem, omnibus ferè Germanis commune.

Turpis Romano Belgicus ore color.

Antiquos verò Germanos herba Glasca ad tingendos crines vsos fuisse prodidit Ouid. de arte.

Fœmina caniciem Germanis inficit herbis,
Et melior vixit, quaritur arte dolus.

Isatis satiuæ Galeno, quæ vtuntur Tinctoribus, facultatis est valenter exsiccatis, nondum tamen mordentis. Est enim simul amara, atque adstringens: proinde magna vulnera corporum durorum glutinat, etiam in capitis musculorum fuerint, vel sanguinis profluvio laborantibus partibus vtiliter illinitur: tumores œdematodeis mirificè digerit, simul ac reprimat, & aduersus omnia vlcera maligna, & cacothæ mirabiliter resistit, etiam si putrescant, exedantur ac erodantur. At si nonnunquam pro ægri natura valentior appareat, foliis eius tritis miscere, aut panem, aut hordeaceam farinam, aut triticum, aut polentam, pro vincente nimirum in vno quoque affectu. At Isatis sylvestris manifestè iam acre quiddam tum gustu, tum affectu profert. Valentius enim quàm satiuæ siccatur, valentiusque humidis etiam putredinibus resistit, ad cætera iam dicta deterior, quoniam moderatius & minus mordaciter siccatur. Vlcerum namque talia

irritantur his remedijs, & phlegmone inflam-
tatur. Cæterum ob potentiorē facultatē lieno-
sis quoque vilis fuerit, cum altera imbecillior
tantum prodelle non possit.

Fernelius Meth. med. lib. 7. Glastum ponit in
suo Emplastro ad Herniam.

Vtramque llatin vino decoctam & potam ie-
cinorosis vtilem esse scribit Tragus, ita tamen vt
simul extrinsecus decocto foueatur Hepar.

Quo. a. anno Glastum primum terræ mādatur,
præsertim si tempestiuus sequatur imber, quater
extinguitur, sarculo duobus digitis sub terra ada-
cto, quo tempore folijs nascitur Plantagini simi-
libus, partim supra terram nonnihil extantibus,
partim humi procumbentibus. Anno deinde
proximo Triticum eidem agro mandatur, qui
Glastum aluit, non enim Glasti prouentu is e-
maciatur, sed lætificatur potius: & ex radicibus
quas firmas & altius impactas aratri culter ne-
quit profcindere, ac extirpare, cum segete pul-
lulant Glasti caules, qui in alteram sectionem se-
men præbent, maioris quàm Triticum pretij.

*Hæc illis subiicienda quæ ante de eius Satione dicta
sunt.*

Pastillos è Glasto hac ratione fieri testatur
Carol. Steph. Decerpta folia in pistrino subi-
gitur, pressa inuertuntur, & seorsim in vase collo-
cantur, inclinato, vt sanies effluat: denuò eadem
molæ subduntur, & tum demum in globos dige-
runtur viginti aut 24. vncias pendentes, in Sole,
aut si id per æris inclementiam non licet, in cli-
bano siccandos: hosce globos quidam in diem
D. Martino sacrum in horreis asseruant, post in
puluerem redigunt, & in acervos aggerunt: quo-
niam verò sæpenuerò acerui calorem concipi-
unt, sæpius commouendi erunt, & recenti a-
quâ affusâ quantum opus videbitur, probè hu-
mectandi: vt enim nimia aquæ proluuie submer-
guntur, ita vicissim parcius affusâ aquâ comburi-
tur: his igitur factis, iidem illi pulueris llati-
dis acerui in longas porcas digerendi, & quarto
aut sexto quoque die inuertendi, quoad probè
refruxerint, extraque omnem concipiendi calo-
ris metum fuerint positi: quâ in re summa est

adhibenda diligentia, alioqui si incaluerit llati-
s viribus exuitur: atque hæc quidem omnia possi-
quam executus fueris, in aream rectè pautam in-
feres, quoad vendendi tempus sese offerat, quo
autem diutius in acervos aggregata fuerit llati-
s, euadit præstantior. Thololates autem, quorum
ager vberem llatidis prouentum reddit, non cõ-
sueverunt globos in puluerem redigere, sed folia
in dolium capacius coniecta prælo subiiciunt, vt
sanem herbaceam excludant: ex relicto mag-
mate globos cogunt, Solique exponunt æstiuo
siccandos: ex quibus in cortinas coniectis Lanæ
cæruleum colorem saturatiorem diluatioremue
pro Insectoris arbitrio imbunt.

Alium modum conficiendi pastillos tradit H.
Lugd. his verbis: Excisa folia & in acervos con-
gelata post biduum aut triduum, in rotundo pau-
mento, quadratis strato lapidibus, dētata molæ
lignæ subduntur, quam oculis pino tectis ver-
sat equus: Sequitur equum circumeuntem villi-
cus, qui palā herbam à mola dissectam in lapides
referat, & conuectat, vt à prætereunte denuò
molâ frangatur. Vbi satis obtritum Glastum vi-
detur, rustici manibus comprimentes, sanies suc-
cosa vt eliciatur, quæ principid nigra atramenti
ferè modo, in cæruleum post colorem abit, globos
ex herba rufa conficiunt, quantum capere & am-
plecti vtraque manu possunt, & eos partim inso-
latu, si cælum sudum est, siccant, propè molam,
& arcam vicinam: partim, si pluit, aut obstat
tempestas humidior, in perticis sub tecto ad-
ibus rusticorum affixis, & ad Orientem vel Sep-
tentionem versis, ordine dispositos, quos dura-
tos & exiccatos conduunt faccis, & ad vsum eius
tincturæ seruant, quæ nigro colore pannos infi-
cit. Semine Glasti manso, vel aliâs trito, & sa-
liua vel alio liquore madido, apparet statim color
è cæruleo purpurascens quo indigenæ manicatū
coriū nondū sordidū tingunt. Est enim illis vt &
olim Britannis, gratissimus eius coloris aspectus.
Cæruleam spumam innatantem, quam igni fer-
uescentes eructant cortinæ, Indum nostri vocant
Insectores, & ad pictorum vsum siccant.

FINIS LIBRI VIGESIMI SECVNDI.





HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS SECVNDVS.

MOLLIENTES ET HOLERACEÆ PLERÆQVE.

Mensura & culinaria beneficia in vnam classē cogere hauriunt Botanicus noster ordo. Congenerum & affinium scietatem ad formā & fructus similitudine estimamus. Dicta sunt multa holeracea in precedentibus. Dicuntur & plures in sequentibus. Ast hoc libro Maluaceas & his quodammodo similes, certe plerasque holeraceas, aut non valde ab his alienas enarrabimus. Vbiq; studiosi Rhiz. tomis consultum volumus. Si quis melius digerere possit, faciat.

DE MALVA SIVE MALACHE VETERIBVS,
& in Genere.

CAPVT. I.



MALVA [de herba, non de arbore nobis sermo est] ex opinione Theophrasti, in altum se attollit, atque mensibus fenis, aut septenis in arborem transit, ita, vt longitudine, crassitudineque hactē instar grandescens, commodē ad vsum baculi veniat: tempore verd longiori exacto pro ratione magis quoque incrementa capeffit. Alibi de Malua inquit: Annuo caule constat, inter olera non nisi cocta manditur: Maluæ folia à Sole atque Sideribus affici sentiuntur. Assiduē namque circumaguntur cum Sole, seque eodem inclinant, quod Sol perfertur. Causa verd in detractōne humoris est. Eodem namque inclinantur, quod Sol humorem feruifaciens prouocauerit.

Lucius Columella idem hexametro hoc testatur.

Et Molochæ primo sequitur quæ verrice Solem.

Quo loco obseruandum est, cum dicit Maluam Solem sequi, id in minori Malua maximē videri. De siluestri ait, à Medicis Althæam vocari: Theodorus Hibiscum vocat, de qua infra dicemus.

Dioscorides Maluam satiuam [χαρδαίαν] recenset inter olera, Malachen [μαλάχην] vocans, ad cibum magis idoneam, quam siluestrem. Sed neutram describit, tanquam notissimam.

Apud Plinium non vnum satiuæ genus, sed duo esse traduntur, totidemque siluestris: hæc amplitudine foliis discernuntur. Maiorem Græci Malopem vocant in satiuis; alteram ab emolliendo ventre dictam putant Malachen. E siluestribus, cui grande folium & radices albæ, Althæa vocatur ab excellentia effectus, à quibusdam A-

lthæa; reliquum genus siluestris non describit. Ex his colligere licet nostram vulgarem Maluam quamvis non colatur, in genere domesticæ apud Antiquos extitisse: Alterum verd genus quod speculagratia fertur in hortis, Malopen esse apud Plinium, quam videtur intelligere, cum àlibi de Malua loquens inquit: in Arabia tradunt auctores Maluas septimo mense arborescere, baculorum vsum præbere extemplō.

Deprompta autem hæc sunt ex Theophrasto, de ea quæ cultu arborescit. Ex Theophr. igitur colligimus, id quod apud nos fertur, satiuum alterum genus fuisse apud Antiquos. Quod verd Theophr. statuit Maluam in arborem transire, hoc non concedimus, sed omnino dicimus esse particulare genus, nec vquam culturā in arborem abire. Sume quam voles Maluam; cole, proceriorem quidem, at nunquam arborescentem, nec specie à pristina differentem efficies.

Galenus siluestris & hortensis quoque meminit, ac priuatim eius, quæ ἀνδροειδής, ἀνδροειδής nuncupatur.

Sunt ergo Maluæ plura genera. Est enim Malua satiuæ, id est, hortensis; siue satiuæ: & Malua siluestris, non quæ in siluis; aut asperis locis, sed quæ in incultis sua sponte nascitur, quam Dioscorides vocat, quæ vox incultam & inelaboratam terram significat, qualis in semitis, pratis, aliisque huiusmodi ruris & agri partibus est. Et siluestrem hanc Maluam, vulgarem hoc capite intelligimus, non Althæam, nec Alceam, de quibus postea dicemus.

Differentiæ quoque multæ, ex florū figurā & vario colore. Alia enim rubras, alia candidas, alia in purpura albicantes Rosas producit. Et has rursus atque illas, vel multiplici foliorum tex-

turā constantes. Ex ipsis Maluæ foliis. Vna liqui-
dem folio sinuato, altera rotundo, nonnulla e-
tiam crispo cernitur. Vna rursū alius attollitur,
altera pumila est & humi iacet, de quibus post-
hac agemus.

In genere omnis Maluā à Græcis *μαράζον* di-
citur, à Lat. Malua, ab Arab. *Chubeze* seu *Chubas*:
& semen illius *Bizeri Chubeiz*: Trago, Germ.
paplen. Belg. *Maluwe*, *fressens cruyt*: Gall.
Maline: H. sp. *Maluas*, Angl. *Mallow*, Boh. *Slyz*
Hung. *Malua*.

Ut porro Malua Latinis, quasi Molua quod
aluum molliat, dicta est, auctore Varrone, ita
Græcis *μαράζον* ab emolliendo ventre, quia *μα-
ράζον* mollire significat.

Plinius maiorem à Græcis Molopen vocari
in sauiis, alteram Malachen, scripsit. Athenæus
μαράζον Atticè dici, in multis autem Antiphanis
& Epicharmi exemplaribus *μαράζον* per o scrip-
tum reperiri memorie prodidit.

Antiquos Malus æterorum olerum modo
veteri solitos fuisse, subducenda alui gratia, vel ex
Theophr. constat. Vnde Martialis:

Vires &
vius
Aluum sub-
ducit

Exoneraturus ventrem mihi villica Maluas:

Attulit, & varias quas habet hortus opes. Et
Vesere lactucis, & mollibus utere Maluis,
Nam faciem durum Phæbe cacantis habes.

Ex Diosc.

Quare scripsit Dioscorides, Malua sativa esui
longè aptior est siluestri, stomacho adueisatur,
aluum iuuat, sed multò magis caules: interaneis
& vesicæ utilis. Cruda folia cum salis exiguo
manducata ægilopas ex melle sanant: verum
cum cicatrice trahere cœperint, eā demum ci-
tra salem vtendum est. Contra aculeatos apum
vesparūque ictus illita efficax est: eadem cruda
cum oleo trita peruncti non feriuntur: vlcera
manantia in capite, fursuræque cum vrina sanant.
Sacrisignibus ex ambustis decocta folia tritaque
vtilissimè ex oleo imponuntur. Eius decoctum
vulvas in sessione molli: prodest erosionibus ves-
icæ, & intestinorum, vuluæ, sedisque, clystere in-
fuso. Ius decoctæ cum radice sua contra omnia
venena auxiliatur, si continuò à bibentibus re-
uocatur. Contra phalangiorum morsus reme-
dio est. Lac euocat: Semen in vino potum, ad-
dito Loti siluestris semine, vesicæ cruciatus lenit.

Ex Galeno

De hac perspicuè differit Galenus his verbis.
Quemadmodum *βερδύκιν*, quæ Lactuca agrestis
est, ab hortenli, ita Malua agrestis à sativa dif-
fert. Plantæ enim congeneres eò inter se diffi-
dent, quòd agrestis quidem siccitate, sativa verò
humiditate saperat. Porro succo Maluæ lentor
quidam inest, quod Lactucæ non inest, à refrige-
rândoque abest perspicuè. Id quod etiam an e-
quam edas intelliges, si vtrumque olus vicissim
calido alicui affectui, vt erysipelati, cataplasmatis
modo applicueris, quòd etiam vulgò faciunt,
tenera folia diligenter ad exactum lauorem con-
terentes. Senties enim in hoc cataplasmate La-
ctucam quidem manifestè refrigerare: Maluam
autem calorem quandam habere moderatum ac
æpidum. Cæterum hoc olus facillè subducitur,
non modò propter humiditatem, verum etiam
propter lentorem; & potissimum quando quis
cum oleo & garo copiosam ipsam sumpserit. Nu-
trit autem & ipsa mediocriter. Et rursus, Malua
agrestis digerentis paululum & emollientis le-
uiter est facultatis. Hortensis quantò plus habet
aqueæ humiditatis, tantò facultate imbecillior
est, fructus eius tantò validior est, quantò & sic-
cior. Porro huius generis est quæ Dendromala-

che nuncupatur, sed efficacissima comprehen-
surum in digerendo.

Plinius diffusius virtutes Maluarum explicat. *Vires et Plin.*

In magnis laudibus Malua est vtraque, inquit, &
sativa & siluestris. Omne solum in quo feruntur
pinguis faciant. Huic contra omnes aculeatos
ictus efficacior vis, præcipuè Scorpionum, vespa-
rum, similitumque, & muris araneis. Quin & trita
cum oleo qualibet earum peruncti ante, & ha-
bentes eas non feruntur. Folium impostum
Scorpionibus terrore adfert. Valent & contra
venena. Aculeos omnes extrahunt illitæ crudæ
cum nitro, potæ verò decoctæ cum radice sua le-
poris marini venena resingunt, & vt quidam
dicunt, si vomatur. De istè mira & alia tradun-
tur. Sed maximè si quotidie quis succi ex qualibet
earum torbeat cyathum dimidium, omnibus
morbis caritutum. Vlceramnantia in capite fa-
niant cum vrina putrefacta, lichenas & vlcera oris
cum melle. Radix decocta fursus capitis, &
dentium mobilitates. Eus quæ vnum caulem
habet radice circa dentem qui doleat punge, do-
nece desinat dolor. Eadem strumas & parotides
panosque, additâ hominis saluâ purgat citra
vulnus. Semen in vino nigro potum à pituita
& nausis liberat. Radix mammarum vitis oc-
currit, adalligata in lana nigra. Tussim in lacte
cocta, & sorbitionis modo sumpta, quinis diebus
emendat. Stomacho inutiles Sextius niger dicit
Olympias Thebana abortiuas esse cum acipe an-
seris. Alii purgan feminas suis earum manus
plenæ mensura, in oleo & vino sumptis. Vtique
constat parturientes foliis substratis celeridus foli-
ui, protinus à partu reuocandum ne vulua sequa-
tur. Dant & succum bibendum parturientibus
ieiunis, in vino decocta hemina. Quin & semen
ætum adalligat brachio, genitale non conti-
nentium. Adeoque ex Veneri nascuntur,
vt semen vnicaulis aspersum genitali semi-
narum auiditatis augere ad infinitum Xe-
nocrates tradat. Item tres radices iuxta adalliga-
tas tenefmo & dyentericis vtilissimè infundi.
Item sedis vitis, vel si foueantur. Melancholicis
quoque succus datur cyathis ternis tepidus, &
infantibus quaternis. Decoctæ comitialibus
hemina succi. His & calculosis, & inflatione, &
terminibus, aut opisthotonico laborantibus te-
pidus illinitur. Et facis ignibus, & ambustis de-
cocta in oleum folia imponuntur, & ad vulne-
rum, impetus cruda cum pane. Succus decoctæ
neruis prodest, & vesicæ, & intestinorum rosio-
nibus. Vuluas & cibo & infusione emollit in
oleo: succus decoctæ pori meatus suaves facit.

*Mira de di-
tut facit*

Scribit Simeon Serbi, Maluam veritriculum *Ex Simeon Serbi.*

facillè subire, non solum propter humiditatem,
verum etiam propter lentorem, atque imprimis
si cum oleo & garo offeratur, vino quo editur
tempore ittoratâ. Vesicam, thoracem, pulmo-
nemque iuuare, & raucam vocem linire. Silue-
stris Malua, vt ferunt, comesta dolores ex vespa-
rum ictu tollit. Si quis morsus à vespis aut apibus,
succo Maluæ præsertim siluestris perungitur, con-
festum dolore leuatur: Dicitur etiam huius deco-
ctum potum lapides contere, somnum concili-
are, facillèque partum præstare, si mulier eâ
crebrius vtatur. Illita inflammationes lenit, & quæ
indurata sunt molli. Illud Maluæ peculiare est, vt
vesparū & apum ictibus imposita, dolores leuet.

Maluæ herbæ nomine sequentes insignimus
plantas. Vulgarem flore minore & minore, seu
folio sinuato & rotundo. Maluam Stellatam:
Maluam trimestrem cum vnguibus purpureis.

Malua speciem Cobes. Maluam roseam, siue hortensem. * Maluam Crispam. Maluam arbo-
ream: de quibus ordine. Sed plures adhuc (de
quibus suo loco) apud Botanicos Malua titulo
habentur plantæ. At enim C. Bauhinus in Phyt.
Altera Malache è silv. cui grande folium & radi-
ces albæ, Althæa vocatur. Sic Harch. in Euch.
Althæam à Galeno Anadendromalachen [arbo-
rescentem Maluam] vocari testatur. Scribit Cam-
mer. hort. Bastinacani (Germ. addo) agrestem in
pratib. nascentem, Malachen agrum dici.

Et Cæsalp. per Maluam caule altiori
ferè ad Malopen accedentem, Althæam,
quæ Sida cognominatur, intelligere videtur.
Sed & Malua Theophrasti Tabernæ. & aliis
nihil aliud est, quàm Althæa Theophrasti, vel lu-
tea. Nec Malua Hispanica, aut Malua silvestris
alia est ab Alcea. Sic penitus nihil differt Malua
quæna ab Alcea tenuissimè secta. Eadem quo-
que est Malua Veneta cum Alcea Solifæqua.
Matth. in cogn. It. titulo Malua quartæ, quam non
describit, Geranium maluatum exhibet. Tan-
dem quam alii Maluam equinam vocant, Petas-
ites mihi dicitur. Cur demum cum Ruellio & Lo-
nic. Anagyridem nonnulli Maluam terrestrem vo-
cent, mihi non constat.

MALVA VULGARIS DUPLEX, VNA

Flore maiore, altera minore: vna
folio sinuato, altera
rotundo.



tales, maiores. Semen, radix, consimilia.

Est mihi Malua data per D. Agerium Bo-
noniæ collecta cum hac inscriptione, Malua vul-
garis maior flosculis minimis, Cobel Plinii: hæc
pilis longioribus & calycibus nonnihil differre
videtur, quæ varietas fortè est à natura loci.

Quemadmodum Cord. in Diosc. Malua silv.
Tom. II.



tantum men-
tionem fecit,
sic in hist. vna
solum descrip-
sit, quam Ma-
luam silv. re-
ctam vocat,
cui per Gesne-
rum figura cõ-
deniens addi-
ta.

Erraticam,
seu fucilem
(*geranioides*) Ma-
luam in duas
distribuit spe-
cies Fuchsius: *Fusch. uog.*
in sylvestrem
pumilam, &
silv. elatiorem,
In figuris au-
tem eius dif-

ferentiam non rite apparet, ac videntur vnus esse
plantæ potius: quàm duarum.

Et licet Tragus vnica habeat figuram, nem-
pe eandem cum Fuchsi pumila, hoc titulo, Malua
vulgaris, Gemein tãß pappeln. In descriptione
tamen distinguit vt Fuchsius, eam autem pingere
videtur quæ magnum florem fert.

Cornar. in Diosc. Malua silv. alia altior.

Dorsth. sub his nomenclaturis: *μαλὰ γὰρ ὑψηλὰς*
Malua, Malua minor, Lien capræ [Porta scri-
bit Malua folia Mago's Lien capræ appellare, ob
eam quam cum liene similitudinem habet,] Mu-
ris vna, duas habet icones, quarum vna refert
Maluam minorem flore maiore: prior verò vi-
detur diuersæ plantæ quippe Calthæ aquaticæ.

Malua quam Antiqui *Omnimorbiæ* appella-
uerunt vulgaris adeò notitiæ est, inquit Matth. vt
nulli ferè repeniantur qui eam non nouerint.
Bellum sanè dictam. Nulli non ferè nota Malua
Matthioli, illo excepto, qui non nouit in vulga-
ri Malua vnam maiori flore, alteram minori, qui
sibi persuadet Italicam arborescentem cultorum
mangonio talem esse: quum sit diuersa, vt postea
dicitur: tueantur Matthiolum Glossatores & Ba-
trocinatores si possunt.

Lacun. solam minorem videtur pingere ex
Matth. cum tamen vnam humilem, alteram ela-
torem statuat.

Gesn. hort. Malua agrestis maior & minor.

Dodon Gall. & Lat. vtramque Fuchsi figuram,
iisdem titulis exhibet.

Lob. & Penz. Adu. Malua silv. vulgaris proce-
rior: Item Malua silv. minor. Lob. Obs. & Icon.
Plant. pingit ambas, ac vocat, Maluam vulgarem
proceriorem: Item Maluam silv. repentem pumi-
lam.

H. Lugd. Malua vulgaris Matthioli: Malua silv.
pumila repens: & Malua silv. maior.

Tabern. Icon & hist. Malua silv. maior, & Ma-
lua silv. minor.

Camer. hort. Malua vulgaris duplex, maior &
minor: Eidem ad Hist. Germ. Malua minor. E.
Epit. Malua, Malua maior & minor.

Schuy. Malua silv. pumila albo flore *μαλὰ γὰρ ὑψηλὰ*
ἀλβὰ. Malua officin. Malua silv. procerior *μαλὰ γὰρ ὑψηλὰ, ἰσχυρὰ καὶ ἄγρια*. Malua silv. recta Cordi.

C. Bauh. Phyt. Malua. usque sylv. folio rotundo.
Malua Brunfels. Trago prima, Lob. pumila. Ma-
lua 2. siue silv. folio sinuato. Brunfels. equina.
L. 111 2

C. B. pr.

Nemina
linguarumLocus &
tempusVires &
Vfus.Tempera-
mentum

Dentes

Fauces ena-
sperta.
Rauco

Anax

Partum
promouet

Purgat

Omnium
orbex.
Malua om-
nisorbis.

Rauco

Stranguria

Pernicies
vesicularum

Trago altera species. Lob procerior: hæc in ge-
nere domesticarum fuisse apud Veteres videtur:
Et apud Arab. Malua i. sine sylu. folio rotundo
quam Theophr. coqui & c. bo. idemam, esse scri-
bit. Figuram penit ex Tabern. quæ cum minore
flore, cur autem potius eam quam quæ cum ma-
iori flore, ignoro, laus magni videntur flores in
figuris Matthioli.

Malua folio sinuato flore maiore Græcis *μαλ-
υα*, à Diosc. *μαλίζον χορδαία*, à nonnullis *α-
πομαλίζον*, quasi doloris mitigatua: item & *απομαλίζον*. O-
riaca. Dodon. Germ. *Neßpappel*, *S. Joh. papp-*
peln, *Wilde rothe pappel*, *Silez. Gall. mauve*, *sa-*
uge. Aut Malua folio rotundo flore minore,
Gens. *τρίαντα βασιν pappel*, *Hein vnde gemein*
pappel, Belg. *Hein Maloume*, *Galkpauite mau-*
ne, *Montb. les Farmagets*, Hung. *Rös malua*.

Syluestris Malua prior in culis locis exit, solo
tamen fecundo, non sterili, iuxta vias, hortorum
sepimenta, agrorum margines, locis nonnihil
humientibus. Proxima non raro in rudibus, ac
aliis perinde incultis ac neglectis locis repentur.
Alunio nichil in multam ætatem flores profert,
isterea tamen semen tarum ad maturitatem
peruenit. Malua pingui delectatur loco, & hu-
mido, gaudet laramine hortorum. Malua Mont-
pelli frequens: Basilæ florentem vidi Maio &
Iunio ac Octobri extra urbem & intra urbem.
Lugduni & Genæe proueniunt. Montbeigardi
passim ac etiam in Horto Ill. E. C. vtraque proue-
nit sponte supra finum, aut culta in orto.

Vires ex Dioscor. & Galeno videant Lectores,
quas referendas existimamus ad modò prædictas
nostras Maluas. Maluæ radix sicca [calida & hu-
mida, Port.] inquit Matthioli, die vna in aqua
maerata, & deinde madida papyro circumuolu-
ta, & sub cinere feruenti decocta, & iterum sic-
cata, vtiliter vsurpatur ad dentificia: mundat e-
nim afflicta dentes, & gypseam materiam soluit.
Foliorum & radicum decoctum gargarizatu exa-
speratas fauces lenit, mucago verò acrimonias ce-
mendat: Feruēfacta folia in cibum apposita rau-
cedines expediunt, ex oleo autem, sale, & recen-
ti butyro aluum citant. Fit à foliis cum salignis
frondibus tritis præstantissimum medicamentum
ad venenosorum morsus. Succus auribus instil-
latus dolorem sedat. Decocta vnà cum radice ad
lentorem vsque datur potanda agere parturienti-
bus magno iuuamento: id quod etiam præstat
succus selibræ pondere haustus. Semen ex vino
rubro potum nauseam tollit. Cauliculi molles
decocti delibati que comeduntur ex aceto, & o-
leo, & sale, Asparagorum in modum, prima statim
mensa, ad citandam aluum. In summa, Malua ad
multa utilis est: idcircoque non immerito Antiqui
Maluam *Omnisorbiam* [omnium orbicem] appel-
lauerunt. Datur vtiliter succus potandus melan-
cholicis sex vnciarum pondere, at insanientibus
vnciæ octo propinquantur.

Ad raucedinem recipit Bapt. Codronch. aq. stil-
latiæ Maluarum ꝑ.iii. Aceti scyllit. ꝑ.iii. cuius por-
tiunculam singulo die per horam vnā vel alter-
ram, non semel ægrum per nares attrahere iubet.
sed etiam bis, prout opus sit. Et hoc erthinum à
se experientiâ comprobatum scribit. Maluam
vulgarem maiorem & minorem cum Allio vino
incoquant ad tertias & bibunt contra strangu-
riam: Hodie Maluarum decocto vti solemus in
Clysteribus ad aluum ciendam & vrinas. Aclia-
nus sanā Maluæ succo suffusa lacertis & simili-
bus insectis perniciem afferri perhibet.

MALVA STELLATA.

Maluz pulchra species, cui caules tenues, Descrip
cubitalis vel bicubitalis, ramosi: folia



priora in tenella planta sunt ex longis pediculis parua, so-
tunda, serrata, vbi autem ado-
leuit per ramos ex brevioribus
foliis, in satis magna, in tres
partes diuisa, quorum quæ-
dam sagittam expriment: se-
por ingratum, non-
nihil viscosum: flos magnus pur-
pureus stratus, quinque foliis
cordatis constans: in medio
pistillus albus ex multis apici-

bis constans: eius calyx prior membraneus vti
& secundus, in quo cuspides tres stellam quo-
dammodò exprimentes: semen quale vulgaribus
Maluis. Totā planta hirtuta.

Argentinae primum vidi florentem & cum se-
mine maturo Septembri, in orto D. Frederici
Meier Argentinae, qui Maluam stellatam nomi-
nabat, is semen à Domino Agerio vt audio acce-
perat.

Locus &
tempusMalua
stellataMALVÆ TRIMESTRIS FLORE CVM
vnguibus purpureis.

Pedali altitudine crescit hoc Maluz genus, Descrip
caule rotundiusculo, tereti, viridi, lanugine
tamen aliquantulum obfuso, quem rara & nullā
certā serie distributa ambiunt folia, tenella, vixi-



dia superne, inferne diluio-
ra infimo cauli ad-
nata, circinatæ
fermè sunt ro-
tunditatis, in
ambitu serrata:
supremum cau-
lem & ramulos
amplectentia an-
gulosa sunt, ad
foliorum Althææ
formam penè ac-
cedentia: flores
summis ramulis
inhærent satis
magni, quinque
foliis extima par-
te lunati, con-
stantes: purpura-
scents coloris,
vnguibus satura-
tione purpura in-

fectis, prodeuntibus ex umbilico staminibus
palidis, villis purpureis: semen in foliaceis capi-
tulis planum: radix est parua, candidans, tenui-
bus

bus fibris prædita; annua tamen, aut potius tri-
mestris, quam subsequens hyems corrumpit.

Huius siccam plantam suis floribus onustam
& charæ implicatam mittebat ad Clusium N.V.
Ioannes Hoghelandus anno 1592. ex qua subie-
ctam iconem delineari curabat.

MALVÆ SPECIES COBES.

Cobes, Malvæ species non inelegans futura,
quantum ex rudimento colligere Camer.
hort. poterat, si ad frugem pervenisset, Clar. V.
D. Paludani ex Syria reduci munus. Semen re-
liquarum Malvarum semine minutius.

Cobes etiam semine ego quondam recepi, quod
statim in horto Ill. E. C. Montbaldardi, sed non
provenit.

C. Bauh. phyt. Malva nona Syriaca, Cobes
Camer. quod Paludanus ex Aegypto allatum,
Kobes nomine Patauji communicavit.

MALVA ROSEA SIVE HORTENSIS.

descriptio



HÆC si, vt
Rosa, na-
res conciliaret,
nulli dubium
quin de præstā-
tia & pulchritu-
dine cum ipsis
Rosis certare
posset. Cæte-
rum Arbutulæ
magnitudine af-
sequitur, stipite
crasso, solido,
hirsuto, recto,
rarius ramis ali-
quot brachiato:
folia alternatim
longis medio-
citer & lanugi-
nosis pediculis
ex caule oriun-
tur, singula, la-
ta, quinque fe-
rè diuisuris ob-
iecta, in
ambus crenata,
suprà atrouirē-
tia, infrà albi-
diora, vtrinque
pilosa: ex quo-
rum alis flores e-
micant successi-
uè plures, Rosæ
magnitudine &
colore, id est,
rubro, aut puni-
ceo, aut saturo
sanguineo, aut
carneo, aut al-
bo: ijque mo-
dò simplices
medium occu-
pante cono api-
culis sublucis



& purpurascens prædita, in multa foliola
flori cōcoloria sese explicante: modò multiplici
foliorum sætu luxuriantes: insident hæ autem

calyci geminato; canā lanugine pubescenti, se-
menque post se relinquunt, in pastilli formam
compressum. Radix longa, alba, lentum mu-
cōrem remittit, non alio quàm Malvæ sylvestris
sapore.

Huius etiā species inuenitur folio amplo, ficus
profundè laciniato.

Cordo Malva hortulana, rata visu, ac quasi
ignota, & Romana Malva dicitur.

Trago in inscriptione Malva Romana, & in-
ter nomenclaturas, Rosa nobilis, Hortensis
Malva, Metensium Rosa ultramarina, Malva
Theophrasti & Dioscoridis (apud quem huius
nomina hæc sint) *Μαράζον*, Anthema [à Pytha-
gora, Dodon.] Diadema [à Zoroastre:] Choco-
tem [ab Aegypto.] Capraz lien [*αὐχὸς σαρδηνίῳ*] Mu-
ris cauda [Vrina, *σαυρὸς*, Dodon.] Malva horten-
sis: Molochæ Veterum (quod videre fit in
Aulularia Plauti) Malva Romana Arabum, alio-
rum Molochia, Maluchia aliorum arborea (cuius
semen Kizeri Katmi vocat:) Hebræorum
Chalmuth, & Harni, teste Aruch Monstieri. Est,
inquit in descrip. colore floris candido, roseo, ru-
bro, & ex rubro nigricante, simplici & multi-
plici foliorum textura. Hæc Tragus, ego non au-
sum asserere hanc esse Maluam Theophrasti, in-
clinat animus in aliam.

Fuchl. Malva hortensis Dioscor. & Galeni,
Corn. Malva *ῥοσά* Diosc. Malva hortensis.

Matth. Malva folio nigro flore Rosarum effi-
gie rubente, candido, vel subrubro: Malva ar-
borea. Et in hist. germ. vt & post. com. cum mag-
n. fig. Malva maior, & Malva maior altera. Bene
sibi consuluit Matth. qui in post. com. ceu &
Camer. in eiusdem Hist. Germ. quod in Epit. fe-
cerat, Maluam roseam non amplius vocant ar-
boream, ac melius, quàm eius Patrocinator.

Lacun. Malva hortensis, flore purpureo, &
albo: Græcorum Dendromalache, Lat. Malva
arborea. Sed vt iam dixi, hanc Maluam nec ar-
boream, nec Dendromalachen fenserim.

Dodon. gall. pingenti Malua satua: Lat. Mal-
ua hortensis, & Malua hortensis multiplici flore:
de qua ait. Ad differentiam aliarum *Μαράζον* x x x
[Malua hortensis:] dicitur à nonnullis vtrò
Rosa ultramarina, & Rosa hyemalis. Atque hæc
est illa, quam in Maluaceo caule fundi Plinius
tradit: folia oleracea (perperam in plerisque ex-
emplaribus, Oleæ, aut oleacea) habens, quam
Μοσχέρον vocant. Appellari autem hanc Maluam
nominibus ex Trago adscriptis inter spuria Dio-
scor. reperitur.

Gesh. hort. Malva Romana quorundam, Ha-
stula regia Apulei, flore candido & rubro, simpli-
ci, vel multiplici. Et in cat. pl. Hastula regia Apu-
lei, Rosa Autumnalis vulgi, Malva genus *δωδε-
καλόζον*, quod non concedimus ipsi.

Rectè meo iudicio dubitant Lob. & Pena in
Adu. Malva rosea fruticosa, an Galeni *Αἰνυδὶς ῥο-
σά* Lob. Obleru. & Icon. plant. duas ponit fi-
guras his titulis. Malva rosea fruticosa: Malva ro-
sea multiplex.

Camer. hort. Malva hortensis siue Romana,
Bismalva vulgi, flore simplici & pleno, multiplici
colorum differentia. Reperiuntur enim candido,
dilutè purpureo, siue vt vulgò vocant incarnato,
rubro, puniceo, nigricante. Atque hæc posterior
differentia primo anno raris flores, & vix durat
ultra triennium.

Hist. Lugd. quinque proponit figuras, licet tot
non erant necessaria; sub his titulis: Malva ma-
ior 1. 2. 3. Matthioli, Malva rosea simpliciore flore:
Malva rosea multiplex Lobglij.

Varietat.

Malva ro-

sa vici-

Malva Ro-

mana.

Rosa nobi-

lis

Rosa ultra-

marina.

Malva

Theophr.

Diosc.

Anthema.

Diadema.

Choco-

tem.

Caprazien.

Muris cau-

da.

Molochæ

Veterum.

Molochia.

seu Mal-

uchia ar-

borea.

Chal-

muth.

Harni.

Trag. nōr.

Malva

Diosc.

Mal-

ua folio ni-

gro.

Mal-

ua arborea.

Totidem & Tab. habet. Quorum 1. Malua arborea, siue horrensis. 2. Malua arborea alba multiflora. 3. Malua arborea flore nigro multiplici. 4. Malua rosea multiplex. 5. Malua rosea simplex.

C. Bauh. Phyt. Malua 5. siue rosea folio subrotundo flore simplici, Malua hortulana Brunfels. Romana Triago, Rosea Lobelio: Hæc Malua fatua est apud Antiquos: Malua quæ cultu arborescit Theoph. Plinio Malope: flores candidi, rubentes, & hi modò saturati, aliàs purpuræ modo relucens, non rarò omninò diluto colore: sic & ex rubro, nigricantes. Malua 6. siue rosea folio subrotundo, flore pleno, Lobelio Rosea multiplex, in flore multiplices differentia, hinc tres icones apud Tabern. Malua 7. siue rosea folio Ficis; Tabern. peregrina. Item Malua 8. siue arborea Veneta dicta, Arborea. Matth. Icon. quoad iconem: & Malua maior eidem fol. Lat. Malua maior vinctus Matth. Icon. quoad descriptionem: & Malua maior, altera eidem Lat. in folio. Eadem apud Matthiolum Malua 1. maior siue rosea folio subrotundo, flore simplici quæ Malua fatua est apud Antiquos. & quam cultu arborescere scribit Theophr. Malua 3. siue rosea folio subrotundo, flore pleno. Malua 4. maior altera siue arborea Veneta dicta flore cæruleo. Quis obsecro credet Maluam vulgarem siluestrem fatione in Roseam mutatam, quis præterea vidit roseam in arbore tranfisse: aliam ego cum Theophrasto, Plinio, & Matthiolo vidi, non hanc.

Nomina
linguarum

Malua rosea, seu horrensis, Germ. (Herren: vnd Rômisch pappeln. Romanas) herbst vnd winter Rosen [Rose Autumnalis, vindemialis, siue hyemalis] Ernrosen / acti Rosam honoris diceret, Belg. winter Roosen / herbst rosen. Gallis Rose d'ouere mer, Malua de sardin, ou cultrine. Ital. Malua maggiore. Matthian com. Ital. Angl. holy hore.

Locus &
tempus

Malua roseam ex semine variis in locis collecto, ac etiam nobis missio, seuimus in horto E. C. Montbelgardi, cuius diuersos habemus colores. Genecia habui flore candido simplici rubro simplici, candido multiplici, & rubro multiplici, florentem Iunio ac etiam Nouembri. Basileæ etiam in hortis vidi, Patavii in hortis, vt Musati. Bononiæ in horto S. Saluator al burgo di S. Catharina. Primo anno caules non profert sed secundo, postea vt plurimum perit, fert alioqui hyemem. Stutgardia in horto Ill. C. V. Virtemb. & in horto ad fontem admirabilem cum variis coloribus pleno & simplici flore obseruavi. Apud Frider. Meier florentem Septembri folio Ficis, flore cæruleo simplici, quam ex Italia missam dicebat. Folii sapor viscosus.

Vires & v-
sus
Porrigenes
Erysipelus

Malua horrensis flores coquunt in vino veteri, vt legimus apud Camer. hort. quo porrigenes abluunt & sanant. Vtuntur etiam ad erysipelatis rubores compescendos, imprimis rubentibus Rosis, imitari coloris similitudinem. Ego florum decocto feliciter vtor in siccitate & ardore linguæ & faucium. Et quia in diæis floribus nullam agnosco adstrictionem, nondum intelligo, quo successu Io. Liebaut ad fluxum menstruum nimium Malua roseæ flores præscribat.

in. Liebaut
vni.

Malua CRISPA.

Descriptio

Altitudinis plantæ, sicut huiusmodi vitæ: quanta homini. caule crassiusculo, non nihil anguloso, vitidanti, glabro, rigido, aliquantum

concauo, & in ramos fissis: folia palmatis & dodrantalibus pediculis, altera parte hirtis, altera glabris appenda, latitudine memorabili, breuibus pilis donata, non tantum laciniata sunt, ve-



rum etiam crebro flexu reflexuque per oram crispata: flores conferti, ad pediculorum, quæ folia sustinent, exortum, breuibus plerumque petiolis insident, baud maiores quam Malua sylvestris pumile seu proliata, colore ex dilutissimo rubore albicante, ex quinque foliis compositis, calyce hirsuto, virecente, quinquepartito, in

quo succedunt in orbem congesta semina, Malua iam dicta: radice subest dodrantalis vt longior, alba, mediocriter crassa, sapore vt & reliqua planta, glutinosa.

Lob. Obs. Malua crispata vulgi & vt etiam Pl. Synon. Icon. Malua crispata. Dodon. Malua crispata. Tabern. Icon. & 11 flor. Malua crispata. Frail pappeln. Catp. Bauh. Phyt. Malua 4. siue folis crispis.

Camer. hort. Malua crispata siue laciniata Cordi, Arborefcere videtur, quamvis tantum sit planta semestris, de qua scribit hæc, Malua Orientale Sole hiat. Occidente clauditur. Pythagoras, vt refert Alianus, nris uas daret, quibus ita daretur [folium Malua esse sanctiss. dixit lib. 4. variaz hist.] nimirum quia mysteria sua in hoc olim scriptabant sacerdotes. Gesh. hort. Malua crispata, Malua Romana quorundam: Althæa crispata & maior Ollingeri.

Cordo in Diosc. Malua horrensis, Malua Romana: Malua sinuosa crispitudine, Malua Dioscoridis. Hanc eadem describit in hist. sub titulo Malua horrensis laciniata, cui Gesh. appositum figuram inscriptione Malua horrensis crispata.

Genecia mihi prouenit in horto, virens Octobri & Nouembri, postquam semen pertulit e mortua, semine deciduo quotannis se propaga, ac è semine deciduo prouenientem ibi vidi hyemem perferre. Basileæ vidi in horto D. Dis Theodori Zwinkeri, Montbelgardi in horto E. C. florentem vidi Iunio & Iulio.

Malua crispata magnam emolliendi vim præ a- Vires liis tribuit Camerarius.

MALVA ARBOREA.

Malua arborea stipite adolescit crasso, ligneo Descriptio quaternum aut quindum cubitorum, perenni, folia amplissima, Malua repentis modo sinuata, sed lanuginosa Althæa mollitie, flores secundum stipitem Maluacei, parui.

Ethacilla est Malua arborea, quam Rauu volff. Halepi ab incolis veteri Arabico nomine nau dicit scribit, sub cuius gratiosa umbra deambulare liceat. Idem meminit Malua arborefcens al-

tius



lens, dicitur perierit interdu ad 8. vel 10. cubitos
allurgens. Tum alibi in Italia, tum frequens in iti-
nere. quo itur Pisà ad portum Liburni ab eodem
aliquando inuenta.

Geln. Malua arborea. In Append. Malua Ar-
borefcens. Dendromalache Galeni.

Maluum quæ in aliquibus locis in Italia arbo-
rescit, nil aliud esse quam faciem colorem ma-
gonio in tantam magnitudinem allurgentem
ignoranter sibi persuadet Matth. dicitur: Mal-
uum quæ in arborem degenerat vidi Grignani
ad Benaci ripas in quodam Monachorum cæno-
bio, vbi eorum otio & cultu tantam sibi aloue-
rat amplitudinem. Hæcille. Ego verbè facili
dederim alicubi Maluum arborem ita humilem
esse, vt in altum se non attollat, sed cultura deinde
arborefcit: verum nunquam concesserim
Maluum vulgarem siue magno, siue paruo flore
arborefcere: colant glorificatores & Patrocinato-
res Matthioli, videbunt quid impetrabunt: cul-
tura maior euadet & elui aptior sed arborea nū-
quam fiet, nec etiam eundem florem nanciscetur;
vt rectè etiam statuunt Lobelius & Pena.

Primò vidi Ellingæ apud insignem Pharmacopœum
Volmarium: postea Monspelii in quibus-
dam hortis. Creuit mihi Geneuæ in orto: Basileæ
Frater C. Bauhinus habuit in orto. Montbel-
gardi à me lata in orto E.C. primo anno creuit,
ad altitudinem quinque cubitorum circiter: re-
posita, floruit sequenti anno: flores parui: ali-
quot annis durat, modò diligenter reponatur.

ALCEA VETERIBVS.

CAP. II.

Quæ inter se affinia sunt, quasi catenâ qua-
dam meriti connectuntur, atque hinc Al-
cea & Althæa seu Bismalua de necessitate Mal-
uarum tractationem quoque consequentur.

Alcea igitur, auctore Dioscoridis, & hæc silue-
stris Malua species est, habens folia fissa, ad ver-
benacæ foliorum similitudinem: caules tres aut
quatuor foliorum plenos addit Plin. J qui corti-
cem Cannabi similem habent: florem paruum
Rosæ similem: radices albas, lanas, quinque aut
sex, cubitales, obliquas adiungit Plinius, qui eam
nati scribit in pingui solo, nec in secco.

Radices, inquit Dioscorides, cum vino aut a-
qua potæ, dyfentericis rupisq; medentur. Plin-
tius: Vfus radices ex vino vel aqua dyfentericis,

aluo citæ, ruptis, conuulsis. Et Alceæ radix colle-
ctioes discurt. Et paulò post Sp. alucis, tremulis,
opisthotonicis Alceæ radix bibitur ex aqua mul-
sa. Sic & rigores exaltatit. Et Alceæ sicca farina
torminibus pota cum vino resistit. Galenus Al-
cea in simplicium catalogo prætermisit, Paulus
ex Dioscoride, Alceam siluestrem: Maluæ speciem
esse dixit, quæ cum vino pota dyfenterias & ro-
siones sanat, & magis ipsius radix. In hoc tamen
Paulus à Dioscoride & Plinio dissidet; quod Al-
cea, id est, rosiones, habet pro his quæ phrygæ,
id est, rupta, Diose. & Plinius appellauere, vt for-
tasse in hoc in Paulo, pro Alceæ legere oporteat.

ALCEA VVVGARIS.

Si Equitibus talis in semetipsum altitudinem vbi
sile quatur, & centibus hirsutis, alperis, fungo-
sa medulla factus: folia Maluæ vulgaris surrectæ,

Descriptio



maiora, ad pe-
diculum vique
plerumque in
tria, quinque,
aut sex segme-
ta diuisa, atro-
a. cæna, hirsu-
ta: & ex eorū
alis, pediculis
quadratis b.
hirsutis appē-
duntur flores
rosæ speciosi,
pimpriæfcente
carthæve co-
lore, quinque
foliis sitatis
compositi,
quorum me-
dium occupat
racemulus api-
cum albicans:
f. m. u. a. conti-
nua

sta compressi caules si emam amulantur, & cu-
vulgaris Maluæ: radix digitalis longæ.

Cordo, Trago, Fuchl. Matth. Apollini, Ia. Synon:
Herba St. mconis. a. a
cunæ, Harchio, Lonic. (cui etiam Herba Simeo-
nis, sed eius icon mala,) Dodon. gall. & Latin foli. Lonic. not.
vbi & speciei minoris meminit, & Cæsalp. Althæa. a. cea.

Brunfell. Alceæ Dioscoridis, & Herba Simeo-
nis dicitur: Ruellio, Rustica Althæa, vel Bisma-
lea siluestris. Trago Alcea, siluestre Malua ge-
nus, Malua altera, Malua siluestris. Barban. Cau-
da Leonis, & Peristerion quorundam. Corn. Al-
cea Officinarum & Herbar. Malua, & Malua sil-
uest. species. Io. Agric. Vngarica herba, Theod.
Dorlth. Dens Leonis, Hermanni Comitæ à No-
uenare Lagopoda Dioscoridis.

Alceam, inquit Matth. passim ferè in Italia, ali-
qui Bismaluum, alij Maluum syluestrem, nonnulli
etiam Maluaufcum agreste nominant: Alceæ
Galenum meminisse non reperio, nisi lib. 7. sim-
plic. vocet Maluum syluestrem.

Ait Cronemburg. de comp. med. Alceam Dio-
scoridis quosdam perperam Maluum Theophras-
ti existimasse.

Amat. in Diose. Alcea, Herba Hungarica. Item
cent. 2. curat. 53. Alcea, Malua Vngarica.

Anguill. Cannabin sylu. facit, ac dicit, Herba-
rij vocant Hungaricam, alij Alceam: quamvis au-
tem non sit Alcea; conantur tamen demonstra-
re descriptionem conuenire.

Cæterum, & xarxæis uæpæ siue Cannabis sylu.
dicitur, quòd (vt Dodon. vult) ex cortice. Can-
nabino persimili, funes intorqueri queant.

Lobel. & Pena in Adu. Vulgaris Alcea, & Malua sylvestris. Lobel. Obs. & Icon. Plantar. Hort. Lusit. & Clus. hist. post. Alcea vulgaris. Hist. Lugd. Alcea Matthioli: Alcea vulgaris Lobelii.

C. Bauh. Phyt. Alcea. 1. siue vulgaris maior. Schv. Maluam sylvestrem, Alceam dictam scribit *Σελαν άραλιν* à colore, quod firmiter dy-senteriz & rupis medeatur, Rorhe pappeln/berz leudre.

Nomina
linguarum

Alcea Græcis & Alcea Latinis. Germ. Syg-marwurtz/ Sigmunde wurtz/ Rächleudren/ wilde pappeln/ Schveugen pappeln/ Brunsell. felzig Cordo, vulgò Herba Simeonis, Belg. Sigmartz cruyt. Gall. Bimaulue vel Guimauue saunage. Ital. Bismarza, Malua silvarica, Maluauis-
co saluatico, Buon vischio. Hisp. Malua montesina, & Malua di Vngria. Boh. Felzyß lowen Zan.

Locus &
tempus

Alcea vulgò prouenit Montbelgardi extra mu-ros horti Illust. E. C. & prope pagum Nommai in Comitatu Montbelgardeni, inter pontem Vau-taucourt, & Dampierre florens Iulio; copiosè cir-ca Marthas Castellum: Mihi uisa est etiam Mon-pelii ac Geneuæ. In Ducatu VVirttembergio ad fontem Admirabilem florens Augusto mense.

Ruri notam dicit Schv. incultis campestribus, agrorum, scrobiumque marginibus, iuxta vias se-pes, & semitas; floret Iunio & Augusto.

Vires,

Ex emplasticorum medicamentorum numero esse Alceam, & soba quæ glutinosum quid ac len-tum habent, & etiam radix ipsa, quæ glutino-sa, dulcis & modicè adstringens apparet gu-stantibus, abundè monstrant. Hinc satis con-sistat Alceam citra insignem, tum caliditatem, tum frigiditatem siccare, ac planè emplasticorum con-sistentiam obtinere. Celebratur ad caliginem oculorum ab empiricis, ut non desint qui credant radicem Alceæ, è collo suspensam aciem oculo-rum supra modum acuerè, & tueri posse. Et hinc fortè nomen indeptum germanicum *Rochleu-schren*: Syluestre Maluæ genus, quam Alceam vocari Tragus dixit, si herbæ & radices vino vel aquà decoctum bibatur, torminibus intestino-rum remedio est, ruptis & conuulsis conducit, & opitulatur. Breuiter, Malua Romana, Alcea, Malua vulgaris, & Ibsicus, omnibus calidis do-loribus totius corporis apprimè conducunt.

Caligo ocu-lorum

Inflamma-tiones.

ALTHÆA SIVE BISMALVA.

CAP. III.

Descriptio

EX Maluarum familia prerogatiuam tulit Al-thæa, vtilitatis multiplicis nomine commen-dator, radicibus multis nixa, benè habitis, albis, mucagine lentâ, quam mansu maceratione de-ponunt, turgidis: caules bicubitales & procerio-res, teretes, tenues, hirsuti, angusto tubulo peruii: in quibus folia alternata Maluz vulgaris. longio-ra, sinuosa, serrata, mollicello tomento incana, ex alis flores proferunt, Maluæ vulgaris surrectæ, co-lore albo tantillum ad carneum declinante, quin-que foliis constantes, in quorum medio stylus 4. apicibus purpurantibus & obsol. tis floridus eri-gitur: semen pastilli compressi rit ut in vulgari relinquitur.

Alcea Dis-cordis.

Dioscorides Althæa folia tribuit, ut Cyclami-no rotunda, lanugine canescentia: florem roseum: bicubitalem caulè: radicem lentam, intus albam.

Hibiscus
Theophr.
stylus.

Theoph. de Hibisco inquit: Folio Maluæ, ma-iori tamen, pilosiorique: caulibus mollibus gustu

Maluz: flore melino: fructu Maluz: radice fi-brosâ, alba.

E sylvestribus (Maluis,) inquit Plinius, cui grande folium, & radices albæ, Althæa voca-tur.

Synonyma ut & alia nonnulla in appendice huius libri tradentur.

Græcis *δωδευαράζο* & *δωδεκαεράζο* dicitur: Arabibus, *Chitum*, *Charim*, *Chalim*, & *Rafa Za-min*: Germ. *Zibsch* *Zybis*, *heylwurtz*, *Sio-dmurtz* & *Sammerpappeln*. Belg. *witte hūcū*, *winde wurt*.

Nomina
linguarum

Maluæ: Gall. *Guimauue*, quodd glutinosa sit Malua: Ital. *Maluauisco*: Hisp. *Hierua canname-ra* & *marmaie*: Angl. *Māshe* *Madow*: Boh. *wysofy* *Sleg*: Hung. *Seyer* *Malua*/h.e.al-ba Malua & Mazola.

Copiosa nūc est Montbel-gardi prorum-pens Maio, flo-rens Iunio, in Horto E.C. no-stra opera, ha-

Locus &
tempus



betur etiam in alius. Monspelii obseruau spontè prouenientem prope mare: Basileæ, Geneuæ & Lugduni in hortis. Nascitur locis vlginosis & pinguibus, humentibus, & palustribus pratis, & in fossis. Floret Iulio & Augusto mense.

Multiplicem eius in medendo usum ac vtilita-tem declarat Dioscor. his verbis: Decocta Al-thæa in vino aut aqua mulsâ, aut per se pota effi-cax est contra vulnera: item ad strumas, paroti-das, abscessus, mammarum inflammationes, con-tusiones sedis, in flationes, nervorum rigores: si-quidem dicitur, & excoquit, rumpit, & ad ci-catricem perducit. Coctâ, ut dictum est, adiecto suillo adipe, aut anserino, terebinthinave, ut malagmatis lentor fiat, facit ad vuluæ inflamma-tiones, præclusioneque in pennis subdita. De-coctum eodem fungitur munere: onera vuluæ, reliquaque à partu extrahit. Decoctæ succus ex vino potus succurrit vrinæ difficultati, calcu-losorum cruditatibus, dysentericis, ischiadicis, tremulis, ruptis.

Vulnera:
Serrum

Vulua.

Plinius Maluarum usum Medicum (de quo iam diximus) suscit persequutus, tandem addit, Al-thææ in omnibus supradictis efficacior radix, præcipuè conuulsis ruptisque. Coctâ in aqua aluum sistit. Ex vino albo strumas & parotidas & mammarum inflammationes tollit. Panos il-lita. Eadem arida in lacte decoctâ, quàmlibet perniciosâ tussi medetur. Hippocrates vulnera-tis, sicutibusque defectu sanguinis, radices deco-ctæ succum bibendum dedit: & ipsam vulneri-bus cum melle & urina, item contusis, luxatis, tu-mentibus, & musculis, nervis, articularis imposuit: & asthmaticis ac dyntericis in vino bibendam dedit. Mirum aquam radice ea addita addensari sub dio, atque laetescere. Efficacior autem quò recentior. Hæc Plinius, quorum quadam etiam Dioscorides habet. Verum quod aquam radic

Althæa

Althæa addensari atque lactescere dixit, idiam ex Dioscoride atque Theophrasto protulimus, vt ex his non immerito dubitet Cornarius an lactescere rectè in Plinio legatur, & non potius lentescere, aut coalescere. Idem Plin. quilla de Althæa prodidit seorsum aliquot locis de Ibisco, vt ab Althæa diuerso scripsit. Hibiscum, inquit, à pastinaca grauitate distat, damnatum in cibis, sed medicinz vtile. Et Pastinacæ simile Hibiscum, quod Molochen agriam vocant, & Aristolochiam, vice-ribus cartilaginis, & ossibus fractis medetur, folia eius ex aqua pota aluum solunt, serpentes abigunt. Apum, vesparum, crabronum icibus, illata medentur. Et mox, Celsus & podagris, quæ sine tumore sunt, radicem eius ex vino decoctam imponi iubet. Et medetur lichenibus Hibisci radix cum glutino & aceto acri decocta ad quartas. Quam in re Plinio aperte refragantur Dioscorides & Galenus, cæterique Græci, qui Althæam Hibiscum siue Ebiscum vocauerunt. Sic enim Galenus: Ebiscus siue Althæa, est autem Malua agrestis, facultatem habet digerendi, laxandi, phlegmonem leuandi, mitigandi, concoquendi difficiles coctû abscessus. Radix porò eius & semen cætera quidè parè foliis modo agunt, verùm tenuiorum partiù, magisque ex siccatoriam, adhuc magis exterioriam facultatem, ostendunt, vt & vitilignes detergant, & semen renum calculos confringat. At radicis decoctum ad dysenteriam, diarrhæam, & sanguinis reiectionem aptum est, nempo cum adstringentem quandam facultatem habeat. Et de Maluis agers. Huius generis est & ea quæ Dendromalache nominatur: sed efficacissima prædicarum in digerendo, appellatur etiam Althæa.

Aqua destillata Althææ erosiones intestinorum ex dysentetia, aliaue cholæræ causâ profectas perlanat, Tragus: athmaticis propinatur vtiliter: Radix minutim concisa, inque lacte aut aqua decocta, quouque in pulstem euadat, & emplastri ritu imposita emollit, & maturat quæcunque vlcera, quæ spontè sua suboriuntur, quale id est quod in manibus saepenumèr nascitur, & à Germanis Das Mittel nuncupatur, nec non alia huic similia, quæcunque corporis parte oriuntur. Oleum ex foliis Althææ compositum, omnes apum & vesparum aculeatos ictus perlanat, illitu. Idem possunt folia per se. Semen in puluerem redactum & cum rore, qui Maio mense excipitur, temperatum, vitilignes & maculas faciei emendat. Radix aut semen in aceto decocta ac calida in ore retenta, dolori dentium auxiliatur: proinde apud Medicos equarios magni nominis & vsus est hæc radix. Hacille. Tumores duri si sint minores tolli tradit Saxonia impositâ radice Althææ maceratâ in aqua ardenti, aut Oxymellicæ.

ALTHÆA PROFVNDE SERRATO siue dentato folio.

Nomine Althææ Thuringiæ accepit Basileus Richnerio Althæam [de qua iam habebam portionem nomine Althææ Thuringiæ Camerarij, ni fallor, inter Cherletianas Basileæ asportatâ] folio molli, hirsuto, vulgaris æmulo, pulchre tamen laciniato, profundè & tenuiter serrato: flore maiuscullo, rubente, stilo apicibus ornato purpureis vel nigricantibus.

An Clusio Pannon. Althæa laciniato folio siue tertia: & Hist. post. Althæa Pannonica 4.

cuius folia sunt incana & mollia, in tres lacinias maiores diuisa: flores etiam paulò minores [quâ in Pannonica] Belgicæ floribus magnitudinè



ALTHÆA FLORE GRANDI ALCEÆ,
Thuringiaca Camerario.

DE hac Althæa flore grandi Alceæ, seu, vt in iconibus ab ipso inscribitur, Althæa Thuringiaca, dubitat Camer. hort. an altera sit fortassis, aut tertia ex Pannonicis Caroli Clusii? Sed dubii sumus & nos, relinquimusque aliis liberum certiora perquirere. An igitur Clusii Althæa

An Althæa
2. aut 3.
Clusii.



Pannonica 2. seu Althæa aliud genus, quod licet foliis totaque reliqua facie cû vulgari conveniat, mausculos tamen flores habere videtur? An verd Althæa Pannon. 3. vel tertium Althææ genus, de quo sub præcedente diximus?

Cal. Bauh. Phyt. Althæa 2. siue flore maiore, Althæa altera

Clusii. Althæa Thuringiaca Camer. Hanc D. Doldius Norimbergâ mittit: ac similem Montpelliero à Io. Henrico Cherlero habemus.

ALTHÆA SPECIES VVLGARI similis.

Althæa Pannonica tertia Clusii hist. post. 2. forma non valdè dissimilis Pannonica 2. (siue flore grandi,) sola in floribus differentiâ, qui minores sunt, vulgari tamen floribus aliquantulum maiores:

ALTHÆA ARBORESCENS

Descriptio



IN arbuscula proceritate excrevit Althæa, ob id arborescens dicta, *Aspiribus* lignosis firmis, cortice tomentoso vestitis: folia Maluarum minorum magnitudine, alias leuiter sinuata, alias Althææ modo, in nonnihil oblongas laciniâs cæsa, candidantia, lanuginosa, pediculis satis longo, villosis, nixa: ex quorum alis ex-

oriuntur flores Maluæ vulgarioris succedæ pares, purpureascentibus vnguibus & ad radicem hirsutis, foliis hirsuto calyce, in quo postea orbiculus circumactorum seminum nigritantum peltula alba contextorum succrescit.

Synon.
Althæa frut.
ex Clusii

Lob. notatur

Alcea cannabina
Clusius reprehenditur

Lobel. Obs. Althæam arborescentem, seu Althæam fruticem Clusii eandem sanè existimat, cum Althæa arborescente in Aduersariis descripta. Clusius autem suam Althæam fruticem seu Althæam fruticantem, à Lobelio Althæa arborea differre scribit, ac ait. Quam Lobelius Althæa arborea nomine exhibet, ea nobis aliquando Mechliniæ semine peregrè missa prouenit, stoloniibus singulis annis Hyeme martescens, &c. Ast semen quod missum Clusio, non fuit Althæa arborea Lobelii, ei enim stolones non pereunt Hyeme: Ea de qua loquitur Clusius est Alcea Cannabina. Scio ipsam perseverare in sua opinione & Cannabinam suam ab ea separare, quam Lobelii putat arboream: an bene iudicent alii, de Cannabina plura sub Alcea.

Idem rursus Lobel. in Icon. plant. diuersas statuere videtur, siquidem eas separat, ac sub diuersis titulis sculptas proponit. Nunc enim Althæam arborem Olbiæ in Gallo-provincia: nunc fruticem Clusii, vocat.

Consulti sibi hac in parte Compiler Hb. Lugd. qu. Clusii Althæam fruticem 1. & Pennæ & Lob. Althæam arboream, eadem tabellâ comprehendit, ac Althæam lignosam Dalechampii cognominat.

C. S. not.

Contra, sed malè. Casp. Bauh. Phyt. Althæam 4. siue frutescentem folio rotundiore itcano: Althæam fruticem Clusii & Lobel. in Obs. Althæam lignosam Dalechampii, ab Althæa sua 5. siue Althæa arborescente folio acuto, Althæa arborea Olbiæ Aduers. separat, ac dicit: Hanc licet Lobelius cum præcedente eandem faciat, diuersa tamen est: utramque habemus: huius enim flores minores, folia etiam non ut præcedentis mollia nec rotunda, sed acuminata &c. quod ex figura facile est colligere. sed si C. Bauh. figuram Lobelii in Aduersariis diligentius considerasset, deprehendisset vique eam non esse b. nam, sicuti plures minus bonas habet. Sunt nobis rami ab ipso Lobelio dono dati nomine Althæa lignosa prope Hircos ad iustam arborem

prouenientis, in quibus folia supèriora in tres partes acutas diuisa, in cæteris non differentia: mihi data etiam per Valerandum Dourez, & ea, quam hæcenus obseruauimus ut mihi persuadè, ac cum ipso Lobelio, cui potius credendum se interpretantem Lob. in Aduers. & Clusii variare autem arborem Althæam etiam in eadem planta ut faciunt cætera Althæa ac Maluæ: Flores in pictura Aduers. ex sicca planta malè picti satis demonstrant non minores fuisse, quàm in Clusii figura: nec etiam si rami ex planta quæ in Protin- cia prouenisset paulò minores haberet flores, ac folia minis mollia, sed paulò rigidiora, hoc faceret differentiam: vidimus quot die quantum immutentur apud nos plantæ, quorum semina ex calidioribus regionibus delata: anni quoque tepus facit mutationem.

Aliquando recepi Lutetiâ à Domino Rasse semen cum hac inscriptione: Althæa frutex, ex quo asseres magni ex Oriente flore rubro: fortè floris colos, præter magnitudinem aliud genus à præcedenti denotat.

Tabernæ Hist. & Ic. in quibus mutata est nonnihil prior icon, vnius plantæ, Althæa arborescens Lobelii, & Althæa arborescens Clusii, duas habet figuras, cum tamen vnica sufficisset.

Tabern. not.

Collegi Stutgardia in horto mense Nouembri semina, quæ Montbelgardi in horto Ill. E.C. fata, ex quibus excreuerat ad altitudinem duorum hominum pulchra sanè arbor quæ hieme domo tecta conseruatur, & folia retinet, & denuò Maio floret. Eam etiam vidi Pfortzemi D. Gündingeri in horto pharmacopœi. Basileæ apud Dominum Zvingerum: Lutetiæ in horto Robini nostri: Quibusdam in locis, teste Lobelio, & feruidiore cælo [quale in marinis Gallo-provincia ad Olbiâ] prouenit tanto fruticat, ut ad sepes constituendas satis sit. Tantùm iuxta urbem Hori- uelam extremis limitibus Valentini regni Mur- ciano finitimi obseruauit Clusius, Martio florentem, an verò perpetuâ esset fronde, cum Hispani- carum stirpem historiam scripsit, ignorauit. Multis autem post annis, ex ea stirpe, quæ à Ioh. de Casabona missa Francofurti ad Mœnum nata est, deprehendit plantam folia non abiicere nisi aliis nouis enatis: ut præterque stirpes perpetuâ fronde videntes facere solent. Frigidioribus etiam locis hyemem perfert.

Locus & Tempus.

ALTHÆÆ SPECIES, QVIBVS DAM AR-
borea altera, vel Bryoniz folio.



ANNO 1602 prouenit nobis in horto Montbelg. foliis rotundis quæ reposita hiemem pertulit & excreuit anno 1602. ad altitudinem hominis, foliis & floribus paulò minoribus: caule ex viriditate lucente: ramis veluti farina aspersis, quibusdam ex superioribus foliis subtus magis candidantibus, quibusdam

quibusdam longiusculis sine laciniiis.

Anno etiam 1602. verno tempore facta, ad altitudinem penè cubiti excreuit, cui folia ex longis pediculis rotunda, coloris Althææ, inferna parte candidiore, caulis tomento candidus.

De hac fortè Clusius hæc scribit. Nata forsitan hæc planta [Althæa frutex 3.] semine, quali me donabat superiore anno Ioseph. à Casabona, Althææ arboris duorum generum appellatione, recens ab ipso in Creta insula collecto. Vni ex amicis quibus communicabam, prouenit planta, quæ sequente anno, valdè adoleuit: nam ramos protulit bicubitales, cortice viridi tectos, cui inaspera est plurima incana lanugo, seu potius tomentum, vt in priore quod descripti genere: folia etiam habet incana, angulosa, & per oras dentata, illis tamen maiora: flores minores, Althææ vulgaris florum magnitudinem vix superantes, quinque foliis cōstantes, instar reliquarum Maluarum, coloris rubri valdè diluti, & ad carneum (si ita vocare licet) inclinantis, multis staminibus ex albo pallescentibus, in oblongiusculo & crassiusculo stilo nascentibus, & vmbilicum occupantibus: floribus defluentibus succedunt plana capita, vt in vulgari Malua, semen in orbem serie quadam distributum continentia.

An Camer. Hort. Althæa arborecens, vel potius fruticosa perennis planta, alia ab Hispanica Clusii, & fortassis eadem cum Prouinciali Penæ, sed non exquisitè picta. Ego Hispanicam Clusii & Penæ eandem puto, diuerfam ab hac, nec hanc etiam ad Tabernæmontani arborecensentem refero, sub cuius inscriptione eam anno 1595. Heidelbergæ communicatam memini.

C. Bauh. phyt. Althæa 6. siue fruticans foliis Bryoniæ petennis. Ramum ex horto Domini Cameratii ad nos misit, inquitis, Doctor Doldius arborecensentis semperiuirentis nomine, cuius etiam fit mentio in horto Cameratii p. 12. Althæa arborecensentis nomine: at ne quis censcat eandem cum Althæa arborem Olbiæ Lobelii.

Mihi missum semen per Dominum Christophorum Schvartz Stutgardia inter semina quæ pro Creticis miserat: Dominus Casabona idem mihi transmisit, cui titulus erat, Althæa arborea 2. ex Candia; foliis ad satis amplam magnitudinem excrecentibus. Argentinx vidi in horto D. Friderici Meier florentem Septembri, Montbelgardi in horto Ill. E. C. prouenit, & reposita sequenti anno floruit Augusto, Septembri, & Octobri, sed semen non maturuit propter Aestatis & Autumnii pluuiosam constitutionem.

ALTHÆA SIDA DICTA QVIBVSDAM.

SIDA nomine planta folium habet circumscriptione Abutili putati, ex rotundo in acutum mucronem desinens, delicatum, molle, villosum, & per ambitum serratum. Flos magnus Maluæ rosæ florem æquat, oblongus in sicca planta, staminibus in medio longis, colore præditus, vt volunt Aduersaria, purpureo, saturatiore quàm Præoniæ aut Maluæ laciæ, aut Cytini, iuxta & in summis cauliculis videntur tempore vindemiarum vtriusculi rotundi, oblongi, phœo, vel pullo colore, Aristolochiæ effigie, prægnantes Smyrniæ semine, aut Milii colore & magnitudine. Radix hortenlis Maluæ: caulis cubitorum duorum.

Dodon. Lat. in folio, Althæa 2. Althææ petegina quædam species apud Belgas tantum hor-

tensis: fructu tuberoso, rotundâ ferè ac globosâ, quinquangulari tamen specie: radice quali Althæa. Nonnulli, inquit, Sidam esse volunt. Sed quia Sida aquatilis est stirps, capite quàm papa-



Figura Lobelii nullam plantæ quam hic tradidimus partem benè exprimit, Lobelium tamen intelligere plantam de qua agimus satis apparet, cum ait, Althæam esse hortensem Dodon. apud quem figura mihi placet.

Nec meliorem Lobelio Tabern. Icon. & Hist. nomine Althææ palustris, [wasser Eibisch] exhibet.

Casp. Bauh. phyt. Althæa 7. siue palustris. Sida Theophrasti maior Bemb.

Nobis prouenit in horto Ill. E. C. Montbelgardi: verum non floruit: aliquot annis reposita durauit, quotannis caulibus exsiccatis.

ALCEA ARBORESCENS GLABRA; ; Keumia dicta.

Fruticis modo assurgit, stolonibus lignosis, cortice nigricante obductis; quali etiam vestiti



prædita sunt vngues purpura floridior, quàm in

uenis maiore, vt Theophr. testatur lib. 4. idèd Sida Theophrasti ad Nymphæam referenda.

Lob. & Peña Adu. Althæa palustris. Cytini flore; Sida Theophrasti exstimata. Obseru, Althæa palustris Cytini flore. Et: Althæa hortensis Dodon. Sida Theophrasti propior palustris planta. Ic. Plant. Althæa palustris Cytini flore, Aristolochiæ vtriusculi.

Lobelius taxat.

Locus

Descriptio

rami, in quos stolones diuiduntur: his nullo ordine distributa adnascuntur folia, angulosa, in paucas lacinias dissecta, in ambitu serrata, superne admodum viridia, inferne quodammodo pallescentia: summis ramis innascuntur flores Rosæ instar ampli, elegantes, quinque foliis cōstantes, albis, quæ multis purpureis venis

Sabdarifæ flore, infecit: ex umbilico prodeunt multa flamina flaua, & stilus albus multifidus. Semen non vidimus. Radix crassa, longa, intus, vi & caulis albicans.

Synonyma

Camer. hort. Alcea arborefcens, cuius duplicem inter icones figuram habet eodem nomine, ac eius Rauuolfium meminisse dicit in suo titiner. nomine, Maluæ arborefcens. Ego autem huc non refeto Maluam arboream Rauuolfii, sed ad veram Maluam.

Sida minor.

C. Bauh. Phyt. Althæa palustris septima altera, flore minore caruleo &c. Eidem Alcea 4. siue arborea. Alcea arborefcens Cameram, quorundam Kefnia Syrorum dicta. Item: Alcea 7. siue Syriaca Lutetia habita à Robino. Hæ mihi vna planta non tres, donec demonstretur discrimen.

In per. Chetmio plantæ Syriacæ dicta species Alceæ, fruticosa, quæ in Syria colitur ad oculorum oblectationem. Chetmio planta Syriaca & Cretica species Alceæ arborefcens. Clus. Althæa frutex 2. Ratum & elegans, seu tertium Althææ fruticans genus.

Locus & Tempus.

Pulchram hanc plantam primum vidi Lutetia in horto loh. Robini hortulani regii. Postea nomine Ketmia in horto D. Frid. Meyer Argentina. Vidi in horto D. Iacobi Zvingeri Basileæ: ac eius ramum habeo cui Frater Casp. Bauhinus ascripsit nomen Ketmia & Sida minoris Theophr. Bembo.

Sida minor

ALCEA PENTAPHYLLI FOLIO vel Cannabina.

Descriptio:



tripartita, sed modò quinque partita, diuersimodè crenata, hirsuta, nigricantia, minus aspera Cannabinis, sapore vilicida. Flores interdum singuli, interdum bini ex longis pediculis vel ramulorum potius extremitatibus, Alceæ vulgaris similes, minores tamen, quibus exidentibus succedunt capitula, qualia in Malua vel Alcea, parua, foliolis obuoluta, in quibus summa Maluæ culpa, nigra: Radix perpetua, cuius pars vna maior, alia minores, extrâ & intus alba, gustu admodum vilicida.

Synonyma.

Quamuis Alceæ alteri satis conueniat Alceæ descriptio apud Diosc. & Plinium, magis tamen videtur Celsi o. conuenire Cannabis syluestris.

Camer. hort. Alceæ Cannabina, secundum non-nullos Cannabis filu. Diosc.

Lob. & Pers. Aduer. & Icon. Plant. Alceæ fruticosior Pentaphylli folio.

C. Bauh. Phyt. Alcea 6. siue Cannabina, Cannabis filu. Dioscoridis.

De hac Clus. in Hist. & Hist. post. in fol. scribit, nomine Althææ arboreæ Lobelii. Quam doctus inquit, Lobelius Althææ arboreæ nomine exhibet, ea nobis aliquando Machliniæ nata semine peregrè misso, feliciter prouenit, atque ex radice crassa lentæque, qualis in Althæa vulgaris, duriore tamen & quodammodò lignosa summâ parte, aliquot stiones protulit humanæ proceritatis, qui adueniente brumâ marcescebant, singulis deinde annis nouo vere plures protudebant: flores Augustò demum producentes, semen Septembri: quo à ventis excusso & deciduo, aliz etiam stirpes spontè renascebantur. Quod verò non sit Lobelii Althæa, quod sibi falsò pertrahet Clusius, vel ex eo manifestum sit, quoddam in Lob. Althæa stiones non marcescunt, nisi tota planta simul pereat. Et licet ab hac Alceam fruticulosa cannabino folio capite sequenti separet, ej tamen allentiri non possum, quamuis quod de flore maiore scribit nostræ plantæ non conueniat. Ceterum Icon, quàm proponit Clusius, est eadem cum iconè Cannabinæ Alceæ Lobelii.

Nata mihi est in horto Ill. E. C. Montbelgardi, ex semine Patauio à Cl. viro D. Iac. Antonio Cortulo misso, nomine Cannabis syluest. quorundam: addente, nec Altheam, nec Alceam esse. Semen maturat Augustò & Septembri, quo tempore florentem adhuc obseruavi. Missum est & eius semen Stutgardia nomine Alceæ Venetæ. Primum autem videri mihi est in horto D. Cortulii.

ALTHÆA THEOPHR. FLORE LVTEO, quibusdam Abuilon.



Cum Alceæ vulgaris de mollitie palmâ certat, quod Abuilon vocat, radice parua, albâ, fibris aliquot adnatis donatâ, subdulci: caulis foris tomento molli totus est oblitus, pingue quid attritantis manibus alinens, incanus: cortici, qui facile delibratur, subest lignum Saligni instar, candidum & durum, medullam succulentam viridem continens. ex caule folia nullo ordine nascuntur, pediculis palmaribus, & minus lata, circinatæ rotunditatis, nisi in mucronem acutiorem desinerent, lanugine incanâ & insigniter molli obducta: ex horum alis rami producuntur: indidem flores itidem prodeunt, Caryophyllatæ aquaticæ, interne & croceæ, striati è quinque foliis compositi, medium occupante apiculorum

Descriptio:

radice duntaxat expressus. Ipsa verò decocta per-
nionibus occurrit. Albæ fauce epiphora sedat
fontillitus; aluminis paucis admisso ignem fla-
crum, sine oleo trita scilicet, adustus medetur. Et
contra eruptiones papularum, coctâque eadem
contra vlcera que serpunt, illinitur, & alopecis
cruda, & vlceribus quæ in capite manant. Succus
eius cum melle naribus indatus caput purgat.
Coquitur & cum lenticula addito aceto, vt ven-
treum molliat. Validius cocta fluxiones stomachi
sistit, & ventris.

Galenus vero auctor succus betarum tergendum habet manifestam ad eam, ut ventrem ad excernendum incitet, & stomachum interdum mordicet, præterim quibus natura sensu exactione præditus est: ob idque edulium id stomacho est noxium, si largius sumatur: corpori autem ab ipsa, ut ab aliis oleis, paucum alimentum accedit. Verum obstruendum per Haluam magis aperit, & multo magis si cum Sinapi aut omnino lactem cum aceto mandatur. Lienosis item eodem modo sumpta est vile medicamentum. Et, beta nitrofa facultatis particeps est, quam tum digerit, tum extergit, & per nates purgat. Cæterum cocta nitrofitate omnem exiit, si que leuiter discutit. Porro ad detergendum digerendumque validior est beta alba: nam nigra adiunctum habet quidpiam adstrictionis, & magis in radice quam in aliis partibus.

Ex Simeone Sethi beta succus mediocriter abstergit, ventrem etiam ad effluxum procat, & stomachum aliquando vellicat, eorum præsertim, qui hûc valdè sensibilem habent. Quapropter edulium est stomacho infestum, si plurimum comeditur. Exiguum est eius alimentum sicut cæterorum olerum. Vilis verò est ad iecoris obstructions cum aceto comesta. Pari modo si edatur, & lienis obstructionibus bonum fit medicamentum. Constat autem beta ex contrariis facultatibus: luccus enim eius calidus est, ventrem confringit, & sitim adfert. Eius verò corpus crassarum partium, flatuosum, & concoctu difficile, & frigidum, ventremque sistit : maxime si aqua in qua eorum est, subinde abiciatur.

Ad betarum cocturam vinum & piper expeti
scribit Martialis his versibus;

Vt sapiant fatuae fabrorum prandia Beta

O quàm sæpè petet vina pipérque coquus.

Præterea eiusdem herbari radicibus conditis v-
tuntur. Conditur autem herbari in aceto hac ratio-
ne, cum foliis & radicibus integrum eradicandum
herbari olus, aqua deinde bene, necnon etiam cul-
tro mundandum : In aqua ex herbis ebuliendum,
& transfundendum in particulas secandum, posito ve-
to in vase aliquo figulino, aqua reiecta, sale cerui
vel granis Iuniperi condies, his superinfuso ac-
eto, cyato vho atque altero pleno, pro herbari quan-
titate.

Nihil in culinis beta hortenſis frequentius eſſe teſtatuſ eſt Traquus. Nam in cibo vſurpatur. Temperamento calida eſt beta, maximè quod ad radicem actinet, id quod hinc maniſeſtum ſit, cum enim ſuccus naribus excipitur, adurit, & ſternutamentum prorit. Beta in cibo ſicut Spinachia parata ſaciliſſimè eſt concoctionis, & iſque inprimis conducit qui ſtomachi imbecillitate laborant. Beta hortenſis plantulæ recentes cum radicibus leviſſime bullit, & ex aceto poſtea deſcuratæ ſibi appetentiam adferunt, ſitum compellunt, choleſtam in ventriculo reprimunt. Debet verò eiuſmodi cibus æſtate potiſſimum vſurpari.

Bayrus emplastro è radicibus Betæ curat acho *Emp 1 affr*
res.

BETA CRETICA SEMINE SPINOSO.

BEtæ Creticæ folia nostrati non multum diffimilia; nisi quod vix ad eam magnitudinem



lati, quorum vnique *semen* inest vnum oblongum, pellicula ruffa tectum, medulla alba. *Rami* multi cubitales vel minores *ex radice* annua supra terram se extendunt.

Si hæc non iam vsurpasset nomen ætæ, ad La-
patham vel Spinacium potius referrem. Calp-
Bauh. phyt. ætæ 6. siue Cretica femine aculeato.
Ætæm Creticam femine spinosâ vidi Basilea
1595. Augusti fine femine maturo in horto Do-
mini Iacobi Zvingeri, quod attuli sterendum
Montbelgardi in horto E.C. quod prouenit. Ac-
ceptotiam à D.Phil. Seb. Sprengero nomine ætæ
spinosâ Candia.

BETA LATICAVILIS MONSTROSA.

Admiranda setæ *ααπλιν* @, quam H. Lug-
dun. picturâ exprimere curavit, cuius caulis
est quatuor digitos latus, circa quem paria sunt
folia, & quem totum semen operit, sed in eius fa-
stigio ita densum: vt caulis prospectum adimat.
Aliquando propè D. Ramberti oppidulum Allo-
brogum in pingui quodam prato talem vidit
Dalechampius siluestris Cichorii caulem.

Č. Bauh. phyt. beta 7. siue lato caule.

Nos quia in monstrosis plantis numeranda est, eam merito à præcedentibus sepatauimus; nec pingendam quidem esse duximus.

SPINACHIA MAS ET FOEMINA.

FAtuo gustu tota est planta: *radix tenuis, al* Descriptio:
ba, folia Dentis Leonis, latiora, profundè si-
nuata, minus tamen crebris lacinii, pinguiscula,
& farina tenui Atropicis modo respersa: caules
siftulosi, striati, in alas diuisi: flores in alis & cau-
libus, à medio ferè vsque ad fastigium, creberrimi

Description

fi, ex herbido purpureo: *femen aculeatum*, & vt nomen docet, spinosum: aliis Lentis modo compressum, orbiculatum & innocens.

Veteribus:
incognitum
olus



Hoc olus Veteribus (quod mirum est) incognitum fuisse videtur, cum de eo nihil illi, quod legatur, literarum monumentis tradiderint: vel forsitan quod cibo, quam medicinz potius natum esset, nec quicquam illustre fortitum, ob id ingenii segnitie obscurum, vel quod, vt conijci potest, nondum in vsum vulgi, literato-

rūmque cognitionem eo seculo venerat, qui eorum quæ suā fuerunt memoriā, prorsus intactum nihil intentatumque reliquerunt. Non enim silentio tam frequens olus abolere voluissent, sed potius celebratum in lucem prodere. Monspelii præceptor Rondeletius, alitum Veterum vocabat, quæ opinio mihi non penitus displicet.

Blitum Veterum
Olus Hispanicum

Seutlomalache Ruell.

Seutlomalache Ges.

Sexus Spinachia

Genera Spinachia

Trago Hist. Germ. & Lat. vocatur Olus Hispanicum, Spinachia altera seu vulgaris, & Spinachia silvestris. Seutlomalachen, inquit Ruellius, recens Græcia fecit olus, quasi dicas Maluaceam betam, quod, vt reor, parentum adulterio natum existiment, Veteribus inaudium, fortè quod figura, & dēicūlato seminis habitu betam, & molitia Maluam mentiretur. Sed fortè Seutlomalachen, ait Gesn. hort. hoc est, medix inter betam & Rumicem natura; potius quàm Seutlomalachen appellandum. Spinachiam manifestum habere sexum scribit Scaliger. Coniicio autem marem ab eo intelligi illum, cuius semen spinosum est: fœminam sine spinis. Ab his non penitus dissona sunt, quæ apud Camer. hort. & Hist. Lugd. leguntur. Spinachia genera duo, sativum, & silvestre. Satiui item duo, mas & fœmina, Mas semen fert, fœmina floret quidem, sed seminis infœcunda sterile scit.

Spinachia describitur & pingitur à Lob. & Pen. Adu. Obs. Ic. plant. Dod. Hist. Lugd. Fuch. qui & Spinacium olus vocat. Brunfelsio. Camer. in Hort. & Hist. germ. Matth. qui Spanachiu inscripsit. Tabern. Ic. & Hist. Amato, atque Matthiolo.

Rumex domesticus
Lapath. hortense
Amato & Casalp.
Hallucinatione

Boulapachon non est

Non est Blitum
Hippocratis

Amatus quidem domesticum Rumicem siue hortense Lapathum, Spinachiam nostram esse sibi falsò imaginatur, quod & Casalp. sentire videtur. Quare meritò Robert. Constant. eum hallucinari scribit dum sine autoritate aut ratione hoc contendit: Constantino in eo adstipulantibus Grapaldo & Matthiolo.

Falluntur & ii, qui Plinii Boulapathon apud Dodonæum esse existimant: Lapathi siquidem genus Boulapathon est: radicis tantum altitudine ab aliis diffrens, vt ipse refert. Nec quoque Hippocratis Blitum est, quod veluti linguam esse scribit lib. 2. de morbis mulieb. Nam inter subditia

istud refertur, quæ rubrum fluxum muliebrem reprimunt ac sistunt. Talis autem Spinachia facultas haudquaquam est adstrictione omni carens. Nec est Chrysosolachanum, vt vult Monardus.

C. Bauh. Phyt. Lapathum hortense alterum, seu Spinachia femine spinosa. Idem apud Matth. Atriplex 2. Lapathum hortense alterum, Spinachia mas quibuldam. Item Phyt. Lapathum 4 siue hortense alterum, seu Spinachia sterilibus. In Matth. Spinachia 3. sterilis.

Spinachia siue Spinacia & Spinaceum olus, Ncmina quod Latini appellant, σπινάκιον recentioribus linguarum Græcis dicitur, ab Arab. & Serap. Hispanac: à Germ. Spiner oder Spineisch: belg. Spinagie: Gall. Espinoches ou Espinars: It. Spinacci & Spinace: Hesp. Spinacen: Angl. Spinache: Boh. Spinak:

Spinacia quidem & Spinaceum olus ab insigni feminis spiculorum nota, quod tam glabra, & mollis herba semen in spinas occalescat. Σπινάκιον verò sumpto nomine à raritate, quod raro illo medici vterentur. Quibus hæc vocabula displicent, Atriplicem Hispanien sem vocant, Mauritani Hispanach, id est, Hispanicum olus, fortasse quod inde primū duxerit originem, ad ceteras tandem nationes translatum: quidam Seutlomalachen.

Spinachiam colimus Montbelgardi in horto E. C. marem & fœminam. Passim in hortis feritur nullum solum respiciens, cum Martio & alio tempore, tum Septembri mense, exiens septem à satu diebus, folio primū triangulo, molli, mox intubaceo, non horrens Hiemis frigora, quæ si iniqua nimis, Iuglandis foliis confervantur: vt Vere cibum suppeditet, quo tempore semē profert: Hieme enim restat: Martio verò satum intra duos menses perficitur, hinc Iunio & Iulio flores & semen edit.

Locus & tempus.

Cultura

In culinis, teste Trago, nihil ferè frequentioris est vltus, pulvis ex Spinachia recenti confectis. Temperamento illa frigida & humida est, cibo & medicinz accommoda. Pultes Spinachia aluo astrictiori profunt, potestque id oleris in omni pene ægritudine cibo deligi, nam meo iudicio inter omnia culinaria olera Spinachia laudatissima est, & gratissima. Spinachia aluum emollit, gutturis asperitati medetur, & aridæ tussi confert, teste Constant. Succus & aqua distillata Spinachia pota, calorem restinguit, stomachi rosiones mitigat, & lac elicit. Spinachia cataplasmatibus instar stomacho & epati imposita, inflammationibus illarum partium prodest, doloremque tollit. Eadem ictibus scorpionum, & aranearum imposita succurrit. Spinachia primæ refrigerantium & humectantium classis, nec omnino vacat nitro qualitate Camer. Aluum emollit, melius Atriplicem suppeditat alimentum, sed aluo parum hærens facile exigitur. Flatus colligit, & vomitiones con- citat, nisi excrementitius humor abiciatur: ventrem decocti iure proluat. Citra aquam coquitur hoc olus, quod magnam vim humoris inter coquendum remittat, & veluti proprio contentum iure alienum aspernetur. Nibitur eius succus ad scorpionum & aranearum ictus, ac etiam vulneri illinitur: quinetiam cocta lenit exasperatas fauces: sed nauseam facile parit, nisi Zinzigere, aut alio consimili condiatur: Recipitur & inter cruda acetaria recens enata.

vtus

Tempus

Vomitiones

SPINACHIA SEMINE NON PVNGENTE;


Folio maiore rotundiore.

Longè maior maioribusque est foliis, quàm Descriptio Spinachia vulgaris, nec non rotundioribus, ceterisque;


Beta candida.



Beta nigra.



Beta radice rubra crassa.



Tom. 11.

Descriptio

Beta nigra
Beta rubra
Beta crassa
Beta species

Genus recensius externae faciei necessitudo intercedit. Verum cum & ipse emollientes sint & holeraceae hinc collocare volumus.

Beta quam ex radicis & foliorum argumento candidam vocat, radicem lignosam habet minimi digiti crassitudine, mediocriter longam, candidam: folia dilutius videntur, Lapathi, crassa & succulenta, sapore nitrofo: caulis duos cubitos altus, aut etiam maior, gracilis, striatus, multis alis concavus: in quibus longa serie fuscis exigui, ex foliorum alis, apicibus luteis constantes, quinis calycem foliis obvallati: semen rotundum, & crispis superficie alperum, fuscum. Huic per similes Nigra dicta, foliis brevioribus, atrovirentibus. Itemque & ea quae vulgi Rubra est, foliis rubentibus. At Rubra alia non tantum foliorum discrimen agnoscit, sed & radice quae ventriola, Napi instar, intus forlucque sanguineo colore saturata est. Reperitur & Lutetia à iam dicta radice buxà foliis differens. Ornant praeter has Ill. E. C. Virt. hortum duae aliae: Una albis, latissimisque costis ornata: altera vero rubris, quarum semen Argentinam missum, quae facile percunt.

Dioscorides & Galenus duo genera tantum faciunt, nigram & albam.

Theophrastus candidam sapore praestantiori esse tradit, pauciorumque seminum, quam Siculam quidam appellauerint: caule carnosio: radice singulari, & carnosâ, longâ, crassâ & rectâ, vti Raphani: suavi, ut crudam nonnulli mandant. Siluestris etiam meminit in genere Carduorum aculeatis foliis non constantis.

Beta hortensiorum, inquit Plinius, lenissima est. Eius quoque à colore duo genera Graeci faciunt, nigram & candidam, quam praefertunt, parvisimifolium, appellantque Siculam, candoris fanè discernere praefertentes, ut Laticam. Nostri Betae genera faciunt, Vernalis & Autumnale, à temporibus sativis: quamquam & Junio feratur. Et mox rursus, Mira differentia si vera est, candidis foliis alios moticè, nigris inhiberi. Item lib. 20. cap. 8. Esse & Betam siluestris idem scripsit, quam Limonium [ut Theophr. vocari tradit, & Neuroidem, multò minoribus, tenuioribusque foliis, ac densioribus, vnde semper caulem. Sed hanc Diosc. non novit, Limonium à Betis valde distinguens. Et Galenus siluestris non esse dicit, nisi quis Lapathum seu Runcem ita nominare velit. Quibus verbis Galenus tam plausibilem ac receptam Platonis sententiam in Timæo ambiguum nobis effecit, satius omnes plantas olim fuisse frax, neque à se ipsis cultu differre. Cum enim, inquit Scaliger, Lapathum à nobis multò studio huius rei gratia cultum, nunquam induerit Betae faciem, aut saporem, etiam nunc hæremus in illius sententia, non omni plantam mittem, fuisse prius agrestem.

Ceterum, videas hodie qui se peritissimos vocari cupiunt, qui quid inter sit inter Betam & Blitum, nec legendo in libro, nec in horto oculis mandue contrectando discernere queant. Apud Monachos in Messem ita scriptum habetur. Herba quædam [Blitum Indicum] habet folia Betae, siue, quod idem est, Bliti. Hos igitur Betam cum Blito confundere dubitationi nullus est locus.

Porro variè varias siluestris Betae nomine inscribunt plantas. Nam Limonium Tragi, quod Germanos Betam pratensem [Wisen Wangolr] vocare scribit, est Trifolium palustre Dodonæi, de quo lib. 17. diximus. Beta siluestris speciem facit Dodon. Lampsanam: eandem Lobelius Lampsanam nomine depinxit. Betam silu. bistortam esse Gesner. in cat. pl. iudicat. Sunt etiam, qui Betae silu. speciem Pyrolam facere non verentur. Alii, ut Lonic. confundunt Betam sylu. [Limonium Tragi] cum Pyrola altera. Myosotis, Auricula muris, ut tradit Gesn. in cat. pl. existimatur à Medicis Germ. Beta siluestris. Aliis, ut Casalp. Beta silu. Plantago [maior] vocatur. Nonnullis, teste Anguill. Plantago aquatica. Gesner. adhuc in cat. pl. Beta silu. nomen Potamogeto adscribit. Lapathum ait Galenus, licet appellare Betam agrestem. Sed & Carduum pratensem multi Betam silu. faciunt.

Betam primam nobiscum appellant candidam Matth. [qui tamen hoc titulo nigram proponit, ex transpositione & incuria Typographi, & ex Matth. H. Lugd.] Trag. qui hanc agrestem seu er-

Dioscor. & Gal. genera

Candida
Theophr.
Sicula

Ex Plinio

Beta anagra
& candida
SiculaLimonium
Beta silu.Plin. reser.
naturBetae & Bliti
nisi plura
merum

Blitum

Trifolium
palustre
Lampsanam
Bistorta.
Pyrola
Pyrola dia
vera.

Myosotis

Plantago
Plantago
aquatica
Potamogeto
ton.Lapathum
Carduus
pratensis
Beta crassa
dida

M m m a

ratiam Betam censet:) Fuchf. Dod. gall. & Lat. in fol. Cord. in Dioscor. Lacun. Hist. Lugdun. & Schuyverghfeldius. Betam album Turn. Gelsner. hort. Lonic. Lob. Obs. & Ic. plant. Hort. Luf. Camer. hort. Epit. & Hist. Matth. germanic. Betam alteram. Csalpinus. Betam Brunfels. & Tragus pingens. Betam 1. siue albam Csalp. Bauh. ad Math. in Phyt. 4.

Beta nigra Beta nigra nominatur à Matth. (qui ut dictum hoc nomine albam pingit.) Trag. (apud quem perperam siluestre Beta genus creditur:) Fuchf. Dodon. gall. Gelsn. hort. Lacun. Castor. Histor. Lugd. (quæ cum Matth. eam transposuit, æ candidam dicit:) Csalp. Bauh. phyt. & hort. Lusatiz. Schvv. vocat Betam nigram à foliorum colore ex obscuro magis virentium: Betam vulgiorem: Betam rubram Dod. Lat. in fol. Lonicerus. Betam Taberna.

Beta rubra Rubra meminerunt Brunfels. Tragus. Hanc inscribit Lob. Obs. Ic. plant. & Hist. Lugdun. Betam rubram vulgiorem, Betam 2. siue rubram vulgarem. C. Bauh. phyt. & apud Matth. pro Beta 2. seu nigra pingitur.

Beta rubra Beta rubra radice crassa ea est, quam Matth. nomine Rusa ita exprimit: In Germania tamen habetur & Rusa, non modò foliis, sed etiam radice, quæ illi Raporum oblongorum magnitudine extuberat: colore aded rufescente, ut eius succus viuum sanguinem referat. Hanc Lob. Obs. & Icon. Cast. Gelsn. hort. cui & Scutostaphylum: Camer. hort. Epit. & Hist. Matth. Germ. & Schvv. cui etiam Rapum rubrum dicitur, Betam rubram vocant, Dodon. gall. & Lat. in fol. Betam nigram Romanam: C. Bauh. phyt. & apud Matth. Betam 3. seu rubram radice crassa: Corn. in Diosc. Rapum satium rubrum.

Hist. Lugd. rectè vnicam descriptionem duabus figuris accommodat, non enim ex ab inuicem differunt, licet diuersis titulis inscripserit. Vocat nunc Betam Erythrorhizon Dodonæ, nunc Betam rubram Matthioli. Fuchsius, inquit ea, inter Raporum genera recenset, & Rapum rubrum vocat, cum tamen Rapi species non sit.

Beta lutea Beta lutea traditur à Camer. hort. Est hæc ea, quam Gelsn. hort. flauam nuncupat, Csalp. Betam 4. radice buxæ. C. Bauh. Phyt. Betam 5. siue luteam.

Compositum Manifestè veritati contrariatur Corn. qui solum ex radicibus, & non etiam ex foliis Betam albam & nigram dignosci posse falsò contendit. Hoc quidem facillè verum foret, si omnes in re herbæ, ut ipse, cæcuerint.

Dorsh. rad. betæ Dorsthenium Betam nunquam gustasse, ne dicam vidisse, credimus. Brassicam siquidem pro Beta monstrat.

Nomina linguarum Quod olus Græcis simpliciter *πιδαν*, vel *πιδαν* vocatur, id Latinis Beta dicitur: Arab. *Deika* & *Celb*, Hebr. *Teradin*, Germ. *Mangolt*/ *pieffen*/ *Römischföhl*/ *puessföhl* & *Romgras*: Belg. *Biete*: Gall. *Bete*, *portee*, *reparee*, & *lotte*, Ital. *bratola*, Hisp. *Aselgar*, Angl. *Betis*, Bohem. *Manholt*, Hung. *Cesla*. Cum adiectione verò, Gr. *λευκή* vel *αυτή* *πιδαν*, Lat. Alba vel rubra aut nigra Beta, Germ. *Rot oder weis mangolt*: Belg. *rotte oder Koodde*: Hæc: Gall. *blanche* vel *rouge bete*, Angl. *white* vel *redde Betis*. Particulatim verò Beta radice rubra, crassa, Græcis *πιδαν* *ερυθρη*. German. *Rott Mangolt*/ *Rott Rüben*, quasi Rapum rubrum dicas, *Reyckisch Rüben*. Rapa Bauuatica, sortè quiddam copiosa inibi aut crescant, aut aliis præstent, & *Rotte Sodarwürgen*. Gall. *des Benders*, *ügers*, Ital. *Bietola rossa*. *πιδαν* porro Græci ab impillu

nominarunt: etenim cultus ratione quadam inclementum capescit arboris, neque vili hortensium latitudo foliorum maior. Betæ nomen sibi adscribit, quoniam figuram & literæ græcæ dum semine turget, referre videtur. Nam summitatem in cacumine reflexam obtinet. Id quod testatum nobis reliquit Lucius Columella in suo carmine de cultu hortorum ita capens:

Nomine tum Graios, seu littera proxima prime,
Pangitur in cera docti macerum magistri:
Sic & humo pingui ferrata cuspis ista
Deprimitur, folio viridis pede candida Beta.

Et quamuis Sicula cognomèto Beta solummodò candida veniat, ut Theophr. & Plin. memoriz prodiderunt, tamen nunc extritè literæ vnâ, ferè omnibus nostris sæculi Medicis Sicula, omnis Beta nominari cepit.

Betam ex cultu arborescere scribit Theophrastus, germinare radicem à latere: Iulio, ut cætera, quæ Seruentis postera vocent, ferendam: æstate sexto, hieme decimo die erumpere: ex semine paucas provenire anno primo, sed longo tempore pòst pullulare, anno sc. sequente & tertio, eas aquis salis inuari, & iis rigatas meliores effici.

Montepelii colunt Betas valdè magnas albas Locu & nigras, sed vbique passim in hortis feruntur. Rubra verò radice crassa multùm in Germania prouenit: Omnes recensitas differentias Montebelg. in orto Ill. E. C. V. Viremb. quondam colebant.

Beta nigra, ut scribit Dioscorides, coquitur cum Lenticula, ut ventrem sistat, quod magis radice eius præstat (genus id cibi *πυραγδίου* Veteres appellauerunt.) Candida aluo utilis est. Vtraque tamen propter nitrosum humorem, quem habet in se, noxiè est succi. Vnde succus earum cum melle naribus inditus, caput purgat, aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radicis & foliorum, furfures lendè que deterget: perniciosè fortu mitigat. Crudis foliis vitiliginis nitro antea perficietas, alopeciarum inanitates, scalpando prius exasperatas, atque depascentia vlcera illini prodest. Eruptionibus papularum, igni sacro am bustique cocta medetur.

Plinius de betis, ut de oleæ & alimento hæc tradit. Vfus iis & cum Lente ac Faba, idè quæ qui oleis, sed præcipuus vitiliginis excitetur acumoniæ Sinapis: Medici innocentiorè quàm olus esse iudicauerunt. Quamobrem appositum non nemini degulare etiam religio est, ut valdis potius in cibo sint. Gemina iis natura & oleis, & capite ipso exilientis bulbi. (Nam cum foliis humi sparsis caulis ex illorum medio prodire incipit, eius caput gustu & callosa quadam firmitate bulbo simile esse videtur.) Et paulò pòst, Mira differentia si vera est, candidis solui aluos, modicè nigris inhiberi. Et cum arassica corumpitur in dolio vini sapor, odore betæ foliis demersis restitui. Sed idem alio in loco vsum medicum ex beta præscribit, tum ea quæ Dioscorides, tum alia recensens. Nec beta sine remedio est, vtraque. Siue candidæ siue nigræ radix recens & madefacta, suspensa funiculo contra serpentium morsus efficax esse dicitur. Candida beta crassa, & cum Allio crudo sumpta, contra tineas. Nigræ radices, ita in aqua cocta portiginem tollunt, atque in totum efficacior esse traditur nigra. Succus eius capitis dolores veteres, & vertigines, item sonitum aurium sedat, insusus iis: ciet vrinam. Medetur dysentericis injecta, & morbo re-gio. Dolores quoque dentium sedat illius succus: Et contra serpentium ictus valet, sed huius radice

radice duntaxat expressus. Ipsa verò decocta per-
nionibus occurrit. Albus succus epiphoras sedat
fronti illitus: aluminis pauco admixto ignem fa-
citur, sine oleo trita scilicet, adustus medetur. Et
contra eruptiones papularum, coctâque eadem
contra vlcera quæ ferpunt, illinitur, & alopecius
cruda, & vlcibus quæ in capite manant. Succus
eius cum melle naribus inditus caput purgat.
Coquitur & cum lentacula addito aceto, vt ven-
trem molliat. Validius cocta fluxiones stomachi
sistit, & ventris.

Vires ex
Galen.

Galeo verò auctore succus betarum tergendum
vim habet manifestam adeo, vt ventrem ad ex-
cernendum incitet, & stomachum interdum
mordicat, præsertim quibus naturâ sensu ex actio-
re præditus est: ob idque edulium id stomacho
est noxium, si largius sumatur: corpori autem ab
ipsa, vt ab aliis oleis, paucum alimentum accedit.
Verum obstructum hepar Maluâ magis aperit,
& multo magis si cum Sinapi aut omnino sal-
tem cum aceto mandatur. Lienosis item eodem
modo sumpta est vtile medicamentum. Et, beta
nitrosæ facultatis particeps est, quâ tum digerit,
tum exterget, & per nares purgat. Cæterum cocta
nitrositatem omnem exiit, si que leuiter discuti-
ens. Porro ad detergendum digerendumque
validior est beta alba: nam nigra adiunctum ha-
bet quidpiam adstrictionis, & magis in radice
quàm in aliis partibus.

Obstructio
hepatis

Ex Simeone
Sethi

Ex Simeone Sethi beta succus mediocriter ab-
stergit, ventrem etiam ad effluxum proritat, &
stomachum aliquando vellicat, eorum præsertim,
qui huc valde sensibilem habent. Quapropter e-
dulium est stomacho infestum, si plurimum co-
medatur. Exiguum est eius alimentum sicut cæ-
terorum olerum. Vtilis verò est ad iccoris ob-
structiones cum aceto comesta. Pari modo si eda-
tur, & lienis obstructio nibus bonum fit medica-
mentum. Constat autem beta ex contrariis fa-
cultatibus: succus enim eius calidus est, ventrem
constringit, & sitim adfert. Eius verò corpus cra-
ssum partium, flatuosum, concoctum difficile, &
frigidum, ventremque sistit: maxime si aqua in
qua coctum est, subinde abiciatur.

Obstructio
lienæ

Corrigentia
Betæ

Ad betarum cocturam vinum & piper expeti-
scribit Martialis his versibus:

Vt sapiant facie fabrorum prandia Beta

O quam sape petet vina pipérque coquus.

Beta con-
denda ra-
tio

Præterea eiusdem betæ radicibus conditis v-
tuntur. Conditur autem beta in aceto hac ratio-
ne, cum foliis & radicibus integrum eradicandum
betæ olus, aquâ deinde bene, necnon etiam cul-
tro mundandum: In aqua ex hoc ebulliendum,
& transuersim in particulas secandum, posito ve-
rò in vase aliquo figulino, aquâ reiectâ, sale carui
vel granis Iuniperi condies, his superinfuso ace-
to, cyato vno atque altero pleno, pro betæ quan-
titate.

Temperat.

Nihil in culinis beta hortenſis frequentius esse
testatus est Tragus. Nam in cibo vsurpatur. Tem-
peramento calida est beta, maxime quod ad radi-
cem attinet, id quod hinc manifestum fit, cum e-
nim succus naribus excipitur, adurit, & sternuta-
menta proritat. beta in cibo sicut Spinachia para-
ta facillimæ est concoctionis, iisque inprimis
conducit qui stomachi imbecillitate laborant. be-
tæ hortenſis plantulæ recentes cum radicibus le-
uiter bullit, & ex aceto postea deuorata cibi
appetentiam adferunt, sitim compescunt, chole-
ram in ventriculo reprimunt. Debet verò eius-
modi cibus ætate potissimum vsurpari.

Bayrus emplastro è radicibus Betæ curat achro-
res.

Emplastrum

BETA CRETICA SEMINE SPINOSO.

Betæ Creticæ folia nostrati non multum diffi-
milia, nisi quod vix ad eam magnitudinem



quantum ob-
seruare licuit,
proueniant, cæ-
teroque sagis
carnosa, per ex-
tremum rotun-
da, aut saltem
obtusâ, iuxta
pediculum an-
guustum non ni-
hil ala: a: *flosculi*
parui, lutei, spi-
cati in ramorū
extremitatibus:
eibini circa cau-
lem nascuntur
ex foliorum al-
lis in tres spi-
nas radiatas de-
sinentes, costis
pulchris donati,
transuersisq;
cancellis reticu-
latis, quorum vnique *semen* inest vnum obloñ-
gum, pellicula ruffa tectum, medulla alba. Rami
multi cubitales vel micæ & sex radice annua su-
pra tetram se extendunt.

Si hæc non iam vsurpasset nomen betæ, ad La-
patham vel Spinachiam potius referrem. Casp.
Bauh. phyt. beta 6. siue Cretica semine aculeato.

Lapathum.

Betam Creticam semine spinoso vidi Basilæ
1595. Augusti fine semine maturo in horto Do-
mini Iacobi Zvingeri, quod attuli ferendum
Montbelgardi in horto E.C. quod prouenit. Ac-
cepi etiam a D. Phil. Seb. Sprengero homine betæ
spinosa Candia.

Locus &
tempus

BETA LATICAVLIS MONSTROSA.

Admirandæ betæ *manxau* quam H. Lugd. Descriptio
dun. picturâ exprimere curauit, cuius caulis
est quatuor digitos latus, circa quem parua sunt
folia, & quem totum semen operit, sed in eius fa-
stigio ita densum: vt caulis prospectum adimat.
Aliquando propè D. Ramberti oppidulum Allo-
brogum in pingui quodam prato talem vidit
Dalechampius siluestris Cichorii caulem.

C. Bauh. phyt. beta 7. siue lato caule.

Nos quia in monstrosis plantis numeranda
est, eam meritò à præcedentibus separauimus;
nec pingendam quidem esse duximus.

SPINACHIA MAS ET FOEMINA.

Fætu gustu tota est planta: radix tenuis, al-
ba, folia Dentis Leonis, latiora, profunda si-
nuata, minus tamen crebris lacinis, pinguiscula,
& farina tenui Atriplicis modo respersa: *candies*
sistulosi, striati, in alas diuisi: flores in alis & cau-
libus, à medio ferè vsque ad fastigium, creberrimi
M m m m 3

Descriptio

fi, ex herbido purpurelcentes: semen aculeatum, & vt nomen docet, spinosum: alias Lentis modo compressum, orbiculatum & innocens.

Veteribus
incognitum
olus



rumque cognitionem eo seculo venerat, qui eorum quæ suâ fuerunt memoriâ, prorsus intactum nihil intentatumque reliquerunt. Non enim silentio tam frequens olus abolere voluissent, sed potius celebratum in lucem prodere. Monspelii præceptor Rondeletius alitum Veterum vocabat, quæ opinio mihi non penitus displicet.

Blitum Ve-
terum
Olus Hispani-
cum

Seutloma-
lachs Russi.

Seutlola-
patius Gœf.

Genus Spi-
nachia

Genus Spi-
nachia

Genus Spi-
nachia

Rumex do-
mesticus

Lapath hor-
tense

Amarus &
Cesalp.

Callisacina-
tur

Boulapathos
non est

Non est Bli-
tum

Hippocratis

Trago Hist. Germ. & Lat. vocatur Olus Hispanicum, Spinachia altera seu vulgaris, & Spinachia siluestris. Seutlomalachen, inquit Ruellius, recens Græcia fecit olus, quasi dicas Maluaceam ætam, quod, vt reor, parentum adulterio natum existiment, Veteribus inauditum, fortè quod figura, & dècuculo seminis habitu ætam, & molitia Maluum mentiretur. Sed fortè Seutlola-pathum, ait Gœfn. hort. hoc est, mediæ inter ætam & Rumicem naturæ, potius quàm Seutlomalachen appellandum. Spinachiam manifestum habere sexum scribit Scaliger. Coniicio autem marem ab eo intelligi illum, cuius semen spinosum est: sceminam sine spinis. Ab his non penitus dissona sunt, quæ apud Camer. hort. & Hist. Lugd. leguntur. Spinachia genera duo, sativum, & siluestre. Satiui item duo, mas & femina, Mas semen fert, Femina floret quidem, sed seminis infœcunda sterile fert.

Spinachia describitur & pingitur à Lob. & Pen. Adu. Obs. Ic. plant. Dod. Hist. Lugd. Fuchf. qui & Spinacium olus vocat. Brunfelsio. Camer. in Hort. & Hist. germ. Matth. qui Spanachiu inscripsit. Tabern. Ic. & Hist. Amato, atque Matthiolo.

Amatus quidem domesticum Rumicem siue hortense Lapathum, Spinachiam nostram esse si bi falsò imaginatur, quod & Cesalp. sentire videtur. Quare meritò Robert. Constant. eum hallucinari scribit dum sine autoritate aut ratione hoc contendit: Constantino in eo ad stipulanti-bus Grapaldo & Matthiolo.

Falluntur & ii, qui Plinii Boulapathon apud Dodonzum esse existimant: Lapathi siquidem genus Boulapathon est: radicis tantùm altitudine ab aliis differens, vt ipse refert. Nec quoque Hippocratis Blitum est, quod veluti linguam esse scribit lib. 2. de morbis mulieb. Nam inter subditiua

Hoc olus Veteribus (quod mirum est) incognitum fuisse videtur, cum de eo nihil illi, quod legatur, literarum monumentis tradiderint: vel forsitan quod cibo, quàm medicinz potius natum esset, nec quicquam illustre fortitum, ob id ingenii segnitie obscurum, vel quod, vt conlici potest, nondum in vltim vulgi, literato-

istud refertur, quæ rubrum fluxum muliebrem reprimunt ac sistunt. Talis autem Spinachia facultas haudquaquam est adstrictione omni carens. Nec est Chrysolachanum, vt vult Monardus.

C. Bauh. Phyt. Lapathum hortense alterum, seu Spinachia femine spinosa. Idem apud Matth. Atriplex 2. Lapathum hortense alterum, Spinachia mas quibuldam. Item Phyt. Lapathum 4. siue hortense alterum, seu Spinachia sterilibus. In Matth. Spinachia 3. sterilis.

Spinachia siue Spinacia & Spinaceum olus, Nomina linguarum quod Latini appellant, *σπινάχιον* recentioribus Græcis dicitur, ab Arab. & Serap. Hispanac: à Germ. Spiner oder Binesch: belg. Spinagie: Gall. *Espinaches* ou *Espinars*: It. *Spinacci* & *Spinace*. Hisp. *Espinaca*: Angl. *Spinache*: Boh. *Spinak*:

Spinacia quidem & Spinaceum olus ab insigni feminis spiculorum nota, quod tam glabrum, & mollis herbæ semine in spinas occalescat. *Σπινάχιον* verò sumpto nomine à raritate, quod rarò illo medici videntur. Quibus hæc vocabula displicent, Atriplicem Hispaniensem vocant, Mauritiani *Hispanach*, id est, Hispanicum olus, fortasse quod inde primùm duxent originem, ad cæteras tandem nationes translatum: quidam Seutlomalachen.

Spinachiam colimus Montbelgardi in horto E. C. marem & fœminam. Passim in hortis feritur nullum solum respiciens, cum Martio & alio tempore, tum Septembri mense, exiens septem à latu diebus, folio primùm triangulo, molli, mox intubaceo, non horrens Hiemis frigora, quæ si iniqua nimis, Iuglandis foliis conseruantur: vt Vere cibum suppediet, quo tempore semè profert: Hieme enim restat: Martio verò satum intra duos menses perficitur, hinc Iunio & Iulio flores & semen edit.

Locus & tempus.

Cultura

In culinis, teste Trago, nihil ferè frequentioris est usus, pulchus ex Spinachia recenti confectis. Temperamento illa frigida & humida est, cibo & medicinz accommoda. Pulces Spinachia aluo a- strictioni profunt, potestque id oleris in omni pene ægitudine cibo deligi, nam meo iudicio inter omnia culinaria olera Spinachia laudatissima est, & gratissima. Spinachia aluum emollit, gutturi asperitati medetur, & arida tussis confert, teste Constant. Succus & aqua distillata Spinachia pota, calorem resinguit, stomachi rosiones mitigat, & lac elicit. Spinachia cataplasmatis instat stomacho & epati imposita, inflammationibus illarum parcium prodest, doloremque tollit. Eadem ictibus scorpionum, & aranearum imposita succurrit. Spinachia primæ refrigerantium & humectantium classis, nec omninò varat nitrofa qualitate Camer. Aluum emollit, melius Atriplice suppeditat alimentum, sed aluo parum hærens facile exigitur. Flatus colligit, & vomitiones con- citat, nisi excrementitius humor abiciatur: ventrem decocti iure proluit. Citra aquam coquitur hoc olus, quod magnam vim humoris inter coquendum remittat, & veluti proprio contentum iure alienum aspernetur. Bibitur eius succus ad scorpionum & aranearum ictus, ac etiam vulneri illinitur: quinetiam cocta lenit exasperatas fauces: sed nauseam faciliè parit, nisi Zinzigere, aut alio consimili condiantur: Recipitur & inter cruda acetaria recens enata.

usus

Temper:


Vomitum

mauer.

SPINACHIA SEMINE NON PVNGENTE

Folio maiore rotundiore.

Longè maior maioribusque est foliis, quàm *Spinachia vulgaris*, nec non rotundioribus, cæteroqui



cateroqui mollitie & fatuo sapore similibus: quemadmodum & floribus proximè circa caulem ad pediculorum exortum mucosus: at semina sublequantur conglomerata multa veluti in racemulum, lenticulis ferè paria, rotunda, nullis spinis horrida, cinerici coloris.


Trago est hæc Oulus Hist.

panicum i. nobilissimum, siue Spinachia i. nobilis. Spinachia fatua folio Lapathi seu Boni Henrici, caule Betæ, seminio nequaquam spinis horrente.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Lapathum alterum semine non spinoso, tertia Atriplex. Spinachia semine non spinoso.

Spinachia semine non pungente, folio maiore, rotundo, rarior habetur, cum Hieme non facillè ferat. Passeres & alie aues seminum huius valde auidæ.

BONVS HENRICVS.



Oxylapathi boxea crassa radice nititur: sed tenuiores complures rantes emittit, striatos, partim erectos, partim supinos: folia triangularia, Atriplicis, atroviuentia, farina tenui respersa, sapore nonnihil nitroso: flosculi in thyrsis, muscoli, herbidi, semen rotundum Raphanino super.

Trag. quem bonum Henricum

cum cum Fuchio inscribit, & Rumicem vinctuosum, [Schmerbel, propter vinctuosa folia] vulgarem vulnerariam herbam Germanos [gemein wunde kraut] nonnullos etiam Serpentinum vel Colubrinam radicem [ob folia, quibus vestitur, Ari aut Vngula asinina similia] vocare dicit: Rumicem tertium siluestrem Dioscoridis quem ille Plantagini similem, & in terra iacentem dicit cum Fuchio esse indicat, ac pro Spinachia sylubens habet.

Totam Bonam, Spinaciæ facie, seu bonum Henricum magni ducunt Aduers. Lob. & Penæ, ita namque de ea loquuntur. Sed Totâ bona pet-

Tom. II.

quàm optima, magisque vsu quàm vllâ penitiâ recepta, Mercurialis credita fuit iamdiu à plebe muliercularum, aut illis non multò penitioribus Pharmacopœis Anglis, quàm adhuc inscitiam magis pertinaciâ quàm vllâ ratione fouent, quia fuit illis euentus. Siquidem est huius plantæ deterforia facultas multò quàm Mercuriali tutior in morbis feruidis, nec tamen est ignaua in attrahendo facultatis, cibus verò multò Mercuriali gravior, tametsi plusculûm flatuum habet, & non ita procul à Spinaciæ natura abesse videtur. Lob. Obs. Tota bona, Spinaciæ facie, Rumicis, genus Fuchii, 2. Turneri. Eidem Icon. plant. Tota bona, siue bonus Henricus.

Dodon. gall. & Lat. in fol. qui sub Tota bona describit & depingit: Ait bonum Henricum à singulari quadam vili facultate vocari: veluti & perniciosam quandam plantam Malum Henricum appellant, de quo alibi dicendum.

Camer. Epit. & Hist. Matth. Germ. Tabern. Icon. & Hist. Brunfels. & Hort. Lust. Bonus Henricus. Thalyo Tota Bona Dodonzi. Atriplicis genus intermedium. Clusio Tota bona. Gesn. coll. stirp. Lapathi seu Rumicis genus, vulgò bonus Henricus vocatum. Atriplicis silu, species. H. Lugd. Lapathi silu. 2. genus.

C. Bauh. Phyt. Lapathum 5, siue vinctuosum folio nonnunquam maximo instar Aaronis. Seignarium botanicum ostendit Dorst. dum sub Colubrinæ nomine ponit iconem boni Henrici & Hühwürm nominat.

Bonus Henricus, G. Güter heinrich, Schmerbel. Belg. Algoede & Cammeffens oore. Gall. linguarum Route bonne i. Tota bona, vti vocant Lob. & Dod. bon Henry. Ital. aërba insarinata, Angl. English Mercury.

Bonum Henricum multis dictum vidi Monf. pelii, allatum ex montibus circa Gangem, florentem mense Maio. Genevæ quâ itur ad montem Thyri copiosè offenditur: Basileæ inter portam cineream & lapideam mense Octobri florens, Montbelgardi copiosè Iulio.

Vulneraria herba est bonus Henricus, ac mirificè ad sordida purganda, ac glutinanda vlcera confert, sicut appensa etiam ac trita vulneribus imposita, vermes qui in iis nati sunt excidere faciat. Hæc Fuchius, quæ Camer. in Matth. Germ. tribuit Atriplici fœtidæ. Sed Fuchio subscribit Dodonæus: ac insuper Dodonæus testatur folia cum oleribus cocta, atque esitata, lubricam reddere alium. Præfertur, vt videre est apud Matth. ad venenosorum animalium ictus. Radicis succus illitus scabiem sanat, & cutis maculas extergit, præsertim si cum aceto misceatur.

DE BLITO IN GENERE.

CAPVT. IV.

Theophrastus olus hoc scribit vtraque parte fructificare, scilicet cacuminib. & lateribus, idè copiosius, protinus enim nodis singulis, semen insidens, racematim gerit: caret radice illa singulari, quæ in rectum tendit, sed continuè ab extremo multas crassas, prolixiores quàm Atriplex gerit, lignosas.

Quamvis autem Diosc. Plin. & Galenus nullas aliti proponant differentias, attamen plures esse cum ab aliis, tum à nobis obseruatum est, de quibus posthac dicendum erit.

BLITVM RVBRVM MINVS.

Descripio **S** Actis magnam radicem pro plantæ ratione habet, rubentem, fibrosam, ex cuius capite plures caules oriuntur, lupini, rubentes: & in his folia multa. Solani hortensis, minoræ, nervosiora, colore attrouirente, sapore fatuo: ex quorum aliis secundum caulem numerosi nascuntur flosculi, ex herbidis & muscosis fibris compositi, obtutum ferè eludentes.

Synonyma


Tragus, à quo
cap. de blito pri-
mum describi-
tur, vocat bli-
tum nigrum, A-
dicit posse vocari
en.]

triplex
triplex fi-
varia.
lit. minus
ubrum.
lit. rub.
spinum

Aduerf. Lob. & Penz. blitum minus rubrum.
Lob. Ic. pl. blitum rubrum supinum. Dod. Gall.
blitum rubrum paruum. Camer. Hist. Matth.
Germ. blitum rubrum : & Epit. blitum rubrum
minus. C. Bauh. Phyt. blitum 4. siue minus pen-
itus rubrum.

FOCUS

Seritur in hortis, ac etiã in iis spontè prouenit, vt & præsertim in iis locis in quibus simus pecorum aliquandiu afferuatus fuerit.



descriptio

Est hoc simile rubro, nec ab eo nisi colore differens, caule vt illud assurgens unico, magno, firmo, ad duos tréve cubitos erecto, albo : sed foliis maioribus, nisi locus interdum aridior diuersitatem faciat.

Blicū
ndidum?
sell taxa.
r. Turgō

An *Hermol. blitum candidum*? An *Ruellia*, qui partem suæ Historiæ desumpsit ex *Hermol.* cuius tamen non recordatur, *blitum candidum*, quod Turgon in Narbonensi Gallia esse scribit, ast male, meo iudicio, videant Lectores. An *Matth. blitum album*? cuius figura ex *Fuchio* desumpta videtur, ac alterius esse plantæ.

bel. nör.

Quam Aduerſaria Lob. & Penz blitum maius album vocant, vereor ne cum blito ꝓ. Tragi confundant, cui folia Ocymi tribuit. Dodon. Gall. ni fallor, hanc deſcribit primo loco, ac vocat blitum magnum album, figurâ autem, quam ponit, blito ꝓ. Tragi debetur: Lat. fortè in fol. ſub blito maiore, iconem Lobelii, qua melius conuenit, ꝓponit.

C11S

Gefn. hort. blitum sativum album. Hist. Lugd.
bliti albi majoris titulo blitum; Tragi ex Matth.
depinxit. C. Bauh. phyt. Blitum. sive album ma-
jus. Hort. Lus. Blitum album.

In Burgundiorum *Faucluse* vidi: ac plantavi
Montbelg. in horto E. G.

Blitum album minus?

Radicem agit profundam, crassam, fibris multis constantem, culsu difficilem, albam, in superiori parte nonnihil rubescentem: *canles* plures, in principio aliquantulum rubentes, ad dorsum, pedemque plurimum per terram sparsos gangulos, succu plenos, albos, serè rotundos, nonnihil striatos, fractu faciles, foliis alternatim dispositis: inferioribus, breuiore pediculo, superioribus maioribus longiori harentibus, oblongis, lubrotundis, in extremitate obtusis & fissis, ex viriditate nigricantibus, ornatis: ex quibus ad cubitalem vel ampliore altitudinem per ratione loci vnus eleuatur, densens veluti in spicam, principijs florum Bliti, vel Amarantii maxime similem, floribus & seminibus plenam. Ramulis etiam in foliorum exortu insident flores sine pediculis, racematim coherentes, virides: odor ex viriditate quodammodo grauis: sapor queque viscidus. Herba inter hororum vitia valde odiosa, quia se expandens alias suffocat.

Trag. Blitum 2. feu Atriplicis filu. genus alterum : Atriplex fimarua propter rationem iam dictam. Lob. & Penz Adu. Blitum minus album. Dodon. gall. Blitum minus [*à la tige verte*] Camer. ad Epit. & Hist. Matth. germ. Blitum album. Hanc Gesn. mihi Corchorum vocabat.

Attriplex
filu. sine
fimaria.

Corchoris.

Montbelgardi abundat passim Blicum minus album vel potius viride. Genææ quoque frequens: Tubingæ, ac Tiguri, in agris non cultis fœcus itinera, in hortis & areis.

Blicum nigrum seu Sanguinaria illa, à mulier-
culis nonnullis in dyſenteris & Languine ſiten-
do vſurpatur. Succo eius expreſſo minit vice in-
ſcriptione vſurpalle ſapè in puerili ætate le me-
minit Tragus. Refrigerat, inquit Matth. hume-
dat, & emolli. Menſes remorantes prouocatur,
molè & ſecundè educuntur, ſi ſcœmæ vapore de-
cocti calidi ſuſſantur, aded vt vapor ad vterum
aſcendat.

Vires.
Dysenteria
Succus ad
cribendu
Facile ar
Menses

BLITVM ERECTIVS, SIVE

3. Tragi.



Purim's fi-
bris radica-
tur, parum al-
demissis, non
nihil rubenti-
bus, quo etiam
colore predicti
sunt caules qua-
drati, dodranta-
les aut cubita-
les, exsuccis, ra-
mosi: in quibus
nascuntur folia
ex intervallis
modò aduersa,
modò Ocymy-
alià acuta, aliàs
obtusà, minùs
crebra quàm in
aliis Blitis, ex
quorum aliis &
in ramorum

Description

- Synon.* gura Fuchiana non in omnibus placet. Hanc pingit Tragus hoc titulo, Blitum Maier: ac pro Blito 3. [Dritte Mist Milten] describit, ac addit: Est & hæc Atrophicis siluestris species, herba innoxia, quæ inter cætera olera non raro legitur; et si non ut alii sit spec. es.
- Fuch. hist.* Fuch. Hist. & Icon. figuram Trago similem habet, verum descriptio ex Hermolao ad aliam plantam pertinere videtur.
- Dod. mag.* Dodon. gall. figuram Fuchii habet siue Tragi hoc titulo, blitum, *blerre*. Descriptionum autem quas Dodonæus posuit nulla conuenit. Latin. in fol. eandem ponit & describit, sub titulo, bliti minoris.
- Mat. not.* Matth. picturam habet quæ videtur facta ad imitationem figuræ Fuchii, cui titulum facit, alitum: videtur tamen non respondere descriptioni aut plantæ quam existimamus eum intelligere. In comm. Ital. eandem figuram habet sub titulo bliti albi: Item in Hist. Germ. Mirum cur ponat duas figuras, cum dicat Blitum album iisdem foliis provenire quibus rubrum.
- H. Lugd. nec.* Iam di&am Matth. figuram proponit etiam H. Lugd. sub hoc titulo: blitum album maius, alit-eius descriptio non conuenit.
- An Geln. hort. huius meminerit nomine bliti siluestris lectoribus considerandum relinquo.
- Polyperon 100, spermo* Anguill. & ex eo H. Lugd. & Lobel. Obs. Polyperon Cassiani bassi. Ic. Plant. Polypermon, à feminis, ut in Obs. contendit, florisque muscoli botrydi non dissimili sceturâ, quibus onusti numerosi cauliculi.
- Locus & tempus* Geneuz proveniebat in hortis: Montbelgardi satis vulgaris: spontaneus etiam in Horto E.C. femine maturo Augusto. Montpelii quoque observatu.

BLITVM MAXIMUM, SIVE AMARANTHUS maior, femine albo.

Descriptio



maiores digesti, easque frequentes, & iubar inftar nonnunquam in latum luxuriantes, colore fuliginoso, aut purpure oboletioris, staminibus luteis, quibus femina succrescunt minuta, alba, Milii excorticati æmula.

Synon.

Et hoc est illud, quod Matth. in post. comm. cum mag. fig. It. & Lat. Blitum maius vocatur.

Hist. Germ. apud Camer. Blitum Vngaricum & Epit. Blitum. Et Icon. Blitum rubrum maius. Dodon. Lat. in fol. Amaranthus maior floribus obfoleti coloris: Lobel. & Pena in Adu. Blitum maius Matthioli vocant. Lobel. Ic. plant. Amaranthus maior floribus panniculosis, spicatis, purpureis.

Geln. hort. Amaranthi species maxima, femine albo, *Pennachia* Italorum fortè. An eadem ex Monachis, Blitum Indicum vel Topianum, planta ex Indiis nuper inuentis allata.

Tab. Icon. & Hist. Blitum Indicum. An de hoc Per. Circa c. 40. par. 1. Chronici, *Quinna*, [ut vult Clusius] ex qua potionem parant, aut elixâ velcuntur.

Cæsalp. Bliti genus aliud, siue peregrinum, de quo ait: Scitur hodie in hortis non solum ad cibos, sed etiam magis pulchritudinis gratiâ, ob coloris venustatem, grande est, specie ferè arborea: folia sunt Blito longiora, rubentia, caulis crassus, striatus, tuberosusque, ad quaterna cubita accedens, ex alis, & ex summis ramis paniculæ longissimæ exeunt ac tenues, colore nigricantis Rosæ, specie floris Amaranthi, sine odore: femina in eis multa continentur, candida, Panico exliora, quæ in cibos veniunt. An hæc Erysimum fuerit apud Theophrastum inter fruges, quod Trionum vertit Theodorus, Plinius *Itionem* vocat?

H. Lugd. & Calt. Blitum rubrum maius. Cæsp. Bauh. Phyt. Amaranthus maximus, siue cristatus: Apud Matth. Blitum maius Matthioli. Hort. Luf. Amaranthus purpureus maior.

Blitum maximum siue Amaranthus maior femine albo simili Milio excorticato, Geneuz interterum excedebat altitudinem hominis: Lugduni etiam in horto meo florebat Septembri & Octobri: Naphlex in hortis variis vidi florens Iunio. Montbelgardi in hortulo meo, & Horto E.C. satum facillè provenit. Aliquando accepi nomine Amaranthi Indici: floret Augusto, femina maturo Septembri. Habetur etiam in fidebus ad hæc nectras opacandas.

AMARANTHVS PURPUREVS.

Flori eximie venustatis Amarantho purpureo, radice crassa, Bliti, succulenta, è rubore candicans: caulis singularis, purpurascens, potissimum propter terram, striatus, alternis alis concavus, cubitum, aut sesquicubitum altus: folia bliti, acutiora, minus ut plurimum rugosa,



atroverentia, per margines nonnihil rubentia, sapore satuo: è quorum alis magnæ gratiæ flores coccinei pediculis suis insident tactu lzues, modò cui spicæ singulares, modò conuulsi plures, quorum si singulares sumas flosculos, quinis foliis totidèq; apicibus constant, Semen per maturitatem nigrum, paruum, nitidum

Descriptio



panicum 1. nobilissimum, siue Spinachia 1. nobilis. Spinachia latius folio Lapathi seu Boni Henrici, caule Betæ, semine nequaquam spinis horrente.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Lapathum alterum semine non spinoso, tertium Atriplex. Spinachia semine non spinoso.

Spinachia semine non pungente, folio maiore, rotundo, rarior habetur, cum Hieme non facile fecat. Passeres & alie aues seminum huius valde auidæ.

BONVS HENRICVS.



Oxylapathi buxæa crassa radice nititur: sed tenuiores complures caules emittit, striatos, partim erectos, partim lupinos: folia triangularia, Atriplicis, atroviuentia, farina tenui respersa, sapore nonnihil nitrolo: flosculi in thyrsis, muscosi, herbidi, semen rotundum Raphanino super.

Trago, quem

bonum Henricum cum Fuchio inscribit, & Rumicem vinctuosum, [Schmerbel, propter vinctuosa folia] vulgarem vulnerariam herbam Germanos [gemein wünder frucht] nonnullos etiam Serpentium vel Colubrinam radicem [ob folia, quibus vestitur, Ari aut Vngulæ asininae similia,] vocare dicit: Rumicem tertium siluestrem Dioscoridis quem ille Plantagini similem, & in terra iacentem dicit cum Fuchio esse indicat, ac pro Spinachia sylu. lubens habet.

Totam Bonam, Spinaciæ facie, seu bonum Henricum magni ducunt Aduers. Lob. & Penæ, ita namque de ea loquuntur. Sed Totâ bona per-

Tolin. II.

quàm optima; magisque vñ quàm villâ peritiâ recepta, Mercurialis credita fuit iamdiu à plebe multercularum, aut illis non multò peritioribus Pharmacopœis Anglis, quam adhuc incitiam magis pertinacia quàm vlla ratione fouent, quia fauit illis euentus. Siquidem est huius plantæ deterforia facultas multò quàm Mercuriali tutior in morbis feruidis, nec tamén est ignauæ in attrahendo facultatis, cibus verò multò Mercuriali gravior, tametsi plusculum flatuum habet, & non ita procul à Spinaciæ natura abesse videtur. Lob. Obs. Tota bona, Spinaciæ facie, Rumicis 3. genus Fuchii, 2. Turneri. Eidem Icon. plant. Tota bona, siue bonus Henricus.

Dodon. gall. & Lat. in fol. qui sub Tota bona describit & depingit: Ait bonum Henricum à singulari quadam vtili facultate vocari: veluti & perniciosam quandam plantam Malum Henricum appellant, de quo alibi dicendum.

Camer. Epit. & Hist. Matth. Germ. Tabern. Icon. & Hist. Brunfels. & Hort. Lusit. Bonus Henricus. Thalyo Tota Bona Dodonæi. Atriplicis genus intermedium. Clusio Tota bona. Gesn. coll. stirp. Lapathi seu Rumicis genus, vulgè bonus Henricus vocatum. Atriplicis silu. species. H. Lugd. Lapathi silu. 2. genus.

C. Bauh. Phyt. Lapathum 5. siue vinctuosum folio nonnunquam maximo instar Aaronis. Signatum botanicum ostendit Dorst. dum sub Colubrinæ nomine ponit iconem boni Henrici & Rhû würtz nominat.

Bonus Henricus, G. Güter heinrich. Schmerz Nomina bel. Belg. Algoede & Cammeffens oore. Gall. linguarum Route bonne 1. Tota bona, vti vocant Lob. & Dod. bon Henry. Ital. herba insarinata, Angl. English Mercury.

Bonum Henricum multis dictum vidi Montpelii, allatum ex montibus circa Gangem, florentem mense Maio. Genevæ quâ itur ad montem Thuyri copiosè offenditur: Basileæ inter portam cineream & lapideam mense Octobri florens, Montbelgardi copiosè Iulio.

Vulneraria herba est bonus Henricus, ac mirificè ad fordida purganda, ac glutinanda vlcera confert, sicut appensa etiam ac trita vulneribus imposita, vermes qui in iis nati sunt excidere faciat. Hæc Fuchius, quæ Camer. in Matth. Germ. tribuit Atriplicis sterida. Sed Fuchio subscribit Dodonæus: ac insuper Dodonæus testatur folia cum oleribus cocta, atque esitata, lubricam reddere aluum. Præfertur, vt videre est apud Matth. ad venenosorum animalium ictus. Radicis succus illitus scabiem sanat, & cutis maculas extergit, præsertim si cum aceto misceatur.

Bonus Henricus vnde dicitur

Lapathum vnde dicitur Dorst. not.

Locus & Tempus.

Vires vlcera Vulnera

Ictus Genæ nati Scabies

DE BLITO IN GENERE.

CAPIT. IV.

Theophrastus olus hoc scribit vtraque parte fructificare, scilicet racuminib., & lateribus, idè copiosus, protinus enim nodis singulis, semen insidens, racematim gerit: caret radice illa singulari, quæ in rectum tendit, sed continuè ab extremo multas crassas, prolixiores quàm Atriplex gerit, lignosas.

Quamuis autem Diosc. Plin. & Galenus nullas alii proponant differentias, attamen plures esse cum ab aliis, tum à nobis obseruatum est, de quibus posthac dicendum erit.



fibrola. Nec alia Atriplicis fatiua rubra facies, nisi quod sanguineo colore tota picta est.

Diosc. Atriplicem, Chrysolachanum vocat, & olus cognitum, idque in satium & siluestre, vt etiam Plin. & Galenus, diuidit.

Theophrastus radicem lignosam tradit, vnam altè descendentem, vnde alia exeant, copiosè fructificare, nam

protinus nodis singulis semen infidens racematum gerit à latere & in summis, semen foliatum, vt in Laserpitio.

Sed licet Atriplicis duo genera tantum tradant Diosc. Plin. & Galenus, satium & siluestre, attamen dari & tertium, quod est Maritimum, nemo inficiabitur: cum teste Marantia, ex frondium, seminum, radicisque similitudine liquidò appareat, non habere aliam differentiam, nisi quod falso gustu sit, propter maris contiguitatem, foehaque subalbida habeant, quod omnibus maritimis euenire solet. Sed misso silu. & maritimo, de satio hoc cap. tractabimus.

Fuchsius itaque videtur vnicà descriptione & figurà, quam Atriplicem hortensem descripsit, ambas proponere, Tragus Atriplicis fatiua tria fastigia facit. Scribit enim quandam proferre folium rubicundum aliam ex luteo languescens, postremam nigricans.

Videtur lãc. Theod. Tabern. cum Hort. Lusit. in eadem specie rubra ponere tres colores, aliter quam Tragus: certum est albam permanere albam, & rubram rubram, quicquid dicat Theodorus. Nos ponimus duas figuras quia ex Fuchsianis erant sculpta.

Matth. qui alias solum domesticam nominat, in nist. germ. Atriplicis Graminis modo virentis, rubra vt ignis, & pallidè lutea meminit. Anguill. Atriplex domestica. Lonic. cuius figura displicet, rubram, albam & virentem tradit. Gesn. hort. Dod. gall. Atriplex fatiua, alba & rubra. Non esse autem cum Trago Matth. Lonic. & aliis Atriplicis fatiua tria constituenda fastigia docet Dodon. Lat. in fol.

Lob. & Penæ Adu. Atriplicis fatiua duplicem constituunt speciem. Vnam, quam Chrysolachanum vocant Dioscoridis tum Antiquiores tum Posteriores, cui folia marcescentia à luteo vel flauo in aureum vergant. Alteram, folio & flore purpureo vniuentem.

Cæsalp. Atriplex, folio colore ex viridi pallescente. Camer. hort. Atriplex purpurea grandis, semel facta postea decedente semine proueniens. Hist. Lugd. vnicam licet Atriplicis fatiua exhibeat iconem, albam tamen & rubram recipit. Albæ, inquit, folia cum tenella sunt, candicant, cum adoleuerunt, colore ex viridi in luteum e. languescunt. Alterius folia, caules, flores in rubro tulescunt.

Alph. Moresch. Atriplicem improprie sanè Tom. I

Chrysanthemum vocat, quod hæcenus apud neminem me legisse memini.

C. Bauh. Atriplex 1. hortensis alba. Atriplex 2. hortensis rubra: ad Marth. Atriplex 1. hortensis rubra. Atriplex domestica: & ab hac differens, colore potissimum, hortensis alba.

Gerard. Atriplex satina alba: Atriplex fatiua purpurea: pro qua ab ipso malè ponitur icon pedis antea 2. Tabern.

Præfens planta Latinis in genere dicitur Atriplex. Græcis, ατρίπλις ή χρυσάνθημον [aureum olus] Arab. Catas, seu Carasf. Germ. Molsen/Mulsen. Belg. Malde: Ital. Atriplice, & Armula, Trapesa Reppice & Treppice: Gall. Arrouches, Bonnes Dames, prendes femmes. Mont. des Arabes. Bizont. Des Armoue. Geneux. Foleffes, Hisp. Armolles: Angl. Orrage seu orethe: Boh. lebeda.

Atriplexum, vt Festus refert, appellabatur ab atro, vt aliqui putant, colore. Verum à voce Græca potius quam ab atrox fluxit nomen. Nam Atriplicis olus ατρίπλις Græcis dici Columella testatur; hippocrates ατρίπλις appellat. nelychius ατρίπλις, quod ατρίπλις, & Suidas ατρίπλις [Atticis, d literam in t mutare frequenter amantibus] εἰς ατρίπλις, ὁ τῆς ατρίπλις ὁ μὲν γὰρ ατρίπλις, id est, quod statim in amplitudinem adolefcit: si quidem octauo à satio die proflit, confestissime incremento proficere conspicitur: fidem celeris augmenti facit ereptum in confinio cæteris herbis alimentum. Ac ne in hortis quidem iuxta eam nasci quicquam tradunt, nisi languidum: χρυσάνθημον, id est aureum olus græci appellant, quod auri colorem representer. Alij tradunt ab aureo siue luteo flore nomen hoc inuenisse.

Atriplex alba & rubra hortensis, non nisi facta prouenit, assiduòque humore satuari amat. Frequens Montbelgar di etiam in Horto E.C. Geneux obseruau paruas plantas virentes, ex semine decido Ianuario, & florentem vt aliis consuevit Iunio & Iulio: Porentum magnas areas Atriplice ferunt, & maiori in vsu quam Montbelg. In hœturis hortis rara admodum Atriplex, frequentissima autem apud Insabres ferunt, à runcolis in hortis & in campis. Hæc inter coquinarias herbas ocyslimè assurgit, nam post quindecim dies à satione vsurpatur in coquinis & tantum Vere edulis.

Atriplex, vt scribit Dioscorides, cocta est vt Vites olus, alium mollit: panos discutit siue cruda, siue cocta illinatur. Semen cum aqua multa potum regium morbum sanat.

Atriplicis, vt oleris, in cibis vsum cum Blito declarat Galenus, qua de re antea diximus. Vltum medicum & temperamentum alibi est explicat. Atriplex frigida & humida temperie est, humida quidem secundi ordinis, frigida vero primi, quam vtique tepidam esse caliditatem posuimus, cuiusmodi Rosis inest: non tamen adstrictionis est particeps, sed aquea est, & minimum terrena, similitet ac Malua. Quin & ventrem similiter permeat vt illa, ob lubricitatem. Hortenses autem Atriplices & Malua quamagrestes tum humidiores, tum frigidiores. Quare phlegmonis & phygethli incipientibus, gliscenibusque & molibus etiamnum, ac velut feruentibus hortenses: videntibus autem ac declinantibus, & indurecentibus commodiores sunt agrestes. Semen eius abstergendi vim habet. Itaque ad morbum regium ex hepate obstru. & phortum vile est. Ex quibus sanè verbis tota Dioscoridis sententia declarata est.

Atriplex & siluestre est, inquit Plinius, & satia

N n n

Nomina
linguarum

Atriplicis
Erym

Locus &
tempus

Morbus re
gii
Temper
ex Galen

Atriplex ge
nera Vite
rum & Re
centium

Fuch. Atri
plex duplex
Tragus tri
plex

Tabern. ar.

Lonic. not.
Error mul
torum Atri
plex fatiua
non tria fa
stigia

H. Lugd.
not.

*Nona se-
cundum
Pythago-
ram*

*Solon nota-
tur*

*Vulgarum
Graecia
Canthari-
da*

Matth. not.

uum, accusatum à Pythagora tanquam faceret hydropicos morboque regio, & pallorem, coque-
returque difficillimè: ac ne in hortis quidem iux-
ta id nasci quicquam, nisi languidum culpauit.
Addidere Dionysius & Diocles plurimos gigni
ex eo morbos: nec nisi mutata sepius aqua co-
quendum. Stomacho contrarium esse, lentigi-
nes & populas gignere. Miror quare difficulter
in Italia id nasci tradiderit Solon Smyrnaeus.
Hippocrates vuluarum vitis id infundit cum
Beta. Lycus Neapolitanus contra cantharidas
bibendum dedit. Quibus subiicit ea quæ Diosc.
& Galenus tradiderunt. Sylvestri, inquit præte-
rea, capillos tingunt, & ad supra dicta vtuntur.
Hippocrates quibus genitura in vtero immo-
ratur, ibique putrescit, & molestiam exci. at, Atri-
plex agrestis semine [sic] vel succum cum melle delingendum offert.

Scribit Serapio Rhazim vidisse hominem quæ-
dam, qui ex Atriplicis semine duarum drachma-
rum pondere sumpto, tam crebris vomitionibus
tum alui eiectionibus, adeo vexatus fuit vt ad ex-
tremam virium imbecillitatem deueniret.

Et Martholus pharmacopœum quendam se
nouisse ait, qui ad rusticos purgandos Atriplicis
tantum semen exhibebat, quod iis non sine mo-
lestia magna aluum clebat abundè, ac simul etiã
crebros vomitus prouocabat. Quam facultatem
quum scribat Matthiolus, paucis haecenus cog-
nitam, ea tamen à Plinio non prætermissa l. 20.
cap. 20.

ATRIPLEX SYLVESTRIS.


Qui satiuam Atriplicem nouerit, is nullo ne-
gotio & hanc siluatam n. nouerit spontis
sue Atriplicem: quæ caule anguloso strigosior non
ita adolebat: foliis ferè rhomboidæis, sinuatis,
quæ inferiora, superiora verò longiora, quædam
parum sinuata, alia in totum sinuata, xerampe-
linis, per margines subinde rubentibus, pulu-
culo farinaceo resperfis: flores racematim mul-
ticolis per ramos visuntur, quibus semina succedunt
parua, rotunda, compressa, laui nitore nigrican-
tia. Figuræ sunt Fuchsianæ, nec admodum placet
vnam etiam ex illis habet Dodonæus.

*Synon.
Atriplex
stercoraria
Atriplex e-
xigua*

Icones

Corn. Atriplicem siluestrem, eod quodd cacione-
nes inducat, stercorariam [Scheiff Milt. vnu-
schiff miltren
cum alus] cog-
nominat. Tra-
go est hæc A-
triplex agrestis
& exigua, flein
ader milt.
Fuchf. Anguil.
Gefn. hort.
Dodon. gall. &
lat. in fol. (quã
succo etiam ru-
bente reperiri
ait, a & albam
adstruit.) La-
cun. Atriplex
siluestris.

Matth. not.



Atriplicem
syly. hortensi
omnibus præ-
pè notis res-
pondere scri-



bit Matth. præ-
terquam foliis,
quæ albidiora
spectentur. Is
olim solam iconem habebat
Fuchsianæ simi-
lem, nunc in
cora. cum mag-
fig. & Germ.
Hist. ommissis
prioribus ver-
bis duas icones
sine descrip-
tione pro vna po-
nit, nec earum
vlla mihi vide-
tur responderet
pizantia.

Lob. & Pe-
na Adu. Atriplex
siliu. sinuata

non distare specie à domestica aiunt. Lob. Obs.
Atriplex silu. vulgarior (hoc vocabulum in l.c.
plant. non habetur) sinuata. Is autem iconem
penè eandem habet cum Matthiolina postrema
cursummitates cum lappulis. Videndum an refe-
renda potius ad nostram Montpellieranæ cum
lappis.

Thal. Atriplex simetaria maior. An Caxalp.
quod C. Bauh. affirmat, Cynocrambe tamis cu-
bito minoribus, candicantibus: foliis veluti cin-
cre asperfis, alioqui Atriplicis silu. sed minoribus,
ac lenatis, Mercurialis modo, seminibus race-
molis, sine flore, exiguis & rotundis.

Tabern. p. n. figuram sine descriptione, hoc
titulo: Atriplex silu. n.

Gerardum pro Atriplice silu. ponere poly(per-
mon Tabernæ non placet, & præterea pro Atri-
plice marina iconem Atriplicis siluestris eruldem,
sed excusandus vt qui non exactè nouerit, ac
ideò miscuerit.

Lohic. Atriplex silu. maior. H. St. Lugd. Atri-
plex silu. n. Matth. primæ editionis. Hort. Lusit.
Atriplex syly. vulgarior sinuata. C. Bauh. Phyt.
Atriplex 4. siue silu. altera. Eccc Frater apud
Matth. non immediatè eam post satiuam collo-
cat: cur cum Lapathum hortensi commisceat. An
Atriplex Lapathum: & contra Lapathum Atri-
plicem quis vnquam dixerit?

Anagallis d. eia, Atriplex silu. Germ. Scheiff
Miltren; w d Miltren / dffer Miltren. Belg.
Welde Welde. Gall. Arraches saunages. It. Rep-
pice satiuata. Angl. Wilde Arche / Selau. Florea
Lobeda. Nunc in Græcia secundum Anguilla-
ram silu. & domestica indifferenter Atriplex &
Chrysolacano vocatur.

Atriplex syly. Montbelgardi etiam in horto
Ill. E. C. Monspelij. Geneuz, Basileæ & alibi, vias,
feminas, scrobes, agrorum margines, vrbium
mœnia, & simetia, vbiq; locorum occupat, flo-
rens vt satiuæ Iunio ac Iulio, & subinde Augusto,
quo mense & Septembri semine maturat paruum,
nigrum, superueniente gelu quotannis perit.

ATRIPLEX ANGVSTIFOLIA laciniata minor.

TAbern. Icon. & hist. Atriplex syluestris 2.
Si Tabern. collegit & nouit, cur non de-
scripsi.

Nomina
linguarum

Locus &
tempus.

Camer. not.

Atriplex
sinuata

quod Casparus Bauhinus Phyt. assentit, ac Atriplex silv. 5. facit, siue minorem.

ATRIPLEX SILV. FOLIIS INTEGRIS
racemolosa

Descrip. &
Synonyma

Atriplex silv. Cordo in Diosc. Cefal. Atriplex sinuata Lobelii. Frater assumit figuram Tabern. quæ mihi diuersa videtur à Matthioli silv. 2. acetiam hist. Lugd. & Lobel.

ocul

Obseruauimus vatus in locis in Sundcotia circa fimos.

ATRIPLEX VVLGARIS ANGUSTI-
folia cum folliculis.

descriptio:


Obscurius huic virent folia, vt parè atria sint, ad Polygoni: folia proximè accedentia, latiora, acuminata, subinde [quanquam rariùs] laxissimè sinuata: excresecit autem ad cubitalem & sesquicubitalem altitudinem: flos radix, Atriplicis filuestris sinuata: folliculacea fert pericarpia, sæpè etiam rhomboidea; conferta, quæ dehiscentia semen ostendunt, singula singulum, rotundum, compressum.

Est hæc Matth. (qui non describit, nec disci-

Tom. II.

scripsit. Nec placet Camerarium Atriplicis silv. 3. titulo apposuisse iconem sine descriptione: præterea Matthioli non meminit Atriplicis tertie. Si figura facta est ad plantam, de qua hic agimus, vt suspicor, folia oportet esse sinuata non aculeata.

An Thal. Atriplex sinuata minor,



C. Bauh. Phyt. Atriplex 12. siue angustifolia; Dod. Silv. altera Lob. Polygoni aut Helxines foliis. Foliis communiter oblongis, angustis, non sinuatis: reperitur tamen aliquando foliis ad principium duabus alis donatis. Apud Matth. Atriplex 7. siue angustifolia Centinodiz folio. Atriplex silv. 1. Matth. inter maiores figuras, inter minores enim non expressit: Dodon. Atriplex silv. humillima & quarta.

Montbelgardi & Basileæ prouenit in vineis Locis & agrorum marginibus.

ATRIPLEX SYLV. MONSPESSVLANA
cum pulchris inuolucris.

Folio est breuiore (quò multum differt ab Atriplice Matth. 1.) albicante, sinuato, Atriplicis vulgaris, breui pediculo constante: inuolucris seminum angulosis; quodammodo Cynoglossæ nostræ copiaris similibus, intra ramulos & foliorum pediculos prodeuntibus; semen includentibus paruum, compressum, nigrum: lappis etiam multo maioribus; nec velut in spicas desinentibus: ita vt habere aliquid videatur similitudinis; quod lappas attinet, cum Atriplice prima silv. Matthioli in post. figuris, melius tamen accedit ad secundam, quam facili estimarum.

Descriptio

Nnnn 2

An Atriplex.
filu. 2.
Matth.

An Matchin com. cum mag. fig. Lat. & Ital.
Atriplex sylu. 2. ? In hist. Germ. Atriplex sylu. 2.
Wilde & Nelsen 2. An Lobel. Obs. & icon. Atriplex
filu. sinuata ? Camer. in Epit. & hist. Germ.
Matth. Atriplex filu. 1. n. & Lugd. p. 336. Atriplex
filu. 2.

C. B. not.

An C. Bauh. Phyt. Atriplex 3. siue filu. folio sinuato ? Hanc, inquit, Atriplicis sylu. hispida paruz recte nomine à D. Doldio accepimus : eandem Monspelii Augusto mente frater Ioh. Bauhinus collegit. Apud Matth. Atriplex filu. lappulas habens, à nobis primum descripta, cauliculi leuissimè hispidi. Hæc frater. Ego quidem anno 1561. Monspelii collegi, & descriptionem misi Dō. Gesnero cum ipsa planta, ast nihil hirsuti aut hispidi obseruavi. Considerandum an Dg. Doldius suam hispida dixerit à capitulis & inuolutis angulosis seminum.

ATRIPLEX HALIMOIDIS LOBELII.

Descriptio

Synonyma

Locus

Atriplex halimoidis Aethiaca est, caules edens æternum & quaternum cubitorum, & folia halimiflora & semina rotunda cæterarum more. Mibi primum visa in viridario Ioh. Mutoni Nerviensis Pharm. Semitas & rudera amat, Lob. Obs. C. Bauh. Phyt. Atriplex n. Halymi folio.

ATRIPLEX ARBORESCENS.

Delinquentio

Seimen quoddam ad nos misit Lutetiâ Rob. S. Botanicus Regius, nomine Atriplicis arborescentis insula dicitur. Istud ferè magnitudine Milii est, cinereum, rotundum ac modicè compressum, hylo candicante, sapore saturo, nec effatu digno.

Scribit hanc plantam semper virere à nobis seminata est Montbelgardi in orto Ill. E. C. Vvirembet. quem colimus.

ATRIPLEX MARITIMA.

Descriptio



nimis crassa.

An Cordo in Obl. siluâ, Atriplicis sylu. genus, gustu salsum Matchin com. lat. & It. & hist. germ.

Atriplex maritima humi spargit caules cubitales numerosos, ex crassa satis radice exortos, totos albicantes, per quos & folia candicante sinuata, Pedis anserini similia. Flosculi per extrema potissimum ramulorum racematim congesti, flores Portulacæ maritæ imitantur. Inicone à nobis pteposita radix picta

(qui dicit Dioscor. & Galen. huius non meminisse.) Dodon. Lat. infol. H. Lugd. Atriplex marina, Meer Melten.

Lobel. & Penz. Aqu. Atriplex marina repens &c. Lob. etiam Obs. & Ic. Plant. Atriplex marina repens. Sed repetitè dicere non conuenit: sparsa est supra tertiam, non repit.

Camer. hort. qui ait rubro & herbaceo semine inuenti Epit. & Hist. Matth. germ. Atriplex marina.

An Cynocrambes 3. genus, in maritimis visum, ramis humi procumbentibus, candidis foliis, velut puluisculo argenteo aspersis, rotundioribus.

Gerard. ut antè dictum, pro Atriplice marina Matth. signam Atriplicis filu. demonstrat, quid pro quo.

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Atriplex 9. siue maritima.

Atriplicem maritimam habeo à Valerando Locut. Dourez. Jac. Reinaudeto, fratre C. Bauh. qui Venetias attulit ex Lio. Frequentem offendit scribit Matth. Tergefti ad salinas in maris litore: Lob. in maritimis mediterraneis & Adriaticis nusquam non obuiam, humi stratum.

Vis Atriplici marinæ quæ cæteris Atriplicibus, Vires sed propter salsedinem, quæ referta est magis quidam alium citat; magisque abstergit si è carnis iure decocta edatur, Matth. His addit Camer. Digerit, incidit, attenuat, liquat, à putredine vindicat, aperit, & abradendo expurgat. humentem ventriculum siccat, hydropicos iuuat, pingues extenuat. Atriplex marina primum crescens in Acuatius Venetis, vnde quandoque citharem parant ad conficienda vitra.

ATRIPLICIS MARINÆ SPECIES Valerando.



Atriplicis aliâ marinâ habeo datam à iam dicto Valerando Dourez Pharmacopæo cui hæc ascripta. Atriplicis marinæ species, Polyperon Cassiani Bassi quorundam. Hæc valde similis Atriplici syluestri vulgaris, nisi eadem.

ATRIPLEX FOETIDA

Vix humo tollit caules, ut plurimum, ramosos, dodrantales, aut etiam maiores: quos vestiunt folia ex rotunditate modicè in acumen desinentia, potissimum superiora, in inferioribus quædam sinuata, farinaceo puluisculo asperso candicantia, odoris virosi intolerabilis, ut qui



Synonyma.
Garum
Vulvaria

qui vel attactu leui manus ita inficit ut longo tempore vix possit elui. Flosculi racemosi Atripliciu aliarum sylvestrium modo. Radix gracilis fibrata.

Cord. hist. Garosmum, Agrestis Atriplicis minima (forte minima) species, Vulvaria. Garosmon autem dubio procul ex eo dicitur, quod Te'ev, siue liquanen

piscium redoleat.

Atriplex canescens.
Garum Henrici.
Vulvaria.
Atriplex.
Error Tragus, ac Lonicari.

Tragus Atriplicem caninam & foetidam, & Blicum foetidum, & B. num Henricum appellat: Germ. güt oder stols Heinrich / hundenmilch. Vicium, inquit, Atriplicis potius est, quam quidvis aliud.

Tragus germanicus.

Sed & Lonic. hanc Boni Henrici (Güter Heinrich) nomine describit, nullam cum Trago ponens figuram, ac nomina Boni Henrici male ascribens.

Dodon. gall. Tragium Germanicum, quorundam Vulvaria: Lat. in fol. Garosmum, Atriplex foetida.

Atriplex canescens.
Garum olens.

Gesf. hort. Atriplex altera, Garosmum.

Lob. Icon. Plant. Atriplex pusilla, olida, Hircina, Vulvaria vocata. Garum olens. De hac aiunt Aduersaria: Est in Nitiobrigum agro, aliisque locis quamplurimis herbula Atriplex accensenda, secus vias frequentissima, tenera, parvula: humi demissa folia candore micant, quasi polline interpersa. Hanc notissimam fecit odor, & ferme infamem: odoratu namque hircus teterque spiritus opplet nares, quo imbuti querunt permulti se meretricum impuros loculos subodoratos esse: planque referre odorem illum virosam quem prostituta libidinis scorta ex impura colluvie congesta spirant. Inde vulgo Furariam dicunt: atque autumant: hac illitas vestium muliebrium plicas canes sagire, atque arrecto vetro Venenis actu actos, illas amplexas cupere inire, praesertim in templis ubi tetrus odor spirat, & minis ventis diffatur. Hae vulgi sunt, tota civibus abdicanda. Lob. Obs. Atriplex olida, Vulvaria, Garum olens, Garosmum Cordi.

Atriplex olida.
Cynocrambe.

Cesalp. Cynocrambe affinis herbula folio minime serrato: sine flore: semine racemoso, exiguo, rotundo: vulgo Conina, nam redolet thuebra: videretur Coniza tertia apud Dioscoridem. Sed quod huic plantae Cesalp. florem negat, errore f. aet.

Coniza.
Dioscoridi.
Cesalp. sap.
furi.

Vulvariam apud Hist. Lugd. à foetido odore Tragium vocavit Dodonaeus. Gall. Herbe de Bonc. Quia verò duo sunt alia Dioscoridi Tragii genera, ad horum discrimen Tragium Germanicum cognominavit. Alii Atriplicem caninam dixerunt, quia eam ex vrina canum nasci putant.

Hanc Tabern. Vulvariam (Schamfräut / Mäuzenfräut) appellavit, dicta nomina in Hist. ferè omnia adscribens. Gerardo, Atriplex olida

Tom. II.

dicatur. Angl. Stintia Ocah. C. Bauh. Phyt. Atriplex 10. siue foetida.

Locus


Atriplex foetida, quae à nobis Montbelgardi, Geneva, Basilea & Lugd. observata est, iuxta parietes provenire dicitur, & locis sabulosis praesertim quae lotio canum sepius aspergantur. Aestate media floret, editque semen. Vbi semel ad hortos translata diutius recurrit.

Vires
Vulva
Stultus
Vlcera
Purpura

Ex vtero laborantibus gravitate odoris prodesset posse testatur Dodonaeus. Fœminis strangulatu vulvae oppressis, conferre creditur, maxime si umbilico imponatur. Bonus hic Henricus, inquit Tragus, vermes in vlceribus putridis animalium quadrupedum natos excutit certissimo experimento, si herba tusa vlceribus imponatur id quod non semel ipse vidi. Sunt qui vermes enei dicant, si herba solum adalligetur iumento.

ATRIplex, DICTA PES

Anserinus.



Pes Anserinus Descriptio

Est Atriplex sylvestris: sinuata vulgariori, sed humilis: ampliora laxius & rarius sinuata, atrovi-rentia, caput grauate odore praedita: flos racemosus Atriplicis iam dictae. Semen exiguum, rotundum. Radix lignescit fibrola: caulis crassiusculus, rectus, cubitalis.

Synonyma
Sola
Venenosum

Tragus hanc inter Solana refert, & Solanum 4. venenosum & furiosum, Schweins rodt / Mortem porcum, Scirp. plag. supplicium suum, ab effectu expertas vocare tradit ancillas. Idem & cum eo Fuch. Dod. gall. & Lat. in fol. Tab. Gerard. & Gesf. de coll. stup. (qui tres & Chenopodium Plinii vocant) pedem anserinum nominant.

Chenopodium
Mat. med.

Matth. in post. com. It. & Lat. cum mag. fig. Atriplex syl. 3. Icon sine descriptione.

Lob. & penz. Adu. Atriplex syl. (siue pes anserinus) latifolia. Obs. Atriplex syl. latifolia. Ic. plant. Atriplex syl. (siue pes anserinus), latifolia, lacris laciniis.

Atriplex
Pis. latifolia

Hist. Lugd. frustra duas icones proponit, ac H. Lugd. detetius diuersis capitibus. An Thal. Atriplex m. simentaria grandior? Cesalp. Cynocrambes genus alterum, quod Hermol. testatur apud Plinium Chinopum esse: i.e. Herbam similem Anserino pedi. C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Atriplex 6. siue silu. latifolia, Cynocrambe, non autem Diotcoridis.

Cynocrambe

Atriplex dicta Pes anserinus, cognominatur à Germanis Gans fuß / quibuldam Siew oder Schweins rodt / & Scir. plag. Belg. Gansen vót. Gall. Pied d'oye. It. Pied di Oca. Ang. Goose se foot.

Secus veteres parietes, vias, semitas, alibi que incultis ac desertis humentibus non nihil locis

Locus

Nana

frequens est, viget ac flor et vna cum Atriplicibus reliquis. Hanc Lugduni, Genetz, nec non Montbelgardi obseruauit.

Vires:

Herba planè lethalis & pestifera maximè si à suis denoretur, Fuchsis & Trago auctoribus. Facultate frigida & humida est, & quidem non minds Atriplice: sed vti apparet, etiam amplius refrigerans, secundo ordine.

ATRIplex DICTVS PES ANSERINVS alter siue ramosior.

Synon.

Chenopodium
Pes anserini-
mus.Reror Ge-
rardi

plice purpurea ponit pedis anserini 2. figuram. C. Bauh. Phyt. Atriplex 7. siue syl. latifolia altera acutior & nigriore folio.

Locus

In antiquis arsis & fossis simi ac pagis inuenitur.

PARIETARIA.

Erym
Descriptio

silo euoluere coneris, subsaltim excussio puluerum impetu spectaculo iucundo, se expandunt repanda, in medio seminis rudimentum circumdantia. Radix fibrosa. Est hæc maior & minor.

Vulgaris notitia est à natalibus dicta Herbariis Parietaria, hirsutis caulibus, ramosis, donata: folia Mercurialis, hirsuta, atrouirentia & nitentia: flosculi cõserti circa caulem ex foliorum alis floccos cocci nei ferici imitantur primulùm è nodulo emicantes. post se flamina ostendunt obscure, ex albo purpurascensibus apiculis, involuta, quæ si

Hanc nostram parietariam Helxines nomine Diof. illas delineat Dioscorides his verbis. Cauliculos prostratos: tenues ac subrubentes, folia Mercurialis, hirsuta: circa caules velut exigua semina, aspera, vestibus adhaerentia.

Matth. Brunfels. (cui & Parietaria, & septima Synon. Parthenii species:) Anguill. Fuchf. Dod. gall. Gesn. hort. Lacun. Lob. Adu. Obs. & Ic. Plant. Turin. (cui & perdicion) Castori. H. Lugd. Casalp. Camer. Helxine. Trago. Lonic. Cord. in Hist. Dod. Lat. in fol. & Tab. Parietaria. Helxine altera & Muralium, Cord. in Dioscoridem. Per Herbari ventri Fuchf. Adolph. Occo. Cord. Apollon. Luminare maius, & alii Helxinem, siue Parietariam intelligunt.

Ex Syn & me. Nomen Græcis, Helxine, Perdicium & Perdicaria Lat. vulgò autem & officinis Parietaria, aut corrupta voce Parietaria appellatur & Muralis: Extant verò eius & alia nomina, cum Sideritis apud Diof. & Plinium, tum apud Apuleium & passim alios, vt Sideritis, Heraclea seu Herculanæ Vitriaria, Vrecolaria, Veratium, Ixine silvestris, Clibadium, Polyonymon, Elitis aut Alitis, Amelxine, Eufine, Amorgine, Sucotachon, Plyphuaccon, Melampeton, Cittampelon, Anatetamenon. Diof. Plinius & Apuleius Parthenium quoque appellant. Sed animaduertendum est Plinium huius nominis homonymia deceptum, duas herbas diuersissimas confundere, nimirum Parthenium Dioscoridis, & Helxinem hanc nostram, siue Parietariam.

Dicta autem est Helxine, quòd aspera foliorum hirsutia, asperoque semine, tenaci nexu vestimentis obuiscis adhaereat. Perdicium, à perdicibus, quæ eam elitare solent: Parietaria, quòd in parietibus exeat, atque eadem de causa Muralis & Muralium. Herba vitri, Vitriaria, Vrecolaris & Vrecolaria, quòd tergendis vrecolis, vasisque vitreis efficax sit. Dicitur Germ. tag vnndt Nacht, non tamen ea, quæ luteis purpureis & similibus linguarum floribus insignis est (S. Petre fraut / Maueraut. Belg. Glasf. cruyt. Gall. Parietarie: Hesp. Teiua del muro: It. Parietaria: Angl. Pellitory of the Wal.

Nascitur iuxta muros, parietes, sepes, in rudibus, ac subinde in vineis, ac ipsis muris. In hortis etiam plantata ita prouenit, vt inde vix abigi possit: Maio mense exit: Iulio, ac Augusto semen profert: radix hieme solà restat. Introduxi in Hortum E. C. ac etiam in meum, vbi hiemem perfert ac non solùm le radice multiplicat verùm etiam semine: Pataum passim prouenit: Montpelii toto anno viret in muris: Montbelgardi verò pereunt folia & Martio mense prorumpunt. Lugduni vidi virentem Septembri & Octobri. Geneuz non longè à Porta Rive in sepibus & in variis hortorum muris.

Vim habent folia Helxines refrigerantem, auctore Dioscoride, & adstringentem, quare imposta sanant ignes sacros, condylomata, arubusta, panos incipientes, omnem inflammationem ac tumores. Succus eius Cerussa admixta illitus, erysipelata & herpetas sanat, & podagras cerato cyprino, aut adipe hircino exceptus: prodest & tussi diuturna succus cyathi mensura haustus. Tonsillis quoque inflammatis vtiliter gargarizatur & illinitur, aurium dolori cum rosaceo instillatus prodest.

Helxine inscit lanas, inquit Plinius, sanat ignes sacros & vlcera quæ serpunt (in vulgatis exemplaribus verba hæc, & tumores collectionesque perperam

Vires:
Inflammationes
Siccitas

Tussis

perpetuam leguntur ex priore versu repetita) & guttura incipientia turgescere. Item veterem tussim cyathis hausto, & omnia (in ore tumida, sic enim legendum) sicut tussillas: Et aurium dolores cum rosaceo. Eadem exempla habent varices cum rosaceis, nullo tempore. Helxine enim cum rosaceo in varices nihil agere potest, nec eius facultatis interminerunt Dioscorides, neque Galenus. Verus codex arietem vocem habet, sed itidem corruptam & nihil indicentem. Quare locum sic, vt posuimus, Cornarius emendauit ex Dioscoride.

Abstergendi & leuiter adstringendi vim cum subfrigida humiditate illi tribuit Galenus ad predichos affectus etiam commendans. Facit, inquit Aëtius, ad alopecias & impetigines herba ipsa per se assidue affricata. Aperit & hæmorrhoidas sedis, & fistulas sanat, & sinus occludit cum modico sale trita, & cataplasmatidis modo posita. Et his intelligere licet multos melixine abuti, qui eam in frigidis vitis pro fomento vsurpant, cum refrigerandi constringendique vi prædita sit. Cæterum cum adstringendi facultas ei quoque insit (est enim gustu nitroso, bliteo, & superficie abstergente,) potest etiam calculosis, & iis qui difficultate vrinæ laborant exhiberi. Succus enim eius trium vociarum pondere haustus auctore Matthiolo suppressam vrinam mirè provocat, eademque super testæ calefacta, vinoque Greco irrorata, & pubi illita, calculosis & vrinæ difficultate laborantibus mirè auxiliatur. Possimum, inquit Fuchsius, si aliquid quod maiorem abstergendi vim habeat, admisceatur. Sic Aëtius hæmorrhoidas aperire tradit, si cum sale cui detergendi vis inest, trita apponatur. Multi hodie visus est in enenaribus ad ventris & vteri dolores paratis, & ad balnea, abstersioni accommoda. Eiusdem vis magna est ad recentia vulnera sananda. Si enim recens semi contusa vulneri allegetur, tertio die soluitur, non erit opus alio vi medicamento. Succus in ore detentus dentium dolores mulcet. Stillaria eius aqua faciem abstergit, & nitorem addit.

OCIMASTRUM VERRUCARIVM.

EX radice tenui, fibrosa, fulca, caulis surgit singularis, teres, subhirsutus. geniculatus, ex viridi rubescens; nitidus: folia ex articulis aduersa, Solani vulgaris, acutiora, atrouirentia, aut ex viridi purpurascens, per ambitum leuiter sinuata: flores in thyrsulis pulchelli, quadrifolii, colo-

Trago gerin:

Euphasia fluviatilis. *Ōcimi foliis herbam*, Helio-
tropii genus, Gesn. aliquando putabat: nunc
hortis *Ōcimsaum verrucarium* appellat. Lob.
Obf. &c. Plant. Circaum Lutetianam dicit. Ta-
bern. Ic. herbam Diui Stephani. Hist. Lugd.
Circaum Dalechampi. Sed non placet plantam
hæc pro Circaea Diol. In descriptione etiam Da-
lechampi sunt, quæ in ipsa planta non offero.
Schw. est Circaea domestica, *Ōcimsaum ver-
ruc.* Item, Circaea fluitans, vel sine filis. siue flu-
viatilis Tab. [Thal. legendum] vult tag and
Nacht: minor est tota & tantillum rubens. Soli
naturam æmulat.

C. Bauh. Phyt. Parietaria 3. helixine silv. fen
fluviatilis & riualis maior & minor Thalyo quid
est ? Item Solanum 9. Solanifolia, Circaea dicta,
ratione loci variat. In monte Fracto multò minor
est vix palmi dimidiùm æquans.


Ocimaitrum verrucarum Montbelgardi in
 fylulae Chesuamum in fylula inter Ejlubum & Mel-
 gionem Danigum [vnde in hortum E.C. transtulit:] Bafi-
 lex in fylulis, nec non Geneue, & propè Mafnu-
 fter, riuus & vlginofis gaudet, locis opacioribus
 frequens. Inueni etiam ad putridos arborum
 truncos. In hortis tepertu fuo odiofa.

MERCVRIALIS MAS ET

forma.

CAP. V.

M Ercuria-
lem mar-
cum *Fennu-*
folia minime
distinguitur,
inter se simili-
mas ad Patietia
fobz accen-
dent, sed gla-
bra, atro viro-
re splendens,
& in ambu-
lata, (tipore
nitrofo cal-
dufculo &
naufeo: cau-
le, vique an-
gufofifpida-
mei, & acetum
maiores, geni-
culati, leues
ex folioli alijs
examine quide
gigule recte
micant, te-
tules, quas
veticillam
eunt in Erica
rebuunt *fl. fcy-*
glomerati,
fulcofif, qui
a quatuor fo-
la herbidu-
fe explican-
tur, cir hos api-
olorum, lu-
lorum aut
herbidorum o-
nentant (nullo
accidente fecu-
ne pereun-
t.) Mari au-
tem ex iisdem



alis breues pediculi oriuntur, quorum singulis testiculata bursula, nonnihil compressa, hirsutaeque infidet, gemina femina recludens [Dodonæo ad Aparines & forma & asperitate accedentia, compressiora tamen.] Radix utriusque tenera & fibrosa.

Est Mercurialis sativa & siluestris. Vtraque mas & femina. Nos hoc capite vulgò receptam sine sativam prolequimur: siluestrem, seu repentem, quæ Cynocrambe dicitur, sequenti capite traditur.

Mercurialis, ut tradit Dioscorides, folia Ocimo similia habet, Helixinæ cognata, sed minor, ramulos duplici geniculorum nodo cinctos, alarum caua multa, densa: fructum femina copiosum, racemosum, mas è foliorum sinu dependentem, paruum, rotundum, seu binos testiculos vnâ coherentes: frutex est dodrantalis aut minor.

Plinius de eadem re paulò aliter scripsit. Linosostis sine Parthenium Mercurij inuentum est: Idèò apud Græcos Hermupoean multi vocant eam, apud nos omnes Mercurialem. Duo eius genera, masculus & femina, quæ efficacior.

Fuch. Matth. Dod. gall. & Lat. in fol. Gesn. hort. [qui de coll. stirp. Linosostin vocat:] Anguill. Lob. Obs. Lacun. Lonic. Castor. Tab. Camer. hort. epit. [ubi Mercurialis simpliciter inscribitur] & hist. Matth. germ. Hist. Lugd. Mercurialis mas. Trago, Mercurialis 2. vel testiculata, aut testiculata. Lob. Ic. plant. Linosostis, Mercurialis mas. Cordo in Diosc. [qui & Phyllon Arthenogonon] & Turn. Mercurialis mascula. Brunfels. Mercurialis, & sexta Parthenii species. Cæsalp. Mercurialis fructum ferens. C. Bauh. phyt. & ad Matth. Mercurialis 1. sine testiculata. Schv. Mercurialis sativa mas, testiculata.

Matth. Fuch. Turn. Dod. gall. & Lat. in fol. Lacun. Gesn. hort. Lob. Obs. & Ic. plant. Cord. in Diosc. Castor. Tabern. Camer. hort. epit. & hist. Matth. germ. Hist. Lugd. Mercurialis femina. Trago, Mercurialis vulgaris & 1. Cæsalp. Mercurialis florens. Cord. in Diosc. Phyllon Thelygonon Theophrasti. C. Bauh. phyt. & apud Matth. Mercurialis 2. sine spicata.

Matth. ait non deesse, qui velint Phyllon à Linosostis [Mercurialis non differre. Verum se non posse cum illis liberè consentire. Sed hanc tanquam erroneam opinionem in postremis comment. Ital. & Lat. merito omisit.

Anguill. Dioscoridis caput de Phyllo corruptum esse scribit [quod tamen non demonstrat] admiscens, quæ Theophr. dixit de Arthenogono & Thelygono, quæ duæ plantæ sunt Mercuriales duæ.

Tragus & Dorst. utramque vnâ icône exprimunt.

Apud Ryff. in Diosc. figura Cynocrambes posita pro Mercuriali mare, & femina Mercurialis pro Cynocrambe, Mercurialis maris pro femina.

Hier. Brunsch. ineptam habet figuram, in edit. anni 1595. quæ postea iterum ponitur pro Confolida media. Aduers. Penz & Lobelii matrem & feminam agnoscunt, Linosolidemque, seu Parthenium, & Mercurii herbam appellant.

Græcis ὁ ἑρμῆος, ἡ ἑρμῆος ἑρμῆος ἑρμῆος [Hermupoean, id est, Mercurii herbæ], Latinis [Mercurialis] [Mercorella Paterni.] quòd à Mercurio Intētia sit, ut ait Plinius. in Ocibasi Med. compendio Elineum coileum habetur, pro

Mercurialis sativa & siluestris. Mas & femina. Mercur. Diosc. Ex Plinio Linosostis Parthenium Olinio Hermupoea Genera duo Synon. Mercur. simpliciter Mercurialis vias Phyllon Arthenogonon Parthenium Mercurialis femina Matth. bal. lucinatur Anguill. nre. Ryff. taxatur Brunsch. Nomina linguatum

quo tamen Linosostis sit. legendum; ut Tragus prudenter monet. Sic & Linosostia super El. de Sebesten & Ellenitii. reperitur. Alibet Auerth. Phyllon Theophr. Dod. Germanis Bingels fructu sumatur, Mercurius fructu. Trago wintergrün. Belgis Bingel cruyt, Mercuriael. Gallis de la Mercuriale. Ital. mercorella. Hisp. mercuriale & Verrigua morta. Anglis French Mercury, Mas Theophr. Græcè ἀρρηκτός, Femina verò ἀρρηκτός appellatur. Notandum autem esse adhuc & aliud Parthenium, & apud Dioscoridem quoque aliud Phyllon.

Reperitur Mercurialis in hortis olitoris, vine. Locis & tis, aliisque locis humionibus ac umbratis, se. tempus horum aruorumque sepiant. Tota Aetate utraque viget: Augusto mense semine prægnans est mas: In femina enim nondum videtur semina, sed tantum flores. Hyeme plurima parte intercidit.

Vtraque Mercurialis Medicis, Sepiastris omnibus, atque etiam mulierculis notissima est (subnitrolo sapore, & nonnihil virolo succo purgante & medicato, ad multa perquam vili. Vtraque enim, auctore Dioscoride, alium mouet, oleum modo comesta, cocta in aqua, & ea epota bilem & aqua ducit. Creduntur præterea femina folia trita & pota, post purgationem pudendis apposita, ut femina concipiantur efficere: mascula verò similiter adhibitis, mares generari.

Plinius de medico vtriusque vsu paulò aliter quam Dioscorides tractauit, eundemque fusiùs ex Hippocrate declarauit, qui etiam hodie in libris illius extat, maxime eo qui de sterilibus inscribitur, & in duobus de morbis muliebribus. Verba Plinii hæc sunt. Mirisaculæ. Vnus. Menses. Sed a. Str. Angust. Item. Vt utrumque generis eorum præditur, ut mares gignantur, hunc facere, ut femina zillam. Hoc contingere si à conceptu fuccus protinus bibatur in passio, & danturque folia decocta ex oleo & sale, vel cruda ex aceto. Quidam decoquant in nouo fictili cum Heliotropio, & duabus aut tribus Allii spicis, donec percoquantur. Decoctum dari iubent, & herbam ipsam in cibo altera die purgationis muliebris per triduum, quarto die à balneo coire eas: Hippocrates multis laudibus in mulierum vsu prædicat has. At hunc modum medicorum nemo nouit. Ille eas vuluæ cum melle, vel rosaceo, vel inno admouit. Item ad ciendos menses, ad fecundasque. Hoc idem præstare potu sotuque dixit. Instillauit auribus olidis succum, inunxitque cum vino vetere. Alio folia imposuit & epiphoris. Stranguræ & vesicis decoctum eius dedit cum myrrha, & thure. Alio quidem soluenda vel in febrili decoquitur quantum manus capiat, in duobus sextariis aque ad dimidias bibitur sale & melle admixto, nec non cum vngula suis aut gallinaceo decocta. Salubris purgationis causa putantur aliqui vtramque dandam per se, sine cūi. Malua decoctam. Thoracem purgant, bilem detrahunt, sed stomachum lædunt.

Mercurialis, inquit Galenus, videntur omnes, ad ventris purgationes duntaxat. Verum si quis eius periculum facere voluerit in cataplasmate, sanè admodum eam esse digerentis experietur facultatis. Hæc Galenus. Eiusmodi in enematis frequentissimus est vsus. Et multis in locis Pharmacopæi multum videntur melle quod Mercurialem vocant. Sacci expressi libris tribus incoquant mellis boni libram vnam cum semisse, vel libras duas ad enemata, & muliebria entanthismata. Obseruatum est Verrucas omnis generis vtriusque Mercurialis foliis tolli vel earum succo. Item vtriusque

Mercurialis inquit Galenus, videntur omnes, ad ventris purgationes duntaxat. Verum si quis eius periculum facere voluerit in cataplasmate, sanè admodum eam esse digerentis experietur facultatis. Hæc Galenus. Eiusmodi in enematis frequentissimus est vsus. Et multis in locis Pharmacopæi multum videntur melle quod Mercurialem vocant. Sacci expressi libris tribus incoquant mellis boni libram vnam cum semisse, vel libras duas ad enemata, & muliebria entanthismata. Obseruatum est Verrucas omnis generis vtriusque Mercurialis foliis tolli vel earum succo. Item vtriusque

Mercurialis inquit Galenus, videntur omnes, ad ventris purgationes duntaxat. Verum si quis eius periculum facere voluerit in cataplasmate, sanè admodum eam esse digerentis experietur facultatis. Hæc Galenus. Eiusmodi in enematis frequentissimus est vsus. Et multis in locis Pharmacopæi multum videntur melle quod Mercurialem vocant. Sacci expressi libris tribus incoquant mellis boni libram vnam cum semisse, vel libras duas ad enemata, & muliebria entanthismata. Obseruatum est Verrucas omnis generis vtriusque Mercurialis foliis tolli vel earum succo. Item vtriusque

viridisque semen cum Absinthio decoctum ich-
thicos mirifice iuuare, malis quæ serpunt succum
cum aceto mederi. Quæ ante M. lura literis
mandauit Ruellius.

CYNOCRAMBE VETERIBVS.

CAP. VI.

CYNocrambe siue Cynia, quam aliqui Mercu-
rialem *(synonymum)* silv. masculam vocant cauli-
culum duorum palmorum altitudine emittit, ce-
nerum *(synonymum)* mollem Sarrac. subalbidum: fo-
lia Mercuriali aut Hederae similia, ex intervallis
subalbida: *semen* foliis adhaerens paruum, rotun-
dum. Vim habet caulis & folia, tum pota, tum
olerum modo in cibo accepta, aluum mo-
uendi. At decoctorum iusculum, bilem & aquo-
sa ducit.

Verum huius Cynocrambes cum neque Theo-
phrastus neque Galenus, neque Paulus, neque Aënius
meminerit, videtur Cornario hoc totum caput
ex præcedenti temere repetitum Dioscoridi ac-
creuisse & superuacuum esse, ac redundare. A-
dulterinum caput est, inquit Matcellus, maxime
cum in vetustis codicibus minimè reperitur. Cy-
nocramben autem Ruell. eandem cum Atriplice
sylv. facere videtur, sed malè, præsertim, quod
Diosc. de silv. Atriplice lib. 2. de Cynocrambe
verò ad finem quarti, tanquam de diuersis plan-
tis tractauerit.

Sed Galenus, Paulus & alii, atque etiam Diosc.
alterius Cynocrambes mentionem fecere sub no-
mine Apocyni de quo suo loco.

Est verò Cynocrambe Honor. Belli & Casp.
Bauh. nobis Aline facta de qua Hist. n. g. l. 29.

Cynocrambe Gerardo Anglonon benè dici-
tur de Phyllo Hist. n. libro præsentis. Est tandem
alia Cynocrambe siue Mercurialis siluestris, de
qua iam agendum.

CYNOCRAMBE MAS ET FOEMIMA
siue Mercurialis repens.

Plurimis fibrosis radiculis perennibus &
lentis, sapore nonnihil dulci sed fastidioso,
per terram repit Cynocrambe tam mas quam fo-
mina, neruo
duro fibrarum
Hellebori in-
star factis: cau-
les surriguntur
aliquot, teretes,
contauti, longis
internodiis ge-
niculati; peda-
les, præpter ter-
ram purpuras-
centes: folia ad
articulos, bina
opposita laui-
fima, lanugino-
sa, foliis Mercu-
rialis vulgaris
similia, tenera;
duas aut tres
vncias longa,
inferiora tamen
multò minorà



sunt, acumi-
nata, in ambita
ferrata, pedicu-
lis brevibus, gu-
stu nauseoso, ex
foliorum alis
pediculi exserti,
in mari quidem
breuiiores, qua-
tuor vel quin-
que, vnciales
aut semunciales
ac maiores, bre-
uiiores alios in-
terdum à latere
proferentes;
quib. insidet si-
culi herbaceo
colore præditi
ternis foliolis
constantes, quo-
rum medium

occupat loculamenti *seminum* rudimentum, ex
tuius cacumine emicant apiculi bini corniculati
extorsum reflexi: loculi hirsuti compressi, in ge-
minos testiculos, Lentis magnitudine diuisi; *se-
mina* bina continent dissepimento membratula
distincta in vno pediculo tergeminà: At in Cy-
nocrambe *semina* ex foliorum alis pediculi sur-
riguntur tres 4. aut quinque vncias longi tenues,
striati, in quibus stoculi in spicam digesti, masculi,
ternis foliolis herbaceis compositi, in quibus
staminula aliquot herbaceæ: qui nullo succedente
semine intereunt. Dodonæo tota herba viridis
odoris ingrati redollet.

Anguillara ait Cynocrambem sibi innotui-
tam.

Cabinæ Brasiliæ, *matensis*, siue cum Matthio-
lo, Cynocrambes nomine, Cord. in Diosc. Mercu-
rialem silv. & quidem cum Matthiolo Trago,
Amato, Aduersariis & H. Lugd. masculam tantum
proponit; In hoc enim genere inueniti *semini*
nam negat, sed non absque errore. Eum autem
falli ac *seminum* haberi, ipsemet in Historia pa-
lam facit. Inibi namque errorem suum agnoscit,
ac duos describit, vnam quidem titulo Mercuria-
lis masculæ sylvestris, altera. n. verò *seminum*, cui
Gels. figuram addit. Is præterea in Diosc. in
hac herba demonstranda Ruellium errasse scri-
bit; id quod Matthiolus clarè demonstrat.
Videtur, inquit, Ruellius existimasse Cynocram-
ben eandem herbam esse cum Atriplice silvestri.
Qua in re (si ita credidit) aperte errasse depre-
henditur. Differt enim ab Atriplice silv. non mo-
dò foliis & facie, sed etià caulis proceritate. Si-
quidem Atriplex silv. quandoque ad duum cubi-
torum altitudinem assurgit. Cynocrambe verò
binum palmorum longitudine contenta est.

Cynocrambe nihil aliud est, inquit Corn. quam
silvestre Linosyrtidis genus. Hanc Officinæ falsò
Atriplicem silv. vocant, vnde quidam, *Wibornes-
den*, & *Heilmelken* nominant.

Dodon. Gall. quamvis solum marem pingat,
tamen Cynocrambes *seminum* quoque statuit.
Lat. autem in fol. dumtaxat vnus meminit, ac fi-
guram Plantini sub titulo Cynocrambe, Mercu-
rialis silvestris ponit, ac describit, atque eam ha-
bere *semina* masculæ Mercurialis: attamen in eius
icone sunt pich flores *seminum*, quasi essent flo-
res maris. Ego sanè hætenus non obleruavi ex

Errat Corn.
di.

Ruellius er-
ror.

Atriplex
silv. non est

Linosyrtidis
Officin. est

Dodon. ror.
xalms.

fœminæ floribus; maris semina prouenire.

Wijn. la.
plu.
Castrag-
ria Castrá-
gula

Fallitur Gesn. hort. qui Mercurialis agrestis marem duntaxat esse asserit, ac ab Italici Castagnariam, vel Castrangulam vocari tradit. Idem præterea in cat. plant. Cynocrambe Brassicam caninam, Cyniam Officinariam, Atriplicem silu. & Springfraut vocitat. Quod nomen germanicum ita conuenit, ac si prunum silu. Acaciam dixeris.

Atriplex
fœmina
Lob. reprob.

Lob. Obseru. & l. c. plant. figuram habet cynocrambes marem & fœminam expimentem, an verò laudabilem iudicent alii. Is, aliàs priuatim nec maris, nec fœminæ meminit.

Ryff. icon
transposita

Ryffius in Diosc. malè habet pro cynocrambe figuram Mercurialis fœminæ proprio errore vel Typographi. Cynocrambes enim maris figura est sub titulo Mercurialis maris.

Matthiolo cynocrambe, cuius Galenus non meminit.

Cynocrambe
sive
Mercurialis
Lob. reprob.

Fuchs. Amat. Dodon. gall. & Lat. in fol. Lobel. Obs. & l. c. plant. Cast. [qui nullius momenti figuram habet.] Hist. Lugd. Euch. Fab. Columnæ, Apollini, Cynocrambe. Fuchs. icon. Camer. hort. Epit. & hist. Germ. Cynocrambe mas. Eidem histor. Germ. Thal. mercurialis syluestris mas. Trag. Lonnic. Mercurialis syluestris. Cæsalp. Mercurialis alpe- ra vel montana. C. Bauh. Phyt. Mercurialis, siue silu. testiculata, apud Matth. cynocrambe i. siue Mercurialis montana testiculata. Schvv. Mercurialis siluatica. Dioscor. cynocrambe Matth. & Dodonæi.

Cynocrambe
sive Mercurialis
Lob. reprob.

Camer. hort. epit. & histor. Matth. germ. Thal. cynocrambe fœmina. C. Bauh. phyt. Mercurialis 4. siue silu. spicata. Apud Matth. cynocrambe 2. siue Mercurialis montana spicata.

Nomina
linguarum

Kuonopelz, xunias, xunias d' yia Græcis, Latinis etiam simpliciter, ac passim Mercurialis syluestris: Aphris harnas, aliis asumeslabon: Germ. hunds fôh, hunds Fraut, vnde wildt Bingel- fraut. Belg. wildt Mærcuriack, wildt Bingel- cruyt. Gall. chou de chien & Mercuriale sauvage: Ital. Mercorella bastarda. Hisp. Verça perruna. Angl. wild Mercury.

Locus &
tempus

In syluis ac aliis perinde vmbrosis gignitur, vi- tet, vigetque eodem quo altera Mercurialis anni tempore.

Cynocrambem marem & fœminam obseruati Geneuz prorumpentem Martio & April: Basileæ cum essem in monte prope Moutets virentem adhauc Octobri, & mense Iunio iuxta Leu- rack, & in monte wasserfal: Abundat mas cum semine Maio in Montbelgarden si monte Mon- bar.

Vires

Facultate Mercuriali alteri respondet, si præ- stat quæ Dioscor. scribit [vide antè.]

PHYLLON EX VETERIBVS.

CAP. VII.

Wijn. la.
plu.

Phylli meminit Theophr. de plant. hist. lib. 9. cap. 19. vbi ita scriptum reliquit: Quædam ad procreandum marem, aut fœminam valere tra- duntur: eamque ob causam herbam aliam [videtur] quod nec Plin. nec Gaza agnouit, hic verò her- bam quandam simpliciter reddidit,] masculinam & fœmininam facientes, marem & fœminam dixe- rant, sibi inuicem similes, & Ocy mi figuram ha- bentes ambas: fructus fœmininæ mulcolo flori Oleæ similis, pallidusque, Alterius figura nuper ex mulcolo flore incipientis Oliuæ cohærens si- bi, geminūque testiculorum hominis modo.

Wijn. la.
plu.

Wijn. la.
plu.

Dioscorides ex Crateua tradit Phylli duo gê- nera. Phyllon, inquit, quod alii Elzophyllon, Bryoniam nominant [sunt qui legant, quod musci modo exeat, qui legant Græcis dicitur] in sa- xosis nascitur. Ac illud quidem, quod Thelygo- non (quasi Fœminiparum) dicitur, solum veluti Bryon, Oleæ pallidius gerit, sed colore magis herbaceo: caulem tenuem, breuem: radicem gracilem: florem album: semen Papaueris ma- iusculum. Arthenogonon (Mariparum) iam dicto simile, nisi quod semen differt: habet enim race- mosum, ei quodammodò simile, quod postquam defloruit Olea, primum emergit atque conspici- tur. Perhibetur autem, Arthenogoni potu ma- res generari: Thelygoni verò fœminas. Hæc me- moria prodidit Crateuas: quanquam talia mihi videtur historia tenuis, tanquam famâ auditione- ne accepta, proponere.

Plinius eadem ferè prodit: in codicibus tamen eius non Arthenogonon, sed Arsenogonon cor- ruptè legitur.

Galenus, Paulus, & posteriores Medici Græci, inter simplicia, Phyllon non recensuerunt, fortè quod nullum eius usum, vt Cornatio videtur, Medicum viderent, & ei, quem priores de ipso tradiderunt, parum fidei haberent: Aut, quod non secus illis ac nobis fuerit incognitum. Quo fit, vt mirari non liceat, si adhuc quoque legitimum nondum sit competum.

Videtur quidem Ruellius existimasse Persica- riam, quam maiorem cognominant, esse Phyl- lon. Quia in re apertè fallitur: siquidem Persica- ria illa humentibus ac viginosis locis prouenit: Phyllum verò in saxosis nascitur, vt Diosc. testa- tur. Qui tamen & ipse, vt eius verba accuratius expèdienti liquet, nullam huius herbæ cogniti- onem habuisse deprehendit, nisi eam, quam ex Crateuz historia habuit. Non desunt tamen, qui velint Phyllon à Linozois (Mercurialis) non dif- ferre, quod pluribus tum notis, tum facultatibus, sibi inuicem respondeant. Verum cum iis con- sentiendum non est, quod, vti iam antè quoque dictum est, Mercurialis folia habeat Ocimi, Hel- xinæ cognata, non autem Oliuæ: florem herba- ceum non album: quod nascatur passim in hortis etiam & vineis, non saxosis tantum: quod de his denique seorsim diuersisque capitibus scripserint Dioscorides & Plinius, vt pote de rebus inter se differentibus.

Ex Theophrasti porro verbis colligit Mat- thiolus, Dioscoridis codicem esse deprauatum, quandoquidem Theophrasto Theligionum non nascitur musci modo, neque solum habet Oleæ viridius, vt in Diosc. scriptum legitur: sed fructum quidem fert in modum musci Oleæ, pallidiorē tamen.

Suspiciantur quidam apud Hist. Lugd. duarum herbarum eandem & repetitam esse delineatio- nem, quare Diosc. caput de Phyllo vtramque Mercurialem marem & fœminam exprimi, quod vtrumque omnino erroneum est.

Alii alia Phylla adiuuenerunt. Est enim Phyl- lon quoddam Arthenogonon, & Theligionon folio incano Monspessulanum quod Dioscoridis putatur Dodonæo & aliis, vt paulò post videre est.

Est vt suum Phyllon Dioscoridis Agetio, de quo dicemus hist. n. g. lib. 29. sub Garyophyllo holosteo tomentoso.

Phyllon ex planta, quam Matthiolus in Salu- tino monte inuenit, nobis Cynocrambe fœmina est. Non enim cum Papæ & Lob. Adu. Noli me tangere.

Diosc. gen-
ra duo.
Elzophyllon
Bryonia

Thelygonon

Arthenogonon

Crateus

Plinius

Galenus
Paulus
Phylli non
meminerunt

Ruell error

Mercurialis
non est

Dioscoridis
codex
deprauatus

Error quod
vnde

tangere eandem suspicamur.

Phyllon Amatus censet ni multum fallimur
Ophyoglosson, de quo lib. 38.

Folium [αἰλλων] herbari, & feminam
αἰρυνθρον & θυλλων esse putat Gesn. in cat. pl.
quam *Umbilicis* vocant. Hanc nos Bisfolium mi-
nus, siue Ophry, esse dicemus lib. 31. Merito au-
tem de horto Gesn. eos increpat Gesn. qui Sedum
ferratim cum Celsis, & H. Lugd. Phyllum cogno-
minant & statuunt. Quod autem idem Gesn. in
descr. montis fracti in fine lib. de Lunaria; Sedum
alpinum minimis foliis ciceretum, Phylli genus fa-
cit, minus conuenit.

Alia adhuc duo Phylla Dalechampia apud
Hist. Lugd. pingit & describit; vocatque primum
simpliciter Phyllum arthenogonum: Alteram
verò Arthenogonon maius quod nos Phyllum
Dalechampi, musci genus inscribimus, de quibus
lib. 37.

Phyllon Hippocratis Libyctum & Aethiopicum
Silphium est, quod traditur lib. 27. *φύλλον* idem
vocat olera condimentaria; Rutam, Mentham, A-
pium, quæ aliis dum emebantur, adici solebant.
In Aëtio sæpè Phylli voces leguntur, pro Folio, &
foliis Malabathri.


De Leucacantha in genere dicitur, quod no-
tha voce Phyllon adpellatur. Est tandem Leuca-
cantha aliqua quam Phyllon alii cognominant,
nos verò, ceu lib. 26. patet, Carduum marianum
appellamus.

PHYLLON ARTHENOGONON ET Thelygonon folio incano Monspensul.



pediculis nixi, vix apparentes ante fructus, sunt
duo apices ochræ colore pallido: Fructus autem
sunt gemelli, testiculati, vt in Mercuriali mari, Cy-
nocrambe & Aparine, villosi loculis compre-
hensi: *femina*, inquit Lobelius, vt minoris Helio-
tropii exiliunt; immatura albidæ, matura verò
Cyaneo nient colore, rotundæ & quàm Papa-
ueris maiora, gustu feruida, & non nihil pinguis.
Radix lignola, exilis: In femina flores spicati ta-
cemosique, veluti in Mercuriali femina.

Monspensulibus hæc planta merito Phyllon
Dioscoridis appellata est, quamvis *Ελαυονδας* vo-
cari tradit propter similitudinem fortè quandam
eum Oleæ: folia enim habet oblonga & candidatio
vt Oleæ: Item *βρωτοια* propter florem masculinum.



matem, Theligonon feminam vocans.

Matth. in post. comin. non dubitat, quin Phyl-
lon à Cortulo missum sit verum Phyllum. Eum
autem mirari subit, siis Phyllum nouerit, cur non
describat, sed tantum pingat.

Dodon. Lat. in fol. feminam pingit, ac idcirco
Phyllon Theligonon merito ascripsit. Duorum,
inquit, generum Phyllon est; mas & femina, ve-
lut Mercenalis.

Phyllum duplex est Veteribus, inquit Clusius,
Quod Theophrastus mariticum [αἰρυνθρον] id
Diosc. Feminis [θυλλων] facit. Præterea Theo-
phr. [cuius sententiam potius sequimur] Phyl-
lo Ocumi folia tribuit: Diosc. Oleæ. Illud inter alia
ei cum Mercuriali, Cynocrambe, & Heliotropio
minori commune est, vt erunt radices temporis
succeslu cæruleum colorem contrahant.

Icones nostræ quæ ex Clusio desumptæ nobis
absentibus (licet non deessent plantæ ipsæ) cor-
ruptæ fuere per pictorem & sculptorem.

Camer. in Epit. & hist. Matth. gerin. ambo pin-
git vocans in hist. Phyllum matem & feminam,
Welsch Bingelfraut. In Epit. *φύλλον* *θυλλων* &
αἰρυνθρον. Sed temerè nimium, meo quidè iudicio,
Dioscoridis contextum huic Phyllo ascripsit, qua-
si absque controuersia atque errore Dioscoridis
Phyllum diceret. Figuræ autem positæ à Camer.
sunt Gesn. cui miseram ante multos annos plantas
siccas cum descriptione vtriusque. Sed quæ tanta
Camerarii ingratitudo, vt nec mei, nec Gesneri
mentionem fecerit. Cuculum semè dixisse in-
gratum.

H. Lugd. Compiler non animaduertit se
duas vnius figuras plâte proponere. Phylli enim
Theligonū Matth. & Phylli Theligonū Theoph.
quod cum eisdem Theophr. Phyllo Arthenogon-
o ponit, est eiusdem plantæ.

Tab. icon. & hist. Phyllon mariticum, Welsch
Bingelfraut Das männlein. Phyllon feminis-
cum, Welsch Bingelfraut Das Weiblin.

Gerard. Cynocrambe Doge Mercurie. 2. Phyl-
lon Theligonon, Chil. Dreins Mercurie. Icones
duas Phylli habet ex Tabern. Quis autem ex
Phyllo testiculato fecit Cynocramben, vt facit
Gerardus.

Cast. Durant. Phyllum.
C. Bauh. Phyt. Phyllon 1. & 2. siue testiculatum
& spicatum: Arthenogonon & Thelygonon.
Nascitur vtrique, vt scribit Clusius, multis H.

Phyllum Ge-
rardus
Matth. Wo-
tatur.

Camer. te-
meritas

Ingratitudo
da

H. Lugd.
ibi.


Cynocramb.
ibi

spaniæ & Galliz Narbonensis locis secundum
vias, ubi Aprilis, interdum maturius, floret. In Bel-
gio verò non nisi ætate: & singulis annis ex se-
mine deciduo germinat apud nonnullos rei her-
bariæ studiosos. Has plantas vidi circa Monspe-
lium virentes, florentes, & semina ferentes men-
se Aprilis, Maio, Iunio & Augusto. Phyllon vidi
in horto D. D. Felicis Plateri Basileæ, quod
cultura maius euadit, Genevæ mihi provenit in
horto.

Vires

Cuius ra-
di morfus

Arthenogoni potum alicui lexus fieri partus,
vt Theligi feminei, Theophrastus & Dio-
scorides scriptum reliquere. Silmanticenses v-
triusque decoctum omnibus animalibus à cane
rabido demortis propinant, magno successe, vt
inquiunt. Granatensis verò, Mauritanis præ-
ferunt, ad muliebres morbos magno in vfu est.



CORCHORVS VETERIBVS ET in genere.

C A P. VII.

Corchorum oleraceis adnumerat Theophra-
stus, qui ob sui amorem in prouerbium
(quod alii sic, *Corchorus inter Olera*) abiit, cuiusque
folium Ocimum emulatur: Plinius iis, qui spontè
nascuntur, quibus pleraque gentium vescuntur
in cibis. Corchorum, inquit, Alexandrini cibi her-
ba est, conuolutis foliis ad similitudinem Mori.
Præcordiis, vt ferunt, vitilis, alopecisque, & lenti-
gini. Boum quoque scabiem celeritè sanari eà
inuenio apud Nicandrum & serpentium morsus
antequam floreat. Sed cum Theophrast. Corcho-
rum Ocimi folio esse dixerit, mirum est Plinium
ex alio fortasse autore scripsisse Corchorum her-
bam esse conuolutis foliis ad similitudinem Mori.
Quare quidam legunt, (ii scilicet qui corchorum
Pilosellam maiorem esse concludunt, de qua suo
loco) commaculatis foliis, ad succi Mori similitu-
dinem, quæ in ea perspicere liceat.

Lectio di-
uersa: Cor-
chori. Cor-
choros. Cey-
cours mali-
dosè.

Sed varia lectio est Corchori. Suidas enim,
quod magis probò, *Κόρχος* habet, *κόρχος* Helych.
& Varinus. Notat etiam Hermolaus *Κόρχος* & *Κόρχος*
apud Græcos multos legi, verum id men-
dosè.

Æquiucca

Anagallis

Angelica 3

repens

Blitum 1.

Tragi

Pilosella

maior.

Pisciculus

quidam.

Corchorus

sive Moio-

chia

Caterum multis hac ætate cum Plinio Ana-
gallis Corchorus dicitur, quorum opinionem
non pto. In Anagallide enim folium non est
conuolutis. Corchori cuiusdam (non tamen Vete-
rum) nomine Angelicæ 3. speciem, quam repen-
tem inscripsimus, intelligit Gesn. horti. Idem Bli-
ti speciem quandam (Blitum 1. & 2. Tragi) facit.
Dalechamplus Corchorum esse suspicatur plan-
tam eam, quam pro Myofotide (auricula muris)
maiore Tragus depinxit ac descripsit, quamque
nos Pilosellam maiorem quorundam vocaui-
mus. Lycophron falsus est, *κόρχος* putans esse
pisciculum quendam, Eratophone teste. Est enim
vt dictum, olus quoddam agreste, & vile in Pe-
loponneso. Diuersum ab his prorsus Corchorum,
Molochiam Serapionis quorundam multi sta-
tuunt, quibus & nos facili subscripserimus. De
hoc igitur agendum.

CORCHORVS SIVE MELOCHIA.

Descriptio

Cvbiti leui caule hanc plantam obserua-
ti, folijs Cynocambes ferè vel Mercurialis



tionibus dehiscentes, semen claudentes copiosum,
cinereum, angulosum, paruum, gustu viscidum.
Flores, teste Alpino, parui sunt, crocei, Leucois
minores.

Prosp. Alpin. pl. Egypt. Melochia. Camerar.
hort. Corcorus sive Melochia. Olus iudaicum.
Hic inter icones ex Gesneri typis semen & folia
cum barbulis exhibet, quæ in Lobeliana pictura
fuerunt omissa. Lobel. Obs. & Ic. plant. Corcoros
Plin. Melochia Serapionis quorundam. C. Bauh.
phyt. Corchorus.

Melochiam seminaui in horto E.C. ex semine
misso per Fratrem C. Bauhinum qui mihi etiam
siccam plantam attulit. Augusti fine nondum
floruit. Crescit copiosè in hortis Halepi.

Semina Melochiæ sunt in maximo vfu apud
Egyptios ad omnes affectus, quibus semina Al-
thææ conducere comperitum est. Nam Melochia
facultate plantæ similis Althææ videtur, proinde
ad suppurandos, resoluendos atque emolliendos
tumores duos, eius maximus vfu est, habet et-
iam maiorem visciditatem eius mucilago quàm
Althææ. In cibis nihil est ipsa Egyptiis familia-
rius, decoquunt in aqua vel iute carniem, ex eius
cibo multi malè se habent, parum nutrit, & suc-
cum viscidum gignit ex quo difficiles viscerum
obstructiones. Foliorum decoctum est pectori
amicum, ipsum enim humectat, ex quo siccis al-
terisque tussibus præsentaneum cum saccharo
candido est auxilium, atque agrè spirantibus. Se-
mina pondere duarum drachmarum sumpta co-
piosissimè purgant omnes humores. Alpinus.
Ravvolvisus acidioris herbarum dicit, cui si cre-
dendum prædictis contrarias habet facultates.

DE LAPATHO, OXYLAPATHO, & Hippolapatho, Veterum senten- tiaz, & in genere.

C A P. VIII.

EX instituto hoc in loco de Lapatibus agemus,
in semine, & Blito his intercedit affinitas,
atque aded tota planta. Adde
quod emolliens est & holeracea.

Lapathi generis est, inquit Dioscorides, quod
in palustribus nascens, durum,
& aliquantulum in extremis acuminatum. Est &
alterum

alterum hortense, primo non ex *homo* Orib. legitur, non in omnibus, cui lectioni subscribit Plinius & Matth. nec legemur *homo* non dissimile cum Hist. Lugd. simile. Tertium silvestre est, parvum, simile Plantagini, molle, humile. Est & quartum genus, quod aliqui Oxalidem, aut Anaxyridem, aut Lapathum (*αἰνυρίδιον*, silv. Lat. ex vet. cod. addit.) vocant. Cuius folia silvestri & parvo Lapatho similia sunt: caulis non magnus: Sem-pagimibus. At vero Hippolapathum, olus magnum est, in paludibus quoque nascens. Diofcor. *homo*, qui quinq; Lapathi genera, non eo quo solent, sed perturbato ordine descripsit.

Lapathum
silvestre.
Oxalidis
Anaxyridis

Hippolapathum.

Plin. incen-
satur.

Galen. Lapa-
thum.

Theophr. no-
tatur.

Actius not.

Actius & Se-
rapionem
apponit.

Nomina
linguarum.

Oxylapa-
thum unde
accidit,
valis.

Oxylapa-
thum unde
accidit,
valis.

Oxylapa-
thum unde
accidit,
valis.

Oxylapa-
thum unde
accidit,
valis.

Oxylapa-
thum unde
accidit,
valis.

Oxylapa-
thum unde
accidit,
valis.

Oxylapa-
thum unde
accidit,
valis.

apud Plinium in humastio Vva, & Bumelia Fraxi-
no: itemque apud Theophrastum.

Lapathorum historia ex Veteribus relata, fu-
perea vt ex iisdem eorum virtutes adscribamus.
Omnium olus decoctum, inquit Diocor. aluum
molli. Crudum illud cum rosaceo aut croco Me-
licerides discutit. Semē sylvestris & Oxylapathi &
oxalidis cum aqua aut vino vtiliter contra dysen-
terias, colicacos affectus, stomachi fastidia, scor-
pionumque ictus bibitur. Si quis etiam in potu
præsumat, nihil ictus patietur. Radices ipsarum
ex aceto & crudæ illitæ, lepras, impetigines, sca-
broque vngues sanant. Sed antea locus aceto &
nitro in Sole perfricandus est. Pruritus decoctum
earum sedat, si eo foueantur. Coctæ in vino si
cum iure colluantur, autium dentiumque dolo-
rem mulcent. Strumas parotidasque discutunt,
si cum vino decoctæ illinantur. Lienies autem
cum aceto. Aliqui vntur radicibus contra
strumas, vinculo collo eas appendentes. Trias
& appositæ feminarum fluxiones sistunt. De-
coctæ cum vino & potæ regio morbo correptos
emendant. Calculos vesicæ comminuant. Men-
ses cient. Scorpionum ictibus auxiliantur. Hippo-
lathon easdem cum antè dictis Rumicum gene-
ribus vires obtinet.

Vicia & va-
sus in ge-
nero.
Ex Diofcor.
Aluum mol-
li.
Melicerides
Dysenteria.

Lepra.

Struma.

Morbus ve-
sicae.
Calculus.
Menfes.

Plinius cor-
rig.

Eadem serē & Plinius. Vbi autem iure exiguo
habet, lego ego thure exiguo: Et vbi melicerias,
lego meliceridas: Vbi poto vino, lego semine
ex vino poto.

Lapathum, referente Galeno, nemo crudum
edent, sicut neque Betam. Oxylapathum verò
crudum edunt rurales mulieres picâ laboran-
tes, aliquando etiam puen gulosi. Sed hæc de
Oxalide dicta credimus, cum qua Gal. Oxylapa-
thum confundit.

Nunc scito Lapathi varias esse significationes:
Ac primò quidem denotat simpliciter lumpum
quodcumq; Lapathum. Quale est Lapathū acutū
nostrum siue Oxylapathum: Lapathum vulgare
folio obtuso: Lapathum sylv. magnum vulgare:
Lathum acutum minimum: Lapathum sativum:
Lapathū maius. Hippolapathū siue Khabarba-
rum Monachorum: Lapathum maximum aqua-
ticum, siue Hydrolapathum: Lapathum aqua-
ticum minus, Lapath. folio rotundo alpinum: La-
patham anthoxantum: Lapathum acutum cris-
pum: Lapathum marinum sinuatum: Lapathum
fluitans longo serrato folio: Lapathum lingui-
neum, siue Sanguis Draconis herba, de quibus sin-
gulis ordine iam iam venit agendum. Est & Lapa-
thum Oxalida nuncupatum, nobis Oxalis maior
folio longo. Docti quidam Acetosam totun-
dam (Oxalidem folio rotundo) Lapathum esse
rentur, aut indocti. Lapathi species minor ces-
nero, Oxalis minima. De Lapatho Persicaria
vulgò dicta vide lib. 38. Vocant Lob. & Pena in
Adv. Fontalem crispam, pusillum Fontilapathum
& Lapatholum tenellum, inconsideratè. Hallu-
cinantur, qui cum Amato contendunt Spina-
chiam esse Lapathum sativum. Lapathum Diof-
coridis tertium, non est Bonus Henricus, vt qui-
dam volunt. Apud Geln. in alcript. Diofcor. falsè
habetur Phyllium esse Lapathum silue &c.

LAPATHVM ACVTVM SIVE Oxylapathum,

Ad cubiti & sesquicubiti altitudinem excre-
cit, canle multis alis concavo, striato, subru-
gato.



bente : folia
Betz, longiora
rugosiora, &
nonnihil in
ambitu crispata,
modò acumi-
nata; alia sub-
rotunda, sa-
pore subacido:
flores mulco-
si, copiosi ex
fibris com-
positi : qui-
bus semen tri-
quetrum suc-
cedit; mem-
branis foliis
ternis ex viro-
re rubescenti-
bus conclu-
sum. Radix do-
drantalis cir-
citer, crassitu-
dine digitali, crocea, sapore amaro.

Gefn. hort. Lapathum silv. Oxylapathum vocatum, à foliorum figura acutiore, non quidem omnibus Lapathis, sed nonnullis: Ex de coll. Lapathum cuius radices vñs est ad scabiem.

Cord. in Diosc. Lapathi 3, species; Oxylapathon, Rumex acutus, Lapathum acutum, silvestre simile, nisi angustiora & acutiora haberet folia.

Lob. & Penz. Adv. Lapathum acutum, siue acutifolium, nusquam non in pratis. Lob. Obferu. & Ic. Plant. Lapathum acutum; Oxylapathum, qui figuram habet, quæ non multum placet. Nostram enim tam sculptam ex Fuchsis quam etiam retinet Amatus.

Dod. gall. Oxylapathon, Rumex acutus, Lapathum acutum Offic. Et Lat. in fol. Lapathum 1. Lapathum silv. siue Oxylapathum.

Fuch. Lapathum 1. Diosc. siue Lapathum acutum Officin. Oxylapathum cuius quamvis anceps in acidum saporem, vel acutum figuram, videatur significatio, tamen nomen à foliis, quæ in mucronem desinunt, accepisse videtur.

Brunfels. Hiero. Brunsch. & Apollini, Lapathum acutum, Oxylapathum. Helfrico, Rumex sylvestris, *admodum acutus*. Wierling. Rumex, Hippolapathum, officinis Lapathum acutum.

Hist. Lugd. Oxylapathum Diosc. primum Lapathi genus, Offic. Lapathum acutum. Aëto, Sylvestre Lapathum 2. in aquosis nascens, folio admodum acuto, quod Oxylapathum Dioscoridis rectè opinatur.

C. Bauh. Phyt. Lapathum 7. folio acuto, Oxylapathum Dioscoridis, & Plinii. Apud Matth. Lapathum acutum, & Sida sylvestris Auicennæ.

Schvv. Lapathum acutum, *admodum* Dioscor. Lapathum acutum Offic. Gelb spiz / Ochsenzünge spiz. Hort. Lus. Lapathum acutum, Oxylapathum acutum, Gelb Ochsenzünge / Glündwurz.

Nemina
linguarum
Lapathum acutum, *admodum*, Germ. Grindwurz, Trag. spiz ampffer / wilder ampffer, mangelwurz, wilder mangolt, Streifwurz, zitter wurz, Belg. panich & paerdich, Gall. paille, Ital. Rombre lapario, Hispan. paradella, Lapacca, & Romaza, Angl. dock.

Locus &
tempus
Montbelgard. Oxylapathum siue Lapathum commune passim provenit etiam in horto E. Cel. spontè: obleruau. Montpel. Basileæ cum semine


menfe Octobri, Genevæ, virens mensis Februarii principio. Martio mensis, vt habet Tragus, folia emergunt, appetente Iunio floret, spontè sua gignitur in humectis hortis, palustribus locis, pratis & circa fossas.

Ex Oxylapathi radicibus aqua destillatur, quæ ad pustulas, alphas, ionthos, vitilignes, lichenas, omnesque denique cutis, præsertim faciei, maculas delendas plurimum facit. Decoctum Oxylapathi ex vino diebus aliquot potum adrignem pellit & cutim pristino nitore restituit. Credunt quidam (ex superstitionis) lippite nunquam eos qui Rumicis sylvæ radicem Lunâ de crescente effossam secum portauerint: Hist. Lugd. Radix Lapathi acuti fortis ad lotiones, fotus, & linimenta, etiamque intro in decoctis, vsurpari Officinis locuta, vt & ramuli & folia.

Vires. &
vñs.
aqua.
Cuius sibi
facies, macula
Decoctum.
Superstitionis
Radix
Lapathum
acutum co-
tum

LAPATHVM VVLGARE FOLIO obtulo.

Folii supernè retusis, breuioribus quàm in Lapatho acuto, rotundioribus, à quo, teste Lobelio, semine, caule, flore & radice viz discernendum.



Lectores perpendant qualem describat Matthiolus; in post. committ. cum magna fig. Lapathum spontaneum, an descriptio fortè non facta ad plantam, si ad plantam facta an possit conuenire Lapathum cui solum retulim.

Descriptio-
nem Matthioli
Historia Lugd. H. Lugd.
posuit pro La-
patho satiuo
Tragi, & figu-
tam Matthioli Hippolapathi pro eo Lapathum cõtra mentem ipsius Matthioli.

An Anguill. Lapathum silvestre; foliis cæteris rotundioribus? C. Bauh. phyt. Lapathum 6. folio subrotundo, Lapathi tertia species Dodon. Hist. Gall.

Idem locis nascitur, quibus vulgatissimum circa rudera & areas.

Lapath. fol.
subrotundum

Locus

LAPATHVM SILV. MAGNVM vulgare.

Lapathum Rumex agrestis quidam qui à Pharmacopolis Lapathum nunc dicitur, à Germ. hasen ampffer / Cassè wüurz, & Butter ampffer / Butter latti, quoniam rustici Butyrum eius foliis inuolutum in vrbes venale ferant: non desunt etiam qui Buglossum eum vocent, Missenorum & Wittenbergensium Saxonum Germanico vocabulo decepti, autore Cordo in Diosc.

Tabern. Icon. & Hist. Hippolapathum silvestre, wild Mengelwurz, aut Meinen wüurz.



Schvv. Lapathum vulgatifissimum, Lapathum Officinatum. Obsen- ginge, Butter- bletter / Ohm- bletter / Gind- wurz. Herba vulgaris noti- tia.

Hippolapathum non solum in palu- stribus proue- nire vidit Mat- th. sed etiam in montibus, iis praesertim in lo- cis, vbi pecudes diutius stabula-

ri solent, & vbi eorū si no pinguescit solum, illi plantae omnino respondens, quae sub Rhabar- bari nomenclatura, passim hodie in hortis ac vi- ridariis colitur. Loc. s humidioribus in arcis pagorum ad stabula plerumque reperiri tradit, Schuvvenchf.

Radices, eodem autore, trita illinuntur contra scabiem aliisque cutis infectiones. Addunt vnguentis quibus capillos flauos reddunt, capi- tisque furfures abstergunt. Folia calidis deflu- xionibus vultu imponuntur. Pares obtinet cum Oxylapatho vires: nec ab eo distinguere vi- detur Dioscoridis.

LAPATHVM ACVTVM MINIMVM



Omnibus partibus minus est Oxy- lapathum vulgato cetera ei similli- mu: interim hoc peculiare habere videtur, quod statim à radice ferè caulis in alas incipit diuidi, in quibus flores ex certis interval- lis verticillatim nascuntur mus- coli, luteoli, sin- gulis ferè verti- cillis appposito foliolo ligula in- star: quo verti- cilla tamen ex- trema carent.

Lob. Icon. Plant. Lapathum acutum minimum. Tab. icon. & H. st. Hort. Lusit. Lapathum mini- mum. C. Bauh. Phyt. p. 135. Lapathum s. siue mi- nimum.

Circa Montbelgardum prouenit locis humidis florens Iulio & Augusto.

LAPATHVM SATIIVM LAPAS.

Descriptio V Era hortensis Rumex, quam Laufannae Sa- baudiæ omnino prouenire scribit Tragus, La- Tom II

patho maiori, siue Rhabarbaro Monachorum, quadantenus similis est, at folia tenuiora sunt pinguiora & molliora, ac etiam magis exigua; quare inter olera reliqua ob dulcedinem suam in culinas recepta est. Rumicem domesticum, Sa- baudienses Lampe & Lampade vocant. Gesn. hort. Lapathum hortense in Sabaudia tantum vi- dit circa Laufannam & alibi, vbi Lampe vocatur vulgo, Lapathum maximum est, quod aliqui apud nos in hortis ferunt: Rhabarbarum Monacho- rum. Cord. in Diosc. Lapathum, Rumex satius Garren ampffer.

C. Bauh. Phyt. Lapathum i. hortense siue secun- dum Dioscoridis, Rumex hortensis, vel satius Tragi, quem Hippolapathi silu. nomine pingit Matth. Ital. & ex eo Lugd. p. 606. Lapathum satiu- um Lugd. 601.

Cui dicitur à fratre Lapathum satiuum Tragi pingi per Matthiolum pro Hippolapatho ani- maduertere non possum. Tragi Lapatho folia sunt magis exigua, Matthioli autem Hippolapa- thi folia Rhabarbaro omnino respondent: in eo imitatus est Hist. Lugd. vbi Lapathum satiuum Matthioli & Lapathum Tragi idem esse tradun- tur, & confunditur cum Hippolapatho Matth.

Conseruator Hist. Lugd. Lapathi descriptionem ponit ex Matthiolo, deinde ei iungit Tragi & Ges- neri sententiam de Lapatho satiuo: praestitisset posuisse descriptionem ex Trago, vel date nouam herbae quam dicit du Lapas vocari: Cur icones e- iusdem plantae Matthioli diuersis locis posuerunt pro Lapatho satiuo Matthioli, cuius assumpsit descriptionem, ponit iconem à Matthiolo non propositam pro Lapatho satiuo sed Hippolapa- tho: cur dicit Lapas ruri in hortis colere deinde in hortis non ferri? Cū h. e. signis confusio ap- pareat, nos lectorem indicandum relinquimus an utraque icones Matthioli non sint referendae Lapatho vulgari sylu. maiori, descriptio autem ex Matthiolo, Lapatho folio obtuso: Nomen Lapas in historia Lugd. amphibologiam habere videtur: Sed vt liberè dicam quod sentio: suspicor Tra- gum & Gesnerum pro Lapatho hortensi Laufan- nensi obseruasse Rhabarbarum Monachorum primo anno satum, quod tunc delicatius est quam sequentibus, si quis nos aliter doceat rem gratam faciet

Lampe
Lampade
Sabaudia
Lapathum
max
Rhab Mo-
nachorum

Hippola-
thum

C. B. nor.

H Lugd.
nor.

Comp.
not.

LAPATHVM MAIVS SIVE RHABARBA-
rum Monachorum.

Hominis proceritatem interdum assequitur, caule surgens striato, rubente, lupo- riora vetulus in numerosos fur- culos diuiso, flo- ribus serie longa per totos ferè ramos mulcosite femine subse- quente angulo- so, folliculis mē- braneis circum- dato: folia pe- dalia & sesqui- pedalia, lata, a- cuminata, dura, rigida, rubentia

Descriptio

sursum aliquando reflexis oris nonnihil, vt Canalem quendam imitentur, pediculis rubentibus longis. Radix proluxa, crassa, multis adnatis fibris donata, intense crocea.

Synon.
Rhabarbarum
hortorum

Quod vulgus Europæ [ait Sylu. de simpl.] pro Rhabarbaro passim in hortis ferit, Lapathi genus omnino videtur licet radicis colore Rhabarbaro nonnihil sit affine, viribus tamen plurimum abest. At cum reliqua Rhoi vtriusque historia nemini scribatur, conuincere nequeas, congenerem plantam, vel degenerem & diuersam, nisi ex partis vnius natura.

Differentia
Rhab Mo-
nachorum
à ceteris
Rumicibus

Tragus in H. It. Germ. Rhabarbarum Monachorum ait esse herbam peregrinam, primum in Hircinia silua reperiri, ac postea in cœnobis Monachorum excoltam, vocatque Hippolapathum & Rumicem grandem, ab aliis Rumicibus in eo tantum differre tradens, quod folio & caule magis rubeat & proceriore sit.

Hippola-
path. Ru-
micis grâdis

Geln. hort. Lapathum maximum, Rhabarbarum Monachorum dictum: idem aut omnino proximum Hippolapathum in palustribus locis, aut montanis nascitur.

Rhab. Ge-
rum magno
eure

Lapathi vel Rumicis speciem, quam in plurimis Germaniæ locis ferunt, magno errore, ait Cord. in Diosc. verum Rhabarbarum esse credunt.

Ande hoc Monardes de simpl. noui orbis lib. 3, ex versione Clusii. Planta quam multi in Hispania Rhabarbari nomine seuerunt Rumicis folia obtinens, cuius genus illam esse existimo, quoniam secundum Rumex rubentem habet radicem.

Patientia
Cugi

Lob. & Pena Adu. Satiuum Hippolapathum latifolium vulgi, & Rhabarbarum Monachorum, Obl. Hippolapathum satiuum latifolium, Rhab Monachorum, Patientia vulgi. Icon. plant. Hippolapathum satiuum latifolium & Rhabarbarum Monachorum.

Dodon. gall. Lapathi 2. species *Latifolium* & *Rumex*, Rumex satiuus, Rhabarbarum Monachorum Neoterorum quorundam, & Galeni Hippolapathum: Et Lat. in fol. Hippolapathum, Rhabarbarum Monachorum.

Fuch. Lapathi 2. genus Dioscoridis: Lapathi hortense, Oxylapathum dissimile, non quidem in vniuersum, sed duntaxat in foliis, quæ Serapione teste, multo sunt latiora Rhabarbaro Monachorum.

Lapath. la-
tifolium
longa &
rotunda
forma

Lapathum latifolium [inquit Camer. hort.] itam longa quam rotunda forma vocant, Rhabarbarum Monachorum, quod Veteres Hippolapathum, in dupla dosi exhibitum nihil purgat. Item Lapathum satiuum: Et alibi: Rhabarbarum Monachorum. Considerent autem Lectores, quæ in re differat Lapathum rotunda forma à Lapathum rotundifolio: præterea perquirant discrimen Rhabarbari Monachorum à Lapathum satiuo.

Patientia

Gortopis in Vertumno, Patientia vulgo; cui nomen de Græca voce *παμ* *α* i: vacuo, factum. Est eadem Heriath. lib. 9. Lapathi genus, delicatius & tenerius ceteris, quod vulgus Patientiam nominat, de quo titulum prouerbium: *Lapathum non in cuiusvis horto prouenire.*

Hippolapa-
thum.
Rhabarba-
rum.
Purgat.

Taber. icon. & hist. Hippolapathum satiuum. Rhabarbarum hortorum, à peregrino non ab simile, quod [vt à medicis fide dignis Matthiolo relatum est] bilem deiecit, quamuis peregrino sit longè infirmius. Ait is præterea in post. commen. Ital. esse aliud Rhabarbarum potius fassum, quæ verum, quod vulgo vocant Rhabarbarum Monachorum. Sed nullam facultatem veri Rhabarbari

habere, licet contrarium crediderint aliqui. Idem in hist. vocat Hippolapathum verum siue Rhabarbarum Monachorum.

C. Bauh. phyt. Hippolapathum 14. siue latifolium Rhabarbarum Monachorum dictum, Hippolapathum Dioscor. Gal. & Plinii. Rumex vrbæ Theophr. Rhabarbarum substituit.

Lapathum maius, siue Rhabarbarum Monachorum: Germ. Münch Rhabarbarum. Galli, *Rheubarbe des Moines*, *la Patience*. Belg. *Patientie Burg*, *Chou lachou*.

Folia mense Martio emergunt, appetente Iunio floret: & sponte semine se propagat. Hippolapathum hortense Matthioli scribitur à pluribus spectaculi causa in hortis & viuariis: siue sponte nascitur in palustribus. Nos in variis Germaniæ, Galliæ & Italiæ locis obseruauimus.

Rumicis, qui Rhabarbarum monachorum vocatur, radix purgandi vim obtinet autore Fuchio, si in puluerem redacta drachmæ pondere sumatur. Neque id mirum admodum, cum etiam Dioscor. ipse omnium Rumicum ulus decoctum alium mollire, atque decoctas eorumdem radices cum vino, regio morbo correptos emendare, ob bilis nimium per inferna educationem, testetur. Quomodo verò eâ vti deceat, Tragus te docet.


Magnan virium, inquit, hæc radix cum pauxillo Zingiberis sumpta, phlegma & bilem perinfensiora euacuat, hoc modo. Rad. aridæ drachmam, Zingiberis scrupulum, in puluerem redige, sume ieiunus in iure calido. Pro Rhabarbaro qui substituant, duplici dosi videntur. Radix d'gerit, abstergit; prouocat, mundat, aperit, nonnihil adstringit. Bilem flauum & serosum humores educit.

Folia tenera in oleribus eduntur ad emboliam alium. Radicis succus, ait Matthioli, cum sulphure illitus scabiem sanat, cum Lupinorum vel d' farina lentiginis, alphas, & alias cutis infestationes extirpat. Radicis diluam, ex vino paratum præstat ad pellendos renum calculos. Idem facit sicca radice puluis: drachmæ pondere ex meraco potus: quin etiam ex matrebelli decocto haustus auriginem curat.

LAPATHVM MAXIMVM AQVATICVM siue Hydrolapathum.

Magis huic in fibras ducta est radix, quam vel Oxylapathum, vel Hippolapathum, foris nigra, intus buxæ: cum notabili adstrictione amaricans: caules surgunt ad cubitos duos, flore & semine Lapathi acui, cui & folia similia, sed longitudine ferè sesquicubitali, lauiora, minusque rugosa, leuiter crispatis oris, subacida, & strenuè adstringentia.

Dodon. gall. Lapathi quinta species, hippolapathum magnum aut Rumex palustris: Gal. *Grande Parelle*, u. *Parelle des Marex*: Germ. *Wasser ampfer*: Belg. *Grote patif* / aut *water patif*. Et lat. in fol. *Lapathum*, siue *Rumex* 3, Hippolapathum dictum folio ampliore ac maiore satiuo. Idem postea hydrolapathum vocat, in fossis ac scrobibus requirendum. Eam autem hydrolapathum non nouisse, commonstrat E. gura, quam pro Lapathum satiuo proposuit. Hippolapathum etiam vocant Cordus, Tragus, & Lobelius. C. Bauh. *Lapathum* 11, aquaticum folio cubitali. Apud Matth. hydrolapathum silv. Matth. & Cast. *Lapathum palustre* Tabern. Schv. *Lapathum palustre maximum* *des Marex*, hippolapathum silv. Matth. *Rumex*



Locus & tempus.

Vires
Erro r quo-
rundam.Viterus.
Vlcera.

Quidam Antuerpiani & Galli audaculi Sepiasarii ad medicos vsus sufficiebant rehen rubro, cuius faculantes & notas non minus adumbrante Lobelio, quam Limonio. Radix crassa, crocea lenit alium. Iheritiam discuit. Folia Podagricis calidis, & vlceribus vtiliter imponuntur fluentibus, Schvvenckf.

LAPATHVM AQVATICVM minus.

Locus.

Hic etiam aquae sunt natales, aiunt in Adv. Lob. & Pena, sed non nisi limpida & fontana, trans quas e fundo exerit

entilapa-
b. pusillum
apathum
enallum.

Lys.

tilapathum, & Lapathium vocatum tenellum.

Lob. Tabern. & Hist. Lugd. C. Bauh. Phyt. Lapathum 12. aquaticum minus. An Geln. hort. Lapathi genus sily. quod circa lacus Tigurenfis ripas nascitur in ipsa etiam aqua. Schvv. Lapathum palustre minus Hydrolapathum minus.


Folia miscenda colligebant sedulo quidam Pharmacopœi Narbonenses, praesertim Nemausi ad vnguenti Martiati nomen & rerum farra ginem consulsissimam, tuebanturque semper

Tom. II.

aquaticus, Grosswasser oder weicher ampffer, wild Münch Rhabarbarwurcz.

Maximum Lapathum aquaticum provenit in fossis vrbis, id existimo variare à vulgari Oxylapatho propter stoma, qui facit ut diuersa videatur planta ob insignem foliorum amplitudinem. Nascitur aquosis palustribus, ac stagnantibus locis & fossis humidioribus.

idem, non aliud generis Lapathi, miscendum esse illi vnguento.



LAPATHVM FOLIO ROTVNDO Alpinum.



Descriptio

Lapathum listud radice furculosa & longa nititur, cuius singuli furculi pluiquā pollicarē crassitiem facile assequuntur, rugosi, & fibrosi, flavescentes intensè, sapore amaro: caulis bicubitalis & tricubitalis, cauus, profundis sulcis exaratus, rubescens, alijs multis donatur: folia Bardanae, notabilis latitudinis, ro-

tunda, glabra, pediculo rubente & striato appenduntur: flores mucosi copiosissimi alas ferè totas obsident, ex herbis tribus foliis apicibusque multis luteis compositi: quibus semina succedunt triangularia, nonnihil rubentia.


Geln. hort. Lapathum siluest. circa Friburgum Helueticorum, folijs ferè rotundis. In app. Lapathum rotundum, Rhabarbarum appellatum propter similitudinem aliquam. Anguill. Lapathum rotundum, quod non vult dicere Rhabarbarum. Lob. & Pena Aduers. Obs. & Ic. plant. Hippolapathum rotundifolium, Pseudo Rha Recentiorum. Figura non multum placet. Camer. hort. Lapathum rotundifolium, quod nonnulli Rha perperam existimant. H. Lugd. Hippolapathum rotundo folio Lobel. Pseudorhabarbarum Recentiorum. C. Bauh. phyt. Lapathum 15. Hippolapathum rotundifolium. Schvvencckf. Lapathum domesticum rotundifolium.

Synonyma
Lapathum
rotundum.Pseudo Rha
quorundamLapathum
domest. ro-
tundifol.

Locus

Nascitur, autore Clusio, in omnibus iugis Alpium Stiriacarum & Austriacarum, praesertim circa humidiora illa loca, ad quae armenta stationem istic habentia æstivis mensibus aquationis gratia conuenire solent frequentissimè. Olim in peregrinatione mea Rhætica cum D. Gesnero inueni in Rhætiae alpihus, habui etiam Genevæ in horto allatum ex vicinis montibus vbi durabat cum folijs amplis rotundis. In horto Ill. E.C. plantatum se propagat.

Nomine Rhabarbari utebatur Lazarus à Vireo, Schvvendè, qui aiebat purgare, si ad duplum Rhabarbari exhibeatur.

LAPATHVM ANTHOXAN-
thum.

Lapathum silu. 4. Dalechampii, eam plantam quidam esse putant, quam nonnulli Panaces Chitonium folio, Lapathi, flore aureo, à Chitonium Plinio dictum esse arbitrantur. Radice est breui, furculosa, fibrosa, dura, lignosa: caulibus duobus,

O o o o ;

aut tribus, angulosis, palmi altitudine: foliis Oxypalathi, oblongis, angustis: flore in summis ramis aureo. Vnde Antoxanthos, id est, lutei floris Lapathum nuncuparunt.

Locus



Casp. Bauh. phyt. Lapathum 10. siluestre flore aureo.

In fossis & viginosis locis prouenit. Nam & C. Bauhino hoc ad palustria circa Norimbergam collectum transmittit D. Doldius.

LAPATHVM ACVTVM

crispum.

Synonyma

T. Abern. Icon. & Hist. Lapathum acutum crispum, Fraus & Spiz mengelyburg.

Cas. Bauh. phyt. Lapathi folio acuto folia saepe angustissima oblonga & crispata. Schuvenckf. Lapathum acutum crispum, *l'asquum*, Spiziger fraus per amper.

Humectis gaudet.

Locis

LAPATHVM MARINVM SINUATUM.



Elegans haec Lapathi species, cauliculus emittit humi procumbentes, alias oblique erectos, dodrantales, in ramulos diuisos angulosos, atque striatos, quibus folia vncialibus se: è pediculis harent, alternatim posita, lacinata, duabus insignibus lacinis inam partem in totidem appendices diuidibus, figurâ oblongâ, è quo-

rum ramulis ramulorum exortus est: qui velut in spicas longas ex semunciali intervallo, flosculos minimos aggestos habent, obolei coloris & ex luteolo virente, quodammodo albicantes. Radix rufescens, simplex ferè paucisque fibris donata.

Gener Cherlerus Iunio florentem collegit prope Argemortem.

LAPATHVM PVLCRVM BONONIENSE LINNÆUM.



pendente, subrotunda: caulis palmaris: in eo calices hispidi geniculatim dispositi.

Pulchrum est Lapathum quod à diligenti stirpium indagatore D. Agorio Medico Argentinenâ accepinus collectum Bononiæ, ex crassa radice multa folia, pleraque duarum vnciarum pediculis tenacibus cuiusdem penè longitudinis proferens, vnciam lata, in medio profundo utrinque sinu ref-

Descriptio.

LAPATHVM FLVITANS LONGO

ferrato folio.



Flus radix est ex singulis geniculis fibras emittit n. bus vado i. haret, primis internodiis rubescens: caules edit multos, rotundos, quinque aut sex cubitos longos, in aqua fluitantes: folia palmataque eo amplius longa, angusta, in ambitu crenata, alternatim per caules nascentia, gustu saturo & sicco. In cau-

Descriptio.

lium vertice thyrsus eminet eâ prorsus specie, quâ in Potamogetone visitur. Nascur in vadis annuum pigriorum, vt Arans.

Oxylapathum aquaticum Dalechampii. Casp. Bauh. Phyt. Lapathum 13. in aquis fluitans foliis crenatis. Lapathi genus silv. Gelfneri.

LAPATHVM SANGVINEVM, SIVE sanguis Draconis herba.

Facilis est huius à Lapathis reliquis discretio, sanguineo succo quo leatet, nervis per folia Lapathi minoris, acuminata, crebris discurrentibus, varioque implexu ruborem atro sanguineum virentibus foliis conaliantibus: quorum succus & manus

Descriptio.

Synon.

Varietas



& manus & alutam primum purpureo, mox in caruleum degenerante colore tingit, quo simul & pediculi foliorum turgent. Reliqua effigiatura non absumilis Laphtho acuto, nisi quod magnitudine superatur.

Dodon. gall. Laphthi quarti species altera, parua & siluestris, tota rubra, floribus & seminibus. Reperiti autem in hoc genere tota cœlidā

instar nivi affrmat. Rubram autem à Latinis Laphthum nigrum appellari scribit, à modernis Sanguinem Draconis: Gil. sang de Dragon, Germ. drackenblut. Et Latin fol. Laphthum s. siue rubens: Laphthum nigrum & niger Rumex. Perperam, inquit, faciunt, qui succum huius, qui ex hoc instar vini rubentis expimitur, Sanguinem Draconis vel esse suspicantur, vel nuncupant.

Hist. Lugd. Laphthum siluestr. tertium: Tertium Laphthi silu. genus Diofco. inditum, Laphthum nigrum & Sanguis draconis. Lobel. & Penz. Aduert. Obl. & Icon. plant. Laphthum sanguineum. Camer. hort. Laphthum sanguineum siue Sanguis Draconis, Græcis σάνγις δράκοντος.

C. Bauh. Phyt. Laphthum g. rubens. Apud Matth. Laphthum sanguineum. Cur leuerus censor iconum Hist. Lugd. non potius imitatus sit iconem Camer. quam Lobeli nescio.

Hort. Lusit. Laphthum sanguineum, Sanguis Draconis herba.

Locus & Tempus.

Sanguineum Laphthum à me satum Mont. belg. in hortu Ill. E. C. facile prouenit & secundo anno caulem profert, semine deciduo se multiplicat & propagat, floretq; Iunio: Basilæ & Lugduni habui in hortu Bononiæ vidi in hortu di S. Saluador al Burgo di S. Catharina: Tubingæ cum effem apud Fuchium ei dicebatur Sanguis draconis. Septentrionis hortis sponte etiam onitur, rarus in calidis plagis.

Folia aluuta crient in iusculo, aut expressis succus sanguineus totius plantæ, Lobelus. Gultu nitrofiore quam Oxylaphthum essa deprehenditur. Reliqua sunt cum eodem communia. Semen puluerisatum & in aliquo decocto astringente potum singularem habet efficacitatem. in sistendis nimis mensibus & similibus fluxibus, Camerarius.


RHAPONTICVM.

CAP. IX.

Descriptio

Rhapontici radix, quam ostendunt S-plasæ, Raphani medicis ciassitudi. e est Rhubarbaro grauior, compactior, goio, fuscoque colore obducta, testâ per trā fectum lpias ostendens, colore vario, minus que rubro quam Rhubarbū, amaro vix euidente & fere duci lapo-

Tom. II.



RHABARBARVM.

CAP. X.



Crassæ radicis taleolæ sunt, quas vtraque manu interdum vix complētis, cortice nigricante obductæ, circularibus Zonulis rugosæ, valliculis tiber bulque inæquales, medio creter graues eū substantia nonnihil interrim sit fungola, crocea, crispo linearum rubentium discursu veluti vndulata, non sine albedine aliqua

Descriptio

Corice

Substantia

Sapor.

admista, sapore amaricante haud ingrato nec vehemente, cum euidente adstrictione. Liqueorem cui infunditur colore croceo tingit.

Hic Rhubarbarum tantum describimus, plura de ea scriptos ex Veterum & Recentiorum sententia in huius Secundi Tomi Appendice tradidimus.

OXALIS VVLGARIS FOLIO

CAP. XI.

Delicacies

Hic libro Oxalides sine imponant. Quantum enim accedat ad Lapatia, vel hortulanis notum est, à quibus plerique Lapatij nomine veniunt. Oxalis igitur vulgaris folio longo, cubito altiores promittit caules striatos, concauos, in alas diuisis: filia B. fortæ minora, acuminata, quæ pediculo adherent falcata pinnatæve, succulenta, atrourentia, sapore acido: flores & semina Lapatij acuti: Radix fibrosa, lutea, strenuè sicantæ & adstringente sapore.

Brunt. Acetola & Laphthum acetosum.

Oooo 4

OXALIS FOLIO AMPLISSIMO GENICV-
lis tuberosis.

Descriptio Oxalidis genus in iugo Wechfel Clusius obseruabat, satiuo multo mai⁹, foliis valde amplis: cui hoc peculiare erat, vt in caulis nodis & geniculis, subinde veluti tubera quædam adnascerentur, è quibus folia tandem sese explicarent: quæ tubera tellure obruta [periculum enim fecit] sui generis plantas protulerunt.

Synon. Clus. Pannon. & Hist. Oxalis amplissima folio. C. Bauh. phyt. Acetosa 4. geniculis nodosis.

OXALIS TUBEROSA RADICE.

Descriptio

Oxalis tuberosa, terram supra, Oxalidè præterem refert: foliis partis magnitudinis & tormæ, aliis caulem alis suis complexis, aliis longiore pediculo nixis. Flos stamineus, luteolus, racemulos. Lobelio teste, radicibus tuberosis filipendulæ vel Oenanthæ perquam spectabilis

Oxalis exotica, foliis, caule & semine hortensis, quam toto habitu præfert.

Synon.

Lobel. Obseru. & Ic. Plant. Camer. hort. Hist. Lugd. Tabern. Oxalis tuberosa. C. Bauh. Phyt. Oxalis 3. tuberosa radice.

Locus & tempus

Heidelbergæ in horto Di. Sprengeri vidi florentem Iunio folio longiore. In Belgis rara & Generosis D. Brancioni à Do. Pancio Ferrariensi medico missa Lob.

OXALIS FOLIO ROTVNDIORE
repens.**Descriptio**

Ludit subinde hæc foliis modò rotundis, ferè Cochleariæ vel Chelidoni minoris proximis, modò alarum appendicibus donatis, aliàs Sagittæ instar mucronatis pinnatisque, veluti Spinachiiæ foliorum extremum, colore glauco, pinguiusculis delicatoq; acore præditis: caules inanes, cubito longiores: flosculi è fibris componuntur ex lu-

teo rubentibus; vt in aliis, quibus & semen respundet. Radix tenuis reptat vt & caules, sapore minus acido, sed magis sicco quàm folia.

Hist. Lugd. Lapathum alterum siluestrester. **Synon.** tium Dioscoridis Lapathi genus, paruum, plantagini proximum, quod docti quidam vulgi Acetosam rotundam esse rentur.

Ruellio lib. 2. c. 49. Acidula aut minuta Oxalis, vulgò dicta Gallicè Ozeille menue: Oxalis altera Hederæ foliis. Oxalis hortensis minor, Ozeille rotunda, de; Ozeille franche, & Ozeille Romaine, Oxalis rotunda.

Lobel. & Peña Adu. Obs. & Ic. Plant. Oxalis fatia franca rotundi folia repens; Romana vocata, quia præfertur cunctis gustu & aciditate delicatior.

Amatin Diosc. Oxalis 3. folio hederaceo; Bilocata Recentiorum. Huius, inquit Rob. Const. apud Amatum, hortensis Oxalidis aliud est genus cuius nec Diosc. nec Amatus meminit folio sc. rotundo & carnosiore. Sed Roberto non assentior dum dicit Amato non cognitam Oxalim folio rotundo, nisi mihi demonstretur diuersam esse quandam folio hederaceo Oxalidem.

Gesn. hort. Oxalis rotundioribus foliis, Lapathi species minor, siue Oxalis alteri minori cognata quam aliqui Acetosam Gallicam vocant.

Camer. hort. Acetosa rotundis foliis.

Cz. alp. Oxalis tertia mediæ magnitudinis rotundioribus foliis.

C. Bauh. Phyt. Oxalis 7. rotundifolia, aliquando sunt quedam folia non angulosa sed in acutum desinentia: habetur & gradissimis foliis, quæ Acetosâ Hispanica Camer. Camerarius non statuit varietatem vt Frater, sed separat interpositâ aliâ specie. Tabiton & Hist. Oxalis rotunda, siue rotundifolia. Hort. Lus. Acetosa rotunda franca. Schvv. Acetosa Sabaudica, Oxalis Gallica Romana, Oxalis rotundioribus foliis Gesneri.

Plantam in horto E. C. ac prouenit etiâ in aliis. Obseruauit Basileæ in hortis, Lugduni, Geneur, aliisque locis plurimis: in quibusdam verò in muris.

Sapidissima est, & aqua inde destillata retinens acidum saporem in febribus vtiliter datur. Succus eius acidus embarratis præcipue vtilis.

Vires
Aquâ

OXALIS MINOR ACVLEATA

Candia.



Ramulos complures dorsales & cubitales humifusos, vndatim flexuosos, graciles striatos, producit; colore propter terram rubente, aliqui viridi: folia pauca, Oxalis veruecinæ, pinnis mutilis: flores ex interuallis per totam ramorum ferè longitudinem multifidi, luteoli: quibus semen succedit triquetrum, purpureum.

Descriptio

scēs, triplici membranula aculeata circumclusum, contorto latiusculo succulento pediculo appendum, radix purpurea gracilis summā terrā haret.

*Acetosa
Cretica*

*Locus &
tempus*

C. Bauh. Phyt. & apud Matth. Acetosa 10. siue Crētica semine aculeato: In hortō Illustr. Ducis Vltimb. qui Montbelgardi colitur.

Inter semina Stutgardiam missa per Dominum Iosephum de Cassa bona fuit semen cum hoc titulo, Acetosa aculeata minor Cardiz, ea fata in Horto Ill. E. C. Montbelgardi Aphidis sine dodrantales cauliculos produxit cum foliis parvis longis siue auriculis, floruit Iunio, semina matura Iulio, quæ aliquid habent similitudinis cum Tribulo terrestri, sed multo minora, nec ita pungentia: præterea adeft pars longa incurua tenuis vt in Caltha.

OXALIS PARVA AVRICVLATA
repens.

Descriptio

Oxalis minima prolixas habet lignosasque radices, valde fibrosas, rubentes, huc illuc reptantes, in plura sæpe capita diuisas, quæ folia emittunt oblonga semunciam aut vnciam longa, ad imum auriculata, gustu reliquorum instar acido. *Flosculi* longos efficiunt racemos, triangulo semine subsequente. Cord. in Dioscor. Lapathi siue Rumicis 6. genus Acetosa forma & sapore simile, multo tamen minus, in agris nascens.

*Synon.
Lapathum
Rumex*

*Oxalis mi-
nima*

*Acetofella
Oxalis ouina*

Oxalis lanceolata

*Oxalis
bicolor*

Trago Germ. & Lat. Oxalis minima, Lapathium, & Acetofella, radice & semine asperi & acerrimi saporis, caule & folio acido vt vulgaris.

Lonic. Acetofella. Tab. icon. & Hist. Oxalis ouina, Schaff. ampffer. Adhæc Oxalis minima 1. Klein. Sauter ampffer. Item Oxalis minima 2. Gar. Klein. Sauter ampffer. Dod. Lat. in fol. Oxalis minima, Acetofella.

An Cæsalp. Oxalis quæ sponte nascitur gracili solo, tenuis herbula? Camer. Epit. Matth. Oxalis minor. Hort. Lus. Acetosa minor ouina. Item Acetosa minima.

C. Bauh. phyt. Oxalis S. aruensis lanceolata. hæc tatione loci maior minore reperitur: hinc Tabern. duas pingit icones p. 446. Oxalidis Ouina & 447. Oxalidis minima 1. nomine. harum minor etiam in montibus Euganeis reperitur. Oxalis 9. aruensis minima non lanceolata. Oxalis minima 2. Tabern. Qui censuerit [inquit Frater] hanc referendam ad præcedentem minorem facile assensimus.

Schvvenckf. Acetosa lanceolata minor. Oxalis minor nobilior Schaff. ampffer / Spieß ampffer / Klein edler Sauter ampffer: palato gratior.

quàm vulgaris: Acetosa lanceolata minor, Oxalis aruensis seldè ampffer / Acher salmer ampffer: quæ semine cum pragnat tota rubra apparet.

Hist. Legd. Oxalis minor Matthioli. Oxalis minor tenuifolia sinuata, veruecina nuncupata, omnium acidissima, ozelle menue, & œuille de brebis Gallicè.

Lob. & Penz. Adu. Obl. & Ic. plant. Oxalis tenuifolia sinuata veruecina. Belgis Scaepè sive el, id est, Acetosa veruecina, quia gustu acido pecori non ingrata.

Geln. hort. Oxalis altera minor, Lapathi species minor. App. Oxalis oblongioribus foliis & pratensi similior, sed tenerior.

Matth. in Diosc. Lapathum minus, Oxalis altera, succosa, foliisque maioris acidior. In hist. Ital. cum magnis fig. Oxalide minore. In epit. Oxalis minor, & a. n. s. purp. Ital. Acetofella, Sacciola & Sannicula.


Minima auriculata multis in locis prouenit ac habeo plantatam in hort. E. C. suo reptantem odiosam. Tanto luxu, ait Lobelius, sabulosis Brabantia, Picardia, Northmannia, & Angliæ importuna, vt segetes enecet, vires aut incrementum præpediat, fusco purpureo seminum, canlium, & foliorum colore solum ipsum operiens. Sabulosis & incultis agris florentem Maio obseruauit Tragis. circa Glaronam Geln. locis siccis, & lapidosis ad pedes montium circa ripam Limagi.

Refrigerat, autore Matthioli, ac siccæ petinde ac altera: digerit, & incidit. Omnia bellè potest; quæ maior, nec infirmioribus pollet viribus.

*Temporibus
Vires.*

OXALIS AFRICANA.

Descriptio



Elegantissima hæc planta præ reliquis Oxalidibus, tum varietate, tum raritate conspicua est. Vix cubitalem adsequitur altitudinem, tamis oppositis succulentis brachiata. Ad quorum exortum folia extant gemina, opposita (aliquando etiam singulata), triplicis siue spinachiz figuræ, sed longæ, &

vel portulacæ ipsa, crassiora. *flosculi* summitatibus hærent ex luteolo virentes & rubello quodam, figura Oxalidis vulgaris, solâ magnitudine differentes, quippe maiores, ex recuruo pediculo penduli. Quibus *vascula* succedunt magna, vncialia, sædè triquetra, pinnata, rutilo quodam conspersa, triangulare semen Oxalidum intergerinis parietibus continentia: radix simplex, alba, paucis fibris donata. Tota cæterum planta gustu & aciditate delicatior reliquis congenerebus præferenda.

An de hæc Prosp. Alp. de pl. Egypt. Zacynth. Oxali

Oxalidem, qua eius insulæ Pharmacopœi ad medicinam utebantur, inspexi, admodum à nostris Oxalidibus omnibus diuersam, quippe exilis herba ipsa est, foliis paruis, crassis, oblongis, Calthæ foliis æmulis, guttum vt nostra acido sapore feciens.

C. Bauh. Phyt. Oxalis 6. Calthæ folio peregrino
Alpini.


Locus & Tempus Martii fine sata Montbelgardi sub finem Maii adoleuit, pauloque post ad magnitudinem peruenit. Missum erat semen Lutetiâ à Robino Herbario regio nomine prædicto.

HERBA IOHANNIS INFANTIS OXALIS
folio.

Hic prætermittenda non videtur ea planta, quæ vñ sunt ii qui Hispaniam nouam primi subiugarunt, in curandis vulneribus. Cuius vñ Monardi primus ostendit Indus quidam Hispani famulus, nomine Ioannis Infantis, à quo hæc planta denominata est. Est autem exigua, foliis Oxalidis, aliquantulum villosis, siue hispidis.

C. Bauh. Phyt. herba Iohannis Infantis, Monardis. At Castor Durantes p. 228. iconem habet.

*Viridis exigua præmanita aut trita, vulneribus
que imposita, sanguinem silit, eaque congluti-
nat. Neruorum aliarumque partium vulnera di-
gerit, & mundat, & denique ad cicatricem perdu-
cit. Iisdem viribus pollet sicca in pollinem reda-
cta: quæ ad vulnera carnis explenda viridictiam
præfertur.*



Cum Oxalide & Fagotritum propter foliorum & seminum similitudinem, quam cum illa habet, coniungi desiderat. Rubente caule ad duos pedes aut altius surgit, striato, laevi, & in ramos aliquot diuiso: folia ex longis pediculis rubescentibus, nederacea, atroviuentia, sapore saturo: ex quorum alis singulares excurrunt.

diculi trientales, aut quadrantales, tenues, qui
flosculos in mucaris sustinent primum colore
carneo, deinde albo praeditos, quorum singuli
quinis constant foliis, apicibus rubentibus. Sem-
en triquetrum, nigra gluma obductum, farinam
candidissimam continet, insipidum. Radix ligno-
sa, alba, longa, multis fibris donatur.

Cord. in Dioc. Frumenti genus folio heda-
ceo. Tragus Ocyrum Veterum Dioc. Plinii &
Platina facit, ac ab *αὐρίσι* [citr] teste M. Varro-
ne dictum scribit, sed quam bene, ostendunt Math. &
Dodonaus.

Existimavit aliquando Auguill. Formentone ^{Formentone}
esse Gramen Parnassi, sed meritò mutavit senten-
tiam, agnoscens (sed & hoc malè) esse Ocymum
M. Varronis.

Ionicer, cui Frumentum vaccinum dicitur, quas Frumentum
exhibet figuras, cum tamen vna fuisseisset.

Mithrioli itaque iudicio, Dodon. Tabern. Camer. & nostro, Frumentum Sarracenicum (ita enim illi in dist. germ. Inscriptis) Veteribus est incognitum. Quare errant quicunque cum Trago & Anguill. Ocyum veterem esse scribunt. Ex plodenda Lonici opinio, teste Matthiolo, in suis in Dioscor. comment. quod Frumentum Turcicum, vel ut plures inter hos Castor, Camer. in E-pitom. & Histor. germ. Matr. placeat, Sarracenicum quod Tridentina rura vulgo appellant Formentone, & Foro Iulienis *Sarraceno*, Ocyum esse *Ocyum* existimat. Quis eum aberrasse deprehenditur, quod huic plantae omnes odorati Ocy mi facultates reddiderit.

Apud veteres quidem nullum habere nomen, nec Ocyum quidem esse, illud Dioscoridis, fuge alterum Varronis & Columellæ, vel inde constat, quòd, attestante Dodonzo (quin Hist. gall. Tragostrophon, de Frumento, autem & Hist. Latin. Fegopyron vocat) Ocyum Dioscoridis herba est odorata: Fagotriticum verò planta sapore & odore facta, Sic & Varronis, aliorumque rei rusticæ Latinorum Scriptorum Ocyum, non alicuius herbæ genus, sed pabuli nomen est, ex fegutibus videlicet, ac leguminibus, veluti Varro lib. 1. cap. 3. de Ocyum scribens, testatur. Id genus pabuli nam, inquit, fegetes virescetes & ante quàm siliquas feriant Item & Pliius lib. 3. cap. 6. Apud antiquos, ait, erat pabuli genus, quod Cato Ocyum vocat, quo ciebant (exemplaria pleræque minus bene sibi tantum) alium bubus, id erat & pabulis, fegete vindi dicitur & ante quàm gelaret. Suram Manilius id aliter interpretatur, & tradit Fabæ modos de eam, Vicia dicit, tantundem & Erulæ in iugero Autumno mitteri & feri lolitos meliis & Avena Græca, cui non cadit semen admixta: hoc vocitatum Ocyum; bonique causa feri solium, Varro appellatum à celestitate promuenit ait. Ex quibus sanè evidensissimum est, Fegopyron propriè Ocyum non esse: sed fugem notam, veteribus non non cognitam, vel non vitatam, vel flegicam.

Fructu quatuor Loban Adu. & Obf. vbi Lamp- Lob. mor-
tanam veram quorundā aſſent, malè,) An Belg- eur
rum Bonifrey (Tricutum Sarracenicum) fit Ery- Lampfana
ſimum Theophrasti, id quod in Ic. Plant. non ab- Non Eryſt.
ſque errore manifeſto inſcriptione ſua concludit. mum
Theophr.

Lobellum sequitur Gelsin cat. pl. & H. Lugd. ^{1. incup.} Error Gels.
 eodem errore Frumentum Sarracenicum Erysi. ^{neris}
 mum Theophr. & Irionem Plinii cum imperitio. ^{et H. Lugd.}
 ribus esse scribentes, Quare relib. 21.

Tabernicon, & Hist. *Ocymum cereale* & *Tra-*
gopyrum. *Formentone Casalp.* C. Bauh. Phyt.
Panicum 6. sive Frumentum Sarracenicum, cui
etiam apud Matth. ubi inter *Tritici* genera repo-
nit & quintum facit.

Γραιε φηγοπυρον [Phegopyron, Fegopyrum, aut
Fagopyrum, quam vocem laudat Had. fun. Latine
Fagotriticum dixeris, fve Triticum faginum quod
faginâ glandem, & formâ triquetrâ & colore for-
didò, licet quantitate multè minus, quodammo-
do refert : Et fanè meliore ratione, quàm fi Ety-
mon vocis ad hirci pabulum, Tragotrophon, Tra-
gopyrum, & Triticum hircinum retuleris. Alii
frumentum Sarcacenici appellare malunt, Gsem;

Nomina
linguarum
Triticum
faginum

*Geerdensorn / Boeckweizen / Buchweizen / vnde
Grütz. Belg. Voetweyde / Büschweyden / vnn
Boeck Weite. Gall. De la Dragee aux Chervix &
Blé. It. Froment. Arabum. Angl. Bechebeate
Vunde Vofweate. Bohem. Poschu.*

Locus

Tempus

Nascitur qualicunque loco, neque vllum quantumvis aridum, macrumque relquit: gaudet modicis: citò prolehit, celeriter maturefcit. Bis in anno feri potest: Nempe Vere Martio aut Aprilis: ac Autumno post mellefi pabuli causâ. Plurisque Germaniæ locis & Brabantia Campaniae vulgare: Italiae etiam non incognitum. Fagotriticum sepius feliciter in horto Ill. E. C. prouenit florens Iunio, Iulio & Augusto. Copiosè obseruauit in Ditione Marchionatus Badensis Rætiana in agris inter Basileam & Binzen pagum. Monspelii & Tiguri florens Septembri.

res

*inflamma-
tio colica.
toluta*

assana.

*Vfus.
crueta.
nita*

Panis

*Abulum
sumentoru
herba viti-
da.*

Autore Matthiolo calefacit, & humectat, verum non multum à temperatis distat. Farina ex lacte decocta praestat illis ad biliosas inflammationes. Rura non solum ex ea panes pifunt, sed pulcem quoque conficiunt, quam polentam vocant, quæ non ingratus est cibus, vbi rectè fiat, & caseo & butyro alpergatur. Prillanam quoque exutis granorum putaminibus, è granis parant & ex carniū iure decoquunt ad esum. Fegopyron, ait Dodon. Triticum, Secali ac Hordeo minus nutrit, plus tamen quam Milium aut Panis. Pulmentaria ac placentæ quæ ex eius farina conficiuntur, facilè concoquuntur, citò descendunt, alime tumque corpori adferunt, exiguum quidem, non tamen malum aut vitiosum. Panis qui ex eo aliquando, cogente annonæ penuria, coquitur, aut farinam eius admixtam habet, humidus est, citiusque descendit, ac flatulenti plus obtinet, quam ex Secali coctus. Herbam viti- dem priusquam semen maturuerit, boues iumen-

taque pascuntur. Senine gallinaceum genus patum ciussimè pinguescit.

*Semen r-
bulum ga-
nris Galip-
niet.*

LUNARIA MAGORVM.

Arabum.

Alohis sinuatis [inquit Lobelius Observ.] Lunariæ crescenti similibus hæc rara planta



Lunariæ nomen adepta, à petitis rei herbariæ, quam non nisi conuallibus Allobrogum inter montem illum præcellsum, vulgò *Mont Senis* vocatum, & D. Io. Maurum vernaculè *S. Jean de Morienne*, collegi, nominèque Lunariæ donauit, alii quò disceratur ab aliis Lunariis, Lunariam Magorum Arabum dixerunt. Exeunt Martio tenella folia à radice lignosa flexuosa, cinerea, Oxalidis francæ rotundifoliae primulum euipentis similia, Thlaspi nederaceo serè patia: flores & semina necdum nobis visa.

*Defcip.
Synonyma
Lunaria.
Lunari.*

*Inserptiabilis
raro.*

Icon. Plant. Lunaria Magorum Arabum.
C. Bauhinus Phyt. Lunaria Oxalidis rotundæ folio, quam nondum videre licuit.

FINIS LIBRI VIGESIMI TERTII





HISTORIAE VNIVERSALIS PLANTARVM

LIBER VIGESIMVS QVARTVS.

LACTVACEÆ, INTYBACEÆ, CÆTERÆQVE ID GENVS,
quarum flos in pappum abit.

Proximè dicentur Papposa, & ipsa non parua laticaulacearum societate stipata. Semen lanuginis est quam Pappum vocant. Nomen Græci dedere, quia nascentia florum capitula numerosâ disidantur lanugine, ipsis seminibus insidente.

LACTVCA, THRYLAX VETERIBVS.

CAP. I.



N Veterum scriptis cum pluri-
um Lactucarum mentio fiat
nec etiam pauciores Neoterici
assignant, de his in genere quam-
dam præfari Botanicus noster
ordo nos coëgit.

Lactuca igitur à lactis co-
lora nomen adepta gratissimum olus est, teneritu-
dine, ac dulcedine cæteris prælatum: numero-
sis constat ab radice foliis, ac latis, se inuicem cõ-
pactili serie amplectentibus, idcirco quæ in me-
ditullio clauduntur, albidiora sunt, ac tenerio-
ra: quia ab iniuriis externi aëris & Solis pro-
teguntur: cum caulescit amara redditur, & lacte
mader: caulis asurgit densis foliis, rectus, & cras-
sus [aculeis quibusdam horrens, id quod & foli-
is, quæ terram spectant, vsu venit, maximè ubi
aliquantulum consenuerint, addit Trag.] qui in
cacumine funditur in ramos candidos, in quibus
pauca sunt foliola, subrotunda, ac viridia: stes-
culos gerit in cacuminibus pallidos, qui in pap-
pos transibunt: semina subsunt oblonga, & com-
pressa, aliis candida, aliis nigra.

Lactucam in satiuam & siluestrem distinguit
Dioscorides. Satiuam quidem, eam nemini non
notam, non delineat, sed medicum eius vsu
duntaxat adscribit, de quo infra, vt & Brasica
syluestri. Nominat verò idem & Lactucam ma-
rinam, quæ à satiuâ profum dissidet, ac Solda-
nella hodie à Medicis & Pharmacopœis nuncu-
patur: de hac egimus libro 15.

Theophrastus lib. 7. ac 4. cap. plura genera esse
scribit. In genere Lactucarum, inquit, candi-
da dulcior, atque tenerior, cuius tria genera

reddunt, Laticaulis, Rotundicaulis, & Laconicum: Laticaulis
huic folium Carduo simile: & recta
ampla, & caule minimè brachiata est: in-
ter latas adeò quædam laticaulis sunt, vt pro
valuis hortorum hisce nonnulli vtantur. Quæ
verò lactis admodum copiosa, & folio pusillo, &
caule candidiori consistit, siluestri similis est.

Plinius Theophrastum sequutus inquit: La-
ctucæ Græci tria genera fecere: vnum laticau-
lis, adeò vt hostiola olitoria ex his factitari pro-
diderint: folium his paulò maius herbaceo, &
angustissimum, vt alibi consumpto alimento:
alterum rotundi caulis: tertium sessile, quod La-
conicum vocant. Alii, inquit, coloris & tempo-
ris satus genera discernere: esse enim nigras, qua-
rum semen mense Ianuario feratur: albas, qua-
rum Martio: rubentes, quarum Aprili: ac om-
nium earum plantas post binos menses differri:
diligentiores plura genera faciunt, purpureas,
crispas, Cappadocicas, Græcicas: longiora his fo-
lia, caulisque lati: præterea longi & angusti,
Intubis similes: pessimum autem genus, cum ex-
probratione amaritudinis appellauere Picrida: est
etiamnum alia distinctio Atræ, quæ Meconis
vocatur, à copia lactis fopiferi: quanquam
omnes solum parere credantur. Apud Antiquos
Italix hoc solum genus earum fuit, & idem La-
ctucæ nomen adepta: purpuream maximè radi-
cis Cæcilianam vocant: rotundam verò ac mi-
nimè radicis Astylida [Astylida Athen. quasi
vrbanam,] quidamque Eunuchion: quoniam hæc
maximè refragetur Veneti. Est [hæc omisit Cæ-
salp.] etiamnum quæ vocatur Caprina (Marina
ex Cœn. Hist. Lugd.) Lactuca. Ecce cum maxi-

Laticaulis

Genus Plini
Lactucæ

Rotundicaulis
Sessile
Laconicum
Nigra
Alba
Rubentes
Purpureas
Crispa
Cappadocica
Græcica
Picrida
Meconis

Cæcilianam
Astylida
Eunuchion

Caprina

P P P

Tom. II,

mè exipit itrepere satius admodum probata quæ Cilicia vocetur, folio Cappadociæ: nisi crispum, latiusque esset.

Quod de laticaulis scribitur, aliquando horum valuis eius caules viles ob amplam latitudinem, non videatur mirum: vidit enim Cæsalpinus inter Anchulas caulem aliquando in speciosam latitudinem creuisse: paucis foliis, ut pote nutrimento in caulem ablumpto: multo autem magis id Lactuæ contingere potest: habitior enim multo est eius caulis.

Matth. mo. Satiuam Lactuam in tria diduxit genera Tragus. Eorum primum est, Lactuca sativa nomen: alterum Lactuca crispa: tertium, quæ & ipsa crispa dicitur, pulcherrima est.

Excaulis, sine sessile. Matthiolus in priorib. comm. plura quidem ac diuersa agnoscit genera, qualia verò illa sint non docet, ac si non cognita. Melius certò in post. comm. cum magn. fig. & Hist. germ. ac etiam Epit. cum addit. Camerarii doctrinæ suæ consulti, dum crispam conglobatis in orbem foliis, teneramque in acini scribit, ac etiam duram, parulam, lactescentemque haberi, esse etiam quam à lato caule Laticaulis, & à rotundo Rotundicaulem, & quam Sessilem (excaulem Ryff. qui triplicem hanc differentiam habet) quod humi procumbat, appellauerint Græci: se verò in Capitata, Rotundam & Crispam (ita etiam Fuchsi. distinxit & Lonicer.) diuidere: differre etiam foliorum colore, nam aliam faruatè viridem esse, aliam subviridem, aliam subcandicantem, aliam cruentis maculis resperfam, è Cypro allatam: esse & quartum quoddam genus, cui in cibo prima laus sit, Romanum vulgò vocatum.

Capitata, sine sessile. Dodonæus gallicus Lactuæ sativæ quinque tradit species, dicitque earum primam absolute Lactuam vocari: secundam à Plinio Lactuam crispam appellari: tertiam verò Lactuam Laconicam & sessilem ab eodem Plinio; à Columella Beticam, à modernis autem capitata nominari: Quartam speciem, esse Cecilianam Columellæ: quintam tandem eiusdem Cypriam seu Plinii Græcam: & has duas species modernis esse incognitas. Ast Dodon. Lat. alias differentias habet: ait enim culturæ mangonio non raro folia Lactuæ hortensis in alia speciem transformari: vel enim crispam & Crispam à Plinio, Cecilianam à Columella cognominari: aut ita in se in orbem contrahi, ut capitata Brassicam æmulari videatur, & vulgò Capitata, Sessilem, Plinio Laconicam, Columellæ Beticam, Crescentio Romanam vocari: atque huius quidem media ac interiora folia ex diluto admodum luteo colore in albicare: præter has verò & aliam quandam Lactuam esse folio obscurius virente, aut, ut Columella dicat, viridis coloris: quam Plinius Nigram appellet, iam & quandam fusci, ac veluti purpurei, coloris, siue ex albo rubicundam, hanc Rubentem, ni fallatur, Plinium nominare: ac addit paulò infra: Purpurei folii, siue ex albo rubentis, Cypriam esse Columellæ, Plinii Græcam. *Vides Dodonæus.* Dodonæi varium & mirabile caput. Is in Hist. gall. Crispam Plinii, à Cecilianam diuersam statuit, nunc in fol. Lat. vnam & eandem pronunciat.

Lib. in Adu. quatuor adscribit Lactuæ sativæ varietates. Satiuam folio Scariolæ: Sessilem siue Capitata, rugosis crispis Brassicæ foliis (harum duarum solum meminit in Observ.) Roma-

nam dulciorem, nigriore & Scariolæ hortensis folio, semine nigro: & Crispam, non capitata.

Has quatuor differentias agnoscit etiam Schwenckfeldius: additque quintam Lactuam fuscam, nigram Cæsalpino cognominatam.

Plures his differentias adfert Tabern. Lactuam absolute inscriptam, capitata, crispam primam [hanc nos eandem facimus cum piosdem Intybaceâ crispa, & Intybam secundam, Intybaceâ Intybaceam crispam, & marinam, quæ est capitata, priusquam caulescat.] *Differentia Tabern.*

Hist. Lugd. videtur recipere Lactuam sativam, Crispam, Capitata, & Romanam. Sed cur illam solum sativam inscribit: nonne & cæteræ tres sativæ sunt? *H. Lugd.*

Cæsalpinus has differentias statuit. Semina, inquit, alius Lactuæ candida, alius nigra: differentia quoque & in foliis: quædam enim latiore folio constat: quædam longiore; quædam crispo: quædam plano: quædam in ambitu sinuato, ac valde crispo, quam priusquam Scarolam vocanti: cuius similitudine Lactuæ & Scarolæ vocant, Tunicarum plexus intricatos, ceruicem, & carpum ornantes: Alia Caputia cognominatur, cuius folia clauduntur ad capitatis eligiem: differunt quoque colore, quædam enim alba, quæ frequentior est: Alia rubra, ac si vinum foliis esset aspersum: Alia nigra: semina autem nigra & huius, & rubræ, cæteris autem candida. Harum autem expositionem cum Veterum Lactuæ partim claram esse, partim curiosiore[m] (laboriosiore[m] intelligo,) videri scribit. *Scarola Caputia*

C. Bauh. Phyt. ex Cæsalp. sua mutuasse nobis videtur, cuius verba hæc sunt. Diuidimus Lactuam sativam in Crispam, Rotundam, Capitata, Romanam, Cypriam: folio enim alia est latiore, alia longiore, alia crispa, alia plano, alia sinuato, alia colore rubro, alia purpureis maculis asperso, alia obscurius virente. Sic & Capitata colore differt: alia enim alba, alia rubra, ac si vinum foliis esset aspersum, alia nigra: hincque duabus posterioribus semina sunt nigra: alii verò candida.

Ex hæc in genere dixisse sit satis: ab vniuersalibus ad particularia descendamus.

Lactuca simpliciter dictæ nomine duplex intelligenda venit. Satiua & sylvestris. Satiua quædam est vulgaris capitata & non capitata & alia rubra: alia Romana dulcior: alia longo, & valde angustio folio: alia crispa dissecta. Sylvestris quædam folio lato, succo viroso, quædam folio lato, succo viroso, quædam Endiuia dicta folio laciniato, dorso spinoso, alia murorum flore luteo: alia purpureo, & his affines, de quibus ordine.

Describitur ab his diuersa Lactuca syluatica purpurea sylvestris sc. *Thalii.* Est hæc syluatica nostra Lactuca purpurea. Lactuca erraticæ, *scilicet* Diolconidis est, si Trago credimus, qui eam ab Apuleio Lactuam siluaticam dici ait: Hæc a nobis Hedy pnois Fuchsi inscribitur. Idem Tragus Lactuam minorem *scilicet* ad *scilicet* Diolconidis, ad Lactuam silu. pertinere scribit: Vocatur hæc a nobis, Hieracium minus Fuchsi præmorfa radice. Per Lactuam Leporinam Apulei intelligimus Sonchum læuè & asperum Fuchsi: In Syr. de Cichorio Lactuæ sylu. nomine sumit Ioub. Pharm. Sonchum asperum. Est Lactuca Leporina Apulei Trago Hieracii species parua. Lactuam siluaticam Apulei credimus esse Sonchum tertium siue repentem. *Equiuoca Pulg. cap. Cy. non cap. Anbra Rom. dulcis Sylvestres plures.*

*Hierac. mi-
nus 1.
Primula
Seris edo-
rata*

pentem. Lactuca minor Dod.gall. est nobis Hiera-
cium minus primum. An Capanule species, La-
ctuce filu. genus in muris Gefn. de coll. stirp. Pri-
mula veris odoratam Italoꝝ vulgus Lactucā sil-
vestre vocat : l. 30. Accedere vult Dod. Olus albu
λευκολόχον, quod Valerianæ campetris specie
facit Camerarius, Lactucæ generibus: vocatur à
nobis Locusta herba. Hist. n. g. lib. 27. Lactucam
petitam Creticam Belli inscriptum Rapuncu-
lum Creticum Petromerulam. l. 10. Lactuca ca-
pitata quorundam est Galega de qua lib. 17. La-
ctuca Aini, Pandectario, Muscellina herba, pro-
cul dubio est Anchusa. H. n. g. l. 33. Lactucæ no-
men attribuitur etiā Lathyridi, vt videre est ex
Trago lib. H. n. g. 17. Lactucam caprinam Latini,
Plinio autore, Tithymalum nominant: H. n. g. lib.
34. Herbam lactariam foeminam Græcos Tithy-
malum myrtiliten vocare scripsit Vesalius. l. 34.
Lactuca marina Latinorum & præcipue Corn-
Celsi est Tithymalus paralyus lib. 34. Lactuca
Solilequia est Tithymalus Heliocopius lib. 34.
Bryon Lactuca foliis, est muscus marinus, di-
ctus Lactuca.

LACTUCA SATIVA VVLGARIS CAPI- rata & non capitata.

Descriptio



Varietes.



form. 11.

Lactucas
tenuas
admittunt no-
strarum men-
sarum princi-
pia subtilecs,
folio Endiuiz
amplo, rugoso,
lacte prægna-
te, per primā
adolescēciam
grato, tandem
amaro & ci-
bis abdicato,
quod sit vbi
caulescit pla-
ta: ceterum
folia aliis in
caput conglo-
bantur, aliis
patula dehis-
cunt: caules
in ramos sin-
ditur crebro
deinceps diui-
dendos: quo-
rum extremis
stipuli hærent
lutei, parui, ex
squammato
capitulo pro-
siliantes, qui-
bus in pappos
facilientibus
femen lucre-
scit patium,
vtrique acu-
tum, oblongū,
compressum,
coloris cine-
ricei.

Tragus si-
guram habet
candem cum
ea quam hic

posuimus, cui titulum hunc fecit. Lactuca cri-
spa & lata, fraus vnde breytter Lattich. Est au-
tem ipsi ex tribus sativæ Lactucæ generibus pri-
mum & maximum, latissimis foliis, ex viridi ni-
gricantibus, quemadmodum Beta maior, ac ver-
sus medium coeuntibus, non aliter quam Brassi-
cæ capitata: semine subalbido: hanc vocat in
margine Lactucam i. siue sativam maiorem. Es-
se etiam in hoc genere scribit nonnullam foliis
candidis, quæ & ipsa in caput quoddam coar.
Alterum Tragi genus, Lactuca 2. siue crispa,
folia acquirit satis longa, quercinis similia, inci-
sa, herbacei coloris: semine nigricante:

Lactuca sativa cuius imaginem dat Fuchf.
folia Intybo sativo haud dissimilia habet: hanc
rotundam vocat, Germ. Breitter lattich. Al-
teram foliis, quæ crispa admodum sunt, duntax-
at à priore variare tradit, aliis per omnia simi-
lem, Latine crispam vocari ait Germ. krauser
lattich, Lactuce commune & crespe, à Columella
lib. ii. cap. 3. Cecilianæ & Beticæ. Fuchf. autem
duo hæc genera vna iconē complexus est: & ter-
tiam capitatam non nisi foliis suis, idque dum
paullulum creverunt, à prioribus differre scribit,
ac Latine Lactucam capitatam: Germ. Grossen
weissen lattich nom. nat.

Nos figuram ex Fuchsiāns quæ placet pro
vulgari hic ponimus. talem etiam proposuerat
Tragus: quam proponit pro Capitata, licet etiā
conuenire possit pro vulgari, & pro capitata po-
ni vbi caule/cit, eam autem (capitatam) poni-
mus postea pro Romana, quamuis pro ea non sit
posita à Fuchfio, qui eisdem habet figuras sub iis-
dem nominibus.

Dodon.gall. Lactuca prima foliis longis, pla-
nis, latis, semine albo: Lactuca simpliciter dicta.
Secunda foliis similibus viruli mesenterio; Plin-
io Lactuca crispa, Gallicè Lactue crespe, Belg.
Obeconfelde lettuce. Tertia glomeratis
foliis, Plinio Lactuca Laconica, Lactuca sessi-
lis Columella. Lactuca Beticæ, Neoterici La-
ctuca capitata: Gal. Lactue primee ou resue. Is
vtramque Fuchfii figuram habet: quam autem
pro Crispa ponit, propriè crispa non est: nec e-
tiam Fuchf. pro sola crispa posuit. Nos illam fi-
guram, quam sativam inscripsit, pro Lactuca
Romana, non quod de ea Dod. scribat, exhibe-
mus. Dodon. Lat. in fol. Hortensis siue sativa
Lactuca folio oblongo, lato, læui: quæ culturæ
mangonio folia ita mutat, vt vel crispentur, aut
ita in se contrahantur, & capitatam Brassicam
æmulari videantur: Lactuca sativa Galeno de usu
vbi dicitur, à nonnullis γαστρίκοις: à Pythagoricis
Γαστρίκοις: Belgis Saleter. Huius generis cum fo-
lia crispantur, Crispa Plinio, Cecilianæ Colu-
mellæ: foliis in vrbem coactis, Plinio Laconica,
Colum. Beticæ, Petro Crescentio Romana, Belg.
Crep. salact.

Prior figura quam sativam inscripsit non im-
mè conuenit vulgari, cum caulescit, amissis pri-
oribus foliis posset fortè accommodari & Roma-
næ nostræ. Quam ponit pro Crispa non probō:
folio enim est laciniato descriptioni non respō-
dens. Tertia figura est Capitata priusquam cau-
lescat.

Matthiol. in prioribus comment. has nostras
Lactucas intelligit, cum è pluribus ac diuersis
generibus, quandam conglobatis in orbem fo-
liis, crispam, teneramque nominat, & alteram
duram, patulā ac lædescētem. Figura autem
quam vbiq; proponit Matth. pro crispa, mihi
videtur non crispam demonstrare, sed eam quam

*Lact. rōi
indua.*

Crispa

Iconi

Lactuca

Lact. cr.

sp.

Dod. mti.

*Thridacmē
Marulinū.
Eunuchrū.*

Dod. mti.

Matth. mti.

rotundam in post. vocat, eadem etiam in postremis pro Lactuca florecente ponitur: ea etiam icon quam olim profuerat pro florida, quamque in hist. German. florecentem facit, respondet Fuchsianæ, quæ pro Romana Matthioli [de qua post] poni potest.

Lonic. has pingit nomine Lactucæ rotundæ, & Lactucæ sessilis.

Corn. crispam ac rotundam Lactucam vocat, & alteram Capitaram candidiorem illa.

De præsentibus Lactucæ speciebus loquitur Geln. de hort. cum ait. Est lactuca crispa (ni fallor) eadem quæ sessilis & capitata: excaulis, Pythagoricis Eunuchion, mulieribus Astylis (sic enim legendum, & Cilicia aliquibus, & Larifolia crispa, latiorque Cappadocia, admodum probata. Capitata quidè genus minus, in hortis nostris est, minus Baileæ, relictum apud Carl. Secundū.

Lobel. Obs. & Ic. Plant. Lactuca sativa (vocabulum hoc omisit in obs.) folio Scariolæ. Item Adu. & Ic. Plant. (ubi iconem ponit quæ posset convenire Lactucæ Romanæ.) Lactuca crispa non capitata, quæ eadem cum iam dicta esset, nisi illi essent folia reduciore, contractiora, & bullatis rugis crispata: unde rota teneior & olere gravior habetur. Semine alioqui & reliquis partibus, à superiore non differt. Et rursum Adu. Obs. & Ic. Plant. Lactuca sativa sessilis, siue [tria vltima vocabula in Obs. non habet] capitata, rugosis [desideratur hæc vox in Obs.] crispis Brasicæ foliis: & hæc supplenda sunt in Icon. Plantini.

Cæsalp. Lactuca folio latiore: quædam longiore: quædam crispo: quædam plano: alia capucia: quædam alba frequentior.

H. Lugd. tres icones habet: priori titulus Lactuca sativa. 2. Lactuca crispa Matthioli. Prior verò floridæ Matth. altera est etiam Matthioli vulgaris nondum florentis. 3. Lactuca crispa Dod. & Fuchsi, eâ figurâ comprehenditur utraque Matthiolina: eam autem ex Fuchsi proponimus.

Tabern. Hist. & icon. lattich, Lactuca, siue prima fopflattich. Lactuca capitata siue 2. Lactuca tertia siue crispa 1. à prima tantum differens foliis crispioribus. Figura quam posuit Cōpulator mihi non videtur competere descriptioni, est enim folio laciniato.

C. Bauh. Phyt. Lactuca 1. siue sativa lactuca florecentis Matth. icon. Item Lactuca 6. siue capitata. Apud Matth. Lactuca crispa quæ capitata & non capitata: est illa crispa Matthioli &c. Item Lactuca tertia, Lactuca sativa Dod. gall. & fol. Lugd. Cord. in Diosc. Lactuca florecentis Matth. Lacun. Lactuca sativa Lobel. Lactuca Gesner. Cæsalp. Camer. Tabern.

Gerard. Anglo Lactuca 1. sativa, Garde lettuce. Lactuca 5. capitata Cabbage lettuce.

Schvv. Lactuca lara, Lactuca crispa, & Lactuca capitata.

Lactuca vulgaris non capitata & capitata passim, frequens præsertim Genevæ, Baileæ, Lugduni, & Montbel. ubi vna mihi candidiori, alia viridiore colore vulgatione copiose coluntur Lactucæ in Horto E.C. ubi interdum hiemem perferunt: Monspelii Lactuca non capitata abundat, capitata tantæ magnitudinis, ut vna patinam satis amplam repleat. Tota hieme ibi in usu. Porentruti in Horto D. Ritneri optimas & magnas conglobatas degustauimus Iulii principio, dicebat se habere cum pluribus capitibus:


anno 1609. habemus cum tribus capitibus, quæ vix differre videntur à cæteris capitatis, capita tamen minora; alteram tamen speciem eximiam, quandoquidem ex particulari semine nobis provenit quod Hortulanus accepit.

LACTUCA RVBRA.

Cæsalp. est Lactuca rubra, ac si vinū foliis esset asperum: hoc gen^{us} laciniatis foliis constat ac patulis, dulcius cæteris, sed durius: idcirco recencia tantum folia secant, regerminat enim diutius antequam caulescat: semina ei nigra.

C. Bauh. Phyt. Lactuca 7. siue maculola; Lactuca 5. Dodonæi, Lactuca rubra Cæsalpini. Synon. errore versatur Dodonæus, ait enim Lactucam foliis rubentibus Nocticris incognitam, quæ Cypria dicatur & Plinio Græca; Dodon. verò notam non fuisse existimo.

Lactucam habemus rubram in Horto Ill. E.C. quæ interdum hiemem perfert: aliquando attulit ex Sultæ Alsatiæ: provenit nobis etiam semine Italico nobis per Illust. C. Wirt. dato cum ex Italia rediit.

LACTUCA ROMANA
longa dulcis.

Enim nomine Descriptionis hortis nostris innouit, folio dulci, oblongo, modicè laciniato, & infernâ parte secundum costam spinulis armato: flore & caule Lactucæ nostræ, sed semine succedente nigro. Figura quam posuimus ea Fuchsiæ in medio ceteris exprime mihi videtur Romanam, ideo etiam

parandam non curauimus.

Lobel. & Pena Adu p. 86. Lactuca Romana dulciore, nigriore & Scariolæ hortensis folio, semine nigro.

Tabern. Hist. & icon. Endiuic lattich, Lactuca Intybacea.

C. Bauh. Phyt. Lactuca 2. siue foliis Endiuic. Lactuca 2. Tragi, Lactuca Intybacea Tabern. Item Lactuca 4. siue folio obscurius virente. Lactuca nigra Cæsalpini. Lactuca Tabern. confideratâ figurâ mihi videtur eadem cum Romana à me dictâ: quâ mihi videtur Tragi secunda diuersa, quia ait foliis esse Quercinis incis: Italia folia non repræsentat figura Tabern. Cæsalpini nigra non malè conuenit cum Romana.

An Tragus hanc sub nomine maxime Endiuic comprehendit non distinguens à Lactuca siluestri lato folio, nescio: ignoro cuius an culturâ possit mutari in Romanam, quæ cum silvestri communis

Locus & tempus

C. B. m.

munes habet spinas in dorso & alia quadam.

Cæsalp. hanc Lactucam nigram vocat, eique folium angustius adscribit ac productius, planū, colore viridi, qualis in Cichorio: non surrigi hanc in caput ait, nisi vinculo alligentur folia: sic enim candidissimam reddi, & fragili ténertudine cæteras vincere: semine rubro.

An Dod. Lat. Lactuca quædam folio obscurius virente, aut, vt Columella ait, viridis coloris, quam Plinius nigram appellat.

Gesl. hort. Lactuca Romana basilicæ in quorundam hortis educati folia.


Matthioli in Dioscor. cum mag. fig. Lat. & Ital. Quarrum Lactuce genus, cui in cibis prima laus, Romanum vulgò vocatum, foliis maioribus, pinguioribus, viridioribusque: id in ouatum caput extruberat, vbi in cacumine ligetur, & cæteris tenerius albiusque euadit, & præsertim si terra circumducatur ad acumen vsque.

Gerard. l. 2. c. 14. Lactuca Intybacea, lumbard lettuce.

Schwenckfeldii nobis videtur Lactuca Intybacea Endiuicen latti / Roman Salatz / à vulgari ditās folio nigriore, nec perinde scabro, semine nigro: tota tenella, gustu dulciore, eaque gratior, aprior ventri mouendo. Videtur & eiusdem Lactuce fuscæ, Lactuca nigra Cæsalpini. Schmazer Salabe / florentiner Salatz. Sed illud miramur, cur dicat minus palato sapere, vt Lactucam capitatam seu scissilem, quam tamen ait primæ in acerbis comendationis. Non video ego quomodo possint simul & semel in eodē subiecto subsistere, esse primæ commendationis, & minus sapere. Quis nisi homo deprauati gustus ei, quod palato minus sapit, primas tribuat?

Lactucam Romanam longam dulcem primam vidi basilicæ, postea Genæ obseruavi copiosam in hortis, vnam candidiorem, alteram nigriore, vtrique dulcem cum paruis quibusdam spinis in costa: vidi etiam in Wattviller: semen solet esse nigricans: Montbelgardi in Horto E.C. prouenit nobis utroque colore, nempe foliis ex viridi nigrioribus & ex pallido candidioribus.

LACTUCA LONGO ET VALDE ANGV- sto folio.



l. ramifolius: flores & semen cum Lactucis vul-
Tom. II.

Hic Lactuca f. lia à radice statim oriuntur multa, palmum aut sesquipalmū longa, vnciam vnam aut alteram lata, superiora verò vt breuiora, ita angustiora, spinulis quibusdam per margines donata, vtrique verò acuminata: caulis cubitalis & sesquicubitalis

garibus eadem, sed semini color fuscus.

C. Bauh. Phyt. Lactuca 5. siue longifolia à fratre Io. Bauhino accepta. Et alia quadam huic valde similis, quam Cast. Durantes pingit, ac Lactucam Gallicam nominat, non tamen candē.

Obseruauimus hanc Lactucam quibusdam in hortis inter Bessfordiam & fodinas argenti in Girardmegni, ac alibi, vt in pago Tremoy: Plantata Montbelgardi in horto Ill. E.C. se propagat semine deciduo, quod maturum Augusto.

Locus & Tempus

LACTUCA CRISPA LACINIATA.



D. Od. Lat. In folio quoad figurā non autem descriptionē; Lactuca crispa.

Tab. Hist. & Icon. Frausser laticif, Lactuca crispa, prima. Item Frausser Endiuicen laticif Lactuca Intybacea crispa. D. d. gall. & Lat. Lugd. Cast. Tab. Fuchsi, Lob. Icon. Cæsalp.

scripioni: Altera figura destituitur descriptionē.

C. Bauhin. Phyt. Lactuca 8. siue crispa altera, Intybacea crispa Taber. Item Lactuca 7. siue crispa latioribus foliis varians. Recedit à me Frater. Separat enim ille, quam ego non separo, iungit autem quam ego separo. Ei autem apud Matthioli Lactuca non capitata dicitur, Lactuca crispa Tragi, D. d. gall. & Lat. Lugd. Cast. Tab. Fuchsi, Lob. Icon. Cæsalp.

Proponit hic Frater iconem Tab. Lactuce crispe: ad quam an sit referenda crispa Tragi, Dodon. Gal. Lugd. Fuchsi & Cæsalp. dubito.

Lob. Icon. Lactuca crispa non capitata. Gerard. Lactuca 2. crispa. Curled lettuce. Lactuca 4. Sabauda crispa Sauoie lettuce.

LACTUCA CRISPA ET TENVITER dissecta.

Potissimum in f. liis est discrimen, quæ obscure virentia, non vt præcedentium Lactucarum integra, sed laciniis tenuibus incisa, illisque undulatis intro forasque flexis reflexisque crispa. Flores conueniunt.

Tabern. Hist. & Icon. Frausser laticif. Lactuca crispa secunda.

C. Bauhin. Phyt. Lactuca 7. siue crispa. Lactuca crispa Tragi. Lobel. Icon. pag. 422. latioribus & paulo angustioribus foliis variat, quare duas icones proponit Tab. icon pag. 422. & 423. Not contra Fratrem non separamus Tabern. priorem crispa ab Intybacea, vt antè monstratum: Lobelii etiam crispa potius ad præcedentem referimus.

Scapula.



plexus intricatos certuicem & carpum ornantes.
Lonicerus huius solo nomine meminit, & vocat *Frangit latic.*

Gerard. *Lactuca* 3; crispa altera, *Small curled lettuce*.

Folius & tempus.

Lactuca crispa Genearum provenit in hortis: Montbelgardi habemus in horto C. Wirtemb. hiemem ferentem. Watvillā attulimus semina. Basileæ quoque observavimus.

Nemina linguarum in genere.

Quæ à *Lact.* *Lactuca* vocatur, à Græcis *βελουχ* dicitur, à Recentioribus, ut Simeone Serhi, *uogel* vel *uogel*, & *uogel*, quoniam siluestre olus quoddam propriè *βελουχ* im appellari Galesus scripserit, Pythagorici *uogel*, Enochum, quoddam coctum, fuerat, mulieribus verò *Astylida*: Hebræi, *esse* *Aruch* Monsteri, *Chafari*, Mauritanis *Cherbas*, seu *Chas*: Auiæ. *Albacæ*: Germani. *Salat latic*, & *Schmalz* *Frangit* Belg lat. *coume*, *Sa*: æt. Gall. *Lactue*; Hisp. *Lechuga*, *heruga*, & *absaro*: Ital. *Lattuca* Angl. *lettice*: Boh. *Salat* & *locyfa*. Hung. *Salata*.

Satio. Locus.

Lactuca, ut Crescencius credidit, feri & trāspantari potest ferè toto tempore anni in terra pingui benè subacta per se vel mixta cum aliis herbis, & quæ sata fuerit Autumno vtiliter plantatur mense Decembri circa areas aliarum herbarum quæ tum feruntur. Ipsa enim non timet gelu, sed roboratur ex eo, & erit bona post hiemem cum aliis herbis quousque semen producet. Sed quæ de naturā parvarum, non transplantantur. Quæ verò sunt ex magnis quæ *Romane* dicuntur, quæ habent alba semina, transplantari debent, ut crescant & dulcedinem habeant, multum iuvantur irrigatione tēpore siccitatis. Scribit *Lactuca* toto anno, sed Martio & Aprili mensibus potissimum, binis mensibus inter semen plantamque & maturitatem. Prouenit à satu, inquit Theophrastus, die quarto vel quinto, recisa regerminat, cuius regerminati caules suauiores: nam dulciores, quamdiu teneri sunt: quidam hos magis lactuosos esse: primos autem magis amaros, & minus concoctos: radix brevis, maxime vniustips; quia caret multiplici radice: sed tantum fibris coheret: translata breuior est radice, quam sata: quia ex lateribus magis mittit: semen lanugine continetur. Transferri autem debet, auctore Columella, cum sex foliorum erit. Locis quidem apricis, & maritimis optime Autumno ponitur: mediterraneis, & frigidis contrā, hyeme non æquè commodè dispergi-

Tempus sationis.

tur: sed & huius quoque radix sumo lini debet, maioremque copiam desiderat aquæ, siue sit tenerioris folii. Sunt autem complura *Lactucæ* genera, quæ suo quaque tempore ferri oportet: Ea enim quæ fulci, & xelut purpurei, aut etiam viridis coloris, & crispis foliis, vti *Cæciliana* mense Ianuario rectè discitur. At *Capadocia*, quæ pallido, & pexo, densoque folio viret, mense Februario: quæ deinde candida est, & crispissimi folii, vti in provincia *Batica* est finibus *Gaditani* municipii, mense Martio rectè pangitur. Est & *Cyprii* generis ex albo rubicunda, leui & tenerimo folio, quæ in Idibus Aprilis commodè disponitur. Ferè tamen aprico cæli statu, quibus locis aquarum copia est, penè toto anno *Lactuca* feri potest: quæ quò tardius caulem faciat, tùm aliquod incrementum habuerit, exiguum testam media parte accipiat, eo enim quali onere coëctat in latitudinem se diffundit.

Si verò & bona specie habere velis *Lactucas* duobus diebus antea quam es ablaturus, comas ipsarum, h. e. supernam partem, iuxta *Constantinum Cæsarem*, ligato: sic enim albæ & speciosæ erunt. Inalbat ipsas etiam arena supernè infusa. Si verò velis *Lactucas* facere concavas & foliosas, & in caulem non excrecere, sed humiles, & ad terram depresso esse, transplantatas rigabis: quum autem altitudinem palmi habuerint, circumfodies ipsas ut appareant radices, & stercore bubulo recenti oblitus obrues, & statim rigabis. Vbi autem increuerint, germen acutissimo ferro fude, & testam non picatam impone, quò in latitudinem, & non in longitudinem augmentum capiant.

Vt autem *Lactuca* habeat in se *Apium*, & *Eruca*, & *Ocymum*, & alia huius generis ab eadem radice, caprinum aut ouillum stercore *Didymus* accipit, & quantumvis paruum sit perforat, & indultrie euacuat, seminaque dicta, aut quæcunque velis, in euacuatam partem dense indit, & in profunditatem non minorem duorum paruarum deponit, stercore tenero ac raro præsubstrat, deinde tenui terra aggestā, & sensim aqua rigat, atque etiam vbi enatum fuerit semen irrorat, assidue stercore inspergendo, & postquam in caulem excreuerit, multo plus diligentia adhibet, nasciturque *Lactuca* cum iniectis simul seminibus concreta. Alii duas aut tres caprini aut ouilli stercore pilulas confringunt, & semina ipsis admiscunt, eaque simul in linteo-lum mittunt & rigata defodiunt, aliaque item curā adhibita *Lactucam* multiplicem & variarum specierum habent.

Reddetur *Lactuca* odorata, si *Citrui* semen in eius semen imponatur, & sic feratur. *Lactuca* sativa, ut scribit *Dioscorides*, refrigerant, stomacho gratè habentur, somnum conciliant, aluum emolliunt; lac euocant (augent *Corn*), verum decoctæ magis alunt. Stomachicis illotas esse prodest. Epotum semen assiduas libidinum imaginationes in somno compescit, & Veneri refragatur (at semen ipsius potum, his qui assidue semen per somnum effundunt, auxiliatur: & coeundi appetentiam avertit. *Corn*.) Ipsa verò frequentiores in cibo claritati oculorum officiant (si assidue edantur visus hebetudinem in ducit: *Muria* condiuntur, cum in caulem exierunt, vim quandam nanciscuntur succo lactis siluestris *Lactucæ* similem.

Est, inquit *Plinius*, quidem natura omnibus refriger-

Succum crispus par-ticular.

Culcas: mangoni.

Inalbatio.

Sesilis. Odor alius.

Vires & alius in genere. m. Diola.

Diola. Sa-ria lectu.

refrigeratrix, ideo æstate gratè stomacho fastidium auferat, & ubique appetentiam faciunt. Diuus certe Angustus Lactuca conferu-
tus in ægritudine feretur prudentià Muli Medici. Somnum faciendū, venerinque inhibē-
di, æstum refrigerandi, stomachum purgandi (ro-
borandi Dalechamp, sanguinem augēdi vim ha-
bent, quoniam & inflationes discedunt, ructūq;
lenes faciunt, concoctiones adiuuant. Crudita-
tem ipsa nequaquam faciunt, nec vlla res maio-
rem in cibis auaritatem incitat inhibetque eadē:
in causa alterutraque modus est. Ambustis pro-
fuit recedentibus, priusquam pustulae fiant cum sa-
te illita. Vlcera etiam quæ serpunt, coëscunt i-
nitio cum Aphronitro, mox in vino trita. Igni
sacro illiniuntur. Conuulsæ & luxatæ caulibus
cristis cum potentia ex aqua frigida leniunt: eru-
ptiones papularum cum vino & potentia. In chole-
ra quoque coctis puerilis dederunt, ad quod vi-
tiosissimæ quàm maximi caulibus, & amaræ. Quidā
lacte insunt. Deseruesfacti ii caules, & sto-
macho vtilissimi traduntur, sicut somno, & satia
maximè Lactuca, & amara latensque, quam me-
conidem vocauimus. Hoc lac & oculorum cla-
ritati causa muliebri lacte vtilissimum esse præci-
piunt: Semen satiarum contra scorpiones da-
ti: Semine trito ex vino potu & libidinum i-
maginationes in somno compesci. Quidam tamē
frequenter in cibo officere oculorum
claritati tradiderunt.

Sed de his accuratissimè Galenus. Plurique Me-
dicorum, inquit, hoc olus, ut Ficus Autumnalib.
fructibus præfulerunt. Nam inter ipsa aliud me-
lioris succi non inuenias. Quod porro nonnul-
li vitio veterant, id ei in præcipuum laudem ce-
dit, dicentes scilicet eam sanguinem & quidem
multum generare. Et si ita res verè haberet, nō
modò nulli olerum, sed ne optimi quidem succi,
ac maximè nutrimenti edulis esset secundum.
Si verò quia permixtum è Lactuca sanguinis cō-
geratur, ideoque damnandam eam censcant, fa-
cillimè huic malo occurrere potest: quippe quam
vescentibus, & liberalius exerceat, & eā parciū
viti integrum sit. Hæc ergo aduersus eos qui olus
hoc non rectè vituperant. Illud porro scire cō-
uenit, omnibus aliis oleribus paucissimum san-
guinem & vitiosum generantibus, ex sola Lactu-
ca non multum quidem, nec vitiosum, haud ta-
mē omni ex parte laudabilem gigni. Ut pluri-
mum quidem crudā ipsi vascuntur: æstate autē
cū iam in semen proruptura est, in aqua dulci
præcoquantur cum oleo, garo, & aceto assumūt,
aut cum aliquo ex condimentis, obsoniisue, præ-
sertim iis quæ caseo constant. Plurique etiam
antequam excaleseat in aqua elixa vtuntur, ut
ego iam facio, ex quo dentes mihi deteriores ef-
fere ceperunt. Nam amicus quidam meus cum o-
lere hoc à longo tempore, me ut familiari cibo
vsum fuisse sciret, videretque post mandī à me ci-
tra magnam molestiam non posse, cocturæ ratio-
nem indicauit. Etenim in iuuentute quoniam
os ventriculi bile effervescebat, ætus moderan-
di gratiā Lactucā vtebar. Cū autem ad proue-
ctam ætatem peruenissem, olus hoc contrā quā
in iuuentute, somnum iam omni studio & indu-
stria accersenti auxilio fuit. Quippe qui etiamnū
iuuenis luebrandi gratia vigilis dedit operā
me assuefeceram. Declinante iam ætate ipsa ex
se in somni, grauius hoc incommodo afficie-
bat. Aduersus quod vnicui mihi præsen-
tissimum remediū Lactuca vespere comman-

duera fuit. Frigidum ergo humidūque suc-
cum profert, non tamen vitiosum. Itaque, sicut a-
lia olera, à iusta concoctione non excidit, neque
alium cohibet, vti neque impellit. Atque hac illi
non immeritò accidit, quā nec aulera, nec a-
cerba sit, quibus facultatibus in vniuersum al-
nus sistitur, quemadmodum à falsis, accibus, &
omnino abstergendi vim habentibus ad excre-
tionem concitatur, quorum nihil lactuce inest.
Et alio in loco. Lactuca humidum est frigidūque
olus, non tamen extremè, siquidem edendo non
foret, verū maximè secundum aquæ, ut sic di-
cam, fontanæ frigiditatem. Proinde ad calidas
phlegmones accommodum est, & parua & leuia
erysipelata, non tamen ad maiora. Est etiam e-
dulium siti aduersum. At semen potu genitura
profluuium cohibet, quāmobrem iis datur qui
libidinis somnis vexantur. Præterea Galenus
alibi ex Archigene recensens olera, quæ stoma-
chicis in cibo conueniunt, in iis habet Lactucas,
& mentanides, quas meconides lactucas conuertit
Cornarius. Appellatur meconis quoddam Lactu-
cæ atræ genus, à copia succi, & lactis soporiferi,
similitudine quadam cū Meconio, hoc est, pa-
paueris succo: quoniam enim Papauer Græcis di-
citur. Lactucæ succus, auctore Marthiolo, ex
rosaceo fronti & temporibus illitus, non solum
febrientibus somnum conciliat, verū etiam ca-
pitis dolorem mulcet. Gargarizatur vtiliter ex
Punici mali succo, ad colicæ mellæ inflammationē.
Testiculis illitus seminis profluuium cohibet,
præsertim addito ephuræ momento, sed venerē
extinguit. Idem præstat eorum semen ex Papa-
uerini seminis cremore haustum, atque etiam ar-
doribus vrine opitulatur. Cauendus Lactucarum
succus suspitosus, sanguine excreatib*, pituitosusq;
& iis maximè qui liberis dant operam.

Huius itaque diuersas ob causas, diuerso etiā
tempore varius fuit vsus. Antiquitus enim quodd
ebrietati oblectretur, eamque prohiberet, in
eæque sine sumebatur: post verò ad conciliandā
appetentiam, in eæque principio sumi cæpta est,
vnde illud Martialis extat.

Claudere quæ cenat Lactuca solebat aurorum
Dic mihi cur nostras inchoat illa dapesi

Hac nunc quoque æstiuo tempore plurimum vi-
timur in acetariis. Herba multum salubris, Vn-
de Columella in carmine.

Itaque saluari properet Lactuca sapore,
Tristia quæ releuet longi fastidia morbi.

Et Paulus Aegineta l. i. ipsam optimi succi san-
guinem facere testatur. Lactucæ caulem, seu
truncum in vsu esse saccharo conditum integrū
prodidit Iouberius. Confectura sæpius est sicca,
demulcendæ siti optima. Si quis (ait Constant.)
viui radicem Lactucæ satiax euulsam ex terra
ante Solis exortum, latenter sub stratū ægri po-
nat, ipsi somnum inducit. Ipsa similiter quoque
folia quinque numero, aut tria, aut vnum, somnū
adferent ægrotis, clanculum sub puluinar posita,
ita ut partes à caule auulsæ ad pedes ægroti spe-
ctent, supernæ verò ad caput ægri vergant. Qui
ieiuni præsumperint Lactucam, & aquarum vari-
etibus in peregrinationibus non consensuatur,
neque offenduntur: neque verò ab ebrietate
tentabitur, quisquis ipsam præsumperit. Ce-
terum Lactuca assidue comesta visus hebetudinē
cohibet, & visus claritatem inducit, præsertim
si sit dulcis: & multæ quidem in cibum acceptæ,
ventrem soluunt, paucæ verò sistunt, & grauedi-
nem mitigant.

Succum
Paramentū

Phlegmone

Ex Ma-
thiolo

Febri-

Columella
inflammā-
tioSuccus
quibus no-
xius sit
Lactuca-
ditur post
ex antea-
namCaulis fac-
chara con-
ditus
Superflui.Novas a-
quarum a-
uerit

LACTUCA SYLVESTRIS LATO
folio, succo viroso.

EX radice minimi digiti crassitudine, candida, paucis fibris capillata, caule terribitali & altiori adolefcit, tereti, leni, inani, ramoso, lac perquam amarum, & tertium saporem ex radicis & caulis vulnere fundens: folia infima lata, Intybo satiuo proxima, nigricantia, in ambitu leuibus spinulis quasi serrata, superiora, Lactuce sylvestris modo, Fuchfio & aliis sinuata, quæ terram spectant spinulis per costæ longitudinem hispida: flores conferti, Lactuce colore luteo, calyce squamato, subrubente: semen ex pappo tomento pendulum, nigrum. Sculptor picturam nostram corruptit.



mato, subrubente: semen ex pappo tomento pendulum, nigrum. Sculptor picturam nostram corruptit.

Ubi autem [siliu. Lactuca] folio breuiori (Sparto) quam satiuæ est, ait Theophrastus, idque consummatum aculeatur, & caule simili modo breuiore perficitur, succum acrem ac medicatum habet. Nascitur in aruis, carpitur succus per menses. Aiuunt eo purgari hydropem, caliginem ab oculis atteri, & argema tolli cum muliebri lacte.

Agræ autem Dioscoridis similis est satiuæ: sed ampliorem caulem habet, & foliis candidiorem (Lactuca), quæ cum Theophrasto legendum (Sparto) breuiorâ vel uelut pappo nigriorâ & graciliorem & asperiorē: est verò sapore amara. De Lactuce sponte nascentis primo genere Plinii, quam Caprinam vocant, plura dicentur inter vires. Hæc fortè est illa maxima Endiuiâ Tragi, siue i. seu maior, foliis Lactuce quadantenus similibus, linguam referentibus minimè incisis: semine omnis Lactuce semine magis nigricante: &c.

Tragi figura ponitur apud Cordum in histor. lib. 2. c. 134. pro Lactuce agrestis, quamuis Cordus mihi de hac non scribat.

Lonicæ eandem figuram habet ex Trago hac inscriptione Endiuia (Endiuiæ), de qua ait. Endiuia aut Antistheni & Gansdistei & leber distel, vulgo Endiuiâ, species Lactuce, quæ quidam volunt esse Lactucam siluestrem, Gallis Laterron dictam.

Lob. Adv. Lactuca agrestis, Scariola hortensis folio, Lactuce flore, opii odore vehementi, soporifero & viroso: Norbonæ apricis locis: Lactuca altera silvestris Rondeletio: & Lactuca silv. vera. Icon. Plant. Lactuca agrestis.

H. Lugd. Endiuiâ Tragi: Thesion Dalechampii: Item Lactuca silv. vera Dalechampii, cui adscripsit saporem insigniter amarum.

Lactuce silv. veræ Dalechampii descriptioni [inquit C. Bauh.] subiungit H. Lugd. alterius Lactuce silv. historiam ex Pena, sine icone tamen: quæ tamen Penæ Lactuca ab hac diuersa non est. Eandem & tertio pingit additâ descriptione sub Thesio Dalechampii.

Camer. hort. Lactuca silv. Anglica, grandis admodum & alta, odore prorsus Opii.

C. Bauh. phyt. Lactuca 12. siue silu. odore viroso, Thesium Theophrasti creditur.

Lactuca silvestris vera Dalechampii in rupibus lapidosis saxosisque locis nascitur, ubi durum solum paucâ terrâ contegitur: nonnunquam ex rupium ipsarum rimis exilit. Vidi Genex, & in Than Alsatiæ, ac habeo Montbelgardi in orto Ill. C.

Nunc de huius Lactuce facultatibus dicendum. Viribus aliquantulum Papaueri similis est, inquit Dioscorides, unde lacteum eius succum aliqui Meconio permiscuerunt. Aquam per alium elicit potus in aceto mulso succus ad duos obolos: argemâ, caliginemque repurgat: contra adustiones efficaciter illinitur cum lacte mulierum. In summa somnum allicit, doloris leuamentum præstat, menses trahit: contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur: Semen non aliter quam satiuæ libidinum imaginationes in somno amolitur, ac venerem arceat. Succus ad eadem valet, sed viribus infirmior. Reponitur in in fictili nouo lac eius, antea, vt in aliis liquaminibus moris est insolutum.

De hac Plinius ita tradit. Lactuce sponte nascentis primum est genus eius, quam Caprinam vocant (marinam,) quæ pitces in mare deiecitâ protinus necantur qui sunt in proximo. Huius lac spissatum mox in aceto pondere obolorum duum, adiecto aquæ vno cyatho hydropicis datur, quibus verbis exprimere voluit illa Dioscoridis ὀφθαλμοῦ ἀντιόχου ὀφθαλμοῦ πόντιος &c. Aquam per alium elicit potus in aceto mulso, &c. Bisuldem succi vsum medicum Theophrastus habet eo loco, quem supra citauimus. Ex quo & hæc Plinius descripsit, additis quibusdam aliis. Succus omnibus [siluaticis] candidus, viribus quoque Papaueri similis: carpitur per menses inciso caule: conditur in fictili nouo. Sanat omnia oculorum vitia cum lacte mulierum. Arceat nubes, cicatrices, adustionesque omnes, præcipue caligines. Imponitur etiam oculis in lana contra epiphoras. Idem succus alium purgat in posca potus ad duos obolos. Serpentiū ictibus medetur in vino potus. Et folia tosta, thyrisque triti ex aceto bibuntur. Vulncri illinuntur, maxime contra scorpionū ictus. Verum contra phalangia commisso vino ex aceto. Aliis quoque venenis resistunt, exceptis quæ strangulando necant, aut iis quæ vesicæ nocent: item Pylmitchio excepto. Imponuntur & ventri ex melle & aceto, ad detrahenda vitia alui. Urinæ difficultates succus emendat. Crateus cum & hydropicis obolis duobus in aceto & cyatho vini dari iubet.

Hæc verò Galenus tradit. Iis qui venereis somniis vexantur agrestis Lactuce semen exhibetur, cuius colligitur succus, argemâ caliginemque expurgans, cum adustiones cum lacte muliebri inunctis.

Quæ argema Theophrastus, Dioscorides, & Galenus dixerunt, Plinius cicatrices videtur conuertisse. Ad Theophrastum Dioscorides addidit, ὀφθαλμοῦ ἀντιόχου succum illini, Galenus ὀφθαλμοῦ ἀντιόχου quod idem est. Sunt autem ὀφθαλμοῦ ἀντιόχου & ὀφθαλμοῦ ἀντιόχου.

Locus & tempus.

Vires & Vius.

Succus:

Somnum conciliat.

Menses Semen.

Ex Plinio

Hydropis.

Plin. ant.

Collectio succi. Oculi.

Prima diffinitio. Ex Galeno

Somnia & uires.

An Endiuiâ Tragi?

que, seu *Endivia* in oculorum vlcera. Ceterum per adfectiones, hoc in loco quigne, vel quouis alio modo ambusta accipiunt, vehementer errant. Auctor *serapionis* Galeni inscripta definit *Endivia* esse, cum superior tunica in superficiei inusta vlcetur, aut etiam paulo altior vlceratio sit, ob magni floris influxum. Unde non male adeo in-
ulso dici potest.

LACTUCA SILVESTIS SIVE ENDIVIA

multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso.



Incondita
habet per
caulem *filia*,
Sonchi diuisu-
ra, laciniata, &
ferrata, spinis
secundum co-
itam auersa
parte donata,
amato la-
cte pregnan-
tia : *caulis*
verò bicubita-
lis & maior, in
principio spi-
nosus : qui in
fumo in mul-
tos abit ramu-
los, quos flores
ornant parui,
lurei, lactuca-
cei, in pappos

degenerantes. Huius Lactuce quædam mihi
species obseruata folio non laciniato etiam per
caules.

Olus illud agreste, quod præter Lactucam sa-
riam (*Endivia*) apud Pergamenum in Asia, *Ser-*
apionis nomine in viis ipsi nasci : & locis fossa-
rum eminentioribus, & præterea riguis ac ple-
risque incultis, inueniri tradit Galenus, siue La-
tuce hæc siluestris, nec ne, cui integrum erit di-
ligentius perquirere, per nos licet. Nobis satis sit
ea de Thridactia illa Galeni, hoc loco adscribe-
re, quæ ab ipso de ea apud Cord. referuntur. Exi-
guum autem id olus est, instar Lactuce hortens-
is nuper enata, amariorisq; quippiam præ se fert,
& multo magis dum adolefcit : vbi autem cau-
lem iam produxerit, saporem amarum habet, vel
manifestum. Hactenus Galenus.

De nostra planta loquitur Cord. in Hist. cap.
de Lactuca falsò Endivia vocata, dicens: Lactu-
cam agrestem Galeni tempore Græcis Thridaci-
nem appellatam hodiè ubique in Germania à ve-
ritate aberrantes Intybum & Endiuia tã Medi-
ci, quàm Pharmacopœæ vocant. Eius caulis fo-
lia profert statim à terra ferè in profundos sinu-
excavata, quorum anterior pars in mucronem
desinit. At Bremæ in Saxonia, ea folii portio nõ
in turbinem fastigiatur, sed in rotunditatem e-
xit. Figura quæ Cordo per Gesnerum ex Trago
addita est, non conuenit descriptioni, sed potius
Lactuce siluestri folio lato, succo virolo.

Tragus lib. 1. cap. 86. figuram non multum dif-
fimilem habet à Fuchii figura, vocatque Lactu-
cam siluestrem, & Lact. silu. primam, *serapionis* a-
pud Dioscoridis, & Condriillam Galeni. Eadem
eidem Trago cap. 89. dicitur vulgaris En-
diuia, Dioscor. Seris & Intybus altera angustio-

ti folio, atque posse germanicè vocari *zamen*
Endiuia & *Genßzügen* / Scariolam autem &
Seriolam à Serapione dici c. 143. ac de ea scrip-
sisse Plinium.

Crediderim ego Appollinare per *Genßzügen*
& *Endiuia* intelligere hanc Lactucam siluestre:
verum ille pingit Sonchum nomina quoque for-
tè confundens in alia impressione.

Lonic. hanc pingit l. 5. cap. 59. sub titulo mil-
der *latic*, atque veteribus Medicis & Apote-
cariis dici Endiuia. Eius postea ponit descri-
ptionem c. 70. quamvis figura non respondeat,
quæ Sonchi non asper. Fuchii est. Hanc appel-
lat *Soydistell*, atque esse Endiuia siluestrem.
Figura autem quam ponit pro Lactuca siluestri
non placet, nec etiam descriptio satis demonstrat,
quid velit : confundit omnia suo more.

Fuch. Hist. & Icon. Matthioli in prioribus
comm. in Dioscor. itè quæ in postrem. cum mag.
fig. lat. & It. In Hist. germ. ac Epit. Camer. Dod.
gall. & Lat. in fol. *Lactuca siluestris*.

Corn. in Dioscor. lib. 2. cap. 121. Lactuca silu.
genus, adeò Intubum, aut potius Serin Lactuce
similem, referens, vt ostiama ipsam Endiuia
appellat.

Lob. & Pena in Aduers. Seris do. nectica, altera
Lactucina Dioscoridis amara, angustifolia, offi-
cinis iam olim sola Endiuia agnita & recepta,
perperam Recentioribus Lactuca siluestris pu-
tata. De hac inibi scribunt. Speciem hanc in-
cultam Seridis sativæ, non varietatem faciunt.

Est enim foliis, dum primùm pullulant & emer-
gunt altius, Scariolæ hortens: postea adtior-
ra in effigiem Dentis leonis sinuantur dentatis
oris, & nonnullis quasi in dorso spina aculeis, vt
in nostra vera siluestri Lactuca : Caulis quaterni
cubitorum, hispidus, vnicus, rectus, læte turgi-
dus, floribus lureis, pallidis Lactuce donatus : a-
maro gustu, & præsertim vetustioris, acri radice,
pulsilla, fibrosa, Seridis hortens, Sympo de ra-
dicibus miscenda consuetudine Practicantium,
quos doctissimos Barbatos, tam proteruè quàm
inscitè, quidam declamatores putidi rideant, &
spurcis conutritis lacerant, quod hanc plantam
Endiuia veram putarint, & etiamnum vsuper
non modò ad Syrupos de radicib., de succo Endi-
uiæ & alios Nicolai, sed etiam stillaricias aquas ex
ea cõficiant, quib. suas Rhabarbari macerationes
parent. Esse quippe nimis calidam, amaram, in-
gratam, quidam illorum reprehensorum, alii au-
tem esse silu. Lactucam, nec aliam se nosse dicti-
tant. Sed enim qui institutum perpenderit vete-
ris Barbarorum nostrorum (chole, animaduertet
illos magna ratione & experimento nequitiam
contemnendo fultos. Quippe non solum hanc
Endiuia, aptiorem esse decocto succo, & stilla-
titia ad intemperies, obturationes hepatis, &
primarum venarum, sed etiam macerationes Rha-
barbari, Myrobalanorum, & similium medicame-
torum : cum enim sit paullo tenuiore & minùs
excrementoso humido, melius reserat & abster-
git : tum etiam intima rerum macerandaru per-
uadit, nec calore exuperat, aut amarore nocet,
cùm eius amaror non sit à calido, aut saltem non
calidus, vt norunt cultioris Philosophiæ periti, &
studiosi cõciliare apud Galenum, & Auerrohem,
questionem de Opio, Meconio, Papauere, La-
tuce, & non parum multis aliis amaris, multum
tamen frigidis. Quin Dioscoride docente Seri-
des siluestres stomacho meliores satius, quia ipsi
estuantem & tenore resolutum refocillent : in pi-

Apollin.

Lonic. r. d.
preh.

Lactuca
silu.

Serin do.
mestica.
Error Re-
centiorum

Radix sy-
rupo mis-
cenda

Endiuia
sera

Lactuca
silu.
institutum
veterum
approbatum

Sonchus arborea.
Endiua sil.
Glo.

his vorata, & foris adnotata: Et nota huius melius congruunt Endiuiæ siue Seridis amara angustifolia, quam Lactuca agrestis. *Idem* poltea dicunt cap. de Lactuca agrestis. Seridis species, quam Sonchum arboream, siluestremque quidam putarunt, nihil Lactucæ simile habet, præterquam lac & semen. Pharmacopœi hanc ubique pro siluestri Endiuiâ agnoscunt & vsurpant. Capite tandem de Soncho aiunt. Propinqua aded est sonchi natura Endiuiæ, ut multi etiam hodie putent spinosam Endiuiam nostram esse Sonchum asperam: verum tres cum notissimas habeamus Sonchos, illam Endiuiam officinarum retinimus.

Lob. Obs. Endiuiæ vulgarior officinarum, Seris domestica, altera Lactucina Dioscoridis amara, angustifolia. Icon. Plant. Seris domestica, Lactucina Diosc. Offic. Endiuiâ.

Thal. Lactuca silu. Cordi ac Tragi.

Lactucina Diosc.

H. Lugd. Lactuca siluestris Matthioli. Hanc inquit Hist. Ruell. lib. 2. cap. 69. passim ab offic. Endiuiam dici tradit, id quod etiam Fuchsius Matth. & Dod. perhibent: verum non sine magno errore Lactucam hanc silu. Endiuiam dicit, ac pro ea medicamentis immisceci. Desinant quæso inquit Fuchsi. hac pro Endiuiâ uti Medici, si modò rectè consilium agis cupiunt.

Cæsalp. Endiuiâ silu. de qua Nicol. Florentinus, qui eam recipit in syr. de Cichorio cum Rhabarbato.

C. Bauhin. Phyt. Lactuca siue silu. costâ spinosa.

Nomina linguarum

Græcis in genere *θυσία* & *ἀγρία*, Lat. Lactuca siluestris, Endiuiâ multis dicta, folio laciniato, dorso spinoso, & à quibusdam Serriola per duplex re. quod scæpe modo acutas spinas folii coita à tergo habeat: à Zoroastro ut memini legere apud Dod. gall. Pherumbrum appellatur: German. wilder lard: Belg. wilde lardiere: Gall. *Lactue sauvage*: It. Lattuca saluatica: Hisp. *Letuga saluaga*.

Locus & tempus

Nasci hanc secus vias, agrorum & pratorum margines, tum & iuxta scrobes, autor est Dodonæus; reperiri & in vineis, ac hortis, in quibus olera feruntur; facillimè autem, ubi semel sata sit, singulis annis recurrere. Lactucam nostram hanc Geneuz vidi virentem hieme ex semine deciduo. Monspelii incipit provenire mense Martio ac ibi abundat, sicuti & Basileæ: Lugduni verò, ubi ad altitudinem hominis excrevit, Februarii & Martio. Ibidem observavi foliis non laciniatis prioribus longiusculis.

Vires & Vitas.

Recentior ætas, ut Dod. perhibet, loco Intybi hac non infeliciter vititur: Nam ad iocinoris inflammationes & morbum regium confert; calorem siquidem contemperat, & meatus expurgando aperit. Semen huius idem, quod Lactucæ sativæ potest, & Veneri refragatur.

LACTUCA SILVESTRIS MYRORVM flore luteo.

Descriptio

Affatim lac fundit tota planta, quæ ex radice digitali, amara, caules perquam tenuis erigit, cubitales & sesquicubitales, læves, subrubentes, subinde inanes, aut certè medullâ fungosa plenos: ad quorum genicula oriuntur folia profundè laciniata, extremâ laciniâ triangulâ hederaceum folium referente, colore quâ terrâ spectans purpurascens, interdum flosculi in ra-

mulis exigui, Lactucæ, plures congesti, colore luteo, quinque foliis constant, eodémque coloria stamina in medio exigunt, postmodum aliorum more in pappos abeunt.

Anguill. Herba Scariolæ silvestris species, cuius meminit Galen cap. de Lactucis. Geln. apud Cord. lib. 2. cap. 61. Lactuca siluatica luteis floribus. de hort.



Flora

Lactuca silu. flore luteo: alia in silvis humidis crescens ad quatuor aut quinque cubitos. Sonchus fortè arborefcens Dioscoridis: species vna folio oblongo, subdulci & grato gustu, anguloso, floribus luteis. In append. Sonchi genus læve, Lactuca illa [ut doctiss. Iuuenis Iohan. Bauh. nos monuit] silu. Anguillæ, cuius meminit Galenus.

Lact. silu. Anguillæ Sonchus

Lob. Obs. & Icon. Plant. Sonchus alter folio profundis laciniis sinuato, hederaceo.

Tabern. Icon. & Hist. Sonchi genus II. Sonchus siluaticus 4.

Cæsalp. Herba quædam in rudieribus nascens, à Plinio inter Lactucas silvestres Hieracia vocat.

Camer. hort. Sonchus luteus varius.

C. Bauh. Phyt. Sonchus 5. siue lævis alter, vel Lactuca murorum lutea. Item: Lactuca 10. siue Lactuca species silu. Gesnero. Et Frater has quidem seiuinxit, ego autem (quia Gesnerus non separat, & quia ignoro quæ sit) ambas iungo. Eisdem apud Matthioli. Sonchus lævis alter, vel Lactuca murorum lutea: Intybus silvestris 3. Trago: Sonchus lævis altera Matr. Cast. & Lugdunensis. Intybus 3. Tragi, cuius nos descriptionem posuimus sub Soncho non laciniato, folio est prælongo, angusto, flore luteo & multiplici ac maiori duobus suis Intybis silvestribus, siue Sonchis. Hæc non conueniunt Lactucæ murariæ: proponit Frater iconem ex Tabern. quæ probanda pro Lactuca muraria, sed quæ nihil mihi videtur habere commune cum Soncho læui alterâ Matthioli: nec cum vlla iconum à Matthioli propositarum pro Soncho.

Locus & tempus

Lactuca murorum silu. provenit Montbelgardi in muris Castelli, & silvis vmbrosis, florens Iulio. Basileæ observavi itinere Dornacum in vassersfall ad duos trésc cubitos excrecentem Augusto cum semine maturo, ceu etiam prope portam lapideam dictam. Frater C. Bauh. qui nescio quâ occasione Chondrillam 2. Dioscoridis nominat, Geneuz in testis, & parietibus mense Decembri virentem conspexit.

LACTUCÆ MYRORVM AFFINIS

Sonchus Dendroides Dalechampii.

Radicem habet crassam, nigricantem, ex qua radiculæ multæ prodeunt: caules bicubita-

lce, atque interdum altiores, teretes, foliis stipatis linuolis, seu per oras ex intervallo infectis, latis, Quercui haud abimilibus, lacte disfluentibus. Rami in caulibus nulli sunt, sed ab imo scapo ad summum usque non procul à singulorum foliorum exore, singuli nascuntur petioli, tenues, qui multos flores sustinent luteos, quales sunt aliorum Sonchorum, aut Lactuæ, qui tandem in pappus abeunt.

Sonchus
Dendroi-
des Dale-
champii
Sonchus ar-
borefcens
Diofcor.

Hic Sonchus Dendroides, i. e. arborefcens Dalechampii, est tertium illud Sonchi genus, inquit H. Lugdunensis, cuius capite de Soncho tertio loco Diofcorides meminit. Sed hic scirpuli ac debitationem rei herbariarum studiosis præfens descriptio Dalechampii iniicit, cum dixerit, ramis nullis, sed foliis tantum & floribus huius Sonchi caules ornari. Diofcoridis autem Sonchus tertius, siue arborefcens [sic] latis confert foliis, quæ quidem caulem in ramos exeuntem distinguant, cum quidem in Diofcor. latino legatur. Sed hunc scirpulum ex Græco codice ita eximendum esse iudicat, ὅς τὸ πρῶτον ὡς ὅτι, ὅς τὸ δεύτερον, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ, ὅς τὸ τρίτον, ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ. Quæ sic fidelius conuertisset Rullius. Alter Sonchus, etiam tener est & arborefcens, & latifolius: sed caulem folia distinguunt.

Ruell
re-
preh.



Sonchum dendroidem provenire scribit.

C. Bauhin. Phyt. Sonchus 10. siue arborefcens, Dendroides Dal. multum cum Lactuca murorum conueniens.

LACTUCA SILVATICA PURPUREA.

Descriptio

Lactuca siluatica purpurea, caule est bicubitali & altiore, glabro, tereti, medullâ alba pleno: quem folia ex intervallo alternatim vestiunt, sinuata, glabra, tenella, subtus glauca, supra vitentia, nullo aut breuissimo pediculo donata, angusto principio, mucronèque, inferiora quidem, vacias duas circiter lata, palmum longa, superiora vix vnciam sæpe lata, & quæ caulibus adhærere interdum latiora quam inferiora, pinatæque, sapore nullo excellentes: caulis in ramos aliquot diuiditur, atque hi rursus in alios minores, qui flores sustinent Lactuæ pares, & quinque foliolis contextos, sed colore hilari

purpurascente, qui in pappum facessunt, semine oblongo, gracili: radice subest pollicaris, à qua multe longissime dependent fibræ, sapore grato, dulci, cum tenuisculo amarore prædite.

Gesl. apud Cordum lib. 2. hist. cap. 61. (vbi pulchra figura) dicitur, Lactuca siluatica purpureis floribus. De hort. Lactuca silu. in filis nascens, purpureo flore, Sonchus Diofcor. fortè. Item: Sonch. arborefcens Diofcor. puniceo flore.

Synonyma
Lact. silu.
purpurea
flore.

Chf. Pannon. & Hist. post. Sonchus 2. Sonchus latus purpureo flore.

Sonch.
purp. flore.

Tabern. Icon. Libanotis Theophrast. sterilis.

Sonchus siluaticus, waldblatich. Hult. wald lateich, an Libanot. Theoph. seu Rosmarinum infrugiferum: item Hist. sine iconè, Sonchi 10. genus.

Libanotis
Theoph. sterilis.

Camer. hort. Sonchus cæruleo flore. Trago.

Lactuca flore purpureo, latitich mit braunrot blumlein Thal. Lact. silu. uestris sp. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.



Casp. Bauh. Phyt. Lact. 9. siue montana purpureo cærulea maior. Huius generis, inquit, est Sonchus 2. Clusii, quem cabitallem dicit, nostra verò Lactuca ad tres & etiam ad quatuor cubitos exurgit: quare hæc Clusii Lactuca

montana purpureo cærulea minor dici poterit.

Gerard. Anglo. Erythimum siluestre. Pro Erythimo Gerard. habet iconem Tabernamontani, cui titulum fecit Libanotis, de qua antè: sed malè: nihil habet commune cum Erythimo.

Error Ger.
rardi

Lactuca siluatica flore purpureo obseruauit Mörbelgardi in monte Eshon: aliquoties seminaui & plantaui in horto Ill. E. C. Abundat circa Mafmunster & Rotenburg. Genevæ mihi visa in montibus Salene & Thuri, & plantata in hortis florens Iulio, eum & in montib. circa Tigurum. Babilæ in montibus circa Dornacum, wasserfall & Mouters, florens Augusto & Septembri. D. Doldius misit Norimbergæ nomine Lactuæ silu. Erythranthemii Thalii. Monte quodam prope Stolbergam (iugum harcynicum quod vocat, die harschböh) copiosa est. Vidit Thal. eandem crebram montes Semanæ siluæ in principatu Hennebergensi habere.

Locus &
tempus.

SONCHUS CÆRULEUS LATIFOLIUS.

Asurgit Sonchus cæruleus latifolius caule bicubitali & altiore, crassiusculo: folia laciniata, intricetram laciniam Hederacei folii æmulam, in ambitu serratam desinunt: summus caulis hirsutus, thyrsus gestat florum, Sonchi similium, sed cæruleo colore nitentium, in pappos celeriter fatiscientium: hunc dedit frater C. Bauh. sicum ex Allatia delatum. Eundem autem

Descriptio

cum Soncho cœruleo Clusi suspicamur, cuius hac est descriptio.

Cubitali, aut ampliore existit caule, rotundo,



striato, lanugine obfuso, intus cauo: quem ambiunt multa folia, ampla, aliquot profundis laciniis verinque diuisa, extremo mucronata, latiore pediculo caulem amplectentia, in ambitu nonnihil dentata, subtus aliquantulum incana, lacteo succo plena: plurimos in summo caule flores profert, purpurascen-

tibus & villosis petiolis inhaerentes, vicenis foliis, ut plurimum constantes, elegantissimi coloris cœrulei, qui per maturitatem in pappum cum semine cinereo exiguo euanescent: radix pollicaris est crassitudinis, oblonga, non in profundum acta, sed obliqua, candicans, dura, veluti internodiis distincta, multas circumquaque fibras crassas agens, & viuax, singulis annis nouos ex latere caules profert.

Synon.
Sonchus laevis cœruleo flore.

Soncho-Cichorium.
Icon.

Camer. bot.

Clus. Pannon. & Hist. post. Sonchus laevis cœruleo flore 1.
C. Bauh. Phyt. Sonchus 8. siue alpinus cœruleus.

Camer. hort. Sonch. cœruleo flore: Soncho-Cichorium. Camer. non describit suum cœruleum, figura tamen artificiosa est, exprimens plantam siccam, quam à Fratre accepi, quæ occulta, ut potius ex Cimeratio euaerimus parandam nostram iconem, quam ex Clusio, cuius vnicum florem exhibemus. Camerarium per alterum cœruleum intelligere putamus Lactucam siluaticam purpuream: luteus verò varius quis sit nobis nobis nondum constat.

Tabern. ic. & hist. Sonchus laevis 4. flore cœruleo, blauer basenfel.

Thal. Intybus πατίφυλλος horticola, cuius folia referunt imaginem aliquam Sonchi laevis, floribus cœruleis, interdum prorsus candidis: foliis tamen in plures lacinias quam prior discissis.

Locus.

Abundè nasci vidit Clus. variis locis vmbrosis, in quibus florebat Iulio & Augusto, quo mense etiam semel ad maturitatem peruenit. In hortos translatus, maturius multò, imò interdum mense Iunio denuò florere. Thalius quibuldâ Horticola locis reperit. In Alsatia montibus altiss. Iulio & Augusto florere, semenque proferre Casp. Bauhinus scribit.

Tempus.

Descriptio
rudis

Folia huius erant, quasi Lactucæ primam enatae & adhuc tenellæ, similique virore prædita, quæ gustata insipida deprehendebantur.

Synonyma

Monardi ex vers. Clus. & H. Lugd. Herba ad renum morbos vilis. C. Bauh. Phyt. Lactuca 15.

Lactuca foliis Peruviana.

siue Lactucifolia renalis.

Admodum vilis est ad renum affectus à calida causa provenientes, eius succo cum rosaceo vnguento mixto, parti dolenti illito, & ipsius Renae plantæ foliis superimpositis: in erysipelate autem & inflammationibus succus illius valde conferre dicitur; nam inflammationem tollit & dolorem mitigat. Ex foliis coniecturam facit Monardes perfrigida esse herbam.

Lactuca ex Peru.

Lactuca siluestris vocata apud Monardem, cuius folia Lactucæ foliis erant similia, ex atro virentia, ex Peru mittebatur.

Monardi ex vers. Clus. & H. Lugdunensi dicitur Lactuca siluestris pumila. C. Bauh. Phyt. Lactuca 15.

Huius foliorum decoctum diutius in ore, quâ parte dentes dolent, retentum, dentium dolorem tollit. Idem præstat foliorum succus dentium cauis instillatus, herbâ superimpositâ. Sapore admodum amaro est: caliditorem existimat auctor, quam in primo gradu.

Lactuca hispanica nomine missa, laciniata.

Lactuca hæc ex semine in capsulam ligneam terrâ oppletam coniecto suecreuit anno 1609. Iulio, Iulioque mensibus. Radix eius vnica, longa, in imo tenuissima, tenuisque ad summum vique crassescit, pluribus non procul à summa eius parte lateralibus radiculis, capillaceis fibris donatis constabat: caulis post hanc triquetus, digitalis crassitudinis: folia omnium primo ex imo nascencia, breviora, laciniis potissimum duabus latoribus conspicua sunt, secunda longiora, etiam præter alias profundas lacinias duas obtinent, cæteris longiores, alarum ad instar altrinsecus expansas, si que lubinde folia amplexicaulia, succedentia foliis iuxta caulis ductum progeminare solent, in sui medio longo nervo constantia, donec in summo caule post folia maxima sensim minorâ multò vifantur, tenerrima, leuique attractu lacteum succum reddentia: folia cæteroquin omnia simul cum caule concolore in luteam palliditatem deuegunt, sapore donata simili, quo Lactucæ capitata, nec dulci ut Romana, nec amaricante, ut quædam Lactucæ.

Eiusdem Lactucam hætenus non vidimus, prouenit nobis anno 1609. lata ex semine per fratrem chariss. misso, titulo, Lactucæ Hispanicæ veræ. Eadem etiam prouenit in eius hortu Basileæ, ubi à nobis inspecta hoc anno.

Egregius vir D. Fridericus Meier Argent. in cat. Plant. sui horti notat Lactucam Hispanicam pro planta non vulgari.

INTYBA, SERIDES, ET CICHORIA
ex Veteribus.
CAP. II.

DE Intybis, Seridibus, & Cichoriis Veterum Lacturi, eorum valde deprauatam, & præsertim Dioscoridis eonfusam lectionem ita relictum. *Σέρεις διοσκού* [σέρεις, η, ης, ης, sic Ald. (ita etiam videt Lacuna): at in Patissien. ista desiderantur. Sarrac. *ἡν ἡ μέν δ' ἔχειται παρ' ἡμῶν καὶ καλεῖται καὶ σέρεις* &c.

Hunc autem Dioscor. locum sic verto. Seris duplex

Duplex, quarum una quidem silvestris, Picris (siue amara) quæ Cichorium nominatur. Alia vero (silvestris scilicet) est foliis latioribus, & stomacho gravior, quam hortensis. Huius vero (hortensis scilicet) duplex genus. Vnum Lactuca similis, & lara folia habens. Aliud angustifolium & amarum (vel subamarum.) Omnes sunt adstringentes, refrigerantes, & stomacho commoda, &c. Postea ait. Et maxime silvestres (Picris seu Cichorium, & alia latioribus foliis, &c.) stomacho commoda.

Corn. lectio
improbatur
Mirum Cornarium sic vertere. Seris duplex est, Ex quibus silvestris, quæ Picris & Cichorium nominatur, latiora folia habet, & stomacho magis commoda est quam hortensis. Et huius duæ species sunt, Altera enim Lactuca &c. Cornarium triantium Seridis statuit genera sua versione, vnum silvestre, duo hortensia.

Hermol.
Hermolaus quatuor statuere videtur suâ versione, ut etiam Anguill. & nos fecimus nostrâ. Ait enim Seris sativa (silu.) quam Picridem aliqui vocauerunt, Aegyptii Agon, Romani Intubum silvestrem. Duam & ipsa generum tradidit, quorum quod silvestre est, Picris, eademque Cichorium dicitur. Alterum folio extensiore, quibusque gravior, quam hortensis. Iterumque hoc (scilicet hortense) in species biduas distrahitur, vnam Lactuca similiorum &c.

Ruellii
descrip.
Ruellius aliter vertit. Seris duam generum est. Altera silvestris, quæ Picris & Cichorium vocatur. Altera sativa, latioribus foliis constans, stomacho quam hortensis vilior. Quæ (hortensis scilicet) iterum in duas species digeritur, vna folio latiore, &c.

Hoc loco malè *descriptio* pro *descriptio* habet Matthiolus ex libro simplicibus Orbisasi dicato: in quo etiam errauerunt Sarracenus, & Hermolaus. Verisimile enim est hortensia origi gratiora esse, quia minus amara silvestribus. Præterea infra ait Dioscor. *descriptio* *descriptio* *descriptio*.

Cichorii descriptio potest desumi ex descriptione Chondrillæ apud Dioscoridem, de qua post.

Marthios.
Serapionis versio habet affinitatem cum versione Cornarii: constituit enim tres species tantum Endiuia, vnicam tantum silvestrem, non tot silvestres, quot domesticas, ut asserit Matthiolus.

Ex Plinio
Cichorium
Greffon.
Pancratio.
dedypno.
Intybi historiam illustrare videntur, ea quæ scripsit Plinius lib. 20. cap. 7. Cichorium refrigerat, inquit, in cibo sumptum, quod quidem propter singularem salubritatem aliqui Chreston appellant, alii Pancration. Et silvestre genus, alii Hedypnoida vocant, latioris folii. Diligentiores plura genera faciunt [Lactuca:] purpureas, crispas, Cappadocicas, Græcas. Longioris hoc folii, caulisque lati: præterea longi & angusti, Intubi similis. Nec ex eodem genere (Lactuca) possunt dici, neque ex alio Intubi, hiemis impatientiores, virisque præferentes, sed caule non minus grati. Seruntur verno plantæ eorum, vltimo Vere transferuntur. Est & Erraticum Intybi, quod in Aegypto Cichorium vocant, de quo plura alia. Intubi quoque (pergit Plin. lib. 20. cap. 8.) non extra remedia sunt. Erraticum apud nos quidam Ambugiam [quædam exemplaria & Celsus Ambubelam, Corn. iappellaure. In Aegypto Cichorium vocant, quod silvestre sit. Satiuum autem Serim, quod est minus & venosius. Et silvestre genus, alii Hedypnoida vocant, latioris folii. Seris & ipsa Lactucis similissima, duorum generum est, silu. melior. Nigra ista & æstiva. Dece-

Tom. II.

rior hyberna & candidior: utraque tamen stomacho vtilissima. De Cichorio in genere loquitur lib. 21. cap. 17. ita scribens. Cichorium & similia circa terram folia habent, germinantibus (germinant, vet.) ab radice post Virgilia.

Seridem subamarum esse olus, & magis quod silvestre est, ac ob hoc ipsum Picrida ab aliquibus appellatum, à quibusdam vero Cichorium nominatum, testatur Galenus. At ambas, Seridem sativam & silvestrem, adstringente qualitate participare, velut etiam Chondrile, quam & ipsam Seridis speciem esse effadit. De viribus plura infra.

Sed & Seris appellatur etiam à Græcis (Constantino, Paulo, & Actio *descriptio*). Officina autem & barbarum Medicorum genus *descriptio* vocem in Taraxacon corruerunt.

1. Seridis, Intubi, Cichorei, Endiuia, & Scario. tæ nomine exhibentur Cichorium silvestre & sativum.

2. Intubum sativum latifolium, angustifolium, & crispum.

3. Hedypnois, Cichorii genus silvestre Plinio.

4. Chondrilla quam aliqui Cichorion, aliqui Serim appellant.

5. Chondrilla altera species à Matthiolo ad Cichorium etiam refertur.

6. Lactuca silvestris, quæ hodie sub Endiuia voce vrantur, quamvis non sit vera Endiuia.

7. Intubi nomine, malè in Virgilio quidam aucti intelligunt, auctore Hermolaio.

8. Cichorii nomine veniebant solum silvestria olera, Iulio Polluce auctore: quæ & gracilia & tenuia cognominantur in Ouidio.

9. Cichorium tertium siue silvestre floribus exiguis luteis, inquit Dodonæus, non abs re Hyoficris, aut (ut quædam exemplaria) Hyoficris esse existimatur.

10. Endiuia suam maiorem, siue Serim, aut Intubum latifolium habet Tragus, quam nos Lactucam Romanam longam, dulcem nostram esse suspicamus.

11. Intybum silvestre duplex Tragi, Scariola seu Seriola dictum, Sonchus aspera à nobis inferbitur.

12. Præter iam commemoratas Intybi silvestris species, aliam quandam ad muros repêtem commemorat, & hanc Sonchum radice repente nominamus.

13. Cichorea candida & rosea Tragi à Cichorea caerulea (Cichorio silvestri) ab eo primo loco descripta, colore tantum differt.

14. Cichoream tertiam habet Tragus luteam, quæ est Hieracium maius.

15. Cichorea quarta eiusdem quæ sit nondum mihi apparet. Eius tamen tertiæ varietatem solum esse credimus.

16. Cichoream quintam Tragi, nos Chondrillam vimineam fecimus.

17. Pro Endiuia seu Lactuca silvestri potest vsurpari Lactuca leporina Apulei, inquit Tragus, eamque inter Cichoreas & Intyba refert, descriptam cap. de Lagopo tertio loco cap. 88. lib. 1.

18. Matthiolus Endiuia crispam, ut vocat, distinguit ab hortensi latifolia in sua hist. plant.

19. Intybaceo generi sunt, teste Matthiolo, qui adscribant Cyanum, de quo agimus l. 26. H. n. g.

CICHORIUM SILVESTRE ET SATIVUM.

Radice pollicari, lacte pregnantis: quæ torulos suos caules proferit eodem succo tur-

Descriptio



maria insigniter deprehenditur: radix, caules, folia, flores: per culturam maius & mitius euadit; in spontaneo interdum caulis monstrosam acquirit altitudinem.

Est, inquit Mare. Virgilius, Cichorion peregrina Græcis vox, quæ omnia Intyborum genera simul indicat. Esti ab aliquibus ad amaram Intybum contracta fuerit. Nec quicquam videtur in antiquis scriptoribus circa congeneris plantæ huius appellationes certum. Accertè ex eo facile est colligere, nullam in his, nec Græcis, nec Latinis, certam perpetuamque appellationem esse: sed in Græcis Cichorium nunc agreste, nunc satium Intybum indicare: Picridem semper agreste: quemadmodum Serim plerumque satium. In Latinis Intybum modò satium, modò agreste: Ambubeiam autem agreste semper. Nec fore antiquos auctores legentibus aliquid vtilius, quàm præcedente rei coniecturâ, contra quàm in cæteris fit, non ex vocibus res, sed ex rebus voces intellexisse. Solus Celsus lib. 2. cap. 29. de vtroque genere agens, ad certas voces in medicina rem contraxisse videtur: satiumque Intybum, siluestre Ambubeiam appellasse. Censet etque Marcellus, quoniam graui periculo in medicina hæc variantur, satium in Græcis Serim, in Latinis Intybum. A greste in Græcis Picrida aut Cichorium in Latinis Ambubeiam semper appellari: vt certa nominum ratio certam legentibus rem indicaret, nisi in medicæ materiæ nomenclatura audacior videri aliquibus timeret.

Luminare maius vocat Endiuia alteram & Cichoream, & Endiuia magis amaram Auicennæ: Intubum quorundam, aliorum Solsequium, Sponsam Solis, Intubum erraticum Plinii, Rostam porcinum: videtur etiam nominare Scariolam agrestem & Bartifescere.

Cronenburg, in syr. de succo Endiuiz Serim siue Intubum erraticum, vel silv. Picridem Attii, & Cichorion Celsi, Latinorum quorundam Ambubeiam & Ambubeiam, offic. Cichoream nominat, dicitque Tragum lib. 1. cap. 91. in sex differentias hanc plantam digessisse, vbi postremam iure satiam asserat, siquidem in Hollandia & alibi, vt retur, omnes pharmacopolæ in hortis eam diligenter curent, hiemis patientem: foliorum stipitibus lanugine molli vestitis. Sed errat Tragus non loquitur de Cichorea culta, sed Intubum satium, à Cichorea culta differente, de qua verba facit Cronenburgius. Tragus loco ci-

tato dicit. Erraticum Cichorium ceruleo flore, Cichorea 1. siue cæreale[in quo genere, rarissime tamen, inueniuntur plantæ, quæ partim candidum, partim roseum gerant florem] est herbasolaris, quæ Varroni Solsequium, Heliotropium, & Egyptiis Agon dicitur: Cichorea satia & erratica [hanc pingit solo Cichoreæ nomine: pro illa Intybum exhibet satium,] pertinent ad caput Dioscoridis de Seride, potestque fieri, vt apud Theoph. lib. 7. cap. 7. & 11. Intyba & Porcellia vocentur.

Recedit à Trago Cordus in Diosc. lib. 4. cap. 19: ita scribens: vegwart herba dicta Germanis, vulgò creditur esse Heliotropium, sed falsò, cum sit Cichorium, i. e. Intybum agreste: erroris causam protulit Plinius, qui cæreuleum florem Heliotropio tribuit. Idem lib. 2. cap. 160. ait. Intybum siluestre, quod Cichorium & Picris ob amaritudinem vocatur, & Amarago à Gaza in Theoph. interpretatur, in pharmacopoliis Cichorea nominatur: flores habet cæreleos, qui ferè semper Solem versus inclinantur, vnde etiam à quibusdam Solsequium siue Heliotropium appellatur, quamvis Heliotropium diuersa sit ab Intybo siue Cichorio, & suis generis herba. Definit hanc Cord. hist. sua lib. 2. c. 66. de Cichorio siue Agresti Intybo cui apposuit figurâ Trag. Gelsnerus, cui de hort. etiam Intybum agreste dicitur: In cat. pl. Ambubeia, Intybus agrestis & erraticus, Seris & Picris.

Subscribit Cordo Amatus, qui hanc lib. 2. c. narr. 125. titulo de Endiuia plures enim dicto loco ac diuersos titulos habet, intelligit, vbi græcè οὐκ ἀγρία, ἀγρία, & ἀγρία vocatur; latine Cichorium, Intubum agreste, & Ambubeia. Is autem pro Seride siluestre, Intybum satium exhibet.

Brunfels. tom. 3. Rhapsod. 33. Solsequium Cichorium facit, ac ex Intyborum genere esse pronunciat, quàm bene autem Solsequium faciat etiam ex Fuchsio patet. Rudissimus, inquit, error quorundam, qui hanc [Intubum silv. siue Cichorium inscribit] Heliotropium esse contendunt: cum tamen primum folia repugnent, quæ non sunt Ocymo similia, neque candida, sed nigricantia magis: deinde non semper candidum, sed magna ex parte cæreuleum florem habet. Radix denique eius, vt Heliotropii, non inutilis, sed experientiâ teste, mirè efficax. Quibus omnibus accedit manifesta cum aliis satius Intubis similitudo, quæ vna satis docet Intubum esse siluestre: & non Heliotropium: vt quorundam remeritatem non satis mirari queam, qui contra apertam veritatem, & omnium Medicorum consensum, secus pronunciare audent. Si quidem species est erratici Intybi, à Plin. lib. 20. cap. 8. memorati, quæ Græcis ἀγρία dicitur, Lat. Ambubeia, vulgo herb. & offic. Cichorea; silvestris (addit Dod. gall. qui eam hoc titulo pingit: Intubum silv. Cichorium, facitque Cichorea & Seridem tertiâ) gall. Cichoréssauage, Germ. mild vegwart, Belg. wilde Licoreye. Cichorium & Intybum (inquit Dod. lat. in fol.) eiusdem generis sunt, Sed Intybum satium, Cichorium verò silvestre. Et hoc duplex est: Vnum latioris folii, Hedypnois Plinii: alterum quod amariū est, ac mæris Dioscoridi dicitur; Lat. Intubum silvestre, Intubum agreste, Intubum erraticum, & Chicorion; offic. Cichorea, Germ. vegwart [quasi viarum cultos, vel vegweiss quoddam peregrinis quasi viam indicare videatur, Fuchsi] hindleuff / & Sonnegwibel, Cordo: Belg.

Synon.

Hundebe.
Hundebe.
Suarben.
Dundebe.
Dundebe.

Solem se
quisit

Herba fol.
Australis

Сопрѣ.
Таб. пос.

H. L. 750

Hieracium
latifol. Er
Gerar.
la

Gerard;
of.

Gerard;
of.

Gerard;
of.

Gerard;
of.

Gerard;
of.

Gerard;
of.

Gerard;
of.

Gerard;
of.

re candido sese offert, vt ad Harcyniam circa Wicrgerodam.

Thvvenchf. Cichorium silu. albo flore, Cichorium album.

Locus. Cichorium siluestre, inquit Dodonæus, non modo in hortis feritur, sed & per vniuersam Germaniam, tum & alibi secus vias ac locis incultis exit: ac potissimum folia habens profundioribus infuris laciniata; quod & reliquis amarior est. Iulio & Augusto mensibus præcipue cum floribus reperitur: semen interea perhicitur.

tempus. Cichorium obseruauit Monspelii florens Iunio; Basileæ, quâ itur Mouters Octobri inter portam cineream & lapideam intra & extra vrbem, & ad ripam fluminis Birsch & alibi. Vidi Lugduni & Patauî, quibus in locis copiosus vssus radicum elixarum in aceti mensis Ianuario & Febuario. Tanta est Cichorii similitudo cum Dente Leonis Veris principio, vt difficile sit discernere has plantas. Cichorium flore albo cultum Montbelgardi habeo in horto E. C. ex semine Stutgardia missio, seipsum ex semine deciduo multum propagans, & non cultum ab erratico non differens, licet in loco culto proueniat.

Vitus & radicum. Hos Solsequii, vt Brunfels. annotat, seu Cichorii, iniectus formicarum cumulo in rubrum vertitur colorem, idque magno naturæ miraculo.

Naturæ miraculâ. De omni Seride Dioscorides hæc prodidit. Refrigerat vtraque & adstringit, stomacho vtilissima: aluum sistit cocta, si cum aceto assumatur. Siluestres stomacho meliores: quandoquidem æstuantem ipsum, & quem imbecillitas vexet, cibo leniunt. Cardiacis per se aut cum polenta, vtiliter illinuntur podagris, & oculorum inflammationibus auxilio sunt: herba cum radice illita, percussis à Scorpione subuenit, igni sacro cum polenta medetur. Succus cum cerussa & aceto, valet ad illitus eorum, quæ refrigerationem delictant.

Vites & vssus. De Seride eadem ferè Plinius. Vtraque stomacho vtilissima, præcipue quem humor vexat. Cum aceto in cibo refrigerant, vel illita, discutiantque vel alios morbos quam stomachi. Cum polenta siluestrium radices stomachi causâ sordentur, & cardiacis illinuntur super mammam sinistram, ex aceto. Omnes ex & podagris viles, & sanguinem reicientibus. Item quibus genitura fluit: alterno dierum potu. At de Intubis & Cichorio. Intubi quoque non extra remedia sunt. Succus eorum cum rosaceo & aceto capitis dolores lenit. Idem cum vino potus iocinoribus, & vesicæ, & epiphoris imponitur. Et mox: Cichorium refrigerat in cibo sumptum: & illitum, collectiones, succusque decocti ventrem soluit: roemori, & remibus, & stomacho prodest: Et paullo post. Quod quidem propter singularem salubritatem aliqui Chreston appellant, alii Pancration. Et siluestre genus, alii Hedyonoida vocant latioris folii. Stomachum dissolutum adstringit cocta, crudaque sistit aluum. Et dysentericis prodest, magis cum Lente Rupta & conuulsa vtroque genere inuantur. Item hus genitura valerudinis morbo cessuat. Ita Plinius qui & nomina & facultatem clarè distinguit.

Succus. Subanatum est olus, inquit Galenus, & maritima. amaram quidam nuncupant. Est autem sic-

Ex Plinio de Seride.

Syluestres Cardiacâ Herba.

Intubi.

Chreston.

Hedyonoida.

Chreston.

mo excessu. Porro domestica Seris magis etiam, quam agrestis refrigerat, sed & humiditatis multæ admistio siccitatem extinguit: verum vtraque adstringens qualitatibus est particeps. Et alio in loco. Cichoria & Seris cibarii generis sunt: nam apud nos rustici hæc edunt & cruda & cocta. Vtut etiam iis Erasistratus abundè in affectionum circa aluum curatione. Facultas horum oleum suffrigida est, & subamara, ac modicè adstringens. Et propter has facultates optima sunt pharmaca calidis temperaturis hepatis: nam præterquam quod moderatè refrigerant, robur etiam visceri addunt per adstringentem facultatem. Præterea committuntur osculorum venarum in sima visceris parte, ac eas quæ in gibba sunt, extergens. Neque verò frigiditas interperies magnopere lædunt, quemadmodum quæ frigidam humiditatem abique adstrictione aut amaritudine habent, facere solent.

Cichorii decoquitur herba & radix, apud Tragus, vino aut aqua, & calidum bibitur id decoctum, aduersus obstructions iecoris, lienis, sed in principio hydropis, & malo corporis habitu, [Græcis *κνέλια* dicitur] hoc remedio vti conuenit: ad eam valet aqua distillata, imprimis verò æstuantis stomacho, & ardentibus febribus, imbecillitate cordis utilis est. Folia Cichorii cærulei abcessibus, tumoribus & inflammationibus, nec non pudendorum pustulis imposita, dolorem mitigant; ardorem extinguunt, calidæ podagris commodissima. Verum aduersus iam commemoratas affectiones aqua distillata maioris est momenti, si ea in linteolis lineis excepta affectis partibus imponatur, maxime verò hoc pacto usurpata anthraci auxiliatur. Aquæ è floribus cæruleis distillata, inflammationibus & caliginis oculorum imposita, potenter remedium addert.

Coniunctim quoque de omni Seridis specie Matth. agit. Intybus, ait, & Cichorium selectissimum præbent medicamen immodicè calenti hepati, quocumque tandem modo usurpata, siue foliis recentibus crudisque aut coctis comestis, siue succo, aqua stillatitia, aut decocto hausto, siue, siccorum foliorum puluere assumpto: modicè enim refrigerant & adstringunt, robur & tonum iecinis conferuant, eiusque venulas obstructas expediunt, idque amaroris causa: totâ substantia hepati familiaria sunt, non tantum in calidis eius affectibus, verum etiam frigidis ex vino albo cum Petroselino, aliisque similibus calidis plantis diureticis decocta & pota: folia cocta ex aceto comesta gonorrhæam reprimunt. Decoctum Cichorii Ictericorum fædos colores delet bibitum: semen contrafactum, & vino haustum ante insultum febrilem, cum mitiorum reddit, & tandem percurat. Ego huius solius plantæ ex aqua decoctum egenis sæpè propinaui in febribus vtiliter: efficacius erit remedium, si Cichorii cum floribus sumas M.j & minutim concitum ex vini albi generosi lib. i. decoquantur ad medias, bibatur colamen manè calidum, quatuor aut quinque horarum ieiunio sequente: eodem modo diebus aliquot iteretur. Quibus natura calidius hepar, dolores capitis & catharros generat, vinum aquâ stillatitia diluant: radix eiusdem saccharo, condita, hepatis calorem temperat. Aqua Cichorei cum linteis imposita singulare creditur ad rhemata pestifera remedium. Foliorum eius cum oleo rosato & aceto rosaceo cephalicam appocatus lenit. Scabiam tollunt & eu-

Cibus.

Temper.

Viscerum obstructions.

Ardentibus.

Abcessus.

Tumores.

Anthracis.

tem emaculant, ex cōtufa Cichorii radice offu-
la cum aqua rosacea.

Cichorea appositā sedat Bayrus dolorem ca-
pitis, & astuaciones à Sole factas. Flores Cicho-
rii ad calculum destillari meminit Gesnerus. Ioā.
de Monte exper. commendat ad oculorum
calorem & ruborem aquam stillatitiam: de
qua vide plura cap. de Linaria lib. 29. Idem te-
statur radices coctas cum carne & eas certum
remedium esse contra omnes fibras. Radix Ci-
chorii silu. flore albo, si certo tempore effodia-
tur ab obsterribus peritis, creditur partum ac-
celerare subtrata parturientibus, vt scribit
Schvvenckfeldius. Plura de vitibus qui scire
volent, legat Matthiol. germ. & historiam Taber-
namontani.

INTYBVM SATIVVM TRIPLEX.

Intyb. sativ. latifolium.



Intyb. sativ. angustifolium.

Corn. Diosc. Intubum sativum lata folia ha-
Tom. II.

A Estiua
est plan-
ta, hiemis a-
pud nos haud
facile patiens,
radicibus fi-
brosis, lacte
pregnantibus:
sola per ter-
ram sparsa,
antequā cau-
lescat, longa,
lata, nonnun-
quam angu-
sta, Lactucæ
foliis similia,
in habitu sub-
inde crenata,
subamara, quæ
hortulanorū
māgonio cri-
spa aliquando
conspiciūtur,
& alba: *caulis*
cubitalis &
sesquicubita-
lis, lavis, stri-
atus, inanis,
multis ramis
brachiatus,
tortuosus, vul-
nere lac fun-
dit: *flores* ex
foliorū (quæ in
caule hederæ
sunt, mi-
nora) alis e-
micant caru-
lei, Cichoreæ
silvestris: *se-
men* quoque
cōsimile. Hu-
ius species
provenit no-
bis Italo se-
mine, folio
laciniato,
quod differt
à Cichorio
culto.

Intyb. sativ. crispum.



Scariolam inscribit, angustiora habere folia, &
subamaram esse tradit, ac diminutio à Seris no-
mine Scariolam dici testatur. Nos Fuchsi binas
admittimus icones, non enim diuersam ab Intu-
bo crispo statuimus, licet non parua, ratione cul-
turæ, in his reperiatur varietas. Sufficisset quidē
vna ex Fuchsiānis, sed quia iam erant sculpræ,
eas Lectorum oculis nobis subiicere placuit.

Exhibet eas quoque & Amatus, ac quidem sub
Seride silvestri, Intubum sativum latifolium pro-
ponit: sub Seride autem sativa, eiusdem Fuchsi
Intubum sativum angustifolium. Nomina autem
quæ Seridi suæ silvestri adscribit, ei non conue-
niunt, sed Cichorio, de qua re antè. Amatus au-
tem de suis Seridibus à se icone exhibitis loqui-
tur, quando ait. Domestica verò Endiua duplex
est, altera latifolia, hortis familiarissima, & quæ
terræ obruta, alba reddita, hibernis mensis, oxe-
læo & sale, cruda, & cocta anteponitur, quanquā
vniuersa Hispania, sic paratam eam nunquam,
quod sciam, viderit, quam aliqui Endiuiam, alii
verò Cichoriam vocant. Altera verò arctioribus
foliis Endiua, à Seri Seriola, pōst verò Scariola
nuncupata est. Cæterum ab Intybo, siue Intyba
corruptè Endiua deducta est.

Hæc est illa Cichorea sativa Tragi, Seris sati-
ua angustifolia Dioscoridis, quo nomine & In-
tybus vocari meruit, potestque fieri vt apud Theo-
phrast. lib. 7. cap. 7. & 9. Intyba & Porcellia vo-
cetur. Cordi in Dioscor. Intyb. sativ. ab I-
talis Endiua sativa vocatur. Cordi in hist.
(cui figura Tragi addita) Cichor. sativum ab Ita-
lis Endiua hortensis, seu simpliciter Endiua
nuncupata. Matthiol. in Dioscor. Intybus hor-
tensis. Et: Intybus hortensis alter. In cōm-
cum mag. fig. Lar. & It. Intubus maior, & Intubus
minor. *Endiua magiore* & *Endiua minore*. In-
tubus crispus. Et quoque tertium Intybi hortensis
genus, amplo, foliosoque cespite proveniens, fo-
lis magnis, sed vbiq; in ambitu crispis ac sinu-
briatis, caule cæteris maiore, crassiore, tenerio-

constare scri-
bit, ac Lactu-
cæ similiorem
facit, Intu-
būque sat.
latifol. siue
Endiuiam in
hist. & icon.
inscribit, quā
ait in omni-
bus pro vera
Endiua debe-
ri vsurpari of-
ficinis. Nam
quā hodie sub
hac voce vta-
tur non esse
verā Endiua,
sed Lactucam
silu., vt suo
dictum loco.
Alteram, quā
Intubum sati-
uum angusti-
folium, siue

reque, in acerariis expetitur reliqua cum ceteris paria sunt. In Hist. germ. Intubus sativus maior, seu Endiua, Enduien. 2. Intub. sativ. minor Garten Scariol/ vera sativa Scariola. 3. Endiua crispa, Große Frause Enduien.

Mathioli ponit [Fuchium imitatus] duas icones valde similes pro diuersis plantis, eiusdem estimarim, nec demonstrat, quia in re differat Intubus alter à Cichorio satiuo: cuius icon etiam similis: in comm. lat. & ital. cum mag. fig. pro Intybo siue Endiua minore ponit diuersam iconem: folia enim laciniata appingit, ea placet pro Cichorio.

Dod. gall. Intubum sativum latifolium, Cichorea domestica 1. Endiua aliorum, offic. Scariola. Intub. sat. angustifolium, Cich. sat. & hortense offic. Cichorea domestica. Lat. in fol. Intub. sativum, *seris prior*, *seris huius*: ab Avic. ac Serap. Taraxacon: ab Italis Scariola nuncupatur, quam appellationem pleræque O. hic. seruant, quæ & Scariolam ipsam quasi Seridem haud perperam vocitant, sed minus rectè Serriolam per duplex rram Scariola Lactuca silvestris est. Dodon. non amplius meminit Intybi sativi angustifolii, quod mirum.

Gefn. hort. Intybum (Endiua vulgo) italicum latifolium, quod ad acetaria hiemis terrâ obruitur: Cichorium latium.

Lob. in Adu. Seris, siue Intybum sativum latifolium, Endiua, & Scariola officinis. A Cichorio nō tantum cultus, sed etiam genericā differētia distat: nullo enim neglectu, transmutatione, aliōue incommodo visa fuit vquam in silvestrē aut Picrim Cichorium degenerasse, aut hæc ad speciem huius Seridis promouisse Et manifesta radicū differentia, est enim Cichorii bene habita, carnosa admodum, grata: Endiua verò fibrosa, penè nulla, nulliusque vsus in cibis, alicubi tamen in quibusdam compositionibus. Lob. Obs. & Icon. Plant. Intybum sativum latifolium, Endiua & Scariola. Omisssa hæc postrema vox est in Ic. Plantin.

Anguill. Seris hortenſis 2. Diosc. Endiua nostra [italica] alba.

Lonic. Scariola sativ. latifol. Intub. sat. latifol. Cichorea sat. latifolia.

Tabern. Icon. & Hist. Intybus maior, Groß Enduien. *seris, huius huius & huius huius*, Plinio & Latinis authoribus Intybum, Intubum, Intybus aut Intubus, Intybum sativum aut domesticum, Seris sativa & Cichorium domesticum, Herbariis Endiua, Endiua maior, End. sativa siue domestica Romana. Serap. & Arab. Dunbebe, Dumbebe Humbebe, Hundebe & Endela, Boh. Serbat / Polon. *Volertz & Melertz* in Candia Endui. 2. Intybus crispa, *Frause Enduien*/Endiua crispa: Belg. *L'hecolde Endiue*: crispitudine foliorum à præcedenti tantum differt. 3. Intybus minor, *lein Enduien*: cui nomina græca priori similia, hodie vocant *seris*, Serium & Seriola, Herb. Cichorium sat. minus, Seris minor, Endiua minor, intybum angustifolium, Endiuiola, practica Scariola, Neapoli dicitur *Scariola*: Hisp. *Seraya Enuida*. Primo similis nisi foliis esset longioribus & amarioribus. 4. Intybus minor flore albo, Scariola alba, & Scariola alba: à præcedenti solo flore albo differt. Monuimus antè plantam solo colore differentem non mereri propriam figuram.

Camer. ad Matth. germ. Endiua, Intybus sativus 2. Endiua crispa. Große Frause Enduien. In Epit. Intubus maior. Item: Intubus crispa: Camer. proponit tantum duas icones novas non tres vt faciebat Matth. quasi vna sit superflua.

Gerard. Anglo, Intubus sativa Garde Endiue. 2. Endiua crispa, Curled Endiue. Item: Intybum silu. wilde Endiue. 2. Intybum silu. latifol. Medowe Endiue. Gerardus omnia con- fundit.

Tabern. sativum facit silu. & minus album sat. silu. latifolium: Tabernamontani icones sunt plantarum solo colore differentium.

H. Lugd. Intubum sativum latifol. Item: Intub. sat. angustifolium Marthioli. Er: Intub. sat. angustifol. Dodonæi [hæc duo sunt vnum:] Item: Intubum crispum.

C. B. Phyt. Endiua 1. siue vulg. latifolia: Seris domestica latifol. Dioscoridis: Intubum & Seris hyberna Plinio quæ Theophr. *impre*: censetur: ac cuius etiam meminit Plinius lib. 21. cap. 15. floribus est cæruleis, raro candidis. Endiua 2. siue crispa. Endiua 3. siue angustifolia, floribus cæruleis, aliquando albis, cuius causa Tabern. duas habet figuras. Apud Marth. 1. Intubus maior. 2. Intubus minor. 3. Intub. crispa. Endiua siue Intybum sativum, cui antea quoque monuimus, propter solum & culturam maius & minus efficitur: crispa verò transplantatione & mangonio hortulanorum.

C. Schvenck. Cichoreum Italicum, Cichorea sativa.

Intubum sativum, à nonnullis Endiua, ab Italis Endiua & Scariola, quam appellationem pleræque officinæ seruant, dictum, à Græcis *seris* *seris* *seris* appellatur; à German. quibusdam Scariol, vulgò Enduien; Lonic. breyt oder groß wegwass oder wegwart; Belg. Endiue / Endiue; Gallic. Endiue ou Scariole, Hispan. Endiua, & vt Dodon. ait, *Serrayes* Angl. Endiue / *white Endiue* vel *garde Endiue*. Intybum crispum: Germ. *frant Enduien*, Belg. *L'hecolde Endiue* / Gall. *Endiue crespu*; It. *Endiua crespa*, Angl. *Curled Endiue*.

Serit Intybum in hortis, & quod Vere satum celeriter adoleſcit, ac ipsa æstate flores semina profert, ac deinde intercidit. Iulio verò satum in Hiemem restat, Septembri aut Octobri terrâ obrutum, colligatis prius foliis, niuis instar candidum redditur, ac deinde mensibus hybernīs mensis aliorum acetariorum loco inferitur. Id quod Plinius [ait Dod.] haud ignorasse videtur lib. 20. cap. 8. vbi Seridem duorum generum esse tradit: nigram æstiuam deteriorem; & hibernam candidiorem. Omnes Intybi siue Serides in Italia vulgaris sunt notitiæ. Lætiior multo exit, inquit Lobelius, è semine Italico, aut cuiuspiam regionis meridionalis, vnde solent ferere quidam Brabant, Angli, & Germani Olitorres: simul æterna, quaternæue foliola eruperunt, in solum pinguius latamine multo trāsmouetur, lateritioque frusto media onerantur folia, quò latius se porrigant luxurientque, quā industria amarorem exiit, gratiamque inquit cum hibernis mensis ad acetaria, seruatur obruta terrâ, fimeto, stramineque.

Hoc olus vt Hieme tota albis & carnosus foliis suis in acetaria veniat, sapore gratissimo, colere sit debet, authore Gefnero. Circa finem Iunii feret non admodum angustè: deinde cum ad duos palmos, seu digitos octo excreuit, tempeſtate sicca, euclles cautè ita vt manu radicem inferius, i. e. remotius à capite apprehendas, & simul corrupta folia si quæ sunt separabis, & rursus plantabis, ita vt vndiquaque duobus palmis minimū distent: & folia etiam p̄ncipio sui non-

nihil

Dod. mot.

Seris hortenſis.

Cichorea sativa Intybus maior.

Intybum

Endiuiola Romana.

Gerard. ro

prob.

H. Lugd.

Er: Intub.

Cichoreum Italicum.

Nomina linguarum

Satio.

Cultura, p̄ mangoniæ.

nihil in terram mergantur. Postea initio Hiemis, antequam nix ingruat, rursus euulsas plantas in cella vinaria seruabis, hoc modo. Soli aliquid spatium ad duos digitos terrâ recenti operies, huic plantas Intybi impones duabus aut tribus radicibus simul iunctis, donec spatium istud repleueris: tum rursus eas terrâ operies, & sic alternis. Aliqui in vili aliquo vase ligneo, cum tetra vti dictum est, alternis instrata, seruant in hypogeo. Galli & Itali in hortis terrâ obruere & seruare solent: sed apud nos in hortis & gelatur facili, & pluuvis deinde periret.

Basilæ primò vidi in horto præceptoris mei Cæli Secundi Curionis, tandem habui in horto Genevæ, vbi in transplantatum parim ferebat folia lata, partim dissecta, florèbatur Junio & Julio, non facile ferebat Hiemem, idèoque arenâ obruebam. Colmaria in Alsatia vrbis Medicus D. Iacob. Weckerus nô euellere è terra, sed inuoluebat stramina & circumaggerabat terrâ. Montbelgardi tardius ferunt, transplantant, ligant & Hieme in arenam reponunt.

Magis quàm agreste refrigerat.

CICHORIVM VERRUCOSVM, SIVE ZACINTHA Hieracii adnumerandum.



Femina magnitudine, in quibus semen copiosum, Lactuæ par, non ita cūpressum. Folia oblonga Dentis Leonis, laciniata, multa per terram sparguntur, in ramis pauca: radix longa, multis fibris donata.

De hoc Cichorio loquitur Matthiol. in post. comm. cum inag. sig. cum ait. Est & alia Cichoracei generis planta, quam quidam Zacintham vocauerunt, nobis autem ab effectu Cichorium verrucosum appellare licuit. Radice hæc nititur Rapunculi figurâ, subnigricanti colore, adnatis circumquaque capillaceis fibris. Folia habet Cichorei, verum paulò asperiora: caules cubitales & quandoque maiores, tenues asperiusculosque, in quorum summitatibus flores oriuntur aurei, cichoraceâ specie, quibus haec feculentibus semen remanet subnigrum, capituli instar, circumquaque secundum longitudinem secti, Melopeponis modo.

Lob. in Adu. Verruca Condrilla: de qua ait: Condrellam Cichoriumne illud siluestre, quod Zacynthum, vsque peregrinarem affectans, vocat Commentator, certum est oriri in Italia,

ne igitur è Zacyntho insula græca tam euocer. Cæterum, dum Lobelius hoc in loco Matthioli carpit, ipse ridendus reprehendūque videtur, vt cui non fuerit Zacantha Matthioli nota: perperam enim putat eandem cum Chondrilla priore Clusii, id quod in Obs. scriptum reliquit, dicens. Verrucaria Chondrilla, Chondrilla prior Diof. Clusii, Zacantha Matth. It. Cichoria verrucaria, & Mazza di caualiero, & Mazza ferrata, Angl. Gumme Succory.

Clus. Cichorium verrucatum, Zacantha, de qua ait. Zacantha Matthioli, seu Mazza di caualiero Italorum nihil commune habet cum Condrilla nostra priore, Diofcoridis legitima (Hedypnoide Monpessulana) vt quidam censent, Zacynthæ, siue Cichorii verrucati, iconi, quæ apud Matthiolum ineptè expressa est, facie decepti &c. Quæ res aded me cogit, vt Cichorei verrucarii legitimam iconem proponam, omisâ Matthioli falsâ.

Gamer. hort. Zacantha siue Verrucaria Matthioli, Cichorium verrucarium Gesneri:

C. Bauhin. Phyt. Chondrilla 8. siue verrucaria.

Cichorium verrucotum satum Montbelgardi anno 1581. prouenit. Hoc acceptum refert Calzolari Matth. qui plantam ad ipsum misit.

Mira huius plantæ facultas est ad tollendas verrucas. Siquidem scimus [inquit ex Calzolari Matthiol.] nos nonnullos, quorum manus verrucis admodum numerosis scæbant, sanatos esse, deuoratis in acetario semel tantum huius Cichoraceæ plantæ foliis. Idem præstat eius semen, tribus diebus drachmæ pondere deuoratum, dum se cubitum recipiunt verrucosi. Parū certum est, authore Lobelio, semel voratâ, quod ait Commentator, & multi de aliis plurimis fabulantur, delere verrucas: illita verò posse certū, & commune illi est cum quamplurimis, quarum succo exuruntur aut exsiccantur verrucarum radices & appendices, tum calidis vt Tithymalo, tū frigidis vt Plantagine, Equisetio, intermedis vt Heliotropiis, de quo nomen verrucarum testatur idem.

CICHORIVM SPINOSVM.



Cichorio spinosus folia indidem plura, ceu ex eodem puncto, alternatim oriuntur, Cichorei, angustiora, sinuata, virentia: caulis glaber in ramulos diuiditur rigidiusculos incoditos, multifariam diuicatos, in duras abeuntes spinas, Tragacathæ aut potius Aspalathi Mospeliensis imitatione: flores

ad ramorum diuicaciones, ipsorumque aded surculorum cacuminibus imposti, cerulei, denticulatis folijs constantes, duplò triplòque quàm

Repositio

Matth. 162
natur

Lob. reprob.

Cichorium
verrucosum.
Non est
Condrilla
prior Diof.
Clusio contra
Lob.
Matth. 162
falsa

Vires

Descriptio

Locos

Vires &
Virus
Verruca

Matth. 162

Synonyma
CichoriumZacantha.
Cichor.
VerrucariaVerruca
Chondrilla

Descriptio

Cichorei vulgaris, minores: cui semen simile: habemus Cichorium hoc tanta copiâ caulium pedaliū se diffundens, vt caput penē ambitu æquet.

Descriptio
Bell.

Locus

Caulis.

Flores

Semina

Chondrilla
spinosa
Cich. spinosum.

Locus.

Chicorium spinosum, ait Honor. Bellus, frutex est in maritimis proueniens, siccisque collibus, & arenosis locis: folia ferens Cichoracea, profundē diuisa, crassiora tamen & minora, magisque amara, quā Cichorei vulgaris: caules dodrantes, albos, in orbem diffusos, crebris albis spinis scatenos, erinaceum quemadmodum Echinopoda totā facie representans: flores inter spinas Cichorio similes profert, colore cyaneos: quibus succedunt semina Cichorei: radice firmatur singulari, magnā vt Cichorium. Recens semine natā, antē quā in caulem abeat, in acetariis manditur, sed durior & amarior est Cichorio. Vocatur vulgō *spinosa*, h.e. Hydria spina, quia vulgariter in tota Creta fictilibus hydriis vtuntur ad hauriendam aquam ē fontibus, quas hac herbā obturant, ne mures aliūdue animal intus penetrare possit, videtur enim ad hoc munus ista planta à natura formata: nam semper rotundā figurā cernitur. Hydria vulgō dicitur *spinosa* & *spinosa* spinam significat, nomine ab *spinosa* corrupto: quibusdam insulæ locis dicitur etiam *radichium* h. e. Radichium stuidam, ob similitudinem, quam cum Cichorio habet, quod in Græcia vulgariter *radichia* vocatur, & stæbe, quæ dicitur *stæbe*. Huius vltus in defectu Cichorei.

C. Bauh. phyt. Cichorium spinosum. Apud Matth. Chondrilla spinosa, Cich. spinosum D. Doldii. Ferd. Imper. Cicoria spinosa, Cichoreæ omnino similis, h. excipias caules spinosos: herba Cretica. Io. Pona. in Baldo, Cichorium spinosum Creticum Belli.

Semen in horto Ill. E. C. terræ commissi quod dederat Frater Neapoli ab Imperato Pharmacopæo missum. Gener. Io. Henric. Cherletus attulit Patauo, vbi colebant Cortusius & Bembus nomine Cichorii spinosi. Verū ea planta nondum protulerat flores, suaque habebat folia. Floret Iulio & Augusto, folia amara non lactescunt, & citō pereunt, etiam reliquis plantæ partibus eleganter virentibus.

HIERACIUM STELLATVM.

Descriptio



AD cubitalem altitudinem assurgit, tenuibus coliculis & ramosis, tantillā lanugine, ni si propter terram, vix hirtis, non sine foliis multis: folia primum erumpentis Hedypnoidis, & pingui solo palmari & plusquam selquipalmari longitudine, sextantali & quadrantali latitudine, nonnihil sinuo-

sa, hirtuta: flores simplices, parui, Lampsanæ, hirtæ: quibus succedunt *seminum* stellæ radiatæ hirtutæ, quæ postmodum falcis in modum incuruantur: tota planta lac manat.

Hieracium hoc stellarum mihi mittebatur aliquando per D. Doctorem Schuuarzium Stut. Synonymi gardiā pro Alstragalo Plinii.

A Lobelio in Obs. inscribitur Hieracium Narbonense siliquā falcatā. In Icon. Plant. Hierac. Narbon. falcatum. A Tabern. Icon. & Hist. Hierac. Monspeliacum & Narbonense, habet h. frans von Montpellier oder Languedoc: Hierac. 10. A Gerard. Anglo, Hierac. falcatum Lobelii, Lroos fod hantewede. A C. Bauh. phyt. & apud Matth. Hierac. 19. siliquā falcatā.

An Cæsalp. Ragadiolo similis, cuius semina stellam representant.

Abundat in loco pingui Monspeli ac circa Bononiam; Montbelgardi in horto E. C. Iunio, Iulio & Augusto.

Hieracii affinis Ragadiolus edulis.

Folii constat tenuioris Cicorii, sine lacte, & sine amaritudine: *stosculos* fert luteos in alis foliorum, & *semina* longa, & adunca: representantia autem pedes: ipsa herba dodrantis, humi procumbens, ramosa: floris foliola ex medio semine videntur erumpere; cum tamen ex summo oriatur: nam reliqua pars vagina potius est seminis.

Cæsalpino descriptionis auctori dicitur vulgō Ragadiolus, Ragadiolo in Pleturia, qui assumitur in cibis crudus, vt Cichorium.

Cichorio similis Spagnin Americarum.

In America insula Madagascari, siue S. Laurentii, auctore Theueto, prouenit cordialis herba, quā Spagnin vocat, similis Cichorio siluestri nostrati [Galliæ videlicet,] quam applicant vulneribus, & morsui viperarum, & aliorum animalium, venenatorum educit venenum.

SONCHVS MINVS LACINIOSA

mitior, siue minus Spinosa, & asperior siue spinosior,

CAP. III.



LACTE tota planta turgēt amaro, *caulis* inanis, cubitum altus & maior, hominē interdum altitudine excedens, ramosus: folia parum laciniata, tenera Endiuæ ferē, spinulis in ambitu donata, sed parū aut nihil pungentibus, caulī immediatē adnascuntur flores lutei, Hieracii, sed calyce

calyce glabro, qui celeriter in pappos abeunt, radia longiuscula, multis fibris donata: Huius similis parum aut minimam laciniata acutis & rigidius horrens spinulis.

Theophrastus Sonchum in genere nominat, eumque inter spinosa foliata numerat, in cuius caule cum ramulorum proventu vna hofculus quoque quidam emergat: peculiaris inter Acanthaceae: qui conceptus non spinosus.

Dioscorides postquam duo Sonchi genera facit, describitque: in huius capituli tertium addit. Vnum, inquit, siluestrius, magis aculeatum: alterum mollius, & delicatius, est ulcetur: caulibus angulosis, canis (xeris, quae dictio quidem in vulg. codicibus non legitur, sed eam habent vetusti codices & Orib.) Ergo non erit, ut aliqui putant, & Dioscorid. taxat reposita, Matthiol., aliquando subrubens: folia habet per intervalla in ambitu diuisa: eorum facultas refrigerandi, modice sub. itaque, si vide conferat stomacho aestuanti, & inflammationibus, & quae sequuntur: in fine autem addit: Alter Sonchus, qui & mollis, arborea specie constat, & lato folio: folia autem caulem cingunt: & huc quoque eadem praefert.

Sed & Plinius duo genera facit album & nigrum, Lactuca minor, ambrosia spinosa effens, caule bicubitali anguloso, intus cauo, sed qui fructus copioso lacte manat.

Galenus aut Sonchum postquam perfecte abfolutus sit, ex spinosis plantis esse.

Sonchi genera duo agnoscit Herbariorum pars maior, id quod ex iam dictis clarè demonstramus.

Quia autem Cornar, duo tantum Sonchi genera ex Dioscor. agnoscit, textum Dioscoridis ita legit: Sonchi duo genera sunt. Alterum agrestius & spinosius: alterum delicatius & quod editur, & quae sequuntur. At Sonchus delicatus ille arborem refert, quae lata folia habet: Priorem nostri Gesnerijstel (Carduum Anserinum dixeris) vocant: posteriorem hasenföl, id est, olus Leporinum. Quidam Palatium leporis, quod sub co lepus in ætu latebras quaerat. Sed quam bene ita legat, videant doctiores. Ego praeterea palatium Leporis exilimo dicendum non palatium, quia leporibus gratus cibus. Corn. etiam suo more Sonchum distinguit.

Cord. histor. Sonchus asper maior & Sonchus asper minor, caule pedali, foliis per ambitum maioris modo spinulis horrido. sapore amaro.

Mitor autem Tragus diligenter stirpium Germanicarum indagatore ita negligenter descripsit Sonchum ut difficile sit intelligere quid velit. Quae dicit de radice serpente non conveniunt Sonchus asperis dictis multis, quia eis non repunt: sed illi qui multis dicitur Hieracium: cui Soncho multa etiam conveniunt quae in postrema descriptione ponit. Sunt (inquit Fuch.) qui Lactucellam & Lacteronem appellant, à copioso lacte, quo caulis eius dissectus diffuit.

Fuchsius (quem sequitur Amatus, cuius figuram etiam exhibet) suo more non describit particulatim, nec distinguit Sonchi alterum genus siluestrius, aculeatus & nigrius, quod Sonchum asperum in Hist. & Iconibus inscribit, à Soncho non aspera: Icon quam proponit est Sonchi folio minus laciniato, quam etiam nos ex eo proponimus.

Dodon. gall. Sonchus siluestrior, aspera. Sonchi species i. Lactuca m. Lat. in fol. Sonchus asper: spinosior alter asperior ac silagrior cognomi-

natus. Item Sonchus, asperior marinus. Figura Dodonaei gallici est folio non laciniato fuchsi, cui non respondet descriptio. Latino est Sonchus asper, qualis Lobelius, non laciniatus.

Cesalp. Sonchus latiore folio ac minus fisso. Gesn. eat. pl. Sonchus silu. nigret, spinosior, xos 75a xob; wilder basen fäl / Seudistel. De coll. stirp. Sonchus agrestis marginibus foliorum aculeatis. Item Sonchi genus silu. procerum, luteis floribus, subdulce, foliis non dissectis, angulosis, totum laeve, sine aculeis. Item Sonchus pinguis caulibus & nervis rubicundis. Sonchum nigrum Gesneri potius repono sub non laciniato, quia mihi in Sonchorum genere spinosior & nigrior videtur non laciniatus.

Lob. Aduers. Sonchus aspera vulgi, flore Hieracii, foliis D. ntis Leonis: alias Diplaci & Lactuce, an Dioscoridis arborecens Sonchus tenerior latifolia, & non tam Lactuca & Italica nigrum vocant, & nulli spinam anserinam. Spinosa namque sunt omnes Sonchis, sed quaedam horridiuscula aculeis, quaedam perpusillis aut nullis ferè vititur. Quamvis duae frequentiores maiores sponte cultis & incultis segetibus & vinetis: minoribus obvia & nota. Aspera quae vocatur, caulem erigit quaternum & semum cubitorum: vni folia laciniata Dentis Leonis, alteri verò Lactuceae. Obs. Sonchus laevis tenerior latifolia. Icon. Pl. Sonchus aspera vulgi flore Hieracii foliis Dentis Leonis, alias Diplaci & Lactuce. Item Sonchus tenerior aculeis asperior aut horridiuscula. Icon. Pl. Sonchus laevis tenerior Icon proposita à Lob. in Obs. respondet Fuchsiæ à nebis propositae.

Hist. Lugd. Andryala maior Dal. Item Sonchus laevis latifolius Lobelii. Item, Sonchus asperior Lobelii. Non placet Hist. diuersis capitibus scribere de Andryala & de Soncho.

Andryala maior Dal. (inquit Casp. Bauh.) Icon Sonchi asperi Fuchsi, & Sonchus laevis latifolius Lobelii sunt idem.

Thal. Hircyn. Sonchus laevis maximus sesquicubitalis, foliis dodrantalibus, cretatis parum, sed non profundè dissectis, in ambitu spinosis, sinuatis.

Schauenckf. Sonchus asper, xos 75a xob; Carduus suillus, Cichorium porcinum. Endymia spinosa sed end. f. Seudistel.

Sonchus aspera folio non laciniato, spinosa valde: Genue Junio: Basilae quoque prouenit & Montpelii, flores Aprilis. Montbelg. frequens in Horto Ill. E. C. Wirtemberg. cum spinulis mollioribus, ac etiam hominem altitudine excedens loco humidiori, flores Iulio.

SONCHVS LACINIATVS NON SPINOSVS & spinosus.

PAnta, fibrosa, albâque radice nititur: caule cubitali & ampliore, intus concauo, purpurascens: folia longa, laeua, ferè glauca, Dentis Leonis diuisura, latiora, teneriora, lacte pragnantia, alternatim prodeunt, aliis pediculo longo, aliis nullo, sed latiore basi caulem amplectentia, in circuitu quasi dentata, in quibus vel nulle spinæ, vel molles: flores foliosi lutei, Dentis Leonis minores, quorum extrema folia aversa parte purpurascunt, & in pappos abeunt. Semen paruum oblongum, & in fusco rubens. Sonchus laciniata sæpe spinis horret ac multum variat, vel foliis amplioribus, spinis minus rigidis, vel minoribus.

Gesn. ref. latur

Spina anserina.

Lob. ref. Lob.

Andryala maior Dal.

Locus & tempus:

Descriptio

bus foliis, rigidioribus spinis.

Describit autem Cordus hac Soncho leni aut
Sed scriptio læui, Sonchum nostrum laciniatum non spinosum

Sonchus laciniatus non spinosus.



Sonchus laciniatus non spinosus



Sonchus laciniatus spinosus

Sonchus laciniatus spinosus

de eo quicquam, quod equidem legerim, memoriam prodiderunt Theophrastus, & Plinius. At idem in comm. cum mag. fig. lat. & Ital. Folia utraque Sonchus profert Cichorii modo laciniata in aspero culmine, & septingentia, si brabentia aq. In læui vero læuia, & spinis nullis rigetia. Huius duo habentur genera: quæ tantum foliis aliquatenus differunt, nempe eorum alterum læuioribus habetur foliis, minus quoque laciniatis, ac etiam magis extensis. 1. Sonchus aspera. 2. Sonchus læuis. Sonchus læuis altera. Hic opus haberet Matthiol. spongia maxima glossatorum & patrociniatium pro expungendis erroribus. Quam olim posuit pro Soncho aspero sine descriptione, ac in postremis retinet, est laciniatus Söchus minor non spinosus, cui tamen in postremis tribuit

folia aspera & pungentia. Quid proponat pro Soncho plano in primis com. & postremis pro læui altera asserere non aulin: Lectores considerent an intelligat Sonchum læuem Lob. de quo agemus sub Soncho Terracrepola. Quam proponit in postremis pro Soncho læui nescio, nili sit noster Sonchus radice reptatrice, de quo postea, quem etiam pro Hieracio maiore exhibere putamus. Matthiolus non sibi constat: nec distinguit bene suos Sonchos.

Lac. in Diosc. Sonchus asperus, Sonchus læuis: proponit duas similes icones, non possum animaduvertere qua in re differant, sunt autem Sonchi laciniati non spinosi.

Lonic. Sordisfel, Endiuiia filu. Item Chondrilla alia species Dioscoridis, quorundam sordisfel. Lonicerus nescit iuo more quid pingat, scribatque. Duas icones habet Sonchi laciniati: primo loco descriptio non respondet iconi, describit enim Lactucam filu.

Dodon. Gall. Sonchus tenerior non aspera. Söchus læuis prior, Brassica Leporina, Sonchus tenerior. In Hist. Gall. est icon Fuchsi folio laciniato spinoso, cui non respondet descriptio: In fol. Lat. Sonchus læuis figura qualis Lobelio, folio laciniato non spinoso.

Sonchus (inquit Cæsalp.) quæ vulgò Cicerbita vocatur & alicubi Ciculpinulus; Quædam in vineis frequens & in arvis locis cultis: Alia in rudibus nascitur: Quædam in collibus umbrosis & siluis nascitur. Quædam in montibus caule bicubitali.

Camer. ad Hist. Matth. germ. & Epit. eiusdem tres nouas icones proponit à Matthioli diuersas. Primæ titulus est in Hist. Sonchus aspera (Sonchus in Epit.) Alteri Sonchus læuis: Tertiæ Sonchus læuis altera. Harum prima, quæ melius placet, est foliis laciniatis, acceditque ad nostrâ laciniatam læuem, siue minus spinosam: quæ verò læuis inscribitur spinis pluribus scatur: tertia quæ sit, adhuc me latet. Hanc ait Camer. vulgò vocari Cicerbitam, & in Italia Crispinum & Crispinulam.

Gesl. cat. pl. Sonchus candidus tener & esculentus, sordisfel, quem Diosc. Cicerbitam à Romanis dici prodiderit, quod nomen adhuc hodie in Hetruria seruetur, ab Herbariis nonnullis Leporis palarium vocari, quod fortassis eadem Apulei Lactuca Leporina fuerit. Item Sonchi genus 3. tenerum, arborecens, à solo Dioscoride descriptum. Ipsi autem in hanc fol. latiore folio. De hort. Sonchus asper & læuis, Lactucæ quædam species siluestres.

Lob. in Adu. Sonchus læuis laciniatis foliis, Germ. hasen fôl: Belg. hasen latave nude. It. Cicerbita liscia. Oleracea tametsi esse potest, tamen quia non colitur non manditur. Obs. & Ic. pl. Sonchus læuis vulgaris foliis laciniatis, Dentis leonis.

Clus. Hist. post. Sonchus læuior vulgaris prima (est eadem cum Lobely icones) Sonchus læuior vulgaris secunda. Clusus has binas læuioris vulgarissimi Sonchi species non describit, sed eas in hunc finem tantum in illo capite rarioribus Sonchi generibus prætigat, ut hæc ab illis commodius ab inuicem fecerim & distingui possent.

Hist. Lugd. Andryala minor Dalechamp. Söchus Fuchsi. & Dodon. alter humilior, tenerior & spinis carens. Item Sonchus læuis laciniatis foliis

Lac.
not.

Lonic.
gnarus.

Dodon.
not.

Camer.
not.

Cicerbita.
Crispinus
Crispinula
Palarium
leporis.
Lact. leporina
apulei.

foliis, Lob. i. Sonchus Asper Matth. i. Sonchus laevis j. Sonchus laevis altera, Matth. 4. Quod anrè dixi iterum nunc dico, displicere historiam ponere Andryalam alio capite, quàm capite de Sonchis. Icon pro Andryala minori est Fuchii quæ non caret spinis, indicante ipsâ iconè: carent spinis Sonchus Lobelii laevis, & Matthioli asper, quas duas icones eiusdem plantæ existimo. Cur duas leues ex Matthiolo ponat nescio, cum sit tantum ea quam olim pro laui primo, & postremò pro laui altero pingit.

Tabern. Icon. & Hist. Sonchus asper. Cicerbita aspera, Gansdistel / Säuwdistel / wilder Hasenföl. Item Sonchus laevis latifolius, Breyter hasenföl. Sonchus laevis alter flore luteo, Geeler hasenföl. Sonchus laevis tertius flore niueo, Weisser hasenföl. Non displicent Icones tres Tabern. pro Soncho laciniato minus spinoso: foliis variè ludit hæc planta.

Fiater C. Bauh. pro Soncho aspera Matthioli, ponit iconem Tabern. folio laciniato spinoso, pro laui laeuem Tab. laciniatum.

Schwenckfeldius vt suprà Synonymis incedat, idem bis ponit, & quidem primò græcum, *σῶν χῶν ἰσχυρῶν*. Secundo Latinum, Sonchus esculentus. Et hæc ab inuicem more suo separant, tanquam diuersa sonent. Tautologiam committit, numquid doctè sentit?

Sonchum non spinosum laciniatum vidi Möspeli: vt & Baillex adhuc florentem Octobri, extra urbem inter portam Stein & Eschen. Geueus passim in hortis florens Nouembri. Montbeigardi passim spontè, etiam in Horto E. C. folio laciniato spinoso.

Sonchus in genere vocatur à quibusdam Cicerbita, & Lactucella, teste Cordo in Dioscor. Germ. *Semmelste & Hasenföl*. Brassica leporina, item *Säuwdistel / Gensdistel / Mosdistel*. Belg. *hasel latouwe / Gansendistel / Miedweye*. Gall. *Laiteron & Laiteron*, Palau de Lieure. Ital. *Lattucella, S. mho*, Cicerbita seu Crespine, Crispini & Latifoli Lob. hisp. *Corayas, Cerrayas, Cerralhas*. Cicerbita & Säuwdistel. Boh. *Miles, nüg*. Sonchus asper, *Bastid*, Sonchus laevis *Pie fef*. *Elj xg*. Græcis dicitur, sic & Lat. Sonchus, *ἀρότον χῶν*, id est, quoddam salubrem fundat succum. Cicerbitam à Romanis vocari, quod vocabulo etiam hodie strurtoria vitur, in quibusdam Dioscoridis exemplaribus legitur. Sed nomen id recens Dioscoridi attributum putat Ruellius, cum nusquam à Latinis usurpatum inueniatur. A Recentioribus etiam Lactucella, eademque fortasse quæ ab Apuleio Lactuca leporina nominatur, quod cum leporem animus deficit æstu hæc sibi solet mederi, Galli *Laiterons* à lactis copia nominant, & leporis palatum, *Palau au lieure*, quod hoc animal vt ab æstu vindicetur, & caloris propulset incommoda, solet sub ramis eius decumbere.

Hi Sonchi nascuntur in hortis, campis, & vineis, Aestateque florent.

Vtiusque vis refrigerat, inquit Dioscorides, modicè adstringit, æstuanti stomacho, & inflammationibus illi profunt. Succus eorum stomachi resolutiones sorbitione mitigat: lac elicit, in velere appositus scdis ac vulæ collectionibus opilatur. Tam herba quàm radix illita vibratis à scorpione ictibus subuenit.

Galenus de Sonchi viribus hæc scripfit. Sonchus ubi adoleuerit, ex spinosis plantis est. Cæterum viridis etiamnum & tener estur, perinde vt cætera olera siluestria: Temperamentum e-

ius quodammodò mistum est: Nam & adstrictionis cuiusdam est particeps, & siue cataplasmatis modo illinatur, siue edatur, apertè refrigerat: postea verò quàm planè refecatus fuerit, terrefre eius temperamentum redditur, modicam habens caliditatem. Quæ præterea Plinius scripserit scire operæ prærium est. Estur & Sonchus, vt quem Thefeo apud Callimachum apponat Hecale, vterque albus & niger, Lactucæ similes ambo, nisi spinosi essent, caule cubitali, anguloso, intus cauo, sed qui fractus copioso lacte manat. Albus cui est lactis nitor vilis orthopnoicis, Lactucarum modo (ex embammate addit Cornarius ex vetere Pliniano codice.) Erasistratus calculos per vrinam pelli eo monstrat, & oris graueolentiam commanducato corrigi. Succus triu n cyathorum mensura in vino albo, & oleo calefactus adiuvat partus, ita vt à partu ambulet grauidæ. Datur & in sorbitione. Ipse caulis decoctus facit Lactis abundantiam nutricibus, colorèque meliorem infantium: vilissimus iis quæ lac coire sibi sentiant. Instillatur auribus succus, calidusque in stranguria bibitur cyathi mensura, & in stomachi rationibus cum semine Cucumeris nucleisque pineis. Illinitur & sedis collectionibus. Bibitur contra serpentes scorpionisque, radix verò illinitur. Eadem decocta cum oleo in Punico Mali calyce, aurium morbis præsidium est. Hæc omnia ex albo. Cleomporus nigro prohibet vesici, vt morbos faciente, de albo consentiens. Agathocles etiam contra sanguinè tauri demonstrat succum eius. Refrigeratoriam tamen vim esse conuenit nigro, & hac causâ imponendum cum polenta. Sic enim Cornarius ex eodem vetere codice.

Soncho nostri vntur hyeme in acetariis, inquit Matthiolus, præsertimque eius radicibus, quæ cum teneræ sint & dulces, mensis expertuntur. Lacteus liquor è caule manans datur potadus [Lectores considerent quomodo liquor lacteus excipiendus & potadus, ægrè spirantibus, & asthmaticis. Idem auribus instillatus dolorem tollit, præsertim in malicorio cum oleo decoctus. Tam herba quàm succus ad æstuosas stomachi lincinationes & hepatis biliosas obstructions vilissima: obid Tertianis & putridis febribus conuenit. Sonchus laevis vulgaris non differt facultatibus. Ex vino stomachi fluxionibus medetur. Suspensiosus & Asthmaticos iuuat & stranguriam sanat. Succus auribus instillatus earum dolores mulcet.

SONCHVS REPENS MVLTIS HIERACIUM maius.

Sonchum repentem voco, quem multi Hieracium maius, cuius radices longè latèque repentes non nisi difficulter euelli possunt, perennes, lactifluz: caulis bicubitalis vel longior inferiore parte glaber, ibi demum pilosus, ubi inter ramulos diuidi occipit: folia & per tetram sparsa & quæ cauli adnascuntur, Sonchi laevis foliis similia, palmaria & plusquam bipalmaria non admodum lata, profundis laciniis incisa, spinis mollicellis donata, colore ferè glauco: flores quàm Sonchis reliquis paulò maiores, lutei, hirsuta foliorum atroreum compage coëcti, qui tandem in pappos abeunt. In iconè nostra Fuchiana radix repens deest.

An Cordo in Diosc. Hieracium maius, in tybi agrestis species, Germ. *wilde sendistel*:

ex Plinio

Album


Plin illu-
stratur.
Calculus
Succus
Partium
iunat
Lac generat
caulisStrangur-
iaIn acetari-
is

Stomachum

Obstructiones
biliosas.
Febre putrida.

Descriptio

*Hierac.
maius Fuch-
sii.*



*Matth. re-
preh.*

à Lat. quibusdam Sonchiten, Lampſucam, & Sichelzan.

Sed & Matth. in prioribus comm. figuram Fuchſii habet pro Hieracio maiore, ſine tamen deſcriptione. In poſt. lat. & It. item Hiſt. Germ. & Epit. [hic vox maius omiſſa] Cameratii, eadem figura eodem titulo ponitur.

An Lob. in Adu. Sonchi tertia ſpecies à Matthiolo picta? Idem in Obſ. & Icon. Plant. imaginem figuræ Fuchſii ſimilem habet, inſcriptione, Hieracii maioris.

Lacuna. nar.

Figuram quoque ferè eandem cum iconè Fuchſii habet Lonic. hoc titulo: *habichſſ fraut*, aur wilde ſanddiſſel. Græci, inquit, Hieracium maius h. e. Accipitrinam, Apuleius Lactucam ſiluari cam, Pharmac. Cichoream luteam, vocant.

Hiſtor. Lugd. Hieracium minus Dalech. maius Matthioli.

Sonchi noſtræ repentis ſub Hieracio maiore ſolam picturam ſine deſcriptione exhibet Lacuna.

Cluſſ. Pannon. Sonchus 3. Sonchus lævis altiffimus, cen & Hiſt. poſter. vbi Sonchus læuior Auſtriacus quintus altiffimus inſcribitur.

Tabern. Hiſt. & Ic. Sonchus 2. ſive lævis anguſtifolius; *ſonchenfraut*, *haſenſöl mit ſchmalen blättern*. Item: Sonchus arboreſcens, *Baum ſonchenfraut*.

Thalio Hieracium maius, ſive Sonchites.

Camer. hort. Hieracium latifolium Matthioli. An Camer. per hoc intelligat plantam quam demonſtrare videtur figurà Matthioli, dubito. Lectores perpendant. An Cæſalp. Hieracium magnum.

C. Bauh. Phyt. lib. 3. Sonchus luteus calyculo hiſtuto: Sonchus tertius, vel Sonchus lævis altiffimus, Cluſſio: Sonchus arboreſcens Tabern. Item poſtea Hieracium maius primum, Hieracium maius Fuchſii, Lobel. Obſ. & Icon. *nicht vna planta & non diuerſa*.

Schvv. Sonchus arboreſcens, *ὄξυς πικρὸς* Dioſcoridis, à vulgari magnitudine differens.

Sonchus repens, multis Hieracium maius, *le-
m. aut ruyne*, Germ. Groß habichſſ fraut: Gall. *Grande Cichorée raine*: Belg. *Groot hauide Fruyt* Dod. & *conyenfruyt* Tabern. Angl. *harſe weed* Lobel.

*Nomina
linguarum*

*Locus &
tempus*

Inuenitur Sonchus lævis altiffimus Cluſſi in paludotis ſilicetis & harundineris, iuxta piſci

Fuchſius. cum Hieracii maioris figuram ponat in Hiſtoria, itemque Iconibus ſine ſufficienti deſcriptione, iudicamus eius Hieracium idè cum noſtro Sòcho repente.

Picturam eandem, quam nos ex Fuchſio habemus, exhibet Dod. gall. pro Hieracio maiore, ſive primo, quod græcè vocari tradit *ὄξυς πικρὸς*.

nas, ſtagnantes aquas ſupra Badam Aufgiz vrbem, viâ quæ Napolim Auſtriæ ducit, & ſupra Tiebfſvinckel pagum, Floret Iulio. Sonchus repens, moleſta ſuo reptatu Montbelgardi in horro Ill. C. W. & in agris prope Audincourt ad Dubim abundat, & paſſim Libi. Genevæ quoque obſervatur, florens Iulio & Auguſto.

Cum porò hæc planta Sonchi ſit haud dubiè genus, iidem etiam facultatibus præditam eſſe verifimile eſt.

Facultates

SONCHIS AFFINIS TERRACREPOLA.

Radicem habet Intubo ſimilem, parum fibratam, candidam: caules multos, cubitales, foliatis: folia Intubo ſimilia ſunt, candidiora, minus infecta ac laciniata, ſucco lacteo manantia, guſtatu ſuauiſſima, licet nonnihil amara ſint: ſtos luteus in pappos euaneſcens.

Deſcriptio

H. Lugd. Crepis Dalechampi. *ἄρκυδιόφυλος* Crepis (inquit Hiſtor.) eſt Theophrasto, i. e. in caule

*Crepis
Dalechampi
p. 11.*

foliata, cuiusmodi cum ſit hæc planta, & eam ſeruato adhuc Crepidis nomine Crepallo vocent Itali, & Terracrepallo, Crepidem eſſe Theophrasti indicauit Dalechampius. Oſus ſilueſtre, in Hetruria, autore Cæſalpino, Terracrepolum vocatum, Dioſcorides Hieracium paruum appellat, Plinius & Theophrast. Crepidè vocant.

*Terracrep-
polus.
Hieraci
paruum.*

Nafeitur ſpontè in aggeribus terrenis agri Monſpelienſis, ſatu verò cultu in hortis noſtris (Lugdunenſibus) inquit Dalechâpius. Orii eam ſcribit Cæſalpinus in collibus ſaxolis & in ædificiis: florere tota æſtate: Hieme nequaquam perire: nam regerminare à latere. Vidi ego Auinioni, & Lutetia in horro cuiuſdam Monachi.

*Locus &
tempus*

Herba Terracrepulus in cibis cruda ex olco & aceto [vt ipſemet Auinioni vidi] expetitur, nam dulcis eſt & ſubſtringens.

Vires

CHONDRILE VETERIBVS.

C A P. IIII.

Aliqui, vt Dioſcorides tradit, Chondrilen Cichorion, & aliqui Serin vocant. Eius duo ſunt genera: Prior quidem folia & caulem, & flores Cichorii ſimilia habet: vnde & ſpeciem Seridis ſylueſtris eſſe ipſam quidam dixerunt: ſed in totum tenuior eſt. At circa ramulos ipſius reperitur gummi ſimile Maſtiche, magnitudine Fabæ. hoc cum Myrrha tritum, magnitudine Oliuæ in lincoo appoſitum, menſes ducit.

*Cichorium
Ser.*

Herba

herba ipsa una cum radice confusa, ammixto melle in pastillos efformatur, qui diluti nitro addito, vitiliginis deterunt. Gummi verò etiam pilos agglutinat. Sed & radix recens ad eadem facit, si in ipsam acus tingatur, & pilis admoveatur. Commoda est etiam ad viperas cum viro pota. Et succus ipsius aluum sistit, coctus cum vino & potus, aut per se ipsum. Est & alia Chondrilles species. Folium habet circumrosum, oblongum, per terram stratum. Caulum succo plenum. Radicem tenuem, acutam, leuem; rotundam, sublauiam, succo plenam. Vini habent concoquendi & folia & caulis. Succus autem pilos in palpebris agglutinat. Nascitur in terræ cultæ locis.

Chondrille
alia.

Vires

Plin. nat.

Condrilem speciem Seris esse, Galenus in Seris tractatione dixit: quam etiam, vt & Diosc. & Cichorion, & Serim vocari tradit.

Plinius utraque species inter se confundit, & quæ Diosc. duabus, ipse tanquam vi attribuit. Præter vires autem à Dioscoride recensitas quas etiam habet, tradit: Aliquos feminis & oculis, generationique virorum contrariam putasse. Inter vulgares in cibo herbas etiam Chondrillam recenseri. Chondrillam amaram esse, ac acri in radice succo.

Condrilla, iuxta Rob. Constantini mentem, est herba Cichorio similis, ob idque *χικωρίδιον*, & quidam vocantur: apud Gal. & Paulum *χικωρίδιον* scriptum, apud Diosc. *χικωρίδιον*, apud Plin. Cōdrillon siue Condrille, & alibi Condrilla, quæ melius scribitur per *α* monente Gesnero, qui suspicatur apud Theophr. pro Andryalia legendum Chondrilla. Hæc dicta fuit, *αὐτὴ τὴ χικωρίδιον*, quod est grumus, & *αὐτὴ* quod continere significat, quasi continens grumos, quos Masticha similes esse ait Dioscorides.

Chondrillacearum generis plantas plurimas passim, easque diuersas admodum specie reperi licet apud auctores, quæ vix quicquam facili & dextrè certis nominibus Thaliò teste, à se inuicem distinxerit: præsertim cum rei herbariæ Scriptores, Intybacearum ac Chondrillacearum [quorum tamen vbius ferè locorum ac terrarum ingens copia sese offert] historiam nondum accuratè examinariint: Solis enim aut nominibus proposuerunt: aut etiam foliis nudis, quæ descriptionibus delineant, non adhibitis iconibus: aut saltem appositis figuris & nominibus descriptiones earundem neglexerunt. Solo nomine proponit C. Bauh. Phyt. Chondrillam 16. siue spinosam. Hanc, inquit, integram cum nondum habeam, eam nominasse sufficiat. Nec dum scio quæ sit Chondrilla illa, *ein wild Endmien* art. Gesneri in cat. pl. Item Chōdrilla altera, *ein Gänßsugen* art, quas solum nominat.

Cæterum è diuersis diuersorum Auctorum Chondrillis, est nobis quædam, quam cæruleam inscribimus. Est & alia lutea cognominata. Sed & Chondrillam vimineam à iam dictis diuersam statuimus. Occurrit præterea Chondrillis affinis quædam laciniosa, an Trinciatella Cameratii; Chondrilla adhuc quædam existit hirsuta rubente flore. Sed & Chondrilla Creticæ nomine quædam nobis missa est semine crispo, de quibus nunc ordine dicam. His subiungimus Chondrillas quasdam ex Thaliò, quas ex foliis nudisque descriptionibus, non adhibitis iconibus discernere admodum est operosum. Tragus in super lib. 1. cap. 91. duas tradit Cichoreæ luteæ species, tertiam & quartam, quas Chōdrillas luteæ Dioscoridis facit: Nos Hieracium minus

Tom. II.

hirsutum. Chondrilla Thaliò *χικωρίδιον* duplex, maior & minor, ac rursus alia species cui folia magis in lacinias diuisa existunt, An Hieracium 1. Dod. minus, & longius radicatum Lobelii; Galenus, inquit Anguillata, meminit cuiusdam Chondrillæ de qua non locutus Dioscorides, quæ nihil aliud est, quàm planta quibuldā dicta Taraxacon, Hedypnois nostra, siue Dens leonis, Chondrilla altera Dod. Thaliò. Chondrilla prior Clusio plurimum accedere videtur ad primam Dioscoridis Chondrillæ speciem. Est hæc nobis Hedypnois Monpess. Chondrilla secunda Dioscoridis Rauuolfii, est nobis Conyza marina. Chondrilla alterius Dioscoridis genus aliud eiusdē Rauuolfii, est Conyza maritima affinis. Chondrillam alteram Dioscoridis Fabii Columnæ, exhibemus pro Cichorio bulboso. Chondrilla Galeni, si Trago non sit contradicendum, est *βελαιόρυχα* Dioscoridis, Lactuca siluestris Fuchii. Chondrilla alteram speciem Dioscoridis, *σαυδιστιελ* Loniceri 1. cap. 74. (qui eandem antea posuerat pro Endiuia siluestris) diximus ante Sonchum non asperam. Quidam curiosi apud Monardem volunt Tragopogonem Hispanicum siue Scorzoneram, Chondrillæ esse speciem, cuius mentionem facit Dioscorides, verum multum differunt. Chondrillæ nomen sibi vendicat Cichorium verrucosum: Item Cyanus, Caranance quorundam, & Cyanus folio Ceterach quorundam. Est tandem Chondrilla à nobis inuenta folio non dissecto.

Hedypnois
siue Dens
Leonis

Hedypnois
Monpessu-
lana

Conyza
maritima

Conyza
maritima af-
finis

Cichorium
bulbosum,
Lactuca,
silu.

Sonchus
non aspera

Scorzonera

Cichor.
verrucosum

Cyanus,
Caranance

CHONDRILLE VEL CHONDRILLA cærulea.



Chōdrilla cærulea caulibus erigit cubitales, teretes, leues, fungosâ medullâ repletos, ramis factis frequentibus brachiatis; folia priora palmaria aut dodrantalia, lacinias ad Cichoreum accedentia, glabra, & pene glauca, superiora autè profundioribus lacinias incisa, leuius

Descriptio

etiam aliàs dissecta, glabra: in summis ramorum flores crebri, radiati, cærulei, ex calyce lógo squamato, in quo semen nigrum longum latum: radice perennis simplex, longa, digitali crassitudine, paucis fibris donata, foris tenui & nigro cortice vestita: intus candida, carnosâ, tenera, & admodum fragilis. Tota herba lacteo turget liquore, & gustu dulcis est.

Chondrillam nostram cæruleam Cordus in hist. inscribit Chondrillam teneram.

Marthiol. in suis comm. Chondrilla 1. & Chōdrilla 2. De prima ait. Siluestris (veri, in comm. Ital. cum mag. fig.) Cichorii species Chondrilla est: gracilioribus tamen foliis, caule, floribus, ac

R. rrr

semine. Frequentissima hæc non modò in Herbaria: & secus vias virefcere, ac suo tempore florescere conspicitur: nec minùs etiàm quàm Cichorium in acetariis recipitur, quamvis amarior sit. Vifitur & alterum genus (air de secunda) huic [primæ] non longè diffimile, foliis tamen non ita in ambitum laciniatis, nec aded in mucronem desinentibus. Hæc à la-

Lactuca

Intybus.
Lactuca

dis vbertate, quo in omni parte, præsertimque radice redundat, à nostris vulgò Lactaiula vocatur. Rura eam suis acetariis pro Cichorio indifferenter admiscunt. Gall. simpl. Chondrilla Intybi speciem: libro autem 2. alim. nec Intybo nec Cichorio, sed Lactucæ similem fecit. *Vitam* Glossatores & Patrocinantes Matthiolo ac eius Simiaz lucem aliquam attulissent, vel errores Matthioli detexissent, si potuerunt intelligere aut animaduertere, ipse nunc lubens tacerem: nec veritatem detegendo odium mihi crearem fautorum Matthioli: ut dicam quod sentio, Matthiolum suo more de incognitis suo nomine scripsisse mihi persuadeo. Figura quam exhibet in com. citatis Lat. & Ital. pro Chondrilla 1. Cichorium planè demonstrat siluestre, sicut & ipsa descriptio: [ex Cichorio fortè elicta planta quales plures habet] quod idem putauit cum Chondrilla: In hist. vero Germ. longè aliam exhibuit iconem quæ Hieracium representat. Quod 2. figuram attinet ea vbiq; similis. Verùm descriptio multùm variat, incomm. tum Lat. tum Ital. dicit folia non ita laciniata nec in ambitum desinentia, quæ verba non conueniunt iconi propositæ: meliùs respondet descriptio Germ. Falsum quod dicit ex Diosc. Chondrillam esse speciem Cichorii, ita enim ait Diosc. *αἰὲρ αὐτῆς τῆς ἑστῆς ἀπὸ τῆς αἰτίας αὐτῆς*.

ad alib. er-
ror.Cacciale-
pore
Carn. no.

Camer. hort. Chondrilla purpureo flore, radice crassa, nascens in montanis locis. Miskia siue Hermundurorum propè vrbes metallicas. Item: Chondrilla flore caruleo, Italis Caccialepore cognominata. Quæ autem sit Chondrilla purpurea Camerarii à stirpium studiosis auide scire desideramus, per caruleam existimamus Camerarium intelligere eandem quam nos de qua hoc capite agimus, quamvis apud Matthiolum in Hist. Germ. eiusdemque Epitome nullam proponat iconem hanc referentem. Chondrilla eius prior est Matthioli referens Hieracium. Chondrilla alterius nomine exhibita icon, iconem Matthioli non representat, cuius autem sit plantæ nondum mihi constat.

An Lohic. malam figuram exhibenti, Chondrilla, quam Enduiz speciem dicit? An Anguill. Epit. Chor. dilla Patavii Caccialepore dicta?

Dod. gall. Condrilla, Condrilla species 1. Condrollon & Condrollis Plinii, Cichorium & Seris nonnullorum. Modernorum Condrilla maior. Lat. in fol. Chondrilla altera. Cast. Dur. Condrilla etiam Italis & Terracrepolo, Arab. Candarel, flore modò caruleo, modò albo: Condrilla prima. Item, Condrilla altera.

Venerat.
Plant.
Terrace-
pelo.

Lob. & Pena Adv. Belgarum Condrilla carulea, Cichorium illud aut Erucæ silv. d. u. fura. In Tabell. Condilla Belg. Terracon Offic. Obs. Chondrilla carulea. Ic. Pl. Condrilla carulea Belgarum.

Casalp. Condrilla in asperis saxosis nascens Lactucæ siluestri maximè similis, floribus caruleis, qui color in nullo alio genere siluestrium adhuc visus: Condrilla à Dioscoride primo loco descripta, Chandras Theophrasti, Chandasia

Theodori.

H. Lugd. Chondrilla 1. Matth. Chondrilla 2. Matthioli, an Chondrilla rara Lobeli? Proponit Historia iconem Matthioli Cichorio similem, & alteram valde lacinosam: nullam lucem adfert, sed ineptè inquit an Chondrilla rara Lobeli, quæ planta plurimùm differt, nec eius generis dici potest.

H. Lugd. rei.
prob.

Tab. icon. & hist. Chondrilla carulea 2. Chondrilla latifolia carulea. Alba solo colore albo differt à carulea. Latifolia differt magnitudine radicis & caulium, & quòd folia latiora, non ita profundè ad neruum vsque incisa. Chondrilla dicitur Serap. l. simpl. c. 43. Candarel, Amiron, & alibi Cadaron. Non erat opus iconè albæ si tantùm colore differt, ut ait Tabern. suspicor non diuersam speciem latifoliam, quia non annotat vbi obseruare, fortè lufus tantùm naturæ.

Tab. non

Casp. Bauh. Apud Matthiolum pro secunda ponit latifoliam caruleam Tabern. quæ in Phyt. est 3. Quam cur subsituat Matthioline secunde ignore, ei enim similior, si non eadem Chondrilla carulea prior Tabern. Quæ etiam occasio ut secundam chondrillam Matthioli dicat latifoliam non video, cum folia sint in iconè Matth. tenuius laciniata, quàm in prima.

C. B. muc.

Chondrilla vel Chondrilla, *χονδρίλλα*: Germ. Flein sonnenwibel/aliquibus steinwibel, cord. Blaw Condrollen frant. Tab. Gall. Lerreron; Hispan. Lerrugas & Lechugas & Lierugas & Liechugas dentro los planos, Lob. Ital. Terracrepolo, Condrilla, Matth. Boh. Focy Lecet.

Chondrillam caruleam primùm reperi in monte prope Tubingam prouenientem cum essem apud Fuchsum qui tunc Chondrillam mihi nominavit. Vidi copiosè Bisantii passim in muris. Ex semine Bizantio alato prouenit Montbelgardii in orto E. C. florens & semen proferens Iulio. Eodem anno quo fata. Prouenit in colliculis vbi terra argillosa propè Basileam. Nascitur & alibi edicis apricisque vineis & montibus, solum amas albicans, pingue & calcaria lapidi mixtum: ut annotat Cordus.

Nomina
linguarum

CHONDRILLA LVTEA.

Descriptio



Lactuco fusc. Leo abundans, in laui & glabro caule folia habet, ad Sonchum latex uem accedentia, multò minor, diuisurà ferè Condryllæ caruleæ, extremit laciniæ pallis alis librantem se in ære circumam expri-munt, per leg-mentorū au-bitum den-ticulata, quod notatu dignū, hacque notā

non florens facit à Chondrilla carulea differenti-

tur: ex horum sinu ramuli exeunt, quorum singulis flus vnicus insidet, Sonchi, luteus, in pappo euanescens.

Condrilla
Coronopi
tenuifolia
lutea.
Condrilla
2. Diofco.
Matth. m.

Lob. in Adu. Condrilla Coronopi aut Cyani tenuifolia lutea vinearum, quam nonnulli alteram Condrillam Diofcoridis esse putarunt, nec sanè ita abfimilis? Ego cum Monipeli effem anno 1562. Condrillæ, vel Sonchi speciem feci, ac quidem per plures annos mihi perfuasi esse Chodrillam Matthioli secundam, quia in Hist. Germ. scribit eam flore luteo conspici: verum pauca fides habenda figuris & descriptionibus Matthioli. An Thaliæ Condrilla altera Matthioli in tennes lacinias profundè dissecta, floribus luteis, duarum specierum maior & minor? Hæreo vti dictum, quid Matthiol. pingat pro Chodrilla altera, mutauit figuram & aliam reposuit.

Locus & Tempus. Monipeli floret mense Februario & Martio in muris nata. Spontè tota Æstate calidiorum regionum vineis & oliuetis glareosis passim obuiam esse scribit Lobelius.

CHONDRYLLA VIMINEA.



PUllulant primum per terram in orbem spatula folia magna, Hedyppoidis lacinias, glabra, quæ in caulem surgente planta marcescunt: ipse verò caulis propter terræ densis spinulis totus horret, atque ad cubitos duos aut tres assurgit, frequentibus ramis vimineis variè diuaticatis fruticosis, foliis aut nullis aut raris, iisque gramineæ tenuitatis: flores extremis ramulis hærent lutei, Lactuceæ pares, nec formâ dissimili, semine succedente iudem Lactuceæ pari, verum non compresso, sed rotundo ferè, striato, oblongo, cinereo, cum tomento villoso appenso. Radix subest simplex, pollicaris & crassior, glutinosissimo lacteo succo abundè prægnans, cubiti aut sesquicubiti longitudine, non ingrata dulcedine prædita. Totam plantam amaro esse gustu tradit Columna, eam fusè describens.

De Chondrilla vimineæ Cæsalpinū loqui crediderim, cum, inquit, ad Condrillas reduci potest quædam in collibus & vineis, & aliquando in ædificiis vetustis frequens: radice valdè succosa, & acti: foliis ab radice Cichorii tenuioris, hirsutis: caule recto, cubitali, propè radicem aspero, superne læui: ramulos fert rectos: in quibus foliola tenuia, non incisâ, quasi Poligoni: flosculos pallidos non in summo, sed à lateribus, qui euanescunt in pappo: in huius ramis aliquando videntur tuberculi nigri, ex concreto lacte geniti.

An Cordo in Diofcor. Chondrilla altera, G. scydæfæ: An eidem in Hist. Ixopus intybacea Tom. II.

Ande hæc
loquitur
Cæsalpi-
nus?

An Ixopus
Cordo.

herba quam ibidem describit, propè seham plurimam prouenire tradens.

Ad eius historiam à Cordo traditam adscribit Isopi Gesnerus nomen à liquore, quem Græci opon vocant, quem Ixi, i.e. visci instar, viscosum habet, confingere: se similem herbam in solo argilloso ad pedem montis vidisse, foliis ferè Plantaginis minoris: radice, cum arida sudicitur, Iuniperum ferè olente.

Trago Cichorea quinta & maxima siue proceræ, καὶ ἐλάκη Diofcoridis. Lob. & Pena Adu. & Ic. Plant. Condrilla viminea viscosa vinearum. Clus. hisp. Condrilla 2. siue viminea. Hist. post. Condrilla 2. siue viminialis, Codrilla viminialis virgis, Condrillæ genus alterum vimineum, Iunquerina Salmaticensis vocatum, aliis Atuniera. H. Lugd. Condrilla viminea viscosa Penæ. Tab. Ic. & Hist. Chondrilla iuncea, viminea, aruensis, Bica condrißen / Alter condrißen. An eidem in H. Condrilla lutea quinta sine iconè? C. Bauh. Phyt. Chondrilla 1. siue iuncea, viscosa, aruensis: prima Diofco. Fab. Columnæ Codrilla, Chondrilla 1. Diofcoridis: nam tota viscosa, atque albo succo est repleta, & si quamlibet partem sectas, radicem, folia, caulem, ramos, flores etiam, ex rima vi orta lacteus succus exit, qui concrefcit paulò post Mastiches duritie, & colore, (imò & odore, quod mirum, nec vllis aliis Condrillis euenit:) sed postea longo tempore nigrescit.

Circa Monipelium prouenit florens Æstate & Autumno. Basileæ apud Rhenum quæ itur Crenas florentem vidi Maio, & Octobri in agris ad portam D. Ioannis. Brisaci copiosè floret, & semen maturat Octobri & Nouembri. Prouenientem plurimam, ac Iunio & Iulio florentem vidi cis pontem Castru noui Monipeli. Cõspexit nascetum Clus. Salmaticensi non modò agro, post menses in aruis, & ad eorum margines, sed plurimis aliis regionibus: copiosè per vniuersam Pannoniam, & variis Germaniæ locis.

Locus & tempus.

CHONDRILLIS AFFINIS QVÆDAM lacinia an Trinciarella?



CHodrillis vel Hieraciis affinis, cui è radice crassa longa prodeunt aliquot capita, ex quibus multa folia vncias duas, longa, lacinia, quorū pars extrema subrotunda, leuia, & satis crassa, spissaue caules iuncea, ramosi, cubitales, interdū multò minores: in eorum extremitatibus flores singulares maiusculi, lutei, in pappo definentes: hæc herba lactescit sine amaro.

Descriptione.

An Camer horti, Trinciarella, quo nomine ex Italia accepit?

C. Bauh. Phyt. Denti leonis similis Trinciarella Camerarii. Item Sonchus 6. laevis angustifolius Lob. laevis Matth. De Sonchis consule scriptis Matthioli, maximè verò de laeui.

Nostram obseruauimus Monspelii & eius speciem minorem propè Gigam florentem Aprili. Trinciarella Camerarii eo ipso quo feritur anno flores & semen producit, & si per hyemem in fictili seruetur etiam in plures annos perdurat: alioquin radices, quæ dulces quoque sunt, vt vniuersa planta, primo frigore laeduntur & intereunt.

CHONDRILLA HIRSVTA.
rubente flore.

Descriptio



Plures ex eadem radice, simplice, alba, dura, fibris donata, lac fundente, caules attolluntur pedales & cubitales, folioli, lactiflui, tenues, striati, singularibus foliis donati: quorum singulis singuli insident flores monocloni, colore ex albo purpurascente, dense

foliis per extremam oram crenatis stipati, ex calyce thorulis hirsutis canaliculato, cui ad basin haud secus atque in Hedypnoide prominula apposita folia, eaque glabra: ea porò florum subinde est præmatura fecunditas, vt vix semuncialem longitudinem assecuti caulium rudimentis, iam cum capitula florum præludia innascentur: folia vel à radice statim vel ab imo caule per terram sparguntur, [nam in caule reliquo rariora sunt] Hedypnoidis laciniis, quibus magnitudinis tamen cedunt, vtrinque hirsuta, odore graui: succedunt semina longa, tenuia, cum pappo.

C. Bauh. phyt. Chondrilla purpurea festida. Chondrilla 6. Chondrilla hirsuta rubente flore apud fratrem Io. Bauhinum visa: An Chondrilla tota hirsuta Camer. de hortis: Huius & alteta species duplò ferè maior, caule ramoso, folio latiore, flore eodem. Dux sunt in Phytopinace eundem plantæ descriptiones.

Variis in locis vidi: in horto verò E. C. W. fata Aprili floruit Iulio & Augusto mensibus, annua est planta, Frater C. Bauhinus obseruauit Basileæ in horto D. Zvingeri.

CHONDRILLÆ CRETICÆ
nomine missa femine crispo.

Radix Denti leonis: caules spinulis horridi, variè nulloque ordine in alas diuisi: Folia

lactuca sylvestris: Flores Sonchi. Semen pulchrum, incuruum, ex ceruice denticulata in rostellum pulchrum desinens, per maturitatem rufum.

An camer. hort. Hieracium Creticum, pro Endivia lutea missum, femine curuo, aspero, vnguium modo. An Gesn. hort. Hieracium maius Creticum satiuum Patauio missum? An Casp.

Bauh. Phyt. Hieracium 10. Intubaceum flore magno albedo?

Breuis zui planta ante hyemem, imò antè Autumnum etiam, perit: floret Iunio & Iulio: Semen iisdem mensibus maturat in horto Montbelgardi. Monspelii florentem obseruauit O. Klotzi.



Chondrilla foliis hirsutis, flore unico magno, luteo.

Chondrilla hæc species est foliis sesquiunquam latis, longioribusque, in terræ superficie ad radicis summum dispersis, hirsutis, in ambitu laciniatis, caule cubitali, amplioreque, tereti, striato, recto, florem vnicum proferente, magnum, luteum, in alabastrino velut calyce detentum.

Descriptio

Chondrilla radice candidulâ, floribus luteis parvis.

Chondrilla species radice candidulâ, exigua, parum fibratâ: folia priora circa radicem dispersa, tria, quatuorve, oblonga, ex tenui pediculo protensa, integra, non dissecta, paucis ac exiguis quasi spinulis in ambitu prædita: quibus superadduntur mox alia tria, quatuor, quinæve, longiora, in laciniis [quæ tamen maiore intervallo à se inuicem dirimuntur, atque in altera Matthioli specie,] diuisa, hæcque rursus consimilia alia, sed breuiora, pauciora & aliquantulum tenuiora per caulem [qui obliquè distortetur ac teres quidem est, sed euidenter striatus, cubitalis ferè] consequuntur: flores huic sunt lutei, parui. Reperitur in locis pratensibus montium.

Descriptio

Chondrilla maior & minor, flore Tragopogonis luteo.

Chondrillarum generis species quædam maior, caule procerò, striato, bicubitali, qui in summo in aliquot brachia diuiditur, quorum quodlibet florem singularem profert luteum Tragopogonis floris instar. Folia caulis exerit pauca, longo intervallo se consequentia, longa, lata: quorum inferiora in ambitu parum subinde excinduntur, superiora verò profundius circumroduntur, infrequentius tamen id quàm in Chondrilla secunda Dodonæi accidit. Huius reperitur & alia species

Descriptio

species flore confamili, caule item, sed foliis deftituto: ea verò pauciora numero humi recumbunt, quorum prima lata quidem aliquantulum sunt, sed subrotundiora, reliqua longiora conspiciuntur, ac in ambitu circumrofa, sed non profundè, nec admodum crebrò.

Minor alia
Huius generis & minor reperitur species, radice parua, lignosa, fibris paucis constare: caule unico, recto, cubitali, ac aliquantulum proceriori, tereti, tenui, laui, foliis carente, quæ solummodò humi reclinantur, numero sex, septem, octo, nouem, decem, pauloque plura, quandoque quadrantalibus, in ambitu circumrofa modicè. *Florè* itidem hæc Tragopogonis æmulum profert & vnicum.

Chondrilla caule hispido, nodis multis prædita.

Descriptio Chondrillæ alia species, paulò ab hinc iam distet minoris (huius scilicet generis) speciei fermè æmula: radice parua, fibratà, nigricante: caule crasso, striato, parum hispido, nodis multis prædita, ex quibus emergunt folia oblongiora, viridiora, circumrofa aliquantulum, scabra, hirsuto dorso prædita.

Chondrilla caule cubitali aspero, floribus pappaceis.

Descriptio Chondrillæ species caule cubitali, aspero, striato: foliis quadrantalibus longitudine, humi sparsis, quaternis, quinis, senis, septenisque, in ambitu circumrofis modicè: iis verò, quæ caulem conscendunt, excisis, ita vt in ambitu euidenter lacinia inde relinquantur: floribus paruis, pappaceis, agminatim in summo caulis constitutis, quorum singulis peculiari petiolo innititur.

Chondrilla minor foliis in dorso rubentibus.

Descriptio Chondrillæ cuiusdam minoris species, radice singulari, quandoque & bifidà, mediocriter crassà, digiti parui longitudine, fibratà, nigra: folia exent parua, leuia, carnosa, oblongiuscula, inter græ, recurua, angusta, in dorso rubentia, numero quaternis, quinis, senis, septenis, octonis etiam quadoque. Colicolum producit incuruum, rubicundum, digiti minoris longitudine, vnico donatum flore luteo, Tragopogonis fermè æliquis modo. In pratis pinguioribus nascitur.

Chondrilla parua, flore singulari, caule foliis prorsus deftituto.

Descriptio Chondrillæ parue species, radice parua, fibratà, ex nigro subrubente: foliis quadrantalibus longitudine, humi procumbentibus, asperis, mediocriter latis, viridibus, confractis facilibus, senis vel septenis, nonnunquam octonis: caule palmari, pauloque longiore, tenui, tereti, aspero, modicè cacumen recurante, foliis prorsus deftituto: flore singulari, simili Chondrillæ Dodonæi alterius.

Chondrilla foliis in ambitu quasi spinosulis.

Descriptio Chondrillæ alterius alia species, radice candida, lignosa, inutili: caule cubitali, minorèque vt plurimum, tenui, striato: foliis donato paucis, viridibus, oblongiusculis, mollibus, integris, in ambitu quasi spinosulis, flore luteo. In Stolbergensibus apricis montibus.

HIERACIA VETERVM.

CAP. V.

Hieracii, vel Hieraciæ form. gen. vt apud Aetium & Homerum legitur (referente hermol.) magni & parui meminit Dioscor. his verbis. Hieracium magnum caulem producit asperum, subrubrum, spinosum, cauum: folia habet ex interuallis rariùs fissà, Sôcho per ambitum similia: flores melinos in oblongis capitibus. Vim habet refrigerantem modicè adstringentem. Quare stomacho æstuant, & inflammationibus commodè imponitur. At succus si sorbeat, stomachi rosiones mitigat. Herba ipsa cum radice imposita, à Scorpioneictis auxiliatur. Hieracium paruum folia etiam ipsum ex interuallis fissà per ambitum habet: caules producit teneros ac virides, in quibus flores melini circulum absoluentes. Vim habet & ipsum eandem cum prædicto. Plinius lib. 20. cap. 7. de Lactucæ spontè nascens generibus agens. Ex his, inquit, rotunda folia & breuia habentem, sunt qui hieraciam vocet quoniam accipitres scalpendo eam, succoque oculis tingendo, obsecuitatem quam sentire discentiant. Est igitur ex Lactucæ generibus hieracium.

Galenus in simpl. censu id præterit, velut sub Lactucâ comprehensum. Ita etiam Aëtius & Paulus.

Terapies Dioscoridi (inquit C. Bauh. Phyt.) Accipitina, ab accipitæ qui *ἰεραξ* nomen habet, cognominatur. Dicitur & *συχίτης*. hieracium quidem ab accipitæ nomen habere testatur Turnerus, sed propterea fortè quod pappi eius viles sint ad vomitum accipitribus ciendum.

Hieracii nomine plures donantur plantæ, facie & facultatibus admodum diuersæ. Plinius enim (teste C. Bauhin.) hoc inter Lactucam siluaticam refert, & cum ea confundit.

Quam nos Lactucam muralem luteo flore inscripsimus, Cæsalp. hieraciam vocat. Condriillam Creticam Geln. de hortis hieracium maius Creticum satium appellat.

Buglossum luteum an sit hieraciū maius Creticum, querunt nonnulli: verum frustra. Est hieracium cum capitulis Cardui benedicti.

Reperitur hieracium quoddam Sabaudicum montanum, cuius meminit Lob. in Adu. Obs. & Ic. Plantar. Item Camer. hort. & Cæsp. Bauhin. Phyt. hieracium grandius apud Belgas Clusii, Cichoreum luteum montanum angustifolium Hieracitæ asperum C. Bauhin. Phyt. eiusdemque Cichoreum luteum pratense hirsutum, est hieraciū maius nostrum hirsutum asperum.

Est hieraciis affine Cichorium luteum, hieracium maius Fuchsi, Dodon. Lobel. Lonic. Camer. Thalii: Cæsp. Bauh. & aliorum, est Sorchus repens nostra.

Hieracium magnum venenatum à Pona missu, an eiusdem in Baldo hieracium Intybaseum flore carneo?

Hieracium foliis & facie Condriillæ Lobelii, est hieracium minus quotundam.

Hieracium minus alterum seu Morsus diaboli, à nobis inscribitur, hieracium minus radice præmorfa.

Pilosellam maiorem Gallorum Pontani Thallio, seu Costam herbam in Italia, alibi *Ingrassiam de Porci* vocat, vt arbitrat Camerarius, depinxit Clusius inscriptione hieracii latifolii (huic titulo nos addimus) ramosis, hirsutis.

Qui vulgo in Hetruria Terracæopolus vocatur,

Hierac.
magnum
Diosc.
Sôcho si-
mile
Vires

PARVUM.

Lactuca
spontanea
Plinio
Hierac. Gn-
de dictum.

Lactuca

Accipitri-
na,
Sanchitis

Æquiuoca

Lactuca
sila

Lactuca
muralis
Condriilla
Cretica

Hierac.
cum capiti-
tulis
Cardui-
benedicti
Hieracium
Sabaudicum

Sorchus re-
pens
Hieracium
magnum
Venenatum
Hierac. mi-
nus quibus-
dam
Hierac. mi-
nus radice
præmorfa.

Hierac. la-
tifolium
ramosum
hirsutum

nobis, *Sonchis affinis Terracrepola.*

Hieracium longius radiculatum Lobelii, est *Hieracium nostrum minus* Dodon. longa radice.

Hieracium intybaceum Tabern. dicitur nobis *Hieracium macrocaulon iuncum.*

Hierac. macrocaulon iuncum.
Hieracium maius latifolium Clusii.
An Hieracium latifol. montanum Geneuense.
Hieracium montanum Clusio quodammodo incanum.
Hieracium montanum vel sextum Clusii, & aliud genus foliis nonnullis laciniatis.
Hieracium minimum vel octauum Clusii, est Hieracium nostrum florem inclinans: Hierac. Lobelii facie Hedypnois.
Hieracium maius Dioscoridis Tragi, hieracii minus Gesn. de hort. coll. stirp. & in Cat. pl. Lonie. Cordi in Diosc. & Euch. Roelin. rectè à nobis inscribitur Hedypnois, siue Dens Leonis.
Hieracium Narbonense rotundifolium monoclonum.
Hieracium foliis & floribus Dentis Leonis Lobelii, hierac. 7. siue montanum laciniato folio Clusii, an hieracium monoclonum hirsutum.
Hieracii affines Intybi Species tredecim tradit Thalus.
Clusius quoque dubitacem Pann. an eius Scorzonera 4. siue humilis fibrosa radice sit referenda ad hieracii genus aliquod. Inscribitur hæc à nobis Trogonopogonis species, siue Scorzonera &c.
Hieracium Narbonense falcata siliqua nominamus hieracium stellatum.
Sed & Cichorium bulbosum in Aduersariis Lobelii Hieracium maximum Dioscoridis alterum cognominatur.
Gesnerus tandem inter ascriptitia Dioscoridis Dracunculum Hieracium appellat.

Hieracium Narbonense.

Hierac. stellatum Cichorium bulbosum.

Dracuncul.

HIERACIUM VLTIS, ALIIS

Cichorium luteum, hirsutum & glabrum, vel minus hirsutum.

Hieracium luteum hirsutum.

Descriptio



Facie tota Cichoreo sylvestri proximum, radices crassas habet & longas, fibratas, lac fundentes amarum: unde caules plures surgunt cubitales & plusquam bicubitales, multis alis concaui, canaliculati, rubentes, aliis admodum hirsuti, aliis ferè glabri, inanes: folia ortu primo tam Cichoreaceis si-

milia, vt distinguere sit difficile, præsertim in eo genere quod folia habet hirsuta: sit enim nunquam, vt, præterquam per nerui longitudinem, reliqua folii pars glabra sit: sunt ea autem Cichorii modo sinuosa, aliàs Dentis Leonis ritu profundius incisa: flores pediculis singuli donati, Lamplanæ florum forma, nonnihil maiores, sinu-

Hieracium luteum glabrum, seu minus hirsutum.



cōuenit cū nostro hieracio, vbi locis cultis & humidioribus provenit, licet figuræ flos maior videatur, & in descriptione minor dicatur flore Dentis Leonis.

Lobel. in Aduers. hedypnois Plinii, Cichorium luteum pratense, Dentis Leonis flore, hieracii folio: & eadem sit Verrucarium Cichorium, luteo flore, & sulcatis capitulis: Obs. hedypnois Plinii, Aphaca Theophrasti. Lobelium nesciunt se de qua planta scriberet satis ex eo apparet quod dubitat in Aduers. an sit Cichorium verrucosum, & in Obseru. cum putauit Zacyntham eandem plantam cum Condrilla Clusii. Figura quam assumpsit pro hedypnoide Plinii est ex Dodonæo. Plant. icon. hedypnois Plinii & Aphace Theophrasti: Cichorium luteum pratense Dentis Leonis flore, hieracii folio. Item hieracii folio. Item hieracium foliis & facie Condrillæ. Prima figura est Dodonæi minus hirsutum demonstrans & cultum.

Matth. in hist. Germ. & Epic. iconem habet hapro Chondrilla. Item Sonnenwibel / quæ retinuit Camerarius quæ nobis videtur exprime- re potius hieracium, de quo hic agimus quod penè glabrum.

An Cam. hort. Chondrilla tota hirsuta frequens in massa, quàm in cibo coctam, & acetarum quoque instar conditâ, auide comedunt: Item hieracium foliis & facie Chondrillæ Lobelii: An Chondrillæ nomine intelligat hieracium hirsutius asserere non ausim: lectores diiudicent.

An Thal Intybi siluestris seu Cichorii sylu. flore luteo species quarta.

Lectoribus considerandum relinquo an Tabern. Dens Leonis tertia de qua in Icon. & histor. non sit eadem planta cum Dodonæi hedypnoide. Is autem in hist. per hieracium Chondrilloides

liter lutei, ex capitulo canaliculato hirsuto, qui in pappos abeunt. Semen relinquuntur minutum, striatum, fuscum. Icon prior à nobis proposita est ex Fuchsianis: secunda Lobelii ab eo pro hedypnoide Plinii exhibita.

Dodon. gall. hedypnois, Intybi 4. species, hedypnois Plinii, German. Geel wegwart, Gall. Cichoree iaulne. Belg. geel Cichoree. Descriptio Dod.

Icon.

Synon. Hedypnois.

Dodonæi.

Hedypnois Plinii.

Aphaca Theophr.

Lobel. nat.

Aphace.

idem

idem forte intelligit quod Lob., verum exactam descriptionem non habet, quâ distinguat ab aliis, nec iconem, sed pro icone, sub N. II. nescio quo errore scriptum, Blauw habidifraut hieracium caruleum: in descriptionibus nullius coerulei hieracii fit mentio.

Cichorium luteum

C. Bauh. Phyt. Cichorium 9. siue luteum alterum, vel Hieracium minus glabrum. nedypnois Dod. nedypnois Plinii. Item hieracium 14. siue Chondrilla folio maius: Apud Matthioli. Hieracium maius Matthioli. Fuchs. Dod. gall. Lac. Lob. Castori, Tab. hieracium magnum Casalp. hieracium minus Dalemchampi: Lugd. Taraxacon maius Lonicero. Frater proponit pro Hieracio maiori Matthioli iconem Tabernamontani Hieracii maioris: verum ea differt multum à Matthioli iconem, à Fuchiana, à Dodonæi, à Lacunæ, à Lobelii, à Dalecham. & Loniceri: hi enim omnes proponunt iconem Sonchi nostri repentis. Descriptio apud Casalpium non videtur male convenire Soncho nostro:

Dens leonis

Gerard. Dens leonis Cichorizata, Succorie den de lion. Item Hieracium maius Dioscor. Great banse weede. Iconem habet propositam à Tabern. pro Dente leonis tertia, sicuti etiam Hieracii eo titulo exhibiti: cur titulos mutat absque figuris?

Gerard. not.

Lonic. habidifraut/ wilde sawdisel *indistinct* maius, Accipitina, Apulei Lactuca silu. Pharmacoporum Cichorea lutea. Lonicerus Hieracii historiam habet, quæ nostro Hieracio maioris hirsuto convenire posse videtur, licet figura non respondeat, est enim Sonchi repentis.

Lonic. t. 4. h. 10.

An Clusio in Pann. & Hiltor. post. Hieracium grandius apud Belgas. An Thalia Intybi siluestris, seu Cichorii siluestris flore luteo, foliis integris, species quarta? Hieracium multis, hirsutum valde, Genueæ abundat florens mense Maio. Monspelii Martio & Aprili. Montbelgardia abundat in Horto E. C. florens Iulio spontaneum, semine cum pappis decedentibus Iulio. Id etiam Basileæ inveni cū flore mense Octobri quâ itur Moutets, & propè fluuium Birsam, hoc glabrum est, aut saltem non ita hirsutum ut aliud quod maius hirsutum dicimus, modò paruum modò magnum. Hieracium vulgate glabrum copiosè nascitur in agris Basileensibus, ubi florere solet adhuc mense Nouembri.

HIERACII PARVA SPECIES HYOSERIS angustifolia aspera.

Descriptio



Exiguâ, sed crassiusculâ donatur radiculâ, succisâ nonnihil, ac si præmorsa esset, pluribus fibris ornata: foliis longis & angustis, hirsutis, in terra spatiosis: caulibus duobus aut tribus, glabris, è radice prodeuntibus, nõ multò plùs palmum longis, versùs superiora, ut plurimum, in bi-

nas alas diuisis, quarum extremitatibus insidet flos vnicus luteus, plenus, satis magnus: tota planta amaricantis est saporis, Tabern.

Tab. icon. Hyoseris angustifolia: nist. hyoseris altera, Flein ferdlein fraut/ hyoseris angustifolia. hyoseris femella. C. Bauh. Phyt. Hieracium 22. siue minimum angustifolium.

*Synonyma
Hyoseris
angustifolia
siue femella*

Lucos multum amat: frequens etiam in solo arenoso, gramineo, & secus vias.


HIERACIUM PVLCHRVM.



AD Dentem Descriptio

leonis laciniis & Cichorii siluestre accedunt huius folia, forma & hirsutis prima verò minus laciniata, alia alternatim per caulem, at saporem nullum manifestum gustanti offerunt, quodque altiora cò minorare redduntur: Caulis vnicus, rectus striatus, cubitalis hirsutus, foliis alternatim orientibus amictus, quæ sine pediculo latam habent basim cum alis: flores in cacumine numerosi, ex pediculis propriis, hieracii similes, lutei, in pappos facillentes: radix non magna cū fibris aliquot crassiusculis. Hoc hieracium vidimus montselii florens Maio.

HIERACIUM ERVCÆFOLIUM hirsutum.



Hieracium Genero Descriptio

Cherlero nobis delatum, quod ut hieracium nostrum pulchrum singulari affurgit caule ad altitudinem pedalem, penitus hirsuto, foliis vestito etiam hirsutis, vncialibus, aut sextantalibus, cineracei coloris, laciniis Cichorii Erucæ circumcrosis, extremo folii ferè triquetro. Flos

in summo caule vnicus aureus maiusculus.

HIERACIUM PVLCHRVM RAMOSVM Sprengelianum.

Inter fœccas meas herbas plantam perelegantem

Descrip.

caule adferuo fescuibitali altitudine, necdum integram pilolam, aliis minoribus ramis, alterno situ ex longa distantia brachiata, ad quorum alas *herent* infernè quidem ex principio angusto longa, ac quadrantaliam, & rē fescunciam lata, profundis & amplius incisuris ordine quodam serrata, ac penè lacinjata, nervo insigni per medium excurrente: superne verò folia breviora lato principio ac veluti alis caulem amplectuntur perfoliatæ instar. Flores in summitatibus lutei quales in Hieraciis in singulis ramis quilibet, plus minus, qui temporis progressu in pappos faciscunt. Tota planta pilosa potissimum in extremis ramis in quibus pili longiores: Pictor non satisfecit nobis, pauciores pinxit flores.



Hanc plantam collegimus Heidelbergæ in cultissimo orto insignis Pharmacopœi & Botanici D. Sprengeri, florentem Iunio.

Locus & tempus

SONCHUS LANATUS

Dalechampi.

Descriptio



IN cubitalem altitudinē & ampliorem excrevit, foliis per caulem crassiusculum pilosum, que fortuito dispositis, duarum triumve vnciarum longitudine, culmi latitudine, nonnihil sinuatis & subinde veluti corosis, ad cyani folia nonnihil accedentibus nervo vnicō secundum longitudinem excurrente, tomentosis, nullo

pediculo nixis, ad quorum radices ramuli enascuntur: superior pars caulis ramosior in plurimos furculos molli lanugine obritos divaricatur: flores gerens aureos Erigerontis, tandem in pappi faciscentes, calycibus circumdatos, tomento delicato & molli pubescentibus: radice nititur satis crassā & longā, non multum fibrosā, planta sicca nonnihil amarā: Interdum hæc palmaris est foliis minoribus lacinjatis.

Varietas.

Hist. Lugd. Sonchus lanatus. Quidam Molluginem appellant, quamvis à Plinii Mollugine

differat.


C. Bauh. Phyt. Sonchus 11. villosus luteus. Monspeli propè Peraux inveni, in saxosis & apricis, florens Iunio mensē.

Locus & Tempus.

Tota planta lacteo succo turget, Cichonii more, gustuque amaro prædita est, sed minùs quam reliqua Cichorea, quorum & facultatem obtinet, licet imbecillior.

HIERACIUM LATIFOLIUM MONTANUM

Geneuense folio Conyze maioris Monspeli.



CAULES editi plures cubitales, ac etiam maiores, cauos, crassos, hirsutos, qui superius in aliquot breves ramulos divisi, flores gerunt luteos, magnos, Hieracii capitulis asperis patet: tandem in pappos evanescentes: folia infima Conyze Monspeliæ maioris foliis paria, palmari circiter longi-

tudine, vnciam lata, sinuata nonnihil, & quasi serrata, per caulem alternatim sunt disposita, caulem modicè amplectentia, hirsuta, potissimum parte inferiore, minùs tamen aspera quàm Hieracium asperum. Radices fibrosæ, crassiusculæ, nigricantes & crassis capitibus. Suspiciamur hoc traditum à Clusio pro Britannico.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 6. siue Conyze folio caule purpurascēte. Hieracium Britannicum Clusii. An Hieracium montanum maius latifolium Tabernamontani: Hieracium Tabern. separo à Clusii & nostro Geneuensi: quia Tabern. folia non habet Conyze: sunt etiam Tabern. autore folia tenuia & mollia, siue non rigida.

Hierac. Clusii folio.

C. B. nar.

Hieracium latifolium inveni in montibus circa Genevam folio Conyze Monspeliæ maioris. Hieracium Britannicum Clusii, impensè amara est planta, nusquam spontè nascens ipsi conspecta: sed Londini duntaxat, in hortis Doctiss. virorum Ioannis Richzi & Hugonis Morgani Pharmacopolarum Regionum, ex borealibus Britanniz regionibus, in quibus spontè crecit, delata. Floret Iunio & Iulio, semen Augusto maturum.

Locus.

HIERACIUM PANNONICVM LATIFOLIUM

Clusio, Pilosellæ maiori, siue Pulmonariæ luteæ accedens, maculatum & non maculatum.

HVIC quina aut sena sunt folia, humi strata, lata, Intybo sativo latifolio non multum dissimilia, per ambitum nonnihil sinuosa, interdum etiam lacinjata, mollia, hirsuta, nigricantibus

Descriptio

bus maculis sapissimè infecta, interdum minimè, lacteo succo turgentia: è quorum medio



caulis exit cubitalis, cauus, raris foliis sepcus: in quo plerumque vnicus (interdum alter & tertius) flos ex crassiusculo calyce, nigraque lanugine hirsuto emicat. Hædipnoidis floribus similis, sed pallidior, plenus, aliquatulum odoratus: semen oblongiusculum, fuscum, papposâ comâ, vtrin Tragopogo, prædictum, quod maturum leuissimum

flatu dispergitur: radix illi minimi digiti crassitudine, nigro atque crasso cortice obduta, lacte succi plena.

Clus. in Pann. & Hist. post. Hieracium Pannonicum siue latifolium primum.

Camer. hort. Costa herba in Italia alibi *Ingrassia di porci*, & quantum ex iconè cognoscere possum, conuenit cum Hieracio latifolio Clusii. Item Hieracium latifolium Pannonicum. Item apud Thaliu, Pilosella maior Gallorum Thalii, quam ut arbitrarè, depinxit in Pann. Clusius cum inscriptione Hieracii latifolii.

An Thal. Harc. Pilosella maior Gallorum, si cut plantam nominabat?

Tab. icon. & Hist. Hieracium phlomoides wül habidifraur: is macularum non meminit.

Assumpsimus figuram Clusii, in qua 4. tantum folia, quia defuit nobis vitens, postea Deo fauente melior icon proponetur.

C. Bauhin. Phyt. Hieracium 2, siue latifolium hirsutum maculatum.

Gerard. Hieracium 1. Clusii, The first haufe weede of Clusius.

Inuenitur plerisque Hungariæ, Austriæ superioris, atque Moraviæ montibus, gramineis & simul apricis locis, siccioribusque pratis. Inueniebam etiam (inquit Clus. in post. Hist.) & maculis luidis, & nullis maculis insignito folio, siccioribus circa Francofurtum pratis. Floret Maio, semen plerumque maturum Iunio.

Hieracium maius latifolium Pannon. 2. Clusii.

Cubitalis atque etiam bicubitalis interdum sunt huic caules, firmi, rotundi, quadam lanugine obfiti: quos inordinata, siue confuso ordine nascencia, multa ambiunt folia, tres uncias aut amplius longa, vnam lata, mollia, in ambitu dentata, lacteo succo plena: summus caulis in aliquot ramulos finditur, sustinentes imbricata capitula, è quibus prodeunt flores lutei, denis, duodenis, aut pluribus foliolis, extimâ parte incisus, constantes: medium occupantibus multis luteis fibris: radix minimi digiti crassitudine æquat, multisque tenuibus fibris capillata, singulis annis augetur, & ad latera nouos, frequentioresque saules profert.

Eius genus inuenitur graciliore caule, angustioribus, & vix semunciam latis foliis: in reliquis conueniunt.

Clus. Pann. & Hist. post. Hieracium maius latifolium siue Pannonicum secundum. *Synonyma*

C. Bauhin. Phyt. Hieracium 3. latifolium foliis mollibus & dentatis.

Nascitur cum sequenti in extremitatibus sicciorum pratorum inter vepres, etiam ad cæduarum siluarum margines.

Hieracium maius angustifolium Pannonicum 3. Clusii.

Cubitalis & huic assurgunt caules, rotundi, superioribus minus crassi, & frequentiore asperioribusque lanugine obfiti: quos similiter ambiunt confuso ordine multa folia superioribus angustiora, breuiora, atque etiam dura, nec minus lacte turgentia, summus caulis diuiditur quoque in ramulos imbricata capitula sustinentes, è quibus exoriuntur flores superiori ferè similes: radix non adeo crassa quam superioris, sed non minus fibrosa, nec in nouis proliis educandis minus fertilis. Illius etiam genus alterum obseruauit author angustioribus foliis & multo longioribus, licet non minus duris, quod aliqui tota quodammodo facie ipsi responderet.

Clus. Pann. & Hist. post. Hieracium maius angustifolium, siue Pannonicum tertium.

C. Bauhin. Phyt. Hieracium 4. angustifolium caule aspero.

Hieracium alpinum hirsuto folio 5. Clus. quodammodo incano.

Aliquot sunt huic folia è radice prodeuntia, vncialis ferè latitudinis, oblonga, molli crispaque lanugine admodum hirsuta, & quodammodo incana, lacteo succo prædita: è quorum medio caulis pedalis plerumque emergit hirsutus, quem per interualla ambiunt folia superioribus breuiora, at triplo latiora, & in mucrone desinentia, non minus quam illa hirsuta, aut lacteo succo prægnata: vnicum in summo fert capitulum



è multis hirsutis & incanis foliolis compactum (nonnunquam in lateribus alterum & tertium) quod in florem sese explicat Hieracii floribus similem; multis foliis luteo colore præditis constantem, qui deinde in pappos cum suo breui & nigro semine euascent: radix nigricat, multis candelantibus fibris prædita est, & singulis annis nouos caules profert. Tota planta admodum amara est.

Clus. Pann. & Hist. post. Hieracium 5. alpinum *Synonyma*

Costa.
Ingrassia
di porci.
Pilosella
maior Gal-
lorum.

Hierac.
phlomoi-
des.

Locus.

Descriptio

varièdi

Descriptio

Synonyma

hirsuto folio. An porro (inquit Clul. in post. hist.) ea planta quam Dalechampius Sonchum lanatum appellat?

Locus & tempus.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 5. montanum hirsutie incanum. Camer. hort. Hieracium 5. Pannonicum. Gerard. Hieracium 5. Pannonicum. Clusii, frond. of hant. weed. Tabern. Ic. & hist. Hieracium latissimum montanum.

Inuenitur in herbosis Alpium iugis, ubi Iulio, interdum etiam Augusto floret: at in hortis Maio, semen verò Iunio perficit. Prouenire obseruauit Tabern. in Vefchgeburg, & in Schwarzwald [Harcynia] in supremis montibus inter Greyzbach, Autegeist & Ribelsauer fontes acidos.

LAMPSANA VETERIBVS.

CAP. VI.

Napum
Lathine.

Lampsana (ita tradente Dioscoride) syluestre olus est, plus alens, stomachoque vtilius, quam Lapathum. Huius folia & caulis cocta eduntur. Hanc Romani Napium, Aegyptii Euthine vocant, Graeci, inquit Hermolaus, Lampsanem.

Lapana.

De Lampsana Plinius lib. 19. cap. 8. hanc scribit. Nec non olus quoque syluestre est trium foliorum, Diui Iulii carminibus, praecipue iocis militaribus celebratum. Alternis quippe versibus exprobrauere Lapsana se vixisse, apud Dyrrachium, praemiorum parsimoniam cauillantes. Est autem id Cyma syluestris. Et rursus de eadem lib. 20. cap. 9. Inter syluestres Brassicae & Lapsana est, pedalis, hirsutis foliis, Napi simillimis, nisi candidior esset flore. Coquitur in cibo: aluum leniter emollit.

Aequiuoca

Galen. lib. 2. de alim. de Lapsana nihil dixit, velut sub Brassicae generibus comprehensa. Versum 7. simpl. Pharm. Lapsana, inquit, si edatur malum succum gignit. Si verò imponatur, extergendi ac discutiendi vim quandam habet.

Lampsana
Dodoni.

Lapsana porro nomine plures non solum, imò penitus diuersas meminimus diuersos Autores referre plantas.

Brassica

Dodonaeus Lampsanam statuit plantam, quae teste Lobelio potius Hieracii congener, aut Sonchis cognata videtur.

Rapistrum
flore luteo.

Pro Lapsana Cornarius exhibet Brassicam, quae opinio non placet, ut indicatum est lib. 1. H. n. g. Veram Lapsanam Lob. Gefn. & alii Rapistrum flore luteo esse existimant, post Rapas à nobis lib. 21. descriptum.

Fagotriticum.
Apium.
Caulis.

Rapistrum album Lampsanam vel lapsanam vocant Riff. in Diosc. Turn. in Herb. Angl. Gefn. de coll. stirp. & in car. plac. Schuenckfeldius.

Lampsana vera quorundam, Ocymum Veterum Tragi Lob. Obl. est Fagotriticum nostrum.

Lapsana cur dicatur Eustach. & Euchario Roesslin de galla, mihi non constat.


Lapsana agreste olus Cordi, ex Brassicae genere, Germanis Rinköl appellatur, quo se apud Dyrrachium victitasse milites Caesari in triumpho exprobrauerunt, quid?

LAMPSANA DODONÆI.

Lac fundit amarum vulnerata, siue radice quam habet albam & digitalem, siue caulibus quos

supra cubitum erigit, hirsutos rubentes, ramosos, concauos: siue foliis denique, quae Barbarae dictae instar formatae habet, sed mollicella, hirsuta: flores autem stellati, lutei, Hieracii, sed parui: qui in pappo illi similiter abeunt.

Dodon. gall. Lampsana, ab aliquibus Napium appellata. Ruellio, ni fallor dicitur Chrysolacharum. Plinii.



Lampsanam, cum in Aduersariis negarit, nec sine ratione.

Camer. hort. Lampsana Dodonaei, laetescens planta, passim obuia, in Prussia Papillaris nominata.

Tab. icon. & Hist. Sonchus siluaticus 1. wildt Sonchenfraut: Sonchus siluaticus 2. Sonchus siluat. 3.

Gerard. Sonchus siluaticus wood Sowthistle. C. Bauh. Phyt. Lampsana 1. varians foliis, aliquando profus integris, aliquando in lacinias aliquot diuisis: an hanc Diosc. intelligat cogitandum. Item: Lampsana 2. siue siluatica, Sonchus siluat. Tabernamontani. Ego has duas non separo: lulum enim naturae duntaxat esse existimo: quod de Tabern. tribus speciebus etiam dictum sit.

Schvv. Lampsana, Ray. L. d. n. Dioscor. papillaris, C. B. nat. wild Sonchenfraut / Rein köhl / Mülchen. Fo. 56 c. Tab.

Parietinis, rudericibus, aruorum & hortorum marginibus frequentem tradit esse Schvenckfeldius: quod & ego obseruauim.

Efficax est in sanandis papillis exulceratis, unde & nomen Papillaris sortita esse videtur. Resiccat, abstergit, & digerit. Papillas exulceratas imposita sanat.

HIERACIUM CAPITVLIS CARDVI

beaediicti, maximum Buglossum echinoides quibusdam.

Multifida radice nititur, crassitudine digitali, albâ, lac amarum fundente: caulibus bicubitalis radice crassitie aequat, striatus, rubens, densissimis spinis acutis, rigidis, sed facile caulem relinquens horrens, succum item lacteum è vulnere fundens, ramis compluribus brachiatus: folia Buglossae, sinuosa, longa, multo magis spinis minacibus horrida: flores Hieracii, crocantes, in pappum facessentes, è calyce, thorulis hifpidis

Synonyma
N. ap. 1. 2. 3.
Chrysolacharum
Plinii.
Sonchis cognatus
gnatus olus

Descriptio

pidis canaliculato. Nostram iconem melius pictam sculpsit corticpit.

Hierac. Echoides. Buglossum luteum
Tabern. Icon. & Hist. Hieracium Echoides, Buglossum luteum, habet hanc / Geel Ophrysung genant.

Lobel in Adu. Buglossum Echoides luteum,

*Lingua
bonina lu-
tea*

*An Hierac.
Creticum
C. B. nat.*



facium capitulis Cardui Benedicti maximum mihi prouenit Montbelgardi in horto E. C. Eodem anno quo facta planta caulem produxit, floruit Augusto, Septembri & Octobri : Annua est planta ipsam seminans, floruit Iunio & Iulio. Basileæ in horto D. Felicis Plateri collegi semina matura sine mentis Augusti. Heidelbergæ vidi in horto Electoris.

Tempus

HIERACIUM ASPERVUM MAIORI flore in agrorum limitibus.

Descriptio



Satis crasse radices multitudine compluribus fibris donata, colore ad buxum inclinata, lacucentes amaro sapore, verum non insigni præditum: caules ex eadem radice multi surgunt, teretes, striati, rigidis pilis asperi, ramosi, lateum succum manantes, cubitales, bicubitales & altiores: folia infe-

riora quidem duobus palmis interdum longiora, sequiunciam lata, acuminata, primum atroviuentia, post de coloris intentione nonnihil remittentia, hispida, acuminata, sinuata per margines, & aliquantulum crispa: superiora verò alternatim caulibus adhaerent, minor, acutiora, ceteroquin similia: sapor utriusque subamarus: flo-

res suis singuli pediculis modò longis, modò brevibus, posteriores prioribus, ut in Impia Plinii, altioribus insident, Tussilaginis floribus pares, lutei, foliola exteriora maiora, crenata, ex capitulo ex longis foliolis multis squamato, subaspero, quod delapsis floribus inferiore parte in ventrem canaliculatum turgescit, semen claudens lanugine oblitum. Cum Hieracio maximo capitalis Cardui benedicti multa communia habet hoc hieracium, quod aliquando Cichorii asperum vel spinosum credideram. Figura nostra ex Fuchianis non in omnibus placet pro nostro hieracio aspero: folia non satis sinuata.

*Cichorium
luteum.
Icon.*

Trago Cichorea (wegwart eadem in histor. germ.) tertia & quarta flore luteo, foliis asperioribus spinulis horrentibus: radice longa luteum succum manante, qui in gummi quasi glutinosum coagulatur, semine subluteo: ad Condrillam Dioscoridis referenda.

*Synonyma
Cichorea
flore luteo,*

Thalio in Harc. Intubus silu. seu Cichorium silu. flore luteo, passim ferme in tota hircynia vulgare, duplex. Aliud foliis integris: quod rursus foliorum ratione subdividitur in quatuor species: Aliud diuisis.

*Intubus silu.
si luteo.*

Tab. Ic. Cichoreum luteum, Geel wegwart:

Histor. Cichoreum luteum primum. Eadem in hist. Cichoreum luteum secundum. Item Ico. Hieracium Intubaceum asperum, Rauch wegwart habet hanc. Hist. Hieracium novum, Collata descriptio & figura Cichorei i. lutei respondere videtur cum nostro Hieracio, quod Fuchius, cum Tubingæ essemus vocabat Intubum luteum tertium. Quale sit Cichorium luteum 2. quod non depingit, sed tantum describit, asserere non possum. Si quis tamen duo hæc Cichoria lutea Tabernamontani, ad Hieracium de quo c. sequenti agemus, velit referre, id eius iudicio committimus. Hieracium eius Intubaceum asperum huc collocatum volumus.

Cichor. luteum

*Intubus
luteus*

Gerard. Cichorium luteum yellow Succorie / Hyofiris Plinio, Lobel. Hedyotis. Item Hieracium asperum, Scharpe haufe weede. Gerardus iconem Tab. habet Cichorii i. lutei: verum an intelligat nostrum Hieracium asperum maiori flore, vel sequens, lectoribus considerandum relinquo. Asperum eius idem est cum eo quod ex Tab. proponimus.

*Hyofiris
Plinio*

*Gerardus
icones*

C. Bauhin. Phyt. Cichorium 7. seu luteum pratense hirsutum. Cichorea lutea vel 3. Trago. Cichorium luteum Tabern. foliis variat, aliud integris, aliud diuisis: illius ratione foliorum quatuor species, qua de re Thalio. Item: Cichorium 8. siue luteum montanum angustifolium, hirsutia asperum, quod Intubum tertium Fuchius fecit, Scariolam tertiam Cortusii, Hieracium Intubaceum asperum Tabern. Non separo adhuc Cichorium 7. & 8. Bauh. donec mihi constet aliqua certa differentia inter hæc duo: & an vnaquæque suam differentiam semper seruet, nolim tamen negare duas species, iudicent alii.

*Cichorea
lutea*

C. B. nat.

Hieracium quoddam asperum vel spinosum mihi aliquando Cichorium luteum nominatum, prouenit passim in agrorum marginibus circa Montbelgardum, ac etiam in horto Ill. E. C. florens Iulio, Augusto, Septembri, & Octobri mensibus. Frater C. Bauhinus misit Basileæ nomine Scariolæ tertie Cortusii. Prouenit in Rossberg prope Masmünster. In Ducatus Wirtembergici monte Teck & Bol in agrorum limitibus. In Alsatia asperis collibus secus agros & vineas, apud Mediomatrices verò in montanis pratis: hertium gigni scribit Tragus.

*Locus &
tempus*

HIERACIUM RECTVM RIGIDVM,
quibusdam Sabaudum.

Descriptio

Synon.

Intybus.



hirsuta, atroviuentia, alternatim posita: radix dura, longis fibris donata.

Lob. Adu. Hieracium Sabaudum montanum. Obseru. Hieracium Sabaudum. Iconib. plant. Hieracium alterum grandius. Tubingæ cum essem præceptor meus Fuchsius faciebat Intybi speciem.

Militaris.
Lactaris.Hierac.
mont. angustifol.Locus &
tempus.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 18. siue angustifolium fruticosum. Hieracium Sabaudum Lobelio. Hoc Parauit laticoribus & hirsutioribus foliis & caule reperitur, quod D. Guilandinus Erinum Matthioli esse asserbat, & apud Galenum Militarem, apud Plinium Lactaridem, dici.

Camer. hort. Hieracium alterum grandius Lobeli, rectum & fruticosum.

Tab. icon. & hist. Hieracium montanum angustifolium 1. Berg habichtraut mit schmalen blättern. Hieracium 15. Sabaudum dictum.

Gerard. Hieracium intybaceum & Endiues haufe weede. Ecce proposita icone Tabern. mutat titulum Gerardus:

Hieracium dictum Sabaudum quibusdam, in Sabaudia obseruauit. Montbelgardi abundat propè vites & in pratis, florēt Iulio & Augusto, plantarum etiam in Horto Ill. E. C. Passim reperitur in montibus ad Rhenum & circa Heidelbergam & in Ostwald, sabulosis & petraeis locis, potissimum circa montanas arces Stratsenburg & Schönenburg in Hircynia.

HIERACII SABAVDI
varietas duplex.

Descriptio

Accepimus à fratre C. Bauhino Lactaridis siue Erini Matthioli nomine plantam siccam accedentem ad hieracium Sabaudum, si non idem: in foliis tamen discrimen, vel lusus: in caule cubitum excedente, folia, priora, alternatim disposita, vncias duas longa & pollice angustiora, ovalia ferè, non crenata, qualia à Matthiolo pinguntur superiora, quosdam dentes habent, hirsuta sunt: flores similes Hieracio Sabaudum, lutei, in pappos euanescentes. Idem nobis misit cum hac inscriptione Plantam cuius etiam i-

conem damus, Lactaris & Militaris Plinii, Erini Matthioli species, Guilandino Parauit. Hæc sanè multum variat si non diuersa planta in caulis cubito altioribus hirsutis, folia alternatim quasi sita, auersa potissimum parte hirsuta, tres pollices longa, duos lata, in acumen delincentia, pulchras habent lacinias acutas, quæ in superioribus ramis breuia sunt & lata, in ramorum extremitatibus flores quales præcedenti.

An Erinum Matthiolo? Non est Erinum, teste

Hieracii Sabaudi varietas 1. Erinum quibusdam Mart. dicta;



Hieracii Sabaudi varietas altera.



Columna, quæ

à Matthiolo

depingitur,

mutata planta,

sine floribus,

quam nemo

nisi ab eodem

depictam vi-

dit, præter i-

psum, qui se

manus lacte

infectisse eà

extirpatâ asserit.

Sed certè folia

ab ipso depicta

Dioscoridis E-

rinum non re-

ferunt, verba

quidem illius

non percepit,

nam folia in-

cisa in superio-

re parte, folio-

rum scilicet

intelligitur, nò

caulis vt per-

peram sicte de-

pinxit. Com-

mentatoris in-

quit in Adu.

Lobelius, im-

pudentiusculù

commentum

licet depre-

hendere & ri-

dere. Is nam-

que quum sibi

vissam & le-

ctam ad riuu-

los aquarum,

adèò lacteo

succo manan-

tem, vt eo

manus infi-

cere posset:

palam & auda-

dacter legiti-

mum Erinum

assequerasset, nò

verbis ausus

fuit describere: sed pingendam curauit plausibili in vulgus Pharmacopœorum icone, quinis, nec pluribus, erectis de cespite caulibus: Ocymi folio, bino, nonnihil crenato, per interualla donata, nullâ additâ prorsum, quæ dubiam vel fidem, plantam fulciret, historiâ: cuius picturæ quum eum puidisset, postremò de vltimis Commentariorum interpolationibus curauit expungendam, nullam interea in huius miscellæ subrepticiam locum sufficit: ac ne verbum quidem subdidit, quâ id de caula dempsisset.

Lacu-

Synonj

Matth ap-
pinit ex-
pletur.Diosc.
explicit.Matth.
carpitur.

Lacuna Matthioli exhibet figuram falsam atque vocari Erinum: barbarice Herba lactis, & Lactarium, nonnullisque per Erinum Balsamitam maiorem intelligere.

Cast. Dur. Erinus, Basilicum aquaticum. H. Lugd. Erinus Matthioli. Sed & Lonic. figuram malam Matthioli habet lib. 5. cap. 341. vbi *masser Basilen* / Erinus & Echinos Dioscoridis, Ocy-mum aquaticum vulgi, Lactor, Herba lactis, Militaris, & Anabula cognominatur.

C. Bauhin. Phyr. & apud Matth. facetur se ignorare quid sit Erinus Matthioli, pro eo autem ipsi ostendebat Guilandinus Hieracium quod Sabaudi nomine Lobelii proposuit.

HIERACIUM MINUS PRÆMORSÀ radice, siue Fuchlii.



Per terram spargit *filia* longa quadam, ad radicem parum lacinia-ta, sic vt interdum lacinie opposito situ respondeant, aliàs verò non item, idque ex brevioribus, vel longioribus interualis, hilari virore splendens, sapore & succo lacteo cum eiusdem classis aliis cœnens, si quibus donata pilis, ii rati sunt:

inter hæc *caulis* erigitur modò vnus, modò plures, cubitales & sesquicubitales, nudifriati, inanes, circa summum in alas aliquot diuisi: quarum singule singulos sustinent *flores* luteos foliiflos, ex calyce oblongo, modicè squamato, incano, lanuginoso. *Radix* fibrata, inâ parte præmorsâ nigricat, per cætera candicans, lacte tur-gida. Hæc sanè planta insigniter variat magnitudine & laciniarum diuersitate.

Synon. Fuchlii. Hieracium minus. Tragus nullam habet figuram sui hieracii minoris, Morfus Diaboli appellati, eandem autem figuram, quam Fuchlius & Dodonæus habent, ponit cap. 88. sub titulo *Lagopi hasenstrauch*, vnde transpositionis suspicio: inibi enim descriptio non videtur quadrare figuræ.

Math. ta-natur. Sed & Matth. in Dioscor. eandem habet figuram, cui inscriptio est, hieracium minus: interea pro suo more non describit. In com. Ital. & Lat. cum mag. fig. ceu & Epit. Camer. eandem quoque retinet, descriptionem quidem apponens, sed quæ non quadrat figuræ: folia enim non sūt asperiora quàm in Cichorio. Nec ea mutat in Hist. germ. Camerarius, sed descriptionem inibi diuertim addit, quæ non facit mentionem asperitatis foliorum.

Camer. aut. Hæreo an hieracium minus præmorsâ radice bene fuerit notum Gesnero de hortis, dicenti: Pro hieracio minori Matthioli herbam Sôchis cognatam exhibet, quod ad vires parum interesse puto à Dente Leonis.

Tom. II.

A Lonicero pingitur sub titulo *hasenföl* / vocaturque in descriptione *hasenlarrich* / Lactuca leporina, *hasenstrauch* / oder *Schmeltz* / Sôchus non aspera, Lactucella, Cicerbita, & *Lacteron* Gallorum.

Lact. leporina.
Cicerbita.

Lacuna nomine hieracii minoris, quod quodam Dentem Leonis vocare scribit, solam proponit figuram. Verùm hieracium hoc non solet dici Dens Leonis sed è contra Dens Leonis quibusdam existimatur Hieracium minus.

An Anguill. Lactuca leporina Apulei, *Caz-zalepre*, & Hieracium minus Dioscoridis. Item postica. hieracium minus. Romæ & in Hetruria *Caz-zalepre*, quo in cibis & potissimum in accartariis vtuntur.

Lacuna. msc.

Ab. Caz-zalepre.
Anguill.

Lob. Aduers. [vbi & morsus Diaboli vocatur:] Obs. (vbi ipsi Lagopus & Lactuca Leporina Tragi videtur) & Ic. Pl. Hieracium minus præmorsâ radice.

Tabern. Icon. Hieracium minus Dioscoridis: Hist. Hieracium secundum: & postea inter nomina, *isepkum itegon* & *isepkum unges* Dioscoridis, Accipitina minor Herbariorum, Sichellade & Sichellade Africanorum, Hispanorum *Coyon de Galbo Hierua*, i.e. herba testiculi galli, Ic. Hieracium minore, Angl. *lytle hasse mede* / Belg. *hasz uiscruyt* / Germ. *klein habichstrauch*. Item Icon. Hieracium nigrum, *schwarz habichstrauch*, Hist. Hieracium tertium. Adhæc Icon. Hieracium minus, Lactuca leporina *hasenstrauch* / *hasenlarrich*: Hist. Hieracium quartum. Tandem Icon. Hieracium aphacoides, *habichstrauch*: Hist. Hieracium quintum, quod Aphacæ Theophrasti simile sit.

Accipitina minor.
Coyon de Galbo Hierua.
Testiculi galli.

Hieracium aphacoides.
Icones 4.

Camer. hort. hieracium minus Matthioli, spôtanea herba: Gerard. lib. 2. cap. 1. proponit icones Tabern. sub his titulis, Hieracium minus Dioscor. Hieracium nigrum, Hieracium leporinum, Hieracium aphacoides.

Hieracium minus.
Hieracium nigrum.
Leporinum.
Aphacoides.
Picris.
Theoph. Amara.
Gaza.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 16. siue minus, Ic. Hieracium 15. siue Chondrilla folio minus, Hieracium Aphacoides Tabern. Apud Matthioli. Hieracium minus.

Hort. Luf. Hieracium minus præmorsâ radice, Lactuca leporina *hasenstrauch* / *hasenlarrich*.

Hieracium præmorsâ radice inueni Genevæ in pratis circa *Arve* fluuium, floret Iunio, Iulio & Augusto. Frequentissimè circa Basileam. In Ducatu Wirtembergico, ad fontem Admirabilem floret Augusto, Septembri & Octobri.

Locus & Tempus.

HIERACIUM MACROCVLON IVNCE- um siue minus primum Dodonæo.

Ex radice crassâ, albâ, amarâ, succo lacteo pregnante, complures exeunt *caules* cubitales, interdum triebitales circiter, angulosi, laues, atrouirentes, concavi, in ramos aliquot diuisi: *flores* singulis circulis insident singuli, Hedypnoidis, lutei, ex squarroso modicèque hirsuto capitulo emicantes, *femine* succedente ruffo, longo, ad tactum, nonnihil aspero, cum pappose tomento: *folia* pleræque omnia ex radice statim orta per terram sparguntur, Sonchi lacinia, interdum plus minùs lacinia, in obusum mucronem desinentia, tenera, hirsuta raris & longiusculis pilis, nonnihil amara.

Descriptio

Dodon. gall. hieracium minus primum inscripsit, dixitque appellari à nonnullis Intybum agreste, aut Lactucam minorem, Germ. *klein hasz bichstrauch* / Belg. *klein hasichstrauch*.

scd

Lob. Adu. Obſ. & Icon. plant. Hieracium longius radicum.

Tab. Icon. Hieracium Intybaceum. *negwar-ten/habichfraut*: In hiſt. Hieracium ſextum.

Item Hieracii machrorhizō, habichfraut in hiſt. Hieracium ſeptimum. Item icon. Hypocharis, Porcella, fōrſlein Fraut: hiſt. Hypocharis:

C. Bauh. Phyt. Hieracium diu-ue Dentis leonis folio, radice oblonga. An Apargia Theophrasti. 7. hiſt. 9. Hieracium 9. ſiue Dentis leonis folio alterum vnicau-ale. Hieracium 6. Tabern. Hieracium 11. ſiue dentis leonis folio minus, Hypocharis Tabern. Antē dixi curiungam prædictas plantas, verū nescio quare Hieracium 6. Tabern. dicatur vnicau-ale, quandoquidem in deſcriptione ramoſum faciat, & figura quoque id indicet.



Hier. Dent.
leonis folio
C. B. mor.

Locus &
Tempus.

Gerard hypocharis, Porcella, Swines Succocie. Item hieracium longius radicum, lang rooted haufe weede. Icones Tabern. habet.

Montspeliū obſeruauit florens menſe Maio ad ripam fluminis propē Caſtelneuf, vbi in pratis ſolet prouenire. Geneuæ in muris. Montbelgardi etiam in horto Ill. C. Wirt. ſpontē, ſemine maturo Iulio, ac florens Auguſto. Frater C. Bauh. Baſileæ collectum miſit nomine Hieracii longius radicati.

HIERACIUM FLOREM INCLINANS.

Deſcriptio



Radix com-
plurib* fi-
bris donata lac
manat ſubama-
rum: folia in or-
bem per terram
ſpargit multa,
Dentis leonis,
hiſſuta, aſpera,
ſpithamæa &
longiora, alia
caulibus adna-
ſcuntur: atque
hi plures ex ra-
dicis capite o-
runtur, nonnū-
quam in ramos
diuiſi & foliis
donati, alii nu-
di, tenuiores,
ſimplices ſel-
quipedalmates &
bipalmates: ſed

enim tum hi, tum illi terram verſus nutant ge-
pandi, ſpinulis rubentibus, vt & foliorum dorſi
coſta, aſperi; flores hieracii, lutei, nutant, in
pappoſ abeuntes: ad radicem ſtorum caules
cratſcunt interdum quā parte ſe contorquent:
ſemina longa ſunt, nigra, inuoluta quibuſdam
partibus humilibus ſeminibus longioribus Calthæ.

Lobel. Icon. Pl. Hieracium facie Hedypnois. *Hier. facie Hedypnois*

Teut. 288.
C. Bauh. Phyt. Hieracium 17. ſiue minus alterū
capitulo inclinato. Hieracium 21. ſiue minimum
latifolium. Hieracium minimum, vel 8. Cluſio.

An Cluſio in Pann. hieracium 8. ſiue minimū:
hiſt. poſt. hieracium 9. ſiue minimum?

An Tab. Icon. hyoſeris latifolia, hyoſeris ma-
cula, ſlein ſerelein fraut: In hiſt. hyoſeris. 1.

Gerard. Anglo hyoſeris macula & Male Swines
Succocie.

Prope Montſpelium obſeruauit florens Aprili &
Maio vbi caules ſolent eſſe ſimplices: Montbel-
gardi in horto Ill. C. à me ſatum, folia maiora,
minus laciniata, caules diuariantur, floret etiam
Iulio. Baſileæ collecti ſemen matuum Auguſto
in horto D. Iacobi Zvvingeri.

Locus &

tempus

HIERACIUM MONTANVM maius latifolium.



Radice viti-
tur breui,
nigro-incanā,
ſuccis, digiti
minorem crat-
ſtudine equāte
fibris multis, al-
bis, in extremit-
tate bifurcatis
donatā, lacte
prægnante, ſa-
poris multum
amari: foliis 16-
gis, latis, crif-
pis, ex albo in-
canis, rigidā la-
nugine obdu-
ctis, Hieracii
Echioidis foli-
lii in modum
effigiat, ſed
duplo latiori-

Deſcriptio

bus, breui petiolo herentibus, caulem amplecten-
tibus, præſertim inferioribus, breui petiolo hæ-
rentibus, acuminatis. Inter folia ad finem Auguſti
procedit caulis rotundus, aſper, piloſus, ſpitha-
mam vnam & mediam lōgus, quandoque in duas
aut tres alas diuiſus, in quibus capitula craſſa e-
xoriuntur, multis foliolis conſtantia: ſtorem pro-
ducentia luteum, plenum, qui ceu alii huius ge-
neris in floccum abit, ac unā cum ſemine nigro
ventis diſpergitur. Tota planta lacte turget.

Tabern. icon. hieracium montanum maius la-
tifolium: hiſt. Hieracium 13. ſiue montanum ma-
ius latifol. Groſſ. Verg habichfraut mit breuten
blettern ſecundum.

Gerard. Chondrilla Hiſpanica, flore purpureo.
Quam plantam intelligat Gerard. nescio: icon eſt
Tabern. qui non deſignat Hiſpanicam ſed Ger-
manicam plantam floris lutei; Icon hæc erat po-
nenda c. 32. pro Hieracio latifolio, Broad leaved
haufe weede, vbi pro eo male ponitur figura Ci-
chorii Tabern.

Synoni

Hort.

Hort. Lus. Hieracium montanum maius latifolium Groß bletterich hapichkraut.

Locus hircynie summis montibus incola, inter Griefbach/ Antegast/vnnr dem Ribelsamer/ Saurbrunn.

HIERACIUM LATIFOLIUM GLABRUM

ex valle Griefbachiana.

Descriptio



Priorē hēc emulatur, licet radix minor sit, & folia angustiora, & paulo breviora, inferiora etiam longiori prædita sunt pediculo, cætera verò pediculo carēt, caulem amplectētia, ad exortum angustiora quā prioris, tenera, mollia: caulu ambit in quinque, sex, aut septem staminula, quibus singulis fls infidet vnicus, luteus, præcedentis floribus par, sed paulo minor: tota planta amara est.

Hier. latifolium minus.

Tab. Icon. hieracium montanum latifolium minus, Flein Berg habichkraut mit breitten blettern: In hist. hieracium 14. hieracium latifolium montanum minus, hieracium 7. siue latifolium glabrum.

Gerardo hieracium montanum latifolium, Great leaved hauke weed.

Locus & Tempus.

Hieracium latifolium glabrum obseruau in valle Griefbachiana Maio florens, vt & Tabern. descriptio author.

HIERACIUM LATIFOLIUM PRÆMORSA

radice, caule singulari, Pilosella maiori amine.

Descriptio



Tom. II.

Syluas amat, foliis palmaribus, quibusdam brevioribus, aliis longioribus, vix vnciā latis, quædam dētata in margine, brevissimis pilis, & quibusdam cōspicuis donata, aliis manifestis, quædam in acumen desinunt: caula dodrantalis ac etiam cubitalis, vnicus ramus, nullis ra-

mis diuisus, sine foliis, multos in summo cacumine cōgestos flores luteos sustinens, ad instar Pulmonariæ Gallicæ, qui tandem in floccos abeūt, ad singulas diuisiones foliolum tenue angustum, Radix fibrata & præmorsa.

Hoc nostrum hieracium videtur habere multa communia cum Intybo ἀνθηρόγυλον Thalii in hircynia de quo paulo post.

Hieracii speciem nunc descriptam, accepi Basileā à Fratre in filais inuentam, qui hieraciū latifolium præmorsā radice nominabat. Habui etiam ab Vldaricho Cholio Argentinā ex plantis D. Agerii.

PILOSELLA MAIOR QVIBVSDAM, ALIIS

Pulmonaria flore luteo.



Hic radix geniculata, rubra, fibrataque, lac manans sapore amarum: à qua caulis surgit lacte similiter prægnans cum foliis, cubitalis, tenuis, hirsutus, in cuius alis summitatem versus ortis, flores infident lutei, hieracii, qui in pappos maridi facellunt: Folia à radice statim exoriuntur, sinuosa, supernè virentia & hirsuta, infernè densiore lanugine canescentia, maculis pulchris interdum notata, sapore amaro & nitrolo, pediculis subrubentibus, villosis, longis quibusdam, aliis brevioribus.

Inscribitur hæc à Trago (qui non meminit macularum) Auricula muris maior, Groß Miesbor: & quibusdam Germanis dicitur hirsut wundkraut / hoc est, Solidago Sarracenicæ.

Pingitur à Lonicero Pulmonaria, quæ à quibusdam Gallica dicitur sub inscriptione, Groß Miesbor / Auricula muris, vnde hæc, Pilosella vulgi, sed descriptio non satisfacit.

Lob. Adu. Obs. & Icon. Pl. Pulmonaria Gallorum flore hieracii, Auricula muris maior Tragi. Gesn. in cat. Hyoseris Plinii, hodie fortassis Auricula muris: De hort. Pulmonaria Gallica, Lactucarum generi cognata: Scopæ fortè illa regia Plinii ramis oblongis: Et forsan eadem Sideritis illa Plinii, Scopæ regia appellata. Robert. Const. in Amat. Pulmonaria.

Tabern. Icon. Pulmonaria Gallica siue aurea, Hist. Pulmonaria Gallica inas. Is non meminit foliorum maculatorum.

C. Bauh. Phyt. Pulmonaria i. siue Gallorum folio pilosissimo, hieracii flore: Theophrasti lib. 7. cap. 7. & Plinii lib. 21. cap. 15. nonnullorū Corchorus.

Nascitur Alfine, siue Auricula muris maior Tragi in vmbrosis nemoribus, nonnunquam etiā ex antiquis muris in perpetua vmbra litis prorumpit: Iunio mense appetente caulem emittit

foliis destitutum. Pilosella Tragi quæ quibusdam Pulmonaria Gallica dicitur, aliis Hepatica, quam Auriculæ muris nomine Lonicer⁹ satis benè pignit, Montpelii crescit in muris & siccis locis, florens mente Aprili. Genevæ vidi virentē in radice montis Salevæ Februarii principio. Basileæ floret Julio cum pulchris maculis in foliis.

Temper.

Galenus inquit Tragus lib. 6. hanc stirpem describit, airque illam frigida & humida naturæ esse, ideoque eodem modo lacris ignibus adhiberi posse.

PILOSELLÆ MAIORIS SIVE PVLMONARIAE luteæ species magis laciniata.

Descriptio



in alas aliquot diuisus, ad quarum exortum, foliolum admodum exiguum, acuminatum, angustumque exoritur: flos in fine lunii apparer, in Julio explicatur ac periclitur, luteus plenus, in pappu abeunt: Tota planta lacte madet.

Tabern. Hist. & Icon. Buch. Weiblein, Pulmonaria Gallica forma.

C. Bauh. Phyt. Pulmonaria Gallica 1. siue latifolia laciniata.

Locus

In silvis densis & opacis Fagorum non adeo frequenter occurrit.

PILOSELLÆ MAIORIS SIVE PVLMONARIAE luteæ laciniatæ species minor.

Descriptio



Radix huic crassa aded, multis crassiusculis fibris donata, ut non nisi lacerta euelli possit: folia ex pluribus ceu capitibus vinctas septem loga, quædam breuiora: quædam parum aut vix laciniata, eaque minora, maiora autem profundè laciniata, parte superiorem vix hirsuta, in aucta pili manifesti in costis vel nervis: fo-

liis inferioribus pediculi longi, superioribus per caulem multò breuiores: caules ipsi dodrantales, infernâ parte rubentes, torridi, caui, hirsuti, in paucos ramos diuisi: quorum extremis flores insident singulares, satis magni, lutei & papposi. Nec in radice, nec in foliis saporem vllum insignem animaduertimus.

In muro pontis Clareuallæ vrbis, nec alibi me obseruasse recordor. Flores & semina decidunt Augusti principio.

Locus & tempus

PILOSELLÆ MAIORIS SIVE PVLMONARIAE luteæ species angustifolia.



Descriptio

Præcedentibus nititur radice magis curta & longioribus fibris donata: folia donatur logo vt prior, sed angustiora, pilosa, lanuginosa, latè dillecta, nec profundè laciniata, non duntaxat à radice orta, sed & caulem ad summum usque amplexo, in summitate ad alarum exortum inte-

gro, non laciniata. Caulis & flos prioribus respondent.

Tabern. Hist. & Icon. Buch. fol. m. t. schmalen Blettern. Pulmonaria Gallica tenuifolia.

C. Bauh. Phyt. Pulmonaria Gallica 3. siue oblonga, angustiorque folio.

Pulmonaria Gallica tenuifolia.

PILOSELLA SIVE PVLMONARIA lutea angustiori folio valdè pilosa duplex.



Descriptio

Pilosellæ maiori siue pulmonariae luteæ similis, cuius tamen folia acuminata sunt, longis pilis valdè hirsuta, non tantum à radice statim orta, sed etiam per caules pedales hirsutos: flores lutei, singuli vel bini, ac etiam terni, maiores quam in vulgari, qui nondum pallescentes, foliis obuectantur, quæ caui longique pili

pili ornant, & tandem in pappos evanescent: radices torosae, nigrae, in fibras crassiusculas desinentes.

Alia similis Huic similis si non lufus cui folia per caules brevia & lata: folia longis pilis hirsuta, inferiora verò breviores habere videntur pediculos: prior in icone notatur litera A. Altera verò litera B.

Locus. Pilosella alpina nostra florebat mense Junio in monte Saleve prope Genevam, vnde mihi allata quae notatur B. Altera quae A. insignitur, reposita à nobis in peregrinatione Rhætica prope Wessert in muris, quam Gefn. Pilosellæ speciem faciebat. Similem habemus ex plantis siccis Agerianis Argentinae datis cum flore vnico.

APHACA OLVS VETERIBVS.

CAP. VII.

Aphaca Aphacæ olus, non legumen, appellat Theophrast. lib. 7. cap. 7. propter foliorum similitudinem: ea enim foliis Intubo quodammodo proximis cõditur. Inter Cichoraceae autè c. ii. Aphacam vocat ingustabilem, & amaram, quæ festinanter floret: sed flos celeriter senescit, atque lanugine pappo dicta marcescit: tum alius iterum prouenit, atque iterum alius: idque tota hyeme, verèque toto vsque ad Aestatem facitatur: flos Melini speciem gerit. Alia tamen est Aphaca inter legumina, vt suo loco patet. Mirari subit Theophrastum, cur Aphacam amaram & quidem ingustabilem scribat, & tamen inter olera recenscat. Plinius Aphacem vocat: Aequinoctio, inquit, nascens Aphacæ, subinde alio marcescente flore emittit alium, totaque hyeme, totoque Vere vsque in Aestatem.

Aequiuoca Quanam porro sit hæc Aphaca Veterum asseru difficile facit. Fuchsius & post eum Matthiol. Amar. Casalp. Thalius, C. Bauh. Schvvekf. & alii, Dentem Leonis esse concludunt. Nos hanc Hedypnoideam siue Dentem Leonis Fuchsi inferibimus.

Hedypnois Hedypnois Plinii, Aphaca Theophrasti Lobelio, an hieracium minus multis, aliis Cichorium luteum:

Aphacæ Aphacæ Theophrasti, non quidem legumini, sed herbæ (inquit Dodon.) conuenit Erigeri siue Senecionis species, Cichorium fœtidum à plarisque [à nobis Senctio hirsutus grauitus olens] appellata.

HEDYPMOIS SIVE DENS LEONIS

Fuchsi.

Descriptio Radice digiti fere minimi aliquando crassitudine, lac e plaga fundente, surgunt nudi & inanes pediculi, palmares & plusquam dodrantales, aliquando hirsuti lanugine facile cedente, quibus insident singuli singuli flores pulchri, patuli, lutei, maiores quàm Hieracii, cuius floribus similes sunt: exterioribus foliis pronà parte ex fusco rubescentibus, calyce glabro, multido, extra quem quatuor aut quinque folia viridantia reflexa: flores in pappos abeunt, calyce dehiscente & circa pediculum reflexo, nudam florum sedem porosa pellicula caluitium senile imitante, obductum.

Synonyma Hermol. in Dioscor. coroll. 663. Cichorium folio latiore, Edypnoidea, & Leonis Dens vulgaris voce dicta. Cordo, & Corn. in Diosc. hieracium paruum: de quo hic ait. Et hoc Hieracium prio-

ri non adeò dissimile, ex Lactucæ aur potius Intybi generibus est, idèoque ab Autoribus per se præteritum, & sub illis comprehensum. Nostri Flein habichtrau dicunt. Alii Kõrtrau. Quæquam sunt qui hedypnoidea Plinii, ista Germanicà appellatione accipiant. Et sanè videtur eadem herba esse. Apud illum (Cordum) annotatum est esse hedypnoideam Fuchsi.

Generosus Dominus Hermánus Comes à Neuenare, tam splendida stirpe natus, non erubuit rei Medicæ dare operam, sed summo studio (vt cætera omnia) herbarum cognitionem est sectatus: id quod Annotationes eius doctissimæ testantur, quas suo secundo



Tomo Herbarii adiecit Brunfelsius. Ibidem herbæ, quam cõmunis vocabulò & recepto Dentem leonis vocant, eâ putat esse, quæ à Dioscoride Lagopus in quarto herbarum hist. libro nominatur.

Sunt, qui Cichorium & Dentem leonis pro eadem accipiant herbæ, inquit Brunfelsius.

Tragus Hedypnoideam hanc pingit, & describit Hieracii maioris titulo, dicens. Generosus Comes de Neuenare putauit hanc plântam ad Lagopoda (Dioscoridis) referri posse. Ego tamen assero Lagopoda non esse appellandam. Quia constanter pronuncio esse Dioscoridis lib. 3. ἡδύπνοον τὸ μέγα, Sonchiten, Lactucam erraticam, & Sitheliam: Apulei cap. 30. ἡδύπνοον ἀγρίαν, Aspidelon, vel Aspidelon, Picridem, Iobonson, Lactucam siluaticam, Officinarum & vulgi Dentem Leonis, Rostrium porcinum; & Apotematiam (vt Comitiam commemorato placent) dici: Germanos etiam, ceu & hieracium minus, propter Solem Sonnenwibel, Heliotropium, temporis ratione Merzenblumen (Florem Martii,) ob colorem Osterblumen, seu Eierblumen (florem vtriellinũ dixeris,) & quia raris capitib. similia sunt scaporum cacumina psaffenblatt / Münchpöpf (Caput Monachi,) & à foliorum forma, lewen zan, (Dentem leonis) & wiesen lattiç (Lactucam pratensem,) seu weglattiç (Lactucam viarum,) quòd forma & lacteo succo à siluaticis Lactucis pertinere videatur, vocare solere: posse & commodè Augenwurz (Oculariam radicem) dici &c.

Matth. in suis comm. Hist. germ. & Epir. cum addit. Camerarii, Dens Leonis, de quo ait. Quæ Theophrasti lib. 7. cap. ii. de plantarum historia Aphaca vocatur, inter Cichorii genera esse reponendam nemo est qui ambigat. Huic per omnia in vniuersum responderet, quæ nonnullis Dens Leonis, aliis Dens caninus, quibusdam Caput Monachi, aliquib. Rostrium porcinum, plerisque verò Ambubeia vocatur. Tamet si Plinio Cichor. ipsum propriè Ambugia vel Ambubeia dicitur.

Dens leonis
Lagopus
Diosc.

Cichorium
non est

Comes de
Neuenare
not.
Lagopus
non est

Rostrium
porcinum
Apotematia
Heliotropium
Flos
Martii
Flos Gese
linus

Caput Monachi
Lactuca
pratensis
Lactuca
Giarum
Ocularia
radix.

Aphaca
Theoph.

Dens caninus

Ambubeia

Taraxacon.
Intyb. erraticum.

Intyb. sil.
Troximus.
Pauli.

Condrilla.
Vrinaria.
Pissenlit.
Gallorum.
Lectiminga.

Corona Mo-
nachi.

Herba Dia-
boli.
Solsequium
luteum.

Aphaca
Casalp.

Seris agre-
ssu.

Hedypnois
Dalech.
Flos canu.

C. Bauh. aut.

Locus &
tempus.

Lonicerus huius figuram habet lib. 9. cap. 71. sub titulo *hagcha fraut / vnde psaffenrolin / dicitur vocari Hieracium minus, officinis etiam Altaraxacon, Græcis Hedypnois.*

Fuchsius, inquit Anguillara, à quo Hedypnois (Plinio etiam Hedipnois dicitur eo quod suauiter dormire faciat, vel quod eius flos præter alias Serides suauiter admodum spiret:) huc Dens leonis inscribitur, Intybi erratici speciem alteram facit.

Fuchsius cum apud eam essem vocabat Intybum siluestre latifolium, Hedypnoim maiorem Plinii, Aphacem Theophrasti, *Intyb. sil. Pauli & Dionysii Vticensis* de re rustica.

Amat. in Diosc. lib. 2. enarr. 126. Secunda species Cichorii agrestis.

Dodon. gall. Condrilla altera. Lobel. in Adu. Vulgi Dens Leonis, siue Vrinaria. Vrinaria herba, pissenlit Gallis pueris dicta, quasi Lectiminga: alium namque suppressendo, obstructioneque referendo Meseraicacum, plus loti de re nat in vesicam, quam quantum pueruli retinendo sunt, præsertim inter dormiendum, eoque tunc imprudenter & iuuiti stragula permungunt. Siquidem mulierculæ mendicæ & pueruli rustici in pratis, prope tumulos aggerulosue Talpari terra semiohiura (veluti Endiuia cotingit) germina, eoque suauiora minus amara, candidiora effolla, in acetariis vorant, aut iuculis indunt. In Obs. Dens Leonis vulgi, Taraxacon, Corona & caput Monachi, Chondrilla Galeni Anguillara, Chondrilla altera Dodonæi: Idem antea quoque vocabat, Condriam alteram Dioscoridis, Dentem leonis Dodonæi, radice longa non rotunda. In Icon. Plant. Dens leonis vulgi, siue Vrinaria.

Gesl. hort. Hieracium minus, Hedypnois altera Plinii. In cat. pl. Hieracium alterum quod minus, tussis fraut [Herba Diaboli] Gæd sonenroibet (Solsequium luteum), Intybum syluestre.

Huius Cæsalpinus meminit, quando ait. Aphaca, cui innumera vulgo traduntur nomina, quæ lubens prætereo passim iuxta semitas, & circa oppida nascitur: &c.

Cronemb. de compos. medic. Seris altera agrestis, Plinii Hedypnois & eiusdem vt Theophr. Apha, Vulgo Dens Leonis. Lac. in Diosc. Dens leonis, Rostrum porcinum, Officinis Taraxacon. Turn. Intubus silu. altera, Theophr. Aphaca, Plinio Hedipnois.

H. Lugd. Hedypnois Dalechampi. Tabern. Icon. & hist. Dens Leonis, Rostrum porcinum, psaffenblatt / sauwüssel / hondsblum, Flos canum.

C. Bauh. phyt. Dens Leonis latiore folio: Item Dens Leonis angustiore folio. Habetur maior & minor. Quum Hedypnois foliis mirabiliter ludat & Cæsalpinus tantum dicat reperi angustioris folii: ego duas Dentes Leonis non facio: sed varietatem existimo.

Hedypnois siue Dens Leonis Fuchsi, vocatur germ. psaffen rolin / Rostraut / psaffenblatt / pippaw, mündtopff. Belg. papenkrust / hont roogen & schorftbloem. Causer bloemen, Gallicè Dent de chien, ou de Lion: ou pissenlit. Italicè Gruani, Radice, Girasole. Dent di cane & Pisci al terro. Patavii Pisso di can. Hisp. Dente de Lion. Angl. Ser de Lion, aut priestes cronene. Boh. Plosska.

Hedypnoim Plinij siue dentem Leonis vidi

Montepelii, Lugduni florentem toto anno, Patavij Februarii, vbi copiose crudam in acetariis edunt, Genæ florentem Februarii principio & Octobri, Basileæ Maio, Iunio, Iulio, Augusto, & Octobri inter portam stein & Eschen. Bisantij vocant des Pepes: Quædam Saga in Burgundia vocabat Craunulor, & falcinata allerebat eam falcinum tollere. Montelgardii frequens etiam in Horto E. C. spontè proueniens, florens April. Cæterum prouenit in hortis, in campis, prope sepes, & in ruinosis ædificiorum muris, quinetiam in vineis, pratis & viridariis.

In apostematibus ac ardentibus febribus nihil sanè vilius ac efficacius vsurpari meo quidem (inquit Tragus) iudicio potest aqua huius (Dentis Leonis) destillata, si ea singulis vicibus mensuræ trium aut quatuor cochlearium bibatur: hoc enim remedio punctori lateris dolores mitigantur, somnus accersitur, tussis aufertur vna cum inflammatione: optima collyria aduersus maculas oculorum ex aqua eius destillata sunt, quam succus idem possit, sed & vehementius & efficacius oculorum caliginem discendit: herba viridis extrinsecus imposita (quod & de linteolis in aqua madefactis intelligendum est) omnem inflammationem nigrarum & adurentium pustularum sedat, siue illæ pedibus, mammis aut genitalibus oriantur: quin & inflammationi membrorum medetur aqua destillata, in linteolis in ea madefactis ac impositis. Postremò solent & mulierculæ facies suas hac aqua abluere, vt maculas exterant, purumque & immaculatum vultum consequantur. Adstringit, roborat, atque abstergit, authore Matthiolo; magis quam vtrumque Cichorium. Cocta, stomachum dissolutum adstringit, cruda verò altum sistit: Eadem dysentericis auxiliatur, sed magis cum lente decocta. Succus potus prodest, quibus genitura effluit in aceto decocta, vrinæ tormina discutit. Vniuersæ plantæ decoctum potum scititiam tollit.

HEDIPNOIS MONSPESSVLANA, siue Dens leonis Montepell.



EX radice Descriptio
crassiuscula caules surgit palmatis, sculpturæ etiam cubitalis & bicubitalis, crassiusculus, concavus, paulò supra radicem in ramos tres, quatuor, aut quinque diuisus; quorum vnusquisque florem gerit vnicum magnus, odoratum, Hedypnoidis nostratis flori similem, calyce multo crassiore, pulchriore, piloso, è foliis multis compacto. floris folia extrinsecus rubescunt, cæteroqui lutea: tandem in pappos euanescent.

Plant. Icon. Condrilla prior Dioscor. Verrucaria

gatiâ Condrilla. Item post. Chondrilla altera Diofcor. Montpellierium Dens Leonis Asphodeli vel Leucacanthæ bulbis.


H. Legel. Quatuor figure vnius (istius Hedyn. Montpellier.) plantæ pro diuerſis & diſtinctis herbis exhibita apud auctoriâ habentur.

C. Bauhin. Phyt. Dens 15. Leonis Montpellieranus, Cichorium Conſtant Matthiol. Chondrilla altera Diofcor. Lob. Item Chondrilla 9. Verrucaria altera, Chondrilla prior Diofcor. Lobel. & Cluſ. Eandem plâtam duobus locis tradit Frater. **Quærit Lob. in Adu. Montpellierium Dens Leonis, Asphodeli, vel Leucacanthæ bulbis oblongis, an Condrilla altera Diofcoridis.** Item demonſtrare videtur minus conuenire Condri- læ alteri Diofcor. lectores locum perpendant: Huius, addit, facilis proventus in Heruriæ, Galloprovinciæ, & Narbonæ marginibus ſatorum & pratorum. Vires quas dicemus alibi opportuni- us, latuete noſtrum Commentatorem, qui hunc Dentem Leonis nouitat; & peregrinacis titulo iactat Conſtantinopolitanum Cichorium, cum tamen Siena illius patriæ, inque Heruriæ, Liguriæ, Galloprovinciæ & Narbonæ pratis non parum copioſum iſtud proueniat. Neque enim ſi flores, ſunt huic duplò ferme maiores magiſque pallentes, quàm communis, propterea putandū ſit ſœlicidius prouenire aut frequentius Cōſtanti- nopolim, quàm Maſilia, aut Monſpelii, vnde ſci- mus cum Commentatori, tum aliis non paucis Scriptoribus hodiernis miſſas & obtruſas pleraſ- que plantas pro Aphricis, Syriacis, & Conſtanti- nopolitanis. Sic res cadit pigris & ambitioſis inge- niis, quos res nondum vilæ oblectant, vt pueri picturâ capiant & decipiant. An putat per- itos illic iſtud Cichorium admiraturos, quia Cōſtantiopolitanum erat & à Cæſareo Orato- re miſſum? An non pudet tantum rei herbariæ ſcrutatore nonnulliſſe Cichorium patrium, & plus credere oratori occupato muneribus au- licis, quàm exercitati ad diſcendas varias ſpecies Seridis. Cluſ. hiſp. Condrilla prior, hiſt. poſt. Condrilla prior Diofcoridis legitima, nonnullis hiſpanis **Terna di S. Guyeria** nuncupata, quo no- mine & Phyllum ab illis vocatur.

Prouenit Monſpelii in pratis, nec non etiam in locis ficcis in iſtis muris vrbis, florens menſe April & Maio, & Autumnio vt Septembri. Habui in horto Genevæ, vbi totam hiemem pertu- lit. Inuenit eam Cluſius Salmaticenſi agro locis incultris, & multis aliis Hiſpaniæ Auguſto florēs, vel etiam ſeriūs.

HIERACIUM MONTANVM LACINIATO folio lanuginolo Cluſio.

EX radice obliquâ & rugoſâ, minimique digi- ti craſſitudine, multis etiam fibris donatâ, aliquot extuberant capita, vnde ſena aut plura e- naſcuntur ſolia, vnius, duarum & trium vnciarū longitudine, ſemunciam lata, craſſiore nervo per mediam longitudinem excurrente, mollia, breui incanâque lanugine prædita, inſimâ parte valdè laciniata & anguſtiora, ſupernâ verò latiora, ſed denata duntaxat, candido ſucco turgentia: de quorum medio, bini aut terni emergunt cauſi- culi, palmares, enodes, foris læues, intus conca- ui: ſuſtinentes flores luteos, floribus hieraci, alpini hiſtulo folio ſimiles, quibus tamen color paulò ſaturatior, ſemen maturum tenue, longi-



terni. hieracium 17.

C. Bauh. Phyt. Hieracium 13, laciniato lanugi- noſo folio, quod valdè conuenire tradit cum hieracio Lobelii foliis & floribus Dentis Leo- nis bulboli. Sed Lobelius pingit ſuum diſſerenti admodum radice & valdè hiſtutum, cum profun- dis laciniis vel ſegmentis. Gerard. hieracium 7, Cluſii, haude ſpæde.

Creſcit in leytenberg, florētque Iunio, hiera- cium montanum laciniato folio Cluſii. Proue- nit in altis Lorharingiæ montibus inter *Eſpinal* & Fonteneus, Tabern.

HIERACIUM NARBONENSE ROTVN- difolium caule aphylo, & Hiera- cium caule Aphylo hiſtutum.

Illud Monſpelio, ex rupibus illi vicinis euulſū, habuimus. Quod ſtatim à radice alatis pedi- culis longiſculis ſolia fundit octona aut dena, plus minus, rotundis, in ambitu exacutis, ſed in-



noxiis apicu- lis, veluti acu- leis, donata, læuia, ſapore maniſeſto de- tituta. E quo- rum ſinu cau- ſiculi iuncea bini exeunt, palmâ vix lō- giores, nudi, quales in Dē- te Leonis vul- gi dicto, quo- rum ſumma ſtorem ſuſtine- luteum, mino- rem quàm di- ctæ plantæ, ſed in elegantem pappum palli- dum ſachil- centes, qui multiplex ſingulos flocculos, ſed Lactucæ pedi- cello, ſuſtinet: ſemen exiguum, longum, ſed La- ctucæ minus, ſubruffum, ſtriatum. Saporem nul- lum maniſeſtum animaduertimus.

ſſſſ 4

tiſculum, nigrâ pappo inuolu- tum à vento abripitur.

Cluſ. Pannō.

Hieracium 7.

montanum la-

cinato folio.

hiſt. poſt. hiera-

racium 8. folio

Hedynoidis:

hieracium mō-

tanum lacini-

nato folio.

Tab. Icon. &

hiſt. hieracium

montanum an-

guſtiſolium fo-

liis Cichorace-

ceis. Berg ha-

bichſtrau mit

ſchmalen weg-

warten blatz

Deſcriptio

Deſcriptio

Hoc autem radice nititur fibras multas demittente, foris fusca, intus alba, quæ aliquando singularis, aliquando iuxta terram in plura capita dirimitur, tandem in vnam radicem coëuntia: per terram sparguntur *folia* semunciam lata, si uato, obtuso mucrone, lirsuta, coliculi



Locus & tempus.

pedales, scilicet pedales & cubitales, tenuis, striati, o-ramosi, hirsuti, inanes: *flor* Dentis Leonis ex hirsuto calyce.

C.B. Phyt. Hieracium 12. siue foliis Cichoraceis flore magno.

Genus pro-uenit passim in pratis florens Maio, Montbelgardi copiose maximè quoque, floret Iunio & Iulio.

HIERACIUM PARVUM HIRTUM caule aphylo, crispum ubi succatum.

Descriptio



& incana, scilicet unciam aut uncias duas longa, satis lata, diuisione Erucae purpureæ nobis dictæ, siccata crispa videntur, *radix* crassa.

A multis annis habemus Montspeli collectum Idem quoque attulit gener Cherlerus, & D.L. fac. Miege: diu durantiem existimo plantam.

HIERACIUM MONTANVM 6. Clusio angustifolium.

Descriptio

Radix, ita descriptente Clusio, digiti crassitudinem interdum æquat, longa, nigricans, tenuibus fibris prædita, summâ parte in plura nonnunquam capita extuberans, quæ summâ tellure fena aut plura oblonga *folia*, semunciam ferè

lata, & nonnihil incana proferunt: è singulis radicis capitibus, prodeunt inter folia, singulares *caliculi*, duri, nudi, dodrantes aut palmares tantum, vnicum *florem* sustinentes, è multis oblon-



gis extremo inter-icetis foliis, luteoque colore præditis, constâtem: quo defluente, *semen* oblongiusculum cum pappo leui aucta flatu exentitur. Aliud eius genus inuenitur, cuius folia nonnihil in lateribus laciniata sunt, ferè instar foliorum Leucoil marini, minus incana: *flor* aureo colore magis rutilat, alioqui per o-

mnia simile. Vtriusque planta lacteo succo plena, & amariuseulo gustu est.

Clus. Pann. & hist. post. Hieracium montanum 6. Tab. Icon. & hist. Hieracium montanum 2. Berg habich fraur mit schmalen bleterren. Hieracium 16. Gerard. Hieracium 6. Clusio, hanc se recede.

C. Bauh. Phyt. hieracium 20. folio oblongo nō Synon. dissecto. huius & altera species, foliis nonnihil laciniatis, minutæ incanis habetur. Cam. hort. hieracium Pannonicum 6. montanum.

In omnibus illis montibus à Calenberg Danubio imminenti ad Alpes excurrentibus nascitur Hieracium hoc sextum Clusij. Floret Maio. Crescit in montibus Alfatæ non longè ab arce montana fönig stein/quæ itur feldberg, Tabern.

Locus
Tempus

CICHOIRVM BVLBOSVM

Descriptio



VTrarum ita pulchrū est Cichorij genus, innumeris fibris tenuibus longè latèq; pectèptas, quibus appensi bulbi, Auellanz circiter magnitudinem, Alabastritis marmoris candore, solidi; *folia* scilicet unciam aut uncias duas longa, semunciam latiora, leuiter sinuata, glabra, in obtusum mucronem desinentia, crassiuscula, rubescencia: inter hæc surgunt *caliculi* palmares hirsuti; quorum fastigijs *flor*es infident Hieracij, lutei, in pappum euanescentes: hæc

Hæc planta amara est & lacteum succum habet.

Histor. Lugd. Cichorium strumosum Miconii: A foliorum forma vocatur Cichorium, strumosum verò ab effectu & forma radicis, quæ strumas refert & sanat. Quam ob causam Barcinone, ubi frequens oritur, Porcellanes vocant, quasi dicas strumofam.

Condrellæ Lobel. in Adu. & Icon. Plant. Condrellæ pusilla marina lutea bulbosa, an Dioscor. radice rotundâ orbiculatâ Strongyle: & an Theophr. Cichorium, Perdictionæ.

An Hamorrhoidalis Casti C. Bauh. Phyt. Chondrilla 10. siue bulbosa marina. Cichorium bulbosum Dalechamp. hist. Lugdunensi. Item Chondrilla n. siue Cichoriū strumosum Myconii, multum similitudinis habet cum prædictâ, folio minime per ambitum serrato. Hoc videtur, Casti. Dur. Hemorrhoidalis nomine velle exprimere.

Locus & tempus Per arenam serpi, floret mense Aprili prope montem Seti ad mare. Bulbi Montepelio à Genaro Cherlero allati & Montbelgardii in horto Ill. E. C. lati pulchrè quidem folia genuerūt, insigniter repentes: in maritimis alioqui & luncetis, vnde maximo labore euulsit scum inter radices luncorum penitus ferè delitescant] obseruatur.

Vires strumæ Radicem istam globosam ad strumas curandas multum cõferre se experimẽto didicisse Myconius apud Historiam Lugdunensem asserit. Quinque aut sex integræ cum melle sumptæ multis diebus continuis mirum in modum profunt. Eadem præstat aqua stillaritia, vel decoctum, sed inefficacius: item conditum ex iis cum melle paratum admodum iuuat. Quare, vti dictum, hanc plantam Myconius Cichoriū strumosum à forma & effectu nuncupauit. Radices, quas scrophulis mederi ait Cæsalpinus, sumuntur ex melle, vel cum farina Triticea in placetis, vt vinum vetus superbibatur ieiuno ventriculo mane & vespri: nam elicit sudores, & strumas in collo discutit.

Aqua stillaritia Radicem istam globosam ad strumas curandas multum cõferre se experimẽto didicisse Myconius apud Historiam Lugdunensem asserit. Quinque aut sex integræ cum melle sumptæ multis diebus continuis mirum in modum profunt. Eadem præstat aqua stillaritia, vel decoctum, sed inefficacius: item conditum ex iis cum melle paratum admodum iuuat. Quare, vti dictum, hanc plantam Myconius Cichoriū strumosum à forma & effectu nuncupauit. Radices, quas scrophulis mederi ait Cæsalpinus, sumuntur ex melle, vel cum farina Triticea in placetis, vt vinum vetus superbibatur ieiuno ventriculo mane & vespri: nam elicit sudores, & strumas in collo discutit.

Placenta Radicem istam globosam ad strumas curandas multum cõferre se experimẽto didicisse Myconius apud Historiam Lugdunensem asserit. Quinque aut sex integræ cum melle sumptæ multis diebus continuis mirum in modum profunt. Eadem præstat aqua stillaritia, vel decoctum, sed inefficacius: item conditum ex iis cum melle paratum admodum iuuat. Quare, vti dictum, hanc plantam Myconius Cichoriū strumosum à forma & effectu nuncupauit. Radices, quas scrophulis mederi ait Cæsalpinus, sumuntur ex melle, vel cum farina Triticea in placetis, vt vinum vetus superbibatur ieiuno ventriculo mane & vespri: nam elicit sudores, & strumas in collo discutit.

PILOSELLA MAIORI FLORE, SIVE vulgaris repens.

Descriptio



re exsiccante: flores, Dentis leonis minores, lutei, Matthioli. are, eximie foris purpurascensibus, calyce hirsuto, fulco, qui maturecentes in paposam lanuginem euolant. Radices numerosæ,

tenuis, sed humi pertinaciter hærentes.

huius notissima herba non meminisse nec nomen vllum ei indidisse Veteres aiunt Herbarii, quam Recentiores Pilosellam appellant à copiosis pilis, quibus tum cauliculi, tum folia vestiuntur.

Minima quædam Intybi species hæc est, inquit Cordus, quod ex floribus formâ, colore, & lacteo foliorum liquore facile colligitur, similiter ab omnibus (vt Dioscorid.) Auricula muris vocata, etiam Germanis quibusdam & Italis Pilosella.

Nomina Meißhor & Nagelfraut sunt quidè Pilosellæ, quam picturâ exhibet Apollinaris: verum vires, quas adscribit, sunt vtriusque Anagallidis: caueant igitur Lectores, ne cum Apollinari hæc duas plantas confundant.

Brunfels. Tom. 3. Rhapl. 45. & in quarto p. 271. Auricula muris. Sed Auricula muris (teste Hieron. Brunsch.) non est Latinorum Pilosella: quâuis tamen Tignus hanc lib. 1. cap. 71. describit & depingat sub nomine Auriculæ muris minoris.

Sed & Theod. Dorst. iconem Pilosellæ proponit hac inscriptione. Auricula muris, *muos & os*, Pilosella.

An Fuchs. hist. cap. 6. de hoc loquitur cum ait. Auriculam muris pro Anagallide qui depictam ostendunt Herbarii, errant. Vt & qui Pilosellam alio nomine Auriculam muris appellari tradunt.

Casti. Dur. Cæsalp. Camer. in Epit. [cui in hist. Matthioli. ger. n. Pilosella minor. j & Matth. in suis comm. Pil. sellæ.

Quidam, inquit Lacuna, existimant, Pilosellâ esse holostium, sed non est: est enim Holostium legitimum incognitum: existimo speciem esse alicuius Graminis. Matthioli idem statuit, & postea in post. Comm. cum ann. C. Bauh. sibi ipsimet contradicit, ô labilem viri memoriam!

Lonic. lib. 5. cap. 75. figuram bonam Pilosellæ maioris fuchii habet, titulo Fle n Neusöhr / Nagelfraut / & præterea aliam paruum quæ nō placet, nec etiam descriptio.

H. Lugd. Pilosella maior Matthioli.

Tabern. in hist. Pilosellam primam: in Iconi. Pilosellam & Auriculam muris cognominauit: C. Bauhin. Phyt. Pilosella i. siue maior repens hirsuta. Thallio. Pilosella media, Auricula muris vulgi. H. Luf. Pilosella vulgaris, Auricula muris.

Pilosella maiori flore, siue repens vulgaris vocatur Germ. Meißhörlin / Nagelfraut. Gall. Pilosella, Oreille de rat ou souris. It. Pelosina, Auricula di topo. Belg. Nagel cruyt / Muysfoor. Gallo-Belg. Peluette & Veluette. hisp. Piloselle Boh. Chlupateck. Sclauon. Musch Czermony a mudny. hung. Egér fil.

Nascitur extenuato & arido solo, in collibus & incultis locis, & agtorum herbidis limitibus. Maio & Iunio mensibus potissimum floret.

Amarum lac secta planta mittit: id quod extenuantis atque abstergentis indicium est facultatis, inquit Matthioli. Tota Pilosellæ planta vehementer adstringit, glutinat, cohibet, refrigerat, siccatur: quapropter huius rei non ignari pastores maxime cauent, ne ouium greges in illis pascuis immorentur, vbi huiusce plurimum gignitur: quandoquidem depascentes oues tantâ alui adstrictione afficiuntur, vt inde facile emoriantur. hinc didicerunt Medici, eam mederi dysentericis, & vteri profluuiis: quin & ex vino austero potam vulnera glutinare, tam scilicet exteriùs, quam interiùs, illatam, cæliacique magno è auxilio, & biliosis vomitionibus: cruentis item

Synonyma
Pilosella
Erymon.

Intybus
minimus

Apollinaris
eror

Auricula
muris
Brunfels.
not.

Dorst. not.

Pilosella

Lap. us
muscorum.

Lonic. not.

Nomina
linguarū

Locus &
tempus.

Vires
ex Matthioli
& alius

Gregi no-
xia.

Dysenteria
Vulnere

Fractura.

Morbum
regium.Foliorum
succum.
Vlcera.
Pulsio.

spuris, enterocelis, & omnibus in vniuersum fracturis opera ferre, sed præcipue caluarie. Non desunt etiam è recentioribus qui eam maximè commendent ad ramicem, vuluæ relaxationem gargarizatu, ad locinoris & splenis affectus, nempe ad regium morbum, incipientem hydropem, & lienis tumores, quod viscera hæc roboret. Additur quoque vtiliter in potionibus intrinsecorum viderum, & in vulnerarijs emplastris, atque vnguentis: foliorum succus non solum recentia vulnera glutinat, sed vlcera quoque contumacia, phagedenâque sanat: & præsertim oris, & pudendorum. Succus decoctumque aciem ferri vel chalybis sæpe merfam indurat.

Huic autem non abssimilis, sed multò maior Camerario alia Pilosella maior cauliculis non ramosis flore magno, quam etiam describit Frater.

PILOSELLA MINOR FOLIO angustiore, minùs piloso, repens.



Insigniter reperit & hæc: folijs per terram spatiosis, angustioribus minoribus, tam infra quàm supra glabris, si raris quosdam pilos in aduerso folio stros excipias, quorum inferiora subrotunda, superiora longiora: caules proceriores, interdum cubito altiores, non sine folijs, in aliquot pediculos circa fastigium diuicati, ubi flores duo, tres, quatuor, lutei vt alterius sæl minores.

Lactucella
sila.

Camer. hort. Lactucella Sylu. repens, ambigens inter Hieracium & Sylu. Lactucam: amara. C. Bau. Phyt. Lactuca 14. Lactucella Syluestris Camer. Item Pilosella 2. siue maior repens glabra: Auricula muris minor Tragi, secunda. Pilosella maior Camerarij. An Horto Lus. Pilosella maior altera, Groß Meußörtlin.

Passim in syluis prouenit, florens mense Maio & Iunio.

PILOSELLA MINORI FLORE Hirsutior & clatior non repens.

Descriptio

Fibrosa est huic radix, turgens lacteo succo acris & amaricante, reptatu fibrarum non se propagans, nec humi procumbens, sed Hieraciorum more, nonnunquam ad bicubitalem altitudinem excreuit in plures caules modicè hirsutos, interdum hirsutissimos, maximè verò parte inferiore, cui folia quædam adnata admodum angusta, vncialia, quadrantalina & palmaria: latiora verò sunt & paulò longiora nonnunquam quæ à radice statim oriuntur, sapore subdulci, nullâ eccellente adstrictione, quæ lac manant sicut & caules, qui



propè summum cacumen in aliquot furculos quadrantales & sextantales diuiduntur, hique rursus plures breues hirsutos pedicellos promunt, quorum singulis singuli insident stoculi, Hieracij alicuius, lutei, pleni, calyce ambitu striato, lanugine nigra oblitto.

C. Bauh. phyt. Synon.
Pilosella 3. siue maior erecta, quam si quis ad

Hieracia referre malit, non cum eo contenderit. Taber. inquit, videtur eam voluisse exprimere in Hist. & Icon: nòmine Pilosellæ maioris alterius. Imò nobis non videtur voluisse, sed expressit. Verum quidem est, quod ea melius pingi potuisset. An Horto Lus. pilosella maior altera Groß Meußörtlin.

C. Bauh.
met.

Pilosella hæc prouenit in muris circa Montebelgardum. Basilcæ collegit Frater in syluis, Patavio etiam attulit.

Locus.

AVRICVLA MVRIS HISPANICA, alys Hieracium Pannonicum flore saturatè croceo.



Vldim? an- Locus.

no 1608. in horto Stutgardiano Ill. Principis, & horto Fontis admirabilis, plantam à nobis hæcenus nullibi obseruatam, quæ sane speciosa nobis videtur è genere pulmonariæ Gallorum, quæ quibusdam pilosella dicitur. Hæc autem vocant Auriculam muris. Ei radix est fibrosa purpurascens amara, manans

Pulmonaria.
Pilosella.Auricula
muris.

Radix.

succo lacteo, ex se emittit climata instar pilosellæ maioris Fuchij & Consolide mediæ, quæ radículas albas in terram defigant, ac ea ratione plurimum se multiplicat & expandit: folia ei primò vncias duas longa, postea palmo longiora, potissimum quæ ex caule prodeunt, ea similitudinem quandam habent cum quadam Scabiosa syluatica, maiora latitudine vncias duas excedunt, quædam habent in margine veluti denticulos longis spatij dispositos,

positos, non nihil sunt aspera, potissimum superio-
re parte, inferiore autem neruola, vtrinque co-
piofi pili: *Caules* ei cubitales & sesquicubitales,
qui horrent pilis nigris longis, per caulem tria
folia, inferiora maiora, superiora minora, & in
his denticuli maiores, à principio caulium maio-
rum oriuntur minores palmares vel pedales, si-
cuti etiam inter folia caulium, quæ rara: ramu-
li singulares: in extremitatibus copiosa *capitula*
florum ex breuibus pediculis prædictæ Pulmo-
nariæ similibus: calyces siue foliola hirsuta pilis
nigris: mense Maio, in medio solus flos, qualis
prædictæ herbæ vel Hieraciorum se expandit: Colore
insigni quasi Arantiorum non bene ma-
turatorum, in medio apices plurimi lutei bifidi:
folia floris in circuitu, qualia Calthæ, denticula-
ta, siue crenata: Vbi flos vnicus euauit in fine
Maii multi simul florent, & veluti vmbellam
exhibent: odor paruus ferè Hedypnoidis siue
Dentis Leonis: Excidunt flores remanentibus
calycibus, in quibus pili & semina, tenuia, longi-
tuncula fusca, semina matura vidi Iunio.

CHONDRILLA FOLIO NON DISSECTO,
caule nudo & foliato.

Descriptio



Radice firmatur
longa, crassa,
lacteò succo
turgente, in
capita aliquot
diuisa, *folia* e-
mittente mul-
ta, palmaria
& longiora,
semicla, plus
minus lata,
Plantaginis
tenuifolia foliis
similia, a-
cuminata,
glabra, crassa,
Chondylle
cerulea in-
star, eiusdem
penè coloris:
caules frequen-
tes iuncea,
dodrantes
siue pedales,
glabri, fugosi,
foliis pluri-
que nudi, no-
nunquam fo-
liati, in binos
ramos vt plu-
rimùm didu-
cuntur, quorù
singulis *fls*
inludet vnus,
magnus, lu-
teus, in pappo
euauescens,
quibus *semina*
adherent te-
nuia, longa,
striata, & ruf-
sa, per matu-
ritatem parù
mihì constat



cuius coloris, ex sicca hanc potissimum descripsi.

Condrillæ speciem aliquando seui, herbam à
me inuentam florere Iunio circa Curiam Rhe-
thorum ad Rhenum. Valerandus Dourez hanc
eandem aliquando mihi dedit pro Chondrilla
ex Syria allata.

Locus &
tempus.

SENECIO SIVE ERIGERON VETERIBVS.

CAP. VIII

Senecio tametsi non fundat Lactem succum,
Stamen inter Lactarias stirpes cum recensere
placuit, propterea quod semen non illius vt ea-
rundem in auras euascat. Cùmque sit vulga-
tissima herba, nihilominus diligentius eius histo-
riam profecutus est Dioscorides, quam vel Bals-
ami, Cinnamomi, vel Garyophyllorum. Descriptio
igitur Senecionis, apud eum hæc se habet.

Senecio, qui Latinis aliter inter Dioscoridis
northa Herbulum, aliis Erechthites dicitur, *cauli-
culo* est cubitali, subrubicundo, *foliis* crebris &
Erucae modo per extremitates diuisis, sed mino-
ribus multò: *floribus* in luteum vergentibus, qui
quidem citò dehiscunt ac deflorescentes in pap-
pos abeunt. Atque inde etiam Erigerontis no-
men Senecio apud Græcos inuenit quòd Vere
fiores capillorum ritu canescant. *Radix* est su-
peruacua. Nascitur porro maximè in maceris &
circum oppida.

Herbulum?

Erechthites

Eruca fo-

lio

Erigeron à Græcis, quæ à nostris (inquit Plin.
in cod. vet.) Senecio vocatur, herba est Trixage-
nis specie & mollitia, cauliculis subrubicundis:
nascitur & in regulis, & in muris. Nomen hoc
Græci dederunt, quia Vere canescit. Caput eius
numerosa diuiditur lanugine (qualis est spinæ)
inter diuisuras exeante. Quare eam Callimachus
Acanthida appellat, alii pappum. Nec deinde
Græcis de ea constar. Alii Erucae foliis esse dixe-
runt, alii roboris minoribus multò. Nec desue-
re qui & alterum genus facerent, nec quale esset
demonstrarunt. *herbarum* Theophr. inter olera &
Intubacea numeratur 7. hist. 7. diutius florens, in-
ter hyberna prorumpens post Aphacam.

Erigeron

Plinis

Trixagena

specie.

Acanthis

Callimachus

chi

Folii Ga-

rietæ

Genus a-

liud.

Cæterum, Senecionis nomine sequentes do-
nauius plantas. Primò quidem Senecionem
vulgarem, quem Etygeronem verum sine Senecio-
nem credimus. Senecionem alterum hirsu-
tum, viscidum, maiorem, odoratum. Senecio-
nem folio non laciniato. Senecionem siue Eri-
geronem caruleum, aliis Conyzam ceruleam.
De his mox ordine agemus hoc libro. Senecio ma-
ior, inquit Tragus, verè appellari potest flos S.
Iacobi & pro illo usurpari tuto potest. hic flos à
nobis Iacobæa inscribitur lib. 25. De Senecio-
ne marino siue Iacobæa marina agemus libro
iam dicto. Senecionis nomen tribui Carduo
benedicto apparebit ex Trago lib. 26. c. de Car-
duo benedicto. Recentiores, teste Cordo, Si-
ymbrium Cardamine, siue Nasturtium aquaticum,
maximo errore Senecionem vocant, vt videre
est lib. 28.

Synonyma

Senecio

vulgaris

siue Etygeron

senecio

hirsutus

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

senecio

SENETIO VULGARIS SIVE ERIGERON.

Fibrosa partimque lignosa radice nititur Sene-
cio, tenui, albâ, subpurpurea, sapore olera-
ceo, ex quâ attolluntur caules terni, quini, & plu-
res, teretes, striati, hirsuti, brachiati, & concaui,
foliis donati vncialibus & longioribus, pediculo

viduis, hirsutis & veluti circumrosis, alterno positu nascentibus: flores in ramulorum fastigijs plures simul iuncti, pediculis breuibus lanuginosis appendi, tanquam itaminum luteorum complexus, qui in pappi celeritè facientes cum ventis feruntur, *bisfe autem* ambiunt inuoluta calycum instar, striata, basi squammulis atro mucronatis compacta.

Synon. Brunfels. Tom. 2. in Diosc. lib. 4. p. 124. Erigeron siue Senecion herba quâ hodiè in acetarijs vtuntur: alias Herba petrella.

C. Bauh. apud Matth. & in Phyt. Senecio minor: Verberna fœmina Brunfels.

Trago dicitur Senecio, Senecio i. vulgaris. Is malè, meo quidem iudicio, Erigeron Dioscoridis & Aphacam Theophrasti ad vnum genus refert & omnia ea de Senecione intelligit quæ Theophrastus de Aphaca prodidit. Nam & ipse Theophrast. Erigeri expresse meminit. Quod verò Simonis Ianuensem Carduum benedictum Erigerum appellansem manifestè errasse scribar, sicut & illos, qui Nasturtium hoc nomine vocent, à veritate minimè alienum est.

An Io. Agricola Ammonio in Nicol. Alexand. in suis paralipomenis Carduncellum, quod vulgus Omnium mensium florem, Germ. Ziser Monnar blumlin vocare tradit.

Synon. Dodon. gall. Erigeron secundum, Senecio minor (& hoc titulo etiam à Castore inscribitur.) Lat. in fol. Erigerum minus: Erigeri species altera seu minor. Lob. in Adu. & Icon. plant. Gesnero de hort. Tabern. Ic. & Hist. Th. lio & hort. Lul. Senecio siue Erigeron. Camer. hort. Senecio vulgaris. Apud Eustachium. Roesslin Senecionis figura malè adaptatur capiti de Caputia. Ponitur à Georg. Pict. in annot. in Æmil. Macrum cap. 47. de Senecione figura Nasturtij aquatici non benè & præter Æmilij sententiam. Senecio Matth. Lac. Fusch. (cui omnes notæ Dioscoridis respondere videntur.) Turn. Corn. in Diosc. H. Lugd. Camer. ad Hist. germ. & Epit. Matth. & Cæsalpino.

Senecio vulgaris siue Erigeron vocatur Græcè *ἑριγέρων*. Germ. *Creutzwort*, *Grundkraut*. Belg. *Cruyscrut*, *Grimferuyt*. Gall. *Sen. con* aut *Sen. f. m.* It. *Spelticiosa*, *Cardoncell.* Patav. *Verzolo*, alibi *Sulaxom*. Hisp. *Bon Varon*, *Cardo morto*, & *yerua cana*. Ang. *Grounfell*. Boh. *Prmetue* Fornuy. Hung. *Aggo* f. u. / *Konto* f. u. Nomencl. Pannonico. *ἑριγέρων* quidem quasi vernus senex, quod flores capillorum ritu vere cauescant & in lanuginem abeant: vnde Latinis Senecio.

Nascitur maximè in maceris, parietibus, & circum oppida. Montbelgardi passim spontè prouenit in hortis, veluti in horto E. C. tota hieme & æstate viret. Florentem vidi Vere & Autumno Montpelij. Basileæ in hortis & alibi Octobri & Maio, Genevæ Nouembri & Ianuario. In monte Rosberg propè Mafmunster florentem Octobri, Parauij Ianuario & Februario.

Folia cum floribus, auctore Dioscoride; refrigerandi vim habent: proindeque illita cum vini modico aut etiam per se folia, testium & sedis inflammationes sanant: quin & ex manna thuris cum reliquis medentur vulneribus, tum ijs quæ neruis inflicta sunt. Illici quoque pappi per se cum aceto, idem præstant: verum recentes epoti strangulant. Totus [ver. hac postrema] periodo caret: autem caulis si ex aqua coctus cum multo potui detur, stomachi dolores à bile contractos per sanat. Erigeronem, inquit Plinius, si ferro

circumscriptam effodiat aliquis; tangatque eundem locum, & alternis ter despuat, ac reponat in eundem locum, ita vt viuat herba, aiunt dentem cum postea non doliturum. Doloribus Erigeron ex aceto illinitur. Cætera quæ habet ex Dioscoride mutatus est.

Galenus contentus dixisse Senecionem vim mixtam, refrigerantem, simulque moderatè discutientem habere, reliqua velut in herba nota omittit. Cum autem herba euidenter sit amara, vt sicet, abstergat, aperiâtque necesse est, quare nil mirum fuerit teste Matthiolo, si fœmina Epoto foliorum succo, aut totius plantæ decocto, remorantes menses sibi prouocent, abaniculis edoctæ. Senecionem herbam suppurationem accelerare prodidit Fontanus: Cæsalpinus folia recipi in acetaria.

Ex Galen.

Menses suppurationis acetaria.

SENECIO HIRSVTVS, VISCIDVS, maior, odoratus.



Perinde vt Descriptio Senecio vulgaris, radice nititur fibrosa: folijs donatus similibus similiterque incisis, sed lanugine vndique obstitis, ideoque nonnihil incanis, insuper tactu viscidis, mollioribus & foetidis: caulis erectior, procerior, hirsutus, quemadmodum & florum luteorum in pappos abiturorum

calyculi striati. Planta nonnihil sapore aromatico, figura aliquin hic posita minus placet.

Trago lib. 1. cap. 50. Matricaria sylvestris, Matricariæ siluestre genus. An eadem dicto libro c. 96. Senecio secunda maior?

Dodon. Gallico Senecio maior: at in fol. Erigerum tertium, in Cichoraceorum ac Inrubaceorum familiam reponendum, foetens nonnihil, vnde Cichorij foetidi à nonnullis appellationem adeptum est: sed quod cum Aphace herbæ Theophrasti conuenire videtur.

Lob. in Obs. & Ic. Plant. amborum meminit, pingens Erigerum. Dodonæi hoc titulo: Erigeron tomentosum. Primum verò siue maius Dodonæi, in Icon. Erigerum tomentosum alterum.

Cæsalp. Senecionis species altior, & in omnibus maior. Gesn. hort. Senecio foetidus.

Clus. Pannon. Iacobæa Pannonica i. mollior. Hist. post. Iacobæa Pannonica prima, quibusdam Senecio foetidus dictus, sine icone.

Taber. Hist. inter nomina Artemisiæ 3. genus, Geeler wetterig / & milder Nitthram / Matricaria lutea, & Matricaria silvestris.

H. Lugd. 1. 5. cap. 18. Senecio foetidus Dalechampii, quibusdam Artemisia foetida, Sideritis quæta Plinii nonnullorum. Lectorum erit considerare an hic Senecio foetidus non sit eadem cum Senecionis

Matricaria sylvestris. An Senecio maior Trago?

Senecio maior.

Erigerum, Cichoreum, Inrubum, Cichorium foetidum.

Erigeron tomentosum. Senecio foetidus.

Iacobæa Pannonica. Clus.

Artemisia, Matricaria lutea, Sideritis 43.

Plin.

H. Lugd. noxatur.


nectionis specie Dodonæi, cuius figuram hoc eodē capite 13. histor. Lugdunenſis ponit, quaſi eſſet diuerſa planta, annon etiam Erigeron tomentolum Lobelii.

C. Bauhin. Phyt. Senecio 2. ſive ineanus pinguis, Erigeron 1. Dod. gall. Erigeron alterum tomentolum Lob. icon.

Creſcit iacobæza Pannonica 1. Cluſii in Pannonia & Aultriaz caduis ſiliis. Floret Iunio & ſemine decido quorannis ſpontē renaſcitur, variis in locis obſeruauit, & habeo in Horto Ill. E. C. ſemine maturo Auguſto & Septembri. Fuchſius præceptor meus cū apud illum eſſem vocabat Arthemifiſam monoclonon Germanicam.

Matricariæ ſilueſtris Tragi ligna in ſiliis caduis ex ordine compoſita incenduntur, vt ignis calore terra ſationi frugum idonea reddatur.

SENETIO FOLIO NON LACINIATO.



Herba eſt cubitali altitudine, radicibus tenuibus, candidis, lignoſis, dulcibus: caule aliquantiſper piloſo, rotundo, cauo, medulla lanuginosa farcto: in quo folia ſunt exigua, piloſa, in ambitu ſerrata, craſſa, aliquantulum viridia, inferne ruſcent a, quæ quandoque colore vinoſo manus

inſciunt: In caulis ſummitate ſtores ſunt lutei, in pappoſ protinus abeunt. Sapor totius plantæ aqueus eſt, vt vulgaris Senecionis. Naſcitur in quercetis, locſque non admodum ſiccis, ſed humidis interdum & in pratis.

SENETIO SIVE ERIGERON CÆRVLEVS, alius Conyza cærulea.

Senecio hic ſubinde magnitudine, ſæcilius aut inſecilius ſolum naſtus, variat, alias ſeſquipalmaris, alias pluſquam dodrantalis: radicibus fibroſis, albicantibus, guſtu nonnihil aromaticis: ex quibus cauleſ ſurgunt multi, tepues, ſtriati, rubentes, hiriſti, ramoſi, medulla alba pleni: folia integra, nec viſquam diſſecta crenataſe, lanuginosa, inferiora quidē vncias ſerē duas longa, ſemunciam lata: ſuperiora vt breuiora ita anguſtiora, vtraque ſapore acri & aromatico: capitula quā in Senecione vulgari longē craſſiora, canaliculata, tomentosa, nonnihil rubentia: ſtrobili ſoliola dilutior purpura tincta ſunt, medium obtinente pappoſ tomento exalbido in luteum vergente.

Trago lib. 1. cap. 49. Tinctorius ſloſ alter (in Hiſtor. germ. das ander ſchæren blumen geſchlecht Schæren Germ. dicta.) Tinctorii ſloris genus alterum, primò (Aſteri atticò purpureo)

Tom. II.



tis, ex obſcuriore rubore ſubnigricantibus: foliis anguſtis, paucis, mollibſque: ſtoſculis in ramulis eminentibus, pallidē luteis, citiſſimē ac non modò eodem die, ſed ſæpè intra horæ ſpatiū in pappoſam lanuginem abeuntibus. Geſn. in ſine Hiſt. Cordi Conyzoides cærulea, heydnitſch wundtſtrant, (heperæſtra dixeiſ.) Dentellaria quorundam. Eidem de hort. Dentellaria noſtra, Conyzoides quædam herb. 1.

Tabern. icon. Conyza cærulea: Hiſtor. Blam. Qürtourz. Cur Tabern. non ampliſ Conyzami appellat?

Quin eſſem Tubingæ Fuchſius vocabat Conyzam minorem.

C. Bauhin. Phyt. Conyza 14. ſive cærulea.

Floſ tinctorius alter Tragi in tractu Rheni in quibuſdam pratis, Iuniperorūque nonnullis colliculis ac montibus prouenit: Iulio & Auguſto menſibus colligitur, poſtea que venundatur, qui tinctoribus tantū in vſu eſt. Erigeron 4. Dod. lat. ſive 3. gall. in viginofis ericetis, quadoque in ſiliis macro & ſterili ſolo naſcitur. Senecio ſive Erigeron cæruleus, ſive Conyza cærulea etiam multis in locis prouenit, circa Montebelgardum.

ASTER EX VETERIBVS.

CAP. IX.

Aliquibus inter notha Aſterifcōn, ab aliis Bubonion, à nonnullis Hyophthalmon, à Dacis Rathyvida, à Romanis Inguinalis herba vocatur) eſt virgultum lignoſum (καλὴν ἑυαλὴν, virga lignoſa rubra) vet. caulis lignoſus Marcell. ſtrobiliſ habens in cacumine purpureum, aut luteum (ανθοειδὴς καὶ ὑψηλὴ) Anthemidis capituli modo diuiſuris inciuſum per ambitum (ἀνθηδὴς vndique malixide vet. Quidam ἀνθηδὴς καὶ ἑυαλὴν) ſolioli ſtelle modo radiati. Quæ verò caulem circundant folia, oblonga ſunt ac hiriſta (vet. aliqui tota ſequenti periodo carent ſive ad Prodeſti, a pūcū.) Exeſtuant ſtomacho, oculorum & inguinum inflammationibus, ſedique præciua illiſ auxiliatur. Aiunt & id quod in

T t t

flore purpurascit ex aqua potum, angina laborantibus, ac plerisque comitialibus opitulari. Prodest verò flos recens ac etiam dum humidus, inguinum inflammationi adhibitus. Si verò aridus sinistra laborantis manu decerpatur, & inguini adalligetur, dolore liberat. Posteriorum Græcorum reliqui addunt: Nasci inter petras, locisque asperis, ac stellares huius radios noctu splendere &c. quæ cum superstitiosi aliquid contineant, nec in antiquissimis optimisque inveniuntur, ut minimè Dioscoride, tenemus.

Aster, inquit Plinius, ab aliquibus Bubonium appellatur, quoniam inguinum præteritaneum remedium est: cauliculus foliis oblongis duobus aut tribus: in cacumine capitula stellæ modo radiata. Bibitur aduersus serpentes. Sed ad inguinum medicinâ sinistra manu decerpi iubent, & iuxta cinctum alligari. Prodest & coxendicis dolori ad illigata. Sic Plin. lib. 26. cap. 5. euarians aliquantum a Dioscoride, qui de serpentibus & coxendicis dolore nihil habet: sicut Plinius, de oculorum inflammatione, anginis, & comitali morbo nihil tradit.

Diosc. Scra
leão.

Περὶ τοῦ ἁστὸς ἡ μέλητος legunt Serapio, Orisbafius, Ruellius, Cornarius, & Anguillara. At Cordus, Marcellus, & Matthiolus, loco distinctiue particule, ἡ, copulatiuâ, &, reponunt. Existimant enim idē genus Asteris hic describi, quod floris foliola, quæ quidem capitulū ipsum ambiunt, habeat purpurea, medium verò capitulum luteum. At Sarrac. & rectè nostro iudicio duo Asteris genera floris colore distincta depingi existimat, quorum vnum illa eadem floris foliola habeat purpurea, alterum lutea: nam in utroque genere quod medium floris locum tenet, citra controuersiam melinum seu luteum visitur.

Inguinalis
herb.

Foliorum in flore Inguinalis herbe numerus, positura, & forma, quibus stellæ modo radiatur cognominem stellis, vulgarem alioquin & in sepius nascentem herbam fecerunt. Vfus deinde medicorumque cæcis vtilem inguinibus cognitam in græcis Bubonium, in Latinis Inguinalem. Atticus autem Aster, quod ibi frequentior quàm alibi prouenire creditus sit, appellatur. Huopthalmum etiam quidam vocauerunt hanc plantam, quasi Suis oculum, quod totus eius flos animalis illius oculum referre videatur.

Bubonium
Huopthalmos.

Stellaria
nomen equi
notum
Carduus
stellatus.

Asterem Atticum Herbarios hodie partim Aspergelam vocare, Germ. verò *Sterntraut*, autor est Cornarius. Nunc, quod monendum videtur, Asterias siue Stellaria nomen est multis plantis commune. Hoc enim nomine donantur Bubonium, Coronopus, Alchymilla, Cardui genus Theophrasti, Myacantha (Carduus nostras stellatus siue Calcitrapa, de qua lib. 26.) Perdicis quoque alterum genus à Plinio astericum quasi stellare nominatum. Præter has omnes sua est Montpellierensibus Asterias siue stellaria, quæ à nobis inscribitur Rubia parua caruleo flore, de qua lib. 36. H. n. g.

Æquinoct.

Asterem Atticum esse censet Virgilianum Amellum Matthiolus, de eo dubitat merito Gesnerus, cum adhuc sub iudice lis sit, aliis affirmantibus, aliis verò negantibus, de quo ille ita Georg. 4.

Est etiam flos in pratis cui nomen Amello
Pecore Agricola, facitis querentibus herba:
Namque vno ingentem tollit de cespite stylum
Autens ipse, sed in filiis, quæ plurima arcam
Fundantur, viola sub luce purpurea nigra.
Præter nostros Asters, quorum magnam conquisimus varietatem, quosque mox ordine re-

censebimus, plantæ aliæ occurrunt non paucæ, quibus Asteris nomen ab aliis inditum.

Conyza enim marina Dalechampi appellatur à Lobelio Obs. & Ic. Plant. & Hist. Lugd. Aster conyzoides Gesneri.

Conyza
marina
Dalech.

Sic quoque Conyza media à Lobel. Obs. & Schwencfeldio Aster Atticus luteus nominatur.

Conyza
media.

Apud Cord. in Hist. pl. lib. 2. cap. 62. pro Atere Attico, & sub eius titulo malè appposita figura Chameli auri quorundam.

Apud Tragum Chamæmellæ eranthemum nominatur Aster Atticus flore medio luteo.

Chamæmellum
aurum
quorundam.
Chamæmellum
eranthemum.

Crichum tertium Matthioli Lobelius in Obs. Asterem Atticum maritimum cognominat.

Sed & Tripolium, Turpetum Serapionis cognominatum, à Taberna. apud Vviflung. Aster marinus nuncupatur.

Est Aster Hermol. Barb. lib. 4. coroll. 734. vulgò Stella dictus, hunc H. n. g. lib. 17. Pedem leonis & Alchimillam vocamus.

Pes leonis
Eryngium.

Aspergula Dodonæ, siue Hepatica Stellaria, multis vulgò censetur Aster Atticus. De hac dicemus lib. 30.

Asterem Atticum vel etiam astericum Arabum interpretes, & Pandectarum author Mathæus Syluaticus cum Eryngio confundunt: alij Alibum etiam vocant.

Alibum;

Theoph. Golius in Onom. Asterem Atticum ab aliis Vuam lupinam vocari tradit. Sed Vuam lupinam siue Herbam Paris non esse Asterem Atticum est manifestum. Asterem quidam dicunt, sed non Atticum multi.

Herbam
Paris.

Considerandum an Asterion Pausaniæ possit esse Marrubium album, inquit Tragus. Idem Tragus Asterij nomen Cannabi etiam tribuit.

Marrubium
Spondilium
Imperatoria
ria.

Spondilium inter Spurias voces, Corn. Dodon. & Gesnero testibus, Asterium cognominatur.

Astericum (Imperatoria) non est Meum, inquit Brunfels. Tom. 2. p. 18. in Corollaris. De Imperatoria lib. 27. H. n. g.

Parietariam à nonnullis Astericum vocari patet lib. 23. cap. de Parietaria.

Hermolaus est testis Carol. 680. Capita Papaueris asteriscos Græcis appellari. Vide lib. 30. caput de Papauere.

ASTER ATTICVS PURPUREO & albo flore.



Aster Atticus qui creditur, caules habet cubitales & sesquicubitales, tenues, ceteres, duros, hirsutos, subrubentes, foliis amicos oblongis, acuminatis, asperis & pilosis, interdum crenatis, paucis incis, sapore subaromatico & subamaro ac siccatæ: caules circa fastigium in sur-

Descriptio.

in furculos diuidantur quibus flores insident ameni, radiato Bellidis maioris positu, sed colore violaceo, Dod. cæruleo purpureo, aut albo, disco medio fuluo, in pappos facillente: *radix* tenuis transversa iacet, à qua multæ demittuntur fibræ, sapore amaro nonnihil aromatico & calfaciente, quidam aiunt nonnihil Caryophylli respicente: *semen* paruum sublongum, Intybo non multum dissimile. De hoc autem ait Tragus. Flos tinctorius primus, tinctoribus spirentibus Schartenfraut dicitur.

Hunc Florem tinctorum i. vocat Tragus, & Chamæmelum tertium, & tinctoribus spirentibus Schartenfraut dici tradit.

Matthiol. Lac. Castori, Fracast. Camer. ad Epitom. Matthiol. Schvvenckf. Lonic. Cordo. Dodon. gall. & Lat. Guiland. Euch. Ræslin. & aliis passim Aster Atticus. Fuchf. Aster Atticus purpureus. Gesn. de hort. Aster Atticus Fuchf. Bened. Aret. Aster Atticus Fuchf. flore puniceo. Camer. hort. Aster Atticus flore cæruleo: ad H. Germ. Matthiol. Aster Atticus. Bubonium, Inguinalis. Lacunæ Asteris Attici 2. species. Thal. Aster Atticus cæruleus. n. Lugd. Aster Atticus Matthiol. Wirsung. Sternfraut, Aster.

Clusio Aster Italorum & Fuchfii: Is autem iconem habet quam Lobel. Obs. & Leon. plant. ponit nomine Asteris Italorum.

C. Bauh. Phyt. Aster 3. 1. apud Matth. siue cæruleus (flore cæruleo, Camer. hort.) vulgaris duplicis differentia, qui enim maturius floret, minus altè assurgit, quam qui serius: deinde habetur latifolius & angustifolius. Item: Aster 4. siue montanius luteus. In planta.

Aster Atticus vocatur græcè Ἀστὴρ Ἀττικός, Boucaivov, & Ἀστὴρ, nonnullis Inguinalis, Asterio, Asterilcon. G. Mejerfraut / Schartenfraut / Bruchfraut / & Sternfraut / wassstrow. Belg. Sterecruyt. Gall. Petite Espargouste, seu petite Muguet. H. Robur, & Estralla-da.

Nascitur asperis, incultis, collibus & conualibus variis in locis, florens Augusto: semine maturo Octobri.

ASTER ATTICVS MONSPELIENSIS purpureus angustioribus folijs.

Cognatus Gess. Asteri Attico Fuchfii, caulibus rectis, cubitalib⁹, teretibus, hirsutis: per quos filia crebra glabra; nervosa, Linariæ folijs magnitudine & formâ respondentia: flores in frequentibus pediculis, aliis palmaribus, aliis vncialibus umbellam mentiuntur, Asteris Fuchfiani similes, paulò tamen minores, violaceis in



ambitu folijs, disco luteo, qui in pappos resoluuntur. C. B. Phyt. Aster 14. siue Tripolii (Tripolii flore etiam dicit Lobel. in icon.) variegato flore.

Tom. II.

Asteris Attici Fuchfii species angustioribus Locus & folijs florens apud mare Monspelii à me visa tempus. mense Septembri.

ASTER ATTICVS LVTEVS, SV- pinus, spinosus.



Aster hic supinus, est canaliculis multis ab vna radice prodeuntibus donatus, humi magnâ ex parte diffusis; striatis & hirsutis: folijs numerosis, superiori penè similibus, sed paulò viridioribus: singuli rami durum & foliosum sustinent cauliculum, in quo flor luteus circinnate rotunditatis, Buphtalmi aut

Descriptio

Chrisanthemi æmulus: quo evanescente, calyculi in adeo dura & lignosa capitula euadunt, vt vngue vix frangi possint, atque semina, quod in iis continetur & humiter inheret, eximit.

Clus. Hist. Aster Atticus supinus siue secūdus: Hist. post. Aster 2. supinus. Dod. de purg. in append. ubi eadem icon quæ apud Clusium, Aster Atticus flore luteo: Eandem habet iconem Lat. in fol. pro Asteri Attico supino siue: Lob. Obs. & Hist. Lugd. [cui & Aster humi iacens,] Aster Atticus supinus Clusii. C. Bauh. Phyt. Aster 2: siue luteus supinus. Camer. hort. Aster Atticus repens Clusii.

Aster Att. sup. Clus.

Aster Att. fl. luteo Dod. donat.

In Getmaniz, Italiz, Galliz, & Bohemiæ asperis & incultis reperitur locis, in sylvis, in collibus, nec non etiam in pratis: florens Iunio, Iulio & Augusto.

Aster auricomus glaber latifolius folio non rigido.

Non penitus omni pilo caret, vetum tam breuè tamque rarum, tam per folia, quam per caulem habet, vt visus vix capiat: adnascuntur autem alternatim folia, caulem pinnis complexa, vnciâ circiter lata, tres longa, nonnihil in ambitu sinuata: ex quorum vniuersiusque sinu palmaris circiter emicat pediculus, florem plerumque vnicum, aliquando binos sustinens, aureo intenso colore micantem; magnum, Triagopogonis lutei æmulum, disco luteo, denso extrinsecus agmine obvallatum foliorum viridantium; læuium, acuminatorum, tantæ longitudinis vt ipsum florem interdum superent. Collegit in campetribus & squallidis quibusdam prope Lupi montem Cherletus Gener meus.

ASTER PVRPVREVS MONTANVS.

Asteri montano purpureo radix satis crassa, longa, nigricans, fibrata, in plura diducitur capita, ac se propagat: ex quorum singulis

T t t t 2

Descriptio



ciam vnam, duas, aut tres longa, semunciam lata, per extremum rotunda. Autore Camerario interdum globuli rumentes villosi prope radicem adnascuntur foliolis, estque omnino minor vulgari Asteri.

Synop.

Camer. apud Math. Germ. Aster Atticus minor, hirsuta vesiculâ quæ adnasci solet, Hein Sternfrant: In epit. eiusdem, Aster Atticus cæruleus Alpinus.

Deser. Clus.

Clus. Pann. Aster Atticus quintus: hist. post. septimus, Austriacus quintus, Aster Alpinus cæruleo flore, siue septimus.

C. Bauh. phyt. Aster 18, siue montanus cæruleus magno flore. H. Lugd. Aster purpureus montanus.

Locus & tempus.

Oritur herbosis Austriacarum Alpium iugis. Floret Iulio. In horros translata sub finem Maii & Iunio floruit Clusio, subsequens deinde hiems abstulit & corruptit: ex earum enim stirpium est genere, quæ cultura vix nitescere volunt. Aster purpureus montanus Dalechampii in sabulosis, aridis, & perflatis montium tumulis ac cliuis gignitur.

ASTER MONTANVS FLORE luteo magno hirsutus, quibusdam Oculus Christi.

Descriptio



emergeat coliculus vna palmaris, rarius dodrantalis, interdum etiam cubitalis, hirsutus, paucis foliis vestitus, in summo florem gestans, maiore quam vulgaris purpurei Asteris, cetera similem, foliolis cæruleis purpureisve luteum veluti oculi stellatim ambientibus, quem in pappis appersum semen sequitur: folia circa radicem multa, pilosa, vna

ciam vnam, duas, aut tres longa, semunciam lata, per extremum rotunda. Autore Camerario interdum globuli rumentes villosi prope radicem adnascuntur foliolis, estque omnino minor vulgari Asteri.

Camer. apud Math. Germ. Aster Atticus minor, hirsuta vesiculâ quæ adnasci solet, Hein Sternfrant: In epit. eiusdem, Aster Atticus cæruleus Alpinus.

Clus. Pann. Aster Atticus quintus: hist. post. septimus, Austriacus quintus, Aster Alpinus cæruleo flore, siue septimus.

C. Bauh. phyt. Aster 18, siue montanus cæruleus magno flore. H. Lugd. Aster purpureus montanus.

Oritur herbosis Austriacarum Alpium iugis. Floret Iulio. In horros translata sub finem Maii & Iunio floruit Clusio, subsequens deinde hiems abstulit & corruptit: ex earum enim stirpium est genere, quæ cultura vix nitescere volunt. Aster purpureus montanus Dalechampii in sabulosis, aridis, & perflatis montium tumulis ac cliuis gignitur.

Enicula-
tim veluti
incedit obli-
quæ acta radix,
nigricans, cras-
sifolia & capi-
tata, fibras
satis longas &
numerosas de-
mittens, ex
pluribus dis-
paratis capiti-
bus subinde in
vnum coeunti-
bus conflata:
caules complu-
res ex supina
radice pedales
& maiores
surgunt, non-
nunquam pal-

mares tantum, pilis obfusi: foliis vestiti superius raris, frequentibus verò terram proximè, tomentosis, albidis, vncias tres vel quatuor longis, semum. latis, ex principio angusto valde virofo: flores in ramulorum extremis eminent singulares, magni, aureis in ambitu comantes foliis, disco concolori, foliis flori circumiectis albidis, euanescentes in pappos.

Lobel. Icon. plant. Aster montanus hirsutus. Tabern. Icon & hist. iconem habet ex Lobelio nonnihil mutatam pro Asteri montano luteo semina, Berg Sternfrant weblein. Hist. Lugd. Aster luteus, Oculus Christi minor. Item Aster Atticus Penz. Nostra icon facta est sicuti & descriptio ad siccam plantam, in qua flores minus paruli, quos expansos esse oportebat: fortè Lobeliana facta ad plantam diligentius siccata.

Casp. Bauhin. Phyt. Aster 11, siue luteus montanus hirsutus: An Conyza maior altera Thalia? Item: Aster 12, siue luteus montanus hirsutus alter. Idem fortè cum præcedenti.

Aster luteus, siue Oculus Christi minor Hist. Lugdunensis in sabulosis tumulis & aridis nascitur quâ Lugduno itur Viennam. Asteris Attici genus flore luteo magno, hirsutum reperi inter Nemaufum & Auenionem prope tres insignes & antiquos pontes du Gab.

Synon?

du Conyza
maior altera
Thalia.

ASTER ANGUSTIFOLIVS luteus.

PVlchrum est Asteris genus, caule gracili, rigidulo, foliis æquabili graminea angustia pal-

Descriptio



maribus aut minoribus, acuminatis, nervosis, & maxima ex parte glabris, viridibus, sine pediculis villis, dense stipato: cuius furculis singuli impositi flores maiusculi, lutei, Calthæ vel potius Conyze mediz Monsipeliensium, cui congener videtur, aut Britannicæ Lugdunensium, calyce squamato ex viridi

incano, hirsuto.

Clusio in Pannon. est Aster angustifolius quartus, qui pingit & describit.

C. Bauhin. Phyt. Aster 7, siue luteus angustifolius.

In umbrosis montium vbi Viennæ vicinorū pratis, in ipsis etiam collibus herbosis, atque in silula ad Danubium sita paulò supra Eberstorf arcem Imperatoriam, primo cum semine ab vbe Vienna miliarî, copiosè crescit. Floret paulò serius posteriore.

ASTER

ASTERI MONTANO HIRSVTO MAGNO
flore, siue Oculo Christi similis si non idem,
siue Conyza tetia Clusii.

Descriptio



Est nobis
planta ex A-
gerianis stirpi-
bus siccis præ-
dictæ à nobis
descriptæ pluri-
mum accedens,
si non eadem,
sed fortè variâs
ratione loci :
folia priora sunt
pede longiora,
ex angusto lon-
go pediculo vix
vnciam lata, fi-
gurâ Scorzone-
ræ foliis acce-
dentia, albican-
tia, villosa, pos-
simum infer-
nâ parte, tactu
læui : folia verò

per caulem breuiora, & breuioribus pediculis,
candidiora : flores similes, quibus orbis ex folio-
lis luteis, in medio apices ex tomento emicantes,
exterius calycis squammæ siue foliola albicantia :
flores tres in nostra planta, vnus maior. Ex pro-
portione partis quam habemus, videtur hæc plân-
ta cubitalis. Icon autem eadem quæ Conizæ
Austriacæ Clusii : vtrique bene conueniens.

Floret lunio : ac in locis siccis & aridis, herbi-
feris tamen nascitur : Clusius.

C. Bauh. Phyt. dicitur Conyza 6. siue Panno-
nica.

ASTER TERTIVS PANNONICVS CLVSII
luteus folio hirsuto Salicis.

Descrip.



Caulibus est
villosis te-
retibus, dodrâ-
te altioribus,
per quos alter-
natim nascun-
tur folia, nullis
subnixa pedi-
culis, Salignâ
circumscripti-
one, venosâ, pi-
lis obfita, se-
mûcia latiora :
nonnunquam
angustiora, vñ-
ciam vnâ aut
tres longa, le-
uiter in acumē
desinentia : flos
summo infidet
cauli, Calthæ
par, luteis per

ambitum foliis, concoloribus in umbilici æquo-
ram fibris, calyce est hirsuto, viridante, folio-
so. Resiccatis floribus, inquit Clusius semen
exiguum in capitulis remanet, quod maturum
cum pappo à vento discutitur : radix fibrosa ad-
modum.


Clusio Pannon. Aster Pannonicus tertius : In
Tom. II.

post. Hist. After lanuginoso folio siue quintus,
C. Bauhin. Phyt. After 6. siue luteus hirsuto Sali-
cis folio : quandoquidem autem suspicamur Ca-
merarium apud Matth. in hist. Germ. hunc quo-
que depingere sub titulo *Ein ander Sternkraut
mit gelben blumen* : Alius After flore luteo : Et
in Epit. eiusdem, pro Aftere luteo flore, aliorum
Conyza species : nos assumptimus iconem Ca-
merarii : verum ne quis fallatur lubere eius de-
scriptionem addere quæ eiusmodi est. Caules
profert mediocres per quædam interualla radi-
cis repentis & se propagantis ab inferiori par-
te demissis fibris rectis, quæ aliquantulum odo-
rata sunt, sapore aromatico modicè ad Cinna-
momi saporem accedente, subacti. In summis
caulibus duos vel tres ramulos habet, quibus flo-
res lutei disco in medio apicibus conferto infi-
dent, quitandem in pappo abeunt. Folia per
caules alterna hirsuta nullo pediculo duab. quasi
alis eisdem amplectuntur. Nascitur in saltu-
bus.

After luteo
flore Camerarii
Icon.
Dsc. C. Bauh.

After luteo
flore Camerarii
Icon.
Dsc. C. Bauh.

ASTERI MONTANO PURPUREO SIMI-
lis vel Globulariæ.



Tota pul-
chella est
planta ex Ageri-
stirpibus siccis :
radice nigrâ,
crassa, pro pro-
portione pusille
herbæ, cuius
cauliculus qua-
tuor vnciarum
foliis alternis
vestitus latius-
culis, vnciam &
semis longis, in-
ferioribus ex
longioribus pe-
diculis quibus-
dam vncialibus,
aliis duobus &
semis culmo
paulo latiori-
bus, in obtusam

Descriptio

extremitatem desinentibus : flos summo caulis
infidet vnicus, staminib. multis glomeratus, simi-
lis Globulariæ quæ Aphyllantes dicitur : folia ac-
cedunt ad folia Asteris montani purpurei, sed
angustiora & delicatiora, nec ita hirsuta viden-
tur, lectores rem poterunt diligentius perpendere
si eis similis occurrat planta.

BRITANNICA CONYZOIDES, QVIBVS-
dam Aster Pannonicus Clusio.

Britannicam Dioscorid. voluit non nemo do-
ctus, Conyis & Asteribus cognatam plantâ,
cubitalem, radice obliquâ, repente, fibrosâ, acri,
cum aliqua aromaticitate, caule incano villosa,
in alas aliquot circa summum diducto : foliis ma-
ximis quidem sesquipalmum longis, duas uncias
latis aut amplioribus, reliquis palmum circiter
longis aut breuioribus, semunciam latis : vtrif-
que longa, densa, canâque lanugine subtus pu-
bescentibus, sapore amaro prædictis, citra vñsam
adstrictionem quantum possum animaduertere :
flore Helenii sed minore multò, luteo disco in
pappo auolante.

Descriptio

Plant. Icon. Britannica Gesnero & Lugdun. Icon. Lobeliana non placet, nec etiam Dalechampii, cum nec descriptio quæ est in Hist. Lugd. lib. 9. cap. 67. ea enim potius facta est ad descriptionem Dioscoridis quam ad ipsam plantam, quod facile agnosceret, cui nota fuerit planta quam tradit Dalechampius, nec nos in ea agnoscentes attractionem: ac displicet tribui huic Britannicæ novæ vires non expertas ab ipso Dalechampio, sed ex persuasione vana. Considerandum an hæc tradatur à Clusio Pannon. nomine Asteris Pannonici primi, & in post. H. I. 4. c. 7. Asteris 3. Austriaci 1.

An Aster montanus prægrandi flore Heleniæ, Lobeliæ

Tab. 108. Tabern. Icon. & Hist. Aster montanus luteus mas, berg Sternfrucht Mannlein. Descriptio illius desumpta, ut ipse faceret, ex Lobel. interea mutata icon, pro more consueti, licet non demonstrat ubi viderit plantam, nec notam aut visam censemus: Cæterum Britannicam Conyzoidem fortè pingit Leon. & hist. pro Conyza, quæ non displicet pro hac, quamvis aliam plantam intelligat, nempe mediam siue tertiam de qua paulo post agemus.

C. Bauh. phyt. Aster. 10. vel luteus magno flore.

Locus. Lobelius hanc magna copia nasci tradit Lugduni ad mœnia & intra pomeria peninsulæ herbida amœnæ, quam alluunt & determinant duo flumina: hinc Rhodanus ab Oriente, illinc Arar (quæ vulgò Sone dicitur) ab Occidente: & vocant vernaculè *Aynez*. Nos observauimus provenientem Lugduni à Ayno, florentem Octobri. Montbelgardi etiam nobis visâ non longè à S. Sulfanna pago & alibi, florens Augusto.

Tempus.

BACCHARIS VETERIBVS. CAP. X.

Baccharis, ut eam describit Dioscorides, herba est fruticosa (βαμνόςδεος, quæ vox in vulg. exempl. deest) odorata & coronaria (βαμνόςδεος, vet. quidam,) cuius folia aspera magnitudine inter violam & Verbalcum (is ἡ φλόμος, Ald. ἀμπύλη) media: caulibus angulosus, altitudine cubitali, propagines adnatas habens (περὶ τοὺς ῥιζῶν, Matth. suspicatur legendum περὶ τοὺς ῥιζῶν) flores purpurei sunt, subalbicantes, odorati, (Cat. addit λεπὰ) radices Veratro [Elleboro] nigro similes, quibus odor (vet. quidam addit ἀσπύ) est cinnamomo proximus. Solum amat asperum minimèque humidum, radix in aqua decocta co-uulsis, ruptis, euersis, seu ex alto præcipitatis, spirandi difficultati, tussi veteri (Vet. addit, μεφάλα-γιστος) ac vrinæ difficili auxiliatur. Menfes quoque pellit, & contra serpentium morsus vtiliter ex vino propinatur. Subdita vnica è tenellis radicibus partus extrahit. Decoctum verò puerperis infidentibus vtile. Vtiliter quoque in diaphanata (diaphanata sunt res in puluillum detrictæ ut commode inspergi possint) inferitur, quippe quæ magnam habeat odoris gratiam. Folia ut potè quæ astringant (τὸ δὲ φύλλον σπένδρ). Sic Agneta Baccharis folia astrigendi vi prædita agnoscat: at radici vim obstructions aperiendi, mensesque & vrinas ciendi tribuit: capitis doloribus adhibita profunt, itemque aurium inflammationi, regilopis incipientibus, & mammis à partu inflammatis atque etiam erysipelatis. Cæterum & ipse odor somnum gignit.

Plinius præter ea quæ à Diosc. mutuatus est

dicat ad vnguenta olim commendatam fuisse: quosdam errore crasso Baccar rusticum Nardum appellasse, cum alia sit herba sic cognominata, quam Græci Afaron vocauerint. Quosdam etiam Perpernam vocasse.

Galenus in Simplicibus Baccharim præterit. Sed in glossis Hippocraticis βαμνόςδεος ἡ ἰσχυρὴ πικρὴ ἐστὶν exponit. Vsurpat Hipp. lib. de natura muliebri, ἡ ἀσπύδιος βαμνόςδεος ἡ ἰσχυρὴ πικρὴ, inquit.

Paulus ex Dioscoride transcripsit, Baccharim esse herbam odoratam, similem Cinamomo, Coronariam, acrem. Cuius radix decocta ab obstru-
rione liberet, & vrinas ac menses moueat: folia verò adstringendo fluxionibus profunt.

Virgilius etiam nouit Baccharem, non solum vt Coronariam, sed etiam vt ἀσπύδιος fascini ex nimia laude. Sic enim habet in Melibœo;

Aur si ultra placitum laudaris, Bacchare fronte
Cingite, ne vati noceat mala lingua futuro.

Baccharis ignota est Officinis, sed herbariorum vulgus, *Benedicten frucht*, id est herbâ Benedicti, siue Benedictam vocat: aliqui etiam *hens(h)uch*, hoc est, Chirothecas nostræ dominæ (est hæc Garyophyllata de qualib. 17.) appellant.

Anguill. existimat caput de Bacchari spurium esse, & idè eximendum ex Dioscoride, Græcis enim nullam esse herbam sub nomine Baccharis, ac caput de Bacchare in Dioscoride idem esse cū capite de Afaro: transpositum tamen, corruptum, diuulsum ab aliquo scolo, qui huic rei attendere debebat. Quod ad Baccharem attinet Latini-
corum, nihil se certi scribere posse: cum Virgilius nihil de eius forma dixerit, Plinius autem describens Combretum dixerit simile esse Bacchari: vnde patet Baccharim eius differre ab ea quæ Diosc. Baccharis habetur.

Contrà sic Lobel. & Pen. in Adu. Licentiùs abutuntur Lectoris patientia, qui istud caput è Dioscoride quasi spurium expuctum volunt &c. Labes hæc profecta è fragmentis Cræteuz, ubi Baccharis Dioscoridis Afarum vocatur & describitur. Quod quidem nos monet, sedulam appellationem perpernam ne utiquam neglectui habendam esse accuratis viris, veri fidei venatoribus.

Monspelij quæ Baccharis vulgò creditur est nobis Conyza maior Matthioli. Ex Ruellio non potest intelligi, quam plantam lib. 3. cap. 37. pro Bacchari herba fruticosa intelligat per D. Mariæ Chirothecas, existimamus tamen eadem esse cum sequenti. Eorum opinionem, qui Baccharim dicebant Digitalem purpuream refellit odor putidiusculus. Caryophyllatam nonnulli suspicantur esse Baccharem Dioscoridis, verum descriptio non conuenit plantæ. Baccharim Libani à Rau-
volffio traditam non probat Clusius, de ea agemus post Gnaphalia. Baccharim Germanicam ac crispâ, Ocimum minus, siue Basilicam vocat Tragus. Baccharim Dioscoridis affirmaret Maior-
nam siue streptem ni stulte temeritatis argui se posse vereretur Tragus. Si Matthioli Baccharis est ver-
basci species vt Aduersaria volunt pag. 245. perpendendum an possit esse Blattaria purpurea. Baccharim Lonicenæ, & Brassaulus ipsum secutus, eam plantam magno errore esse putarunt, quam quidam Sclaream appellant, & nos Gallitrichum inscripsimus. Alteram Orualæ speciem [Gallitrichum filu flore minore] Baccharim

Baccharis
Virgilis.

Benedicti
herba.

Benedicti

æquiuoc

rim esse non placet Dodonæo. Baccharis, vt testatur Turnerus in Herb. Angl. par. 1. pag. 74. dicitur Officinjs Pulmonaria, quam ad Baglosum accedere scribitur H. n. g. lib. 33. Violam matronalem Fuchsi albam, purpuream, panicamque (Leucojum) aliqui Baccharin esse putant. H. n. g. lib. 21. Baccharis etiam dicitur Astarum, quamuis appellatio Baccharis Astaro minime conueniat.

CONYZA MEDIA MONSPELIENSIS,
quibusdam Asteris Attici genus folio
glabro rigido.

Descriptio



Conyza medicæ nomine innouit Monspelensis herba, caule pedali & pluquam cubitali, striato, glabro, duro: folijs alternatim positis amictis, hisque duris, rigidis, nervosis glabris, pediculo delituitis, semunciam lata aut paulo latiora, tres uncias plus minus longa, acuminata, le-

uiter in ambitu crenata: flores Chrysanthemi, conspiciuntur magnitudinis, lutei, è capitulo squaroso, succedente cum semine pappo lanugine: atque hi quidem, non secundum caules & ramos nascuntur, sed Alteram modo singuli singulorum furculorum extremis insident: radix subest longa, fibrata. Icon nostra facta nobis absentibus non placet, erat pingenda ex planta vidente, vti imperaueramus, sed picta ex heca.

Aster Atticus Pann.
Classis Salicifol.

An Tincto-
rius flos 3.
Trago?

Bellulutea
Oculus
Christi.

Existimamus hanc à Clusio traditam in Pannon. pro Astere Attico Pannonico secundo, & in post. hist. pro Astere quarto, seu Austriaco secundo, Astere Pann. salignis folijs quarto.

An Trago Tinctorii flos tertium genus, das drit Schartenblumen geschlecht.

An Gelin. in sine Hist. Cordi pag. 216. Tinctorius flos luteus Tragi & xovgōis flos luteus?

H. Lugd. Asteris lutei genus aliud, pratibus vdisque locis gaudens, quorundam sententia Bellis lutea, aliis oculis Christi vocatus.

An Cæsalp. Asteris Attici altera species in rudicibus ramosa, altior: capitulis ac floribus minoribus luteis?

An C. Bauh. Phyt. Aster 5. siue montanus luteus Salicis glabro folio: Aster montanus Lobel. Icon. p. 350.

Florentem reperi Iulio inter Vaniancourt & Dampierre, locis satis siccis ad sepes tamen. Plantam Montbelgardii in Horto Ill. E. C. reperi etiam inter Montbelgardum & iuxta vites montis la Chau, semine maturo Iulii sine. Obseruauimus etiam florentem inter Colmariam & Polweiller florentem Iunio. Frater Calp. Bauhinus mihi

collectam Basiliensibus montibus, nomine Asteris Conyzoidis Gschneri.

CONYZA MEDIÆ MONSPEL.
affinis multiflora.



Est nobis inter nostras plantas sicca vna cui manu Valeradi Dourez ascriptum est Conyza Matthioli: Hæc similis est Conyza mediæ Mōspeli. dictæ: folia glabra rigida: verum per caulem admodum crebra, breuiora & in extremis minus lata denique sunt, sublonga, flores lutei quam plurimi veluti

Conyza
Matthiol.
Valerando

umbellam representantes, minores, duodecim supputauimus, ex utrumque caulem fuisse cubito altiore, satis autem crassus est: Sunt nobis similes plantæ non recordamur unde, minores & cum paucioribus floribus.

CONYZA SPECIES FOLIIS
virgæ aureæ.



Est nobis Conyza quedam collecta anno 1595. Iunio mense, Spiræ in horro Cl. & insignis luteisconcl. D. Tengenagel Allessoris Cameræ Imperialis Spirensis stirpium seduli indagatoris, ea non parum differt à cæteris plantis quæ Asteres vel Conyza denominantur, folia enim per caules alternatim disposita, ferè similia Virgæ aureæ vulgaris folijs, qua-

Locus:

Descriptio

tor vel quinque uncias longa, ex angusto pediculo longo dilatantur ad unciam vnam, dein paulatim tendunt in acumen, eo modo quo Virga aurea, in iis pilos non animaduertimus, folia in superioribus partibus breuiora & angustiora sunt ex principio lato: Caules rotundi, cubitales & scilicet cubitales, in aliquot ramos diuisi, in quorum longis partibus supremis capitula magnitudinis circiter Chamæmeli lutei vulgo dicti, quæ cinguntur corona paruorum foliorum luteorum, vt cætera Conyza & Asteres, qualis

fit diffus non repordor: calix constat ex foliolis
sue squamis cinereis vel albicantibus. Tiguri
cum eodem anno 1661. apud Gesnerum observauit
ram, ea ei dicebatur Conyza species, eandem re
peri inter plantas siccas Valerandi Dorez cū
hac inscriptione: Conyza media quædam.

CONIZA MEDIA MATTH. FLORE
magno luteo, humidis locis
proveniens.

Descriptio



Conyza me-
dia ad cu-
bertum vnam
aut alteram ex-
crevit, inter-
dum altius, cau-
le tereti, lanugi-
ne incana obdu-
cto, lento: foliis
crebris nullo or-
dine rectis, ven-
tibus, alis vtrin-
que caulem am-
plexantibus, a-
cuminatis, ru-
gosis, albican-
tibus, villosis: flo-
res ramis extre-
mis insident,
Bupthalmi,
circinata folio-
rum luteorum

serie disci medii orbitum concolorem radiatim
ambiente, odore nullo eccellente: radix subest
caulem crassius æquans, oblique ferè acta, paucis
fibris donata.

Trago, qui eam describit lib. 1. cap. 54. vocatur
Conyza maior seu mas.

Fuchf. hist. Calaminthæ tertium genus, An
Anguill. epist. p. 210. Conyza tertia? Matth. hanc
depingit in priorib. comm. in Diosc. lib. 3. cap. 119.
In post. cum mag. fig. Lat. & Ital. cap. 130. sub titulo
Conyza media (vt & Lacuna, & Dodon.) sed non
describit: in Hist. Germ. Camer. & Epit. eam
exhibet pro Conyza 3. Mittel dürrwur.

Lonic. lib. 5. cap. 100. Calamintha tertia, Geel
& Muung. Item cap. 127. Conyza media Mittel
dürrwur. Frustra duas figuras & duas historias
vnius plantæ diuersis locis ponit.

Geln. de hort. Conyze species tertia aquatica.
Lob. & Penz. Adv. vt & Obseru. Conyza me-
dia, Dioscoridis lineamentis affabre congruens.

Clutio Pann. p. 526. Conyza tertia vulgaris
frequentissima per Pannonias locis riguis, ab om-
nibus tertia Dioscoridis aut media appellata,
quæ duplex est maior & minor.

An Thal o Conyza aquatica duplicis differen-
tia: alterius speciei folia sunt integra & latiora,
alterius paulo strictiora & profundius in ambitu
ferrata.

C. Bauh. phyt. Conyza 4. siue maior vulgaris,
Conyza maior Trago sine icon, Conyza Matth.
& Baccharis Montpelienisum. Item Conyza 5.
siue media, Alteris flore luteo, vel 3. Dioscoridis:
Cunila tertium genus apud Plinium lib. 20. cap.
16. quæ Cunilago: plura habet genera Cunila, vt,
latiuam quæ Satureia est horrentis: Cumilam
montanam, quæ Satureia syluestris: Cumilam
gallicanam, quæ origanum siluestre: & denique

Cunilaginem quæ Conyza est. Hæc Frater, ego
Conyza maiorem Tragi separe à Conyza Mat-
thioli & Bacchari Montpelienisum Lobelii.

Conyza media Matth. flore magno luteo, hu-
midis locis proveniens, Germ. vulgo dicitur dürr-
wur, aut dōndewur. Fuchf. Geel & Muung.
Gall. Calament aquatic. Hils. jerna de las pulgas ole-
rosa. Boh. slary frut.

Conyza duo genera in locis humectis ac gra-
minosis, cum nodi sunt margines fluviorum,
paludibus Sole exiccatis, humidioribus pratis, &
ad nonnullas sepes nascuntur. Frequentissima in
omnibus regionibus quas peragravit Clusius lo-
cis riguis. Bassileæ, Lugduni, Montpelii, Genevæ
& Montbelgardi observauimus.

Eius facultates Clusio non sunt compertæ. Vi-
res à Diosc. Conyza attributas huic tribuit Ta-
bern. atque alias: verum quum satis appareat ei
non bene notas has plantas & tribus diuersis plā-
tis indiscriminatim ascribere vires nos eas omit-
timus, ne cuiquam illudamus. Solent hanc A-
niclez in die Assumptionis Mariæ, vt vulgo vo-
cant, colligere, suisque sagminibus, & quas vo-
cant Verbenis adiungere, ac consecrare, aduer-
sus Diaboli præstigiis, tempestatumque iniurias,
sibi persuadentes iis locis conitrua, grandineque
minimè nocere posse, in quibus Conyza seruetur.
Sed relictis his superstitionibus, ad alia Cony-
zæ genera transeamus.

CONIZÆ MEDIÆ MINOR SPECIES
flore vix radiato.

Conyza media altera, radice ferè est vnica,
capitula aut sesquipalmaria, aliàs paucissimis
fibris donata, alià plurimis, nunc recta, nunc ca-
preolorum ritu tortili, lignosa, alba, insipida.

Caules erigit
plures, subru-
bentes, Cony-
zæ mediæ
prioris bre-
uiiores, sesqui-
palmares &
dodrantales.
teretes, subru-
futos, & Gna-
phali vulga-
rissimi ritu cis
saltigium ra-
mosos, hoc est,
vt soboles ma-
trem superet:
folia ex inter-
uallis alterna-
tim oriuntur,
quàm in dicta
Conyza mino-
ra, Senecionis
cærulei ferè



patia, undulata ac crispata, odore remissione, sapo-
re ingrato: flores minores quàm in Media prima
Conyza. Nostra icon parum placet, ita sculptam
emimus. An Trago Conyza fœmina Theophras-
ti? Inquit Gesn. apud Cordum in Hist. lib. 2. cap.
143. Conyza Tragi, quam hic exhibeo, vt cum
Cordi Conyze conferatur, videtur Conyza mi-
nor Matthioli. An igitur Conyza Matthioli mi-
nor? Hanc frater C. Bauhinus sibi persuadet esse
Conyza Lobelii, quod facillè concedo.

Matth.

Nomina
linguarum

Locus

Vires
Tab. nat.
Superflua

Descriptio

Matth. not.

Matth. ponit figuram sine descriptione parum artificiosam. Lacuna figuram habet Matthioli Conyze minoris nomine. Lonic. Conyza minor seu fœmina, flein durwurrg.

A Dodon. gall. Conyza minor tantum describitur, ac ab eo existimatur Conyza fœmina Theophrasti. Eadem in fol. lat. pingitur pro Conyza minima, & describitur pro Conyza tertia vel minore, Theophrasti. fœmina: aliis Panion, vel Libanotis, ut inter nothas appellationes reperitur.

Label. & Pena Adu. Conyza minima siue Pulicaria. Obs. pag. 187. Conyza minima, minimè omnium glutinosa: perperam Conyza minor Matthioli. Psyllium Cordi. In inst. lib. 2. c. 119. Ego existimo errore Typographi ibi positam, nec hanc inflexisse Cordum ut putat Label. Pl. Icon. Conyza minima.

Camer. ad Matth. Germ. sine icon: Parua Conyza Norimbergæ proveniens locis humidis secus vias, depicta à Lobelio & Dodonæo.

H. Lugd. p. 1044. Conyza minor Matthioli. Item p. 1045. Conyza minima Lobelii. Hæc describitur, illa non, vna verò planta. Clus. Pann. & Hist. post. Conyze mediæ minor species, vel Conyza tertia vulgaris minor. An Thelio Conyza minima. Tabern. Icon. & Hist. Conyza minor, flein durwurrg. C. Bauh. Conyza 7. siue minor flore globoso.

Conyza mediæ minor species flore minis radiato Montbelgardii abundat locis humidis, florens Julio & Augusto ante pontem è regione horti mei. Frater Casparus Bauhinus observavit Basileæ frequentissimam, & Monspeli vocari Herbam S. Rochi. Vbitis Gallie, Germaniæ & Angliæ locis lacustribus & humentibus arvis multa. In Bernardi greyen ara & fossis altero à Londino lapide fixitacat Label.

CONYZIS AFFINIS HERBA VVLNERARIA, siue Solidago Sarracenica tertia Tragophrisula.



De descriptione
Dum Lugduni medicinam faceremus Germani quidam dedit nobis plantam iam sunt quadraginta anni quam nos adhuc integram habemus, is autem eam curauerat deferendam ex locis supra Spiram Germaniæ urbem celebrem, ut commendatâ ad vlcera tibiarum: in ea

secca observauimus, caulem teretem villosum folia rotundis pinnis amplecti, nullis nixa pediculis, acuminata, vnciam aut palmum longa, latitudine vnciali aut semuncia angustiora, non multum dissimilia à foliis Conyze vete maioris, nonnihil hirsuta: summum caulis fastigium in

plures abijt pediculis, quorum singuli florem gerunt aureum in pappos degenerantem, calyce imbricato. Hæc ex heca.

CONYZA MAIOR MATTHIOLI

Baccharis quibusdam.

Ex radicibus multis sparsis non altè depactis lignosis, fragilibus, odoratis, amaris, & acerbis, surgunt ad cubitos tres aut quatuor alti caules, stipati, atropurpurei, canâ lanugine hirsuti,



supra mediū in multos ramos erectos diuisi: folia Verbasci nigri, minora, leuiter crenata, odorata, sapore acri & nonnihil amaro: flores cœferri, grauiter olentes, lutei, papposi, è calyculis squarrosis, mollibus, viridi rubroque versicoloribus. An Arctium siue Arcturus Diofcoridis Catalpino:

Cordus ni multum fallor hanc describit lib. 2. hist. cap. 145. nomine Conyze Helenicidis, ubi Gesnerus figuram apposuit, cui hunc adscripsit titulum, Conyza Helenitis: Eadem aut simillima videtur Matthioli Conyza maior.

Hanc Matthioli lib. 3. cap. 119. in Diofcor. pingit, traditque in Hetruria passim provenire ac vocari vulgò Pulicariam. Hanc eandem forte aliter pingit lib. 1. c. 44. ex sicca planta pro Bacchari Diofcoridis Româ à Lacuna missa. In Hist. post. Italic. cap. 130. eandem pingit pro Conyza maiore, & lib. 3. c. 46. eandem Baccharis nomine iterum pingit: Anguillaram exagitant, qui purant Baccharis caput superfluum apud Diofcoridem. Idem Epit. cum addit. Camer. Conyza. Græcis καλὴ, Italis Coniza seu Pulicaria: Germ. Gschmuntz. Hisp. Aradegua: Gall. herbe aux Pucies. Item Hist. Germ. lib. 3. cap. 97. Grosse Durwurrg Conyza maior seu mas. Item libro 3. cap. 43. Baccharis. Matthioli nec Conyzam maiorem valdè vulgarem, nec suam Baccharim describit: idque suo more, ego suspicor Baccharim eius non differre ab eiusdem Conyza maiore, nisi figurâ, quæ non placet: displicet in epit. addi nomen Gschmuntz, diuersæ plantæ, non magis conueniēs quàm alia nomina: nec ea planta placet pro Conyza maiore, nec pro Bacchari, figuræ etiâ non arident. Cùm Mospelii essem vocabatur hæc planta à Monspeliensis Baccharis, & olim Tubingæ per præceptorem meum Fuchsum, Conyza maior.

Lacuna lib. 3. cap. 47. quamvis Baccharim siccam miserit Matthioli, ab eo tamen relapsa figurâ: & exhibet Baccharis nomine: ac iterum postea eandem cum Matthioli pro Conyza maiore depingit.

Hanc, ait Gesnerus de horti, Baccharim Mō-

Conyza
Helenitis

Corda

Conyza
maior
Matth.Pulicaria
Italar.
Baccharis
Diofcor.
Matth.Matth.
censurâLacuna
lib. 3.
cap. 47.

spelli existimata falsò ab Aretio. Esse enim Conyzis cognatam herbam, vocarque Conyzam maiorem.

Synon.

Planta nostra à Lob. in Adu. *Chææris* aut potius *myzæris* nominatur. In Obs. Baccharis Monspeli. Aduers. 245. perperam Conyza maior Matth. & Dodonæo Conyza helenitis Cordi. In Icon. Plant. p. 574. Baccharis Monspeliensium.

Dodon. gall. Conyza maior Theophr. mas, Pulicaria & Cunilago. Germ. *dürmurtz* & *donnermurtz*. Lat. in fol. Conyza altera, ab aliis pro prima specie iudicata.

Incenfaria
Cafalp.

Lonic. Conyza maior seu mas *Groß dürmurtz*.

Cafalp. vulgò Incenfaria, quorundam Baccharis, aliorum Libanotis sterilis apud Theoph. Mas Conyza Plinii.

Camer. hort. Baccharis Monsp. Conyza maior Matth. frequens ad Danubium circa Ratibonam.

H Lugd.
nor.

Lugd. p. 917. Baccharis Monspeliensium, Conyza maior Matthiolo. Item p. 1044. Conyza maior Matthioli. Eadem figura bis posita.

Cafalp.

Castor. Dur. p. 144. Conyza, *abroza*. Ital. Conyza & Pulicaria, Germ. *Geelmürtz* Conyza maior. Figura non placet, nec etiam nomen Germanicum quod conuenit terræ eius Conyza.

Thalio Conyza Helenitis Cordi.

Hort. Luf. Baccharis Monspeliensium, Conyza maior Matthioli.

Statichæ.

Quæ à Matthiolo Conyza maioris nomine exhibetur, minimè teste Clusio Conyza esse potest, sed ad Dioscoridis Baccharim accedere videtur: cum satis ineptè Salmanticenses Heleniū faciebant, cum nullis cum Helenio notis conueniat.

Baccharis
Tabern.
Tab. not.

Tabern. Icon. Baccharis *Groß dürmurtz* quibusdam. Hist. Baccharis, quam Lonicerus describit, cuiusque Matth. meminit. Iconem habet Matthioli in qua summitas non respondet Conyzae maiori, suspicamur fictitiam.

Gerard. Angl. Baccharis Monspeliensium *plotzmaus Epfnard*.

C. Bauh. Phyt. Conyza 4. siue maior vulgaris: Conyza maior Trago, Baccharis Monspeliensium. Conyza maior Tragi est alia à Bacchari Monspeliensium.

C. B. not.
Locus &
tempus

Nascitur spontè plerisque cædis montanis siluis: muris, fecus vias, & eiusmodi locis, quemadmodum obseruauit Florentiæ in Castello: circa Tubingam, Monspellii (florentem mense Septembri: Basileæ [mense Octobri adhuc florentem: Geneuæ, Lugduni, & Montbelgardi virentem totà hieme, etiam mensis Februarii principio, ac Florentem Iulio & Augusto.

Vite.

Radicem ex vino decoctam propinabant quidam vetulæ ad profligandam scabiem, in quem vsum & nonnulli Monachi ex eius radice & foliis vnguentum parabant: Clusius.

CONYZA HELENITIS MELLITA incana Lobelii.

Descriptio.

Caulis emittit sesquipedalem, tomentosum, incanum, ex radice fibrosa, Baccharis vulgaris non absimili; folia oblonga, Digitalis foliis affinia, inferius exalbida, seu cinericea, superius purpurascientia, foliorum Rhaphontiei instar: flores lutei, Conyzae alterius similes, multò maiores quàm Senecionis,



CONYZA HELENITIS
pilosa Lobelii



Pilosa alpina dicatur.

CONYZA VETERIBVS.

CAP. XI.

Aliquor Conyzae speciebus traditis, superest vt ad ea eius genera veniamus, quæ ad Veterum Conyzas magis accedere videntur. Præmittemus tamen prius eorundem de iis sententias.

Præstat enim exiguum circumlustrare Conyzam.

Conyza, inquit Theophr. alia quidè mas est, alia verò fœmina: quidè tenuiore folio est, & confectiore, & in totū minor. Mas autem maius & pinguius, habens præterea verò florem splendidiorem. Fructifera verò ambo. In vniuersumque serò floret, circa ærcturum aut post ærcturum germinat: Grauis autem odor maris: fœminæ verò actior (sc. odor) Quam ob rem contra venenata vtilis. Et hæc Theophrastus, ex quibus sua mutuatus est Plinius.

Conyza apud Dioscoridem quædam parua vocatur, odore præstantior: maior altera, quæ fruti-

mellis virginæ odore, sapore acrisculis, Lobel. C. Bauh. phyt. Conyza octaua siue Helenitis mellita incana Lobelii Iconum pag. 347.

Synon.

Nascitur in syluis quibusdam Artæicis, vnde propter raritatem in hortos aliquos translata.

Descriptio

Proximè ad Conyzam helenitem mellitam incanam accedit, foliis, radice, & floribus. In eo verò potissimum differunt, quod & caules & folia admodum aspera & pilosa sunt: Lob.

Synonyma

C. Bauhin. Phyt. Conyza 10. siue alpina pilosissima. Hæc adeò pilosa est, vt quibusdam

pilosa aspera.

Olea folia.
Maior.
Radices.
Contra Venenata.
Culices,
pulices.

frutice altior est, foliisque lanioribus atque graueolens. Vtriusque *folia* Oleæ familia, at hirsuta & pinguis. Et maioris quidem Conyze *caulis* in binum cubitorum altitudinem assurgit, minoris verò pedem aequat. *Flos* squalidus (vel friabilis Sarrac.) est, lutei coloris, & subamarus, ac in pappos abit: *radices* autem superuacuae. Frutex cum foliis substratu sustinuitque venenatas bestias fugat, culices abigit, ac pulices quoque necat. Folia vtiliter imponentur serpentium moribus, tuberculis atque vulneribus. Flores etiam ac folia ad menses partuque pellendos in vino bibuntur: itemque contra stranguriam, tormina, morbumque regium. Eadem ex aceto pota, comitiales adiuvant. Quin & decoctum infellu vuluæ vitis medetur, monesque purgat. Subditus autem succus abortum infert. Sed & herba ex oleo peruncta, contra rigores est efficax. Temuior verò, etiam capitis dolores imposita sanat: (nonnulli cod. carent sequentibus ad capitis vsq; calcem.) Est & tertium Conyze genus, caule crassiore mollioreque, foliis mediæ inter maiore & minorem amplitudinis. Minime autem pinguis ca est, ac odore longè grauior, atque adeò inuicundior simul & inefficacior. Locis aquosis prouenit.

Rigoris.
Dolores ca-
pit.
Conyze
tertia.

Tempera-
mentum.

Galenus tria quoque vt Dioscorides, Conyze genera assignat. Conyze maiorem, minorem & mediam. Maior & minor, inquit, similes sunt tum temperaturæ, tum facultatis, gustui amara & acres. Est & tertium Conyze genus, in locis humidioribus proueniens, vtriusque illis tum graueolentius, tum imbecillius. Sed primæ memoratæ tertiæ sunt ordinis exalfaciendo & exsiccando.

Dio, inquit Schol. Græcus, sunt Conyze generæ: alia quidem agrestis: alia verò vrbana mistice. Vtrum agrestis acrior est sarua. Ceterum inter nothas Dioscoridis appellationes vocatur Conyza magna, aliis Cynozemates, aliis Danaïs, aliis Tanachion, aliis Phycos, aliis Ichys, aliis Dinofmos. Prophetis Brephoctonös, aliis Anubias, aliis Hedemias. Aegyptiis Ceti, Romanis Intyban, aut Militaris mina, aut Deliarium, aut Febrifuga. Aliis Phragmosa, aliis Mustertum, aliis Pissa. De altera Conyza, alii Conyze parua vocant, alii Panion, alii Libanotida. Prophetis est Coronos.

Aequiuoca

Virga au-
rea siue so-
lidaginis
Sarraceni-
ce angu-
stifolia as-
finis.

Alisma
maritima siue
plantago
alpina.

An Senetio
alius siue
hirsutus?

Senetio ca-
ruleum.
Ambrosia
gustulidam
Alpium
Montis siue
herba rer-
rebitis.

Posterior ætas circa Conyzarum à Veteribus traditarum notitiam nonnihil laborat. Præter alias enim Conyze plantæ, tradunt quandam aquaticam maximâ teratofoliam Gesnerus, Thalius, Camer. & Hort. Lusitanus, quam Virgæ Aureæ siue Solidagini Sarracenicæ angustifoliæ affinem facimus, est Lingua auis Dalechampli.

An Conyze annumerandum sit Alisma Alpinum, Caltha Alpina Gesneri [Alisma Matthioli siue Plantago Alpina,] dubitat Hærcynia Saxo-nothuringica Thalii.

An Senetio alius siue hirsutus est Conyza fœtida Hippocratis de qua Gesnerus hort. sub vocabulo Corula, Thal. sub titulo, Erigeron fœtidum seu maius.

Senetionem cæreuleum Fuchsius cum apud illum esset vocabat Conyze minorem: Conyzoideum cæreuleum siue Conyze mutalem Gesnerus.

Conyza Hippocratis aliquorū, est quibusdani Ambrosia, teste Gesnero de hortis.

Conyza tertia quorundam, Alypum montis Ceti Lobelii, quam Herbam terribilem Narbo-ænses Hist. Lugd. Hippoglossum Valenticum

Clusius, Pearmicæ quidam cognominant, est Alypum Monspelii siue herba terribilis.

Vulgo Connina videretur Conyza tertia apud Diof. Cæsalpino, quam Atriplicem fœtidam inscripsimus.

Confundit Plinius cum Origano & Cunila Conyze, diuersas naturæ plantas.

Conyza non est Thymbra sicut perperam sentit Iacob. Manlius, testibus Io. Agric. & Eur. Cordo.

Perficariæ duæ species sunt, vt opinatur Tragus in dissert. apud Brunfels. tom. 3. p. 277. Conyza Dioscoridis.

Oliuer. de Serres in suo Thef. agr. l. 6. c. 15. confundit Conyze cum Psyllio.

Errat Auerr. dum Harmel Offic. Rucam siluestrem vocatam Conyze hippocr. appellat.

Conyza dicitur Eustachio Rœsin. de Cicuta, de qua Hist. n. g. lib. 47.

Atriplicem
fœtida.

Origannum?

Thymbra.


Perficaria?

Psyllium.

Ruta sylv.

Cicuta.

CONYZA MAIOR MONSPELIENSIS odorata.



Conyza Descriptio

Cmaior
caule fruticat
selque cubitali
& bicubitali,
multiplici, li-
gulo, rigido,
hirsuto, & ta-
ctu glutinoso,
Clusio, obso-
leti colotis, in
multos ramos
brachiato: fo-
lia germina-
tione primâ;
inordinata,
alternatim
caulera am-
plectētia, tres
vincias longi-
tudine aequat,
non totâ vn-

ciam lata, obiter ferrata, adulta vix vnciam vnâ longa, mollia, pilosa & glutine quodam lento viscida, ex viridi pallentia Clusio: flores secundum extremos ramos spicatum frequentes exiliunt lutei, Clusio rotundi. Senetioni ferè similes, in pappos euanescentes, semine paruo, cineraceo: Radix subest crassa fibrosa. Tota planta grauius odorata est.

Figura ex Fuchsianis non est integra & melius posset depingi, desunt flores & serraturæ in foliis.

Hanc appellat Camer. in horto Conyza maiorem: ad Matthioli. Germ. Conyza minor siue fœmina, quam alii tradunt pro Conyza maiore odore grato, quam describit Pena, quæ videtur à Clusio tradita & Rauuolffio. In Epit. Conyza minor. Ego separo Rauuolffii quia illi potuit esse nota Monspellulana: quamuis in figura quedam respondeant figuræ Penæ & Lobelii in Aduers.

Dod. Lat. in fol. Conyza maior.

Lobel. & Pena Aduers. Conyza maior verè; Dioscoridis lineamentis affabè congruens. Illi Pl. Conyza maior verè. Figura Lobelii non omnibus absoluta.

An Anguill. epist. p. 230. Conyza fecunda?

n. Lugd. Conyza magna Penæ. Hæc figura, vt

Icon.

Synon.
Conyze mi-
nor Camer.
Camer no-
tatur.

Conyza
maior Diof.
Conyza
maior Geræ
Lob.

An Conyza
2 Anguill.
Conyza
magna Pe-
næ, Lugd.

iam dictum non in omnibus placet. Cum Conyza magna Penæ eandem tradit esse Conyzam Syriæ C.Bauh.in animadu. in hist. Lugd. quam propterea notat. Nos cum H.Lugd.diuerfas agnoscimus.Nec Conyza magna Penæ spinas habet.

C.B. not. Clus. Hisp. & Hist. post. Conyza maior, cuius radicem Plinius à quibusdam Libanotim appellari tradit. Hanc Gaza Pulicariam vertit, propter eam fortè quam illi Dioscorides in enecandis pulicibus tribuit facultatem: nam alia est Pulicaria dicta ob feminis cum pulicibus similitudinem. Hispani quidem yerua pulgera, nimirum ob similes quas dixi vires, vocant.

Caster. not. Figura quam habet Castor p.144. pro Conyza minore nullo modo est minoris Conyze veræ, imò à multis exstimatur maior uti à Matthiolo.

C.B.Phyt. Conyza 1. siue mas Theophrasti, maior Dioscoridis.

Locus: Radix, autore Clusio, viuax est, multis annis persistans, quotannis nouos pluresque caules proferens. Supra Olysiponem frequentissima ad collium Trago flumini imminentium radices, Murciano item Valentinòque regno, atque etiam Narbonensi agro iuxta vineas & vinearum margines. Aliquando in Belgica fœtilibus sata prouenit, & egregie flores protulit. Solo maritimo, ut testatur Dodonæus, & austrino cælo gaudet, & circa Adriatici sinus littora, & circa Romæ & Florentiæ reperitur. In Narbônensi quoque Gallia, haud procul Monspelio, secus vias, ac vinearum margines. Conyzam maiorem Monspelii dictam florentem vidi mense Septembri. Passim prouenit Monspelii, Florentiæ etiam vidi in arce & circa arcem. Montbelgardi prouenit mihi in Horto Ill.E.C. & aliquot annis durauit.

CONYZA MINOR VERA.

Descriptio



dine, sed minores, numerosiores.

An Conyza 1. Anguit. An Anguill. epit. 210. Conyza prima, in Apuleia Pecanale, & aliis locis Pulicaria.

Clus. Hisp. & Hist. post. Conyza 2. seu minor, Conyza femina Theophr. quam Gaza Pulicariam vertit. Hanc Clusius non depingit. Gesn. hort. in append. Conyza vera minor.

Composit. a mi. not. Clusio Dod. Lat. in fol. Conyza præter maiorem mediam & minimam alia minor, iis etiam odoratior, sine iconc.


TAm hæc maiorem refert, ut qui illam norit, & hanc quoque oblatam norit, odore simili, sed vegetiore; ea minor est præcedenti, cubitū ferè alta, vtplurimum recta, quod in altera non temerè videas, ramosa. Folia multò tenuiora, angustiora, subhirsuta, viscida: flores iidem, eodemque spicato or-

Lobel. Aduers. & Icon. plant. Conyza minor vera.

H. Lugd. Conyza minor vera Penæ.

C. Bauh. phyt. Conyza 2. siue femina Theophr. minor Dioscoridis. Floret autem cum maiore, sub Autumnum videlicet, & subinde semen profert, obseruauimus spontè Monspelii (ubi etiam Clusius) copiosè prouenientem & florentem mense Septembri: repertum in Italia inter Saleul & Montem gilbi mense Aprili, ut & Basileæ florentem mense Septembri.

CONYZA SYRIÆ QVIBVS DAM.



Plures ex eadem radice profert cauliculos, citriter pedem aut paulò amplius altos, quorum nonnulli sunt surrecti, potissima verò pars humi procumbit, nouasque fibras agens, subinde alios cauliculos producit: longiuscula habet oleæ folia, pinguia, subhirsuta, satis grauis odoris, cui ta-

men suauitas quædam admixta sit: alioqui floribus & cæteris notis à Maiore non valde dissimilis.

Rauu. volff. Itin. pag. 54. Species minoris dicitur wurzel, 1. Conyze] Diosc. Latinis & Græcis dicta Conyza: hanc inter Icones parte 4. eodem titulo pingit.

H. Lugd. append. p. 20. Conyza Syriæ. Huius plantæ authoris non meminit Historia, immemito sanè.

Clus. Hist. post. Conyza minor Rauu. volffii, fortè maioris genus.

Conyzam Syriacam C. Bauhin. in annot. in Hist. Lugd. non paruo errore eandem statuit cū Conyza magna Penæ.

Circa Tripolim Syriæ obseruauit descriptionis auctor Rauu. volff. suam Conyze minoris genus.

CONYZA MONTANA MYCONI, folio Hyssoi vulgaris, villosa.

Radice est lignosa, solidà, intus candicante, foris nigrescente, minimi digiti crassitudine, gustu aliquantū adstringente, exsucca, non minus, quam suberis cortex. Ex hac foliis multo prodeunt, teretes, villosi, solidi, dodrantales: in quibus folia tenuia, Hyssoi vulgaris, sed glutinosa Ledi modo, odore graui & viroso, & hircinum quid olente. In summo cauliculorum sunt strobili Soncho similes, luteoli, in pappos abeuntes. Gustu subamara est cum leui acrimonia, caput tentans.

Mycos.


Descriptio
p. 110

renda; vnde Myconus alias plantas misit Dalecham-
pion.

C. Bauh. Phyt. Conyza n. siue montana glutinosus pilosis foliis.

CONYZA CAPITATE NUTANTE.

Descriptio



dum terramque versus inclinatam sustentantes, ex multis seu squamis compositum, quarum medium obsident multi apices lutei, eo ferè modo dispositi, quo in Verbena floreant ambiunt quædam longiuscula, folia viridantia stellæ in morem radiata: Radices fibrosæ, Hellebori nigri similes. Hanc Basileæ inueni ante multos annos. Thalius in montibus apricis Soli Meridionali & Orientali obiectis.

H. Lugd. p. 1040. Hydropiper aliud Dalecham-
pii.

C. Bauhin. Phyt. p. 641. Cannabina similis capitulis nutantibus, quam nobis ostendit frater Iohan. Bauhinus, Verbenæ similis cum capitulis nutantibus nominans. An fortè Hydropiper alterum Dalechampii;
Lugd.

Tom. II.

CONYZA MARINA.



Prolixas sub terra ag-
git radices non
sine fibris in
tuberosum ve-
luti bulbuni
tandem desin-
nentes. Caulis
statim copul-
culi, dodranta-
les cititer, e-
mergunt, hir-
suti, foliis ami-
cti frequentibus
duarum triumue vnciarum
longitudi-
ne, vix culmum
latis, rigidis,
nervio vnicio
per longum
donatis: cau-

lis superius diuisus flores gestat Conyze maioris;
luteos, in pappum euanescentes.

H. Lugd. p. 1366. Conyza marina. Lob Obs.
& Ic. Plar. Alter Conizoydes Gesneri Rauvvolf.
Itiner. Chondrylla Diosc. altera.

C. Bauh. Phyt. pag. 216. Chondrilla 12. bulbosa
angustifolia maior.

Gener Cherlerus in Gallia Narbonensi copiose
obsertauit & collegit in campestribus illis iuxta
Montem Lupi. In Anglia; Belgio, & agro
Louaniensi iuxta Academiam pomæria: iuxta Ale-
pum in aruis reperitur.

CONYZÆ MARINÆ AFFINIS CHON-
drylla alia Rauvvolfii.

Conyzæ mar-
tinæ similis
planè est radice
& floribus; folia
tamen latiora;
pilosioraque,
magisque cine-
rea sunt, perin-
de vt Holostii
Montepeliensis;
Rauvvolfii.

Rauvvolfii.
Hodæporici p.
117. Chondrylla
alia. Hanc pin-
git parte 4. in I-
con. numero
117. pro Chon-
dryllæ Diosco-
ridis genere a-
lio. H. Lugd.
app. p. 27. Chon-

dryllæ aliud genus Dioscoridis.
p. 217. Chondrylla 13. bulbosa angustifolia minor.

Lapidosis agris circa Alepum nascitur Chon-
dryllæ Dioscoridis genus aliud Rauvvolfii.

CONYZA ALPINA.

Ramis frequentibus fruticat, sesquicubitali
rigido caule: folia alternata ferè, pediculis
vncialibus & sesquicubitalibus hærentia, ex rotundo
Vuuu

Descriptio

Conyza?

marina

Lugd.

Alter Co-

nyzidet

Gesn.

Descriptio

Synonyma

Chondrylla

Dioscoridis

genus

Rauvvolfii

Lugd.

Chond bulb.

bosa Casp.

Bauh.

Locus.

Descriptio



nonnihil oblonga, vncias circiter ternas lata, paulo longiora, modicè in acumen desinentia, profundè in ambitu serrata, tubus incanè lanugine pubescentia, supra virentia: flores ramulorum extremis crebri inhaerent, lutei, Chrysanthemi similes, in pappos euanescentes.

Clus. Pannon. p. 576. Jacobaea latifolia altera: & in Hist. post. lib. 4. p. 23. Jacobaea Pannonica quarta, sine icone.

An Gesnero in descriptione Montis fracti, Conyzae alpinae genus sequebatur aut amplius proceritate, corymbis florum luteis, fibris radicis cum albis pluribus & confertis, subamaris, quod à pecore non attingitur, pastoribus Boni vocatum, aliquibus Goldfrut:

C. Bauh. phyt. Jacobaea 7. siue foliis rotundis, serratis.

Locus

Hanc cum Gesn. in peregrinatione nostra obseruauimus in monte prope Wesen, non longè à lacu Tigurino, florentem mense Iulio.

JACOBÆA PANNONICA FOLIO non laciniato.

Descriptio



Terna, aut quaterna, aut plura habet folia, latiuscula, in ambitu leuiter dentata, caulem cubitalè plerumque, angulosum, gracilem, per quem inordinata sparsa sunt folia, infimis paulò minoribus, at in supremo angustioribus, lata basi ipsam amplectentia: in summo caule quaterni aut quini, tanquam in umbella nascuntur flores, Jacobaeae vulgaris floribus non multum ab similes, antè quàm explicentur ex atro rubescentes, sed ubi aperti sunt auri fulgore splendentes, quos in ambitu stipant quindena aut plura foliola per extremum incisa, superne phœnicea, subius verò quodammodo rubentia: ii flores maturi in pap-

pum abeunt, cui inuolutum est semen nigricans, oblongiutculum, vulgaris Jacobaeae semini non dispar: radix non valde magna, nigricans, tenuibus fibris candicantibus donata, sub Autumni noua denud folia latiora, ad veteris caulis sedem singulis annis producit. Tota planta mollicula, & quadam lanugine obsita conspicitur: amaricantis est aporis.

Clus. Pannon. p. 573. Jacobaea secunda, p. 574. Jacobaea Pannon. folio non laciniato: Hist. post. lib. 4. p. 22. Jacobaea Pannon. 2.

C. Bauh. Phyt. Jacobaea 8. siue foliis nonnihil dentatis.

Jacobaea Pannon. 2. Clusi nascitur apud Nemetum III. Balthazaris de Batthyán, aliique Pannoniae & Austriae inferioris montibus & cauis siluis. Floret Iunii initio, & sub eiusdem extremum finem, semen maturum est.

H. Lugdun.

Loc. us.

JACOBÆA MARINA SIVE cineraria.



Vitus cōsimilis

Descriptio

Jacobaeae cognominem hanc reddidit, natalisque locus maritimus differentia adiunxit: prima folia Quernis similia, rarioribus fissuris minusque altis incisa; quae postmodum ad costam usque profundius diuiduntur, digitaliter intercapedine signata laciniata intercedente, crassiuscula; inferius cinereo molli tomento vnà cum pediculo obsita, superius atroviuentia, nitida, & nonnulla quoque lanugine fortuito obiter respersa, sapore praedita parum grato: flores multi coacervati Jacobaeae, Melini, in pappos tandem abeunt. Lob. Adu. & Ic. Pl. Cineraria, Jacobaea marina, Chrysanthemum marinum, & Artemisia marina Neotericorum. Tabern. Icon. & Hist. Jacobaea marina, Cineraria, G. Jacobs blum. Dodon. Lat. in fol. Jacobaea 3. Cineraria vulgò dicta, à subalbido cinerum quorundam colore, quem refert Cinerariae nomen, quae à nonnullis Erigeron marinum dicitur. C. Bauh. Phyt. Jacobaea 1. siue marina. Erucam cineream Lugdunensis bis pingit bisque describit p. 651. & p. 133. quae sanè eadem cum praecedenti.

Hanc plantam olim vidi in horto di S. Saluator ad Burgo di S. Catharina, Vidi etiam in horto Nicolai Ferrariensis & à Innocenti: Egyptii, autore Alpino, Artemisia alba (quae illi Achaouam, Cineraria, & Jacobaea marina vocatur,) ad multa videntur, quippe decoctum ex foliis paratum ad renum vesicaeque calculos pollere aiunt, nec non ad sanandas viscerum antiquas obstructions, frigiditatem, strangulationem, sterilitatem, inflationem, atque ad menses interceptos reuocandos, in infestationibus.

H. Lugdun.

IACO.

IACOBÆA VULGARIS.

Descriptio

Lætius solum nacta trium cubitorum altitudinem assequitur, caule recto, rubente, striato: folia alternatim posita, Senecionis maiora, leui adstrictior: prædita: flores plures iuncti, Senecionis, maiores, lutei, umbilico concolori in pappos tandem abeuntes: radix alba, fibrosa. Duas figuras ex Fuchianis ponimus non vt specie differentes, sed tantum variantes.



Synonyma

Senecio maior.
Herba S. Jacobi.
Flos S. Jacobi.
Herba Iacobæ.
Iacobæa Senecio.
ar. missa polyclo-
nos.
Flos Iacobæus.
Differentia



bet, inquit, in foliis: alterius sunt instar Erucæ laciniata: alterius ad Raphani folia accedunt, sed minus hirsuta.

Iacobæa vulgarem Germ. vocant S. Jacobs blumen: quibusdam S. Johans blumen: & groß creutz blumen. Belg. Sint Jacobs cruyt aut bloemien: Gallis, Herbe au fleur de S. Jacques. It. Cardumello maggior.

In Pannoniis, Austriâ, vicinisque regionibus nascitur frequentissima, Iacobæa vulgaris Clusii. Iacobæa abundat passim Montbelgardi florens adhuc Septembri & Octobri: Montpelii obseruauit cum flore mense Aprilis & Maio: Basileæ quâ itur Moarers Octobri, ab fluium Birsæ intra videri & quâ itur Brenzard & versus Godeslinguen prope Molendinum. Genæ frequens est.

Flos S. Jacobi non solum eandem formam, sed eandem cum Senecione vires & facultates obtinet, vt pro illo iure vsurpari possit, in primis autem vulneribus, inflammationibus, & fistulis medetur, Tragus.

Tom. II.

IACOBÆA LATIFOLIA.



Iacobæa latifolia caulem habet tricubitalem, teretem, rubentem, medullâ albâ factum, in ramos alterius instar diuisum, quorû extremis flores insident, magni, lutei, stellati, ceu vulgata, & tandem in pappum tomentum euanescentes: at folia plurimum differunt, dodrantem ferè longa, duabus vnciis latiora, serrata,

Descriptio

glabra, mollia, profunde circa principium fecta, reliquâ & vltimâ laciniâ ad Bugulæ folium accedente: verum enimvero, quæ per ramos conspiciuntur paulò magis sunt laciniata, Artemisiz ferè diuisura. Radix obliqua, multis fibris capillata: suspicor annum herbam.

In Sundcomia florentem Augusto obseruauit ad ripam fluioli.

IACOBÆA PANNONICA LATIFOLIA.



Cvitali, interdum excreuit caule, firmo, striato, quem ambiunt folia lata, rugosa, mucronata, per Delinep-
oras serrata, viridia, latiore basi, & veluti appendicibus quibusdam prædita, infimâ parte quâ caulem amplexitur, ingrati & nonnihil acris saporis: quæ vero à radice germinant,

rotundiora sunt & maiora, sed nullo appendices habent, perinde tamen serrata atque superiora: summus caulis diuiditur in aliquot ramulos, qui flores omnino luteos sustinent, Iacobææ vulgari similes, multò tamè maiores, & ad Buphthalmi amplitudinem accedentes, maturitate in pappum euanescentes: semen obseruare non licuit: radix satis crassa & candicans, subinde fibras vulgaris Iacobææ instar, in latera expandit.

Clusio Pann. p. 574. Iacobæa latifolia Pannonica tertia.

C. Bauhin. Phyt. Iacobæa 6. siue latifolia flore Buphthalmi.

Vuuu 2

Prouenit in Austriacis Stitiacisque Alpibus:
Floret Iunio & Iulio, in hortos translata etiam
Maio:

CHRYSANTHEMVM ALPINVM
Iudenbergenſe Iacobææ affine.

Descriptio



ſectis foliis ornatos, ſtriatos, in quib⁹ veluti vmbellæ denūm aut duodenūm luteorum ſlorum, Iacobææ vulgaris floribus non multū abſimilium, & eiūſdem odoris: radix crassiſcula eſt, multiſque candicantibus fibris capillata.

Cluſ. Pann. p. 565. Chryſanthemum Iudenbergenſe, ſiue [vt in poſt. unt.] alpinum 1. Ad Chryſanthemi genera referendū, aut Iacobæis adnumerandū.

C. Bauh. phyt. p. 225. Chryſanthemum 2. ſiue alpinum foliis laciniatis: Hoc attulit D.D. Theodorus Collado Nemaufanus nunc Medicus ex helueticis alpiſus.

Locus.

Chryſanthemum alpinum 1. Cluſii prouenit in Iudenburg, Spital, & aliis quibuſdam Stiriz iugis, cum Leucanthemo mox deſcribendo: eodem tempore florens.

CHRYSANTHEMVM ALPINVM
Erfcheſianum Iacobææ affine.

Deſcriptio



Nam proxi-
mè radice
cem naſcun-
tur ſolia. A-
brotoni ma-
ris foliis reſ-
pondentia, di-
luciore viri-
ditate nitentia, & odore,
ſi terantur,
haud ingrato,
ſapore verò amaricante & minimè
grato: ex his
caules exeunt
pedales, minoribus foliis
onuſti, in ali-

quot interdum ramulos diuiſi, qui ſingulos aut geminos ſuſtinent flores Chamemelo vulgari maiores, inodoros, omninò flauos, hoc eſt, medium orbem luteum cingentibus etiam luteis foliis, ſatis latis: radix fibroſa & nigricans eſt, plureſque à latere ſpargit ramos.

C. Bauh. phyt. Chryſanthemum 3, ſiue alpinum foliis Abrotani multiſidis.

Inuenitur, inquit Cluſius, in Ertſcher, Snealben, Veitzalben, & celſis aliis Alpium Stiriz iugis. Floret Auguſto. Inibi etiam inuenitur Chryſanthemum Alpinum Snebergenſe, Cluſio 3. [C. Bauh. 4.] Alpinum dictum.

Locus. &
Tempus.

TRAGOPOGON SIVE BARBA
hirci Veteribus.

CAP. XII.

Tragopogonis ſeu Tetrapogonis, quem alii Comen vocant, inquit Dioſcorides, caulis brevis eſt, ſolia habens Croco ſimilia, radicem longam, dulcem (ſupinam addit Hermol.) In ſummo caule calix eſt magnus [ἐν τῇ τοῦ κωνίου κεφαλῇ] & eius ſumma parte erumpit ſemen nigrum (νεανίς μύλας) à quo etiam nomen accepit. Eſt autem herba, quæ in cibi uſum venit. Et ita Marcellus, Hermol. Cornar. Matthiolus.

Tragopogon
Copa.

Hirci barba, inquit Theophraſtus, radix longa & dulcis, ſolia Croco ſimilia, niſi quodd longiora ſunt: caulis brevis, ſuper quem calix amplior, & è ſummo vertice pappus canus grandior, à quo ſcilicet Tragopogonis nomen accepit: ſ non igitur à ſemine nigro vt ſibi falſò nonnulli imaginantur.]

Cæterum, Tragopogon [Hirci barba] & Scædix à Plinio vocatur, niſi, quod ſuſpicatur Hermol. deprauata lectio ſit: iſ aliaſ deſcriptionem Dioſcoridis mutauit.


Scandia:
Plin.

Acetarium quidam olus hanc eſſe falſò volunt, quam vulgò Barbam petræ & in Gallia Ciſpadana Barbulam hircinam vocent: habetur & quæ Gerontopogon, id eſt, Senis ſiue præſbyteri barba dicitur, Tragopogoni fere tota ſimilis, niſi quodd lacte manat & radice amara eſt, non dulci: à Nicandro Geros Pogon fortaſſe nuncupata. Tragopogona vocari, & in Trago piſce partem ſubgula eius nigricantem Athenzus autor eſt. Tragopogona, Galenus inter ſimplicia non recenset, inquit Cornarius. Et officinæ oſtendunt falſam pro vera Hirci barba herbam. Tragopogon à Galeno cognominata eſt planta, quæ Ledum ſeu Ladanum dicitur, & barba hircina Arabibus, vt Auicenna & Serapioni, teſte Trago libro 1. cap. 95. inquit Geſnerus. Amarus quantum videt Matthiolus, eam plantam Tragopogona putat, quæ Fuchſio Apios dicitur. De hæc nos H. p. lib. 17. egimus ſub titulo Chamæbalanus.

TRAGOPOGON FLORE
luteo, purpurco, ac
punico.

IN pratis obuius Tragopogon radice lacte turgente dulei, minimi digiti craſſitudine, longa: caulis cubitalis, foliis ab imo ad ſummum veſtitus, ſerè portaceis, capinatis, caulē

Describe



lem amplectē-
tibus : ex quo-
rum sinu rami
pronascuntur :
quorum sum-
mis insident
flores magni,
denso foliorum
radiatorum a-
gmine stipati,
lutei : qui in
pappos abeunt,
semine appenso.
Ab hoc non
multum differt
atropurpureus,
& puniceus,
sive spontaneus
cultus. Qua-
libet plantae fe-
re pars vulne-
rata lac fundit
album, emanās,
max in luteum
foeciflens, visci-
dam, quod radi-
dici recte, digi-
tali vel maiori
crassitudine, te-
nera copiosum
& dulce cum
sit, culinīs ex-
peritur : caules
inanes ramosi,
foliis multis
stipantur Por-
raceis, quae in-
terdum valde
lata interdum
tenuissima : flo-
res foliis octo
viuentibus lon-
gis & acumina-
tis obuallati, su-
perantes, qui colore sunt vel atropurpureo vel
puniceo : qui postea in pappos abeunt : quibus
adhaeret semper duas uncias longum, ceres, striatū,
asperum, per maturitatem extremam nigricans.

perantes, qui colore sunt vel atropurpureo vel
puniceo : qui postea in pappos abeunt : quibus
adhaeret semper duas uncias longum, ceres, striatū,
asperum, per maturitatem extremam nigricans.

Synonyma

Salsifraga.

Hermol.
reprob.
Hirci bar-
bula.

Camer. hort. Barba hirci flore luteo & pur-
pureo.

C. Bauh. Phyt. & apud Matthiol. Tragopogon
1. siue pratense luteum. Itē Tragopogon 2. siue co-
ruleum.

Anguill. epist. 7. scribit Tragopogonem, i.e.
Barbam hirci, in Tuscana dici Salsifragam &
Barbam di prete : Patavii Herbarum lissam. Cord.
Hist. Hirci barba.

Hieron. Brunsch. magno errore Hypocistida
in hac herba nasci putavit ; Ledum fortē intel-
ligens, quod à Galeno Tragopogon nominari,
iam supra ostendimus.

Tragopogonis & Gerontopogonis H. Lugd.
tres ponit figuras, sufficerent duae ac etiam v.

Tom. II.

na : si nostra Fuchiana placuisset, secundum non
curassemus puranda : non exstimatorum à Tra-
gopogone distinguendam Salsifragam Italorum.

Tragopogon alterum (inquit C. Bauh. in ani-
madueri in Hist.) & Gerontopogon p. 109. In
omnibus conveniunt, praeterquam in radicis sa-
pore, qui in illa amarissimus, in hac dulcis sta-
tuitur. Sed ideoque duabus figuris non erat o-
pus.

Dodon. Lat. in fol. Tragopogon, vt Fuchf. Lo-
nic. & Cæsalp.) Item : Tragopogon cum pappo :
figura superflua.

Tragopogon flore luteo purpureo, ac puniceo
vocali Græcis, τραγοποιον & κρηνη. Item & τρα-
γοποιον. Hirci barba, Coma. Germ. Bocksbart/
Gaudsbart. Belg. Bockhaert / Josepho bloens.
Gall. Barbe de Bœuf. Montbelg. de la barbe au Loup.
It. Barba de Recca. Hisp. Barba cabrina & Barba
de cabron. Angl. Bockes beard. Boh. Kosy brade
fa. Pueri, aut Tragus, qui radice tenera adhuc
velci solent, sicut & alias herbas, praeterim O-
xalida deuorare consueverunt, Gaudb. et / qua-
si Coccycis panem, ob dulcedinem radicis vocat,
quæ si Apitiis perspecta foret, nunquam non a-
cetiariis suis illam praeter ceteris herbis & radicibus
infererent.

Tragopogonem luteum obseruavi Montpelii
cum flore Aprilis & Maio & Augusto in pratis,
Genevæ vitetum in horto meo mense Ianuario,
cum flore Maio in pratis, etiā Iunio. Lugduni
copiosum in pratis : Patavii vidi mense Febru-
ario, & Montbelgardi abundat in pratis florens
Maio. Notandum omnes flores ad Orientem co-
uerti. Tragopogonem purpureum passim proue-
nit mense Aprilis & Maio.

Barba capri tenella à Belgis holitoribus ac-
etariis miscetur, ac facultatibus Condriillis adstipu-
latur, lancinationibus æstuantibus, iecori, sto-
macho, renibus & thoraci auxiliū est. Eius Bar-
bula hirci prior Matthioli, hyeme frequenter
in acetariis, glutinat recentia vulnera, si folio-
rum succus vel eius stillantia aqua splenis & ar-
tritidis hincolis superponatur : radix excoalefacit,
ac etiam primo ordine humectat : alterius radi-
cis lacteus succus adstringit, cohibet, siennat, &
modicè abstergit, cui tamen inidonea est. Radix
cruda aut cocta est, vel ius bibitum, vrinæ stilli-
cidio medetur, calculū expellit. Pectoris vitiis
succurrit : tussis, respirationi difficili, tabidis, &
pleuritis, ecce & succus eius, & aqua distillata. Sed
& vulneribus vtiliter adhibentur, & lac eius, quæ
breui temporis spatio ad cicatricem perducunt.
Aquam ex herba & radice distillata Maio mense,
remedium esse praesentissimum ad æstus aposte-
mata & dolores laterum legitur apud Tragus.
Plura qui volent, legat Tab.

TRAGOPOGON FOLIO LACINIATO

flore pallido, & Montpelienſe
flore luteo.

Tragopogoni radix similis tenera lactiflua,
filia priora tenuia, longa, quædam non laci-
niata, alia laciniis paruas habent, vbi primò
provenit ex semine deciduo & locis siccioribus
cultis : in qua caules plures nascuntur cubitales,
amplexu foliorum liberi, quæ tamen satis cum
per ramos frequentia, triplo quadruploque vulga-
ti Tragopogonis foliis latiora, in crebras pro-
fundas laciniis dissecta, quæ aliquid commune
habent cum Dente Leonis : flor luteus pallens

Vuuu ;

Dod. not.

Nomen
linguæPars
Cau-
culi.Locus &
compus.Vires
Facultas
Condriilla.

Vulnera.

Vrina
stilla-
cidium.

Pleuritis

Apostema.
ia.

Describe




gris nec laciniatis.

Locus & tempus

In horto Ill. C. Wart. floret Maio, semen maturat Iunio & Iulio, quo tempore perit, nec ultra unum durat, semine deceduo quorannis se propagans. Basilæ, Patavii, & Bononiæ etiam oblectantur.

TRAGOPOGON FOLIO GRAMINEO
flore albo & luteo cum tanulla
purpura.

Descriptio



Belli maiori [Ioānis blumen:] provenit incultis locis humidis: floret Iunio & Iulio.

C. Bauh. phyt. p. 536. Tragopogon 5, gramineo folio, radice villosa.

TRAGOPOGON HISPANICVS SIVE
Escorzonera aut Scorzonora.

Descriptio

P Edali longitudine est radix, crassitudine pollicari, lacte dulcissimo, non sine aliqua adstrictione, prægens, caulis sesquicubitalis, multis alis concavus, inanis, lanugine quadam rutili obsitus: quæ eadem inferius pubescunt folia, latiore basi caulem amplectentia, longa, Tragopo-

gonis, sesquiciam lata vel angustiora, in perquam longum angustissimum mucronem desinentia: flores insident extremis ramulis singuli, Tragopogonis, lutei, ex calycibus liguatim compactilibus, lacuibus: semen Tragopogonis pappolum.

gonis, sesquiciam lata vel angustiora, in perquam longum angustissimum mucronem desinentia: flores



insident extremis ramulis singuli, Tragopogonis, lutei, ex calycibus liguatim compactilibus, lacuibus: semen Tragopogonis pappolum.

Scorzonera Hispanica postea comm. & Bohemica mag. fig. ca. Math.

Scorzonera Hispanica ac Bohemicae meminit, easque pingit ac Tragopogonis congeneres facit,

aitque Hispanis Scorzoneram sive Scorzoneram, quod à vipera demorsis, quam in Scurzo vocant, præsentaneo remedio auxiliatur, Viperinam esse. Is non putat esse quemquam qui de ea ante ipsum scripserit: inuentam esse primum in Catalonia Hispania à quodam seruo Aphro: qui propinqua radices succo incolumes seruabat quorquor demorsi fuerant: primum misisse siccam Ioh. Odoricum Melchiorum Trid. Regine medicum, paulo post viridem ex Hispaniis allatam: Non multo post tempore copiosam quæ in Bohemia nasci compertum esse: &c. Non deesse autem, qui in Hispania hanc plantam Chondryllam esse censeant: sed horum sententia non esse subscribendum.

Gesnero de hortis Tragopogon peregrinus vel Hispanicus dici posse videtur illa herba quæ Hispanis Escorzonera, hoc est, Serpentina dicitur, quæque depicta est in fine iconum stirpium Fuchsii edit. Antuerpiensi. Tragopogonis autem genus esse monuit Coudenbergius. In Tarracoenfi Hispania [nunc vocant Catalonia] Herba Mauri cuiusdam industriâ cognita est quam vocant Escorzoneram. Existimant eandem esse quæ olim Ptolemeus liberatus sit, vt Cardanus lib. 6. de rerum variet. prodidit, qui Escorzone, ram vocat.

Lobel. Icon. Plant. p. 551. & Obs. p. 298. Scorzonera, Viperaria.

Casalp. p. 518. Scorzonera de qua Nicolaus Monardes Hisp. quam multi existimant apud Dioscoridem Chondryllam esse, sed magis videtur ad Tragopogoni genus reducenda.

Camer. hort. Scorzonera floribus simplicibus & plenis in multis locis Germaniæ, à qua Hispanica non alia ratione quàm soli & Climatis ratione videtur differre. Aliquot huius differentias Pannoniæ & Austriæ peculiaries recenset Clusius.

Thal. Scorzonera tenuifolia lutea, de quo stirpis genere varia variè hæcenus statuerunt. Nā initio planta Hispanica nonnullis dici cepit, deinde Scorzoneræ nomen ei accessit: plurimis in Germaniæ locis reperitur. Differentias verò foliorum ratione & florum etiam evidentes obinet, ita vt altera sit latifolia, altera angustifolia. Est etiam

etiam altera subdulci, altera amara radice, quā antidotaria vi magis præditam esse existimo.

C.B. not.

Hæc eadem verba Thali pro suis recitat C. Bauh. Phyt. qui præterea male separare videtur suam Scorzoneram i. siue latifoliam sinuam, seu Matthioli Hispanicam, ab eiusdem Boëmica, seu sua latifolia secunda. Matthiolus Equidem has non distinguit. Non male quidem C. Bauh. Scorzoneram Serpentiariā quoque, quod contra venena serpentum efficac habeatur, cognominari posse diceret, sed id ipsi non donandū quod Scorzoneram & Serpentiariam eandem statuat. Serpentiariæ nomen de pluribus dicitur plantis. Tragopogonis porro adnumerandas esse eas plantas, quas vulgò Scorzoneras vocant, nemo est, vt arbitratu Clusius, qui dubitet. In eo solum differre videntur quod illorum radix minime sit viuax, contrā quā Scorzonera.

Tragopogonis Scorzonera differrentia Locus.

Tabern. Icon. & hist. Scorzonera Hisp. Viperaria. Item Scorzonera Germanica. Mirar tantam similitudinem picturæ Scorzonerae Hisp. cum Scorzonera Germ. si diuersarū plantarum. Oritur montosis locis, præcipue humectis. Maius Scorzonerae genus duntaxat in Hamburgensi monte Pannoniæ inuenit Clusius, quodā loco admodum herbofo, & arboribus circumscripto. Boëmicam nasci scribit Matth. in monte quodā fluoso, viginosque, nō lōge à Poggebro. Scorzonera latifolia siue Hispanica ex semine mihi feliciter Montbelgardi prouenit in Horto Ill. E. C. vbi caulem & semina petulise, perit interdum tamen, plantæ non ferunt caulem ante tertium annum: eam etiam habui Lugduni & Genevæ in hortis meis, primo anno non ferebat caulem: Lugduni florebat Maio, Genevæ Iunio. Patavii observavi mēse Martio in horro D. Cortusii: Spire vidi florentem Iunio in cultissimo horro Clarissimi viri D. Tenguadel Affessoris.

Vires

Tota planta magni est vius ad magnos morbos depellendos. Namque præsentaneo remedio aduersus viperarum cæterorumque venenatorum morsus ictusque, ac pestiferos morbos quoscunque, tam è foliis, quā è radice succus desumitur, præbeturque potandus: Veilis repolita conseruæ modo ad vertiginēs & capitis dolores, aliquoties ꝑ̄b. in hebdomadē sumpta. Comitialibus item ingruente insultu mirè affectis subuenit. Cardiacis item datur & vertiginosis. Enimvero commanducata per se radix tristitiam discutit, hilaritatemque conciliat. Quin etiam lateus radicis succus oculorum aciem acuit.

Dolor capitis Comitialis

Oculi.

Tanta eius vis, inquit Manardus, aduersus Scorzonem, vt si eius succo tangatur, torpeat confestim: si iniiciatur in os, pereat: manibus eo succo illitis contrectatur serpens prædictus sine periculo: non enim mordet, atque adeo torpescit, vt semimortuus videatur: qui fuerit ictus, si comedat de eius radice, aut succum foliorum bibat, confestim sanatur, si inflatus iam fuerit, desidet tumor: sedantur dolores, & deliquia: si præsumatur antequam momorderit, non superueniunt praua symptomata: bibitur eius succus clarificatus, vel per se vel cum aliis roborantibus cor, aut veneno resistentibus, non solū ad Scorzonis ictum sed & ad Vipere, aliorumque serpentium: datur eius aqua distillata ad febres pestilentes & malignas: prouocat enim sudorem misericordem, vbi natura hunc motum tenet: confert ad melancholias, tristitias & deliquia: miscetur quoque epithematibus cordi conferentibus: radices conditæ per multos dies assumptæ, & aqua prædicta obstruções Hepatis & Lienis tollunt:

Febres pestilentes.

menstruasque purgationes moluntur.

An porro similibus facultatibus prædite sint Scorzonere Pannonicæ quibus celebrem illam & adeo decantatam Hispanicam pollere aiunt, neminem adhuc periculum fecisse arbitratu.

TRAGOPOGONIS SPECIES, SIVE SCOR- zonera humilis latifolia.



Latiora breuiorque habet folia, quā Scorzonera maior Pannonica i. Clusii, Bupleuro latifolio, siue Elaphobosco Mōpelliano non valde dissimilia, crassiora tamen & duriora, quinque nervis, seu venis per longitudinem excurrentibus, distincta, ærulei quodāmodo viridi permixti coloris,

gusto verò aliquantulum amaro & fetuido: caulis inter hæc assurgit gracilis, pedalis altitudinis, striatus, raris foliis septus, cui insidet / superior similis, luteus, magnus: quo marcido nascitur in calycibus semen oblongum, asperum, Tragopogo simile, sed minus, in villosa materiā albā latens: radix pollicaris est crassitudinis, interdum maior, longa, nigro, rugosaque cortice tecta, intus alba, quæ contracta lacteo succo manat, successu temporis haescente, superiore parte, hirsuta veluti casarie donata est, & in plura capita plerumque extuberat, ex quibus folia prodeunt.

C. Bauh. Phyt. Scorzonera 3, siue latifolia nervosa, Clusio humilis latifolia.

Hanc Clus. in monte Badensibus thermis imminente, vicinisque aliis locis, observavit in Austria.

TRAGOPOGONIS SPECIES SIVE SCOR- zonera humilis angustifolia.



Firmatur hæc crassa radice longā, nigro, denso, rugoso cortice prædita, lacteo succo plenā, quæ nunquam superiore parte in plura capita, quemadmodum præcedens, extuberat, crassitudine minimi digiti (nouellarum plantarum instar) villosa: ex quibus multa Vuuu 4

Descriptio

HISTORIÆ PLANTARVM.

nascentur folia Tragopogo similia, firmiora tamen, breviora, & eiusdem, cum præcedentis foliis coloris: inter ea excrefcit humilis, palmum vix excedens caulis, aliquot breuibz foliis septus, cauus, florem in summo fastigio ferens flauum, alteri ferè similem: semen deinde in longioribus caliculis. Scorfoneræ Hispanicæ semini par, minus tamen, quod maturitate, leuissimo auræ flatu excutitur, & eius arbitrio fertur.

C.Bauh. phyt. Scorzonera 4. siue angustifolia prima.

Locus & Tempus.

Hæc & sequens florent Aprili & Maio: semen interdum Maio, aut sub lunii initium maturescit.

Meminit etiam Clusius Scorzoneræ humilis fibrosa radice quæ illi 4. C.Bauhino verò quinta dicitur.

TRAGOPOGONIS SPECIES SIVE

Scorfonera maior angustifolia subcæruleo flore.

Descriptio



Frequentia huic sunt folia; longa, Tragopogi foliis minora & angustiora, inter quæ cubitalis assurgit caulis, cauus quidem ille, sed firmus, durus, viridis, aliquot oblongis foliis septus, & supremâ parte in binos aut plures ramulos diuisus, ferentes in longioribus calicibus florem Scorfoneræ Angustifoliæ

floribus non dissimilem, nisi quod paulò minor sit, & coloris ex cæruleo purpurascens, iucundi odoris, pastillorum è benzoino confectorum nidorem quodammodò æmulantis, sed fugacis admodum: sena deinde, octona, aut plura in singulis calicibus semina, Scorfoneræ seminum æmula, quæ matura, cum suo pappo à vento excutuntur: radix singularis, minimi digiti crassitudinem æquat, denloque, foris nigricante, & rugoso cortice obducta, supremâ parte hirsuta, & villosa, quæ vulnerata, succum exstillat initidò lacteum, deinde fuluescens, gustu primum gummoso, postea aliquantulum acti: viua est, vtriusque radices, vetustate crassior euadens, & superiore parte in plura capita subinde exuberans.

Clus. Pannon. p.639. Scorfonera Pannonica 5. Hist. post. lib. 5. p. 139. Scorfonera angustifolia elatior pannonicæ. Scorfonera maior angustifolia cæruleo flore.

C.Bauh. Phyt. p. 538. Scorzonera 6. siue angustifolia subcærulea.

TRAGOPOGON SPICATVS

tenusfolius

Tragopogon spicatus Histor. Lugdunensis,



VIRGA AVREA VVLGARIS latifolia.

radice; foliis, caule ge- Descriptio

niculato, similis est reliquis Tragopogi generibus, nisi gracilior caulis est, radix tenuis, folium angustius, flor autem luteus maximè discrepat, & qui spicatum coarctatus sit.

C.Bauh.

phyt. pag. 536.

Tragopogon

4. siue spica-

tum luteum.

Geniculatum hu-

ius incedit radice, oblique per terram acta: fusca, frequentes dimittens fibras albicantes, sapore aromatico: caules recti & rigidi, duos aut tres circiter cubitos alti, striati, subhirsuti, medulla fungosa farcti: folia tum à radice, tum in caule, & hæc quidem alter-



natim, longis pediculis appensa, interdum nullis aut perquam breuibz donata, quorum quæ ima sunt, palmum ferè lata existunt, duos circiter longa, superiora minora, atrourentia, vtræque hirsuta & per ambitum serrata: flores, tum in summo caule tum pediculis peculiaribus ex foliorum alis exortis, frequentes insident, Doricæ vocatæ floribus similes, lutei, magnam partem staminei, in pappos euanescentes.

Virgam auream vulgarem latifoliam multi Solidaginem Sarracenicam, heidnisch wundkraut/ appellant. An autem hæc vera sit Solidago Sarracenicæ asserere non vult Matthioli. Is in post. comm. Ital. & Lat. cum magn. fig. quam vulgò Virgam auream vocant Herbam Iudaicam & Paganam cognominat, atque eius flores non esse similes Camomillæ, vt Fuchsius in suo herbario pinxit. Negat præterea esse villo modo Sideritin primam. Non existimo ego Matthiolum nouisse discrimen inter Solidaginem Sarracenicam & Virgam auream: reprehendit figuram Fuchsii, quum tamen planta quam pingit, ei nota non sit: præterea eius figura, quod folia attinet minùs probanda videtur: merito dixit se nolle

Matthioli.

nolle asserere, an sit vera Solidago Sarracenica.

Fuchs. nos.

Virga aurea, inquit Gesn. de hortis, vulgò ab Italis dicta, nominatur a Fuchio Solidago Sarracenica (latifolia, vt ab ipso nobis præsentibus appellabatur). Verùm præceptor Fuchio hac in parte assentiri non possum, quum hæc plantæ non parum differant.

Hist. Lugd. p. 1272. Virga aurea Matthioli. Itē: Virga aurea Dodonæi. Dux figuræ eiusdem plantæ.

C. Bauh. Phyt. Virga aurea 2. siue angustifolia. Hæc sæpè sine crenis vel saltem minùs cōspicuis, aliquando folia circum minutissimè serrata: foliis oblongis, aliquando subrotundis.

Nomen

Virga aurea hæc planta nomen inde accepit, quòd ramuli floribus grauidi, auricolorem virgulam referant. Belg. Gulde ronde. Gall. Verge d'or. Sunt qui Leucogaphin Plinii aurament. Solidago & Consolida ab aliis à viribus denominatur.

Locus & tempus

Copiosè prouenientem vidi Genevæ. Basileæ cum essem obseruavi copiosè florentem Octobri in monte Mouets, & in monte propè Trenzach, in eis etiam Augustè florentem in monte propè Leutach.

VIRGA AVREA SIVE SOLIDAGO SARRACENICA latifolia serrata.

Descriptio



Triplidatiora huic quam iam dixi folia; longiora, cæteroque similia, perinde vt caules ramique: at verò flores lutei, papposi non secundum ramulos spicati, sed summis extremisque umbellam quodammodò effigiantes hærent.

Hist. Lugd. p. 1271.

Consolida Sarracenica maior: item p. 1273. Virga aurea altera Lobelii. Dux figuræ vnius stirpis existimo duobus diuersis capitibus descriptas.

Casp. Bauh. Phyt. Virga aurea 3. siue latifolia serrata: Reperi in monte Rosberg propè Maslmünster florentem Octobri: Frater Casp. Bauh. in Basileensi monte Mündschstein.

VIRGA AVREA ANGUSTIFOLIA SERRATA, siue Solidago Sarracenica.

Virgam auream angustifoliam hæc voco, ad alterius differentiam quæ foliis latioribus prædita est: quatum vtraque à Virga aurea vulgari diuersa est. Hæc itaque, de qua nobis sermo, bicubitalis & tricubitalis est; caulis striatis, glabris: ex quibus alternatim folia nascuntur palmum & sesquipalmum longa, vnciam vnam aut duas lata; similia ferè foliis Salicis auricu-

late, Doriæ instar per ambicum crenata, sed tenuiora, glabra, non hirsuta vt in vulgari, sapore quodam aromatico prædita, calidiusculo: flores non secundum caulem, vt in Virga aurea vulgari, sed extremis furculis vt in Doriæ, vt umbellam quodammodò mentiantur, lutei, foliis longiusculis; ternis vel quaternis constantes, staminibus in pappos resoluendis mediū obtrinentibus.



Descriptio

Trago, Dodon. & Fuchio, Herba fortis, quibusdam Herba fortis, quibusdam etiam Cartaphylago & Filago, cum, inquit Fuchius Cartaphylax dicendum esset cuius nec descriptio isti conuenit.

Herba fortis, Herba fortis.

C. Bauhin. Phyt. est Virga aurea 4. siue angustifolia serrata cuius aliam adhuc speciem esse asserit longioribus foliis.

H. Lugd. p. 1270. Consolida siue Solidago Sarracenica à coniungendis vulnerum labris à Sarracenis & Turcis ita dicta: Herba fortis Gall. Consoude & Consolide Sarrazine. Dux figuræ habet, vni titulus Solidago Sarracenica Fuchii, alteri Solidago Sarracenica Lobelii.

A me collecta est in monte Rosberg propè Maslmünster, & plantata in Horto Ill. E. C. florens Septembri; ac etiam Octobri.

VIRGA AVREÆ SIVE SOLIDAGINI angustifoliæ affinis Lingua auis Dalechampii.



Descriptio

Lingua maior duorum aut trium cubitorum, est cubitorum, caule striato; cauo, per quæ ex longis interuallis alternata folia Solidaginis Sarracenica non multum absumilia, sine pediculis adnata, palmum aut sesquipalmum longa, femunciam circiter lata: in ambitu serrata, in acutū mucronē desinentia, & subtus veluti tomento obita: supremus caulis in furculos crebros diducitur, atque hi rursus in pediculos, in quibus flores lutei Solidaginis Sarracenicae.

Descriptio

Lingua ma- H. Lugd. p. 1037. Lingua maior. Cameratio in-
ior H. Lugd. ter icones Hircyniarum stirpium fol. 3. Conyza
Conyza maxima ferratifolia.

rsfol. Cam. An Lob. Icon. Plant. p. 347. Conyza Helenitis
 foliis laciniatis? Geln. hort. Conyze aquaticæ
 species. Thal. Conyza aquatica maxima ferra-
 tifolia. C. Bauh. phyt. Conyza 12. siue palustris
 ferratifolia.

Locus & Non placet à Dalechamptio reponi inter Ra-
Temper. nunculi genera cū quibus nihil commune habet.
 Ante triginta annos plantæ caulem cum foliis
 non floridum repofui, vbi collegerim non recor-
 dor. Siccam etiam habui à Richnero.

ALISMA SIVE DAMASONIVM Veteribus.


Alisma, quod alii *Αλίσμα*, alii *Δαμασόνιον*, alii
Αλίσμα, alii *λίσμα* vocant, teste Dioscoride,
Alid. Aco- folia habet *λίσμα* similia, angustiora tamen
ron. Lycop. & ad terram deflexa: Caulis est cubito altior, ha-
 bēs capitula thyrii specie, (quidam *εστρεμίδης*) flo-
 res sunt tenuis, albi, subpallidi, radices *μελας*
εστρεμίδης, tenuis, odorata, acres, subpingues:
 Amat locos aquosos. Radix drachmæ vnius aut
 duarum pondete pota cum vino, commoda est
 his qui Leporem marinum vorarunt, & quos
 Rana rubeta momordit, & qui Opium hauserūt.
 Item ad tortiones [*εστρεμίδης*] & dysenteriam, tum
 per se, tum cum pari Dauco pota. Conuenit e-
 tiam conuulsis & ad vteri affectiones. At ipsa
 herba aluum sistit, & fetus reducit, & impoſita
 tumores (*εστρεμίδης*) mitigat.

Meminit & Plinius lib. 25. cap. 10. Alismatis &
 quidem duplicis: alterius laciniatis angustis foliis,
 alterius maioribus foliis, vtriusque in syluis,
 cætera quæ habet sunt Dioscorideæ. Eius in cal-
 calo expellendo vires se casu expertum esse tra-
 dit Galenus, in dysenteria autem minime.

Æquinoctia De Alifinate siue Damafonio, magna inter
 Auctores controuersia: aliis Plantaginem: aliis
 Calceolum Mariæ: aliis Digitalem: aliis Men-
 cham græcam: aliis Auriculam vris, aliis Primu-
 lam veris: aliis Bifolium maius & minus: aliis
 Plantaginem aquaticam: aliis Saponariam: aliis
 Lilium conuallium: aliis Halyimum: aliis Elle-
 borinen: aliis Costum hortensiem, aliis Alifina
 Monspelienſium, siue Dorian de qua iam: aliis
 aliam plantam statuentibus.

ALISMA MONSPELIENSIVM siue Doria.

Descriptio Oblique fertur radix, crassitudine digitalis, al-
 ba, multas longas ab inferiore parte fibras
 dimittens, concaua, vbi in caulem excreuit, sapo-
 re aromatico & amaro, caulis trium aut quæ-
 tuor cubitorum est altitudine, rectus, simplex,
 tōcœuus: cui alternatim sine pediculo folia ad-
 nascuntur, Lepidii foliis accedentia, non
 neruosa vt sunt Plantaginis aquaticæ, quibus e-
 tiam sunt longiora, acuta, crenata, pinguiora,
 prius folia habent aliquid simile cum plantagine a-
 quatica, non tamen sunt ita lata, nec neruos se-
 cundum longitudinem habent, cum pediculis
 sunt cubitalia. Sunt sapote Angelicæ aromatico,
 sed remissiore, amaro: caulis fastigium in ali-
 quot digiditum furculos, qui *stres* sultinent Iaco-
 bræ luteos, sed minus foliosos, in pappos abeun-
 tes. Sculptor noster malè pro ferratis veluti
 pilos in icone nostra demonstrat.



Geln. hort. p.
 286. Virga au-
 rea, fortè Pana-
 ces Chironium
 cui Lapathi foli-
 um tribui-
 tur, nisi id po-
 tius Doria circa
 Monspelium di-
 cta sit.

An Lobel. &
 Pena Aduers. p.
 124. Norbonen-
 sium Dorea qua-
 si aurea, quam
 perperam Doria
 vocant: neutri-
 quam Doræ du-
 ci tritemū, quasi
 exorice huius
 repetæ laudem
 verè asserūt her-
 barii quidam.

An Theophr. Panax Chironium
 & Plinii Pharnaceum. Figura Aduers. non pla-
 cet. Lobel. Obl. p. 258. Ic. plant. p. 297. Herba Do-
 ria. Item Icon. plant. p. 277. Herba Doria Narbo-
 nenſis.

Camer hort. Dorea herba vtrique maior &
 minor ad Consolidam auream accedens.

H. Lugd. p. 1273. Dorea siue Herba aurea Nar-
 bonensium Penæ, vulgò *L'herbe Dorée*. Item Li-
 monium aliud.

C. Bauh. phyt. Virga aurea 1. siue maior, vel
 Doria, id est, aurea.

Alifina siue Damafonium quod quidam Mon-
 spel. diiudicant, habeo in in horro ill. E. C. viua-
 ci radice quod floret Iulio & Augusto, semer
 maturum Septembri; Vidi etiam Monspelii Ma-
 tis florentem ad flumini ripam prope Castel-
 neuf: vt & Patauii: Tiguri florentem Iunio in
 horro D. Gefneri qui Dorian appellabat. Ferra-
 riæ in horro monasterii S. Dominici.

*Locus &
 Tempus.*

TRIPOLIUM MAIUS ET MINUS



Descriptio Tripolium
 vocat hodie quidam
 herbam mari-
 tinam, cubita-
 lem & sciqui-
 cubitalem, ra-
 dice fibrosa he-
 rentem: folia
 ad Limonii
 maius folia
 accedunt, stri-
 ctiora, longi-
 tudine ferè pa-
 ria, neruis re-
 ctis Plantagi-
 nis donata,
 glabra, nullo
 ordine per ra-
 mos crescen-
 tia: caulis fa-
 stigium ramo-
 sum flores gerit furculorum extremis hærentes,
 purpureos caruleosque, qui in pappos euascent.
 Tripolium, [ait Diosc.] folia habet Maris, attra-
 uenit

men crassiora : caulē palmareū & superna parte diuifum. Eius flos ter die colorem mutare perhibetur, [Id fieri poffe, inquit Lobel. & Pen. in Adu. lubet credere, cū videamus ē naturæ officina multō mirabiliora euenire:] ita vt manē candidus, meridie purpureus, vesp̄i puniceus aspiciatur. Radix est alba, odorata, calidi gustus.

ca, siue venenis resistentia medicamenta.

Caterū Tripolium, Turbich Serapionis, radix alium non citet decocto & succo pota ait Lobelius. Sed ego cum non intelligo, Si Tripolium quod exhibet, alium non cit non erit Dioscor. Tripolium quod *ῥιπολίαν* videri dicitur.

EUPATORIIUM ADULTERINVM.

CAP. XIII.

Reperio

(Matth. verba sunt) in historia Tripolii non parum hallucinatum esse Plinium libro 21. cap. 7. vbi turpiter Tripolium cu polio herba confundit, adeo vt asserere non dubitauerit, polium ter in die foliorum mutare colorem. Id quod de Tripoli floribus tradidere tum Dioscorides ;



tum Antiquorum reliqui.

ῥιπολίαν, inquit Dodon. gall. vocatur Latine Tripolium, Arabicē Serapioni, capite 330. Turbich, sed non est Turbich Mesue aut Auicennæ, quidam vocant *Camomille bleue*, vel *Marguerite bleue*, quæ tamen nomina non conueniunt. Fabulosum est [ait etiam quod à Dioscor. adscribitur, tradi nempe vno die ter colorem floris eius mutari : & manē album, meridie purpureum, vesp̄i *φανικόν*, id est, phanieum. Sed tamen tres florum colores vno die reperiri posse, veritati hand repugnat. Nam cū flores omnes, non simul, sed particulatim & sensim perficiantur, res facile contingit florum colores obseruari : incipientium nempe, completorum, & deficientium. Nondum patentes aut completi subpurpurei sunt : perfecti patentesque, quales scripsimus : deficientes papporum candidam ostentant lanuginem.

Camer. hort. Tripolium à Lobelio depictum. C. Bauh. Phyt. Tripolium 1, siue maius. Item Tripolium 2 siue minus. Nasctur, inquit Dioscor. apud Dodonæū, Tripolium locis maritimis, quæ vnda alluit, recedensque demittit. Ac talibus quidem in Belgii quibusdam maritimis nostrum reperitur : vt in Zelandiæ insulis. Neque videlicet in mari, neque in sicco, sed locis, quæ æstus mare allidit, recedens, refluens, retròque commicans deserit. Translatum ad hortos diutine viget, sed luxurians grandescit, & in fibras radices commutat. Æstiuis mensibus flores facit. Scatent hæc, teste Lobelio, Narbonica & Anglica littora & aluminum crepidines, quas refluxus & maris æstus inundant, vbi ferme nulla alia herba comparer. Frequens in litore Veneto.

Temperā. Tripolii radix, vti Galenus ait, gustanti acris est, & facultate calida in tertio excessu. Dioscorides radicem in vino potam duarum drachmarū pondere per alium aquam ducere refert : itēque vrinam. Conciditur etiam ad alexipharma-



Quarum Descriptio
A tipas accolit adulterinum Eupatorium, insigni proteritate dūm, trium, aut plarium cubitorum altitudine gliscens, caule recto, tereti, tomentoso & in vitidi purpurante, medullā albā pleno ; gratum & aromaticum odorem, cū inciditur, spirante, multis alis concauo :

folia per interualla disponūt, sed ex eodem ceu genicula plura exeunt in vnum pediculum coeuntia, veluti in Cannabe, cuius foliis similia sunt satis, oblonga, acuminata, per ambitum serrata, pilosa, sapore amaro : flores in mucatis glomerati, meris ferē staminulis constantes, ex albo purpurascunt, in pappos tandem facillentes. Radix subest fibrosa, alba, non ab simili cum foliis gustu.

Trago Herba S. Kunigundis dicitur, quam Officinæ hactenus pro Eupatorio non sine errore vsurparunt.

Dodon. Gal. Pseudohepatotium mas, Eupatoria *bastard masle* : in officinis non sine magno errore pro Eupatorio vsurpatum : Doctis recentioribus Eupatorium aquaticum, aut adulterinum, Belg. *Coning hunceruyt* / *herre claueren* & *Bos scenscruyt manneken*. Dod. lat. in fol. Vulgare siue adulterinum Hepatotium vulgi, Eupatorium nonnullorum, Eupatotium adulterinum Fuchsi, Cannabina plerorumque à similitudine foliorum Cannabis, Terzola Baptiste Sardi exstimata.

Lobel. Aduers. pag. 227. Aquatica Cannabina Eupatorium dicta mas, quod permulti Pharnacopæi, Belgæ præsertim, Eupatorium Auicennæ foliis Cannabinis præditum vocitant. Obseru. pag. 284. & 285. Cannabina aquatica planta, Eupatorium dicta, Officinis Galliæ Eupatorium cannabinum. Officinis Belgii perperam Eupatorium Græcorum. Icon. Plant. p. 528. Cannabina aquatica; siue Eupatorium mas.

Amato in Dioscor. lib. 3. enarr. 163. Cannabis silu. & non, vt multi rentur, Eupatorium. Item lib. 4. enarr. 44. Eupatorium Auicennæ ; quod ait falsò Ruellium apud Dioscoridem Hydropiper esse credere.

Merito Cord. in Dioscor. lib. 2. cap. 191. Ruellium à veritate aberrasse scribit, quod falsò vocitatum Eupatorium Hydropiper esse iudicet. Adolph. Occo in pharm. Eupatorium Auicennæ

Herba S. Kunigundis.

Pseudohepatotium.

Eupatorium aquaticum.

Cannabina multis Terzola Sardi Cannab. aquatica.

Eupat. cannabinum.

Cannabis silu. amato; Ruell. err.

Plin. hallucinatur.

Non est Turbich

Diosc. fabulosus

Temperā.

Aquam & vrinam ducit.

(ita quoque vocat Rob. Constant. apud Amat.) Kunigundis herba & Origanum aquaticum. Castor. Durant. p. 177. Eupatorium vulgare & Auicennæ, iis in fine herbarii aliam habet figuram quæ melius placet. Anguill. epist. 14. Eupatorium Auicennæ non verum.

Math. in prior. comm. Lat. Eupatorium Auicennæ inscribit: Euchar. Roesslin. Eupatorium. Harchio in Ono. pag. 38. Eupatorium Auicennæ, foliis Cannabinis. Monach. in Mef. dist. 6. cens.

Eupat. A. 189. Pseudo seu Adulterinum Eupatorium.

Fusch. hist. Eupatorium adulterinum, *Eupatoire des Arabes*. De compos. medic. Eupatorium alterum, Eupatorium Auicennæ, quod pro vero & Græcorum Eupatorio vsurpari non debet: sed eo vtendum vbi Sepalsarii Auicennæ medicamenta construunt. Casalp. Eupatorium vulgò, Thallio pag. 85. Pseudohepatotium mas, seu Hepatotium Auicennæ quorundam: Camer. hort. Eupatorium. n. Auicennæ siue aquaticum.

H. Lugd. p. 1073. Eupatorium vulgare, quod vero Dioscoridis Eupatorio ferè omnes substitunt, non rei ignoratione, sed maiorum virium obseruatione, & experientia ducti, quas etiam ipsa aspectu insignis planta, foliorum amari tudine & odoris præstantia, satis præ se fert. Igitur propter amicas hepatis vires, fortè & ob folia Eupatorium vocauerunt, verius Pseudo eupatorium dicendum.

C. Bauh. phyt. Eupatorium 1. (2. apud Matth.) siue cannabinum. Tabern. Herba S. Kunigundis. Schvv. Eupatorium adulterinum, Origanum pahstre, Cannabina aquatica: Circa scrobium, tiuulorum, ac stagnantium aquarum margines, flumiorum ripas, aliisque vlginosis, subinde & in veteribus ac humentibus muris nascitur: Amataquosa & vicina aquis loca, non tamen rigari omnino postulat. Iulio & Augusto floret ac viget: radix restibilis est; sed caules foliæque hyeme intercidunt. Obseruauit varijs in locis, vt Lugduni, Geneuæ, Monspelij, Baileæ, & Montbelgardi.

Vires & Temper. Herba viribus insignis; quamuis ab Antiquis silentio fuerit prætermissa. Amaricanis quidem est gustus, odoris non minùs tamen suauis, quàm Agrimonia odorata, cui viribus proximè accedit, ac nonnullis in affectibus excellentior est. Obesæ nimis naris erant, te-

ste Lobelio, qui scetere eam dicabant. Radici minorum seu fibrarum eius incilarum pugillus in vino decoctus, colatus & potus, Gesnero per per horam post, alium semel mouit, postea verb vomitum duodecies ferè cum magno labore: ita vt Ellebori albi instar purget, sed longè facilius & cùtius, profuit sanè plurimùm, magnà pituitæ copiâ euacuata. Gustu vehementer amara est, inquit Fuchsius, vt calidam & siccam esse in secundo ordine aut in medio tertii non sit dubium. Haud dubiè hæc herba astringit, expurgatque, & quæ in venis est crassitiem incidit: Potest obstructions iccoris & lienis aliarumque partium corporis soluere. Hic frutex, præsertim in flore, vulnera & vlcera sanandi vires obtinet. Argentina, autore Trago, in pecoribus tantùm curandis vsurpatur. Certum est vino decoctam herbam aut aquam destillatam vitii internorum membrorum vtilissimam: Sussitu herbæ siccate venenata animalia fugantur. Aiunt ceruus telis lætos remedia ex hac herba petere. Pseudo-Eupatorium, vt apud Matthiol. & H. Lugd. legitur, calido siccoque est temperamento: calfacit, tenuat, abstergit, incidit, aperit. Ex recentibus foliis contusis succus exprimitur, & insolatus cogitur in pastillos, quorum frequens in medicamentis vsus. Confert maximè eiusdem decoctum, aut epotus succus iocinoris doloribus & aliis eiusdem affectibus ab obstructione ortis. Quare vtiliter propinatur hydropicis obstructionibus vexatis. Datur quoque succus ad ventriculi apostemata à frigiditate nata, quibus etiam prodest herba exterius illita. Foliorum decoctum auxiliatur diuternis, præsertim pituitosis, febribus ab obstructione prouenientibus. Idem vrinæ & menses pellit: scabiem pruritumque sanat cum fumaria decoctum ex caprino sero: sed succus validior est, qui potus elephantiasis incipienti medetur. Flores illiti vulnera recentia & vlcera sanant. Datur idem vtiliter pecoribus tussientibus & anhelosis equis, quorum etià dolores finit. Succus binum obolorum pondere in catapotijs deuoratus intestinorum vermes necat. Idem recens expressus illinitur commode ex aceto & sale aduersus scabiem. Addi scribitur à Schvvencsfeldio balneis ad vteri affectus, & lixiulis aduersus inueteratos capitis dolores.

Succus.

Decoctum.

Hydrops:

Febres diuturnæ.
Menses.Elephantiasis.
Vulnera.
Vlcera.
Pecora.

FINIS LIBRI VIGESIMI QVARTI.



ALCEA TENUIFOLIA CRISPA.

Descriptio



A Vulgaris Alcea in eo potissimum differt, quod folium habeat tenuissimè in creberrimas lacinijs tenues, crispas diuisû; aliqui folio alterius Alceæ par. Flos purpureus magn⁹, conuenit cum orbiculata seminum sublequentium placenta. An solus naturæ lusus: & an ex eodem semine proueniat præ-

cedens & hæc considerandum?

Lonic. Malua querna, Dens Leonis, *Sclerophyllo* *Lewenzan*. Ryf in Diof. Alcea altera, segmentis profundioribus laciniata. Camer. hort. & Hort. Lusit. Alcea tenuifolia folio crispo.

An Celsalp. Alcea quadam parua in syluis, quam ad Cannabin syluestrem reduci posse putat? An Cordo in Sylu. obsl. Alcea tenuissimis folijs?

C. B. nor.

C. Bauh. phyt. Alcea tenuifolia Camerario: Hæc ego non duas statuo species, sed tantum vnam.

Schv. v. preh.

Schvv. Malua sylu. seu Querna, Dens Leonis, *Zugen pappeln* / *fältyß*. Eodem cum priori loco natali, solummodò differens quoddam sub Quercubus nascatur. Schvv. prædè iudicat aliud discrimen in descriptione ostendi.

Locus & Tempus.

Collectam eundo Beffordiam Montbelgardo, plantam in horto Ill. E. C. obseruauit etiam circa S. Cosmum in Suntgouia: Frequens etiam in Harcinia sylua & apud Rhenum.

ALCEA VILLOSA.

Descriptio



Alceæ villosæ nomen dedit dēsus ille villus rigidusculus & asper quo tota planta horret. Rami palmares aut dodrantales, teretes, hirti, multi, ex radice simplice, gracili, palmati, statim exoriuntur. Folia parua, prolemque profundè in tres lacinijs serratas distincta; lantiginosa. Flores tamen ex foliorum fi-

nu quam in ramorum extremis, medijs inter Maluæ syluestris repentis & erectæ flores, purpureascentes, è quinque folijs compositi, è calyce magno quem componit duplex foliorum acuminatorum asperorum pilosorumque agmen; in quo succedit orbiculata seminum nigricantium placenta.

Hist. Lugd. Alcea villosa. C. Bauh. Phyt. Alcea 9. *Synon. Alcea hirsuta*

Valerandus Dourez à quo primum habui plantam vocabat Alceam montanam. Data mihi Ar. Locustæ gentinæ ab Agerio 1593, ubi audio in vicinia prouenire. Copiosam obseruauit & collegit Gener. I. Henr. Cherlerus in vineis circa Monipellum, sicioribus præsertim & in collem subqualium elatis.

ALCEA PANNONICA CAMERARIO.

Descriptio

Alcea Pannonica cuius semen communicauit Clusius, minutius vulgari, planta ipsa folijs primùm exit nullam diuisuram habentibus, rotundis, crenatis, postea in caulem asurgens magis laciniata profert. Hæc Camerarius.

An Alceæ genus tertium Clusio?

Huius figuram non inuenio apud Camerarium, nec in post. Hist. Clusius meminit. C. Bauh. Phyt. Alcea 4. siue Pannonica.

ALCEA AMPLISSIMO FOLIO laciniato.

Descriptio



Miserat nobis Bauhinus Alceam pulchram folio amplissimo mandis expansa ferè magnitudinis, in magnas partes diuiso, glabro, in pediculis tamen pili aliqui tenuiores quam in vulgari, si bene iudicamus ex sicca, flos etiam quem misit separatim, si eiusdem plantæ est, quod nobis persuademus, pediculo est tenuiore quam in vulgari, ac longiore vnciarum trium, folia floris qualia vulgari: calycis foliola minora, & minus hirsuta.

MALVÆ INDICÆ FORTE genus.

EX prima navigatione in Iauam à Batavis alla- *Locus?* *Descriptio*
tus est Clusio [Exot. lib. 2. cap. 19. decimus octauus] fructus subrotundus in plano formæ, vinctus ferè, nigro aut subfulco & leui cortice tectus, in quinque partes diuiso, sub quo latebat cartilagineus alius cortex, inæqualis & asper, ex-

xxx



cleus certè manducatus, lentum & viscosum quidpiam præbebat.

ALCÆA SOLISEQVA MVLTIS
Veneta.

Descriptio



quàm Alceæ vulgaris minores, sed peregrina elegantia acceptiores, ex luteo herbidi; vnguibus purpurantibus, quorum medium occupat cuneolus apicibus croceis & coccineis stipatus, quibus circumiicitur vtriculus membraneus hirsutus, striatus, quinis thorulis à medio sursum-versum radiatus.

Synon.

Alcea Gofficaria
Alcea Veneta
Malua Veneta
Alcea peregrina
Hypecoum Matth.
Lonic. nort.
Herba Hungarica

C. Bauh. Phyt. Alcea 8. sine vesicaria.

Conabantur nonnulli Trago persuadere Maluam seu Alceam Venetam eam esse stirpem quæ Dioic. Androsamos dicitur, sed errant. Existimat is eam congenerem esse vel Altheæ vel Alceæ.

Gefn. hort. Malua Veneta: Alcea peregrina. Hypecoum Matthioli, Malua & Alceæ species. Item in append. Alcea Bononiensis Volmarii.

Cord. Obs. sylu. alceæ species.

Lonic. stirpium ignarus duas habet figuras, & descriptiones vnius plantæ. Harum prior est Malua Venetiana, Venediger oder Wetter rößlin. Et Herba Hungarica. Unger frout.

tuberans eâ parte quâ superior

cortex diuisus,

continens in singulis localis

melcentibus quaterna aut quina

grana Alceæ Ægyptiæ granorum

magnitudine, longiora tamen, &

infinâ partē quâ cortici adhaerant

angustiora; nucleum exalbidâ

tunicâ testum intus verò subuirdem,

continentia, nullo manifesto

sapore præditum. An Maluæ ali-

quod genus? nucleus certè manducatus,

lentum & viscosum quidpiam præbebat.

Alcea Veneta vel peregrina Solisequa nominant. Sunt qui Gallicè vocent, La gloire du

Monde, & Germanicè Laternblum. Hort. Lus. mundi

Alcea peregrina. Veneta Solisequa sata in orto Ill. C. V. vit. Montbelg. quotannis prouenit: dum

annotauit non mihi placere pro Hypecou: Locus habebam etiam Geneuæ in orto: flos Junio,

semen maturat Iulio.

Alcea Veneta Tragi. Error quæ. raudans

Matth. in Dioscor. Hypecoum. Græc. ὑπεκούμ. Ital. Hypecou.

Camer. ad Matth. Hypecoum Matthioli, alii Alceam Venetam vel peregrinam Solisequam nominant. Sunt qui Gallicè vocent, La gloire du

Monde, & Germanicè Laternblum. Hort. Lus. mundi

Alcea peregrina. Veneta Solisequa sata in orto Ill. C. V. vit. Montbelg. quotannis prouenit: dum

annotauit non mihi placere pro Hypecou: Locus habebam etiam Geneuæ in orto: flos Junio,

semen maturat Iulio.

Nostra quoque figura quæ erat iam sculpta non placeat.

Quamuis quidam hanc Italicam & Venetam dicant, tamen nusquam meminimus, auct. Lob. & Pena in Adu. in Italia, nedum Venetis, nisi hortis vidisse. Admodum rudis est Commentator, qui

Ruta folia huic esse contendit: impositum huic vires Opit affert, Lobel. Obs. & Ic. Plant. Alcea peregrina Solisequa. Alcea vesicaria Dodonæo,

perperam Hypecoui Matth. Alcea Veneta Tragi. Matth. in Dioscor. Hypecoum. Græc. ὑπεκούμ. Ital. Hypecou.

Camer. ad Matth. Hypecoum Matthioli, alii Alceam Venetam vel peregrinam Solisequam nominant. Sunt qui Gallicè vocent, La gloire du

Monde, & Germanicè Laternblum. Hort. Lus. mundi

Alcea peregrina. Veneta Solisequa sata in orto Ill. C. V. vit. Montbelg. quotannis prouenit: dum

annotauit non mihi placere pro Hypecou: Locus habebam etiam Geneuæ in orto: flos Junio,

semen maturat Iulio.

Appendix ad cap. III. lib. XXIII.

Martell. Althæa Malua: siluestris, Brunsch. Althæa & Malua Hispanica. Camer. hort. Thal.

Clus. Hort. Lest. Althæa vulgaris. Lob. & Pena Adu. Ic. Plant. Gese hort. Althæa & Ibisus. Tragi.

Germ. Ibisus & Malua genus. Gese hort. Malua agrestis perus. Car. Alp. Malua siluestris prima,

& B. Inalua. Cordo in Diosc. Althæa, siluestris Malua genus. Et Hifi. Althæa, seu Malua palustris.

H. Lugd. Althæa Matthioli. C. Bauh. Phyt. Althæa seu Diosc. & Plinii, floribus candidis,

aut ex albidis dilutè purpurascens.

Ceterum notissima hæc est Althæa titulo passim autoribus, & omni Chirurgorum vulgo, ex

vnguento maximè quod de Althæa appellatur.

D. buerat autem nostrâ ætate in maiore nominis & usus honore Althæa esse: Nec M. ra quon-

dum peccatis sui greges videri compellere Hibiscum ex quo tam honestum Garcia illi appellatib-

em ferat: ut sola hæc inter omnes naturæ plantas à toto Med. ruz. An indicaretur: Siqui-

dem rebil Althæa Græcis aliud est, quàm si à mendendo Medicam simpliciter dicas: Quibus addis

in Medicina pharmacum remediumque: & addis

verbum mederi est: sic enim nominata est hæc

autore Dioscoride, id est, quod inter primas sit vtilis, & plurimis

polleat remediis. Nec aliter in Theriacis suis Nicander addidit aliquod sæpè appellat. Hanc Pal-

ladius in Octobri mensis Hibiscum dici testatur

his verbis: Althæa h. e. Hibisci folia, vel radices,

aut eius caulem tenerum decoctum, ut vinum ex

molli fiat fortè in dolium mitti asserunt. Nominatur tamen etiam Ibisus, teste Diosc. seu Ebi-

cus & Euficus ἰβισκος & ἰβυκος. Item Malua viscus, nonne ex Malua & Ibisco composito: Officinis

Bismalua, seu Vismalua, quasi Malua viscida, & ab excellentia effectus à quibusdam Aristalthea

[Aristalthea] inquit Phinius, à Theophrasto etiam

quodam dicitur [Malua siluestris] Est enim, ut ait

Dioscorides, in siluestro Maluarum genere.

Dicitur tandem quoque Dendromalache & Anadendromalache [δένδρον ἰβυκος] & Anadendromalache [δένδρον ἰβυκος] & Anadendromalache [δένδρον ἰβυκος]

quidam olus Iudaicum appellant.

Præter Althæam Bismalua dictam, nobis hæc quoque sunt gentia. Althæa profundè serrata

sive dentato folio. Althæa flore grandi Alceæ,

Thucini-

Thuringiaca Camerarij. Althæa arborefcens. Althæa species quibufdam arborea altera, vel Bryonia folio. Althæa Sida dicta quibufdam. Althæa flore luteo, quibufdam Abutilon. Appellatur etiam Abutilon Indicum à C. Bauh. Althæa. Sed & Maluam arboream nonnulli Althæam vocant. Sic quoque Lobelius & Pena in Adu. Maluam rofeam Althæam faciunt. Maluam crispam, Althæam crispam & maiorem appellat Olling. apud Gefn. hort. Plurimi, inquit Braffau. decepti funt, Alceam cum Althæa confundentes. Althæa Lobel. Clusij mihi videtur Alcea pentaphylli folio, siue Cannabifilu. Cortufi. Althæa demum dicitur de Ocimoide inter fupposititia Dioscoridis apud Cornarium de qua hiftoriæ nostræ generalis lib. 29.

Appendix ad C. IX. LIB. XXIII.

DE RHA SIVE RHAPONTICO
Veterum sententiæ.

Rha. Diof. Locus. **Delebitur.** **Pires.** **Exhibendi ratio.** **Rhacoma Plinio Radix Cusca similis.** **Vires.** **P** quod alij *ρῶν* vocant [alij *ρίον*, Romani *παυρίον*, inter spura Diof.] Nascitur in locis supra Bosphorum, vnde etiam adfertur, radix nigra, Centauro magno similis, minor tamen & rubicundior [i. e. *rubra*] quantum levis. Optimum est quod terendines non sensit, viscosumque gustu, cum remissa adstrictione (*adstringens siccitas*) & quod commanum pallidum est, & Crocum quodammodo colore refert. Postum facit ad inflationes, stomachi debilitatem, omnis generis dolorem, conuulsam, splenicis, hepaticis, nephriticis, tormina, vesicæ & Thoracis vitia, præcordiorum distentiones, vteri affectiones, coxendicum morbum, sanguinis sputa, anhelationes, singultus, dysenterias, cælicas affectiones, circuitus febriles, & venenatorum mortus. Datur ad singulas affectiones similiter vt Agaricum eodem pondere, & cum iisdem liquoribus, non febricitibus cum vino multo : febricitibus cum aqua mulsa, tabidis cum passo : plenici cum aceto multo : stomachicis ita vt est manditur ac deoratur, nullo insuper liquore absorptò. Tolle etiam lurida & imperpignes cum aceto illi. Et inflammationes omnes diuturnas diffundit cum aqua illitum ac impositum. Summa vetò ipsius vis est adstringere cum aliquantulum caliditate.

Rhacoma (ita enim vocat Plinius) affertur ex his quæ supra Pontum sunt regionibus. Radix Costo nigro similis, minor & rufior paulò, sine odore, calfaciens gustu & adstringens. Eadem trita vini colorem reddit, ad Crocum inclinantem. Illa collectio in inflammatione que sedat, vulnera sanat, epiphoras oculorum sedat ex passo illita. Insignita cum melle, & alia liuentia ex aceto. Farina eius inspergitur contra Cacoethes & sanguinem reicientibus drachmæ pondere in aqua. Dysentericis etiam & Cælicis, si febricarent, in vino : sin aliter, ex aqua. Facilius teritur, nocte antecedente madefacta. Datur & decoctum eius bibendum duplici mensura ad rupta, conuulsam, contusam, ex sublimi deuolutis. Si pectoris sint dolores, additur pipetis aliquid & myrrhæ : si dissolutio stomachi, ex fugida aqua sumitur, siue intus, siue extrâ, purulenti excretionibus : item hepaticis, splenicis, ischiadicis : ad renum vitia, suppuria, orthopneas. Arteric scabritias sanat ex passo, tribus obolis potis trita, aut

decoctum eius. Lychenas quoque ex aceto imposita purgat : Bibitur contra inflationes & perfrictiones, febres frigidas, singultus, tormina, asperitates, capitis grauitates, melancholicas vertigines, lassitudinum dolores & conuulsiones.

In Rheo (teste Galeno de Antid.) quoque fraus committitur. Nam quibus in locis nascitur, simulatque euulsum est, ipsum elixant, quò succum remittat, ac tam succum vt lyncerum & aquæ impermistum, quam Rheum exiccant, vt non elixum ad nos postea mittunt. Quamobrem scientia opus est verum ab adulterino secernendi, quam facillimè consequuntur, qui suæ spontis Rheum aliquando viderint. Nam elixi pars quæ sub aspectum venit, densa per totum & compacta non est, sed tior : & gustu tentatum saporem adstringentem, vel nullum vel obscurum remittit. Cum tamen si adulteratum non sit, vehementer adstringat. Citò tamen & ipsum foraminosum efficitur. Rheum [ait porro Gal. simpl. 8.] quidam Rha nuncupant, mistam habet tum temperatam, tum facultatem : habet enim quiddam terrestre frigidum, ceu indicio est adstrictio : & adiuncta est quædam illi caliditas : siquidem si plussculum mandatur, subacre conspicitur. Quin etiam aëreæ cuiusdâ substantiæ subtilis est participes, quod indicat tum laxitas, tum leuitas : verum [adde minime] & opera : ob id enim (Add. licet adstringens tamen) non tantum conuulsis, sed & ruptis & orthopneæ prodest : Sic quoque liuentia & lichenas sanat illitum cum aceto. Porro quò adstrictionis opera haud insisteret, hinc discernere liceat, quò sanguinem expuentibus, cælicis & dysentericis, conferat : nec enim reluctatur terrestri frigido tenue aëreum, imò eò quò deductum in altum valentioris effectus causa existit.

Meminit Rhapontici Paul. Agineta diuersis in locis. Et primò quidem de cruditatibus & vomitu in mulieribus prægnantibus, vbi dicit, bibant Ponticam radicem, quæ vernacula lingua Rha vocatur. Idem eodem lib. cap. 43. Si magis subducere volumus, de Rheo parum ammicemus. Item lib. 7. in antid. ex corallio podagrica, & paulò post in Antidotò podagrica Agapeti, dicit, Rheo barbarici. Et tandem l. 7. sub litera R. Rheon alij Rha vocant, compositum est ex terra frigida, & tenuium partium aërea substantia, calidæque ac leniter acri. Vnde conuulsa & rupta, & erecta ceruice spirationes iuvat. Item liuida, discutiendo. At adstringendo, sanguinis sputationibus, & cælicis & dysentericis prodest. Vtraque verò facultate, hepaticis.

Nunc Mesuem de Rhapontico scribentem audiamus, Rhubarbarum etiam clemens, inquit, & excellens est medicamentum, multas doses medicamento purganti maximè expetitas complementum. Calidum siccum ordine secundo potius quàm primo, substantia duplici constat, vna aquea, terrea, adstringente, corpus dante, profunda, altera aërea, & ignea (à qua rarum efficitur) superficialia, quæ suam terream, essentiam adurendo amarum effecit, & purgatorium, & obstructa liberans. Has autem substantias trahendo separamus : Vt calida & purgatrix in humorem transferatur, terrea verò adstringens remaneat. Bilem verò puritatemque illa vacuat, præcipuè à ventriculo & hepate, & inde sanguinem purgat, obstructiones liberat, & affectus malè natos sanat, iterum, hydropem, splenis tumorem, febres putidas, etiam diuturnas, dolorem hypochondrii,

Rheum Galeno
Adulterium

Facultates
ex Galeno.

Rhaponticum
Agineta.

Pontica rad.
dix.
Rha.
Rheon.

Rheum Barbar.
Substantia

Temperamentum.

Antidotum.

Euanthi
l. 7. p. 21.
trist. ag.

rum puncturum. Hac verò Hemorrhagiam pul-
monum, vel aliarum partium sistit: ex casu quo-
que contusa, rupta, fracta, interna, & exter-
na sanat, si eius drachma vna cum Mumie granis
duobus, & rubiæ tinctorum grano vno & dimi-
dio, & vino austero bibatur. Oleum quoque eius
contusis & contractis musculis, vtiliter illinitur:
singulum item & Dysenteriam sanat, præcipuè
assum, & cum succo plantaginis & pauco vino au-
stero potum. Rhabarbarum quoddam est Indi-
cum, alterum Barbarum, generis nomine appel-
latum, tertium Turcicum, omnium ignobilissi-
mum: Vt Indicum est præstantissimum, præter-
tum si recens est, & subnigrum, in rubrum incli-
nans: si rarum, tamen graue, si fractum ex ruto &
glauco, alternat: si mansum vel aliquo liquore
solutum, croci modo tingit. Indigenæ ipsum dies
quinque aqua macerant, qua siccata, trochiscos
fingunt regibus. Reliquum verò etiam siccatum,
sed iam exanimatum, & vi purgatrice tota, aut
propè tota, priuatum, venale ad nos transmit-
tunt. Hoc autem est densum, valenter adstrin-
gens, croci colore non inficit, contractum intus
nigricat, amissa colorum dicta varietate. Inno-
xium est Rhabarbarum, omni tempore tutò dat-
ur, omni est ætati salubre, atque adeò pueris &
prægnantibus. Efficacius autem agit sumptum
ex lero lactis, præsertim Caprini: aqua quoque
Intybi, & Apij vel plantaginis cocta, & colata
maceratum, idque omnino cum Spica Nardi a-
ctiorem eius in primis iuuante, expressumque.
Quod si ad liberandas obstructions propinan-
dum est, vini albi puri & odori modicum mace-
rando admisceatur, expressumque eius tum su-
matur, & cum deterfione ac purgatione opus est.
Quod si post purgationem viscera adstringendo
roborare volumus puluis eius triti datur: si ad-
strictio maior expetit, assum datur: si maxima
vsum. Rhabarbarum legitimum & integrum a-
liquandiu teri quoque viribus integris potest,
rariori autem & laxiori vehemens contritiui-
tutem resoluit. Datur expressum à scsquidra-
chma ad drach. tres. Tritu verò à drachma vna ad
drach. 4. Annos tres aut quatuor integrum incorru-
ptumque seruatur, si cæra sola, vel cæra cum tere-
binthina liquata circumlinetur, aut melle albo,
aut Psyllo aut Milio mergatur. Scalig. exerc. 104.
par. 8. Raued toti Ponto, atque vniuersæ Europæ
aduenam, Rha temerè vocant isti Græculatores.
Rhacoma verò cum eorum quidam appellasset
ostentator, non potui quin excuterer nomen. Item
exerc. 181. Malaca regnum efficacius in agro Cam-
pæ longè optimè Raued oritur: quod ipsi vocant
Calama. Hoc idem cum Rha Pontico existimate
extremæ dementiæ est.

Appendix ad Caput IX. Libri XXIII.

Liquet ex Fuchsis posterioribus Græcis,
Actuario præsertim & Nicolao Myrepsio, du-
plex esse Rha, seu Rheum Ponticum, & Barba-
rum. De Rhabarbaro postea: Nunc de Pontico,
quod Veteribus (vt Dioscoridi) *ῥῆμα*, *ῥῆμα* (vt
etiam Galeno) dicitur. Idem interdum cum adie-
ctione *ῥῆμα πόντου* (Rheum ponticum) appellatur.
Vltus est eisdem nomenclaturis Paulus. Interdum
etiam, perinde atque Actuaris, *ῥῆμα πόντου* (Ra-
dicem ponticam) vocans: Plin. Rhacoma: Cellus
radicem Ponticam. Hoc Rha Veterum purgandi
facultate destitutum fuit. Siquidem nemo vete-
rum Græcorum aut Latinorum illi vnquam pur-
gandi vim inesse literis mandauit. Imò inter Ara-
bes Serapio & Aucenna Rhabarbari historiam

tractantes, nullius prorsus purgandi facultatis,
quæ illi inellet, meminerunt. Nullam verò fuisse
purgandi facultatem in Rhapontico, Diosc. om-
nium maximè ostendit, qui disertis verbis in
Rhapontico supremam & maximam esse adstri-
ctoriam facultatem asserit. Porro nullam prorsus
habuisse Rha Veterum purgandi facultatem, ex
eius quoque succedaneo conspicuum euadit. Pro-
pterea namque (vt apud Galen. legitur) Centauro
Veteres utebantur. Apud neminem autem Vete-
rum legitur Centauro purgatoriam inesse facul-
tatem. Denique non habere purgatoriam facul-
tatem Nicolaus etiam Myrepsus, qui pro eo non
solum Centauro maiore, sed & Symphiti radice
viendum esse docet, satis confirmat. His omni-
bus accedit, quod Rhaponticum illud, quod D.
Gerardus Caroli Quinti Imperatoris apud
Solymmannum Turcarum Imperatorem O-
rator, propriis manibus in Ponti regionibus
eradicatum, in nostras regiones inuexit, ite-
dem purgandi facultate destitutum est. Nam ex-
perientia compertum est, duarum drachmarum
pondus datum alium haud mouere, sed pectus
adstringere. Hæc Fuchsius, quem talia non expe-
rientiæ edoctum, sed autoritate ductum narrare
credimus, siquidem vt mox dicemus, tres drach-
mas purgare experti sumus.

Qui vult, inquit Bellon. Obs. habere Rha-
ponticum, Constantinopoli Rhabarbarum expec-
tat: discernen non norunt: eodem enim quo
Rhabarbarum nomine vocant, eligat radices
longas & nigras, externæ & internæ Centauro
similes, manifestum est satis magnam esse diffi-
cultatem inter Rhaponticum & Rhabarbarum.
Hæc ille, qui an idem nobiscum intelligat Rha-
ponticum asserere veremur, plura videant lecto-
res, ex eius verbis quo c. de Rhabarbaro citatur.
Rhaponticum Antiquorum (ita namque inscri-
bit Lob.) Rha è Ponti flumine, Rha Dioscori-
dicum, nunc postremò cognitum, à Rhabarbaro
diuersum, Sequinus Martinellus, fratri Alberto
ad Angeli Symbolum Venetias misit, quod Mæ-
dici nulla reclamante notâ Theriacis addiderunt,
& ad ceteros affectus incilium deduxerunt: præ-
sertim Lugduni in Gallia Dalechampiis: neuti-
quam purgabat, sed astringebat. Sic & Pharma-
copœi nonnulli, vt Valerandus Dourez, huius
non semel fecerunt & viderunt periculum factum:
sed vt dixi Fuch. (quem Lob. sequitur) au-
thoritatibus, non accurata rerum obseruatione re-
tinetur. Sapius in officina Valerandi præscripti ad
Dysenteriam, & alios affectus, purgabat, sed le-
uius quàm Rhabarbarum, vt expertus sum ex-
hibitis drachmis tribus. Cum eissem protector
Theriacæ eiusdem Valerandi, imposita fuit pro
Rha Pontico. Purgatio non videtur impedire
quò minus sit Rha Ponticum. Dioscorides ait
ῥῆμα πόντου *ῥῆμα πόντου* *ῥῆμα πόντου*.

Hoc Rhaponticum vidit Veronæ apud Io. Bel-
licorum insignem pharmacopœum annò 1563.
non differebat ab eo quod antè videram apud
Gelnertum & Fuchsum. Hic sanè Pharmacopœus
multa habebat pulchra Theriacæ specimina. An
merito reprehendantur Matthioli ab Aduersariis,
annotatum de Rhabarbaro: videant lecto-
res, & considerent an de nostro hoc Rhapontico
loquantur Fuchsius, Matthioli, Dodonæus,
Brasauolus & Syluius.

Quod verò Dioscorides remissam esse adstri-
ctionem Rhapontici; Galenus autem vehementer
adstringere non adulteratum dicit: Quomodo
modo hic nodus sit soluendus non video, nisi
dicamus

Adstringit
sumit.Centauro
substitutumSymphiti
succedaneo.
Fuchsius.Rhabarbar.
Constantinopoli.
Bellon.Rhaponticum
Antiquorum
quorum
Rha Dioscori-
dicum.Lobel. no-
tatur.Conciliari
Diosc. &
Gal.

dicamus Dioscoridem respicere genus astringentium, Galenum autem habere rationem eius quod adulteratum, ac cum eo conferre non adulteratum, quod si conferatur cum adulterato animaduertetur vehementer astringere, interea non respicere genus adstringentium, nec cum omni astringente conferre: vel fortè in Dioscoridis codice deprauatam quis dicat lectionem: dicit enim in sine capitis summam eius vim esse astringere: Mesuus aliter ac Galenus, dicit illud quod maceratum & exanimatum valenter astringere & croci colore non inficere.

Appendix ad Caput X. Libri XXIII.

Rhabarbarum inquit, Syrius in Mesuem, à Rhapsico Veterum diuersa res est, priscis incognita. Hoc ex rigois ad Rha fluium supra Pontum [vnde Rhapsicum Græcis & Latinis, & Radix Pontica Celto dicitur] & Bosphorum Septentrionali tractu affertur: parum purgatorium experientiâ Posteriorum, licet inuentu sit rarissimum, & hodie propè ignotum: obscuratum opinor à Rhabarbaro seu Indico, quod ex India Meridionali in totam propè Europam quæstu maximo conuehitur, odoratum, grauitate insigni commendabile, astringens, amarum, cholagogum magis, colore cùm manditur planè croceo. Quod siue idem sit genere cum Pontico, siue omninò diuersum, aliis disquirendum relinquo, quibus plus est otii & facultatis: cùm præsertim etiam celebres hodie Medici in ea controuersia sibi non consentiunt, & nuncidem, nunc diuersum affirmant. Manardus namque in Epistolis suum idem, nunc diuersum censet. Mesues & Serapio suo Rhabarbaro tribuunt omnia, quæ Dioscor. & Gal. Rheo. Mihi satis fuerit admonere, in locum Pontici iam propè desiti Indicum vitibus proximum, & ubique copiosum potius esse sufficiens: tantò tamen parcius quanto efficacius, &c.

Eadem ferè tradit Taganitus quæ Syluius, Rhabarbarum, inquit, seu Rheon barbaricum vulgare, & quo hodie passim ad subducendam alui nobilium præsertim & delicatorum, Medici vtiuntur, radix est preciosissima, & ad multiplices medelarum vltus proficiens: Pænis & Arabica familiaris Scriptoribus, & passim nunc in Officinis Raues Sceni & Rheubarbarum vocatur. Verùm ætate P. Aginetæ qui longè post Dioscoridem, Galenum, & Plinium vixit, Rheon barbaricum appellari cepit, quòd ex Barbarorum regionibus deportaretur. Ideoque Raues Sceni Arabes dixerunt, quòd ex Scenitarum agro deportaretur. Vnde Græca posteritas Rheo Sceniticum vocauit: quòd apud Scenitas Arabes legatur. Quare & Arabicum iure dici posset. Auerois Cordubens. Rheo hoc barbaricum inter cetera purgantia medicamina ponit præcellentissimum. Quem secutus Mesue, ubi medica pharmaca solutoria quæ benedicta vocat recenset, eius honorificam mentionem facit. Non idem esse putatur multis Veterum Rhapsicum & vulgare nostrum Rheubarbarum. Hoc enim 1. Ex meridionalibus regionibus ad nos deferitur, non autem ab Aquilonaribus vt Veterum Rhabarbarum. 2. Nigrum non est, sed potius flauum, neque vllam, cum Costo nigro similitudinem habet, vt Rhachoma Plinii. 3. Vehementem habet odorem. 4. Quò grauius èd melius, Meluz, & nostris Sepiasiatibus omnibus ac Medicis. 5. Plurimum valet purgandum. 6. Tempore Pauli Aginetæ [qui inter Vetreos non connumeratur] cepit innotescere mundo, medicis qui ante illum fuerunt planè incognitum.

Tom. II.

Rheum hoc, Rha Recentiorum Tu chio appellare placuit, quia Veteribus Græcis Dioscoridi, Galeno, & Theophrasto, atque inter Arabes Serapioni & Auicennæ etiam incognitum fuit: Recentioribus autem Græcis, Paulo nimirum, Actuario, & Nicolao, quibus simpliciter Rheon appellatur, celebratum. Eius duo faciunt fastigia. Vnum Rheon Capricornus, hoc est, Rheum barbaricum, quòd ex Barbaria vocata deportetur, illis dicitur. Alterum Rheon Indicum, hoc est, Rheum Indicum, propterea quòd ex India, aut locis Indiæ proximis, nempe Scenitis populis, vt auctor est Stephanus de vrbibus Persidis, affertur, vnde Sceniticum etiam à quibusdam nominatur. Vtriusque Nicolatus in Drosoto septuagesimo meminit, & quidem separatim, vt hinc diuersa esse inter se liquet. Mesue tria facit Rhei genera, vnum Indicum quòd Raues Sceni appellat, omnium præstantissimum. Alterum Barbarum generis nomine vocat. Tertium Turcicum omnium ignauissimum. Id quo hodie passim ad subducendam nobilium & delicatorum alui medici vtiuntur ex meridionalibus regionibus, præsertim ex eius parte, quæ Barbaria hodie nominatur, ad nos deferitur, ideoque rectè Barbaricum appellatur. Hinc superioribus annis, quum Tunisiam, vel vt nunc vocant Tunetum, Carolus Imperator expugnasset, milites eius magnam copiam secum in Germaniam attulerunt. Regio itaque vnde asportatur, satis indicat à Veterum Rheo esse diuersum, vipote quòd ab Aquilonaribus regionibus delatum fuit. Accedit quòd nigrum non sit, sed potius flauum: vehementer quoque odoratum est, ac graue, & quò grauius est èd melius. Plinius denique, &c. Mercatores, addit, ex Alepo & Syria, alunt Rhapsicum non diffire à Rhabarbaro: sed eandem esse iadicem: Rhapsiticum plantam esse iuuenem, idèd nullo præditam odore, nec ita efficaciter propterea purgare, vt faciunt alia radices, quæ ad veram peruenire perfectionem: ac vbi vnà colligitur ibid. & aliud.

Rheon Veterum & Recentiorum Rhabarbarum diuersa esse etiam statuit Manardus in Epist. Rheon, inquit, scribunt Plinius & Dioscorides radicem esse absque odore; Costo nigro similem: cùm id quod in vltu est cum Costo nigro nullam similitudinem gerat, magnumque longè odorem nec in suauem iactet. Præterea Rheon barbarum à nostris vocatum ex Meridionalibus regionibus ad nos affertur, non Aquilonaribus, vbi Bosphorus, Rha fluius, & Stagna Mæotica &c.

Contrariam verò sententiam amplectitur Anguil. Quod ad me attinet, ait, credo verum Rhabarbarum non esse plantam diuersam à Rheopontico: quandoquidem videantur multæ plantæ, quæ iuuenes differentes radices habent ab iis quæ ad perfectionem peruenire, id quod existimo in hac planta fieri, ac id quanto magis videmus nec figurâ, nec substantiâ, nec colore diuersam Rhapsiticam à Rhabarbari. Quod Rhabarbarum purget & non Rhapsiticum euenire potest ratione imperfectionis, vt iam dictum de radice. Quod odorem non habeat, in causa est inuentus, vt apparet in vera Aristolochia longa, quæ odoratissima est; dum autem iuuenis est, nullum planè odorem habet. Eadem ætas efficit vt gustu non sit amara, non arida, non densa: sed rara & leuis: inueniuntur enim multæ radices, quibus idem euenit. Id expertus sum in radicibus, quibus vescimur, ita vt in eadem specie iuuenis multum à matura differet, qui ignorasset, existimasset aliud esse. Huius etiam opinionis

Xxxx

fuit Mesues Rha ponticum & Rhabarbarum eandem esse rem, cum Rha ponticum vocat Rhaet Turcicum, dicens, debilius reliquis omnibus prae nominatis. Itaque si Mesues existimat Rha ponticum esse Rhaet Turcicum, & iungat cum Rhabarbaro: erit iuxta meam opinionem Rheubarbarum, sed imperfectum comparatione facta cum reliquis Rhabarbaris. Quandoquidem si fuissent species differentes, duo fecisset capita, non sub vno complexus fuisset. Sed cum sciet eandem speciem non distinxisset, nisi bonitate inior. Quod ad eos attinet qui dicunt nasci circa fluvium Rha, dico falsum esse, quandoquidem iis in locis non nascitur Rheubarbarum: sed Lappathi species, quae ibi abundat, quae ad nos adfertur, cum autem nescio quid simile habeat cum Rhabarbaro, vocatur eius radix Rhabarbarum monachorum & Rheoh, ut etiam affirmat Iohannes Tzetze Hesiodi commentator, quem deinde nostri sequuti sunt. Si verum esset ibi nasci, maior eius copia Constantinopoli videretur, quam videatur: ubi minus quam alio in loco videtur. *Clima* posse efficere, cur Rheu ponticum, hoc est Rhabarbarum non soluat, & inodorum sit, credi posset, cum multa sint nobis exempla, ut in Persia, quae ex Persia ubi venenata est in Aegyptum translata, sub eo climate venenum amittit, ac fit cibis idoneus. Galenus loquens de vino dicit vitem Pergamo translatam ad vnum stadium qualitatem manifestè mutare. *His igitur de causis non dicemus Rheu ponticum plantam diversam esse à Rheubarbaro. Sed hoc illi perfectius & maturius esse: Quae Anguillarum sententia nobis non patum ardet.*

Lappathi species

Rheubarbarum monachorum

Locus

Nemo plantam videt

Vnde Rheubarbarum deferatur.

Tempus

illis mensibus (ij nostro auctori sunt alio quodam loco Iunius, Iulius, Augustus) interea aliud praestantius & recentius ex Ormuz importatur, cuius usus. In montanis vero hieme adseruati alia est ratio, putredini enim non est adeo obnoxium. Eam ob causam qui illud in India conseruare volet, in Disnager aut Balagate perferri curet. Referunt genus quoddam nasci in certa Tartariae vrbis nomine Samarcandar: sed quod improbum sit, nec nisi iumentorum purgationibus vile. Nullum autem est Rha barbaricum, aut Indicum: sed solummodò Chinense, quod Rauam Chini Persae appellant, Mauritaniam tamen plerique solummodò Rauam. Aliquando in Cochinchinam intellexi Rhabarbarum ab indigenis interdum decoqui aut destillari, & eius decocto aut stillatua aqua se purgare, eamque esse causam cur interdum tam facile terebrinem sentiat & corrumpatur. Sed cum neminem audierim, qui, an haec ita se haberent, se vidisse diceret, affirmare non ausim.

Nullum Rha barbaricum aut Indicum sed Chinense.

Rhabarbarum, pergit Acofta, in interiora Chinarum regione duntaxat prouenit, vnde in urbem Cantam [illius Praeuius portum & emporium, ubi Lufitani habitant] exportatur & inde nauibus in Indiam aduehitur. Alià item viâ ex eadem Provincia camelis deferunt per Tartariam, quod non adeò cariosum &c. Quod verò nonnulli scribunt eius regionis incolae Rhabarbarum macerare &c. fabula est, quam inde originem sumplisse arbitror, quod nonnulli gentiles mercatores Rhabarbaro fungifion & vetustiori [ut facilius à corruptione liberent] aquam tepidam adfundunt, deinde lineis pannis emundatum bacillis aut filo traiciunt ut exsiccet, & nonnulla foramina piperis tenuissimè triti polline & cera obteunt: deinde probè siccatum in Pyllyli semine adseruent. Haec mihi retulit Mercator Caranus.

Rhabarbarum mittit China, regio ultra Calchut: montes Singui ciuitatis, & Praeuius Succhur magno Cham tubieci. Sed in Chorazami regione Persidis imprimis mira est eius copia, id eâ coniecturâ se adsequutum scribit Ludouicus Romanus nauig. quod senæ Rheubarbari librae nostro more pondo vnciarum duodecim singulo aureo veniebant.

Plurimum purgat Rhabarbarum, ut testis est apud Fuchsum, Actuarius, flaua bilis imperus, potissimum Indicum, potenter domat, ideoque verè cholagogum existit. Quare Mesues sententiam falsam esse oportet, qui Rheon hoc planè innoxium esse, ac tunc pueris, tum praegnantibus dari posse literis mandauit. Nam ut quotidiana inultorum experientia comprobatur est, & id ipsum tum Graeci posteriores, tum alii Medici testantur, humores in venis biliosos attrahit & educit, id quod sine grauiore agitatione fieri non potest. Quia vitæ agitationem grauidis periculosam semper, viris: autem interdum molestam esse abundè constat. Non igitur rectè faciunt nostri temporis Medici, cum imbecillioribus & grauidis idipsum exhibent. Nam & ipse noui Medicus qui non satis feliciter cessit Rheo in muliere quadam teneriore exhibitio. Atque tum magis purgando laedere solet, quam maceratum exhibetur. Nam quum macerando eius substantia calida & purgatrix, quod Mesue etiam fatetur, in liquorem in quo maceratum est transferatur, terra verò & altitngens, adeoque roboreans, & purgandi vires nonnihil frangens in Rheo remanent, necesse est ut tum validius pur-

Vires & visus dilectus purgat Mesues tacet

Grauidis non dandi

Historia

Pragmaticus huius praesidi re dare in rebus quam iniquum

get, quàm si integrum exhiberetur. Præstaret itaque imbecillioribus & delicatioribus integrum exhibere Rheum, quàm eius dilutum. Nam hoc modo illi adesset, quod vehementiam eius frangeret, adstrictio scilicet minorum ipsa. Hinc est, quod Auerrohes Rheum barbarum alius purgantibus medicamentis præfert, ut quod infranans eius vehementiam secum habeat, cæteris ferè omnibus eo destitutis. Prægnantibus tamen & pueris præstat Cassiam & Mannam propinare, quæ maiori facilitate, citraque omnem noxam alium inducere possunt, quàm Rhabbarum. Si enim omni caret vitio & noxa, ut Mesue & Iuniores Medici affirmant, cur in eius sumptione infranantia, aut ut ipsi loquuntur cortigètia, illi esse adicienda docent: nempe spicam, mastichen, Cinnamomum, & luncum odoratum.

Mesue sibi
contrarius

Rheum re-
centiorum
non dandum
dysentericis

Cæterum in quum purgandi facultate præditum sit Rheum Recentiorum: reprehensione non vacat, quod illud hodie plerique dysenteria laborantibus exhibent. Erroris autem occasio nulla alia fuit, nisi *ἡλικία*, id est, perueritas imitatio. Quum enim viderent Veteres, tum Græcos, tum etiam Arabes, in dysenteria crebro fuisse vfos Rheo Pontico, voluerunt & ipsi Rhabbaro, quod idem est: putauerunt, in eodem malo vti. Quod si verò eius quod nunc vocant Rheum Ponticum radice pro Veterum Rheo vfi fuissent: omnem reprehensionem effugere potuissent, quòd eius, ut ostendimus, legitimum sit succedaneum. Nam vt Veteres suum Rheum in dysenteria & vulneribus sanandis esse efficax experti sunt, ita etiam Centauria mixta, quam Officinæ Rhaponticum nominant, radix in iis malis vim obinet.

Porro Rheum hoc Recentiorum datur ex lactis sero vel decocto Intybi sativi latifoli. Maceatur quoque in iisdem liquoribus, aut in stillatio Intybi iam distillato, idque æstate potissimum: aut vino albo & odorato, & id quidem hyeme. Propinatur per se tritum pondere drachmæ vnius cum dimidia [si trita eius substantia assa addit Aug. Ferr.]. Mesue autem est ad drachmas quatuor progredi, quæ satis multa est quantitas. Dilutum seu infusum vnius, duarum, vel trium, aut quatuor [si purgans atque addatur] drachmarum pondere sumitur. Hoc castigatione non eget, ut Aug. Ferrerius de vera M.M. de castig. præst. Med. docet, sed Spica Nardi, Schoenantho, Cinnamomo, vigorari creditur.

Dosis in
subst.

Rhabarb.
corres. non
probat

Improbatur idem præterea & merito præsertim in dysenteria torrefictum Rhabbarum. Quam enim morbus requirit, naturalem & efficacem habet adstrictionem, & exsiccationem vi purgatricis coniunctam. Præterea in torrendo, si modum excesseris, non solum remittit medicamentum, verum etiam purgatoriâ facultate penitus destituit. Cùmque porro modum attingeris, vix efficies, quin medicamentum vitione acrimoniam [propter quam & tenuitatem in alui fluxu Veteres purgantia non adhibebant, quòd & intestina roderent, & nouam materiam ad locum affectum traherent] acquirat, præsertim in partibus exterioribus, internis vix ignem sentientibus.

Rhabbari vsum in prægnantibus cum Mesueo probo consideratis considerandis; vt qui multas scilicet sine vilo damno purgarim: infusionem præfero substantiæ, quòd enim citius sine violentia medicamentum purgans euacuat ed mibi gratius, idèd Præceptorem Rondelierum secutus, non laudo correctionem purgantium

per adstringentia.

Non approbo eorum morem qui in dysenteria à principio astringentia exhibere, ita augent morbum dum per ea retinent educenda, nempe acres malignos & putridos humores: quò natura vergit ed ducere oportet, si per conuenientia fiat loca: si igitur statim à principio educantur, conuenientibus purgantibus subleuantur citò, & postea tutò astringentibus vti licet. Inter medicamenta purgantia magni facio Rhabarb. multifolia experientia edoctus, nolim tamen asserere an torrefere Rhabarb. sit calidius tosturâ red-dere.

Quia autem Rheum calidum & siccum hepatis calidioris mors est, nisi refrigerantibus temperetur: Idèd illius extractum quod Spagyrici cum aqua vitæ parant calorem noui caloris accessione adaugentes, non magni facio. Si quid laudandum in eo, est quod in pilulis possit commodè exhiberi, & fortè etiam melius conseruari & circumferri.

Appendix ad caput vltimum lib. XXIV.

~~VERBESINA, SIVE CANABINA AQUA~~

VERBESINA, SIVE CANABINA AQUA
trea, flore minus pulchro elatior ac
magis frequens.

Descriptio

Verbesina altera elatior, & crebrior priorè, amplior etiam, extra aquas nasci solet, caules plerumque cubito maiores tollit, rarius minores, rubentes, hirsutos, solidos: folia ad articulos bina aduersa, tripartita, Cannabinorum vel potius Pseudoepatorii æmula, profunde terata, pilosa, subinde per ramos quoque nullo modo laciniata: cæterum ex foliorum sinu profiliunt ramuli, quorum extremis flores insident luteoli, multi, squamis striatis purpurantibus in ambitu, pulchritudine multum sequenti cedentes. Semen longum, lauem, in duos stilos asperos desinit, qui veltibus adherent: totum verò florem obvallant folia, iis quæ in summis conspiciuntur ramulis [supra] radiatim disposita: radices fibrosæ, inuolutes.

Trago Verbenæ 3. siue supina dicitur, Verbenæque supina Dioscoridis esse ab illo statutum, licet, ut ipsemet fuitur, Verbenæ supina Dioscoridis ipsi perspecta ac cognita non sit. Nec placet ipsum adscribere nomenclationes spurias Verbenæ supinæ Dioscoridis, siquidem ea non sit.

Verbenæ
supina
Trago

Dodon. gall. p. 46. Pseudohepatorium fœmina: Gall. *Eupatoire femelle bastard*, Belg. Boelsens cruys mysser, Eupatorium Auicennæ existimatur, idèdque à quibusdam Eupator. Auicennæ appellatum. Lat. in fol. Hepatorium aquaticum, ad Hepatorium vulgare & adulterinum referendum, quod & Terzola dicitur, quæ de causa etiam Terzola aquatica dici potest. Descriptio à Dodonæo posita sicuti & figura videntur demonstrare quas Verbesinam de qua agimus, id tamen asserere non ausim: in postremis nomen Belgicum huic non amplius tribuit, sed Eupatorio Officinarium.

Pseudohe-
pat fœmina

Eupat. A.
nos.

Terzola d.
quas.

Dod. nos.

Thalio Pseudo-Hepatorium alterum seu fœmina. H. Lugd. pag. 1039. Hydripiper, Pseudoepatorium fœmina Dodonæi [Gall.] Chrysanthemum aquaticum quorundam. C. Bauh. Phyt. p. 641. Cannabina aquatica 2. siue folio tripartito diuiso. Verbenæ supina vel 3. Trago. Pseudohepatorium Dod. Huius folia communiter in tres tripartita, partes, aliquando quinque, sex diuiduntur.

Hydropi-
per

Cannab. d.
quar. fol.

Sciens Ca-
laip.

Casalp. lib. 2. cap. 17. Quædam in aquis ferè nascens, Eupatorio brevior, ramosa: foliis tripartito divisis, capitulis in cacuminibus paucis, stellatis, flore luteo: feminibus valdè compressis, oblongis, in duos arculos definentibus, unde Bident. vocatur.

Еурат Со-
юздар.
Сонига а-
яна.

C. Schweig. f. Eupatorium Conyzoides primum Conyza aquatica maxima ferratifolia, Eupatorium Canabinum foemina Septentrionalium stellato & odore flore, Lobelio. *Nobis* non vna planta sed tres distinctae. Prima quidem Verbesina praefens est. Altera, Lingua avis maior Dalechampi: tertia, Verbesina pulchrior flore luteo. S. Hoven. f. c. confudit omnia.

Locus &
tempus

Locis humidis, palustribus & fossis præuenit
 circa ppyda & ppygos. Hepatorum aquaticæ. Dido-
 nant, in riguis gignitur, quæ rard & non nisi
 siccissimis ac feruentissimis temporibus, æquæ
 carent, prodit viret & intra flauiorum quorun-
 dam late patentes alioque: quod altius crescit &
 flores proferit, orbiculato ambitu, multis exiguis
 luteis foliis latis, Baphthalmi vniuerso. Non
 morbo autem in Belgio, sed & in Germania, ac
 Bohemia reperitur: nec desistuntur eo humida
 Britannia loca. Plurima æstatis parte floret ac vi-
 get, semineque perficit,

Vires
Venend.
Flora

Verbenaca lupina serpētes, aliāque venēnosa animalia pellicit veluti & Coniza. Potest etiam depasciturus, ac longē lueque serpentibus viciis adhiberi, autōre Trago. Terzola aquatica Dodonæi amara herba est; proinde calida & siccā, vsum tamen in medicina habere ignoratur; nisi stercutimenta ciēt.

Servus
Thomae C. S.

VERBESINA PVLCHRIORE FLO-
re luteo.

Description



Verbefina
pulchriore
flore mihi di-
cta, fibris radi-
catur multis, al-

ta tantummodò, non in lacinias diuisa, superficiei
vtrinquelzui, sapore acriusculo: ex foliorum alis
duo ramuli diuersi exeunt, quorum alter altero

minor esse solet. Flores multo pulchiores quam
in Verbena elatiori, quorum extima folia ex
lateo Viridantia striis nigricantibus picta, his
proxima aureo fulgore nitescentia, in orbem
acta: medium occupant alternatim remissi foli-
cula lateoli quinquepartiti, apicibus nigros ex-
ferentes, squamulæque striata, extimis quidem
similes sed suppartes: semen oblongum, compres-
sum, sulcatum, breviusculum cum antheris asperiusculis
capiti adnatis ad vestes adheret.

Verbesina [aliàs Forbesina] Italis dicta; videtur Gelnihort. in append: planta floribus Indicis vulgò dictis cognata.

Lob. Ad. pag. 227. *Fœmina Canabina* Septentrio-
 nialium stellato & odoro flore. Icon. plant.
 529. *Eupatorium Canabinum* fœmina Septen-
 trionalium stellato & odorato flore. *Mirror* in fi-
 gura Lobelium flores pulchrè radiatos non de-
 monstrare, quasi non horit discrimen inter Can-
 nabinam minùs specioso flore; & eam quæ pul-
 chriorè habet florem. Folia nonnihil respon-
 dent ei de qua hoc capite agitur.

Hist. Lugd. lib. 9. cap. 27. videtur pingere pro *H. Luedg.*
Hydropipere altero Dalechampii : quoniam *cap. 27.*
non placeant figuræ : convenit nomen Chyris-
themii aquatici ; non tamen figura Dodonæi sub
titulo Hydropiperis Pseudo-eupatoriæ stemina
Dodonæi : licet quædam respondeant, non tæ-
men omnia.

Cresalp. lib. 12. c. 17. Bidens folio non dissecto.

Tabern. Icon. & Hist. Eupatorium Cannabinum
Chrysanthemum majus, fructu / fungum
fructu treble, majus siernfract / Geel feber
fract R. B. Beeteine austreiffen. Eupatorium
cannabinum femina, Vnga aurea aquatica, Stel-
laris aquatica, Consolida aquatica, Verrellent.
litalic Terzola, qua ytilis ad tertianas, non
Terzola Baptizti Sardi, cui flos caruleus, id
vocatuz Terzollam luteam, hoc est, Tertia-
riam luteam. Tabern. tribuit huic plantae nomi-
na Belgica, de quibus sibi non constat Dodon.

C. Bauh. phyt. Cannabina aquatica 3. siue folio non diuiso.

Schvvenckfeld. Eupatorium Conyzoides le- Eupat con-
cundum, Eupatorii Cannabini 2. species, Hydro- zoides.
piper 2. Lugd.

Semper obleruau in aquis locis, ubi aqua i locus &
fluit vel refidet, vt in diuione Phrentis propè tempus
Haur mouffer. Montebeldi circa vberem florens
Angusto. In Lacunis & fossarum stagnantibus a-
quis quâ itur Oetdingen propè Basileam repe-
ritur. Borealis magis & ipsis in visis aut mediis
riu: his cunctanter fluentibus viuit. In Angliâ
ubique vderum præsertim Londini & Auxonz;
Lobel.

Vulneribus, inrò sumpta præsertim, plurimum confert, & eadem superior potis est : Tibi-
buit, huic Lobelius faculates Pseudo-eupatorii
vulgaris : huic Eupatorii Officinarum, ne Lecto-
res fallantur prius inuestigent quàm vntur, de
qua Canabina hic loquantur, an de ea quæ pul-
chrum florem habet, an de ea quæ minus pul-
chrum, & quæ elatior est.

Torvesin a.
Cannab. fœ.
mna

H. Ingrā.
i 106

*Eidens folio
non delicta*

Virgin.
 aquat.
 Stellaria
 aquat.
 (onjol.
 quat.

- Eupat cond;
- Zoides.

locus &
tempus



ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.

OMNIVM PRAECIPVORVM CAPITVM
QVÆ IN SECVNDO VNIVERSALIS HISTORIÆ
PLANTARVM TOMO CONTINENTVR
INDEX.

A		
A Bsis foliis trifolijs		
Abutilon Indicum	pag. 361.	Alcea arborefcens glabra
Accium	959.	Alcea Pentaphylli folio vel canabina
Achanaca Indorum	95.	Althea Theoph. flore luteo, quibusdam Abubilon
Aconitum Lycoclonum Dodonai	835.	Amaranthus purpureus
Acorus veteribus	901.	Amaranthus Pannicula speciosa cristata
Aegilops quibusdam aristis recurvis	734.	Amomum in genere
Aegilops Veteribus & in genere	433.	Amomum quorundam odore Cariophylli
Aegilops Bromoides	434.	Amomum nostrum ex ipsa fructu
Aegilops Maritimo flore	436.	Amomum Clusij
Ages	439.	Amomum novum Cardamomi vulgaris facie, sine Indi-
Agrimonia seu Eupatorium	793.	cus Racemus
Allium vulgare & sativum	398.	Amomum verum quorundam
Ally genus ophiocoron dictum quibusdam	554.	Anomis sine Pseudamomum
Allium sine Mch. inontanum latifolium	559.	Anacokaccedens Phascolum totus ruber
Allium bicorne	ibid.	Anonis, sine testa bouis, vulgaris, & alba, spinosa
Allium bicorne	ibid.	Anonis lutea non spinosa, Dalechampia Natrice.
Allium purpurascens externe	560.	Anonis non spinosa purpureo flore
Allium sylvestr. bicorne flore viridi	561.	Amblatum Cordi, sine Aphyllon
Allium sylvestr. bicorne purpureum prolesum	ibid.	Antyllis prima quibusdam.
Allium sylvestr. M. inoffensivum albinum Io. B.	ibid.	Apocynon Veteribus
Allium flore luteo sive pallido	561.	Apocynum sine Periploca scandens, folio longo, flore pur-
Allium quoddam sylvestre flore purpureo	562.	purpureo
Allium Spherocephalum purpureum sylvestre	ibid.	Apocyno affinis Secamone flore albo
Allium Spherocephalum bifolium italicum	563.	Apocynum folio rotundiore, flore ex albo pallescens
Ally genus forte Scovodoprosson alterum Labelio	564.	Apocynum latifolium amplexicaule
Allium Petreum umbelliferum	ibid.	Apocyni fructus
Allium n. bell. frum. praetense	564.	Aphyllon Indicum
Allium sylvestre propusill. uncinifolium moschatum	565.	Aphace in genere
Alisma Monspeltensum sine Doria	ibid.	Aphaca olus veteribus
Alisma sine Damasorum Veteribus	1064.	Aqua vita
Allys affinis pseudorchis Monophyllos	ibid.	Arbor Angelina
Allium urinum bifolium vernum sylvestricum	ibid.	Aracus fabaceus
Allium alpinum	566.	Aracus fabaceus serratus
Alopecurus Alpinus	809.	Aracus veteribus
Aleone nodosa Dalechampi	861.	Arachidna Veteribus
Altharia	883.	Arachidna, aut potius Aracoides Honorij Belli
Alyssum Veteribus & in genere	933.	Araci, vel Apios leguminosa species Carolo Toffano
Alysson siliqua lata aspera, quibusdam Lunaria flore	ibid.	Arbor Trifolia Indica
luteo	934.	Arundines ex Veterib.
Alysson Anguillare	ibid.	Arundo vulgaris palustris
Anil sine Nil Indorum	945.	Arundo maxima & horientis
Alcea Veteribus	933.	Arundo Papyrus quibusdam.
Alcea vulgaris	ibid.	Arundo Anglica C. Bauh.
Althea sine Bismalua	954.	Arundo scriptoria
Althea profundè serrato sine dentato folio	955.	Arundinis scriptoria Indica genus spadicæ colore
Althea flore grandi Alcea Thuringiaca	ibid.	Arundo Nastor seu farcta toxica figurata
Althea species vulgari sinitis	ibid.	Arundo nastor seu farcta sine Toxica, gracilis
Althea arborefcens	956.	Arundo humilis, rara ac inusitata
Althea sive dicta quibusdam	957.	Arundo Indica versicolor
		Arundo Indica versicolor flexilis
		ibid.

INDEX.

<i>Arundo Indica punicea mollis</i>	ibid.	<i>Bataia affinis Inguame sue Inhami</i>	793.
<i>Arundo Indica fluitans</i>	ibid.	<i>Barbarea</i>	868.
<i>Arundo Indica latifolia</i>	ibid.	<i>Barbarea muralis Ioh. Bauhini</i>	869.
<i>Arundo Indica latifolia flore luteo punctato</i>	490.	<i>Balsamina semina Persicifolia, vel Salicis folio</i>	909.
<i>Arundo Saccharina, & Saccharum</i>	531.	<i>Bamia</i>	919.
<i>Arum</i>	785.	<i>Bamia aliquatenus affinis Sabdariffa</i>	960.
<i>Arum Bizantinum</i>	785.	<i>Bascharia veteribus</i>	1048.
<i>Arisarum latifolium quibusdam</i>	786.	<i>Beidelsar Alpini sine Apocynum Syriacum</i>	156.
<i>Arisarum angustifolium</i>	787.	<i>Bexucco del Peru.</i>	151.
<i>Asclepias Veteribus</i>	138.	<i>Bera sine cereuisa</i>	414.
<i>Asclepias sine vincetoxicum multis, floribus abicantibus</i>	ibid.	<i>Belmuscus Egyptia Honorio Bello</i>	960.
<i>Asclepias flore nigro</i>	140.	<i>Beta</i>	ibid.
<i>Asclepias Cretica Clusij</i>	ibid.	<i>Beta Cretica semine spinosa</i>	961.
<i>Asclepias Indica</i>	ibid.	<i>Beta laticaulis monstrofa</i>	ibid.
<i>Astragalus quibusdam</i>	326.	<i>Ronus Henricus</i>	965.
<i>Astragalus Veteribus</i>	932.	<i>Bodaplam finitius exoticum Paladano</i>	188.
<i>Astragalus Romanus</i>	333.	<i>Bulbus Esulentius Veteribus</i>	969.
<i>Astragalus Maritimus</i>	333.	<i>Bulbus vomitorius veteribus</i>	570.
<i>Astragalus maior Fachsio</i>	334.	<i>Bulbocodium vulgatum</i>	493.
<i>Astragaloides, sine Astragalus sylvaticus, Astragalo Fuchsij affinis planta</i>	ibid.	<i>Bulbocodium Hispanicum</i>	594.
<i>Astragalus reticulatus hirsutus</i>	ibid.	<i>Bulbocodium flore pleno</i>	ibid.
<i>Astragalus Monspessulanus</i>	318.	<i>Bulbocodij pleno flore speciosum genus Venerij</i>	595.
<i>Astragalus quidam Montanus</i>	319.	<i>Bulbocodij sine narcissi stori lutei multiplicis varietas</i>	ibid.
<i>Astragalus Monspessulano candidior & Onobrichis quorundam</i>	ibid.	<i>Bulbocodium minus</i>	596.
<i>Astragalus Syriacus</i>	340.	<i>Bulbocodium minimum coronatum</i>	ibid.
<i>Astragalus forte lanuginosus Boeoticus</i>	ibid.	<i>Bulbocodium tenuifolium flore luteo</i>	ibid.
<i>Astragalus Dioscoridi quibusdam</i>	340.	<i>Bulbocodium tenuifolium aliud flore luteo fimbriato</i>	ibid.
<i>Asphodelus maior</i>	625.	<i>Bulbocodium forte affinis bulbus alius flore luteo</i>	598.
<i>Asphodelus bulbosus Dodon.</i>	627.	<i>Bulbocodium minimum tenuifolium album</i>	ibid.
<i>Asphodelus minor folio fistuloso</i>	631.	<i>Bulbus Eriophorus</i>	211.
<i>Asphodelus minimus albus</i>	632.	<i>Bulbus Monophyllos flore albo, an Boeot. Cyn Theoph.</i>	612.
<i>Asphodelus luteus</i>	ibid.	<i>Bulbus sylvestris Fuchsij flore luteo, sine Ornithogalum.</i>	ibid.
<i>Asphodelus minor radice lutea</i>	633.	<i>luteum</i>	923.
<i>Aster ex veteribus</i>	1042.	<i>Bursa pastoria, sine Pilella siliquosa</i>	870.
<i>Aster Atticus purpureus & albo flore</i>	1044.	<i>Bursa pastoria</i>	936.
<i>Aster Atticus Monspessulensis purpureus angustioribus folijs</i>	1045.	<i>Bursa pastoria parva</i>	937.
<i>Aster Atticus luteus, spinosus</i>	ibid.	<i>Bursa pastoria minima, oblongis siliquis, verna, loculo oblongo</i>	ibid.
<i>Aster purpureus Montanus</i>	ibid.	<i>Bursa pastoria folijs persiliata</i>	918.
<i>Aster Montanus flore magno hirsutus, quibusdam Oculis Christi</i>	1046.	<i>Bursa pastoria sublongo loculo affinis pulchra planta</i>	ibid.
<i>Aster angustifolius luteus</i>	ibid.	<i>Blitum in genere</i>	965.
<i>Aster tertius Pannonicus Clusij luteus folio hirsuto Salicis</i>	ibid.	<i>Blitum pulchrum rectum magnum rubrum</i>	966.
<i>Asteri Montano Purpureo similis vel Globularia</i>	ibid.	<i>Blitum rubrum minus</i>	967.
<i>Athera, & Beta sine Cicuten</i>	412.	<i>Blitum pulchrum magnum album</i>	ibid.
<i>Atriplex rubra & alba hortenstis</i>	970.	<i>Blitum erectum, sine 3. Tragi</i>	ibid.
<i>Atriplex siliquosa</i>	972.	<i>Blitum maximum, sine Amaranthus maior semine albo</i>	968.
<i>Atriplex angustifolia laciniata minor</i>	ibid.	<i>Bryonia alba maculata</i>	146.
<i>Atriplex sili. folijs integris racemosa</i>	973.	<i>Bryonia seu vitis nigra baccis</i>	ibid.
<i>Atriplex vulgaris angustifolia cum foliis</i>	ibid.	<i>Bryonia laevis sine nigra baccifera C. Bauh.</i>	149.
<i>Atriplex sili. Monspessulana cum pulchris involucris</i>	ibid.	<i>Bryonia Mechoacanna nigricans</i>	151.
<i>Atriplex maritima</i>	974.	<i>Brassica Marina sine Soldanella</i>	166.
<i>Atriplex Halimoidis Lobelij</i>	ibid.	<i>Brassica Veteribus & in genere</i>	819.
<i>Atriplex arborescens</i>	ibid.	<i>Brassica capitata alba</i>	826.
<i>Atriplex marina species Valerando</i>	ibid.	<i>Brassica Italica tenerima glomerata flore albo</i>	827.
<i>Atriplex fatida</i>	ibid.	<i>Brassica Sabaudica rugosa</i>	828.
<i>Atriplex, dictus pes asperinus</i>	975.	<i>Brassica rugosa longioribus folijs</i>	ibid.
<i>Atriplex dictus Pes asperinus alter sine ramiflor</i>	976.	<i>Brassica multiflora</i>	ibid.
<i>Auricula Muris Camerarij</i>	387.	<i>Brassica alba vulgaris</i>	829.
<i>Avena alba & nigra</i>	432.	<i>Brassica alba expansa</i>	ibid.
<i>Avena nuda</i>	433.	<i>Brassica Colorata</i>	ibid.
<i>Avena pilosa</i>	ibid.	<i>Brassica Monospermos Angelica</i>	830.
<i>Auricula muris Hispanica</i>	1042.	<i>Brassica tophosa</i>	ibid.
<i>Auricularia Sylus quibusdam</i>	800.	<i>Brassica Anglicana minima nuda</i>	ibid.
		<i>Brassica nigra dicta</i>	831.
		<i>Brassica capitata rubra</i>	ibid.
		<i>Brassica rubra vulgaris</i>	ibid.
		<i>Brassica crispata lacinosia</i>	832.
			Brassica

B
Balsamina Cucumeraria
Bataia

INDEX.

Brassica laciniata rubra
Brassica laciniata alba
Brassica tenuissima laciniata
Brassica Thysoides
Brassica rubra minor
Brassica glauca
Brassica spinosa
Brassica sylvestris procera Thabio
Britannica Conyzoides

ibid.
 ibid.
 ibid.
 833.
 ibid.
 ibid.
 835.
 837.
 1047.

C

Capparis spinosa & non spinosa
 Capparis officinarum Cortese
 Capparis arborescens
 Capparis sebaginea sine Papias Luteianorum
 Capparis fere similis Albani
 Campanula Indica
 Cacubalum quibusdam vel Alfine Baccifera
 Cardamomum Veteribus & in genere.
 Cardamomi equinoculationes
 Cardamomi genus Ad aximum, Grana Paradisi, sine Melegeta
 Cardamomi species cum siliquis sine thecis longis & bre-
 vibus
 Cardamomum maius meligethe simile, sicut modo tur-
 binatum Cordo
 Cardamomi facie fructus, triangularis malignus
 Cantabrica Veterib.
 Catianace in genere
 Catianace leguminosa quorundam
 Calamus aromaticus in genere
 Calamus aromaticus verus quibusdam
 Calamus aromaticus Cecchini Martellii
 Cape sine cepa rubra & alba rotunda ac longa
 Caps Ascalonica sine fissilis
 Calamus Aromaticus vulgaris, multis Alorum
 Canva sine Arundo Indica, quibusdam flos Canovi
 Campanula parva, Anguillana Cantabrica
 Campanula folio hederaceo, species Cantab. Anguil-
 lara
 Campanula rotunda folia minima
 Campanula linifolia rara, flore caruleo
 Campanula lychnidea
 Campanula angustifolia carulea & alba
 Campanula Maior & asperior folio viti a
 Campanula sine Cervicaria Maior & lauior flore albo
 magno
 Campanula Alpina glabra, flore delutissimo caruleo
 ibid.
 Campanula sine Cervicaria Bononiensis parva flore
 ibid.
 Campanula repens flore minore carulea
 Campanula sine Cervicaria Media Thabio floribus car-
 ruleis parvis
 Campanula pulchra a Tassano Carulo missa
 Campanula Serpylli folia lob. Banksii
 Cakile quibusdam, alis Erucae marina, & Raphanus
 marinus
 Cakile sine Erucae marina latifolia
 Camelina Myagrum Alderanda
 Chamacisus Serpylli folio, nigricante, & hirsuto
 Chamacisus angustifolius flore luteo Clusij
 Chamacisus folio Myrti Tarentina, canis vel cineris
 18.
 Chamaecrisus
 Chamaenorus Noruegica
 Chamaenorus altera Noruegica
 Chamaecerasus Gesneri, vel chamaerichymenon quod-
 dam Alpinum
 China radix
 China spuria pyriformis sine turbinata

61.
 ibid.
 65.
 66.
 66.
 165.
 175.
 300.
 104.
 204.
 204.
 205.
 207.
 208.
 159.
 308.
 309.
 535.
 538.
 530.
 547.
 551.
 714.
 752.
 796.
 797.
 ibid.
 ibid.
 803.
 ibid.
 805.
 804. & 806.
 ibid.
 807.
 ibid.
 816.
 867.
 868.
 894.
 17.
 ibid.
 107.
 120.
 122.

China spuria Acori effigie Labelij
Chamaebalanus leguminosa
Chondria & balica sine alica
Chondria veteribus
Chondria vel Chondrilla carulea
Chondrilla lutea
Chondrilla viminea
Chondryllis affinis quedam laciniata, an Tricinctella?
 ibid.
Chondrilla hirsuta rubente flore
Chondrilla Cretica nomine missa semine crispo
Chondrilla folio non dissecto, caule nudo & foliato
Chrysanth. Alpinum ludenbergense Jacobae affinis
Chrysanthemum Alpinum Escherianum Jacobae affinis
 ibid.
Cistus & de eo veterum sententia
Cistus mas maior folio rotundiore
Cistus mas 2. folio longiore
Cistus mas 3. folijs dilutius virentibus
Cistus mas 4. Adonsp. folio oblongo albido
Cist. mas 5. folijs crispis, & quodammodo sinuosis
Cistus semina Adonspeltiana flore albo, & Hissani a
 luteo
Cisti species quadam Hispanica flore albo
Cistus folio Halami flore luteo
Cistus filio Halami longiore inano
Cistus folio Lauendulae Clusio forte idem cum Helian-
 the no recto
Cistus folio Sampsuchi Clus. cui macula in flore
Cistus folio Thymi Clus. cum maculis in flore
Cistus Ledon latiore folio
Cistus Ledon flore macula nigricante notato
Cistus Ledon, Populi nigra folijs Clusij, maior & mi-
 nor
Cistus Ledon latifolium Creticum
Cistus Ledon 4. Clus. flore candido
Cistus Ladansera, sine Ledum Adonsp. angusto folio
 nigricante.
Cistus Ledon 6. minoribus angustioribusque folijs Clu-
 si
Cistus Ledon folijs colore cinereo
Cistus Ledon folijs Rosmarini Coronaria Clusij, flore
 luteo
Cistus L. don 9. Clusio
Cistus Ledon Thymi folijs Clusij
Cistus annuus 1. Clusio folio rotundiore
Cistus annuus 2. Clusio, flore pallido, macula purpurescente
 insignito
Cistus annuus flore guttato
Cistus annuus folio Ledo flore luteo
Cistus minimus folio subrotundo
Cisti species annua angustifolia
Cistus humilis Clusio, sine Helianthemum omnino can-
 dicans, flore nunc albo nunc pallido
Cistus Helianthemum flore paruo luteo
Cistus Helianthemum folio Polij montani
Cistus pusillum folio candido flore luteo
Cistus pumilus montis Baldi, forte Austriacus vixisse
 luteo
Cisti folio arbor exotica, capitulis Platani
Cistulus folio Colocynthis secto, semine nigro, quibus-
 dam Anguria
Citrulo affinis melo Lydisso, sine Parbeca
Citrulo vel Meloni Indico accedens Camolanga
Cicera antiquis
Cicer in genere
Cicer arretinum
Cicer sylvestre multifolium
Cicer sylvestre minus Thalij
Cicer siliu. trifolium
Cichorium sylvestre & sativum
Cichorium verrucosum, sine Lactuca Hieracis

123.
 324.
 411.
 1018.
 1019.
 1020.
 1021.
 ibid.
 1022.
 ibid.
 1041.
 1048.
 ibid.
 1.
 2.
 ibid.
 3.
 ibid.
 ibid.
 4.
 ibid.
 5.
 ibid.
 ibid.
 6.
 ibid.
 8.
 ibid.
 9.
 ibid.
 10.
 ibid.
 11.
 ibid.
 ibid.
 12.
 ibid.
 13.
 ibid.
 14.
 ibid.
 ibid.
 15.
 16.
 17.
 19.
 ibid.
 ibid.
 21.
 236.
 237.
 ibid.
 291.
 ibid.
 292.
 294.
 ibid.
 295.
 1007.
 1007.

INDEX.

adnumerandum	1023.	<i>Cosmogratus sine Thapsia species</i>	ibid.
<i>Cichorium spinosum</i>	ibid.	<i>Crocus</i>	637.
<i>Cichorium bulbosum</i>	1038.	<i>Crocus verni species varie pag. 640. & sequentibus</i>	646.
<i>Clematis purpurea flore pleno scandens</i>	119.	<i>Crocus montanus Autumnalis</i>	ibid.
<i>Clematis carulea serrato folio</i>	ibid.	<i>Crocus siluestris Bizantinus candidus: munitum subca-</i>	647.
<i>Clematis Pannonica flore caruleo surrecta</i>	ibid.	<i>rulcus</i>	183.
<i>Clematis Daphnoides sine prima veterib.</i>	130.	<i>Cropus rugosus fructus</i>	214.
<i>Clematis Daphnoides minor flore purpureo, violaceo, &</i>	ibid.	<i>Cucurbita in genere, eiusque species varie pag. 231.</i>	238.
<i>albo, simplici, ac pleno</i>	ibid.	<i>Cucurbita in genere, eiusque species varie pag. 231.</i>	245.
<i>Clematis Daphnoides maior flore caruleo & albo</i>	132.	<i>Cucumis vulgaris viridis & albus</i>	247.
<i>Clematis acria veteribus</i>	114.	<i>Cucumis minor pyriformis</i>	ibid.
<i>Clematis latifolia siue Athragene quibusdam</i>	118.	<i>Cucumeres longissimi</i>	248.
<i>Clematis Betica Clusio</i>	126.	<i>Cucumis & Erysimus Chare</i>	ibid.
<i>Clematis siue Flammula scandens tenuifolia</i>	127.	<i>Cucumis siluestris siue Asininus</i>	249.
<i>Clem. siue Flamm. surrecta alba.</i>	ibid.	<i>Cucumeris silu. succus Elaterium.</i>	979.
<i>Clem. siue Flamm. flore caruleo.</i>	128.	<i>Cyclaminus</i>	176. & 177.
<i>Co. hlearia.</i>	942.	<i>Cynobatus veteribus</i>	33.
<i>Colubrinum lignum primum: 11. & 111. pag. 169. 170.</i>	171. 172 & 173.	<i>Cynorrhodon veteribus</i>	ibid.
<i>Colocynthis Veteribus & in genere.</i>	231. & 232.	<i>Cyperus in genere</i>	499.
<i>Colchicum Veteribus</i>	648.	<i>Cyperus species varie pag. 501. & sequentibus</i>	758.
<i>Colchicum album cum purpur. lineis</i>	651.	<i>Cynorchis prior Dodona</i>	760.
<i>Colchicum vernum Clusio</i>	652.	<i>Cynorchis Delphinia</i>	ibid.
<i>Colchicum biflorum</i>	ibid.	<i>Cyno, orchis minimis maculosis foliis</i>	ibid.
<i>Colchicum Polyacthes</i>	653.		
<i>Colchicum vernum Camerarij</i>	ibid.		
<i>Colchicum candido flore Anglicum</i>	654.		
<i>Colchicum pleno flore</i>	ibid.		
<i>Colchicum versicolore flore</i>	655.		
<i>Colchicum montanum</i>	656.		
<i>Colchicum minimum tenuifolium</i>	657.		
<i>Colchicum minus malignum, siue Hermodactylus Offi-</i>	658.		
<i>cinatum.</i>	660.		
<i>Colchicum Illyricum siue Gracum.</i>	662.		
<i>Colchicum paruum montanum Luteum, alij Nar-</i>	679.		
<i>cissus</i>	790.		
<i>Colchicum Orientale & Syriacum</i>	154.		
<i>Colocasia</i>	159.		
<i>Convolvulus maior</i>	165.		
<i>Convolvulus peregrinus pulcher</i>	166.		
<i>Convolvulus Bona nox dulcis</i>	168.		
<i>Convolvulus peregrinus L. Bauhini</i>	169.		
<i>Convolvulus maritimus Solanella affinis</i>	1050.		
<i>Convolvulus & Erysimus</i>	1051.		
<i>Conyza media</i>	ibid.		
<i>Conyza affinis herba vulneraria</i>	1052.		
<i>Conyza maior Matthioli, Baccharis quibusdam</i>	ibid.		
<i>Conyza Helenitis mellita incana</i>	1053.		
<i>Conyza Helenitis pilosa Lobelij</i>	1054.		
<i>Conyza veteribus</i>	ibid.		
<i>Conyza maior Montpellierensis odorata</i>	1055.		
<i>Conyza media Montpellier.</i>	ibid.		
<i>Conyza media Montpellier affinis</i>	1056.		
<i>Conyza species folijs virga aurea</i>	ibid.		
<i>Conyza minor vera</i>	1057.		
<i>Conyza maritima</i>	1058.		
<i>Conyza Alpina</i>	1059.		
<i>Conyza Syria quibusdam</i>	ibid.		
<i>Conyza montana Martini</i>	1060.		
<i>Conyza capue nutante</i>	1061.		
<i>Coralloides prana quinquefolia</i>	900.		
<i>Coralloides altera siue septifolia</i>	901.		
<i>Coralloides Emecaphyllor Clusij</i>	902.		
<i>Coralloides minor bulbifera</i>	ibid.		
<i>Corchorus</i>	982.		
<i>Coronopus Rutlij siue Nasturtium verrucosum</i>	919.		
<i>Cosmos</i>	748.		
<i>Cosmos Arabicus & similis</i>	749.		
<i>Cosmos Indicus Clusij</i>	750.		
<i>Cosmi Adalucenses duo</i>	751.		
<i>Cosmos Helenis facie officinarum</i>	ibid.		
<i>Cosmos Helicis Offic.</i>	ibid.		
		D	
		<i>Delphinium minus Casalp.</i>	865.
		<i>Dentaria aphyllis minor Tabern</i>	783.
		<i>Dentaria quinquefolia</i>	900.
		<i>Dentillaria Rondeletij</i>	941.
		<i>Digitalis purpurea</i>	812.
		<i>Digitalis flore magno candido</i>	813.
		<i>Digitalis Lutea flore maiore</i>	ibid.
		<i>Digitalis ferruginea</i>	ibid.
		<i>Digitalis flore minore subluteo</i>	814.
		<i>Draba lutea quibusdam</i>	870.
		<i>Draba lutee similis</i>	ibid.
		<i>Draba veteribus</i>	919.
		<i>Draba multis flore albo</i>	ibid.
		<i>Draba species glabra</i>	940.
		<i>Draba minor orbiculatibus capit.</i>	ibid.
		<i>Drackena radix</i>	740.
		<i>Drackena affinis radix</i>	741.
		<i>Dracunculus veteribus & in genere</i>	787.
		<i>Dracunculus maior vulgaris</i>	789.
		<i>Dracunculus aquaticus</i>	ibid.
		<i>Dryophoron Plumj</i>	924.
		E	
		<i>Epinedium quorundam</i>	391.
		<i>Ephemerum non leibale veteribus</i>	647.
		<i>Ephemerum Matthioli</i>	905.
		<i>Erinos, Erinos, vel Echinos Veteribus & in genere</i>	798.
		<i>Erinos maior rapunculo affinis</i>	799.
		<i>Erinos Dalechampi</i>	812.
		<i>Eruca maior sativa annua</i>	859.
		<i>Eruca Romana seu Genista</i>	860.
		<i>Eruca sativa Hispanica</i>	ibid.
		<i>Eruca tenuifolia perennis</i>	861.
		<i>Eruca silu. angustifolia flore luteo</i>	ibid.
		<i>Eruca minimo flore Montpellier.</i>	862.
		<i>Eruca inodora</i>	ibid.
		<i>Eruca purpurea, alij cerulea</i>	865.
		<i>Eruca palustris maior fl. albo</i>	867.
		<i>Erysimum Tragi</i>	865.
		<i>Erysimum alterum Matthioli</i>	864.
		<i>Eupatorium seu Agrimonia</i>	398.
		<i>Eupatorium adulterinum</i>	1065.

INDEX.

F

F Aalim Thonetii Helenio folijs simili	392.
Faba vel Phasolus Indicus magnus	374.
Faba arborescens species varia	375.
Faba, cyanos leguminosa in genere	378.
Fas fiducium ex Veteribus	415.
Festuca graminea glutina vasculis: affusis inbus: & nemorale lat. folia	479.
Festuca unceofolia C. Bauhini	480.
Festuca unceofolia folio pica gemina C.B.	544.
Festuca sexta Thaly	ibid.
Festuca pragensis Lanuginosa C.B.	ibid.
Festuca dumetorum Eiusdem	545.
Flos Persicus Sisymbrio congener	70.
Fanumgracum siluestre, siue Glycyrriza silvestris quibusdam	310.
Fanumgracum syl. Tragi affinis planta	331.
Fanumgracum	361.
Fanumgracum silu. Dalechampi	365.
Fragaria ferens fraga rubra & alba	394.
Fragaria non fructifera	395.
Fragie Serapionis	191.
Fritularia nigra	682.
Fructus Iguammosus cum granis piperis nigri, an Brama Diosc.	188.

G

G A'anga maior	718.
Galanga minor	719.
Galega	342.
Galega montana Dalechampi	343.
Galega nemorensis verna	ibid.
Galega nemorensis verna affinis flore albo uen. fl. purp. & albo	344.
Gladulus siue Xyphium	345.
Glabri folia Cichoroides Bauhini & Turritia secunda Clusio	701.
Glaux Hispanica	846.
Glaux Veterum	341.
Glaux leguminosa Herbariorum	352.
Granadilla Hedera similis	ibid.
Glycyrrhor sue Amara dulcis	114.
Glycyrrhiza	109.
Glycyrrhiza Dioscor. chinata non repens	316.
	327.

H

H Abazelin siue Granum Alzelin veterib.	504.
Haemina Serapionis siue Piperella	189.
Halicacabum peregrinum siue Cor Indum	173.
Hedera veteribus & in genere	110.
Hedera communis maior & minor	111.
Hedera Dionysias Dalechampi	113.
Hedera Lachryma	114.
Hedypnois siue dens Leonis Fuchsj.	1035.
Hedypnois Monspeffulana	1036.
Helianthemum vulgare flore luteo	15.
Helianthemum folijs maioribus flore albo	16.
Helianthemum flore albo folio angusto, hirsuto	17.
Helianthemum tenuifolium glabrum luteo flore	18.
Helianthemum alpinum folio Pilosella minoris Fuchsj ibidem.	
Helianthemum folio Thymi ineano	19.
Helianthemum, siue Cistus humilis, folio sampsuchi, capulis valde hirsutis	20.
Helianthemum adnunculariam accedens	ibid.
Helianthes species rara coma inflexa ut in Heliotropio ibidem.	
Helxine Cissampelos	156.
Helxine Cissampelos multis, siue Convolvulus minor	157.
Helxine semine triangulo	157.
Helenium Aegyptium ex genere forte vicinarum	314.

Herba mimosa

Hermodactylis veterib.	392.
Hemerocallis veterib.	647.
Hemerocallis veterib.	688.
Hemerocallis veterib.	667.
Hemerocallis veterib.	688.
Hesperides flore purpureo albo & vario	877.
Hesperis Pannonica inodora	878.
Hesperis colore inoleganti	879.
Hesperis Syriaca	ibid.
Hesperis Syriaca alia	ibid.
Hesperis Alpina muralis minor siue repens	880.
Hesperidi Alpina siue muraria affinis Draba succulentata.	ibid.
Hesperidi Alpina murariae similis surrecta & magna	881.
Hypocoon	799.
Hieracium stellatum	1014.
Hieracia Veterum	1015.
Hieracium multis, alijs Cichoreum luteum hirsutum & glabrum, vel minus hirsutum	1014.
Hieracy parva species hyoseris angustifolia aspera	1015.
Hieracium pulchrum	ibid.
Hieracium Erncefolium hirsutum	1015.
Hieracium pulchrum ramosum Sprengerianum	ibid.
Hieracium latifolium Geneuense folio Conyze maioris Monfess.	1016.
Hieracium Pannonicum latifolium Clusio, Pilosella maiori siue Palmata lutea accedens maculatum ibidem.	
Hieracium capitulis Cardui benedicti, maximum Bueglossum echinoides quibusdam	1018.
Hieracium asperum maiori flore in agrorum limitibus	1019.
Hieracium rectum rigidum quibusdam Sabaudum.	1010.
Hieracy Sabaudi varietas duplex	ibid.
Hieracium minus pramosa radice siue Fuchsj	1031.
Hieracium Macrocaulon inuenum siue minus primum Dodonae	ibid.
Hieracium montanum maius latifolium	ibid.
Hieracium latifolium glabrum ex valle Griesbachiana	1033.
Hieracium latifolium pramosa radice, caule singulari, Pilosella, maiori affine	1033.
Hieracium montanum laciniato folio lanuginoso Clusio	1037.
Hieracium Narbonense rotundifolium caule aphylo, & hieracium caule aphylo hirsutum	ibid.
Hieracium paruum hirsutum caule aphylo crispum vis siccatum	1038.
Hieracium montanum 6. Clusio antiquifolium	ibid.
Hordeum veterib. & neotericis in genere	419.
Hordeum distichum	429.
Hordeum Hexastichum pulchrum	429.
Hordeum Polystichum	ibid.
Hordeum distichum Germanis Oriza	429.
Hordeum nudum siue Gymnocritum	430.
Hordeum murinum	431.
Hordeum vrens vena Hispania	ibid.
Holostium Matthioli inuenum	ibid.
Hyacinthus parvis facie gramin Triglochin	508.
Hyacinthi historia ex veter. sententia	571.
Hyacinthus vernus Botryoides minor caruleus, angustioribus folijs, odoratus	571.
Hyacinthus Botryoides vernus minor, latifolius, caruleus, inodorus	572.
Hyacinthus Botryoides albus	573.
Hyacinthus autumnalis maximus maior	574.
Hyacinthus maximus Botryoides coma carulea	574.
Hyacinthus Orientalis quibusdam Constantinopolitana	575.
Hyacinthus brumalis albus	577.

INDEX

<i>Hyacinthus minimus serotinus flosculis hyacinthi Orientalis</i>	578.	<i>Iris dilute cœrulea inuolucro albo foris Dalmatica ibidem.</i>	
<i>Hyacinthus odoratissimus dictus Tibecadi, & Muscari</i>	578.	<i>Iris Lusitanica verna violacea, Clus. Maior latif. nona cum vanis purpureis</i>	717.
<i>Hyacinthus odoratiss. Tibecadi luteus</i>	579.	<i>Iris atrof. bicolor caruleo obsoleto cinereis mixta</i>	718.
<i>Hyacinthi Tibecadi lutei varietas siue Muscari lutei</i>	ibid.	<i>Iris flore albo</i>	719.
<i>Hyacinthus stellatus bifolius, & trifolius vernus dumetorum flore caruleo, & albo</i>	ibid.	<i>Iris lutea, folijs florum repandis variegatis</i>	720.
<i>Hyacinthus stellaris albicans serotinus</i>	580.	<i>Iris latifolia maior Syriacæ vel Chalcædonica flore maiore variegato Clusio prima</i>	721.
<i>Hyacinthus stellaris vernus parvulus, flore ex caruleo cinereo</i>	581.	<i>Iris biflora Lusitanica flore violaceo clusio</i>	722.
<i>Hyacinthus stellaris albicans serotinus</i>	580.	<i>Iris flore violaceo fœio virente, an Clusii 25. canit folijs nudo</i>	723.
<i>Hyacinthus stellaris vernus parvulus, flore ex caruleo cyreneo</i>	587.	<i>Iris humilis latifolia colore violaceo, & saxatilis eadem, nec valde similis, e luf. primum genus. Chamæiris nuxa</i>	723.
<i>Hyacinthus stellaris maior.</i>	ibid.	<i>Iris humilis latifolia maior acutis: Clus. Chamæiridis latifoliae genui alterum</i>	724.
<i>Hyacinthus stellaris astinus minor</i>	581.	<i>Iris humilis latifolia minor, & eius varietates quinque</i>	ibid.
<i>Hyacinthus varius</i>	ibid.	<i>Iris humilis latifol. minor elegantiss. variegata, Clus. Chamæiris</i>	725.
<i>Hyacinthus stellaris Byzantinus</i>	582.	<i>Iris angustifolia minor Clusii quarta</i>	726.
<i>Hyacinthus stellaris astinus</i>	583.	<i>Iris graminea cui pereunt quotannis folia</i>	727.
<i>Hyacinthus irifolius Theophrast. Lobel.</i>	ibid.	<i>Iris tenuifolia maior flore caruleo & striato angust. ibid.</i>	
<i>Hyacinthus comosus Byzantinus Candicans cum staminibus purpureis</i>	ibid.	<i>Iris angustifolia flore albo</i>	728.
<i>Hyacinthus Comosus albus cum cœruleis staminib.</i>	584.	<i>Iris tenuifolia flore violaceo an Clusii</i>	729.
<i>Hyacinthus affinis Platan.</i>	ibid.	<i>Iris tenuifolia Michel Feldensis spontanea, foris Clusii angustifolia minor siue prima</i>	729.
<i>Hyacinthus Peruvianus</i>	585.	<i>Iris Tripolitana folijs longissimis flore aureo</i>	730.
<i>Hyacinthus Angelicus siue Belg.</i>	ibid.	<i>Iris Tuberosa Belgarum</i>	ibid.
<i>Hyacinthus Hispanicus</i>	586.	<i>Iris Palustris lutea siue Acorus Adulterinus</i>	732.
<i>Hyacinthus stellaris cinereus</i>	ibid.	<i>Iris, siue Erysimum Veteribus</i>	862.
<i>Hyacinthus totus albus Campanilla</i>	ibid.	<i>Iris, siue Erysimum Veteribus</i>	304.
<i>Hyacinthus flore rubro</i>	ibid.	<i>Iris, siue Erysimum Veteribus</i>	ibid.
<i>Hyacinthus obsoletior Hisp. Anglico familia</i>	587.	<i>Iris, siue Erysimum Veteribus</i>	ibid.
<i>Hyacinthus minor Hispan. angustifolius caruleus & albus</i>	ibid.	<i>Iris, siue Erysimum Veteribus</i>	ibid.
<i>Hyacinthus minor Hispanicus obsoleto flore</i>	588.	<i>Iris, siue Erysimum Veteribus</i>	ibid.
<i>Hyacinthus Indicus tuberosa radice</i>	ibid.	<i>Iris, siue Erysimum Veteribus</i>	ibid.
<i>Hyacinthus Mauritanicus</i>	ibid.	<i>Iris, siue Erysimum Veteribus</i>	ibid.
<i>Hyacinthus latifolius Dalechampi</i>	ibid.	<i>Iris, siue Erysimum Veteribus</i>	ibid.
<i>Hyacinthus libofolius stellatus</i>	589.	<i>Iris, siue Erysimum Veteribus</i>	ibid.
<i>Hyacinthus Tripolitani</i>	ibid.	<i>Iris, siue Erysimum Veteribus</i>	ibid.
<i>Hyacinthus ex Thracia</i>	ibid.	<i>Iris, siue Erysimum Veteribus</i>	ibid.
<i>Herich Theneri</i>	791.	<i>Iris, siue Erysimum Veteribus</i>	ibid.

I.

<i>Iacobaea Pannonica folio non laciniato</i>	1056.	<i>Lalluca, Thrylax veteribus</i>	995.
<i>Iacobaea Marina siue Cintraria</i>	ibid.	<i>Lalluca sativa vulgaris capitata & non capitata</i>	997.
<i>Iacobaea vulgaris</i>	1057.	<i>Lalluca rubra</i>	998.
<i>Iacobaea Pannonica latifolia</i>	ibid.	<i>Lalluca Romana longa dulcis</i>	ibid.
<i>Iberis Fuchsi siue Nasturtium pratense sylvest. & flore pleno</i>	879.	<i>Lalluca longo & valde angusto folio</i>	999.
<i>Iberis Fuchsi affinis Trifolia Cardamine</i>	890.	<i>Lalluca crispata laciniata</i>	ibid.
<i>Iberis Fuchsi aliquatenus similis Cardamine Dalechampi totam</i>	891.		
<i>Iberis Fuchsi vel Nasturtio aquatico affinis Cardamine Alpina media Clusii</i>	ibid.		
<i>Iberis & Lepidium Veteribus & in genere</i>	915.		
<i>Iberis</i>	918.		
<i>Iasminum siue Gelseminum flore albo</i>	107.		
<i>Iasminum Hispanicum flore maiore</i>	101.		
<i>Iasminum siue Sambach Arabum Alpino</i>	102.		
<i>Iasminum siue Gelseminum luteum & caruleum</i>	ibid.		
<i>Iasione veterib.</i>	155.		
<i>Inryba ferides & Cichoria ex veteribus</i>	1006.		
<i>Inrybium Sativum triplex</i>	1011.		
<i>Iridis bulbosa species varia</i>	703. & sequentibus		
<i>Iridis bulbosa siue juncinum mixtus</i>	ibid.		
<i>Iris vulgaris violacea siue purpurea hortensis & sylvestris</i>	709.		
<i>Iris ex Veterum sententia</i>	ibid.		
<i>Iris Dalmatica maior</i>	715.		
<i>Iris Dalmatica minor</i>	716.		

L

<i>Lalluca, Thrylax veteribus</i>	995.
<i>Lalluca sativa vulgaris capitata & non capitata</i>	997.
<i>Lalluca rubra</i>	998.
<i>Lalluca Romana longa dulcis</i>	ibid.
<i>Lalluca longo & valde angusto folio</i>	999.
<i>Lalluca crispata laciniata</i>	ibid.

Lalluca

INDEX.

<i>Lactuca crispa & tenuiter dissecta</i>	ibid.	<i>Lilium Asphodeli radice luteo, siue Lilio Asphode-</i>	
<i>Lactuca silu. siue endiuia, multis dicta, folio laciniato,</i>	1003.	<i>lus quorundam flore luteo</i>	700.
<i>dorso spinoso</i>	1003.	<i>Lilium radice Asphodeli phaniceum, siue Lirio Aspho-</i>	
<i>Lactuca silu. murorum flore luteo</i>	1004.	<i>delus quibusdam</i>	701.
<i>Lactuca murorum affinis Sonchus Denaroides Dalechā</i>	ibid.	<i>Lignum Colubrinum in genere</i>	169.
<i>py</i>	ibid.	<i>Lobus cum seminibus consuelulo maiori accedentibus</i>	166.
<i>Lactuca silu. purpurea</i>	1005.	<i>Lobus Aethiopico piperi similis, acris</i>	188.
<i>Lampiana veteribus</i>	1028.	<i>Lobus Cartilagineus ex Insula Mauritiis, Phascolo siue</i>	
<i>Lampiana Dodonai</i>	ibid.	<i>Faba nigra</i>	272.
<i>Lachryma Iobi multis, siue milium arundinaceum</i>	449.	<i>Lobus peregrinus cartilagineus, Phascolo ex puniceo</i>	
<i>Lapathum, Oxylapathum, & Hippolapathum, ac de</i>		<i>nigro tanquam annulo cincto.</i>	273.
<i>is V eterum sententia, & in genere</i>	987.	<i>Lobus quadrangularis</i>	278.
<i>Lapathi species varia</i>	pag. 983. & sequentibus	<i>Lobus membranaceus plantis niger</i>	ibid.
<i>Lathyrus siue cicercula in genere.</i>	302.	<i>Lotus in genere</i>	353.
<i>Lathyrus maioris species flore rubente, & albedo, mino-</i>		<i>Lotus satua veteribus</i>	354.
<i>re, dumetorum, siue Germanic.</i>	ibid.	<i>Lotus satua veterum</i>	ibid.
<i>Lathyrus maior, latifolia, flore maiore purpureo spe-</i>		<i>Lotus corniculata glabra & hirsuta minor</i>	ibid.
<i>ciosior</i>	303.	<i>Loti Corniculata maior species</i>	355.
<i>Lathyrus maior Narbonensis angustifolius</i>	304.	<i>Lotus Corniculata siliquis singularibus vel binis, le-</i>	
<i>Lathyrus species lutea</i>	ibid.	<i>nus</i>	356.
<i>Lathyrus luteus sylu. dumetorum</i>	ibid.	<i>Lotus sil. quesa flore fusco tetragonolobus</i>	358.
<i>Lathyrus siliqua hirsuta</i>	305.	<i>Loti siliquosa aliquomodo similis Coronopii, ex</i>	
<i>Lathyrus species qua Erutia silu. Dodonai</i>	305.	<i>C. ar</i>	ibid.
<i>Lathyrus anguloso sinu</i>	306.	<i>Lotus Ornithopodii siliquis</i>	ibid.
<i>Lathyrus flore rubro & alius albo</i>	307.	<i>Lotus siliquosa lutea Monspeliensis</i>	359.
<i>Lathyrus quidam, quibusdam & Aegyptia Aracum</i>	308.	<i>Lotus satua, odorata annua flore caruleo</i>	359.
<i>Lathyrus folio tenuiore florib. rubris</i>	ibid.	<i>Lotus silu. ex Cod. Casar.</i>	373.
<i>Lagopus Trifolius quorundam</i>	177.	<i>Lolium quintum Trago Hordei granis aristis non ad-</i>	
<i>Ledum, & Ladanium</i>	6.	<i>medum rusticis</i>	436.
<i>Lens</i>	317.	<i>Lilium gramineum spicatum</i>	437.
<i>Leporis auricula Celsipini</i>	309.	<i>Lopulus mas & femina</i>	151.
<i>Leucoium bulbosum Hexaphyllum cum unico flore, ra-</i>		<i>Lupinus in genere eiusque species varia</i>	288. & sequ.
<i>rius bino</i>	590.	<i>Lupinus silu. Italorum rusticorum Celsip. dictus</i>	314.
<i>Leucoium bulbosum minus Triphyllum</i>	591.	<i>Lunaria maior siliqua rotundiore</i>	881.
<i>Leucoium bulbosum praeox Bizantinum</i>	ibid.	<i>Lunaria maior siliqua longiore</i>	882.
<i>Leucoium bulbosum Polianthemum tardius florens flo-</i>		<i>Lunaria bisculata</i>	935.
<i>ribus minoribus</i>	592.	<i>Lunaria peltata minima quibusdam ad Thlaspi refe-</i>	
<i>Leucoium Triphyllum flore caruleo Someri</i>	ibid.	<i>renda</i>	ibid.
<i>Leucoium bulbosum autumnale minus tenuif.</i>	593.	<i>Lysimachion veteribus</i>	901.
<i>Leucoio bulbofo ferit affinis Bulbus flore intus luteo, fo-</i>		<i>Lysimachie species varia</i>	ibid. & pag. sequentibus.
<i>ria purpureo</i>	ibid.		
<i>Leucoio bulbofo ferit affinis Bulbus quidam</i>	ibid.		
<i>Leucoium ex veterum sententia</i>	871.		
<i>Leucoii species varia</i>	872. & sequentibus		
<i>Leucoium cum siliquis rotundis flore luteo</i>	931.		
<i>Leucoium spinosum, siue Tolispi spinosum alius</i>	931.		
<i>Leucoium luteum spinosum</i>	931.		
<i>Lepidium Pauli</i>	940.		
<i>Lepidium non repens</i>	941.		
<i>Libanotis species Rondeletii</i>	25.		
<i>Lilium Alexandrinum siue Oraithogalum magnum</i>	629.		
<i>Syriacum</i>	685.		
<i>Lilium album vulgare</i>	687.		
<i>Lilium album Syriacum Rauwolfii</i>	688.		
<i>Lilium rubens vel croceum maius</i>	689.		
<i>Lilium rubens vel croceum minus</i>	690.		
<i>Lilium Phoeniceum di. unum</i>	ibid.		
<i>Lilium cruentum latifolium</i>	ibid.		
<i>Lilium Bulbiferum maius</i>	691.		
<i>Lilium bulbiferum incanum</i>	ibid.		
<i>Lilium bulbiferum repens</i>	691.		
<i>Lilium Croceum flore pleno</i>	ibid.		
<i>Lilium bulbiferum cruentum angustifolium</i>	696.		
<i>Lilium flore nutante ferrugineo duplex, maius & mi-</i>			
<i>nus</i>	ibid.		
<i>Lilium flore nutante albo</i>	694.		
<i>Lilium flore nutante maximum</i>	ibid.		
<i>Lilium flore miniato, siue Hemerocallis Chalcidonica</i>	695.		
<i>aliquibus</i>	696.		
<i>Lilium praeox nutante flore rubro</i>	697.		
<i>Lilium nutante flore flauo</i>	699.		
<i>Lilium Persicum siue Sufianum</i>			

memorialis
pag 977

INDEX.

Nasturtium & in genere

N

<i>Nasturtium Indicum</i> folio peltato scandens	175.
<i>Nasturtium Indicum</i> fol. anguloso	176.
<i>Nasturtij</i> Indici putata filiqua Peruviana	176.
<i>Nachani</i> Garciae	417.
<i>Narcissus</i> Cyprinus luteus polyanthes flore pleno	395.
<i>Narcissus</i> folijs florib. albis, oblongo calice luteo	397.
<i>Narcissus</i> luncifolius omnino albus calyce longo	398.
<i>Narcissus</i> luncifolius albus calyce magno	399.
<i>Narcissus</i> in genere	ibid.
<i>Narcissus</i> Medio purpureus flore pleno	601.
<i>Narcissi</i> varia alie species ibidem & sequ. usque ad pag. 609.	
<i>Narcissus</i> Persicus croci flore molino, Colchicis affinis	661.
<i>Narcissus</i> autumnalis minor & similes planta	661.
<i>Narcissus</i> Africanus bifolius sine exoticus	679.
<i>Narcissus</i> Africanus folio rotundiore	ibid.
<i>Napus</i>	842.
<i>Napus</i> sylvestris	483.
<i>Nasturtium</i> veteribus	911.
<i>Nasturtium</i> vulgare	912.
<i>Nasturtium</i> crispum Ioh. Bauhini	915.
<i>Nasturtium</i> lasifolium Dioscorideum Ioh. Bauhino	ibid.
<i>Nasturtium</i> Alpinum Caps. <i>Nasturtium</i> vulgare. Ioh. Bauh.	918.
<i>Nasturtium</i> Alpinum tenuissimè diuisum	ibid.
<i>Nasturtium</i> sylv. Valentinian Clusio	920.
<i>Nasturtium</i> vel <i>Tiblasti</i> maritimum	927.
<i>Nerium</i> Alpinum quibusdam, alijs <i>Ledum</i> glabrum, & hirsutum	21.
<i>Nerium</i> sive <i>Rhododendrum</i> flore rubro & albo	140.
<i>Nerij</i> facie arbor	142.
<i>Nerij</i> filique effigie Kaye Baka	ibid.
<i>Nit</i> Arabum quibusdam sive <i>convolvulus</i> cœruleus	164.
<i>Nigundo</i> arbor mas & femina	188.
<i>Noli me tangere</i>	209.

O

<i>Ornithopodio</i> affinis vel potius <i>solea</i> , vel ferro equino, herba	343.
<i>Ornithopodium</i> flore flavescente	350.
<i>Ornithopodium</i> tuberosum Dalechampi	351.
<i>Ornithogalum</i> Cœruleum pallens, & <i>ornithogalum</i> Hispanicum minus	622.
<i>Ornithogalum</i> pallido flore	624.
<i>Ornithogalum</i> luteum minus	ibid.
<i>Ornithogalum</i> veterib.	627.
<i>Ornithogalum</i> spicatum flore virente	627.
<i>Ornithogalum</i> spicatum albo flore Monspess.	628.
<i>Ornithogalum</i> Creticum & Pannonicum albo flore	629.
<i>Ornithogalum</i> vulgare & verius minus & minus.	630.
<i>Ornithogalum</i> Neapolitanum	631.
<i>Orobis</i> sive <i>Eruum</i> in genere	317.
<i>Orobis</i> sive <i>Eruum</i> multis	321.
<i>Orobis</i> cicer Lobelij	322.
<i>Orobo</i> similis <i>Lathyrus</i> Cretensis Honorij Belli	ibid.
<i>Orobo</i> similis <i>Aracis</i> Cretensis eiusdem	ibid.
<i>Oobros</i> in genere	295.
<i>Omphacium</i>	84.
<i>Onobrichis</i> in genere	336.
<i>Onobrichis</i> purpureo flore	337.
<i>Onobrichis</i> subcervuleo flore	ibid.
<i>Onobrichis</i> pallido flore	ibid.
<i>Onobrichis</i> Celsij.	342.
<i>Oriza</i> veteribus	450.
<i>Oriza</i> in genere	451.

<i>Oriza</i> Indis orientali peculiaris	483.
<i>Orchis</i> sive <i>testiculus</i> in genere	735.
<i>Orchis</i> barbata fatida	736.
<i>Orchis</i> galea & alie ferè cinerele	737.
<i>Orchis</i> stratumatrica maior	738.
<i>Orchis</i> stratumatrica minor	ibid.
<i>Orchis</i> ornithophora folio maculoso	739.
<i>Orchis</i> magna latis folijs, galea nigricante.	ibid.
<i>Orchis</i> alius purpureus, alius ex roseo candidus Trago sine quartus	760.
<i>Orchis</i> maior tota purpurea non maculata	760.
<i>Orchis</i> Ornithophora flore colore herbaceo	761.
<i>Orchis</i> Ornithophora candida	ibid.
<i>Orchis</i> minor purpurea & aliorum colorum	ibid.
<i>Orchis</i> sine <i>Cynorchis</i> tertius Dodon.	762.
<i>Orchis</i> maior tota purpurea	763.
<i>Orchis</i> genus paruum	ibid.
<i>Orchis</i> parva flore rubro sive phœniceo	764.
<i>Orchis</i> minor folijs tenuioribus reflexis flore puniceis	ibid.
<i>Orchis</i> Bataunica	ibid.
<i>Orchidum</i> quarundam Icones	ibid.
<i>Orchis</i> minor angustifolia	765.
<i>Orchis</i> parvis floribus, multis punctis notatis.	ibid.
<i>Orchis</i> rotundus Dalechampi	ibid.
<i>Orchis</i> sive <i>testiculus</i> maximo flore	766.
<i>Orchis</i> fusciflora	ibid.
<i>Orchis</i> melissas	767.
<i>Orchis</i> sive <i>testiculus</i> sphegodes hirsuto flore	ibid.
<i>Orchis</i> Myodes	ibid.
<i>Orchis</i> Serapias tertius Dodon. & <i>Myodes</i> Lobelio	ibid.
<i>Orchis</i> Myodes flore grandiusculo	768.
<i>Orchis</i> Myodes lutea	ibid.
<i>Orchis</i> parva autumnalis lutea	ibid.
<i>Orchis</i> Frisia hirsuta	769.
<i>Orchis</i> sine triorchis lutea tertia	ibid.
<i>Orchis</i> spiralis alba odorata	ibid.
<i>Orchis</i> radice repente	770.
<i>Orchis</i> Lilifolia minor	ibid.
<i>Orchis</i> alba calcari longo	771.
<i>Orchis</i> hermaphrodita bifolia	772.
<i>Orchis</i> genus quibusdam satyrium castratum	772.
<i>Orchides</i> , <i>Culices</i> minores triphylla	ibid.
<i>Orchis</i> Batrachites	ibid.
<i>Orobanchæ</i> & <i>Hamodorum</i> Veteribus & in genere	779.
<i>Orobanchæ</i> flore maiore	780.
<i>Orobanchæ</i> flore minore	781.
<i>Orobanchæ</i> minor purpureis floribus sine ramosa	ibid.
<i>Orobanchæ</i> magna purpurea Monspessulana	782.
<i>Orobanchæ</i> affinis nido auis	ibid.
<i>Orobanchæ</i> & nido auis affinis Pseudo <i>Aspidopoy</i> An-	ibid.
<i>Oxalis</i> violaceum	ibid.
<i>Oxalis</i> vulgaris	989.
<i>Oxalis</i> cista	990.
<i>Oxalis</i> sylvestrica maxima	ibid.
<i>Oxalis</i> folio amplissimo geniculis tuberosis	991.
<i>Oxalis</i> tuberosa radice	ibid.
<i>Oxalis</i> folio rotundiore repens	ibid.
<i>Oxalis</i> minor aculeata Candide	ibid.
<i>Oxalis</i> parva auriculata repens	992.
<i>Oxalis</i> Africana	ibid.
<i>Oxis</i> sive <i>Trifolium</i> acidum	387.
<i>Oxys</i> lutea	388.

P

<i>Palmata</i> Satyria in genere	773.
<i>Palmata</i> non maculata.	774.
<i>Palmata</i> speciosiore tyro, folio maculato	ibid.
<i>Palmata</i> maculata	775.
<i>Palmata</i> alba.	ibid.
<i>Palmata</i> sive <i>Serapias</i> palustris	ibid.

INDEX.

<i>Palmata siue Orchis Pannonica</i>	ibid.	<i>Pisi pulchra species folio anguloso</i>	ibid.
<i>Palmata Serapias palustris leptophylla, violacea, maculata & non maculata</i>	776.	<i>Pisi minora ex purpureo variegata, vicia similia</i>	298.
<i>Palmata angustifolia palustris</i>	ibid.	<i>Pisa parua viridia</i>	ibid.
<i>Palmata Serapias montana</i>	ibid.	<i>Pisa minora rubra variegata</i>	ibid.
<i>Palmata floribus impenis rubris</i>	777.	<i>Pisa magna, rubra variegata</i>	ibid.
<i>Palmata palustris Nephelodes</i>	ibid.	<i>Pisa maiora, alba</i>	299.
<i>Palmata siue Cynophorebis macrocaulos galericulata C. Gemma</i>	ibid.	<i>Pisum erectius comosum</i>	ibid.
<i>Palmata Caryophyllata</i>	ibid.	<i>Pisa sine tunicis durioribus in siliqua magna alba</i>	300.
<i>Palmata angustifolia maculata purp.</i>	ibid.	<i>Pisum Guinea album siue Cicer</i>	ibid.
<i>Palmata rubella cum longis calcareibus</i>	778.	<i>Pisum Brasilianum flauescens area fusca germen cin- gente</i>	301.
<i>Palmata minor odoratissima</i>	ibid.	<i>Pisum Brasilianum phoeniceum, & nigrum</i>	ibid.
<i>Panicum silvestre dictum & dens Canis</i>	443.	<i>Pisum Indicum variagatum</i>	ibid.
<i>Panicum vulgare panicum</i>	440.	<i>Pisum Indicum quoddam rotundum, fuscum</i>	ibid.
<i>Panicum ceruleum siue Indicum</i>	441.	<i>Pisum Indicum maius nigrum</i>	ibid.
<i>Panicum Americani sesquipedalis spica</i>	ibid.	<i>Pisum Indicum umbilico eminente</i>	ibid.
<i>Pentaphyllum Veteribus</i>	396.	<i>Pisa Indica folijs longiusculis</i>	ibid.
<i>Pentaphyllum vulgare repens</i>	397.	<i>Pisum sylvestre</i>	309.
<i>Pentaphyllum rectum</i>	398.	<i>Polygalon veteribus</i>	315.
<i>Pentaphyllum Alpenum splendens</i>	ibid.	<i>Polygalon Gesneri</i>	ibid.
<i>Pentaphyllum minus molis lanugine pubescens</i>	ibid.	<i>Polygalum minus saxatile</i>	ibid.
<i>Pentaphyllum paruum hirsutum</i>	ibid.	<i>Polygalo Gesneri affine caput Gallinaceum</i>	ibid.
<i>Pentaphyllum minus folio subitum albicante</i>	ibid.	<i>Polygalo Gesneri similis plania</i>	349.
<i>Pentaphylli recti species variae</i>	ibid.	<i>Polygalon cortusi</i>	351.
<i>Panocratum Veteribus</i>	610.	<i>Polygala quibusdam</i>	ibid.
<i>Panocratum Adonisefulcanum multis Scylla alba parua</i>	611.	<i>Potentilla siue Argentina</i>	398.
<i>Panocratum Indicum</i>	613.	<i>Porrum</i>	551.
<i>Panocratum alterum Vernum Indicum</i>	614.	<i>Porrum setium, & Schoenoprasum quibusdam</i>	553.
<i>Papyrus Nilotica</i>	507.	<i>Pseudo china radix clus.</i>	122.
<i>Pavietaria</i>	976.	<i>Pseudo Asphodelus quibusdam</i>	634.
<i>Pauato arbor folijs multis aureis</i>	102.	<i>Pseudo-narcissus albo flore clusii</i>	597.
<i>Pentaphyllum vel potius heptaphyllum flore rubro ibi- da.</i>	ibid.	<i>Pyramidalis Valerandi, hirsuta</i>	808.
<i>Pentaphylloides supinum</i>	ibid.	<i>Pyramidis laevis</i>	ibid.
<i>Pentaphylloides erectum</i>	ibid.		
<i>Pentaphyllum folijs inferis & superis incanis ibidem</i>	ibid.	<i>Quanoctis</i>	177.
<i>Pentaphyllum siue potius heptaphyllum flore muscofo ibid.</i>	ibid.		
<i>Pentaphyllum Indicum</i>	ibid.		
<i>Pentaphylli effigies Leucas quibusdam</i>	ibid.		
<i>Perichymenum veteribus</i>	103.		
<i>Perichymenum plurimis siue Caprifolium duplex perfo- ratum & non perforatum</i>	104.		
<i>Perichymenum rectum, fructu rubro & nigro</i>	106.		
<i>Perichymeno similis</i>	107.		
<i>Perichymenum rectum folio serrato</i>	ibid.		
<i>Perichymenum rectum fructu ceruleo</i>	108.		
<i>Perichymenum paruum Prutenicum Clusii</i>	ibid.		
<i>Pepo indicus minor angulosus</i>	226.		
<i>Phacelus, Phascolus, Phasolus, Dolichus, Smilax hor- tensis in genere</i>	233.		
<i>Phaseli seu Phasoli sexaginta circiter species varia pag.</i>	238. 259. 260.		
<i>& sequentibus usque ad pag.</i>	278.		
<i>Piper nigrum</i>	181.		
<i>Piper nigrum Clusii</i>	182.		
<i>Piper nigrum Aosta</i>	183.		
<i>Piper abortivum, Brasma</i>	184.		
<i>Piper album</i>	ibid.		
<i>Piper Insule Taprobane candidum Molaga</i>	185.		
<i>Piper caudatum</i>	ibid.		
<i>Piper longum</i>	ibid.		
<i>Piper longum Monardis</i>	186.		
<i>Piper longum Clusii</i>	ibid.		
<i>Piper ex Florida</i>	187.		
<i>Piper Aethiopicum siliquosum</i>	ibid.		
<i>Pisum in genere ex veteribus & neotericis</i>	295.		
<i>Pisa potissimum vulgaris, parum, alba, siue arvensis</i>	297.		
		<i>R</i>	
		<i>Radix Quinbaya.</i>	151.
		<i>Radix purgativa Indica maltalita</i>	ibid.
		<i>Radix Caroli sancti, folijs Lupuli</i>	153.
		<i>Radix Malace quaedam toxicis sagittis resistens</i>	175.
		<i>Radix S. Helena Galanga species:</i>	740.
		<i>Rapunculus vulgaris campanulatus</i>	798.
		<i>Rapunculus gentis folio serrato rotundiore</i>	798.
		<i>Rap. montanus, siue Franchellum montanum</i>	808.
		<i>Rap. spicatus siue comosus albus & ceruleus: istemque folio maculato</i>	809.
		<i>Rap. siue globoso purpureo</i>	810.
		<i>Rap. minus folio tenui gramineo</i>	ibid.
		<i>Rap. Alpium paruum comosus</i>	811.
		<i>Rap. comoso spicato aliquatenus affinis ex Baldo</i>	ibid.
		<i>Rap. Sonchi facie umbellatus</i>	ibid.
		<i>Rap. Creticus Petro-marula</i>	ibid.
		<i>Rapum setium rotundum & oblongum</i>	818.
		<i>Rapum sylvestre pygmae apia veteribus</i>	841.
		<i>Rapum sylu. Matthioli</i>	ibid.
		<i>Rapistrum flore luteo</i>	844.
		<i>Rapistrum Monospermon</i>	845.
		<i>Rapistrum genus Autriacum</i>	846.
		<i>Rapistrum flore albo striato, sinapi agreste album Trago</i>	851.
		<i>Raphanus</i>	846.
		<i>Raphanus Byzantinus</i>	850.
		<i>Raphanus Ramula Cretensis dicta</i>	ibid.
		<i>Raphanus sylu. veterum</i>	ibid.
		<i>Raphanus sylu. Matthioli</i>	ibid.
		<i>Raphanus sylu. siue Armoraci à multis</i>	851.
		<i>Raphanus aquaticus Tabern.</i>	867.
		<i>Radicula sylu. siue palustris</i>	866.
		<i>Rhapenticum</i>	986.
		<i>Rhabarbarum</i>	ibid.
		<i>Ribes vulgaris acidus rubens</i>	97.
		<i>Ribes vulgaris acidus, album baccas ferens</i>	98.

INDEX

<i>Ribes flore rubente</i>	ibid.	<i>Saccharum Candum</i>	938.
<i>Ribes monocarpus</i>	ibid.	<i>Saccharum Candum violaceum</i>	937.
<i>Ribes Alpinus dulcis</i>	ibid.	<i>Saccharum Penidum</i>	938.
<i>Ribes nigrum dictum folio olente</i>	ibid.	<i>Saccharum candum rosaceum</i>	ibid.
<i>Ribes verum Arabum</i>	99.	<i>Saccharum cinnamomeum</i>	ibid.
<i>Ribes Rauwolfii, aut illi congener planta</i>	100.	<i>Saccharum Albeifar</i>	ibidem.
<i>Rosmarinus sylvestris quorundam</i>	23.	<i>Satyrium quorundam Erythronium bifolium flore unico</i>	680.
<i>Rosmarinus sylv. deoquor Clusio.</i>	24.	<i>radiato albo & purpureo</i>	680.
<i>Rosm. sylv. minor Camerary</i>	ibid.	<i>Satyrium veteribus in genere</i>	755.
<i>Rosm. Coronarius fruticosus</i>	25.	<i>Satyrium Erythronium Matth.</i>	779.
<i>Rosa.</i>	27.	<i>Scammonia Monspeliaca flore parva</i>	136.
<i>Rosa rubra, flore valde pleno, & semipieno, & simplici</i>	34.	<i>Scammonia & Scammonium veterib. & in genere</i>	160.
<i>ferè</i>	209.	<i>Scammonia Syriaca flore maiore consualuili</i>	165.
<i>Rosa Hierico</i>	35.	<i>Scammonium, succu Scammonia densatus</i>	164.
<i>Rosa Achantos, flore pleno: coloris rubelli</i>	ibid.	<i>Scorpioides Leguminosa</i>	349.
<i>Rosa sine spinis, colore penè secum vius rubri</i>	35.	<i>Scorpioides leguminosa altera</i>	350.
<i>Rosa pumila Panonica flore rubello</i>	ibid.	<i>Scopa Regia veterum</i>	868.
<i>Rosa sylv. rubella parva frutice</i>	36.	<i>Scorpioides ex sententia veterum</i>	898.
<i>Rosa rubello flore maiore multiplicato sue pleno, in-</i>	37.	<i>Scorpioides siliqua Campode hispida</i>	ibid.
<i>carnata vulgo</i>	ibid.	<i>Scorpioides montanum</i>	899.
<i>Rosa folio crispo, flore rubello sue incarnata</i>	ibid.	<i>Scorodolaspis Valsis Alaroandis</i>	938.
<i>Rosa rubella sue incarnata similis</i>	ibid.	<i>Scorodoprasum dictum</i>	358.
<i>Rosa Prænsina alba versicolor</i>	ibid.	<i>Schænanthus sue Iuncus odoratus</i>	915.
<i>Rosa Hollandica rubella, plena quibusdam centifolia</i>	ibid.	<i>Scilla veteribus</i>	614.
<i>spinofo frutice</i>	38.	<i>Scilla rufa magna vulgaris</i>	615.
<i>Rosa centifolia Batavica altera</i>	ibid.	<i>Scilla magna alba</i>	618.
<i>Rosa poma spinosa, folio hirsuto</i>	ibid.	<i>Scythice radix veteribus</i>	328.
<i>Rosa pomifera Venetijs, Sprengeri, folio hirsuto</i>	ibid.	<i>Securidaca flore luteo, siliqua lata oblonga</i>	345.
<i>Rosa spinosissima hirsuta</i>	ibid.	<i>Securidaca altera sue minor</i>	347.
<i>Rosa minor rubello multiplicato flore asperis spinis</i>	ibid.	<i>Securidaca genus Triphyllum</i>	373.
<i>aristata</i>	39.	<i>Secale</i>	416.
<i>Rosa cinnamomea floribus subrubentibus spinosa</i>	ibid.	<i>Secale latifolia C. Baub.</i>	417.
<i>Rosa rubello flore parvo, simplici, non spinosa</i>	40.	<i>Secale luxurians C. Baub. quid?</i>	ibidem.
<i>Rosa sylv. pomifera Lobelia, flore rubello, sine spinis</i>	41.	<i>Seriphium Germanicum sue Sophia quibusdam</i>	886.
<i>pumila, eadem forte cum præcedenti</i>	42.	<i>Sesamum veteribus</i>	895.
<i>Rosa pumila spinosissima folijs Pimpinella, glabri</i>	43.	<i>Sesamum</i>	896.
<i>flore albo</i>	44.	<i>Senecio sue Erigeron veteribus</i>	1041.
<i>Rosa spinosissima pumila flore rubro</i>	ibid.	<i>Senecio vulgaris sue Erigeron</i>	ibidem.
<i>Rosa arvensis Tabern. spinosa</i>	ibid.	<i>Senecio hirsutus, viscidus, maior, odoratus</i>	1042.
<i>Rosa minima</i>	ibid.	<i>Senecio folio non lacinato</i>	1043.
<i>Rosa folijs odoratis Eglantina dicta</i>	ibid.	<i>Senecio sue Erigeron, ceruleus, alijs Conyza cerulea</i>	ibidem.
<i>Rosa Eglantina flore pleno</i>	45.	<i>Sicyopepon compressus rotundus, Melonis effigie</i>	216.
<i>Rosa sylvestris, folio Eglantine virente, albo flore &</i>	46.	<i>Zizucor, Zizuc, Zizuc, Zizuc, Zizuc, Cucumis</i>	218.
<i>rubello</i>	47.	<i>Pepo, & Melopepon, veteribus & neotericis</i>	218.
<i>Rosa sylv. alba cum rubore, folio glabro</i>	48.	<i>Sisyrinchium veteribus</i>	707.
<i>Rosa sylv. folio glabro, flore plane albo</i>	49.	<i>Sinapi veteribus & in genere</i>	892.
<i>Rosa sylv. alba, cum aliquo rubore, folio hirsuto</i>	50.	<i>Sinapi siliqua latiuscula glabra semina rufa, sue vul-</i>	895.
<i>Rosa candida plena & semiplena</i>	51.	<i>gare</i>	896.
<i>Rosa latifolia</i>	52.	<i>Sinapi album siliqua hirsuta, semine albo & rufa</i>	897.
<i>Rosa humilis</i>	53.	<i>Sinapi Erythra Trage cognatum sue sinula</i>	898.
<i>Rosa moschata maior</i>	54.	<i>Sinapi sylvestre Monspeliolanum</i>	ibid.
<i>Rosa moschata minor flore simplici</i>	55.	<i>Sinapi Geneuense sylvestre</i>	ibid.
<i>Rosa moschata minor flore pleno</i>	56.	<i>Sinapi Monspeliolanum siliqua aspera hirsuta</i>	ibid.
<i>Rosa Succarina plena</i>	57.	<i>Sinapi Echinatum</i>	ibid.
<i>Rosa lutea</i>	58.	<i>Sinapi agreste flore purpureo</i>	866.
<i>Rosa lutea flore pleno</i>	59.	<i>Sinapi aquaticum Pataninum</i>	867.
<i>Rosa subviridis & carulea</i>	60.	<i>Sisymbrium Cardamine, sue Nasturtium aquat.</i>	884.
<i>Rosa semper virens Clus.</i>	61.	<i>Sisymbrium Cardamine sue Nasturtium aquaticum</i>	885.
<i>Rosarum collectio, delectus, repositio, & substitutio</i>	62.	<i>flore maiore elatius</i>	886.
<i>Rosarum virens & visu</i>	63.	<i>Sisymbrium Cardaminis species quedam insipida</i>	887.
<i>Rubus maior fructu nigro</i>	64.	<i>Stum seu Lauer Matth. siliquosum</i>	888.
<i>Rubus minor fructu ceruleo</i>	65.	<i>Sisymb. cardamine hirsutum minus flore purpureo</i>	889.
<i>Rubus Idæus spinosus fructu rubro, & albo</i>	66.	<i>Smilax aspera</i>	115.
<i>Rubus Idæus non spinosus</i>	67.	<i>Smilax aspera minus spinosa fructu nigro</i>	116.
<i>Rubus sine spinis Valentinus</i>	68.	<i>Smilax affinis Salsaparilla</i>	117.
<i>Rubus Alpinus humilis</i>	69.	<i>Smilax aspera Zacynthi Alpino</i>	ibid.
<i>Rubus Idæus minor affinis Chamaemorus</i>	70.	<i>Smilax laevis veteribus</i>	114.
<i>Rubi facie fenticosa planta Lobelia</i>	71.	<i>Smilax bortenfis</i>	255.
	72.	<i>Smilax bortenfis, sue Phasiolus Anagyridis similis ferè</i>	161.
<i>S</i>	73.	<i>colore rubescens</i>	1005.
<i>Sapa sue Hepsema</i>	74.	<i>Sonchus oleraceus latifolius</i>	1005.
<i>De Sambach seu Zambach & Lasmino quadam in-</i>	75.		
<i>genere</i>	76.		

INDEX

<i>Sonchus minus laciniosa minor, sive minus spinosa, & asperior sive spinosior</i>	1014.
<i>Sonchus laciniosus non spinosus & spinosus</i>	1015.
<i>Sonchus repens, multis Hieracium minus</i>	1017.
<i>Sonchus affinis Terracrepola</i>	1018.
<i>Sonchus lanatus Delechampy</i>	1016.
<i>Sorbi</i>	
<i>Sorghi album, Melium Indicum, Dota,</i>	447.
<i>Soldanella montana quibusdam</i>	448.
<i>Spartium spicatum, pungens, Oceanicum</i>	817.
<i>Spartium maritimum, sine Oceanicum latifolium.</i>	511.
<i>Spartium parvum Lobelia</i>	512.
<i>Sparganium quibusdam</i>	513.
<i>Sparganium alterum</i>	541.
<i>Sparganium minimum Bauhin.</i>	ibid.
<i>Sparganium Placca Narcissi simile flore albo Lilij</i>	ibid.
<i>Spatula foetida, spicisque Xyris</i>	663.
<i>Spinachia mas & semina</i>	731.
<i>Spinachia tenuis non pungens, folio maiore rotundiore</i>	963.
<i>Symphonie Dalech. que Amaranthus tricolor</i>	964.
	970.

T


<i>Telebium veteribus</i>	889.
<i>Telebium Scorpoides</i>	ibid.
<i>Tetragonolobo Loto similis filiqua</i>	359.
<i>Thlaspi angustif. Fuchs. Nativum sylv. Io. Bauh.</i>	914.
<i>Thlaspi ceterib. & in genere</i>	920.
<i>Thlaspi vulgatum</i>	921.
<i>Thlaspi apiculatum hirsutum</i>	922.
<i>Thlaspi cum filiquis laetis</i>	923.
<i>Thlaspi Creticum quibusd. flore rubente & albo</i>	924.
<i>Thlaspi umbellatum arvense amarum</i>	925.
<i>Thlaspi parvum umbella o flore nuce odorato</i>	925.
<i>Thlaspi umbellatum tenuius diuiso folio amaranthi Narbonense</i>	ibid.
<i>Thlaspi folijs globularia</i>	926.
<i>Thlaspi folijs globularia affine sine Alsinefolia cu Myagris folijs</i>	ibid.
<i>Thlaspi capsula cordata peregrinum</i>	927.
<i>Thlaspi minus quibusdam, alijs Alisson minus</i>	928.
<i>Thlaspi montanum luteum</i>	ibid.
<i>Thlaspi montanum minimum Monspeliensium folio laciniato</i>	929.
<i>Thlaspi capsulis sublongis incanum</i>	ibid.
<i>Thlaspi semper urens species candida</i>	930.
<i>Thlaspi fruticosum alterum Lob.</i>	ibid.
<i>Thlaspi fruticosum folio Leucoij marini minoris</i>	931.
<i>Thlaspi folio Alitaria</i>	932.
<i>Thlaspi Alexandrinum Cortusi Io. Bauh.</i>	933.
<i>Thlaspi hederaceum</i>	ibid.
<i>Tigridis flos</i>	684.
<i>Tormentilla</i>	398.
<i>Trasi</i>	504.
<i>Trasi minores</i>	506.
<i>Tragos</i>	415.
<i>Tragos duplex Casalp.</i>	361.
<i>Tragorchis minore flore fuliginoso</i>	764.
<i>Trachelium minus multis</i>	800.
<i>Trachelium ramosum florib. plerisque singularibus</i>	801.
<i>Trachelium minoris species duas, sine Rapunculus sylv. umbellatus maior & minor Thalis</i>	ibid.
<i>Trachelium minus album</i>	ibid.
<i>Trachelium altissimum hirsutum asperius, folijs angustis, floribus parvis</i>	ibid.
<i>Trachelium minus petraum</i>	ibid.
<i>Trachelium maius, petrae Pomae simile, si non idem</i>	802.
<i>Trach. Tragopogi folio montanum Fab. Columnne</i>	ibid.
<i>Trachelium sine Viola Calahisiana Herb. Angl.</i>	ibid.
<i>Trachelium candidum Anglicum minus, folijs fere Diuiliis vel Campanula</i>	807.


<i>Trachelium pumilum Alpinum, lanugine glaucasans singulis florib. ex singulis ramulis satis magnis</i>	809.
<i>Tragopogon sine Barba hirci veteribus</i>	1058.
<i>Tragopogon flore luteo, purpureo, ac puniceo</i>	ibid.
<i>Tragop. folio laciniato flore pallido, & Monspeliense flore luteo</i>	1059.
<i>Tragop. folio gramineo flore albo & luteo cum tantilla purpura</i>	1060.
<i>Tragop. Hisp. sine Scorzonera aut Scorzonera</i>	ibid.
<i>Tragopog. species, sine Scorzonera humilis latif.</i>	1061.
<i>Tragop. species, sine Scorzonera humilis angustif.</i>	ibid.
<i>Tragop. species sine Scorzonera maior angustif. subcaeruleo flore</i>	1062.
<i>Tragop. spicatus tenuis.</i>	ibid.
<i>Trifolium minus & minus</i>	1064.
<i>Trif. capitulo glomerato rigido</i>	378.
<i>Trifolium albo-incarnatum spicatum, Lagopus maximum</i>	376.
<i>Trif. angustif. Hispan. sine Lagopus angustifolium flore alme rubente</i>	377.
<i>Trif. glomerulis Personata Chertleri</i>	ibid.
<i>Trifolium parvum rectum flore glomerato cum unguiculis</i>	378.
<i>Trif. cuius caules ex geniculis glomerulos oblongos profertunt</i>	ibid.
<i>Trifolium glomerulis tomentosis, per caulium longius, dinem</i>	379.
<i>Trif. folliculaceum, vesicarium minus purpureum</i>	ibid.
<i>Trifolium caule nudo glomerulis glabris: & alme parvum cum glomerulis, lignosum.</i>	ibid.
<i>Trif. parvum quoddam sine lotus pratense purpureum Dalech.</i>	ibid.
<i>Trif. maius albo flore incarnum Clus.</i>	380.
<i>Trif. pratense flore albo minus, & sem. glabrum</i>	ibid.
<i>Trifolium parvum Monspeliensium pilosum cu paucis floribus</i>	ibid.
<i>Trifolium pratense luteum mas flore minore, semine multo</i>	ibid.
<i>Trif. affine quadrif. Phœum Lob.</i>	ibid.
<i>Trif. pratense album a Fuchs. depictum, sine mas</i>	ibid.
<i>Trifolium Terrestris</i>	381.
<i>Trifolium argentatum florib. luteis</i>	382.
<i>Trifolium rectum Monspeliensium</i>	383.
<i>Trif. album rectum bisulcum valde</i>	384.
<i>Trif. Halicacabum, sine vesicarium</i>	385.
<i>Trifolium in genere</i>	386.
<i>Trifol. sine Lotus Hieracum, edulis, filiquosa</i>	387.
<i>Trifol. Asphaltum sine bituminosum odoratum, & non odoratum</i>	388.
<i>Trifolium Americanum</i>	389.
<i>Trif. odoratum sine Melilotus vulg. flore luteo</i>	390.
<i>Trif. Italicum sine melilotus Italica Corniculis incurvis</i>	391.
<i>Trif. pratense, & Lotus prat. veterib. & in genere</i>	392.
<i>Trif. maculata & acris</i>	393.
<i>Trif. purpureum vulgare</i>	394.
<i>Trif. purpureum minus, folio & spica longiore & brevior</i>	395.
<i>Trif. maius Clus. secundum, non albi, sed rubri</i>	ibid.
<i>Trif. maius rectum purpureum Clus.</i>	ibid.
<i>Trif. montanum minus Thalis, purpureum</i>	ibid.
<i>Trif. alpinum Reticum Astragaloides</i>	396.
<i>Trif. stellatum purpureum Monsp.</i>	ibid.
<i>Trif. angustif. spicatum</i>	397.
<i>Trif. pratense luteum semina, flore pulchrior, sine Lupulino</i>	398.
<i>Trif. saxatile hirsutissimum sine argenteum</i>	ibid.
<i>Trifolium petiatum Creticum</i>	399.
<i>Trif. cochleatum marinum, Medica marina</i>	400.
<i>Trif. aculeatum Creticum</i>	401.
<i>Trif. palustre</i>	402.
<i>Trif. hepaticum sine Trinitatis herba, flore carul.</i>	ibid.


INDEX.

<i>Trif. hepatic. sue Trinitatis herba flore rubro</i>	390.	<i>Typha palustris media</i>	340.
<i>Trif. hepatic. flore pleno</i>	ibid.	<i>Typha minor</i>	ibid.
<i>Trif. Affinis Anonis pusilla glabra fruticans Cherl.</i>	394.		V
<i>Trif. Affinis Anonis minima hirsuta Cherleri</i>	ibid.	<i>Vella Eruca folijs flore violaceo</i>	865.
<i>Triticum veteribus & in genere</i>	399.	<i>Vitis vinifera</i>	67.
<i>Triticum vulgare glumae eritrande deponens</i>	407.	<i>Vitis folio Apij</i>	73.
<i>Tritic. cum multiplici spica glumae facile deponens</i>	ibid.	<i>Vini genera tria</i>	87. & 88.
<i>Tritic. rufum Hexastychon</i>	408.	<i>Vini genera varia : Vini natura : Vina factitia : Vin-</i>	
<i>Tritic. dictum Far Clusinum Dalech.</i>	408.	<i>na marina : Vinum melitense</i>	88.
<i>Tritic. cinericeum maximis aristis donatum, eritrande</i>		<i>Vitis sylvestris</i>	125.
<i>glumae deponens</i>	ibid.	<i>Vitis alba sue Bryonia</i>	143.
<i>Tritic. speciosum grano longo</i>	410.	<i>Vitis nigra quibusdam</i>	147.
<i>Triticum sylv. Agriostari Cretenfibus</i>	ibid.	<i>Vicia vulgaris sativa</i>	310.
<i>Triticum Indicum</i>	453.	<i>Vicia alba semine</i>	311.
<i>Triticum Peruvianum album longum</i>	454.	<i>Vicia vulgaris sylv. semine parvo, & nigro frugum</i>	312.
<i>Tuberaria nostras</i>	pag. 12.	<i>Vicia sylv. quasi incana flore albo</i>	ibid.
<i>Tuberaria maior Myconi</i>	ibid.	<i>Vicia sylv. flore albo alia</i>	ibid.
<i>Tuberaria minor Myconi</i>	23.	<i>Vicia luteo flore sylv.</i>	313.
<i>Tulipa sine Lilionariffina</i>	663.	<i>Vicia sepium perennis</i>	ibid.
<i>Tulipa praecox flava</i>	666.	<i>Vicia lutea cum galea fusca</i>	314.
<i>Tulipa praecox rubra</i>	ibid.	<i>Vicia multifolia cum latis siliquis</i>	ibid.
<i>Tulipa praecox alba</i>	ibid.	<i>Vicia multiflora perennis, nemorensis, sue dumeto-</i>	
<i>Tulipa praecox purpurea</i>	667.	<i>rum</i>	ibid.
<i>Tulipa praecox varia</i>	ibid.	<i>Vicia praua, sue Cracca minor, cum multis siliquis</i>	
<i>Tulipa praecox lutea varia</i>	ibid.	<i>hirsutis</i>	315.
<i>Tulipa praecox rubra varia</i>	668.	<i>Vicia sue Cracca minima species, cum siliquis glabris</i>	
<i>Tulipa praecox alba varia</i>	ibid.	<i>ibid.</i>	ibid.
<i>Tulipa praecox purpurea varia</i>	669.	<i>Vicia sylv. maxima pifo sylvestri similis</i>	ibid.
<i>Tulipa praecox Amethystina varia</i>	670.	<i>Vicia aliqua</i>	316.
<i>Tulipa serotina</i>	ibid.	<i>Vicia sylv. cum Lentis siliqua</i>	ibid.
<i>Tulipa serotina flava cui quatuor folia in Caulis</i>	671.	<i>Vicia parvum genus, folio longo</i>	ibid.
<i>Tulipa serotina rubra</i>	ibid.	<i>Vicia pulchrum genus multifolium, sine species quibus-</i>	
<i>Tulipa dubia</i>	ibid.	<i>dam</i>	ibid.
<i>Tulipa coccinea holosericea</i>	ibid.	<i>Vicia que pinine Anguillare, lata siliqua, flore lu-</i>	
<i>Tulipa dubia secunda media prima</i>	672.	<i>teo</i>	ibid.
<i>Tulipa tertie medie secundum genus, flore precocibus</i>		<i>Vicia folijs Aracus Anguillare</i>	317.
<i>equali</i>	ibid.	<i>Viola Mariana Dodones, quibusdam medium.</i>	804.
<i>Tulipa balisifera</i>	674.	<i>Virga aurea vulgaris latifolia</i>	1062.
<i>Tuliparum icones ex Lobelio, diversa ab ijs que Clusiba-</i>		<i>Virga aurea Solidago Sarracenica latif. serrata</i>	1063.
<i>bet in postrema historia</i>	ibid.	<i>Virga aurea angustif. sine Solidago Sarracenica</i>	ibid.
<i>Tulipa lutea obusis foliis florum</i>	ibid.	<i>Virga aurea sine Solidago angustifolia affinis lingua</i>	
<i>Tulipa Phoenicea luteis oris, flore spatulo</i>	675.	<i>aus Dalechampi</i>	ibid.
<i>Tulipa Coccinea Pannicave rutilans</i>	ibid.	<i>Volulus terrestris</i>	160.
<i>Tulipa coccinea candidis oris</i>	675.	<i>Vilago</i>	418.
<i>Tulipa rubra oris & vaginulis albis</i>	ibid.	<i>Vulneraria rustica</i>	362.
<i>Tulipa nivea tota</i>	ibid.	<i>Vna monstrofa barbata</i>	75.
<i>Tulipa candore & rubore confusa</i>	ibid.	<i>Vna passa</i>	85.
<i>Tulipa pumiles</i>	676.		Z
<i>Tulipa minor lutea Narbon.</i>	677.	<i>Zea in genere ex veteribus & neotericis</i>	410.
<i>Tulipa Hispanica Narbonensis</i>	678.	<i>Zea sine Spelta</i>	412.
<i>Tulipa lutea Bononiensis</i>	ibid.	<i>Zea verna Immer</i>	413.
<i>Tulipa pumilio angustifolia alba</i>	ibid.	<i>Zea monococco, Briza quibusdam</i>	413.
<i>Tulipa pumilio alba altera Lusitanica</i>	674.	<i>Zedoaria</i>	741.
<i>Turritis pulchra nova</i>	837.	<i>Zingiber & eius Siliqua</i>	743.
<i>Typha palustris maior</i>	339.	<i>Zingiber Alchemilla, rara varietas</i>	746.









RARE
FOLIO
QK
41

B34

1650 v.2

Inv#
71

